

REVERBUNTUR TE QUAMDIU ERIT
SOLE ET DURANTE LUNA. PSALM. LXXII. 5.



HISTORIÆ
PLANTARUM
UNIVERSALIS

Tomus III.

Auctoribus

JOHANNES BAUHINO,

Archiatro.

JOH. HENRICO CHERLERO,

Doctore:

Basiliensibus

Quam recensuit et auxit

DOMINICUS CHABRÆUS,

D. Genevensis

Jureis verò publici fecit,

FR. LUD. AGRAFFENRIED.

Dñs in Gerzensee etc.

EBRODUNI,

MDCLI.

*Affice medicum suis honoribus convenientibus usui ipsius :
etenim ipsum creavit Dominus. Eccle. XXXIX. 1.*



Conradt Mejer fecit. Tiguri.

REPRODUCED FROM THE
ORIGINAL MANUSCRIPT



HISTORIA
PLANTARUM
TOM. III.
JOH. H. VON CHERLENO
DOMINICUS CHABRIUS
ED. J. A. G. REINOLD
LUDWIG

3P
1557
/3

Res. VA

HISTORIA
PLANTARVM
VNIVERSALIS NOVA
ET ABSOLVTISSIMA
CVM CONSENSV ET DISSENSV
CIRCA EAS.

Auctoribus

IOH. BAVHINO ILL. CELS. VVIRT.
ARCHIATRO

ET

IOH. HEN. CHERLERO PHILOS. ET MED. DOCT.
BASILIENSIBVS.

Quam recensuit & auxit

DOMINICVS CHABRÆVS MED. DOCT.
GENEVENSIS.

Iuris verò publici fecit

FRANCISCVS LVD. A GRAFFENRIED.
Dominus in Gertzensee &c.

Continens

DESCRIPTIONES STIRPIVM EXACTAS, FIGVRAS NOVAS, EX IPSO
Prototype maxima ex parte depictas: earumdem Satum, Cultum, Mangonia: item Vires omni-
nas: Preparationes, Extractions, ac Distillationes præcipuas: Exoticarum Orien-
tis atque Occidentis, aliarumque ante nostrum seculum incognitarum,
supra mille Historias novas: Synonyma: Æquiuoca: Succe-
danca: & præcipuarum Linguarum appellationes.

In primis verò

PLACITA VETERVM GRAECORVM, ARABVM, LATINORVM.
& posterioris seculi Scriptorum:

INTERPRETATIONES AC CORRECTIONES SENTENTIARVM
obscurarum & deprauatarum.

Notantur ERRORES eorum qui de Plantis scripserunt: Ac continentur
pluraque omnia, quæ

THEOLOGI, IURISCONSULTI, MEDICI, PHILOSOPHI, HISTORICI, POETAE
Grammatici, Geoponici, Architecti, alique de Plantis promulgarunt.

Vt meritò omnium Herbariorum vicem supplere queat.

TOMVS III.

EBRODVNI.

CIO. IO. CLI.



PRÆPOTENTIBVS, NOBILISSIMIS,
GENEROSISSIMIS, STRENVISSIMIS, SPLEN-
DIDISSIMIS ET EXCELLENTISSIMIS

Dn. Dn. CONSVLIBVS, PRAE-
TORIBVS, AMMANIS, MAIO-
RIBVS, SENATORIBVS, CIVI-
BVS ET POPVLIS

FLORENTISSIMARVM RERVMPVBLICARVM, AC

CANTONVM

TIGVRI, BERNÆ, LVCERNÆ, VRIÆ, SVITÆ, VN-
DERVVALDIÆ, TVGII, GLARONÆ, BASILEÆ, FRIBVR-
GI, SALODORI, SCAPHVSII, ET ABBATISCELLÆ:

atque in genere

TOTI INCLYTÆ, POTENTISSIMÆ, ET
FOELICISSIMÆ

HELVETIORVM CIVITATI-



ELEBRET POTENTISSIMI
& EXCELLENTISSIMI
CANTONES, Pyramides
Memphis, Turrim Pharos, Muros
Babylon, Templum Ephesus, Co-
lossum Rhodus: celebrent prisca se-
cula præcellētiora reliqua sua omnia:
celebrent nostra sua Mirabilia: cele-

bret VESTRA HELVETIA tractus in quibus ita variant
tempestates, vt vnâ eademq; die in Hyemem, in Ver, & in Ae-
statem incidas: præcellos celebret montes in quorum verticibus
summis niues & gelu, depressioribus locis viridatia pascua, par-
tibus imis segetes maturæ: infinitæ alia celebret quæ miraculi
loco esse possint: Leuis hæc momentî, Nos maiora de magnis.

TOM. III.

Atheniensem Respublica quæ ex compluribus collecta erat Populis, Achæorum quæ duodecim constabat Urbibus, & Israëlita quæ tribubus totidem, internis breui confectæ fuere disfidis: In tot populis Vestris, moribus, studiis, & religioso cultu plurimum à se inuicē disitis, summa & perennis Concordia. Liberis Ciuitatibus minimè tutam cum summis Principibus familiaritatem pronuntiauit Græcæ princeps Eloquentiæ: VESTRÆ cum finitimis omnibus Monarchis innocentia fœdera. Aucta ad hæc in hocce temporū articulo Vestra foelicitas, asserta securitas, dum reciprocantibus procellis, incursionibus, præliis, & proscriptionibus totus lacerabatur Europæus Orbis: dum aræ, foci & penates armis incessebantur: dum sanguini eorū non parcebatur pro quibus fundendus erat sanguis: dū obmutescebat inter militaria signa Libertas: dum Aquilas suas Romanum horrebat Imperium: dum denique res eius eò redigebant alii, vt saluē esse non possent nisi beneficio seruitutis: alij verò durioribus id sanabant remediis quàm pericula erant. Sic mouistis gubernaculum **POTENTISSIMI CANTONES**, sic secundo vsi estis vento, sic aduerso restitistis, sic dubium & communem vobis vendicastis.

Hęc miramur, hęc suspicimus, hęc immortalitati consecrare annitimur: eoque præsertim, quòd, sæuiente vndique Marte, sic fuerit exulantibus Musis alylū aliquod, sic Apollini apud VOS litare licuerit, sic tandem emicuerit quæ diu latuerat Virtus, & conditam retegendi sit facta potestas.

Qui quasi Phisō omnia implet sua Sapiētia: Qui vt Euphrates ingenium fœcundat: Qui profert vt Lucem disciplinā cognitionis: Qui scientiam hominibus dedit vt in Mirabilibus suis gloriā consequatur, sub nouissimi seculi extrema præfulgēs excitarat lumen, IOANNEM scilicet BAVHINVM, Virum in omni scibili peritissimum, rei verò Herbariæ studiosissimum: Virum qui toto, nec breui, vitæ curriculo, in ea exornanda & perficienda ita diligenter & feliciter laborauerat, vt hac in parte *ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ, τὸ ἐν ἑαυτοῦ, τὸ ἐν ἑαυτοῦ* longè post se reliquisse omnium calculo meritò censeatur: Virum qui, factō apud Antiquos & Recentiores spicilegio, absolutissimam conscripserat plantarum

*Ecclesiast.
cap. 24*

rum historiam, Vnum quiddam ex multis, Concinitum ex dissonis: Virum qui, vt alter Phidias, ex auro, argento, ære, marmore, & viliori etiam materia, fecerat simulacra, qualia ex quacunque fieri optima poterant. Virum tandem, qui Naturæ ingressus sanctuarium, quæcunque in eius maiestate & penu speculatus erat, doctè, eleganter & dilucidè aperuerat. Sed perierant tantæ eruditionis viri Lucubrationes, resque penes irritos māsisset conatus, si non apud VOS renasci ipsi contigisset, nisi fouisset Lucina in ortus primordiis, si non in blandè obstetricantes manus incidisset.

VOBIS igitur POTENTISSIMI CANTONES natales ille debet suos: VOS meritò Patronos ac Mecanates suos nuncupat. NOS verò VNIVERSALIS eius PLANTARVM HISTORIAE Tertiam, Maximam, & Extremam Partem publici facturi juris, eā omni cum debita submissione splendidissimo NOMINI VESTRO inscribere gestimus. Sed PARTEM EXTREMAM, de qua, quod sapiens olim in genere, *Rei Finem meliorem esse Principio eius*, dicere auctus sumus. Plantas Spinis Armatas, Genti quæ libertatem armis assecuta, eam fortissimè tuetur. Plantas Umbelliferas, Genti apud quam ab hoc bellorum æstu penè exusti saluberrimum nacti sunt umbraculum. Plantas Coronarias, Genti quæ tutissimum censetur Coronarum præsidium. Plantas Lacte turgentes, Lacte & melle fluentis amplissimæ regionis Principibus. Plantas Galeatosferentes flores, strenuissimæ & bellicosissimæ Genti. Aquis gaudentes Plantas, Genti apud quam præcipuorum Europæ fluuiorum ortus. Plantas tandem in summis nascentes Alpibus, earundem Dominis.

In nostris nunc tantum est Votis, POTENTISSIMI CANTONES, vt VESTRIS sit accepta EXCELLENTIIS huius Operis Nuncupatio: Vestris dignum censeatur aris quod promimus Munus, humillimè nostræ Monumentum obseruantiae quod æternitati sacrum facimus: Velitis, jubeatis sub Auctoritatis Vestræ munimine à Liuis in iuriis tutum esse hunc Foetum.

Vt deinde protector & susceptor vester Deus vnanimi-
tem, & 45.

psalm 69

tem, pacem & prosperitatem perpetuet vestram: vt operian-
tur confusione & pudore qui Vobis mala quærunt, contur-
bentur qui vos turbant: vestrorum inimicorum conterantur
arcus, arma confringantur. Vt is tandem cuius ope tam sæpe,
tam fortiter, & tam foeliciter pro communis patriæ libertate
dimicuiſtis: Is qui confortauit feras portarum vestrarum, nec
fecit taliter omni Nationi, Vestra augeat in dies Magnalia, ita
vt, quemadmodum antehac, sic & deinceps, de Vobis sem-
per dicantur gloriosa: Fiat, Fiat, Exaudiat de habitaculo suo
Virtutum Dominus:

Vota sunt

POTENTISSIMI CANTONES,
EXCELLENTIIS VESTRIS

Humillimè deuotissimorum

FRANCISCI LVDOVICI à GRAFFENRIED
Ebrodunensis Ditionis pro tempore Præfæcti:

&

DOMINICI CHABRÆI M. D.
Illust. Celsit. Vvirtemb. à Consiliis Medicis,
Vrbisq; Ebrodunensis Medici ordinarij,

Ebroduni Helueticorum Calendis Septembr.

Anno reparata salutis M. DC. LII.

STANCES

SVR L'IMPRESSION DE LA GRANDE

Histoire des Plantes faite sous les Auspices de Noble &
Magnifique Seigneur, Monseigneur FRANÇOIS
LG VYS DE GRAFFENRIED Seigneur
de Gertzenzee, Baillif d'Yuerdon.

DONCQVRS par le moyen de ce MECENE illustre
En fin nous possédons ce précieux trésor,
Qui donne à la nature autant & plus de lustre
Qu'elle en peut recevoir des perles & de l'or,
Elle avoit réservé ceste mere chérie
D'estaller les beautés de sa tapisserie
Dans ce riche tableau qui doit ses premiers traits
A la main de Baubin, à un autre grand Maître
L'entier achèvement de ses plus beaux pourtraits,
La vie à cet Heros lequel l'a fait renaître.

Que doit à l'univers le Monarque Alexandre
Après l'avoir conquis étant victorieux :
Après tant de combats son corps réduit en cendre
Et rongé par les vers, est-il plus glorieux ?
Les sages que vient de sage & ce grand Maître
Auquel il confessoit de devoir son bien estre,
Luy ont bien élevé un plus auguste autel,
Lors que par son moyen ceste sçavante plume
Deservit autresfois au vif le naturel
De tous les animaux dans son docte Volume.

Quand ce grand Conquerant, cet Empereur Auguste
Eut annulé l'arrest donné par un Acheur
Contre ses divins vers, comme étant trop iniuste,
Et qu'il se fut porté pour leur grand protecteur :
A eul plus obligé le poëte Virgile,
Conservant son ouvrage, ou mesme aussi sa Ville,
Que soy mesme, vivant encor dedans ses Vers,
Qui ont gravé son nom au Temple de memoire,
Et fait briller l'esclat de son illustre gloire
Jusques aux derniers bords de ce grand Univers ?

Ainsi, ô grand Heros, imitant ces Monarques
Tu laisseras un jour à la posterité
De ta noble Vertu des glorieuses marques
Recevant le loyer que tu as mérité.
Tu éterniseras ton renom & sa gloire
Dedans les monuments de ceste belle Histoire :
Si tu peux rappeler un homme du tombeau
Qui pourra conserver dedans maints corps la vie,
Ne pourras tu produire un effet aussi beau,
Empêchant que la tienne aux tiens ne soit ranie ?

A π λ λ ε ς .

I.P. DAPLES Med.pract. Laus.
& prac. Class.

CLARISSIMO DOCTORI MEDICO

Dn. Dn. DOMINICO CHABRÆO
Plantarum Historiæ Restauratori meritiſſimo.

Epigramma Græcum:

Πρὶν πολλὰς θεραπεύει νόσους ἀντάξια πολλῶν
ὧμίνας Ἀρχίατιρ χερσὶν ἀλεγκάμοις.
φαίδμα· ἄλλ· ἴση Ἀ· σελήπ· αὐτὴς ἰστρος
Ταυρομένης Βοταίων βίβλοι ἐγέρως ἰλῶν.
Ἀ· τίς· ἔσχοι ἐπὶ ἄξια νόσων θεραπείας : οὐκ ἔστι
Νῦν δὲ κερὶς, μετ' ἄλλων θυμῷ πιήσει θίαν.

Epigramma Latinum:

ARs tua dat conclamatas producere lucas:
Quicquid & illa facit cuncta stupenda facit.
Eripere at tenebris & reddere Nomina luci,
Nomina in æternos pene sepulta dies,
Hoc opus, hic labor est, nobis miracula sunt hæc
Quæ superant cunctas nobilis artis opes.
Talia tu præstas, dum reddis pene sepulto
Bauhino optatum doctæ CHABRÆE diem.

Epigramme François:

TOIN Art peut prolonger la vie des humains,
Et nous faire admirer les œuvres de ses mains:
Mais pouvoit surmonter tant de fâcheux obstacles
Qui se sont opposés à son dessein si beau,
Lors que tu rappellois son Baubin du tombeau,
Cet œuvre incomparable approche des miracles.

Idem I.P. DAPLES Med. pract. Lauf
& prize. Claf




HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM LIBER XXV.

CAPITATE NON SPINOSÆ, VT SCABIOSÆ, IACEÆ, &c.
ET SPINOSÆ, VT CARDVI, &c.

PAPPVM & Carduorum florem dedit quidam dicunt, quod is quoque in lanuginosam quandam substan-
tiam, & veluti floccum factuscat. Preterius forte & apertius hoc genus quis spinosum dicat, si omnes species
aut differentia tales essent. Nunc quando spinis carentes multi, in ceteris nihilominus satis inter se affines vi-
dentur, in eo tamen potissimum cognatas sciat herbaria studiosus, quod capita, seu species quoddam insigne, se-
rant, qua deinceps dicuntur. Quamobrem Capitata generalissima voce dicere placuit, quorum maximum
numerus implebit Carduorum familia, tam Naturâ peculiari cura manente, multiplici modo: quippe hic
caulis, illic solum spinis obseptum horret: illic florem ac semen, & in plerisque pappum caulium summis & è
capitibus emicantem, nihilominus minacibus spinis munitionem videas: quæ omnia ingeniorum maxima, non se-
dum admirari, sed & rationculis scrutari, & ac denicibus coniecturis ventilare sunt ausa. Cui verò scire aut
absque indignatione scire Parentis suscitari nobis sit integrum, cur plantas spinis armaret: Succine doctos de-
ceat naturam examinare, nec certum ferre responsum? Eamus ulterius scrutatum, aliisque ratione eam pro-
nuocemus, certiora vtilioraque querendo, sed ea lege ac omne, ut eam tanquam ferilem, benignam, & salutife-
ram agnoscamus & admiremur. Carduis tamen præmissentes ac interuicentes alias capitatas, sed illis qua-
dam ratione cognatas.

DE SCABIOSIS.

CAPVT I.



VSQVAM reperimus Veteres
Scabiosæ meminisse, nisi fortè
aliqua ex Scabiosis quarum
magnam varietatem ex multis
vnius obseruauit Clusius, [qui
nullas provincias adire memi-
nit, in quibus earum peculiare

psa Actis aliquod genus non inuenerit,] sit Plora Acti,
quam cum nomine tantum expresserit, nullâ ad-
iectâ descriptione, de eo vix quicquam certi sta-
tui potest.

Pluribus autem plantis potest accommodari
Scabiosæ nomenclatio (non secus atque Plora
Acti) ut lacez, morsu Diaboli, ac similibus facie
& viribus. Nec desunt, qui Scabiosam eam esse
contendant, quæ Stæbe ab Antiquioribus inscri-
bitur. Sed horum error manifestatur. Scabiosam
enim vocatam non esse Stæben illud abundè
ostendit, quod hæc foliis constet laciniatis, sub-
hirsutis: caulibus tenuibus, cubitali altitudine, at-
que etiam maiore: in quorum cacumine flores
emicent in cæruleo albicantes: & in pratis, &
campestribus proueniat. At Stæbe folia ferat
aculeata, & in lacubus, stagnis, paludibus, aliisque
Tom. III.

locis aquosis nascatur. Vnde rectè Fuchsius, nec
rerum notæ, nec vltus, nec vlla ratio, conuincere
potest Scabiosam Officinis & vulgò dictam esse
Stæben.

Scabiosarum genera non leuibus de causis, vt
Clusio videtur, ad phyteuma Dioscoridis refert
Fab. Columna. Sed hæc Clusii opinio recipien-
da non videtur: Phyteuma Dioscoridis ad ama-
toria conuenire nonnulli prodiderunt: Scabiosæ
autem hanc facultatem esse concessam, nemo
prodidit.

Scabiosam igitur vt dictum, quidam Phyteu-
ma volunt, Stæben alii, alii Cirsium, sed frustra.
Actio vt Tabernamontano videtur *psa*, vel
psa dicitur: Lat. Plora & Herba apostematica,
Germ. Scabiosen / Scabiosen frucht / Apostemen
frucht / Pasemen frucht / & Grindfrucht / Belg.
Scabiose: Gall. Scabieuse. It. & Hisp. Scabiosa,
in Candia Strabo Cortho: Angl. Scabius: Boh.
Karpia: Hung. Sepren siu, quod ex ea scopas
faciant: Polon. Driafuctu / & Driafachi. *Scabiosa*
quidem secundum quosdam à scabro herba
habitu dicitur, quod vulgatè quidem conuenit,
iuxta verò alios quod scabiei medeatur, quod

*Phyteuma
Diosc. Col-
lumna.
Columna
refutatur.*

*Cirsium nō
est.
Nō mina
linguarum*

*Stæbe.
Error quo-
rundam
Stæbe non
est.*

vox plora prætendere videtur.

Locus
Collectio.
Tempus

N. scitur in campestribus & pratis. Colligitur mense Iunio, seruat per annum. Si aqua ex hac distillanda sit colligitur vnâ cum radicibus circa finem Maij. Floret Iunio, Iulio, Augusto: deinde semen profert.

Vires & vi-
sus
Pflora Gene-
rum.

Omnia Scabiosæ genera calidam & siccam temperaturam obtinent, authore Trago. Sed apud Veteres, si Plora sit, externis tantum corporis partibus, aduersus tumores & contractiones neruorum & venarum radix tusa emplastri instar apponebatur. Nostri vero Medici minus eam extollunt laudibus, & rectè quidem, autoritate nimium versuum quorundam nixi, quos S. Urbanum composuisse ferunt, qui sic habent.

Scabiosa.

Urbanus pro se nescit pretium [virtutes alij]

Scabiosa

Purgat.
Apostema.
Anthrax.
Pleuritis.
Modus a-
quâ distil-
landi & v-
tando.

Nam purgat pectus [caput ali] quod comprimit agra senectus.

Lenis pulmonem, purgat laterum regionem.

Abcessus [apostema ali] frangit si locum bibica rangit.

Tribus vniâ f. ris anthraxem liberat heris.

Herba vino decocti, pleuritico morbo medetur. Aduersus eundem morbum Maio mense Aquam distillare solent ex ea herba hoc modo. Scabiosam vnâ cum radicibus colligunt circa finem M. ii: contundunt & distillant in balneo aquæ feruentis: deinde per aliquot dies ponunt ad Solem, de qua propinant singulis vicibus potandam mensurâ ii aut iii. cochlearium, non tantum pleuriticis, sed & contra pectoris vitia & apostemata, tussim, pestem, omnisque generis thoracis affectus. Aqua hæc conseruatur per annum. Apostematibus alijs rursus è Scabiosis tale conficiunt medicamentum. Accipiunt manipulum Scabiosæ herbæ desiccata, dulcis radicis d. s. lectæ in minutas partes vnciâ vnâ, ficiis 12. seminis feniculi vnciam vnâ, seminis Anisi tantundem, Iridis vnciam dimidiam, quæ omnia per noctem in mensura aquæ macerant, postero illa die supra tertias decoquentes, postea verò Saccharo vel rosaceo melle indolcorant, vespertine ac mane calidum haustum inde præbent, quo Apostema maturari, emolliiri ac per tussim excreabile fieri affirmant. Succum Scabiosæ omnis generis scabiei, pforis & Lepre usurpatus per se vel in balneis vtilissimus est, quo etiam furescens capitis abiguntur, si cum eo caput abluatur. Pollere autem hanc imprimis aduersus scabiem, nomen illi inditum per se manifestat. In hunc autem usum non modò eius decoctum quotidie potandum præcipiunt: sed & herbæ ipsius succo, per se, aut in vnguentis addito, scabiosa corpora illinunt. Prodest omnibus pectoris vitiis, & respirationi interuentibus organis: quippe quæ & eorum inflammationes purulentas dissiciat, & omnia pectoris excrementa expurget. Anthracibus, siue Carbunculis pestiferis vtiliter illinitur: aded vtilita hos lethales abscessus trium horarum spatio prorsus abolere existimetur. Scabiosa porro herba est admodum mordax, cuius succus calidus impositus vulnibus sagittæ extrahit. Item ad carbunculos efficac, unde etiam in Germania nomen illi impositum Apostemenfrant. Extractum Scabiosæ efficac admodum in pulmonum affectibus, ac præsertim peripneumonias. Camerario commendauit C. Hoffmannus Archiater Ill. principis Elect. Brandenburgici. Scribit Arnol. de Villan. quicumque de nouo passus fuerit rupturam, si omni mane sumat de succo Scabiosæ vnc. ii. eum curatum ut infra nouem dies ad summum. In si-

gno sagittarij Scabiosæ radices eruendas præcipit Coler. & in taleolas oblongas scindendas, de filo suspendendas & resiccandas, & sicubi infans torminibus affligatur, vel etiam scabie labore, in potum demittendas: hunc enim iecur repurgare, & scabiosam cutem omnem decidere.

SCABIOSA MAIOR COMMVNIOR

hirsuta folio laciniato & non laciniato, & latifolia.


Inter Scabiosæ genera, vulgarissima est ea, quæ inter sata proueniens radicem habet longam rectam: caules sequicubitum & duos cubitos altos, admodum hirsutos, inanes, quibus sæpè plura capita insident: folia ex geniculis aduersa, carâ laugine pubescentia, formâ Valerianæ maioris, profundius subinde laciniata, aliâ minus, sapore

Descriptio

subacri: flores caruleos ex confertis corniculis quadripartitis congestos.

Hæc scabiosa aut mira biliter ludit aut differentias aliquas habet, quædam valde laciniata ut demonstrat icon nostra Fuchsiæ, quæ quædam folia habet iuxta radicem ferè pedem longa, quædam multò breuiora pro ratione loci ubi prouenit, quæ non sunt laciniata vel profundè diuisa, ac etiam vix versus superiora aut rariora. Icon nostra secunda, quæ ita sculpta empta quodammodò exprimit Scabiosam communem folio non laciniato: Est mihi inter siccas plantæ quædam latior & breuior folio hirsuto, quæ accedit ad iconem tertiam

Varietas aut lusus nature. Scabiosa non laciniata.



Scabiosa latior & breuior.

à nobis propositū, quæ etiâ iam sculpta enimus, non tamè omninò caret ramis, ut icon demonstrat.

De Scabiosis hæc nostris dubio procul loquitur Celsus, quando ait. Aliæ folio scisso constant, aliæ integro, quæ scissa ferunt folia in aruis potius similia altius inter stipulas nascuntur ex melle salp. relictas: caule cubitali, aut amphiore: ramis ad latera sparsi: paucis folijs, subhirsutis, utriusque diuisi, modò crassius ad similitudinem Cerretæ, modò tenuius ut papaueris spumæ: cacuminibus ramu-

Scabiosa folio scisso, et integro, Camerario.

Cerretæ

ramu-

Defi.

Succus.

Vitiis pectoris.

Vulnera.

Extractum Scabiosa

Ruptura.

Terminatio.



Piora Acti

Scabiosa
dissectifolia
maior Th.

Media

Scabiosa m.
trifolia
Thunb.Scabiosa
maior / ar-
vensis Gual-
tero Lob.Scabiosa al-
tera cam-
pestris Thunb.
sive se-
getum Lob.Scab. maior
flore ex ca-
eruleo purp.
Tab.

lorum capitulum insidet, in latitudinem suum, flosculis ad caeruleum vergentibus: seminibus aceruatis subhirsutis: radice singulari: tota planta admodum amara est, & subadstringens: putatur hæc, apud Actium Plora esse, cuius vltimo fumo arborum erucæ moriuntur.

Scabiosam comuniorem hirsutâ folio la-

cinato duplicem assignat Thalius, quas sic describit. Scabiosa 1. siue dissectifolia maior, foliis est in lacinias diuisis, Valerianæ sylvestris ferè modo, pilosis, caule sesquicubitali, flore ex cyaneo rubicundo, villosa, pratis familiaris. Quarta siue dissectifolia media, caule exurgit cubitali, hispida: folia circa radicem obtinens integra, paucas nonnunquam serratas incisiones in ambitu suscipientia, oblonga, nigricantia, pilosa, mucronata, quincunciali longitudine, fescunciali ferè latitudine: reliqua deinde profundas ac frequentiores incisiones ac in lacinias diuisiones admittunt, prioris istius generis speciei ritu, sed tamen illius folus multò sunt minora. Idem Scabiosam communem folio non laciniato ita depingit. Scabiosa 1. siue integri-folia, foliis nimirum neququam dissectis caulem protrudit cubitalem, hispidum, asperam, geniculatum: folia oblonga, plantaginis acutæ ferè, mucronata, asperiora, & pilis horridiora, quincunciali ferè longitudine (quâ radici videlicet ea propiora sunt,) vnciali autem latitudine & quandoque fescunciali, ac ex quolibet caulis geniculo bina semper ex aduerso sibi opposita, nihilque dentatæ vltimum impressionis omnino habentia. Quandoque tamen huius generis stirpibus quibuldam, rariore ac superficiales in ambitu quorundam foliorum eiusmodi impressiones apparent: sicuti & in minoribus foliis summum ferè caulis contingentibus, vna atque altera iuxta pediculum laciniata dissectio habetur. Flos huic speciei est ex cyaneo rubicundus, villosus. In pratis quandoque reperitur.

Scabiosa maior satorum vulgarior, siue Plora Actii dubitat in Aduers. Lobelius: pro qua in Obleru. p. 191. iconem habet hoc titulo: Scabiosa maior satorum: Quæ icon minis placet nostrâ Fuchianâ, pro Scabiosa vulgari: videntur enim in ea quædam folia multum ad Centaurium collinam accedere: quantum capitula differant. In Icon. autem Plant. hæc figura est p. 536. sub inscriptione: Scabiosa maior satorum vulgarior. Sed præter hanc alia rursus ponitur p. 537. sub hoc titulo. Scabiosa altera campestris siue segetum & satorum. Et hæc sanè melius exprimit nostram vulgarem Scabiosam.

Tabern. Icon. p. 158. & Hist. p. 546. Scabiosa 2. siue maior flore ex caeruleo purpureo, Gross. Porperblaw Scabiosen / Ader Scabiosen. Item Icon. p. 159. & Hist. p. 547. Scabiosa arvensis siue

segetalis, sexta in Hist. Ader Scabiosen, in omnibus similis secundæ, exceptis foliis maioribus in caulibus.

C. Bauh. Phyt. Scabiosa 1. siue Officinarum hirsutissima solus modo crassius, modò tenuius vtrinque diuisis: flore ex caeruleo: alio Bersilico colore tincto: hinc duæ figuræ apud Tabernamontanum. Item: Scabiosa 7. siue maior sator. vulgarior Lobelii. Tabern. non distinguit suam Scabiosam maiorem ab arvensi colore, Tragus id quidem fecit: Lobelius dicit suam Scabiosam maiorem satorum hirsutam non glabram, cur igitur traditur à C. Bauhino pro specie particulari. Is apud Matth. ait, Scabiosa 3. siue Officinarum, quæ hirsutissima est & notissima, omnibus in pratis & etiam inter segetes protinens, foliis modò profundius laciniatis, floris etiam colore variat.

Dicitur Scabiosa primum genus Trago: Scabiosa vulgaris Fuchsi. Scabiosa communis, Dodon. gall. Scabiosa, Lacunæ quoad descriptionem Lonici. Scabiosa maior, Castor. Tabern. & Camer. hort. Scabiosa maior vulgaris Penæ & Lobelii: H. Lugdunensi. Scabiosa vulgarior inter segetes nascens, Clusio: Scabiosa scabra hirsutaque Geln. hort.

Apollinatis sub inscriptione Apostemenfraur. vires tradit, sed figuram non vltimè ad bonam ponit, quæ exprimere videtur Scabiosam Fuchsi.

Scabiosam maiorem & communem Montbelgardi passim in segetibus, & in horto Il. C. VV. in monte Vitium la Chan in superiore parte dumetorum obseruavi florentem Iulio & Augusto. Hæcibi variat folio nunc non profundè inciso, nunc profundè laciniato. Item in colle è regione pontis ultra fluvium l'Altan dictum, fortè ab antiquis Alduadubis. Obseruavi Genevæ florentem Iunio, Lugduni Maio, Basileæ Augusto in monte propè Leurachin Fichelberg propè Balneum admirabile Ducatus Wirt. cum flore Septembri.

Lobel. Scabiosa maior satorum ad eandem ad quæ minor efficacissima: cordi, hepati & visceribus peramica, vt cuius succo epoto ternum vnciarum pondere cum Mithridatii aut Theriacis 9 ii. sudorem mouendo febres exitiales & pestiferæ etiam abiguntur. Omnes scorditates cutis vltima abstergit. Scabiosa scillo folio Cæsalpini tota admodum amara est & subadstringens: celebratur à Re- centioribus ad scabiem malignam, & lepram, tum potu succi eius, aut aquæ distillatæ, tum ablutione ex eius decocto, aut inunctione: necat lumbricos, dissecit abscessus internos, præcipuè thoracis & pulmonis: & interna vlcerà siccant: dantur aquæ distillatæ vncie tres singulis diebus ter vel quater ad thoracis abscessus, tussim, pestem, & venenâ, vlceribus quoque præhumidis opitulatur externis illita. Plura in genere diximus.

Icones duæ vltimæ incuriâ typographicâ his fuerunt transpositæ.

SCABIOSA MINOR VULGARIS.

Cvbitum altos caules tollit, inanes, propter terram rubelcentes, leuiter hirsutos, in alas diuisos: quibus insident flores ad caeruleum accedentes, Matth. caeruleo albicantes, conglomerati, quorum singuli in quinas lacinias, quarum vna maior, diuisi sunt: succedente capitulo aristis raris horrido, folia inferiora oblonga, Bellidis maioris ferè, serrata, superiora profundè ad costam incisa, singulis segmentis serratis, pinguis, atrouitencia, sapore lento & nonnihil acti: radix

Scab. arvensis siue segetalis Tabern. Scab. Offic. hirsutissima C. B. Scab. maior glabra eisd. C. B. lapsus Varis

Synonyma

Locus & tempus


Virg.

Lepra

Lumbrici

Vlcera

Descriptio



Scabiosa 3.
genus Eueh-
sis

Scabiosam quam minorem vulgarem voco, Fyghsia cum apud illum essem post. comm. scriptis Scabiosa; genus faciebat. Eandem Tragus tradit pro Scabiosa quinta & sexta: flos alteri ex caeruleo purpureus, alteri vero planè candidus.

Scabiosa
Marr.
Scab. minor

Mattheam pingie in prior. comm. nomine Scabiosam posticum mag. fig. Lat. & Ital. titulo, Scabiosa minoris, cuius plurimus sit usus: flos foliosi, caerulei coloris aut pallidi, qui deflorescentes, capitulum relinquunt subuolide: rotundis ocellis refectum, colore pavonum pennas imitante, tanto sanè naturæ artificis, ut diligenter rem insuetas in admirationem trahat. Idem in Hist. germ. & Epit. cum addit. Camer. ait, Scabiosa minor. Græcis ὀφύλιν: It. Scabiosa minore. Apoffementis Fraus: folius crescit inferioribus per ambitum denticulatus, humi accubantibus, subalbicantibus oblongis & subhirsutis, verum quæ in caule sunt, tenuiora, & magis diuisa spectantur. Caulem mittit tenuem, teretem, rectum, ramosum: flos caeruleos, supatos aut pallidos, è quibus capitula oriuntur colore subuolide: speciosis obducta ocellis: Radix est illi palmatis, multifida, subcandicansque.

Scab. minor
differt. fol.
Camer.
Scab. lanis
Germ.
Scab. minor
differt.
Thalio

Camer. hort. Scabiosa minor dissectis foliis. Gesn. hort. Scabiosa altera lauis, & ita etiam vocabat cum ei conuenerem.

Thalio in Hircynia Scabiosa minoris vulgaris plures differentias inueniri scribit, quæ ordine recensenda hic sunt. Scabiosa ergo eius 7. siue foliis Bellidis sylvestris maioris maior, sic nobis prima. Hæc caule assurgit cubitali, tereti, geniculato, cuius priora folia iuxta pediculos suos canaliculatos in aliquot laciniis profundius inciduntur, parte anteriori ipsius subrotundiori, ac in ambitu dentata: reliqua deinde (quorum semper bina ex vno geniculo è contrario sibi coherent) integra sunt, breui ac imbricato pediculo innixa, non infixa, in ambitu tantummodo serrata, vncias duas longa, vnam lata, colore ac serrata folia Bellidis sylvestris maioris exprimentia: post hæc superioris caulis parte, qua ipse brachiata adnata producere incipit folia alterius figura consistunt, tenuiora, in plures tenuiores ac angustiores laciniis diuisa. Flor huius speciei conglobatus est, caeruleus, Succisæ similis.

Huius minor species siue Scabiosa eius sexta obis secunda: Ex vna radice quæ nigra est, plu-

res profert tenuiores, teretes, ac dodrantes colliculos, non ita foliosos, ut prior, sed ferè prorsus nudos, nisi inferiore parte: Folia priora hinc sunt in breuioribus & canaliculatis pediculis, Bellidis sylvestris maioris foliis idem simili, propè pediculum laciniata ut plurimum, reliqua parte serrata: post quæ reliqua quæ deinceps sequuntur folia, diuersa ab aliis exitum forma, frequenter in tenues & strictiores laciniis diuisa: flores caerulei, conglobati.

Scabiosa eius 7 siue tenuifolia candida seu maior, quæ nobis minor tertia est: caule prodi cubitali, tereti, calami frumentacei crassitudine, lignosa, geniculis nodosis prædita: folia ei propè radicè sunt in oblongo & canaliculato, pediculo veluti incocta quadà constituta, in plures at tenuiores laciniis & per euidencia admodum à se utroque latere intervalla seunctas, ac in ambitu dentatas, diuisa, quorum pars extrema mucronem constituens latior est & crenata: quæ deinde superiori in parte caulis exoriantur, ea quantò subinde ferre sua breuiora fiunt, tantò & in strictiores laciniis dirimuntur: inter alas autem versus canis summum brachiola utrinque profiliunt, consimilibus sed longè breuioribus foliolis exornatas: flores deinde emergunt Scabiosæ nonnihil similes ex pallidiori flauedine albentes. Elegantior hæc est cæteris Scabiosæ speciebus omnibus.

Scab. Thalio
7 siue tenui-
fol. candida
maior

Scabiosa Thalio 8. siue tenuifolia media (4. minor nostra) Radicem obtinet nigram, multifidam, colliculos tenetiores, teretes, minus foliosos: folia priora multò minora quam prædictæ speciei, diuisa in laciniis tenues, latiores tamen paulò quam sunt foliorum reliquorum subsequentiū laciniis: quæ nimirum existunt admodum tenues & angustæ ac fœniculaceæ quodammodo: flores sunt ut prioris speciei.

Scab. Thalio
8 siue tenui-
fol. media

Scabiosa eiusdem 9. seu tenuifolia minima prioris [nobis 5.] colliculus est dodrantalus, teres, tenuis, prorsus nudus, propè radicem solummodo planta hac folia protrudente in canaliculatis pediculis, laciniata, breuiora cæteris duabus iam positis speciebus, ac tenuiora. In summo caulis, florem continet caeruleum in orbiculato capitulo succisæ simili, ex cuius ambitu extensius breuiora, quædam ac tenuiora progrediuntur sursum porrecta, adnata in brachiolorum exiguorum modum, semel geniculata ac bina ad geniculum ex aduerso locata folia, continentia, in quorum cuiuslibet summo aliud ac breuius florum emergit capitulum conglobatum ac caeruleum. Locis autem prodi aridioribus in collibus apricis ac meridionalem Solem excipientibus.

Scab. Thalio
9 siue tenui-
fol. min.

Est & 10. nobis 6. Scabiosa tenuifolia speciei, quam foliolam nominat author, propterea quod 10. foliolis colliculus qui ipsi dodrantalus est, ac geniculatus à radice vsque in summum cacumen folijs in frequentes, tenues ac fœniculaceas laciniis diuisis, eleganter exornatur, quorum ad quodlibet geniculum bina ex opposito sibi correspondent. Flos huius est in globum collectus, caeruleus: Huius autem libuit hic meminisse obiter, licet, quod Thalio sciat, in Hircynia ipsam nondum repererit: attamen in vicinis montibus non raro se conspicendam ea offert: nec dubitat admodum in ipsa Hircynia alicubi eam quoque existere.

Scab. Thalio
10 siue foliolam

De Scabiosa minore vulgari loquitur Lobelin Advers. ubi præteritur, Peristereon siue Columbaris dodrantalus in aquaticis, desiccans & adstringens, qualem Aegineta memorat, an sic

Scabiosa

Scabiosa minima tradēs eā foliis esse foliis Verbenaculuris per lūma alioribus, laciniolis, similibus tamen, & altera superficie albidis, ad terram stratis, latioribus, minoribus serratis. Caule plurimum surgit recto, pedē & cubitū alto, gracili, supernē in ramulos rectos sparsos: hilares flores, rotundi villosique, ex cælo cerulei vel glauci, Morlus Diaboli: semine compresso, radice pusilla quantum parvus digitus, parum fibrosa. Hæc plurimum, inquit, utuntur Montspelienses Pharmacopœi &c. Quod autem existimemus Lobelium trahere Scabiosā à nobis descriptam, Icon ab eo sita Obs. p. 190. & Icon. plant. pag. 575. titulo Scabiosæ minoris Adv. 131. nostram opinionem confirmat. Sed cur Clus. in Hist. sua positā iconem Lobelianā poluerit pro sua Scabiosa montana quanta ignoramus. H. Lugd. p. 1066. Scabiosa Matthioli minor.

Tabern. Icon. p. 160. Scabiosa minor 1. item pag. 161. Scabiosa minor 2. & Scabiosa minor 3. Adhuc p. 162. Scabiosa minor 4. Klein Scabiosen. Hist. lib. 2. p. 348. Scabiosa 3. siue minor 1. Scabiosa Scabiosa 10. siue minor 2. Scabiosa 11. siue minor 3. & p. 349. Scabiosa 13. siue minor 5. Item Hist. pag. 551. Scabiosa 20. & 21. absque iconē, quæ semper intelligenda, ubi simpliciter Scabiosa scribitur, flore ceruleo vel purpureo, interdum albo, Herbariorum semina, à qua mas parum differt. Ego existimo has quatuor Scabiosas esse tantum varietates ludentis naturæ Scabiosæ minoris vulgaris, nescio cur in Hist. pro 12. faciat 13. melius placet ordo in iconibus: Si quod existimat Frater Scabiosa 20. Tabernæmontani est eadem cum nostra vulgari minori Tabern. non debet separare à suis minoribus: an Tabernam. benè describat iudicent lectores.

C. Bauh. Phyt. Scabiosa 2. siue capitulo globoso maior, Scabiosa minor siue Columbaria eidem Icon. Plant. Phytoma Dioscoridis Columnæ. Variat floribus colore, qui communiter ceruleus, aliis purpurascens albus. Item, Scabiosa 3. siue capitulo globoso minor 1. 2. 3. & 4. Tabern. Variant tantum foliorum dissectionibus, alteri enim tenuissimè dissecta, ad mediū neruum: alteri non item: tertia etiam folia inferiora habet penitus non dissecta, cuius nomine 3. [imò 4. Frater non benè observat] apud Tabern. icones habentur. Item apud Matth. Scabiosa 2. siue minor, Scabiosa 10. Tabern. Scabiosa foliis Bellidis Thallio. Has duas cur C. Bauh. separat?

Scabiosā minimā prope Monspelii Agidiam portam adriuum, & agrorum margines, Norbonæ plurimā, ac etiam in Apenninis Bononiæ meminit Lobelius: Matthiolas minorem in pratis & campestribus, in agris non cultis, secus itinera, & in collibus terrenis. Phytumatis Columnæ Neapoli toto anno propter celi amœnitatem ubique visum per margines, videri, florida capitula visuntur, sed æstate magis. In horto Ill. C. Virt. sponte ac yrbi Montbelg. vicinis locis passim protenit florens Iunio. Hæc Scabiosa quibusdam in locis est valde parva, aliis in locis maior, & iuncea ferens caules cubitales vt Montbelgardi, ubi cum candido flore reperi. Quæ Montspeli prouenit satis parua est & hirsutius. Basileæ observavi florentem Augusto propè Leutach in monte, & quæ itur Mouten adhuc vegetam & florentem Octobri. Genève pulchre virentem Februarii principia quæ itur ad montem Saleuz, & alibi, vt prope flumini Arre florentem Maio. Tiguri quoque vidi Montbelgardi viret tota hieme.

Tom. III.

Sapore est amaro Scabiosa minor Matthioli Vires. vt in eiusdem Epit. cum addit. Camerarii videre licet: quare exsiccatur, extenuatur, abstergit, aperit, & crassa, lentæque expectoratur. Herba ipsa in puluerem pota, aut succus ex melle delinctus, pectus, & pulmones abstergit, crassaque, ac glutinosa per os eicit. Idem præstat eius decoctum potum, ac scabiem sanat. Id quod & succus facit in vnguentis additus. Folia crassa contusa, & pestiferis carbunculis admodum, mirifice eorum perniciem colercent: Datur vtiliter earundem succus quatuor vnciarum pondere, cum theriacæ drachma pestilentia affectis, prima statim die, verum à potione agros ludare oportet: & iterum, atque iterum medicamentum repetere. Datur item contra serpentium venenosorum morsus, herba verò exterius imponitur. Illius Scabiosæ succus cum Chrysololla, & Caphuræ momento, lentiginēs, alphas, impetiginēs, & ceteris cutis insectis abstergit, oculorumque per se, & cum succo Fœniculi, albugines delet. Scabiosa minimā Lobeli, plurimum venit Montspelienses Pharmacopœi propter inibi maioris Scabiosæ penuriam, non modò ad sanguineum serum putridum educendum, descandendumque, & Thoracopulmonesque congerie pituitosa expediendum: sed etiam ad Morpheas Arabicasque Elephantiasas, & Græcorum lepras squammulæve, reprimendas, item impetiginēs, sacri ignis excretionēs, pruritus, cutisque scabies scindas: Tineam ablunt lixiuio, in quo maduerit aut decocta fuerit Scabiosa. Succo vitæ Tragur. Dioscorides hanc ad amatoria vtilem esse scripsit, sed modum omisit, quare incognitus adhuc erit, præsertim cum potius magica, quàm physica facultate hoc efficere possit, sicuti in aliis, quæ appensæ collo, vel domui, vel tectæ, vel simili modo viles ad aliquid esse prædicantur.

SCABIOSA PROLIFERA.



NVlquam Locis Descriptio
spontè nascentem conspexi (inquit Clus. in post. Hist.) Scabiosā quæ mihi in cultioribus Belgicis hortis observata: floribus ex purpureo subceruleis in caput congestis, ad cuius latera in orbem fundebantur multi longiusculi perisoli, è quibus dependebant alii minores flores maiori- bus colore similes, & ex his

interdum etiam tertii, sed imperfecti: primis floribus succedebant semina Scabiosæ 5. [quam Scabiosā glabram carnosis foliis diximus] similia: radix subsulca, & multis fibris prædita, sed non viua.

Lobel. icon. plant. p. 339. Scabiosa prolifera. Tabern. Hist. p. 549. Scabiosen mit neben blumlein 17. Scabiosa prolifera: Belg. Scabiosen mer

Binder Foss. C. Bauh. Phyt. Scabiosa 14. sine prolifera Lobelio.

SCABIOSA RVBRA PEREGRINA
quibusdam Indica.

Descriptio
Foliorum
Infus.

Planta hæc, licet vna sit & singularis, & Scabiosæ minori vulgari similis, plures tamen foliorum figura differentes species, vt illa, induit.



Quippe ima, quæ propter radicem sunt, reliquis latiora, quædam crenata, quædam lacinijs sed minus profundis diuisa, longo pediculo hærent, veluti repanda. Quæ sequuntur superiora versus, altius secta, profundioribusq; lacinijs diuisa, veluti in plura alia subdividuntur, quorum singulæ partes infimis

crenatis, non magnitudine quidem, sed specie & figurâ quodam modo respondent. Sunt inter hæc quædam adhuc profundius & minutius secta. Suprema, quæ ad ramorum diuicationes exoriantur, vel paucis aliquot incisuris, minus tamen profundis, vel nullis planè constant, & per ambitum tota æqualia, angusta, breuioribus pediculis donata. Ima folia cum caule modicè hirsuta sunt.

Scabiosa
Indica Clu-
ff. Caulis.

Nos existimamus à Clus. in Hist. post. lib. 4. p. 3. depictam pro Scabiosa 6. Indica ac sic descriptam: Cubitali aut ampliore assurgit caule, satis gracili, qui in multos tenues ramos diuiditur, ex imâ parte veluti umbellam flosculorum in caput congestam gestantes, exterioribus flosculis, qui reliquos ambiunt, maiusculis, in quinque lacinias diuisis, quemadmodum & interiores flosculi, qui minores: omnes autem coloris elegantis rubri saturi, & ad purpureum quodammodò tendentis: his succedunt stellata, vt in alijs Scabiosarum generibus, semina, in caput metæ formâ congesta. Folia non absimilia habet illis quæ conspiciuntur in Pannonica oxycorymbosa: sunt enim similiter incisa, viridiora tamen, & splendentia, caulem atque ramos in singulis internodijs ex aduerso amplectentia. An radix viuax esset & perennis initidò dubitabam, quia anno primum 1591. florentem obseruabam, semine mihi misso natam eodem anno. Sed sequens annus annuam esse me docuit. Floret Æstate & Autumno: semen sub Septembrijs finem, aut Octobris initium maturum fuit. Accipiebam id semen ex Italia Scabiosæ Indicæ nomine: quod quibusdam amicis communicatum. florem variauit, qui fuit, illis referentibus, multò dilutior. Memini etiam Viennam mihi missum Scabiosæ semen ex Hispaniis, quod flores dedit eodem anno quo satum: sed illi etiam rubri dilutiores.

Flosculi.

Folia.

Radix.

Tempus.

Varietas.

C. Bauh. Phyt. Scabiosa 5. sive peregrina rubra,

quibusdam Hispanica rubra.

Hæc Scabiosa à me obseruata est florens iunio, Iulio & Augusto in hortis Di. Griennigeri tempus. Pharmacopœi in Pfortzheim, & Basileæ in Di. Martini Medici Poloni, & Di. Zwingeti & eius fratris Helini cum semine maturo Septembri.

SCABIOSA LATIFOLIA
albo flore.

Meminit Clusius in post. Hist. in hortis Belgicis pænè similem Scabiosæ ochroleuco flore, cuius tamen flores essent didiores: Aliam præterea latioribus folijs, firmioribus caulibus, & florum niueorum capitulis interdum singularibus, plerumque tamen binis aut ternis coherentibus & simul nascentibus. Hæc ille qui iconem habet hoc titulo, Scabiosa alba Belgicorum hortorum.

Eandem Lobel. Obseru. & Icon Plant. p. 538. Scabiosa poluit pro Montana Scabiosa calidarum regionum: Hist. Lugd. p. 110. pro Scabiosa montana calidarum regionum Lobelij & Penæ.

Sulpicamus nos hanc vidisse nondum florentem Iulio apud D. Griennigerum Pfortzheim, dicebatur esse flore albo, folia inferiora similia vulgari parua, sed maiora, alia laciniata, ad vulgarem hirsutam accedentia.

SCABIOSA PARVA ODORATA
flore folijs maculis infectis.

Pulcherrima atque grata oculis, atque naribus Descriptio
est Scabiosa hæc, quæ lignosam longamque radicem habet, ex qua folia exeunt diuersa, nam



in imo vel sunt sylvestri Erucæ paria, vel Coronopo similia, minora verò atque hirsuta, in caule verò similia lacinijs Scabiosæ vulgari minori, sicuti & flores, qui purpurei ex albo colore sunt, nec vt in alijs, ex cæruleo purpurei, in capitulis rotundioribus, atque singuli flores Ocimi flores imitantur, nam galeticulati sunt, & per ora laciniati,

admodum similes exotico Ocymo, folijs purpureis maculis infectis simbratisque, atque etiam, quod in alijs Scabiosis non obseruatur, benè odorati sunt.

Fab. Colum. nou. pl. p. 31. & 32. Phytanma minus, Scabiosa parua, floribus Ocimi laciniatis atque odoratis.

C. Bauh. Phyt. Scabiosa 4. sive Scabiosæ globoso flore similis, odore flore. Is eandem cum minore Tabern. diceret, ni floribus Ocimi laciniatis ac odoratis esset.

Floret Æstate, atque etiam Hieme propter cæli

Scabiosa
alba folijs
laciniatis
gemino tri-
capite.

Scabiosa
calidarum
regionum.

Locus &
tempus.

Radix.

Flores.

Phytanma
minus Cei-
lumna.

Scab. flor
ocimi

celi amenitatem. In montibus oritur Amal-
for orz.

SCABIOSA CVM PVLCHRO

semine minor.

Descriptio



Simplice & signosa radice albicante figitur, paucis & iis quidem exiguis fibris capillata: caulis dodrantalis aliquot diuisuris concavus, teres, hirsutus, folia tenuiter dissecta, superiorum foliorum Columbarie Scabiosae modo, pilis obfita, capitulis radiata, subiecta folia oblonga: semen per omnia simile

Scabiosae Hispanicae magnae dictae, tomentolum, calathio membranaceo coronatum, vnguis ferè magnitudine, pellucidum, striatum, in cuius medio stella parua quinquepartita, ex seminibus autem finis capillamenta quaedam parua atque rigidiuscula prominent.

Locum.

Ab specier

Descriptio

Talis ea est quae mihi ex Prouincia per insignem Parmacoporum Iac. Ranaudum missa. Postquam verò nostra figura iam esset parata, aliam eiusdem speciei accepi ab erudito Medico D. Salzmanno Argentinenf. lectam propè Sectionem in Galloprovincia. Ea altitudinem nostrae figurae non excedit, estque vix trium aut quatuor vnciarum, nulla diuisura, folia ut prioris dissecta, pilosa: flosculi iidem ad plantulae proportionem magnitudine praedictis cedentes, iidemque radiatis foliis sed angustissimis suffulti, striati, emicantibus staminibus nigris ac longis. Prioris plantae flores sua magnitudine appingi curauimus. Maior maioris est: minor minoris plantulae.

De Scab.
Hispanica
minor Clusii

An Clus. Hispan. & Histor. post. Scabiosa Hispanica minor, siue 2. maiori Hispanicae (quam à pulchro semine denominamus) persimilis & sola magnitudine differens: est enim per omnia minor, folia tenuius incisa, caliculi & flores minores ex caeruleo purpurascunt: cum Hispanica maiore iisdem locis nascitur, atque eodem etiam tempore flores, & semen ad maturitatem perducit.

Scab. affinis
minor folio
laciniato
Lob.


Lobel. Obs. p. 293. Scabiosa æstius minor, folio laciniato Scabiosae aut Erucæ, flore caeruleo vulgaris Scabiosae, spirillis longiusculis virentibus sesquiuincialibus, Rosarum gratia, stellæ modo radiato. Semen membranis inuolutis argutis implicatur, Scabiosae maioris Hispanicae ritu. Unde hæc apud nos oritur rediituo singulis annis semine. Mutonus noster primus hanc mecum communicauit.

Scab. peregr.
stellata
minor C. Bauh.
S. B. var.

C. Bauh. Phyt. Scabiosa 16. siue peregrina stellata minor, Clusio Scabiosa Hisp. minor. In maritimis Adriaticis reperta, parua & repens apud nos in

fiat sesquicubitalis enata. Suspicio Præter Scabiosam in maritimis Adriaticis repertam eandem esse cum maritima mea parua & diuersam ab Hispanica minore Clusii.

SCABIOSA MARITIMA PARUA.



Longiusculam agit radicem, satis crassam, multorum capitula, pro quorum numero caules emergunt dodrantales, & si accedat cultus, etiam cubitales, ramosi, folia inferiora tenuia, foliorum Scabiosae semine pulchro sectionibus diuisa, triuunciarum longitudine, at superiora angustata & veluti

Descriptio

graminea, nullam agnoscunt diuisionem: capitula pro plantulae modo magna, flosculis magnis referta, praesertim circa margines (colore in sicca planta purpurante) caput obvallant folia oblonga viridia, ut in Scabiosa Hispanica maxima pulchro semine, at enim huic semen non ita pulchrum: quamuis interim membranei quid habeat pilis magnis oblitum. Huius semen nobis misit Frater C. Bauhinus cum hac inscriptione, Scabiosa parua maritima ex Clodia insula: facta Montbelgardi in Horto E.C. prouenit, attulit etiam plantam siccam rediens Patavio dodrantalem vel paulò maiorem pro Scabiosa maritima vera Cortuso.

Locum

Scab. parua
marit. ex
Clodia.

Scab. marit.
vera
Cortuso.

SCABIOSA GLABRA CARNOSIS FOLIIS
virentibus, flore ex caeruleo
purpureo.

Tradit Clusius in Pannon. p. 535. Scabiosam Pannonicam secundum genus siue Scabiosam alpinam, quæ in post. Hist. 4. ab eo dicitur Scabiosa montana siue quinta, quam ita describit. Quina autem sena habet folia, humi sparsa, Scabiosae vulgariori, & inter segetes nascenti ferè similia, minimè quidem villis obfita, sed carnosa, præ viriditate quodammodo splendens, aliquot crenis incisa, sapore si manducetur lento, & gummoso, deinde aliquantulum acris: ex horum medio crescit palmaris caulis, aliquando paulò amplior, gracilis, rotundus, cuius inferiorem partem ambiunt quaterna aut sena folia, profundis & tenuibus laciniis diuisa, bina semper ex aduerso sita: extremo cauli insidet capitulum ut in vulgari Scabiosa ferè, è multis flosculis quinque foliis constantibus congestum, quorum exteriores maiores sunt, eleganti colore ex caeruleo purpurascens præditi, villis quibusdam nigris singulorum flosculorum sedem ambientibus: radix longa, nigra, crassiusculis albis fibris capillata.

Scab. Pannon.
2. siue alpina
Clusii.

Descriptio


Locus & tempus.

Clus. narratur.

Inuenitur in summis Sneberg & Snealben Austriae & Stiriae alpium iugis, in tenui gramme nascentis, ubi floret Augustus: similiter in depressioribus nudisque circa Viennam collium superciliis, ubi Iunio & Iulio floribus onustam legēbam. Cnr Clusius, qui in Pann. figuram omisit in post. Hist. pro Scabiosa sua quinta iconem posuerit Scabiosae minoris siue Columbariae Lobelij, ut antè dictum, nescimus, considerandum an aliquis error Typographicus. Est autem Lobelij Scabiosa minor ea cui ante titulum fecimus Scabiosae vulgaris minoris. Hoc etiam considerandum in descriptione Clusij modò proposita nobis quidam videri respondere nostrae Scabiosae glabrae foliis rigidis viridibus.

SCABIOSA GLABRA FOLIIS
rigidis viridibus.

Locus.
Descriptio
Caulis



Montbelgardi in horto Ill. E.C. in insignem magnitudinem adoleuit, rigidis striatisque caulibus, per quos foliorum est situs aduersus, veluti ex geniculis: multa tamen ea sunt, setiquipalmaria, quaedam dodrantalia, longis haerentia pediculis, duarum triumve vnciarum latitudine, segmentis paucis longèque distitis inferiore parte diuisa, ultimo segmento quod mucronem constituit, trium vnciarum longitudine aut maiore: rigida sunt ea, viridantia & vtrinque glabra: surculis autem peculiaribus palmam aut dodrantem longis haerent flores ex mascululis capitulis squarrosis albicantibus, hirsutis. Semen longum hirsutum. Quam Scabiosam vocamus glabram Frater C. Bauhinus siccam dedit cum his nominibus. Stoebe Theophr. Cortuso & Brassuolę, Guilandino Scabiosa alba, Bononiae collecta, quae ipsimet postea in Phyt. vocatur Scabiosa 9. siue latifolia glabra alba, Clusij Scabiosa 4. & maior Pannonica: Stoebe Theophrasti aliquibus credita, Scabiosa alba dicta Bononię. An Clus. Pann. p. 339. Scabiosa 4. (8. in Hist. post. lib. 4. p. 3.) siue maior Pannonica albo flore.

In Tabern. Hist. p. 346. Scabiosa 3. montana, Berg Scabiosen/ sine iconē. Item p. 346. Scabiosa montana peregrina, & Scabiosa Norbonensis. Ex semine per Fratrem Bononia allato, mihi quē communicato, provenit Scabiosa glabra Montbelgardi in horto Ill. C. Vvrt. cum foliis non mollibus ut in aliis, sed solidioribus: peruenit ad cubiti altitudinem, rudimenta florum tantum apparuerunt.

SCABIOSA MONTANA CALIDARVM
regionum maior Lobelij.

Locus

Colles aniat, inquit, hae plagae temperationis, ut Pedemonius propè Ruoliam, &




Norbonae, ubi montanam vocant Herbarij, folio angustiore, albidiorē, parum hirsuto leuulque laciniato ad imum caulem Verbenacę, aut vulgaris Scabiosae: superiora verò in ramulis plusculis, gracilioribus, altius diuisis, & flores per Iunium & Iulium prominentibus purpureos [albos corrigit in Obferu.] Scabiosa parua, aut laeae, capitulis squammatim compactis, ubi semen Trifolij Alphalutidis, pulchrum, copiosum, inuolucris membranaceis arguta concinnitate effictis, angustias plicarum fornicum pusillorum cohibentibus.

Iconem à Lobelio in Obs. p. 291. in Ic. plant. p. 338. ab Hist. Lug. p. 110. pro montana Scabiosa calidarum regionum proposita, Clusius in post. Hist. lib. 4. p. 4. posuit sub titulo Scabiosae albae Belgicorum hortorum: ea sanè icon bene representat nostram Scabiosam glabram foliis rigidis, verum descriptio Lobelij in Adv. p. 233. non competit in omnibus.

Iconem à Lobelio in Obs. p. 291. in Ic. plant. p. 338. ab Hist. Lug. p. 110. pro montana Scabiosa calidarum regionum proposita, Clusius in post. Hist. lib. 4. p. 4. posuit sub titulo Scabiosae albae Belgicorum hortorum: ea sanè icon bene representat nostram Scabiosam glabram foliis rigidis, verum descriptio Lobelij in Adv. p. 233. non competit in omnibus.

Frater C. Bauhinus phyt. ait p. 326. Scabiosa Lobelij est Scabiosa maior Matthioli, cuius capitula ait non rectè pingi & squammata pingi debuisse. Verum ego Fratri assentiri non possum: non solum figura Lobelij, verum & descriptio plurimum var. at à descriptione & figura Matthioli Scabiosae maioris.

SCABIOSA MULTIFIDO FOLIO,
albo flore, vel potius Ochroleuco.



Cvbitales Descriptio
Caulis, rotundi, graciles, firmi, virentes, nodosi, eos ad singula genicula amplectentibus binis folijs ex aduerso semper respondentibus, quae tenuibus & profundis lacinis aded diuisa sunt, ut alata videantur, color ex cinereo virens, sapor amarusculus: quae verò secundum radicem nascuntur, antè quàm planta in caulem asurgat, latiora sunt, minoribusque lacinis diuisa: ex sursum

cem nascuntur, antè quàm planta in caulem asurgat, latiora sunt, minoribusque lacinis diuisa: ex sursum

Floras.
Semen:
Scabiosa
glabra
Stoebe quibusdam
Scabiosa
alba.

Locus & tempus.

ex summis alis ramulos fert tenues, & nudos, qui sustinent plana capitula, & candidis siue potius *αχαιυκοις* [praesertim antè quàm explicentur] inodoriisque floribus simul nascentibus congesta, quinquis foliis [quorum tria inferiora manifestula sunt] constant, paucis intus staminibus: floribus succedunt hirsuta semina vulgaris Scabiosae seminibus minora, in orbiculare caput congesta: radix minimi digiti crassitudinem interdum aequans, multisque exiguis fibris in lateribus praedita, viuax est, & singulis annis novos caules proferre.

Synonyma

Clus. Pannon. p. 537. Scabiosa 3. siue multifido folio, albo flore: item p. 538. Scabiosa 3. In Hist. post. lib. 4. p. 3. Scabiosa septima *αχαιυκὴ* flore.

Camer. hort. Scabiosa Bavarica pumila, folio tenuissimo, flore purpurascens vel incarnato, non ab similibus Pannonicis.

C. Bauh. Phyt. Scabiosa 6. siue multifido folio.

Tabern. Icon. & Hist. Scabiosa 18. maior alba, *Groß weiß Scabiosen* inueni in Alsatia prope *höhen Königsberg* & *Schlestadtum*. An Tabern. eandem intelligat cum Clusio nescio, figuram eius assumpsit.

Locus

Nullum est Austriae inferioris pratum siccius ediorisve loco situm, nullus ager gramineus, nulli ferè aruorum margines, in quibus non nascatur hoc Scabiosae genus, adeoque fertile est in gerendis floribus & pertinax, ut sola bruma illius luxuriam coarctet, alioqui Iunio florere incipit: frequens etiam est in Morauia.

SCABIOSA LATIFOLIA RUBRO FLORE & alia purpurante ex nigro flore.

Descriptio



Cubitales caules, rotundi, nodosi siue geniculati, nonnihil hirsuti, concaui: in singulis geniculis bina filia ex aduerso nascentia, non multifida testat aliarum Scabiosarum, sed lata, in ambitu tamen crenata, Vitiæ foliis interdum maiora, ex breui petiolo pendentia, colore ex viridi dilutiorè prædita,

amaro & acri sapore: ex alarum sinu rami etiam prodeunt foliati, qui ex lateribus pediculos protrudunt, floribus vulgaris Scabiosae modo congestis, ornatis, coloris rubescentis, nullius odoris: deinde semina simul congesta, angulosa, hirsuta, Cnici ferè intentum magnitudine stellata coronâ insignita: radix minimi digiti crassitudinem nonnunquam aequat, longa, nigricans, statim à capite quoddam fibras satis magnas sparsens, & subinde ex lateribus novos caules producens.

Scab. latifolia purpurante ex nigro flore.

Est & alia [? in Pann. quarta in post. Hist.] quæ magnitudine iam dictam [primam in Pann. 3. in Tom. I. H.]

Hist.] superat, maioræque & nigriora habet folia, purpurascentem ex nigro florem: in reliquis satis conueniunt: [olim autem sic de scripsit, Hæc Scabiosa per omnia maior alia inuenitur maioribus & nigrioribus foliis purpurascentem ex nigro flore: alioqui nihil differens.]

Eadem est ni fallor cum Clusii Scabiosa, cuius binos adseruamus ramos à Fratre C. Bauhino in horto Patauino collectos, sesquipedales, hirsutos quibus folia Vitiæ æmula ex longo intervallo proximè & immediatè hærent, quædam trium aut quatuor unciarum, duarum, triumve lata, aduersa, pilosa, pallidè virentia, per ambitum serrata, in acumen abeuntia. Ex superiorum combinatione geniculata, ramuli sursum vergunt terni, medio vtrumque lateralem excedente, qui florum capitula sustinent, iuniora quidem & primulæ prærupentia Succisæ similia: foliis angustis, stellatim in orbem positus, Asteris lutei modo, veluti basi subnixa: flores in sicca plantâ valdè rubebant.

Deser. lib. 1. Scab. latifolia.

Clus. Pann. p. 535. Scabiosa 1. siue latiore folio, rubro flore: In Hist. post. lib. 4. p. 1. Scabiosa 3. siue latifolia Pannonica rubro flore. Item in Pann. Scabiosa 2. siue latifolia purpureo flore. In hist. post. Scabiosa latifolia Pannonica purpureo flore, seu 4.

Synonyma

Lobel. icon. Pl. p. 518. Scabiosa rubra Austriaca.

C. Bauh. Phyt. Scabiosa 11. siue latifolia rubra. Item Scabiosa 13. siue Virgæ pastoris folio Tabern. Scabiosa latifolia peregrina Tabern. conuenit multum cum 11.

Scab. rubra Austriaca Lob.

Tabern. Icon. & Hist. Scabiosa 8. latifolia peregrina, frembit oder rot Scabiosen. Item hist. Scabiosa 7. latifolia, Breyt Scabiosen/ Scabiosa rubra: Austriaca: fassnet cum eandem plantam bis tradere.

Prouenit vtrique Scabiosa Clusii in omnibus ferè caduis siluis iuxta lupos, locisque umbratis per vniuersam Pannoniam Austriamque infra Anisum. Floret Maio & Iunio, quo tempore semen plerumque etiam maturescit.

Locus & tempus

SCABIOSA MAIOR CVM PVLCHRO semine.



Clusius sic describit: Folia vulgaris Scabiosae maioris foliis similia habet, laciniata videlicet, altè incisa, mollia, lanugine pubescentia: caules nodosos, rotundos, interdum cubitales, & quorum geniculis folia inter se opposita: summis ramis capitula insident & multis caliculis membranaceis &

Descriptio

paleaceis composita, qui singulares flores conti-

nent candicantes; quibus decedens, in medio quasi singulorum caliculorum umbilico, exigua quidam stella subnigra conspicitur, quatuor, quinque, aut sex interdum radiolis constans: paulatim verò hi caliculi excrecentes expanduntur, donec semen hirsutum & crassum [quo caliculi sustinentur] maturescere incipiat: radix candida, crassa, vulgari similis. *Clusius* in hac sua descriptione tam in *Hisp.* quàm in *post. Hist.* non meminit foliorum longorum floribus subiectorum stellatim dispositorum, ut in *Astete Attico* luteo *Montspel. montano*: icon quoque eius, quæ eadem apud *Lobelium*, ea non demonstrat: an cultura id faciat considerandum: nos cultam, *Clusius* siluestrem exhibet, ac vocat *scabiosam maiorem Hispanicam* primam, pingitque in *post. Hist.* solo *Scabiosa* nomine.

Lobel. Obs. p. 292. & Icon. plant. p. 539. Scabiosa maior Hispanica floribus albis.

H. Lugd. p. mo. Scabiosa Hispanica Clusij maior. Dodon. lat. in fol. Scabiosa peregrina. An Czfalp. lib. 13. cap. 58. Scabiosa genus peregrinum breue: foliis non aded scissis: capitulis sphericis, amplis: seminibus circumstantibus, crassis, quibus singulis stylus insidet, stellam gerens, iucundo aspectu. Tabern. Icon. & Hist. Scabiosa 5. maior Hispanica, Spanische Scabiosen. C. Bauh. Phyt. Scabiosa 15. siue peregrina stellata maior. Fab. Columna p. 100. Scabiosa Hispanica maior, semine in imo hirsuto. An Lanaria herba vel Struthium? Semina huius plantæ ad nostram separatim appicta sunt. Camer. hort. Scabiosa Hispanica elegans planta.

Crescit iuxta vinearum margines & semitas, locisque incultis agro *Salmanticensi*, per reliquam etiam *Hispaniam*, haud dubiè & in aliis calidioribus. Floret istic mense *Iunio*. Apud *Germanos* verò, qui illam semine ex *Italia* misso interdum natam colunt, feritis: sed cum magnâ ex parte circiter *Autumnum* flores præbere soleat, plerumque inane succedit semen, [licet aliquando benè maturum colligere meminerit *Clusius*] & subsequens hyems stirpes corrumpit. Vidit tamen qui ramis in terram demissis propagare & conseruare studuerunt: sed operam luserunt. Vidi *Basileæ* in horto *Di. Zvingeri* semine vix maturo *Septembri*, & habeo *Montbelgardi Octobri* florentem, rarò autem apud nos maturitatem acquirit semen, nec herba hiemem perfert.

SCABIOSA MAXIMA DUMETORUM folio non laciniato.

Descriptio

Radices habet potentes fibrosas, longas, etiam ad cubitum, latis crassis, ac multas capillares, intus albas, extrâ nigricantes: sapor ingratus cum dulcedine & amaritudine aliqua, odor indicibilis: folia priora palmæum longa vel breuiora, ac etiam longiora, lata duos aut tres digitos, similia foliis *Succisæ* maiora, molliora: quæ per caules folia per geniculos modò bina, interdum ternaria, quæ versus superiora redduntur glabra, & minùs mollia, serrata, non dissecta ut in vulgari, pulchrè virent: caules bicubitales vel tricubita-



les, crassipiores, ab vna radice oriuntur, cauli, circa inferiora purpurascens & hirsuti, in superioribus partibus & ramis, glabri: & iuxta flores iterum hirsuti. Flores in extremitatibus ramorum, similes *Scabiosæ vulgaris*, necnon etiam *Scabiosæ vineæ*: Differunt hi flores à floribus *Succisæ* cui tota similis herba: quod maiores [vti & folia herbæ maiora] flo-

res in circumferètia magni hiantes, qui non sunt in *Succisæ*, color etiam dilutior quàm in ea & *Scabiosarum æmulus*, iucundi odoris: flore decedente inter semina non sunt foliola ut in *Succisæ*. Semina sunt longa, hirsuta, compressa, cum quatuor angulis. Icon melius exprimit *Scabiosam* folio ferè integro *Clusij*, qui describit.

An *Czfalp. lib. 13. cap. 59. Scabiosa alia in sylvis* *Synon. succisæ similis. Gesn. hort. Scabiosa tertia maior quam ab omnibus aliqui denominant [vt Dodonæus] &c. Per Gesneri maiorem Scabiosam intelligo nostram dumetorum diuersam à Dodonæi Quina.*

C. Bauh. Phyt. Scabiosa 12. siue Muttensis latifolia maxima Clusij: Scabiosa latifolia purpurascens flore. Hæc à latifolia rubra non solè magnitudine differt sed etiam hirsutie: in hac enim caulis asperimus est, folia etiam hirsutissima, frequens in nostris montibus. Clusij Scabiosam latifoliam purpurascens flore huc non refero.

An *Thalio Scabiosa integrifolia. Hanc veridè Scabiosam latifoliam vulgarem credimus.*

Hæc *Scabiosa* inter dumeta & in pratis humidis montium iuxta *S. Hippolitum* abundat, vbi vulgarem non vidi: quamvis minor sit sibi copiosa. Abundat etiam montosis locis circa *Tigurum*: Florebat adhuc copiosè *Augusto* & *Septembri*. Eandem inueni cum essem *Basileæ* in *Monte Mouters*, florètem *Octobri*. Item in monte *Kofberg* propè *Masmunster*. Transuli *Montbelgardum* in *Hortum E. C.* vbi facillè prouenit & durat.

SCABIOSA MINOR INTEGRIFOLIA seu maculata.

Descriptio

Scabiosa 2. *Thalij. siue integrifolia minor seu maculata*, rariùs obuia, coliculum producit tenue, teretem, scabrum, dodrantalem: folia pauciora circa radicem, octona ferè, vncias duas longa, semissem lata, non hirsuta ut priora, stigmatibus quibusdam nigricantibus exasperata, aliis læuoris quid obtinentia, carnosæ, quorum ex superiori ordine vnum atque alterum quandoque in ambitu paucas dentatas impressiones recipit: flore ut in cæteris *Scabiosæ* speciebus ex cyaneo subrubicundo.

SVC.

SYCCISA SIVE MORSVS

Diaboli.



Quæ radices, minimi ferè digiti crassitudine, fibræ longæ, albæque circumnascuntur; ea præcila seu præmorfa apparet, sapore misto acri & amaro: folia oblonga, acuminata, Scabiosa, quanquam nõ dissecta, sed vel integra vel paucum quid, præsertim quæ superiorem obtinent locum, serrata, magis

superà quàm infra virentia, & hic quidem pilis; illuc nullis prædita; extremis marginibus ruboris cuiusdam vestigio tinctis, bina ex aduerso per caulem, ignauiore sapore quàm radix: caulis cubito altior, rectus, & in alas diuisus: flores cærulei aut purpureo violacei, Scabiosa.

Differetia
c. 2.

Differentias has, inquit C. Bauhinus, obseruauit, quod alia communiter sit glabra alia hirsuta: glabra, alia maior, alia minor: maior alia [et communiter] foliis integris, alia foliis dissectis. Variat & flore, qui communiter cæruleus, aliquando purpureus, rarius albus.

Varia
ignota

Succisa

Morsus
diaboli

Quo nomine Veteres aut Posteriores Græci plantam hanc nuncuparint, & an eam cognouerint, nondum certò compertum est. Latino & conueniente huic herbæ nomine, quidam Succisam vocant: quod eius radices præmorfae sint: alii eadem de causâ Morsum Diaboli nuncupant, sed nomine ex superstitione indito. Quasi verò, ut nugantur superstitiosi, Cacodæmon quidam huius radicem magnæ efficaciz, ad multa vtilem futuram, inuideat hominibus, atque ob id ubi succreuerit, statim eam dentibus succidat, atque circumrodât. Et hanc superstitionem sapiunt etiam Germani, qui Teuffelo abbiß. Belgæ, qui Smiuelo beet: Galli, qui Mors du Diable: Itali, qui Morsu di diavolo, & Angli, qui Devellesbury appellant.

Scabiosa

Morsus
diaboli cum
dentibus

Ad Scabiosas pertinet & Succisa. Et hinc ait Lobel. in Aduers. Non video quid negotii sit hanc non esse Scabiosis vnâ probare quod quidam contendunt: verum adeo Scabiosis est similis, ut plerumque pro hisdem accipiat: euidentem tamen discrimen in radice, à qua tota, Diaboli morsus dicitur, quod nomen Herbarii retinent, nam Antiquis non debetur. Cum itaque sit multis crassis fibris sparfis, depacta, præcila apparet quæ crassiores cœunt fibræ plures, quasi præmorfa foret à quopiam cacodæmone: tamen si idem ferè cernatur in plantagine: quare malunt alii dictam ab vrida vi quæ mordicat bubones & carbunculos pestilentes, quibus magno lenamento admonetur.

Geris Geum
Pynocomon
Drofe.

Esse quosdam scribit C. Bauh. Phyt. qui Gerim (Geum, Fuch.) Veterum censeant: Columnam Tom, III.

verò p. 37. Pynocomon Dioscoridis esse statuere: alios ad Iaceas, alios ad Scabiosas refert: quibustam similis, ut plerumque pro Scabiola accipiat. Quidam Niginam Plinii esse putare.

Niginam
Plin.
Synon.

Succisa seu Morsus diaboli dicitur, Matth. Dodon. lat. in fol. & C. Bauh. Iacea nigra, Brunf. & Dorst. Morsus Diaboli, eisdem & Trag. Dod. gall. Lon. Lob. Adv. Obs. pag. 295. & Ic. Plant. pag. 596. H. Lugd. Tabern. & Camer. Succisa, Fuch. Cast. Scabiosa folio integro, Czf. Pynocomon, Columnæ.

C. Bauh. Phyt. Succisa r. vel glabra. Item Succisa 2. vel hirsuta, solâ hirsutie caulis & foliorum à prædicta differens. Cur igitur separat Frater

C. Bauh.

In pratis & viis quibuslibet occurrit multa: Particulariter obseruauit Succisam in quodam prato prope Monspelium, Genueæ florentem mente Iunio. Cum Basileæ essem copiosè in monte Moutets florentem Octobri inueni: ut & alibi Tiguri circa Fargesee inueni inuenem valde pilosam. Montbelgardi abundat etiam iuxta vites nostras in monte la Chau dicto, infra & supra, incipiens florere Augusto, foliis prioribus hirsutis: vnde attuli Montbelgardum in Hortum E. C. Semen maturum Nouembri ac etiam citius: ea nunc durat in horto in flore aliqua rubedo.

Locus &
tempus

Eadem, authore Trago, cum Scabiosis vires obtinet uterque Morsus Diaboli, ideoque illo pro Scabiosis, & vicissim Scabiosis pro illo uti videtur possumus. Morsus Diaboli cum flore, herba, & radice in vino decoctus, facit ad omnia ad quæ Scabiosa, maxime verò ad discutit dos sanguinis grumos, & aduersus pestem. Eadem potest aqua ex herba distillata. Hæc sicut & succus herbæ vitriolo mixtus execat & sanat quasvis papulas, omneque fluentem scabiem illit. Amarauscula est herba, teste Dodonæo, calido, siccoque temperamento prædita, ad vtriusque secundum ordinem intensum referenda: Aduersus diuturniores consillarum fauciumque tumores, qui ad suppurationem rigrè perueniunt, nulli secunda: adhærentem faucibus pituitam abstergit, digerit eadem, & discutit: tumoresque earum partium citò tollit, decocto in ore sæpius retento aut gargarizato, præsertim mellis rosatei exiguo addito. Posse verò & quæcunque Scabiosa, fertur, & aduersus ictus virulentorum, venena, & pestilentes morbos non minus efficax: tulam & impositam pestilentes etiam bubones discutere: tum & decoctum eius si batur, vteri dolores lenire, statimque pellere. Morsus Diaboli [inquit Dorst.] herba & radix eadem vires habent, calefaciunt & siccant primo gradu. Radix contusa ac inflammationi imposita eam extinguit. Herba adhuc viridis vsui est, contra omnes affectus exteriores corporis, inter sumi non debet quia calorem adfert. Egregium iudicium Dorstenii [ut & Apollinis eiusdem opinionis est] qui sibi ita contrarius, is enim præter dicta exhibet hanc plantam & eius aquam in morbis calidis.

Viris
Viribus
Scabiosa

Sanguinis
grumos

Papula
Temperata

Tumores
faucium

Bubones
pestis

Inflammatio

SCABIOSA FRUTICOSA FOLIO NON
dissecto peregrina:

Adversis pediculis longiusculis caulem amplexis folia ordine per caulem nascuntur, oblonga, acuminata, medio latiora, hirsuta, incana, Plantaginea, nisi alius esset nervorum decursus

Descriptio

caulis teres, arborescent, albicat, pilosus, florem sustinens glomeratum: semen eius pulchrum, album, sublongum, crassiusculum, desinens in latam pelliculam, ut Scabiosa magna, cum pulchro semine, quod nullum ab Hortulano Florentino, nomine, Scabioz arborescentis semper virentis. Lobelio tunc & virgulus Valerianæ rubiæ, sed tunc & semine Scabioz Hispanicæ.

Scab. peregrina Lob.



Lobel. Obi. p. 292. Scabiosa peregrina, rare elegantia nullum hactenus literis prodita. Plant. Icon. p. 540. Scabiosa peregrina. H. Lugd. p. 1108. Scabiosa peregrina Lobelij. An Camer. hort. Scabiosa fruticosa siue arborescens Catalpinis?


Tabern. Icon. & Histor. Scabiosa 16. peregrina foliis

non dissecta frembe Scabiosen. C. Bauh. Phyt. scabiosa 17. siue folio non dissecto stellata.

Scabiosam fruticosam primum vidi Lutetia apud Io. Robinum hortularum regium, florentem mente Augusto: eius semen accepi Stutgardia, quod latum in Horto E. Wirt. Montbelgardi prouenit.

SCABIOSA GRAMINEA ARGENTEA.

Descriptio



Scabiosa caputulum, mediocri magnitudine, argenteo villo tomentosum, numerosis circumcirca acuminatis foliolis stipatum.

Camer. hort. Scabiosa Graminea argenteo flore purpureo. C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Scabiosa argentea angusto folio.

Prouenit in monte Vicentino Sumano dicto: unde ad C. Bauhanum misit Paschalis Gallus. Florentia missa Camerario, nascitur etiam in fodinis

Scab. graminea C. Bauh. Phyt. Scab. argentea C. Bauh. Phyt. Locus & Tempus.

Ferri Styriæ. Mihi dedit DD. Zyvingerus collectam in monte Sumano Vicentia. In Euganeis montibus vix una aut altera observata H. Cherro, nedum Maio perfecte florens.

SCABIOSA MONTANA OMNIUM MINIMA.

Scabiosarum omnium minimam hanc animus Descriptio



Stuillet Lobelio Verbenam paruum facere, nisi in montibus cretaceis & incultis obuia foret Nam sesquipalmares pedalesve paucos edit cauliculas, foliis in imo sepius donatos angustioribus, inter Sesamoidem & Scabiosam minimam, floribus dilute purpureis, & squamosis capitulis non diuersis.

Lobel. Aduers. pag. 233. Scab. omnium minima Lob.

p. 540. Scabiosa omnium minima. H. Lugd. p. 1109. Scabiosa montana omnium minima, Penz. C. Bauh. Phyt. Scabiosa 18. siue montana minor.

Tabern. Hist. pag. 549. Scabiosa 15. Scabiosa montana minor 7. Minima cognominata, sine icone.

SCABIOSA GLOBULARIS QUAM QUINAM VOCANT.

Descriptio

Dram lignosamque habet radicem albican- tem, fibratam, in plura interdum capita diuisam: caules promit multos palmares, nonnunquam cubitales, ramosos, interdum simplices, graciles, hirsutosi & in his folia pilosa exigua, semunciam aut vnciam longa, mollia, crispata, Lobelio aliquantum serrata, que vero circa radices sunt, duabus vncis longiora sunt. Sapor his nullus evidens: flores extremis hærent ramulis



Aphyllantis Anguillæ, glomerati, staminibus contenti caeruleis, parui.

Dodon Gall. Scabioz, genus, Belg. Schæe Scabiosa per Scas

Scabiosa
Ovisum.

pes Scabiose / hoc est, Scabiosa ovium. Gesn. hort. Scabiosa tertia maior, quibusdam ab ovibus denominata, ut Dodonæo, qui hanc magnitudine mediam facit.

Scab. media
Lob.

Lobel. in Aduers. p. 232. Media Scabiosa serrato angusto folio, flore Globulariz. Obleru. p. 291. Scabiosa media: Scabiosa media flore Globulariz: Aphyllantis genus quorundam, albis floribus, varians agro Louanensi. Icon. Plant. p. 536. Scabiosa media.

Scab. minor
Dod. lat.

H. Lugd. p. 1110. Scabiosa media Lobelii. Eadem cum Aphyllante, quæ habetur p. 864. Quæ sit Dodonæum tertium Scabiosæ genus secisse: [Putat in Historia gallica. Est enim ipsi in Latina in fol. Scabiosa minor, siue secunda]

Camer. hort. Scabiosa ovula Dodonæi.

Tabern. Icon. Scabiosa minor quinta: Flein Scabiosen Hist. lib. 1. p. 543. Scabiosa 12. minor 4. in descriptione 13.

C. Bauh.

C. Bauh. Phyt. Scabiosa 19. siue arvensis minor folio non dissecto, Gesnero Scabiosa tertia. Duplex est, altera foliis hirsutis: sed non crenatis ut rectè Tabern. pingit. & apud nos frequentior: altera quæ foliis est crenatis ut Lob. floribus est cæruleis, rarius albis. De Gesneri Scabiosa iam diximus nostram sententiam. Tabern. in descriptione suam dicit esse foliis crenatis.


Locus &
Tempus.

Quum essemus Monspelij reperi Speciem florentem mense Octobri circa Gargen. Hanc etiam obseruavi vere & Iunio inter Monspelium & Lugdunum. Inter Chaltenoy & Nommay pagum Montbelgardensem locis aridis florentem Iulio: plantam in Horto Ill. E. C. ubi provenit: huius vnicam plantam reperi flore albo & cum semine Augusto, inter Mosarilara arcem & Gruningen in Sundicovia. In marginibus agrorum Septentrionalium, teste Lobelio, læxior multo & maior adolefcit, quam in calidis.

Hæc alba.

APHYLLANTI AFFINIS SCABIOSA quinta Clus. Bellidi affinis.

Descriptio



Ramos per terram repantes spargit, subinde demissis fibris radicem agentes, alioquin prædictam primariam lignosam crassitudinem habet: folia Globulariz similia, saturatè virent, glabra, crassa satis, sed non ut Globulariz folia, per extremum integra, verum fissis & cordatis, ex pediculo longiusculis.

lo, sapore amaro: pedicelli breues, aliquando satis longi, inter folia surgentes, si rem gestant cæruleum, glomeratum, Globulariz, cui nec ita dissimile semen.

Scab. mont.
expon. Clus.

Clus. Pann. p. 539. Scabiosa 5. montana repens: & p. 540. Scabiosa 4. (scribendum erat 5. nam descriptio Tom. III.

criptioni quintæ respondet.) in post. hist. Scabiosa 10. siue repens: Scabiosa montana [minor, addit inter nomina] repens siue 10.

An C. Bauh. Phyt. Bellis 12. cærulea frutescens: quam ex Cæsalp. in Ilia nasci tradit.

Bellis cærulea
frutescens C. B.
Locus &
Tempus.

Scabiosa montana minor repens siue 10 Clusii nascitur in omnibus Pannoniz & Austriæ montibus glabris & asperis, inter saxa & salebras sparsa, gramineis etiam quibusdam siccioribus incultisque agris, veluti supra Neapolim Austriæ. Floret Aprili & Maio: semen Iulio & Augusto maturefcit.

Ceterum non dubium est, inquit Clusius, Viret quia decem mæ Scabiosæ iisdem facultatibus sint præditæ, quibus reliqua Scabiosarum genera: quandoquidem omnium est idem temperamentum.

APHYLLANTES ANGVILLARÆ siue Globularia Bellidi similis.



Afloris pul. Descriptio

cherimini glomerati figura Globulariz dixerunt quidam: constat autem is staminibus cæruleis densè sacris, insidens cacumini caulis palmaris & si squipalmatis, rarius cubitalis, rotundi, striati, rubescentis, foliis vestigi multis, interdum unico, interdum ab eadem radice multiplicis: alia per

terram sparguntur folia, Bellidis proxima solidiora, glabra, nervosa, gustu amara: radix lignosa, dura, fibris donata, rubra, exterius interrim alba.

Clus. Pann. p. 541. post. Hist. lib. 4. pag. 6. Globularia seu Scabiosæ pumilum genus quod vulgò apud Herbariz rei studiosos Globulariz nomen inuenit, Anguill. (ut dicit in Hist. post. Clus.) Aphyllantem appellat Viennenses muliercula quæ in suis hortis alunt Blaw Ruchbarzue, id est, cæruleam Bellidem nuncupant, quo nomine etiam in Belgicis hortis culta dicebatur. Gallis: Marguerites bleues. Is Viennensi agro, nunc uero flore variantem nonnunquam conspiciebat.

Globularia
Clus.
Scabiosa
pumila.
Aphyllantes
Anguill.
Bellis cærulea.

Floris nunc

Cæsalp. Bellis montana, in asperis nascens: foliis ab radice Bellis pratensis, rotundioribus: cauliculo simplici, sæpe nudo, aliquando paucis foliolis: in cacumine capitulum rotundum, cærulei coloris: herba amaro gustu prædita.

Bellis mont.
Cæsalp.

Anguill. epist. 12. pag. 116. Aphyllantes, id est, Frondiflora: Is lectionibus liberum relinquitur dicium, an Bononiensium Bottonia de quibus esse possit.

Aphyllantes
Anguill.
An Bottonia
Bottonia.

Lob. in Adv. p. 199. Bellis cærulea Globularia Monspelientium. Is describit & depingit p. 200 atque in Obs. p. 253. Bellis cærulea nostra Aduers. est Aphyllantes & frondiflora Anguillaræ. Mons

B 3

Aconitum Pardalianches est Do-
 Marantha lib. i. cap. n. asserit Aconitum parda-
 lianches esse Doronicum vulgare, non tamen ven-
 enatum ait hominibus, aut Doronicum ne-
 gat.

Doronicum [inquit *Lonic.* impress. anni 1569.]
est radix nota *Oithicinis*, foliis *Cyclamini*, *Theo-*
phrastio *Thelyphonum*, species *Aconiti* autore
Matthiolo, qui nominavit *Aconitum Pardalian-*
ches minus: quidam volunt esse *Zurumbet* *Se-*
rapionis & *Arnabonem Pauli*, & *Carnabum* &
Carnabadum Aetii, sed malè.

Dodon. gall. pro Aconito Pardalianche exhibet figmentum Matthioli. Ast lat. de purg. licet eodem Pardalianches titulo duas describat species, easque lat. in fol. etiam exhibeat pictura, tamen fictitiam Matthioli figuram respuit, ac dicit, Aconitum Pardalianches quod exhibeo & describo, herbarum studiosi plurimi Doronicum appellant: Pharmacopœi passim pro Doronico medicamentis admiscunt. Quod tamen Arabes Doronicum nominant, aliud longè ab hoc Aconito Pardalianche est. Hoc enim Auicenna Strangulatorem Leopardi: Doronicum verb. Dunnigi appellat. Adhuc Durinigi ait calidum & siccum in tertio gradu, cui & ipse Arabs Serapio consensit. Strangulatori verb. Leopardi suas ex Theophrasto & Dioscoridis adscribit, quæ multum à Durinigi viribus recedunt. Et ita Dodonæus cõcludit, qui omnia miscet, ac Pardalianches suum cum Pardalianche Veterum cõfundit. Sensus verborum eius hic est, Aconitum Pardalianches suum non esse Doronicum quia viribus Doronicum à suo Aconito Pardalianche discrepet. Sed fallunt, Aconitum suum Pardalianches quod exhibet, à Doronici viribus non recedit, sed ab Aconiti Pardalianches à veteribus commemorati. Nec enim quod exhibet Aconitum Pardalianche, Veterum Pardalianche est, cuius facultates suo Pardalianche falsò adscribit. Sed falsum est eius fundamentum quod sc. Aconitum Pardalianches vocet Auicenna, quod is picturâ expressit. Nam Auicenna Durinigi vocat.

Lob. composit.
920. scrobis.
Doronicus
6. p. 12.
Doronicum
triplex.

Doronicum aliq[uo]d Pardalianches Aconitum esse negat Lobel. in Aduers. ac idem rursus affirmat, sibi ipsi contrarius. Eius verba ita sonant Doronici varii nostratis, quorum nullus est Aconitum Pardalianches, radices in pharmacariis tabernis prostrare vides. Ex triplici in differentia sunt, tamen non ita dissita. Nonnullis enim Franciæ collibus cæteris Doronicum minore, minusque fibrosâ radice inuenias: Aliud item foliis oblongis vti Plantaginis: Et alterum maiore, longioreque multò radice, scorpij forcipulis non absumi. Hæc priori propior est, si non prorsus eadem sit suffragio etiam Herbariorum, qui eas magnitudine diu duntaxat distare aiunt. Iam neuquam opus est multâ disquisitione ad statuendum, ecquid sit discriminis inter Theophrastu, Dioscoridis, Plinii, & aliorum Pardalianchen, Theliphonum, aut Cammorum: quæ nomina vnius huius plantæ diuersa putamus: nec videmus vlla insigni distinctione mereri genericam differentiam: facies enim, sapor, odor, omnibus idem, itemque ferè natales. Sed tamen paulùm quid variat Dioscor. de radice delineatio, quippe candæ hic, Theophrastus verò cadaueri toti continuo alius generis serpem astringit: sed eandem brachiorum aut alarum expertem, vt sepius orbata, quam eidem donata visitur. Nec dubium quin mutuatus sit ex Theophrasto, vel vterque de alio quopiam scriptore: nam quæ de nocu-

Discrimen
Doronicus ab
Aconite
Pardalian-
ches.

Aconitum
Matthioli.

mentis & effectibus prodiit essent; vt lecta,
non explorata, subdunt. Plinianum non esse
idem insiciari eius interest, qui non meminit,
pleraque omnia in stirpium historia illum accep-
ta ferre Theophrasto. Ecquid loci sit isti com-
mento Pardalianche relictum, dicent consulu-
ssimi & stirpium exploratores indelessi Italorum
doctissimi, qui nullum vltiam sibi visum, vel au-
ditione cognitum plerique omnes nobis asse-
rebant, querebanturque ea spe frustra se lustrasse
penè quantum est Alpium & caue um, nemorum
& montium, perpetuo illo dorso à Lemano Cla-
uennam, indeque ad Veronæ Baldique deuexa,
nusquam tamen comparuiss. Nostre tis interim
Doronicum plurimum diuersis locis obuium ha-
buiss: eoque nobis tamentis inuitis suadebant
istum Senensem Commentatorem, cui imposu-
isset hæc leuiuscula, quam supra agnouimus, diffe-
rentia, quasi vnâ quampiam nouam & sui ge-
neris sanxisse. Indicio esse, quoties curauit re-
cudenda illa commenta, toties variatam Iconem
nec nisi vnâ miscellam, caule, floréque mutilam,
semel chartæ mancipatam, tot vbique gentium
vestigationibus sedulis repertam fuisse. Historiæ
fidem item temeratam audacia, vt qui nullo facto
periculo (nec enim potuit) illico decreuerit Par-
dalianchen. Quo verò fastu, astu, & palpo ma-
gni nominis eruditio inculcet illud, *Palpare &
videre*, quoniam Matthioli non scribit menda-
cia, se ridere & mirari: forte tameniam, vt senior
eoque moderatior factus, fateatur se lapsum, lu-
geatque Doronici, sibi ignotum antea, quidd scie-
lesse nefas, vili Esculapio Cortusio primùm in-
notuerit, & per istum mortalium generi sit rete-
ctum. Quod maleficium cum nostræ memoriæ
plerisque notum esse tenuissemus, & Cortusio in
hortulo suo Pataui inter colloquendum respon-
dissemus, id verum quidem esse, ceterum minime
mstrum: vt qui experimento certum haberemus,
Aloë saluberrimâ interfici vulpes, easdemque
enectas amygdalis amaris ex Plutarcho meminif-
semus, annuit ille Italicè cuidam compatri suo
Pharmacopæo, qui vulgatum exemplum de Nu-
ce vomica subdidit, eâ nempe seles, canes, aubé-
que interim, quæ tamen tuâ & magno com-
modo aduersus lethifera & Epidimicos morbos in
Electuariis Liberauit, datur homini. Immortè
proinde Doronicum verbo diro dum infame fa-
cit, quàm multum sciret & parum saperet, perspi-
cuum facit: Dæmones quippe scælices vocari vel
Monachi norunt, qui Cacodæmones haud atro-
ciori conuicio inceslunt, quàm ille Doronicum è
republica Medicorum exigere nititur. Tantillam
rem, tam valdè vulgatam, captum superasse tanti
Commentatoris, stupet vulgus, qui Philomelis,
Alaudis, Hirundinibus, aliisque delicatioribus
auiculis non solùm non nocet, sed interdum ci-
bus, laxissimè remedium vnicum & panchæston
fit. Quam multis tu Principibus, nos pauperi-
bus, Doronici ignoratione, exitio fuissimus, quâ-
tam stragem plûs quingentis abhinc annis dedif-
sent Medici, freti electuariis de Gemmis & aro-
matibus, & aliis Cordi amicis, quibus frequen-
tissimè vsi sunt, teque monere possunt, Doronico
ne tantopere conuiciaris, sed potiùs dosim me-
tiaris, alioqui Croci, Moschi, similibusque dato
quaternum drachmarum dementem homini, &
comperies Dæmonium tuum. Quin thus etiam,
multò quibusdam minore mole, meminimus
perniciem attulisse. Tantæ expectationis Com-
mentatoris intereris, saltem hac postrema Com-

Pisano
Pardalian-
ches sur-
munt.

Pardalipne-
ches.

- Certus
videtur.

*In Derivando
maleficiam*

e Aloe Gul-
 L. pub. Vene-
 ra.
 D. Amygd. a-
 mara
 Nux Vom-
 ca.

Dura Mat-
chois.

Dordicum.

3, *Thuris* no
common

mentariorum manu & mole, an Pardalianche eodem necaret modo, quo cetera Aconita, exquirere: quippe si nominis etymon & sensum Symptomatum perpendas, videtur, aut sola (aut certe comute veneno strangulatione, id patrare: quemadmodum Fungi, papposque excrementa Typha & Cannarium, quæ bullis, præsertim siccis & angustis meatibus nec ruminantibus, si cum esca pauca multum cõfertim vorarint, mortem moluntur suffocando. Quin non semel audimus venatores affirmantes, se frustra dedisse Nipellum, Helleborum, & alia toxica à sensu statim vomitu rejecta: ac ubi paucillum Taxi addidissent, erotum nullum animal euadere, quippe nauseare, sed euomere nihil. Percunt igitur partem veneno, partim oculo spiritus, puta ad fauces tracheam & diaphragma: plerumque etiam euomere bilem, mucum, cibum, veneni autem nihil, nisi ob siccitatem, serd, aut perparum. Non igitur respiciemus nos Doronicum, sed utemur moderatè: si non ut aromate, saltem liceat nobis ut Theriaca & antidoto quapiam: cuiusmodi instituisse vides in El. de geminis Melux, & aromatum Electuario, celebres Medicos, quos temerè inficit & sceleris reos facis. Sed hæc silius paulo mox, in Paride & Nipelli muscis, non muribus tuis, quos multi equè caui Herbar, jatque te non minus sagaces requirquam venati sunt. Iste descriptæ radices à nobis Aconita censita, ut omnes congeneres, sic sapore pendè eodem sunt, nempe ignauiore, subdula, & emplastico. Quod magis adducitur, ut credamus Dioscoridis legitimum esse Aconitum quippe assentit ille, oculorum scilicet remediis blandis, temperatæque calore & crassis nonnihil, emplastica, paucilla adstrictior e, digerente. Et hæc Lobel, quem mirari subit, quid sibi velit cur prioribus vltima contraria scribata. An fortè dum acriter nimis in Matth. inuchitur sui ipsius oblitus fuit? Is in obseru. pap. 570. & Icon. plant. 648. triplicis sui Aconiti differentia imagines exhibet sub his titulis. 1. Doronicum minus officinarum, hoc pingit longo folio, de quo specialius infra. 2. Doronicum brachiata radice cancri, forcipularum ritu. 3. Doronici tertij varietas: Aconitum Pardalianches Dodonzi.

*Taxi nomen-
mentum.*

*Doronicum
no respuen-
dum*

*Excusatur
Mefues.*

Aconita.

*Lobel. re-
preh.*

*Doronicus
differentia
Casp.*

*Aconitum
cur iudica-
tum?
Mamiras
Pauis
Helenium
Pliny.*

Casparinus Doronica differre scribit pro crassitie & longitudine radicum, & foliorum asperitate, ac leuitate, paucisque alijs, adferri & inter merces peregrinas ex Oriente radiculam eandem, in antidotis expectam: Hoc ob similitudinem radice cum cauda Scorpionis iudicatum esse Aconitum pardalianche, facto experimento: Esse præterea qui Doronicum Mamiras esse putent apud Pauli Is autè Plinij Helenium iudicat. H. Lugd. p. 1735. Somnium Matthioli pingit sine floribus. In appendice verò p. 16. Aconitum Pardalianches primum vocat, & iconi, quam prius propoluerat adpingit ramulum foliorum floribus onustum, de quo ait. Præcessit inter Aconitorum genera Pardalianchis figura, qualem Matth. exhibuit, verissima, & certissima, quamuis falsam ac commentitiam esse quidam existimant, sed muila radice tantum picta cum folijs. Ego integram natum à Sephasiano Treuorense, in cuius horto plantæ aliquot multis iam annis viuunt, & vigent, cor trouersiam pertinaciorem de hoc Aconito, quod his oculis conspexi, iactatam inter Gesnerum ac Matthiolum, ut dirimam, Matthioli fidem suam, quæ labare videbatur, asserui, & plantam ostendi, minimè decurtatam, &c. Manifesto autem errore contraria scribit.

Radix, ait in vno loco, prorsus ea specie est, quam Matthiolum delineauit ac expressit: in altero dicitur figura Pardalianchis, qualem Matthiolum exhibuit, verissima & certissima, sed mutila cum folijs & radice picta: verissimam pethibet figuram Matthioli, sed mutilam cum folijs radicem agnoscit: fittine patrocinatur Matthiolo? Labat certè fides Matthioli ac etiam Lugdunensis.

C. Bauh. Phyt. est Aconitum; quod se nunquam vidisse scribit.

Historia insuper præter falsas has duas & commentitias imagines, quatuor adhuc figuras habet tres quidem p. 1737. quarum primam inscripsit Doronicum Romanum, Aconitum Pardalianches antiquorum Dodonzi [Clusii ad Dod. gall. p. 583. teste C. Bauh. cui est Doronicum i. siue radice Scorpionis] Alteram, Aconitum Pardalianches minus. Matthioli [C. Bauh. phyt. hoc cum præcedenti idem facit:] Tertiam, Aconitum Pardalianches Plinii [Aconitum 5. Casp. Bauh.] Quartam, Aconitum Pardalianches Theophrasti ex Matthiolo. Est & hoc 4. C. Bauhino. Sed cur separat C. Bauh. Phyt. suum Doronicum i. siue radice Scorpionis ab Aconito suo 3. 4. & 5. quod non fecit Matthiolum.

*Figura 4.
H. Lugd.*

*Acon. Pard.
minus
Acon. Pard.
Plinij
Ac. Pard.
Theophr.
C. Bauh.
not.*

Tabern. Icon. & Hist. Doronicum primum. Monachi in Mesuem describunt Doronicum & dicunt Ianuensium & Luminare maius loqui sub nomine Doronici de Trali. Doronici non rectè, aliqui [Clusius Doronicum 4. facit,] ad numerant inquit Gesnerus, Caltham alpinum. Est hæc nobis Alisma Matthioli, de quo post Doronicum.

*Tras.
Caltha. al-
pina.
Alisma
Matthioli.*

Gaudet montibus umbratis, inquit Lobelius. Inueni autem ego spontaneum in monte Appennino inter Bononiam & Florentiam, & Bononiæ florentem vidi in horto mense Aprili: inter Comum v. b. Italix & Mundis. Ferrariæ in horto Monasterij S. Dominici à l'Angeli. Patavij cum paucis rotundis folijs virens mense Ianuario, in horto Di. Cortusij, & mense Martio florem protrudens in horto Di. Triuesani: vidi missum Neapoli D. Guilandino. Florentiæ in horto Nicolai Ferrariensis mense Aprili deflouerat: Bernæ, Basileæ in horto Di. Dis Fœlicis Plateri. Lugduni habebam in horto uti & alij, florebat mense Maio & Iunio, flore in pappos euanescente succedit semen paruum, nigrum, striatum, Montbelgardi in horto Ill. C. VV. mihi etiam egregiè prouenit florens Aprili & Maio.

Disputatur hodie ut dictum antè, an sit Doronicum venenatum, quod de nostro alij affirmare nolunt, & in Antidotariis id admittunt, alij verò reiciunt. Admittunt hoc Bononienses in suo Antidotario. Admittit & Iulius Alexandrinus, nec à compositionib. auferri vult, ne, inquit, ablato eo medicamento compositio tota pereat, formæque claudicet.

Vireo

In Germanica Matthioli editione ad inflationes corporis, præsertim vteri, commendantur Doronici radices. Lumbricos necant & expellunt, intestinorum obstructions referant, urinam prouocant, faciunt contra cordis palpitationem, syncope correptos reuocant; venenis aduersantur, in theriacam adduntur: eadem in puluerem trita, & cum confusis sicubus mixta venenum iaculantium virus domant impositæ. Has radices sæpius Iohannes de Vroede Rhizotomus, teste Lobelio, sine noxa ullòque percepto incommodo impunè deuorauit ut & Gesn. quamuis canibus perniciosum prodantur.

*Vireo.
Lumbrici
Obstructiones
Vena
Pulvis
Radices si-
ne noxa de-
uorant.*

Cæterum

Matth. 10. Ceterum mirari subit Matthiolum cur Doronici vsum in Hist. germ. approbet, qui antea in comm. eum penitus damnauerit, ita scribens. Doronicum inter Aconita esse recensendum, me primum admonuit Cortusius quod certo sciret, factum esse pluries peficulis, extingui facile canes, qui horum radices deuorant. Vix ego id credere poteram, sed interim datus cuidam meo cani vulgatum Doronicorum quaternis drachmis, crudis carnibus occultatis, is post septimam horam obiit. Sed id mirum profecto mihi fuit, quod ipsemet canis toto illo tempore, quo superuixit alacer, letus, ac hilaris semper fuit, nihilque symptomatis passus est, imò quod maius dici potest, quadam cum domestica canicula pluries venerem exercebat, & crenantibus nobis audissimè comedit. Quo factum est, ut ego profecto crederem, me hoc facto. periculo frustratum iri. Atqui paulò post præter omnium nostrum sententiam, is repente admodum, ac si morbo comitiali percussus esset, totus in terram cecidit, ubi horrendo spasmo correptus, spumanti ore paulò post conuulsus interit. Cortusio itaque nobilissimo, hoc amplissimam manus futura posteritas acceptum referat, ipsamque nouum vitæ nostræ custodem appellat. Huic Nymphæ violas, & Liha fundant: hunc suauissimis vestiant rosis, & Baccharum cingant. At interim desinant Medici, quibus hominum vita cordi est, exitioso, & pernecabili Doronico uti. Expellant & illum Pharmacopœi suis à Myropolus, & interdican pui, & optimi principes, qui Rempublicam gubernant, ne posthac venenum hoc præsentissimum vaneat. O quam misera sit eorum conditio, qui superiori ætate nos præcesserunt, quorum scire nemo simplicia medicamenta rectè nouit, quique sæpe venenosos auxilios vsi sunt, ubi saluberrimis antidotis uti putarant. Erit itaque Doronicum posthac Demonicum, non Doronicum appellandum, quod Diabolus in huius locum Thelyphoni genus hoc intrulerit. Hinc autem sit, ut ego errorem quoque meum iam agnoscam, quod noluerim Maranthæ concedere, Doronicum vulgaris vsus esse Aconitum Pardalianchen, cum viderem id innocuè sumi in medicamentis ab hominibus: verum non ob id fieri puto, quod canibus sit venenum, homini verò salubre medicamentum, ut quidam mihi respondent, quibus eum de huiusce Doronici exitiali facultate sum locutus: sed quod non tanta quantitas propinetur à Medicis, quàm homines necare valeat, aut quod raro exhiberi soleat absque aliis antidotis, quæ venenolam eius vim dissipant, & extinguunt. Nam quæ canes occidunt, & lupos, facile adducor, ut credam, eadem homines quoque necare: ut de vomica nunc ego fateri possum, quippe qui sciam hæc tantum mulierem iam senescentem esse extinctam, quæ cascum è quo sibi cibum parauerat super instrumentis ferreo ab hoc parato attriuerat, super quo eius filius superioribus diebus Noces vomicas aliquot in particulas confecerat, quibuscum necandis canibus, qui eum nocte oblatrabant.

Isidorus Ceterum, malim ego cum Aut. Fuch. Coll. Flotentino, Gesn. Camer. hort. & aliis pro Doronico Garyophyllorum dimidium substituere: Aut Rutam, aut Aristolochiam, quàm Doronicum nostrum pro Veterum Durungi usurpati. Traditus quid pro quo, Zurumbet æquali pondere, aut duas tertias de Garyophyllis pro Doronicis accipit. Sed & Bonotie les in Antid. par pondus Zedoariæ Doronici loco sumunt. Idem

Tom. III.

quoque cum Gesn. & Adolpho Occone Galan- *Galanga;* gam substituunt. Caueant autem sibi Medici & Pharmacopœi ne cum Matth. in comp. pro Doronico Antoram siue Anutoram, Aconitum *Antora* pro Aconito sumant. *maile.*

DORONICVM FOLIO SVBROTUNDO
tetrato.

Descriptio
Caulis habet aliquando cubitalem, rotundum, striatum, viridem, intus concavum, capitulum in summo caule magnum, ex multis *stipulis* luteis concavis, & quinque crenis diuisis congestum, quod ab alis longiusculis & in extremo crenatis foliis, fulgore auri splendentibus ambitur, non inodorum: semen superiori simile, cum suo pappo facile euanescent: folia circa radicem longo pedicelo inserta, orbiculata ferè sunt, sensim tamen à pedicelo in latitudinem sese explicant, in ambitu dentata & serrata, quæ verò caulem ambiunt, longiora, & ab ipsa statim pediculi sede in latum expansa, omnia



saporis acris & amari: radix ex viriditate candicans, minimum digitorum crassa geniculata, & quasi squamata, internodiisque distincta, sed nodis sursum tendentibus, non infernè, ex inferiore geniculorum parte longas agens fibras albas laticras, & propagines in lateribus, gustu ferè succi è glycyrrhizæ radice expressi & densati.

Clus. Pann. p. 18. Doronicum Austriacum 2. si- *Synonyma* ne iconem, cui in Hist. post. iconem addit, & Doronicum 3. Austriacum 2. inscribit. C. Bauh. Phyt. *Dor. latifolia* *serratum* *C. B.* Doronicum 4. siue latifolium serratum.

Inuenitur in Etzhei, Durrenstein, & quibusdam aliis Austriacarum, Styriacarumque Alpium iugis, inter saxa. Floret Iulii initio, aut etiam feriis, in hortos verò translatum, ubi non diu permanet, Maio plerumque.

Hoc vñ cum Doronico maximo venatores, pastoresque montani, qui Rupicaprarum radicem appellant, aduersus vertigines non minus commendant, quàm Auriculæ Vrsi statim flectere radicem, viribusque firmandis adprimè vtilem esse ferunt.

Vites *Rupicapra-* *rum radix.*

DORONICVM FOLIO LATO, FLORE
magno.

Descriptio
Humilius est plerumque iam dicto hoc Doronicum, & capite floris maiore, foliis à pediculo statim pæne orbiculatis, ut in Cyclamino alioqui superiori non dissimilibus: radicem item nodi & propagines neque in hoc, ut nec in præcedenti, deorsum tendunt (nodi autem in hoc



Synon.
Doronicum latifolium
fol. flore
magno.

Locus

Nascitur in Veitzalpen supra Neuberg in Stiria, & eodem quo præcedens tempore floret.

**DORONICVM MAXIMVM FOLIIS
hyosciami Peruani modo cau-
lem amplectentibus.**

Descriptio



pediculo nullo, sed instar foliorum Peruani Hyosciami latifolij, Tabacum maius vulgè vocatum, caulem latiore basi amplectentia, viridia, hirsuta: flores extremis alarum ramulis insident magni, vicenis aut tricenis oblongis folijs, & orbem satis latum ambientibus constantes, lutei coloris, odoris expertes: semen vt aliorum Doronici generum, striatum, virelcentis tamen coloris, quod cum suo pappo, auræ leni statu desinit, initium ab exteriori ambitu faciens, quemadmodum & in reliquis Doronici generibus: radix ex viridi candidans, nodosa, squillulæ similis est: sed vbi propaginibus aucta est, crassior fit, & ex multis veluti corporibus in vnicum conflat, & coalescit.

Synon.

Clus. descriptionis auctori, est in Pannon. p. 523. Doronicum 5. siue Austriacum maximum.

minùs apparentes aut anfarum instar longè à matre sese spargunt, sed quasi matri contiguae sursum tendunt & extra terram folia promètes, fibris in tellure sese firmant.

Clus. Pann. p. 520. Doronicum Austriacum. Item pag. 521. Doronicum 3. Hist. post. Doronicum 4. Stiriacum. C. Bauh. Phyt. Doronicum 5. siue latifolium alteru flore magno.

Hist. post. Doronicum 7. Austriacum. C. Bauh. Phyt. Doronicum siue maximum folijs caulem amplectentibus.

Secundum ritus è montibus labentes, locis vmbrosis in descensu iugi Vvechfel primùm obseruabam [inquit Clusius] vnde in hortum translatum mihi egregiè propagatum fuit: sed postea longè maiore copiâ, decliuis, siluosis tamen, locis Fitcheri & Herrenalben inueniebam Augusto flores proferens, cum in Vvechfel floret Iunij initio. In hortis cultum Maio flores dat, veluti & in montanis siluis vltra Drauum, Pannoniâ interamni, vbi anno 1579. frequentissimum etiam obseruabam: semen in hortis Iunio maturum.

Locus

Tempus

**DORONICVM GRAFFOY
dictum.**

Radix rugosa, tuberibus hinc inde inæqualis, Polypodij radicem crassitudine, longis perplexisque fibris donata, quæ in sicca ligularum instar plantæ nonnihil conspiciuntur, sapore insigniter dulci: talis est Graffoy radix sicca, quæ eo nomine delata viridis & plantata, produxit pediculis hærentia folia crassiusculis, aut nullis aut raris pilis donatis, sui similibus vbique, nec foliosa appendice Doronici vulgaris modo auctis: ita quoque & folia ipsa atro virentia, rugosa, duriora, minùsque hirsuta quàm Doronici vulgati, sensim in acumen desinentia, obiter per margines sinuata.

Descriptio

Basileæ in officinis prostat nomine Graffoy vt in Officina Egregij Pharmacopœi Io. Heitzman: qui viridem allatam radicem ex Alpibus Valesianis plantauit in ollam: ea verò translata in hortum Martio incipiebat caulem & florem depromere.

Quidam vulgares comedendam suadent ad vertiginem, quam verè nescio, mihi sapor satis nauseosus quamvis dulcis, qui fortè subuertendo ventriculum ingrata dulcedine potius fortè vertiginem excitaret.

Virus

**DORONICVM FOLIO FERE
plantaginis oblongo.**



Herant teneri, pusilli: folia mollicella, oblonga, vt plantaginis: nonnihil ex viridi fluorescentia, conspicuè hirsuta, Pilosellæ modo, vel Cucumeria agrestis, sed attractanti lenia, ambitu rotundo, sed nonnihil lacinioso & superne angustio, Cucumeri agresti, quàm Cyclaminis similiore, ternis vel quaterna:

Descriptio

quaterna: pediculis innatis radici exiguae, tereti, orbiculatae, sed infernè in angustum lentim adductae, subtus & transuersis quasi squamularum torulis articulatae, apprimè scorpionis cadaver & caudicellam exprimentis, pluseulis donatae fibris: color candidus, sapor dulcis, amari, & lentorem multum paucillè coniectum attractioni praefert: sequispalum altus caulis floribus in summo donatur luteolis, aut pallidis, radiis, Bupthalmi, aut Medice Consolidæ.

Species

Lobel. Adu. descriptionis auctori dicitur Doronici planta, Doronico vulgari & minori prorsus eadem. Obs. p. 370. & Ic. Plastr. p. 648. Doronicum minus Officinarium.

Clus. Pann. p. 517. & Hist. post. lib. 4. p. 16. Doronicum angustifolium, Doronicum Lobelii primum, longiore folio, ad Plantaginis folium quodammodo accedente.

C. Bauh. Phyt. Doronicum 2. siue Plantaginis folio.

Locus

Frequens hæc nunc in hortis Belgicis & Anglis. Burdigalâ delatam etiam habuit Clusius.

DORONICI SPECIES EX HORTO Ferrariensi folio longo hirsuto.

Descriptio



Hæc à Clusio, cuius figuram propono, ni fallor, ita describitur. Eorum Doronici generum, quæ in Austriacis, Stiriacisque iugis à me obseruata, primū caule est breui, pedali dūtaxat, molli, hirsuto, striato: folia illi rara, parua, crassa, longiuscula, supinā parte admodū viridia, & quodammodo splendētia, omnino

tamen villosa, pronā autem læuia, dulcius virentia, at quæ caulem ambiunt, angustiora sunt, omnia porro peracris saporis: summo caule vnicum plerumque fert florem Tertio Lobeliano similem, sed magis aureum, quo evanescente, succedat exiguum semen nigricans, lanugine & pappo coronatum quod leui aura excutitur, & ventu arbitrio fertur: radix parua, geniculata, & internodiis distincta, nigricans, crassioribus candidatibus aliquot fibris donata, gustu aromatico.

Clus. Pann. p. 517. Doronicum 1. siue minus. Hist. post. Doronicum 2. Austriacum 1.

C. Bauh. Phyt. Doronicum 3. siue longifolium hirsutum.

Locus

Primum suum Doronicum Clusius obseruabat in Sneberg, deinde in Snealben & Neuberg: nusquam verò maiori copia quàm in summo Etcheri iugo, inter saxa, tenui, nigraque terra leuiter tecta. Floret Iulio, nonnunquam etiam Augusto, quo mense semen subinde maturitatem consequitur.

Tempus

Tom. III.

Doronicum folio longo serrato.

Mollicellâ lanugine & colore ex viridi flauescēte cum Doronico vulgari conueniunt folia, figurâ tamen alia, utpote longa, parum lata, vnciam circiter, & in ambitu serrata: reliqua petenda ex descriptione Doronici folio rotundo.

Descriptio

Reperi in Rhætia florens mense Iulio.

DORONICVM GERMANICVM FOLIIS semper ex aduerso nascentibus, villosis.



Terna aut quaterna, autore Clusio, summa tellure fundit folia, Plantagini latifoliae ferè æqualia, longiora tamē, & ad Digitalis, luteum seu pallidum florem ferentis foliorū similitudinem magis accedentia, nervis distincta, mollia, viridia, supernè nonnihil villosa, infernè candidiora & laxiora, bina semper ex aduerso

Descriptio

nascentia, gustu nonnihil amaro, & acri: caulem habet ferè cubitalem, nudum, rotundum, hirsutum, qui superiore parte in paucos ramulos diuisus, calicem sustinet hirsutum, ex quo magnus emergit orbis multis flosculis luteis in quatuor foliola diuisis, constans: eum orbem ambiunt quindena, aut plura folia, Doronico latifolio similia, latiuscula, & per extremum crenata, coloris flui elegantis: semen floribus succedens, ut in Doronici generibus, in pappum evanescit: radix minimi digiti crassitudine parè æquat, nodis quibusdam infirmis distincta, multisque fibris donata, lateribus propagines fundens, & singulis annis noua germina profertens.

Clus. Hist. post. Doronicum 5. Germanicum; Pannon. p. 520. Doronicum Austriacum 4. quoad descriptionem: descriptio etiam ibi sine iconē. Figura namque quæ inibi proponitur caret descriptione, estque Doronici illius, quod folio subrotundo serrato inscriptum, isque Hist. post. Doronicum tertium, Austriacum verò secundum cognominat.

In omnibus ferè pratis sublimioribus ad Alpium radices, tum in ipsis Alpibus, Austriæ sitis frequens est: praesertim verò in Wechsel, ad cuius radices Maio florebat, in ipso autem iugo quâ Septentrionem, & Orientem spectat, ferius. Et uebam (inquit Clusius) etiam his proximis annis in caeduis siluis ad Mœnum amnem sitis, circiter mille passus infra urbem Francofurtum ad sinistram. Memini etiam in montanis Belgicæ caeduis syluis erutam, ad nos Machliniam aliquando adferri, Damasceni appellatione.

Locus & tempus

C 2

ALISMA MATTHIOLI SIVE
Plantago montana.

Descriptio



Oblquam agit radicem & veluti reptantem, rufam, quæ ex trāſverſo multas longas fibras demittit, radicem Hel-lebori nigri æmulas, rariores, tenuiores, ſapore acri aromatico & grato: folia craſſiuſcula per terram ſparguntur plantaginis more, quatuor, quip-que, ſex, vel ſeptem, alia

vinciam longa, aut paulò plùs, plantaginis foliorum æmula, alia palmum, vncià latiora, leuiter in acumen deſigentia, Digitalis luteæ ſerè formâ, hirsuta, neruis ſecundum longitudinem donata, non tamen omnibus à pediculo uſque deductis, ſed ex medio neruo obliquè nonnihil & in arcum exporrectis: caulis vt plurimum ſingularis inter hæc ſurgit, Doronico ſimilis, cauus, hirsutus, cubito minor, nonnunquam maior, vnâ aut alterâ oppoſitorum foliorum acutorum, multò inferioribus minorum, coniugatione donatus: ſummo ſaſtigio ſtorem geſtans vnicum. Doronici ſimilem ſerè, formâ & odore, maiorem tamen, totum luteum, foliolis ſtellaus Calendulæ diſcum luteum in pappum ſacillentem obuallanubus, è calyce folioſo viridi, hirsuto: ſemen pappo criſtatum, longum, ſtriatum, hirsutum, compreſſum, acre, odoratum, à Doronici ſeminibus multum differt: eſt vbi & caulis in ramos diducitur, quorum ſinguli flores ſingulos ſuſtinent.

Fallitur Matthiolus exiſtimans hanc plantam omnibus notis Alisma Dioſcoridis repræſentare: ita vt non dubitet aſſerere eam eſſe legitimum Alisma: eius quidem effigiem exhiberet, ſi ſlos non eſſet luteus, nec montes inhabitaret, ſed aquoſos, vt Dioſcorides de ſuo Alismate ſcribit, amaret tractus. Deſcriptio quam Matth. ſuo Alismati accommodat, eſt Plantaginis aquaticæ. Quam pinxit autor (inquit Camer. in Epit.) pro Alismate, non candidum, ſed aureum genti ſtorem in hirsuto ſubrudenteque cauliculo, pedali, odore ſternutamenta cientem, qui tandem in pappos abit. Hanc Boh. vocant Augelfy fraut/ Engelfraut, Helueticj Mutterwurz, & plantaginem alpinam.

In figura Matthioli & Dalechampij (qui eam Ptarmicæ nomine pingendam curauit, vt ſuſidè dicetur) non erant omittendi nerui nec pili, quamvis interdum obſcurius appareant.

Gefnero de hort. vii videtur, Alisma alpinum ſortè nominari meretur, herba plantaginis folijs, flore Doronici, ſternutamenta mouente. Idem hanc Caltham alpinam vocat, ac aliquos [Cluſium teſte Camer. in Hiſt. germ. Matth.] Doronicis non rectè adnumerare ſcribit.

Lobel. in Aduerſ. pag. 133. hanc deſcribit, vocatque Nardum Celticam alteram, ac ait Rondeletium Nardi Gallicæ ſpeciem conieſſaſſe. Idem alibi dicit Commentatorem ſaſtiditæ cæterorum iudicijs, mutam picturam indiſta ſuffeciſſe pro Alismate, & neſci cuius plantæ ſit. Nobis autem figura Aduerſariorum non multum placet, quâ melior eſt Matthioli, quamvis non agnoſcat ſuum Nardum pro Alismate Matthioli, ſed hoc ad aliam plantam referat. In obſerv. porrò pag. 170. ipſi videtur Nardus Celtica altera, Caltha alpina Gefneri, plantago alpina quorundam.

Dodon. lat. in fol. Chryſanthemum latifolium inſcribit, ac Germ. waldblum vocat, aitque eſſe qui Alisma Dioſc. velinaſſe idem eius opinionis ſuit in Hiſt. de floribus] ſed Chryſanthemum latifolium citius appellandum quàm temerè Alismatis nomen ei tribuendum.

Hæc planta eſt Doronicum quartum Cluſio in Pann. Doronicum ſextum Pannonicum in Hiſtor. poſt. quod ipſi non obſimile videtur illi plantæ, quam Matthiolus pro Alismate exhibet.

Hort. Luſ. Alisma Matthioli alpinum, Caltha alpina Gefneri, Engel tranck/ laugen fraut/ Mutterwurz/ Schinere blumen/ Plantago alpina, Damafonium quorundam.

Tabern. duas habet figuras vnus plantæ in Icon. & Hiſt. lib. 2. p. 410. 1. Damafonium Dioſcoridis, Groß Luciansfraut. 2. Damafonium alterum.

C. Bauh. phyt. Alisma ſiue 2. folio hirsuto, flore luteo. Huius, inquit Plantæ, tres apud auctores extant figuræ. Quarum prima eſt Alismatis ſeu Damafonij nomine apud Matth. fol. lat. pag. 604. lib. 3. cap. 157. & icon. 4. pag. 606. qui ſolis glabris vnico neruo medium ſolium percurrente pingit. Hunc imitatus Lugd. pag. 1057. Damafonii Matthioli nomine ipſius figuram proponit: & etiam pag. 1169. Ptarmicæ nomine deſcripſit. Sic & pag. 924. Nardi Celticæ alterius Penæ nomine, ita vt vnus plantæ quatuor figuras diuerſas pinxerit. Secunda eſt Chryſanthemi Latifolij apud Dodonæum pag. 265. qui glabris quidem pingit folijs, ſed neruis aliquot per ſolium latiſ: hunc imitatur Tabernamontanus Icon. pag. 738. Damafonij primi Dioſcoridis nomine: & Lugdunenſis pag. 1358. qui figuram Dodonæi nomine Chryſanthemi latifolij poſuit. Tertia eſt Lobelij Icon. pag. 313. Nardi Celticæ alterius ſeu plantaginis alpinæ nomine: qui hirsuta & neruoſa pinxit ſolia.

Doronicum 6. Pannonicum, quinto Germanico non valdè diſſimile, ſatis copioſè naſcens Cluſius inueniebat vicinis Nemethvyvvar arci cæduarum ſiluarum decliuiſus, ſtorens Maio. Plantago montana, vti mihi primò denominata eſt, in Rhætia circa Burmium reperta, vbi in montibus collegi meſe Iunio anno 1561. in peregrinatione mea Rhætica cum Gefnero. Hæc planta à me etiam reperta eſt in Lotharingiæ monte Balon, ſtorens adhuc Auguſto cum ſemine maturo, maxima pars deſloruerat: inde tranſtuli in Hortum E. C. Montem belgardum, verum periit. Sicca mihi etiam allata per Doctiſſimum Medicum D. Petrum Turnerum Anglum caule multò maiori, in quo erant duo, tres, quatuorve flores, vt in Doronico, ſortè culta fuerat in horto.

Nauſcam pecorum emendat, herba in puluerem redacta ac propinata. Potiunculâ ex huius Meiſque decocto parata vrinæ copiam cuidam dyſſuria laboranti eliciuit Lobelius.

Nardus
Celtica Aduerſ.
Nard. Gallica.
Aduerſ. mala.

Plantago
alpina
Chryſanth.
latifol. Dod.

Doron.
Cluſ.

Huius plantæ tres figuræ apud auctores.
Alisma

H. Lugd. 4.
inſidè plantæ figura.

Chryſ. latifol.

Nardus
Celtica.

Locus & tempus

Viret.
Nauſia
pecorum.
Dyſſuria.

Matth. le-
ſus.

Plantago
aquatica.
Matth. no-
tatur
Figura
Matth.

Pharmica
H. L.
Alisma al-
pinum.

Caltha al-
pina.
Doronicum
male.

TUSSELAGO ALPINA FOLIO
longo.

Descriptio.

Tussilago
alpina
caule
longo.

Hellebori
fibras i-
mitatur quo-
dāmodō Tul-
silaginis huius
Alpinæ radix
transuersa, fi-
brosa, sapore
ut mihi vide-
tur nonnihil
aromatico: fo-
lia crassa, que-
dam palmo
longiora, par-
te inferiore
hirsuta, per
margines ser-
rata, multo
breviora, la-
tioraque ado-
lescenti, quā
adultæ plantæ,

caules interdum cubitales, summum cacumen or-
nat flus ruginus Doronici, vel Calthæ aut Planta-
ginis Alpinæ Iohannis Fabricii (à qua tamen dif-
fert) aliquando duo, tandem in pappum abeun-
tes.

Gesl. in annot. propria manu ad plantam scrip-
ta, Tussilaginis species alpina, quam à floris co-
lore auream cognominat. An Aster montanus
luteus de quo H Lugd. p. 1134.

C. Bauh. Phyt. Tussilago; sine alpina folio o-
blongo. à Fraire Io. Bauhino accepta.

Locus &
tempus.

Hanc plantam primò obseruauimus in horto
Gesneri cum ei conueneremus anno 1650. post in
nostra peregrinatione per Alpes Rheticas in
prealto monte Braulio & Albulæ florentem Iulio,
tandem in Sabaudico monte altissimo Thutidi-
do, aliquot miliaribus à Geneua, ubi etiam flore-
bat mente Iulio.


CONSOLIDA AVREA NEMORVM,
Limonii folio, non Alisma
montanum.Locus &
tempus.

IN Areliz Gallicæ syluosis densissimis quæ no-
stro H. Morzano perelegans floruit hoc mense
Iunio Londini, radiatis multis in ambitu foliolis,
Nardi Montanæ, aut Doronici florem & colorē
similē habentib⁹, foliolis est sinuatis Lob. & Pen.
in Adu. Inigre Betæ, aut pondus Limonii, attritis vi-
rentibus, carnosiss, aliquantū hirsutis, crassis,
venosis, Doreæ similibus, amplexis pedales
Doronici cauliculos bines aut ternos: floribus
radiatis Doronici, aut Calendulæ, & conco-
loribus, scitè pectinatim confertis, & com-
missis foliolis, antequam pandantur, ele-
ganti spectaculo: radice multis filamentis al-
bidis sparsa in cespitem summum; Bellidis
modo: sapore Medice Consolidæ, tantillū
acrimonie prodeus, aut Herbæ Doreæ, cu-
ius etiam vires & quandam aromaticitatem
simulatur.

Tom. III.



Alismate Matthioli conuenit: nondum tamen
vidi.

CYANVS.
CAP. III.

Hæc def. C. B. n. 11

criptio habet
multa [non
omnia, ut
C. Bauh. len-
tire videtur]
quæ conue-
niunt Tussi-
lagini nostræ
Alpinæ longi-
foliæ. Alisma
tertium [inquit
idem C. Bauh.
Phyt.] siue A-
lismati affinis
Doreæ foliis,
consolida au-
rea nemorum,
Limonii folio
Aduers. p. 125.
Icon. Plant.
pag. 298. cum

Alismati
affinis Doreæ
fol. C. B.

DE cyano Descriptio

DE cyano
flore, non
lapide nobis
sermo est. Is
igitur ligno-
sam habet,
multisque fi-
bris capillatam
radicem ubi
excreuit: vn-
de caules plu-
res surgunt
cubitum & ses-
quicubitum al-
ti, angulosi, ca-
ui, lanugine
incani, in ra-
mos diuisi: fo-
lia infima;
Lob. acutis la-
ciniis sinuata,
Scabiolæ aut
Dentis Leonis
more, alia lon-
ga, culmum la-
ta, per longitu-
dinem nervo-
sa, crassa, albi-
cantiaue, flores
ex capitulis
squammatis
compactis se
explicant cor-
niculis lacinia-
tis constantes,
colore com-
muniter cyaneo;
& ut no-
men loquitur
cyaneo; alias
albo, aliis pu-
niceo Gesl.
crebris in m.

C 3

Verzeichnis
Florb con-
solider co-
der facche-
11

Eclypsus
angelus
...

Ficus
Sarcocolla
Larrea
Palm.
Opuntia
Cactus
Morus
Gum.
Ficus
Morus
Parosela
Scutella.

fiducia

Deutsche
Ergänzung

donz. Matthioli flores Cyani cum seminibus in vino cotto, contra araneorum & Scorpionum puncturas exhibet: floribus eius conciliatur colore elegans Saccharo, cuius usus omni vacat periculo. Flores Cyani probè cum aqua tunduntur, quæ per densum deinde linteum transmittitur: hac aqua si extrahatur ecchylisma Amygdalinum, pulchro colore caeruleo placebit, magisque si in candidis patinis inferatur mensæ, inspersis passulis Corinthiacis, sine sale: ad putrida ulcera valent florum Cyani contusorum succus instillatus, aut pulvis andorum inspersus: idem succus ad aphthas confert & putrida oris ulcera collutione. Præcipitatis ab alto, & sanguinem spuentibus, propinantur Cyani maioris flores ex aqua Plantaginis. Cameratio florum assumptus pulvis efficax est contra morbum regium. Italice mulieres ad præfocationem uterinam, suffitu ex floribus Cyani utuntur. Io. Wittichius vititur floribus Cyani ad febrem Epidemiam cum mania. Condrillis & Scabiosis congenerem, affinesque facultates & temperiem Cyano inesse crediderunt Atani nostri [inquit Lobeleus] non tanta infelicitate Syrupus à Cichorio Guillelmi Placentini ad æstus viscerum & iecoris immiscere soliti: Astringendo, siccandoque plantaginis ritu refrigerant flores. Contagiosis febribus, ruptis, vulsisque auxiliantur. Utuntur Cyani floris decocto aliqui in palpitatio cordis. In Saxonia eius manipulum in ceteris cum butyro coquunt & exhibent in iætero & ilchoria. Cum aqua florum destillata extrahitur succus ex canero viuo contuso & coingitua puerorum in dentitione illinuntur. Pulvis florum vnde cum capitibus pulueratis, exsiccatis pnis, erysipelati voliter inspergitur.

CYANVS ALPINVS RADICE
perpetua.



Numerosis
fibris &
medioenter
crassissim vnam
radicem coeun-
tibus viuacem
& perennem,
ingrato sapo-
re, figitur: cu-
bicales & al-
tiores caules
sunt gens lanu-
gine multa vil-
losos, argulo-
los, quibus ad-
nascuntur folia
Lychnidis co-
ronariz, lon-
giora, latiora,
lanuginosa,
mollia, alis la-
tiusculis ad

proximum usque folium semper cum caule continuatis : capitula squammata flores sustinent Cyni vulgaris, sed longe maiores, fimbriatos, & æ caeruleo purpurantes, nonnunquam & albos, corniculis circiter uncialibus purpureis, quo etiam colore prædita sunt *stamina*, apicibus tamen cinereis.

Verbalcula Tragus hunc Cyanum inter Verbaſci genera
4. loco reſcribet, Verbalculumque inſcribit, ſed

quâ ratione non vido. Is sit à Dioscoride Lychnitidem, Lucernare, & Tryallida nominati, Ast Thryallis, vt Dodon. titatur, flore rubet., cum tamen Tragus suo Vebaculo cæruleum acscribat. Cyanum siluestren, inquit præterea, Germanicè wald forn blüm apello, quoad commodius sit. *Cyanum* emergat nomen.

Dicitur hæc plāta Meth. in suis comm. qui tan-
tūm pingit. Dod. gall. & Lat. in fol. Lob. Obf. p.
296. & Icon. Plāt. 548. Cast. H. Lugd. p. 347. Camer.
in Hist. Matth. germ. & Epit. & hort. Cyan. maior.
Lobel. Advers. p. 246. Cyan. maior hortenſis. Lo-
nic. wald form blūm cyanus filu. verbalci ſpe-
cies ſiluatica. Taberi, cyanus montanus, Geſn.
hort. cyanus exoticus Reichio, cyanus monta-
nus vel ſiluaticus. Ceſalp. cyanus flore grandi.
C. Bauh. Phyt. cyanus ꝑ. ſive montanus latifo-
lius, vel Verbaſculum cynoides.

An præterea Math. in prior. comm. in Diosc. lib. 4. c. 10. Piloselle genus, flore cyani similitudine, maiore tamen, foliis Echii? Hanc Pilosellam in post. comm. cum mag. fig. vt imaginariam non meminit.

Cyanum montanum sine alpinum ex montibus in hortum transtuli Genevæ. Basileæ cum essem inveni in monte wasserfal / nec non in hortis florentem junio & Octobri observavi. Montbelgardum attuli ex montibus circa *Montier*, in hortum meum, ubi hilariter provenit, mirèque serpit, florens adhuc Octobri, quemadmodum etiam transplantatum in Horto g. c. Bononiæ in orto ad S. Salvatorem aliquando vidi.

Huiusce plantæ vires nullus Antiquorum, Vires:
quod Matthiolus sciverit, scriptis mandavit: non
desunt tamen Recentiores, qui putent cyanum
propria dote pestilentibus morbis aduersari: *Pestilen-*
maioris pulvis datur vtiliter ab astro de uolutis, &
morbis.
sanguinem reiicientibus, ex aqua Plantaginis, aut
Portulacæ, aut maioris Symphyti, aut Equiseti:
succus illitus recentia vulnera glutinat, & oris
vulnera sanat.

SERRATVLA.



Quam Ser- Descriptio
catulam
vocalum à
Betonica dif-
fert. Hæc au-
tem ~~ante~~ re-
cto à rigido,
striato, glabro,
rubente, ad cu-
bitos duos at-
tolitur, qui eis
summitatem
in ramos mul-
tos finditur:
folia, aliâ inte-
gra, Betonice
paria, aliâ Sca-
biose instar la-
ciniata, utra-
que atrouir-
entia, hisluta,
arguto spinu-

larum initium agmine ferrata : capitula crebra
extremis furculis infident, oblonga squarrosa,
atrorubentia, è quibus flores emicant, lacez ni-
gra, purpurei siue carnei coloris: radices è crebris

fibris parvis componitur, sapore subamaro, tandem & eo quem Cynus manu exhibet.

H. Lugd. p. 1068. laca rubra maior laciniola. Item p. 1357. Serratula. Iuxta figuræ & descriptiones vnius plantæ.

Quod C. Bauh. in suis n. Hist. animaduersionibus non obseruauit, sed ipsemet etiam eodem errore lapsus est, tradens bis eandem plantam.

Tabern. icon.

Tabern. tres habet icones, Serratula tinctoria: 1. 2. 3. 4. Scharren Krauter / ferber scharren. Verum mihi videntur luteæ naturæ, nec diuersarum plantarum icones. Et porro laceam aromaticam, & laceam Caryophyllatam cognominat, propter odorem quo prædita est radix, Boh. Sepef.

laca aromatica aut caryophyllata

Serratula, à foliis minutum circumquaque serratis, nomen habet. Serratula dicitur Matth. passim in suis in Dioscor. comm. Dodon. lat. in fol. Lob. Adv. p. 231. Obs. p. 287. Ic. plant. p. 534. Cast. Camer. ad Hist. germ. & Epit. Matth. item de herba. Clus. Serratula Matthioli. Thal. Centauroides aut Centaurium maius siluestre Germanicum. An Solidago Sarraceni Lonicero. An C. salp. lib. 13. cap. 53. *Certerra*, seu *Serrera* ab insectoribus lanarum appellata, quæ herba lanaria dici possit.

Herba lanaria Locus.

Nusquam non occurrat, authore Clusio, in siluis cum Pannoniæ tum Austriæ, atque etiam in plurimis vdis pratis siluis contiguis: frequens in Francofurtensi agro. In siluosis etiam Bohemiæ pratis nasci scripsit Matth. olus. Pena etiam in nemorosis & decliuibus Pedemontis & Septentrionalium Nortmanniæ & Angliæ. Serratulam collegi Tubingæ, præceptor meus D. Fuchsius in com. scriptis vocabat Seabiosa 8. genus. Generæ reperi, Dom. Dalechampius vocabat laceam rubram maiorem, Montbelgardi habeo in Horto E. C. primo anno caulem protulit.

Vires Ruptura. Vlcera. Hamorrhoides.

Datur vtiliter, autore Matthiolo, potanda ex albo mero raptis, & ab alto deuolutis: idem præstat radix puluerisata, & 3i. pondere in vino calidè pota: in vino decocta, ac deinde illita, vlcera minuscè mundat, carne replet, & cicatrice obducit: hæmorrhoidum quoque dolores mulcet foris adhibita: folia, & radix simul contusa & imposita vulnera & enterocelas sanare creduntur. Serratulam calidam & siccam in secundo gradu statuit Tabern. qui radicem ad vsum medicum colligendam præcipit, quam primum folia protuberent.

Enterocela.

CYANVS PVLCHRO SEMINE centaurij maioris.

Descriptio

Cylindrica proficit hæc herba, si qua alia plurimum: spontanea caulis vix palmaris læpè singularis: in hortis bicubitalis & multis ramis brachiatus, firmus, rigatus, medulla alba donatus: folia priora duo orbiculata, alia quæ sequuntur longa vncias duas vel tres, laciniata, quæ veluti crispantur, nonnihil hirtula, superiora in laciniis insigniter tenues diuiduntur: extremis ramulis insident capitula parua oblonga, squamis raris sed longis, purpurascensibus, lumbis, imbricata: florem ferentia stamineum purpurascens: semina Centaurij maioris, minoris, nitido lactore lubrica, inferne nigricantia. Zona alba circa partem superiorem cincta, vimbilicem coronante rufio, longoque barbituo, ut pulchre aspergillum aquæ lustrali intungi solitum.



simulentur: inest semini medulla alba: nondum solet singularis esse longiuscula. Nostri icon non placet.

Lobel. & Pena Adv. p. 189. plantula non inelegans, caule sesquipalmaris & pedalis, semine Carthami. Obseruat. p. 16. Chondrilla rara purpurascens flore semine nitido deciduo: an Chondrilla al-

Synoni

tera Matth. Belg. Crupina, detorto vocabulo à Gruyden hoc est, repere, quia semen manu contractatum se subducit ac prorepat. An hæc Chondrilla rara purpurea Lobelij, sit Matthioli Chondrilla altera, frustra inquit Hist. Lugdunensis, & Lob. id quod iam monuimus capite de Chondrilla.

Crupina Belgarum. H. Lugd. Crupina Lob. not. Chondrilla altera Lob. Camer. Chondrilla Narbonensis.

Camer. hort. Chondrilla rara Lobelij siue Crupina Belgarum.

Tabern. Icon. Chondrilla Hispanica Narbonensis, Spanisch Condriellen. Hist. Herb. Condrilla purpurea quibusdam Crupina. Tota planta est sapore amariante.

C. Bauh. Phyt. p. 215. Chondrilla purpurascens flore Lob. Chondrilla rara, diuersa est à priore [Matthioli intelligo] quia hæc multo tenuiore est folio minorque: illa Italica, hæc Narbonensis. Nullam noui Chondrillam Italicam cui hæc Narbonensis similis sit aut cum qua comparari possit.

C. Bauh. not.

Prouenit Montbelgardi in Horto E. C. Montpelij obseruauimus. A Tabern. colitur in hortis, ei missa ex Hispania. Hæc rariæ, & agri Narbonensis collibus non procul à Lupo monte exit, Lob.

CYANVS PERAMARVS REPENS folio Lauendula.



Minor obseruata hæc (inquit Lobel. & Pena Aduers.) non alio quam ad Cyanum aut laceam referenda, foliis oblongis, angustis, Lauendula, rigidis illius plantæ, quæ incanis, albidis, Cyanis & laceæ mediam, vna interiecta planta, proximè descriptissimus, similibus, in cauliculis gracilibus, viticosis, palmar-

Cyanus lat. ca.

palmaribus, pedibus, & sesquipedalibus: quorum singulis summis staminei flores singuli laceę, obsoleta purpurā, ē poculis squammosa infertione conflatis prodeunt. Radix digitum paruum æquat. Tota planta gustu perquam amaro & ingrato. Lobel. Obs. p. 296. Cyanus peramarus lupinus capitulis squarrosis Sesamoidis parui. Icon. Pl. p. 548. Cyanus repens.

C. Bauh. Phyt. Cyanus 3. siue repens latifolius. Subter Seseli pratensis ramulos ad Sellam novam & alibi agri Monspeliaci reptando latitat, inquit Aduers. ex quibus desumpta præmissa descriptio.

CYANUS LINEOLIVS

repens.

Descriptio



A Valerado Dourez plantam siccam habuimus hoc titulo Heliochrysi species, cauliculus dodrantalis, folia ferē Lini, valdē crebra, vñcia pauld longiora, angusta capitula longa, squammosa; similia Stœchadi citrinæ alteri inodoræ, verūm squammæ breuiiores videntur, ē quibus erumpit tomentum candi-

cans: saporem insignem non animaduerto.

Hanc plantam etiam optimē exprimit figura Lobelii Obs. p. 296. cui titulus Cyanus repens alter Cyanus peramaro repenti non abfimilis, sed exillioribus multd foliolis & candicantibus capitulis argentei nitoris.

Icon. Plant. p. 549. Cyanus minimus repens.

C. Bauh. Phyt. Cyanus 4. siue repens angustifolius.

XERANTHEMVM. CAP. IV.

Descriptio



Tom. III

A Nguloso est caule, incano, lanuginoso, palmari & altiori, singulari plurimum & in ramos diuatico: per quem folia alternatim disposita, denso tomento candicante vndique obsita, vñcias duas aut tres longa; culmum lata: singulorum ramulorum extremis singula hærent capitula oblonga, ex

quammiis candicantibus & lucidis, nitidis contexta, in acumen desinentibus cum stria rubente: flos stellatus, squallidus & exsuccus, foliis constat acuminatis rubentibus, capitulorum squammas imitantibus, sed longioribus: quorum medium occupant stamina numerosa confertaque, rigida, candida, hirsuta; inter quæ latent semina lata, veluti spinæ albæ, mollia: radix singularis lignea.

C. Bauh. Phyt. p. 533. lacea 24. siue incana altera, Cyani capitulis, folio integro. Stœbe incana altera Lobelio.

An Gesn. de hort. Ptarmica alia Monspeli di- & a, vera [ut existimant] Aretio? An Cæsp. lib. 13. cap. 54. Quædam Cyano similis quam Dioscoridis Ptarmicam vocat? An Lobel. Aduers. p. 235. Incana altera Cyani aut laceæ capitulis & flore, propior Cyano quàm laceæ, quàm quidam arbitrati Ptarmicam siue Sternutariam primam? An eadem in Obseru. p. 295. Incana lacea altera? Adv. Ptarmica vulgaris Herbariorum? An Icon. Plant. p. 544. Stœbe incana altera Cyani aut laceæ capitulis & flore, Ptarmica vulgaris Herbariorum?

Synon:

Ptarmica

Stœbe incana.


Locus & Tempus.

Xeranthemum vocabat præceptor meus Gesnerus, ob siccitatem & squaliditatem florum etiā recentium. Hanc plantam habeo siccam, eandem etiam mihi attulit Gener Cherlerus collectam collibus quos aux Garignes vocant propē Monspelum.

XERANTHEMVM ALIVD, SIVE

Ptarmica quotundam.

Descriptio



C Vitali inquit Clusius cuius descriptionē & & iconem exhibemus] assurgit Ptarmica Austriaca caule candicante, Cyani æmulo: folia illi infimā caulis parte secundum radicem numerosa, longiuscula, angusta, superne molli lanugine incana; acidiusculi saporis, in ipso autem caule rariora: caulis in aliquot

ramos se spargit, sustinentes capitula, ē squammis veluti argenteis imbricatum sibi inuicem incumbentibus contexta: ē quibus emergit flos venustus & elegans, duodecim aut quatuordecim foliis constans, duris, siccis, mucronatis, coloris initid albi, deinde ex caruleo quodammodo purpurascens, aut illius æmuli qui in Sesamoidis minoris Matthioli flore elucet, nullo odore commendatus, sed solā venustate gratus, & immarcescibilis: coloris enim gratiam retinet per multos annos ē trabe suspensus, aut inter chartas repositus: in ipsa verd plantā [si non euellatur] senescens subfuscum contrahit colorem: semen non multum abfimile Sesamoidi minori, tenuius tamen, & copiosum, inter albam lanuginem latet: radix singularis est, nigricans;

D

dura, capillaribus quibusdam fibris septa, sed annua.

Ptarmica
Matth.

Matth. in Diosc. in prior. comm. *Ptarmicam* latinè Sternutamentariam dictam in Hetruria frequentissimè provenire scribit: Nascitur autem & in Tridentino agro, præsertim Ananienfi tractu, folia incana, Oleæ modo oblonga; unde & *Oliuella* à multis vulgò nominetur. Sed in post. comm. cum magnis fig. Lat. & It. *Ptarmicam* alteram inscribit, ac aliam esse plantam ait, quam *Ptarmicam* appellare libeat, hanc Diosc. *Ptarmicam* non esse. Lectores perpendat an figura *Ptarmicæ* Matthioli sit vera icon alicuius plantæ aut fictitia, aut malè expressa in comm. cum magnis fig. Lat. & Ital. & in histor. Germ. flores nonnihil mutat & alios appingit, multa omittit eorum quæ antè de ea scripterat, ut loca ubi viderit & nomen *Oliuellæ*, quod antè ei tribuebat. Non ampliùs Dioscoridis *Ptarmicam* censet. Et hinc apparet quàm falsò in prior. comm. scripserit capitulo florum & herbæ vim quandam aded acrem inesse, ut olfacta statim sternutamenta excitet. Hæc enim vis *Ptarmicæ* Diosc. debetur. Falsum ergo etiam est huius Galenum meminisse. Si Matthioli *Ptarmica* est eadem cum Austriaca ut vult Lobelius ineptè picta est.

Ptarmica
Austriaca
Lob.

Lobel. Icon. Pl. p. 545. Obs. p. 295. *Ptarmica* Austriaca, *Ptarmica* Matthioli, *Ptarmicæ* vulgari cognatæ, peregrinæ venustatis: Herbarij eam in hortis colunt propter elegantis effigiatæ floris gratiam, similinæ & concoloris *Sesamoidi* parvæ, sed aspectu hilarioris è capitulis squamulis lucidis argenteis compactis, sibi imbricatim incumbentibus. Folia Oleæ. Huius semen in Belgium Viennâ Austriæ ad amicos misit Clusius, quæ feliciter adolevit. *Ptarmicæ* nomen huic plantæ imposuit Clusius, non quòd sternutamenta moueat, sed quòd reliquis notis satis aptè cum Dioscoridis *Ptarmica* conveniat: tenues enim habet virgas, folia Oleæ, incana, molliora tamen, & *Anthemidis* parè florem. Austriacam cognominavit, quia primum in Austria infra Anilum flumen, præsertim verò circa Viennam totius Austriæ metropolim, spontè nascentem inuehiebat: conspiciebat etiam in Pannoniâ Transdanubiana, Tirnaviensi itinere. A mulerculis *Rhyzotomis* *Scabiola* appellatur, sicæque in totum annum servatur, & venalis proponitur.

Cyanus
Hierosolym.

Camer. hort. *Ptarmica* Austriaca, *Cyanus* Hierosolymitanus. In Hist. germ. & Epit. Matth. *Ptarmica* 2. wilder Bottram / *Oliuella*, hanc reuocat Matth. in dubium. Sunt qui Diosc. *Ptarmicam* faciunt, sed falluntur, Tertiam proponit Clus. cum pulchris lucentibus rubellis floribus. *Camerarius* proponit iconem Matth. nec demonstrat quæ sit, sed diuersam facit à *Ptarmica* Clusij, in eo non consentiens Lobelio & fratri C. Bauhino.

Error quodam.

Gerard. *Ptarmica* Austriaca. C. Bauh. Phyt. 533. Iacea 26. siue oleæ folio altera: *Ptarmica* altera Matth. H. Lugd. *Ptarmica* Austriaca Lob.

Locus & Tempus.

Xeranthemum aliud in Sabaudia reperi florens Iulio, provenit etiam mihi hoc mense Lugduni in horto florens. Inter siccas plantas *Valerandus Dourez* reperi inscriptam titulo *Stæbes* Galeni. Stutgardix collegi semen in horto Illust. Ducis, quod à me seminatum Montbelgardi. Indicavit nobis Dominus Nicolaus Agerius se observasse in Austria & copiosam in Italia. Floret Iulio.

Vitæ.
Fascinat
Scop.

Sib persuadent, teste Clusio, illius decoctum pueris & infantibus propinatum, aduersus fascinationes valdè vtile esse. Rura Italica ex Mat.

thioli *Ptarmica* scopas, quibus panimenta veruntur; conficiant, nec in alium usum colligant.

XERANTHEMI FORTE species.



Pusilla incana. Descriptio
na Iacea altera folio Oleæ, per omnia similis Incanæ alteri capitulis & floribus, exotica Syriaca plantula: sed calliculus minus diuisus, palmaris & sesquipalmaris: folia maiora, Oleæ, magisque incana, minimè serrata, capsula habitiora, nitidis argenteis squamis, gustu insipido, minimè amaro.

Lobel. Obs. Pusilla incana Lob. ser. pag. 294. Icon. Plant. pag. 545. Iacea altera folio Oleæ, *Ptarmicæ* species. Lobel. 294.

Casp. Bauh. Phyt. pag. 533. Iacea 25. siue Oleæ folio C. B.

CATANANCE DALECHAMPII, flore Cyani, folio Coronopi.



Catanance Dalechampii dicta, folia habet Coronopi, hirsuta, candidiora, sæpè integra, aliquando vno aut altero denticello inequalia, sapore nullo eccellente: caules bicubitales, in varios fissi ramos, non sine foliis, teretes, pilis brevibus, sed aliquatùm asperis obstiti, lac manant: ramorum satis longorum extre-

mis insident, singulis singula squartosa capitula, squammis pulcherrimis membraneis pellucidis albicantibus striâ rufescente per medium decurrente, laxo connexu incumbenibus, & tanquam æstu nimio squallidis compacta: quæ in flores expanduntur cæruleos, Cyani æquales: sed foliorum formâ longè diuersa, quippe latiuscula, non corniculata, extremâ orâ Cichoreorum ritu crenata

crenatæ, quorum singulæ adnatæ fibræ ex purpureo hæscientes, apicibus luteis: medium occupati cinnus foliolorum corniculorum violaceorum: radix subest crassa, longa, exterius rubens.

Sesamoides parva Lob. Hæc à Lob. in Adv. p. 336. Ic. Plant. pag. 549. *Sesamoides parva Dioscoridis* inscribitur. Commentator noster, inquit ille, cum suis bellè astipulantibus omnibus ex imagine, aut potius ignavis notis, huic Phalaridis flores & capitula commentus est, & affigit, suo ne, an sui Thesei errore, nescio: forte quia qui illi pictam miserat à nobis Patavii siccam habuerat: Tamen in Italia Longobarda non infrequentior quàm Norbonensi agris plurima squallidis collibus, & etiam herbis ad Lanum.

Loc. Aduersaria meliorem habent figuram quàm Matthiolus, quem non immeritò redarguunt. An autem sit Sesamoides iudicent qui plantam videre.

Matth. lap. in. Quàm verè Matthiolus in prioribus commentis, se minoris Sesamoidis nullam habere cognitionem, tam falsò in post. repertam esse ait hanc plantam, notis omnibus perquàm bellè Sesamoidi minori Dioscoridis adstipulantibus, ut solers quis ex utriusque collatione conicere poterit.

Camer. in Hist. germ. Non leui etiam errore Camer. in Epit. & Hist. Matth. germ. suo Sesamoidi paruo, vires Sesamoidis parui Dioscoridis ascripsit. Nec descriptio Sesamoidis parui Dioscoridis huic in omnibus conuenit, ut ipsemet Camer. in Hist. germ. attestatur.

Matth. in. Chondrilla à nobis appellata species [inquit Dod. de purg. in app. & in sol. lat.] Sesamoides minus nonnullis esse videtur. Parum tamen cum Sesamoide conuenit: est Chondrilla species, non tamen Dioscoridis. Si hanc herbam Matthiolus pro Sesamoide minori depingit iconem eius non benè pictor expressit.

Catanance parva. Hist. Lugd. pag. 1670: Sesamoides minus Matthioli, cui non rectè Phalaridis flores & capitula affinxit, ac qd quidam Catanacè ptiorem esse putant. Item p. 1190. Catanance quorundam, coniectura non aspernanda: quod multè in Historia Diosc. commemoratæ notæ illi conueniant. H. Lugd. duas descriptiones & figuras vnius plantæ habet.

H. Lugd. in. Tabern. icon. & Hist. Sesamoides paruum Matthioli, flein Sesamoides fraut. Figura non bona.

Sesamoides cerulea. C. Bauh. Chondrillis adnumerat, ac Phyt. pag. 117. Chondrillam ita facit, Sesamoidemque dicit aliis appellari ceruleam, nonnullis Catanacè.

Catanance. Gesn. de coll. stirp. Corionopus quidam flore ceruleo.

Loc. & tempus. Chondrillam Dodonzi Frater C. Bauh. in colle iuxta Castelneuf, Monspelii florentem vidit mense Iunio. Catanancem Dalechampii obseruauit Basileæ florentem mense Iunio, Iulio, Augusto, Septembri & Octobri in horto Dis. Fœlicis & Zyvingeri: eodem mense collegeram in Gallia Narbonensi, Inter Nemausum & Monspelium, & inter Pontem S. spiritus, florentem Iunio, sed ibi multò minor erat cyano minore cuius olim speciem faciebam: floret Iulio & Augusto Montbelgardi in horto, durans reposita per hyemem: Septembri semen maturat. Satam depingit ut puto Matthiolus non spontè natam. In Narbonensis agri squallidis collibus & etiam herbi.

Tom. III.

dis copiosè prouenire, atque etiam in Longobardia, legimus apud Hist. Lugdunensem.

CATANANCE AFFINIS SESAMOIDES paruum flore magis completo Camer.



Ad Inty- *Intybus Camer.* Abacca potius ego referrem [inquit Camer.] hanc plantam, cum radix late non pauco turgat & multis quoque doctis & rei herbariæ peritissimis hæc sententia arideat. Flores Cichorio figura respondent & alii simplici foliorum textura constant, alii densius stipantur, colore elegant


ceruleo, stamina in medio lutea habentes, è quibus relinquitur semen subnigrum, angulosum, pusillum, squammatis capitulis inclusum: quod an purgandi vim obtineat neminem experiendo cognouisse arbitror. Vnum hoc scio in parua quantitate exhibitum nihil efficere. Sapore est omnino dulci, nihil vel minimum amaritudinis obtinente.

Huius figuram & descriptionem posuit Camer. in Hist. germ. & Epit. Matth. p. 945. hoc titulo Sesamoides paruum flore magis completo:

C. Bauh. Phyt. p. 117. Chondrilla 15. Sesamoides dicta cerulea altera: Apud Matth. Sesamoides 2: siue paruum flore magis completo Camerarii.

Sesamoides paruum flore magis completo.
Chondrilla Sesamoides cerulea.

IACEA NIGRA VULGARIS capitata & squammosa.



Nillum rei herbariæ studiosum addèd tenuè progressus in stirpem cognitione fecisse arbitramur qui Iaceas vulgè appellatas, quarum magnus est numerus ad Scabiosarum classem pertinere cum Clusio statim non agnoscat. Vocatur autem hæc Iacea nigra ad differentiam Tricoloris Violæ, quæ &

Scabiosa Clusio Inscriptio: mi. patio. Viola Tricolor.

Descriptio
Radix.
Folia.

Caulis.
Flores.
Super.

Scabiosa
vulgaris
Tragi
Cirsium
Buglossum
grande.
Spina mul-
lis.
Diversa à
Scabiosis.
Nomen à
colore vio-
laceo im-
positum.
Gemma Sc-
lig.
Geum Pl-
nanum.

Hyosciris.
Lombrina
Bonon.
Herba delle
ferite.
Matresillon
Stoebe
Aphyllantes
Varietas in
flore.
Icon Dodo-
nei.

Hyosciris
Plinij.

Medium.

Iacea nigra

Sanicula
ad ruptu-
ras.
Succisa
Schvvenck.

ipsa Iacea nuncupatur. Huic quædam cum Cy-
anis communia, *radix* latis crallæ, lignosæ sapor,
cum naulea adstringens: *folia* priora aliquid com-
mune habent cum Cichorij folijs, sunt enim
nonnihil laciniata: prævitore nigricantia, lanu-
gine canâ respersa, potissimum quæ per caules,
angusta & rigidiuscula: *caules* striati, fractu contu-
maces, similiter lanuginosi: *flores* è squamuloso
nigricante capite, Cyani vulgaris, pleniores, co-
lore purpurascens: herbarum sapor non perinde in-
gratus ut Morfus Diaboli, subdulcis, cū astrictio-
ne, siccitas efficacior multo, calor propè nullus.

Plantam hanc, ni fallor, Tragus, inter Scabio-
sas refert [Pestimentis] & Scabiosam vulgarem
pratensem cognominat, & ad caput Dioscoridis
conicit, ubi Cirsium describitur. Idque ait se non
sine ratione facere, quod non tantum descriptio
huic competat, sed & nomina, Buglossi nimirum
grandis, & spinæ mollis, quoque conspiciant.

At Iaceam nigram diuersi omnino generis es-
se à Scabiosis, contra quam aliqui putarunt, sta-
tuit Gesner, de hortis, ac ait. Iacea, siluestres her-
bæ, flores habent violacei coloris, unde & no-
men forsan illis impositum. Ia enim Græcis vio-
læ sunt: quæquam Iaceæ nomen vetus non est.
Scaliger alicubi Getiam pro Iacea scribit, tan-
quam à Geo factio nomine, nimirum quod nigra
cognominata in hoc genere radices, ut Geum
Plinianum, odoratissimas habeat, ut ipse scribit:
ego hætenus odorem illum non inueni, cum
tres aut quatuor species norim, omnes Centau-
rio maiori cognatas: hortis quidem dignissima
fuerit species illa, si inueniatur, quæ Scaligero
Cinnamomum aut Nardum olet, veluti Baccharis
quædam. Idem Gesn. Centaurij maioris & Iaceæ
pratensis species minor.

Anguill. epist. 12. Hyosciris Plinij, quibusdam
Græcis dicta Scabiola, Bononiensibus Lombrina,
& Patavij Herba delle ferite.

Dod. gall. & Lat. in fol. pag. 124. Iaceam nigram
cognominat, quam plerique Matresillon voce (ut
apparet) corrupta appellant, & alij Stoeches spe-
ciem faciunt: videtur ipsi à quædam non temere
dici posse: absque folijs siquidem flos eius sit, ex
folijs densè confarctis staminibus constans, ex
quo Aphyllantes nomen acceperit. Is varietate-
tem in flore agnoscat: nam flores ei tribuit coloris
è purpura rubentis raro albidis. Sed icon Dodo-
nei est apud Clusium pro Iacea Austriaca 6.

Errat Senensis inquit Lobelius, qui huius fa-
cultates Violæ flammeæ asserit, & à Scabiosis di-
scernere nesciuit: sed decepit illum nomenclatu-
ra Iaceæ utriusque communis. Ceterum qui hanc
Plinij Hyosciridem diuinant, secedunt: tamen si
pluris ducant virium quàm effigies coniectu-
ram, cum utraque consentiente sit opus: Folia illi
nigricantia, hirsuta, rigida: flores ex purpureo ni-
gricant in ventricosis poculis squammulis com-
pactis semine Cyani aut Carthami. Eidem Obl.
pag. 292. Iacea nigra vulgarior, Iacea nigra vulga-
ris: Hyosciris Plinij Anguill. Medium Diosc. Mu-
tuo.

Tabern. icon. & Histor. Iacea nigra Schwarz
stockblum / Iacea 1. & 2. & 3. & 4. & 5. & 6. & 7. & 8. & 9. & 10. & 11. & 12. & 13. & 14. & 15. & 16. & 17. & 18. & 19. & 20. & 21. & 22. & 23. & 24. & 25. & 26. & 27. & 28. & 29. & 30. & 31. & 32. & 33. & 34. & 35. & 36. & 37. & 38. & 39. & 40. & 41. & 42. & 43. & 44. & 45. & 46. & 47. & 48. & 49. & 50. & 51. & 52. & 53. & 54. & 55. & 56. & 57. & 58. & 59. & 60. & 61. & 62. & 63. & 64. & 65. & 66. & 67. & 68. & 69. & 70. & 71. & 72. & 73. & 74. & 75. & 76. & 77. & 78. & 79. & 80. & 81. & 82. & 83. & 84. & 85. & 86. & 87. & 88. & 89. & 90. & 91. & 92. & 93. & 94. & 95. & 96. & 97. & 98. & 99. & 100. & 101. & 102. & 103. & 104. & 105. & 106. & 107. & 108. & 109. & 110. & 111. & 112. & 113. & 114. & 115. & 116. & 117. & 118. & 119. & 120. & 121. & 122. & 123. & 124. & 125. & 126. & 127. & 128. & 129. & 130. & 131. & 132. & 133. & 134. & 135. & 136. & 137. & 138. & 139. & 140. & 141. & 142. & 143. & 144. & 145. & 146. & 147. & 148. & 149. & 150. & 151. & 152. & 153. & 154. & 155. & 156. & 157. & 158. & 159. & 160. & 161. & 162. & 163. & 164. & 165. & 166. & 167. & 168. & 169. & 170. & 171. & 172. & 173. & 174. & 175. & 176. & 177. & 178. & 179. & 180. & 181. & 182. & 183. & 184. & 185. & 186. & 187. & 188. & 189. & 190. & 191. & 192. & 193. & 194. & 195. & 196. & 197. & 198. & 199. & 200. & 201. & 202. & 203. & 204. & 205. & 206. & 207. & 208. & 209. & 210. & 211. & 212. & 213. & 214. & 215. & 216. & 217. & 218. & 219. & 220. & 221. & 222. & 223. & 224. & 225. & 226. & 227. & 228. & 229. & 230. & 231. & 232. & 233. & 234. & 235. & 236. & 237. & 238. & 239. & 240. & 241. & 242. & 243. & 244. & 245. & 246. & 247. & 248. & 249. & 250. & 251. & 252. & 253. & 254. & 255. & 256. & 257. & 258. & 259. & 260. & 261. & 262. & 263. & 264. & 265. & 266. & 267. & 268. & 269. & 270. & 271. & 272. & 273. & 274. & 275. & 276. & 277. & 278. & 279. & 280. & 281. & 282. & 283. & 284. & 285. & 286. & 287. & 288. & 289. & 290. & 291. & 292. & 293. & 294. & 295. & 296. & 297. & 298. & 299. & 300. & 301. & 302. & 303. & 304. & 305. & 306. & 307. & 308. & 309. & 310. & 311. & 312. & 313. & 314. & 315. & 316. & 317. & 318. & 319. & 320. & 321. & 322. & 323. & 324. & 325. & 326. & 327. & 328. & 329. & 330. & 331. & 332. & 333. & 334. & 335. & 336. & 337. & 338. & 339. & 340. & 341. & 342. & 343. & 344. & 345. & 346. & 347. & 348. & 349. & 350. & 351. & 352. & 353. & 354. & 355. & 356. & 357. & 358. & 359. & 360. & 361. & 362. & 363. & 364. & 365. & 366. & 367. & 368. & 369. & 370. & 371. & 372. & 373. & 374. & 375. & 376. & 377. & 378. & 379. & 380. & 381. & 382. & 383. & 384. & 385. & 386. & 387. & 388. & 389. & 390. & 391. & 392. & 393. & 394. & 395. & 396. & 397. & 398. & 399. & 400. & 401. & 402. & 403. & 404. & 405. & 406. & 407. & 408. & 409. & 410. & 411. & 412. & 413. & 414. & 415. & 416. & 417. & 418. & 419. & 420. & 421. & 422. & 423. & 424. & 425. & 426. & 427. & 428. & 429. & 430. & 431. & 432. & 433. & 434. & 435. & 436. & 437. & 438. & 439. & 440. & 441. & 442. & 443. & 444. & 445. & 446. & 447. & 448. & 449. & 450. & 451. & 452. & 453. & 454. & 455. & 456. & 457. & 458. & 459. & 460. & 461. & 462. & 463. & 464. & 465. & 466. & 467. & 468. & 469. & 470. & 471. & 472. & 473. & 474. & 475. & 476. & 477. & 478. & 479. & 480. & 481. & 482. & 483. & 484. & 485. & 486. & 487. & 488. & 489. & 490. & 491. & 492. & 493. & 494. & 495. & 496. & 497. & 498. & 499. & 500. & 501. & 502. & 503. & 504. & 505. & 506. & 507. & 508. & 509. & 510. & 511. & 512. & 513. & 514. & 515. & 516. & 517. & 518. & 519. & 520. & 521. & 522. & 523. & 524. & 525. & 526. & 527. & 528. & 529. & 530. & 531. & 532. & 533. & 534. & 535. & 536. & 537. & 538. & 539. & 540. & 541. & 542. & 543. & 544. & 545. & 546. & 547. & 548. & 549. & 550. & 551. & 552. & 553. & 554. & 555. & 556. & 557. & 558. & 559. & 560. & 561. & 562. & 563. & 564. & 565. & 566. & 567. & 568. & 569. & 570. & 571. & 572. & 573. & 574. & 575. & 576. & 577. & 578. & 579. & 580. & 581. & 582. & 583. & 584. & 585. & 586. & 587. & 588. & 589. & 590. & 591. & 592. & 593. & 594. & 595. & 596. & 597. & 598. & 599. & 600. & 601. & 602. & 603. & 604. & 605. & 606. & 607. & 608. & 609. & 610. & 611. & 612. & 613. & 614. & 615. & 616. & 617. & 618. & 619. & 620. & 621. & 622. & 623. & 624. & 625. & 626. & 627. & 628. & 629. & 630. & 631. & 632. & 633. & 634. & 635. & 636. & 637. & 638. & 639. & 640. & 641. & 642. & 643. & 644. & 645. & 646. & 647. & 648. & 649. & 650. & 651. & 652. & 653. & 654. & 655. & 656. & 657. & 658. & 659. & 660. & 661. & 662. & 663. & 664. & 665. & 666. & 667. & 668. & 669. & 670. & 671. & 672. & 673. & 674. & 675. & 676. & 677. & 678. & 679. & 680. & 681. & 682. & 683. & 684. & 685. & 686. & 687. & 688. & 689. & 690. & 691. & 692. & 693. & 694. & 695. & 696. & 697. & 698. & 699. & 700. & 701. & 702. & 703. & 704. & 705. & 706. & 707. & 708. & 709. & 710. & 711. & 712. & 713. & 714. & 715. & 716. & 717. & 718. & 719. & 720. & 721. & 722. & 723. & 724. & 725. & 726. & 727. & 728. & 729. & 730. & 731. & 732. & 733. & 734. & 735. & 736. & 737. & 738. & 739. & 740. & 741. & 742. & 743. & 744. & 745. & 746. & 747. & 748. & 749. & 750. & 751. & 752. & 753. & 754. & 755. & 756. & 757. & 758. & 759. & 760. & 761. & 762. & 763. & 764. & 765. & 766. & 767. & 768. & 769. & 770. & 771. & 772. & 773. & 774. & 775. & 776. & 777. & 778. & 779. & 780. & 781. & 782. & 783. & 784. & 785. & 786. & 787. & 788. & 789. & 790. & 791. & 792. & 793. & 794. & 795. & 796. & 797. & 798. & 799. & 800. & 801. & 802. & 803. & 804. & 805. & 806. & 807. & 808. & 809. & 810. & 811. & 812. & 813. & 814. & 815. & 816. & 817. & 818. & 819. & 820. & 821. & 822. & 823. & 824. & 825. & 826. & 827. & 828. & 829. & 830. & 831. & 832. & 833. & 834. & 835. & 836. & 837. & 838. & 839. & 840. & 841. & 842. & 843. & 844. & 845. & 846. & 847. & 848. & 849. & 850. & 851. & 852. & 853. & 854. & 855. & 856. & 857. & 858. & 859. & 860. & 861. & 862. & 863. & 864. & 865. & 866. & 867. & 868. & 869. & 870. & 871. & 872. & 873. & 874. & 875. & 876. & 877. & 878. & 879. & 880. & 881. & 882. & 883. & 884. & 885. & 886. & 887. & 888. & 889. & 890. & 891. & 892. & 893. & 894. & 895. & 896. & 897. & 898. & 899. & 900. & 901. & 902. & 903. & 904. & 905. & 906. & 907. & 908. & 909. & 910. & 911. & 912. & 913. & 914. & 915. & 916. & 917. & 918. & 919. & 920. & 921. & 922. & 923. & 924. & 925. & 926. & 927. & 928. & 929. & 930. & 931. & 932. & 933. & 934. & 935. & 936. & 937. & 938. & 939. & 940. & 941. & 942. & 943. & 944. & 945. & 946. & 947. & 948. & 949. & 950. & 951. & 952. & 953. & 954. & 955. & 956. & 957. & 958. & 959. & 960. & 961. & 962. & 963. & 964. & 965. & 966. & 967. & 968. & 969. & 970. & 971. & 972. & 973. & 974. & 975. & 976. & 977. & 978. & 979. & 980. & 981. & 982. & 983. & 984. & 985. & 986. & 987. & 988. & 989. & 990. & 991. & 992. & 993. & 994. & 995. & 996. & 997. & 998. & 999. & 1000.

C. Bauh. Iacea 1. siue nigra pratensis hirsutifolia: a-
liquando folijs inferioribus laciniatis. Iacea 2. si-

ue angustifolia: Item Iacea, siue nigra altera hirsu-
tuto capite, Iacea nigra Dod. Hist. Gall. & Lobel.

In pratis, teste Lob. & Dodonæo, ac locis her-
bosis, negligentius cultis, tum & iuxta sepimenta Locus &
agrorum ac pratorum frequenter occurrunt. Inter tempus
vicia pratorum censeri potest, ab hac etenim bo-
ues & iumenta abstinere, nec scænum, cui admix-
ta pascuntur. Iunio ac Iulio, non raro & Augusto,
cum flore videtur. Iacea nigra vulgaris capitata
vita Genæ florens Maio: Basileæ in pratis quæ
itur Mouters, & quædatur frenzack (Iunio & O-
ctobri: propè Menmonuū Augusto. Lugduni etiā
vidi. Montbelgardi passim secus vias & in pratis,
acta hortu lil. & C. p. inuenit semine maturo Iulio
& florens adhuc Octobri.

Gargarizata oris, faucium, laryngum ulcera, &
quævis vitia emendat, apostematibus & vulnere
sauciatis medetur, inquit Lobelius. Calida est ac
sicca, sed non adeo ut Succisa siue Morfus Dia-
boli: commendatur etiam ad faucium, tonsilla-
rum, vulvæque tumores, veluti succisa, sed facul-
tate & potentia minor est, teste Dodonæo. Com-
mendatur à Chirurgis apud Tabern. ad quascun-
que rupturas & affectus internos decocto propi-
nata. In quem vsum & puluerem eius in cibo &
potu offerunt. Ad relaxationem Iaceam albam &
nigram adhibet Fontanus.

IACEA CVM SQVAMIS CILII instar pilosis.

Hæc (qualem habemus) in dodrantes ra-
mos finditur, graciles, angulosos, stri-
tos, aliquantulum hirsutos, folijs am-
plos vncialibus & sescuncialibus, semuncia-
li latitudine & angustioribus, duris, subhir-
sutis: flores ungis purpuræ saturatior, stami-
neos, Iaceæ vul-
gari similes, &
capitulo par-
to, nigrican-
te, cuius squa-
mæ singulæ pi-
los breues ag-
minatum cir-
cumcirca, cilij
instar, possi-
dent.



Clus. in Pân.
pag. 58. Iacea
montana hirsu-
tuto capite: i-
conem autem
p. 545. inscribit
nomine Iaceæ
Austriacæ. Hi-
stor. post. lib. 4.
p. 7. Iacea mon-
tana hirsuto ca-
pite siue 6. Au-
striacæ. Is figuram habet quam Lobel. & Dodo-
næus posuerunt pro Iacea nigra, diuersam tamen
statuit à vulgari, nos volumus dare meliorem
figuram, verum sculptor non bene expressit flo-
res & squammas. Hanc puto intelligere fratrem
C. Bauhinum per Iaceam 3, siue nigram alteram
hirsutocapite.

Siccam habeo munere Vldarici Chelii Medici Locus &
Argentinenfis, mihi etiam data Basileæ à Richne-
ro cum hac inscriptione, Iacea nigra vulgaris.

Anno

Anno 1600. D. Agerius dedit nomine Iacea capite hispido collectam propè Argentinam Crescit in montanis Austria & Pannoniæ pratis, florens Iulio & Augusto.

IACEA CVM SQVAMVIS PENNATIS

hæc capite villoso elatior
& humilior.

Descriptio

Ramis multis brachiata est, usque cubitalibus & longioribus, striatis, angulosis, subhirsutis: cunctis modis & sita per ramos alternatim disposita, breviora, latioraque quam Iacea nigra vulgaris, siccitatem autem viciam longam aditumque vne aliacumata, crenata, ut si na verò palmum



& sesquipedali æquant, ut si Iacea vulgaris magnitudine respondet, verum singula squamæ longo barbato, nigricante reflexo è mutatione præterea sunt: flos è medio squamæ Iaceæ vulgaris, purpureus. Caliculi circa Moospehlum creto, longè est stigonior, foliaque possidet interdum

sinuata potius quam crenata.

Synonyma

Elatior est Clusio in Pann. p. 543. Iacea 2. siue montana villoso capite: hanc pingit p. 544. pro Iacea Austriaca villoso capite secunda: Hist. post. lib. 4. p. 6. Iacea montana villoso capite, siue 4. elatior. p. 7. Iacea 4. Austriaca villoso capite.

C. Bauh. Phyt. Iacea 6. siue nigra 5. villoso capite, folio integro: & alia huius species humilior. Camer. hort. Iacea Pannonica Clusii capite hirsuto.

An Thallio Cyanus Sylvestris montanus integrifolius maximus in Iacea genere?

Minorem habeo inter meas plantas siccas. Maxima dein mihi nata est in horto Ill. u. c. Montbelgardi, attulit etiam Gener Cherlerus in monte Lupi collectam. Elatior & humilior Iacea Clusii in montanis Pannoniæ & Austriæ pratis nascuntur. Florent Iulio & Augusto, & semen subinde proferunt, quod maturitate siccum florem è calicibus excutit.

IACEA MONTANA SQVAMMOSA

maior semine nigro.

Descriptio

Numerosa ab eadem radice ptohit folia, oblonga, vulgatissima Iacea haud absimilia, nec tactu minus aspera, sapore non nihil calido, subastringente tamen: caules plerumque cubitales, striatos, ramosos, foliis angustioribus, & interdum paucis lacinis secundum pediculum præditis obsitos, vrin vulgatissima: capitula in Tom. III.


extremis ramis crassiora, non hirsuta, sed multis squamis tenuibus, & si vel digitis leniter attingas, crepitantibus prædita, internè candicante, superne verò, quæ se flos explicat, fusca: flos multis exiguis foliolis ex purpura candicantibus, in quinque lacinias diuisis consistit, è quorum medio purpurascens tubulus exilit, in summo vultu furina aspersus, quem ambiunt purpurea maiora longioraque foliola, quinque inæqualibus lacinis etiam constantia, vti vulgatissima: semen Cnicus formæ simile, sed exiguum, nigro, paulo maius quàm vulgaris, subastringentis gustus: radix etiam vulgatissima similis est, fibrosa, nigricans.

Clus. Pann. p. 542. Iacea Austriaca 1. siue montana squarroso capite maior. Hist. post. lib. 4. p. 6. Iacea squamato capite 1. montana.

C. Bauh. Phyt. Iacea 4. siue nigra tertia squarroso capite maior.

Provenit copiosè in montanis Pannoniæ & Austriæ pratis, florens Iulio & Augusto, ac subinde semen proferens, quod maturum statim è valculis reptans, siccum florem excutit.

Locus & Tempus.



IACEA MONTANA SQVAMMOSA

maior semine albicante.

Hæc priori serè per omnia similis, paulo tamen humilior, ut quæ raris cubitalem superet altitudinem, foliis minus asperis, & aliquantulum incanis, paulo dilutiore flore, semine minore nec nigro, sed candicante & cineraceo, linguam etiam magis exaltante.

Descriptio

Clus. Pann. p. 542. Iacea 2. siue montana squarroso capite minor. Hist. post. lib. p. 6. Iacea squamato capite 2. montana.

Synon.

C. Bauh. Phyt. Iacea 5. siue nigra 4. squarroso capite minor.

Idem, quibus præcedens locis etiam hæc nascitur, sed maturius plerumque floret, & semen Iulio perit.

Locus & Tempus

IACEA MONSPESSVLANA CUI IN

Squammis fibræ nigre, interdum
acaulis.



SPONTANEA Descriptio

Spalnum vix superat interdum aculei, cultura in cubitalem altitudinem proficit, multis ex radice crassiusculis pro ductis foliis striatis, hirsutis, iocis fungosis, multum ramosis, folia pumila per terram sparguntur Cyani foliorum æmula, incanè longine obliqua, lacinata, alia integra, reliqua per ramos fortuito posita nascuntur: capita foliis oblongis,

minimè dissectis, acuminatis obvallata sunt, medioeris magnitudinis, mollicella, squammis longiusculis compacta, quarum oras fimbria nigra ambit, acumè verò in pinnatas spinulas innoxias fatiscit: *flor* albus stamineus in pappos abit, habui etiam flore purpureo.

Iacea pumila Lob.

Lobel. in Adv. p. 235. vocat hanc Iaceam pumilam, quam etiam depingit prout spontè prouenit. Multò enim ramosior & maior euadit culta in hortis, ita ut alia serè videatur planta. Hanc etiam exhibet in Icon. Plant. p. 542. hoc titulo. Iacea pumilis, serpens, acaulis ferè, flore cyaneo & albo.

Flor duplex.

Est C. Bauh. Phyt. Iacea 12. siue humilis, Hieracij folio, varians floris colore, qui caeruleo aboleto purpurascit, aliquando albus est.

H. Lugd. pag. 1193. Iacea humilis, Hieracij folio Penz.

Locus & tempus.

Monspelij obseruavi flore albo, quæ sine vlllo caule primò erat, sed postea caules producebat multos in terra sparsos: florebat Vere. Hanc dein habui etiam flore albo & purpureo tum Lugduni, tum Genèux in hortis meis, ubi hiemem perserebant, ac virebant, Maioque mense florebant. Rariùs occurrit Lobelio, & serè Norbonensium est, marginibus satorum ad pontem Monspelio distitum, via quâ Frontignanam itur.

IACEÆ GENVS STOEBE SALMANTICA,
folijs mollibus lanuginosis,
caule infirmo.

Descriptio



Folia omnia habet mollia & lanuginosa Eruca instar laciniata, *caule* infirmum ramosum, in terram procumbentem, cuius flores summis ramis innascentes superiore maiores, barbulis exterioribus Cyani æmulis, purpureis (quibus intermixti villi quidam lutei) medium florem occupantibus: *semen* superiori

stipule, vel Cyani semini: *radix* digitalis, albicans, non viuax, sed quam subsequens hiems corrumpit.

Stoebe Salmantica.

Clus. Hist. p. 359. sine icone Stœbes Salmanticensis prioris genus, à Salmanticensibus ad Cyanos relatum. Hist. post. lib. 4. pag. 9. Stœbe Salmantica 1.

Icon Clusii.

Icon apud Clusium in post. Hist. p. 9. non malè videtur quadrare ejus descriptioni: verùm Lob. eam ponit, ut monemus capite de Cœtario collino pro sua Iacea nigra differente planta: & Dodon. pro Cyanoide flore, quam verò Dod. intelligat plantam asserere non possumus, quædam enim in ejus descriptione cum hac planta conuenire videntur.

C. Bauh. Phyt. p. 531. Iacea 17. Stœbe dicta maior altera folijs Eruca.

Nascitur abundè Salmanticensi agro in aruorum & vinetorum marginibus. Floret Iunio, Iulio & Augusto, & subinde semen profert. In Belgica non nisi altero à satu anno.

Locus & tempus

IACEA MONTANA CAPITIS
magno strobili.



Descriptio.

Planta duarum triumve vnciarum altitudine, interdum dodrantalis aut maior, *folia* caulilongitudine vix cedunt: primum nascentia accedunt formæ ad priora Centaurij folia, sunt lata & sublonga, sequuntur alia, in profundas lacinias æquali situ diuisa, subtus densa mollique lanugine candicante oblita,

quæ etiam superius non omninò destituuntur, plerumque tamen viridantia, quædam interdum non laciniata aut parum: *coliculus* quoque tomentosus est, inque ramos subinde diuiditur, sæpè simplex, cuius cacumini insidet *caput* magnum, Scolymi, squammis argenteis aut ex argenteo rutilantibus, purpurascens, per quæ n. tenuibus mollibusque, per oras latefcentibus cristatisque compactile: medium obtinent pappi quos *flor* reliquit, staminibus purpurantibus constans: *radix* satis crassa, simplex aliquando, interdum plurium capitum nigricans.

An Monach. in Mel. Chamæleon albus & Carduus pinea?

Camer. pag. 78. Iacea pumila siue nana: Penz montana, & Carduus pineus Norbonensium: Theophr. Chamæleon non aculeatus.

C. Bauh. Phyt. p. 531. Iacea 13. siue humilis montana capite Pino simili.

Lobel. in Adv. pag. 367. Theophr. [omissa hæc vox in Icon.] Chamæleon non aculeatus.

H. Lugd. p. 1192. Iacea montana, in apricis & glareosis montium locis, Aprili florens, semen Iunio maturescens.

Iacea montana Lob.

Iacea montana Dalechampii mihi oblata est dum essem Monspelij, allata ex monte Ceti, quam postea inueni in montibus propè tres Pontes Mense Iunio. Io. Renauldus Pharmacopœus mihi transmisit maiorem multò, excedentem palmum, ex vno caule duo capita producentem. Vidi etiam folia, quæ palmum excederent. Lugduni mihi prouenit lata.

Locus & tempus

SCABIOSA SQVAMMATA ARGENTEA.

Lignosa radice firmata, *caules* cubitales & bi- cubitales striati, subhirsuti, multis alis con-

Descriptio.

caui

cauli: folia multiplici exsurā difsecta, ad Centaurii maioris speciem minorem accedunt, nigriora, teneriora: extremis ramulorum *capitula* nascuntur turbinata, concinnis lucentium squammarum & candicantium scandulis imbricata.

Synonyma

Sed et
f. m.
m.

Clus. Hisp. p. 359. & p. 361. Scæbe Salmantica altera: in post. Hist. tertia, ad Scabiosas seu laceas referenda, à Salmanticensibus Scæbes nomine insignita, quodd extrema folia utcumque aculeata sint. Hac pro Scabiosa videntur.

Lobel. Obl. p. 294. Ic. Plât. p. 544. Scæbe argentea Salmantica minor, Scæbe

Salmantica 2. Clusii. H. Lugd. p. 1109. Scæbe Salmantica altera Clusii.

Laceæ
capitula
argentea

C. Bauh. Phyt. 530. Iacea 11. siue capitulo squamato argenteo, Iacea alba, Tabern. Scabiosa squamata 10. Bauhini. Iacea 18. siue Iacea Scæbe dicta tertia foliis profundè incisis. Scæbe Salmantica altera Clusii. Scæbe argentea Salmantica minor Lob. Tabern. Iaceam albam huc non refero nec mihi videtur mea Scabiosa squammata argentea, quamvis figura Tabern. aliquatenus conveniat, & quod dixit capitula ex albo lucentia: Iacea mea squammata argentea eadem est cum Salmanticensi 2. vel eiusdem speciei Belgica.

C. B. m.

Tabern. icon. & Hist. 543. Scæbe minor, fleit Etchen fraut: Figuram habet Clusii.

Locum &
tempus

Memini me habuisse Genevæ in horto plantam similem Centaurio maiori tenuifolio, ut eandem penè existimarem donec omnia diligentius perpendere. Valerandus Dourez hanc dicebat esse Scæben Anguillare. Scæbe Salmantica altera Clusii nascitur Salmanticensi agro frequens in aruorum & vinetorum marginibus. Floret Iulio, Augusto, & subinde semen profert. Apud Belgas non nisi altero à saturo anno floret.

IACEA SQVAMMATA CRETICA, quibusdam Scabiosa Cretica dicta.

Descriptio

Habet multa folia longā, supra tellurem expanſa, instar maioris Scabiosæ Matthioli, crasso nervo prædita, & secundum illius longitudinem, non modò multipliciter laciniata, sed ipsæ etiam laciniae in minores alias sectæ: *caulis* deinde emergit cubitalis & amplior, striatus, durus, non dissimilis Iacæ primo loco hoc capite descriptæ, per quem sparsa sunt folia tam dictis minoribus & minus laciniata: finditur deinde in varios ramos, minoribus adhuc foliis, & rariis sectis præditos: extremi rami sustinent squamata capitula, quæ producunt deinde florem multis longioribus *st. seculis* purpureiscentibus, interdum omnino albis, & valde sectis constantem, ex quorum

medio exilit stilus pallescens: euanido flori, succedit semen non dissimile prioris semini, mulea lanugine involutum: *radix* laus crassa, & fibræ quibusdam prædita, instar radices Scæbes Hispanicæ, quæ an vinax sit, me latet.

Peregrino semine (Cretâ allato) Scabiosæ nomine nata est planta Clusio, quæ ipsi in post. Hist. tertium est Iacæ genus ad Scabiosarum classem cum reliquis Iacæ & Scæbes ab ipso descriptus generibus pertinens: Iacea squamato capite 3. Cretica.


An Scabiosa Cretica Anguillare?

Scabiosa
CreticaAn Scabiosa
la Candia?

Scæbe argentea incana Aldroandi.

Scæben aliam ab argentea Salmantica vidit Descriptio Lobel. Obl. p. 294. operâ D. Hermetis Clerici Medici Niuernensis etiam foliis & caule argenteæ Scæbes, sed delicatoribus virgultis, & foliis tomento crasso incanis.

CENTAVRII MAIORIS Species tenuifolia.



Centaurei maioris speciem facio, capitulorum augmento: *radicem* habet minimi digiti crassitudine dodrantalem, sapore Cyani nauseoso: *folia* Scabiosæ squamata argentea, tenuiter difsecta, albidiora, sapore amaro prædita: *caules* vnius, duorum, aut trium interdum cubitorum, altitudine pro

locorum ubi provenit ratione, in multos ramos fissi, *foliis* etiam tenuioribus Absinthii ferè Pontici vestiti: *flores* Cyani formâ, staminei, minores, purpurantes, è capitulis emicant turgidulis turbinatisque, Scabiosæ squammata argentea, paulò minoribus, squammulis asperis pilosis imbricatis, non lucidis, ut in Argentea illa: *semina* parva, oblonga, rufa, quaternis costulis striata, quibus pili adherent: Tanta huius plantæ similitudo cum Scabiosa argenteis squamis ut eandem existimarem.

Est hæc Gesneri Centaurii illa species, quam circa Basileam in muris & asperis locis nasci tradit. Est H. Lugd. p. 1192. Iacea alba, Tabern. icon. p. 151. & Hist. lib. 1. p. 539. Iacea alba, Weisfloedenblum, Iacea 2. species Scæbe: capitulis ex albo lucentibus squammatis: foliis ex cinereo albis. In capitulis autem pilos appingit Tabern, qui in argentea Scabiosa non sunt.

Centaurei
species.
Gesneri.
Iacea alba
Tabern.

C. Bauh. Phyt. Iacea 19. siue Iacea Scæbe dicta 4. Centaurium maius in muris Gesnero. Scæbes Salmanticæ alterius altera species Clusio. Iacea alba Lugd. Item p. 532. Iacea 23. Iacea incana Cyano similis Clusio Cyano minori similis,

Gerard.
nat.

Gerard. Angl. Iacea flore albo white flowered
Anapweede. Non bene dicit flore albo. H. Lug-
dun. p. 1192. Iacea alba. An Lob. Adv. p. 236. Cy-
anus minimus? Cyanus noster minimus, inquit,
in Obs. pag. 294. viticulis Sparteis, perpusillis co-
liculis, qui humenti solo Belgico longè maior
conspicitur.

An Stoebe Salamantica quarta Clusi?

Locus &
Tempus.

Montpelij tota æstate & Autumno conspicitur.
Basilæ abundat in muris vrbis, potissimum
circa Colberg, inter portâ Stein & Eschen, ex-
tra urbem & intra, in itinere versus Moutets in-
ueni: florentem Octobri & cundo Xrentzack: &
veniendo Montembelgardû propè pagum Ra-
gene: euulsi plantandam in Horto E. C. Dale-
champi curatur depingendam nomine Iaceæ
albæ, verum figura non placet. Brisaci Brilgoiz
ad Rhenum florens adhuc Octobri & No-
uembri.

IACEA MONTANA NAR- bonensis.

Locus

Hanc notam subdere visum fuit, propter
nonnullam inter se similitudinem. Cautibus
& collibus Castri noui conterminis Montspeli-
ensis agri nonnusquam à Lobelio reperta. *Cautis-
lo* riget dodrantali & pedem alto, rotundo: folia



pag. 531. Iacea 15. siue montana.

Iaceæ luteæ &
Chamæleonis
læuis Theophr.
media edente,
altera parte in-
cana, glauca,
tantillum hirta:
flores Iaceæ aut
Cirsij, sed mi-
nores: radix se-
quipalmaris,
gracilis, minûs-
que fibrata, gu-
stu cyaneo a-
maricat.

Lobel. Ob-
seru. pag. 294.
Ico. Plant. pag.
543. Hist. Lugd.
pag. 1193. Iacea
montana Nar-
bonensis. Casp.
Bauhin. Phyt.

CENTAVRIVM COLLINVM GESNERI flore purpureo & albo.

Descriptio

Similitudo huic cum Centaurio maiore: De
Centaurio autem collino, Matthiolus, qui
eam Scabiosam maiorem in post. comm. cap. de
Stoebe, inscripsit, hæc tradit. Primo statim ex or-
tusolia profert longa, nullis in ambitu laciniis,
at quæ his succedunt plûs, minoris modo, dis-
secta cernuntur, quæ verò in caule, & ramis sunt:
minora habentur, & magis laciniata. Caules gerit
æstate sesquicubitales, teretes, striatos, incanô-
que qui circa cacumen suos fundunt ramos, in
quorum fastigiis capitula oriuntur in acutum de-
clinentia, compacti squamarum ordine cõtectâ;
Cyani modo, è quib. flores prodeunt ferè etiam

similes, sed rufescentes. Hos denique sequitur
semen paruum; & subnigrum Lychnidis corona-
riæ simile; Radice nititur pollicari crassitudine &
sæpè maiore, brachiataque, sapore subdulci, pasto-
nace proximo. Nascitur inter fruges, & in campis
non cultis, argilloso præsertim solo. Quæ quidem
notæ maximè arguunt magnam inter Scabiosam,
& Stœben intercedere differeñtiam. Siquidem
Stœbe folia fert aculeata, & in lacubus, stagnis,
paludibus, aliisque locis aquosis nascitur. Hæc
Matthiolus, cuius licet figura nobis placeat, di-
splicet tamen seminis descriptio. [Id enim
obseruauimus paruum, oblongum, rufum, &
superiori parte pilosum esse.] Sed displicet
etiam quod vulgaris Scabiosæ vires huic insuper
inscribat, sibi persuadens esse vulgarem. Mat-
thioli glossator pulchram habet iconem. Verum
non demonstrat, an vires scabiosæ, huic conue-
niant, vel Scabiosæ vulgari minori, cuius etiam
figuram nouam posuit.

Camer. nat.

Gesn. hort. Centaurij maioris species Collina
maior, foliis dissectis. Lobel. & Pena Aduers.
p. 232. Iacea nigra maior laciniola vulgari ab inscio
Matthiolo supposita. Item p. 234. Iacea maior fo-
lio multum lacinioso, Dentis leonis, maiusculis
vasculis floris lutei. Obs. p. 292. Iacea maior, &
pag. 293. Iaceæ maioris folio multum lacinioso va-
rietas. Num Cyanoidis flos Dodæadem? an non
potius congener? Nonnunquam Mechlinia in
hortis floribus albis, & capitulis spinosis visa. Ic.
Plant. p. 541. Iacea maior. Lobelium in Aduersariis
per Iaceam maiorem intelligere Centaurium no-
strum non dubitamus, an eius capita bene vocet
vascula, alijs diiudicandum relinquimus: An
etiam in Obs. & Icon. veram eius figuram ex-
hibuerit dubitamus, quia Clusius in Hist. in fo-
lio proponit pro Stoebe Salamantica æ cuius de-
scriptio non conuenit cum nostro Centaurio
collino: licet videatur icon non malè responde-
re suæ descriptioni. Considerandum igitur an
icon illa non sit alicuius plantæ differentis à no-
stro Centaurio collino siue Iacea maiore Lobel.

Iacea ma-
ior.

Dodonæus
proposuit ico-
nem nomine
Cyanoidis flo-
ris, qui qualis
sit asserere nō
possumus. Fra-
ter C. Bauh. re-
fert ad Iaceam
spinosam Mō-
speliensem.
Thal. Cyanus
silu. maior at-
uenis, Mat-
thioli Scabiosa
maior.

Tabern. icon.
p. 153. Hist. lib. 2.
pag. 540. Iacea
tertia, floctem
blum; Item
icon. p. 158. &
Hist. pag. 546.

Scabiosa maior flore purpureo, Gross braun
Scabiosen. Existimamus Tabern. duobus locis
eandem plantam tradere, ided fratri C. Bauhino
duas diuersas statuendi, non consenimus adhuc,
dones nobis ostendantur diuersæ plantæ consi-
miles.

Gerard.

Gerard. Angl. Iacea maior, Great Masfellen. Item ante Scabiosa flore purpureo, purple flowered Scabious.

C. Bauh. Phyt. p. 526. Scabiosa 8. siue maior squamatus capitulis, Matth. maior. Lob. Montana Scabiosa calidarum regionum in qua capitula non recte pinguntur: Hæc floribus est ex purpura subrubentibus: reperitur floribus paucioribus minoribus candidis. Item pag. 530. Iacea 8. siue rubra latifolia laciniata Tabern. Iacea tertia. Item apud Matth. Scabiosa maior squamatis capitulis: Scabiosa quinta Trago. Matthioli Scabiosa montana videtur potius ponenda cum Iaceis, quæ inter Scabiosas præterea conferenti descriptionem & figurâ Matth. cum descriptione & figura Lobelii Scabiosæ montanæ calidarum regionum, manifestum est diuersas ab illis exhiberi plantas. Scabiosam maiorem Matthioli aliquoties obseruavi colore purpurascens & albo, sed non variantem numero aut magnitudine florum.

H. Lugd. pag. 1066. Scabiosa Matthioli maior. Item p. 1108. Scabiosa montana Dalechampii. Vtrobique describitur & depingitur eadem plantæ, quod seuerus Cenfor non obseruauit.

An porro Trago lib. 1. cap. 80. Scabiosa tertia, Scabiosæ 3. genus?

An Dodon. lat. in fol. p. 125. Aphyllantes 3. foliis magis incisus, &c.?

Locus & Tempus. Segetum potius quam pratorum, in Gallia & Anglia plurima. Horti Belgici hanc ut præstantiorem ad usum Medicum colunt: tamen in Angliæ segetibus Conuentrix conterminis abunde proueniat, teste Lobelio. Fuchsius cum apud eum esset vocabat Scabiosæ quartum genus: vidit Tubingæ: Lugduni, Geneuæ, & Tiguri. Valerandus Dourez dicebat Limoniam Theophrasti Dalechampio. Frater C. Bauhinus attulit mihi siccam plantam cum hac inscriptione Cleoma Octauii Horatiani Guilandino. Basileæ cum esset reperi cum flore purpureo & albo in uasculis Brenzæ & Leürach. Montbelgardii abundat iuxta vires: prouenit etiam in Horto E. C. Flore albo vidit Heidelbergæ in horto Dr. Sprengerii cum semine maturo Iunio, unde attuli semina ferenda Montbelgardii in horto Ill. E. C. vocabat Iaceam albam.

IACEA LATIFOLIA SPINOSIS
capitulis pulchris flore purpureo.

Descriptio



Tom. III.

Multis brachiata cubitalibus & longioribus, striatis, a gulosis subhirsutis, tactu asperis, interdum coccinis: folia infima pedalia circiter, palmari latitudine in profundas laticinias diuisa, & Cichori syluestri similia, hirsuta, aspera, superiora vero per ramos passim multo sunt minora, Cyani

aut Hieracii foliorum diuisurâ & magnitudine, vique ad ipsum capitulum crebra. Cæterum capitula extremis ramis hærentia, turbinata sunt; Cyani aut Iaceæ vulgaris capitulis paria, quorum singulæ squammæ flavescentes aut rubentes, alioqui laues & politæ in quinas, senas, aut septenas radiatas spinas, deorsum vergentes desinunt: flores purpurei staminei, tandem in papillos facellunt: semina oblonga, Cnico aliquatenus similia, multo minora, variegata: radix crassiuscula.

Frater C. Bauh. aliquando dedit nobis, nomine Iaceæ spinosæ, ramum huius plantæ, quæ non culta, ea est strigosa, foliis minoribus multo, non tamen angustis, ut in tenuifolia Narbonensi, sed latis etiam iuxta capitulum, laciniatis in spinis etiam differentia: plures enim quam iam dicta & non ternæ.

An Clus. Pann. p. 546. Iacea 4. siue Iacea montana echinato capite. Hist. post. lib. 4. p. 7. Iacea montana echinato capite siue 7.

An C. Bauh. Phyt. p. 530. Iacea 7. siue nigra 6. echinato capite.

Alabat Argentorati in horto suo D. Fridericus Meyer, qui referebat ex semine natam missa à Domino Agerio.

Iacea latifolia spinosa.

Iacea cum spinosis capitulis purpurea tenuifolia.

Caules huius cubitales, striati, asperi: folia aspera, angusta, vnicuique duas longa, quædam rariis laciniata, aut cum quibusdam eminentiis: capitula parua; quæ squamis constant flavescentibus glabris, nisi desinere in tres spinulas: flusculi purpurei.

Lobel. & Pen. Adv. p. 234. Capitulis spinosis Iacea: ad Cellam nouam & vicinis vinetis Montpelii minor sponte visitur alia [Iacea] nigra eadem prorsum radice & effigie, duntaxat tristiore aspectu: florem edit purpureum, interdum album, in squammoso & spinulis horrido capitulo, Calcitrapæ haud absimili.

An Dodon. hist. lat. in fol. pag. 125. Aphyllantes altera similis primæ (id est Stœbe Salmanticæ primæ Clusii) sed caule breuiore, capitulis minoribus, & foliis nigrioribus, saturatiisque virentibus, squamulis capitulorum asperioribus & nonnihil spinosis: flore purpureo è staminibus confecto.

Locus

Iacea spinosa.

An Aphyllantes 2. Dod.

C. Bauh. Phyt. Iacea 10. siue Iacea Stœbe dicta squammis asperis Aphyllantes 2. Dodon.

Iacea nomine passim prouenientem Montpelii obseruauimus florentem Vere, Æstate, & Autumno: Gener Chierlerus attulit ex Gallia Narbonensi.

Iacea Scabiosa. Aphyllantes Locus & Tempus.

Iacea purpurea Hispanica muricata.

Iaceæ luteæ non multum absimilis, foliis Seridis candicantibus, ramis cubitalibus & flexilibus, in quorum summo capite squammata, florem deprementia purpureum: radix valde crassa est longaque & glutinosa.

Descriptio

Clus. Hist. & H. st. post. lib. 4. p. 8. Iacea purpurea Valentina muricato capite, Granatensibus vulgò Arzella: proponebant nonnulli pro Poterio, cum tamen eius descriptioni non responderet.

Iacea purpurea Valentina muricato capite Clusii. Arzella Poterii non est.

Lobel. Obs. p. 483. Capitulis spinosis Carduus stellatus, seu Calcitrapa altera, videtur eadem cum Iacea altera Granatensium Clusii.

Cardus stellatus seu Calcitrapa altera Lob.

E

Abundantissimè inuenitur agro Granatenfi
Locus & Valentino, locis humectis & vmbrosis, floret
Tempus. Martio.

CENTAVRIVM COLLINVM SIVE

jacea spinosa, flore
luteo.

• Descriptio



Foliorum
Varietas.

Flores
Radix

Jac. maior
folio multo
laciniato
Lob.

Jac. nova-
sur

Jacea lutea
Clus.

Jac. fl. lutea
spinosa.
H. Lugd. ar-
bor.

Rigido & recto sur-
gunt, duo-
rum triumve
cubitorum alti-
tudine, multis
alis concauo,
striato, angu-
loso, glabro:
folia ramulo-
rum exortui
subiecta, ali-
biq; per cau-
les & à radice
ad Centaurij
collini (cuius
species vide-
tur) folia acce-
dunt, duarum
triumve un-
ciarum longi-
tudine, vnciam

plus minus lata, in profundas lacinias ad costam
vique dissecta, rigida, dura, tactu aspera: capitula
extremis haerent ramorum, luglandis serè ma-
gnitudine, quamvis loricata, ex viridi flauescen-
tibus, per oras nigricantibus, aliquando laevibus
& sui vndique similibus, aliquando denticulatis
marginibus, interdum in primam longiuscu-
lam mordacem & nigricantem desinentibus,
nonnunquam inermibus: florum stamina in or-
bem explicantur, coloris lutei: radix minimum
digitum crassitudine aequat, superiore parte sub-
inde comola.

Lobel. Aduers. pag. 234. Jacea maior, folio mul-
tulum laciniato, quam alias flore purpureo videre
est in segetibus Montepeliacis, floribus luteis, ve-
nustis: Carthami siluestris nullatenus diuertam,
capitulis, foliis, aut caulibus: Nisi quia tota aspe-
riuscula: quam qui malit Plinij Hyosciriden, no-
bis secundis liceat. Obseru. p. 483. Cardui stellati
varietas: Jacea lutea Clusij, Tragacanthum Clu-
sij. Icon. pag. 543. Jacea maior lutea. Item
pag. 13. Tom. 2. Carduus stellatus capitulis spino-
sis siue Calceitripa. Lobelius non agnouit Jaceam
luteam ludere capitulis modò spinosis, modò
non spinosis: modò vtrumque in eadem planta:
ideò vnam in Aduersariis, & postea in Obseru.
Clusij assumpsit figuram, ponens sub alio titulo,
quam etiam hic habemus p̄teritam nobis absen-
tibus, non tamen rejicienda Lobelij in Aduersa-
riis, quamvis non habeat spinas in capitulis vt in-
terdum visitur.

Clus. Hisp. Jacea lutea i. Hist. post. Jacea lutea,
Salmanticensis vocant Tragacantham. Tabern.
icon. & Histor. Jacea lutea maior Geel Jacea aut
Stocken fraut. Figuram habet Clusij. Gerard.
Angl. Jacea maior lutea yellowe knapweed.

Camer. hort. Jacea flore luteo spinoso.


H. Lugd. 1193. Jacea maior lutea Penz. Item
p. 1474. Jacea lutea Clusij, quoad descriptionem.
Figura enim est Cardui capite tomentoso. Histo-

ria habet duas figuras, prior ex Adu. Lobelij: al-
tera ex Clusio est p. 1488. errore Typographi po-
sita nomine Cardui Erioccephali Dodonzi, quæ
autem cap. 21. aliò transferenda est.

C. Bauh. Phyt. Jacea 10. siue lutea capite (spino-
so. Jacea maior lutea Aduers. collegit Montpelij,
vbi prouenit ad semitam, quæ itur Pœraux, non
procul à siluula, florens Iunio & Iulio: In Sal-
manticensi agro frequens nascitur ad vinetorum
margines & arido solo: floret Iulio: semen Au-
gusto maturum est, Tabern. primùm obseruauit
in agris satis copiosè in Burgundia inter Grand-
ville & veson: Interdum in segetibus Montpelia-
eis videre fuit Lobelio.

Jac. lutea
cap. spinoso
C. B.
Locus &
Tempus.

JACEA MUSCHATA.



Radix ligno-
sa, lœu-
lis rotundis, pe-
dalis: folia lō-
ga, lata, mollia,
tomentosa, laci-
niis longis di-
uisa, alba vel ci-
nerea. Capitula
forma & colo-
re Jaceæ secun-
dæ [quæ Cen-
taurium murale
dicitur] tota plā-
ta satis suauis o-
dore prædita
est, saporis ama-
ricatus cum ad-
strictione qua-
dam. Ita descri-
bit Taberna-
montanus, cu-

jus & descriptionem & iconem proba-
mus.

Eidem Icon. & Histor. Jacea Muschata, Ja-
cea montana. Bergensfloekblum / Groß Bi-
semfraut. Herba muschata maior nuncupa-
tur.

Egregius Medicus Petrus Turnerus Anglus
olim attulit mihi cum hac inscriptione, Herba
quam vocant Inam moschatam, odore florum
suauis Heidelbergæ prouenit arenosis & siccis
locis. Prouenit in montibus & collibus sabulo-
sis, potissimum in agris montosis, vt & circa do-
mum montanam Erdbachianam Schoenen-
berg: præterea inter Electoralem domum Vena-
toriam dictam Neuen Schloß & pagum furn-
heym. Gaudet locis altis & apricis.

JACEA INCANA LACINIATA

capitulis Clusij, flore vno
aut altero.

Hæc ex radice crassa, lignosa, caulem
profert palmarem, angulosum, inca-
num, nudum: folia habet multa ad ra-
dicem per terram sparsa, lata, Stœbes instar laci-
niata, molli lanugine incana: flos vnus vel
alter, Jaceæ vulgari similis, ex capitulo
squarroso prodians, caulis summitati infi-
det:

Descriptio.

C. Bauh.

Casp. Bauh. Phyt. Iacea 14. [apud Matth. Scabiola 5.] sine incana laciniata.

In montibus prope Capuam prouenit.

IACEA SPHÆRITIS.

AD Aphyllantem referri posse videtur, nec squassilis temerè, cuius icon in Celsæo codice extat Sphæriudis nomine, nisi quod abique enatus staminibus depingitur. Nulla tamen Sphæritis à Veteribus descripta reperitur (teste Dodon. Lat. in fol. pag. 126.) præter Cupressi.

C. Bauh. Phyt. Iacea 21. Sphæritis ex codice Celsæo Dodon.

STOEBE ET PHLOEOS
Veteribus.

DE Stœbe, quam & Stibam alicubi & Phleum vocant, inquit illo loco Theophrastus ubi Stœbem [στίβη] appellat. Folia huic in fruticum genere veluti carnosâ [συνέφυλλα] scilicet quia pulpa constant vt Cupressus, Myrica & alia: alibi inquit, Phleus (φλέω) quam nonnulli Stœbem vocant, inter eas est, quæ iuxta spinam seu aculeum alterum quoque folium habent [στίβη τὴν ἀκανθὰν ἰσχυρὰν ἐνὶ τῷ φύλλῳ, & non vt vertit Gaza, iuxta folium aculeatum, altero quoque folio conduntur] vt Ononis, Tribulus: iterum de Phleo inquit. Spinosarum quoddam genus ex toto spinosum est: quoddam spinoso folio constat: tertium genus est aculeatum, quod iuxta aculeum folium gent. Phleus enim Tribulus, Capparisque peculiare nimirum obtinent, non solum caulem aculeatum, sed etiam folium hispidum habent. Et ita omnino legendum esse annotauit etiam aliquando Dalechampsius. Sed quod eo in loco subiungitur, Theodorus non benè omnibus his tribuit, peculiare scilicet habere, vt non solum caulem aculeatum, sed etiam folium habeant hispidum [τὸ στίβη ἰσχυρὰ ἀκανθὰς ἔχει, & τὸν καυλὸν] nam infensius peculiare id soli Cappari inesse traditur: Phleum autem & Hippophæum foliis nitibus constare, id est sine aculeis: ibidem tribuit Phleo folium carnosum multifidum: multasque radículas [τὸ στίβη] non in profundum germinat, inquit, cum Virgilio, nec folia dicitur, non enim annua, sed diuturnior est. Hæc omnia pulchrè conueniunt herbæ suprascriptæ. Sed alia apud eundem Theophrastum Phleum neutro genere appellatur, in stagnis nascentis, cuius fructus placentaceus in lacu Orchomenio protuberans Anthella vocatur: alibi sterile, quæ femina est, foliis Harundineis, de qua alibi dictum est à nobis.

Plinius Theophrastum sequutus malè intellectum: inquit quædam in folio, & in caule habet aculeum [in folio non, sed in caule habet. Falsò igitur hæc Plinius, inquit Dalechampsius, Stœbe Theophrasti folio minime pungit, sed præter folium exarmatum spinosum fructum gignit, Tribuli alterius modo] vt Phleos quod aliqui Stœbem appellauere: vnde error Theodori fluxit. Alibi Dioscoridem imitatus inquit: Stœbe, quam aliqui Phleon vocant, & cœcta

Tom. III.

in vino præcipuè auribus purulentis medetur; item oculis ictu cruentatis: Hæmorrhoidæ quoque, & dysentericæ infusa.

Stœbe, inquit Dioscorides vulgaris est notitia, folia & semen astringunt: ideo dysentericis infunditur decoctum, auribus quoque purulentes instillatur, imponitur etiam oculis cruentatis: ac folia cohibent sanguinis eruptionem.

De Stœbe Galenus lib. 7. simpl. med. diffinit his verbis. Stœbes fructus, & folia maximo sunt visui, adstringendi vim habentis mordacitatis expertem. Sed & desiccant euidenter in tertio ferè ordine incipiente. Quamobrem decoctum eorum dysentericis inicitur, & auribus purè fluentibus tum vulnera magna conglutinat. Evidentiùs hæc præstat cum vino atro austero: valenter enim desiccant omnes præter naturam humiditates. Præterea folia viridia, si illinantur, vim habent erumpentis sanguinis supprimendi: denique & oculorum ex ictu suffusiones illita iuuant.

Alia Stœbe Galeni est odorata & acris descripta lib. de antidotis, qua doliis aggesta patet etis ne acrescerent, imbecillia vina conseruabat. De hac ait. Quam incolæ Colymbada vocant, alii Stœbem, herba fruticosa, calida & acris valdè, parumper redolens, aptissima ad præseruandum vina: appellatur & Stœbe, quodcumque valis interpositur opplendi gratia: ne inuicem collidantur, vt natura fecit in pulmonis fabrica: nam carne molli, instar Stœbes cuiusdam: eius vasa fulcra scribit Galenus.

Id nondum in consilio esse scribit Dalechampsius, An Stœbe Dioscoridis eadem cum Phleo Theophrasti, quam is lib. 6. cap. 1. à quibusdam Stœbe vocari dixit.

Nescio (inquit Anguillara epist. 8. pag. 146.) quid sit Phleon quod Gaza vertit Stœbe. Sed quo loco ita conuerterit Gaza, Anguillara non ostendit, nec nos hæcenus locum inuenimus.

Phleos & Stœbe (vt Honor. Bellus perhibet) vnum & idem est & ex aculeatarum genere. Phleum autem nomine neutro multum à Stœbe differt: plerique doctissimi viri ex confusione horum nominum in maximas tenebras incident, omnes qui Phleos & Phleum apud Theophrastum confundentes eandem esse plantam putant frustra Stœben cognoscere conati sunt. Philios quæ vocatur Stœbe à Theophr. lib. 6. cap. 1. enumeratur inter eas quæ præter spinam folium habent, vt Pimpinella spinosa, & non vt vertit Gaza: Plutarchus in vita Thæsei & Etio Stœbe. Quod Theophr. cap. 3. lib. 6. tribuat Phleo, Cappari & Tribulo folium hispidum, mendum esse suspicor, ait Bellus, &c.

Scabiola minor tenuifolia Matthioli negatur esse, vt quidam voluerunt, Stœbe.

Stœbe Salmantica Clusii 2. est nobis Iacæ genus siue Stœbe Salmantica foliis mollioribus.

Stœbem Salmanticam tertiam Clusii, inscriptis Scabiosam squammosam argentæam.

Stœbe & Scabiosæ Candis Anguillaræ titulum fecimus, Iacea squammata Cretica, quibusdam Scabiola Cretica.

Stœbes Salmantices genus, Centaurii maioris speciem fecimus tenuifolia. Stœbe argenti incana

E r

Stœbe Galeni.

Stœbe alia Galeni.

Colymbada

An Stœbe Dioscoridis eadem sit cū Phleo Theophrasti. Anguill. redarguitur.

Phleos & Stœbe eadem planta sed diuersa Phleum.

Gaza non

Aequiuoca Scabiola minor Galeni Scabiola maior com. minor hirsuta Iacea genus Salmant. foliis mollioribus. Scabiola squammosa argentea.

Xeranthemum.
Stoebe spinosa.
Stoebe Rosmarini folio.
Pimpinella spinosa.
Vulneraria rustica.
Sagittaria.
Sparganium.
Palma humilis.

Aldroandus quandam cognominavit. Stœbe incana, dicta est de nostro Xeranthemo. Stœbem spinosam ex Dodonæo proponimus. Stœbe Rosmarini folio Ponæ. Stœbe Dioscori. Pimpinella spinosa differt à Galeni Stœbe: ut tradit Honor. Bellus, quæ opinio & nobis placet, ut ostendimus suo loco. Stœbe dicitur de Vulneraria rustica, de qua H.n.g. lib.17. Sagittam quidam putant esse Stœben & Phleō Theophr. vide lib.8. Phleon apud Theophr. neutro genere cuius fructus Anthella in stagnis Cæsalpino. Phleon Cordo de Chamæpites, vide Hist.13.

STOEBE SALAMANTICENSIS PRIOR Clusij, siue Iacea Intybacea.

Descriptio. **C**aulis cubitales, striati, subhirsuti, fungosâ comedullâ facti, valdè ramosi: per quos ramosque conspiciuntur folia, Cichorij laciniata, nigricantia, hirsuta, duas, trèsvè uncias longa, vix



culmum lata, in laciniis nihilominus cæsa, vel serrata: capitula summis ramis hærent, Cyani paria, turbinatio- ra, glabris niti- disque & poli- tis, albicanti- bus, per extre- mum rubenti- bus squammis imbricata, è quibus florum emicant stami- na purpurea, quibus marces- centibus pappus dehiscente ap- paret capitulo.

Clus. Hisp. &

Hist. post. lib.4. pag.11. Stœbe Salmantica i. vel prior, ad Scabiosas seu Iaceas referenda, & à Salmanticensibus Stœbes nomine insignita, quod extrema folia utrinque aculeata sint, ac isti cæbequela dicta, h. e. capitulum.

Obel. Icon. Plant. pag.543. Obel. p.293. & 294. Stœbe Salmantica maior Brancionis, quæ ima folia Scabiosæ Hispanicæ & Sequanorum Cirsij media habet. Radix oblonga, nonnihil fibrosa. È cubitalibus & duorum pedum caulibus in longioribus petiolis & squammoso capitulo flos Cyani purpureus. Semen Cnici sed minus: Vniuersa planta gustanti peramara, præsicca, adstringens.

Dodon. Lat. in fol. p.125. Aphyllantes i. is negat esse Stœbe.

Camer. hort. Stœbe Hispanica Clusij. H. Lugd. p.119. Scabiosa seu Stœbe Salmantica prior Clusij. Tabern. Icon. & Hist. Stœbe maior, Gross Stœbenfrant. C. Bauh. Phyt. Iacea 16. siue Iacea Stœbe dicta, maior folijs Cichorij.

Crevit mihi Genex in horto ad aliquot cubitos. Primo verè florentem reperi in itinere Montpello versus Frontig. Sata Montbelgardi in horto E.C. provenit per fratrem C. Bauhinum misso semine, nomine Stœbe. Frequentem tradit Clus. in Salmanticensi agro in aruorum & vine-

torum marginibus, florere Iunio, Iulio, & Augusto, & subinde semen proferre: In Belgia autem non nisi altero à sætu anno. Prouenire obseruauit Tabern. in incultis locis secus vias ad agros & vineas inter Wormatiam & Francenthal.

STOEBE SPINOSA.

Exstat Stœbes spinosæ imago in vetere Cæsar. Loc. Libræ bibliothecæ codice: huiusmodi spinosam Stœbem Dodon. suâ ætate reperiendam esse dixit in Cypro atque Peloponneso, vulgò Morea, planis ac apticis locis, vnde aridam secum attulerit Dominus Bernhard. Paludanus stirpium diligens obseruator.

Dod. Lat. in fol. p.123. Stœbe ex codice Cæsar. Loc. Libræ. Cæsar. Bauh. Phyt. Iacea 22. siue Stœbe spinosa, quam Cyani maritimi nomine se accepisse ait.

STOEBE CAPITATA ROSMARINI FOLIO Ponæ, siue Chamæpitis fruticosa Cretica Belli, aut Iacea fruticans Pini folio Cæsar. Bauhin.



Ex albicante Descriptio. radice lignosa, & aliquantulum fibrosa, varij essentur caules teretes, modo Coronariæ Libanotidis, triid circiter cubito- rum, quadam canitie aspersi: profert folia ut ipsa Libanotis, sed longiora multò, & acumina- nata magis, quæ paulatim flaccida facta, ita sese coarctant, ut omnind appareant Pinaltri

folia, quæque supernè subuirescunt; infernè albicant, cum quadam lanugine, uti & cauliculi: in ramulorum fastigijs edit capitula quemadmodum Stœbe Salmantica prima Clusij, quasi magnitudinis Centaurij maioris, cui etiam flos similissimus est, nisi quod magis purpureascent: semen retinet Cnici, sed nigricans: perennis est planta.

BEHEN ALBUM RAVWOLFFII.

Ex radice folia prodeunt magna & acumina- ta Lapathi instar, rigida ut Pyri folia: ad quorum ima quatuor alia minora aduersaque disposita sunt: cuiusmodi etiam in cauliculis teretibus conspiciuntur: quorum quidam etiam ad cubitalem altitudinem assurgunt, superiora etiam planè adhaerent cauli, ut in Smyrnijs Cretico. Horum summitatibus capitula squammosa oblonga, luteaque insident singulana: è quibus flos quoque luteus emergit.

Radix

Stoebe Sal-
mantica
Clusij.

Stoebe Sal-
mantica
maior Br-
cionis. Obel.

Aphyllantes
Dod.

Iacea Stoe-
be dicta
maior fol.
Cichor.
Locus &
tempus.



Radix prælonga est, in summo ma-
iuculis fibris prædita, quæ
admodum excre-
sunt, ut cum
tempore trās-
plantari que-
ant. Paucis a-
lioqui & penè
nullis fibris prædita est:
tenax est, &
sicut Glycy-
riza nostræ
flexilis, cui
colore & cras-
sitie conferti
potest: magis
tamen albi-
cans angulo-
sæque est.

Rauvolf. itin. lib. 2. cap. 12. verum Behen A-
rabum, quod etiam nostro seculo vocant Behmē
ackma. Item parte 4. inter fig. 288. Behmen
abiad Arabum, id est Behen album.

Ad radices Libani prouenire hoc Behen al-
bum auctor est Rauvolfius descriptionis
auctor.

CENTAURIUM MAIUS

Veteribus.

CAP. V.

Centaurei vox, cuius etiam Hipp. lib. 1. de as-
sect. intern. meminit, passim apud Theo-
phrastum legitur. Ac primò quidem de Hist.
plant. lib. 9. cap. 1. hæc habentur. Accidit verò,
ut vel proprium succi colorem plantæ nonnullæ
fortiantur: aliis enim albus, vel lactuosus: aliis
sanguineus, ut Centauræ & spinæ quam Attra-
ctylidem appellant: aliis viridis, alius alius color:
sed planius hoc in annuis, & annuerialio caule
præditis, quam in arborum genere. His addit
dicto libro cap. 14. Centauris decem vel duode-
cim annis durat, pinguis hæc, spissaque admo-
dum est. Capite verò 9. eodem libro ait. Atilla
veluti commentitia, & è longinquo ducta appa-
rent, Præoniam enim quam alii Glycy pedem vo-
cant, noctu effodiendam præcipiunt: nam si in-
terdiu, & à primo Martio visus quispiam sic seu-
ctum quidem legens, oculis periclitabitur, radi-
cem autem si secat ei pedes procidit. *Centauris*
quoque secantes [accipitrem] triorchon nuncu-
patu cauere, ut sine vulnere nõ possint discedere,
& alia huiusmodi de quibusdam aliis narrant.
Precari autem in secando haud quidem absur-
dum fortasse sit. Sed quæ addunt, absurda potius
dixeris. Hæc Theophrastus, apud quem lib. 9. cap.
1. hist. legendum censemus pro *Centauris*, *Centauris*,
facili errore, quum Plinius etiam ita legisse vi-
deatur. Item lib. 9. cap. 14. *Centauris*, ubi Gaza
malè vertit Fel terræ. Item lib. 9. cap. 9. hist. v-
bi *Centauris* legitur non benè vertit Febrifugæ:
sunt ea nomina Centaurii minoris: quamobrem
non videtur animaduertisse in Theophrasto di-
crimen inter Centaurium maius & Centaurium
minus. Gesner. lib. de auib. cap. de Triorchæ le-
gendum putat Centaurio. Plinius, ut apparet è
Tom. III.

capite 6. lib. 25. legit Centauridi, ubi locum Theo-
phr. de iis qui Centaurium secant & à Triorchæ
vulnerantur, cap. 9. lib. 9. hist. malè vertit. Ego
[Dalechata namque propria manu adscripta] ni-
hil mutandum cenleo. Centauriam quòd existi-
mem illam herbam esse, rubro succo turgentem,
quam sanguinem Drachonis vocamus.

Centauria
herba sanci-
gus drach-
onis.

Nos contra existimamus Theophrasti verba
posse de Centaurio magno interpretari; quan-
doquidem ei radix subrubra, teste Dioscoride, di-
cente: Centaurium magnum aliqui Narçen vo-
cant. Folia habet Nuci regie similia, prælonga,
colore viridia, ut in Brassica, sed ambitus ipsorum
incisuras habet ad ferræ modum. Caulem habet
instar Lapathi, duorum cubitorum aut etiam
trium, atque hic à radice multas propagines ha-
bet, in quibus capita sunt Papaueri similia, in
ambitu oblonga. Flos est caruleus. Semen si-
mile Onico, velut in lanuginosis floribus insi-
tum. Radix crassa, solida, gravis, ad cubitos duos
extensa, succi plena, æris, cum quadam adstric-
tione ac dulcedine, subrubra. Amat terram pin-
guem, apream, & sylvas ac colles. Copiosa est in
Lycia & Peloponneso, in Helide & Arcadia ac
Messenia: & circa Phloë, & Lyciam, & Smyr-
nam. In sine capitis post vires, appellata est
Centauria (Panacea) &c.

Centauria
magnum
Diosc.
Narçen

Locus

Panaceæ

Chironi

Pan. lib. 25. cap. 6. Diosc. descriptionem decla-
rat his verbis, Centaurea curatus dicitur Chiron,
quum Hercules excepti hospitio pertractanti ar-
ma, sagitta excidisset in pedem. Quare aliqui
Chironion vocant. Folia sunt lata & oblonga,
ferrata ambitu, densa ab radice, caules ternum
cubitorum geniculati. In his capita ceu Papau-
rum. Radix vasta, rubescens, tenera, fragilisque,
ad bina cubita, madida succo, amara cum quadam
dulcedine. Nascitur in collibus pingui solo. Lau-
dissima Arcadia, Elide, Messenia, Phloë, & Ly-
cia, atque in alpihus, pleribusque aliis locis. In
Lycia quidam & ex ea Lycium faciunt. Vis in
vulneribus tanta, ut cohaerescere etiam carnes vi-
trant, si coquantur simul. In usu radix tantum
duabus drachmis bibenda, quibus dicitur, si se-
bris sit, in aqua trita: ceteris in vino. Et addit:
Medetur & omnium morbis decocta succus.
Hoc autem in Dioscoride ad finem habetur sic,
Centauria di panacea iustis partibus & phlo-
ë melle munda. Quanquam hoc in plerisque
exemplaribus non habeatur, sicut neque ea
nomina, quæ paulò post ab Apuleio referuntur,
& ad finem inter supposititia à Cornario relata
sunt. Plinius tamen clariùs eiusdem libri cap. 4.
dicit. Quædam genus Panaces ab eadem Chiro-
ne repertum. Centaurium cognominatur. Disting-
uit tamen Lucanus poeta hoc versu:

Locus
Lycium

Panaceæ

Et Panacea potens & Thessalana Centaurea.

Tertia [pergit Plinius eiusdem lib. cap. 6.] est
Centauris Plinio cognomine Thiorches. Qui
eam secat, rarus est ut non vulneret sese. Hæc
succum sanguineum mittit. Theophrastus de-
fendi eam, impugnarique colligentes tradidit à
Triorchæ accipitrum genere, à quo & nomen ac-
cepit. Imperiti confundunt hæc omnia, & pri-
mo generi assignant. Huc usque Plinius, cui
Theophr. lib. 9. cap. 9. errandi occasionem præ-
buit.

Centauris
Thiorches

Centaurium, ut refert Apuleius cap. 34. à Græ-
cis dicitur Maronion, aliis Nesson, aliis Pete-
thronia, quibusdam Limnites. Sed Prophetæ eam
plantam nominant Elema heracleon, alij Chiro-
roniam, alij Limnestin, alij Apogonifapon, alij

Plinii lib. 19.
Pete-
thronia

Maronion. Polyhydion, alij Hemeroton, Ægyptij Antiamas, Itali Fel terra, siue Vneferam. Maronion quidem appellatum est à Thraciæ monte Maronia, quoniam plurima aut probata illic nascitur. Quemadmodum à Chirone Centaura Chironia: Sic etiam à Nello, siue Nello, qui Centauri fuerunt, Nello appellata est Centauria.

Nello. Pelethronia dicta à monte Thessaliæ, vbi Lapithæ quondam equitandi artem, cuius ipsi periti, alios docuerunt, inter quos & Chiron Centaurus censetur. Limnitis, id est paludalis & stagnalis, dicta, quod secus aquarum scatebras & paludes, quas Græci ἀλμας dicunt, nascitur. Et eadem est ratio cur aliqui Limnestin vocauerant & Limnelion. Hæma Heracleos (id est sanguis Herculis) appellata est, eo quod, quemadmodum Hercules immania monstra edomuit: sic etiam herbæ huius radix à quacunque humani corporis parte fluentis sanguinis impetus domat. & consistere facit, seu quod radix ipsa & succus eius sanguinis modo rubescant. Polyhydion, id est, multi aqueam & succosam: succo enim plena est illi radix, & locis succosis ac pinguibus lubens etiam nascitur. Hemeroton dici potuit à nâsuetudine & dulcedine quadâ saporis quæ in radice sentitur: licet enim sapore sit acris & stipticante, nihilominus tamen dulcedine aliqua participat, quæ tamen Græcis mansuetus dicitur. Appellatio Fel terræ ex minore Centauria maiori adiecta est contrario sensu. Constat enim re ipsa maioris radicem dulci quodammodo sapore dotatam, minori verò amaro: quare fel quod amarum est, minori & non maiori conuenit, quod Plinius etiam testatur vbi de minore agens dicit, Hoc Centaurion nostri fel terræ vocant, propter amaritudinem summam.

Vires ex Diosc. Conuenit radix ruptis, autore Dioscoride, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, tussi antiquæ, sanguinem spuentibus: non febrientibus cum vino, febrientibus cum aqua, ita ut radice triæ drachmæ duæ dentur. Similiter ad tormina & vteri dolores. Ducit etiam menses & foetus, in collyrij figuram derata, & vtero apposita. Eadem & succus facit. Est & vulneribus idonea, dum quidem humida est, contusa: andæ verò prius madefacta, atque ita contusa. Committit enim ipsa & glutinat. Quin & carnes dum coquuntur inter se committit, si quis ipsam contusam simul coquat. In Lycia succum ex ipsa exprimunt, & pro Lycio vtuntur. Appellata est Panacea, quoniam omnes inflammatas affectiones sedat.

Rad. triæ drachmæ. Menses. Collyrium. Vulnera. Centaurij magni radix sicut gustu contrarias qualitates, ita in vsu contrarios effectus præstat, id attestante Galeno: Gustu itaque acris simul adstringentque apparet cum leuicula, dulcedine. At in actionibus acrimonia quidem caliditatis opera ostendit, menses prouocans, & foetum mortuum euellens, viuumque corruptens atque eliciens. Adstrictio verò, opera crassæ terrenæque frigiditatis, cum vlcerâ glutinet & sanguinem reuoluentibus proffit. Exhibentur autem eius drachmæ duæ, febrientibus quidem cum aqua, febri verò liberis cum vino. Porro secundum omnium simul qualitatum actionem, ruptis, conuulsis, dyspnœæ siue spirandi difficultati, tum inueteratæ tussi conuenit. Nec enim in talibus euacuare solum quod præter naturam est oportet, sed partem quoque euacuata robore ac confirmare: Eadem quæ radix & succus ipse efficit.

Dispositio.

Plinio.

Eadem quæ Dioscorilli tradit etiam Plin. & mederi vniuersi morbis: ac valere contra venena ac magicas artes, & radicem in vulnibus doloribus prodesse. Contrita & imposita, inquit Apuleius, tumorem fieri non patitur. Ad sugillationes & dolores succus perundus ex aqua summè facit. Ad vulnera recentia tam efficax est, & ad plagas glutinandas, ut etiam carnes coherescant, quæ ex aqua eius coquuntur: In vino decocta & potui data, splenem persanat.

Mirum est, inquit Humelbergius, tam diu latuisse Medicos, & adhuc etiam multos ignorare quænam planta sit Centauria maior, ipsoque longè aliâ & diuersâ herbâ vlos pro Centauria hac fuisse; quum tamen in multo vsu & honore atque pretio eam semper habuerint, & adhuc nostro tempore etiam habeant: sed ignorantes ipsam esse Centauriam, alienòque, hoc est Rheu-pontici nomine, cuius radici assimilatur, appellantes. Nam quam vulgò nunc omnes Rheu-ponticum vocant, ea verè est Centauria maior, multi vsus contra iecoris atque lienis mala.

Rheuponticum igitur Pharmacopolorum nostrorum non est Rheum Ponticum sed potius Centaurium maius Iuglandis folio, de quo mox dicendum. Scabiosa alpina maxima, falsò ab aliquibus Centaurium creditur, ceu antè monstrauimus. Quam nos paulò antè Centaurium collinum infersimus, eam Iaceam collinam maiorem dissectis folijs, Iaceam montanam squamuloso capite, & Centaurioides maius cognominat Schvænckf. Centaurium collinum maius C. Bauh. Centaurij maioris speciem Gesnerus. Centaurij maioris quædam species in muris & alperis locis nascens Gesneri, est nobis Centaurij maioris species tenuifolia. Paucos autores comperit Hieron. Brunschweig. quibus nota sit Centauria maior, quamquam quidam experti dicant esse Matricariam, quod non affirmat Apuleius, ut videre est apud Tragum lib. 1. cap. 42. Enulam quoque Centaurium vocat. Centauriæ radicis nomen quidam attribuunt Gentianæ, autore Dioscoride, ut testatur idem Tragus lib. 1. c. 42. & 56. Tragus adhuc lib. dicto cap. 42. Aquileiam Centaurium cognominat Germanicum. Dioscorides, ut legitur apud Tragum lib. & capite iam scripto Hyosciamum Centaurium vocauit. Auicenna, inquit Campel. in spec. pharmac. his ponit Centaurium in Theriaca, per ignorantiam omittens Pentaphyllum. Pro Centauria ponit Polium Tract. quid pro quo. Non desunt qui sibi & alijs persuadere conentur eam plantam esse Centaurium, quæ Lyfimachia spicata dicitur. Androsæmum à recentioribus Chirurgis Matrifylua dicta, inquit Cæsalp. lib. 9. cap. 42. fortè apud Theophrastum Centeria fuerit, quam recenset inter plantas succo sanguineo constantes. Androsæmum hoc Cæsalpini, est nobis Siciliana, de qua agemus H. n. g. lib. 19.

CENTAVRIVM MAIUS IVGLANDIS folio.

Centaurij maioris caulis rectus, hominis proceritatem assequitur, in ramos circa summitatem diuisus: folijs amplissima in alæ formam disposita, quarum singulæ spithamam ferè longa, trium aut quatuor vnciarum latitudine, per ambitum ferratæ, nervosa, glabra, saturatè vietiæ: at primum

Quia morba

Vlcera.
Canceromæ
Sugillationes
Dolores.Centaurij
maioris
nunc denota
planta.

Rheuponticum.

Centaurij
maioris
Iuglandis
folio
Scabiosa
alpina
maior.Centaurij
maioris
species
tenuifolia
Matricaria

Enula.

Gentiana.

Aquileia

Hyosciamum

Pentaphyllum
PoliumLyfimachia
spicata.

Siciliana

Descriptio



*Centaurea
maior
et
minor.*

*Descriptio
inter Rha-
ponti-
cum
et Rhap-
onticum.*

*Centaurea
Dioscoridis
Tragae
Herculis
sanguis
Vnifera
Apuleius
Rhaponticum.*

*Radix Rha-
ponti-*

at primam prodeuntia folia integralunt nec disseccionem agnoscunt: capitula sirculorum extremis insident squarrola, è quibus emicant flores staminibus purpureis contextu, in pappus cunabulantes. Semen nitidum, oblongum: radix rubens, crassiuscula, longa, recta: Figura nostra quæ iam erant factæ minus placent. Quia autem ex empiriis sculptis erant, nec tempus meliores fieri permisit, his uti cogebamur.

Tamet si doctis inquit Corn. videatur Centaurium maius esse id quod Officina hodie Rheuponticum vocant: & huic etiam Diosc. ac Plinii descriptio magna ex parte

respondeat: tamen habent Officina aliud quod pro vero Centaurio maiore ostendunt, quod tamen descriptionem Dioscor. nulla parte refert. Rhaponticum illud Antiquorum auctore Tagaulio, de simpl. med. purg. longè diuersum est ab hac radice quæ nunc ab Officiis Rheuponticum nominatur. Nam Verum Rhaponticum, radix est fungosa, pondere levis, laxo contextu: Hæc verò grandis, solido concretu ponderosa. Adde quod illa, si oris salina diluatur, colorem reddit ad Crocum inclinantem: hæc ne pallidum quidem, verum cum recens fuerit rubro madet succo, siccata nequaquam inficit croco salinam. Leoniceus ac docti serè omnes huius seculi medici radicem Centaurii maioris, Galeni, Plinii & Diosc. arbitrantur.

Trago lib. i. cap. 42. dicitur Centaurium Dioscoridis, quod alii nuncupatur Narce, alii Limnelis, Magis Herculis sanguis, Romanis Phietu & Vnifera & Fel terræ. Quodque Apuleius sequentibus insigniuerit appellationibus, Pelethronia, Limnites, Limnolus, Apegonifapo, Polytidios, Hemerotos, Antiamas, & Fel terræ: Serapio cap. 304. Kantaurion, & Kibir, alii verò Centauriam solidam dici affirmant. De Centaurio maiore præterea loquitur Tragus cum ait. Quod ad Rhaponticam radicem attinet, non desunt inter doctos qui Centaurium maius esse af-

seuerent [vide Antonium Musam, quod si ita est, nobis quoque Germanis in altissimis Heluetiarum alpibus, maximè verò in montanis Sedunorum nobilissima ac decantatissima radix prouenit. Eius historiam Antonius Musa diligentissimè descripsit. Quod si verò quis quærat, cur Aquilegiam nostram Centaurium appellem, tum vicissim ego interrogabo, quare Dioscorides Hyoscyanium, Rhaponticum, & Gentianam Centaurium vocauerit.

Centaurii magni radix, Rhei pontici appellationem hodie in officinis medicorum retinet, nulla profectò alia de causa, quàm quod cum postquam in veri Rheipontici penuriâ medici eius succedaneo Centaurii magni radice uti cepissent: quæ Rheo pontico, Dioscor. auctore, formâ & facultate similis est: sensimque è medicorum cognitione verum Rheum Ponticum abisset, eò tandem ventum sit, ut quum prius iam ex illorum noticia exardisset, eius succedaneum verum esse Centaurium maius crederent, adeoque eius nomen in Centaurii magni radicem transferrent, quod etiam hodie retinet.

Centaurium hoc maius Pharmacopolis hætenus improprie Rhaponticum dici testatur Cordus in Dioscor. notatque Ant. Musam, quod absque necessitate hoc negarit. Idem ait alibi Felis terræ appellationem malè ad maius Centaurium transiitibile apud Theophr. Gazam. Idem in H. B. Centaurium maius vocat, describit, ac dicit in omnibus hodie Pharmacopoliis & à cunctis Medicis Rheu siue Rhaponticum appellari magno errore.

Huic Gesn. addit figuram, à quo in Obs. silua Centaurium maius Germanicum appellatur: de hort. verò, Centaurium maius vulgè Rhaponticum alterum solis Inglandis ferè.

Centaurea maior dicitur Amato, de qua ait: Hæc absque ambagibus & controversia vlla, Rhaponticum Officinariū est. Cæterum Theodorus Gaza in Theophrasto, perpetuè huic Fel terræ nomen indidit, quum hoc nomen minori Centaurio potius obinsignem eius amaritudinē conueniat.

Cæterum contendat licet Musa Ferratiensis Medicus clarissimus, radicem quæ Rhapontici loco plerumque Officina vtuntur, Centaurii magni radicem non esse: is tamen hac in re decipi [pace eius dixerim inquit Matth.] manifestè deprehenditur, cum ea radix, quæ vulgaribus Rhapontici vicem explet, omnibus sanè notis Centaurium magnum representet. Quippe quod crassa sit, grauis, compacta, tripedalis, & rubeo succo prægna, qui gustui non modò quadante, nus sit acris: sed etiam cum aliqua adstrictione dulcis, quin etiam [ut nos quoque obseruauimus] striata, & funiculi modo contorta. Adde quod & folia, caulis, capitula, flores, & semina illi prius sint eadem, quibus consistere Centaurium magnum Dioscorides & Galenus memoriz prodidit. Ea, quæ hodie ad nos conuehitur, Gargano præclarissimo Apuliz monte numerosa nascitur: quin & in aliis Italiz locis, nempe in Veronensi agro Baldo monte: quem Benaci aluit vnda, sed infirma radice si ad Apulam compares. Porro vtriusque Centaurii vno tantum capite mentionem facit Mesues: sed adeò alterum cum altero miscet, ac confundit, ut mirandum non sit, si à nonnullis ætatis nostræ diligentissimis rei herbariæ Inquisitoribus acriter fuerit accusatus, eisi nouus quidam Mesuos ipsius Commentator fauolis argumentis, horum doctissimorum virorum censuris refragari nitatur,

Aquilegia

*Anton. Musa
saproch
Fel terra
male Cen-
taurium
maius dicitur.
Error quorundam.*

*Cent. maius
Germ. Falis
Inglandis*

*Centaurea
maior A-
mato.*

Musa error

*Centaurea
magnum.*

Locus.

*Confusus
Mesues.*

*Aluicenna
error
Serap. er-
ror.*

Plinij error.

*Vires ex
March.*

*Nomina
linguarum*

*Centaurij
magnum
Dodonaei
Centaurij
maioris duo
genera.
Differentia
certum.*

*Dodonaei
preh.*

*Lob. redar-
gatur.*

*Centaur.
maius Gulg.
Centaurij
Disse.*

*Centauria
maior.*

in tam aperto illius errore. Quinetiam Auicenna, qui cum illo pariter errat, & cum utrisque Serapio. Siquidem is scripsit ex auctoritate Aben Meisai, Centaurij magni radicem lentam trahere pituitam, simul & bilem, & coxendicem doloribus opitulari. Quae tamen facultates Centaurij maioris non sunt, sed minoris, ut alibi explicabitur. Ceterum neque Plinius ab errore vindicari potest, qui tamen in Centaurij magni historia lib. 25. ca. 6. in omnibus serè Dioscoridi subscribat, in facultatibus tamen errasse videtur, quod Centaurio maiori amaritudinem cum quadam dulcedine tribuere: cum amaritudo non in maiori, sed in minori tantum deprehendatur. Datur Centaurij magni radix Hydropicis, Ictericis, & Iocinorosis; tum vino macerata, tum in puluerem pota. Radicis recentis succus vnicæ pondere hautus, ac etiam vulneri illitus, auxiliatur à serpente demorsis. Hec March. passim in suis commentis, qui pingit ac dicit. Centaurium magnum nil aliud est, quam radix præteritæ nuper ætati Rhaponticum credita, Græcis *κνικαβενδύκη* vocatum, Aphis Chantaurion Kibir, seu Sacurion habere, It. *Centauria maggiore*, Germ. *Reupontich*, Hisp. *Ruipontic*, Gall. *Rhepontice*. Sed pingitur etiam his nominibus pro Centaurio magno à Camer. in Hist. Meth. germ. & Epit. eiusdem.

Angu. II. dicitur Centaurium maius, in Apulia Rhaponticum vocatum.

Dodon. Hist. purg. & lat. in sol. Centaurium magnum duplex statuit, licet in Hist. gallic. vnius solum meminerit. Effigie & naturâ abesse Centaurium paruum à maiore satis constat. Maioris autem duo genera [inquit Lob. in Aduers.] foliorum incitura duntaxat differre videntur, magis quâ in radice, quæ utriusque, cum maxima, equat caput humanum: colore Pentaphylli: flavo succo, subruffescente: flos & semen utriusque eadem: folia verò ex vno octona, aut septena, non pediculo, ut in alio, sed medio nervo aptata, tarsi aut ferratulæ modo, serrata & profundè laciniata: radices consimiles, quæ siccatæ verius Rhapontico falsò eadem olim putabantur. Iam verius nullo discrimine vtuntur sanguinem spuentes & asthmatici: et amque matricis foribus educendis, vtitur Dodonæus, quem aptius possent hic erroris insimulare Cretici, quam eius Centaurij maioris iconem, ut non legitimam reculare. Nam illic potuit decipi, Arabes sequutus, qui vires maiors & minoris serè contrariis confuderunt, hic neutquam. Vireta enim Belgica plurimas huius Serratifolij adhuc plantas, vsui optimas, & nulla notâ vulgatiore, nisi folijs iuglandis, discretas. Semen utriusque Cnici simile & par, in capitulo squarrolo laccæ nigrae maioris: flos ex purpura albicat. Hoc posterius, Belgicis hortis frequentius: rarius autem Alpinis tractibus, vbi alterum frequentius etiam spontè. Et hac insibi Lobelius. Sed quid sibi velit cum sua censura circa vires ex Dodonæo adscriptas non video: eadem enim sunt non solum apud Arabes, sed etiam apud Dioscoridem & Galenum. Vocat autem is Centaurium maius suum duplex, Gall. *grand Centaurie*, Belg. *Groote Scentory*: Belg. *gread Centorye*. Ico. plant. p. 7. 2. eiusdem cum Dod. lat. habet figuram hoc titulo, Centaurium maius. Sed & Clus. Hist. post. eam proponit hac inscriptione, Centaurium maius 1. vulgare, Centaurium magnum quale à Dioscoride descriptum est, vulgari omnino notitia. Est sine descriptione.

Calalp. Centauria maior in monte Gargano

Apuleiæ nascitur: eius radix in officinis pro Rhapontico venditur, exterius nigra, interius subrubens, crassa, & longa: folia ab radice fert erecta, similia Cerretæ, sed multò maiora, sectionibus utrinque digito latioribus, instar folij Nucis: caules fert rectos, ab eadem radice plures, paucis ramis, bicubitales, amplioresque, in quibus pauca folia: cacuminibus capitula Cyani grandiora, flore purpurascens: semen Cnici simile inter lanugines.


C. Bauh. Phyt. p. 188. Centaurium 1. siue maius folio in plures partes diuiso, quod Officinarium est Rhaponticum: Rhapontica Centauria maior habita Trago sine iconc.

H. Lugd. p. 1287. Centaurium maius, ut & Camer. hort. quod hic ait à Centauro Chirone sic dictum, à quo *Bomard* Achilles edoctus fuit. Asferitur ex Apulia de monte Gargano siue S. Angeli dicto, ac pro Rhapontico venditur.

Tabern. Icon. & Hist. Centaurium maius, vulgò Rhaponticum. Schvlenckf. Centaurium maius, Centaurium maius serratifolium.

Centaurium maius folio iuglandis provenit mihi Genevæ in horto ex semine: Lugduni habebam in horto: Basileæ vidi in horto Di. Cæli Secundi Curionis præceptoris, & Di. Dis Theodori ZWingeri & Humelii Pharmacopœi, ipse etiam habui in horto patris florentem Maio quod excreuerat ad altitudinem hominis: Patavij in horto publico & Di. Cortusij mense Februario. Curia Rhatum in horto. Montbelgardi in Horto Ill. E. C. satum aliquoties provenit, verum perit priusquam caulem protulerit.

CENTAVROIDES FOLIO GLABRO flore flavescente.



Cubitalis Descriptio. & scilicet cubitalis est planta, caule glabro, ramoso, tereti: folia dodrantalia & longiora, glabra, glauca, in multa segmenta ad costam vsque diuisa, quæ quidem segmenta, aliàs opposito situ respondent, aliàs verò minime, crassiuscula, nervo bifido per longum exserte-

to, in ambitu raris denticulis crenata, aliàs integra, sapore oleraceo: singulis porro ramulis singula infidè: capitula Olivæ magnitudine, sed formâ conicâ, splendens, imbricata, tam acuratâ squammularum commissurâ contexta, ut lævia esse videantur, nec vllâ asperitate molesta, è quibus emicant flores flaminei, dilutâ flauedine imbuti.

Esti cum Censureo collino luteo Monspelien si magna huic sit similitudo, omnia tamen in hoc inoffensâ luxitate politiora sunt, squammæ item capitulorum viridantibus stris pictæ, obtusæ, nullæ

*Centaurij
maius folio
plures par-
tes diuiso.*

*Cent. maius
serratifolium.*

*Locus &
tempus.*

*Discremen-
Centaurij
collino.*

nales vel spinarum rudimentis donata, cum Centaunum collinum lateum Monspelicense squammas habeat minimè striatas, spinulis in ambitu rufis, mucrone mordaci aculeato.

Locus & **Tempus** Stockgardia in horto Ill. x. c. donauit D. Schwartz nomine Centaurii maioris siue Rhapontici Officin. Iam etiam in horto Montbelgardis ubi Augusto & Septembri floret. Considerandum an eadem sit planta, quam apud Fratrem vidimus siccam anno 1594. nomine Centaurii magni flore luteo & folio vndique glabro, ex monte Baldo.

CENTAVRIVM MAIVS ALTERVM
folio integro.

Descriptio



Hoc Centaurium describitur, ni fallimur, Clusius, dum ait. Longa habet folia, non in lacinas diuisa ut vulgare, sed Armoraciz foliis non dissimilia, & ad Glauco foliorum humi expansorum similitudinem plurimum accedentia, per ambitum tamen serrata, saturæ viriditatis, & amariusculi saporis: caules inter folia pro-

deunt cubitales aut ampliores, rotundi, circa summum bifidi aut trifidi, squamata capita sustinentes, Centaurii maioris primi æmula: florem villosum, coloris albescentis, instar vulgaris: semen Crisco ferè simile, seu, ut verius dicam, vulgaris, summo hirsutum, & molli lanugine inuolutum: radicem valde crassam, duram, longam, denso cortice tectam, foris quidem nigro, interna verò parte flavescente, succumque croceum resudante, qui cum amaritudine quadam aromaticus est.

Synonyma Lobel. Obs. p. 409. eandem cum Dod. lat. habet figuram hoc titulo, Centaurium maius alterum, Centaurii maioris varietas.

Em. mag. al. Dod.

Em. Galb. in foliis Lapathi.

Dodon. Hist. purg. & lat. in fol. p. 333. Centaurium magnum alterum folio non dissecto, verum Lapathi modo, longo, lato, simplici atque indiviso, per ambitum tamen serrato: caule brevior, floribus, semine, radice, prout cõformibus. Atq. huius Centaurii maioris meminit autor (qui Galenus fertur) libri de virtutibus Centaurii ad Papiam, Crateum adducens testem, in libro eorum quæ effodiuntur: ubi duæ Centaurii species referuntur, maior & minor, ac maior foliis describitur Lapathi.

Em. Lusitan. Clus. Rhaponticum Error Lapathium.

Em. maius fol. non dissecto. C. Bauh.

Clus. Hisp. & Hist. post. l. 4. p. 9. Centaurium maius 2. siue Lusitanis Tagi accolis Rapotis, hoc est, Rhaponticum nominatum, vulgarem Pharmacopolarum errorem sequentis, qui notius Centaurium maius, eo nomine donant.

C. Bauh. Phyt. p. 178. Centaurium maius 2. folio non dissecto. Cum Rhapontico, inquit, folio Helenii quidam idem volunt, ac illius folia subtus incana & villosa sunt huius verò intento sunt virore, ut Clusius monet.

Locus. Simplicis folii Centaurium maius Dodonæo, Hispania mittit, atq; adiectæ Anteverpiæ radices, Tom. III.

terraq; commisit, subinde in hortis reuivescit. Supra Olyssipponem, lapidosi iuxta Tagum collibus duntaxat inueniebam (inquit Clus.) in Belgica peregrinum omnino: nam tamen si radicem ad amicos inde miserim musco madido inuolutam, ut facilis conseruari posset, & postea etiam Olyssipone acceperim, numquam tamen illic persistere, aut illud se esse ferre potuit. At Primum illud vulgare folis dissectis in omnibus hortis conspicitur.

CENTAVRIVM MAIVS, RHA CAPITATVM
folio Enulæ, subtus hirsuto & incano.

Descriptio



Folio est am-plo, Enulæ siue Verbasci nigri, magnitudine & formâ oblongâ, pronâ parte lanugine cinericea obducta, supina verò viridate, per ambitum serrato, crasso nervo per longum decurrente, à quo in margines oblique porriguntur venæ, antequam ad oras pertingant in venulas alias diuisæ, pediculo longiusculo, laus crasso,

villosa: caulis, ut scribunt Aduersariorum auctores, rectus, capite fastigiatus, foris squamulis lorricato, ac per maturitatem stamine purpureo pleno: semine dum circa lunium & iulium maturuit, Centaurii maioris vel Carthami longiore: radix etiam fungosior, maior, & Rhabarbaro similior quàm Centaurio.

Dodon. gall. l. 3. cap. Græcè *ῥαπὼν* radix eius propriè appellatur. Arab. Rheu & Raued ou Rauei. Plinio latine Rhecoma & Rhacoma. Sunt sane Rha diuersa genera, figurâ non differentia, sed ratione locorum ubi proueniunt & inveniuntur: Vnum quod supra Bosporum nascitur, Græcè dicitur *ῥαπὼν*, Lat. Rha Ponticum, aut Rheum Ponticum. Mæliæ Raued Turcicum: Rha de Turquie. Secundum prouenit in Barbaria & vocatur Rhabarbarum, à Mælie & Pharmacol. Rhabarbarum. Tertium prouenit in India vocatur Rha aut Rheum Indicum, Medicis Arabibus Rauesceni aut Rauedsem. Vultus, inquit, hisce in regionibus in horto Galparis vari der heiden Louani, qui seminauerat & coluerat magnâ diligentia. Floret Iunio. Item in Hist. Lat. in fol. p. 385. Rha siue Rheu, ut existimatur, icon. Nullam addit descriptionem, quod mirum, cum olim in Gallica scripsent se vidisse, & descripsisse: icon quidem postrema variat à priore, sed eiusdem plantæ videtur.

Rha diuersa genera Dodon.

CENTAVRIVM SIVE RHAPONTICVM
alterum angustiore folio.

Valde affine Capitato Rheo, quod ex Italico semine habent D. de Brancion & Georgius Ryeensis: sed folia angustiora multo, acui Lapathi

Descriptio



Rha ponticum alterum Lob.

lio. Plant. Icon. pag. 288. Rha ponticum alterum angustifolium.

paria, aucta item parte incana, & caulis rectus, capite fastigiatus (quā multis loricato, ac staminibus purpureis Cynaræ aut Cardui concoloribus pleno: semina Cnici sylvestris compressum ægrè maturat in Belgioradix Centaurij maioris, fungosior.

Lobel. Obs. p. 153. Rha Ponticum alterum angustiore folio.

CIRSIVM VETERIBVS.

C A P. V.

Cirsium Diosc.

Cirsium [*κίρσιον*, Ald. cod. *κίρσιον*, malè] ita describente Dioscoride, caule est tenero, bicubitali triangulari [*τρίγωνο*] ab imo foliis Rosæ pusillis circumdato (*τὰ κατωτέρω φύλλα ῥόδου*) habentibus ex intervallo angulos spinosos, sed molles, Buglosso similibus, modicè hirsutis, longioribus (*μικρότερον*, minoribus vet.) subcandidis, & per extremitatem aculeatis. Est autem pars summa caulis rotunda & hirsuta, illique insident capitula in summo purpurea, quæ in pappos seu lanugines solvuntur. Huius radicem memorie prodidit Andreas laboranti loco adalligatam [*ἀναδεδυμένην*, *ἀναδεδυμένην* vet. religatam, dolores varicum [*κίρσιον*, *κίρσιον* perperam Ald.] sedare.

Diversa folia.

Diosc. refertur Cirsium Plin.

Diosc. locum corruptum.

Diosc. correxit.

Cirsion, inquit Plinius, cauliculus est tener duum cubitorum, triangulo similis, foliis spinosis circumdatus: spinæ molles sunt: folia bouis linguae similia, minora, subcandida, & in cacumine capitula purpurea, quæ solvuntur in lanugines. Hanc herbam radicemve eius adalligatam, dolores varicum sanare tradunt. Et hæc Plinius lib. 27. cap. 8. qui ut Cornarius attestatur, nihil addidit à Dioscoride enariat, nisi quod folia non Buglosso, sed linguae bouis similia esse dicit. Buglossum autem folium habere linguae bouis simile, etiam ipse Diosc. alibi dicit. Deinde minora folia dixit, ut qui *μικρότερον*, legit, quod hodie codices habent *μικρότερον*, id est longiora. Illum porro locum [*τὰ κατωτέρω φύλλα ῥόδου*] depravatam esse, & pro *ῥόδου* vocem aliam desiderari credit Sarracenus. Neque enim ait is, verisimile fuerit vnius & eiusdem herbae folia ab imo rosarum speciem referre, pusillaque esse: reliqua verò quæ de caule profiliunt, Buglosso similia & longiora. De caule item, *τρίγωνο* τὸ κατωτέρω, legendum videtur: quoniam paulo post subdit Auctor, τὸ ἀνωτέρω τὸ καυλὸν περικεῖται, hoc est, summam caulis partem rotundam esse. Ita porro imam caulis partem summam videtur opponere, dum hanc scribit esse rotundam, illam verò triangularem. Sed & *γυνίς* seu anguli, de quibus deinde agitur, minime ad folia, sed ad caulem

potius referri debere videntur. Esti verò suspensio sit Sarraceno tota ista periodus, attemon verbum verbo reddere satius duxit, quàm (quod fidum Interpretem minime decet) extra codicis vilius auctoritatem libens quicquam immutare.

Apud Plinium (inquit Leonie de error.) cen- Error Dio. tia in vetero quodā Dioscoride censum Cirsii & rectius] folia lingua bouis minora scribuntur: quem puto errorem ex vocabuli Græci similitudine & codicis mēdo quem Plinius habuit, contigisse: quoniam pro *μικρότερον*, minoriora scriptum inuenit. Ego verò in multis codicibus Græcis non solum impressis, sed etiam manuscriptis apud Diosc. *μικρότερον*, id est, longiora, non autem *μικρότερον*, id est, minora reperi.

Galenus, Paulus, & Aëtius Cirsion non habent.

Cæterum, varices, quos Græcorum Medici omnes, Cirsios vocant, Cirsio, de quo nunc agimus, nomen fecerunt: illis siquidem medetur. Sunt autem qui grandem Buglossum appellant, Romani Spinam mollem inter nothas Dioscoridis appellationes.

Cirsii descriptionem apud Dioscoridem intrinsecam esse scribit Anguillata, idēq; fatetur, quid sit, se dicere non posse.

Cirsii nomine sequentes donatur plantæ. Cirsium Dod. gallici volunt quidam esse Carduum pratense Tragi. Alij pro Cirsio tradunt Carduum bulbosum Monspeliensium, sine Acanthum silu. quorundam foliis laciniatis. An Cirsion minus Lobelij Obs. pag. 17. est Carduus dictus Cirsium folio laciniato nigrius? Leucacantha Anguillata quorundam est Cirsium nomen: olum radice bulbosa. Est Cirsium maximum Clusio, foliis carnosissimis bulbosæ radice fortè Luritanum. Carduus Cirsium Monspeliacum folio longo, utrinque glabro Mattholi. Cirsium Anglicum radice Hellebori nigri modo fibrosa. Cirsium foliis non laciniatis vixore Brassicæ & Macrocaulon. Cirsium Britanicum Clusij repens. Cirsium Pannonicum Clusio, folio non laciniato. Cirsium luteum Sequanorum Lobelij, est carlina sylvestris Dodonæi. Ad Cirsium Dioscoridis conuenit Scabietolæ tres vltimas Tragus, quarum vna fortè est laccanigra Dodonæi, aliz autem duæ colore tantum inter se distinctæ, quæ sint, videant lectores. Si Borrago Cirsion nō est (inquit Hermol. in Diosc. coroll. 73.) mirum quam ob rem sic indicta Veteribus, nisi quis Buglosii generibus contribuat Cirsion & officinæ & vulgus Herbariorum vocant Buglossum maius & minus, de his 143. Heracium capitulis cardui benedicti, de quo præcedenti libro egimus, vocatur à Turn. part. 2. p. 142. cirsium. Hallucinatur qui herbam vel linguam hircinam vulgò dictam, nobis Echion, cirsium arbitrantur.

Error Dio.

Ergo Cirsio.

Platæ Cirsii nomine donatur, & Equivoca. Cardium pratense Tragi. Monspeliensium.

Cardium Cirsion di- Buis fol. laciniato nigrius. Cirsium maximum Clusio.

Cirsium maximum sine Luritanum. Card Cirsium Monspeliacum. Cirsium Anglicum.

Cirsium Britanicum. Cirsium Pannonicum. Carlina sylvestris Dodonæi.

Scabietolæ tres vltimas Tragus. laccanigra Dodonæi. Buglossum maius & minus. Heracium capitulis cardui benedicti. Echion.

CARDVVS PRATENSIS TRAGI.

Nouicellus est Tragi pratensis carduus & nitibus spinis donatus. Caulis striatus, glaber, trium, quatuorve cubitorum altitudine, cui folia ex longis intervallis adnascuntur, pallidè virentia, alia tubitum longa, alia palmum; alia satis profundè laciniata, alia duntaxat serrata, mollia, & tenera: ramis in quos caulis funditur insident capitula.

Diosc.

Card. pratensis.

Brassica
pratensis
fol. Card.
pratensis.

capita satis magna, simul multa congesta, mollia, & quibus flores exsunt ex flauo pallentes: semen Cnici, minus: radix crassa.

Carduus pratensis, quod in nonnullis pratis nascatur nomen habet. quod verò folia in cibis quoque ut reliqua olia expectantur, idem à mulierculis wisen fôl [Brassica graminea]

nuncupatur. Est autem inter omnes Carduos hic tenerimus, si spinas consideres molliusculas. Trago *ἀγρία ἀγρία* Diosc. & Plinii esse videtur.

An Cordo Obl. silv. p. 222. Herba carduaceis foliis, acanaceis que capitulis, in montanis pratis.

Gesn. hort. Carduum pratensem Tragi existimat Limoniam Theophrasti, quam G-zam malè Betam siluestrem veruisse scribit. Eadem de coll. stirp. Acanthus silv. Hieron. Bock wisen fôl [Brassica pratensis]: Groß fôl [Brassica graminea]. Item in cat. pl. Acanthus sylvestris, unde Bräca vrsina. An eadem de coll. stirp. Basenfôl [Brassica leporina] volens fortè scribere wisenfôl.

H. Lugd. p. 1447. Acanthus silv. Carduus pratensis Tragi. An eadem p. 583. Cirsium Dodonæi?

Lob. Adv. & Icon. Plant. Carduus pratensis Tragi, Acanthi facie. Lonic. *Ἀγρία ἀγρία*, Carduus pratensis. Tabern. apud Vvirsung. Acanthus silv. Carduus pratensis, & Brassica pratensis.

Locus & Tempus.

Copiosum hunc Carduum vidi ad ripam Düb- bis inter Longeulle & Bauans: Gener meus Theobaldus Noblot obseruauit circa Audincourt: Quam essem Geneuz ex pratis montis Thuri transuli in hortulum: florere incipiebat Iulio, uti Montbelgardi, Augusto semine etiam maturo. Obseruauit præterea in monte prope oppidum S. Hippoliti: Item non longè à Basilea locis aquis circa Binte pagum in Marchionatu Badenfi, & Frater Casparus in pratis circa Birlam. Planta est, auctore Trago hyemis comèptrix, & quæ frigora facillè ferat. Aprili mense quotannis noua candida folia è capillata exeunt radice: Iulio mense caules emittit.

CARDVVS BVLBOSVS MONSPELIENSIVM, SIVE ACANTHVS SILV. quibusdam, foliis laciniatis.

Descriptio

Fecit foliorum non inepta similitudo ut Acanthi sylvestris nomen meruerit: sunt ea namque Acanthi seu Brassicæ vrsinæ foliis aliquatenus similia, admodum nigricantia, paulùm hirsuta, vel potius tomentosa, crassiuscula cum spinulis in extremitatibus lacinarum, quorum pediculi ad radicem rubescunt: caules bicobitales, rubentes, imprimis parte imâ, quorum ramis longis capita insident aliquot Cirsii capitibus similia, miti squaroso echino, floribus stami-

Tom. III.



neis purpurascens: comatò, qui tandem in pappo resoluuntur: semen album, oblongum: radices ex vno capite plures dependent, turgidulæ, bulbos imitatz, sapore nonnihil saluginoso, in quo & plantaginis gustus elucet.

Clus. Pann. p. 660. sine icon. Cirsio maximo similis planta, sed longè minor, quam in pratis Montspelianis olim e-

ruere meminit, quam tum nonnulli pro mœcanâ Nardo ipsi ebrudere volebant. Eadem tradit in Hist. post. pingitque l. 5. p. 149. hoc titulo Cirsio 5. [maximo] congener Carduus bulbosus Montspeliensis.

An Leucacantha Dioscor. Lobel. in Adu. 2. Is autem etiam carduum bulbosum Montspeliensium & Albam spinam vocat, ac à Spina alba (quorundam) non parum dissidere scribit, contra quam nonnullis persuaserat vocum paritas. Icon. Plant. tom. 2. pag. 10. Carduus bulbosus Montspeliensium.

An Tabern. Icon. Iacea aculeata seu tuberosa Stachelkraut/Stechgünnel: Hist. Iacea 4 flosculis blum: Et postea inter nomina: Iacea aculeata & Consolida aculeata, à foliorum spiroso mucrone sic dicta, & ab ipso Iacea tuberosa à radicis tuberibus nuncupata, & inter Scæbes genera relata.

H. Lugd. p. 1465. Carduus bulbosus Montspeliensium, quem quàm proximè ad Leucacanthâ Dioscoridis accedere Lob. existimat, & quidam carduum Triglochinum esse malunt. Sed hunc carduum credimus esse carduum dictum cirsii folio laciniato, nigrius, Asphodeli radicibus bulbosis de quo mox differemus.

Acanthus silvestris quorundam floret mense Maio in pratis circa Monspeliam locis vdis frequens inter Narcissos & Arisoloclias, vbi non rarò à nobis collectus.

CARDVVS DICTVS CIRSIUM FOLIO laciniato nigrius, & idem cum Asphodeli radicibus bulbosis.

Cirsio affinis est hic carduus, laciniatis spinosisque membranis caulem striatum ornantibus: at verò folia palmum aut sesquipalmum longa, glabra, nigricantia, profundis Carlinæ vulgaris laciniis incisa, rigidioribus spinis horrentia: scapi foliosam & spinosam simbriam habent, & in longos ramos diuiduntur in quorum extremitatibus flores purpurei, verùm capita squammata, singularia vnde emicant: radix satis crassa, à qua pendunt prælongæ fibræ nigæ, Hellebotti nigri vulgaris æmulæ. Hæc descriptio est ex planta sicca collecta olim Basileæ & Geneuz, quæ fortè bulbosa fuit.

Descriptio

F z

An Dodon. hist. purg. in append. p. 452 & lat. in fol. p. 725. Spina Cirsii similis, prima? An Lobel. Obs. p. 313. Cirsion minus? An Hist. Lugd. pag. 1444. Acanthus sylu. alter Dalechampij, Acanthus sylu. 2. alius dictus Lemonia, qui in pratis nascitur: Herbarij quidam Carduum *perizonia* vocant: alij verò Leucacantham esse volunt.

Locus & Tempus.

Olim obseruaui hoc Cirsium cum essem Geneuæ in monte Thuri florens Maio: & idem florens Augusto in montibus circa Wasserfall. Hoc Cirsium collegi etiam in montibus circa S. Ursanæ, & plantauit in horto Ill. E.C. Montbelgardi, idem etiam ni fallor Basileæ vidi in horto Di. Martini Chmielecij Poloni, delatum ex Wasserfall, sed foliis amplissimis, cultura fortè facit uarietatem.

CIRSIVM TOMENTOSVM RADICE
bulbosa quibuldam Leucacantha
Anguillarz.

Descriptio.



EX eodem capite multæ pendet radices Præoniz vulgaris more, candidæ, gustu ferè insipido: vnde folia primum prominunt dodrantalia & cubito longiora, mollia, incanâ lanugine supra infraque obducta, per ambitum laciniata, spinisque mucronib. obsita: post caulis, & is quoque foliosus, attol-

litur, crassus, lanuginosus, inque ramos diuisus: flores singulis pediculis insident singuli, nutabundi. Cirsij vulgaris, coccineo colore præditi, è capitulo squarrello enucantes, qui in pappos abeunt: semen relinquunt paruum, album.

An Cirsii montanum vulg. Pann. Clus.

An Anguill. ep. st. 8. p. 147. Planta spinosa quam reperit in Illyria & circa Pisam Hetruriz vrbem?

An Clus. Pann. pag. 660. Hist. post. lib. 5. p. 149. Cirsium 4. siue montanum 2. quod vulgare in Pannonia, in Belgicæ autem hortis coli menunt, foliis aliquantulum laciniatis, & Cirsio montano tertio paulo mollioribus, similibus ferè floribus, caule striato, & perenni etiam radice?

An Lob. Obs. pag. 313. Cirsij varietas duplex in Belgarum hortis? An Plant. Ico. p. 582. Cirsium maius?

An Cirsii varietas duplex Lob. Acanth. pe. reg. Tabern.

Tabern. Icon. & Hist. par. 2. p. 360. Acanthium peregrinum semib. weddissel Hist. Lugd. 584. Cirsium maius singularibus capitulis. Camer. hort. Cirsium utrumque, tam spinosum, quam leue. Item grande aliud bienne, & aliud exiguum perenne. In tanta breuitate, non possum distinguere Cirsia Camerarij.

Locus & tempus

Leucacantham Anguillarz Patavij vidi mense Martio in horto publico & Domini Cortusij. Frater Capl. Bauhinus attulit nomine Acanthæ

leucæ: vidi etiam Bisantijs apud Dom. Doctorem Chifflet Medicum humanissimum, qui mihi misit plantam, quam Monsbelgardi in horto E.C. plantauit, folia sunt longa, radices similes Alphodelo vel Præoniz, magna & pulchra planta, similis Cirsio, caulibus & capitulis Centaurij floribus purpureis, vel Acantho syluestri Dalech. qui in pappos resoluuntur, in quibus semina parua, alba, floret tota æstate.

CIRSIVM MAXIMUM FOLIIS
carnosis, bulbosâ radice,
fortè Lutetianum.



AD Cirsii generare. fert Clusius etiam id Cardui, siue spinæ molle genus, quod in bicubitalem, & maiorem interdum altitudinem excrecit, pollicaris crassitudinis caule, striato, incanâ tomentæque lanugine obsito: folia illi maiora quàm in superioribus generibus, magis carnosa, succi plena, viridia, in ambitu

dentata, mollibusque spinis hirta: capita in summo caule summisque ramis maiora iam descriptis, quæ in stamineos purpureo colore nitentes flores expansa, maturitate in pappum resoluuntur: radix multis crassis fibris, Alphodelinos bulbos ferè referentibus, & oblongis firmatæ.

Cum hoc Clusij Cirsio idem fortè vel simile vidi Lutetiz florens Augusto in horto Robini, cui folia erant glabra, & carnosiora quàm ceteris, lata non laciniata, spinulæ breues & molles in margine foliorum: flores cum capitulis similes nostro tomentoso laciniato.

Cirsium hoc maximum foliis, carnosis bulbosâ radice, est Clus. in Pannon. p. 660. Hist. post. lib. 5. p. 149. Cirsium 5. siue maximum incano folio, bulbosâ radice, sine icone. An Cæsalp. Cirsium alterum?

Nascitur in montanis pratis, etiam ad piscinam. Locus & rum vdos margines, inter salices amerinas quoque, & harundines. Floret Iulio. tempus.

CARDVVS, CIRSIVM MONSPELIANVM
folio longo, glabro, Matchioli.

Radix & ima folia inquit Lobelius, Dipfaci modo & ortu, Buglossi angustifolij acutiora, & leuibus hirsutisq; spinis aspersiora, longiora, viridia. Caulis ut plurimum singularis, binos ternosve cubitos æquat, angulosus, rectus, incanus, tener, Sonchi modo. In quorum extremo flores, rotundis, oblongis capitulis. Cardui, purpureis, densis conflati staminibus: in pappos desinentibus, relicto exiguo, oblongo Cardui semine suluo.

Descriptio.

Leucacantha Anguillarz, de qua egimus sub Cirsio tomentoso, non malè huic etiam conueniret, si sciremus an radices bulbosæ & amaræ, quæ deinceps diligentius obseruandæ.

Leucan.



Matthioli
Cirsium
Matthioli
Cirsium

Plantam quā
Pisus ad Matth.
misit Lucas
Ghinus, qui na-
sci eam scribit in
vliginosis locis:
Ea Matthioli
quidem iudicio
Cirsio maxime
ad stipulari vi-
detur. Sed mi-
rum quod pla-
tam incognitā
quam passim in
suis com. egre-
gius & ingenio-
sus Commen-
tator ex una
sola figura Cir-
sium referte
putavit, ac
quam pro eo
approbavit,

in historia Germanica, non amplius Cirsium
Dioscoridis esse tradit. Planta de qua agimus,
est Dodon. Lat. in fol. p. 72. spina altera ad
Cirsii genus referenda, folus Cirsio spinosioribus:
flosculis concoloribus, sed tribus, qua-
tuorue vntis, quorum minora capitula non re-
flectuntur: Hanc pro Cirsio Matthioli depin-
xisse videtur.

Matthioli plantam pingit [missam à Luca
Ghino præceptore meo inquit Turn. part. 1. pag.
142.] pro vero Cirsio, sed nec Italium nomen
indicat, neque Herbariorum, neque Officina-
rum, neque describit etiam, ut in eius cogniti-
onem liceat pervenire. Cumque leuiter transeat,
nec indicato plantæ odore, sapore, aut facultati-
bus, neque verum Cirsium concedere possumus,
nec penitus reicere & confutare. Ex figura ta-
men ab illo proposita confutari posset quod eam
plantam pro Cirsio habent, eodem modo quo ip-
se alios confutat Buglossum putantes esse verum
Cirsium. Confutatio enim eius talis est: folia Bu-
glossi vulgaris infima spinosa non sunt Rosa si-
milia, non potest ergo esse Cirsium: Ita quoque
licet Matthiolum refellere, Infima folia plantæ
ab eo pictæ non referunt Rosam, sed longa &
continua prodeunt, ergo &c.

Gesl. hort. Cirsium Matthioli Vveyselo Sile-
sio. H. Lugd. p. 582. Cirsium Matthioli.

C. Bauh. apud Matth. Cirsium Matthioli, Cir-
sium agri Pisani Cæsalp. quod Cirsii montani
2. nomine Clusium hist. Pannonicæ describere
credidit Frater. Sed an Cæsalpini Cirsium Pisanum
idem sit cum Clusii 2. merito dubito quia capitu-
lum in Clusiano vnum esse solet, flos satis ma-
gnus, in Cæsalpini Cirsio capitula tenuia tan-
quam in umbella: Figuræ etiam valde differunt.

Hanc, inquit Lobel. in Adn. cum Guini Cir-
sio in Matthioli commentariis eleganter depi-
ctam, inuitu, quod licet, coniectamur: propte-
rea quia idem Senensis vique sui similis, nullam
descriptionem appoluit: Ruellio abisque doctis,
qui putarint hanc Buglossum angustifolium es-
se, deueniamus parum: si virentem, florentem
que, ut nos, vidisset. Sane vix vlla in Dioscoride
plenius descriptioni responderet & sicutatibus,
quàm hæc, floribus non quidem Buglossi, sed
papposis & lanuginosis, euandis, caducis.

Camer. ad Hist. & Epit. Matth. Cirsium, welsch
Tom. III.

obfensung. Figuram & descriptionem quan-
dam ponit Camerarius non suam sed Matthioli,
Figura enim ex Matthioli commentariis de-
sumpta.

Vidi etiam obseruavi Montspeli, sicuti etiam
Frater plurimis annis post iuxta Molendinum
loco paludoso. Hanc plurimam prope pistrinum
Oliuatum, & pone Molas farinarias, in locis va-
dosis Lani amnis Montpelaci, & pratensibus
lacustibusque hircotis à Grammunio luco in
mediem deuoxis, quā maris alluionibus &
Solibus feruidis longè latèque patètes planicies
sale niueo opertas pedibus terebat Lobelius, Io-
nio 1566. Notissima hæc illic studiosis, alibi Ita-
liæ aut Galliæ parum nota aut frequens.

Locus &
tempus

CIRSIVM ANGLICVM RADICE

Hellebori nigri modo fibrosa
foliolongo.



Cirsium An-
glicum vi-
detur Spinam
albam adum-
brare, spitha-
meo caule &
foliis Cirsii, cui
refecti cōmo-
dè potest flos
singularis Car-
dus bulbosus:
Radix Bellidis
aut Hellebori
modo fibrosa
prouenit in
pratibus in villa
vernacula lin-
gua Arton no-
mine, gustu ad-
stringere, præ-
dicto, modera-
tè calido.

Descriptio

Angli examinent quantum Cirsium Britannicum
Clusii, de quo mox infra, ab hoc differat: des-
criptio hæc Lobelii Obs. p. 115. nimis succincta.

Lob. Icon. Plant. p. 583. & Hist. Lugd. p. 584. Cir-
sium Anglicum.

Cirsium
Anglicum

CIRSIVM FOLIIS NON LACINIATIS

viore Brassicæ & microcaulon.



M Vltro pro-
fert folia
Cirsium foliis
non laciniatis
viore Brassicæ,
oblonga, Cen-
taurii maioris
non laciniati,
foliorum pro-
penodum x-
mula, Brassicæ
foliorum colo-
re & viriditate,
satis carnosæ, in
ambitu crebris
aculeis præli-
ta: inter quæ
medius exit
caulis, cubitalis
aut amplior,
striatus, quem
atternè amb. ut

Descriptio

folia superioribus minore, latiora pediculo eum amplectentia, & veluti membranaceas quasdam alas, ad proxima folia, secundum caula, cui adnatae sunt, longitudinem producentia, eâ de causâ caules quodammodo alati apparent: summus caulis in hirsutum, multumque squamulis imbricatum: *caput* definit, quod tandem in stamineum *fl. rem* purpureo colore rubentem explicatur, & propendit: in superioribus alis nascuntur interdum ramuli quâdam lanugine obsiti, similes sustentantes flores, qui deinde, ut alii, in pappum & lanuginem resoluuntur, *semen*que in eâ reliquis simile occultant: *radix* minimi interdum digiti crassitudine, aliquot fibris donata & viua, singulis annis propagines à lateribus furdit.

Semen.

Cirsium Dod.

Cirsium
spina

Cirsij folius non laciniatis vitore Brassicae meminit Dodon. Hist. purg. in append. p. 451. & Lat. in fol. p. 725. vbi Cirsion vocat, ac ita describit. Ex Carduorum & Spinarum numero etiam Cirsion est: folia eius oblonga: Lactuca quasi similia, verum acuminata, & per circumferentias aculeata, candidiora longioraque quam vulgaris Buglossi: caules recti, bicubitalis, in duas alas nonnullas discreti: in quorum singulis capitulum eminet spinosum ac hirsutum, quod post floris vigorem deorsum reflexum nutat, tandemque in papposam lanuginem resoluuntur, floris purpureo rubet colore. Semen laeve resplendet aliorum multorum Carduorum instar.

Cirsium al-
terum Lob.

Lob. Adv. p. 251. Obseru. p. 314. & Icon. plant. pag. 382. Cirsium alterum.

Cirs. Pann. Cirsium 3. montanum & pag. sequent. 659. vbi figura, Cirsium 3. Histor. post. ad Iconem, Cirs. 3. montanum: ad descriptionem Cirsium 3. siue montanum 1. H. Lugd. p. 483. Cirsium aliud Dodonzi.

Locus &
tempus

Clusius Cirsium suum crescens obseruabat in montanis quibusdam siluis Pannoniae, ut supra Polonium & Nemethyvar, aliis etiam ad Alpes tendentibus supra Badenses videlicet Thermas, & vicinis. Florebat Iunio.

CIRSIVM PANNONICVM 1. CLVSIO. folio non laciniato.

Descriptio



per circumferentiam praedita, Cirsij coloris: ex horum medio caulis emicat pedalis, aut etiam cubitalis, tenuis, firmus, lanugine quadam obsitus,

(per quem sparsa sunt folia iam dictis minora) vnicum in summo plerumque ferens *caput*, nonnunquam alterum & tertium, multis squamulis imbricatum compactis, nonnihil purpurascens: & acutis asperum, quod in stamineum *florem* expanditur, vulgari Cirsiorum modo, colore purpureo: *semen* etiam illorum semini non dissimile, multa lanugine involutum nascens: *radix* multis nigricantibus & duris fibris praedita est, eamque supremo capite hirsutam, vetustorum foliorum nerui remeantes efficiunt.

Nascitur inter arbores in decliui montium Locus & quorundam Pannoniae: sed montanis pratis quae Tempus. secundum Danubium extenduntur, multo abundantius. Iunio floret, & subinde semen etiam profert.

CIRSIVM BRITANNICVM CLVSII repens.



Non mi- Descriptio
nus est
elegans Cirsij
genus, & haud
dubio proxime
huic collocandum, cuius
descriptionem
& iconem Clusio
anno 1581. Londini communicauit C.
Vir. Thomas Pennz. Lō-
dinenſis Medicus. Planta
est caule singulari, cubitali
aut ampliore: folia per caule
alterna, longa,
in ambitu spi-

nnulas, minimèque pungentes habentis, quorum supinae partes virent, pronae albicant, & canâ lanugine obducuntur: in summo caule *capitulum* vnum Carduorum modo, quasi ex squammis mucronatis compactum, *florem* sustinens satis magnum ex multis apicibus, colore ex rubro purpurascens, actandem in pappum abeuntem: *radix* est nigricans, fibrata, quandoque per magnas fibras se propagans. Floret Iulio & Augusto. Prouenit in pratis ad radices montis Englebrov totius Angliae celsissimi in comitatu Eboracensi.

Clus. Pannon. pag. 657. Cirsium 2. siue Britannicum, & pag. sequ. ad Iconem Cirsium 2. Histor. post. Cirsium Anglicum siue 2.

An verò Cirsia à nobis descripta, Cirsij Veterum saeculatis respondeant, ignorare nos cum Clusio fatemur: & iudicium de his ferre difficile. Nam neque Dioscorides suo Cirsio vllas vires tribuit, nisi quas ex Andrea descripsit, de quibus ante à nobis dictum.

CARDVVS MOLLIS LAPATHI folio.

Pedali assurgit caule, ut cūque crasso, striato, nonnihil lanuginoso: folia illi circa radicem
maiora



maiores, Lapa-
thi foliis fere si-
milis, aut po-
tius illius plan-
ta, quam vul-
go Totam bo-
nem, sive Bo-
num Henrici
cognominant,
quæ pediculo
adherent, la-
tiora, & quo-
dammodo an-
gustiora, extre-
ma vero parte
mucronata, in
ambitu aliqua-
tulum sinuosa,
& mollibus ve-
luti aculeis ob-
fita, supina par-
te virentia,
prona vero

omnino incana, foliorum albe Populini-
stae, & densa lanugine obsita, gustu nitidissime
deinde amariuscule, quæ vero caulem amplectun-
tur minora sunt & angustiora, ex quorum sinu
circa summum caulem ramuli exeunt, terna, qua-
terna, aut plura sustinentes capitula squamata:
Cyani, aut laxe capitulis respondentia: quæ,
dum expanduntur, florem promunt ex caruleo
purpurascens, & semen deinde continent la-
nugine involutum, Cyani semini non valde dis-
simile, sed paulo maius, radicane. radix nigra,
aliquot tenuibus fibris prædita, dura, viua, & la-
tenbus propaginis spargit.

Clus. Pannon. pag. 663. & 664. Carduus mollis
[Hill. post. lib. 7. pag. 191. mollior] 1. sive Lapathi
folio.

Locus.

Tempus.

Hunc eruebat Clusius, circa secundum Sne-
berg, excelsi admodum montis, iugum, inter saxa
nascentis, cum Auricula vrsi flauo flore, incano so-
lio: deinde etiam in Eschero. Florebat utroque
loco mense Iulio. Viennam relatus & in horto
repositus semen tulit Augusto, deinde perit. V-
bi tamen sponte nascitur, viua est: nam superio-
ris anni caules aridos trimentem, cum floretet
deprehendebat.

CARDVVS MOLLIS HUMILIS & angustifolius.

Descriptio

Humilior hic est, neque palmarem altitudi-
nem excedit, caule non minus crasso quam
superioris, multis longis foliis exornato, supernè
etiam virentibus, infernè cana [non tamen adeo
densa, ut superioris folia] lanugine vestitis, &
molles quasdam spinas in ambitu obtinentibus,
gustus etiam amari, inuid autem adstringentis:
summo cauli infidet singulare capitulum squama-
tum, maius quam præcedentis capita: ex quo stas
multa lanugine ex caruleo purpurascens pu-
belcons exoritur: semen observare non potui:
nam tamen aliquot surpes in horto magnâ dili-
gentiâ excoluerim, quas loco natali & florentes
& nondum florentes erueram, ad frugem tamen
non peruenierunt, sed paulatim sterculentis,
prorsus tandem contabuerunt & perierunt: ra-
dix nigra, & frequentibus subnigris fibris prædi-
ta, subinde nova germina à lateribus producit.

Clus. Pannon. pag. 663. Carduus mollis [Hill.
lib. 7. pag. 191. mollior] tertius sive humilior an-
gustifolius.

Crescit in summis Shealben iugis, cum Aur-
icula vrsi quarta, quæ glabro & splendens est
folio, carnei coloris flore. Floret vero Iulio &
Augusto.

Locus
Tempus

CARDVVS MONTANVS FOLII Helenii non spinosus.



Folius Heli-
nii non spi-
nosus, capite
rubro, frequens
in montibus
Hermunduro-
rum circa vrbes
metallicas, non
multum disse-
rens à Carduo
molli latifolio
Clusii, in cuius
descriptione
huius quoque
meminit.

Descriptio

Camer. hort. Synonyma:
pag. 35. Carduus
montanus folius
Helenii non spi-
nosus. Clus.
Pannon. pag.
967. & Hill.

post. lib. 7. pag. 191. Cardui mollioris genus ele-
gans, præaltum, & radice serpente in cultissimo
horto c. v. 19. Camer. Carduus mollis Came-
rarii.

CARDVVS MOLLIS FOLIO laciniato.



Multa fe-
cundum
radicem habet
folia, cum hu-
mi sparsa & ia-
centia, cum
laurecta, infer-
nè cana mollis-
que lanugine
obsita, super-
nè virentia;
valde lacini-
ata, & ad me-
dium usque
necnon disse-
cta, calcitrax
sive cardui
municato capi-
te, mollioribus
& gene-
rioribus foliis
pende similes
nullis tamen

Descriptio

spinis horrentia, gustu primùm exsiccan-
te, deinde amariuscule: ex quorum medio unus aut alter
caulis assurgit cubitalis aut amplior, erectus, ro-
undus, striatus, purpurascens, & molli quadam la-
nugine obsitus: inferiora folia per infimum

caulem sparsa: etiā laciniata sunt, licet iam di-
ctis minora, quæ verò supremū caulem ambiunt,
oblonga, angusta, nullis laciniis diuisa, mucrone
vt plurimum purpurascens: extremi caules in a-
liquot ramos interdum diuiduntur (magnā ta-
men ex parte singulares sunt, vnicūque susti-
nent caput) qui capitula sustinent, ex multis te-
nibus squamis imbricatis dispositis composita
molliter echinata, quorum medium occupat sta-
mineus & villosus *stos*, coloris purpurei elegan-
tissimi: flori flaccido & euasido succedit *semen*
angulosum: radix digitū crassitudinem nonnun-
quam æquat, subfusca, longa, aliquot fibris do-
nata.

Synon.

Clus. Pannon. pag. 661. Carduus 1. siue mollis
[mollior, Hist. post. lib. 5. pag. 150] laciniato folio.
Hunc ait Clus. Gesnero atque Benedicto Aretio
notum fuisse, nomine *Edeldistel* / Cardui inter
Carduus spinosissimus, folus referentibus folia
herbæ *Mosblumen* nominata. At fallitur Clu-
sius, multum enim distat *Edeldistel* ab eius Car-
dus molli laciniato folio. Demonstrant id aperte
folia, herbæ *Mosblumen*, id est, *Calix* aquaticæ.

Clus. lapsus.

Camer. hort. Carduus mollis tenuifolius, cuius
icon extat apud Clusium.

Inuenitur hic, inquit Clusius, totā illā mon-
tium catenā, quæ à Calenberg & Danubio, cui
imminet ad Alpes usque extenditur, & deinde
per Leytenberg, rursumque per Prellenberg &
Hamburgerberg ad Danubium duobus supra
Polonium millariis reflectitur. Floret Maio,
semen perficit Iunio & Iulio.

CARDVVS SIVE SCOLYMVS

Satiuus, spinosus & non spinosus.

Descriptio.

AD culinarum cupedias satis Scolymus folia
à radice promit pedem & sesquipedem lon-
ga, semipedem serè lata, in lacinas latas subiectas
diuisa, incano & cinereo tomento obsita, potissi-
mum parte pronā, nullo aculeo minacia; inter-
dum nulla est lacinia angululve qui non spinis
rigidis luteisque minetur: *caulis* pedem vnum aut
alterum altus, striatus, tomentosus, ramis aliquot
donatus, in singulorum acumine caput gerit tur-
binatum, squamis magnis glaucis, carnosissimis, acu-
mine obtuso, aliis spina robusta præpilato, vn-
gue infimo crassiusculo tenero, vESCO, albicante,

compactū, quod
sensim diuulsis
squamis supe-
rius latefcit,
tandemque
floris itamina
purpurascens
explicat.

Scolymi duo
habentur gene-
ra: satiuum, &
spontè nascens
de quo postea.
Satiui quidem
nulla verè gene-
ra sunt, licet ge-
nera dicat esse
Matthiolus. Ex
eiusdem liqui-
dem stirpis se-
mine, vterque
tam spinosus,



Genera duo
Matth. no-
tatur.



quā non spi-
nosus enascitur.

Spinosus folia
gerit non spi-
nosus, magis di-
uisa, magisque
laciniata, tenui-
bus circumdata
spinis: caulem
quoque non
spinoso similē,
striatum, subal-
bicantēq; in cu-
ius summitate
echinatum acu-
leatumque ex-
tuberat caput,
flore hyacinthi-
no: semine Cni-
ci minore. Radi-
ce nititur crassa,
firma, non in-
suauis.

suauis.

Non spinosus folia fert ab radice amplexa, lon-
gitudine serè cubitali, scissa, subhirsuta, cinerei co-
loris, nequaquam aculeata, paucis exceptis: caule
ex medio foliorū erigit crassū, & in cacumine ca-
put figura Pineæ Nucis, ex latis squamis coactū &
tatum. Caput hoc aliquādo occultatur inter folia
media: non procul à radice, quod si non auferatur
tenellū, attollitur in dies cum caule supra fo-
lia, ac floret: *stos* lanuginosus est, colore purpureo:
semina inter candidam lanuginem continet, ob-
longa, lani cortice obiecta, candido, vel nigro:
Fert & alia à latere capitula duo, aut tria, sed mi-
nora, quā quod in medio continetur. Capitulum
squama figura folij Laurini, aut Myrthini in acu-
leum desinunt: breuem, nunc rufū, nunc in-
firmum, nunc propè nullum: similiter & folia,
quæ in caule aliquando aculeata, aliquando mi-
tia sunt: differunt & colore squamarum: nunc e-
nim subrubentes, nunc virides spectantur: capi-
tis quoque figura nunc oblonga, nunc rotunda:
gustui gratissima.

Theophrastus spinosum intellexisse videtur, *Callus*
cū inquit. Quæ autem Cactus [Cattus Calsalp.
mallè meo iudicio] nuncupata est, in Sicilia tan-
tū nascitur, Græciæ nusquam habetur sui gene-
ris planta: hæc enim statim à radice caules in ter-
ram procumbentes emittit, folio lato atque spi-
noso, caules desquamati cibo idonei sunt, paulu-
lū amaricantes, qui in muria asservari queunt:
aliū verò & caulem producit, quem Pternicen
[πτερύκη] vocant, is quoque cibo aptus, sed reser-
uari nequit, fructus spinosa facie [σπειράριον] ex-
pus lanuginosis seminibus, vESCO, est, & pal-
ma cerebro similis, *σπινάριον* appellant, (Plinius Af-
caliam legit.) Athenæus *Ἀσπινάριον*.

Spinosam Cinaram, inquit Dodonæus, Scoly-
mum esse Dioscoridis, Fuchsius & plerumque aliis
visum fuit. Scolymus autem Dioscoridis folio est
Chamaeleonis aut Spinæ albæ: caule multum fo-
lioscapite spinoso. Cinara autem spinosa huius-
cemodi non est: Nam tametsi caput spinosum illi
sit, caulem tamen non habet multum foliosum,
sed sæpè foliis viduum, vel vno aut altero tan-
tummodò folio ornatum. Conuenit magis hæc *Callus*
Cinara cum eo qui *Callus* à Theophrasto ac Pli-
nio dicitur, &c.

Theophrastus porrò de Scolymo satiuo non
spinoso, egit, vt puto, statim post Scolymum, cū
inquit

Scolymus
Dioscoridis
est.

Vernilago.

inquit: contrariio modo se habere Scolymum, quam Chamæleontem [Theodorus Vernilaginē vertit] hic enim quamvis solus constet non aculeatus, tamen Acani speciem gerit, senescensq; flos in lanuginem, pappum vocatam, cōuertitur: pergitque ad ætatem usque, aliud parturiens, aliud florescens: seminis autem solum quale Laurinū, aut Myrthinum, aut cæterorum huiusmodi, exiguum humorem ac mediocrem habet, & arefactū relaxatur, & non amplius pungit: sed hæc verba transposita valde perturbatam faciunt in codice græco lectionem. Scolymo satiuo non spinoso pleraque ex Theophrasti prædictis adscripsit etiā Plinius: Ixinen, ut ille, inter Cardui satiuu genera constituens.

Cinara Co-
lumbæ.
Cinara
Dioscoridi
Cinara
Galenus

Cæterum, apud Columellam Carduus satiuus Cinara vocatur. De Cinara apud Diosc. mentio est tantum inter attributa: nam de Chamæleonte alio inquit, ex medio foliorum spinas erigere, Echini marini modo, aut Cinara. Galenus inter alimenta ex spinosis quæ sita inquit: æstimari Cinara plenis, quàm conueniat; ab aliis Cynara proferri.

Figura
Tragi
Cardui spi-
nosus Tragi

Tragus l. 2. c. 15. describit Scolymū virumq; spinosum quidē pro primo Cardui genere siue Scolymo, eumque depingit, figura autem [quæ etiam Cordo additur] non admodum placet. Non spinosū facit 2. Cardui genus, primo per omnia simile, exceptus aculeis spinis illis, quib. hūc carere ait.

Lonic. dif-
fer.
Lonic. dif-
fer.

Lonic. duas exhibet picturas, duasque species [non genera vt Matth.] tradit, vnum Carduū aculeatum: alterum minorem non aculeatum, Cinaram Columellæ Tragi. Sed huius icon ex Trago inutilis est, uti etiam distinctio illa minoris.

Cardus ge-
nera Plin.

Est vnius tantum Cardui [Scolymi] breuiter meminerit Diosc. Theophrasto tamen, Plinio, ac aliis probatis auctoribus [vt posthac etiam apparebit] plura Cardui genera traduntur, inquit Matthiolus. Verum vt primum de his, qui natura cultrice sponte proueniunt, sermo fiat, scire sanè conuenit, quod eorum diuersa sunt genera: quorum tamen nomina propria, quod sciam, non habentur. Atqui Plinio l. 20. c. 23. duo tantum eorum genera produntur: vnum fruticosius statim à terra: alterum verò vnicauale & crassius. Satiuorum autem, qui tum in hortis, tum in agris seruntur, multiplex est genus. Horum principem locum tenent, qui Hetruscis vulgò vocantur Cardoni.

Cardus

Namque si diligenti culturâ aded teneri, fragiles, albique euadunt, vt magno quidem apparatu, secundis cœnis pro bellariis cum sale, & pipere expectantur. Quo argumento ductus, equidem putauerim de his verba fecisse Theophrastum l. 6. c. 4. de plantarum historia, cum ita scribit. Quæ autem Cactus nuncupata est, in Sicilia tantum nascitur, &c. Nostrates quibus vbique nunc Hetruria scatet, ed ex Neapoli allati fuerunt. Neapolim verò (vt audio) ex Sicilia. Quapropter nostri cum hoc Theophrasti genere, maxime conuenire videntur, quod scripserit, Cactum Siciliæ peculiarem esse plantam. Continentur præterea in Carduorum genere etiam ij, quos in India Hetruscū vulgus appellat Carcioffi: illis verò alibi Archichiozhi dicuntur: quorum item meminit Theophrastus eodem loco, eum subdit. Alium verò caulem erectum producit, quem Pternicem vocant. Qui pro palmæ cerebro illud, quantum equidē reor, intelligit, quod Galenus encephalon pluribus in locis appellari tradidit, & quod nunc corrupta voce Neapolitanis, & Siculis vulgò vocatur Cefaglione. Carduorum autem, quos vulgò Carcioffi vocari diximus, nobis plura sunt genera, variâ capitis formâ, distincta. Siquidem proferunt om-

Carcioffi
Pternici
Theoph.Encephalon
Gal.Cefaglione
Carcioffi
genera
Matth.

Tom. III.

nes echinata capitula, sed aliqui spinis sursum respicientibus constant, alii verò ad terram versis, nonnulli etiam aculeis vacat, (id est, quod Theophr. c. 4. l. 6. vult Scolymi capita oblonga esse, minimèque aculeata.) Sunt præterea in hoc postremo genere, quibus echini in longū fastigientur, quibus verò in globū extuberent, dehiscenibus in altero squamatum spicis, in altero iisdem squamis, veluti corticosis vnguibus, in vnum compactis, & coagmentatis, Nucis pineæ instat. Ex quo faciliè in eam sententiam deductus sum, ut crediderim, hæc Cardui speciem postremam Nucis pineæ æmulam, esse Carduū pineam Theophrasto vocatā, quod is loco antè citato ita de ea scribat. Est Carduus pinea ab radice foligera: qua de media seminalis Acanus, veluti malum extuberat: hæc ille. Cæterum Cardui aculeati genus & illud est, cuius echinati capituli floribus Hetrusci coaguli vice vtuntur, et si Cardui satiu omne genus idem suis floribus præstet. Sed faciliè potuit factū esse, vt ij, qui aculeis non rigent, humano cultu mitiores euaserint, cum natura Carduorum omne genus spinis vacare nequeat. Hæc Matthiolus, quæ Theophrastum malè intellexisse, ac à Gaza deceptum esse, constabit illi, qui consulat textū Græcum, vbi hic vertit Carduum Pineam, id quod ipsemet animaduertit: nam in post. comm. (vbi duas pulchras exhibet figuras) omisit hanc opinionem. Ixiam Gaza Carduum pineā vertit, ineptè & nimis confidenter. Est autē Ixia Theophrasti Chamæleonis genus. Is sibi præterea contradicit: nam Carduorum genera omnia proferre echinata capitula perhibet, quod falsum, vt ipsemet paulò post ait, nonnulla aculeis vacant. Omnes quidem strucluli tanquam laminarum ordine in metam & verticem fastigiantur.

Card. pinea
Theoph.Card. non
spinosa
Matth. l. 1.
c. 15.

Gaza errat.

Matth. no-
caturCarduus
Scolymus
dictusDioscor. cor-
rectio
Plin. cor-
ruptioCactus
Theoph. est
Cynara
Gal. Belloni
Cinara spi-
nosa Dod.
Carduus
aculeatusCinara
non
spinosaH. Lugd. 4.
figura
Spinosa duā
non spinosa
H. Lugd.
mirè cor-
rupta om-
nia

Carduus, quæ Græci vocant Scolymō, secundum Galenum, Aëtium & Paulum, diuersus est à Cinara. Quidam tamen in eo duntaxat differre volūt, quod Carduus sit siluestris, Cinara autem satiuu. Mea quidem sententia [inquit Turn.] ex Plinio, Diosc. & Theophrasto, palam est nostrum Artichock esse Scolymum & Cinaram. Sed illorū descriptionib. addendum profundè incisa esse folia, ad medium usque neruum: echinum autem cono Pini similem esse, squammas tamen latiores esse crassioresque, quàm Pini.

Bellon. l. 1. Obs. c. 18. videtur nolle Artichock satiuum, esse Scolymum, sed si eum benè intelligo potius Carduū vult. Sed melius iudicat Anguill. epist. 8. cum ait. Planta, quam Romani vocant Carduum, Theophr. Cacton, Græci recētores, vt Galen. Cynara, culturâ & mangonio reperitur sine spinis, vt affirmat Cassianus Bassus l. 12. c. 39. rei rusticæ, estque eadem cum Scolymo Dioscoris.

Cinaram distinguit Dodon. in spinosam & non spinosam. Spinosam verò siue aculeatam Carduū vocat, eamq; à non spinosa nihil differre scribit, nisi quod foliorū eius omnes anguli, ac conis squamæ, duris, pungentibus spinis armentur, vnde & Cardui nomē ei imposuit, ac ab It. cardo, ab Hisp. cardos, à Gall. chardon, nuncupari ait, & degenerantē Cinara esse dicit. Nō spinosā verò, Cinaram Galeni esse tradit. Is olim figuras duas posuit, nūc in postremis Carduum spinosum duntaxat pinxit.

H. Lugd. quatuor proponit figuras, nullā quidem necessitate cogente. Harum duæ spinosæ, duæ non spinosæ. Spinosa 1. est Cactus Matth. Carduus aculeatus, p. 1438. 2. est p. 1440. Carduus altilis, Cynara sine capitibus acuta, Dodonæi. Non spinosa 1. Cinara non aculeata Matthioli. Al-
tera Cinara nō aculeata Dodon. Ambæ p. 1439. cū

descriptione mutila. Apud Historiam mirè confunditur omnia. Pro Scolymo Dioscoridis Lugd. Cynaram siluestrem pingit: pro Scolymo autem Theophrasti, Carduum dictam spinam luteam, de qua inferius agemus, nunc verba H. Lugdunensis adscribamus. *Σκώλυμος* Græcorum, inquit, Latini Carduum interpretantur generatim. *κινάρα* autem à quibusdam per i scriptam, teste Galeno, ab aliis per ypsilon, quidam corrupta voce *Articolum*, alij *Alcocalum* vocant, nunc vulgus Herbariorum, *Articolum*, Arabes *Raxos*, *Harxos*, Alexander Trallianus *ἀρτυμιν*. Cynara nomen dedit puella eiusdem nominis, quam in hanc herbam conuersam fuisse fabulantur. Sunt qui à cinere dictam velint, quo, ut Columella & Palladius aiunt, latatur. Hoc etymum Græcos id à Latinis mutuo sumplisse indicat, tamen contra huius vocabuli notionem, ex Græcia venisse in Latium vetustissimi huiusque Græcitur Poëta tum Oratores demonstrant, quæ apud Athenarum Cynara spinæ meminerunt, Sophocles, Hecataeus Milesius, Callimachus, & alij. Sunt qui potius à cane dictam malint *κύναρα*, quod Apollinem cōsulerent Libero redditum est oraculum, urbem ibi consideret, ubi lignea cane morderetur, tandem intrare Cynara vulneratus, oppidum construxit. Sed Didymus apud Athenarum Cynosbaton potius, id est, canis sentem intellexit. Dioscorides de Scolymo tantum egit, de Cynara minimè, Scolymus Dioscoridis alius est, quam Theophrasti, quos Plinius confundit, his verbis: siluestrium genera sunt duo: vnum fruticosius à terra statim, (Scolymus est H. Lugd.) alterum vicaule, crassius (Scolymus Dioscoridis iudicatur H. Lugd.) utriusque folia pauca, spinosa, muricatis cacuminibus: sed alter (nempe Dioscoridis: nam alterius luteus flos est) florem purpureum mittit inter medios aculeos, celeriter canescentem, & abeuntem cum ætate. Scolymum Græci vocant, &c. Præter utrumque Theophrasti Scolymum sunt in hortis frequentes Cacti, ac Cynara cum quarum foliis albi Chamæleonis folia Dioscorides confert. Galia vulgus Cactos appellat *Cardos*, Cynaras *Artichauts*, hac differentiâ, quod Cactosum capita non mandantur, sed radicis pars suprema foliorum ima, cum tenellis, germinibus: contra in Cynara nullus earum paruum usus est, sed capitum solum. Præterea Cactis & folia & capita nunquam non aculeata sunt: Cynara verò cum duplex genus sit, alteri pariter ea, ut & Cactis, spinis armantur, alteri spinis earent, diuerso hac in re palatorum iudicio, quibusdam ea magis commendantibus quæ spinosa est, alijs contra eam, quæ spinis nullis pingit. Galenus, Paulus, Aëtius Scolymum stomacho prodesse adnotarunt. Cynaram autem viciosum succum gignere, præsertim, ut Galenus ait, cum iam induruit, nempe melancholicis, alijs verò biliosum & tenuem, ideoque elixam adiecto Coriandro potius edendam, ex oleo, gario, & vino: vel absque ijs, si in patinis, aut sanguine cocta fuerit, quo modo eius strobilos, siue capita multi præparant. Hac inter alia habet *Historia Lugdunensis de Scolymo satino confusa scribens.*

*Hispida pinarum Cynara, qua dulcis luteo
Potanti ventat, nec Phæbo grata canenti.
Hæc modo purpureo surgit glomerata corumbo,
Myrsiolo modo crine viret, deflexu quo collo
Nunc adoperta manet, nunc pinea vertice pingit,
Nunc similis calathæ est, spinisq; minutis horret.
Pallidum non nunquam torcos imitatur Achanthos.*

Quibus Carduum aculeum siue Cactos & Cynaram hic videtur Columella delineasse.

Cardus hortensis siue Cynara species multæ sunt (inquit Camer.) capitulis non spinosis esculentis, eisque vel oblongis vel latiusculis discernendæ. Spinosissimus præditus est quem Cardus vulgò vocant, nec velsis, aculeis longis armatus. Colitur tamen opertus ac terra obrutus, ut stolonnes tenerigulæ arideant. Is Veterum Cactus est, de quo Theophrastus Idil. 10.

Cardus hortensis species Camer.

Cactus Theophrasti

Cardus hortensis

Sed longe sequeris velut agnus ouilia cuius

Cuspide spina pedem pungens disci dit acuta.

Scolymus sativus, ait C. Bauh. apud Matth. est duplex, aculeatus & non aculeatus, & rursus capituli figura nunc oblonga, nunc rotunda, hocq; maximum, mediocre & paruum, cuius squamæ in aculeum desinunt breuem, nunc robustum, nunc infirmum, nunc propè nullum: quorum color nunc subrubens, nunc viridis. Dicitur Cardus Plinio, Cynara Galeno & Columellæ.

Scolymus hortensis

Scolymus aculeatus, Casp. Bauh. Tab. Scolymus, Trag. Fuchf. Cord. in Diosc. & hist. (cui & Cardus sativus) Lobel. (cui & Cactus Theophrasti) Cam. Cardus aculeatus, Matth. Cardus Lacun. Cardus hortensis spinosus, Gesl. hort. Cast. Cardus Scolymus, Lon. Cardus altus, Lugdun. Cactus, Matthioli eadem. Cynara aliud genus, Dodon. gall. Cynara, Dodon. fol. à cinere, ut habet Columella, quo stercoreari amat. Cardones Casalpino.

Scolymus non aculeatus

Scolymus non aculeatus, Casp. Bauh. Tab. Cactus, Lon. Cardus hortensis non spinosus, Cast. Cardus hortensis, Scolymus cactus vel Cynara vulgò *Artichaut*, foliis sine spinis, Gesl. hort. Cardus sativus, Casalp. Cynara, Dod. gall. Lac. Cynara non aculeata, Lugdun. sæpè ex vno semine utraque prouenit, ut spectatim aculeata ex semine non aculeata: quamvis & maiore & minore habeatur semine.

Clusius quoad iconem & inscriptionem Scolymum sativum proponit in post. Histor. hoc titulo. Scolymus Dioscor. Cactus Theophrasti.

Scolymus hortensis Monspelij per totam hyemem durat, videbatur duplex esse, vnius foliis altissimis multum dissectis, alter foliis nigrioribus & obtusioribus minusque dissectis. Ibi colunt maxima copia sine vllis spinis. Ferunt magna capita sine spinis, quanquam interdum quædam habeant minimas in extremitate foliorum. Comedunt illa capita Vere. Hunc videramus olim copiose Stutgardia in horto Ill. Ducis Wirtembergensi, Ibiq; erant duæ species, una spinis horrida, alia sine spinis. Basileæ etiam in hortis variis florens Septembri obseruauimus, habuimus etiã in horto. Apud Gesnerum meminimus visum spinis horridum. Genevæ copiose colitur in hortis, optima & maxima capita vidimus adhuc in fine Nov. Ebr., in horto nostro virebat lanuatio. Maio interdum sunt eis capita spinosum verò ut plurimum sepe hinc ad calbationem foliorum, quorum pediculus vocant *des Cardes*, Potavi in hortis vidimus spinosum & non spinosum. Montbelgard in horto Ill. E. C. sunt nobis Scolymi spinosis foliis & capitibus, alter non spinosus capitibus mediocribus, cuius squamæ obtusæ, habemus etiã genus foliis non spinosis cum capitibus ita magnis ut patinam replant magnam, huic squamæ longæ, spinosæ: hoc genus hieme faciliè absumitur.

Locus & Tempus.

CARDVVS

CARDVVS SIVE SCOLYMVS MAXIMVS
non spinosus.

Cuius iconem huius exhibemus, fatemur nos oculis nostris non vidisse, ac propterea et sine ulteriori delineatione eam iconem proponere voluisse, ne novarum rerum cupidi haberent, quod temere desiderarent. Hanc primus depinxit Lob. in Icō. Plant. Tom. 2. pag. 3. hac inscriptione. Cy-

nara maxima ex Anglia delata.

Nomen Carduus siue Scolymus sativus, à cinere [quo amat stercoreari:] Cinara etiam, Græcè Galeno zura, &, dicta videtur. Germanis Strobildorn & imitato nomine Gallico Artichoch. Belgis & Gallicis *Artichaux*: unde & Articolalus & Articoca à nonnullis dicitur.

Cultura Colitur porro Cinara in hortis: stercoreatam & solutam terram diligit: quamvis & in pingui posset melius provenire. Serenda est circa Calendas Martias Luna crescente si fieri potest: semina in area spatio semipedis discreta, non altè imprimenda sunt, sed tribus digitis comprehensa mergantur, donec ad primos articulos terra peruenierit: tunc leniter terra operiantur, & herbis liberentur assidue. Circa Calendas Novembriis, [vel etiam citius in Germania] planta deprimenda, multoque cinere stercoreanda: Id enim genus stercoreis humi olei videtur aptissimum. Singulis autem annis à caudice auferendæ sunt plantæ siue soboles, cum aliqua tamen radicis parte vellendæ, quæ circa Autumni æquinoctium disponendæ sunt, Columellâ & Palladio auctoribus.

Usum Spinis autem carebunt Carduorum capita, ut ait Palladius, si cacumina seminum confringas, vel, ut olitores aiunt, si delibratis Lactucæ radicibus & disiectis, semina integra condantur. De Cynaræ cultura & usu consulendus & Aug. Galenus. Scolymus inquit Dioscorides, radicem nigram, crassamque habet, quæ graueolentes alarum hircos, & reliqui corporis virosi odorem emplastrata [inspersa in pulvillum detrita Cornar. *zura* non *zura*] emendat. Idem etiam decocta potaque in vino potest: nam pota itidem copiosum graueolentem vrinam proliciat. Eo nomine quoque virulentæ tertiz Gonorrhææ differentiz præsens esse remedium expertus est Langius. Et Orbasius lib. 2. Synopseos: Cardus radix, inquit, magnam educit graueolentium vrinarum copiam, si quis vino incoquat, & decoctum bibat. Et in deliciis ganez, Carduus aded frequens erat, ut sine eo nulla magnifica aut adicialis conferetur cœna. Huius folia constructa, & terra obruta, albescunt: &

Tom. III.

hyeme, si inter fercula cum thyrsio decocta fuerint, gratissima. Caulis eius in vere pineas aculeatis foliorum squamis compactas gestat: quæ autem radicis eius pars tenerior, ut Asparagi, in iure cum butyro elixata [ad proliciendam Venerem uterque sexus edit] æstate ad id viris in Veneris consuetudine languentibus, hyeme verò mulieribus ad Venerem pigris, ut Hesiodus refert, patrocinator. Glaucias quoque prodidit Cardui elum ad prolis masculi conceptum plurimum conferre. Nil igitur mirum, mulieres Carduum aded ambire: ut diligentiori earum culturâ effectum sit, ut non tantum echinata Carduorum pinea, sed radices, caulis, & folia per totam hyemem, quæ cætera contabescunt, nobis in cibum suppetant: ne quis omnino, ut fertur, sine Cardui sit dies. Galenus scribit Scolymi radicem copiosam vrinam graueolentem elicere, si quis eam in vino coctam bibat, ac proinde graueolentiam sanare tum alarum, tum totius corporis. Atque hoc, sanè medicamento inest ex tota substantia, nimirum cum succus sit purgatorius. At quæ secundum qualitates editur actio, calidum in sicco ordine completo, aut tertio incipiente, medicamentum indicat, siccum verò in secundo. De Scolymi viribus plura Plinius habet. Scolymus vrinam clere præcipue traditur: sanare lichenas & lepras ex aceto, Venerem stimulare in vino, Hesiodo & Alceo testibus: qui florente eo Cicadas acerrimi cantus esse, & mulieres libidinis audissimas, virosque in coitum pigerrimos scripsere, velut providentia naturæ, hoc adiumento tam validissimo. Item graueolentiam emendat radicis emedullatæ vicia, in vini Falerni heminis tribus decocta ad tertias, & à balneo ieiuno, itemque post cibum Cyathis singulis pota. Mirum est quod Xenocrates promittit experimento, vitium id ex alis per vrinam effluere. Hæc Plinius.

Nunc nullis non hortis cardueta spectantur, plurimæ hortorum atque Cynaris refertæ sunt, nec iam sine cibo hoc, nisi tempus anni neget, opipara vel adicialis vlla sit cœna. Apponuntur capita nondum florentia Asparagi modo iuribus incocta, eorumque pulpa estur cum sale & Pipere. Itali rarè decoquunt, sed eruda cum sale vorant. Scribit Aëtius Scolymum calidum esse in principio tertii gradus, siccum in secundo, id quod in Scolymis, quem in Anglia se habere scribit Turnerus, nunquam animaduertit. Truncus Cynaræ autore Iouberro ex melle potius condiendus, aduersus pulmonis infarctum. Summi verò debent Cynaræ caules terrâ obruti & candidiores facti, saporisque mitioris.

Patet verò ex hætenus dictis Cornario Scolymum non fuisse notum, quem suo tempore in cibum non venisse affirmare audeat.

CARDVVS SCOLYMOS
Sylvestris.

Scolymus sylvestris satius persimilis; caule procerò hominis altitudinem assequente: folia amplissima, exsura satui, sed tomento copiosiori obducta, cuius nulla est lacinia quantumvis exigua, quam non arment spinarum mordacium flauescens spicula, quibus & lingua capitis squamarum extrema, sed maioribus multò rigidioribusque horrent, ipsa verò capita satui capitibus magnitudine cedunt: florum stamineus consimilis purpureus. Semen Cnici.

G 1

Venerem
stimulat.

Ad masculin
li conceptu.

Nulla dies
sine Cardui.

Succus purgatorius
Temperamentum ex
Galeno.

Vires Plin.
Luben. Lepros.

Refus demoi
stium.

Actio cum
radice
Turn
Truncus
Cynara
melle con
ditus
Delectus.
Cornarius
Scolymus
non notat.

Alarum
hircos.
Dign. cor
rig.

Ad Gonorrhæam
virosam.
Prima graueolens
in deliciis
habetur.



*Carduus
Pinnatifidus
non
est.*

Turnero Scolymus silvestris multò habet angustiora folia, quàm præcedens hortensis, spinasque longiores multò pungentioresq; , totusque fructus spinis acutissimis horret.

Ait Bellon. Oul. lib. I. cap. 18. se non posse assentire ijs, qui Artichaut sauvage volunt Carduum esse Plinij, & Artichaut cultus, Scolymum: quando-

quidem silu. semper spinosus manet.

An Brassicæ in exam. syr. de Eupat. Acantha leuce, siue Spina alba. vel Bedegar?

Anguill. epist. 7. Cinara multum spinosa cum magnis foliis spinosissimis, abundans in Abruzzo ad pontem di S Clemente.

De hac, ni fallor, Matth. loquitur, quando ait lib. 4. cap. 9. Falluntur, qui putant, stirpem illam Pternici non abssimilem (nostri eam *Carosio* appellant) cuius [hunc errorem notat etiam Appollo rad. 1.] flore coaguli vice Hetruria vititur, album esse Chamæleonem. Nam eorum error ex eo maxime diluitur, quod hæc contra Chamæleonis albi descriptionem in longo admodum caule echinatos suos proferat fructus. Idem cap. 12. de hoc Carduo Scolymo sylu. ait. Sunt præterea qui spinam albam [Carduum Echinopum] esse velint echinatham illam ac spinis rigentem herbam, quæ Hetrusci in lacte cogendo coaguli vicem explet. Item paulò pòst. Errant [& in hoc etiam errore Ruellius versatur] qui sibi persuadent. Spinam albam illud esse Cardui genus, quod à Tuscis, ed quodd [ve paulò antè diximus] coaguli vicem præstet, vulgò vocatur *Presura*. Tandem c. 14. Cardui aculeati genus & illud est, cuius echinati capituli floribus Hetrusci coaguli vice vtuntur. An Matthiolus ritè dicat Ruellium hanc spinam albam putasse, videant lectores.

Clus. H. 6. fortè huius meminix, cum ait. Scolymus Dioscoridis abundanter & spontè nascitur pinguib. Lusitaniz aruis, præsertim ad Anam veteribus dictum flumen, vulgò Guadiana, & pletisque Beticæ locis. Eadem tradit Hist. post. ac figuram Scolymi satini exhibet hoc titulo: Scolymus Dioscoridis, Castos Theophr.

Lobel. in Adu. & Icon. plant. Tom. 2. p. 6. Scolymus silu. siue Chamæleontha Monspeliensium: Cardu^s sylvestris coagulatus, Cinara silvestris.

H. Lugd. p. 1437. Scolymus Dioscoridis, Cinara sylvestris Penæ, de qua ait. Scolymus hic circa Monspelim in laeis agris secus vias profilit, quæ indigenæ vocant *Chardonnarette*, Officinæ Chamæleontha, nulla prorsus nota ex iis quas Dioscorides memorat reclamante: partu etiam cum adhuc tener est, in cibis grato, & germinibus, ac radicibus, quæ præsertim germinibus connectuntur [nam inferiores & alijs depactis ob lignosam duritiè espunt] esu suauissimis. Hanc plantam Pena Scolymum silvestrem siue Cynaram

aculeatam refert. Hoc tantum interest, quòd folijs angustioribus, aridioribus, & multò deffloribus spinis sit: flores item eleganti purpura multi, conferti lanugine. Huius delibratis caulibus teneriusculis & capitulis nondum in flores erumpentibus vicitare rusticos Italos ait Pena. Eius flore lac densant in caseum: eiusdem florem vulgò credunt contra feminarum sterilitatè valere, & grauidarum partus ad instu vlt; tempus continere.

Camer. hort. Carduus spontaneus apud Brutios, ideòque nostras hyemes minùs ægrè fert, quâ delicatus ille, qui spinas magonio deposuit.

Honor. Bello in epist. ad Clus. dicitur Agriocinara: de qua postea.

Scolymum sylvestrem florentem vidi mense Iunio. Abundat multis in locis circa Monspelim, maxime prope Peroux, quâ itur ad mirabilem quendam fontem, quem sibi persuadent esse lethalem rustici. Fons autem erat acidus vi gustauit Io. Bauh. qui videtur feruere instar Cacabi magni repleti aquâ bulliente. Colore aquæ croceus est. Pronenit item inter Monspelim & Nemausum, videlicet propè Colombier & Eusian: alibi non obseruavi.

CARDVVS AGRIOCINARA CRETENSIS, ex quo Costus niger officinarum.

Svptà Chisami arcem in insula Creta authore Bellon. in Oblea montis parte quâ Calohierorum monasterium, cui nomen D. Ioannes de Prædermos, situm est, Artichocæ silvestris genus crescit, pastoribus Agriocinara appellatum, cuius radicem cubitalis longitudinis, & humani cruris crassitudinis, foris & intus nigram, pyri in modum turbinatam, Costi Indici loco in Atomatariorum officinis venalem esse asserimus. Intelligimus autem nigram illam radicem quam Costum nominant, quamque ab omni antiquitate in usu esse credimus. Capita fert instar Cinaræ siue Artichocæ, quæ pastores cruda mandunt. Eius flos maxima ex parte candidus est (licet & purpureus inueniatur) & suavis odoris. Ipsius radices Chamæleonis albi radicibus similes sunt, & folia Chamæleonis nigri folijs. Differt ab alijs Artichocis silvestribus multis Italiz locis nascentibus.

CARDVVS MARIANVS SIVE LACTEIS maculis notatus.



Vndulato macularum lactearum viscentiumque discursu variata folia, lata longaque conspiciuntur, sinuata, & squis aculeis horretia, nitida: caulibus digitalis, striatus, lanugine villosa incanus, duos aut tres cubitos altus, in ramos diuiditur plures: echini intrastabiles rigidissimis aculeis

*Cynara
filu.*

*Card. spontaneus
Camer.*

*Locus &
Tempus.*

Locus.

*Artichoca
filu
Descriptio*

Costus.

*Florum
varietas.*

Descriptio

*Cinara
silu. unum
pinosa An-
guill
Cardu
Cinara
Cinara.*

*Cardu
er-
ter*

*Cardu
aculeatus.*

*An Scolym
Diosc. Clus.
Hist.*

*Chamæle-
ontha Monspeli-
ens.*

*Scolymus
filu. Diosc.
H. Lugd.*

Chardonnarette.

que spinis armati, Scolymi mediocri magnitudine, callosa squammarum cartilagine, dulci, veluti, florum purpurascens flamina explicant, quibus semen succedit Carthami: radix longa & crassa, esculenta.

Synon. Brunfels. Fuchl. Corn. Trago [qui & Labrum Veneris appellari asserit] Carduus Mariæ & Spina alba dicitur.

Card. Ma-
ria
Card. Ma-
rianus.
Spina alba
im. qd.
Cordo in Diosc. dicitur Carduus Marianus. Is eorum opinionem non approbat, qui cum Amato Chamæleonem dicunt, seu nec eorum, qui cum Fuchl. Corn. Trago, Lonici. Toxite Helfr. & aliis Bedegar album, h. e. spinam albam esse affirmant.

Card. Ma-
ria
Card. Ma-
rianus.
Spina alba
im. qd.
Sed & Dodon. gall. Spinam albam Carduum Mariæ Officinatum vocat, ac quorundam Agriocinatum facit, Donacitum, Erylisceptrum, Spinam regiam, Cardum rampartium, & Bedegar Arabum, non sine errore: Quem tamen errorem animaduertit Dod. lat. in fol.

Card. Ma-
ria
Card. Ma-
rianus.
Spina alba
im. qd.
Carduum Mariæ vulgi, aliqui [huius farinae est Anguill. epist. 8.] Silybum Veterum putant ab his tamen meritis dissentit Gesn. de hortis, qui reclus de coll. stirp. Cardui genus nuncupat, maculis albis quod à plenitudo vulgè appellari tradit.

Card. la-
beus
Dodon. re-
darguer.
Lobel. in Aduers. Silybum, Carduus Mariæ & Lacteus dicitur. Is reprehensionem ex Turnero aduersum Dodonæum adducit, ob vires quas ex Dioscoride vulgaribus plantis tribuit. Dodonæi sedulitas, inquit Lobelius, ut multis aliis locis laudanda, ita plerisque minus tempestiua, ubi ignotis plantis facultates certas asserit, quas à Dioscoride accepit, magno detrimento ægrotum & experimentatorum, qui quod vident à viro bono, & veritatis amico scriptum, illic ut verum arripiunt, & per experimenta mortes agunt.

Silyb. Lob.
Lob. cap. 1.
Leucogra-
phis Plin.
C. hamuleum
albus Ama-
nus.
Obi. pag. 479. Silybum siue Carduus lacteus, Leucographus Plinii Aduersariorum, Leucographus Plinii quidem aliqui volunt, sed hoc non legimus in Aduersariis, ut hoc loco scribit Lobelius.

Icon. Plant. Tom. 2. pag. 7. Silybum, Carduus Mariæ & Lacteus, Leucographus Plinii.

Male Amatus Chamæleonem album facit, nec congruit nomen eius gallicum, Carline, huic plantæ. Sed & Toxites in onom. phil. pag. 241. Acanthion leucon Carduum Marianum cognominat, & diuersos eo capite confundit Carduos p. 354. cum Tribulo S. crucis & Tribulo S. Mariæ. Loniceri vocabula, spina alba & Arcebutum fundæ non sunt approbanda: figura quoque non multum placet. Tabern. Icon. & Hist. Carduus Marianus siue lacteus. Is falsè spinam albam, seu Bedegarim, credit.

Camér. hort. Carduus Mariæ vulgi, eidem in Epit. & Hist. Matth. germ. Carduus lacteus: C. Bauh. apud Matth. Carduus lacteus, Carduus Mariæ.

H. Lugd. duas habet icones. Priorem p. 1464. hoc titulo: Carduus lacteus Matthioli. Posterior p. 1475. hoc: Leucographus Plinii, Carduus Mariæ. Vtrobique describitur: in illa figura folia, in hac capitula non placent. Tertio describitur p. 1466. sub Silybo Penz sine icone.

Theod. Dorst. qui Bedegar, Labrum veneris & Spinam albam Carduum Mariæ cum Fuchl. & aliis non sine errore opinatur [ait enim hanc in omnibus conuenire cum descriptione Spinæ albæ apud Diosc.] Eringii iconem, non Cardui Mariæ proponit.

Nomina
linguarum
Cæterum, Carduus lacteus, Lactarius, D. Ma-
Tom: III.

riæ, Marianus, & lacteis maculis notatus Lat. congruè dici potest, Germ. Mariendistel & framendistel/weiß wegdistel. Belg. Ouser vrouwen distel. Gall. Chardon de nostre dame. It. Cardo Mariano, Cardo maculato, Scardacio bianco. Hisp. Cardo pinto. Angl. Our lady distel. Boh. Ostrós pec.

Passim Montbelgardi prouenit, nec non Basileæ, Lugduni & Geneuæ, in hortis, in quibus olera seruntur, non raro & secus vias locis incultis, florens à Iunio in Augustum vsque: altero à quo enatus est anno: interea & semen maturitatem consequitur, quo maturo perit, ut plerique Cardus, quibus non diuturnior est vita, quam ad seminis vsque perfectionem.

Radix exaltat auctore Matthiolo in Epit. Camerarii, absterget, aperit, prouocat & attenuat. Eius decoctum datur vtiliter potandum ad iocunditatis, & vatorum infarctus, & remorantes vrinæ, quare confert hydropicis, ictericis, ac nephriticis. Idem menses elicit, tum potum, tum in deflectionibus additum: Radicum siccaturum puluis propinatur ex pusillana cum Fœniculi semine, & longo Pipere ad lac augendum. Aqua, ut Tragus perhibet, è foliis Cardui Mariæ destillata, ac quantum mediocrius haustus continet pota, laterum morbo auxiliatur. Si huic potioni seminis Cardui Mariæ tuli dimidiam drachmam adiectis efficacius id præstabit, quin & pestilentiali veneno, & quibuscunque aliis corporis internis malis exigendis apprimè conducit, aqua destillata inflammationibus incensi hepatis, & deliquio animi in lintheolis foris imposita opitulatur. Cæterum Cardui Leucographi folia tenera, demptis spinis, aliquando oleribus non incommode addi, testis est Dodonæus: ad quæ præterea viliâ incognitum est.

Locus &
Tempus.

Vires.
Decoctum
radicis.
Vatorum
infarctus.
Remorantes
vrimæ.
Menses
Puluis rad.
Lac angel.
Aqua Fœ-
niculi
laterum
morbus.
Pestilentialis.

CARDVVS LACTEVS PEREGRINVS Camer.



Semen subal-
bicans in-
uenit auctor
inter Epithy-
mum è Creta
delatum; sed ad
frugem non
peruenit plan-
tâ, frigore su-
perueniente
corruptâ radice,
& mox conta-
bescens foliis;
quæ tene-
riora erant &
planè similia il-
li Carduo quæ
indem Lactei
nuncupat D.
Rauuolffius,
vel Bedegar
Arabum cum

Descriptio

Syniacis herbis aliis ipsi communicatum; flore purpureo pallescente, caule exalbido, spinis nitidis è luteo albescentibus. Fortasse idem fuerit. Nos iconem ex sicca à Camer. delineatam proponimus.

Camér. hort. Cardui Mariæ vulgaris species, Card. Ma-
quem Rauuolffius Carduum Lacteam vel Be-
ria Camér.

Ab Bede-
gar Arabum
cum Rau-
uolffio.

*Card. la-
teus Syria-
cus.
Card. Ma-
ria Syria-
cus.*

deguar Arabum vocat. Item Icon. Carduus lateus Syriacus.

C. Bauh. apud Matth. Cardui Mariz altera species ex Syria. An Honorii Belii Agauanus Creticus illius spinola quam Acanon Veteribus dictam fuisse iudicat, ac à qua reliqua spinarum genera Acanacea nuncupata fuere.

CARDVVS GALACTITES IOH. Bauhini.

Descriptio.



Galactites Carduus, natus radice lauis tenui & simplici, caulem tollens interdum simplicem, interdum ramosum cubitalem, striatum, cano villo pubescentem, membranis spinosis pinnatum, cuius summum in furculos aliquot successit, capita sustinentes Auellanae magnitudinis, squartosa, quorum singula

lquam in longam, acutam, inuallidam spinam desinunt: hinc flores emicant purpurei, gratia sua post multos annos tenacissimi: semen pappo appenditur, oblongum, lubricum, candidum, amarum, ceterum folia palmo longiora, minus aculeata, profundis crebrisque laciniis diuisa, ima parte albida lanugine donata, superna virescunt, fortuitis maculis lacteis respersa.

Hi Lugd. p. 1463. Spina alba altera Matthioli. & alibi, Leucacantha Monspeliensis Dalechampii. Dux figuræ vnius plantæ & nullæ descriptio.

Locus.

An Celsalp. lib. 13. cap. 40. Spina alba alia? Carduus Galactites floret vere secus vias non longè à Monspelio.

ACANTHIUM VETERIBVS.

CAP. VII.

*Antiqua
Dioscoridis
lectio.*

Est corrupta

*Acanthium
Plinio.*

Acanthium (τὸν δ' αὐτὸς ὀρίζον) inseritur in hoc cod. vet. folia gerit spinæ albae similia, in summis extremitatibus aculeata, quibus collectis, simulque contextis, bombycinis similes vestes fiunt. Huius radix & folia retrorsum distentis opisthotonicis in potu auxiliantur. Et hæc est antiquæ lectionis in Dioscoride descriptio. Perisse autem huic lectioni aliquid, sermonis patum sequax ductus ostendit. Quid autem desiderare, & amissum instaurare, ut Marcelli verbis utar, nos oporteat, id ex deprauata lectione & etiam ex Plinio, & magis tutò ex Orisatio, manifestè colligitur. Nam Plinius, qui de aculeatis plantis quibusdam egit, lib. 24. cap. 12. Acanthium hoc his verbis describit. Huic similis est Spina illa, quam Græci Acanthion vocant, minoribus multò foliis, aculeatus per extremitates, & araneosa lanugine

obductis: quæ collecta, etiam vestes quardam bombycinis similes fiunt in Oriente. Ipsa folia vel radices ad remedia Opisthotonis bibuntur. Et sic etiam Orisatio legit. Patet ergo Dioscoridem ita esse restituendum. Spinæ albae similia habet folia, in summis extremitatibus aculeata, araneosa lanugine obducta, quæ collecta &c. Reliqua enim rectè habent. Hæc namque si quis contulerit, omnia eadem utriusque esse inueniet, præter ea, quæ Plinius ait, lanugine obducta, quæ ad explendam Acanthii historiam tam necessaria sunt, ut sine ijs non possit integer sensus esse Dioscoridi, contraque suo loco instauratis nihil aptius audiatur. Quomodo enim quæso ex aculeatis foliis simul contextis vestes bombycinis similes fierent. Ast ex lanugine ex foliis collecta textaque vestes bombycinis similes fieri nemo negabit. Neque verò ignoro aliud esse bombycem, aliud verò bombacem seu Xylum, gossypiumve: sed & Plinium imitari lubet, qui Xylo quoque seu gossypio bombycis nomen tribuit lib. 19. cap. 1. Quæ verò sit spina Acanthium dicta, & an in nostris regionibus nascatur, nemini satis notum est arbitror. Quam enim nullatals spina apud nos reperitur, ex Oriente petenda videtur. Galenus Acanthii folia & radicem tenuium partium esse, & calidam vim habere asserit, ut etiam conuulsis auxilietur. Ita ex ipso etiam Paulus.

*Diosc. resti-
tuitur*

Bombyx

Ex Galeno.

SPINA ALBA SYLVESTRIS Fuchtio.



Tres quatuorve cubitos altum profert caulem, striatum, tomento sum, cui membranæ per longum adnatae, valde spinosæ, sinuatae, albicante villo obductæ, quibus cōtinuantur folia, sesquipalmaria & dodrantalia, interdum cubitalia, sinuata, spinis horrepta, similiter utrinque villosa & candida, potissimum minora, priusquam excreuerit caulis, capita extremis ramorum harentia mordacia florem explicant purpureum, semine cum pappis sequente Cnici, minore, vericoline, amaricante & acri, radix tenera, alba, subdula in adolescente planta, quæ qualitates per ætatem mutantur.

Descriptio

An Ruell. lib. 4. cap. 16. Acanthion herba: Gorih. Acanthion: Brunfels. in Diosc. Acanthion, alba spinæ simile: Cordo in Dioscor. Chamaeleon albus, Carduus Viehdistel à quibusdam falsè appellatus: Brassauolo in tyr. Eupat. Leucacantha, Cardui genus quadratum: Amato Acanthium, quod in horto Azaioli Ferrariensis videt, Anguill. epist. 8. Onopordon Athenzi, in Calabria & in Sicilia Anaperdo, & ab Italis Scari & d'Asin. dictum: Rydus

*An Acan-
thium?
An Chama-
leon albus
Cordo?
An Leuca-
cantha
Brass.
An Onopor-
don Athen-
zi Anguill.*

Spina alba
agrorum
diff.

Ryffus in Diosc. lib. 3. cap. 16. hanc intellexisse videtur, per spinam illam, quam in agris nasci tradit, & Acanthion esse; asserere non audet. Corn. in Diosc. Spinam albam Officinarum Bedegare vocat, ac à Carduo Mamano, weiff wegdistel / wehdistel / non bene, meo quidem iudicio, distinguunt.

Spina alba
filv. Fuch.

Fuchsius Spina alba silvestris, spinæ albæ alterum genus huc silvestre, proxime ad Dioscoridis descriptionem accedens, ideoque à Germ. Weiff wegdistel / Gallis autem *Artichaut sauvage*, ou *Chardon commun* vocatum.

Spina alba
Trag.

Tragus hanc spinam albam. inscripsit, ac Germ. weiff wegdistel nominat, & esse alteram apud Dioscor. spinæ albæ speciem [quæ Græcis *ἄκανθα λευκή* Arabibus Bedeguar dicitur] neminem negare posse putat, & spinæ albæ cognominat: pro more suo recenset. Sunt autem hæc. Agnociuara, Donacids, Erysiaceptum, Spina alba, Auregia, Carduus Campanus.

Amat. m.
prob.

Apud Amat. capite de spina alba ponitur figura spinæ albæ silvestris Fuchsi (ita enim à Fuchsi. inscribitur icon, quæ eadem cum nostra est) licet in Amati contextu eius non fiat mentio.

Lonc. m.
sur.

Lonic. cuius icon satis inepta cum Calepino etiam spinam albam seu Acantham leucen vocat: ac præterea Leucacantham cognominat, licet Leucacantham Diosc. separat. Eadem etiam spina alba silvestris dicitur.

Card. j.
March.
Acanthum
March.
March. m.
prob.

March. in enchir. med. Carduus tertius, weiff wegdistel Germanorum.

Matth. plantam nostram in post. comm. cum mag. fig. lat. & Ital. pro Acanthio depingit, ac dicit. Si planta in Italia nascitur, quæ legitimum Acanthium repræsentet, hæc profecto Acanthium mihi rectè repræsentare videtur. Siquidem solus est & albæ spinæ per extremitates aculeatus, & araneosa lanugine obductus Matthiolius suo more ex sola figura, non cognita planta de qua scribit, dicit repræsentare Acanthium: non agnoscit eam dandum esse exhibitam pro spina alba nec docet qualis sit, quam exhibet, nec ubi vident.

Acanthium
Dod. gall.
Acanth. al.
terum Lat.

Dodon. lat. in sol. figuram, quam Gall. ex Fuchsi olim simpliciter pro Acanthio posuerat, Acanthium alterius nomine proponit, addens aliam figuram pro Acanthio, quæ etiâ assumpsit Lobel. in Obs. p. 476. & Icon. Plant. Tom. 2. p. 1. Sunt igitur duæ figuræ vnius plantæ. Posterior ex Fuchsi, qualis etiam nostra, æquè bene exprimens Acanthium atque prior Dodonæi & Lobelii. Et licet duas habeat figuras & descriptiones, minus distinctè tamen de hoc Carduo scribit, nec ostendit quid potius Acanthio conveniat, nec etiam tradit, an eodem vel diversis proveniat locis.

H. Lugd. 4.
figura.

H. Lugd. duas vnius plantæ ponit figuras pag. 1446. vni hic titulus Acanthium, Spina albo silvestris Fuchsi. Non placet & tertiam huius plantæ figuram pag. 1466. poni sub titulo Silybi, siue Leucacanthæ Loniceri. Præterea Lonicerus non meminit Silybi, nec etiam vocat Leucacantham: pro Leucacantha pingit aliam plantam, quamvis in comm. in Diosc. eam fortè intellexit. Considerent lectores an huius plantæ non ponatur quarta figura p. 1472. pro Onopyxo tertio Dalechampi, & male torè.

Castor. m.
satur.

Per Acanthium, cuius figuram ponit Castor, intelligo spinam albam filv. Fuchsi, quæ fortè Castori non bene nota, alii qui præstanti floribus poluunt, vel eum descripsissent, quum vulgaris sit planta, & ab aliis melius depicta.

Comiti à Neuenare in annos. apud Brunfels.

Tom. 2. p. 242. Carduus armentarius siue pecuarius, Germ. Viehdistel. Carduus albus Brunfelsio.

Card. m.
mentarius
Card. albus
Brunfels.

Samer. hort. Acanthium, Onopordum aliis.

C. Bauh. apud Matth. spina alba silvestris, Acanthium Matthioli.

Hort. Lus. Acanthium vulgare.

Acanthium
Acanth.
vulgare.
Carduus
filv. a. j. a. l. p.

Czasp. Carduus silvestris in rudibus nascens: foliis latis non scissis, candida lanugine hirsutus: capitulis hispidis, non squammosis, sed potius hirsutis: vsus eius ad lactis coagulationem, idè à quibusdam vulgo *Prasura* appellatus.

Prasura
An Card.
Spinoss.
vulgaris
Hort. Lugd.

An hort. Lus. Carduus spinosissimus viarum flore purpureo, Onopordum 1. Tabern. Item Carduus spinosissimus flore albo, Onopordum 2. Tabern. Weg distel mit purpurbraunen unde weissen blumen?

An Schvvenckf. Carduus viarum vulgarior, Carduus vulgaris spinosissimus, Lob. Onopordum 1. Tabernomontani?

An Ioh. Agricola Carduus pecuarius?

Acanthium
vulg.

Tabern. Icon. & Hist. Acanthium vulgare 1. flore albo, weiff wegdistel. Acanthium vulgare flore purpureo, wegdistel mit purpurfarben blumen / wegdistel: dicitur Græcè *ἀκανθα λευκή*, Latinis spina alba: Acanthium: Arabibus Bedeguar: Gall. *Espine blanche*. Ital. *Spina bianca*, Boh. *Tröbily*. Non placet poni duas figuras plantarum, quæ solo colore differant, non video etiam quomodo Acanthia leuce & Acanthium idem esse possint: figuræ etiam duæ pro Onopordo 1. & 2. vix demonstrant discrimen nec etiam descriptiones. Montbelgardi abundat: Observauit etiam Monspelii, & Lugduni: Genevæ solet hie mem perferre. Basileæ provenit propè portam Bisce extra portam S. Albani, mirè tomentosus candidus infernè & supernè, maximè folia minora priusquam florem ferat. Nascitur in vtraque Germania secus vias, tum & alibi. A Iunio in Aug. itum vsque flores: altero à quo enatum est anno: interea & semen maturitatem consequitur, quo maturo perit, ut plerique & alii Cardui, quibus non diuturnior est vita, quàm ad seminis vsque perfectionem.

Tabern. m.
satur.

CARDVVS QVIBVSDAM DICTVS

Acanthium Illyricum, aliis verò
Onopordon.



Magnam Descriptionem habet cū Spina alba sylvestri Fuchsi similitudinem: folia tomento candicante similiter obducta, profundius secta, tota spinis armata: caulis membranaceis aculeatis alatus sex septemve cubitorum altitudine: in ramorum, quos crebros habet, extremis flores gerit purpureos iam dictos

Cardui, ex echino etiam simili.

Onopordum
Tabern. &
Dod.

Tabern. Icon. & histor. Onopordum 1. weiß wegdistel. Dod. lat. in sol. Onopordon inscribit, ac ait: Peregrinus hic Carduus Belgio est. Onopordon Herbarij appellant: Plinij tamen esse Onopordon affirmari nequit: nihil enim apud eum de Onopordi forma. Fortassis etiam Acanos est, quem Bellonius omnium Carduorum spinosissimum refert: & in Creta hac ætate Aconachiam vocari. Paucæ autē de Acano à Veteribus prodita extant: pauciora verò etiam de Onopordo. Certius est Acanon spinam esse, quàm Onopordon. Cur Dodon. non subnectit Onopordon, Acanthio cum quo plurima similia.

Acanth. Illy-
ricum.

Lobel. Adu. Acanthium Illyricum. Obl. p. 476. & Icon. plant. p. 1. Tom. 2. Acanthium Illyricum, Onopordon alterum Herbariorum & Dodonæi.

Acanth. Illy-
ricum.

Camer. hort. Onopordon vel Acanthium Illyricum. Lusit. Acanthium Illyricum Onopordum windisch weiß wegdistel.

Locus &
Tempus.

Acanthium Illyricum primò vidi Lugduni in horto meo ubi satum fuerat per Valerandum Dorez qui semen ex Sclauonia attulerat, in meo etiam horto vidit Lobelius: Carduus est spinosissimus qui affinitatem habet cum Carduo sylu. Fuchij: satum Montbelgardi in Horto E. C. prouenit & flores protulit. Argentor. 1595. Octobri vidi in horto Friderici Meier, qui semen dedit nomine Cardui Dalmatici.

CARDVVS ACANTHOIDES.

Descriptio



Haud minora sunt huic folia quàm Carduo Mariz, per ambitum magis spinosa, calus mediocriter profundis, sed quibus nullæ asperæ lactæ maculæ, nec illius adest glabrities, quin cano tomento oblecta sunt, potissimè inferius, supernè enim præualeat viror inter cædorem tomentum interlucens: caulis duorum

cubitorum, quatero alarum spinosarum versu pinnatus, capitula parua, sublonga, extremis ramorum plura simul congesta, nec pediculis distincta: [quo nomine tum à Carduo Mariz, tum ab Acantho syluestri Fuchij haud obscure discernitur, ei in ceteris valde similis.] flores dilutè purpurascens, quos pappi albicantes excipiunt. Sapor huic plantæ nullus euident.

Locus &
tempus

Carduum hunc Acanthoidem florentem obseruari Monspelij mense Martio. Colendissimus præceptor Gesnerus, cui omnes meos labores communicavi, Acanthium Matthioli fecit.

CARDVVS MONSTROSVS.


Descriptio.

DE Carduo hoc monstruæ formæ Cornu copiz repræsentante, quem Ferdin. Imperat.



Hist. sua natural. lib. 28. cap. 7. exhibet, & existimat fuisse Onopyxō Theophrasti, quid dicam, nunc non habeo. Vellem Imperatum diligentiùs descripsisse, & cum Onopyxo Theophr. contulisse, locumque ubi cum inuenerit annotasse, quò posteri è faciliùs veritatem indagare possint.

CARDVVS NVTANS.



Similis est Descriptio

SCarduo syluestri Dodonæi, verum humilior multò, caule pedem vnum aut alterum alto, in varios scisso ramos subhirsutos, & membranatis spinosis per longum alatos: folia minora, asperiora, minus profundè crebriùs tamè laciniosa, spinosa, & hirsuta, per extrema ramorum in-

terdum sine vllis spinis, verum tomento recta, rotunda. Suum gerit vnusquisque ramus echinum, magnum, Cardui Mariani similem, deorsum nutantem, squammis aculeatis, lationibus quàm in Carduo syluestri, compactum: strobili copiosi, purpurei, interdum albi, latè se explicant: radix rubescens vel nigricans.

Dodon. hist. purg. in app. pag. 451. & Lat. in sol. Cirsiion tertium tota sua stirpe magis spinosum.

Clus. Pann. pag. 660. capite de Cirsiio ad finem, & Hist. post. lib. 5. p. 150. de hoc Carduo loquitur, cum ait. Non minùs vulgaris agro Viennensi, multisque Pannoniæ locis, & apud Francofurtum est quàm in Zelandia, Flandria, Hollandiaque maritimis, spina illa, quam Dod. inter Cirsiij genera tertio loco recenset, magno, valde spinoso, nutantèque capite, è quo flos multis purpureis elegantissimisque staminibus constans emergit, quem nuneo flore variare aliquando memini: Est semine Cirsiij.

An Tabern. Icon. & Hist. Onopordum 2. weiß wegdistel: Si intelligit Carduum nutantem, ut videtur, non probo eius figuram, cæque minùs illam demonstrat, quàm Fuchsiana.

Consi.

N. Lugd.
eandem
forte
describit
Drypis
Drypis Lo-
nicer.

Considerandum aliis relinquo an nō ab Hist. Lugd. lib. 14. cap. 26. describatur & depingatur his eadem planta. Primò p. 1479. nomine Drypidis simpliciter. Secundò pag. 1480. pro Drypide Scolymo, & Carduo sylvestri Loniceri, Aculeosa Gazz, Ruelli Oxyacantha. Ego Drypidis nomen apud Lonicerum non inuenio, figura quidem est (quamvis non admodum felix) in Hist. germ. lib. 5. cap. 29. nomine Gemein haber distel [Carduum vulgarem auenaceum dixeris] quem postea vocat Carduum sylvestrem, & Scolymum sylvestrem, qui sanè non videtur obseruasse Tragum l. 2. c. 110. varias species sylvestrium Carduorum intellexisse & nō vnicā, vt Lonicerus describit.

Locus
tempus

Hort. Lus. Card. sylvestris Dodon. capite grādi. Carduus capite nutante floret Augusto. Abūdat circa muros & fossas vrbis, necnon in agris; vt inter Audincont & Arbuis. Frater Casp. obseruauit etiam Basileæ. Flore albo obseruauit in ducatu Wirtemb.

CARDVVS CAPIT TOMENTOSO

Descriptio



Tomento-
so striato
caule, crebrisq;
ramis. stipato
ad duos aut
tres quatuorve
cubitos assurgit,
qui licet non sit
pinosus, vix ma-
nu potest attingi
propter folio-
rum aculeos: folia
cubitu lō-
ga tomento vil-
loso inferius in-
cana, superius
atrouirentia, &
Echij modo as-
pera, ex plurib.
foliis minorib.
quæ ex certis
interuallis qua-

terna, utrinque bina, altero antrosum, altero re-
trosum posito, conflata, spinis longis rigidis
acutis minacia: caput pugillari lapidi æquale, la-
tum, squamis paruis lōgis & spinis parum mor-
dacibus densissima lanugine intertextis: stipes
eius summo emicat, constans multis staminibus
& diuersis coloribus, qualibus Hyacinthus Fuch.
maximus, violaceus & cæruleus: apices inuol-
uunt vaginula alba, quæ sua albedine pulchre
hunc florem ornat, hanc vaginulam alia circum-
dat purpurea in quinque apices diuisa, sub flori-
bus caro alba grati & aromatici saporis: semen lu-
bricum cineraceum, striatum, oblongum, modicè
compressum, dulce, tomento inuolutum: ra-
dix crassa, gustu non ingrato, sed aromatico, qua-
li etiam caulis & foliorum, si excipias medullam
albam siccam & inspidam: vbi capita excindun-
tur apparet lacteus succus.

Figura me-
la
C. Bauh.

Corona fra-
trum.

Lobelius.

De eo Lobelius in Adn. cuius pictura non pla-
cet, ita vt mirari subeat, Patronum Matth. quod
suum Matthiolum eā ornare ausus sit. Is in Obs.
p. 481. vocat Coronam fratrum Herbariorum, &
Carduum Erioccephalum Dodon. In Icon. Plant.
Tom. 2. pag. 9. Carduum tomentosum, Coronam
fratrum Herbariorum: Item p. 10. Carduum to-
mentosum Aduersariorū. Dux figuræ vnius plā-
te. Mala Aduers. poterat omitti, imò debebat.

Tom. III.

Camer. hort. & Dod. lat. in fol. dicitur Carduus
eriocephalus, vt & Clusio Pannon. p. 666. & Hist.
post. l. 5. p. 154. de quo ait. Carduum eriocephalū
vulgo Herbariorum satis notum flore albo va-
riare obseruati. Eum autem qui est flore purpu-
reo, sed longè humiliorem, aliquoties eruiere me-
mini agro Salmaticensi in Hispaniis, cuius semen
amicis in Belgicā misi cum hac inscriptione, for-
tè Corona fratrum, quoniam multis notis respō-
dere conspicebam ei plantæ quam Monachi in
Melsuē commentatores lib. 10 Hispaniis obser-
uatam, Coronam fratrum appellassent, quod ra-
mi æquali altitudine nascentes, & suis capitibus
eriphoris onusti, medium caput masculculum
summo cauli innatum, quodammodò in orbem
cingerent, vt Monachi suū Abbatem aut Prio-
rē solent. Ex eo tempore Coronæ fratrum no-
men apud Belgicos herbarios hæc spina obti-
nuit: postea tamen à capitibus candicante lanā
inuolutis, conuenientiore appellatione Carduus
eriocephalus dici cœpit.

Flore albo.

Corona fra-
trum cur
inferius
Clus.

Eriocphe-
lus Gnd.

An Carduus montanus echino lanugine obdu-
cto Matth. in Diosc. An eiusdem Carduus caule
rotundo sentela aranæ obducto, in Hist. Germ.

Card mon-
tan echino
lanugine
obducto

Non placet tres figuras & tres descriptiones
vnius plantæ diuersis locis posita ab Hist. Lugd.
quasi diuersæ sint species. Harū prima est p. 1446.
hoc titulo, Acanthium montanum Dalechampi:
hoc quod in gelidis montibus, vt in monte Iura,
nascatur, ita cognominauit. Altera est p. 1472. pro
Onopordo, quod Onopordum Plinii rectè dici
posse Dalechampus putat, & Parisienses feruata
græci nominis significatione Per d'Asue, vulgò
vocare ait, & affirmat alinos eo gustato subulta-
re, crebròque pedere: in locis cultis & pingu-
bus, pecudum morsu non violatum ad hominis
proceritatem crescere. Tertia figura ponitur p. 1474.
pro lacea lutea Clusii, & describitur p. 1483. pro
Carduo Erioccephalo Dodonæi, Carduo tomen-
toso Anglico, seu Corona fratrum Herbariorum.
Melior itaque figura transposita est sub nomine
laceæ luteæ Clusii, quæ eleganda erat ad caput
de Carduo Erioccephalo: pro Acanthio deterior
exhibetur.

Matth.
Huius tres
fig. & tres
descript. a-
pud id Lugd.

Card Erio-
cephalus.

Huius figu-
ra est tras-
posita.

Quam pro Spina Arabica figuram adieci apud
Matth. (inquit C. Bauh. spinam Arabicam Diosc.
& Plinii cœt Cæsalpinus, at Aduers. & Lob. Car-
dium tomentosum nominant, Suchaba Arabum
Guilandino dicebatur. Hæc frater, Alst Cæsalpino
Arabica spina propè cubitalis est, rami infirmi,
cum paucis foliis viridibus, modicè pungentibus.
Carduo verò tomento teste Dodon. & Lob. cau-
les crassi, terni in quaternumve cubitorū, incana
lanugine obsiti, folia magna spinosa, pronā parte
candidiora: quæ rationes faciunt vt non existimē
Carduū tomentosū esse Spinā Arabicā Cæsalpini.

C. Bauh. vocat

An Bacchanello Acanthium illud, quod quid
sit nescit, etsi aliqui Carduum montanū pro spe-
cie Acanthii demonstrent?

An Cæsalp. Acanth. aliud in agrorū limitibus
passim nascens maius & nigrius, in omnib. spinæ
albæ campestri simile, sed colore viridi, nigricante:
capitib. nō tantā lanuginē sudentib. vt Acanthiū

An Monach. in Mel. dist. 6. cens. 189. Cardui ge-
nus, caule carēns, qui Corona fratrum dicitur?

An Thalia Cardui species capitulo spinoso, cā-
didā lanugine, squamis eius intercurrente?

An Rauuolff. in Itin. l. 1. c. 1. Carduus tomento-
sus circa Marsiliam, Leucacanthæ non dissimilis?

Satus primo anno caule nō fert sed sequenti, po-
stea perit, se suo semine deciduo propagat. Olim
colebā in horto meo Lugd. & postea Geneuæ qdē

Locus &
tempus

H

seminavi in Horto Ill. E. C. ubi nunc habeo. Florere variis in locis observauimus Iulio, Augusto & Septembri. In Salmanticensi agro observauimus, inquit Clusius, locis apertis & non cultis: ac in Belgicis hortis: sponte etiam in multis Austriæ & Styriæ locis.

Quibus potè facultatibus peculiaribus sit præditus, neque Clusius intellexit, neque quemquam fecisse periculum arbitratur.

CARDVVS LANCEOLATVS SIVE filu. Dodonæi,

Descriptio



Stem est bicubitale & tricubitale, villo candido obuestutū, angulosum, subinde nonnihil purpureum, membranis spinosis secundum longitudinem alatum. furculosum, rigidum, quem alterno polito ornant folia, palmum vnum aut duos longa, infra supraque hirsuta, sed deniore

candidiorēque lanugine inferius donata, profundè crebris caulis diuisa, quorum singula segmenta in aculeum infestum facessentia, lanceatam mucronem imitantur: echinū, oblongus, mitior ad Lappæ innocentiam ferè accedit, rigidioribus tamen vtrinque aculeis, nec reflexo mucrone aduncis, sed rectis, lanugine alba intertextis, florum cincinnos è capite profert purpureoscentes, quos pappi excipiunt, quibus semen nitidum longum appensum.

Echinus.

Onopyxos
Dod. 14. 6. w.
gall.
Buxus as-
fininus.

H. Lugd. pag. 1471. Onopyxos Dodonæi, de quo ait. *eromē* & inter spinosas stirpes à Theophrast. & à Plinio lib. 21. cap. 16. numeratur, Buxum asininum vertit Gaza, quoddam Carduus asinis in cibo gratissimus, & summo perè expetitus: granquam non desint, qui non per, sed per n, *eromē* legendum esse putent. quod ad eum pascendum asinus perpetuò defigatur & hæreat: qua ratione & *Dipsacum eromē*, idem nuncupant, quoddam ad eum asinus magna alacritate feratur cum senserit, quasi Asini corculum. Cum verò asinos ubique observauerim ad quosdam Carduos libentius accurrere, is libentius, & maiori cum voluptate vesci, ab eisdem magis allici, merito *eromē* nominauerim hunc qui hæsitur passim secus vias, in agrorum limitibus, scrobium marginibus, silvarum aditu, & ubique ferè in cænis obuius.

Dodon. gall. Scolimus Carduus siluestris Plinio & Limonium, quibusdam *eromē* & *eromē* Chardon sanuege. Figura posset melius exprimi quam exprimitur apud Dodonæum. Eam tamen etiam retinuit Lat. in sol. hac inscriptione p. 727. Carduus filu. primus.

Lobel. Obs. pag. 489. Carduus vulgarissimus

viarum, Onopyxos nomen & descriptio non male conueniunt Carduo syluestris, figura non item, quæ Carlinæ syluestris.

An Gesn. de coll. stirp. Carduus asininus communis? Tabern. Icon. & Hist. Carduus lanceolatus Speerdistel. Thal. Carduus sylu. Dodonæi. Schwenckf. Carduus Silesiacus, & (vt Hort. Lust.) Carduus lanceolatus.

An Cæsalp. lib. 13. cap. 36. Carduus filu. alter? Montbelgardi abundat circa Castri horreum, & vrbis fossas intra & extra, florens Iulio, Augusto & Septembri, inter alios syluestris Carduos paulò tardius florere videtur. Basileæ etiam obseruauit frater C. Bauhinus.

Card. Vul-
gariss. Sin-
rum Lob.
Lob. nora-
tur.
An Card.
communis
asin Gesn.
Card Lan-
ceolatus Tab.
An Card.
filu alter
Cæsalp.
Locus &
Tempus.

CARDVVS LANCEOLATVS ferocior.




Calidarum hic regionum est, Galliz Narbonensis & cōsimilium. Folia eā spā ferè diuisa, quā lanceolatus nobis idēus, sed multò rigidior ac penitus aduersa parte, atq; per ambitum spinulis densè obsita. Auerā verò, quā neruosa, rigidus leu eo in tuncem spinam hirsutissimā, lanugine quadā

Locus
Descriptio

obsita sunt, sed mollia. Caulis etiam crassior est firmiorque sicut Cardui capite tomentoso. At quæ in summo sunt capita, terna plerumque, quæ & ipsa Lanceolati capitibus maiora sunt, minora quàm in prædicto tomentoso capite, ita spinarum obseptu horrent, vt totò eas ac temerè contrectare non sit. Lutea habuimus.

CARDVVS LANCEOLATVS PARVVS.



Carduus parvus purpureus mihi datus à Domino Agerio 1606. accedit Carduo lanceolato ferociori, sed omnibus partibus minor si spectatum singulas eius particulas perpendas, non tamen ita ferrox.

Descriptio

Card filu.
1. Dod lat.

CARDVVS

CARDVVS CAULE CRISPO.

Descriptio



AD cubitū & sesquicubitum & altius allurgit, caule digitali, tubuloso, viridante, membranis laciniatis spinosis, crispo implexu undulatis, per longitudinem adnatis donato fistuloso, multis alis concavo: folia sinuata dodrantalia aut minora; acutiuscula, hispida, aculeis mordacibus crebris purgentia,

flore si mul aliquot iunguntur, laxeæ nigrae vulgaris ex staminibus purpureis conflatæ, qui in pappos abeunt, quibus capitulum Anellanz magnitudine subest, spinis mollioribus obsitum: radix sesquipalmari longitudine creberrimis fibris capillata. H. Lugd. p. 1473. πολυάκανθος Theophrasti, quod ex eo Plinius in spinosis stirpibus recensuit, ac Theodorus Aculeosam Latine dixit, à spinarum infinito serè numero, quod nullum sit Cardui genus pluribus magisque confertis aculeis contextum & armatum.

Polyacantha
Theoph. H.
Lugd.

Card. silv.
3. Dod.
Card. asinus
An Aculeosa
Gaza
Lobelia?

Dodon. gall. Cardui silvestris tertium genus fecit sine iconæ, negavitque esse Scolymum, sed vocari posse Carduum asinum concessit.

An est Lob. in Aduers. Aculeosa illa Gaza, de qua dubitat an sit Polyacantha Theophrasti? An Anguill. epist. 8. Aculeosa quæ Theophrasto vocatur πολυάκανθος?

An Geln. de coll. stirp. p. 66. Carduus asinus quidam procerus in siluis angustioribus foliis?

Tabern. Hist. & Icon. Flein wegdistel/ Polyacantha Theophrasti.

Carduus caule crispo non solum provenit ad altitudinem trium aut quatuor pedum: sed etiam hominis staturam interdum excedit, si solum nascitur commodum. Abundat circa Castrum & in Horto E. C. ac aliis in locis semine maturo in fine Iunii. Sed & inibi Carduum caule crispo observavi flore albo.



& Lat. in fol. An Card.
per Carduum
silvestrem al-
terum intelli-
gat Carduum
nostrum re-
pentem? des-
criptio conue-
niet, si addi-
disset radicem
reperere, quod
fortè non ob-
servavit. Figu-
ra in Hist. Lat.
in fol. pro Car-
duo sylvestri
altero posita
pag. 727. est al-
terius plantæ,
nempe Carli-
næ silvestris,
cuius loco ma-
le posita est pag. 716. pro Carlina silvestri, Car-
duus silv. alter.

Figura
Dod. lat. est
transposita.

le posita est pag. 716. pro Carlina silvestri, Carduus silv. alter.

An H. Lugd. pag. 1471. & 1472. Onopryxus alter.

An Spina Ceanotus Theoph. Anguillare & Lobelia?

An Onopry-
xus alter
H. Lugd.
Card. ar-
vensis Geln.

Geln. coll. stirp. fol. 66. Carduus arvensis, Haber distel. Eidem hort. Carduus arvensis maior purpureo flore, qui flore nondum nato, mol-
chum olebat Carduus arvensis.

Tragus hanc inscripsit Carduum silvestrem, ac inter fruges, potissimum verdè avenam enalci scribit, ac dicit. Ex Carduis silvestribus alii proceritatem viri attingunt, quidam humiliore statu contenti sunt, in uniuersum tamen omnes aculeatis, & dissectis foliis caulem ambientibus præditi, nec non capitulis [quorum alia rufos, alia candidos, nonnulla roseos gerunt flores, cetera Carduo puellarum, consimiles] in vertice spinosis emicantes. Eorum semina oblonga apparent, punicea serè coloris, læuia, ac Carduo Maris magis exigua. Uniuersa Carduorum iam descripto-
rum genera, quæ agricolis & messoribus subinde impedimento sunt, nos vitia frugum, seu Carduos silvestres esse iudicamus, de quibus Vergilius in hunc modum.

Card. silv.
Virgil.

Carduus & spinis surgit Paliurus acutis.

Germani Haber/oder feld distel vocant. Thallio Carduus auenarius, seu silvestris Tragi. Tabern. Icon. & Hist. Carduus arvensis, Ader distel. Hort. Lus. Carduus arvensis, Carduus auenarius, Carduus silv. Tragi.

An Schvvenck. Carduus arvensis seu Auena-
ritus Thalli, Carduus segetalis, Aculeosa Gazæ Aduers.

In agris passim abundat & vineis, vt & in Horto E. C. & aliis multis, in vrbe & extra. In multis locis Germaniæ & Galliæ etiam observavi, florentem Iulio & Augusto.

Locus &
tempus

CARDVVS SERPENS LÆVICAULIS.

Descriptio

AD sesquicubitum & altius excrefcit caule tenui, singulari, læui, striato, rubenti, cui folia alternatim adnascuntur Cardui caule crispo mihi dicti, modò tomentosa, modò glabra, modò angusta, modò latiuscula, minus profundè laciniata: scapus in aliquot furculos diuiditur, quibus insident echini plures, oblongi, parum admodum aut nequaquam mordaces, squammati, purpurascens, odorati, ex quibus emicant flores staminei carulei, interdum albi: radix longè latèque sub terra serpit, tenuis, subinde nigricans, odore satis graui. Ea autem minus benè picta, sicuti & flores, in figura nostra ex Fuchianis.

Considerandum an Dodon. Gall. lib. 4. cap. 73. Tom. III.

CARDVVS CHONDRYLLOIDES

Dalechampij.

Carduus Chondrylloides Dalechampij ita Descriptus
Cognominatus, quod foliis Chondryllam secundam valdè imitetur. Crescit in asperis & saxosis, radice dodrantali, lignosa, dura, candida, obliqua, tenuissimis villis capillans: foliis proximè radicem multis, laciniatis, & circumrosis Chondryllæ modo, brevibus, aculeatis, in superiore caule paucis,

H 2

qui pedalis est, in ramos ferè duos tantum diffusus, teres, angulosus, in cuius cacumine capitulum nullum, sed eius vice corticosus vertex, ut in Borragine circinatus, velut in radios dispersitus: flos aureus, in pappos evanescens: Quod itaque Scolymo proprium esse vult Theophrastus, ut spinoso capitulo, quod Acanum vocat, is careat, id & huic Carduo commune est præter aliorum Carduorum naturam.

CARDVVS ARÆOPHYLLOS

Dalechampi.

Descriptio.



Carduus Aræophyllos Dalechampi ita dictus, quod *caulis* qui angulosus est, raris foliis vestitur. Hæc ex intervallis singula longiuscula, angusta, oleæ similia, paucis & mollibus spinulis aspera prodeunt in caule terete, pedem alto, in cuius summo quatuor, aut quinque conspicias capitula, subalbidâ, minimè aculeata,

sed laminularum positu, ordinibus & scansili in æquilatate lenissimè tantum atrectantium manus scabentia: flos purpureus est: semen paruum, oblongum, inter omnia Carduorum genera mollissimâ & longissimâ lanugine reconditum.

Dolendum Dalechampium non addidisse locum ubi hunc & præcedentem Carduum observauerit.

DE CHAMÆLEONE ALBO

Veterum CAP. VIII.

DE Chamæleone Veterum dicturis exordium petere liceat ab albo, huncque à nigro separare conveniat. Vires siquidem radicem, auctore Theophrasto, inter se distant, & ipsæ radices inter se specie differunt. Ita namque de albo Chamæleonte, quam Theodorus Vernilaginem vocat, inquit: radice distat à nigra: candida enim est, dulcis, crassa, & graviter olens, utilis traditur ad alui profusa decocta: dissecta Raphani modo digeritur in taleolas, & iunco transfigitur: valet & ad interaneorum animalia lata, acetabuli mensura in vino austero pota, sed præsumptâ vultu palatâ: occidit & canes & lues: Canes quidem subacta in farina hordacea, cum aqua & oleo: lues autem cum Brassica: & si hominem ægrotantem expetiri volueris an vivere possit, laundum eâ radice triduo iubens: hoc enim si toleraverit, moriturum nequaquam existimant: nascitur æquè omnibus locis folio Scolymi, verum ampliore, & terræ proximo: capite magno Acano simili: vnde quidam Acaum eum vocarunt. Alibi Ixiam

vocat, quæ in Creta habere lacrymam dicitur, alia autem apud eundem est Ixine: nam in eodem capite utriusque meminit, tanquam diuersarum. Alia quoque intelligitur apud eundem nomine Chamæleontis seu vernilaginis: folio scilicet non aculeato, ut in Carduo satiuo diximus.

Chamæleonem album idem Ixiam appellarunt, ait Dioscorides, quod quibusdam in locis viscum ad ipsius radices inueniatur, quo etiam pro Mastiche vtuntur mulieres. Folia habet Silybo aut Carduo similia, sed Chamæleonis nigri foliis asperiora [περὶ τὰ πρὸς αὐτὸν]. Sic Orbasius, Plinius, itemque Serapio: at codex Aldinus habet *μεγίστη*, hoc est, crassiora, acutiora atque validiora. *Caulem* non promit: verum ex medio spinam echino marino aut Cinaræ similè erigit: flores verdè emittit purpurascentes, capillorum figura, qui in pappos evanescunt: semen Conci simile: radicem in latis quidem collibus crassam, in montosis verdè graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, odore graui, dulcem. Hæc pota acetabuli [uterque Goupili codex *medicæ*] mensura, lantum ventris lumbricum pellit. Sumitur verdè in vino austero cum origani decocto. Hydropicis quoque commodè drachma in vino datur: etenim eos extenuat. Ipsius quoque decoctum contra difficultatem vrinæ bibitur. Aduersatur & in vino pota virulentarum bestiarum venenis. Canes autem, suæque ac mures occidit, subacta cum polenta, aquaque & oleo diluta.

Chamæleonem, inquit Plinius, aliqui Ixiam vocant: duo genera eius: Candidiora superiora folia habet, serpit in terra, echini modo spinas erigens, radice dulci, odore grani. Quibusdam in locis viscum gignit album sub alis foliorum, maxime circa canis ortum, quomodo thura nasci dicuntur, vnde & Ixias appellatur. Hoc ut mastiche vtuntur mulieres. Quare ut Chamæleon vocetur, varietate foliorum euenit. Mutat enim cum terra colores, hic niger, illic viridis, aliubi cyaneus, aliubi croceus, atque alijs coloribus. Ex his candidus hydropicos sanat succo radices decoctæ, bibitur drachma in passo. Pellit & interaneorum animalia, acetabuli mensura succi eiusdem, in vino austero, cum origani scopis [decoctis]. Facit ad difficultatem vrinæ. Hic succus occidit canes suæque in polenta, addita aqua & oleo. Contrahit in se mures ac necat, nisi protinus aquam sorbeant.

Galenus albi Chamæleonis radicem ad lumbricum latum dari scribit, acetabuli mensura, cum vino austero, exhiberi ipsam & hydropicis, & similem esse temperamento nigri radici, præterquam quod amarior quàm illa sit.

Ixias [ἰξία, seu ἰξία] appellatio autem non huic albo Chamæleoni tantum sed & nigro iccirco rectè tribuitur, quod utriusque radicibus gummi quoddam ἰξία visci æmulum a nascatur. Sic enim Plinius de Chamæleone in vniuersum, lib. 22. c. 18. Chamæleonem, inquit, aliqui Ixiam vocant: ac paulò post, nigri Chamæleonis (quod quibusdam ἰξία & ἰξία vocari scribit) radices tradit viscum ferè vlcibus utilissimum. Hesi-chius: ἰξία, ἡ τοῦ τοῦ ἰξία χαμαλέονος. Galenus verdè in lexico vocem Hipp ἰξία interpretatur, ἡ τοῦ τοῦ χαμαλέονος. Reperiuntur tamen nonnulli, in quibus sunt Cordus, Ruelhus & Goræus, qui nomen hoc ad nigri Chamæleonis radicem contrahant, existimantque ἰξία radicem esse nigri Chamæleonis, non quidem cuiusvis, sed eius tantum qui viscum profundit: quod locis tantum

Ixia cordi-
bus Diosc.Diosc. illi-
stratur Ga-
rio

Vires

Genera duo
Plinio Cha-
mal. candidior.Chamæleon
cur datur.Plin. l. 22. c. 18.
distudat.Chamæleon
alb. GaleniIxias appel-
latur Gario.

Ixias Hesychio.

Ixias radice
nigri ChamæleonisChamæleon
alb Theoph.
Vernilago
Gario.An homo sit
miser.

Acanum.

Ixia.

tantum quibusdam & statis anni temporibus euenire ailerunt : de quibus fuis & doctè Sarracenus.

*Appellatio-
ni nota.* Chamæleonem album sunt qui Herysicep-
trum, qui Ixiam vocent, inquit Marcellus, Egyp-
ti Ephet, siue Ephtholechim, Romani Carduum
minorem appellant. Descripsit Plinius herbam,
facileque est legentibus nouisse, ab animalium
genere, Chamæleone lacerta Crocodilo minori,
per terram serpente, herbam humi repentem, vn-
dique spinis & aculeis fertilem, nomen traxisse.
Id autem non totius, aut partium quarundam
figura & species fecit, sed mutationis colorum
euentus. Vt enim animal subinde & oculis, &
cauda, & toto corpore colorem mutat, redditque
semper quemcumque præter rubrum & candi-
dum (& si discrepent in hoc antiqui scriptores:
exapiuntque aliqui candidum tantum,) eodem
modo & herba cum terra colores mutat: hic ni-
gra: illic viridis: alibi crocea: atque aliis colori-
bus. Nec alia nominis huius in herba quam à co-
loris mutatione quam similem communemque
cum eo animali habet ratio in græca appellatio-
ne est. Alioquin in censu Carduorum vterque
Chamæleon est, candidus sc. & niger. Dico autem
Carduos nunc spinosum omne illud genus: quod
siue altius à terra erigatur, siue humilids serpat,
siue his aut illis, hæcve parte ancilla aculeatum
sit, spinosum florem aliquem profert, in quo lanis
& pappis lemina inuoluuntur. Neque enim diffi-
cile diligenter pingua inculta loca, præsertim-
que rudera mensibus Maio & Iunio obseruantibus
vtrumque hoc genus & eorum discrimina
obseruasse: præcipueque ex floribus: qui ex la-
uore veluti pyxide in altero purpurei prodeunt:
in altero quo mox colore describentur, &c.

*Discrimen
Chamæle-
onis ab al-
bis & ni-
gris
March, re-
preh.* Miror Matthiolum inquit Guiland. in Theo-
ne, quando ipsum in explicandis Ixia & Chamæ-
leonte albo nigroque scdè aded hallucinatum
esse video, vt nihil possit dici turpius. Itane illi
Dioscorides, quem explanare conatur, lectus est,
vt Ixiam, quam auctor ille libro sexto inter vene-
na connumerat, non albi Chamæleontis gummi,
quod ipse falsò statuit, sed plantam per se ab v-
troque Chamæleonte discretam ignoraret: De-
bebat cum profectò eius rei Theophrastus ad-
monuisse, qui tres esse plantas, Ixiam, Chamæ-
leontem album, nigramque prodidit, vt interim
Dioscoridem silentio præteream, qui eodem li-
bro, cuius proximè mentionem fecit, Ixiam &
Chamæleontem inter pestiferas & lethales radi-
ces connumerauit. Si itaque Ixia, Dioscoridis te-
stimonio, planta sui generis est, à Chamæleonte
differens, nequaquam albi Chamæleontis vis-
cum, ea esse Ixia poterit, quam idem auctor inter
exiosa pharmaca reponit. Eludet fortassis ille
nodum hunc, Ixiam Dioscoridem Chamæleon-
tem candidum appellasse inquiens, Chamæleon-
tis autem nomine absolute posito nigrum intel-
lexisse. Sed caueat quæso, ne se in grauius multò
priori periculum præcipitet, quando auctores
habeo non vulgares, qui Ixiam, quatenus vene-
num est, ab albo Chamæleonte separant: quan-
quam licet Chamæleontis etiam nomine, nigrum
intelligat, errat nihilominus, quòd atrum Cha-
mæleontem à Dioscoride inter venena referti
negat. Hæc si diu annuoso quidem, seni, sed
herbarum nobilis scientiæ rudi, obseruata fuis-
sent, nunquam *ixiam* & *ixiar* apud Theophrastum,
quæ voces Gaza nullo discrimine, Carduum pi-
neam malè reddidit, quod item interpretes ille A-

Tom. III.

nazarbe celebris hætenus ignorauit [qui enim
scire potuit, cum Theophrastum græcè nunquam
legerit, nec si legere velit, possit:] ad Scolymi ge-
nera reieisset. Sed tempero mihi æquè in his
atque in cæteris nazis suis latè explicandis,
quando cursim tantum ista noto, iustum aliquan-
do de omnibus volumen conscripturus: etsi ve-
hementer interim doleo, mihi cum tam indocto
impudentique homine, cuiusmodi ipse est nego-
tium intercedere. Sed omnis fortuna ferenda est.
Herculi quoque procaces mulierculas alapas
impegisse legimus. Sic ille sanè edentulus senex,
iuuenem quinque & viginti annos natu n impe-
ritæ accuset, modò ipsemet suam toti orbi insci-
tiam declarat patefaciatque.

Plura qui volet circa ea quæ tum obscura tum
controuersa sunt in Ixia & Chamæleonis tum
albi tum nigri historia, consulat Marcellum,
Guilandinum & Sarracenum, nec non etiam
Gesnerum.

CHAMÆLEON NIGER

Veterum. CAP. IX.

DE hoc Theophrastus ita scriptum reliquit.
Nigro Chamæleoni solum inest albo si-
mile, specie Scolymi, sed minus, & læuius: tota
autem herba umbraculi speciem repræsentat: ra-
dice crassa, & nigra extrinsecus, sub fulua intrin-
secus, nititur: loca gelida, humidaque amat: alii
codices habent non *gelida*, id est, humida: sed *gelida*:
id est, inculta: lepram & vitiliginem trita in ace-
to & ramenti illita expellit: nec non & canes
occidere potest: vtilis annis quadraginta: hæc
Theophrastus.

*Theoph. lei-
dio varia
Vires.*

A quo multa mutasse videtur Dioscorides,
cuius verba hæc sunt. Chamæleon niger [qui &
Pancarpon, Vlophonon [Buphonum legit Si-
pont.] Ixia, Cynomazum, Ocymastrum, Cnidium
granum, & Cynozolon inter Dioscoridis nothas
appellationes ab aliquibus vocatur, ab Ægyptiis
S. bel, à Romanis Carduus niger & Vernilagium
dicitur] & ipse *foliis* Scolymo [Carduo Corn.] si-
milis est: ipsa tamen habet minora, tenuioraque
[*λεπτότερα*. Restitueret Sarrac. ex Theophrasto
λεπτότερα, nisi vnus esset omnium exemplarium
consensus. Siquidem Theophr. loco modò cita-
to inquit, Nigro Chamæleo (Vernilaginem vertit
Gaza) folio est Scolymi, at minore læuioræque] ac
rubro distincta. *Canlem* verò producit digitali
crassitudine, dodrantalem, ac subrubrum: qui
quidem umbellam gent [*ἡ χοι σπινάδα*: fortè
ἡ χοι legendum, vt ad Chamæleonem referatur:
vel *ἡ χοιτα*, vt ad proximè præcedentem vocem
καύλον. Porro aliud quàm quod signant hoc loco
verba Dioscoridis, voluit Theophrastus, nimi-
rum totam stirpem umbraculi speciem repræsen-
tare] floresque spinosos, tenues, Hyacinthi zmu-
los, & versiculosos. Radix trita, additis atramenti
sutorii exiguo, cedrino oleo, & axungia, psoras
tollendi vi pollet. Eadem vnà cum sulphure ac
bitumine in aceto decocta inunctaque, lichenas
absterget. Eius autem decoctum collutione den-
tium dolores mitigat. Sed & cum pari Pipere &
Cera oblita radix, dentium doloribus auxiliatur.
Fouentur & eà dentes in aceto decocta & affu-
sa. Dolentem quoque dentem comminuit, si per
stylum calida illi adhibeatur. Maculas verò de-
purgat à Sole contractas, & vitilignes cum sul-
phure emendat: lepræ medicamentis admisce-

*Ex Diosc.
Pancarpon.
Vlophonon
Cynomazum
Ocymastrum
Cnidium
granum
Cynozolon:
Card niger
Vernilagium
Diosc. lectio*

*Diosc. illa:
straw.*

Vires.

tur, ac denique imposita, phagedænica efferatq; vlcera sanat & extirpat. Cæterum vt vocetur Chamæleo foliorum varietate cuenit. Nam pro locorum differentiis, hic intensè viridia, illic albicantia, aliubi cyanea, aliubi denique rubra [Addit Oribaf. ἡ μίπα, nonnunquam rufa] reperiuntur.

*Ictio Ori-
basia.*

*Chamæleo-
nis sexus
Plinio,
Vires*

Ex nigris, inquit, Plinius, aliqui marem dixere, cui flos purpureus esset, sceminam cui violaceus: Vno nascuntur caule cubitali, crassitudine digitali: Radicibus earum lichenes curantur, cum sulphure & bitumine vnà coctis. Commanducatis verò dentes mobiles, aut in aceto decoctis. Ferunt & hoc viscum vlcibus vtilissimum. Omnium autem generum earum radices scorpionibus aduersantur.

*Chamæleon
niger Gale-
no.*

Galenus de Chamæleonis nigri radice sic scribit. Habet quid venenosum. Quare extrinsecus vñs eius competit ad scabiem, impetiginem, vitiliginem, & omnino quæcunque extersione opus habent. Miscetur etiam mollientibus ac discutiendis medicamentis. Et phagedænica vlcera sanat imposita. Est enim sicca ordine tertio, calida secundo completo.

*Ixia vox G-
vtrique Cha-
mæleonem cō-
munes
Error quo-
rundam.*

Multa superiori capite, quæ ad Chamæleonem nigrum pertinent, adduximus, hic tamen rursus de eo admonendum duxi, quod communis vtrique Chamæleoni Ixiæ vox & appellatio est: falsò tamen & sine causa: quum albo tantum adnascatur viscum, vnde ea facta est, illiusque propria, cæteras [appellationes] nigro relinquit. Dioscorides etià ad albi tantum radices refert quod Plinius ait: Ferunt & hæc Viscum vlcibus vtilissimum. Theophrastus de Ixia loquens, quam Chamæleonem non nominat: sicut neque in libri progressu, de Chamæleone vtroque agens, Ixiæ appellationis meminit. Quare etiam si vterque Chamæleo viscum producat, & inde Ixiæ appelletur: tamen aliud esse videtur medicamentum Theophrasto Ixia appellatum, quæ à Diosc. inter radices venenatas recensetur, & à Paulo. Aëtius tres diuersas radices facit, qui lib. 13. cap. 71. de Ixia agit, & mox sequenti capite de Chamæleone nigro & albo, qui priuatim strangulationem inducit. Est igitur Ixiæ radix peculiaris ab vtroque Chamæleone diuersa, & tamen fortassis id nigri Chamæleonis genus, quod Plinius à quibusdam Vlophonon vocari dicit: quæ appellatio etiam in supposititiis Chamæleoni nigro apud Diosc. attribuitur. Et ab eodem Diosc. Pauloque ac Aëtio, etiam Ixiæ ascribitur. Et propterea etiam Nicander Vlophonum ixionem, id est, viscosum appellauit in Alexipharmacis:

*Ixia radix
peculiaris.*

*Blattæ ma-
le interpr.
Nicander.*

Nec hic fides habenda est, authore Cornario, interpreti eius qui Ixiam genus blattæ esse dicit, quoddam colore nigrum, odore verò in potu, Ocimi semini simile: quum Diosc. Paulus & Aëtius, palam inter radices recenseant. Plinius quod Ixiam ab Ixo, id est, visco nominatam videret, vbiq; pro Ixia venenosa radice, viscum reddidit. Quod etiam si tolerari ac excusari possit, tamen *ἐπιφθόρον*, ad viscum arborescens & aucupis inferuentem, vitio non caret. De his & huius generis similibus plura apud Marcellum & Leonicenum habentur.

*Æquiuoca
Chamæleon
albus & niger
per
Spina alba
sylvæ Fuch-
sij.*

Cæterum Chamæleonis vox absolutè posita, album & nigrum, plantas viribus radicum diuersas, denotat. Chamæleonem album, quidam eū Carduum esse dicunt, qui à nobis spina alba syluestris Fuchsij inscribitur, & à Chamæleone differt, autoribus Euricio & Valerio Cordo. Inno-

tuit nostris regionibus, ait Tragus, Chamæleon niger verus. *Asl* fallitur Tragus. Est Echinopus de quo infra. Chamæleonē Eustachius Roesslin, Amatus & Brunfelsius, existimant Carduum Marianum, sed à Chamæleone differt, testibus Euricio & Valerio Cordo, & Apolline. Falluntur, inquit Matthiolus, qui putant stirpem illam Pteridici non absimilem, Italis *Carciso* appellatam [nos Scolymum syluestrem inscripsimus hoc libro,] aculeis horrentem, cuius flore coaguli vice vtuntur in Hetruria, esse Chamæleonem album.

Auicenna teu antè dictum idem de herba Mezereon scribit, quæ Chamælea Græcis, quod de Chamæleonte Dioscorides, vt linguarum imperiti sæpè vocabulorum similitudine decipiuntur. Confirmat hoc Gesnerus de Ouiparis, dicens: Arabes Chamæleonem & Chamelæam, quam & Mezereon vocant nulla ratione confundunt. De Chamælea dictum lib. 5. Chamæleonum generis esse dixerim Carlinam hodiè medicis appellatam, quasi Cardinam: Carduus enim humilis est, cuius iidem duæ vel tres differentiæ sunt. De his mox agemus. Meminit idem Gesnerus de quadrup. Ouip. in Gallia & alibi genus Cardui quoddam videre solus diuisis, albicantibus, amaris, non aculeatis, capitibus spinosis multis stellatum (vt ita dicam) aut muricum ferreorum instar radiatis, candidis, sed à Chamæleonte diuersum, vt indicat. Dicitur hæc à nobis Calcitrapa, siue Carduus stellatus, de quo paulò infra. Arnoldus de Villanova in breuiar. lib. 1. cap. 21. Florem Chamæleontis coaguli vñm præstare scribit. Atqui spina illa, cuius floribus multis Gallia locis hodiè ad lac coagulandum vtuntur spina alba Græcorum est, quod & Ruellio placuit. De Leucacantha, siue spina alba vide infra. Chamæleon est inter Diplaci nomenclaturas apud Dioscoridem, teste Gesnero. Tradetur hic paulò post. Perpendant lectores an Chamæleon Salmanticensis Clusij, sit Carduus Acarna Anguillæ, & an idem cum Picnocomo Lobelij. Eringio vulgari, potius quàm vlli plantæ fauere nomenclaturam Chamæleontis ait Lobelius. Carduum benedictum Syluius voluit Chamæleontis speciem, cuius iudicium non probandum. Iacea montana magno capite, est Chamæleon Theophrasti, differens à Chamæleonte Dioscoridis, vt vult Anguillara, qui sibi non notum ait. Malè Plantinus in Icon. Tom. 2. p. 2. Branchæ vsinæ spinosæ siue Acanthi aculeati iconem ponit, pro Chamæleonta Monspeliensium. In lacertarum genere Egyptus, Africa, & India Chamæleones passim & quotidie videt, hoc attestante Marcello. Cæterum de Chamæleonibus nobis dictis iam agemus. Inter hos autem primus sese offeret Chamæleon exiguus Tragi. Secundum locum dabimus Chamæleoni nigro Dioscoridis Maranthæ. Ab hinc sequetur Carlina caulifera vel Acaulos quæ à quamplurimis pro Chamæleone habetur. Quartus & postremus erit Chamæleo albus, à nobis inscriptus.

*Carlina x?
23.*

*Spina al-
ba.
Dipsacus.*

*An Car-
dus Acar-
na Anguil-
læ.
Eringium
vulgare.
Carduus
benedictus.
Iacea mon-
tana ma-
gno capite.
Brancha
spinosa.
Chamæleo-
nis lacerta.
Chamæleon
exiguus
Tragi.
Chamal.
niger Diosc.
Maranthæ.
Carlina
caulifera
vel Acaulos
Chamæleo
albus.*

CHAMÆLEON EXIGVVS TRAGI.

Chamæleon exiguus Trago dictus folia in orbem per terram spargit Carlinæ, profundè laciniata, hirsuta, atrouirentia, aculeis horrida: inter quæ aut nullo, aut breui cauli vñciali vel sesquiunciali hirsuto insidentia enascuntur capsula oblonga, in glandis formam, minora, quàm Carlinæ,

Descripti.



Chamel
exiguus Trag.
8.

linæ, squarrola, nec villis spinis armata, & quibus flores emicant purpurei: radix minimi digiti crassitudine, longa, fibris aliquot crassiusculis donata, oblique agitur, colote subrubente, præsertim intrinsecus, sapore aliquantulum aromatico.

Hunc Chamæleonem exiguum inscripsit

Tragus: in margine verò Chamæleonem secundum, seu album exiguum nominavit, dixitque: Alterum verò Chamæleonis genus ferè ubique locorum provenit, potissimum verò in asperis montibus, ac forti albaque terra: radices grauíssimi odoris. Augusto mense florem ostendunt in perfectione sua. Hic Chamæleo Ruellio opumè fuit notus, vulgarissimus incultis asperisque agris, maximè ædificato loco sitis. Hunc Suechaham Arabum [Auic. lib. 2. cap. 674. & Rhaf. & simpl. cap. 48] esse semper putavi. Pertinet verò ad Chamæleonta album Dioscoridis, quod descriptio testatur, quæ huic ita convenit, ut nulla nota reclamare videatur, quod Ruell. lib. 3. cap. 8. diligenter observavit.

Suechah
Arabum.

Chamel.
albus Diosc.

Dod. gall.
an Carlina
arabica.

An Dodon. gall. Chamæleontem hunc Ruellij non confundat cum Carlina sine caule [quam spinam Arabicam inscribit] iudicent alij.

Lonic. figuram Tragi habet sub hac titulo, Klein oder weis Eberwurcz/Chamæleon exiguus siue albus.

Ryffio in Dioscor. dicitur Chamæleon albus, vulgò wegdistel & nider distel / ac si Carduum viarum & Carduum humilem dicat.

Card. Si-
rum, siue
humile.

Card. a-
caulis Sep-
tentrionalium
Lib. meta-
ror.

An Cro-
codilum Cor-
di.

Carlina
minor Cla-
ss.

Lobelio in Obs. pag. 480. Leon. plant. Tom. 2. pag. 5. Carduus acaulis Septentrionalium, Chamæleon albus Cordi, Chamæleon exiguus Tragi. Apud Cordum hoc nondum admodum, licet hoc ipsum in Hist. Lugd. Dalechampius de Chamæleone exiguo Tragi statuatur. Existimo potius esse eius in Dioscor. lib. 3. cap. 12. Crocodilum, quod Germ. wild Eberwurcz vocant.

Clusio est Carlina minor, tam in Pann. p. 667. [ubi tamen eius iconem non dat] quam in Hist. post. lib. 5. pag. 156. ubi icon, Carlina minor purpureo flore inscribitur, & ex quorundam opinione non dissimilis esse iudicatur Chamæleoni Theophrasti, cuius meminit lib. Hist. plant. 6. cap. 3.

Coronilla
fratrum Mo-
nachorum
in Mes.
Class. reser-
vatur.

Monachorum Cardui genus Corona fratrum [quia caput magnum stat tanquam Pater, Caputula verò tanquam Filius eius, & Fratres in modum Coronæ itant, circumlætes ipsum Patrem] dictum suspicor, licet Clusius, cuius iudicium magni facio circa stupes, Coronam fratrum ad Carduum capite composito mihi dictum, referre videatur: sed Clusio descriptio Monachorum in Mel. dist. text. censur. 139. manifestè contradicit.

Carduus radice perenni, qui solet locis petrosissimis provenire, Genevæ à me observatus. Item Montbelgardi propè pontem Vauvaucourt, ac S. Hippolytum in descensu à Blamontio inter Vaulule & Chastillon inter montium conualles, florens Septembri. Montbelgardi ad Vites florens Iulio & Augusto. Angliæ collibus, Picardiz, Gallobelgicorum marginibus obuius & frequens. Crescit in Panthoniæ montibus, frequens in siccioribus pratis, etiam in acclivitatibus herbidorum collum.

CHAMÆLEON NIGER DIOSCOR.

Marantha.



Chamæleo- Descriptio
Cui vero nigro est umbella spinosa tam grata alpe cum floret, ut nihil pulchrius videri possit: est enim umbella loculis, siue siliquis oblongis densissimis acutarum spinarum circumseptis plena, in quibus flores purpurei, oblongi, intus candidi, tenues, Hyacinthi æmuli supereminent: sed illa siliqua

spinosa semen occludit Cnicus simile, adhuc vigentibus in ea floribus, quod tandem illis decidentibus maturescit: folia vario colore maculis inspersa: caulem habet purpureum, dodecantalititudine, radicem sulcam foris antea raditis Aristol. longæ colore, atque inter mille vix vix aut alteram vidimus, quæ non sit carnosa, quamquam Diosc. interdum exeam esse tradit, acerrimi gustus est, sed commanducari oportet.

Huic Chamæleoni (inquit Marantha descriptio- tionis autor, lib. 2. Meth. cognosc. simpl. cap. 7.) omnes notæ pulchrè respondent, quas ei Diosc. assignat, præsertimque umbella spinosa. Appellatur hæc planta à Theophr. lib. 9. cap. 13. Chamæleo niger, Vernilago nigra, ut vertit Gaza, & non acceptatis nominibus Vlophonon & Cynoxilon, & Cynoxilon: Plinius hæc nomina exponens, inquit ita appellari propter gravitatem odoris.

Synonyma

Castori dicitur Chamæleon niger Dioscoridis. Bellon. verò Obs. lib. 1. cap. 19. & 25. videtur Gallos & Germanos Medicos frustra laborasse in depingendo Chamæleone, tam nigro hoc, quam albo.

Chamel.
niger Theo-
phr.
Vernilago
nigra.

Anguill. epist. 8. Cardacelli, & Cardoncelli, planta in Apulia reperta, cuius descriptio Chamæleoni nigro Dioscoridis omninò convenit. Chamæleonem nigrum Antiquorum eum esse, minimè asserere dubitat Sarracenus, quem & ipse Marantha pro Chamæleone nigro agnoscit.

Chamel.
niger Diosc.
Castori.

Cardacelli
Anguill.

Matth. in Diosc. cum mag. fig. lat. & Ital. ait se

non habere, cur Chamæleonem nigrum à Marantha Neapoli transmissum, Chamæleonem nigrum legitimum esse affirmet. Hæc, inquit, tametsi umbellas Hyacinthinis floribus scatentes proferat, cum tamen folia rubris maculis varia non sint, in caule nulla prorsus rubedo spectetur, mansa radix acedinis tantillum haud respiciat, exesa non sit, non flavescat, nec caules digitali crassitudine videantur, cur legitimum Chamæleonem nigrum hanc plantam esse affirmem non habeo. Sed de his diffusius libro quarto nostrarum Epistolarum disseruimus, ad Marantham respondentes. Hæc Matthioli, qui Chamæleonem hunc, Chamæleonem nigrum inscribit, ac merito sententiam suam iis censendam relinquit, qui rei plantarum maiorem, quam ille peritiam habent.

Camer. in Hist. Math. Germ. & Epit. cum pro Chamæleone nigro pingit, virelque ex Veteribus unâ cum descriptione attribuit, cum his nominibus. Chamæleon niger, dicitur Græcis *Kamailion mias*, Arab. Chamaleon melanos, It. Chamæleon nero, Germ. Schwarz Ebertwurz, H. sp. Cardo pinto: Gall. *cardanne*, Boh. *Pupauma carna*. Meo quidem iudicio vires huius à veteribus traditas Chamæleoni nigro rectè adscribit. At nomina non continent. Is enim his nominibus Carlinam tradit. Huius iconem exhibet H. Lugd. pag. 1454. pro Chamæleone nigro Matthioli ac Fuchij. Sed huius titulus non convenit, dicendū erat Chamæleon niger alter Matthioli. Sequitur errorem Typographi in Matthioli compo-
sitione, ubi figure transposuit, ut etiam sub Carlinâ dicitur. Sed huius & alteram figuram habet pag. 1455. pro Chamæleone nigro vero Dalechampij.

C. Bauh. apud Matth. dicitur Chamæleon niger alter Matthioli.


Maranthæ & Anguillæ depictus Chamæleon (inquit Lobel. in Adn.) videtur aut verum esse Crocodylium, aut certè Germanici opinionem sustinere posse. Obseru. pag. 480. & Icon. Plant. Tom. 2. p. 5. Chamæleo niger.

In Apuliz finitimis ac multis aliis locis, in campis & siccis locis Chamæleonem suum nigrum, maximâ vbertate prouenientem sapius collegit Marantha. Bellon. Obs. audet affirmare. Chamæleonem nigrum neque in Germania, neque in Gallia, neque in Italia sed in Lemno nasci: nam præterquam quod stirpes per Italiam perquisiverit, sibi etiam fidem facere Aloisium horti Patanini præfectum: qui asserat, utrumque se cõquisivisse, sed nondum isthic reperisse. Ast dicat quicquid velit Bellonius, ego Chamæleonem nigrum Maranthæ vidi apud Clariss. Virum D. D. Felicem Platerum, nomine Carlinæ ex monte Fracto. Ante paucos annos reperta est planta hæc (inquit Anguill.) quæ satis frequens occurrit iuxta oppidum Sebeniacum di Sebenitz Sclauoniz, non longè à mari distitum. Satis etiam frequens est in Samnio tra il Castello Zare.

Cum Chamæleonis nigri radices apud pagum quendam in insula Lemno, Liuaдохorio nuncupatum erui curarem (verba sunt Bellonij,) plurimi Græci & Turci spectâ um venerat quid ageremus: eas verò fruticulatim sectas filo traieciamus, ut facilius exsiccari possent: Turci in eo negotio occupatos nos videntes, similiter radices tractare & secare voluerunt: at cum summus esset æstus, & omnes sudore maderent, quicunque eam radicem manibus tractauerant, sudoremque abstergerat, aut faciem digitis scalpe-

rant, tantam pruriginem ijs locis quos attigerant postea senserunt, ut aduri viderentur: Chamæleonis enim nigri radix eâ virtute pollet, vicuti applicata ipsam aded inflammet, ut nec squillæ, nec Vrticæ vllæ centesimâ parte ita adurant: prurigo tamen non aded celeriter sese prodit. Post unam aut alteram portò horam, singuli variis faciei locis cutem inflammatam habere cepimus, ut tota sanguinea videretur; atque quod magis eâ cor fricabamus, tantò maior excitabatur prurigo. Fonti assidetes sub Platano, pro ludo habuimus initio, & risu: at illi plurimum indignati sunt: & nisi asseuerassemus nos nunquâ expertos tali virtute eam plantam pollere, haud dubiè malè nos mulcassent. Attamè nostra excusatio fuit ab illis facilius accepta, cum eodem incommodo nos affectos conspicerent, Mirum sanè, tantillæ radici ingentem efficaciam nostro malo expertos esse. Et ex his apparet, quod ex instituto mulierculæ apud Marantham faciant, quæ radici succo pedicines inficiunt ad puerorum pediculos enecandos. Quod prætegea Dioscorides, dixit Chamæleonis nigri radicem commanducatam mordere, non semel expertus est Marantha, licet ea in primo statim gustus occurru nullam ostenderit acrimoniam.

CARLINA CAVLIFERA VEL Acaulos.



Carlina *caulifera*, cuius præcipua est commendatio, longè latèque vagatur, profundèque intra terram agitur, crassitudine pollicari plûs minus, superficie veluti corrofa & foraminulenta, coloris foris ruffo, intus candido, sapore aromatico, nonnulli graui: antequam verò è terra emergat, in capita aliquot ut plurimum facies.

fit, ex quorum singulis separatim folia in orbem supra oriuntur, palmum vnum aut duos longa, vnciam vnam aut alteram lata, profundis ad costam vique incisuris diuisa, & veluti crispa, aculeis minacibus horrida, nonnihil tomentosa, viridantia; exceptâ pediculi infima parte atroturbente, in horum medio sessilis hæret echinus orbiculatus, spinosissimis folijs vndique oblitus, è cuius umbilico flores emicant staminei, purpurascetes, vallo foliorum argenteorum cincti: semen papposo tomèto innoluit, oblongū, hirsutū. Aliàs è singulis capitibus caulis surgit pedem altus, atroturbens, lanugine quadam donatus, non sine folijs alternatim positis, in cuius summo echinus nascitur floridus, ut iam dictum, folijs, qualia in caule & circa radices conspiciuntur, circumcirca stipatus.

Carlina

Chamæleon
niger. Matth.

Nomina
Matthioli
non conueniunt
Error H.
Lugd.

Chamæleon
niger alter
Matth. C. B.

Chamæleon
niger Lob.
Locus

Vires

Caulifera

Carlina
vulgo dicta
genera duo.

Carlina
Gugo dicta
genera duo.

Carlina huius distinctio nostra non latuit Clusium. Ita tamen que ait in Pann. p. 669. Crescunt in plenisque Pannonia montibus Carlina siue Chamæleonis vulgò nuncupati bina genera. i. Vnum flore amplo, albo: quod nonnunquam in pedalem caulem assurgit, interdum vero prorsus est exauert. Atque hanc etiam differentiam duplicem in Hist. post. lib. 5. p. 155. duplici expressit icones, quales Lobelius etiam habet, Vni titulus, Chamæleon albus Dioscoridis Theophrasti. Alteri Carlina elatior, Chamæleon albus vulgans.

Quia verò de hac Carlina auctores maxime dissentiunt, singulorum placita ordine, quoad fieri poterit, quam breuissimè enarrabimus.

Chamal al-
ba, est Car-
lina

Radix Ger-
mi.

Cardopati-
um nota-
cor.

Crocodil-

Carlina
Mauchis
Suehiana
Serap. sp.
na Arab.
Diosc.
Bedeguar
Serap.

Chamal.
ab Fuch.
Card. juu-
niat.
Cardopa-
tium cor-
rupte.
Pancration.

Carlina no-
ta Cham-
leon.

Toxites
in onom.

Non conuenit [in Hist. Corn. in Diosc.] herbanis & officinis de Chamæleonibus. Quodam Carlina dictam, Chamæleonis albi radicem esse volunt. Alii prius albi radicem [esse] Eberwurz vocant: posteriores nigri, Schuuarze Eberwurz, quali radicem verris albam & nigram. Alii album Chamæleonem, Viehdistel vocant: nigrum verò priuatum Eberwurz / eundemque Cardopatum, & Carduum suillum. Suspiciamus Cornatum non cognouisse discrimen inter duos Chamæleones quos nominat, is præterea videtur non benè Eberwurz distinguere à Carlina, cum de Crocodilio scribit: Quidam hanc wald distel, alii Schwarze garten distel vocant. Alii Carlina dictam, verum Crocodilum esse putant: siue à Carolo magno nomen id habet, cui ab angelo ad depellendam ab exercitu pestem ostensa fertur: siue Carlina quasi Cardina siue Carduina dicta est.

Carlina [aiunt Monachi in Mef. distinct. 6. cens. 189] duplex: vna quæ non eleuatur à terra & hæc est Suehiana Serapionis, & spina Arabica Dioscoridis. Altera quæ simillima, præterquam quod eleuatur à terra, haud dubiè est Serapionis Bedeguar siue Bedegar, siue Bedoar [hæc namque voces vnum & idem significant] quæ in nonnullis Italici locis magis quam altera, intelligitur pro Carlina.

Figuram habet Fuchsius Carlina cauliferæ satis laudabilem Hist. & Icon. pro Chamæleone albo, quem Carduum suarium & varium Latini, Officinis & Barbaris Cardopatum appellati tradit, ac de his vocibus ait. Cardopati nomen haud dubiè corruptum est, deductumque à dictione Pancration, nam sic olim esse nominatum Chamæleonem Apuleius testatur: aut à Carduo vario, à qua dictione, u, scilicet litera in p, & r in t, mutata, in Cardopatum facili est lapsus. Germanus Eberwurz / eleganti allusione ad Carduum suarium, nuncupatur, Gallis Carlina, ou Artichaut sauvage: Chamæleon autem à foliorum varietate dici cepit. Suarius autem Carduus dictus est, quod sues, si in potentia exhibeatur, perimat. Ob quam etiam causam [Eberwurz] germanis nuncupatam puto. In glabretis montium prouenit, & in siluis, ut hinc etiam siluaticus Carduus cognominatus sit. Chamæleonem esse Carlina negat Amatus in Dioscoridis lib. 3. cap. 8. Miror verò Lacunam in Dioscoridem lib. 3. cap. 8. eandem plantam, caule tantum variantem, facere lethalem & non lethalem.

Toxites in onom. philosoph. vir doctus (ut sibi met videtur) vana miscet nomina pag. 280. Acanth sc. Arabicam, Acanth Egyptiacam, Carlina nigram, Cardopati, & Eberwurz. Hoc chaos quomodo componendum ipse videtis.

Tom. III

Qui Chamæleon albus tam ab Hetruscis, quam cæteris serè Italici incolis vulgò Carlina vocatur, nunquam Fuchsius vidisse existimari (inquit Matth. in Diosc.) quod eum procero satis caule depingat. Hallucinantur Monachi cum sibi persuadeant, Carlina[m] (ut eorum viar distinctione) caulem proferentem, quam legitimum Chamæleonem nigrum Dioscor. semper existimamus eiusdem esse spinam albam quam Græci *καλαμίσκος λευκός* dicunt Mauchiani Bedeguar. Item Carlina[m] alteram, caule viduam esse spinam Arabicam ab Aphris Suehiana vocatam. Sunt qui velint Carlina[m] vitamque, nihil differre, nisi sexu, ac negant has plantas esse Chamæleones, illamque præsertim nigrum Chamæleonem esse nolunt, quæ caulem rutilum gerit, &c. An Galenus errarit dicendo radicem Chamæleonis aliquid lethale habere? Postea capite sequenti ait: Sunt qui volunt Carlina[m] vulgò dictam quæ caulem profert, legitimum Crocodilum esse. Sed eorum opinio mihi quidè nullo modo satisfacere potest: præsertim cum factio periculo us sanè viribus careat, quibus Crocodilum præstat scribunt: nempe quod radicis decoctum potum sanguis est per nates copiosum trahat. Adde quod Crocodilio radix sit longa, leuis, aliquantulum lata, & odore, ut Nasturtii, acuto. Illi verò Carlina[m] generi crasse, nigra densa, exesaque non autè lata, nec leuis, nec Nasturtii odorem spirans. Non placet Matthæi Carlina[m] genere facere duas plantas, ex aculi album, quem non describit, ex altero nigrum, quem ipse met fatetur, umbellam non ferre, quam Diosc. in nigro Chamæleone requirit, sed echinatum capitulum perinde ac albus Chamæleo, quod illud ipsum eum omnino à sua opinione dimouere debebat, & ad credendum inducere Carlina[m] caulem fundentem non esse Chamæleonem nigrum, sed eandem cum aculi. Et hinc manifestum est, eum Chamæleonem album & nigrum non leui errore in Hist. Camerarii germ. & Epit. ab inuicem separare, ac descriptiones & vires Chamæleonis albi ipsis ex Veteribus attributas adscribere. Cæterum de Chamæleone albo [aculi] inquit, vocatur Græcis *καλαμίσκος λευκός*, Mauchianis, Chamæleon lente, seu Chamalium, Ital. Carlina & Chamæleon bianca, Germ. Weiß Eberwurz / Hulp. Cardo pinto, Gall. Carlina siue Chamæleon blanc, Boh. Pupaiva bulá. Notandum apud Matthiolum errore Typographi figuram Chamæleonis nigri Matthioli esse sub titulo, Chamæleonis nigri alterius. Et hunc errorem commisit etiam Camer. in Matth. Epit. in qua eum à Chamæleonte albo non differre scribit, nisi quod in caulem crescat. Hunc lapsum animaduertit in Hist. eiusdem germ. ac titulum ei fecit. Carlina caulescens, quondam Chamæleon niger.

Carlina, inquit Camer. in horto, sessili flore *άκανθ*, & alia alioquin ab hac nihil diuersa. Nam plerumque si eo anno floruerit, quo in hortum transfertur, sine caule permanet, sin minus, multò latior altero anno assurgit & cauligera fit.

Matthiolum ut probet, ait Marantha, alteram Carlina[m] vulgò dictam, esse nigrum Chamæleonem Dioscoridis, quia eius facultas non est venenata, ut ex Galeno esse deberet, sed absque noxa deuorari solet, ad regionem confugit, in quibus in Græcia, & in Ponto fortasse talem plantam posse vim veneni fortis: sed fieri posse, ut in Italia sit salutaris: quemadmodum in Persea arbore, ac quibusdā aliis euenisse constat: verum acceptari quidem hæc posset, si hæc vna nota, ac

Chamæleo-
albus Mat-
thioli.
Fuch. nota
9. 10.

Monachi
hallucinam-
tur.
Chamal.
niger Liosc.

Crocodil-
um non est.

Matth. re-
arguitur.

Matth. lap-
sur.

Error alius

Carlina a-
canthos &
caulifera
Camer.

Matth. no-
tatur Car-
lina non est
Chamal.
niger cam-
era Matth.

non omnes ferè aliz dissentirent. Altera namque flores profert in capitulo, altera in umbella.

Aduersus Matthiol. & Fuchj. Carlinæ sp. xps.
Spinam albam (apud Apollinem Rad. i. in elect. Hamecha.) quidam contendunt Carlinam, id est Chamæleonem album, vel alteram caulem profertentem vocant nigrum Chamæleonem, quas alij sexu distinguunt, marem alterum, alterum feminam appellantes, folijs enim nullatenus penè differunt, at niger caule est dodrantem paulò altiore, non vacuo, floribus autem nullo pacto Hyacinthum æmulantur Matthioli, nec in omnibus Dioscoridis historiæ respondent. Hæc ille, varia aduersus Matthiolum & Fuchsum scribens, sed obcurè: Maracham etiam carpit ac Angullaram, varia dicens etiam obcurè de Ixia & Ixine (spina: Monachos aberrasse ait, qui hæc Spinam albam dixerint: Idem etiam ostendit Amatum existimare cauliculofam Carlinam esse Crocodilium, ac eam sententiam à Matthiolo oppugnari.

Chamal. Vulg. Trago Eryngium.
Ego, inquit Tragus, Chamæleonem vulgarem [Ebertwurz] Eryngij aut certe Chamæleonis nigri [quam Pancarpon aliqui, alij Viophonon, alij Ixiam, alij Cynomazon, alij Oxyroides, alij Cnidion Conon, alij Conoxilon, Latini Carduum nigrum aut Vernilaginem, Egyptij Sebel vocant.] genus existimo.

Cardopatiū Vulg. Carlina differ. Gess.
Gess. de hort. Carlina cum caule non videtur verus Chamæleon niger. Idem postea ait. Cardopatiū vulgò dicitur [vel Carlina] nonnullis herbanis, genus est Cardui Ebertwurz: eius differentia quædam sunt à magnitudine & floris colore, in alijs a bo, alijs purpureo. Item caule, quo aliz carent, aliz habent. Ex his Chamæleon albus videtur cui flos purpureus caulis nullus: Silybum verò cui lauior albiorque spina (sen flos spinosus) est: isque rursus vel cum caule vel sine caule. In Baldo monte Italiæ flore maximo pilei instar nasci audio. Ex eodem genere esse audio Ixinem spinam quæ Mastichen in radice fundat Hispanis cognita, Spanisch Ebertwurz. Huius floris calycem, tum recentem, tum etiam siccum, noctu claudi, ad Solem verò aperiri, nuper in hortulo meo miratus sum. Idem in descr. montis Fracti p. 63. Silybus, quam vulgò Carlinam vocat Germ.

Chamal. al. b. m. Silybum.
Radice apri in colle dextro vallis Ejitalæ, cuius capitula carnosa, calyce floribus ac semine relectis, optimi edulij loco nobis fuere ex aqua cum sale, lauiore etiam pipere adiecto futura. Tandem de Quadruped. ouipar. lib. 2. ait. Chamæleonem generis esse dixerim Carlinam hodie Medicis vocatam, quasi Cardinam: Cardinus enim humilis est, cuius idem dux vel tres differentia sunt.

Ixine Spina
Bonius Ixiam esse scribit gummi viscosum, quod prouenit ad radicem Chamæleontis, cuius magna habetur copia in monte Baldo, vulgò dicitur Carlina.

Radix apri.
Eucharis pro Chamæleone nigro, Ebertwurz, pingit Carlinam cauliferam. Lonic. lib. 9. cap. 25. pro Chamæleo Carduo suario Offic. & vulgi Cardopatiū, aut vt spii magis arridet Pancratio, Groß oder schwaarz Ebertwurz, pingit Carlinam vulgarem cauliferam.

Chamæleon Cardina.
Carlina vulgaris quæ existimatur Chamæleon niger si prouocaret sanguinem narium, non dubitaret Anguillara, esse Crocodilion Cratææ & Diosc. in quo addita verba quædam quæ non sunt in Orbasio & Cratæa de semine rotundo.

Carlina Bonio.
Eucharis pro Chamæleone nigro, Ebertwurz, pingit Carlinam cauliferam. Lonic. lib. 9. cap. 25. pro Chamæleo Carduo suario Offic. & vulgi Cardopatiū, aut vt spii magis arridet Pancratio, Groß oder schwaarz Ebertwurz, pingit Carlinam vulgarem cauliferam.

Chamal. niger Euchar.
Carlina vulgaris quæ existimatur Chamæleon niger si prouocaret sanguinem narium, non dubitaret Anguillara, esse Crocodilion Cratææ & Diosc. in quo addita verba quædam quæ non sunt in Orbasio & Cratæa de semine rotundo.

Pancratium.
Carlina vulgaris quæ existimatur Chamæleon niger si prouocaret sanguinem narium, non dubitaret Anguillara, esse Crocodilion Cratææ & Diosc. in quo addita verba quædam quæ non sunt in Orbasio & Cratæa de semine rotundo.

Cord. in Diosc. lib. 3. c. 11. Chamæleon niger videtur ea Cardui species quæ à Germ. Ebertwurz appellatur, Carlina Italica: sciendum est inquit, in nigro Chamæleone Ixiam interdum inueniri vt Plinius lib. 22. cap. 18. ait: Ipse vidi in ea radice quam Ebertwurz vocamus Ixiam nasci. Hæc Cordus apud quem in annot. quadam contrarium asseritur, & Carlina nigra, Chamæleon niger verus ab hoc diuersus statuitur, ac hodie ab eruditissimis in Italia ignorari asseritur.

Bellon. Obs. lib. 2. cap. 106. Carlina, quæ Antiochia prouenit, quàmque multi falsò Chamæleonem vocant. Carlina, inquit lib. 1. cap. 18. non est Chamæleon niger nec albus.

Dodon. gall. Leucacantha (quæ distinguitur ab Acantha leuce) alijs dicta Polygonatum, Phyllon & Iechias, Antiquis Romanis Spina alba: nunc Carlina aut Carolina, quibusdam Cardopatiū, Gall. Carline blanche, German. weiß Ebertwurz. Item Spina alba, Carlina alia, Gall. petite Carline, Monachis Romanis a'na'ia a'pazina, Lat. Spina Arabica, quibusdam Acanthis: Arab. Suthala, eorum opinio videtur valdè verisimilis. Eadem ferè Lat. in fol. p. 714. tradit: Prior Carlina, [caulifera] inquit, & Cardopatiū, ac à nonnullis Cardina dicitur, à Carolo magno primo eius nominis Romanorum Imperatore, cuius exercitus huius radice liberatus & præseruatus à peste olim fuisse fertur: Germanis Ebertwurz: Belgis, Gallis, ac alijs quoque Carline. Dioscoridis est λευκακάνθη: conueniunt radices validæ & amaræ: respondent quoque facultates. Appellatur verò Leucacantha, & alijs, sed nothis vocibus λευκακάνθη, εὐδαρ, ἰσχυρὸς: à Romanis Gniacardus, à Tuscis verò Spina alba. Differens tamen ab ea Spina, quam Dioscorides ἀγρίων λευκή, hoc est, Spinam albam facit. Alteram verò & Carlinam recentiores faciunt: & Carlinam humilem vel minorem appellant: flos medio stamineus rubentibus foliis, quardòque verò candidis ambitu circumseptus est: radix albidula, solida, non timosa, sapore minùs acris aut amaricans, atque idcirco Medicinæ minùs expetita. Falluntur autem non parum, qui ambas ad Chamæleones referre student: In Italia siquidem Germania aut Gallia nullam Chamæleones nascuntur, vt vhus, pro multis, testis est Petrus Bellon. lib. singularium 1. Figuris habet Chamæleontis albi & nigri Matthioli, in quo Matthiolus & Monachos etiam secutus ex vna planta duas facit: Ruellij præterea Chamæleon albus diuersus mihi videtur: denique quod Carlinam acaulon alijs notis in postrema histor. describit, facit vt existimem illi non bonè notam Carlinam, non magis quàm Matthiolo Carlinam eandem esse cauliferam & Acaulon, vel eos confudisse Chamæleonem minorem Tragi cum Carlina.

Carlina Herbariorum inquit Lobelius in Aduers. è varietate non genere duplex, non est Leucacantha, sed Chamæleon albus Dioscoridis. Idem in Obseruat. Carlina herbariorum Aduersar. 367. Chamæleon albus Dioscorid. Helixine Pliniana Arguillaz. Item Chamæleon albus caule donatus, Cardopatiū, Chamæleon albus & niger, sine Carlina Officinarum. Chamæleon niger vulgaris Herbariorum. Chamæleon albus Fuch. sij Germ. Ebertwurz, Belg. Ewertworte & Carlina. Galis item Carlina Aduersarijs pag. 367. Hæc ille, qui duas habet figuras vnam sine caule, alteram cum

Carlina fl. no Leucacantha Dod. lat.

Carlina al. terra

Carlina Chamæleon non est.

Dod. vna.

Carlina herbariorum Lob.

Helixine Pliniana

Lob. vna.

cum caule. Dūbito an Anguillara hanc Carlinam intellexent per Ixinam Plinianam: Nec Chamæleonem album, dicere aſſim. C. Bauh. apud Matth. Chamæleon 1. ſive albus, ſive acaulis. Ixia & Chamæleon albus Theophy. [Vernilaginem G. zi vertit,] & Plinij: Chamæleon albus Matth. Cordo in Dioſcorid. Carlina minor Dodonzi, Carlina vulgi Caſalpino. Cordopatum flore albo, caule nullo. Geſn. hort. Silibus vulgò Carlina Geſn. Fracto. Helxine Pliniana Anguill. Item Chamæleon 2. ſive albus caule donatus. Chamæleon niger alter Matth. Hæc non videtur à præcedente differre niſi quòd caulem proferat. Non aſſim dicere Chamæleonem album Cordi eundem cum Carlina ſive Ebermürg; ab ea enim ſeparat ille. Ac quum dicat Anguillara ſuam Ixinam ſpinam ſive Chamæleonem album coopertum lanugine valdè alba, & ipſe ſeparat à Carlina vulgari, ego non aſſim eandem dicere.

Icon. Plant. Tom. 2. pag. 4. Chamæleon albus Dioſcoridis, ceu & Schvvenckſ. cui & Carlina maior. Caſton & Harchio, Chamæleon albus, al às Carlina.

Brunſell. in Herb. p. 218. non deſcribit Ebermürg; nec icon reſpondet: Eſt Cardopati minoris quorundā, de quo nō loquitur in contextu.

H. Lugd. tres exhibet figuras, quarum prima Carlinæ acaulis pag. 1451. hac inſcriptione: Chamæleon albus Matthioli. Reliquæ duæ ſunt cauliſeræ, quarum prior eſt p. 1454. hoc titulo, Chamæleon niger alter Matthioli. [Hæc ponenda erat ſub Chamæleone nigro Matthioli & Fuchſii] quæ eadem icon repetitur pag. 1476. pro Crocodilio, Catlinæ caulem habente.

Locus & Tempus. Carlinam ego reperi non longè à Montbelgardo eundo Audincourt: ſed paucam, copioſam autem non longè à Blau montio, vnde tranſtuli Montembelgardum in Hortum 1. c. vbi ſæpiùs floruit, Genevæ habui in horto, in monte Saleve, abundat. Ea modò reperitur cum caule, modò ſine eo iſdem locis, ut ſæpiùs obſervavi: Abundat etiam in montibus propè fontem Admirabilem ducatus VVirttemberg. Quidam nobis aſſerebat eam quæ vnum caulem haberet vnus eſſe anni, quæ duos duorum, quæ tres trium: Loco dicto in montis planitie dicta aũſſ büſſen, terra multis in locis erat inuenta: dicebant, qui me deducebant, evertiſſe apros, ac illos quæſſere radices Ebermürg;. Naſcuntur Carlinæ albæ Dodonzi, in montibus altis, locis deſertis, ac quandoque ſecus vias: ſed quæ caulem fert Germaniæ frequentior. Iulio & Auguſto, tum & ſeriùs quandoque florent, ac ſemen maturum proferunt.

Vites. Carlinæ echinus ſpinis mundatus, conditur ſiccaro vel melle paratur, frigidiore ventriculo cōducibilis, ut expertus eſt Amatus in quodā: valet radix contra peſtilentem luem, quæ ab Angelo Carolo magnò, ut eā exercitum à peſte liberaret indicata creditur. Carlina eoſdem habet in curādis malignis vlceribus vſus quos Chamæleon niger: egiegrā vim contra peſtē & omnia venena habet ſi Cordo credimus. Dum Philippus Melanchton hypochondriacis doloribus conſtitaretur, eoſ vſu herbæ Chamæleontis mitigavit, & huius remedii efficacitatem eum prædicat teſtatur Camerarius. Carlinæ radice, auctore Dodonzo, præcipuè vſus eſt. Secundo ordine latius inſenſo excaſſat: & cum partium ac ſubſtantie tenuitate, tertio ordine ſeccat: ſudores verbò enā mouet: ventris tinea ac lumbricos pulſat: vene-

Tom. III.

nis omnibus reſiſtit: peſtis contagia non modò arceat, ſed & eandē curat ſi tempeſtiuè propinetur: commanducata dentium dolores ſedat: iocunoris ac lienis obſtructiones aperit: vrinas citantes promouet: hydropicis conſert: datur & ex alto delapſis ac cæcis. Radix Carlinæ ſeu Chamæleontis vulgaris in puluere redacta, ac drachmæ pondere è vino ſumpta, peſti aduerſatur, quo nomine pecori, poſſimū autē ſuibus nonnulli radicem hanc exhibent, perſuadentes ſibi hoc pacto iumenta & ſues à ſordida & peſtilenti lue conſeruati poſſe: Quidam eſcam Columbarū quod mutas alias venentur, è radice Chamæleontis vulgaris conſiciunt, aliis nonnullis adiunctis. Eandē etiam in aceto decoctam commendat Fuchſius contra ſcabie, impetiginem, & omnes cutis ſordiditates curatu diſſiles. ſi eius decocto lauentur, quod dentium dolori etiam ſuccutere tradit. Ferunt hanc radicē vires his qui eam geſſauerint augere, comitibus autem qui cum illo degunt, adimere. Sed credat hæc qui vult: ego, quod ſciā, nuſquam in ſcriptorib. eius rei mentionem factā legi. Vtriuſq. radices calidæ & ſiccæ ſunt facultatis. Agrytæ & qui radices hinc inde venales circumferunt, plenò ore Carlinæ radices prædicant, ac fieri poſſit, ut ad multa ſit vtilis.

CHAMÆLEO ALBUS.

CHamæleontem album vocant Carduum Deſcriptio
Quendam, cuius folia, ut à Carlinæ foliis lanugine canefcente, rariſ, quæ vtrinque ſunt obducta, differunt, ita cum iis conuenit inciuſurā, rariore tamen: ſic ut latiores ſint lacinie, ſpinoſæ: aliàs verd cardui lactei ſeu Maris folia latitudine adæquat, craſſiuſcula, neruoſa: Hunc Lugduni in horto Pharmacopœi Bralierii, Chamæleonis nomine vidimus, multū à Carlina vulgari differentem.

An Cluſ. Pannon. pag. 667. Carlina ſive Chamæleon vulgò nuncupatus flore amplo albo?

An Geſn. hort. Ixine ſpina, quæ Maſtichen in radice fundit Hiſpanis cognita Spaniſche Ebermürg; ex genere Cardopati, ſive Carlinæ? An Cordo in Dioſcor. lib. 3. cap. 6. Chamæleon albus in Italia proueniens?

An Anguill. epiſt. 5. Helxine Pliniana quam eſſe Chamæleonem album Dioſcorides dicit eſſe manifeſtum, ac à Theophr. dici Ixiæ, & Gaza interprete Carduum Pineam? Item epiſt. 8. pag. 117. Ixine Theophrasti lib. 9. cap. 1. & 6. cap. 3. & 4. quā malè, Gaza modò vertit Spinam Ixinam, modò Carduum pineam. Ixines Latinis dictus Carduus Pineæ producens lachrymam reperitur in Orientalibus partibus. Conſiderent lectores an Anguillara non ſit ſibi contrarius dum epiſt. 5. Ixiæ; & 8. Ixiæ dicit, duas plantas diuerſas.

Bellonius ni fallor de Chamæleone albo noſtro hæc tradit. Fruſtra inter reliquas ſtirpes Chamæleon albus depiſtus fuit: nam nec in Germania, nec in Gallia, nec etiam in Italia naſcitur: vnde certum eſt (cum venia ſic dictum) iſtas tres nationes hallucinari: neque enim Carlina, neque alii ſimiles, Chamæleon albus eſt. Hic radicem producit humanæ coræ craſſitudinem æquantem, pedalem, interdum etiam cubitalem longitudinem, aded odoratam, ut cōclauē in quo reposita, Viola odore ita repleat, ut capitis grauedinē inducat. Cretenſes paſtores,

I 2

& rusticani pueri, præsertim apud Rhetimo, eius gummi colligunt, quo semina pro masticatorio vtuntur, vñ mastiche in Chio, & Chondrilla gummi in Lemno. Cola vel Chamæleon vulgò nuncupant Chamæleonem album.

Chamæleon
vulgaris.

Honor. Bellus in Epist. ad Clusium meminit, huius Chamæleonis his verbis. Chamæleon albus, gummi, vt Mastix, ferens, copiosissimus est: radicem habet maximam, odoratam: Iunio & Iulio, circa echinum gummi distillat, quod pueri legunt, & aliquantulum masticant, postea digitis læoigant, & complanant, complicatumque in vesiculæ formam, super alteram manum fortiter impellunt, ita vt ex istu vesicula rumpatur & crepitum edat: quo ludi genere summopere pueri delectantur. Quod autem, vt scribit Bellonius, loco masticis id gummi dentibus atterant, nondum scire potui: nam hic Cydoniz neque legitur, neque curatur: radices vocantur κάλας.

TETRALIX VETERIBVS.

CAP. X.

Tetralix
Theophr.

Plin. lapsus

Tetralix à Theophr. hist. pl. lib. 6. c. 3. cum reliquis aculeatis plantis enumeratur, acquidem inter æstate germinantes, atque à quibusdam Ixinen [ἰξίνη] vocari. Sed & Plinius Theophrastum imitatus Tetralicem æstate florere prodidit Helxinen [Ixinen Theophr.] Quod vitium auctoris esse, non exemplaris, monstrant hæc, quæ lib. 22. cap. 17. scribit. Sed nos qualis esset Helxine vera, diximus lib. 21. cap. 16. vbi Helxinen [Tetralicem] & folio & caule spinosas habere lanugines affirmat.

Tetralix
Spinosa
differt ab
Erica

Ex quibus colligere licet Tetralicem hanc spinosam ab Ericæ [Erithace CH.] quæ lib. 22. cap. 16. ab Atheniensib. etiã Tetralicē appellari perhibet, diuersam esse: quia Ericam spinis armatam esse nullus vnquam Herbariorū prodidit, id quod etiam perspicuum est ex Dioscoride & Plinio de Erica tractantibus. Deinde Tetralicem Ericæ post primos Autumnii imbres florere, nempe ad Idus Septembres, & Calendas Octobres idem Plinius testatur.

Tetralix di
uersa a Te-
tralice Pl.

Alio verò in loco Tetralicem & Ixinem florere tradit æstate: quanquam Theophrastus, ex quo hæc Plinius mutuatus est, Ixinem & Tetralicem non scribit florere æstate, sed germinare.

Ericam Athenienses, vt ait Plinius apud Hermol. Corol. 115. Tetralicem vocant, Euboea Sisarum, siue, vt Varro, Sisaram (de hac diximus H. n. g. lib. 10.) Theophrastus Tetralicen non Tetradicem, nisi mendosus codex est, appellat in genere fruticum, aculeatam & germinantem æstate: De hac Ericæ intelligat nec ne haud scio: quia tamen bis anno floret Ericæ, prima videlicet & vltima syluestrium, nec inter aculeatas ponitur: fieri potest vt alia sit Tetralix sua Theophrasto, alia quæ pro Ericæ Athenis capitur: nisi quis hanc Tetradicem, illam Tetralicem vocari malit. Caueant igitur lectores, ne Tetralices has posthac confundant.

Carduus
Echinopo
maior

Quia autem Tetralix à Theophrasto numeratur inter Carduos, hinc fit (vt scribit H. Lugd.) quod quidam eam esse putent, quam Tragus post Carduum vulgarem & Chamæleonem album pro vero Chamælonte nigro pictam ostendit, de quo mox agemus sub Carduo Echinopo maiore.

CROCODILVM VETERIBVS.

CAP. XI.

Crocodilum, ita describente Dioscoride, Chamæleonis nigri figuram habet. Nascitur autem in syluosis [stirpibus & arboribus confectis locis Hermol.] radicem habens longam [his sequentibus vetus caret vsque ad vocabulum acrem, quæ lectio probatur & Hermol.] lætem, aliquantulum latam, odore, vt Nasturtium, acrem. Feruefacta in aqua [ἐν ὕδατι. Corn. ἐν ὕδατι, in aceto] & pota [ποτῶν, & non vt Ald. cod. πρὸς τὴν μύτην, lota, quidam etiam, sed non sine errore, legūt ἐπὶ τῇ μύτῃ si per nares attrahatur] radix, valet ad copiosum sanguinem per nares pellendum. Datur & lienosis eos euidenter adiunans. Sed & semen ei rotundum est, ac duplex, veluti scutum [vet. omittit ista, quæ nonnulli adiecticia censent, & ex Tordylj historia huc perperam transata] quod quidem vrinam ciendi vim habet.

Crocodilum
Diosc.
Diosc. variè
illustratur.

Diosc. lectio
Garsa

Ea Plinius sic videtur reddidisse. Crocodilum Chamæleonis herbæ nigre figuram habet: radice longa, æqualiter crassa, odoris asperi. Nascitur in tabuletis. Pota sanguinem per nares pellit edipiosum, crassumque, atque lienem consumere dicitur.

Ex Plinio

In quibus Plinius legisse videtur ἐν τοῖς ἀμυγδαλαῖς, id est, in tabuletis, pro ἐν τοῖς δρυοειδέσιν, id est, siluosis, vt habet Dioscorides: deinde pro ἰσχυρὰν aliquantulum latam, ἰσχυράτην, siue ἰσχυρὰν ἢ παχέαν, id est, æqualiter latam, siue æqualiter crassam, Oribasius subcrassam legit. Quem verò δισχιμένον Dioscorides, Plinius suo more odorem asperum dixit. Oribasius radicem acrem, odoremque Nasturtio similem. Quod verò ad semen attinet rotundum, duplicis scuti figura, id à Plinio omissum est, & ab Oribasio, qui integras historias ex Dioscoride exscribere consuevit. Præterea id à Dioscoride præter morem additum fuisse videtur, absoluta scilicet historia & viribus explicatis, atque falsò huic plantæ attributum, cum ἀνὰ δόξαν sere omnia semen edant Cnico simile. Quare adiecticia hæc viri docti censent, & ex Tordylj historia cuius semini figuram hanc Dioscorides assignat, huc à sculo quodam nominum vicinitate decepto ascita fuisse. His adde, quod in Crateæ fragmentis desunt verba illa, ὅτι τὸ σπέρμα οὐδὲν ὅν, καὶ διπλὸν ὡς ἐσθλόν, id est rotundum, & duplum vt scutum.

Diosc. &
Plinio lectio
consentit

Galenus Crocodilj semen acre & aromaticum esse dicit, vrinæque ac menses ciere, vt calidæ sit facultatis & discussoria ac siccantis. Succum item caulis similem semini vim habere, & renibus affectis prodesse. At radicem expulsiōnes à thorace vehementer adiuuare, quæ aeris quidem tenuis sit quàm semen, sed non minus amara: & ducat etiam sanguinem per nares.

Crocodilum
Galeno.

Differt, ab utroque Chamæleone, inquit Marcellus, Crocodilion quodd eorum alter albus scilicet, sine caule in medio, inter folia Spinam marino Echino similem profert: Niger non vnquam verum duas trèse aliquando coliculis potius quàm caulibus impositas ostendit, Crocodilion autem singularem mittit caulem & in caule spinosum Echinum. Est & alia differentia, quod illi pinguibus campestribus & maritimis locis nascuntur: hic inter stirpes, & confectis arboribus locis. Differunt & radice quæ in illis qualis ab hoc describitur: in Crocodilio longa cum latitudine aliqua, absque nouis illis quæ descriptæ paulò

Differt à
Chamæleone.

Differentia

*Crocodyli
nomenclatur
ra obijura.*

paulò ante sunt. Nec multò liquet, teste Lobelio: nomenclaturæ Cardui ratio, ut ne vix quidē antiquis probè cognitū fuisse putemus. Nam antiqui Galenus, Oribasius, Paulus duntaxat verba ex Dioscorido mutuati, aut à Cratæa, à quo Diosc. & Plinius, qui locis sabulosis codicis errore, omni scribit, sua sumptere. Sed in Cratææ fragmentis desunt verba paucula. Ab Aëtio facta mentio maxime Crocodyliad: s.

Aequioea.

Neque descriptio Dioscoridis tam aperta, ut à tot aculeatis plantis facili sit genuinum Crocodilium distinguere & internoscere. Echinocaliqui [ex quorum numero est Anguill. Amat. ex auctoritate Ruellii, quem tamen hac de re dubitare scimus, & Brissoni, H. Lugd.] Carlinam vulgarem suspicantur esse Cratææ, Dioscoridis, Plinii & Galeni Crocodilium. Horum opinionem refutat Matthioli & Io. Agricola: Negat Anguilla. ra: Dubitat Gesnerus.

*An Chamæleon exiguus
in Dioscor. lib. 4. cap. 12. quam ait Germanos wild
Ebertburg vocare.*

An Chamæleon exiguus, Crocodilium Cordi in Dioscor. lib. 4. cap. 12. quam ait Germanos wild Ebertburg vocare.

Maranthæ & Anguillæ Chamæleo niger, videtur Lobelio verum esse Crocodilium, aut certe genuini opinionem sustinere posse.

Maranthæ & Anguillæ Chamæleo niger, videtur Lobelio verum esse Crocodilium, aut certe genuini opinionem sustinere posse.

Crocodyli historię subnectit Lob. in Adv. plantam, quam Gesner. Echinopum minorem vocabat, & Dalech. Crocodilium Monspelien-

Crocodyli historię subnectit Lob. in Adv. plantam, quam Gesner. Echinopum minorem vocabat, & Dalech. Crocodilium Monspelien-

sium.

Crocodyli nomine exhibent Carduum Echinopum maiorem Lacuna, Lobel. & Gesnerus.

Eryngium marinum

Eryngium marinum putat Gesalp. lib. 13. c. 19. Crocodilium Dioscoridis, cuius sententiam minimè probat Anguillara & Matthioli.

Dioscoridis.

Crocodyli dici, qui aliàs Dipfacus dicitur, testis est Dioscor. lib. 4. cuius etiam nominis meminit Tragus lib. 2. cap. 106. & Gesn. in Afeript. Dioscoridis.

Dracunculus maior de quo lib. 19. diximus, ut videre est apud Fragum lib. 2. cap. 81. Apuleio dicitur Crocodilium, Colubrina & Dracontea.

Eucharius Roeslin in herb. pro buchen, Dracontea, Viperina siue Crocodilia pingit Bistoriam.

Crocodilium tandem confundi ab H. Lugdunensi cum Tordylis quod aliqui Sesele Creticum vocant, videre erit suo loco.

ECHINOPVS MAIOR

Descriptio



Tom. III.

Altitudo vnius & alterius excrecit, caulibus crassitudine digitali, purpurascente lanugine obductis, striatis, ractu pinguibus, mansu dulci sculis: quos folia ambiunt latiore basi oblonga, tota ractu glutinosa, profundè laciniata, superne aruolenta, interne incana, verine

que pilosa, multis tamen numeris magis inferne quam superne: in caulibus extremis eorumque alis capitula exactè globosa nascuntur, stoculis ex albo cæruleis: radix mediocri crassitudine. Huius generis est & ille, cuius foliorum, quæ sauis sunt angusta, laciniæ nihil aliud quàm infesta praelongaque spicula sunt.

Camer. hort. Sphærocephalus flore albo. In Epit. Matth. spina alba putata, aliis Echinopus, nonnullis Acanthium, vulgò Sphærocephalus, quibundam Chamæleon niger, aliis Crocodilium, Germ. Bifem Inoff. Plurimum est generum, & quibus hæc vulgarior cum altera spina alba putata flore cæruleo. Eidem apud Matth. Vermeintè weisse Bergdistel mit weissen Blumen: spina alba, albis floribus. Item Vermeintè weisse Bergdistel mit blauen Blumen: spina alba cæruleis floribus: folius angustioribus & paulò rarioribus. Pro cærulea spina alba ponit figuram Matth. verum ego nescio unde colligat Matthioli cæruleam & minorem: considerandum an Cameraarius tunc non intellexerit, carduum Sphærocephalum minorem annum: cuius dat figuram in horto.

C. Bauh. apud Matth. Spina alba altera Matthioli, Chamæleon verus Trago.

Lobel. Adv. Crocodilium Fuchsi, Echinopus seu carduus Echinatus Gesneri: Sphærocephalus Cordi. Spina peregrina Dodonæi, Germ. weisse distel/ Belgis Roemische distel. Obs. p. 81. Crocodilium Fuchsi & Cordi, perpetuam Chamæleon vetus Tragi. Adv. pag. 368. & 369. Icon. Plant. Tom. 2. pag. 8. Rutro seu Rutro Theophrasti.

Dodon. gall. lib. 4. cap. 64. Chardon estranger, Spina peregrina, Belg. Dremde distel, qui quomodo vocant Veteres nescit, nisi sit Acathus sylvestris. Lat. in fol. p. 710. Carduus sphærocephalus primus, quem Fuchsius quandoquæ Chamæleonem nigrum facere studuit, sed postea rectius sentiens spinam peregrinam vocavit, & Val. Cordus Sphærocephalum appositè appellavit.

Cordo Hist. Sphærocephalus carduus, ibi pulchra figura, ac annotatum: spinam albam in Italia quidam hodiè vocant, querendum an Echinopus Veterum sit: Crocodilium videtur.

An Anguill. epist. 3. pag. 142. Spina bianca, siue alba Cretensium, foliis non multum pungentibus, quam Gesnerus cum illi conuicerem Echinopum existimabat.

Apollin. rad. 1. supra elect. Hamech. Spina alba ab Alexandrinis herbariis allata, quam melius Sillybum referre ait: mirum ibi dicere eandem esse cum Matthioli spina alba, cum non sit hispida, ac levis admodum: Matthioli autem dicat suam habere spinas rigentes.

Fuchsi. hist. cap. 339. χαμæleon niger, carduus niger aut Vernilagium Germ. Schwarz garten distel, qui parum an legitimus sit Chamæleon niger addubitat. Eidem Icon. spina incognita.

Matth. in Dioscoridem in prior. comment. ἀκανθὰ λευκή Spina alba, quam descriptioni Diosc. ad stipulam ait, frequentissimam plantam, quæ suis echinis ac spinis rigens in excelsioribus Anariæ vallis montibus laticis abiegnis & piceis sylvis refertis Iulio mense visatur. Eadem commemorat in post. comm. Lat. & It. cum mag. fig. vbi & secundam speciem assignat, dicens: Est & aculeata altera planta, cuius hic imago secundo loco visitur, quam quidam spinam albam esse censent, sed plura in hac desiderantur. Quidam

*Sphærocephalus
flore albo
Camer.*

*Spina alba
altera Matth.
C. Bauh.
Crocodilium
Fuchsi. Lob.*

*Spina peregrina
Dodgall.*

*Card. f. h.
Cordo*

*Sillybum
Apollin. n.
ratur.*

*Chamæleon niger
Fuchsi.*

*Spina incognita
Fuchsi.
Spina alba
Matth.*

*Aculeata
planta
Matth.*

demonstrant pro spina alba Cardui genus, cui caput rotundum, quod videtur telis araneis tectū: figuram hic posuimus, non est vera spina alba, quamvis posset pro ea sumi. Figura quam ponit satis conuenit cum Echinopo: verūm non describit: at tantūm repetit inaniter Diosc. descriptionem: quam etiam in postremis repetit pro Carduo nostro Galactite, quem cum sua Ananiensi spina miscere videtur, ibidem figura transposita, & primo loco posita quæ esse debet, & quam ante probauit rejicit, ac ita dubiè scribit quasi spina eius alba Cortusi, Spina Alba Ananiensis, & Spina alba quam olim pingebat, tres nūc censet plantas diuersas. In hist. Germ. videtur descriptio conuenire Carduo capite tomentoso: denique confusè scribit Matthiol. nec scire videtur quid viderit, aut curarit depingendum.

H. Lugd. 4. figura.

Spina alba Matth.

Spina Arabica

Chalceos

Tetralix

Spinosa

Tragi

H. Lugd. la.

plur. Garg.

Vnius plantæ quatuor icones apud H. Lugdunensem. Ac prima p. 1462. pro Spina alba Matthioli: Est & altera planta aculeata, inquit, cuius iconem hic exhibemus quam quidem Spinam albam esse censent: sed multa in hac desiderantur. Hanc tamen depinxit Pena nomine Spinæ albæ. Secunda p. 1467. pro Spina Arabica. Sunt qui Carduum illum tantoperè aculeatum quæ Matthioli nomine Spinæ albæ exhibuit, Spinam Arabicam esse opinentur. Tertia p. 27. *χαλκίος* inscripta: Quarta p. 1483. pro Tetralice spinosa Tragi. Multa hoc loco displicent in histor. Lugd. Primum quod eandem figuram nempe Matthioli ponat duobus locis: nempe pro Spina alba & pro Spina Arabica: secundo eandem existimet Penæ Spinam albam. Tertiò quod pro Spina Arabica exhibeat. Quartò quod alias duas figuras exhibeat Cardui Echinopi pro plantis diuersis Chalceio & Tetralice. Cui obsecro placeat Hist. Lugd. lib. 14. c. 28. Tetralicem spinosam Tragi vocare plantam non ita dictam à Trago, ac præterea eiusdem plantæ aliam ponere figuram cap. 27. cum inscriptione Chalceios, quasi illæ duæ figuræ & earum descriptiones non sint vnius plantæ diuersimodè descriptæ & depictæ.

O. Bauh. 4. in manu. sio in H. Lugdun.

Spinæ albæ (inquit C. Bauh. in animadu. H. Lugdun.) pag. 1462. figura est absque descriptione. Spina Arabica p. 1467. figura eadem numero cum priori, addita tamen descriptione. Eadem tertio proponitur & Silybi siue Leucacanthæ Lonicæ nomine p. 1466. describitur, non autem pingitur. Quartò Chalceios nomine pag. 1481. describitur. Quintò, repetitur & describitur pag. 1483. & Tetralix spinosa Tragi appellatur. Sextò, Ruthrum alterum dicitur, & ex Pena describitur, sed sine iconē, pag. 1482. En vnius plantæ lexicon mentionem!

Acanthium Turn.

Quam herbam ego Acanthium censeo (ait Turn.) genus est Cardui, Branchæ vti nūc modo foliis lacinia, verūm lacinia non ita longè ab invicem distantibus: contractum solum habet in se aliquid oblongum gossypio simile: capitulum Cardui fallonum echino simile, sed minus multo flores cærulei: tota herba est viscida, odorēque grati prædita. Nusquam obseruavi, quā in hortis Angliæ & Italiæ. Aiunt quidam, Herbaris dici Carduum asininum. Nullum eius nomen Anglicum hæcenus potui discere. Communis igitur cōgruū nomen ore thessal. Carduus auenaceus vel Coteo thessal. [Carduus villosus] propterea quod semina granis Avenæ sint similia, foliaque contracta villum gossypii: Rat referant. Lucas Ghinus præceptor meus Bononiensis, interpretis pu-

Card. auenaceus
Card. villosus

blicus Dioscoridis, docuit me primus, hunc Carduum Matthiolo nunquam in Italia conspectum. Londini vidi in vanis hortis.

Taberb. Icon. & Hist. Carduus Sphærocephalus. Trago dicitur, Chamæleon niger verus. Gesn. de hort. Echinopus, quibusdam Spina alba, aliis Crocodilium, aliqui Germanicè Jungfrauen distel appellant. Cast. Durant. p. 464. *cardus*. Spina alba, Arab. Bedeguar: Priorem, Matthioli figuram habet. Cronemb. de compol. medic. lib. 3. sect. 36. Certum se esse gloriatur de spina alba, & hanc quidem esse Bedeguar: Pingere exquisitam imaginem in Diosc. suo Matthiolum, quam hæcenus non viderit. Quæ autem certitudo obsecro ex planta non visa? Figuram Echinopi (quam ad ipsam plantam non existimo factam) Lonic. habet sub his nominib., weiß garten distel/ Jungfrauen distel/ Zangarten distel *αἰώνιος*, Alba spina.

Card. sphaerophalus
Lonic. notatur
Echinopus
Gesn.
Spina alba
Castors
Cronemb.
videtur.

Lonic. iron.
mala.

Nostra opera est Carduus echinopus Bisem distel à forma capitum similium pilis odoratis & musco infectis, in Horto E. C. Montbelg. non solum dum durat hic Carduus & hiemem perfert, verūm etiam seipsum disseminat: Inter scripta Gesneri inuenio dici Acanthum sylu. Bononiensibus. Accepi semen Lugduno à Dom. Sebastiano Heberlin nomine *Chardons des Dames*. Spina alba altis floribus Camerarij habetur in hortis, & spontè nascitur saxosis & fluuiis imminuentibus collibus: altera flore cæruleo, peregrina cum sit, non nisi in hortis querenda est.

Decoctum Spinæ albæ albis floribus echinati capitis vnà cum caule & seminibus, quæ admodum sunt amara, mirificè prodest in doloribus dentium.

Vires

SPINA ARABICA VETERIBVS.

Spina Arabica, ab alijs Acanthis dicta, Dioscoridi videtur natura similis esse Spinæ albæ, nimium adstringens. Et ad fluxum muliebrem, & ad languinis educationem, & ad alias fluxiones: radix eius similiter idonea est. Nascitur in asperis locis.

Spinad. arab.
Diosc.
Vires

Spinæ Egyptiæ siue Arabiæ laudes, inquit Plinius lib. 24. cap. 12. in odorum loco diximus. Et ipsa spissat adstringitque destillationes omnes, & sanguinis excretiones, mensiumque abundantiam, etiamnum radice valentior. Ita vetus codex, inquit Corn. sed in vulgatis, *Aegyptia siue*, voces desunt: Et hæc sunt quæ etiam Diosc. habet, nisi quod *ἐν τῇ γυναικείᾳ*, Plinius mensium abundantiam reddidit: quum d'fferat fluxus muliebri à mensibus siue menstrua purgatione. Ceterum locus quo se *Aegyptia* spinæ laudes dixisse ait, est lib. 11. cap. 9. Nec minus spina, inquit, celebratur, in eadem gente duntaxat nigra, quoniam incorrupta etiam in aquis durat, ob id utilissima nauum costis. Candida facili putrescit. Aculeus spinarum & in foliis. Semen in siliquis, quo coria perficiuntur galli videtur. Flos & coronis iucundus, & medicamentis utilis. Manas & gummi ex ea, &c. At non satis animaduertit Plinius, altam esse Spinam Egyptiam ex qua Acacia præparatur, quæque item Acacia appellatur: de qua & hoc loco itemque lib. 24. ca. 12. vbi Acaciæ spinam vocat, agit, & de qua mox capite sequenti. ait: Gummi optimum esse ex *Aegyptia* spina conuenit, vermiculatum, colore glauco, purum: sine cortice, dentibus adhærens: Et de hac spina in *Agypto*

Spina Aegyptiæ siue Arab.
Plinius.

Plin. lectis.

Plin. error
confundens
Acaciam
cum spina
Arabica.

Egypto nascente, arborosa, ex qua & Acacia fit, & gummi egit Diosc. lib. 1. cap. 112. Meminit eius & Theophr. lib. 4. & lib. 9. princ. ubi lacrymosum eius humorem esse ait, ipsumque ferre non in coriis, sed in vase: non satis animadvertit, inquam, Plinius, aliam esse hanc arborosam Ægyptiam spinam: aliam spinam Arabicam, quæ & ipsa Ægyptia vocatur, de qua superiore loco agit, ipsique omnia à Diosc. attributa adscribit. Hanc tamen Dioscor. natura similem spinæ albe videri dicit. Sed Galenus simpl. spina Ægyptia, inquit, quam aliqui Arabicam nominant, similis est spinæ albe quæ apud nos est, magis tamen adstringente ac siccante vi prædita est.

Ceterum, hallucinantur qui sibi persuadent Arabiam spinam, cuius hic sit mentio, esse quam Acaciam vocant.

Spina Arabica à quamplurimis de Carduo in genere dicitur & habetur.

ACANTHA LEUCE, SPINA ALBA Veteribus.

C A P. XII.

Spina alba nascitur in montibus & syluosis locis, folia habens albo Chamæleoni similia, angustiora tamen & candidiora, subhispida, & spinosa: caulem duos cubitos excedentem, digitum magni aut etiam maiori crassitudine, subalbum, intusleucus vacuum. In huius cacumine caput est spinosum, erinaceo marino simile, sed minus & oblongum. Flores sunt purpurei, in quibus semen velut Cnicus, sed rotundius. Huius radix pota facit ad sanguinis sputum, stomachicos, celiacos: ciet etiam urinam, & ad tumores in cataplasmate imponitur. Decoctum ipsius colluitur in dentium dolore. At semen potum pueris qui conuelluntur auxiliatur, itemque aduersus serpentium morsus. Aiunt & Amuletum ex ipso appensum venenatas bestias fugare. Alibi Scolymus folia habet Chamæleonis & eius quæ Acantha leuce appellatur.

Spinam albam alii siluestrem Cinaram, inter notha Dioscoridis, alii Donacitum, alii Erythraeum vocant. Romanis est spina alba siue regia: alius Carduus ramparius.

Inter spinarum genera, inquit Corn. meminit Plin. l. 24. c. 12. etiam spinæ albe, his verbis: spinæ albe semen contra scorpiones auxiliatur. Corona ex ea imposita capitis dolores minuit. Nec alibi ipsam describit, nisi quod lib. 15. c. 28. In papyris & ferulis, spinaque alba, caulis ipse pomum est, inquit.

Galenus spinam albam, id est, *ἡ ἀκανθα λευκή*, quosdam composita voce *λευκάκανθα* nominare dicit, sed postea sub litera *α* diuersam facit *λευκάκανθα* ab illa quam prius *ἀκανθα λευκή* vocauit, & de hac ait, radix ipsius siccat, & moderatè adstringit. Quare & celiacis & stomachicis prodest: & sanguinis eductiones cohibet: & tumores in cataplasmate coëctet. Dentium etiam doloribus prodest, si quis decoctum colluat. Semen autem tenuium partium & calidæ facultatis est, ut etiam conuulsis in potu medeatur.

Non parua inter authores oritur contentio, quænam in aculeatarum genere, quas plurimas genuit natura, Spina alba legitimè, notis omnibus adstipulantibus, appellari possit. Verum essentiam hanc transigere nequeant: interim tamè pro spina alba alii alias herbas ostendant, & quibus

que suam veram existimat. Quandoquidem sunt eorum complures, qui sibi certò persuadent spinam albam eam aculeatam herbam esse, quam Carduum Minianum siue lacteum nominamus. Sunt alii, qui Cardum Echinopum maiorem vocant. Sunt præterea, qui spinam albam esse velint, illud Cardui genus quod Spinam albam quorundam inscribimus, Spinam albam à Cortusio sibi missam habet Matthiolus, quam veram existimat. Sed fallitur. Carduum Galactem verius nobiscum dixerit. Habet Spinam albam & Anguillara, quæ Lobelius existimat esse Crocodilium Montpeliense. Sed qui plantas vna cum descriptione conferent, dubitandi occasionem inuenient, ac nobiscum Cardium Echinopum maiorem cognominabunt. Spinam albam siluestrem Fuchsi, siue Acanthium quorundam ad Diosc. spinæ albe delineationem quàm proximè accedere scribit Fuchsius, quem plures alii sequuntur. Spinæ albe arboris nomen, cum spina alba, herba eduli, [quam nos hodie Scolymus satium, Goropius verò Carduum vocat] confundit Plinius. Errant, & in hoc etiam errore Ruellius versatur, qui sibi persuadent spinam albam illum Carduum esse, qui à Tuscis *Prasura*, à nobis Scolymus silu. vocatur. Dalechampius spinam albam esse arbitrat, quam Eringium montanum appellamus, & ei quidem notis omnibus à Dioscoride traditis optimè quadrare. Spina albe Diosc. non minùs accedere Carduum tomentosum Anglicum aie in Aduers. Lobelius. Hunc nos Carduum capite tomentoso nominamus. Carduus stellatus, teste Lobelio in Obs. est spina alba vera Rondeletio. Sunt eorum complures, qui sibi certò persuadent spinam albam eam aculeatam herbam esse, quam aliqui Herbam Turcam, nos Cardum benedictum vocamus. In manifesto errore versantur qui sentiunt Leucacantham, ab Acantha leuce h. e. Spina: lb., nullo pacto differre. Spinæ albe Symphytum substituit Apollo in conf. Hamech. Spinæ albe loco in syr. de Eupator. Matth. germ. Cyperum substituit. Ruellius aculeatæ arbusculæ radicibus [quæ candida est Dioscoridis Rhamnus, nobis autem Rhamnus primus, siue Monspelienis] omnes tribuit facultates; quibus legitima spina alba à Dioscoride commendatur. Cautos nos esse oportet ne res diuersas spinæ albe nomine confundamus. Nam præter iam dictam Rhamnum, Rhamnus cum spondylo siue tertius etiam spina alba cognominatur. Merito Matthiolus reprehendit Ruellium, quod spino albo (nobis Oxycantha Matthioli dicto) attribuat facultates spinæ albe Dioscoridis. Spina alba Brunschuygeio sunt Rosæ siluestres albe. In spinæ albe locum cuius decoctum ad dentes firmandos laudatur, author ille Italici libri, *De gli ornamenti delle donne*, Caryophyllatæ radicem substituit. Sed argumentum parum firmo.

SPINA ALBA QVIBVSDAM CAPITE echinato.

Perennis est planta caule ad cubitorum aliquot altitudinem surgente, striato, in ramos varios diuiso: folia plùs minùs dodrantalia, quædam palmaria; tum alibi, tum ramorum diuinationi subiecta; pronà parte tomento incano vestita, alterà viridantia, lacinis diuisa ad costam vsque profundis, quatum singulæ in vnciam & longiorem, rigidam, infestamque spinam delinunt,

*Carduus
Morianus
Echinopus
maior.*

*Spina alba
quorundam
Carduus
galactites
Cardi-
nopus minor*

*Spina alba
siluestris
Fuchsi
Scolymus
satiuum.*

*Scolymus
silu.
Eringium
montanum.*

*Card. capite
tomentoso
Jo
Carduus
stellatus*

*Card. benedictus
Leucacantha.*

*Cyperus
Rhamnus 1.
siue Mons-
pelianus.*

*Rhamnus
cum spon-
dylo, siue
tertius.
Oxycantha
Matth.*

*Rosa silue-
stres.*

*Garyophyl-
lata.*

Descriptio

Sphærocephalus
max Cam.

Cardi sphærocephalus
acu-
tus Dod.
Spina alba
Lob.



spatia quoque
interiecta tota
spinis horret:
singulis ramis
acutus insidet
sphaericum,
Cardui echino-
pni glomeri
simile, sed
spinosum.

Camer.hort.
Sphærocephalus
maximus.

H.Lugdun.
pag.1482. Car-
dus *Sphæro-*
cephalus acu-
tus Dodonæi.

Lob. Adu.
Spina alba
quam Bede-

guaram Arabes vocant, nec tamen villis notis
notiorem faciunt Melues aut Serapionis inter-
pretes, &c. Non est hæc quam sibi m. s. m. olim
Pataui Senentis dat: ceteris omnibus jugula-
tis sententiis, ut suam ambrosiosè et trudi terri-
dendis argumentis, & plus allaturis ad suam
ipsius quam ad aliorum refellendam. Obseru.
pag. 481. Icon. Plant. Tom. 2. pag. 9. *Spina*
alba.

Matth. re-
preh.

Spina alba
altera
Matth.

Matth. in comm. in Diosc. cum magnis fig. Lat.
lib. 3. cap. 12. *Spina alba* altera, quam legitimam in
contextu dicit, ac eius primo loco imaginem se
exprimere ait, misisse que ad se Pataui Jac. Ant.
Cortusum, quæ notis omnibus genuinam repræ-
sentet. Si quidem folus sit albo Chamæleoni si-
milibus. In comm. Ital. cum mag. figur. inquit:
Spina bianca. *Spina alba* si legitima prouenit in
Italia non possum aliud affirmare, quam eam esse,
quam misit Cortusus. In lat. comm. transpositâ
figurâ, quæ primo est loco debuit esse secundo,
ponit solam imaginem sine descriptione præter
repetitam frustra ex Diosc. quam olim attribue-
bat alteri plantæ: existimo hanc plantam illi fuisse
ex sola figura notam & tamen asserit legiti-
mam suo more.

Matth. no-
tatur.

Casp. Bauhin. apud Matth. *Spina alba* r. Mat-
thioli.

An Fuchsius de hac dicit in hist. vidimus her-
bam peregrinam siccam, quæ haud dubiè vera
Spina alba erat? An Gesn. de coll. stirp. fol. 109.
Spina alba Dioscoridis, Cardui genus? An Car-
dus Leucanthemus Schvvenckfeldij sit *Spina*
alba Aduersariorum?

Locus &
Tempus.

Spina alba nomine fuit nobis datum Cardui
semen quod in horto prouenit Genæ & ante
Lugdunum prouenerat etiam: in horto nostro,
hiemem pertulit ac floruit Iulio. Obseruavi
etiam Bizantijs & Patauij tum in horto publico,
tum in alijs.

ECHINOPVS MINOR.

Descriptio

Digito minor est radix, rugosa, in plura capita
fissa, ex quorum unoquoque caulis unus
pullulat dodrantalis & longior, propter lanugi-
nem densam totus albicans, ex quo prodeunt
crebra alternata folia, quorum quædam parum
cauli longitudine cedunt, alia vnciâ paulo ma-



iora, tenuissi-
mè & ad co-
ritam usque in-
cisa, spinosa,
infra lanugine
molli candi-
dâque veluti
& costa, pube-
scentia, super-
nè virdantia:
summo caulis
cacumini,
sphaericum in-
sidet capitulû,
minus quam
Echinopsi ma-
ioris, flusculis
cyanei coloris
glomeratum.

Camer.hort. *Sphærocephalus*
Spina alba Cam.
lus annuus

flore caruleo in satis magnum globum redactio.
Icon. p. 45. *Sphærocephalus* annuus.

Lob. in Adu. picturam habet Cardui cuiusdam *Lob. rana-*
huic plantæ correspondentem quem existimat *mr.*
Rutrum siue Rutrum Theophrasti secundum
Anguillaram: verum aliter se rem habere com-
periet, qui eorum descriptionem vel ipsam plan-
tam conf. ret cum Anguillara descriptione, Icon.
Plant. Tom. 2. pag. 8. Rutro floribus caruleis Ad-
uers. pag. 369. *Retro fl. ca-*
ruleo.

Hunc primò obseruavi inter Monspelium & *Locus &*
Percus. Est verd mihi nunc in horto E.C. annua *tempus*
planta quæ quo anno facta caules & flores pro-
fert Iulio & Augusto, & Septembri semina matu-
rat, quibus deciduis perit, ac sequenti anno ex his
renouatur.

DIPSACVS EX VETERIBVS.

CAP. XIII.

Dipsacus quoque aculeatarum stirpium ge- *Dipsacus*
neri à Dioscoride ascribitur. *Diosc.*
Caulem habet *Diosc.*
altum spinis horridum & folia *Diosc. l. 3. in*
a mula, caulem amplectentia *varia.*
[*σφαιροειδὴ τὴν ἰσ-*
χὴν, var. caret] bina in singulis geniculis, prælonga,
[*σφαιροειδὴ*, sublonga *σφαιροειδὴ* vet.] quæ & ipsa acu-
leata sunt, ac ceu quædam bullas in dorso medio
intus forisque spinosas habent: concavos autem
sinus [in altero est *καύλα*, alij *καύλα*] qua
parte folia illa copulantur, ad geniculum (*πρὸς*
τὸ γόνυ, addit vet.) quibus aquas ex rore & imbri-
bus in sese colligunt (*καμίζον*, vet. *καμίζον* ser-
uant,] unde & Dipsaci quasi sitientis, no-
men traxit. At in cacumine caulis singulis bruc-
lis singula insunt capitula, echino similia, oblon-
ga & aculeata: quæ quidem arte facta candida spe-
ctantur, diuisa verd per longitudinem in me-
dia medulla vermiculos ostendunt. Huius ra-
dix è vino decocta tusâque, usque dum cerati Vires
crassitudinem acquirat sedis rimas & fistulas im-
missa sanat. Verum hoc medicamentum æneâ
pyxide recondendum. Aunt & ipsum myrme-
ciarum, verrucarumque pensilium medelam ef-
fe. Ceterum capitulorum vermiculi, solliculo illi-
gati, & collo brachiòve appensi febres quartanas
curare perhibentur.

Dipsacum alij inter spuria Dioscoridis Croco- *Nomina*
dion vocant, alij Chamæleonem, alij Onocar- *spuria.*
dion.

dion, alii Veneris lauacrum, Romani Veneris labrum, alii Veneris Carduum, Aegyptii Sefencor, alii Chir, alii Meles, Daci Sciaren.

Dipsacus
Planta

Dipsacum ita descripsit Plinius, ut multum lucis Diolecor. afferat. Dipsacos, inquit, folia habet Lactucæ, bullas spinosas in dorso medio, caulem duorum cubitorum, iisdem spinis horridum, genicula eius binis foliis amplexantibus, concavo alarum sinu, in quo subsistit ros salus. In cacumine capitula sunt echinata spinis. Nascentur in aquosis. Sanat rimas sedis. Item fistulas decocta in vino radice, usque dum sit crassitudo ceræ, ut possit in fistulas collyrium mitti. Item verrucas omnium generum.

Tempera-
mentum ex
Galieno
Apuleio
et
Celso

Galenus Dipsaci spinæ radicem secundo ordine liccare dicit, & quid extersitum habere.

Dipsacus
nostratus

Dipsacum cum Chamæleone albo confundit Apuleius. Siquidem Chamæleonis albi, curationes & virtutes Dipsaco attribuit. Dipsaco autem præter paulo ante recensita nomina etiam hæc adscribit. Dipsacon quidam Græcorum nominant Cneoron, alii Meletam, Prophetæ Aphrodites lutron, alii calycem Cardion, Aegyptii Semmeor, alii Cinaram rusticam, alii Statoron, alii Morariam, Hispani Analenudium, Aegyptii Gerbaste, alii Sapha.

Chamæleon

Qui quidem Latine labrum veneris & Carduus magnus appellatur, à similitudine quadam

Dipsacus

Chamæleon dictus est, scilicet ad herbam quæ inter aculeatas proprie sic vocatur, Humelbergio teste.

Onocardi

Sed & Crocodilii appellationis eadem ratio est. Dipsacus verò appellata est à siti, quam Græci

Meletam

δύψακον dicunt, vel quia humorem illum contra eam paratum semper habet, aut quia iuxta fontes & locis humidis nascitur. Onocardi, id est, asini

Meletam

Cardui, factum illi ex Græcia & Latina voce nomen, & enim asinus est. Meleta dicta videtur à capitulorum figura, oblongiori instar pomi,

Meletam

quod Græci μήλον dicunt. Aphrodites lutron, hoc est, ut inter Latinas appellationes habetur, labrum Veneris

Meletam

αἰνιδίου enim Græcis Venus est, πύργος verò, vas aquarium quo in balneis ad lauanda corpora utebantur, & quod Labrum Latine dicitur: sunt tamen non solum aquaria sic dicta vasa, sed olearia quoque & vinaria, in quæ oleum & cortina, & vinum à lacu transfertur.

Calyx cardii

Calyx cardiacus appellata est à figura capitulorum quæ oblonga instar cordis existunt & baccæ rosæ, antequam tota aperiantur: καρδία enim Græcis cor est, & αἰνιδίου verò totæ baccæ dum adhuc clausa est rosæ, & omne putamen in quo aliquid includitur, significat. Quemadmodum porro pro Chamælea Chamæleonem, sic etiam pro Cicere rustico Cinaram rusticam, id est, sylvestrem, reponendum censuit Humelbergius, eo quod spinæ albe, quæ Cinara sylvestris etiam dicitur, sic quodammodo similis.

Calyx cardii

Illud nobis cum multis persuasum habemus

Equinoca

Dipsacum Diolecoridis esse herbam quæ adhuc hodie Dipsaci sativi nomen à quamplurimis ob-

Dipsacus

tinuit. Huius Dipsaci est & alterum genus sponte proveniens, quod Dipsaco Diolecoridis nullis

Dipsacus

notis repugnare dicit Matthiolus. Quam bene videndum postea. Dipsacum sylvestrem folio

Dipsacus

laciniato, non visâ prius Tabern. figurâ descrip-

Dipsacus

simus, ac ita inscriptimus. Dipsacus, officinis & herbariorum vulgò Virga pastoris, non sine

Dipsacus

errore nominatur. Mathæus Syluaticus Pandætarum author, in grauiorem errorem lapsus

Dipsacus

Dipsacum cum Polygono turpiter confundit,

Dipsacus

Tom. III

Polygonum

qui quidem tantum à Polygono differt, quantum lepores ab ursis. Dictamno Gretico, ut videre est lib. 28. Dipsaci nomen quoque adscribitur. Dipsacon tandem etiam de Aspalatho dicitur.

Dictamno
Gretico
Aspalatho

DIPSACVS SATIVVS.



Descriptio

DVorum. Durs. triū cubitorum aut etiam maiorem altitudinem assequitur caule pollicari, recto, rigido, multis aliis concavo, striato, spinulis quibusdam horticæ, folia bina opposita, ita continua inuicem sunt ut ea caulibus transadigat & concavum labrum excipienda aquæ efficiant, am-

pla, longa, non minus caule horrida: capitula quæ pugnum impleant oblonga, vinctatis hamulis rigidissimis, deorsum spectantibus minacia: inter quos stili emicant, bulbuli instar colore ex albo tantillum purpurascens: radice verò nititur læuicandida.

In omnium ferè stirpium genere, si Trago credimus, duo fastigia statuere licet, nimirum ut vnum sativum, alterum verò sylvestre aut erraticum dicatur. Id quod in hoc Carduo

Dipsaci ge-
nera

Dipsaco vel maxime locum habet. Est enim sativus quem iam descripsi, & sive spontis, de quo infra verba faciam. Alii [et Lonic.] in marem & scemnam Dipsacum distinguunt. Sed error hic desumitur ex Pandectario, ut bene mo-

Dipsaci se-
xus
Error Lo-
nic. et
Error Pan-
dect.

ment Monachi, dicentes: Pandectarius errans tribuit anam pluribus unionibus errandi. Quia in suo capite Dipsacos duo capitula Serapionis immiscuit, scilicet capitulum rosæ, quod est de

Carduo Dipsaco, scilicet Labro Veneris, & cap-

381. quod est de Virga pastoris, scilicet de Sanguinaria seu Polygono. Cuius erroris Pandectarium etiam arguunt Fuchsius & Matthio-

lus.

Dipsacus autem sativus dicitur Trago

Card. ful-
leni Trago

Cardus Fullonum; Carduus Fullonius. Huc sativus: Isque una figura utrumque comprehen-

dit.

Matthiol. in prioribus com. Dipsacus, siue labrum veneris: In post. comm. cum magnis figur. Latine & Italicè Labrum Veneris, siue

Labrum Ve-
neris, Matth.

Dipsacus: In Histor. germân. cum addition. Camer. Dipsacus, Labrum Veneris, & Carduus

fullonum: In Epitom. Labrum Veneris. Ait autem Matthiolus [& subscribit Agricola. Medic. herb.] in huius capitibus reperiunt ver-

Matth. ex-
opinio ex-
plesa,

miculum, quamvis Marcellus sibi nunquam

compertum scribat. Reprehendit præterea Sylva-
teum Diplacum cum Polygono confundentem.
Is autem suo more Diplacum non describit in
comm. nec nouis satuum à siluestri distinguit.
quem olim non pingebat. Camerario apud Mat-
thiolum est noua figura, dicenti esse quorundam
Spinam Selenitum Theophrasti, & Galedragon
Xenocratis, apud Plinium.

*Spina Sele-
nitum Theo-
phrast. Ca-
mer.
Galedragon
Xenoc. An-
guill.
Synon.*

Galedragon, cuius meminit Xenocrates, in-
quit Anguillara epist. 8. videtur Dioscoridis Di-
placus, qui dicitur Labrum Veneris, Græcis nunc
ἀνὰ δὲ πύλινδρις.

Diplacum vocatur à Matth. Trago, Cast. in
cat. pl. Rob. Cöstlin. lex. Euch. Roelslin, Turn.
Fichsli, & Tabern. Icon. & Hist. Labrum Veneris
Matth. Corn. in Dioscor. Cast. Catalp. Turn.
Diplacus satius Ponz in Baldo, Dodon. Gall. &
Lat. in fol. Cord. in Hist. Gels. hort.

*H. Lugd. 2.
scener.*

Ponz in Baldo. Diplacus satius, vel Galedra-
gon Xenocratis, Anguillario, seu Spina Selenitis
Theophr. Guilandino.

H. Lugd. p. 1447. Diplacus seu Labrum veneris
Matth. Item Diplacus satius alter Matthioli.
Dux figuræ ex eadem plantæ.

Euch. Roelslin. pag. 59. Cudo fullonum, Virga
pastoris. Labrum Veneris. Eulen strock / Carten
distel / hertenstaf / frau Venus badt / weber farten:
duo genera vnum molle, alterum pungens, am-
bo calidæ naturæ. subraneus calor, qui tamen fa-
cile euanesceat. Debedisteln habeat aliquid frigi-
ditatis. Quanta ignorantia Euch. qui hoc loco nō
scit quid scribat, & ineptè p. 123. Carduum Mariæ
vocat Labrum Veneris: præterea iconem Diplaci
habet quam postea iterum ponit pag. 23. nomine
Virgæ pastoris ac pro mare describit.

*Euch. igno-
rat.*

Lobel. A lueri. Diplacus satius Fullonum.
Obi. p. 487. & Icon. pl. Tom. 2. p. 17. Carduus Ful-
lonum, siue Diplacus satius, siue labrum Ve-
neris.

Casp. Bauh. apud Matth. Diplacus satius albo
flore.

*Nomina
linguarum*

Planta hæc Græcis Diplacus vocatur sicut &
Lat. Item ἀγροδίτης autem: Lat. Labrum Vene-
ris, Carduus Veneris, Carduus fullonum & vul-
gò virga pastoris Dod. Germ. farten distel / far-
tenstaf / Eulen strock / & weber farten. Belg.
Caerden / Voldero Caerden. Gall. Cardon, Char-
don de foulon, Chardon à carder, Verge à bergier. Ital.
Dissaco & Cardo, & Cardo da donna. Hisp. Cardencha
& Cardo penreador. Angl. Tassel Boh. Stiefsa.
Hung. Bogach fóro / Polon. Szczytki.

Diplacus

Diplacus autem, ut dictum, quasi sitiens
dicitur, quoddam aquam in cohærentium folio-
rum sinu contineat, quæ ad suis iniurias abi-
gendas utatur. Labrum verò Veneris à foliorum
etiam positu, peluis vel lauacri speciem consti-
tuyente, humorem perpetuò continente.

*Labrum Ve-
neris*

Cardui fullonis nomen tolerari potest, inquit
Tragus, modò sciamus Carduum fullonum nihil
aliud esse quam Diplacum Dioscoridis, quem ali-
qui Crocodilion vocant, alij Chamæleonem, alij
Onocardion, alij Veneris lauacrum: Romani La-
brum Veneris, alij Carduum Veneris: Egyptij
Sesenor, alij Chir, alij Meleta. Daci Sciarâ vocat.

*Locus &
tempus*

Diplacum quidam Montebardi diligenter
in hortis colunt. Sed & nos cum habemus in
Horto E. C. Seritur in compluribus Italiæ locis,
præsertimque in agro Bonomeri, singulari à
cultoribus: dhibita diligentia ad lanificia. Iunio
ac Iulio floret: echinata capitula Autumnò col-
ligenda sunt.

DIPSACVS SYLVESTRIS, SIVE Labrum Veneris.



VT satius Descriptio
Dipsaco

congener est
sylvestris, ita
rò paucis cum
eo nous con-
uenit: pari can-
lis spinosi alti-
tudine ramo-
rumque diuari-
catione: folio-
rum non dispar
amplitudo & la-
bri emulus coi-
tus, quæ spinis
non secundum
costam dunta-
xat minacibus
armata, sed &
reliquo quocq;
folio, quib. op-
posita parte co-

lylæ respondent. Echini spinis vt longiorib. quàm Echini.
satius horrent, ita & minioribus, minùque rigi-
dis nec aduncis, ex quorum sinu flores emicant
purpurantes: radix & semen satius similia.

Matth. in Diosc. lib. 3. cap. 11. Diplacus sylu. nul-
lis prorsus repugnans notis, quas illi reddidit
Diosc. Inuenitur autumnæ tempore, in eius ca-
pitulo iam exarefacto medullitùtque dissecto
vermiculis, etsi Marcellus dicat sibi hunc nun-
quam compertum: Diplacus officinis & Herba-
riorum vulgo virga pastoris maior nom. natur.
Id comm. cum magn. figur. lat. & ital. ceu & Epit.
Camer. Labrum Veneris alterum, In Hist. Ger-
man. wilde farten distel, Diplacus sylu. & ita
etiam vocatur Dodon. latin. in fol. pagina 723. Matth. nō
Matthiolum quasi ex libris senberet non vi-
so Diplaco, non ostendit quæ in se dfferat
sylu. à satius: in hist. etiam Germ. transposita
figura.

Fuchs. Hist. Diplaci alterum genus spontè pro-
ueniens Diplacus purpureus, floribus purpureis,
Gall. Chardon à foulon rouge, in cavitatē echini in
quibuldam vermiculi reperi. Icon. p. 128. Dip-
acus purpureus. Braun farten distel.

H. Lugd. p. 1448. & Ponz in Baldo Diplacus
sylu. maior Fichsli. Carduus fullonum Brunfels.
Carduus fullonis erraticus, Trag. Labrum sylu.
Veneris. Cast. Labrum Veneris, Corn. in Diosc.
Lob. Icon. Labrum Veneris stoculis purpureis
Cet. Diplacus Brunfels. Lonic. Tab. Dip-
acus sylu. Dod. gall. & fol. Cord. in hist. Gelsner.
hort. Thal. & Turn. Molybdæna Plin. Dalecham-
pio in Plin. C. Bauh. apud Matth. Diplacus 2. siue
sylu. flore purpureo.

Dipsaci sylvestris siue Labri Veneris nomina
& autores qui de eo scripserunt sub præcedenti Dip-
saco sunt annotati. Multis in locis præuenit spontè
etiam in Horto E. C. Item quæritur Betor court:
Geneux, quæritur ad montem salene & alibi. Ba-
sileæ repertum cum suo flore purpureo mense Octo-
bris apud fluvium Birse in yrb. Lugduni abun-
dat. Inter Horbourg & Colmarium copiosè pro-
uenit. Diplacus sylu. ad secl. serè pro-
uenire, & in aquosis, scribit

Turnerus.

DIPSA-

DIPSACVS SYLVESTRIS FOLIO-
laciniato.

Descriptio



Protera plā-
ta est, duo-
rum, triumve
cubitum, &
interdū altior,
radice crassā,
simplici, albā:
caule recto ad-
uerlis ramis
brachiato, striato,
aculeis hor-
rido: folia val-
de ampla, lon-
ga, lataque, spi-
nis duntaxat
secundum co-
stam & averso
folio, armata,
non bullata,
profundē laci-
niata, in labri
formam coeun-

tia: atque hoc quidem genus laciniatum, flores
habet albicantes, & vulgaris instar quadripartos,
ex aculeorum carina, quibus echinus oblongus
horret, mitionibus tamen & longioribus spinis
quā in Dipsaco sativo, nec ut in illo aduncis,
semen oblongum striatum.

Dips. Tabern. Icon. & Hist. Dipsacus secundus.

*Dipsacus folio dissecto sylvestris copiosē pro-
uenit inter Horburgum & Colmarium, ibi colle-
gi semen quod satum in Horto Ill. E. C. provenit,
primo anno caulem non protulit, florebat lunio.
Hunc Dipsacum observavi etiam inter Roufach
& Colmarium.*

*Vires ex Veterib. antē sunt traditæ, aunc quid
Neotorici sentiant, adscribendum. Aqua ē foliis
Dipsaci destillata colluta vlcenibus & putredim-
oris opitulatur, inquit Tragus: folia capiti impo-
sita phrenesin sedare tradunt: aqua quæ in folio-
rum concavo reperitur, caliginosis & rabentibus
oculis prodest: eadem maculas faciei, maxime
eas quæ oculis subsunt emendat & exteri colu-
ti: mulicula forma studiose vsum huius opti-
mē tenent. Hodie verò, auctore Dodonæo, exi-
guus est vsum in medicina Dipsacus, capita ad in-
terpolandum laneos pannos usurpantur. Dip-
sacus in Italia vulgaris est planta, auctore Matth.
iis præcipuē locis ubi lanificia exercentur: Siqui-
dem echinato eius capitulo mangones rudem
adhuc parum pectunt, expoliunt, detractisque
floccis concinnant. Vermiculus in capitulo quem
collo adalligatum quartanis febribus remedio ef-
se produnt, piscatoribus hamo affigendus maxi-
mē expetitur. In fluxu mensium nimio exhibet
Io. Liebaud drach. i. Dipsaci sativi cum ovo sorbi-
li. Quædā aliz facultates à Seraptonis interprete
& aliis recētorib. illi conceduntur, quæ non sunt
genuinæ sed spurix & Polygono adscribendæ. I-
neunte hyeme, ait Turnerus, Cardueles consue-
verunt ad Dipsacum, seminis caullā, cuius appe-
tentissimi sunt, conuolare.*

Ordi

Ad paucos.

Macer

Descriptio

Tota facie Dipsacum refert, quatuor & quin-
que cubitos alic, caule ditali, glabro, osten-
jis, ex quibus duræ mordacitq; spinulæ oriuntur,
secundum longitudinem striato, concavo, & in
Tom. III.



ram spectant per nervos dispositis armata: at
capitula Dipsaco multum cedunt, Scabioz cap-
tulis parva, strobilis albis, quadripartis, labello
paullō reliquis lacinis productiore, apicibus par-
tim cineraceis, partim atropurpureis, confertim
stipata: quos intercedunt nigricantes pilosæ &
mollicellæ spinæ, secus quā in Dipsaco, longio-
res item, & in mucronē magis directæ. Monspeli
cū degustare sapor mihi Præaginis videbatur
cū quadam saltugine, licet non esset apud mare.

Est hæc Trago Cardui folio tertium genus, Card. fol.
quod ad Atractylidis aliquod genus referri pos-
se putat. Virga pastoris Matth. Lobel. in Adu.
Obs. p. 487. I. 6. Plāt. Tom. 2. p. 15. & Camerario, cū
& Dips. sativus. Dipsacus tertius Dod. gall. & Lat.
in fol. eui & Gledrag. Plinii. Dipsaci species mi-
nor, Gein. hort. Dips. minor siue Virga pastoris
Thalio, Dipsacus silu. minor C. B. ubi apud Michi;
& H. Lugd. eui & Pūbago Plinii quorundam.

Prope Arbouans provenit copiosē. Genevæ
etiam observati, & Basileæ inter portam Stein &
Eshen extra urbem mense Octobri. in vis ad vi-
neas & prata, ac etiam ad fluvium Rur in tra-
hem, mense Augusto florentem. Genevæ mense
Novembri. Monspeli in prato vicino urbi flo-
rante mense Aprili & Maio.

CARDVVS ACANTHVS SIVE
Brancha vrsina.

multos ramos
brachiato: folia
gemina ad ge-
nacula nascun-
tur, opposita,
minimē caulem
amplectentis,
sed pediculo
vnciali, nonnū-
quam brevior-
re, appensa, infi-
maque parte
auriculis binis
donata, post
aunculas ab an-
gusto principio
sensim dilatan-
tur, & in mu-
cronē desinunt
ac serrata sunt,
spinis quæ ter-

Card. fol.
long. Tragy

Dips. minor

locus &
tempus.

Descriptio

Acanthi
folia humili-
fusa, pedalis,
profundē laci-
niata, mollia,
intenso viro-
re splendent,
pilosa: inter
hæc surgit cau-
lis duū triū-
ve pedum, re-
ctus, qui à me-
dio ad summū
usque fastigiū,
thyrsus gerit
florū cardo-
rum, quorū fo-
lia rictum imi-
tata, oblonga,
foliis cōp. cen-
tur virentibus,
K.

per extremum laciniatis nonnihil & spinosis, medium occupantibus staminibus crassiusculis: semen in oblongis continetur pericarpis: radices longè lateque vagantur, foris nigrae, intus albae, sapore glutinoso & viscido, ut & folia.

Acantha
Diosc.

Acantha, siue Herpacantha, ut Dioscorides memoriae prodidit, folia habet multo latiora ac longiora quam lactuca, fissa velut Brucæ folia, subnigra, pinguis laevis. Caulē laeuem altitudine duorum cubitorum, digiti crassitudine, ex intervallo ad verticem foliosis quibusdam circumdatum, velut pileolis oblongis, spinosis: è quibus flos prodit albus: semen est oblongum, melini coloris: caput autem thyrsi figura. Radices subsunt viscosae, mucosae, ignei ruboris, longae.

Acantha
Plinio.

Acantha siue Acanthus, ut Plinius & Galenus vocant, est topiaria, inquit Plinius, & urbana herba, lato, longoque folio, crepidines marginum, adurgentiumque puluinorum toros vestiens. Duo genera eius sunt, aculeatum & crispum, quod breuius (de hoc postea agemus) alterum laeue, quod Paderota vocant, alij Melamphyllon. Ita Plin. sed Diosc. descriptio elarior est, euentiusque depingit eam, quam & Officina & vulgus Herbariorum Brancam vrsinam Italicam vocant, & nostri, inquit Cornarius, melsch Beerenflaw: Nam alia est quam Germanicam, aut etiam simpliciter Beerenflaw dicunt: à similitudine foliorum ad vrsi pedem.

Branca
Græca
ital.
est alia à
Germ.

Acanth.
Græca
Branca
Græca
est eadem
est.
Matth. re-
gionis.

Eos non aberrasse existimat Matthiolus qui Acanthum & Brancam vrsinam, vnam & eandem plantam esse scriptis tradiderunt. Sed cum Branchæ vrsinae denegat spinas in comm. in Dioscor. quas tamen habet, ac etiam ipsemet in Histor. Germ. ei concedat: satis apparet quantum Matthioli scriptis credendum, qui modò rem concedit, modò negat: præterea apud Dioscoridem legitur *πυλίσκος ἀκανθάς*, foliis spinosis, & non spinis horrida, ut ait Matthiolus.

Brancam vrsinam ab Antiquorum Acantho haud discrepare statuit cum Veteribus & plerisque eruditis Langius: verum ab eo dissentit Guilandinus, post longam controuersæ agitationem in epistol. ad Langium concludens Brancam vrsinam Italorum haudquaquam à Dioscoride celebrari.

Guilandino subscribit Camerarius in Epitom. Matthioli dicens: Tametsi Acanthus, qui vultis in hortis reueri: folia spinosa non habeat: non tamen ob id spurium id esse fuerit credendum. Siquidem (ut Plinius est author lib. & cap. 22.) duo Acanthi habentur genera, alterum crispum aculeatumque, alterum laeue.

Topiaria

Acanthi pueri in florem sui nominis versi fabula nobilis, quem *παιδα* à puerili, ut suspicatur Kyberus, amore Græci vocant. Aliqui Topiariam cognominarunt, quod à historiali facilitate in omnes formas vegeta virēque trahatur, ut in varias animalium effigies duci, & figuras exprimere multarum rerum possit. Græci quoque Melamphyllon appellant, quod solum saturato vitore nigrescat alijs comparatum, quæ diluiori colore placent. *Μελανφύλλον* quoque Latinis audio nominari: quæ vox omnibus Diosc. exemplaribus deprauata cognoscitur, quod Acanthi folia Columnarum maxime Corinthiarum capitulis insculpebantur, quarum identidem tam scapi quam vertices marmore splendebant. Frondibus Acanthi ut lib. 4. capit. Vitruuius scriptis mandauit, columnas Corinthias veteres Architecti coronabant, quarum effigies adhuc hodie nostris

Melam-
phyllon.

Marmora-
ria.

sele frequenter oculis offert.

Carol. Stephan. in prædio rustico, Acanthum siue Acanthos, siue Acanthi, inter herbas emollientes meministi verbis. Acantham, quæ in acetariis non venit, vulgus Brancam vrsinam appellat, nisi mauis dicere, Brancam hircinam: Folia enim habet cornibus hircorum similia. Cæterum emollienda alui facultatem retinet, unde à Virgilio mollis Acanthus dicitur:

Ille comam mollis iam cum runderet Acanthi.

Et à medicis inter quatuor remollicina, quæ appellant, annumeratur, quibus vtuntur in decoctione clysterum. Plinius lib. 22. cap. 22. Acanthus, inquit, est topiaria & urbana herba, lato longoque folio crepidines marginum assurgentiumque puluinorum toros vestiens. Duoque eius genera facit, aculeatum & crispum. Porro Acanthi folio Veteres ob pulchritudinem & figuræ elegantiam epistylia communiebant, & vestibus preuosis figuram Acanthi foliorum circumtexebant. Vnde Virg.

Et circumtextum croceis velamen Acanthi.

Satis suam ignorantem demonstrat Carolus Stephanus: quæ obsecro similitudo foliorum Acanthi cum Hirci cornibus, quæ simplicia, non ramosa, aut in partes diuisa: fortè dicta est à pedibus vrsi.

Carol. Steph.
phani non
tatur.

Acanthum nominat Matth. Cord. in Diosc. Synon. Lacuna, Anguill. Lonic. Cast. Gesner. In append. & Celsipinus, qui ex eius succo glutinoso gummi Tragacanthæ emulum quoddam facere prodidit. Acanthum verum Camer. hort. vocat: Acanthum verum Fuchsius, qui in Diosc. Mamolariam deprauatè legi testatur. Acanthus verus satius, Herpacantha, Melamphyllon, & Branca vrsina Italica Trago dicitur, qui figuram habet in fine operis sui. Acanthus satius appellatur à Dod. gall. & Latin fol. Gesn. hort. Lob. Aduersp. 365. Obsp. 477. Icon. Plant. Tom. 2. p. 2. & Tabern. Icon. & Historia. Acanthus satius Matthioli Hist. Lugd. p. 144. Acanthus satius Calp. Bauh. apud Matth. cui & Acantha herba Theophrasti, ubi Spinam Gaza vertit, & Acanthus mollis Virgilij. Branca vrsina Romana, herba Topiaria, Acanthus Græcorum & Paderotes, de qua Virg. in Nuc. Eur. Cordo.

Mamolaria
deprauata

Quam Græci *ἀκανθὴ* & *ἀκανθῶν* nominant, *παιδα* quoque appellatur, & *μελανφύλλον* Galeno, Orib. & Plinio autoribus. A Lat. Acanthus quoque dicitur & Branca vrsina (licet alij Spondylium Brancam vrsinam vocent,) Germ. & Belg. Beerenflaw. Gallicè *Branche Orfine*. Ital. *Acantho* siue *Branca Orfina*. Hisp. *Terna giguare*, & *Branqua Vrsina*. Boh. *Alfaut*. Dicitur verò Branca vrsina à similitudine, quam eius folia cum anterioribus vrsorum pedibus habent.

Nomina
linguarum

Acantha, authore Dioscoride, nascitur in hortis, & petrosis ac humentibus locis. Acanthum satium habeo Montbelgardi in orto Ill. E. C. qui mihi lapidis prouenit ex semine, semel verò tantum floruit & semen protulit. Basileæ mihi etiam ex semine nata. Monspelijs abundat in hortis, & in quibusdam muris. Vbi florantem vidi mense Aprilis, Maio & Iunio. Obseruari Patuij & Bononiæ in orto sancti Saluatoris alburgo di sancta Catharina, Genez in plurius hortis. Lugduni frequens in hortis.

Locus &
Tempus.

Acanthæ Dioscoridis radices ambustis & laxatis commodant in cataplasmate impostæ. Potæ eadem vrinam ducunt, & aluum sistunt. Tabidis item, rupis ac conuulsis profunt. Eadem

ferè

ferè Plinius. Radices. vltis luxatque, mixtè pro-
funt. Item ruptis, conuulsis & phibylis metuenti-
bus incoctæ cibo, maximè pifana. Podagris
quonque illinuntur trita & calefacta calidis. A-
canthus aurore Galen, vim habet moderatè dif-
cutiendi. Radix autem ficut & leniter fecat, &
tenuum partium eft. Videtur Galenus, aut eius
Amanuenses quas facultates Dioscorides Acan-
thio attribuit Acantho assignaffe. Interpres de-
buiſſet vertere apud Dioſc. non luxationes fed
torſiones aut hgamentorum tractiones. Acan-
thi fatium folia, vt perhibet Dodonæus, temperie in
calidi & frigidi medio quali confiftunt, nonni-
hil humida, emollientem ac leuiter digerentem
facultatem, veluti Malua, obtinent. Enematis id-
circo non minus quàm Malua vtiliter incoquun-
tur. Profunt autem tabidis ſanguinem ſpuenti-
bus, cum ex alto delapſis, ab icu, aut conatu ali-
quo ſupra vires laſis, non minus quàm Symphiti
maioris radices, quas ſubſtantia, lento ſucco, &
qualitate proxime referunt.

CARDVVS ACANTHVS SIVE BRANCA Verſina ſpinola.



Acanthus
ſylueſtris
Scolymo ſimi-
lis aculeatus
Dioſcoridis, an
Chamæleonta
Môſpeliennſis ?
an num potiùs
hæc noua acu-
leata Branca
Verſina, ſive A-
canthus acu-
leatus Lobelia
Brancæ huius
Verſinæ ſive A-
cathi varietatis,
in agro Beno-
nienſi Lom-
bardicæ aded
flores & folia
ſimilia ſunt
huic Acantho
ſpinolo [forte

legendum, ſimilia ſunt Acantho ſatiuo] vt nobis
perſuaſum fuerit Dioſcoridis eſſe Acanthum ſyl-
ueſtrem quem Dioſcorides aſſimilauit Scolymo
ſilv. & ſatiuo Acantho hreniorem & aculeatum
dixit.

Quod genus Acanthi Plinius aculeatum &
criſpum ac hrenius dixit, velut precedenti capite
monuimus, hoc eſſe videtur, teſte Cornario,
quod Dioſcorides ſylueſtrem Acantham appella-
uit, & cuius radicem eadem, quæ Acanthum ſa-
tuum, poſſe prodidit.

Lob. Icon. Plant. Tom. 2. pag. 2. Chamæleonta
Môſpeliennſium quoad iconem. Huic enim in-
ſcripta Typographi falſus impoſitus titulus. Siqui-
dem hanc in Obſ. pag. 477. Brancam Verſinam ſi-
ue Acanthum aculeatum inſcripſit. H. Lugd. p.
1445. Branca Verſina aculeata Lobelia. C. Bauh.
apud Matth. Secundus Acanthus ſilv. ſpinola.

Anguill. epiſt. 8. pag. 147. Acanthus ſilv. Her-
barius Bononiennſibus Branca orſina ſaluatica.
Cam. apud Matthioli. Acanthi ſpecies ſpino-
ſa ſpontanea circa latus Bononiæ, quæ non male
Tom. III.

conuenit cum Acantho ſilv. quæ etiam in qui-
buſdam locis maritimis reperitur.

Vidimus Baſileæ in horto D. Diſ. Iacobi
Zuyingeri cui creuſtat ex ſemine mullo ex Creta,
vnde etiam nos accepimus à D. Ho-
norio Bello Medico, ſerendum in horto Ill. C.
V. Vitemb. Monthelg.

Locus &
Tempus.

CARDVVS BENEDICTVS.

CAP. XIV.



Succoſa gra-
ſoli radice
nititur: folia
laciniata Son-
chi aut Dentis
leonis diuſa
ſpinulis pun-
gentibus arma-
ta, colore quæ
in Borraginis
foliis eſt cerne-
re, hirsuta: caulis
digitalis, multis
alis concavus,
ſupinus partim,
partim erectus,
ſubpurpureus,
ſtriatus, villo-
ſus, flores par-
ui, lutei, ſpinis
rubentibus ra-
moliſ, quæ

Deſcriptio.

multa lanugo intercedit, obuallati: quibus ſub-
ſunt ſquammata conformia capſula inter folia
circumſcripta ambientia poſita: ſemen in his conti-
netur oblongum, ſubluteum, ſtoccis appenſum:
inſigni amaro tota planta eſt prædita.

Hunc circa Carduum magni Medici grauiter
lapſi ſunt, Quorum quidam hanc herbam eſſe al-
teram Cnici ſylueſtris ſpeciem: quidam volue-
runt eum per Atractylidem alteram hirsutiorem
ſignificari: quidam Acanthum ſatiuum eſſe ſta-
tuerunt: alii verd Acanthium: nonnulli Scoly-
mum ſecerunt: quidam etiam Cræſſulam mediam:
Senecionem & Chamæleonem, teſte Doſithe-
nio, crediderunt, à quibus herbis ſingulis multis
partibus diſcrepat.

Cnici ſylueſtris alteram ſpeciem eſſe Carduum
benedictum, non ſine graui lapſu crediderunt
Ruell. March. Aduerſ. Lobelia, & Apollo.

Credidit namque Ruellius lib. 3. cap. 56. Atractylidem alteram hirsutiorem, ſeu alteram Cnici
ſylueſtris ſpeciem [ambas namque has lib. 3. cap.
159. inter ſe confundit, eademque indicat] eam
eſſe ſtrepem quæ Carduus benedictus, vel ſan-
ctus appellatur. Eamque opinionem haudqua-
quam improbandam cenſet Matthioli quando-
quidem Carduus benedictus vocatus ſolo pro-
cumbit denſa foliorum comâ, & quodammodo
humicaulis cernitur, quinetiam fructum gignit
anarum, harbzque modo hirsutum: & caules
proſert Sonchi modo rubentes. Quem Bene-
dictum, ſeu ſanctitatum Carduum plebeius con-
ſenſus nuncupauit, alteram Cnici ſpeciem eſſe
iamdud doctis, & mihi (ait Lob. in Aduerſ.) per-
ſuaſum eſt. Apollo rad. in Elect. Hamech,
Lobelia & March. & Ruell. ſubſcribit his verbis.
Spinam albam quidam faciunt Carduum bene-

Acquinoca

Cnicus ſilv.
Atractylis
acanthus
ſatiuus.
Acanthium
Scolymus.
Cræſſula
media. Se-
necio.

Chamælea.

Carduus
ſanctitatus

dictum, id est, secundam Cnici siluestris speciem.

Atractylis hirsutior
Card. gall.
et lat.

Atractylis & Cnicus silu. 2. Theophrasti, secundum Anguillare opinionem, nihil aliud est, quam Carduus sanctus. Hic à Dodon. gall. inscribitur Atractylis hirsutior, Atractylidisque species sit Plinij & Theophrasti. Latinus etiam, quæ de Atractylide Theophr. tradidit, Carduo benedicto adesse credit. Geln. hort. Atractylidem hirsutiorum Fuchsi, Cnicum, & Atractylidem siluestrem cum quibusdam vocat, ac de genere Cnici agrestis cum Fracastorio lib. de cont. 3. cap. 3. esse scribit. Idem fecit & Fuchsi. Hist. cap. 42. ubi Atractylidem hirsutiorum, inscribit, ac gall. *saffran sanuage bonssu* vocat.

Acantha
Lonic.

Lonic. in Diosc. lib. 3. cap. 17. Acantham appellat, & Acanthum, Acanthepopiam, id est, Acanthum topiariam, cuiusque meminisse scribit Theophrastum Idyll. 1. & Galenum.

Licet autem illi Carduum benedictum Atractylidis speciem hirsutam esse statuat, Ruellium secuti, attamen Tragus lib. 1. cap. 114. Acanthum germanicam appellare maluit. Acanthum autem Germanicam, Acanthum satiuam à Dioscoride Herpacantham vocatam esse sibi persuadet. Ego nolum Carduum benedictum vocare Dioscoridis Herpacantham, siquidem nomen illud melius conuenit Brancæ vrsinæ, quæ repit & serpit, quam Carduo benedicto annuæ plantæ, quæ non repit.

Acanth Germanica
Trag. notatur.

Tragus sequitur Harchius in Enchir. mēd. duos faciens Acanthos satiuos, quod non placet. Carduus, inquit, benedictus, Carduncellus quibusdam, sunt qui mollem seu Germanicum Acanthum, siue satiuum quem Diosc. Herpacantham & Melamphyllon nominare videtur, esse existiment. Acanthus German. quem nonnulli Carduum benedictum esse volunt.

Acanthium

Carduum benedictum Acanthium facere sequentes authores, patefaciunt eorum dicta. Atractylis (inquit Fernel. meth. lib. 5. cap. 21.) hirsutior quibusdam, aliis Acanthium, Carduus benedictus. Lonic. lib. 5. cap. 25. Carduus benedictus, Acanthium. Multi se torquent, ait Ryff. lib. 1. cap. 12. in refor. n. phar. germanica, ut Cardui benedicti nomen inueniant apud veteres Græcos & Latinos, si non sit Acanthium aut genus Chamæleontis, relinquam cum consueto nomine. Acanthium, inquit Cord. in Diosc. lib. 3. c. 18. est sine dubio Carduus benedictus, quem Pharmacopolæ Itali Carduncellum vocant. Idem lib. 4. cap. 290. ait. Alterum silu. Cnicum siue Cnecum siue Cnecum Theophr. lib. 6. cap. 4. Diosc. & alij Græci Acanthij nomine indicant.

Carduncellus
italus.

Acanthium non videtur
agricola.

An verò sit Carduus benedictus, Acanthium dubitat Io. Agricola, ut & Cronenburgus, dicens de comp. med. lib. 8. de oleo Hyperici. Carduum benedictum Syluius maluit Acanthium aut Chamæleontis speciem existimare, cuius iudicium hic probare nequeo, cum Græcorum patet ac Latinorum repugnet.

Cnicus agrestis
Andernaci.

Andernaco. Cnicus agrestis. Lob. Obf. p. 484. Icon. Plant. Tom. 2. p. 13. Tabern. Icon. & Histor. Camer. hort. Brunfels. Lacunæ, Dod. Lat. in sol. Cast. Lugdunensi, Theod. Dorst. & C. Bauh. apud Matth. Carduus benedictus. Cæsalp. Carduus sanctus.

Nomina
linguarum

Carduus benedictus dicitur Germ. Geseignes ter distel / Bornsturtz Apollinari (qui vires hoc nomine adscribit,) Klein freuz wurtz Dorst. & Cardobenedict, quarum postrema vox etiam

Belgis innotuit: Gall. Chardon benedict ou benit: Ital. Cardo benedetto, Cardo sancto, siue herba turca: Hisp. Cardo sancto. Boh. fard benedict: Hung. Papa siu, id est, Herba Papæ: in Lemno cæderacantha dictione corrupta, teste Bellonio, id est, Spina alba.

Carduus benedictus prouenit passim in hortis & transtulit. in Hortu E. C. nec usquam repertus est. prouenientem, licet in variarum regionum hortis obseruauerim ut Italica, Monspelij, Lugduni, Patavij, Bononiæ & Genevæ, florentem adhuc & pulchre ac copiose virentem mense Decembri ex semine deciduo. In Lemno Mediterranei maris insula locis campestribus nullâ adhibita culturâ frequens occurrit Petro Bellonio teste; apud Germanos & Belgas, tum & Italos ac Gallos studiosè in hortis colitur. Iulio ac Augusto floret, quo tempore ad medicinæ usum maximè colligendus ac reponendus est.

Tradunt, ut testis est Tragus, Carduum benedictum primum omnium ex India adinuentissimum Imperatorem Fridericum ante annos aliquot honoris gratiâ missum, multisque laudibus celebratum, ut qui in cibo & potu usurpatus ab immenso illo præferret capitis dolore, quem Græci *μαρμαρίαν*, Germ. den Nagel, hoc est, Clauum, quod in eiusmodi morbo tantus caput tenet dolor, ut clauus inter oculos (nam supra illos maximè grassatur) impactus videatur. Eadem planta in cibo & potu usurpata, contra vertiginem valere, memoriam bonam facere, & amissum auditum restaurare, fertur. Folia Cardui benedicti in pulverem redacta, ac ex vino pota, pituitam malosque humores abluunt, maximè si ex illis pilulæ, ut vocant, conficiantur. Eadem usurpata vitia pectoris & sanguinem purgant, phthisicis profunt. Folia vino decocta & calida pota, tormina sedant, sudoresque eliciunt, calculos comminuunt, mentes promouent. Foliolorum pulvis mensura Nucis juglandis corticis cum vino potus, aduersus pestem ne noceat præsentissimum est remedium, si intra spatium 24. horarum quem corripuit, eisdem præstant folia in vino decocta & pota. Pulvis prædictus & decoctum his exhiberi debent, qui putridis febribus ventriculi & quartanâ laborant. Sunt qui pulverem foliorum aut decoctum succumve omni veneno hausto aduersari testentur, asserentes puellam quandam Paulæ, cum venenum inscia in pomo quodam sumpsisset, aded intumuisse, ut nec theriaca, nec alio quouis antidoto curari potuerit, tandem verò aqua Cardui benedicti destillatâ sumptâ periculo omni & veneno liberatam: nonnulli etiam referunt serpente, cum puero cuidam in agro dormienti per os irrepsisset, aqua Cardui benedicti destillata per inferora quamprimum secessisse, puerumque incolumem omnique periculo liberum supernixisse. Cardui benedicti aqua destillata, oculis indita, rubedinem & pruritus illorum inuat: idem de succo intelligas velim. Folia tusa & imposita ambustis igni, ac anthraci profunt: eadem & aqua stillatitia potest. Folia adhuc tusa & imposita Scorpionum & Serpentum ictibus medentur. Aduersus cancerum aliæque maligna & putrida vlcera vix aliud Cardui benedicti folijs, succo, decocto, aut aqua destillata est præstantius remedium: ac tradunt nonnulli maxima mala vitiaque hoc pacto sanata fuisse, imprimis verò testantur iis mulierem quandam, cuius mamma cancro

Locus & tempus.

Dolor capitis, Hemorrhagia.

Vertigo.

Pituitam ducit.

Pectoris Gritia Sudorem mouet. Pessus.

Febres putrida.

Venenum.

Oculi.

Vlcera putrida.

Menstru-
um.
Morb. con-
mali.

Canceris

Veneris.
Tumoris

Canceris
Lentis

Syrup.

Interdum

Quo

Lumbis

Arthriti

Levi

Temperam.

cancer ad costas usque absumptis succant, aqua destillata & puluere foliorum insperso mundata & sanata fuisse, Vaporationes, lomenta, defestiones, & balnea sudatoria, calculis & mensibus eliciendis, ex Carduo benedicto parati ac confici recte possunt. Matthiolus comitialibus infantibus exhibet eius decoctum, aut stillatitiam aquam, aut pulueris draclumam. Herba tam recens quam sicca, & pota & admota externis, contumacia ulcera, & quae cacothoe vocantur, sanat, cutemque obducit: quamobrem decoctis miscetur quae de ligno Guaiaco ex vino, & aqua iis parantur, quos lues Gallica corripuit: Florum autem pappi vulneribus impositi, ea sine dolore sanant: ex foliis cum multo cataplasma tumores mox discutit pudendorum: Testator Arnolius de Villa noua cap. 44. Practica, vidisse se quendam, cui ex putridis & cauis vlcibus erosa fuerat ad ossa usque caro omnis tibiata, quique bona omnia in curationem frustra expenderit, hac tandem ratione sanatum: recentia Cardui benedicti folia contusa cum vino generoso discoquebat, additaque postea liquefacta porci mingia, ebullire sinebat, tandem iniecta farina triticea, contumidis spathula agitabat quoad omnia in emplastri consistentiam coalescerent, quod cadum bis quotidie vlcibus imponebat. Auctor est Camerarius aquam Cardui benedicti vitreis organis, iterata destillatione, eximium esse sudastis remedium, si calida auti instillatur. Plurimum vero tribuit si in remedia contra lueem veneream addatur, sic vix extractum eius non parum in eum usum sit efficax: ex succo syrupus, non tantum in peste, verum etiam in aliis ventriculi & iecinis imbecillitatibus apprimè utilis est, nec non in colicis cruciatibus. Succus ex tota planta expressi inspissatque praecipua laus ad menses fecundos. Cardui Benedicti planta magni ubique visus contra putridos & malignos morbos. Extractum utile in morbo Gallico, palpitatio cordis & in quartana. Aqua eius cum aqua Cuscutae & Ligustici in faciei rubedine utilis est. Per se etiam, ut placet Io. Matthaeo, multum confert, quando singulis diebus tres, vel quatuor unciae cum sex vel septem guttulis spiritus vitrioli vacuo ventriculo aegris peste correptis exhibentur. Accipit D. Declerin Lipsia ad febres folia venella & medio Cardui benedicti exsiccata, in puluerem redigit, de eo ter vesperi sumendum cum vino calido propinat. Et hoc tanquam secretum iactat Io. de Monte de Experimentis. Ex siccis foliis, cum paucis Cinnamomo, Foeniculo & Saccharo puluerem parat sentragam Gesnerus, quae vititur cum paucis pane tostis madente vino, mane vel à cena. Hanc & lumbicos pellere, & valetudini in vniuersum, ut sperat, conferre testatur. In liquore stillatio ad arthritidem vititur cineribus Cardui benedicti Franciscus. Indix de Gutta. Cardui benedicti effectum mirabilem cum Centaurio in expellendis ranis vide cap. de Centaur. ex Schenckij observatione. Veluti autem amara vehementer Cardui huius herba est, ita quoque excofaciens ac resuscans ordine secundo, & simul expurgans, aperiens, abstergens & digerens.

CARTAMVS SIVE CNICVS

CAP. XV.

Tereti sargit caule singularique Carthamus, qui superius in ramos diuiditur: folia per



caulem ramosque indigesta, nervosa, glabra, breuibus spinulis per ambitum donata, sescunciam aut vltra duas longa, vnciam fere lata, in acutiusculis dentata, angustis ceruicibus ramis adhaerent ramulorum extremis infident capita, inter folia, squammata, & quibus flores explicantur flamineo, saturis crocei

rubore tincti: semen pappo adhaeret oblongum, album, medulla dulci alba.

Croco Dioscori. folia attribuit oblonga, per ambitum diuisa, aspera [scilicet spinae] Matth. crassa, & recte: nulla enim in totis asperitas aculeata: caules cubitales, in quibus caput ad magnitudinem summorum Oleae germinum: florem Croco similem: semen album aut fuluum, oblongum, angulosum. Non liborauit hoc in loco Dioscori. Cnici differentias annotare, siquidem vnam tantum speciem describit, & tamen inquit constare semine candido, interdum rubro. Non distinguit, inquam, satium à siluestri, sed simpliciter Cnicum vocat: videtur autem Dioscorides Cnicum rubrum vocare genus syluestre, quod & ex descriptione foliorum significatur: nam folia oblonga, incisa, aspera, & spinosa nequaquam conueniunt domestico.

Fructum inquit Theophrastus aculeatum, & veluti retortidum fert: florem vna cum seminibus ipsis edie: folia illi sunt aculeata: multis caulibus constat, & ramos fundit: siluestri, urbanaeque describitur.

Plinius celebrari apud Aegyptios scribit Cnicum, Italiam ignotam, ipsis autem oleo non cibis gratam: hoc faciunt ex semine eius, differentia prima siluestris & sativa: syluestrium [ut Theophrasto] duae species: vna mitior est, simili caule, tamen rigido [quam ille urbanae admodum similem dicit] itaque & colu antiquae mulieres utebantur, exilis, quam quidam Attractylidis vocant: semen eius candidum, & grande, amarum: Sed Plinius us verbis potius domesticum demonstrat quam sylvestre, & quia mitior, & quia semine candidum.

Melnes Carthamum vocat inter purgantia, quo nomine hodie vititur: tradens esse domesticum sylvestrem: assumi ad purgationes domesticum, eligi semen album, lene, crassum & planum cuius medulla vinctuosa, pinguis, & cortex tenuis: & melior flos est, qui est sicut pili Croci.

Theophrasto & Plinio, inquit Dodonaeus, est urbana & sativa, ad differentiam Attractylidis, quam siluestrem Crocum faciunt.

De Cartamo quod asserit Tragus, Serapio duo scripsit capita nimirum centesimum vigesimum sextum de Churtal, & ducentessimum secundum de Cartam. Sed fallit Tragus, Caput enim Serapionis 246. est de Avena scriptum, cuius titulum

Cnicus
Diosc.

Diosc. nota
tur.

Cnicus
Theoph.



bus flos colore diuersus: nam luteus non est, sed ex multis staminibus caerulei coloris constat: semen Cnici semine minus & subrufum: Radix pollicaris crassitudinis est, carnosa, succulenta, foris fusca, non annua, vt vulgaris radix, sed aliquot annis interdum permanens.


Camer. hort. dicitur Carthamus siue Cnicus flore albido & caeruleo, perennis, sed à gelu xcriore muniendus. Clus. Hisp. & Hist. post. l. 5. pag. 152. Cnicus alter flore caeruleo. Tabern. Icon. & Hist. Cnicus caeruleus blauer wilder Saffran. Lob. Obs. p. 485. Icon. Plant. Tom. 2. p. 19. Cnicus flore caeruleo, Cnicus alter Clusi.

Lam. & Tempt.

Circa Cordubam in segetibus inuentus à Clusio & agro Hispalensi, florens Maio & Iunio. In Belgio verò Iulio & Augusto. Habemus & Môtbelgardi in horto Ill. C. VV.

CARLINA SYLVESTRIS QVIBVSDAM, alius Atractylis.

Descriptio



Caulis surgit plerumque singulari, albidus lanugine obfuso, cirs fastigiū in rectos aliquot ramos abeunte. foliis semipalmatis & palmatis, ac etiam maioribus duplō, aculeatis, laciniosis, crispis, infra villosis, albidis, supra viridantibus, nitidis, ab imo ad summū densè stipato: echini laxa foliolorum spinoso-

rum compage horrent, luglandis se è magnitudine, è quibus nitor ille radiorum florum abreo colore fulgentium, dilute et stramineisve atentis, emicat, exterius ad basin sanguine cruer tatus: flamma verò media confertiora & mollicella maturæ messis aridis comparia: radix lubeil lignosa Pterocelinæ radici equalis, fibris raris donata. Do-

Tom. III.

don. acere est semen: H. Lugd. verò Cnici, strigosum & tenue scribit.

Spinosam hanc herbam suspicantur quidā esse Acarnam Theophrasti, vt H. Lugd. Csalp. Lob. Clus. & Dodonæus.

Csalp. Acorna dicitur. Lobel. in Adp. Sequenorum Cirsium luteum vocat, ac an sit Acorna & Erythral Theophr. in titulo dubitat, ac rursus in contextu affirmat, sibi inconstans. Fugra etiam apud eum trāspōita est: est enim in Obs. p. 489. sic & in Icon. Plant. p. 20. nomine Cardui vulgarissimi viarum, Onopyxos Guilandini.

Dod. gall. Carlina silvestris, Carlina sauvage, Germ. drey distel, frawendistel, & Scwidistel / Belg. dreyedistel. Item Lat. in fol. p. 716. non inep- tē Carlina silvestris dicitur: nam flore Carlina amulatur, nec foliis valdè dissimilis est. Hanc autem esse Acarnam tantū est difficilius affirmare, quò breuior de hac Theophr. est: Ait autem hanc Cneco vibano simile. colore flauescens, succo pinguem. Differt autē Acorna ab Acarna: Acorna siquidē, vt Helychius ait. d'acorn is, siue Laura seft: Sed Acorna dicitur quod id est, spinosa stirps.

Tragus Atractylidem seu Cartamum silvestre nominat, ac dicit. Anicula circa Festum Assumptionis, vt vocant, Mariæ, hoc genus Cardui teneri magno studio quærun, suisque sagminibus; sicut plena sunt hodie omnia pro h dolor! scda superstitioe] adiungunt, maxime verò eos expectunt Trago in hoc genere Carduos, qui tres furculos, seu ramulos supra in vertice ostendunt, eosque vt præstantissimos ceteris inieponunt, vnde & ne men Germanicum dreydistel, quasi dicas Carduū triū furculorum, deriuatum fuit. Vocant verò & frawendistel, quodd vna cum ceteris sagminibus herbis die Mariæ Virginæ sacro in templis consecrari soleant. Sunt nonnulli qui Germanica voce Scwidistel, h. e. Carduum suarium nuncupatum velint. Quod verò in Diosc. nomen habeat, mihi non satis constat, nisi sit quantū dicitur d'acorn is. H. e. c. 55. quod Ruellius quoque lib. 3. de natura stirpium c. 55. sic sit solum, seu eolum agrestem, & Cartamum sylvestrem appellans.

Loniceri figura l. 5. c. 24. sub sequentibus nominibus posita nō placet. Wilder feld Saffran, oder dreydistel Atractylis, vel Cnicus silvestris, Fulus agrestis, Colus rustica. Gall. Saffran sauvage, d'oult.

Muth. in Diosc. n. comm. cum mag. fig. lat. & Ital. plantam, de qua hic, agimus, pingit pro Carduo vulgari: In Hist. germ. cum addit, Camerarii, pro Scolymo silvestri, Ed. dñ hârlc / Martb. l. 1. c. 1. egregius commentator in suis com. posuit suum more figuram cum solo titulo: in Hist. germ. mutato titulo addit imperfectam descriptionem, quam an contulerit cum planta, priusquam depinxerit, vel addiderit interpret, nescio. Glossatores & Patrocinatores nullam ipsi adserunt lucem. Camerarius aliam habet huius plantæ figuram, quam in Epit. omisit.

Gest. hort. Atractylis media, Kreichio Cardui quoddam genus, quod multi Atractylidem putarunt. Pingitur à Fuchio pro Atractyli vulgari, minori. Hanc propriè Græci Atractylida, Latini verò Fusum agrestem, aut eolum rusticam, quodd eius caule rigido admodum & exili, veteres mulieres pro colo, vt dictum est, utebantur, nominabant. Sunt qui Cartamum sylvestrem appellat: Germanicè itaque vocetur [wilder feld Saffran] Gall. l'ne espece de Chardon ayant la feuille iaigne, ou Saffran baslard, vt hac ratione disceratur à Cnico, quem aliqui Cartamum, & crocum hortensem nominant.

Acorna Csalp.

Carlina silv. Dod.

Acorna ab Acarnadifforentia cōtra Lugd. Csalp.

Acorna Laurus. off. Atractylis seu Cartamum silv. Superstitio.

Carduus marian.

Fusus seu Colus agrestis. Lonic. notatur.

Card. vulgaris Martialis Scolymus silv. Camer. Martb. reprob.

Camer. v. C. Bauh. notatur.

Atractylis media Gef. d'oult. Fuchio.

Cartam. silv.

Tabern. icon. & Histor. dicitur Heracantha breuifol. & distel.

Locus & tempus.

Carduus Dodonæo dictus Carlina sylvestris circa Montembelgardum copiosè provenit ut colle extra hortum E.C. & aliis locis: Genevæ in monte Salens, Basileæ vidi virentem mense Octobri & florentem Augusto inter portam Stein & Eschen extra muros.

Vltus

Viennenses Rhizothomæ Sarrasut nominant ab effectu, quia non modò illius sicca siue recentis gestatione, sed etiam intuitu, den sat (sitim & fauciam accensionem ex nimia crapula & bilis regurgitatione ortam esse putat Clusius) sisti, vulgus istic sibi persuadet, & experimento probatum asserit. Certè aliquando observavit, Nobilium virorum famulos in equis heris suis præcantes, huius herbam in pileis gestantes, ut perpetuè nimirum illam heri in conspectu haberent, & si corperentur eo vitio ab illo liberarentur.

CARDVVS CARLINA MINOR SYLV.
Clusij, flore luteo.

Descriptio

Palmi altitudinem non superat cauliculo tenui, vilico, canà lanugine obuito: folia carlinæ sylvestris: vulgans foliorum zinnula, minora, incana, spinis horrida: summo cauliculi fastigio bina ut plurimum fert capitula spinola (nonnunquam etià in alis) in quibus flor luteus orbem oculi imitans, media lanugine pallida, quæ ambiunt rigidiuscula & exsucca foliola, coloris flauo: radix tenuis, rufescens vivax non est, sed singulis annis perit.



Carlina syl. minor

Sequano-
rum Cirsi
varietas

Clus. Hist. [descript. auctori] & Hist. post. Carlina syl. minor. Lob. Obs. p. 485. vbi Clusij figura Acarnæ siue Sequanorum Cirsiij (Carlinae ve addit in Icon. Tom. 2. p. 15.) varietas. Hist. Lugd. p. 1484. Carlina syl. Clusij quoad titulum & descriptionem, Icon est Carlinae syl. vulgans. Cam. in Matthioli Histor. germ. Carlina parvam Clusij, Dod. lat. in fol. pag. 717. & Ponz in Baldo. Carlina syl. minor Clusio, Tabernacon. & Hist. Carlina syl. Clusij, Flein wild Carlina oder Eberwurz.

Locus & Tempus

Nusquam hanc inveniebat Clusius, quàm in aridis quibusdam petrosisque & desertis circa Salmanticensi urbem locis, promiscuè nascentem, Augusto mense florentem.

ATRACTYLIS VETERIBVS ET
in genere. CAP. XVI.

Atractylis Theophr.

Hanc Theophrastus de plantarum Historia pluribus locis tradit, ac primo lib. 6. cap. 4.

inter genera agrestis Cnici eam recenset. Vocatur, inquit, & quædam Atractylis [Fulus agrestis, Gaza] candidior his [Cnico & Acarna:] cuius folium priuatim id habet, ut anulatum, carnique conficatum, sanguineum reddat succum. Eamque ob causam Phonom, id est, eadem seruoem Gaza] aliqui Spinam hanc vocant. Habet præterea grauem & sanguinis in eade odorem, nec nisi per Autumnum fructum absoluit. Idem lib. 9. à principio statim de liquore succoque plantarum & eius diuersitate agens, sanguineum succum Atractylidi [Agrestis fulo, Gaza] tribuit.

Atractylis, auctore Dioscoride, spina est Cnico similis, sed quæ in summis virgultis folia multò longiora [maximè, minora minimè] Oribal. proferat: maior autem pars nuda est & aspera, quæ etiam semina pro colu vntur. Capitula [aspèra, Goupylus in utroque exempl. legit xim, comam] etiam gerit in cacumine aculeata: siorèque pallidum (Ald. in nothis, de viciis di rimit mappur, quæ verba Marcell. & Ruellius interpretantur, quibusdam verò locis purpureum: radix tenuis est atque inutilis (a' xanc, & non superuacua ut Sarracenus reddidit. Huius folia, coma & semen trita potaque cum Pipere ac vino à Scorpione percussis succurrunt. Tradunt & nonnulli percussos, quamdiu herbam illam tenuerint, cruciatum non sentire, sed illà deposità statim sentire.

Atractylida sunt qui Amyron [Ascyron Marcell.] qui Cnicum sylvestrem, qui Aspidrum. Magi Aphedron, hoc est, Menstruam purgationem, vocent, fortè à sanguineo succo, quem folia conficata reddere dicuntur. Et hac ratione Theophrasto q' id est, cruor, Actio, a' d' g' r' u' o' r' appellatur: quoniam & illa sanguineo succo est, ut ceruus in ea docebitur. Sunt etiam qui Theiatrium, Egyptij Cheno, Romani præsepium, aliqui Fulum agrestem, alij Colum rusticam appellant. Cur autem præsepium (modò integrè ea vox sit) Romani eam vocarint, in certum esse scribit Marcellus. Cur autem Colum rusticam & agrestem Fulum, ex herbe figura factum esse, quæ in maiore altitudine Colum, in minore Fulos rusticis feminis dederit ad lanificium quibus diu sine opere, humanoque arustico nascentibus quotannis vsa ubique vita est. Sed postquam natæ & tractatæ in urbibus artes sunt, quæ omnia urbanis elegantiora facerent, neglectis rusticis suis & colo, Buxus, Ebur, & Argentum in matronali lanificio amari ceptum est: & ad vitæ delicias, fortunæque opes translatum, quod solam sedulitatem sibi exigebat. Non tamen exclusa penitus & in muliebri opere damnata natura est. Sed antiquum retinet in agro honorem Atractylis: & quem quondam in omnibus habuerat vltim in rustica muliebri plebe adhuc habet: quæ ut audi adhuc seculo: nec exulta artibus vitæ ab omnibus fiebat: fulorum genere hoc natura tamen eos porrigente aliquibus locis vitur. Vltim qui Eburneam milessam colum scripto priuatim carmine Theagenidi amici Nicæ uxori laudatam donauit Theocritus pastoralis & bucolico carmi de aliquo, idem agrestem hanc descripsisset. Et quam ipse humano opere factam tantopere celebravit, in siluis inuentam Amaryllidi à pastore donatam finisset, &c.

Atractylidem numeravit Aginetalib. i. inter Olera, Cardui quo coniunxit.

Plinius

Fulus Ga-
Theophr. il-
lustratum
Phonom
Cader
Cruor

Atractylis
Diosc.

Sarracenus
nos,

Nemine
spuria.
Menstrua
purgatio.

Præsepium
Colum sine
fulum rusticam
ca.

Atractylis
Aginetalib.

Cnicus
filix-pla.

Plinius l. 21. c. 15. de herbis Aegyptiis agens, ita scribit. Cnici siluestris vna species mitior est, simili caule, tamen rigido. Itaque & colu antiquae mulieres vrebantur ex illis: Quare quidam Atractylida vocant: Semen eius candidum, grande, amarum. Idem de eadem libro eodem c. 32. Nec de Cnico siue Atractylide verbosius dici par esset, Aegyptiâ herbâ, ni magnum contra venenata animalia præberet auxilium. Item aduersus fungos. Constat à Scorpione percussos, quamdiu teneant eam herbam, non sentire cruciatum.

Atractylis aut Cnicus siluestris, inquit Galenus, & ex eo Paulus, planta est ex spinolarum genere, habens vim siccandi & moderatè calidam.

Aequinoctia

Quod Atractylis sit referenda, de qua loquitur Toxites in Onom. Philoloph. Cordus in Diosc. l. 1. c. 107. & lib. 4. c. 190. Rob. Const. in Lexico, Apollo rad. 2. in Diacassia cum foliis Senz, Fernel. m. lib. 6. cap. 14. Gesn. in cat. plant. Baechan. in Conf. David Kyb. in Lex. & Helfric. in nomencl. 2. c. 23. vbi aliquot plantas simul confundit, perpendant lectores. Videntur nobis Atractylida Veterum intelligere, quam sibi incognitam fatetur Brunfels. in exeg. in Dioscor. lib. 3. Tom. 2. p. 118.

Cartamus
filix.

Est Cornario Atractylis ea herba, quam officina ait Cartamum siluestrum, Germanos verò wilder feld Saffran appellare. Sed existimo Cornarium nescire quid sit Atractylis. Non enim vulgaris est Germanis, nec nouimus plantam, quæ dicatur wilder feld Saffran, nisi intelligat Carlinam minorem quorundam, verum ea non meretur nomen Croci.

Carlinia
filix.Carduus
humilis.

Sunt qui Atractylida credunt eam esse plantam, quæ Carduus benedictus vulgò dicitur, in qua quidem sententia non permanerent (inquit Marantha lib. 2. c. 10.) si foliorum situm non parui fecissent. Habet enim Atractylis folia in summis virgis, cæterò magna ex parte nuda existens. At Carduus ille, per caules folia profert.

Atractylis
purpurea
quorundam.

Atractylis purpurea Bononiensis tractus Atractylis Veterum esse non potest, quia non reddat succum sanguineum.

Spina la-
tea.
Siler.

Atractylis marina cognominata, quam Pena apud Hist. Lugd. lib. 14. cap. 13. Pycnocomon appellat, est Carduus, qui Spina lutea dicitur.

Quam Siler, alii Sulium, alii Fusaginem, Theophrastus Enoaymum appellasse videtur, fortè melius, ut Cæsalpino videtur, Atractylis dicenda esset, à fuso, quàm spinosa herba in genere Cnici Phomos appellata à Theophrasto.

Acarna.

Acarna Theophrasto videtur genus quoddam Atractylidis. Mirum autem Tragum lib. 2. cap. 166. dicere suum Carduum fullonium tertium posse ad Atractylidis aliquod genus referri. Est nobis Virga pastoris. Anemone Conicero in Diosc. Gesn. in alcrip. Diosc. & Tabern. cognominatur Atractylis.

Virga pa-
storis
anemone
in genere,
de Chamæ-
melum
orant. quo-
rundam
Atractylis
vera flore
luteo.


An Tragi lib. 1. cap. 42. *ἀνθρακίνη* seu aut nigra Dioscoridis, quam Atractylida inibi Tragus cognominat, est Chamæmelum eranthemum quorundam?

Atractylidem tandem veram existimo, quam flore luteo frequentem Lugduni & quidem spontaneam inueni, de qua hunc dicendum.

ATRACTYLIS VERA FLORE LUTEO.

Descriptio

EX radice parua, nonnihil obliqua, caulis p. o-
mneur singularis, striatus, subhirsutus, medullâ
Tom. 111.



candida lartus
subhirsutus, fo-
liis alternatis
vestitus, atrou-
renibus, ner-
uosis, in profun-
das & acutas
spinolas laci-
nias dissectis,
nullo donatis
pediculo: su-
premus caulis
in alas aliquot
facessit, quarum
extrema occu-
pant capita so-
liolis longis mor-
dacibus squam-
mis compacta,
isque flores, qui
staminei lutei
in pappos re-

soluendi, superantibus.

Matth. in post. comm. Ital. cum mag. fig. l. 3. c. 101. figuram habet, ni fallor, huius Atractylidis malè expressam, sine descriptione. Ita ut merito Lobellus in Aduersariis capite de Carduo benedictò in hæc verba prorumpat. Senensis suo more mordet, & nihil docet. Nam eius Atractylis nullis depicta aut asserta verbis iacet spectanda, non ut nos certiores, sed ut dubios reddat: parùm enim Diosc. descriptioni aut receptæ Atractylidis accedere videtur: vtrum verò illius silentium, an pictoris in exprimendo solacium & cacozelia incusanda sint, viderit lector. Fortè huc nullo delectu intrusa fuit, quia in penultimis illis commentariis absuit, nec dum vlla certa, ut videtur, auctor nota fuit. Idèd (suo more, ne nihil sibi egisse videretur, velutandi ansam arripuit: ait Atractylidè non esse Carthami syluestris speciem, duntaxat, quoddam argumento triuali sanguineum succum non remittat, &c.

Matth. n. 101.

Atractylis (inquit Camer. apud Matth. in Hist. germ. lib. 3. c. 14. & in horto) non est ita reflexis & curuis caulis, ut Matthiolus pingit.

Matth. fl. mala.

De præsentī planta H. Lugd. l. 4. in duobus capitibus scripsit. Ac in primo quidem capite sc. 6. p. 1450. eam ita inscripsit. Cnicus siluestris prior, Atractylis Dalechampii. In secundo capite, sc. 13. eundè plantæ duas rursus exhibet figuras. Priorè videlicet p. 1468. imitato titulo, qui sic habet: Atractylis. Item alteram malam p. 1469. hac inscriptione: Atractylis quorundam Matthioli.

H. Lugd. fl. figura. 4.

Atractylis Græcis, Latinis quoque, seu Dodon. Gall. & Lat. Matth. in post. comm. It. cum mag. fig. lib. 3. cap. 101. Lobel. in Aduersariis & Cnici siluestris species Dioscoridis, Galeni, Plinii, & Aetii suffragio, Obf. pag. 483. Icon. Plant. Tom. 2. pag. 11. Lacunæ in Dioscoridis (qui figuram habet, quæ placet.) Camer. in Hist. germ. & Epir. Matthioli. Bellon. Obf. lib. 1. c. 18. & Hort. Lusit. [qui mîsd Cardebenedictæ vocat] Atractylis dicitur, quod eâ antiquæ mulieres pro fuso vterentur: *ἄρακτις* enim fuso significat. Quare Gaza Fusum agrestem, alii Colum rusticam appellant. Vocatur etiam *κνικὸν ἄρακτις*, Cnicus siluestris. Recentiores quidam siluestrum carthamum appellant, hoc est, Belgis wilden Carthamus. Nothæ verò voces ante dictæ sunt, quæ à nonnullis huic adscribuntur, seu & facultates.

Synonyma

A Scroenkl. appellatur Carthamus sylv. recentiorum, Atractylis sylvestris hirsutior, Atractylis recticaulis Theophrasti. A Tabern. Atractylis Matthioli, Spindel: oder Spillen distel. Miror cur assumpserit malam Matthioli figuram.

Locus & tempus

Atractylidem quam veram existimo vidi Geneuz in horto Di. Coladoni, Iuriconsulti, & circa Thuri sponte provenientem & florentem Iulio, & in itinere Basileæ Geneuam: Basileæ in horto Di. Doctoris Felicis Plateri. Lugdunum frequens est spontanea. Montbelgardi in Horto E. C. lata feliciter provenit & semen maturuit. Nascentur, teste Dodonæo, in Creta, nonnullisque Græciæ provincijs ac insulis, & in Narbonensi Gallia: Germanis ac Belgis hortensis est. Serò admodum floret, & semen maturat.

SPINA LUTEA.

CAP. XVI.

Descriptio.



PRo Scolymus Theophrasti Cardui exhibent, radice nitentem pollicari, fulvescente, lacteum succum fundente, vesca: ex qua caulis surgit bicubitalis, altiorque, multus alis concavus, albicans, hirsutus: folia primum erumpentia, palmo longiora, per tria sparguntur, dorantem mox æquantia, viridantia, lacteis

maculis confusis, leviter sinuata, spinis horrida, lactiflua, at quæ in caule & ramis sunt, ut breviora, ita & rigidiora sunt magisque senticosæ, à quibus productæ alæ spinosæ cauli ramisque adnatae, tum hos tum illum intractabilem reddunt: flores inter folia resident aureo fulgore comantes, ex capitulo Ponticam nucem æquiparante, squamis innoxijs compacto, lac, non secus ac folia, fundente. Semen compressum.

Icones duas proponit Clusius, suam, quam Scolymum Theophrasti Hispanicum inscribit, & Lobelij, cui titulum fecit, Scolymus Theophrasti Narbonensis. Dodon. lat. in fol. pag. 713. duas quoque exhibet Icones. Prima est ipsius Clusii, hoc titulo: Carduus Chrysanthemus. Secunda est ipsius Lobelij, hoc titulo: Cardui Chrysanthemi altera icon.

Scolymus Theophrasti diversæ à Cynara & Cardu.

Vocatur Lob. in Adv. Scolymus Theophrasti seu Eryngium luteum Monspeliensium, quem à Scolymo Diolcoridis haud parum abesse scribit. In Obs. pag. 478. Icon. Plant. Tom. 2. pag. 6. Scolymus Theophrasti, Eryngium luteum Monspeliensium, Eryngium Vegeti Clusio, Eryngium Archigenis Anguillæ.

Eryngium Vegeti, inquit Anguill. epist. 5. ex demest. planta cum Scolymo Theophrasti. Item epist. 8. ubi describit, dicit: Græci hodie vocant

Scolymum illam plantam quæ Vegetius in Mulo-mediciâ nominat Eryngium, quæ plantâ nunc Bononiæ videntur pro Eryngio.

Cametar. hort. Eryngium Vegeti, Scolymus Theophrasti Anguillæ. Item Acarna Theophrasti Scolymus eiusdem, Eryngium Vegeti. H. Lugd. pag. 1438. Scolymus Theophrasti Clusio, quem ait Vegetium lib. de Veterinaria Eryngium nominare, Eryngium luteum Monspel. & Italos Bononienses, Gesner. hort. Spina citrina vel lutea. Tabern. icon. & Hist. Scolymus Theophrasti, Arctophos Theophrasti.

Bellon. Obseru. lib. 1. cap. 18. Carduus frequens in Creta vulgò græcè *Ascalimbres* dictus. Anton. Rinc: & in Romana ditione *Spina borda*. Idem c. 25. ait in Lemno hanc spinam vocari *Scombronolo*, id est, *Chardon de macquereau*. *Ascalimbres* *Spina borda* *Scombronolo*.

Pasim provenit circa Monspelim, florentem vidi mense Septembri & Iulio xxi & Vere. Geneuz primo anno non protulit caulem, sequenti floruit Iulio, hiemem protulit. Lugduni habui etiam. Montbelgardi ex semine mihi provenit in Horto E. C. Valdè frequens in Creta, ubique sponte provenit, vidit Bellon. Ravennæ, Anconæ, Romæ. Salmanticensi agro, totaque adeo Castella frequentissima est Scolymus Theophrasti Clusio, integra æstate florens, interdum etiam Autumno, subinde semen proferens.

Sues non minùs libenter vescuntur eius radice, quàm Eryngij vulgaris, ut Clusius aliquoties conspexit, Salmanticensi viuent, ubi incolæ tenellam adhuc plantam, & primum germinantem, cum ipsa radice elotam, crudam, aut cum carnib. coctam edunt: ipsius lacteo succo omne lactis genus coagulans: etiam eius flore, crocum adulterant (tamen vicinis locis laudatum crocum a hunc nalcatur) ut quædam alie nationes Cneci flore. Vidimus Ravennæ in foro venalem & Anconæ mulieres colligentes necnon Romæ: vescuntur autem radice & folijs prius quàm cauliscat: inquit Bellon.

Vfus.

HACVBI SIVE SILYBUM

quibusdam.



Primo vere Asparagus protrudit, quos incolæ secant, nostratiumque in modum coquant ac comedant. Tota planta Carlinæ nostrati apprimè similis est: Maior tamen ea altiorémq. erigit scapum, cui in summo capitula insident spinosæ, ex quibus fossilis emicant rubelli.

Halapensis, descriptionis autore teste Rauvvolf. dicitur hodierno die Hacvbi Serapioni c. 295. Hacvbi Alcardeg. Diolcoridis Silybum existimandum.

Circa

Locus.

Circa Halepum, locis præsertim aridis, asperis provenit.

Vires.

Radix insula potaque nauseam parit & vomitum, ventriculoque inappetentiam imprimit.

CALOCHIERNI CARDVVS

Cretensibus.

Calochierni Cretensium Hon. Bello ad Clusium, spina est Atractylidi & Conico silvestri similis, maior tamen, echinos & ipsa proferens, flores non vidi, inquit Bellus in epist. ad Clusium nam tota sicca erat, semen duntaxat collegi. Hæc etiam à rusticis antè quàm caules exeant, comeditur, & nisi Acarna siue Acorna sit Theophrasti, ingenuè me camignorate fateor: interea semina terræ committere poteris, & eam obseruare, vocatur *καλὸς χιερνός*, hoc est, æstiva spina. Et hæc Clusio semine nata, quæ antequam florém proferret, gelu corrupta, valdè autem similis Atractylidi.

ERYNGIVM VVLGARE

Delantio



Vulgare Eryngium radice perquam longâ nititur, minimi digiti crassitudine, candidâ caulis striatus, albicans, cubitum aut sesquicubitum longus, medullâ fungosâ albâ plenus, in crebros ramos circa summum diuiditur: folia lata, serè glauca, rigida, sævis spinis vndique minantur, præfundè lacinia-

ta, quorum singulæ lacinie consimiliter subdividuntur: echini creberrimi, Virgæ pastoris æquales serè, inter mordaces spinas flores proferunt albicantes, apicibus concoloribus donatos, quibus subiecta in orbem folia striata, longiuscula, & mucrone & marginibus spinosis.

Eryngium in aculeatarum genere dicitur à Dioscoride. Lata autem sunt eius folia, & in extremo ambuæ aspera [*σπῆλαι*, alii *σπῆλαι* sed vulgata scriptura melior, gustu aromatica. Sed ubi angustant, circa complures caulium eminentias in spinas aculeantur, in quorum summitatibus globosa [*σφαγεδὼν*, vetus caret] sunt capitula, spinarum acutissimarum durarumque ambitu stellatim [*ἀστὴρ* & *ἀστὴρ* vulg. sed Cat. addit *σπῆλαι* alii] circumuallata. Horum color aliàs viridis (*ἡ χυρὴ* deest in vulg.) nunc pallidus, aliàs albus, interdum etiam cæruleus inuenitur. Radix oblonga, lata [*πλατὴς*, pro qua voce vet. *σπῆλαι*] in superficie quidem nigra, intus verdè albicans, pollicis crassitudine (vet. addit *μακρὰ*) quæ & ipsa odorata est, & aromaticum quidam respicit.

Tom. III.

Eryngium sunt qui Eryngum, qui Eryngen, qui Eryneren [Erynerin Corn.] qui Caryon, quæ Gorgonium, qui Hermion, qui Origanum Clonium [Clunion Corn.] qui Myracanthon, qui Moly, qui Cartere, qui montanam chloen [montanam herbam Corn.] qui Chida appellent. Egypui Crobiscum, Magi Symertum, Prophetæ Siftertor Corn.] Daci Sicupnoen, Hispani centum capita (*κατὰ κεφάλαιον*, à numero capitum) Aphri Cherdan, Romani capitulum Cardui, vocant. Myracantha verdè inter alias nothas appellationes vocatur à vi & radicis odore. Nihil enim aliud quàm odoratam Spinam ea vox significat.

Plinius Eryngem & Eryngion vocat: Ipsa dura, inquit, fruticosa: spinosis foliis: caule geniculato, cubitali, & maiore aliquando: alia albicans, alia nigra: radice odorata, & sativa quidem est: sed & spontè nascitur in asperis, & saxosis, & in littonibus maris durior, nigriorque: folio Apii. Ex his candidam nostri Centum capita vocant: omnes eiusdem effectus: caule, & radice receptis in cibos Græcorum viroque modo, siue coquere libeat, siue crudâ velci: commendat contra venena omnia, aliaque multa addit ex Dioscoride.

Cæterò cùm Dioscorides Eryngium odoratum esse scribit: intelligi statuit Marantha si abruptatur & aliquatenus tundatur: aliter enim vix in eo odorem aliquem sentiri.

Cardo in Dioscor. Fuchl. Matth. in prior. comm. Trago, Rhegino in exerc. Harchio, Lacuna, Lonie. in Hist. & in Dioscor. Casalp. Gesn. in Maio. Camer. in Epit. Matth. & Tabern. Eryngium. Anguill. epist. Eryngium vulgare in Græcia & Italia. Camer. apud Matthioli. in Hist. germ. & in horto med. Dod. gall. Clus. in Hesp. Pannon. & Hist. post. & Schvvenckf. Eryngium vulgare. Clus. item, vi & Lob. in Adv. C. Bauh. apud Matth. Eryngium campestre vulgare. In Obf. p. 499. & Icon. Plant. Tom. 2. pag. 22. Eryngium campestre mediterraneum. Bellon. in Obf. & Turn. Eryngium mediterraneum. Cast. Durant. p. 172. Eryngium, Eryngium terrestre siue montanum. Dod. lat. in fol. Eryngium campestre siue alerum, à Plinio Centum capita vocatum, flosculis cæruleis, radice luteis. Gesn. hort. Eryngium alterum mediterraneum; de coll. stirp. fol. 75. Eryngii, id est, Cardui cuiusdam odorati species. Matth. in post. comm. cum mag. fig. Lat. & Ital. Eryngium montanum. H. Lugd. Eryngium montanum Matthioli.

Ἠρύγιον Græcis, Lat. Eryngium, Iringus Officinis corrupto vocabulo dicitur, plerisque etiam Centum capita nominatur, à numero nimirum capitum, quæ in summo obtinet, vnde Gelli. Chardon à Cent testes vocat. Germ. Wäsendistel/ Brackendistel/ Frausdistel, Maustrew/ & Rasdendistel. Belg. Eryodistel. Dod. gall. Panicle Matth. It. Erygio, & Iringo. Hesp. Cardo corrodor, quia caulis resiccatus & abruptus, à vento impelli & provolui solet, præsertim locis planis & apertis. Angl. Sea hollye or Sea hâluer & communiter Sea Syde. Turn. Boh. Mätska oder Mätska wura. Isten asfongra tonies/h.c. à Deo maledicta spina, Centum capita. Græci quidem Philolophi Eryngium quasi [*ἐρύγιον*, id est, ructum, dictum autumant, quodd capre quæ mortu furculum Eryngii præciderint, vel deglutierint, cunctum gregem ponè sequentem quasi stupore attonitum sustineat, donec Eryngium ructu reiecerint.

Eryngium

Nomina
linguarem

Frequens propè Tridentina mœnia ac in Gori-
licensi agro, quin & compluribus Italię locis. In
omnibus, quas adiit Clusius, Prouincijs frequen-
ter obuium fuit. Copiosè prouenit in planitie
inter Arboiāns, & Audincourt è regione Be-
champs non longè à Montbelgardo: Geneuæ
in *plain palais* incipit erumpere in fine Martij:
Montpelij, Lugduni & Basileę passim, in campe-
stribus & asperis locis.

Vires

Eryngij folia, authore Dioscoride, primo ger-
minatu muria condita in cibos oleris vice reci-
piuntur. Id porro vim habet calefaciendi. Potum
ducit vrinas & menses, tormināque ac inflatio-
nes dissoluit. Hepaticis autem, & à venenatis be-
stius commorsis, & his qui lethale venenum sum-
pserunt conuenit cum vino. Bibitur aduersus
plurima mala, cum semine Pastinacę drachmę
vnius pōdere. Fertur quod alligatum pro amu-
leto, & in cataplasmate impositum, tubercula di-
scutit. At radix ipsius cum aqua mulsa pota, opi-
sthotonicos & comitiales sanat. Non parum au-
tem falluntur qui Secacul ab Eryngio secernere
nescientes, Eryngij radices tum Saccharo tum
melle asseruatas Venereis infelicer commiscere
auxilijs, vt qui ederint fortiores, salaciorēque
reddantur. Quippe hac facultate Eryngium præ-
stare nusquam hæcenus apud Diosc. & Galenum
Matthiolo reperire licuit. Radix, cū visco querno,
ijs subuenit quos vel epilepsia, vel spasm^{us} affligit.
Eadē saccharo cōditur in vsus prædictos. Ex tene-
ris folijs mēse Maio aqua exstillatur, quę pota exi-
mi è bona est contra pustulas Luis Venereę, mi-
rificęque ab hac labe sanguinem emundat: utilis
eadem in febribus quotidianis & tertianis expe-
rimiento certo cōprobata: ad quęvis colli vitia,
cum aqua pluuiali etiam prodest. Radix contu-
sa & imposita, spinas & lignorum fragmenta as-
fusilave extrahit. Eadem cum arungia salsa mi-
sta, carnem ab ossibus recedentem continet im-
posita. A veterano quodam Medico Italo, teste
Camerario, compertum est, radicem Eryngij pro-
be contusam, modicęque in vino rubro coctam,
& imposita abortu prohibere, quāquā cōtrā intro-
sumpta partum acceleret. Foliorum succum cum
vino expressum vtiliter propinat Dodonæus ijs,
qui gonorrhœa Venerea vexantur. Aiunt au-
tem Eryngium herbam, si capella vna in os su-
mat, ipsam primum, mox totum gregem subsi-
stere, donec accedens pastor ori eam eximat,
Plutarcho auctore. Affirmabat quidam, inquit
Aëtius, assiduo Eryngij vsu, nunquam postea
minxisse calculos, cum prius eo morbo frequen-
tissimè vexaretur.

ERYNGIVM CÆRVLEVUM.

Descriptio

Eryngium hoc cæruleum à vulgari nobiscum
distinguitur solo floris colore Matth. An-
guillara, Castor, & Gesnerus de hortis. An ei-
dem in App. pag. 292. Eryngium improprie voca-
tum, Rosa Hæticantis?

Lob. In Aduers. Eryngium montanum cæru-
leum, non recipiendum pro Dioscorideo. Obs.
Eryngium montanum tenuifolium ambitu pro-
funde sinuatum. Clus. Hist. post. libro 5. pa-
gina 158. Eryngium 4. siue montanum sine
icone.

Cæsalp. lib. 23. cap. 28. Eryngium aliud cacumi-
nibus cæruleis, quod in monte Averno Apenni-



ni Spinam S.
Francisci voc-
cant. Camerar.
hort. Eryngij
totum cæru-
leum in mon-
tibus Allobro-
gum. Ad Hi-
stor. Matthiol.
Germ. lib. 3. ca-
pit. 10. Eryngij
aliud genus
cæruleo flore:
cuius genus
prouenit tan-
tū in Auer-
no Apennini,
&c.

Locus, &
tempus

Per plures
annos habui
Montbelgardi
in Horto Ill.

E.C. sed incuria hortulani perit, qui euulsit im-
prouidè: Vidi Eslingz in horto Di. Volmarij:
Basilex in horto Domini Doctoris Felicis Plate-
ri: Stutgardiz in horto Ducis: Argentinz in
horto Friderici Meier.

ERYNGIVM MARINVM.

Descriptio



Eryngio ma-
ritimo radices
substant longissi-
maz circumque-
que profundè
vagantes, sapore
aromatico, folijs
plurimū pullul-
tia, quę in Mat-
thioli iconē o-
missa ex longis
pediculis, nihil
aut perparum la-
ciniata, ferè ro-
tunda, latiora ta-
men vtrunque
quàm longiora,
interdum latitu-
dine palmū ex-
cedentia, crassa
siue spissa, albi-
cantia vel glauca, vti tota planta, quę in adole-
scente planta tum in lacinias abeunt, non admo-
dum tamen profundas, sed rigidorum spiculo-
rum mordacitate multò infestiores, nec crassitu-
dinem illam etiam siccata amittunt, licet neruo-
siora appareant, multò etiam quàm Mediterra-
neæ latiora, caulis cubitalis valdè ramosus: capita
extremis ramulorum inter pungentia folia se-
dent, flores proferentia albidos. Semina duo iun-
cta, lata, quę cū spinis vndique sint obfessa, vix
impunè eximi possunt.

Hoc Eryngium Gesner. de coll. stirp. & in ap-
pend. Anguill. epist. 8. (qui cum Matth. Croco-
dilon negat,) Matthiol. in suis comm. in Dioscor.
Hist. germ. & Epir. Camerarij (qui posuit aliam
figuram ex Gesnero factam ad meam plantam illi
missam) Camer. hort. Castori pag. 173. Apolli-
ni rad. 1. supra Dialat. Clus. Hist. post. lib. 5. p. 159.
(cui &

(*hai & Eryngium* 3.) & C. Bauh. apud Matth. *Eryngium marinum* dicitur. Brassauolz *Eryngium*. *Goropio Eryngium mariumum*, *Eryngium glycyrrhizon*. Hist. Lugd. p. 1459. *Eryngium mannum* Matth. de quo ait. *Eryngii licet* *atis dilucida sit à Dioscoride tradita delineatio*, quodnam tamen *Eryngium* propriis repræsentat, nondum inter Herbarios constat. Aliis enim *Eryngium* hoc *marinum* indicis omnibus propriis exprimi placet. Hoc Plinius lib. 22. cap. 7. in litoribus maris, folio Apii esse dixit, quod aut falsum est, aut deprauati codices, ut pro *marino* *legisse* videatur.

Lacuna in Diosc. lib. 3. c. 4. hoc *Eryngium* pingui nomine *Glycyrrhizæ spinosæ*. Dicens Plinius lib. 9. cap. 21. confundere vulgarem *Glycyrrhizam* cum *Eryngio marino* quod vocatur etiam à *Crætea Glycyrrhiza*. Non existim cum *Lacuna* confodisse *Eryngium* cum *Glycyrrhiza* Plinium, sed malè legisse folia *Glycyrrhizæ* & *Echinodea* pro *Schinodea*, id est, *Lentiscina*.

Dodon. *Eryngium marinum*. Lobel in Advers. p. 375. *Eryngium marinum* & vescum Dioscoridis descriptioni magis accedens. Obseru. p. 489. *Eryngium marinum*. Drypis Theophrasti quorundam. Aduers. p. 375. videtur *Acanos Plinii*. Icon. Plant. Tom. 2. p. 21. *Eryngium marinum*, Drypis Theophr. quorundam.

An Bellon. Obs. lib. 1. cap. 18. *Eryngium Antiquorum & Eryngium marinum* in *Creta* proueniens?

Eryngium marinum mihi prouenit *Montebellardi* in Horto r. c. Habebamus *Lugduni* in horto. Vidimus *Stutgardia* in horto Ducis, & *Basileæ* in horto Dj. Dis *Fœlicis Plateri* pulchrè virens *Octobri*. Semen maturum profert in *Autumno* & prouenit *Verè*. *Veneta litora* vndique referta spectantur. Non modò in calidiorum regionum, quales sunt *Hispania*, *Italia*, *Gallia Narbonensis* & similes, sed etiam frigidiorum & ad *Septentrionem* vergentium, ut sunt *Anglia*, *Belgium*, *Hollandia*, atque alie iis adhuc frigidiores, maritimis frequens spontè nascitur, & radice sub tertia vagatur.

Matthioli ait radicem minùs siccare quàm alteram, sed easdem possidere vires. *Dodonæus*, qui primum facit, ei tribuit vires quæ vulgari *Eryngio* tribui solent, dicens: vtriusque radix exaltatoria, &c. Meminit *Clusius Rondeletium*, *marini Eryngii radices* (quas potiss. usurpandas censebat,) *Saccharo* conditas præscribere solere mulieribus frigidiorè vteri intemperie laborantibus, ad iuuandum conceptum, prius tamen purgato ut decet corpore, & necessariis præmissis.

ERYNGIUM PVVILLVM.

Descriptio

Palmi est, nonnulla quàm pedis, altitudine, caule gracili, multis ramis ex aduerso, ut plurimum nascentibus, præditi: folia circa radicem in rotæ speciem humi sparguntur, masculula, latiuscula, & molliora: et, quæ in ipso caule sub alis nascuntur, masculula sunt, tenuia, in ambitu serrata & aculeata: ramulorum summitatibus globosa insident capitula, octo plerumque spinosorum foliorum ambitu stellæ instar circumualata, ipsa etiam spinosissima: & tota capitula cum suis foliolis ex ambientibus, cærulei sunt coloris: succrescente plantâ, folia secundum radicem in orbem nascentia marcescunt, deinde alia caulem




ambientia exsiccat: tur & decidunt, ut ratò plantam [cùm uel floruit] cum foliis, præsertim inferioribus, reperire liceat: radix doræ quidem & lignosa sed quæ non viuax sit, & singulis annis semine maturo pereat, semineque deciduo renascatur.

Clus. Hisp. *Eryngium pumilum*. Hist. post. lib. 5. p. 159. *Eryngium pumilum* Hispanicum, *Eryngium* tertium.

Lob. Obs. p. 490. Icon. Plant. Tom. 2. pag. 23. *Eryngium pumilum* Clusii. Tabern. icon. & Hist. Dodon. lat. in fol. p. 720. & H. Lugd. p. 1461. *Eryngium pumilum* Clusii.

Post menses plerumque inuenitur passim agro *Tempus*. *Salmanticensi* in collibus, & nusquam alibi: semine quidem inde relato, natum est apud *Belgas*, sed serius flores protulit, qui nullum semen ederunt, deinde color ille cæruleus longè fuit remissior.

ERYNGIUM PVVILLVM.
planum.

HVmilè e- Descriptio
rat, inquit *Clusius*, statim à radice in plures ramos diuicatum, teretes, rotundos, procumbentes: ad quorum singula veluti genicula nascebantur inordinata folia, extremè latiuscula, circa pediculum angustiora & crenata: quæ verò circa radicem, formâ quidem illis si-

milis, sed ampliora, vnciam lata, binas aut amplius longa, ex viridi pallescentis coloris: frequentes ex alis ramuli nascebantur, ad quorum singulos nodos foliola, & echinata virentiaque capitula exoriebantur: florem obseruare non licuit, nondum se prodebat cùm sub sequentem *Autumnum Viennam* euocarer: radix satis crassa, & aliquot fibris donata: quin & procumbentes cauliculi plures, secundum radicis caput, crassiusculas fibras agunt, quibus subinde sese

firmant. Et secundum hoc Eryngij genus, Eryngium f. pusillum planum, non à me quidem natali loco observatum sed in exculco horto Ill. viri Joannis de Brancion crescentis conlocatum, quod Joannis Mutoni Tornacensis Pharmacopœi, munere accenerat.

Pusillum Eryngium planum Mutoni, inquit Lobel. (ita enim inscribit in Obs. p. 490. Icon. Plant. Tom. 2. p. 22 & H. Lugd. pag. 1461.) raro rari vel in horti apud B. Igas videtur, foliis quam Diptacus longè minoribus, angustioribus: coliculis dodrantalibus & pedibus, ar. fractuosis & divaricatis, in quibus summis & secundum longitudinem flosculi minores quam Campestres Eryngij Radix Carudæ aut Alpirag, sed minor multo perennat. Nusquam me vidisse memini, nisi in horti Joannis Mutoni.

ERYNGIVM PLANVM, LATIFOLIUM

Capitula rotundo parva.

Descriptio



Cum Clusij Descriptio omnibus numeris absoluta sit, eam hic tradimus. Bicubitalem, inquit, vel ampliotem habet altitudinem, caulem firmum, striatū, medullā albā plenam, ac velut nodis distinctum, præsertim quâ parte eum amplectuntur latâ & membranaceâ lede folia, tres aut plures uncias longa, duas

lata, viridia, venosa, in ambitu serrata, & aspera nonnihil, subamaro, aculeculoque gustu: quæ verò circa radicem nascuntur, longiora latioraque sunt, & oblongis pediculis inniuntur: summis caulis in aliquot ramos divisis, breviora folia habet, eaque in profundas lacinas divisa, & molli-bus spinis prædita: summi deinde alii in aliquot ramulos desinunt, echinata capitula ferentes, sphericæ fere rotunditatis, in quibus multi exul-let fl. siliis albicanibus staminibus præditi, sub ipsis autem capitulis novem aut plura oblonga, angusta, aculeata foliola, stellæ imitæ expansa: ipsa porro capitula cum summis ramulis, supremæque caulis parte, interdum vetustate cærulea prorsus colorem adquirent: radix in novellis plantis digitæ crassitudinem & longitudinem æquat, aliquot fibris donata, foris subsulca, intus alba, carnosa, gustu dulcicula, perinde ac Eryngij marini radix: vetustate tamen grandescit, & in plures alias radices extuberat, singulis annis ex latensbus frequentiores caules profert: aliquando tamen hoc in ista planta observabam, ut producto semine, subsequens hiems illam propterea corrumpere, præsertim cultioribus locis.

Matth. in post. comm. Italici lib. 3. cap. 22. Eryngium planum: s. nomine tunc tantum meminit. Nec placet Camerarium apud Matthiolum pro

hoc Eryngio plano ponere figuram Eryngij Alpini, ac diuersum facere à Clusij Pannonico Matthioli planum.

Castori Durant. p. 173. Eryngium planum siue lzue. Clusio Pann. & post. Hist. l. 5. pag. 158. Eryngium Pannonicum latifolium. H. Lugd. pag. 1460. Eryngium planum Matthioli. Dodon. Lat. in fol. p. 720. Eryngium spurium primum. Tabern. icon. 746. pag. 693. & Histor. lib. 2. pag. 367. & 369. Eryngium cæruleum 1. Blaw meer wurttzel. Item Eryngium cæruleum 2. Item Eryngium alpinum cæruleum, Blawberg/ Brackendistel. Tres figuras vnius plantæ habet, postenor est Matthioli quæ deterior.

C. Bauh. apud Matth. Eryngium alpinum planum capite Diptaci, quem Carduum nobilem Bernenses, in quorum alpi-bus frequēs, vocitant. Eryngium planum Matthioli (in cuius figura capita Diptaci requiro) Dodon. Cast. Lugd. Eryngium aliud montanum Dalechampi eidem, quod & sub Spina alba, sed figura vitiosa, potius se videtur. Eryngium alpinum Gesneri, Eryngium magnis latisque capitulis. Eidem in app. Eryngium montanum tenuifolium, ambitu profunde sinuatum Lob. Obs. Alpinum cæruleum Geneu. Lobel. Eryngium alpinum cæruleum, Tabern. Eryngium capite Diptaci Cam. Herba peregrina foliis Acanthi, & Acanthus sylv. Dig-leor. Casalp. Non videtur fuisse notum C. Bauh. no Matthioli Eryngium planum, si notum, in eo non requireret capita Diptaci, nec idem fecisset cum Carduo Diptaci capite, qui diuersus, sicuti etiam Carduus nobilis Bernensium.

In horti Vrauslaviæ primum istud observavit Dodonæus. Frequens nascitur in pratis ad Danubium supra & infra Viennam sitis, & in hortos illatum scilicet provenit. Floret Iunio & in Silesiacis montibus sponte etiam nascitur. Provenit nobis Montibelgardi in Horto E. C. unde habuimus semen non recordamur, primo anno non protulit caulem. Floruit autem nobis Augusto & Septembri.

C. Bauh.
Locus & Tempus.

ERYNGIVM ALPINVM LATIS FOLIIS, magno capite oblongo cæruleo.



Plurimum ca- Descriptio:

Plurimum est radix pollicaris, terram verius comosa: folia prima plusquam cubitalibus nixa pediculis, Calthæ palustris, eodem modo propter pediculum salcata, sed mucrone acutioris, per ambitum serrata, alia per saepe ad ramum divaricata, unguem laciniata, & profunde incisa, cærulea,

potissimum suprema, quemadmodum & caulis ipse cum ramis, echini magni oblongi, densissimo creber-

Creberrimorum cristatorumque foliorum cartuleorum echinum superantium vallo latent medulla.

Lobel. in Aduers. p. 375. Icon Plant. Tom. 2. p. 23. Eryngium alpinum cartuleum Geneuense perquam venustum. Gesn. hort. Eryngium alpinum Edler distel. De coll. stirp. fol. 75. Eryngium alpinum cartuleum Edler distel.

Camer. apud Matthiolum Germ. & Epit. Eryngium planum, siue lzure, Italis *Iruga liso* & *Iruga senza spine*. Figura ex Gesnero, cui aliquando nisi Eryngium alpinum pulchra est planta, diuersum tamen facio ab Eryngio plano Matthioli, huic enim magna capita longa.

H. Lugd. p. 1460. Eryngium aliud montanum Dalechampio. Eiusdem Eryngii malam figuram existimo poni pag. 1462. titulo spinæ albe Dalechampi.

Eryngium alpinum Geneuæ vidi translatum ex vicinis alpibus in hortos mense Martio folia incipere depromere. Quidam rusticus, ni multum fallor, vocabat Cardon gentil: abundantem reperi in monte Thuri florere incipientem Iulii principio. Basileæ vidi anno 1595. mensis Augusti sine cum semine maturo in horto D. Io. Meuzman Pharmacopœi, vnde accepi semen serendum Montbelgardi in Horto J. C.

CARDVVS STELLATVS SIVE Calcitrapa.

Descriptio



Cvbitū & celsitudo bitum altus est caulis angulosus, subhirsutus, alis multis concavus: folia latis mollia, pedem aliquando longa, aliquantum incana, profunde in laciniis inconditas dissecta: capitula extremis hærentia famulis glabra, Cyani capitulis æqualia, singulis squamis in vnciales & sescunciales rigi-

das, mordaces, rectâ foret minantes spinas desinentibus, ut radiatam stellam imitari videantur: florum stamina purpurea, rarius alba: semen lubricum paruum, oblongum: Radix digitum vel magis crassa, mollis, succosa, neruum habens ut alæ radices, duriusculum, colore albescens, longa pedem, Raphano similis, Columnæ.

Ruellius stellatum hunc Carduum intelligit lib. 3. cap. 84. ubi ait. Tribuli terrestre genus quibdam esse putatur, quod vulgus Chaucetrapam, vel Calcitrapam vocat, quod cacumen veluti muricibus, quas vulgus appellat Calcitrapas, muniatur, & spinarum aculeis insigniter armetur, ramis humi procumbentibus, siliqua spinarum vallo muricata, in qua semen rotundum, nigrum, rudera & septa villarum oblidens: sed se-

Tom. III.

lium mihi nullam refertte Portulacæ similitudinem videtur, nisi forsitan id genus esset, cui Cicerculæ folium à Theophrasto redditur. Adhuc lib. 2. cap. 117. dicens. Acanos non multum ab ea quam vulgus Calcitrapam appellat dissidere cognoscitur, cum aculeata sit & brevis, latis & nocentibus vallata spinis, caule brevi ac toroso, floribus, seu potius pappis in cacumine purpureis, rotundis capitibus, & spinarum septo muricatis, inde nomen in vulgus abiit, quod murices Calcitrapas nominet: radice candida, digitali. Hanc spinam humo etiam rura domorum laqueantibus appendunt, ad arcenda ut putant maleficorum veneficia. Nascitur in incultis & asperis vbiq. Ea spinæ breuitate, & multitudine capitulorum rigentibus aculeis armatorum Eryngium sectatur, idem Eryngiorum generi nonnullis, ut Aëcius retulit, ascribitur. Echinato capitellorum habitu reliquaque facie album Chamaeleonem exprimit, quare ipsum Acanon, ut Theophrastus testatum reliquit, aliqui vocauerunt, inde ab Acano Latinis quæ aculeato sunt conceptu, aut floris sede, fructuque spinoso, scilicet Acanacea dicuntur, laborantibus Græcis vno verbo hos tres affectus includere.

Cordus in H. st. lib. 2. cap. 16. nomine Polyacanthæ describit, cuius icon è Dodonzi libris mutata est, pictorum fortè incuriâ, non optima.

Trago Eryngium alterum, quod minus recte describit. Apollinatis lib. 2. pag. 154. male pingit Calcitrapam pro Brachendistel / Maüstrew [Eryngio] nec sine errore hæc nomina germanica ei vna cum viribus Eryngii adscribit.

Tragus & Apoll. nec.

Apollo rad. 1. in Diasatyr. 2. Labuntur, inquit, qui Calcitrapam radicem, vulgè Cacatrepola, stellarum herbam, de qua Plinius lib. 12. c. 7. pro Eryngii radice, vtrumque confundentes, loco Secacul substituant. Item in elect. de cineribus. Matthiolum in Ruellium inuehitur, quod existimat Tribulum aculeatum Theophrasti eam esse stirpem vulgato Cacatrepolæ nomine: secus autem dicat Ruellius, cuius verba post descriptionem subiecta sunt. En ergo pigmea phalanx in Herculem dormientem Ruellium. Quid Apollo velit per auctoritatem Plinii nescio, nondum vidi, nisi error Typographi, & fortè legendum 22. lib. cap. 7. quia ibi fit mentio Eryngii, Matthiolum non tantopere mihi reprehendendus hoc loco videtur ut sit ab Apolline, non antiquans hæc Ruellii verba, nisi forsitan id genus esset cui Cicerculæ folium à Theophrasto redditur: apparet Ruellium dubitasse, ac veluti separasse Tribulū Dioscor. à Tribulo Theophrasti.

Dodon. lat. in fol. p. 721. Carduus stellatus. Nonnulli Stellariam vocant: Cordus Polyacanthum, sed tamen *σπυδαία* siue *σπυδαία* Theophr. (Gaza Aculeolam vocat) fortassis ab hac differt. Falluntur autem qui Eryngium aut aliquam eius speciem esse autumant. Match. Calcitrapam Italis dici ait, Germanis wallendistel / Kadendistel: Belg. Sterre distel: Gallis *Chausse trappe*. Gall. 1. 4. c. 60. Carduus stellatus & Stellaria & Calcitrapa. Non est species Eryngii. Figura in H. st. Gallica Dodonzi minus placet, potissimum quod capita attinet, quæ melius pingi possent. Brunfels. herb. p. 281. satis commodam figuram exhibet sub alieno titulo, nempe Eryngii.

Lobel. in Aduers. Carduus stellatus, seu Calcitrapa, & Tribulus Ruellii, Coronopus [adde quod vocabulum errore Typographi in Adv. omissum est] Plinii. Calcitrapam vulgè nuncupatam

M

Lobel notatur.

quia non manibus, sed calcibus atteritur, minus decuit Commentatorem in dictam præterisse. Indictum Matthiolo non est hic Carduus, ut sibi falso persuadet in Aduers. Lobelius. Idem in Obseru. p. 48. Carduum stellatum, siue Stellariam & Calcitrapam satis commodè (ut etiam in Icon. Plant. Tom. 2. p. 11. sub iam dictis nominibus) pingit, ac dicit: Perperam Polyacantha Cordo vocatur, an Myacanthus Theophrasti cap. 4. lib. 6. Spina alba vera Rondeletio, an Theophrasti Tribulus folio Cicerulæ Ruellio.

Clus. Hist. post. lib. 4. cap. 2. Carduus muricatus, vulgò Calcitrapa dictus: Iconem sine descriptione ponit.

Tabern. Icon. p. 701. & Hist. lib. 2. p. 376. Stern distel, Spina stella. Itē Icon. p. 702. & Hist. p. 377. weisse Stern distell, Spina stella alba. Frustrà ponit duas figuras.

Casalp. *Cacatreppola* vulgò quasi Cacotribulus, id est, infestus Tribulus, quidam Stellariam.

Camer. hort. 4. Carduus stellatus, Eryngium Guilandini, Calcitrepola. C. Bauh. apud Matth. Carduus stellatus. Schvvenckf. Carduus stellatus, Calcitrepola Italorum Matthioli.

Fab. Columnæ de plant. Hist. pag. 107. Hippophæstum dicitur, ac ab ipso cum Hippophæsto Veterum confunditur.

Locus & tempus

Nascitur circa vrbes, oppida & pagos, planis & campestribus locis, præsertim in Rhenana regione, aurore Cordo. Clusio teste crescit in nonnullis Stiriz & Moraviz locis, verum non adeò frequens ut in Germania reliqua & Belgica Galliz Provincijs. Exit passim, inquit Dodonæus, in Zelandijs & alijs maritimis, circa Antuerpiam frequens: reperitur & in Germania, Italia, ac alibi secus vias: Iulio & Augusto potissimum cum flore vigena. Carduum stellatum siue Calcitrapam acceperui Genevâ, attuli etiam Colmariâ, plantavi & seminaui in Horto E. C. verum non diu durat, Monspelij vbi abundat vocatur Calcitrapa. Florentem vidi mense Augusto inter Lannam & Genevam, & in vrbe ac extra urbem *en plain palus* vel alibi mense Octobri & Novembri. Reperi albo flore inter Genevam & Coloni: Copiosum observavi in Italia ut Brixiz & Mediolani in ipsa vrbe mense Maio, Patavij circa muros, Lugduni cum flore albo & purpureo Septembri & Octobri.

Vfus & Vires

Angerius ad calculum plurimum prædicat. Facultate autem hic Carduus, Dodonæo teste, ex-calfacientis naturæ est. Semen ad urinæ difficultatem commendatur: urinas ciere & calculos expellere fertur cum vino exhibitum. Baptista Sardus aquam ex hoc Carduo destillatam auxiliari affirmat lue venereæ infectis: iecur item huius vsu adiuvari, obstructions eius tolli, sanguinemque à vitiosis humoribus emundari, & aduersus diuturnas febres, siue quotidianas, siue tertianas, vtiliter exhiberi. Pont. de morb. int. lib. 4. cap. 8. ad diarrhæam in lotionem crurum cum astringentibus præscribit radices Calcitrapæ. Item cap. 10. ad dysenteriam.

LEVCACANTHA VETERIBVS.

CAP. XVII.

Descriptio

DE *Leucacantha* quam Romani Gniam Cardui, Thulci Spinam albam vocant, Dioscorides

breuius, quam nobis ad eius cognitionem comparandam necesse fuerat, scripsit. *Leucacantha radix*, inquit, similis est Cypero, amara, valida (vel ut alij *μαρὰ ὡς κύπερος*, i. e. amara valde) Hæc manducata dentium dolores mitigat. At decoctum eius cyathorum trium mensurâ cum vino potum, auxiliatur pleuritidis diuturnis, ischiadicis, ruptis, & conuulsis. Sed & succus radices potus eadem facit.

Nec fufius Plinius. *Leucacantha*, ait, quam alij Phyllis, alij Ischiada alij Polygonaton appellant, radice Cyperi, quæ cōmanducata dentium dolorem sedat. Item laterum & lumborum, ut Hiccius tradit, semine poto drachmis octo, aut succo. Eademque ruptis conuulsisque medetur.

Galenus *Leucacanthæ*, quam aliqui Polygonaton, aliqui Ischiada vocant, radicem amaram esse dicit, & propterea secare ac ficcare tertio ordine. Verum in calefaciendo primi ordinis esse.

Ex qua breui mentione, quæ sit hodie *Leucacantha*, haud facilè est decernere. Illud saltem extra dubium est, quod *Leucacantha* [Alba spina] non solum vocum transpositione & compositione ab *Leucacantha* soluta compositione i. e. Spina alba, differt, sed etiam re ipsâ maximè, quod aperte præsci authores monstrant, qui seorsum & diuersa, de vtraque tractant.

Suspiciatur Cornarius eam esse Spinam, quam vulgus Herbariorum Carduum Mariæ, Matthiolum lacteum appellat, quam opinionem non approbamus cum Lobelio.

Figura, quæ apud H. Lugd. lib. 14. c. 11. pro Silib. seu *Leucacantha* Loniceri ponitur, est Spina alba siluestris Fuchsi, siue *Acanthij* quorundam. *Leucacantha* non est *Carlina* illa, quæ caulem profert, licet Dodonæus eius fuerit opinionis, teste Lobel. Lonicerus pro *Leucacantha* male ponit lib. 5. cap. 28. nomine *Weißgarten distel* Carduum, qui *Echinopus* cognominatur. *Leucacantham* Dioscoridis suspiciantur Lob. & Pena esse Carduum bulbosum Monspeliensem. Sed errant, ut patet capite de *Acantho* siluestri Dalechapij, siue Carduo bulboso. *Leucacantha* Mōspelijsi Dalechapij in Hist. Lugd. lib. 14. c. 10. genuina non est, ut periti Herbarij nobiscū iudicant, sed Carduus Galactites. Spinam Solstitialem, quam Sesteriensis *Auricle* vocant, quidam pro *Leucacantha* monstrant, quorū opinio nobis multum aridet. *Leucacanthæ* loco sumi Carduum Benedictum conqueritur Matthiolum. Sed conqueritur sumi & eius loco Chamæleonem album. Apud Tragus lib. 2. c. 117. contendunt nonnulli, Eryngium vulgare esse *Leucacantham* Dioscoridis. Rhamnus [Oxyacantha Matthioli] in ascriptis Dioscoridis *Leucacantha* vocatur, teste Gesnero.

SPINA SOLSTITIALIS.

IN frequentes ramos diuaticata est, caule gracili, bicubitali, albedo tomento vndique obito, membranarum passim secundum longitudinem apertis alato: folijs stipato vna cum ramis ad Cyani folia accedentibus, duarum triumve vnciarum longitudine, & longioribus, per superiores ramos vix vnciam longis, albicantibus, hirsutis, quæ in florem eunte caule, serè decidunt, capitula Cyani capitulis aequalia, longis rigidis luteis Cardui stellati spinis è singularum squamarum margine

Aequiuoca

Acanthi lench.

Card. Maria

Spina alba siluestris Fuchsi.

Carlina

Descriptio



mucrone natis infesta, florum stamina lutea, quæ tandem in pappos euasculant: radix satis longa lignosa.

Camer. hort. Carduus Solstitialis, "sive spina Solstitialisquam Allobroges nominant Aureoles, ob floris colorem aureum. Cæsalp. l. b. 13. c. 49. Cacaurepola altera. Dodon. Latin sol. p. 721. Spina

solstitialis Cardui stellati altera quædam species. Lobel. Aduers. Spina solstitialis, Aureoles Provincialis, an Pliniana? Stellato Carduo similis, nec minus nobilis spina, aut Stella solstitialis. Icon. Plant. Tom. 2. pag. 12. Spina solstitialis. Pontæ in Baldo, Spina, seu stella solstitialis Penz. Gesn. in epist. ad Io. Bauh. Spina solstitialis & Spina cætrina.

Locus & Tempus

Spina solstitialis florens adhuc in nostro horto Genevæ mense Nouembri, hiemem non pertulit, D. Felici platero feliciter provenit Basileæ, ut & mihi Montbelgardi in horto Il. C. Monspelii abundat sponte, mense Augusto florens, sicut & Autumno reliquo & Vere. Eandem ex semine ortam vidi Tiguri in horto D. Funckii mense Septembri.

Vires.

Spinam solsticialem annotavit Valerandus Dourez efficacissimam in morbo regio ex experientia Fontanoni. Florem atque radicem, id annotante Camerario, mirifice prædicant valere in Cachexia, hydropo, febribus diuturnis, virginum decolore facie, & aliis obstructionibus. Eius decocto vel destillata aqua rustici vtuntur ad coxendicis dolores, punctiones laterum, lienis tumores, & sudorem ciendum.

ACARNA FLORE LVTEO.

Descriptio



Carduus quem à Valerando Dourez habui radicem demittit sesquipalmarem, crassiusculâ, albam, fibras raras è lateribus producentem, circa caput grandescit, cæculos emittens plures patulos, per terrâ sparsos, duum, cæsimue aut etiâ quatuor ferè vnciarum: varîe diuaticatos lanugine alba

rectos, membranaceis appendicibus tomentosis spinosisque secundum longitudinem alatos: folia creberrima, extremis potissimum ramulis, vnius aut duarum vnciarum, non totam semunciam lata, incanâ lanugine vtrinque pubescentia, nonnihil sinuata, non tantum infesto mucrone luteo, rigido, longo minantia, sed & pari fertate spinas è marginibus iaculantia: capsa oblonga occultant dense foliorum phalanges, lanuginosis squammis imbricata, ex pappo candicante pendente semine oblongo, Cnico simili, multo minori, minus candido, & striis nigricantibus variegato.

Anguil. epist. 8. dicitur Acarna Theophrasti, quam ait in Illyria in insula Lesena copiosam inueniri, spinis luteolis, in cæteris totam albam, ramis pluribus, floribus luteolis, ex paruis echinis, semine simili Cnico, coloris rufescentis [Taneto.] annuam esse plantam.

Lobel. in Adv. p. 373. Picnocomos Cretæ, Salonensis Gallo-provinciæ, pusillus, pulchellus & rarus Carduus, &c. Idem Obs. pag. 484. Icon. Plant. Tom. 2. p. 14. Picnocomos Cretæ Salonensis Galloprovinciæ Aduersariorum, Chamæleontis nigri species, fortè Acarna humilis quorundam. Item Obs. pag. 486. Icon. Plant. Tom. 2. pag. 16. Acarna Valerandi altera. Figura à Lobelio binæ exhibitæ pro Picnocomo & pro Acarna altera Valerandi valde sunt similes, sicuti & descriptiones, suspicor eiusdem plantæ.

Tabern. icon. & Hist. Acarna Valerandi altera. Item Icon. & Hist. Chamæleon niger, Groß oder Schwarz Ebertwurz. Ambæ figuræ sunt eadem cum iconibus Lobeli. Hist. Lugd. pag. 1456. Picnocomos Cretæ Salonensis Penz. & Lob. Item p. 1484. Acarna Valerandi altera. Dux figuræ, dux descriptiones vnius plantæ.

Reperitur Acarna Anguillaræ in Schiaunonia [Illina] & copiosè in insula de Leseno. Nos qualem pinximus habuimus à Valerando Dourez.

Locus.

ACARNÆ SIMILIS FLORE

Purpureo Chamæleon Salmanticensis Clusii.



Chamæleon, Descriptio Cinquiflorus, Salmanticensis vocatur, tamen si historia proflus refragetur: asinitatem tamen habere videtur, cum ea planta quam Anguillara pro Chamæleone nigro Dioscoridis exhibet: Est autem hæc planta ex Acarnæorum genere: caulem pedalem habet interdum etiâ cubitalem, multis aliis siue ramis concanum, striatum & quasi sulcatum, durum tamen & firmum: folia numerosa, longa, angusta, candicantia, spinis horrida: summis ramis

M 2

veluti umbellæ quædam ex quinis aut senis cauliculis siue capitellis spinosis constantes innascuntur, in quibus *stus* purpureus dilutior, (maturo semine) subinde in pappum evanescit, reliquorum Acanaceorum more: semen est Cnici seminis forma, sed minus, foris subnigrum aut cinerei coloris, intus candidum, dulce: radix nigra, dura, si gulletur, dulcis. Tota planta *argvâdis* est, & firmarum spinarum vallo munita.

Dodon. Lat. in fol. pag. 717. Chamæleon niger Salmanticensis. Lobel. Obs. pag. 486. Chamæleon Salmanticensis Clusii [ita etiam inscribitur in Icon. Plant. Tom. 2. pag. 17. & H. Lugd. p. 1456.] ortu, folio, totaque facie Acarnæ admodum affinis est, & fortè eadem nigri Chamæleonis hæc species agro Salmanticensi oriunda, & à Clusio literis prodita: flore purpurâ diluto. Tabern. Icon. & H. stor. Chamæleon Hispanicus Clusij, Spanisch Ebertwurz.

Locus & tempus

Spinis rigentibus acutis similem Acarnæ Carduum dedit mihi Heidelbergæ Dom. Sprengerus nomine Cardui ferocii similem itidem Carduum armatum atrocibus spinis, foliis vtrinque etiam candidis, vidi in horto Di. Friderici Meier Argentinz, flores quoque in horto Di. Obrechtii Luristonsult. mense Augusto flore purpurascente, qui an idem esset vel diuersus à Chamæleonte Clusij asserere non ausim. Agro Salmanticensi frequens: floret Iulio & semen Augusto maturum est.

ACARNÆ AFFINIS LEO FEROX flore pallido.

Descriptio



clausus. Lobelius.

Lobel. Obs. pag. 485. & Icon. Plant. Tom. 2. p. 15. Phœnix, Leo, Carduus ferox. Ital. *Cardo fiero*, *Leone detto*. Tabern. Icon. & Histor. Carduus ferox, Phœnix, Löffendistel. Dodon. Lat. in fol. p. 726. Leo, Carduus ferox.

Locus

Planta rara & vix nota, nullius propterea vltus: audit tamen Lobelius quibusdam aridis collibus Italiz, ab Apenninis non ita distitis, magno proventu gliscere.

HVnctuosus Acanacei generis facile Phœnicæ, Leonem ferocem dixere nuperi à spiculis & infestissimis spinis: nihil enim aliud è foliis aliud è capitulorum exordiis, quam spicula & vepres vnciam & selescunciam longas videas: cauliculus vix palmum æquat: *stus* Cnici sylvestris, pallidus, spinis & aculeis fruentibus horridisque

POLYACANTHVS CASABONÆ

Acarnæ similis.

Descriptio



Polyacanthus est Carduus bicubitalis circiter, per cuius caulem rotundum, album, lruè, ramolq; folia dodrantalia ac etiam longiora, vnciali latitudine, acuminata, superne ex atro virore splendens, inferne tomento candicante obsita densa, pressa, nec nisi scalpello aut alia eius nodi re ten-

tes radere, cōspicuo, æquabili marginum circumscriptione, nisi prohibeant spinulæ flavescentes mordaces, quæ ex intervallis binæ, ternæ, aut quaternæ, rariùs singulares, in quas nervi desinunt qui oblique à magno secundum longitudinem decurrente nervo in bræa exporriguntur. Semen paruum, oblongum, lucidum, nigrescens. Folia superiora, interdum lata vnciam, etiam & semina, & capita abundant rigidis spinis.

D. Casabona Herbarius Ducis Florentiz misit cum hac inscriptione Italica, *Leon di cardi maschio*.

Lobel. Obs. pag. 486. & Icon. pl. Tom. 2. pag. 16. Acarna Theophr. Anguillare. Lobelij descriptionem & figuram exhibet etiam H. Lugd. pag. 1484. hac inscriptione: Acarna Theophrasti Anguillare Lobelio.

Tabern. Icon. & Histor. Acarna Theophr. Anguill. wild Carlin.

Ferd. Imper. hist. nat. lib. 28. c. 1. tribuit Acarnæ Theophrasti folia longa spinosa, in circuitu extimo candicantia, parte internâ viridia. Ipsas quoque spinas albas, ternas, in foliorum ambitu ordine quodam iunctas. Florem azureum: semen nigrum papposum. Icon Imperati multò melius convenit nostro Carduo, quàm Lobelij, lectores omnia diligētis examinent, & an Lobelij & Imperati icones diuersarum sint plantarum vel vnius.

Montbelgardi & Stutgardiz in horto Ill. E. C. Locus; provenit, semine à Casabona misso nata. Eundem Lutetiz observare memini in horto Robini, frigoris est impatiens. D. Zvingerus in horto aluit cui etiam flores produxit.

CARDVNCCELLVS MONTIS Lupi.

Statim è radice simplice complura nascuntur Descriptio: folia, duas vncias aut palmum longa, rigidula, in lacinias spinosas, semunciales, longiusculè distantes divisa, Cardui stellati foliis similia: caulis plurimum nullus, aliquando sesquipalmaris, foliis paucis



pauca minoribus vestitus, breui lanugine subhirsutus, caput grande in cacumine gerit vnicum oblongum, rigidis nervosis spinosisque foliis oblitum, quibus squammis oblongis & innocentibus subsunt, pappum coercentes, quem floris purpureis marcescens relinquit.

Lobel. & Pena Adv. p. 374. & Icon. Plantar.

Tom. 2. pag. 20. Carduncellus montis Lupi.

Locus.

In planitie prope montem Lupi versus Meridiem copiosam oblerunt & collegit gener H. Cherlerus, & tam aculeam quam sine caule, nec vllibi praterca ipsi videre contigit.

CARDVVS PARVVS.




Inuentis mihi inter plantas Valerandi Dourez pulchellus Carduus, longiusculâ sed gracili radice nixus, à qua caules surgunt aliquot tenues, palmares & altiores, in ramos diuisi per quos foliola vncialia, culmum lata, spinulis per margines donata, subhirsuta, capitulo extremis ramulorum herentia, inter re-

ticulatos pinnatorum foliolorum cancellos conclusa, Cyani similia, minora. Carduus hic non muled maior est ipsa icona prout à nobis vilus.

LINCOSTIS HERBA ARISTOTELIS.

Emisit Aristoteles herbæ cuiusdam Lincostis dictæ, eiusdemque multum spinosæ, quæ aliam procreet plantam, hoc modo. Quia in aqua crescit, & multos aculeos habet, & hinc inter spinas multum liquoris colligit, qui putrescens, successu temporis, mediante Solis calore, aliud [numero] herbæ genus producit: de ea etiam Cardanus lib. 8. Subtil.



ECHINOMELOCACTOS.

Arduum hunc Indicum vidimus apud Charriff. Fratrem C. Bauhinum cui spinæ robustæ, Tom. III.



quædam curuæ, alia recta.

De hoc autem Carduo hæc tradunt Lobel. & Pena in Aduers. pag. 376. vbi iconem proposuerunt: Mixæ raritatis & venustatis Carduus, quæ spontè edunt noui orbis Insulæ Occidæ, præsertim ea quæ D. Margaretæ sacra est, vnde reduces Naucleri Anglici

Locus.

oris, Morgano peritissimo Pharmacopæo Londinensi attulerunt. Sit ne cæli Europæi patientia huius semen, nondum scimus: sed primo Verè experiemur. Videtur autem hic quasi quidam naturæ Cinnus ex Pepone, Melone, & Carduo coaluisse: eoque nos Echinomelocacton, siue Melocardium Echinatam, signatâ magis quam receptâ nomenclaturâ vocauimus, &c. Mant. Icon. Tom. 2. p. 24. Echinomelocactos, siue Melocardium echinatus Indiarum Occidentalis Teut. 27. Tom. 2.

Clusius qui nouam iconem proponit ait in Exot. lib. 4. cap. 24. Anno 1601. plures Echinomelocacti plantas à quibusdam naucleris peregrè redeuntibus in Hollandiam illatas, varias autem fuisse quas conspiciebat, plantæ magnitudines, prægeandes aliquas, mediocres nonnullas, patuas, & nondum plenam maturitatem consequutas alias. Mediocre m fecabam, quæ duodecim vncias longa erat: infimæ partus terræ insidentis ambitus quinque & viginti vnciatum, à qua in metam affurgebat: sedecim profundis sulcis tondemque elationibus costis prædita, quarum singulæ nouem tomentosa tubercula habebant, è quibus decussatim acutissimæ firmissimæque, & tanquam corneæ decem spinæ, vnciam, vt plurimum longæ, interdum etiam ampliores, prodibant, inter quas binæ (in maioribus ternæ, in minoribus singulares) surrexerant: rea autem sessili parte plantæ, quæ videlicet supra terram incubuerat, & veluti fornicis instar curuata erat, sulcæ & nigricantes, mediâ parte, ex spadiceo candicantes, supernâ cineracei coloris, cuspidibus verò purpurascens. Summâ parte plantæ, siue verius fructus [etenim foliorum expertus erat, & radice duntaxat nitebatur] densissimum tomentum emicabat ad vnciæ altitudinem, triusque verò latitudinem in diametro, cineracei coloris: exterior fructus pars viridis erat, qualis ferè foliorum Tunz, à nonnullis Fictis Indica & Opuntia appellata, parte tamen terræ proximâ ex albo pallefcebat interna pars siue pulpa, candida, spissa, & aded lenta, vt in tenuissimas etiam laminas secta & digitis extenta vix frangi posset (quæ propter concoctum valde difficilem esse, coniecturam faciebam.) Cucurbitæ quodammodo saporem referens: pulpæ medullium & ipsum cor mimis album erat, nullamque cavitatem habebat, quæ semen contineretur, sed solidum erat: suprema autem pulpæ pars, cui tomentum in

M 9

hærebat, non nihil purpurea sebat: ipsum verò tomentum tenuissimum instar lapidis amianthi, & candidissimum erat, in quo latebant multæ exiles spinulæ purpureæ, quæ supra tomentum sese exerentes, rigidiusculæ erant: ab extrema pulpa rari quidam prodibant in tomento latentes folliculi membranacei, siue vaginulæ, coloris sanguinei elegantissimi & floridi, vnciam longi, supernâ parte crassiusculi, infimâ autem, quâ videlicet pulpæ adhæserant, angusti & tenues, pleni semine exili, nigro & splendente, instar seminis Amaranthi purpurei, vel Symphoniz, alio nomine blitum versicolore folio appellatæ, summo horum folliculorum capiti inhærebat oblongum quidpiam, tanquam flosculi rudimentum, quod supra tomentum caput extulisse videbatur, sed prorsus aridum, ut qualis formæ fuisset, coniecturâ assequi nequirem: radices crassiusculas, longas, lentas & fibrosas, insuper alias in ambitu minores adhuc retinebat ex infima sede productas: &c.

H. Lugd. pag. 1443. Melocardus echinatus Penn. Tabern. Icon. & Hist. Melocardus Melonen distel.

CARDVVS PITAHAYA FRVCTVM ferens.

Descriptio

Carduum non minus admirandum quàm Melocardium echinatum descripsit Ouiedus lib. 8. cap. 24. in Hispaniola insula nascentem. Pitahaya, inquit, fructus est pugni mediocris magnitudine. Hunc profert Cardui genus, spinis quidem horridum, sed aspectu iucundum & pulcherrimum: foliis enim caret, sed horum & ramulorum vice brachia quædam habet, sex pedes longa, quadrangula, in medio canaliculata, in quo medio & in angulis spinæ sunt valdè pungentes, venenatæ, satis longis spatiis à sese distantes, ternæ simul, aut quaternæ digiti maximi longitudine. Inter hæc brachia fructus medius exoritur, qui Pitahaya illic nominatur, cortice crasso, spisso, & veluti squamoso contextus, qui tamen facile cultro inciditur, etiam si tota interiore parte granulis carni permixtis, siquidem nostratum modo, sit repletus, coloris venustissimi, nempe Chermesini saturati. Est & tota hæc pars edulis, manûsque inficit Mori modo. Qui comederit, non statim, sed duabus horis ab eo sumpto, urinam reddit planè crudam. Est tamen innoxius & spectatu elegantissimus, sed qui cum profert Carduus horrendus, specie valdè agresti & admiranda, viridi, cinerea, candicante.

Huius meminit & Cardan. de rerum varietate lib. 13. cap. 67. dicens. Tunæ alij Pithaiam (fructum) adnumerant, cum qua in duobus convenit, in colore rubro splendido, quo manus inficit, quòque aded urinam tingit, ut sanguis exquisitissimus videatur: in granis fructus, quæ intus habet rubra velut Ficus, & ex aculeatis plantis oritur: sed Pithaia coronatum non habet fructum, ut Tuna, sed Malo Appiano non ab similem formâ, colore rubro, cortice præduro.

NANA SIVE STROBILVS PERUVIANVS, & Ananas.

DE Ananas Theuetus, cuius figuram primo loco posuimus, ita scribit: Fructus

quo in America plurimum vtuntur, ibi Nana dictus, mediocris Citrij mali magnitudinem æquat, specie est Pinei Coni, ut & figura docet. Maturus flauescit: sapore & dulcedine excellens, & vel saccharo ipso iucundior. Verum ad nos importari recens nequit, aded fugax existit. Nulla fert semina: ideòque non nisi furculis transplantatur, eo ferè modo quo apud nos per insitionem. Crudus adhuc elui tam est rudis, atque ingratus, ut etiam fauces exconet. Folium eius arboris primo ortu Iunci lausolij simile est.



Hanc H. Lugdun. pag. 1840. Nana Brasiliæ-norum Theuetus: Item pag. 1841. Nana fructum, siue Yamama nominat.

De hac loquitur M. ffeus Ind. lib. 2. in Brasilia ex omni genere fructuum palma tribuitur iis quos vulgus Ananazes appellat, planta est humilis, cuius è ramis veluti pinea nucamenta dependent, præ-

mollia, hæc suo tempore in frusta desecta, gratissimè simul odore ac sapore non recenti duntaxat edulio sunt, verum etiam in longum tempus adseruantur è Saccharo.

Hanc eandem, ni multum fallor, Onied. Hist. suæ lib. 7. cap. 13. tradit in hunc modum. Nascitur in Hispaniola reliquisque vicinis insulis fructus quidam, quem nostri à Strobili siue Pineæ nucis similitudine Pinas appellant, non quod eiusmodi lignosas squammas habeat, sed quod eius cortex simili modo distinctus, videatur, tametsi non squamatim, sed peponis modo cultello integer auferatur. Ut autem succi bonitate & suauitate reliquos fructus hic antecellit: ita color ille pulcherrimus ex luteo virescens, paulatim per maturitatem virore evanescente. Odor iucundissimus qualis ferè in eo Persicorum genere quod à Malis & Cotoneis nomen apud Italos & Hispanos inuenit, magnitudo illi vulgaris Melonis. Nascuntur verò singuli fructus ex Cardui genere aspero & spinoso, oblongis prædito foliis, è quorum medio profilit caulis rotundus vnicum ferens fructum, qui post 10. aut 12. mensem postea maturefcit. Eo sublato nullus præterea in planta nascitur fructus, ideòque ea velut inutilis abiicitur, &c.

Quibusdam locis nascuntur etiam hæc genera spontè in agris abundanter: at quibus cultura accessit, longè sunt illis suauiores, & cultoris beneficium abundè compensant. Huius fructus abundantia auctoritatem eius minuit: Sed tamen & his insularibus cum bonitate, tum magnitudine præstant, qui in continenti nascuntur. Maturus fructus quindecim vel viginti diebus conservari potest.

Mangas fructus Clusii reuocat in memoriam, Yamama Ouiedij, tametsi plus similitudinis habere ipsi videatur cum eius Anon de quo H. n. g. lib. 1.

Mangas Anon.

cap. 47. egimus Iayamz Ouiedi Theuetus, si Clusio credendum apud Garc. lib. 2. cap. 9. similem describit nomine Hoyui cap. 33. lib. sing. America de quo paulo infra dicemus. Sed & Monardem l. 3. c. 63. Ananam Theueti intelligere credimus, dicentem: Nux Pineae siue Strobilus Peruanus celestemus est totius Indiæ fructus cum apud ipsos Indos tum apud Hispanos.

Acosta Ananas historiam nunc adscribamus. Peregrinus fructus, & ex Provincia S. Crucis in Brasilia primum in Occidentalem Indiam, deinde etiam in Orientalem Indiam delatus, in quibus nunc vberissime prouenit. Citrii verò mali

Ananas Acosta.



magnitudine est, admodum flauus & odoratus cum probe maturus est, adeo ut prætereuntes ex odore dignoscere queat ædes in quibus sit succulentus & grassissima poris, procul inuentus. Cinara videtur, sed pungentibus atuleis caret. Singulæ stirpes Cardui edulis magnitudinē æquant, vticumq; malum gestant in medio quasi caule, & circa

eum multas alias proles, quarum nonnullæ et a suo fructu præditæ sunt. Qui itaque fructus maturos colligunt, proles illico terræ mandare solent: de quibus singulæ deinde stirpes proueniunt suo Malo onustæ, vti mater, quæ intra anuum spatium colliguntur. Eius radix Cardui eduli perquam similis est, sed & folia non sunt disparia tamen ad Ananas situleis folia magis accedat. Vulgò *Ananas* vocant: Canariini verò *Ananasa*. Cum primum in Indiam illatus est hic fructus, singuli decem ducatis, aut paulo amplius æstimati sunt: nunc verò propter abundantiam tamen neque saporis neque odoris Pruniz cedat, vix duobus regalibus Castellanis veneunt. Hæc *Acosta* ex vrsipne Clusii de suo Ananas, cuius historiam iisdem verbis refert H. Lugd. in Appendice p. 12. ac Acanam *Acostæ* inscribit: ac de quo etiam similia scribunt Paludanus Ouiedus & Theuetus.

Hic ita traditis, superest ut Ananas ex Linschottani sententia prosequamur. Ananas fructus est, inquit, perelegans & speciosissimus, ut non desinat, qui hunc fructum sua forma delictabili reliquos omnes superare putent. Cretæ humi incumbens herba asperæ & expansæ *Azucar* seu *Semperuivo* Hispanico haud ab simili, quoad folia. Quæ primò viridia, maturatione demum aureum colorem acquirunt, cum modica quadâ rubedine. Intus tamen perpetuò flauus est, sectione facillimè peruius: odore fragrantissimo, sapore qualis Mali Persici benè maturi. Estur ex vino: sed sepius excitare solum estu liberaliore.

Nam stomachum impensè refrigerat, ac proinde nimis salubris censendus. Abundat succo, eoque tam acri, ut cultello quo dissectus fuit non deterso, vnica nocte notabilia vestigia exesione sua imprimat. Conditur cum saccharo. Gent hic fructus velut umbellam quandam aliquot foliis constantem, ex qua si terræ mandes alia proueniunt,

Ananas Linschott.




et si vel per quatuordecim dies iacuerit. Delatus est hic fructus primum à Lusitanis ex Noua Hispan. & Brasilia in Indicas oras, in quibus nunc vndique & magna abundantia prouenit. Maturescunt hi fructus quadragesimali tempore, tum enim gustu pollent gratissimo. Melonis sunt magnitudinē, formā conii, aut Nucis pineæ, facili tamen scinduntur,

ac Persicum colore maturum representant, pari item ferè sapore. Verum delicato gustu supra omnes fructus præstant. Succus musti dulcoris instar vix satietatem implet. Calidi sunt nam si cultum horæ mediæ spacio infertum teneas ferè consumptus erit. Sanè communis vti hominibus vix nocent, nisi supra modum sumantur, vsque ad gulam. Infirmis haud permittitur. Vulgò scinduntur orbiculatim vinoque merfantur, suauemque omnino cibum præbent. Et hæc ex duplici versione Linschottani. De hoc etiam fructu scripsit Leuinus Hulsius in navigatione Holland. in Indiam Orientalem: vt & Leri cap. 13.

Nux Pineæ, siue Strobilus Peruanus, stomacho utilis esse censetur, item cor roborare, languentem appetentiam excitare. Vulgaris est per vniuersam Indiam, & magna apud incolæ existimationis: editur prima mensa, & in pomeridiano æstu nam frigidus esse perhibetur. Siccus ad meperlatus est, & conditus siccus, ut illius formam contemplerer, duntaxat vtilis fuit: ac conditum grati saporis deprehendi, tamen asperiusculum immaturum dum condiretur fuisse arbitror, inquit Monardes. Hætenus in Medicum vltum non est receptus Ananas, sed solummodò ob saporis gratiam commendatur. Calidus & humidus est, editurque maceratus in vino siccatur & inuidissimum Regem Ferdinandum comedisse uti Persicum Malo-cotoneum & facilis est concoctionis: nimis tamen inflammationes parit quemadmodum Duriones Malacenses. Si medius seceatur, & partes denud conungantur, vniuersus dies aut noctis spacio cultellus relinquitur, inuenietur tota ea pars quæ in vulnere hæsit assumpta. Et hæc *Acosta*, qualis etiam Paludanus tradit.

Vires & Vires.

Descriptio. AIZOI MAIORIS ORTV PERSIMILIS
exotica planta Lobel.



Lobel. in Teu-
ton. p. 458. ceu
& in Icon. Plant.
p. 375. hanc ita in-
scripsit. Aizoi ma-
ioris ortu persi-
milis exotica
planta.

Clusius Iconem
eādem, quam nos
ex Lobelio al-
sumpsimus ponit,
ac scribit: Qui ex
ex Iava anno 1599
redibant naucleri
Ananas fructum
saccharo cōditum
reportabant, & e-
ius planta germi-
na viēna admix-
ta, quorum iconē
hic subiiciendam

curabam. Erat quidem is fructus satis suavis, sed
qui ob nimiam dulcedinē, mihi nanseam ferē ex-
citaret, cuius pars intima durior, & difficilis (et
apparebat) concoctionis. Folia porro antē viderā
ex Guineā delata (vbi fructus Pinus à Lusitanis
appellatur, ob aliquam formę eum Pineæ nuce si-
militudinem:) Aizoi aquatici foliis nō valdē dis-
similia, minūs tamen crassa, & in ambitu serrata
siue dentata, vt in subiectis germinibus animad-
uertere licet.

ANANAS SILVESTRIS, FOLIO ALOES
fructu Cupressino.

Descriptio



gnam foliorum comam fundunt, maiorum quā
quæ in arbore sunt, quæque procul intuentibus
Aloës foliis simillima videantur, tenuiorum ta-
men, pluribus spinis horridorum, & dilutē viren-
tium: adnatis se propagat, alique stirpes ex aliis

Alciūs al-
surgit
qui Ananas
silvestris nun-
cupatur: nām-
que truncum
habet hastæ
magnitudine
læuem admo-
dum, rotundū,
& Mali aureæ
crassitie, spinis
horridum: fo-
lia spinosis
cuspidib. præ-
dita, & per am-
bitum molli-
bus spinis se-
pta: singulæ arbo-
res secundū
radicem sum-
mā tellure ma-

enascuntur, præsertim in sepibus & hortorum
ambitu, quos egregiē muniunt. Rami foliorum si-
mul glomeratorum capita proferunt, flauentium
admodum, & tenerorum, suauissimi odoris, quæ
nihil aliud sunt quā flos ipse: ex horum singu-
lis spica prodit Arundinis spicæ non absimilis,
sed crassior, compactior, & elegantior, odore Cē-
dri. E ramis dependent fructus *Ananas braus*, id
est, *Ananas siluestris* dicti, quia cum domesticis
nonnullam habeant similitudinē, Melonis ma-
gnitudine, coloris rubri elegantis & oculos oble-
tantis, totū in partes diuisi, quemadmodum Cu-
pressini strobili, seu nuces exsiccant, sed tubercu-
lis foris obsui, vt procul spectantibus magni Pi-
nei strobili appareant.

Arabes, descriptionis autore Acoſtā teste, ex
versione Clusij, *Queura* vocant, quemadmodum
in Decan: Perſæ *Ananasa* & *Angali* florem (qui ca-
put illud foliorum odoratum est) Arabes *Chux-
raid*, Perſæ *Pixcoxuith* dicunt. Turcis est ignota.

Clusio ad Acoſtam *Ananas siluestris* habens
aliquot notas non dissimiles Aloë Americanæ.
Cui hæc Clusius in postreditione omisit?

H. Lugd. *Ananas siluestris* Acoſtæ.

Capitum teneriora folia seu flores crudi edun-
tur, Carduolique sapiunt: sed exiguum alimen-
tum præbent.

Succum commendant Arabes ad iccoris & re-
num calores, renum vlcerata, purulentas yrinæ, pe-
nis excoꝛiationem, diabetem & Erysipelas.

CARDVVS EX MADAGASCAR
Indiæ.

Descriptio



Non fru-
ctus, in-
quit Clusius, sed
elegantissimi
cuiusdam Car-
dii generis ca-
put (decimus
quintus eius
fructus Exot.
lib. 2. cap. 15.) le-
ctum in ma-
gno illo sinu
Insulæ Mada-
gascar, à Lusit-
anis Baya d'An-
lon-gil nuncu-
patō, Orienti
exposito, ele-
uatione Poli
antarctici sex-
decim grad. in

quo Hollandi primā suā navigatione, & aquam,
& alia ad victum necessaria comparabant, aliquot
diebus isthuc hæsētes, antequam in lauam perge-
rent. Vnicum porro huius Cardii caput reper-
tum in ligneis illis capsis à Naucleris relatis,
quarum antē meminī, cui nullum
nomen additum, sed scheda
duntaxat, indicans in
iam dicto sinu le-
ctum fuisse.

FINIS LIBRI VIGESIMIQUINTI.



HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM LIBER XXVI.

CORYMBOIDES, VEL CORYMBIFERÆ, ET MINVTIORA
CAPITVLA FERENTES; ALIÆQVE NONNIMIL SIMILES.

Reflans inter Capitatas Corymbos florum gestantes. Quanquam verò Prisci Hederae Baccas seu racemos Corymbos, & Ferularum caules ac racemos Corymbiam dicat Plinius, Corymbosque quos condiebant: tamen apud eundem legimus comantes auri fulgore Corymbos dictos flores, seu, ut ille ait, fructus Chrysocoma; quæ non infima est infra dicendarum stirpium. Estque κόρυμβος quodvis summum. Et pleraque hoc libro enumeranda flores gerunt densum, & in capitulum aggestum quendam minutissimorum staminum stiparum; quem Corymbi nomine rarisper complecti libuit; dum tu certius ac melius inuenias nomen. Οὐκ ἔστι τοιοῦτον ὅτινις lex vetat nulla. Sed illud cum Philosopho edictum volumus, oportere τὰ ὀνόματα τῶν ἔντων εἶναι ὁμοεικαστά.

OTHONNA VETERIBVS.

CAP. I.



Thonnam Dioscoridi fuisse incognitam, vel illud conuincere potest, quod nihil ex se de ea certi scribat, sed omnia aliis accepta referat, ex quorum tantum opinione famaue hæc de Othonna memoriz prodiderit. Othonnam aiunt nonnulli [his Codices quidam vetusti vsque ad habet hæc folia &c. omnino carent] maioris Chelidonii succum esse, quidam Glaucii: alii (ē) floribus corniculati Papaueris expressum [τῆς κορατίνδος μικροῦς τῶν ἀνθῶν χαλάν, quæ verba sic leguntur in veteri: τῆς κορατίνδος μικροῦς χαλάν: sed vulgatam scripturam Goupylus meliorem esse censet.] alii Anagallidis caruleæ, Hysciami & Papaueris succorum mixturam esse contendunt: alii denique Trogodytica cuiusdam herbæ succum, quæ Othonna vocetur: nascique eam in eo Arabiæ tractu, qui ad Ægyptum spectat. Habet hæc folia Erucæ [ἐὶς ἄκρον] proxima, crebrò perforata, & tanquam à tineis pertusa, squalore obsita, pauca: quare quidam Anemones speciem esse existimauerunt. Ex ea succus expressus oculorum medicamentis conuenit, ubi expurgare opus est. Mordet enim & quæcunque oculis caliginem offundunt, absterget. Tradunt & humorem quendam ex herba emanare, qui clorus, semotis lapillis, in pastillos ad eadem digeratur. Aliqui tamen affirmant lapidem Ægyptium esse, in Thebaide nascentem, æreo colore, exigua magnitudine, gu-

Tom. II.

itu cum seruire quodam & astringitione mordaci.

Othonne, inquit Plinius lib. 27. cap. 12. (tradens ea, quæ Dioscorides,) in Syria nascitur, similis Erucæ, perforatis crebrò foliis, flore Croci (Cocci CH.) quare quidam Anemonem vocauerunt. Succus eius oculorum medicamentis conuenit. Mordet enim leuiter (leniter, & calfacit CH.) & excalfacit, astringitque siccando. Purgat cicatrices & nubeculas, & quicquid obstat [oculis obstat vet.] Quidam tradunt lauari atque ita siccaram digeri in pastillos.

Iam pridem cogitauit Marcellus; & in eam partem inclinauit ei animus, ut crederet sui generis omnino esse Othonnam: quæ verò alia de ea tradantur à virium & potestatis similitudine ab aliquibus credita, dictaque fuisse: & ex eorum ratione, quæ Græci ἀπὸ θαλάσσης vocant, ad Othonnam translata fuisse.

Matthioli verò in Othonna suam ignorantiam accusat, quæ quia ei non nota fuit, protinus ab omnibus in Italia ignorari falsò definit, authore Guilandino in Theone.

Nobis quidem, inquit Sarraceni. In schollis, haud secus ac Priscis incerta omnino huius Othonnæ historia fuit in causa, ut è Recentioribus nonnulli varia variè in hoc Dioscoridis capite legerint. Ac inter cæteros quidem Rondeletius, ἀπὸ τῆς ἐν Ἰταλίᾳ, ἡδύσμου, legebat. Doctissimus Dalecāpius, ἀπὸ τῆς παλαιοῦς ut audio, legit παλαιοῦς. Marcellus, ἀπὸ τῆς χαλκῆς, λιγυρῆς. Attamen perbellè respondent, quæ de

N

Matth. 101

Othonna fertur Plinius, cum vulgata Dioscoridis lectione. Mirari subdit Matthiolum Herbam incognitam Italicè vocare Othonnam.

Flos Aphri-
canus And. Lacuna Florem Africanam Othonnam herbam esse, Dodonæo teste, suspicatus fuit, cum cuius tamen descriptione haud per omnia iste flos conuenit.

Herba Sen-
ilis Othonna accommodare voluisse Rondeletii Herbam venti ait Lob. in Adu. dubitatque de hac opinione in Obs.

Scrophula-
ria major Idem Rondeletius in pharm. supra Marciatum dicit apud Dioscor. cap. de Othonna, melius legi Mentham pro Eruca, ac eam esse, quam alii Clymichon putat, & quam Arabes Mentham maiorem vident, nos Scrophulariam maiorem. Cetera æquiuoca vide in ipsa Dioscoridis Othonna Historiâ.

TAGETES INDICVS MINOR SIMPLICI flore siue Caryophyllus Indicus, siue Flos Africanus.

CAP. II.

Descriptio



STriatos
Sprodit
caules, dodra-
rales, aut pau-
lo maiores, in-
tus fungulos,
alis aliquot
concauos: fi-
lia Tanaceto
similia, pinna-
ta, ex quinque
aut octo con-
iugationibus,
imparique ex-
tremo com-
missa, odore
viroso graui:
singularia sa-
turatè virent,
tres, aut qua-
tuor uncias
longa, semun-

ciam cireiter lina, circumquaque denticulis ser-
rata, in acumen debentia: flores extremis ra-
mulis hærent singulares, ex calyce turgidulo ob-
longo, simplice foliorum ordine radiati, colore
infra ex flauo, supra ex flauo ferrugineo, holose-
riceam telum imitante: medium obtinet flamina
numerosa, flauentia: quibus appenduntur semi-
na tenuia, oblonga, nigra: radix brevis, fibrosa,
ac ubi è terra prodit, bina habens longiuscula
folia. Non nostra ex Fuchsiâ iam erat para-
ta, quæ Tagetem flore pleno apprime potissimam
demonstrare videtur.

Garyophyllos Indicos, referente Trago Ger-
manico, lib. 1. cap. 192. quidam volunt esse Flam-
meam Violam, quæ Græcis *κάρδω* & *καρχέν* dicitur.
Idem lib. 2. cap. 145. author est vocari *Sammeto*
blumen (quasi dicas Serici villosi flores) & *In-*
dianisch Vågelin [Garyophyllos Indicos.] Sibi
videri esse Caltham Plin. Se non posse satis mi-
rari, cur nonnulli hanc plantam Arthemisiæ ad-
numerare voluerint, cum non solum formâ, sed
etiam odor & sapor manifestè reclamant. A fo-
liis Tanaceti similibus, Tanaceti speciem cense-
ri. Non esse porro Tageten Apulei cum eius hi-
storia nulla apud eundem autorem extet. Proin-

de siue Caltha, siue Scopâ regia Autumnalis, aut
quocunque tandem nomine appelleretur, certè sibi
esse quam gratissimam. Hæc ille, qui Garyo-
phyllorum Indicorum tria facit genera, exiguum
nimirum, medium, & grande, distinguens ea tan-
tum magnitudine & tempore, nec indicat, an sint
simplici, vel multiplici flore. Videretur autem pin-
gere Tagetem minorem flore simplici.

Tria quoque genera hæc Garyophyllorum In-
dicorum assignat Matthiolum in post. comm. eum
mag. fig. Lat. & Italicis. Non desunt, inquit, qui
Othonnam esse censeant eam plantam, quam In-
dicos Caryophyllos vocat vulgus, quib. ego quo-
que subscriberem, si hæc planta Eruca foliis ex-
cresceret, utque paucis, cribri modo perforatis, &
friabilibus. Verum cum foliosa sit planta, & non
paucis foliis referta, quæ Tanacetum potius, quam
Erucam referunt, eaque cribri modo perforata,
aut tanquam à vermibus erosa sint, nec friabi-
lia, non video sanè cur in horum sententiam
concedere queam. Nihil enim me mouet ad pro-
bandam horum opinionem floris color, & latifolia
itnago, aliis reclamantibus notis, cum nume-
rosa sint plantarum genera, quæ croceis & latis
proveniunt floribus. Ego quidem si mihi decer-
nendi facultas daretur, in Chrysanthemi genere
hanc plantam reponerem. Ceterum tria huiusce
plantæ obseruavi genera, floribus tantum differe-
rentia. Matthiolum autem genera hæc nunquā
inspexisse, illud nobis manifesto argumento esse
potest, quod non solum floribus differant, sed et-
iam foliis & caulibus, id quod hortulani norunt,
qui facili cognitione antequam flores proferat,
maiores plantas à minoribus distinguunt. At
porro, ut omnibus satisfaciatur, duas se addere In-
dicæ huius plantæ imagines: Sed has in dictis
commentariis nondum videre contigit.

Camerarius in eius Hist. germ. eadem tradit,
ac duo genera tantum pingit, licet tria esse refe-
rat. Sed in Epit. duo picta duntaxat agnoscit.
Videretur autem huius flores simplices pingere se-
cundo loco, hac inscriptione: Caryophyllus In-
dicus minor: Italis, *Garofano Indico minore*. Est
hic Matthiolo in commentariis dictis, Tertium
& postremum Garyophylli Indici genus, siue mi-
nus, floribus simplicibus foliorum coronameto.
Camer. hort. Flos Indicus minor flore simplici,
Tagetes, siue Africanus Flos.

An Dodonæo ritè perspectæ sint species Floris
Aphricani considerent lectores. Airis in H.
Gall. Flos Aphricanus, Flos Indianus, qui Gall.
vocat *Oeillet d'Inde*, Belg. *Thunis bloemen*
videtur doctis quibusdam Othonna Dioscoridis.
In foliis huius floris, si Soli opponantur, obser-
uari ferè possunt, quæ Diosc. de Othonna dicit.
Duplex huius inuenitur species. Maior est altitu-
dinis octo aut nouem pedum: colore Arantiorum
saturatiore parte superiore, inferiore pallecentes:
fioret primum Augusto. Minor incipit florere
Aprili & adhuc Maio, deinde tota Æstate, maio-
ri omnino similis, caulibus, foliis, floribus &
semine, nisi omnino minor esset, nam non
multum altior pede exurgit: ambæ tum fo-
liis, tum floribus odore sunt ingrato valde.
Dodonæus eadem de Florib. & Hist. lat. in fol.
habet, ac addit. Inter Calthas numerandus vide-
tur Flos cognomento Aphricanus. Huius duæ
species: vna minor, altera maior, erecta, ad tres,
vel amplius cubitos assurgens: folia vtriusque
cribri modo Soli aut lumini opposita, perforata
cernuntur: flores ex octo aut decem foliolis con-
gesti, inferius luteis, superiore verò parte in ful-

Matth. nat.

uo rubentibus, & obscure rubens villosum holo-
scicum æmulantibus: Est utraque species cum
foliis, cum floribus grauitè odorata: vtriusque
etiam flores, sed maioris frequentius subinde
multiplicantur: quorum foliola ab utraque parte
lutea vtpurimum: Sunt qui velint Plinii Peti-
lium lib. 21. cap. 8. Sed Petilius flos est autumn-
alis, circa vepres nascens. Andreas Lacuna
Othonnam herbam esse suspicatus fuit, cum
cuius tamen descriptione haud per omnia iste
flos cõuenit: nisi forte squalidior, & paucioribus
foliis, similioribus Erucæ, manifestiusq; perfora-
tis, in Aphrica quam in Europa nascatur. In hac
enim amplius, multifolius, foliis Tanaceto, quã
Erucæ similioribus, usq; non verè perforatis, sed
quæ talia lumini opposita tantummodò appa-
rent, gignitur. Et non rarò euenit, vt feruenti,
calida siccaque regione: ex sterili aut inculto, &
aprico solo, in humidius, cultiusque, vbique cæl-
lum clementius, translata stirpes luxurient. Nam
soli, cælique mutatio, ad stirpium mutationem
plurimum habet momenti, & maximè acceden-
te culturæ mangonio. Quæ tamen an tantum po-
tuerit, vt florem hunc totum penè transforma-
uerit expendèdum reliquimus. An Lycopersium,
cuius Gal. lib. 4. de simplici med. facult. meminit, sit
Flos Aphricanus detiniri absolute non potest.
Videtur tamen illi, si non idem, similis: folia
etenim, & præsertim flores graui admodum &
ingrato prædita sunt odore, qualitateque vene-
nosa, Cicuta proxima. Cuiusmodi autem expro-
fus & resiccatus succus, nondum quidem obser-
uasse, nos confitemur: vero simile tamen est, ex
floribus haud alterius, quàm flauis, aut sublutei
coloris, & graecolentem futurum. Et hinc non
audiendi sunt ii, qui hanc Tanaceti, vel Artemis-
ie speciem, aut innoxiam stirpem fore autumant.
Et hæc Dodonæus, qui olim in Hist. gall. propo-
suit figuram Fuchsi, quam proponimus pro mi-
nore flore pleno. In postremis exhibet iconem
Lobelii, cui titulum fecit, Floris Aphricani, vbi
etiam proponitur pro minore.

Lycopersium
flos al-
bus.

Tanacetum
nunciatum
in Arte-
misia

Rosa Indica
Tanacetum
Peruvianum
Cord.

Flos Portu-
galicus

Pedua
Viola flam-
mea

Genera duo
Gefn.

Othonna
Italorum

Othonna
Dioj. non
est

cum sit calidus gustu, inquit, vix opinionem O-
thonnæ tuetur.

Florem Indicum alterum minorem vulgò ap-
pellatum inter autumnales flores; Cæsalpinus
Anemonæ Dioscoridis conuenire tradit, & qui-
dem radice potius, quàm Argemoniæ Plinii.

Tabern. Icon. & Hist. dicitur Flos Aphricanus
minor flore simplici: & sic etiam Gerardo.

C. Bauh. phyt. Tanacetum Africanum; seu Flos
Africanus minor, quem ait variare magnitudine
& florendi tempore: esseque flore simplici, hos-
que reperiri rubros, croceos, mellesos, & albos.

Tagetes siue Caryophyllus Indicus, siue Flos
Aphricanus in genere dicitur Germ. Indianisch
Nägelin Sammetblüemen (quasi Florem ho-
loscicam) Indianisch d'uemien/ Portugalisch
bloemen: Brabantis, Flandris & Belg. vulgò
Thunis bloemen: Flos Tunetanus. Gall. Oeillet z
d'Inde: Genevæ Fleur de Rome: Ital. Garofano India-
no: Boh. Karaffilat Indyásky.

Tagetem Indicum minorem flore simplici
habemus Montbelg. in horto Ill. C. W. Monspelii
florentem obseruavi Iunio in hortis, Genevæ &
Basileæ: In horto Ill. E. C. Gappingæ, & in Boll:
ac in horto adm. balnei. Apud Belgas, Germanos
& alibi, teste Dodonæo, in hortis colitur. In
Africa plerisque locis spontè prouenit: vnde
primò in has regiones inuectus: quondò vide-
licet Carolus V. Romanorum Imperator apud
Tunetum celebri potitus esset victoria: ex quò
illi & Africano & Tunetensi cognomen.

Tagetes Indicus minor multiplicato flore.

Alterum Tagetis minoris genus contractio-
re habitu, facile à maiore separatur, cum
quo tamen flore multiplice ei conuenit; minore
nihilominus, & colore speciosiore picturato, vò
prædictum genus.

Gefn. de hort. dicitur Flos; vel Caryophyllus
Indicus minor flore multiplici. Math. in Hist.
germ. Caryophylli secundum genus, Indianisch
Näglen.

Fuch. Tagetes Indicus, Artemisia genus quat-
tum, floribus luteis, & Croci ferè colorem refe-
rentibus, elegantia nulli alteri cedentibus,

In edit. Lugdunensi anni 1551. huius figura est
sub falso titulo pro Artemisia tenuifolia, quæ
eadem pro Tagete Indico ponitur.

Tabern. Icon. & Hist. Flos Aphricanus minor
multiflorus, Enfselt Sammet / oder Flein ge-
sult Thunis blüemen. Icon Tabern. melius pla-
ceret pro Flore Aphricano medio à nobis des-
cripto.

Gerard. Flos Aphricanus minor multiflorus;
The Smalest Double Africane Marigold.

Habeo in horto E. C. Montb. ex semine à me
collecto Scurgardiz, & aliis in locis. Genevæ vi-
di florentem in horto Cæli Curionis mense Iu-
lio: Tiguri in ollis mense Septembri, Octobri &
Nouembri.

TAGETES INDICVS MEDIVS FLORE luteo pallido.

Medio se modo habet inter Maiorem Mi-
noremque: foliis grauique odore cum v-
trisque conueniens. Verum huic flos denso folio-
rum agmine stipatus, pallida flauedine [exceptis

Anemonæ
Dioj. Cæ-
salp.
Argemonæ
Plinii
Flos phrie;
minor flore
simplici.
Tanac.
Afric. G. B.

Nomina
linguatum

Locus &
cuius

extimis foliis intensius coloratis) tinctus est, haud secus at Maior, quo tamen ut minor, ita & procerior est, caule minus recto praeditus.

Hunc habeo Montbelgardi in horto E. C. collectum Stutgardiae, floret citius quam maior, rosula minor, maior tamen quam in priore minore, colore ab eo etiam diuerso, nempe pallido, simili maiori, caulis non ita rectus nec magnus, ut in maiori.

TAGETES MAXIMVS RECTVS FLORE simplici ex luteo pallido.



Super sunt Sda maximo-
rum species : prior
praeditus omnes proceritate
superat, non alia ferens
interim s. h. a:
flos simplice
contentus foliorum agmine
multis numeris maior,
e calyce quoque maiore,
ex luteo pallidescit, minus
amoenus quam Minoris simplicis.

Trago forte hist. Germ. Caryophyllus Indicus maximus, das allerhöchste Indiamisch Negele.

Casalp. Flos Indiae vulgo, Othonna Dioscoridis, Othonne Plinii.

Camer. hort. Flos Indicus maior flore pleno & simplici.

Tabern. Icon. & Hist. Flos Aphricanus maior simplici flore, groß Thunio bluem einfach. C. Bauhin. phyt. Tanacetum Africanum 3. siue maius simplici flore. Gerard. Flos Aphric. simpl. flore, the great simple French Marigold.

In horto Montbelg. ex semine Stutgardiano, olim & aliis locis ut Basileae, & Gœppingae.

TAGETES MAXIMVS RECTVS FLORE maximo multiplicato.

Descriptio Tandem succedit maximus ille serotinus, humanam proceritatem aliquando superans, caule recto, rigidoque : flores lutei pallidi, innumeris stipati foliis tanta amplitudine ut volam manus contegant.

Gesl. de hort. dicitur Flos, vel Caryophyllus Indicus flore multiplici.

Matthiol. in post. comm. cum mag. fig. Caryophyllorum genus 1. siue procerius, floribus aureis magnis, numerosis admodum stipatis foliis. Sed considerent lectores, an huic conueniat, quod ait Matthiol. flores lutei holoserici charmesini.

Camer. ad Matthiol. germ. Caryophylli Indici 1. floribus magnis, nullo malo odore. In Epir. Caryophyllus Indicus, It. Garofan. Indiano, Ger. Goldfarb dossen / vel Indiamisch Nagele / odore minus graui.

Hanc pingit Lobelius in Obs. p. 410. & in Icon. Plant. pag. 713. hoc titulo : Othonna maior

polyanthos.

Tabern. Icon. & Hist. Flos Aphricanus maior aureus multiflorus, Groß goldgeel Thunio blum Item: Flos Aphricanus maior, Groß goldgeel Thunio blumen. Cur duas icones proponat nescio. Eadem etiam exhibet Gerard. his inscriptionibus : Flos Aphricanus maior poly-



anthos, the great Africane double Marigold. Item : Flos Aphricanus maior, multiflorus : the smaler double Africane Marigold.

C. Bauhin. Phyt. Tanacetum Africanum 2. siue maius flore pleno. Icon. Matth. Caryophyllus Indicus maior.

Hunc sepius in horto E. C. Montb.

habui à me seminatum, accepto semine ex diuersis locis, ut Stutgardia ex horto Ill. Ducis, ubi exercebat ad altitudinem hominis & ultra. Genevæ vidi florentem mense Octobri, & Nouembri. Seritur in hortis, colitur in fistilibus, & arculis spectandi gratia. Tagetem vidi transplantatum Stutgardiae Iunio, quem cum limaces vorarent, calcem in circuitu sparserunt, quo remedio vtuntur in aliis etiam plantis à limacibus conseruandis.

Odor huius plantae, auctore Trago, nec non gustus eius calide illum qualitatis participem esse arguunt. Nonnulli male feriat homines preter omnem rationem & experientiam de eo iniquos spargere rumores non sunt veriti, dictantes leprolos eos fieri qui herbam eam secum gestant. Excalfacit & siccatur, inquit Matthiolus, quo fit, ut is quoque in medicum usum trahi possit, ubi abstergere & aperire sit opus : Minor valentius id praestat quam maior. Venenola autem & refrigerandi potentia, florem Africanum donatum esse, odor ingratus, caput aggrauans, Circutæ similis, qualis Lycopersii succo, ostendit : deinde & experimentis nonnullis constat. Meminit etenim Dodonæus in puero, qui flores mandere inceperat, labia & os inflata se videre : sicuti crebro iis accidit, qui Cicutæ fistulis ludentes aut modulantes, intral a biazas aliquandiu continuerunt. Feli etiam flores cum calycibus, recenti casco permistos olim dedit : quæ mox valde inflata, & paulo post mortua fuit. Mures quoque qui semen arroserant, mortui feruntur reperti. Quæ omnia venenosam & deleteriam huius herbae facultatem ostendunt : & non audiendos esse eos qui hanc Tanacetum vel Artemisiæ speciem, aut innoxiam stirpem fore autumant.

CHRYSANTHEMVM VETERIBVS. CAP. III.

XΡΥΣΑΝΘΕΜΟΝ, aut χρυθα, nonnullis βερβεραιος, tenera quædam herba est auctore Dioscoride,

de, sed fruticis specie, quæ læues profert caules: *folia* multifida: *flores* melinos vehementer splendentes velut oculum in orbem circumactum; quare ita nominata est [*χρυσάνθος* *μικρο-τρεφής* *διό* *χρ* *ἵππερ* *ω* *δ* *ὀ* *μ* *α* *χ* *α* *ν* *θ* *ος*]. Matth. hæc demenda vult vt translata ex capite Buphthalmi.] Nascentur circa ciuitates. *Caules* ipsius oleru n modo eduntur. *Flores* tritici cum cerato, Steatomata discutere dicuntur [Quæ sequuntur vult etiam Matthiol. demenda, vt translata ex capite Buphthalmi] ipsa herba pota in balneis, post exitum de solio, morbo regio correptis breui bonum colorem inducit.

Plinius Chrysanthemi seorsum non meminit, nec Galenus, nec posteriores Græci Medici. Quæ verò Dioscorides de hoc prodidit, ea omnia de Buphthalmo Plinius tradidit, hic saltem Cornario teste, aliis verbis vsus: quare hoc loco suppositum esse hoc caput videri possit.

Et hinc non desunt, qui credant Buphthalmum & Chrysanthemum vnam & eandem esse plantam, quoddam paribus notis inter se certare videantur; tamen si particulares quædam notæ in vtriusque diligenter expendantur, facile inter has plantas discrimen aliquod notari deprehendetur. Quoddam cum optime sciret Dioscorides, diuersis libris, diuersisque capitibus de his speciatim differuit. Quod vtrique minimè fecisset, si compertum habuisset, nullam inter eas intercedere differentiam. Quæ tamen hinc cognosci potest, primum quod Buphthalmi folia insunt Fœniculo similia, quæ planè capillaria constant: Chrysanthemo verò multifida. Deinde Chrysanthemi caules in cibis mandi aliorum olerum modo scribit Dioscorides: id quod de Buphthalmo agens silentio præterit. Præterea flores Buphthalmi reddidit Anthemidi similes: Chrysanthemo verò luteos, & vehementer splendentes. Cæterum de horum viribus differens, Buphthalmi flores, cum cerato tritos, tumores, duritiasque discutere tradidit in vniuersum, & affirmatiuè locutus. Verum postea de Chrysanthemo scribens, huius flores, inquit, steatomata discutere produntur, particulariter, & dubiè locutus: Hæc sanè harum plantarum manifesta discrimina faciunt, vt credam, inquit Matthiolus, quoddam aliquis antiquorum curiosus, nimisque sciolas Buphthalmum & Chrysanthemum vnam tantum referre plantam fortè existimans, omnia in Chrysanthemo adiecerit, & confuderit, quæ libro tertio de Buphthalmo memoriæ prodidit Dioscorides.

Chrysanthemum suum habet Matthiolus, quod ait nulla prorsus reclamante nota cum Dioscoridis Chrysanthemo conuenire. Inscritbitur hoc à nobis Chrysanthemum segetum.

Chrysanthemum multorum doctorum hominum iudicio Calendula siue Caltha nostra est. Chrysanthemum sunt qui velint eum esse florem quem Germani, inquit Cornarius, *Schmalzblumen* vocant. Plinius Elichryson à quibusdam Chrysanthemum vocati dixit. Chrysanthemum chamomillam postremam Dioscoridi dictam existimat Tragus lib. 4. cap. 86. esse Corulam non foetidā, seu Chamæmelum inodorum. Chamomillam tertiam inquit Tragus lib. 1. cap. 47. vulgarem Dioscorides Eranthemum & Chrysanthemum vocat. Quod Chamæmelū aureum peregrinum capitulis sine foliis inscripsimus, ait Dod. latinus esse Chamæmelum Dioscoridis; & Galeni præteritum & ignoratum. Artemisia in ascript. Dioscoridis apud Gesnerum Chrysanthemum cognominatur. In Aduers. Lobelii Artemisia marina Noeticorum [Iacobæa marina] Chrysanthemum appellatur. Caryophyllos Indicos posse esse Chrysanthemi genus concedit Matthiolus germ. lib. 4. cap. 61. Chrysanthemi nomen attribuitur à Dioscoride & Plinio Heliochryso, & hinc vocant Lob. & Pena in Adu. suum Heliochrysum Chrysanthemum. Chrysanthemum Democriti Dod. de purgantib. lib. 4. cap. 2. Vnguem aut Pedem Leopardi vocat. An Ranunculus rectus non repens? Ranunculum dulcem, seu pratensem (Ranunculum repentem non acrem) Tragus lib. 4. cap. 31. Chrysanthemum Democriti vocat. Non placet pro Chrysanthemo apud Lonic. lib. 5. cap. 65. Goldwissen blumen, Mosblumen. Est enim, nostro quidem iudicio, Caltha aquatica. Chrysanthemum apud Gesnerum in ascript. Dioscoridis Chrysocome vocatur. Chrysanthemum apud Dioscoridem dicitur de Chrysocome inter reiectanea, quam nescio quā occasione sibi Tragus persuasit esse Fabam inuersam, seu vt nos vocamus Anacamperes. Chrysanthemum inter spuria Dioscoridis dicitur de Aizoo maiore, hinc fit vt Tragus inter nomina, Sedo maiori attributa habeat.

CALTHA.

Caltha flore simplici.



Caltha flore pleno.



A Vreus
florum
Descriptio

splendor, antequam utilitas comperta esset, nobilitauit: qui omni auro saturatius suffescit, Chrysanthemi segetum forma, non vt illud è squamato capitulo sed calyce multifido hirsuto prodeuntes, odorati, disco luteo vel fusco, semine relicto incuruo duplici, granulis quodam modo asperato: caules tenues, nonnihil angulosi, hirsuti, & tactu nonnihil viscosi: folia linguæ forma, sine pediculis, oblonga, pingua, hirsuta, incana, gustu herbaceo, mox caliditculo: radix lignosa.

Flos interdum alios parit in ambitu, matre minores, in

Chrysanth.
segetum.
Caltha.

Chrysanth.

Chamæmelum
modicum.

Descriptio

Caltha prolifera.

Mollia luteola pingit Vaccinia Caltha.

Columella verò in hortis libro decimo his verbis.

Candida Leucia & flauentia lumina Caltha.

Plinius autem l. 21. cap. 6. Caltham etiam grauius odoratam esse ait, qualis in totum Calendula est, quæ ut diximus, cum grauitate quadam odorata, & aut colore luteo splendet.

Synonyma

Cæterum plurimum errare rectè videntur Ruellio, qui Soliam vulgò dictam, aut officinis Calendulam, aliquibus Solis sponsam, Heliotropion esse censeant: namque etsi flos ortu Solis aperiat, & occasu claudatur, vnde Solsequia, vel Solis sponsa, quoddam exspargiscatur & occubet crepusculis sopita, ac desiderio quodam redeuntis syderis excita perditur, quasi scdere quodam amoris, aut tueatur Solè, ob idque amica Solis aliquibus dicatur: nihilominus, flos qui ei luteus est, prorsus reclamare cognoscitur: nam Heliotropio candidus tribuitur. Nec de flore sed folio circumactus ille traditur. Siquidem lutei flores omnes ferè, splendore Solis illecti, Solem sequuntur. Folia quàm paucissima vides Solis cursum imitari, nisi Maluæ & perquàm paucarum, quarum ratio superius nobis est reddita.

Nec folia Solsequiæ Ocimi foliis respondent, aut aliqua germanitate iunguntur. Repugnant item floris natales dies, singulis enim ferè mensium Calendis florere deprehenditur, inde vulgò Calendula dici multis putatur: Heliotropium verò Solstitio tantum florere scripsit Theophrastus, cui experimentum suffragatur. Item flores huius Calendulæ parentem in amplitudinem dehiscunt, Heliotropii veri in caudæ Scorpionis speciem contorti curuantur.

Scorpioides herbula, Scorpiuron & alio nomine Tricoccon dictum Calendula vel Solsequia dici non potest.

Scorpioides speciem Calendulam nominatam haud dubiè esse censeret lib. 4. in Dioscor. c. 187. Matthioli, si folia, sicuti semen, Scorpioidi responderent. Verum cum Scorpioides foliis paucis, hæc verò multis, longisque profiliat, ii falli apertè deprehenduntur, qui in hac opinione versantur. Ipsi porro, ut Ruellio, plurimum errare videntur, qui censent esse Heliotropium maius: namque omnes prorsus illius notæ huic reclamare deprehenduntur. Neque eorum opinio-

pediculis triente longioribus, hirsutis, foliolis aliquot acuminatis. Interdum maximus, plenus, volam manus ferè implens sub quo rudimèta parua aliorum florum.

Hanc Caltham veteres, Virgilius & Columella, ostendunt esse florem luteum aut flauum colore. Virgilius quidem in Georgicis Aecloga secunda, sic scribens.

ni illud quicquam addit, quoddam huius Calthæ semen, quadantenus scorpionum caudiculas refert, quoniam Dioscorides Heliotropii florem, non semen, Scorpionis caudæ effigiem repræsentare scripsit. Recentiorum sententiæ non audent subscribere, aut refragari, quia Calendulam vocatam Virgilius & Plinius Caltham existimant, hoc argumento nixi, quod flores aureos luteosque profert. Id quod nobiscum sentit Dodonæus merito negans cum Matthiolo esse Heliotropium, aut Scorpioides.

Caltham Theod. Dorsthenius, Otho Brüsels & Hier. Tragus Caput Monachi appellare videntur, quod flore decedente, capitulum, Monachi caput exprimens, relinquatur.

Hermolaus, ut legitur apud Tragum, scribit se quondam vidisse in Dioscoride peruetusto depictum Leontopodium, eamque picturam cum Calendula conuenire, vnde eam Leontopodium esse affirmat. Manardus putauit illam esse Lysimachium Dioscor. Iacob. Manlius herbam blacam vocat. Matthæus Syluaticus, putauit eam esse herbam Paralyseos. Alii Heliotropion, Sponsa Solis, Solsequium, seu Verrucariam appellant, atque hi quidem maiori in errore versantur.

Tragus in re clara & aperta maximè hæsitat. Calendulam enim à Dioscor. lib. 1. descriptam, & Catanances alterum genus esse existimat, & nomenclaturas spurias pro Catanance propositas, more suo recitat.

Manardus porro, quam Lysimachiam esse aliquando suspicatus fuit, Omnium mensium florè vulgò appellari tradit, German. Ringelblumen, i. e. Circularem florem, à semicirculo, quem semen refert, vel quoddam ad Solem circulariter nuter. Et idè Dorsthenius. Solarem, aut Solsequium aut Heliotropium appellari ait à quibusdam, sed adhuc incertum esse quo nomine apud Græcos & Antiquos vocata sit, Anguillara licet dicat in epist. 124 Calendulæ meminisse Galenum de Dynamis.

Nondum constat, inquit Turnerus, quo nomine fuerit Græcis appellata: difficile enim est reperire, ex professo factam de ea aliquam mentionem: tamen meminisse video eius Dioscoridè in descriptione, ubi Ruellii versio habet, Chrysanthemon aut Caltha nonnullis &c. Quæ si non vera esset lectio, certò possemus Græcum vocabulum scire. Nam præterquam quod ipsum esset Græcum vocabulum, nominaretur etiam Chrysanthemon. Sed meus græcus codex à Cornario editus, legit Chalchas, ut Ruellius vertit Caltha. Quo fit ut dubitè, utrum eius meminerint Græci ac non? Nam Chrysanthemon (Angl. Gold-floure,) tam potest Chalchas ab æneo colore vocitari, ac Buphthalmos à bouini oculi similitudine. Cæterum Caltha ieiunè à Latinis describitur. Virgilius solum Luteolam nominat: Plinius inter Violas luteas, aliisque flores luteos recenset, atque odore esse grauem. Ex quibus locis coniectari tantum licet nostrum Marygolde esse Latinorum Caltham.

Caltha Poëtarum, Chrysanthemon oculatum versus Dioscoridis, Calendula Offinarum, Kaledula nostras, aiunt Aduersaria, quin sit Poëtica Caltha nullus neget, qui in Georgicis Luteolam Caltham, & in Plinio grauius odoratam leget: Columella autem Buphthalmum hunc innuere videtur, ubi fauentia lumina Calthæ, canit, nēpe aureum rutilumque flauorè, & orbem circinnatum, vmbonèque in centro extante conspicuo, luminis, siue oculi, in speciem. Vnde Calchan, id est, hiantulam & apertam dixerit: sicque Caltham-

tham putet quis decifam à Calatho, qui Latinus, Seruio teste, poculum & calix est, cuiusmodi ostentant singulis terminis Calendis Calendulae florum pocula flaua: cuius & nos sumus sententia, &c. Lobelius in Obseru. p. 299. figuram habet ac dicit, Chrysanthemum Dioscoridis, Caltha Poëtarum, forse Gromphena Plinii. In Icon. plant. p. 522. Chrysanthemum & Caltha inflexis (plenis) floribus.

Gelin. hort. Calendula vulgò dicta, flore simplici, & alia multiplici, Caltha hortensis. Circa Montpelium lux spontis.

Tabern. Icon. & Hist. par. 2. nouem Calthas pingit: Quas licet in sariam & lux spontis, siluestrem siue aruensem, distrahatur, quam non loco ponit, attamen spontaneam à cultiua folio duntaxat minore, differre scribit. Inter sariuas autem hoc discriminis tradit, quod alia sit flore simplici, qualem primo loco exhibemus, quæ cum eius Calendula 6. siue sariua conuenit, & alia flore pleno, qualem secundo loco damus, ad quam referimus eius Calendulas quinque priores: Calendulam sc. multifloram maximam 1. Groß gefult Ringelblumen; Calendulam maiorem polyanthon flore aureo 2. Groß goltegel gefult Ringelblumen; Calendulam polyanthon flore aureo 3. goltegel gefult Ringelblumen; Calendulam sariuam polyanth. inclinatam 4. hamgeel Ringelblumen gefult; & Calendulam multifloram orbiculatam 5. Rundgefult Ringelblumen. Quod præterea alia sit prolifera; qualis est quæ vltimum siue tertium locum possedit. Et hæc respondet eius Calendula 7. & 8. siue prolifera 1. & 2. Sufficiens sunt tres figure, una flore simplici, altera pleno, & tertia prolifero.

Td no

C. 8. var.

Nomina
haguarum

Dictatum nouem Calendularum meminit & C. Bauh. phyt. distinguens eas vt Tabernamontanus, eius etiam sequutus logomachiam.

Caltha, à Recentioribus Calendula dicitur; quod ferè singulis mensium Calendis florere conspiciatur. Germanis Ringel bloümen/ ab inorto, & in circulum acto semine: Belgis Gofte bloümen ab auti æmulo floris colore: Gallis Soules siue Souleie. Angl. Marygold. Valeriol. de pest. Gaudet aut Gaudet, Calendula vel Caltha. Ital. Fior ranio, siue Fior d'ogni mese, ob colorem aureum Mali Aurantij: Boh. Mesycet. Hung. Teuz verag/ h. e. Flos ignis.

Caltha quidem à Matthiolo; Trago; Fuch. Turn. Lonic. Dalechamio in Plinium [à cerebro ipsius flore Cerinthen putat] Chrysanthemum & Bupthalmum Dioscoridis. Caltha Poëtarum, Lugd. Calendula, Brunfels. Dodon. gall. & in fol. Anguill. Camer. Cæsalp. Clymenum Dioscoridis Fabio Columnæ.

Tempus.
Locus.


Montpelij Caltha passim spontè prouenit in agris & hortis toto flore anno etiam hyeme, Basileæ flore simplici & denso in hortis florere Iunio, Iulio, Augusto, Septembri. Geneæ flore simplici abundat in hortis flore mensis Octobri, Nouembri & Martio ex reliquiis hiemis: eandem habent etiam flore multiplici florentem Aprili & Maio. Lugduni abundat in hortis: Bononiæ vidi cum flore Aprili in horto di Salvador al borgo di S. Catharina. Parmæ etiam florentem Aprili: Patavij in hortis. Montbelgardi habemus in hortis vt E. C. flore simplici medio luteo; & alteram medio siue floris discolorato: & magno flore pleno: prouenit mihi in Horto III. E. C. flore magno pleno restitescens;

id est, ex vno flore alios multos producent: Semina etiam collegi Sturgardie in horto Ducis Calthæ flore maximo pleno.

CALTHA MINIMA.

Caltha minima, coliculos emittit vnciales aut breuiore, tenues: quorum singulis flosculis infidet Calthæ, exiguis, luteis, ex calyce folioso viridi: folia Linariæ, angusta, semunciam longa: radix simplex tenuis, coliculo longitudine par.

C. Bauh. in phyt. Caltha 8. siue humilis. Crescit, inquit, copiose ad fluuium non longè Lutetia vbi vix dum reperias vllam, quæ quatuor transversorum digitorum altitudinem adæquet. Sic & frequentior est non ramosa.



Aqua ex floribus Calendulæ præsentaneum adeoque expertum remedium præstat oculorum rubori & inflammationi instillata mane vespereque, vel si lincola in illa madefacta oculis imponantur: flores in puluerem redacti inque vellere dentibus inditi, dolorem illorum sedant: flos perinde atque ipsa herba secundas educit mirifice, si aridus suffribus admotus fuerit. Hæc Tragus, cui contrariatur Marth. dicens, Calendulam in Hetruria passim acetiariis adhibent, gustu adstringente, cum quadam leuiuscula amaritudine: ex quo non video, quomodo hæc, vt quidam scriptis tradiderunt, menses ciere possit, nisi id fortasse fiat ab occulta quadam facultate. In Germanica tamen Camerarii editione, Trago subscribit. Ibidem Camerarius ad angustias thoracis commendat, ad icterum, cordis palpitationem, præsertim verò iuueniculis quibus menses subisterunt, appetitiam reuocate tradit: aquam autem stillatitiam ad pestem valere: succi etiam uncias duas, Alexandrum Benedictum exhibere, vehementer enim sudores ciere. Dodonæus florem taxat ad secundum ferè ordinem calidorum, præsertim resiccatum & aridum, creditque cor corroborare: herba autem folia calidiora esse, acrimoniam enim quandam feruidam habere, sed quæ propter humiditatem ei coniunctam non protinus se exferat, ratione cuius in oleris sumpta, aluum mouere & lenire.

Calendulæ aquam Brunsvicensis omnibus oculorum morbis conducere asserit, siue à calore sint siue à frigore. Tollereque dolores capitis omnes. Suffitum ex illius floribus siccis & accensis, per vulvas receptum secundas morantes extrahere. Prescribit Arnold. in quodam med. ad Epileps. radices Calendulæ, si Caltha in-

Descriptio

Locus

Virus

intelligit, non videmus, ad quid inutilis radix præscribatur, & non potius flores aut folia. Sæpe fieri ex Calendula ad multos supra dictorum vsus & Oleum videre licet apud Tabernamontanum.

CHRYSANTHEMVM MAIVS FOLIO valdè laciniato, flore croceo.

CAP. IV.

Descriptio



Chrysanthemum, cubitum aut sesquicubitum, duos, tresve equat caulibus teretibus & leuibus: è radice nonnihil obliqua, fibris multis capillata, lignescēte: folia sine pediculis cauli ciusque alis adnascuntur: Matricariæ ferè diuisurâ, pingua, tenera, sapore olereæco, quam non ita

accepto: flores è squarroso squammatouè capitulo, Bellidis maioris, colore aureo, umbone è caucolis planam superficiem efficientibus, croceo. Figura nostra ex Fuchio non in omnibus placet.

Errant, vti dictum cap. 3. de Chrysanthemo Veterum, qui credunt Buphtalmum & Chrysanthemum vnam & eandem esse plantâ. Chrysanthemum, inquit in prioribus commentariis Matthioli, cui omnes Dioscoridis notæ conueniunt, frequentissimum prouenit in Senensi agro prope Montem nigrum oppidum appellatum, esturque ibi à rusticis veluti Beta & Brassica. Credit Fuchius in suo de plantarum Historia commentario, Chrysanthemum illud esse Ranunculi genus, quod folio Apii, luteis floribus, in pratis plurimum nascitur. Qua in opinione quantum, pace eius dixerim, hallucinetur, euidentius omnibus esse puto, quam vt à nobis ostendi debeat. Hæc ibi Matthioli, qui figuram maioris Chrysanthemi folio magis secto exhibet, Eandem etiam habet in post. comm. cum mag. fig. Lat. & It. & Hist. Germ. vbi Chrysanthemum, Germ. Goldblum, & Boh. žlatý fvet vocari scribit. Cameraarius autem in suo Matthiolo germanico mutauit figuram & posuit duas. Vni titulus est Chrysanthemum: alteri Chrysanthemum minus. Idem in Epit. Matthiol. ambo etiam exhibet.

Anguill. epist. 14. p. 265. Chrysanthemum notissimum in Italia, potissimum in Hetruria, & in horto publico Patauino.

Hist. Lugd. p. 87. Chrysanthemum Matthioli. Lonic. lib. 5. cap. 65. Goldwisen blum / Schmalz blum / Noßblum / Matblum / Dratblum / gel wisenblum / Dotterblum / χρυσάνθεμος: Gall. Marguerite, quod nomen non placet. Lacuna dicitur Chrysanthemum & Caltha. Tab. Icon. & Histor. Chrysanthemum Matthioli, Chalcitis.

C. Bauhin. Phyt. Bellis 3. siue lutea foliis profundè incisis maior: variat folio, altera enim magis virente & plùs diuiso, altera folio magis caruleo & minùs dissecto. Item Bellis 4. siue lutea foliis profundè incisis minor, Camer. in Epit. minus.

Chrysanthemum vidimus Tiguri apud D. Gesnerum vt & apud Fuchium Tubingæ, ac etiam mense Febuario virens in horto Patauino: Môtbelgardii in horto Ill. E. C. mihi prouenit è semine Stutgardia misso nomine Chrysanthemi Panonici, quotannis se propagat ex semine deciduo: est enim annua planta.

Locus & Tempus.

CHRYSANTHEMVM CRETICVM duplex.

CAP. V.

Descriptio



Semine Crete misso, & Clusio nata, hæc duo elegantia Chrysanthemi genera, nec ab alio prius descripta: quæ cum annua sint, & decidua semine spontè renascantur, facile suum genus conseruant.

Habet autè primum cubitales aut apliores caules, satis crassos, striatos, intus fungos,

in multas alas diuisos, & frequentibus foliis breui petiolo inæqualiter nascentibus ornatos, quæ in varias & profundas lacinias diuisa, eas denud valdè dissectas habent: extremis cauli & ramis innascuntur ampli flores è squammoso capite prodeuntes, duodenis aut pluribus foliis constantes satis latis, flauo coloris, & latiusculum discum ambiētib: flori utunque odorato succedunt capita è multis inæqualibus longiusculisque seminibus compacta. Non minùs fruticosum minùsue altum est Alterum genus: minùs tamen crassos habet caules, fungolos & striatos, etiam illos quos ambiunt folia non aded dissecta, sed in minores lacinias & rariùs incisas diuisa, propiùs ad Chrysanthemum segetum accedentia: sustinent extimus caulis & rami squammata & quasi imbricata capita, è quibus nascuntur flauo flores, totidem quot in primo foliis constantes, angustioribus tamen & medium orbem aureum cingentibus: quibus etiam succedit semen simile, sed aliquantùm minus. Quantum autem differant hæc Chrysanthema Clusii à præcedentibus à nobis traditis Chrysanthemis considerandum.

An Honor. Bello epist. ad Clus. ex Creta Cydonia Chrysanthemum matris, quod à rusticis editur, ipsi tamen sapore & odore parum probatur, licet in multis cum legitimo conueniat.

♦♦

CHRYSAN-

CHRYSANthemVM FOLIO
minùs secto glauco.

Plurimum cum Chrysanthemo segetum conuenit, sic ut ex eo annotatis differentiis minime difficilis sit futura huius cognitio: nam, ut à flore, qui maxime oculos afficit exordiar, is squamato calyci viri sâti insidet aureus, Chrysanthemi, disco granulato concolori: *radix, canalis*, sapor idem: *folia* verò glauco Cerinthes colore aut Glasti, oblonga, pingua, polita, & magis leuia, minùs laciniata. Idem in hortis altius excresecens quàm præcedens, denique tota minor & delicatior planta; Figura quam ex Fuchsiânis apponimus ut verum fatear non in omnibus placet.



Lobel. in Adu. & Obs. Chrysanthemum segetum folio multiscisso, Germ. Geyßblum, Belg. Geel gånse bloemen, & Vogelauw. Adu. 257. perperam quorundam Bellis lutea. Icon. plant. & H. Belg. Chrysanthemum segetum: Anglis Golden flower aut wild Marygolde. An Lob. agnouerit discrimine

Chrysanthemi ut agnoscimus nescio; figura quâ habet demonstrat nostrum flore glauco, fortè vtrumque intelligit.

Dod. gall. Chrysanthemon dicitur, quod explicat florem aureum. Sic & Lat. de florib. & in fol. ubi ait, quibusdam in locis reperiri foliis magis confectis, aliis minùs: à Germanis S. Jozans blum & Geyßblum appellari, à Belg. vulgò Rogelaer, & quandoque geel gånse bloemen, & houtroosen: addit in Hist. gall. esseque incongnitum Officinis. In Hist. Lat. ait Græcos ab aureo florum fulgore χρυσάνθμον nuncupare: nominare verò plerosque Bupthalmum & Caltha: non decisse quoque qui Bellidis speciem faciant, & luteam Bellidem dicant: sed Bellidem alterius generis herbam esse. Figura Dodonæi in Gallica hist. melius placet cæteris.

Camer. in hist. Matth. Germ. lib. 4. cap. 6. & Epit. pag. 793. figuram habet Chrysanthemi minoris, quæ hoc satis exprimit de quo hic agimus, istamen non distinxit à maiore.

Clus. Hist. post. p. 334. Chrysanthemum segetum, à nonnullis ita cognominatum, quod inter segetes nascatur, foliis Bellidem maiorem quodammodò æmulantibus, sed mollioribus & dilutius virentibus, flore similiter Bellidis maioris, sed omnino flauo. Eandem habet iconem cum Lobelio.

Locus. & **Tempsus.** Tubingæ vidimus apud D. Fuchsiûm. In Gallia Campania in aguis spontaneum comperimus, ac collegimus semen quod satum Montbelgardi in Tom. III.

horto Ill. E. C. prouenit ac quotannis ex semine deciduo se renouat, est enim annua herba.

Segetes frigidiorum tractuum Gallia, Germania, Belgia & Anglia hoc scætant; flauam per mellea Cererem ornante, regionibus æstiuâ rariùs.

CHRYSANthemVM LATIFOLIUM.



Fibrosis nititur radicibus; *caulis* striatus, glaber, ramis alternis diuisus: *foliis* sitis idè, fescuncialibus, & duas uncias longis, semunciam aut paulò minùs vnciâ latis, ad Bellidis maioris folia proximè accedentibus, per extremum latioribus, circumcirca serratis, glabris, sine pediculo canli ad-

natis. *flores* extremis ramulorum hærent singulares, minores quàm Bellidis maioris, disco folisque discum coronantibus aureis: florem suffulciunt folia viridantia. Figura ex Fuchsiâ non attridet multum.

Attulit mihi frater Casp. Bauhinus ex Patavinis hortis pro Chrysanthemo latifolio Guilandino & Asella Plinii, Icon à nobis ex Fuchsiânis proposita aliquatenus exprimit.

CHRYSANthemVM PARVVM,
sive Bellis lutea parua latifolia.

CAP. VI.



Perfimilis est Bellidi **Descriptio** maiori, cuius folia habet vix vnciam longa, serrata, eodem ordine per caulem disposita, qui singularis, pedalis, subhirsutus, summo vertice florem gerit vnicum paulò iam dictæ Bellidis minorem, radiatis in orbè foliis saturatè croceis, umbonè staminibus, eiusdem colore is coronantibus, quæ obacta



nec etiam in iis iconibus radices crassiores placent: plantam etiam dedit bifidam in qua duo flores. Saporem foliorum in sicca planta nullum manifestum animaduertimus.

Consideranti diligenter icones propositas quas emimus cum Fuchsiæ apparer vnius esse plantæ tribus tabellis expressæ, quæ cum accedant ad nostram Bellidem luteam, hæc ponimus, quia non occurrit adhuc quod referre debeamus.

CRITHMVM MARINVM TERTIVM
Matthiolo flore luteo Bupththalmi.

CAP. VII.

Suffrutex est maritimus, statim ab ipsa radice multos emittens stolonibus cubito altiores, rectos, robustos, teretes, rubentes, per quos folia densissima, vnciam longiora, angusta, crassa, teretia, glabra, acri, saluginoso, aromaticoque sapore prædita: stolonum scapi in foliolos ramulos finduntur, quorum singulis insidet stolis masculus, luteus, in pappos euanescentes.

Tabern. Hist. Crithmus 1. Bacillenfrans quo ad figuram. In descriptione enim & inter nomina Crithmi tertium genus est, quod ab Herbariis vocari ait Crithmum, Chrysanthemum, Chry-

parte suffulciunt folia pallide virentia, subhirsuta: radix brevis, gracilis, multirida.

Huiusmodi vnicam plantam gracilem & strigosam dedit nobis D. Georgius Rentzius Medicus delatæ ex Italia nomine Bellidis luteæ.

Eodem nomine collecta in agro Neapolitano speciosiores dedit D. Agerius Medicus Argentinenis eiusdem altitudinis & singulari caule hirsuto, folia autem ad radicem multa, sesquiunciam longa, ex angusto principio serrata, parte extrema & suprema lata, qualia etiam sunt folia per caulem: Icones nostræ ex Fuchsiæ in eo displicent,



santhemum littoreum, & Asterem Atticum marinum. In Iconibus huius titulus est p. 101. Crithmum Chrysanthemum, Geel Bacillen / Meersterne. Fraus: Ad figuram ponitur p. 100. pro Crithmo sativa, Asparago Gallico. Et quavis nostra non placeat figura, nobis tamen deterior vide-

Descriptio

tur quæ à Tabernamontano proponitur.

A Matthiolo in prioribus comm. lib. 2. cap. 122. sine descriptione picta est, pro Crithmi marini specie. Sed in post. comm. lat. & Ital. mag. fig. pro Crithmo 3. depingitur. Et rursus est in Hist. germ. & Epit. Camer. pro Crithmo 3. lib. 2. cap. 68. cuius descriptio ponitur cap. 67. eiusdem libri. In Epit. vocatur Vitriaria.

Lob. Aduers. Littoreum Chrysanthemum flore Bupththalmi, aut Conizæ, foliis Kali aut Luz muscatæ. Ei autem non placet hanc reponi inter Crithmi genera. Tertia species Crithmi Commentatoris, inquit, quid negotii, aut similitudinis cum Crithmo habet, ad Chrysanthemum referendum. Obs. p. 215. Littoreum Chrysanthemum, cū in Icon. Plant. pag. 395. Crithmus Chrysanthemus Dodonæi, Aster Atticus marinus, Crithmum tertium Matthioli.

Hist. Lugd. p. 1379. Crithmi species tertia Matthioli. Item Crithmum Chrysanthemum Dodonæi.

C. Baub. Phyt. Crithmum 3. siue marinum flore Asteris Attici.

Hoc ex Prouincia mihi misit Iacobus Rainaudus Pharmacopæus nomine Crithmi Matthioli. Florentem vidi Monspelii apud lacus saluos & mare, florentem Augusto. Bononiæ in horto S. Saluatoris al Burgo di S. Catharina. Pfortzemæ in horto Domini Grienningeri Pharmacopæi: pulchrum autem delatum Monspelio plantauimus in horto Ill. E. C. Montbelgardi.

Locus & tempus.

Iis pollere facultatibus dicitur in Epit. Camer. quibus Crithmum Antiquorum Dioscoridis & Galeni, de quo maxime dubitamus.

Vires

HERBA MAXIMA.

CAP. VIII.

Merito hoc nominis peregrinæ huic plantæ indiderunt Recentiorum nonnulli, ut cui in herbaceo genere nulla sit magnitudine comparanda: caule singulari, brachii crassitudine, duodecim aut decem pedum altitudine in nostris hortis, vicinam etiam & quatuor referant alii solo hispano: incondita per hunc folia, Calicis formâ, non item magnitudine, quippe spithamâ longa, aut etiam sesquipediam, haud multo angustiora, acuminata, alpera, hirsuta, in ambitu serrata, pediculis longis hærentia. Summum

Descriptio

caulis

caulis fastigium florem sustinet vnicum, notandum, orbiculatum, Helenii simile, sed tam am-



quidam minor, sed quæ florum multitudine



que viginti quatuor flores in vna planta, plures in Hispania, in Germania etiam decem obseruati. Adolefcit in Hispania ad viginti quatuor pedes; aliquando flos tantæ magnitudinis vt 2462. semina contineat. Florum item folia in aliquibus longiora: sic & plantæ folia in aliquibus asperiora. Albo flore aliqui obseruarunt.

Ad Chrysanthemi genus referendus videtur Dodonæo, peregrinus hic tæx magnitudinis flos, quem Solem nonnulli Indianum appellant, alii verò Florem Solis: at Dodonæo Chrysanthemi Peruuiani nomenclatura placuit. Existimari posset, inquit, hic flos Plinii esse Bellio, si credibile foret, illa ætate Romæ vel visum, vel vilo modo agnitum: per ambitum siquidem luteus est, & plûs quàm quinquaginta foliis medijs eius orbis cingitur. vt Plinius lib. 21. cap. 8. de Bellione. Luteus, inquit, Bellio patulicantibus quinquagenis quinque barbulis coronatur. Sed veritius Bellionem omninò alium esse florè.

Tom. III.

Idem & aliud minus tradit.

Lobel. in Obs. p. 322. figuram Dodonæi habet, quam ita inscribit, Solis flos Peruuianus, siue Sol Indicus, Chrysanthemum Peruuianum Dodonæi, Lusitanicè *Gigante*, à proceritate stirpis. Idem habet & aliam figuram cui titulus est, Solis flos minor.

Planta maxima (inquit Cortusus in epist. ad Matth. quæ est in principio commentariorum Italicorum) primò missa per Clusium, *Corona regale*, *Cappa di Gioiè*. Quidam volebant Solsequium & heliotropium, ego Veneratricem Solis existimo, dicitur etiam Bellis Plinii *Tromba d'Amore* & *Rosa di Hiericho*: crescit ad 120. palmos Geometricos. Hæc ille qui pingit & describit.

Cæsalp. Helenium Indicum vocat, & appellari posse concedit Florem Solis, quia non solam effigiem Solarem præ se ferat, sed & cum eodem in Orientem, modò in Occasum conuertatur, semper inclinatus ad terram, quasi præ reuerentia capite nutans. Scribit idem caulem incisum lachrimam [Gummi Camer.] perlucidam, flauam [rubram Camer. odoratam, subacrem fundere: apparere etiam in floribus aliquid resinofum, planè Terebinthinam substantiâ & odore referens.

Tabern. Icon. & Hist. quatuor exhibet figuras pro Corona sc. Solis 1. 2. 3. & 4. quam feminam facit, nec aliter eas ab inuicem distinguit, quàm primam & secundam flore maiore, à 3. & 4. flore minore. Vocat autem Germ. *Sonnen fron* & *groß Indianisch Sonnenblum*.

Herbam maximam siue Florem Solis maiore & minorem sæpe in Horto E. C. Montbelgardi habui, raro profert semen maturum, potissimum maius genus: Basileæ vidi aliquando in hospitio Ciconiæ maiorem, quæ ad altitudinem duorum hominum excreuerat eamque excedebat, mense Iulio & Augusto: semen maturuit Octobri, grati saporis: minorem vidi in horto D. D. Felicis Plateri, Genæ opera D. Valerandi Dourez Pharmacopœi insignis, habui in horto, ac tunc primùm ibi visa, quæ excreuit in satis magnam altitudinem. In oppido l'Isle dicto Burgundiæ prouenientem vidi in horto D. Baronis à Marnaut: D. Robert. Constantinus aliquando mihi dedit semen cum hac inscriptione, Regina herbarum siue maxima: arborefcit, flos aureus, *αυροχάματος* est, clypeique magnitudinè sæpè exuperat, nihil pulchrius. Affertur ex Brasilio. D. Cortusus Patavio mihi misit semen cum his titulis *popugian del Indio* seu *planta maxima: pianta del Sole*, seu *Corona regale*. Rastius autem Chirurgus insignis Lutetia misit nomine Oculi Indici. Ventorum iniuriis exposita, nisi firmo alligetur adminiculo propter radicem summa cellulæ sparsam, facillè euellitur.

Flos Plantæ maximæ benè repurgatus à foliolis coctus cum oleo, sale & aromatibus, melioris est saporis quàm Fagi, Asparagi, & Cardui & Scolymi, ac ad Venerem insigniter stimulat, vt in se ipso expertum esse scribit Cortusus. Chrysanthemi Peruuiani pediculos foliorum teneros adhuc, pilisque detasis, in craticula decoctos; sale oleoque priùs præparatos, esu suaves & perquàm gratos esse, euidenti experimento cognouit Cortusus, inquit Dodonæus, & similiter ipsos quibus floris foliola semenque insident calyces: quos & ipsius Cinaræ comis siue capitibus delicatiores suauioresque in cibo esse scribit, & non minus, verùm amplius, *αεισ ἀποδίδωρα*, ad quæ plu-

O 2

rimum possunt facere. Quâ in se industria ac diligentia eius commendari ac laudari satis non potest. Semen purgandi vim habere instar Cartassi quidam Casteratio retulit, quod tamen in seipso periculum faciens non potuit deprehendere. Caulis fractus facillimè callo obducitur: unde vulnerariam esse coniciunt & ad fracturas conuenientem: sed hoc signum non sufficit: inesse tamen vulnera glutinandi facultatem non negat Camerarius. Sunt, inquit Cæsalpinus, qui caput in cibis assumant assatum: quas præterea facultates habet, à nemine hætenus traditum est: conicere tamen licet vim calefaciendi ei inesse, cum tenui substantia: idcirco ad eadè pollere ad quæ Helenium: sed lachrymam longè efficaciorum esse.

HELENIVM SIVE ENULA CAPANA.

CAP. IX.

Descripta



Synonyma

Insigniter grandescit Helenium, ad trium & quatuor usque cubitorum proceritatem, ante recto, canaliculato, villosa, subrubente, aliquot alis concavo: folia nullis interuenientibus pediculis, caulibus adnascuntur, Verbasci latioris, incana, lanuginosa, per ambitum crenata: flores odorati sed

obscurè, Buphthalmi effigie, sed multis numeris maiores, aureo fulgore comantes, quibus squarrosus subest latius capitulum, semen continens gracile & oblongum, quod falsò Petrus de Ctescentiis negat. Radix notandæ crassitie, foris fusca, intus alba sapore aromatico, acrimoniâ cū nonnullo amarore mixtâ.

Folia habet, ut describit Dioscorides Verbasci (βαλεαν) angustioribus foliis prædito [mendosè legit Lobel. in Adu. βαλεαν, pro plantæ enim altitudine & foliorum longitudine angusta satis folia sunt] similia, asperiora tamen & oblonga: caulem quibusdam in locis [ut non tunc verè caret] non emittit. Radicem habet subrusam (ὑποκρίαν: κριαν, fuluam alti: addunt & alii, interdum ὑπολαμνόν (subalbidam) odoratam, subamarâ (ὑποδερμνόν: δερμνόν, acrem verè.) magnam, vegetam: ex qua agnitæ propagines [Liliorum, λεύκων, quod nondum in aliis exemplaribus legi] velut in serendis Cinâris (κινάρων, & rectius meo iudicio, quàm Aris, ἀρίων) ad insitionem decerpuntur optimæ & insignes. Et hæ notæ omnes in Inulam vulgatam prorsus competunt.

Ceterùm sunt qui Helenion, Symphyton, qui Persicam, qui Medicam, qui Orestion, qui Nectarian, qui Cleoniam, qui Rubum Idæum, qui Verbascum Idæum appellent: Aegyptii Lenen, Latini Terminalium aut Inulam campanam.

Plinius Inulam vocat, recensens inter ea, quæ seruntur in hortis cibi gratia: brevior Sisere est,

inquit, sed torosior, amariorq: Inula per se stomacho inimicissima, ea dè dulcib. mixtis saluberrima: pluribus modis austeritate victa gratiam inuenit: illustrata maximè filia Augusti quotidianocibo: superuacantem eius semen, quoniam oculis ex radice excisis, ut Arundo setitur.

Quod porro Dioscorides Helenium ab Antiquis Symphyton vocatum tradidit, in hoc testes ubi aliquot habent (ait Marcellus) qui Græcorum Lexica conscripserunt: inuenisseque id nomen videtur ex sobole adnatisque illis quæ in radicibus Liliorum modo *λευκόν*, id est, comascuntur & hærent. Testantur eadem Græcorum Lexica Medicam & Nectariam radicem Inulam dici, factò à regione & à dulcedine nomine: sic Cleoniam dictam conicere licet: Est in probatissimo mihi codice non simpliciter *καλόν* legitur, sed *καλόν καλόν*, id est, Buglossum cleoneum appellati. Apuleius etiam quod non multum à Cleonio differat, Chironium panacem dicit vocari: ut in alterutro vitium sit: adiectumque hoc à nobis est ne quid obseruatum & inuentum hætenus relinqueretur. Ab Oreste nomen illi etiam antiquitas fecit, ignoramus nos tamen causam: nisi fortè Orestis & Helenæ propinquitas communem eius plantæ laudem & honorem ambobus fecerit. Quæ sequuntur deinde appellationes: Rubus & Verbascum Idæum ex sola similitudine (ut toto hoc opore infinitæ alia) factæ sunt: quod ex hoc ipso autore in Helenii aut Verbasci historia deprehendere facile erit: Et quemadmodum copiosum in monte Ida nascetur Helenium: ideo loci & regionis discrimine à propriè Rubus & Verbascum dictis discretum est: unde autem Terminalium Romani (modò integra ea vox sit) Helenium dixerint: nihil pro comperto habemus: quemadmodum contra Inulam dici Antiquiores Latini omnes testantur: nulli tamen ex Campania magis quàm aliunde ab illis laudatur: suspicamusque nos, quod à principio diximus, multas in Scriptore hoc non legitimas esse appellationes, deincepsque per tempora inserta aliena & peregrina, ubique admirantibus cunctis: eoque magis in Romanæ gentis fortuna & imperio hanc Græcis miscere propriis placuisse: & ex propinqua urbi regione eam laudasse: quando ut omnes iam pridem nouimus: quò se fortuna illuc etiam fauor hominum inclinat: & ut nos in doctrinis qualescunque Græcorum voces adhuc admiramur & amamus: eodem modo & illos Romanas admirari & amare solitos fuisse verisimile est.

Nectaria Antidotus videtur Cornario esse appellata ab Helenio, quod recipit: siquidem id Nectarium appelletur, unde & Dioscoridi Nectarites vinum dictum sit. Nec aliud esse putent quidam, quàm Homeri Nepenthes 4. Odys. Vnde Plinius etiam lib. 21. cap. 11. de Helenio loquens, eandem vires ei tribui testatur, quæ Homerus ad Nepenthes retulit, & Nectarium appellatum dicit.

Diosc. caput de Helenio, mendis scaterere scribit Matthiolum, idque testis est, Auicennam confundere cum Helenio nostrate Helenium Aegyptium: Esse præterea qui dicant (ut etiam testatur Galen. lib. de Ther. ad Pisonem, si modò Galeni liber legitimus sit) quod si Helenii succo tela venatoria inficiantur, venenata effici, idque in Dalmatia fieri, ut feràs omnino perdant, quod quidem ipsum fabulosum dicit.

Apud Anguillaram quidem epist. 1. dicit Galen. lib. de Antido. compositionem parari ex Helenii radice

radice, quæ venenum sit animalibus: hominibus tamen non noceat. Miratur idem Epist. 2. Plinium loquendo de Helenio voluisse Nepenthem Homeri confectum fuisse ex Helenio Crateuz.

Tragus Enulam campanam pingit & describit, dicitque à quibusdam eam putari radicem aliam, quam Mercurium Vlyssi aduersus venenatam Circes demonstrasse, Homerus testetur Odyssæo libro: Sic dicens.

*dedit Herban Martarius
Ex terra e. ellens, & mihi genus ipsius ostendit.
Radix quidem nigra erat, lacti verò similis flos.
Moly quidem ipsam vident Dii, difficile autem
effodere
Viris mortalibus, Dii autem omnia possunt.*

Panacis porro & Chironii nominibus appellandam suspicabatur Tragus, quam suspitionem Apuleius ipsi pariebat. Verum si radicem Enulæ, formam eius, odorem, saporisque acrimoniam, coloré denique & vires cum Helenio Dioscoridis diligenter & cum iudicio conferas, deprehendes illam verum esse Helenium. Quod Apuleius cap. 96. Panacem centaurion & Enulam campanam vocat; Serapio Iasum & Zinziber de Sem: Auerthoes Alfaran; Laur. Pinnius Hebraicè Elina, quod rectius Enula scribi posse Trago videtur. Quam autem nihil certi habeant nomenclaturæ, non solum Apuleius testatur, qui tres plantas Enulæ nomine appellauit, verum etiam Dioscorides, qui dictas voces aliis subinde herbis attribuit: ac apud Cordum in Diosc. annotatum est, Helenium Theophrastum nomine Chironii Panacis describere.

Helenium, inquit Astruc, nostra est Enula Campanica. Quia autem radicem fert amaram, credendum est, ut doctè adnotauit Marcellus, Dioscoridis historiam hanc corruptam & acephalam esse: Nam quod folia angusta Verbasco similia habere tradat, id cæli causæ forsantribuendum esset, quum in vno loco procerius herba vnaquàm in altero crescat: sed quod insignem amaritudinem in Enula repertam, silentio prætermiserit, non possum non testari textum istum corruptum esse. Unde Marcellus Virgilius confirmat se amaritudinem in Antiquissimo Dioscoridis codice legisse. Quamquam eâ quoque à Plinio prætermittam animaduerto, unde Matthiolus Senensis, hic falsè admodum Pliniū adducit libro 19. cap. 5. quia vltra quod in eo capite, nullam penitus de Helenio, siue Enula mentionem faciat, libro tamen 21. cap. 10. vbi Helenij meminit, non de hac loquitur, sed potius de Ægyptia, cui Dioscorides in hoc capite, ex mente Crateuz herbarij, ramulos Serpilli modo, humi sparsos tribuit, folia verò Lentis similia, cui quoque in eo loco nullam tribuit amaritudinem: Imò in describenda herba hac, Plinius à Dioscoridis variat, quum Dioscorides folia lentis, & ramulos Serpilli per terram sparsos Ægyptiam Enulam habere tradat: siue verò non Lentis folia sed Serpilli potius possidere dicat. Accedunt ad hæc, quod cap. 21. prædicti libri, vbi medicamenta Helenij pertractat, dulcem esse asserit, non amarum, ut liquidi constat Plinium de illa tantum dulci Ægyptia Enula memoriam fecisse, non verò de hac amara à nobis tractata: Proinde Matthiolus, si Plinij auctoritatem in hac parte subticuisset, prudentiùs dubio procul fecisset, ac non ita duplici errore hallucinaretur: primò,

Tom. III.

quum credat Plinium de hac Enula primam mentionem fecisse, quum ut diximus potius de secunda Ægyptia agat: secundo quum dicat Plinium Enulæ amaritudinem tribuere, quum re vera illi dulcedinem condonet, & non amaritudinem, ut cuique legenti notum erit. Verum Enulæ radicem adoleat ut in omnium Apothecariorum ore sit, inde hæc de causa, à multis creditum est, hanc Nepenthem herbam illam ab Homero tanta laude decantatam esse, quia perpetuam partem lætitiæ, & tristitiæ omnem aboleat, omnes abigendo curas, & malorum omnium obliuionem inducendo, præcipue si eius succus vino immixtus bibatur, quæ omnia vera esse crediderim, modò de Ægyptio Helenio Campano dicatur, quum in nostra Enula hæc prorsus non reperitur: nec Itali illius radices quotidie coctas, & Saccharo vel melle & aromatibus paratas licet essent, talia experiantur. De illa igitur Enula Ægyptia vera Nepenthe suo loco dicitur. *Hæc Amarus*: qui quid velit nondum video, ac Matthiolo fortè iniuria fit, nisi in prioribus Commentariis olim aliquid scripserit: præterea nescio cur dicat locum malè citatum à Matthiolo, & Plinium Enulæ amaritudinem non tribuere: vtrumque inuenio apud Plinium.

Apuleius cap. 95. vel Humelbergio teste, duas diuersas miscet plantas. Nam Enulæ nomina & virtutes, seu titulus promittit, traditurus, Chironii Panacis immiscuit nomina & historiam.

Robertus etiam non distinxit duo Helenia, præterea non facit mentionem Nepenthes, quod debebat, dum ait: Helenium, Enula Campana, cuius radicem si quis comederit omnium dolorum obliuiscitur.

Pater itaque ex hæcenus dictis Helenium, simpliciter dictum longè diuersum esse ab Helenio Ægyptio Crateuz dicto, quod multi Panax Chitonium falsò volunt, & melius alii Helianthe vulgare statuant, & alii Helianthe flore albo, & alii Herbam colubrorum, nos Heliantherarum, Osius Medicam matutam, quidam Securigacam siue Hedyсарum clypeo aspero.

Planta à nobis exhibitæ, Helenium dicitur Trago (cui & Enula campana) Fuchio & Gorteo. Helenium Diosc. Corn. Matth. Anguill. Cordo & Ruell. [quibus duobus & Helenium 1.] Amato, Hermol. Dod. passim Eluchas. Tabern. Cast. Lobel. [cui & Panax Anguillæ] Maranthæ, Apollin. Cronemburg. Rob. Steph. Monach. in Mes. Camer. Hort. Lusitanico, & Schvvenckfeldio. Helenium vulgò cognitum Rob. Const. in Lexico. Helenium vulgare Ioh. Agricola, & C. Bauh. cui & Helenium primum in suo phytop. Helenium Matthioli H. Lugdunensi. Enula Plinio. Enula campana Apuleio. Enula Lonic. & Cæsalpino. Panax Theophrasti, Helenii prima species Dioscoridis Anguillæ.

Helenium, inquit Græcis, hodie non solum officinis, sed etiam vulgò omnibus notum est. Latini Enulam & Enulam appellant: Officina: Enulam Campanam: Arab. *Iasum* siue *Rasen*. Getim. *Alant*, *Alantwurrt* [quia ferè radicis vsum solum nouerunt:] Belg. *Balandwurtele*: Galli *Enule Campanæ*, *Aulnee*, & vulgus *L'aune*: Itali *Lella Ena* & *Enola*: Hisp. *Rarz dell' alla*: Angli *Elecampane*: Poloni *Oman*: Boh. *woman*: Hung. *Seneny gyöfer* / *Drüeny fin*.

Helenium porro ab Helenæ lachrymis dictum esse volunt, ex quibus natum fabulantur Poëtæ: Alii quod contra serpentes ex eo primum ab He-

lena remedium inuentum sit, & Menelao comiri suo in Ægyptum nauiganti ostenderit. Alii ab Helena insula vbi longè optimum luxuriat.

Helenium siue Enula campana, Genecur vidi in hortis, Lugduni habebam & alii in hortis, Frater obseruauit Basileæ in Michelsfelden / ego ibi tantum in hortis vidi. Montbelgardi priusquam adornaremus Hortum Ill. E. C. in eo erat copiosum spontaneum, vt nunc cultum haberetur, floret Iunio & Iulio, in locis vt Dioscorides ait, montanis vmbrosis & siccis (*aridis*) vel rectius (*calidis*) humidis. In pinguibus & latis, teste Dodonæo, nascitur pratis: reperitur quandoque & in montibus, locis vmbrosis, & non omnino aridis: Frequens non modo apud Belgas, verum & alibi, vt in Italia, Gallia, Germania &c. Flores Iunio ac Iulio vigent. Radicis frustum recens terræ mandatū nullo negotio prouenit, id quod Dioscor. & Plinius supra testati sunt. Radix æstate effoditur & lecta siccat: non raro etiam Aprili & Maio mensibus legitur: viget Autumno.

Vires

Helenii radicis decoctum, authore Dioscoride, potum vrinas menslesque ciet. Ipsa verò radix in eclegmate sumpta cum melle prodest tussi, orthopnææ, ruptis, conuulsis, inflationibus & venenatorum moribus: quippe quæ in vniuersum excalfaciendi vi polleat. Folia ex vino decocta vtiliter Ischiadicis illinuntur. Est & radix stomacho vtilis, dulci musto condita: Siquidem salgamarii paululum exiccata eam, mox decoctam, aqua frigida demergunt: postea destrutum coniiciunt & ad vsum reponunt. Trita potaque ad sanguinis reiectiones est efficax.

Plinius non vno loco Inulæ meminit. Amarior, inquit, per se stomacho inimicissima, eadem dulcibus mixtis saluberrima. Et mox illustrata maximè Iuliæ Augustæ quotidiano cibo. Et Inula quoque à ieiuniis commanducata dentes confirmat, si, vt eruta est, terram non attingat. Cōdita tussim emendat. Radicis verò decoctæ succus tineas pellit: siccatæ autem in vmbra farina ruffi, & conuulsis, & inflationibus, & arteriis medetur. Venenatorum morsus abigit: folia ex vino lumborum dolori illinuntur.

Galenus de eadem ita scripsit, Helenii radix maximè vtilis est, non primò statim occursu excalfaciens, ac proinde non dicenda calida & sicca exquisitè, seu Piperitum atrum, cum candidū, sed cum recrementitio humore. Quapropter eclegmatis, quæ faciunt ad educendos ex thorace & pulmone crassos lentosque humores idoneè commiscetur. Rubrificant quoque eā partes frigidis ac diuturnis vexatas affectibus, cuiusmodi sunt ischiades, & exiguæ assiduæque articulorum procidentia ac luxationes. Hæc Galenus.

Helena, quæ in ore omnium est, postquam Græcis Troianisque pro se pugnantibus infinitos dolores intulisset: Helenium vt poëtæ cecinerunt ex lachrymis suis in Helena insula natum mortalibus dedit: quo tristitia omnis aboleretur: si primo doctrinarum & antiquitatis parenti Homero credimus: qui ad obliuionem poculo iniectum ab ea in cœna dixit: tam præsentis ad eam obliuionem potestare: vt nec defunctis ante se parentibus, filiisue aut fratribus, lachrymis genas rigaturus sit quā die id biberit aliquis, poëta ille testetur: quæ an vera sint in poetis excutienda relinquimus: naturæ enim & corporis: non fortunæ & animi mala in Dioscor. tractamus.

Radicem Helenii in mustum coniectam coqui vt destrutum fiat & sapa, atque inde eximi, ac vinum siue Sapam in vsum reponi, scribit Cornarius: eadem etiam vti vulgus ex aceto trita ad scabiem confricandam. Radix Helenii, vt Trago placet, cum recens adhuc est, saccharo condiri potest, quemadmodum Zingiber & Calamus aromaticus. Sique illa desiccata & in puluerem redacta, saccharo vel melle misceatur, vt ita fiat eclegma, benedictam præstat medicinam aduersus suspiria & lentam tussim: hoc namque eclegmate crassi & viscosi thoracis humores inciduntur & excreabiles fiunt. Eodem remedio internæ exulcerationes & abscessus pulmonis, matricis, aliorumque viscerum (sic vsurpato) persanantur. Cataplasma ex Helenii vitidis radice confectum tumores & inflammationes locorum muliebrium & genitalium detumescere facit. Nō improbarim cum Trago in tumoribus frigidis & flatuosis, in phlegmone nolim vti: Radix siquidem, teste Dodonæo, huius Inulæ ad multa maximè vtilis sit natura excalfactoria & resiccans tertio ordine: præsertim arida. Nam recens & adhuc succo plena, excrementitio redundat humore, qui calfaciendi ac resiccandi eius potentiam nonnihil obtundit. Prodest aduersus respirandi difficultatē, orthopnææ, veteremque tussim, Vētriculorū. cōmoda & salubris radix cōdita est: à cœna supra non modò concoctionem promouet, sed & aluum faciliorem reddit. Sunt etiam qui ipsi decoctis, tritis ac melli instar vnguenti permixtis, vetera vlcera expurgari atque ad cicatricem perducere affirmant.

Aridæ radicis farina, vt prodit Matthiolus, denarii pondere diebus aliquot ex vino vetere hausta spleniticos iuuat, Helenii radicis succus cum pari hyssopi succi pondere, & aquæ stillatitiæ Tussilaginis triplicato pondere, saccharique quantum sat fuerit, ad mellis spissitudinem decoctus, magnopere asthmaticos iuuat, si frequenter vtantur. Sicca radix foris vtilis est, sin intro sumas humente adhuc atque recenti vtendum, præsertim in pulmonis chronicis affectibus. Helenii radicem, flores & folia tanquam peculiare præseruarium pestis tempore commendat Bokeilius. Condit autem radices & flores etiam, de quibus manè aduersus prauum aërem & difficultatem spirandi vtiliter assumi scribit, quemadmodum & vinum Helenites: vtilem etiam radicem in aceto forti maceratam & odoratam perhibet.

Inuenitur & Nectarites vinum ex Helenio paratum, sed magnā inter pondus radicis & mensuram multi diuersitate. Plinius enim quadraginta denarios radicis, hoc est uncias quinque, si denarium drachmæ pondere accipiamus, in sextarios sex musti mittit. Dioscor. autem quinque drachmas, in sex congios inicit: qui post tres menses primò diffundit, vt in hoc exilius pondus sit, ad tantam vini mensuram: in illo magnum pondus sit, ad exilem mensuram. Quare si in illo sextarii in congios mutarentur: in Dioscor. contrā congii in sextarios, mihi cum Cornario aptior miscendi modus videretur. Sed hæc tota res experimento constat, & in cuiusque arbitrio sita est, prout quævis mixtura cuiuslibet iucunda est. Facit ad stomachū, & thoracem: ducit & vrinas. Vinum quod ex Helenii radicibus passim in Germania paratur frequenter in potu sumptum mirificè visum acuit.

Vinum Nectarites.

BATANICA PLANTA FOLIIS

Helenii.

CAP. X.

Cypre

Descriptio

DE hac planta Clus. in Exot. lib. 4. cap. 23. talibus agit verbis. In Doctoris Colui, siue Coolmans (portulis, quæ deportatæ sunt Amstelredamum anno 1601. ex India Orientali, in chartacea pagina, hæc latina verba ipsius Doctoris propria manu exarata reperiebam. An Conyza odorata aut Helenium alterum Saluæ odorem spirans? Herba cuius folia Helenii formam referunt, flores parui hæscientes, & in pappos abeuntes Conyza minores. Bantamæ comeditur. *Hec ille.* Ego verò ex notis quas in sicca planta obseruabam, quæ sequuntur addebam: Plantæ illius folia palmum erant longa aut maiora, tres ferè uncias lata, per oras crenata, aliquot venis à medio nervo folium per longitudinem medium secante inæqualiter nascentibus, & in latera excurrentibus prædita, pronaque parte incana: foliorum pediculi paruas appendices adnatas habebant veluti aures: tenelli rami & recenter nata folia albâ lanugine pubescebant, etiam in reficcatâ, quam duntaxat conspiciebam, & cuius folia degustata aliquid amaritudinis habere deprehendebantur.

HERBA MALVCANA ACOSTÆ.

CAP. XI.

Descriptio

DVorum aut trium cubitorum longitudinē adquirat hæc planta, nonnunquam etiam locis vberioribus & humidis, quinque cubitos superans, eleganti vitore prædita, caule tenui, tenero, nonnihil concauo, imbecillo, & nisi uti lasminum pergulis sustineatur, humi sese diffundente, quemadmodum Hedera; & multos ramos spargente, qui subinde radices agunt ut Mentha & Melissophyllon; adeoque serpunt, ut planta sola, vel ramus transpositus, breui temporis spatio magnum locū occupet: folia habet tenella & mollia, in ambitu serrata, magnitudine & forma Sambuci foliis respondentia: florem croceum, Chamæmeli flori admodum similem, paulò tamen maiorem. Toto anno virescit & luxuriat.



Acosia, Historiæ huius auctore, teste, ex vers. Clusii, vulgò nuncupatur Remedium pauperum & destructio Chirurgorum: Canarini Brungara arabus appellant, id est, quæ flore est croceus.

Hist. Lugd. Malucana Acostæ.

Frequenter vtuntur cum in Maluca [vnde

primam originem traxisse creditur; quoddam istuc abundè crescat, & plurima admisceatur Chirurgicis remediis] tum in omnibus Indiæ prouinciis, in quibus diligenter colitur, & in pretio habetur, nec iniuriâ.

Coquuntur huius plantæ folia in oleo, & cum cera inspissantur vnguenti modo: mirificè curat id vnguentum omnis generis vlceris recentia & antiqua, etiam si sanguinolenta, fordida, cuniculosa, maligna, & putrida sint: miræ esse efficacis deprehendi in tibiæ vuneribus inueteratis, & recentibus vuneribus.

Alia est præterea huius stirpis vtendæ ratio. Eius enim caulem & ramos superiore cortice denudant, & sumunt membranam illam tenuem quæ media est inter exteriorem corticem & caulem, quæque faciliè, uti in Cannabi, retellitur: eam oleo nucis Indiæ madentem, ipsius plantæ foliis inuoluunt, & sub cineribus calidis recondunt: ubi incaluerit & emollita fuerit, conterunt, & recentibus cruentisque vuneribus imponunt, seu grandia sint, seu leuia, & paucis diebus non sine admiratione conglutinant absque vlla inflammatione aut apostemate: lenit enim dolorem sanguinisque fluxum cohibet: breuiter nullo alio medicamento adhibito omnino ad cicatricem perducit: singulare etiam perhibent esse remedium aduersus neruorum punctiones & vulnera.

Eodem præterea modo adhibetur in apostemate aperto ad emundandum, carnem generandum, & ad cicatricem perducendum: item in inueteratis vlceribus & cuniculosis, in quibus ea solummodò trita interdum apponitur.

Quia porro certissima sunt huius plantæ, quæ enumeravi, remedia: vulgaris illorum vsus est in vniuersis illis prouinciis, & magnæ æstimationis: multi præterea alii, qui inde nauigant, vnguentum ex hac herba cum oleo & cera confectum, secum efferre solent, tantam fiduciam in eo collocantes, quasi omnia Chirurgica remedia apud se haberent: itaque quacunque occasione, in qua chirurgorum opera requiri posset, subito ad vnguentum ex herba Malucana confectum confugiunt, tanquam indubitatum remedium.

BELLIS MINOR SYLVESTRIS

Spontanea.

CAP. XII.

Descriptio



Torum cæspitè operit sparsis humi foliis numerosis, pinguisculis, hirsutis, ex longa, ceruice sensim latescens: rotundatisque: caulem nullum prouinit, sed pediculos frequentes, palmares & altiores, tenues, teretes, hirsutos, quorum singulis flus insidet vnus, Bellidis hortensis,

minor, singulati foliorum in orbem ambitu, lateorum aut ex albo sanguineorum, luteo umbilico: radiantur porro fibris multis tenuibus.

Bellis non videtur à Græcis descripta: ast apud Plinium Bellim & Bellium vocari plerique fatentur, & ut Cæsalpino videtur, optimâ ratione: inquit enim lib. 26. cap. 5. bellis in pratis nascitur: flore albo, aliquatenus rubente: ad omnes cervicis dolores, tumoresque quacunque in parte illi cum Artemisia: lib. 21. cap. 8. Luteus, inquit, & Bellio pastillicantibus quinquagenis quinis barbulis coronatur: pratenses hi flores, ac sine vfu, idè & plerique sine nominibus: quin & his ipsi alii alia nomina imponunt. Quo loco luteum dixit florem, id est internum: neque obstat, quod Bellio luteum esse florem tradat, quia non ad ambitum, sed ad discum, mediumque floris, quod sanè luteum est, respexit, inquit Fuchsius: & hinc est quod à quibusdam Plinii locus ita legatur. Luteum & Bellio, ut subaudiatur semen. Barbulas autem appellavit circumdantia foliola. Alibi putat Cæsalp. hanc eandem intellexisse sub nomine Anthemi, cum inquit: primum Anthemum quoque calculos elieit: parvis è radice foliis quinis: caulibus longis duobus: flore roseo: radices tria per se ceu Lauer crudum. Assumpta hæc ex Theophrasto, qui Anthemon quoddam scripsit ab radice tantum foliatum: sed Theodorus inibi vertit Nigellam.

Cæsalp. porro hanc eandem apud Dioscoridè dicit inter genera Anthemidis nominatam, quâ Cranthemon vocat, quasi florem veris: ad id enim alludit & appellatio vulgaris apud nos: hæc dixit flore purpureo constare, efficacissimam ex omnibus generibus ad calculos, in totum maiorem: quæ nota, si de flore intelligatur, convenit, maior enim est in totum: non si de frutice, ut Plinius interpretatur: brevis enim hæc est.

De Bellis silu. spontanea loquitur Ruell. lib. 2. cap. 125. his verbis. bellis qui & Bellus dicitur, flos pratensis, duorum generum est. Maior (de hac postea dicetur,) & minor flore albo, aliquatenus rubente quinquagenis ternis tantum barbulis circumcinato, folio pingui, in terra iacente, in rotundum oblongo, leuissimè serrato sylvestris floris calyculus simplici foliorum constat ambitu, emaculato candore, vnde Galli *Margaritam* vocarunt. Hæc tria cum Artemisia strumas efficacissimè compescit. In officinis minoris Consolidæ titulo demonstratur. Hybernis quoque nascens coronis hyeme tota provenit, primus etiam Veris flos, in Italiam ex occidentè, ut quidam existimant, conuectus. Laudatur ad podagras, lichiada, & nervorum resolutionem, vnde nonnulli eâ Paralytim vocant. Hallucinatur qui Bellium vulgò Leonis dentem dictum interpretantur, quem non quinquagenæ quinæ, sed plusquam centenæ coronant barbulae, non candidæ sed luteæ, semine pullo in auras evanescente: Bellio, albæ luteum verticem circumdant, qui à multis semè intelligitur. Porro qui Antipatrem vulgò dictum rentur esse, liquidò falluntur.

Lonic. Primula veris, Solidago minima (Flein ronnndfraut.) Arthritica (Gichtkraut, ab effectu) & Bellis minor. Videtur autem pictura eam exprimere, quæ est pleno flore.

Brunfels. Solidago, Consolide species. Eidem in quarto & Cæsalp. Primula veris, quod sc. Vere inchoante mox erumpat. Trago, Primula veris, Arctica Pandectarii. Fuchs. & Dod. gall. Bellis minor sylvestris. Tabern. Icon. & Hist. bellis 4. siue minor sylvestris. C. Bauhin. Phyr.

Bellis 7. siue silu. minor, varians floris colore: discum enim luteum in orbem cingunt folia vel alba, vel ex candido rubra, in ambitu alba: aliquando in viridem colorem degenerant.

Lobel. in Adu. Consolida minor Officinarum. Obf. p. 153. Bellides siue Consolidæ minores, Primulae Veris Tragi.

Bellis minor in post. comm. quam in prioribus Matthiolus lib. 3. cap. 139. bellidis alterum genus facit, in pratis plerumque nascens. Turn. Bellidis genus alterum, siue spontaneum, ubique iuxta semitas & in pratis obvium, quod Septentrionales Angli *Baumurt* vocant. Videtur duas figuras proponere.

Hæc est ille Amellus Guilandini in Theone, quem Asterem Atticum esse negat, & vel Chelidonium minus, vel Primulam Veris minorem affirmat, in quarum foliis evidenter admodum Violæ subluceat purpura nigra, ancipiti foliorum intellectu, neu quis misceat.

Bellidem minorem siluestrem spontaneam, Nomina linguarum vocant Germani *Maßlieben*, *Maßulen*, *Maß bliemlin*, *Hein zeitlosen*, & simpliciter *zeitlos*: Belgæ, *Madelienen*, *ferissouwen*, *Margrieten*: Galli *Pasquette sauvage*, ou *Consine petite* Fuchs. & simpliciter *Marguerite* ou *Pasquette* (forte quod ad Pascha fere florere incipiat,) & *petite sauvage marguerite*: Itali *Margarite* & *Flori di prima veri gentili*: Angli *Dayzie*: boh. *Marec kuf*, *Sadmlrofa*.

Pasim provenit in pratis & similibus perinde palustribus ac humidis compluribus locis, vernis mensibus florens. Et quidem Monspelii & Patavii mense Februario: Montbelgardi Martio, Octobri, & Novembri: Genevæ & Decembri: Basileæ Maio.

Aqua primulae seu bellidis destillata, secus refrigerat, calores internos restinguit, reprimat choleram, pustulas linguæ ab ardore faucium profectas, orisque exulcerationes sanat potu.

Herba ipsa adhuc tenera cum sale oleo & aceto commanducata aluum adstrictam laxat: folia recentia quibusvis calidioribus vulneribus imposita prolunt. Herba tusa, tumoribusque genitalium imposita, calorem repellit, leniterque dolorem sedat. Quidam & herba & floribus Primulae quibus Ebulum & Eupatorium adiungunt, ad balnea sudatoria utuntur, atque ea membrorum resolutioni, Græci paralytim vocant, mirifice conducere asserunt. Vercor ne Tragus hæc tradens Primulam Verbalci speciem confundat.

Bellidis minoris folia, auctore Dodonæo, humectandi, refrigerandi que facultate donata sunt: & humectant quidem ordine secundo intenso, refrigerant vero eodem remisso. Dolores omnes, sed præsertim articulares ac podagricos, ex calido siccoque humore, mitigant: cum butyro recenti & intus trita, ac locis dolentibus imposita, potissimum additis Malvæ foliis. Eadè oleribus addita, faciem aluum faciunt, & in cassonide febri, ac intestinorum inflammationibus, magna utilitate enematis admiscetur.

À Dodonæo dissentit Fuchsius, dicens bellis uterque calidus & siccus est, id quod ex Plinio colligi potest, qui illorum ad discutendas strumas usum esse scribit. Acetosus tamen sapor quæ in gustu minor præ se fert, aliquam frigiditatis in eo portionem esse monstrat. Quicquid tamen sit, exicare bellios evidentissimum est. Temperatè frigidas & siccas potius quam humidas dicitur Lobelius, & nonnihil adstringentes. Quotquot hodie viuunt vulnerariam herbam bellum esse noverunt.

Locus & tempus.

Vires

nouerunt. Vulneribus enim vilis & potissimum in fractura capitis admota: & hinc Consolida nomen adepta videtur. Succus etiam herbæ vtiliter à vulneratis bibitur Folia recipiuntur inter cetera.

BELLIS FLORE VIRIDI.

Descriptio



Est & hoc in hoc flore admiratione dignum, quod ubi in valde humido loco diutius inhaerit, si non aliud transferatur, in viridē planē colorem degenerat. Talem enim Bellidem primò vidi Sturgardiæ florentem Iunio, cuius *salsa* erat minora, quam in vulgaribus, quæ etiam mihi pallidiora videntur:

flores etiam minores ex flosculis virentibus constantes, capitulum representantes sine foliolis in circuitu. Nos curauimus depingendam sua magnitudine.

D. Arnoldus Gillenius in botanicis egregiè versatus, ait non genus particulare Bellidis, sed abortiuum quod non negam.

C. Bauh. phyt. Bellis 7. siue filu. minor. in viridem colorem degenerans.

BELLIS HORTENSIS SIVE
flore multiplicato.

Descriptio



Bellis, crebris est in orb. m. fufis *sulis*, pilosellæ, pinguisculis, nonnihil crenatis, aliàs integris, hirsutis, sapore adstringente: inter quæ pediculi oriuntur palmares, tenues subrubentes, luxuri; qui flores sustinent albos purpurascensue, mediolutescos, Anthemidis modo: aliàs verò numero-

sa foliorum luxuries umbilicam luteum obumbrat, repetita transplantatione, colore vel albo, vel rubro, vel in ambitu rubro in medio albo, vel alternatim, vel viridi, vel quâ denique fors tulit temerè versicolore varietate foliorum

Tom. III.

commendabilis: nec radices fibrosæ reptatu contenta se propagasse, quin & e flore ad margines, nouam sobolem, haud aliter atque in prolifera Calcha, sufficit, sed matre, ut par est, minorem.

Quid cultus mangonium in primula Veris efficere possit, commemorat Tragus. Hodie,



inquit, versicolores, & multiplici barbularum contextu stipatos puellæ inter coronarios flores, hos quoque plantare solent. Quidam enim ex iis rubri, quidam candore emaculato, postremò nonnulli ex albo & rubeo mixti, alij intus rubri in ambitu albi spectantur.

Quin & candidi flosculi, qui multiplices cultura euadunt, nisi citius carpantur, ex se alios generant, ita ut sepe ex vno capitulo, seu [ut ita loquar] cerebro primi floris, quatuor aut quinque alij erumpant, qua in re naturæ felicitas & mira vis nobis commendatur.

Math. in prior. comm. Bellidis primum genus siue hortense siue iconæ. In post. cum m. g. fig. Lat. & It. Bellis minoris tres species. Turn. p. 78. Bellis siluestris prior, quantum mihi videtur.

Fuch. Bellis minor hortensis, quam Officinas Consolidum minorem appellare scribit, Germanos Monarblume oder rote blume/ Gallos Marguerites de jardin, ou Consire perite.

Gesn. hort. Bellis minor in hortis.

Dodon. gall. Bellis minor hortensis, *petits Marguerites d. mestique*. Lat. in fol. Bellis hortensis. multiplici flore. Plant. icon. p. 476. Bellis hortensis multiplici flore, siue Bellides Consolida minores & mediz: Tragi primula vera.

Tabern. icon. & Hist. tres ponit figuras; Bellis 1. hortensis, multiplex flore albo, *weiß gefült* *Maßlieben*. Bellis 2. hortensis flore rubro, 3. Bellis tertia minor hortensis.

C. Bauh. phyt. p. 506. Bellis 8. siue hortensis flore pleno, albo, rubro, incarnato, vario: id est, candido & rubente, minore item & maiore flore, cuius nomine tres icones apud Tabern. p. 327. & 328. & apud Lobel. duz. Item p. 507. Bellis 9. siue hortensis prolifera: hanc dixit Tragus lib. 1. cap. 51. albo colore, & talem fieri si non citius carpantur flores, suauē rubentem Lutetiā habemus: viridem obseruauit Lobelius.

Casalp. primula veris, in hortis coli solita, hieme tota florens, multiplici foliorum rubentium ordine.

Bellidem flore pleno hortensem habent Mōspelli in hortis: sed non ita frequentem ut Basilæ: cuius ibi diuersi sunt colores, quemamodū & Genevæ, ubi florentes obseruauit Nouembri & Decembri: albas in horto habui florentes Ianuario: sunt etiam Bellides satiuæ in hortis Pa-

Locus & tempus

raui & Bononiæ. Montbelgardi habet in hortis: aliquot genera plantarum in Horto E.C. Albâ plenam, rubras duas, vnam foliolis florum angustioribus & fistulosis ferè, aliam latioribus in quibus cum rubore sunt partes, quas albas cinereas ferè dicas.

BELLIS SYLVATICA.

Descriptio



RADICE haud secus fibrosa est quàm minor bellis, sed crassior, etiam aliquando lignosior: folia verò maiora, oblonga, per extremum rotunda, & in ambitu nonnihil serrata, hirsuta, subinde etiam subrubentia; longo pediculo donata: Coliculi ex radice nudi aliquot exeunt

dodrantes aut pedales ac maiores, florem singuli vnicum sustinentes bellidis maioris similis, sed paulò minorem, foliis, radiatis albis, disco luteo.

Matthiolo in prioribus comment. bellis quoad iconem: In post. comm. Ital. & Lat. cum mag. fig. & Hist. germ. bellis media, Mittel Maßliche ben.

Gesn. hort. Tabern. Icon. & Hist. Lobel. Aduers. pag. 199. bellis media. Obseru. pag. 151. bellis maior. Icon. Plant. pag. 476. bellis maior sylvestris. Teur. 561. *Exstirpationis* malè dici maiorem. Dodon. Lat. in fol. bellis prima, bellis sylvestris.

Clus. in post. Histor. bellis media Matthioli, maior Lobelii, à vulgo ex Consolida minoris generibus habita.

C. Bauhin. Phyt. bellis 6. siue silu. media caule carens. An dicenda sit hæc bellis caule carere nescio, meo iudicio caules non foliosi dici possunt pediculi flores sustinentes.

Frequentissima est in Alpinis pratis, vnde illa sæpius in hortum transtulit Clusius, cum Viennæ ageret. bellidem syluaticam siue mediam Tiguri obseruauit, & basilicæ in hortu D. Doctoris Felicis Plateri Medici, nec non Genevæ. Mense Maio copiosam inueni florentem in montibus circa S. Vrsanè inter dumeta: transtuli Montbelgardum in hortum Ill. E. C. vbi diuturna non fuit.

BELLIS MAIOR.

Fibrosa radice reptat, caules emittens plures dodrantes & altiores, quadratos, modò in alas diuisos: folia oblonga, pinguis, serrata, subacti sapore: flores buphthalmi aut Pyrethri, umbilico luteo, foliis in ambitu albis, odore nullo eccellente: foliola calycum habent subriam ni-

gricantem. Figura prior ex Fuchsianis, non malè videtur nobis exprimere bellidem ramosam, quâvis possit etiam poni pro Chrysanthemo.

Frater C. Bauhinus misit nobis bellidem maiorem, caule non ramoso, foliis valdè angustis dentatis, serratisque, in acutum desinentibus, Præmice Fuchsi aliquando respondentibus, flore alioqui præcedenti simili, cui satis similis Fuchsiana icon,

Descriptio

si folia tantillum angustiora picta esset: suspicabar fratris secundam, verum quæ de rotunditate acuminata ait, non conueniunt: duæ icones à nobis propositæ iam erant sculptæ.

Brunfelsio Tom. 1. Rhap. 49. in folio. Parthenii quinta species, seu oculus bonis vel vaccinus: Eadem in quarto pag. 11. buphthalmos.

Parthenii

Buphthalmos

Matth. in prioribus côm. bellidis tertium genus, cæteris maius, sine icône: In post. comm. cum mag. figuris Lat. & Ital. bellis maior.

Fuchsio, bellis maior, Officinis nonnullis Consolida media. Germ. Gansblum. Verum alia est consolida media.

Gesn. hort.

bellis, Consolida recentioribus maior.

Pro Bellide maiore Trag. Germ. malè figurâ Hyperici sub sequentibus nominibus ponit, G. Gansblum/Moguntinenses S. Johans blum, hoc est, Florem S. Iohannis: Moguntinis, Treuerensibus ac Spirensibus falsè aug, hoc est, vitulinus oculus, Buphthalmus sed non Dioscoridis. Hermolaus Barbatas Bellium maiorem appellat.

Dodon. gall. Lat. in fol. Bellis maior, Marguerite grande.

Lobel. Aqu. pag. 200. Obs. pag. 155. Ic. Plant. pag. 478. Bellis maior, Consolida media Vulnerariorum. Germ. Gansblum.

Tabern. Icon. & Hist. Bellium maius Gansblum.

C. Bauhin. Phyt. Bellis 1. siue sylu. caule folioso maior, rarissime flore pleno reperitur.

Cæsalpin. Bellis maior, iuxta vias nascens, de qua



Tragus

qua sit. Caules rectos fert, dodrante altiores, foliosos: folia sunt Oleæ figurâ, serrata: flos in summo candidus, longè amplior Chamæmelo: ætate floret, utuntur quidam floribus cum axungia ad capitis vlcera maligna, quam Tineam vocant: non dubito hanc apud Theophrastum inter genera Anthemi ceteri, quod foliaceum vocat. Theodorus Nigellam foliosam vertit.

Hort. Lusit. Bellis maior. Bellium maius, Bengblum, S. Johano blum.

Locus. & Tempus. Bellidem maiorem vocant Patauii *margaritam*, comedunt mense Februario in acetariis. Genevæ viret tota hieme & Ianuario. Basileæ florentem vidi mense Octobri quâ itur Mourets & in pratis inter portam Stein & Eschen & apud fluvium Birse intra urbem, & mense Iunio passim in pratis. Monspelii mense Maio: Lugduni frequens, Montbelgardi vulgaris in pratis, etiam in Horto E. C. spontanea, florens Iunio & Iulio.

Temperatam in caliditate & siccitate hanc tradit Tabernamontanus. Vtilis admodum vulneribus, & rupturis in potu bibita, vel Emplastri modo applicata. Lobelio si credimus eadem potest quæ bellides, eodem modo vsurpata.



minea, unciam duarum aut sescuncie longitudine, subinde crenata; magna verò caulis pars nuda est; flos summo infidet cacumini vnicus, maiusculus, Bellide præfili maior, albus, disco luteo, capitulo squamis nigricantibus compacto.

Gæzer Cherlerus attulit collectam ad

Montis Lupi pedes & circum iacentibus campestribus squalidis & incultis.

ANTHEMIDES SIVE CHAMÆMELA Veteribus.

CAP. XIII.

Descriptio **E**X radice serpente, lignosa, nigricante, & ab una parte fibras spargente caulem emittit vnicum, cubitalem altitudinem excedentem, rotundum, striatum, ad radicem villosum, circa quem folia pediculis carentia, quinque vel sex digitorum transversorum longa, angusta, rigida, ex rotunditate acuminata, per circumferentiam crenata, nullo ordine disposita, in caulis summo flos vnicus medio luteus, quem plurima folia alba cingunt, totusque flos multò prior maior est: hæc in Baldo monte Veronensi provenit, ut Frater descriptionis auctor prodidit. C. Bauh. phyt. Bellis 2. siue alpina maior.

BELLIS ALPINÆ ALIA SPECIES MINOR foliis non rigidis.

Hæc iam dicta caule breviori foliis duplò triplòque angustioribus, & brevioribus, levius crenatis, nec rigidis in exquisitum acumem desinentibus, flore quinetiam minore, in montibus Euganeis Patauinis provenit.

C. Bauh. Phyt. descriptionis auctori Bellidis secundæ siue Alpine maioris altera specie.

Hæc cum præcedenti nobis Chariff. frater C. Bauh. communicavit, quarum nemo ante ipsum mentionem fecit, cuius studio indefesso in re Botanica multum debetur.

BELLIS MONTANA MINOR

Descriptio **S**esquicubitali est caule, eoque simplice & indiviso: folia terram proximè multa semuncialia, per extremum subrotunda, serrata, longis pediculis nixa: alia per caulem alternata, gratum. III.

Genera Anthemion plura dicit Theophrastus. Anthemion, inquit, floret particulatim, incipiens non ab imo, ut in cæteris, sed à summo: flos candidus circumdat, medium viridis tenet [id est pallidus,] & semini color idem: decidit id uti & spinosorum conceptaculo inani relicto: genera eius plura: quædam ab radice tantum foliata: Quædam in caule solum: sed hanc Theodorus Nigellam vertit, teste Cæsalpino.

At Dioscorides genera tria proponit flore tantum distantia, his verbis. Anthemidem alii Leucanthemon, alii Eranthemon, quoniam Vere floreat, alii Chamæmelum quoniam odorem Mali habeat, nonnulli Melanthemon, alii Chrysocomen [Orib. *χρυσόκομης*,] alii denique Calliam vocant. Huius genera tria flore tantum distantia: rami dodrantes fruticosi, alii multis concaui: foliola parva tenuia numerosa: rotunda item capitula, intus quidem aut colore fulgentia, foris verò orbiculatq̃ ambitu floribus circumdata candidis, aut purpureis, magnitudine foliorum Rutæ. Hæc Dioscorides, quæ ferè ad verbum transcribit Plinius, addens eius florem inter coronamenta reponi; ac magnis laudibus celebrari ab Asclepiade.

Anthemidis, inquit Marantha lib. 1. cap. 9. tria genera posuit Dioscorides, tantum flore distantia: atque clariùs explicans seipsum, in colore, non in forma hanc discrepantiam sumpsit. Vnde quia nullam aliam habebat differentiam, omnia hæc tria genera vnica descriptione complexus est: sed necesse fuit ea distinguere, ut quæ facultatum gradibus distarent: nam si æquè omnia viribus pollerent, nullam fecisset in genera diversitatem.

Porro in Anthemide hac ex tam multis appellationibus nulla est, quæ non certam & rei coniunctam significationem habeat. Omittimus quas ipsemet hic declaravit, Eranthemon quòd Vere floreat: & Chamæmelum quòd Pomi odo-

chius, quæ à Dioscorido propriè λευκάνθημον, vt vulgo hodie Camomilla vocatur, gall. *Camomille blanche*. Primum autem hoc Anthemidis seu Chamæmeli genus esse verum & legitimum Chamæmelum, neminem dubitare arbitror, quod nihil in hoc sit, quod Dioscoridis descriptioni, quæ antè adscriptimus, non respondeat. Inscribitur à Fuchsio Chamæmelon leucanthemon.

Tragus hanc, Chamomillam vulgarem inscribit, ac tertiam facit, agrestemque cognominat. Non minùs rectè Anthemidem Dioscoridis, Anthemon Theophrasti, Leucanthemon, seu Melanthemon Plinii lib. 22. cap. 21. esse existimat.

H. Lugd. p. 968. Anthemis leucanthemos Plinii. Item p. 1345. Chamæmelum siluestre Dodonæi (puta Gallien.) Non bene duas figuras vnius plantæ diuersis capitibus proponit, quasi diuersæ essent plantæ, quinimò videtur priori loco confundere Chamæmelum Romanum vocatum cum vulgari.

C. Bauh. phyt. Chamæmelum 3. [1. apud Matth.] sic vulgare, quod Leucanthemon Dioscoridis esse confirmat.

Chamæmelum vulgare obseruauit Lugduni, Basileæ, Montpelii, Geneuæ, florens Maio in segetibus. Montbelgardi abundat etiam in herbo E. C. ac ineunte Ætate segetibus interdum tam frequens & satis, vt non parum incommodum sit.

Vim habent, vt testis est Dioscorides, radices, flores, & herba Anthemidis, exalfaciendi extenuandique: potu & infusione pellunt menstrua, partus, urinam, calculosque: aduersus inflationes & ilei tormentia bibuntur: bilem suffusam expurgant: iocinorum vitia sanant: decocto earum velicæ fouentur: ex omnibus Anthemidis generibus, ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet, cuius amplitudo maiuscula est hanc propriè Heranthemon vocant. Ea cui Leucanthemon nomen est, item quæ Chrysanthemon dicitur, vehementius urinam cient: ægilopis illis medentur: commanducata vlcera eruptiones in ore sanant: nonnulli in clysteribus ex oleo vtuntur, terunturque in farinam ad abigendos febrium circuitus: flores & folia recondi debent, & priuatim tusa, in pastillos digeri: radix quoque siccare, dumque ingruit necessitas, binæ partes herbæ dari, modò floris aut radicis pars vna, modò contra, floris partes duæ & herbæ vna permutatim duplicato pondere, alternis diebus: bibere autem oportet in vino mulso diluto.

Est Chamæmelum Galeno tenuium partium: quamobrem digerendi, rarefaciendi & laxandi facultatem obtinet: tenuitate Rosæ persimile, calore verò ad olei facultates magis accedit, quapropter lassitudinibus, vt si quid aliud, confert, doloresque mitigat: præterea tensa remittit & laxat, quæque mediocriter dura sunt, emollit, quæque constipata condensatæ sunt, rarefacit: adhuc febres quæ citra visceris alicuius inflammatorum infestant, dissoluit, præsertim quæ ex humoribus biliosis aut cutis densitate consistunt, Quæ de re ab Ægyptiorum sapientissimis Soli consecratum est, febriumque omnium remedium puratur. Verùm hac quidem in re à veritate aberrant: solas enim quas diximus febres sanare potest, easque quæ iam concoctæ sunt: iuuat autem pulchre reliquas etiam omnes, quæ melancholicæ sunt, pituitosæ, aut ex visceris inflammatione prognatæ: nam & harum remedium

Tom. III.

Chamæmelum vel strenuissimum est, vbi iam concoctis adhibetur: quapropter & hypochondriis, vt siquid aliud, gratum existit.

Tragus memorie prodidit, aquam Chamæmeli florum destillatam eadem efficere, quæ Dioscorides herbæ simpliciter tribuit: puerperis verò primo loco positam in primis utilem esse, per eam enim efficaciter purgari. Qui morbo comitiali continuò vexantur, iis flores Chamæmeli aceto & melle decocti, propinari in potu debent, quos si vsi fuerint, statim confurgunt, morboque per aliquot tempus liberantur. Chamæmeli odor, aqua eiusdem stillatitia, nec non lixiuum, in quo illa decocta fuerint, debilitati capitis & cerebri conferunt: decoctio eius, in ueteratis malignis vlceribus lauandis vtilissima est. Oleum ex Chamæmeli floribus confectum, induratos tumores & collectiones emollit ac detumescere facit, doloresque mitigat.

De Chamæmeli viribus hæc Matth. Indubitata fidei experimentum contra dolores internos quos status peperit, vritur ad albedinem talis suillus, testitur in puluerem, cuius drachma vna ex vino propinatur in quo decoctum fuerit Chamæmelum. Eiusdem decoctum ex iusculo carminum, euporiston est contra dolores colicos si bibatur. Scribunt quidam, si quis Chamæmeli triti puluerem melle excipiat, vt fiat electuarium, deque eo quotidie bis horis tribus ante cibum, singulis vicibus cochlearis menturam sumat, sensimque deglutiat, bronchocele curare. Magni est Chamæmelum vsus in medicina ad compescendos dolores ventris, matricis, lumborum, renum, vesicæ, atque inter omnes plantas, quotquot in balnea contra calculum recipiuntur, nihil floribus Chamæmeli efficacius: faciunt & ad cruciatus spasmi flatulenti, aliosque conuulsivos: in quem finem vsus duplex commodissimus, vel enim Chamæmeli & Maluæ ex vino aut aqua factam decoctionem, colatam in vesicam infundunt bouinam, aut suillam, donec ad medium sit repleta, quam constricto collo parti dolenti applicant: posset & decocto addi oleum Chamæmelinum: Alter vtendi modus est talis, folia aut flores Chamæmeli cum seminibus Lini in sacculum coniiciuntur interpunctum, qui in aqua calefacta parumper infusus, postea inter orbis duos expressus, quam potest fieri calidissimus, loco dolenti imponitur, superdato panno quadruplicato calente, vbi refrixerit, denud eodem modo calefit: idque sepius iteretur, mane ieiuno ventriculo & vespere, quotiescunque vrgent dolores: prodest & ante applicatum partem oleo Chamæmelino inungere: præterea Chamæmelum in aqua decoctum cum fursibus triticeis, additâ postea axungia porcinâ, vt emplastri consistentiam adipiscantur omnia, tumores duros emollit, dolores mitigat, suppurationem promouet. Ad omnes tumores, quantum vis duros probatum est emplastrum calidum impositum, ex ramentis coriorum derafis, & floribus Chamæmeli simul in aqua coctis. Flores Chamæmeli mollitiem cuti conciliant lotione. Oleum Chamæmelinum tumores duros emollit, dissipat, dolores sedat. Clysteribus additur cum aqua florum Chamæmeli ad dolores intestinorum placandos, siue illi etiam sint ab utero, renibus, vesica: inprimis autem ad conuulsiones facit, relaxat enim tensa, emollitque dura: Ad infantum tormina vix præstantius inuenias, quam vel omentum vteruque minucim concisum, in

P 3

Chamæmelino oleo in sartagine, lento igne sensim frictum, calensque ventri inductum. Cum vini spiritu miscetur oleum chamæmelinum, quod vtiliter spasio frigido imponitur, superaddito calente panno. Meminit Camerarius olei ex floribus Chamæmeli stillatitii cærulei, cuius usus sit multus in variis affectibus internis, præsertim verò contra tormina, si eius guttæ aliquot ex calido iulculo sumantur. Quæ omnia potissimum de vulgari, & in segetibus spontaneo Chamæmelo intelligi vult Dodonæus: Nobile enim, & illud quod flore pleno est, facultate esse intensiore, quam Chamæmelo à Galeno attribuitur. Caliditate siquidem & siccitate qualitatem illam viuienti familiarem ac temperatam, quæ Chamæmelo à Galeno tribuitur, quamque ipsum habere quotidiana ostendit experientia, multum excedunt, utpote secundo ordine calida & sicca: cum autem & ipsa substantia tenuitatem habeat coniunctam digerendi ac rarefaciendi potentiam habent ampliore: molliendi verò, dolorisque sedandi, aut mitigandi, remissiore: proinde ubi magis, quam vulgaris usus Chamæmelum potest, incalfacere, aut rarefacere opus est, vtiliter adhiberi possunt, uti in balneis, quæ sudoris euocandi & rarefaciendæ cutis causa parantur, in quibus horum Chamæmelorum usus haud est negligendus: nam & cutim nimis adstrictam rariorem faciunt, sudorem euocant, bonumque corpori odorem conciliant. Author est Tabernaemontanus, ex floribus Chamæmeli hoc seculo etiam Chamæmelites vinum, extractum, conseruum, sale, & oleum chymicè arte extractum parari, de quibus lector ipsummet consulere poterit.

CHAMÆMELVM ODORATISSIMVM
repens flore simplici.

Descriptio.



Non, ut vulgare, recto assurgit caule, sed in terram proci- duos multos fundit radix coliculos, paullo breui- ores, foliis vesti- tos habitio- ribus, vegetio- ri amabili o- dore præditis: flores nò mul- tum absimiles Chamæmeli vulgaris flori- bus, radiatis albis flosculis vmbonem co- ronantibus.

Figura ex Fuchsiæ minùs placet quia proci- dui ramuli radiantes non picti.

Camer. in Epit. Matth. ol. pro Anthemide siue Chamæmilla ponit figuram Chamæmeli odora- tissimi præter sententiam Matthioli, quod Dios- coridis Anthemidem censet. Idem facit etiam in Hist. germ. ubi Chamæmelum & Camomillâ nominat, Chamillen / hermiugel / welsch oder Römisch Chamillen / Chamomillam Italicam vel Romanam.

Turn. part. 1. Primum Chamæmeli genus, &c.

Græcis vocatum, Angl. Camomyle / G. Römisch Camillen / Offic. Germaniæ Chamomilla Romana. Rara est in Germania: in Anglia verò tam frequēs, ut nò solum hortensis sit, verum etiam supra Londinum spontè exeat planitie Ri- chemontana & Brantfurdiana, omnium verò co- piosissime in Hunsleiana.

Lob. in Adu. Anthemis siue Leucanthemum odoratus, Romanorum, Belg. Romsche Camibloemen. Anthemis priore suauis multò quiddamque aromaticum Amaraci, aut Abrota- ni halans, multoque ad aspectum hilarior & cō- prior, & hac denique notione Romana dicta. Obs. p. 145. & Ic. Plant. p. 770. Anthemis seu Leucanthemis odorata, Parthenium Tragi.

Dod. gall. Chamæmelum Leucanthemum, & Chamæmelum album. Lar. de florib. & in fol. Chamæmelum odoratum, Chamæmelum nobile Tragi. Olim in Hist. gall. faciebat Antiquorum Chamæmelum, & præsertim Apulei bene olens, nunc mutat sententiam & figuram, quæ in postremis melior. Et sanè id esse, quod à Dioscoride, Galeno, aut aliis Veteribus in usu receptum fuit, non omnino videtur asserendum: verisimi- lius est ab ipsis fuisse præteritum & incognitum.

Camer. hort. Chamæmelum odoratum, Itali- cum, simplici flore. In Hist. Matthioli. germ. quoad figuram Chamæmelum siue Camomilla. In Epit. Anthemis Chamæmilla. Huic præter o- pinionem Matthioli adscribit vulgaris Anthemi- dis nomina, descriptionem Dioscoridis, itemque vires & facultates etiam ex Galeno, quæ huic nò omnino conueniunt.

Eundem errorem committit H. Lugdunensis, sequuta dubio procul cum Camerario Dodonæ- um gallicum. Confundit Historia Anthemi- dem Romanam, cum Anthemide Leucan- themo Matthioli, siue Chamæmelo vulgari, cuius iconem videtur pro Anthemide Romana, quam ex aduersariis Lobeli describit, ponere, miscetque nomina linguarum. Falsò præterea sibi persuadet Chamomillam Romanam esse Cha- mæmelum verum Dioscoridis, eique vires Anti- quorum malè adscribit. Gesu. hort. Chamæmelum Leucanthemum Dodonzi (gallici) Camomilla Romana alba quorundam, Chamæmel. odoratum uel nobile Tragi, Chamæmel. hortense. In appéd. Chamæmel. nobile, Parthenium nobile Tragi.

Trago, Parthenium, nobilis Chamomilla [quæ propriissime Parthenium, à Serapione Matrica- ria dicitur, inquit postea lib. 1. cap. 63.] Chamo- milla prior, verum ac nobile Parthenion Diosco- ridis, Perdicium & Muralium Celu, aliorum Leucanthe & Tannachum, Plinio lib. 21. cap. 21. teste. Parthenium, ut Dioscorides testatur, alii Amaracon, alii Anthemida, alii Leucanthemon, alii Chamæmelon, alii Chrysocatin, alii Melaba- chron, nonnulli Campestem florem, Romani Solis seculum, aliqui Millefolium, Hetrusci Cau- tam, Aphri Thamath appellant. Sed quod ad has appellationes attinet, tribuuntur & ipsæ aliis stirpibus, ut verissime dicas, multa nomina mul- torum errorum sapenmerò esse causas.

Tabern. Icon. & Hist. Chamæmelum Romanum inscribit, cognominarique Leucanthemum, & Chamæmelum nobile. Huius iconem non pro- bo, quia repentem non facit.

C. Bauhin. Phyt. Chamæmelum 1. siue nobile, seu odoratus. Gerard. Anglo Chamæmelum Ro- manum.

Chamæmelum repens odoratissimum, vocant Medici Chamæmelum Romanum, siue nobile, Offic.

Chama- mel. Lewi- carthamum Dod.

Chama- mel. odora- tum Ital. simplex, Camer. Error. Ca- mer.

Engl. lap- sui.

Partheni- um Tragi.

Locus & tempus.

Offic. Chamomillam Romanam; G. Römisch oder Edel Camomillen. Belg. Roomsche Camillen: Galli Camomille Romaine ou odorante: Hisp. Manzanilla, siue Manzanilla i. e. Mancianilla. Tabern. de odore aromaticorum pomorum Mancianorum; Angli Lamomyll.

Chamæmelum repens odoratissimum flore simplici habui Basileæ in horto, vt & Lugduni. Tubingæ vidi in horto D. Fuchsi. Montbelgar-di copiose florebat in horto meo adhuc Nouembri. Audio passim provenire in Nortmannia sponte. Abundat circa Tyberim non longè à Roma, & præsertim, vt Camerarius tradit, in villa Adriani Imperatoris. Restibili fertilitate & perenni radice sese instaurat & fundit propagationes proculcationis contèptices, eoque voluptatis ergo totum vertere annu in Angli-cis viretis artonderit: neglecta namque, pro- trita, & reiecta foelicius & vberius vernat, & luxuriat. Siquidem teste Lob. in Aduers. Angliæ vniuersæ haud alia fermè nota. Ruri miliari vno, aut altero ab vrbe Londino plurima, herbidis, aridis, vbi sponte orta. Galliz & Italiæ meri-dionalibus [tamen Romana dicta] rarior spon-tè. In Belgio & Northmannia ad Druydum vr-beulam multa.

Vnus

Angliæ vniuersæ, si Lobelio credimus, haud alia vlt recepta, quàm hæc. Syrupus ex huius floribus, succo, & vino albo conht, ad splenis & hydropis icterum optimus. Secus puluillos & thoros & ambulacra insternitur. Plura de huius viribus vide antè, ex Trago & Dodonæo.

CHAMÆMELVM REPENS

odoratissimum perenne flore
multiplici.

Descriptio



E Adè huiè odoris fragrantia quæ ià dicto nobili Chamæmelo, nec foliorum, aut crescendi mod^o multum dissimilis, verum flores, qui ibi simplices albi umbonem luteum possident, hic multiplici foliorum fœtura umbonem occupante luxuriant.

Lob. in Aduers. p. 43. Anglorum ni-

Synonyma
& Nomina
linguarum

ueum λευκὸν ἄνθος, flore multiplici. Figura non in totum placet.

Camer. hort. Chamæmelum odoratum Italicum flore pleno. In Epit. Matth. Chamæmelum flore multiplici, ita densè stipato, vt nonnunquam centrum luteum prorsus sit opertum. Ad Hist. Matth. germ. Chamæmelum flore pleno Gesselt Chamillen.

Dod. lat. in fol. Chamæmelum quoddam odoratum, foliola medium floris ambientia densissime multiplicans.

Tabern. Ic. & Hist. Chamæmelum Romanum flore multiplici. Hoc in Hist. licet secundo loco pingat, tamen pro tertio describit, ac insuper aliam eius speciem assignat, quam quarto loco recenset.

H. Lugd. p. 969. Anthemis, Leucanthemis niuea Anglorum flore multiplici. C. Bauh. phyt. Chamæmelū i. siue nobile flore multiplici. Gerard. Chamæmelum Anglicum flore multiplici, double flowered Lamomyll.

Abundat nunc in horto Ill. C. W. Montbelgar-di, vbi hyemem perfert: florens Iunio & Iulio. Circa Aureliam sponte nasci relatum est Camerario: instructionibus tantum hortis familiaris in Germania, primò delata ex Anglia, vbi multi flore pleno reperiuntur.

Eadem potest, quæ prior.

CHAMÆMELVM AVREVM

peregrinum capitulo
sine foliis.



C Anticulas proferit Descriptio
tenues, inualidos & in terra prostratos: folia quoque tenuia, vt prioris, sed candidiora, & paululum minor: pro flore, qui aliis omnibus Chamæmeli ac Cotilarū generibus medius, luteus est orbiculus; nudus & nullis circumambientibus foliolis cinctus; radix

similis. Et huius herba odorata quoque est, odore & facultate priori similis.

Chrysanthemos Anthemis dicta, vmbellis, aureis bullis, folii facie, odore & sapore Romanæ Chamomillæ est, aiunt Aduersaria: Sed magnitudine vincitur, nullisque foliolis radiatim cingitur eius umbo prominulus: usus non dispar.

Dod. gall. Chamæmelum Chrysanthemum, à Græcis χρυσάνθεμον appellatū, à Lat. Chamæmelū luteum, à Germ. Geelle Roomsche Camille / à Gall. Camomille jaune cultrine. Aliam huius speciem tradit, cui folia tribuit lutea in capitulorum circuitu, primo Chamæmelo Leucanthemō, odorato, albo, similem odore & formā, exceptis floribus omnino luteis. Imaginaria nobis videtur secunda hæc Chysanthemi species Dod. gallici, quandoquidem Lat. in folio eius nullam mentionem facit, & silentio præterit.

Lob. Aduers. p. 343. Ic. Plant. p. 446. Anthemis Chrysanthemos.

Tabern. Icon. (vbi titulus est transpositus) & Hist. Chamæmelum luteum.

H. Lugd. p. 969. Anthemis Chrysanthemos Dodonæi. Item: Anthemis Chrysanthemos Penæ & Lobelij. Frustra proponit duas icones vnius plantæ.

Synonyma

Gerardo Chamæmelum nudum odoratum, Sweete naked Cammomill. C. Bauhin. Phyt. Chamæmelum 6. siue luteum capitulo luteo foliis.

Locus.

Spontè non provenit, sed magna diligentia colitur, non solum in hortis Germaniæ, verum etiam in Brabantis & Anglicis.

CHAMÆMEI O AFFINE, BUPHTHALMUM italicum segetum altissimum.

Descriptio



TAm altè assurgit, ut segetes in Italia etiam superet, uti retulit D. Agerius Medicus Argentinensis, & in studio Botanico verisatissimus, à quo ramum habemus supereminè hirsutum, foliis alternè positis ex vnciali distantia vestitum, minutissimè ac profundè dissectis, quorum seg-

mentorum extremitates, velut pilos tenuitate sua representant. Summitas florem sustinet album, singularem, figura & facie Bellidis maioris.

Hanc eandem etiam vidi Pforzheimii mense Maio & Iulio cum flore.

Simplicibus autem caulibus duntaxat observavi, per quos *folia* Chamæmeli lutei quorundam, seu Buphthalmi Matthioli, asperiuscula: *flos* in fastigio vnicus, iam dicti Buphthalmi floris æqualis, radiato in orbem simplici foliorum candidorum agmine constans, umbilico luteo: differt à Cotula foetida, ne quis fallatur.

CHAMÆMELVM INODORVM SIVE
Cotula non foetida.

Descriptio



Radice est satis crassa, multis adnatis fibris capillata, haud alia foliorum florumque facie à Cotula foetida, solo narium iudicio discernenda, ut quæ in hac nullum, nedum foetidum odorem, deprehendat.

De hoc Fuchsius in H. cap. 52. loquitur in hunc

modum. Βύθηλας Græcè, Buphthalmum Latine, hodie Oculus bouis aut vaccæ, & Cotula non foetida herbaris vocatur: Germ. Rinsang oder Bhuang: Gall. Oeil de bœuf, pisse en liti: ou Camomille sauvage. Buphthalmum autem non alia ratione dixerunt Veteres, quàm quòd eius flores oculi imitentur formam, & boum potissimum oculis similes sint.

Cotulam non foetidam esse verum Buphthalmum rectè contra Fuchii opinionem negat Dodonæus, tam in Hist. gallica, quàm latina in folio. Tertia species Chamæmeli, Cotula non foetida appellatur (ait in gall.) Camomilla fatua, & Camomilla inodora, Græcis quibusdam Βύδαμος, cum tamen verum Buphthalmum non sit, quare melius Cotulam non foetidam inscripsi, & Cotulam albam cognominavi.

Sunt aliqui (inquit Cord. in Dioscor. lib. 3. c. 156.) qui Buphthalmum & Chrysanthemon eandem esse herbam credant, quibus non vehementer repugnabo. Illud tamen nosse oportet, esse plures Buphthalmi species.

Tragus hanc tradit pro Chamomilla quarta, quam, quia odore proflus destituitur, à reliquis quasi degenerans, Chamomillam fatuam, inspidam, non odoratam, & Cotulam non foetidam vocari posse concedit. Hæc ipsi ea videretur esse, quam Dioscorides Chrysanthemon appellat, cuius plura alia nomina eodem loco vide.

Lob. in Aduers. Inodora Cotula, minor Parthenii species inter segetes, odore imbecillo, aut nullo. Tabern. Icon. & Hist. Corula. Iconem Cotulæ non foetidæ Tabernamontani, cur Gerardus ponat pro foetida nescimus.

H. Lugd. p. 1. c. 348. Cotula non foetida, Buphthalmum Fuchsi. C. Bauh. Phyt. Chamæmelum 4. siue inodorum, quod solo odore à priori (nobili) discerni posse putat.

Lugduni & Montpelii Chamæmelum inodorum observavi, & Basileæ pulcherrimè florens mense Octobri. Montbelgardi etiam abundat. Fuchsios cum Tubingæ essem Buphthalmum adhuc asserbat: Genæ florens Maio à me observatum in arvis, sapore amaro est.

Cotulam inodoram moderatè calidam esse, & ad Chamæmeli vulgaris temperamentum quantenus accedere legimus in Hist. Lugdunensi, quòd tamen arduum est & difficile admodum credere, iudicent lectores.

CHAMÆMELVM FOETIDVM, SIVE
Cotula foetida.

CAP. XIV.

Si fecundum nacta solum fuerit foetida officinarum Cotula, parum abest quin ad duos cubitos se porrigat, ramis multis à radice digitali crassitudine alis crebris concavis: in quibus *folia* Chamæmeli, tenuiter incisa, odore abominabili: *flores* Chamæmeli vulgaris, albi, radiati, bullam ambiunt luteam in tuberculum rotundum paulatim surgentem.

Hæc facile Phni Buphthalmos esse putaretur, inquit Ruellius, quam rustici Bouis oculum, & othine Cotulam ab odore foetidam appellant. Siquidem similem boum oculis florem habet, folia Foeniculi, fruticosa: nec aliter florem explicat, quæ satis Cotulæ cognomento foetidæ congruunt. Hallucinantur, qui Cotulam vulgò dictam, Parthenium esse putant, cum folium ei Foeniculi,

Contra Foetidium.

Chamomilla 4. Tragi.

Gerard. 1101.


Locus & tempus.

Temperat.

Descriptio

Fœniculi, Parthenio Coriandri tribuatur. Cotulam Succiones *Canefonem* vocant, quali Canulam, quod herba in dilutum virorem canescat, apiariis optime cognitam.

Tragus lib. i. cap. 47. de Chamomillis secundo loco Cotulam foetidam describit, eamque inter nomina,



Chamomillam alteram, Corulam, Cautam, vel Chamomillam foetidum, Cynobotanem, Cynanthemin, Germ. Brottendill, & hundsdyll vocat, si-ri-que posse ait, ut Thalictrum sit Dioscoridis: Neque enim esse Partheniū, ut multi putarint.

Cordus in Diosc. quam Pharmacopole Cotulā fo-

etidam vocant, Bupthalmi speciem minorem esse concludit. Sic & Corn. Bupthalmum quoque nominat.

Brunfels. Tom. i. Cortulam foetidam, quartam speciem Parthenii dicit, suspicaturque eam esse, quam Leoniceus Cautā, Cortā & Cortā vocauit.

Camomilla
foetida

A Dod. gall. recensetur inter Camomillas silvestres, & sic Chamemeli. silu. species secunda, vocaturque latine & officinis Cotula foetida, aliis Caura & Camomilla foetida, græcè *αυραβόχης* & *αυροβοτανή*, h. e. Camomilla & herba canis, germ. frorendill / hundsdill, hundsd-blum / & wilde Chamill, Brab. paddebloemen / & stinckende oder wild Camille. Idem in Hist. Flor. & lat. in fol. Cotulam albam inscribit, ac inter silvestria Chamemela recenset, foetidumque cognominat, galliceque *Espargourte* vocat, additque Fuchsiū voluisse esse Parthenium, quam opinionem improbat.

Matth. her.

Quod Matthiolo Cotula foetida incognita fuerit, id probè demonstrat, quod eam descripserit, neque depinxerit, dicens tantummodò, Contendunt Brassavolus & Fuchsius eam omnino plantam verum referre Parthenium, quam herbarii vulgò Cotulam foetidam appellant. Sed quàm isti magno in errore versantur, iudicent ii qui probè sciunt Cotulam foetidam folio esse Fœniculi, aut Anthemidis potiùs, quàm Coriandri: neque sapore usque ad eò amaro, ut in Parthenio requiritur. Et hæc non sua sed Ruellii verba sunt.

Cotula

foetida

Nar.

Matth. her.

Lob. in Adu. p. 335. titulo de Matricaria, ait Cotulam vulgi magis quadrare Parthenio Plinii & Pauli, quàm herbariorum Matricariam, quamvis si vltum odoremque respicias, quibus uirginis morbis Matricis opitulatur, utraque possit Parthenium dici. Idem postea titulo de Parthenio p. 334. ait. Parthenium, vel virginea, est Cotula foetida, non Matricaria: illos præterea reprehendit & potissimum Matthiolum, qui hæc Parthenium negarint.

Gesn. quoque de hortis Parthenium interpretatur. Tom. III.

tatur, quam alii Cotulam foetidam vocant, & ipsi in cat. pl. Thalictrum videtur.

H. Lugd. 1345. Cotula foetida Dodonæi. C. Bauh. phyt. Chamæmelum 5. siue foetidum. Camer. apud Matth. in Hist. germ. Chamæmelum à D. Thoma Penæo missum, in hortis valde se propagans, paulò tenuius vulgari & odore multò gratius, in vulgare tamen degenerans.

Basileæ Chamæmelum foetidum, quæ itur Moutets vidi adhuc florens mense Octobri, item intra & extra urbem, intra portam cineream & lapideam ad fluvium Birse / & quæ itur Brenschach; Genevæ mense Maio. Lugduni & & Mörbelgardi passim abundè provenit, etiam in horto E. C. Wirtembergici.

Locus &
tempus

Odor huius capiti obest, & si crebriò utaris, Vires phrenesim inducere creditur, teste Brunfelsio. Sed decoctio eius, auctore Trago, non aliter, quàm Castoreum, contra præfocationem vteri, infessu, fomentationibus, ac odoratu saluberrima est. Cotula foetida tusa, & emplastri instar vulneribus imposita, illa conglutinat, ac persanat. Sapore est acutissimo, inquit Matth. in post. commentariis, & exulceranti vi prædito. Calidam autem siccamque esse, odor saporque demonstrant. Apiariis, ut prodidit Ruellius, optime cognita, qui hac suas fricant manus, vel secū habentes gestant, cum alucaria castrà adfuerint, sequentiū imperus sunt cohibedi, illico furore huius sensu edomito mitescunt. Nā etsi flos sit pulcherrimus ita ut apes amœnitate huius illectæ eminus aduolent, huic tamen non insident, sed herbam totam perosæ diffugiunt, vel certè gustato flore protinus fastidiosæ transuolant. Nam apiculæ muscæque, quæ convenientes ramis huius cohaeserunt, emoriuntur, argumento, quod hunc fruticem demortuis apibus aut muscis inuenies semper onustum, ita apibus aduersatur.

Temper.

CHAMÆMELVM FOETIDVM marinum.



HAVD multum dissimilis habitus à Chamæmelo horrensi. Verum non modò caules ramique striati, subrubentes, lanugine albâ sunt vestiti, sed etiam folia, eaque minutius, ut videretur, dissecta, & prope modò cædicatâ: flores æquales, stellatis candidisque, in ambi-

Descriptio

tu radiatis foliolis umbilicem luteum ambientibus.

Attulit gener Cherlerus in maritimis Narbonensium collectum, ubi ei occurrit non ita frequens. Figura facta est ad plantam siccam.

Q

CHAMÆMELVM MARINVM.

CAP. XV.

Descriptio



multis fibris donatæ.

Lob. in Adu. & Icon. Plant. p. 774. Corula siue Parthenium marinum minimum.

Floret Aprili, Augusto, & Septembri.

Complures humi spargit *coliculos*, palmares aut dodrantes simplices, per quos ordine ascendunt *folia*, quàm Chamæmeli vulgaris latiora, breuiora, crassiora, nec aded tenuiter incisa, amara & subacria, odore ferè Chamæmeli: *flores* singulis geniculis insident singuli, Chamæmeli similes, candidi, radiati, sed maiores, eundem ferè odorem halantes: *radices* satis profundæ, nigricantes,

Chrysanthemo vocata nonnulli putant. Est hæc dicta ruribus nostris Camomilla crocea, & est Buphthalmos Plinii & Dioscoridis, cuius picturæ respondet. Suspicio eundem eodem libro cap. 101. per Corulam suam, quam inibi tradit, maiorem, intelligere quoque Chamæmelum hoc aureum quorundam, quamvis in descriptione multa habeat, quæ non conueniunt. Verùm is mos Ruellii, vt cōcineret suas descriptiones antiquorum verbis, & frustra pro suis vendiderit. Si eandem nobiscū intelligit plantam, vt eius verba demonstrare videntur, cur non monuit eā de plantā iam suprà dictā intelligendā esse, & sic se bis eandem tradere?

Est Buphthalmos (inquit Trag. qui præsentem nostram plantam hoc titulo depingit & describit) tota sua substantia vulgari Chamomillæ cōsimilis, nisi quod radices, caules, folia & flores habet crassiores, proceriores, latiores. Huius floribus vtuntur mulierculæ ad linimenta sua, quibus lectos illinunt, ac ided patriâ voce Streich oder sterckblum vocare solent. Quam verò in Dioscoride nomenclaturā habeat, facillè intelliget qui flores, caulem, folia, & radicem pressius considerauerit, cūque Buphthalmo Dioscor. contulerit. Est itaque hæc planta non Eranthemum Hippocratis, vt multi putant, sed potius Buphthalmus verus Dioscoridis, quem ille Balsamenam, Hæmorghan, Mercurii genituram, Aphthitis semen, aut Mnesitheū, Cappacoranā, & Narat, nec non Cachlan cognominari tradit, & Serapio cap. 158. Bichar vocat. Chamæmelū hoc Tragus antea hoc lib. 1. cap. 45. Bellidem maiorem luteam vocauit. Item postea 118. Chamomillam luteam.

Buphthalmos Trag.

CHAMÆMELVM CHRYSANTHEMVM quorundam.

CAP. XVI.

Descriptio



superent, odore Chamæmeli: in singulorum ramorum fastigio *flos* vnicus, Chrysanthemi, totus luteus, siue quæ in ambiū sunt folia species, siue discus qui rigidulis apicibus asper est: *calyx* porro cui insidet, incanus, Chrysanthemi instar squamosus est.

De Chamæmelo Chrysanthemo ita differit Ruell. lib. 3. cap. 69. Buphthalmos, quā Romani Boariam appellant, eandem esse Dioscoridi cum

Caulibus & maioribus, tenuibus & incanā lanugine obductis, pluribus propter terram rubentibus, ex lignosa *radice* obliquè exortis ramosis. *folia* adnascuntur itidem lanuginosa. Millefolii, denticulata, pinnatæque, multò minora, quippe quæ non temerè vnciā longitudine

A Fuchio Chamæmelon aureum inscribitur, ac alterū Anthemidis genus statuitur, quoddioscorides à luteis per ambitum florum foliis, quibus constat, haud dubiè Chamæmelon Chrysanthemon nominari, & Herba S. Mariæ vulgò nūcupatū sit, Germ. Goldblumen & geel Camillen/Gall. Camomille saune.

Chamæmelon aureum Fuchii

De Chrysanthemo seu Caltha Cordus in Dioscor. lib. 4. c. 58. differit, vbi eam à Germ. Goldblum/ & à Lat. Buphthalmos appellari tradit.

Camomillam suam siluestrem quattam Dodon. Gall. Corulam luteam inscribit, quam ait quosdam Chamæmeli (Dioscoridis) secundam speciem existimare, ac vocare Chrysanthemum, verum illos falli. Quinam verò hi sint in Hist. de florib. & lat. in fol. indicat, dicens. Corulam; siue luteam Fuchius Anthemidis speciem, & Chamæmelum Chrysanthemum facit: folio tamen parum, odore nullatenus, Anthemidem siue Chamæmelum Leucanthemum refert. Matthiolus pro legitimo Buphthalmo depinxisse videri: desideratur tamen folium Marathocides, quod Buphthalmo esse Dioscorides restatur. Quare inter Corulas & siluestria Chamæmela potius reponendam duxi, quàm alterutrum temerè asserere.

Camomilla silv.

Gesn. de hortis Buphthalmum veram nominat, flore Bellidis maioris, sed toto semine peramaro. Dodonæum carpit (& meritò mea quiddem sententia) quodd Buphthalmum faciat herbā illam, quā pro Elleboro nigro quidam vtuntur. Is verò Chrysanthemum Dioscoridis & Buphthalmum eandem esse, meo iudicio non absque errore statuit.

Cordus & Dodonæus.

Sed & Matthiol. cum Amato Buphthalmum vocat. Figura eius in prior. comm. non placet. In post. nonnihil eam mutauit. Quam verò Camer.

Matth. not.

in

In Epit. & Hist. germ. eiusdem posuit, Buphtalmo Matthioli non respondet. Videtur Buphtalmum tenuifolium, folio ferè Millefolii. Ait autem is. Variæ exhibentur nomine Buphtalmi vulgaris plantæ, ut Cotula à Fuchio, Helleborine flore luteo à Dodonæo: Buphtalmum vulgare Croatæ vocant Herbam serpentis, Græci & Latini Buphtalmum, Oculum bouis, Itali *occhio de bue*, Bohemi *wolowce*, aut *Xwietec*, Galli *Oeil de bœuf*, Arabes, *Bihar*.

Lob. in Adu. Buphtalmus, Oculus bouis Millefolii folio, Chrysanthemum Fuchii, Aster atticus Cordi. In Icon. Plant. p. 772. Buphtalmus, Oculus bouis.

Error quorundam.

Tabern. Icon. & Hist. Buphtalmum, de quo ait. Errant qui Buphtalmum hoc, Chamæmelum Chrysanthemum faciunt. Buphtalmus dicitur Dioscoridi Incorruptibilis genitura [*γενος ἀφθαρτον*] Boanthemum, Mercurii genitura (*γενος ἑρμου*) Cappacorania, Cachlas & Boaria (*ἀναστροφὴ*) Herbarius Buphtalmum Chrysanthemum, Oculus vaccæ, Oculus bubulus, Cotula lutea, & Herba crispula, Nicolao Myrepso Crespula & Crespulus, Serapioni Bihar, Auicennæ Bithar, & teste Bellunensi, Chiaosegem. Peonasar, & Peonafari, Africanis Narrat; Hispanis *Ojo de Buey* & *Ben Mequeres Amarillos*, Hung. *Sforzóm* / Belgis *Strickblóm* / Germ. etiam *Steinblum*, Viennensibus Rhizotomis mulierculis *gelb fassblumen*.

Gerard. Buphtalmum album. Cur pro Buphtalmo albo proponat iconem Buphtalmi Tabernamontani flore luteo, ignoro, & fortassis ipsemet.

Turn. Chamæmeli alterum genus, Chrysanthemum dictum, Angl. *yellow Camomill*.

H. Lugd. p. 362. Buphtalmum Matthioli.

Clus. Pann. p. 569. Buphtalmum vulgare: Hist. post. p. 332. Buphtalmum vulgare Chrysanthemum congener.

C. Bauh. phyt. Buphtalmum s. siue Dioscoridis.

Chrysanthemum Cæsalp.

Cæsalp. lib. 12. cap. 27. Chrysanthemum in rudibus nascitur, similis Cotulæ tum foliis, tum caulibus, hiscutionibus tamen: flos secundum totum luteus est, ac sine odore: quidam pro Buphtalmo accipiunt.

Locus & Tempus.

Chamæmelum hoc Chrysanthemum quorundam primò vidi Tubingæ, postea Basileæ extra portam lapideam mense Iulio & Augusto florentem; Montpelii prope aquas mortuas, ut vocant; Patavii in hortis. Montbelgardi copiosè habeo in horto E. C. florens Iunio, Iulio, Augusto, & adhuc Nouembri, hiemem perferens, diutius durans, ac se disseminans. Apud Belgas hortensis, authore Dodonæo. In Anglia, quod meminit Turnerus, nusquam vidit. Germaniæ & Angliæ hortis, inquit Lobelius, inquilina. Romano autem agro, Hetrusco & Gallo-provinciæ prope Olbiam ad mare Hieres vocatum, spontè secus vias & margines satiorum: flores Æstate, etiamque in usque brumam Londini vegetos vidi in horto Morgani, & Bristolæ. Clusius frequentissimam esse prodidit per vniuersam Pannoniā, etiam illam, quæ ultra Drauum fluium est, atque tota Austria in agris, & secundum vias passim Moguntiaci agro, in Moravia, Bohemia, & Norimbergensi agro. In aruis inter Auenæ & Triticici segetes, peculiare earundem vitium nascitur, inquit Tragus. Solent autem mulierculæ illud cum in flore optimo fuerit, Iunio mense colligere.


Fom. III;

gere, siccare, & ad usus quotidianos recondere.

Vsus est hac herba Tragus in vino decocta aduersus inueteratam fellis suffusionem, potu illam decoctionem calidam, hoc morbo laborantibus, tanquam concoquens & discutiens remedium exhibuit, tertioque deprehendit eam extenuandi, discutiendique & educendi citra dolorem & periculum vi præditam. Habent flores omnes facultates odoris Chamomillæ, possuntque loco florum Absinthii usurpari, Croatarum mulieres, ut refert Clusius, Buphtalmum vulgare tritum vtiliter vulneribus imponi asserunt. Floribus eius vtuntur et mulierculæ ad linimenta sua, quibus lectos illinunt quæ ratione Croco parantur. Et quantum nobis constat, hodie florum huius nullus est usus in coronamentis, ut narrat Ruellius, qui ei magno errore Buphtalmi vires adscripsit.

Vires & Vfus.

CHAMÆMELVM PURPUREVM.



Diuersum est à dictis Chamæmelum purpureum, quod hic depictum est, foliis, ramis, capitulis grandius & amplius reliquis Chamæmeli generibus, sed foliorum quæ capitula ambiunt orbe purpureo decorum, flos priusquam dehiscat, corticoso compactilique inuolucro, propemodum, tam crasso &

Descriptio

euidente quàm in Cyano, coërcetur. In asperis locis prouenit.

Rara hæc est planta & paucissimis nota. Apud H. Lugd. Anthemis Eranchemos p. 971. inscribitur, ac Chamæmeli Eranchemi nomine describitur. C. Bauh. phyt. Adonidem secundam, siue flore maiore cognominat.

BUPHTALMVM ANTIQVIS.

C. A. P. XVII.

VT de Buphtalmo Veterum agamus, hoc loco requiritur. Siquidem ex dictis nonnullæ pro vero Buphtalmo habentur, nec pauca ex posthac dicendis pro eo à quamplurimis creduntur & assumuntur.

Bēβαλλος igitur [quam quidam Chachlan vocant, authore Dioscoride] teneros emittit *cauliculus*, & quodammodò tenues; *Folia* Fœniculi; *Flores* melinos, maiores, quàm Anthemidis, oculorum similitudine: vnde & herba nomen traxit. In campetribus & circa oppida nascitur. Huius flores triticum cerato ædemata duritiaque discutunt. Aiunt verò, post exitum à balneo epotâ, regio morbo correptis ad tempus aliquod colorem gratiorem facere.

Q. 2

Eadem Plinius lib. 25. cap. 8. habet, nisi quod caulibus fruticosam dicat, ut etiam in quibusdam Dioscoridis exemplaribus legatur, & pro cerato ceram legat.

Nec multum à Dioscoridis historia euariat Galenus. Bupthamon, inquit, ita nominatum est à floribus, qui, iuxta figuram, bouis oculo similes esse videntur. Nam colore Anthemidis floribus simillimi sunt. Sed multo maiores & acriores, & propterea, etiam maiore discutiendi vi præditi, eo utique, ut etiam duritias sanent, ad ceratum ammixti.

*Nomen
mutha.*

Bupthalamon sunt qui Cachlan, qui Balsaminen, siue Balsaminā, qui Menelicheon, siue Menelicheum vocent. Prophetæ Hæmorrham, Magi Mercurii genituram, siue incorruptibilem genituram, aut semen incorruptibile: Romani Capacoraniam nominant, & Aphri Narat. Bupthalmi quidem nomen sibi à maioris quadripedis oculo inuenit, bouisque oculis dici voluit. Siquidem particula in græcis auger, Habetque ea Gens penè infinita, quæ coniuncta sibi ea particula augentur, & in suo genere maiore amplitud. sunt: qua ratione & Bupthalmos non à bouis oculo simpliciter, ut quidam credunt, sed à magnitudine ambitus, quo maiorem oculum refert, nominatur.

Æquiuoca

Chrysocome

*Guiland.
nor.*

De vero Bupthalamo variae sunt recentiorum Herbariorum sententiae. Et quia formā videtur & facultatibus conuenire cum Chrysocome, hoc esse putarunt nonnulli. Et hinc factum, quod Guilandinus in Theone scripserit, Dioscoridem non raro in diuersis locis de eisdem tractasse placis, ignorantemne, an abundè diligentem, se nescire. Exemplum esse Bupthalamon & Chrysanthemon. At nescit ipse Bupthalamon & Chrysanthemon diuersas esse herbas.

*Chama-
melum sa-
uarum.*

*Chama-
mel sativum.*

Multi hodiè sub Corula nō foetida, siue Chamæmelo inodoro Bupthalamum delineant. Sed cur horum sententiam comprobem contra Fuchium cum Matthiolo non habeo.

Corulam Brunfelsius in suis palinodiis Bupthalamum à quibusdam credi admonuit, etiam si Bupthalmi historia à Chamæmeli foetidi delineatione multum discrepet, ut diligenter conferenti, facile patebit.

*Chama-
mel. Chry-
santhemum
quorundam*

Bupthalamum tenuifolium, folio Millefolii ferè.

Chrysanthemum segetum.

Bupthalamum Dodonæi, quibusdam

Elleborus tenuifolius Belli maior.

Caltha.

Fuchsius, Tragus, Gesn. Matth. & alii nonnulli verum Bupthalamum contendunt, quam Chamæmelum Chrysanthemum quorundam antè inscripserunt.

Pro Bupthalamo vero Tabern. & Gerardus exhibent Bupthalamum tenuifolium, folio Millefolii ferè, de quo mox dicemus.

Ostendimus Chrysanthemum segetum à Bupthalamo differe, licet aliter senserint Gesnerus, & alii.

Bupthalamum verum à Dioscoride descriptum, multi censent herbam illam, quæ bupthalinus Dodonæo, & quibusdam Elleborus tenuifolius dicitur. Verum errant.

Aliqui teste Matthiolo, putant Bellidem maiorem, esse legitimum bupthalamum, sed non est.

Columnella per bupthalamum Calendulam innuere videtur, ubi fauentia lumina Calthæ canit. Lob. in Adu.

Bupthalamum tandem reperitur inter spuria nomina, quæ apud Dioscoridem Aizoo maiori attribuantur.

Ad bupthalmi genera refert Clusius Chrysanthemum Valentinum, quod quidam Achilleæ speciem esse statuunt.

*Sedumma-
ius, siue di-
xum ma-
ius.*

BUPHTHALMVM TENUIFOLIUM folio Millefolii ferè.

CAP. XVII.



Hoc Bupthalmi genus tomentosum habet caules, & frequentibus satis ramis multifidos, per quos folia nascuntur ad Millefolii tomentosi folia accedentia, hirsuta, pari dispositione & diuisurâ ferè, verum nonnihil latio-ri: st. singulis ramis in cacumine hæret vnicus magnus, radiatis in ambitu foliis lon-

giusculis luteis coronatus, disco concolori, calyce folioso, lanuginoso, canescente. Foliorum siccorum sapor nullus notatu dignus.

De hoc apud H. Lugd. p. 862. hæc habentur. Dalechampius Bupthalamum verum depinxit ad Rhodani ripam prope fossas Marianas proveniens, radice breui, tenui, candidâ, capillatâ: caule palmum longo, tereti, gracili, subrubro: foliis Faniculi per ramos à caule prodeuntes sparsis: flore Anthemidis, prorsus luteo, media sui parte veluti exsculpto & cauo, oculi figurâ. Idem videtur esse Chrysanthemum Valentinum Clusii. Lobelius etiam Bupthalamum tenuifolium Narbonense vbeat. Penâ idem Bupthalamum exhibere videtur, quod ex Dalechampsio pictum damus folio & facie Corulæ foetidæ, &c. *Hæc Hist. Lugdunensis.* Ego facile crediderim Dalechampsii Bupthalamum & Lobelii tenuifolium Narbonense in Obs. & Penæ alterum in Aduers. eandem esse plantam, idem tamen Chrysanthemum Valentinum Clusii dicere non velim, quia non radiati flores: non comperio Compilatores H. Lugdunensis dicere Matthioli Chrysanthemum idem esse cum Chrysanthemo Valentino Clusii.

Camer. apud Matth. in Hist. germ. lib. 3. cap. 107. bupthalamum aureo flore, Rindsaug. Item Epit. p. 651. Bupthalamum, & pag. 652. bupthalamum flore purpurascens.

Tabern. Icon. & Histor. bupthalamum verum Rindsaug oder Streichblum / bupthalamum tertium folio quodammodo Artemisiæ & Faniculi, sed multo tenuiore, colore ex luteo pallido, odoris non ingrati. In Hetruria sponte provenit unde mihi delatum. Item in Hist. bupthalmi quartum genus, folio Corulæ non foetidæ, proveniens in provincia Gallia, & Gallia Narbonensi, non longè à mari: bupthalamum Narbonense aut maximum maius, Gross Meer streichblum. Item: bupthalmi quintum genus, quod etiam provenit in Provincia & Gallia Narbonensi folio Corulæ foetidæ: Bupthalmum Narbonense aut marinum minus & tenuifolium, Klein Meer streichblum. Egregia comparatio Tabernamontani sui Bupthalmi cum Anthemisia & Fo-

Bupthalamum Gerani.

Camer. icones duæ.

Tab. nat.

Tab. 100. & Feniculo, foliis multum dissidentibus. Est mihi Buphthalmum delatum ex Hetruria, ac etiam ex Gallia Narbonensi, in quibus discrimen non animaduertitur; ipsemet etiam Tabern. non mihi videtur certas demonstrare notas, quibus distinguere possint ab inuicem eius tria Buphthalamia, si reuera diuersa. Hoc considerandum Lobelium suum Buphthalmum eo penè modo describere, & ex eo Camerarium in Hist. Math. germanica, quo Tabern. suum Buphthalmum quintum. Gerard. Angl. vnica figura contentus, cum Buphthalmum verum interibat, ac Anglicè *The right oxe eye* nominat.

C. Bauh. phyt. Buphthalmum 6. siue caule & flore purpurascens. Er: Buphthalmum 8. siue Cotula folio. Meminit Gesnerus de hort. 251. alterius speciei, flore partim candido, partim luteo nulloque alio discrimine: hoc sanè visu elegantissimum. Cor Frater hæc duo Buphthalamia, separare mihi vna planta videtur.

Buphthalmum Narbonense
vnde Gesnerus
de Hort. 251
meminit Clusium

Huius meminit Clusius, cum dicit. Chrysanthemum Valentinum plurimum à Buphthalmo Narbonensis prouinciae, mihi sanè non ignoto, differt: nam id obseruare & eruere memini apud oppidum illud Aquæ mortuæ nuncupatum, nonnulli fossam Marianam (quam apud nescio) appellant. Habet autem id Buphthalmum radiatos flores, Anthemidi vulgari similes, maiores, medium orbem lateum cingentibus foliis luteis, plerumque subrus nonnihil purpurascens, aut subrubentibus.

Siccam habeo plantam à Valerando nomine Buphthalmi. Gener. Cherlerus attulit ex Gallia Narbonensi, vnde & D. Rud. Salzmännus collectam referuauit, mihiq; comunicauit. Sed & D. Agerius ea me donauit, quam propè Pisam in Italia ad ripam Arni, ubi abundare ait, collectam affirmavit. Secus Araucorum lucos Olbia in in Galloprovincia maritima, à Lobelio reperta, & in Agro Romano.

BUPHTHALMO TENNIFOLIO
simile Chrysanthemum Valentinum Clusii.

CAP. XIX.

Descriptio



Saluam cient, & acidula sunt: flos in singulis
Tom. III.

Vnico plerumque assurgit Chrysanthemum Valentinum Clusii, caule, pedali, raro ampliore, ramoso: foliis secundum radicem numerosis, deinde temere & sine ordine per caulem sparsis, multifidis, Millefolii stratiotis foliis penè similibus, lanuginosis & incanis, quæ degustata

ramulis vnicus, luteus, vel potius auri splendore fulgens, quique resiccatus, multis annis narium colorem etiam retinet, medio Anthemidis disco sine umbilico maior, & sine radiatis in ambitu nascentibus foliolis, odoris non iniucundi: radix vnica, candicans, firma, crassiuscula.

Chrysanthemum vocabant Valentinæ virbis peritiores, longè tamen à Dioscoridis *χρυσάνθημον* diuersum, & ad Buphthalmi genera, Clusii iudicio, potius referendum, nisi quis *χρυσάνθημον* specie esse malit. Matthioli tamen Chrysanthemum esse nego, inquit Clusius, licet id sentiat, qui Historiam Lugduni impressam, concinnauit, sed ipsum valde falli deprehender, quisquis diligenter utriusque Historiam conculerit. Ceterum hæc plantæ, ne quis fallatur, plurimum à Buphthalmo Narbonensis Prouinciæ differt. Hæc Clusius, qui Compilatori H. Lugdunensis detrahit. Is enim non sentit Chrysanthemum Valentinum idem esse cum Matthioli Chrysanthemo, vt voluit Clusius, sed idem cum Buphthalmo Dalechampi.

Synonyma

Clus. re-
darguunt

Lob. in Obs. p. 445. Buphthalmum tenuifolium Narbonense, strigosis Galloprovinciæ & Narbonensis Galliæ prouenit, floribus radiatis, luteis, Buphthalmi, & folus Anthemidis vulgaris siue Cotulæ non fortidæ, minutis, nonnihil incanis: radix palmum æquat: cauliculi pedales, cuiusmodi etiam memini apud Franciscum Peninum & Valerandum Doureum, erutas agro Monspeliiaco. Hæc Lobelius de Buphthalmo tenuifolio Narbonensi, Chrysanthemo [Ic. Plant. p. 773.] Valeriano Clusii, Non docet autè an Buphthalmum suum tenuifoliū diuersū sit ab eo quod in Aduersariis Buphthalmum alterum vocauit: si diuersas plantas existimat, qua in re differant, non demonstrat: præterea an suū Buphthalmos quod flores habet radiatos, vt ipse testatur, ritè adapret figuram Clusii, videant alii: dicit enim Clusius sine radiatis in ambitu foliolis esse Chrysanthemum Valentinum. Valerandi Buphthalmum nobis idem cum præcedenti.

Gerardo dicitur Chrysanthemum Valentinum Corue Marigold of Valencia. C. Bauh. phyt. Buphthalmum 7. siue foliis Millefolii lanuginosis.

Valentino regno ad aruorum margines, iuxta semitas repertum eruebat Clusius, nusquam alibi ipsi obseruatum, florebat isthic Martio:

FLOS ADONIS VVLGO, ALIIS
Eranthemum.

CAP. XX.

EX radice digito minimo tenuiore, alba, recta, sapore herbaceo & nonnihil nauseoso, caules surgunt pluribus alis donati, striati, rubulo angusto perforati: folia Nigellæ citrinæ, glabra, subacri gustu: flores in extremis ramulis Chamæmeli, ex foliis octo, aut paucioribus, latioribus, coccineis vel pallidis seu luteis, compositi, quibus circumposita folia quina, extroisum virentia, intus rubentia: apices in medio frequentes atropurpurei capitulum oblongum & acuminatum concolor ambiunt: semina tanquam in racemulum congesta, densè facta, acuminata.

Descriptio

Duas icones emptitias ponimus, quæ

Q;

iam sculptæ non quodd discrimen demonstrant, licet discrimina quædam sint, quorum aliqua tertia figura demonstrat.

Rectè, meo quidem iudicio, apud Cordum in Hist. annotavit Gesnerus, duplicè eius Anemone tenuifoliam, quam agrestem & Papaueri non dissimilem dicit, non esse Anemonè, sed Chamæmalum Eranthemum Dioscoridis: cuius semina ad frangendū calculum efficacissima sint. Has Turingos vocare reus felo auge (Oculum Demonis quasi dicas) propter colorem florū, prunæ non ablimilem, quasque ardentem. Acrimoniam nullam habere, quæ propria sit Anemone. Cæterum, quod Cordus Anemonè magnā habere similitudinem cum Papauere tradit, hactenus non animaduerti. Figura autem quæ apposita Cordo reicienda calumnianaque, pessimè siquidem picta, diuersos habens flores, ut iam dicemus aduersus Tragum.

Tragus igitur, qui lib. 1. capite 38. hanc Anemo-

nem tertiā (das dritt vnd fleinst flapper Rößlin) vocat fulup flore. Item cap. 40. feld oder

ader Rößlin/ Anemonem agrestem, huic assignat flosculos quatuor foliolis distinctos, minui colore tinctos, aliquando candidos, vocans Aculeatam Plinii. Quamuis autem dicat suam Anemonem flosculum habere è quatuor foliolis compositum, nihilominus tamen in icone flores duos pingit, è pluribus foliolis constantes & capitulum quale in Chamæmelo Eranthemum multis dicto: Flores verò in eadem Icone multum diuersum quatuor foliolis, videntur alterius plantæ, ac accedere ad folia Melanthii in Germania spontanei.

Malam Tragi figuram exhibet quoque Lonicerus, sub nomine Aculeatæ Plinii, quam vocat Germ. feld Rößlin.

Cæsalp. lib. 14. cap. 6. Quædam (ex Ranunculis) in aruis nascens inter segetes, floribus rubicundis, quam quidam inter Anemonas pingunt: alii Chamæmelum Eranthemum putant, ipse Ranunculis adscribendum censeo, fortè quem Dioscorides purpureum vocauit.

Meminit huius primū Marth. in post. cōm. Ital. & Lat. cum magnis fig. dicens. Adonidem Virgilii quorundam, sunt qui censeant esse purpuream Dioscoridis Anthemidem, sed reuera hallucinantur, quod huiusce Anthemidis genus, Dioscoride teste, flores proferat in medio aureos & forinsecus orbiculato-ambitu purpureos, à quibus maxime differunt vulgaris Adonidis flores, qui Papauerorum siluestrium flores æmulantur. Eadem in Epit. & Hist. germ. cum addit. Camerarii, qui pro Adonidis icone laudabili Matthioli, ineptam posuit figuram, ac insuper aliam addit. Priorem quidem inscribit Adonidè, ac Germ. feld Rößlin & Margrethen blümlin vocans.

Turn. negat esse Anemonem, existimans esse Papaueris erratici speciem. Idem ait rursus alibi. Existimant quidam Eranthemon esse, Amariscam rubram Herbarius dictam, quæ nostratibus appellatur Rede math/ aut Rede Madewede. Quominus autem sit Eranthemum hæc prohibent: non habet capitulum luteum, foliis in ambitu purpureis, quemadmodum reliqua duo capitulis donata luteis, scilicet altero foliis in ambitu albis, altero flauis: Capitulum verò huius, nihil habet simile cum illorum capitulis, neque formā, neque magnitudine, neque colore: semen etiam spinachæ semini æquale est, minime tam spinosum: in alijs multis notis descriptioni respondet: folia admodum sunt tenuia: Verum flores phænicei sunt, cum deberent esse purpurei. Eranthemon porro dicitur quoddam Vere floreat.

Gesn. hort. dicitur Anemone quædam, aut verius Chamæmelum rubrum. Item Chamæmelum Eranthemum Kreichio, & Coldembergio, quoddam quosdam non rectè Anemonas generi attribuisse testatur, aliquosque Adonium vocare.

Dod. gall. Anthemidis siue Chamæmeli 3. species (sine icone) Eranthemum & Chamæmelum purpureum, quod ait esse incognitum, nisi sit planta quam quidam vocent Florem Adonidis, alii Anemon: posse vocari gallicè Cam. mille à fleur purpurée; Germ. & belg. Roede Camille. Hoc pingit cap. 31. eiusdem lib. 2. hac inscriptione, Heranthemum fortè. Hoc loco autem eorum opinionem ceu verisimilem admittere videtur, qui Florem Adonidis existiment. In Hist. de florib. & Lat. in fol. vbi pulchra figura, Eranthemi titulo proponit, atque. Nostru sua lingua Eranthemum vulgare Bruynnetrens appellant: Germanorum

Anemone agrestis.

Trag. not.

Icon. Tragi confusa.

Icon. Lonice mala.

Ranunculus purpureus Cæsalp.

Adonis Virgilii Marth.



Cam. not.

Papaueris species Turn. Amariscam rubram Eranthemum non est.

Chamæmelum rubrum Gesn.


Adonium Anthemus 3. Dod. gal.

Heranthemum fortè eadem.



Oculus Demonis.

Gerd. refutatur.



Anemone 3. Tragi.

anorum nonnulli feldtrößlin : hæc erate *sp. d. di-*
mu. Esse tamen tertium Anthemidis genus, quod
 propriè Eranthemum dicitur, nemo facile asser-
 mauit. Matthiolus Eranthemum hoc præfens,
 Adonidis florem nuncupat, sed Adonidis flos
 Anemone esse creditur. Adonidis liquidem flo-
 rem vento excuti Ouidius scribit, Metamorph.
 lib. 10. in fine: venti autem flos Anemone est. Nā
 Anemone *ἀνὸς τῷ ἀνέμου*, id est, à vento nomen ha-
 bet, ut Plinius auctor est lib. 21. cap. 17. Flos, in-
 quit, nunquam se aperit, nisi vento spirante: vnde
 & nomen accepit. Cum Anemone autem Erā-
 nthemum hoc non conuenire, manifestum est.
 Hæc ille, satis ostendens non esse Amellū Virgili.

Eranthemum negat & Lobel. in Adu. Anemo-
 nemque concludit his verbis. Recentiorum A-
 donis, aut Adonicum Poetarum, species Ane-
 mones, non Eranthemi. Certius etiam augura-
 rentur, si eximie pulchritudinis florem istum
 vulgò Adonidis vocatum, vel Adonium qui e-
 tiam inter segetes passim in Gallia, Germania,
 & Anglia reperitur, & in hortis coronari⁹ habe-
 tur, ad Anemonas retulissent: Etenim Eranthem-
 um cur non sit, satis iam dictum: cur autem
 Anemone sit & eadem cum Poetarum Ado-
 nide videatur, faciunt flores punicei Gallicæ aut
 Germanicæ, intenso cruore saturati, & aliquan-
 tum nigricando lucidi. Folia, caulis, ramuli, &
 radices Cotulæ, aut Anemones Monspelicæ:
 semen in pusillis, oblongis, racemosis, Ranuncu-
 li longioribus fastigiolis, Asparagi primùm pul-
 lulant, ut signanter monuit Dioscorides in A-
 nemone: tota gustu subacri, vnde Monspelien-
 ses etuditi plerique in Anemonem potius, quàm
 Eranthemum ducendam voluerunt. Sententia
 quorum fauent etiam Nicandri Theriaca con-
 iectura, ut qui hanc Adonidis cruore genitam
 Anemonem vocent, & Ouidius itidem:

— Cum flos de sanguine concolor ortus.

Qualem qualis lentis celant sub cortice granum

Punica ferre s' lent, nimia lenitate caducum,

Excitantur idem, qui perstant omnia, venti.

Vbi vides Anemonem vulgi nomenclaturā,
 Herbam venti adumbratam. Obs. p. 150. Recen-
 tiorum Adonis videtur *φλωδὸς* Theophrasti, à floris
 flammeo igneque colore, quam inter vernos flo-
 res recenset. In Icon. Plant. p. 283. Flos Adonis.

Tabern. Icon. p. 20. Chamæmelum purpureum,
 Braun oder roth Camilleh. Item p. 22. Adoniū
 luteum, Adonium mit geelen blumen. In Hist.
 lib. 1. p. 72. Chamæmelum purpureum siue 6. flore
 miniato, septem foliolis recuruis constante: Græ-
 cè *ἰσάβηκος*, *ἰσάβηκος*, & *ἰσάβηκος*: Flos sacer, O-
 culus Demonis: errat Val. Cordus, qui Anemo-
 nem minorem putauit: hæc enim planta caret
 acrimonia. Et p. 102. feldtrößlein [Rosulam
 campestrem dixeris] prima species flore rubro
 miniato; capitulis spinosis; semine spinachiz.
 Altera species differt tantum flore candido. Qui-
 dam stirpium ignari confundunt feldtrößlin,
 cum Chamomilla rubra, licet magnum sit disci-
 men: liquidem in feldtrößlin, nunquam in flore
 sunt plura quàm quatuor foliola, in Chamomilla
 rubra verò septem. Quoniam autem nomine a-
 pud Veteres vocata sit, me latet: feldtrößlin di-
 ctam, vocant Herbarii nostri Aculeatam. Et
 hinc Tragus Anemonem aculeatam Plinii
 credit, cum tamen cum Anemone communis
 nihil habeat. Quare cum aliis Aculeatam
 vocabo. Et p. 89. Adonium 1. flore miniato. Ado-
 nium 2. primo in omnibus simile, excepto floris

colore luteo, Adonium luteum (in Icon, vti di-
 ctum p. 22.) Reperitur & tertium flore albo sed
 rarius. Herbariis Adonium, Adonidis flos Poë-
 tis. Quamvis multi Anemonen & Adonidis,
 florem existiment, attamen non inficias ibunt
 docti, quod *φλωδὸς* & *φλωδὸς* Theophrasti à me ap-
 pelletur, quam gaza Flammam & Flammulam
 interpretatus est: vocatur Germanis Brunet-
 rößlin / & seither Rößlein / Adonis Rößlein;
 Flandris & Brab. Bruynctrefens / & Adonis
 bloem. Item in Icon. p. 790. Adonis siluestris flo-
 re citrino. Hist. p. 459. lib. 2. Adonis flore citrino,
 aut rubro [addit in descr.] capitulis spinosis:
 dicitur aliis Anemone agrestis, aut Anthemis,
 Germ. Rote feldtrößlein. Hæc sparsim Tabern.
 apud quem in Iconibus transpositus est titulus
 latinus Chamæmeli purpurei, & ascriptus Cha-
 mæmeli lutei, errore & incuria Typographi,
 quod quidem veniam meretur, non item quod
 Tabernamontanus stirpium ignarus separet
 Chamæmelum suum purpureum ab Adonio, & à
 sua Aculeata, quam ei incognitam fuisse vel in-
 de colligo, quòd dicat flores habere tantum qua-
 tuor foliola, cum Tragus, vti dictum, in vno flo-
 re plura pingat. Si præterea ei nota fuit Aculea-
 ta quadrifolio flore, cur non demonstrat ubi ob-
 seruauit, quandoquidem Tragus nullum assignat
 locum particulatè, & eius icon videatur falsa.
 Cur, inquam, hanc non depingit? Adhuc in illo
 capite nihil tradit, quòd ad illustrationem Ane-
 mones aculeata faciat, verba tantum dat. Error
 etiam ille nō paruus videtur, quòd eandè plantā,
 aut saltem congenerè ponat l. 2. pro Adonio: ve-
 rum is fortè ignorantiori compilatori tribuend⁹.

Gerardo, Cotula lutea, yelow Maie weede.
 Cur autem iconi Tabernamontani Chamæmeli
 purpurei, titulum Cotulæ luteæ inscribat, ignoro.
 Hort. Lus. Adonium purpureum.

Hist. Lug. p. 969. Dodonzi verba de Era-
 nthemio habet ac pag. 970. Anthemidem Era-
 nthemion Dodonzi vocat. Item eadem pa-
 gina pro Adonide, siue Anthemide Matthioli
 quoque pingit. Ac rursus eandem figuram p. 144.
 exhibet hoc titulo: Chamæmelum siluestre Mat-
 thioli, siue Anthemis. Dicit Compiler Ado-
 nidem esse Anthemidem Dodonzi, & Matthioli,
 quorsum ergo duæ figuræ, & tertia, quam sine vl-
 la descriptione infra repetit.

C. Bauh. phyt. Adonis tertia, siue flore mi-
 nore: variat flore pallido, rubro, luteo: albo co-
 lore inter segetes collectam dedit Cargillus. Et
 Adonis 4. siue siluestris flore pallido minore, in
 purpureum vergens.

Chamæmelum Eranthemum multis dictum
 habeo in horto Ill. E. C. Witt. Montbelgardi, qua-
 le traditur à Cordo primo loco. Feliciter proue-
 nit ex semine deciduo, & etiam sato: semen
 maturat Iunio, Iulio & Augusto, quo tempore
 adhuc floret. Recordor quondam circa Basi-
 leam in segetibus spontè proueniens repertum
 florens Maio. Frater etiam reperit in a-
 gris, quā itur Dornacum. Florens vidi mense
 Aprili inter Monspelum & Nemausum; inter
 Auonium & Arelatam in agris, Tiguri
 mense Septembri in horto Dom. D. Funckii.
 Geneuē mihi florebat in horto mense Nouembri,
 ac etiam Ianuario & Februatio, quæ prouenien-
 te frigore perit, ibi nomine communi Melanthio
 vocant *Barbue* vti & Lugduni. Monspelii cum
 studerem vocabant Anemonem; D. Cortulus
 Patauii & D. Rob. Const. nominabant Argemonē,

Flammia
 ex Flamm-
 mula Ger-
 2a Tab.

Adonis sil.
 flore citri-
 no Tabern.

Tab. n. 1.

Cotula li-
 tea Gerard,
 Adonium
 purpureum

Adonium
 purp. Hort.
 Lus.

Adonis flo-
 re minor
 C. Bauh.

Locus &
 tempus.

Plant. h. 1.
 p. 72.

Plant. h. 1.
 p. 72.

Plant. h. 1.
 p. 72.

Plant. h. 1.
 p. 72.

Stutgardie in horto E. C. Wirt. obseruauit florens Maio, flore paruo aureo, vnguibus purpureis ferre. Spontè frequentissima, inquit Clusius, nascitur inter segetes, non modò in Gallia Narbonensi, sed etiam per vniversam Hispaniam, qui etiam non minus frequentem obseruauit inter segetes in Austria & Morauia.

Antè diximus commendari ad calculum, quod etiam annorauit Camer. ex loco, vt existimo, allegato. Adonium calidum & siccum in secundo gradu tradit Tabernamontanus, qui herbam in balneo sudatorio ad humores frigidos prouocandos vtilem esse scribit. Dodonæus tamen ait Eranthemi huius nullum esse in medicina vsum: quantum autem gustabilis qualitas eius ostēdat, aliqua caliditate participare, sed tamen non magna. Voluptatis gratia in hortis colitur à virginibus, quarum coronas ornare consuevit.

PARTHENIVM VETERIBVS.

CAP. XXI.

Parthenium autoritate Dioscoridis, foliis est Coriandri (κοριάνδρι Ald. marg. χαμαίμελον) tenuibus, floribus per ambitū albis, in medio verò melinis, odore subuiroso & sapore subamaro. Siccatum cum aceto mulso (Lacuna addit ex vet. cod. 2, 5, 6) aut sale porum, æquè ac epythymum pituitam & bilem atram detrahit, suspiriosisque ac melancholicis prodest. At herba citra florem calculosis & anhelatoribus magna vrilitate propinatur. Ipsius verò decoctum, ad insidendum valet ipi vuluarum duritiis & inflammationibus. Sed & ipsa cum floribus, erysipelatis & inflammationibus imponitur. Parthenium, sunt qui Amaracum, qui Anthemida, qui Leucanthemon, qui Chamæmelum, qui Chrysocalida, qui Malobathron, qui Campestem florem appellent. Thufci Cautam, Aphri Tamacath, Romani Solis oculum aut Millefolium vocant.

Cæterum, alia hæc Parthenion est [hoc attestante Marcello] ab ea quam Clusius lib. 3. Perdicion vocari etiam tradidit: reprimereque simul & refrigerare. Illa Elxine muralis & Perdicion dicta: hæc pluribus ab Anthemide appellationibus similibus congenerèque illi credenda est. Illa à Nicandro Theriacis venenatis mederi prodita, hæc sanandis suspiriis, atræ bili, calculosisque, inflammatis, duratisque muliebribus locis apta. Hæc Chamæmelo similis flore per ambitum candido in medio luteo, illa Mercurialis herbæ foliis descripta: &, ne longiores simus, notis omnibus inter se diuersæ, solo eodè nomine legentes fallunt. Fallit autem non nomine sed & Parthenion tam similis Chamæmelo: vt pro ea sæpius ab imperitis carpatur. Habet enim illi similem paulò minùs quam in cunctis florem. Differt magnitudine quæ in Parthenio amplior vndique est: differt & figura: quodd coloribus in vtriusque flore paribus Chamæmeli flos in medio tumet & in altum erigitur, folia verò ad terram inflexa descendunt. In Parthenio folia medio exæquata per ambitum stant. Nobis ex his quæ diu obseruauimus inclinatur animus Chamæmelo congenerem esse: & vt in plerisque aliis sit nota aliqua priuatim ab aliis dispelci: quæ in Parthenio hoc virosus odor est. Quemadmodum in bouis oculo, sola magnitudo, quæ à Parthenio hoc illa distinguitur. Sunt Parthenii huius alie appellationes in fine capituli numeratæ: quarum quæ Chamæmelo communes sunt à no-

bis relinquentur, alie qualis Amaracus est parum certè dici, & enarrari à nobis possunt: Et si antiquissimi Scriptores Amaracum hanc vocari dixerint: Galenus, Paulus, alique plures: quorum fides & autoritas non parum difficilem nobis alterius Amaraci, quæ primo volumine dicta est, historiam & commentationem hanc nostram facit: falsòque à Marone dictum fuisse vbi mollis Amaracus illum &c. Cum hæc *ἐπιμήνιον*, i. viroso & graui odore sit. Incertum etiam cur Romani Solis seculum dixerint: nisi fortè non Solis seculum sed Solis oculus dicenda ca sit. Hoc enim magis probamus quàm si Solis equum dicatur. Neque enim quod hæcenus degerim Solem sequi Parthenion hæc à quoquam dicta est. At si Solis oculus dicatur aptior rei appellatio erit. Foliis enim per ambitum radiatus eius flos: in medio autem luteus orbis Solis disci figuram ostendit. Millefolium autem foliorum tenuitas facit: quæ vt in bouis oculo sunt capillata, & Fœniculo similia videntur, & infinita penè ex vno ramulo pendent.

Parthenium alii Lencanthemon, alii Amaracum vocant. Celsus apud nos Perdicion & Muralium. Nascitur in horrorum sepibus, flore albo, odore mali, sapore amaro. Ad insidendum decoctum in duritia vuluarum & inflammationibus. Siccatum cum melle & aceto potum, bilem tradit atram. Ob hoc contra vertigines vtilis, & calculosis. Illinitur & sacro igni. Item strumis cum axungia inueterata. Ita Plinius inquit Cornar. in Dioscor. lib. 21. cap. 30. ex recta veteris codicis lectione. Verum ipse Plinius duas herbas in vnam confundit. Nam muralium & Perdicion à Celso dicta, est quidem Parthenium à Græcis appellatum, sed non hoc de quo hic Dioscor. agit & Plinius agere voluit. Verum quodd infra l. 4. cap. 74. Dioscor. Helxines nomine describit, itemque Parthenium appellari dicat. Ad hanc itaque pertinent Celsi verba lib. 2. cap. 33. At simul reprimunt & refrigerant, Herba muralis, Parthenium vel Perdicion appellant. Ita Celsus. Cæterum quæ sequuntur in Plinio, ad Parthenium de quo hoc loco Diosc. agit, pertinent: nec multum euariat à Dioscor. Plinius.

Galenus, Paulus, Aetius, Parthenium hoc suo nomine non agnoscunt, sed sub Amaraci nomine describunt, quod non ingenerosè calefaciat, sed siccet non valdè, verum vt in caliditate ordinis sit tertii, in siccando secundi.

Ex hæcenus dictis clarè pater, Parthenium Helxine dictum, de quo lib. 15. Hist. n. g. egimus, ab hoc Parthenio multum differre. Quæ autem planta hodie hoc Parthenium repræsentet, lis est inter Autores. Multi namque verum & legitimum Parthenium *Marricaria* dictam esse contendunt. Non desunt alii, qui Chamæmelum nobile, Parthenium Dioscoridis affirmare non verentur. Reperiuntur non rari [inter hos sūt Fuchf. Gesn. Lob. Anton. Musa, Schvvenck. & alii] qui Parthenium uolunt esse *Cotulam* scetidam, sed hoc meritò negant, Matthiol. Dod. & alii. Sunt etiam qui Parthenium mas appellant, & Athanasiam, quam Tanacetum cum quibusdam vocamus, esse censeant. Parthenii nomenclatura, Teste Trago lib. 1. cap. 63. competit etiam *Arthemisia*. Mercurialis etiam, eodem Trago teste lib. 1. cap. 62. dicitur apud Dioscoridē lib. 4. Parthenium. De Mercuriali diximus lib. 23. H. n. g. Plantam Lappariam (*Cynoglossa* *lapparia* forte Plinii nostra. Plinio lib. 22. cap. 17. recenseri Parthenii nomi-

Aequinoctia Helxine

Marricaria
Chama-mel nobile
Chama-melum scetidum

Tanacetum
Arthemisia

Mercurialis

Cynoglossa lapparia
lapparia
lapparia

ne, author est Thalius. Parthenii nomenclatura adscribitur etiam Maioranae, de qua dicemus lib. 28.

MATRICARIA VULGO, MINVS
Parthenium.

CAP. XXII.

Descriptio.



Perquam
fibrosa ra-
dice nititur,
caules surrigēs
cubitus vnū,
aut alterum
altos, striatos,
fungosā me-
dulla refertos,
& in plures a-
las diuisos: fo-
lia Artemisiae,
multis laciniis
diuisa, ex viri-
di luteola, o-
dore graui, sa-
pore amaro:
flores in medio
melini, foliis
exteriorib⁹ cā-
didis, Chamæ-
meli modo.

Non dubitat Tragus Matricariam cum Tanacetum sub Anthyllidis Dioscoridis descriptionem referret sed meo iudicio absque ratione.

is porro Matricariam depingit & describit dicens. Matricaria videtur mihi genus esse Tanaceri potius quam Chamomillae, vel Artemisiae species, ut multi putarunt. Et quia Parthenii appellatio à doctissimis quibusque illi tribuitur, cū aliis Partheniū vocabo. neq; multum refert, siue Partheniū siue Artemisiā uocaueris. Dicitur lac. Mālio Febrifuga, Auicennae lib. 2. cap. 723. Vchue, Serap. cap. 243. Achuen, Laur. Phryio in Synonymis Amarella, Hebraicè Molufa, Amaration & Lampuesia. Cordus existimat Amaracum Galeni. Sit itaque Matricaria Parthenium, vel Cautā nomine, tamen formā & temperamento, non Artemisiā tenuifoliam (ut quidam sentiunt) sed Tanaceri genus esse deprehender, qui singula in vtraque stirpe penitus considerauerit. Et vno verbo, ut dicam, Parthenium Dioscoridis & Plinii, ac praesentem Matricariam, vnam & eandem esse plantam sentio. Idem in Hist. germ. lib. 1. cap. 51. ait. Matricaria dicitur lac. Manlio Crespula, à quibusdam malè Centaurium magnum: Quidam existimant esse Auicennae Embrachit. Matrari subit Tragus quod vnam herbam modò Tanacetum, modò Parthenium vocet, & tamen Tanacetum, seu & Matricariam, quam Parthenium facit, separatim describat & depingat.

Nescio [inquit Matth. in Diosc.] qua ratione ductus Brassauolus in suo simplicium examine pro certo crediderit, eam herbam esse minorem Artemisiā, quae in Hetturia in officinis Matricaria, & vulgò mulieribus Amarella vocatur, dicens. Quam nos Matricariam & Marellam vocamus, Artemisiae species est, illa sc. quae malè olet. Hæc Brassauolus, qui errore notatur, quoddā asserat Matricariam, siue Marellam, quam legitimum Dioscoridis Parthenium centemus, esse

Tom. III.

grauolentem Artemisiā. Quandoquidem minor illa, quae Dioscoridi secundo loco redditur, grauius olens, non quidem florem profert in medio luteum, & per ambitum albis foliolis cinctum Matricariae, vel Amarella modo, sed candidum, paruum ac tenuem. Sed cū porro seipsum hac in re deceptum deprehendisset Brassauolus [ut legitur in suo vltimo volumine Venetiis impresso] dum longa oratione contendit, Amarellam seu Matricariam inter Artemisiae genera reponendam esse, Cotulam verò fertidam, Ferrariensibus Brusciaculo vulgò vocatam legitimum esse Parthenium, adeo seipsum [pace eius dixerim] & sua scripta confundit, ut nullo pacto, quid is tandem decernat, percipi possit. Nam cū Aliserit Amarella siue Matricariae succum vnciarum quatuor pondere haustum vtramque bilem, ac pituitam deicere, aperte quidem fatetur hanc esse Parthenium, cui priuatim ea vis inest. Attamen paulo post eorum forte oblitus, argumentis quibusdam, mea quidem sententiā, satis leuibus contra asseuerat nil aliud esse Parthenium, quam suam Brusciaculum. Adhuc non in minori quam Brassauolus versantur errore Monachi, qui in Mesuei commentariis sunt, quippe qui & hunc sequuti eadem hallucinatione scriptis tradiderint, Matricariam vulgò vocatam omnino esse minorem Artemisiā. In horum denique opinione, vel potius errore, ipse quoque Fuchius implicatur, adeo ut etiam nemini dubitandum esse censeat, quin Matricaria sit alterum Artemisiae genus.

Matricariam ad Artemisiae speciem, non quidem secundam, verum ad primam referre conatur Turnerus part. 1. p. 62. quam tamen suam opinionem retractat, Matricariam Parthenium esse contendens, part. 2. p. 78. contra Antonium Musum & Fuchium qui volunt esse Cotulam fertidam, in qua etiam opinione fuit Lobelius in Aduersariis.

Tabern. Icon. Artemisia tenuifolia. Item & Hist. vbi ait. Artemisia (Beyfus) secunda species, falsò à multis æstimata Parthenium Veterum: Graecè dicitur, *τρυγανθός*, à grani odore, *καλὸν* à flore albo, *οὐρανίου*, & *οὐρανίου*. Latine Apuleio, Tragantes, Onicanthe, Onantheum & Leucopis. Herbariis, & Botanicis Matricaria, Matronaria, Amarella, Amarulca, Tagetes, Oculus Solis, Matronella & Parthenium adulterinum, siue Pseudoparthenium. Italis Amarella, Marella, & Matricaria, Hisp. Madricaria. Gall. Matricaire, Marone & Espargoute. Boh. Xymbasda. Hung. vt Carol. Clus. testatur, Benedicta, & Alba Benedicta. Angl. feuerfew & feddersfew. Belg. Mater/ & Moedereruyt Germ. Metram oder Metram/ Boctoblum/ Matrenen/ Metter, Metre/ Matronfraut, Meydstrauf/ Meyd-blum, Mutterfraut/ Metterfraut/ fedderfraut/ Sonnenaug/ Metterig/ Vund Magd-blum.

C. Bauhin. Phyt. & apud Matth. & Camer. Matricaria i. siue vulgaris. Brunfels. Matricaria, prima Parthenii species. Cordo in Dioscor. & Hist. Dod. gall. Gesn. hort. Lacunæ. Castori, & Thali Parthenium. Ericio Cordo, Amaracus Galeni. Toxica in Onom. philos. Amarulus. Dod. fol. lat. Lonic. Cæsalp. & Hist. Lugd. Matricaria. Fuch. in Icon. Artemisiae ramosae altera species. Monach. in Mes. dist. 17. cens. 34. Segiat mariæ seu Arbor Mariae, vel Planta Mariae, ut scribit Ebenbitar est herba Alachue dicta, & est Matricaria, & apud Italos vulgares

R

Herba S. Mariæ nominatur.

An Io. de S. Amando, supra Martiatum in Antid. Nicolai, Herba S. Mariæ, quæ alio nomine Buchor marien nuncupatur?

Locus.

Montbelgardi Matricaria vulgò dicta prouenit variis in hortis. Patauii mihi visa, & Basileæ. Nascitur authore Dodonzo, in sepibus, in hortis, secus veteres muros: locis gaudet ruderalis: subest sæpenumerò radicum fibris aliquis, licet exiguus, carbo, quem inter rudera facillè contingit reperiri: de quo Cardanus nugæ nonnullas in lib. de Subtilitatibus adfert. Ætius mensibus in vigore ac flore est.

Vires

Matricaria, vt memoriæ prodidit Tragus, calidæ siccæque naturæ est, potestque in Medicina non aliter, quàm Centauria vel Absinthium, & Tanacetum usurpari. Ventris tineas expellit inter sumpta, id quod de herba & de succo expresso intelligendum erit. Quare à prudentibus matronis commendari solet: frigidioribus enim, febricitantibus, & immundis mulieribus purgandis, stillatitiâ aquam, succum, aut herbam in puluerem redactam, exhibet. Pecoribus etiam desiccata cum sale vesperti aduersus inflationes, & difficultatem spirandi, vtiliter præbent mulierculæ veterinatæ. Herba recens tusa, sacro igni & collectionibus, & ventris doloribus efficaciter illinitur. Excalfacit autem, ita tradente Dodonzo, tertio ordine, siccatur verò secundo. Abstergit, expurgat, aperit & quæcunque amara possunt, feliciter præstat: ad vterinos affectus non parum confert: menses remorantes cit, secundas, & mortuos educit sætus, siue eius decocto epoto, vel in balneo incocta, aut etiam cataplasmatibus modo pubi imposita. Facit & ad suffocationes ex vtero hunc in modum, & ad eiusdem durities. Matricariæ viridis parum contusa folia vertici capitis imposita dolorem à frigidis humoribus orum plurimum mitigant.

MATRICARIA FLORE PLENO.

Descriptio



caules, striatos, in multas alas diuisos, folia vulgari perquam similia, & multis laciniis diuisa, herbacei coloris, & amari saporis: extremæ alæ plurimos flores candidos & multiplici foliorum serie constantes ferunt, nullo, aut perquam exiguo in meditullio orbe, quemadmodum Chamæmeli pleni flores, quibus sunt persimiles, vel etiam pleniores & candidiores: semen Parthenii

Matricariæ vulgari per omnia similis, flore excepto, qui in hac cōfertissimis foliis multiplex.

Parthenii pleno flore, inquit Clusius, nihil prorsus à vulgari Matricaria, vel formâ, vel magnitudine differt. Cubitales enim aut ampliores interdum habet

vulgaris, sæcundum, licet aliquoties satum mihi non prouenerit: surculis autem certiore prouentu feritur, Leucolii pleno flore instar. Londini in Anglia mihi primùm conspecta est hæc plâta, anno salutis humanæ 1579. quam inde Antuerpiam deferabam: eius verò iconem ad semina adquirebam Viennæ, munere C. V. Richardi Garth Cancellarii Londinensis, deinde longè frequentiore obseruabam biennio post, cum Londinum rediissè. Florete incipit Iunio, & totâ deinde Æstate flores proferre non desinit, interdum ad ipsam vsq; brumam, nonnunquam squamata capita in multa viridia foliola transeunt, præsertim Autumno, e quorum meditullio emicant niuei flores, reliquis maiores. Ceterum valde ferax est Anglia huiusmodi florum multiplici foliorum serie constantium, quos an arte & mangonio adquirant ignoro.

Lob. Icon. Plant. p. 751. Matricaria duplici flore. Non bene meo iudicio dicit Lob. flore duplici, pro pleno.

Tabern. Icon. & Hist. Artemisia tenuifolia flore pleno, Gesfult Mettram: Quarta alterius generis Artemisiæ species, Matricaria multiflora Herbariorum, aut Matricaria flore pleno, Gesfult Metter / oder gesfult Magdblum. Camer. hort. & C. Bauhin. Phyt. Matricaria 1. siue flore pleno, à Matricaria odoratiore tantum flore differens.

Matricariam flore pleno, antè nunquam visâ, obseruavi in horto D. Michaelis Ioachimi Gruningeri celeb. Pharraacopœi in Pfortzen, cuius surculum decerpsi, ac in horto Ill. C. Witt. transplantavi, qui se plurimum multiplicauit, ac postea copiosè floruit adhuc Octobri. Flores, authore Camerario, aridi terræ mandati, semine intus iam maturo plantas plurimas ferunt. Commodè autem feruntur pluuiâ imminente, etiam vel mediâ Æstate, cum alioquin cum aliis seminibus sati nasci reculent.

MATRICARIA ODORATA.



Huius meminisse Tabernamontanum, apud quem tamen præter figurâ, & sequentia nomina, quæ ei adscribit, nihil inuenio. Artemisia, inquit, tenuifolia odorata, vocatur, Germanicè wölz riechêd Mettram / Spanisch Metter / Spānisch Magdblum / Matricaria odorata, & Matricaria

Hispanica, Medicis & Herbariis in Hispania Argentina. Tabern. in nouellis plantis proponendis est admodum somnolentus & negligens.

An Camer. hort. Matricaria altera ex Ilua insula maris Thyrræni à Casabona Florentinâ transmissa,

Tab. 106.

missi, odore gratiore prædita. C. Bauh. phyt. Matricaria alijs odorator.

PARTHENIVM INODORVM,
siue Achaouan Egyptiorum.

CAP. XXIII.

Herba Cam-
melo.
fines.



Herba est Cam-
melo proxima, quæ tamē non ad eā alta extollitur, sed parū suprà latius expanditur, folijs Parthenii, minoribus ac densioribus, floribusque Cammeli æmulis. Herba saporis odorisque expers percipitur, sed flores odorem grauem, perobscurumque spirant.

Egyptii, porro, quibus & hæc planta patria est, de scriptore Alpino autore, florum, foliorumque decoctum in usu habent ad tollendas viscerum obstructions, præsertimque ad ictericos.

TANACETVM VVLGARE
flore luteo.
CAP. XXIV.



Tanacetū vulgare in latis magnā adolescit proceritate, duorum cubitorum & altius: caulibus teretibus, nonnihil striatis & hirsutis, medulla albā fungosā plenā: folijs ex viridi in flauum vergentia, pennata, in segmenta per ambitum crenata, costę medię adnexa, odore vehemente, sapore

amaro: summos caules occupant corymbi lutei, Chamæcyparissi, minores, è folijs ceu staminulis compositi, quæ in semen tandem abeunt, per maturitatem nigrescens: radix longè, latèque reperit.

Brunfels. Tanacetum, secunda Matricariæ species, & Parthenium.

Si temeritatem suam vniā consequi posse Tom. III.

consideret Tragus, non certè dubitaret vñ cum Matricaria, de qua paulò antè à nobis dictum est, Tanacetum sub Anthyllidis descriptionem referre. Verū sententia eius ratio nibus & veritate non confirmatur, ideoque non recipitur. Iac. Manlius Tanacetum Danetam cognominari ait, sed à quo non ostendit. Nec desunt qui Artemisiā, quæ Monoclonos dicitur Tanacetum esse statuunt, quæ quidem opinio nobis non probatur. Tragus præterea Tanacetum inter Artemisias recenset, & secundā nominat, ac Tageren, Tanasiam, & Athanasiam cognominari testatur.

Fuchsius quoque Artemisiā facit, ac Artemisiæ monoclonos titulo pingit, ac dicie. Tertiā Artemisiæ speciem, Tanacetum corrupto nomine pro Tagete hodie nominant, Germani Reinsarn/quod Filicis ferè speciem referat, & in aquarum ripis nascatur, alio nomine mutifraut / quoniam lumbricos pellat. Esse verò hanc herbam, aliquam Artemisiæ speciem, vel inde etiam constare potest, quod Artemisiā, nonnulli Germanorum Groß Reinsarn vocant. Pulchrè ratiocinatur, si Diis placet, Fuchsius. Betonicam coronariam Germani cum Caryophyllis Indicis communi vocabulo Nāgelin vocant: Ergo Betonica coronaria continuè Caryophyllus erit. Vides itaque quantum sit argumentum Fuchsi, apud quem in edit. Lugd. anni 1551. figurè Artemisiæ monoclonos, transposita est, & pro Artemisia latifolia posita.

Fuch. vob.

Hallucinantur Ruellius & Fuchsius, ait Matthioli, Artemisiā tertii generis eam esse putantes, quam alii Athanasiam, alii Tanacetum appellant. Eorum sententiā magis probandam censerem, qui mas Parthenium volunt. Monachi in Mesuem hallucinantur, tradentes Tanacetum esse Artemisiā vnicaulē. Sed & Matthioli in errore implicatur faciens Tanacetum mas Parthenium. Hoc nomen tantum tradit nec quale sit demonstrat. De Parthenio mare apud Autores, quod equidē sciam, nihil occurrit.

Matth. vob.

Tanacetum Artemisiæ Dioscoridis speciem esse, non absque ratione negat Turnerus.

Tanacetum vulgo appellatum, ab alijs Danetam, non multum differre à Matricaria tum specie tum facultate non inconcinne videtur Celsus.

Hippiam interpretatur Albertus in quodam remedio ad vulnera & vlcera canum Tanacetū agreste. Sed melius, vt nobis videtur, Gesnerus de Quadr. Hippia nomine Anagallidem intelligit [sic enim vel Arabes, vel Barbaros appellare legitur, seu cum Tanaceto nihil cōmune est quā quod vermes similiter interimere potest, nimirū acri & nitrosā facultate sua, quā Betæ similis aut etiam superior est, quod ipse Gesn. se obseruasse testatur. Quamobrem idem ad apoplegmatismos vtriusque vñs.

Tabern. Leon & Hist. Artemisia Dioscoridis Artemisiæ: species Dioscoridis & Apuleii. Quibusdam Parthenii species, & Parthenium masculinum, inquit, dicitur. Sed errant, est vera Artemisia tenuifolia, vt prodiderunt Ruellius & alii multi docti viri, descriptio & vires conueniunt cum Artemisia tenuifolia: dicitur Græcè ἀρtemισία λεπτοφύλλος & ἡ βαλάνος, id est, Artemisia tenuifolia & Artemisiæ vnicaulis; Herbariis alijs Athanasia & Herba immortalis, Tanasia & Tanacetum; Iac. Manlio & Variguanæ Daneta; Syluatico Herba maris, Tangete & Tanasia; Italis Tanaceto, Daneto, Athanasia & Daneda, Gallis Aranesie & Tageren & Tanase, addit

alius, Hung. *Varadich*: Anglis *Tausy* & *tausie* / Belg. *Reinauer* / *Reinueren* & *wormcroyt*: Germ. *Rheinfaren* / & *wurmsfor*. Item Icon. & Histor. *Artemisia* flore albo, nec formâ, nec odore, nec sapore differens, sed tantum colore floris, qui in hac albus est, & raro reperitur, & propterea in hortis colitur. *Mirum* si solo colore differt, ut ipsemet hinc asserit, cui figuram aliam à *Tanaceto* vulgari diuersam exhibeat. Locum etiam ubi hanc raram plantam viderit, annotare debebat. Verum illud est quod errent, qui *Parthenium* esse contendunt. Sed nec illud falsum est, ipsum quoque hallucinari, *Tanacetum* *Artemisiâ* statuentem cum doctis, qualis ille est: doctius his sentit *Turnerus*.

Gerardus etiam malè sequitur *Tabernamontanum*, qui præter *Tanacetum* vulgare, alterum minus flore albo quoque picturâ expressit.

Tanacetum dicitur, *Brunfels*. *Matth. Cord.* in *Hist. Gesu. hort.* *Lonic.* *Dodon. lat.* in *fol. Lob. in Obs.* p. 432. *Castori.* *Turn.* & *Cæsalpino.* *Tanacetum* *Millefolii* foliis *Lob. in Icon. Plant.* p. 719. & in *Aduersariis.* *Tanacetum* vulgare luteum *Trago.* *Tanacetum* maius *Dod. gallico:* *Tanacetum* citrinum *Thalio:* *Athanasia* *H. Lugdunensi:* *Athanasia* vulgaris *Lacune:* *Artemisia* tenuifolia *Fuch. in Iconibus:* *Arthemif.* monoclonos eidem in *Historia:* *Artemisia* *Dioscoridis* *Tabernamontano,* *Tanacetum* *Paracelsi* & *Filix* *Adamo* à *Bodestein* in *Onomastico:* *Sanctæ Mariæ* herba & *Tanacetum* *Io. Agricole:* *Tanacetum* 3. siue vulgare, flore communiter luteo, rarius albo (vnde *Tabernamontanum* duas iconas habere ait) *C. Bauh. in Phytopinace,* quod apud *Matthioli.* *Parthenium* *microphyllon* (eodem lapsu quo alii *Artemisiâ* tenuifoliam *Dioscoridis*) *Hippocratis* esse credit, ac *Tanacetum* ita distinguit. *Tanacetum*, inquit, quod fortè à *Tanaco*, quo nomine *Parthenium* appellatum fuisse testatur *Plinius*, vel odorum est, vel inodorum: odorum aut maius, quod foliis est vel planis, floréque aut luteo, aut albo, vel crispis: aut minus, hocque vel campestre, vel alpinum: inodorum, flore minore, vel maiore. Nos de his specialius agemus.

Locus.

Spontè in variis locis *Montbelgardi* secus vias ad hortos eundo ad *Molédinum.* *Genevæ* habebam in orto. Obseruaui copiosum *Basileæ* multis in locis. *Lugduni* prouenit. Vidi *Patauii* in orto Iesuitarum: Reperi circa riuulos inter *Vicentiam* & *Villam-nouam*: in *Alsacia* abundat, ubi passim secus agrorum margines, aggeres, & hortorum sepimenta exit.

Vites.

Tanacetum cum *Matricaria* eiusdem esse temperamenti nimirum calidi & sicci, eundemque fere in *Medicina* usum habere scriptum reliquit *Tragus*: Semine verò cum melle & vino poto, ventris lumbricos pelli, eiusque dolores sedari, sudorémque denique elici, vulgo etiam dictitante, manifestius esse, quam ut pluribus indicari debeat. Facultate porro calidum & sicum esse *Tanacetum*, attestatur *Dodonæus*: utpote omnibus suis partibus amarum: non tamen secundum utriusque ordinem longè egrediens: Ex tenellis herbæ erupentis foliis cum ouis placentas vere confici, ori nec ingratas nec iniucidas, vetriculo verò etiam utiles. Nā si qui in eo hæreant vitiosi humores, eos partim ad concoctionem illas perducere, partim abstergendo deorsum deducere: Succum herbæ cum vino potum, aut eiusdem decoctum, urinam prouocare, dolores vesti-

cæ lenire, & urinæ stillicidio mederi: eundem succum cum oleo rosaceo spinæ ante accessiones illitum, febrium rigores tollere latum esse: cum quouis autem oleo, etiam neruorum contractionibus ac doloribus auxiliarem esse: Dicit & de radice, quod cum melle aut saccharo condita, aduersus podagram plurimum faciat: si ieiuno vetriculo eius aliquantula pars, continuo aliquo tempore sumatur. *Tanacetum* flatus discutit ventriculi & intestinorum: rectè igitur, inquit *Turnerus*, fuit à Medicis consultum, ut in cibos veniret post Pascha, ad dissipandos flatus per ieiunia quadragesimalia contractos ex esu piscium, pisorum, fabarum, aliarumque herbarum flatulentiarum, quæ tum temporis in acetariis comeduntur. At meo consilio per ipsam quoque Quadragesimā vtentur, ut tum calculū, tum colicos cruciatus eo tempore inualescentes præcaueant. Urinam ciet: referunt recentiores *Tanacetum* viris, *Matricariâ* fœminis, vtiliora. Hic addit *Cæsalpinus*, uti recentiores ad omnes cruciatus internos mitigandos tum potâ, tum exterius applicatâ, Abrotomi modo: Item contra quascunque febres propinare succum eius pondere drachmarum duarum cum aqua *Plantaginis.* Florem in puluerem contritum cum Saccharo grauidis conducere: folia sicca & contrita in vino sumpta muliebres locos expurgare. Expertus sum (inquit *Herc. Saxon. de Luc. venerea cap. 11.*) in muliere, quæ octo annos continuos manuum fissuras gesserat, & inutiliter omnium & Venetorum & Patauinorum opera vîa fuerat, remedium quo breui & facillè fuit curata. Est autem succus herbæ, quam alii *Arthemisiâ*, alii *Tanacetum* vocant. Dum administratur hic succus, cauendum est ab omni manuum lotionem, & pena hoc ipso illita, in singulas rimas succus inferitur. Expertus sum hunc ipsum succum in impetigine, in vlcetibus crustosis, & successit curatio feliciter. Sic poteritis pedum & manuum rimas curare. Plura qui vult de huius usu ceu etiam varia præparatione, ut aqua stillatitia, vino, extracto, conferua, syrupo, sale, & oleo, videat *Tabernamontanum* lib. 1. c. 7. circa finem.

TANACETVM CRISPV M FLORE LVTEO



Cvi *Tanacetum* vulgare notum, ei magis obuia erit *Tanacetum* cognitio quâ herbâ: est quippe hoc rarius, reliquâ vulgari descripto simile, sed foliis elegantissimis, crebriori incisurâ diuisis, segmentis frequentius argutius crenatorum marginum flexu reflexuque crispis, cristas castrenses imitatis, odore

Descriptio

gratiore, sapore amaro.

Lob. in Adu. Tanacetum Angliz. In *Obs.* p. 432. *Tana-*

Tanacetum speciosius cristatum Anglicum. In Icon. Plant. 749. speciosum *Tanacetum cristatum Anglicum.*

Camer. hort. *Tanacetum Anglicum* siue crispum, odoratum admodum. H. Lugd. p. 956. *Tanacetum cristatum Anglicum* Lobelii. Tabern. Ic. & Hist. *Artemisia lactuca* Anglica, *Englisch Ketnsfahnen / Artemisia*; species, *Tanacetum crispum*, siue *Cristatum*, vel *Anglicum*. Gerard. *Tanacetum crispum Anglicum*, double *Englisch Tausie*. C. Bauh. phyt. *Tanacetum* 4. siue foliis crispis.

Locus. *Tanacetum crispum* flore luteo vidi Balmæ in horto insignis Chirurghi Petri Rolot, à quo accipi plantandum in hortum E.C. Wirt. & meum Montbelgardi, ubi feliciter se multiplicat. Vidi quondam Cabillonii siue Chalon in Camania & Lutetia in hortis. Frater attulit collectum folium in horto Bononiensi. Floret Iulio & Augusto.

Vires
color
ad
curat. *Tanacetum Anglicum* vsus est in cibis, præsertim contra vermes puerorum, inquit Camerarius. In Scoria, vt testatur in Therapeu. puerperarum Io. de Bon Regius. Medicus in Gallia, Heroina lectum *Tanacetum* ad prohibendum abortum ad mouere solent partibus inferioribus frequenter & cum felici successu, quod vt grauidis oleat, prius manibus atterunt, aut sub cineribus paululum coquant.

TANACETVM ALBVM.

Dactylis



describimus in horto cultam.

Eadem aut similis est, sed ratione loci multò minor, quam reperimus Montpelii in montibus circa tres pontes, quos vocant du Gab, quam sic delineavi. Herba foliis similibus *Tanaceto*, floribus omni parte & colore similibus *Chamaemelo*, gratissimum spirantibus odorem, quatuor vel quinque, vix ad altitudinem palmi excrecent.

Quum figura nostra ex Fuchsiæ, iam sculpta non placeret, iconem *Tanacetum inodori* Clusij, quod idem cum nostro statuimus, curauimus pingendam, primam scilicet ampliore flore, cui folium & florem ex ipsa planta addidimus, quæ *Tanaceto* secundo inodoro Clusij bellè responderet. Sic autem Clus. de duplici suo *Tanaceto* Tom. III.

inodoro scribit.

Tanacetum inodorum nuncupat Clusius: Lob. Adu. *Tanacetum non odoratum siluestre*. Eidem Lob. Obs. p. 431. & Icon. Plant. p. 750: *Tanacetum non odoratum*, porperam *Sideritis Italorum*. Camer hort. *Tanacetum Leucanthemum*, id est, floribus albis, inodorum in montibus altioribus Franconia crescent.

Hist. Ludg. p. 1147. *Athanasia Leucanthemos*, quam quidam *Vchnam albam* Auicennæ volunt, vel vt legit Bellunensis Achnam, *Tanacetum siluestre non odoratum* Lobelij.

Tabern. Icon. & Hist. lib. 1. p. 470. *Tanacetum Leucanthemum*, vnde *Regefahrn*. Idè antea in Hist. videtur hoc per *Tanacetum* quartum genus intellegere, ac *Tanacetum fatuū* & *Tanacetum inodorum vocasse*; Italicè verò *Tanaceto senza odore*, & *Tanaceto balordo*, quamuis aliqui *Sideritis* uelint. Vides vnam & eandem sub diuersis nominibus esse traditā. p. 37. & 38. pro *Tanaceto* 4 genere, sine icon. pag. verò 470. pro *Tanaceto Leucanthemo*, vbi icon.



C. Bauh. phyt. *Tanacetum* 1. siue inodorum montanum: hoc aliquid similitudinis habet cum *Sideritis montana* Matthioli, quoad folia: at si ramos & capitula perpendas conuenit cum *Ruta canina*: Lob. *Tanacetum non odoratum*. Item. *Tanacetum* 1. siue inodorum flore *Bellidis maioris*, Clusio *Tanacetum inodorum* 1. *Hac* duo *Tanaceta* C. Bauh. non duæ, sed vna planta, aut saltem eiusdem speciei, ita vt non separandæ videantur.

Gerardo, *Tanacetum non odoratum* *Unsanorie* *Jansie*.

Natalem habet in horto E.C. Montbelgardi, ex Gallia per me allatum. Hoc primo anno caulem non produxit, secundo floruit Iunio, semen maturuit Iulio & Augusto, Basileæ obseruavi in monte Mouters & in horto D.D. Fel. Plateri: Genevæ in proximis montibus collegi bicubitalem, inibi verò in hortis florentè Iunio & Iulio. Paruum vti dictum, obseruavi Iunio florentem prope Gab, odore gratissimo; Magnum, si bene redor, in monte Wirtembergico *Eichelberg* florentem Septembri. *Tanacetum inodorum* vtrumque Clusij prouenit ferè in omnibus vtriusque Pannonia & Austria montibus humilioribus, & siluis cædis: vbi florēt Maio & Iunio, & si Autumno seratur, flores interdum prouducit sequente Augusto.

CHAMÆCYPARISSVS.


CAP. XXV.

Non iniuriâ inter suffrutices quis hanc connumeravit: ex radice lignosa virgulta eu-

R 3

bicō altiora emittit, lignosa, tenerā lanugine incana: in quibus folia longitudine circiter vnciali, cana, minutim denticulata, ita vt quatuor serē denticuli in eadem phalange agminatim dispositi conspiciantur, odore mendicamentofo, & cum quadam suauitate graui, sapore partim acri, partim amaro, singulis ramulis singuli insident flores Tanacetii lutei.

Chamæcy-
parissus
Nemau-
sensis sponte
nascens.



Vnguentaria
via.



Santonicum
maius
Cordis.

Santonium
minus Cordis.

Hæc Chamæcyparissi à nobis plerūque obseruata descriptio est, cui similis, si non eadem, vt nos suspicamur, sponte promouens, visa circa Nemausum, hirsutior & candidior, cui respondet Matthioli figura. Vulgari persimilem aliam Vnguentariam denominatā nouimus, caulibus tenuioribus, candidioribus (qui bicubitales nobis in plurimis hortis conspecti) foliis vestitis minorib⁹, sed quæ maioribus denticulis incisa sint, odore min⁹ graui & iucundior. Figura apud Lobeliū & Dodonæū huic conuenit, idēd eam figuram exhibemus.

Santoniciū maius [inquit Cordus in H.]

Abinthio cognatus & odoratus frutex est, caudicem habens pollicari crassitudine, numerosas, cubitalesque virgas emittentem, tenerā canāque lanugine obductas, vnciā longioribus, canis & Ericæ modo in breuissimas carnosasque partes diuisis, & Hieme durantibus foliis vndique vestitis. In summis virgis flores lutei sunt, breuibus staminibus in paruum orbem dispositis facti. Semen habet tenue & fursuraccum. Radice nititur lignosa. Colitur apud nos in hortis, in Narbonensi verò Gallia sponte nasci fertur, si Dioscoridi, & iis qui nostra ætate ibidem genitam viderunt, credimus. Santonicum minus, quod Plini⁹ Chamæcyparissus dicitur, maiori in cunctis simile est, pauld tamen minoribus virgis & foliis constat, remissiorēque habet tū sapore, tum odorem. Colitur similiter apud nos in hortis Cypressi nomine. Nascitur & hoc

copiosissimè in Narbonensi Gallia. Hæc Cordus, quibus fortasse intelligit duo genera à nobis descripta. Is in Dioscor. lib. 3. cap. 26. erroris eos arguit, qui Cypressū herbam (quam Germani Cypressen, Græci Chamæcyparissum nominant) Seriphium, id est, Marinum Absinthium esse contendunt.

Chamæcyparissum duplicem quoque statuit Dod. gall. his verbis. Inuenitur in hortis Gallie Santolina duplex genus, figurā admodum simile. Primum & vulgatius appellatur à Plinio Chamæcyparissus, à Latinis Chamæcyparissus, à modernis quibusdam Santolina, & est officinis incognitā. Alterum simile huic, sed ramulis tenuioribus, flore pallidiore, & minoribus: odore gratiore: sine dubio species est Cypressi (Cypres,) non Cedri [Cedre] vt quidam vocant.

Locupletat Dodon. lat. Historiam de Floribus & latinam in folio, plura tradens (quinque sc.) Santolinæ genera, dicens. Aurei coloris corymbos Santolina profert, odorata est, & non raro coronis admiscetur. Eius aliquot sunt genera. Prima virgulæ sunt tenues, foliis circumdatæ paruis, oblongis, angustis, denticulatis: frutex cauliculis & foliis albicans, & suauiter cum grauitate quadam odoratus. Huic similis est & altera species, foliis longioribus, virentioribus ac min⁹ candidis, flore pallidiore. Tertia foliis breuissimis & Ericæ proximis: floribus luteis, & aliarum similibus. Quarta foliis est min⁹ denticulatis, & Cypresso similioribus, perinde vt aliarum. Quinta cauliculi non eriguntur, sed procumbentes per terram repunt: folia crassiora & lanuginosiora magis canescunt: flores aliarum Santolinarum. Omnes hæc vno Santolinæ nomine appellantur. Belgæ verò Cypres nominant. Chamæcyparissum plerique faciunt: sed de Chamæcyparisso sententia nec reici, nec probari potest. Officinæ Semen contra vermes, & Semen sanctum appellant. Quod nonnulli ignorantes ex qua stirpe colligatur, Santonici semen esse existimant: alii Seriphii siue Absinthii marini: vtique à vero aberrant. Hallucinantur etiam non parum, qui Santolinam Abrotanum sceminam esse volunt. Abrotanum siquidem scemina, foliis est maris, Seriphii videlicet, similibus, sed procerius & fruticis modo arborescens. Santolina humilior est, & non Seriphium, sed proximius Ericam folio exprimit. Plus similitudinis cum Abrotano scemina Heliochryson quorundam habet, vnde Abrotani folio cognominauimus: odore etiam ei vicinum est, non tamen Abrotanum, sed sui generis herba.

Abrotani scemina & Seriphii Dioscoridis icones Lob. in Obs. suis his titulis proponit. p. 443. Abrotanum scemina Adu. p. 341. Chamæcyparissus Plinii Herbariorum: Santonicum minus Dioscoridis Cordi, Hispanorum Terna Lembriguera. p. 436. Seriphii Abrotani scemina facie differentia, Adu. p. 336. & 337. Santonicum maius Cordi, Santolina Dodonæi, cuius sex varietates alebat Montonus, quarum pars foliis est Chrysocomes Monspelicæ angustifoliæ, pars verò foliis cristatis Chamæcyparissi, Sabinæ, vel Ericæ, minutis. Ex Hispamiis & Galloprovincia belgii inquilina facta sunt. Horum nullum est officinarum Semen sanctum, siue contra vermes, vt credidit Dodonæus. Seriphium Galloprovinciæ Aduers. p. 337. successu temporis degenerat fragrantia, ac tomento, & candore exuitur in Belgii & Angliæ viretis. Mirum Lobelium in Obs. locis iam citatis, bis vnam & eandem figuram [cā sc. quam

Santolina
Chamæcy-
parissus.

Varietates
sæ.

Non est
Semen/an-
trum offi-
cinarum.
Lob. nec.

sc. quam Dod. pro Santolina habet) sub diuersis
titulis proponere , cum in Aduers. pro Seriphio
Dioscoridis aliam exhibuerit imaginem. Tres ha-
bet in Icon. Plant. figuras. Prima [ex Aduers.] p.
754. hoc titulo: Seriphium Dioscoridis Abrota-
ni foeminae facie. Secundam iam dicta paginâ
hoc titulo: Seriphii Abrotani foeminae facie diff-
ferentia. Et hanc rursus pictam dat p. 768. hac in-
scriptione : Abrotonum foemina, Cur autem
hanc sub diuersis titulis bis pingat, causam nul-
lam video.

Clusius posuit priorem iconem Lobelii pro
Abrotano fœmina Narbonensis, pro qua non vi-
detur Lobelius posuisse. Clusius præterea pro A-
brotano fœmina vulgaris exhibet modò dictam
Lobelii secundam siue tertiam.

Abrotonum fœminam Salmanticense diuersum esse ab eo, quod vulgò ab Herbariis Abrotoni fœminæ nomine circumfertur, quodque Santolinam appellant, testatur idem Clusius. Illus autem in Historia rariorum stirpium per Hispanias obseruatarum, duo tantùm genera tradit, licet in post. Historia lex assignet.

Abrotoni fœminæ sexu facile crediderit Ruellius intelligi, quod vulgus Gallicum Cypressum appellat, quoniam in arbusculam fruticem, albicans, foliis Seriphii Abinthii modo scissis, ramulos circumdantibus copioso flore, comantibus quibuldam in summo auti fulgore corymbis, odore cum suauitate quadam violento, gustu amaro. Qui Chamæcyparissum existimant esse, quem vulgus ab odore formæque foliorum eiusdem nomenclaturæ arboris, Cypressum appellat, falluntur, si Ruellio credimus. Nam etsi coactæ sit breuitatis, & velut arboris cuiusdam abortus, non tamen in genere punilionum sedē inuenit, nec in arborum, sed fruticum censu cōstitui haberi. Huc facit quod nihil apud classicum authorem de Chamæcypresso legatur. Ad alterum igitur Abrotoni sexum melius fuerit referre, cum nulla videatur delineationis nota repugnare.

Non placet figura Tragi, nec etiam quod Chamæpryn statuatur. Fuchii icon quam proponimus paullo melius arridet.

Abrot. montanum Plin.
Fuchsius cap. 2. de Abrotono præsentem nostram plantam Abrotonum fœminam vocat, & Abrotonum montanum Plinii, ac silvestre Cypressum vulgi, eiusque figuram cap. 335. de Chamaecyparisso ponit, ac dicit. *Χαμαειρύριον* Plinio dicta est, quasi pumila Cupressus: apud Græcos, quod sciam, eius fruticis nulla sit inventio: vocatur vulgò Cupressus ab odore & forma foliorum eiusdem nomenclaturæ arboris, Germ. *Cypree*/ Gallis *Cypres*.

Anguill. epist. 10. in fine Santolinam vocat, ne-
gatque esse Abrotonum fœminam:

Abrotonum quod fœmineo generi adscribitur, non omnibus notum est, inquit Marthiolus: non idem, quodd & ipsum frequentissimum non seratur in hortis; sed quodd à paucis pro Abrotono fœmina cognoscatur. Quandoquidem id alii Cypressum, alii Santolinam vulgò appellant, alii verò marinum esse Absinthium existimant. Sed ii profectò falluntur: quippe Santolina vulgò vocata, nil sanè aliud est, quàm Abrotonū fœmina. Quodd primùm (vt Dioscorides inquit) arboris speciem quandam repræsentet, vnde & à quamplurimis Cypressus vulgò dicta est. Deinde

quoddam candidantibus constet foliis, circum ramulos minutim incisis, floribus aureis, orbicularis, caulem summum Æstatis & Autumni tempore corymborum modo comantibus. Postremò quoddam in vniuersum suauiter oleat cum grauitate quadam & amaro gustu. Ex hac equeidem delineatione adducitur Marthiolus, vt decernere non dubitet, hanc plantam, quam vulgus (ypressum, siue Santolinam appellat, esse Abrotonum feminam. Hinc itaque Fuchsius errasse credidit, quoddam pro feminei generis Abrotono, plantam subiecerit ab eo longè diuersum. Qui etsi Santolinam seorsum postea depinxit, non tamen eam Abrotoni feminæ nomine agnouit, sed herbariorum (vt arbitratur Marth. vulgus securus, eam Chamæcyparissum nuncupauit, cuiusque nullam à Græcis factam fuisse mentionem falso credidit.

Abrotonum fœminam Camer. in Hist. Matth.
germ. vocat & Epic. vbi præterea ab ipso Chame-
cyparissus, germ. garten Cypress / Ital. Abrotono
femina, Herba camphirata, Santolina, Cypressina &
Crespolina cognominatur, eique meo iudicio non
absque graui periculo eadem qualitates & vires
conceduntur, quæ Abrotono mari debentur. Et
licet hoc loco Abrotoni fœminæ vnus tan-
tùm memoretur, attamen in Horto, duo eius
genera reperiri scribit, quorum vnum vulgare &
candidius ait esse, alterum foliis magis viridibus,
quod etiam admodum culturâ fruticescere tradit.
Reperiri præterea & alias differentias quoque
testatur.

An Turn. par. 1. p. 14. Abrotonum fœmina, An-
gl. lauander corren. *Confusio.*

Gefn. hort. Chamæcyparissus & Centonia Gal-
lorum, si non fallitur. In cat. pl. Abrot. fœmina,
α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω, Cypres fraur / Cypressus Ruel-
lio. Item : Chamæcyparissus, Cypres de jardin.

Tabern. Icon. & Histor. Abrotonum foemina;

Α' β' ὅταν θηῖ, γ' ἐξ ὅταν σκελετωπὸν, θηλυθῶσαν, &
θηλ' ἄμικτο: Abrotanum Siculum, Thelyphtoriū &

C. Bauh. phyt. Abrotanum 1. siue fœmina Dio-
scoridis, Chamæcyperisus Tragi, verùm figura *Tab. mët.*
ipsum nimis lata exprimit folia: Abrotanum
fœmina Lobelii, cuius figuram bis posuit. Abro-
tonum 2. siue fœmina flore maiore, Santonicum

maius Cordi, Seriphium Dioscoridis Abrotoni
fœminæ facie Lobelii. Abrotonum 3. siue fœ-
mina flore maiore alterum maius, Abrotonum
fœmina Salmaticensis 1. Clusii. Abrotonum 4.
siue fœmina flore maiore alterum minus, Abro-
toni fœminæ Salmaticensis primæ altera species
Clusii. Abrotonum 5. siue fœmina odore vn-
ctuosio, Santolina 3. Dodonæi, Vnguentariæ no-
mine Luteriæ collecta. Abrotonum 6. siue fœ-
mina foliis minüs denticulatis, Santolina 4. Do-
donæi, qui notat & alteram differentiam Sabine
folio. Abrotonum 7. siue fœmina repens cane-
scens Santolina 5. Dodonæi. Abrotonum 8. si-
ue fœmina tota viridis, Abrotonum fœmina Sal-
manticensis secunda Clusii.

Non placet nobis corū opinio, vt liberè dica-
mus, qui Abrotonum fœminam volunt: hanc o-
pinionem olim oppugnaui, non visâ nec Dodo-
næi, nec aliorum sententiâ, qui nobis as-
sentiantur. Chamæcyparissus non est *ἡ ἀβρότον*,
sed candidior: non est foliis *λεπτοχέλιον ἀβρότον*
εὐκρίνον: in Chamæcyparisso folia non diuisa aut se-
cta instar Seriphii: non intelligo Lobelii Seri-
phium, quod nulli Absinthio simile, nec etiam
Abrotono vt voluit Matthiolus: quæ similitudo
obsecro Chamæcyparissi speciebus, cum Absin-
thiis vel Abrotono: placet argumentum Dodo-
næi in Chamæcyparisso non esse *ἡ τὰ χαλκία πύ-
ρις αὐτῆς*: sunt enim non plures circa ramulos, sed
singulares in singulis virgulis: mirabilis est o-
pinio D. Leonhardi Kretschneri à Streckenbach
Medici Snidnicii in Silesia, asserentis in epist. ad
fratrem C. Bauhin. contra Matthiolum, non esse
Abrotonum, sed Aristolochiam Clematitim.

Locus &
tempus.

Chamæcyparissum spontè nascentem & sylue-
stem inueni prope Nemaufum inter *Eusan* secus
viam copiosam florentem mense Maio & Iunio,
hirsutis foliis & candidioribus quàm exprimit
Matthioli figura. Satiâ vidi Monspelii, Pata-
ui, Ferrariæ, Bononiæ, Basileæ, Lugduni, Gene-
uæ, vbi Hiemem fert, & alibi in hortis. In horto
Ill. E. C. tantam copiam habebam, vt fimbrias mul-
tas curarem plantandas, quæ aliquot annos du-
rarunt: tandem quadam Hieme omnes plantæ
eum in horto E. C. cum in aliis Montbelgardi, vbi
abundauit, perierunt, ita vt nulla restaret. Anno
1593. ex Allatia allatam plantandam curavi: par-
tim in arcis relictam, partim repositam, quæ de-
terius habuit. Quæ Vnguentaria dicitur, mihi
visâ Luteriæ, vnde etiam à Fratre mihi missa, &
plantata in hortum Ill. E. C. Montb. Abrotonū
fœmina Chamæcyparissos Lobelii in hortis fre-
quens colitur & Galliæ Narbonensis Nemaufen-
sibus vinetis & cæpis patentibus fruticat plurima,
viâ præsertim quæ Monspelium ducit, sesquileu-
ca ab vrbe ad dextram. Seriphium Dioscoridis
Abrotoni fœminæ facie in Galloprovincia mon-
tis celsi D. Magdalene celebris accliuibus quæ S.
Maximum spectat oppidum: redeunt item Ol-
bia maritima vulgo Galloprovinciæ Hyeres di-
cta multum obuium istud Absinthium Lobelii.
Santolina Dodonæi in Belgio omnes peregrinæ
sunt, neque alibi in hortis reperiuntur: primum
genus familiarissimum: reliqua rariora.

Vires &
Vfus
Scabiei.

Abrotoni fœminæ decoctum aiebant Salmati-
censes Clusio, vtiliter propinari ad scabiem pro-
figandam: quod si ita est, proculdubio habenda
est ratio naturæ illorum, quib. darur. Matth.
scribit istius folia sicca, ad sistenda alba fœmina-
rū profluvia conferre, si continuis decem die-
bus aut pluribus sumantur à ieiuniis, & deinde in-
terpolatis diebus. Est autem, authore Dodonæo

Santolinæ semen gustu amarum, potentiâ calidū,
siccūque tertio ordine ventris lumbricos sum-
ptum interimit quotidiano experimento mulier-
cularum, & aduersus eisdem efficax est.

MILLEFOLIUM STRATIOTES pennatum terrestre.

CAP. XXVI.

VBique viarum obuium est Millefolium, do-
drantalibus cubitalibus, & altioribus ramis
surgens, rigidis licet tenuibus, angulosis, hirsu-
tis, lubrubentibus, qui circa summitatem in ali-
quot surculos diuiduntur, atque hi rursus in
plures petiolos, qui flores in umbella ferunt o-
doratos, paruos, colore albos, vel subpurpureos,
quinque, septem, paucioribus, aut pluribus foliis
constantes, ex calyculo squamato: folia pinna-
ta ad costam alligantur, tenuibus Chamæmeli
diuisuris, sed compositioribus, rigidiusculis, sua-
ueolentibus, gustu acriusculo: radix lignosa
& fibrosa nigricat. Millefolium maius purpu-
reo pulcherrimo flore ex horto nobilis ab Ha-
genbach attulit Hortulanus Ill. E. C. quod ob co-
lorem, qui summè intuenti arridet, plantauit:
Hoc fortè idem cum rubro Clusii, de quo po-
stea, & C. Bauhin. purpureo magno.

Descriptio

Stratiotes millefolius (*στράτιotes χιλιόφυλλον*)



ita describen-
te Dioscoride,
pusillus: est
frutex, palmi
altitudine, aut
etiam ampli-
us assurgens:
habens folia
pulli pennis
similia (notè
στράτιotes pro quo
vet. *στράτιotes*, alii
στράτιotes,
i. cit., recenti
ac tenellæ Fi-
lici.) Sunt au-
tem foliorum
exortus *αἱ ἐκ-
έρχοντες*, pro ai
vet. legitur] breues admo-
dum & incisus
ris diuili. Fo-

lia maximè Cuminum agreste tum breuitate, tum
etiam scabritiâ [*αἱ τὰ τῆς χιλιόφυλλον*, quibus vetus ca-
ret] simulant, sed sunt etiamnum breuiora paul-
lò, densiore pleniorque umbella. Surculos in
cacumine gerit exiguos, in quibus umbellæ in
modum Anethi, flores paruos candidique.

Plinius de hoc Millefolio inquit: Etruria hoc
nomine appellat herbam in pratis tenuem, à la-
teribus cappillamenti modo foliosam: eximii
vius ad vulnera: Boum neruos abscissos vomere
solidari eâ, rursusque iungi addita axungia,
asserians.

Oslanderunt Herbarii pro Millefolia stratio-
re ætate Marcelli, colicolum breuib. & exiguis
foliis undique vestitum. Responderuntque hi-
storix Dioscoridis omnia, exceptis umbellis, quas
author dicit Anethi modo in summo eius esse.
Quos enim Marcellus vidit flores magis longi-
uolens

Profluvia
alba

usculis pediculis pendentes sunt, quos credit esse, quæ Dioscorides *καρφία* (festucas vocat, & quibus umbellam sustineri ait. Sed singuli potius flores quasi in umbellâ plures congesti sunt. Cætera, ut existimat, egregiè respondent. Nulla est (fallit Marcell.) quod meminerit, Stratiotes millefolia Plinio: siquidem nullam hoc nomine descriptam in eo indenerit. Græci hanc Stratiotem millefoliam notis ab alia discreuerunt: terrestrem hanc præsentem appellant, quæ præter humorem & frigus habeat aliquid, quod adstringat; aliam verò, de qua suo loco, aquatica nominâtes, quæ frigefaciat & huñcet.

Matth. in Diosc. duas ponit figuras maioris & minoris, nec in contextu aliter, quàm magnitudine tantum distinguit.

Hæc Lob. in Ada. p. 111. sub duobus diuersis titulis, quorum prior est, *Militaris terrestris*; alter, *Militaris siue Millefolium*, flore albo, purpureo & luteo. In Obs. p. 420. & in Ic. Plin. p. 74. ad us quoque exhibet figuras: priori titulum fecit, *Millefolium terrestre vulgare*, *Stratiotes millefolium* Dioscoridis. Alteram inscripsit, *Millefolium terrestre purpureis floribus*.

Quam Ruellius magno errore Achilleam (*Ἀχιλλεύς*) esse credidit, inquit Cord. in Dioscorid. est sine dubio illa herba, quæ à Dioscoride *χιλιόφυλλος ὁ στρατιώτης*, & hodie ubique *Millefolium* vocatur. Cordus in Hist. descr. bit, & Stratiotem terrestrum maiorem appellat. Gesn. verò alius figura addidit, & in titulo posuit *Millefolium terrestre maius*, *Trigon Millefolium* nobile videri nuntiare, Et licet Cordus minorem quoque tradat & describat speciem; neutrum tamen *Millefolium Cordi*; est *Millefolium nobile Tragi*, quod Cordus Achilleam vocat.

Gesn. in cat. pl. Achillea, *Ἀχιλλεύς*; Item *Millefolium*, seu *Millefolia Hetruria*, & *μυρριόφυλλον* dicitur: quam aptè autem, videant alii. Trago *Millefolium* vulgare *Stratiotes* est terrestris apud Dioscoridem.

An Hermol. Cotoll. 647. *Sideritis* 4. siue *Achilleos*, quam nonnulli *Panaces Heracleon* appellant, & *Hetruria Millefoliam* vocat, herbam in pratis reuertem, eximii vsus ad vulnera. *Achillios* & *Achillion* vocatur quarta *Sideritis*, & à Lat. quibusdam *Lumbus veneris*: Dioscorides *Supercilium Veneris* non *Lumbum*, dici voluit, alterutro errore orto, quod Græci *ἰσφόν* *Lumbum*, & *ἰσφόν* *supercilium* appellant.

Eadem hæc Hermolai verba recitat Ruellius, eum tamen non citat; more suo cuncta pro suis venditans. *Achillion*, inquit, *Sideritis*, alii *Heracleon*, Romani *Supercilium Veneris*, aliqui *Militarem* & *Millefoliam* esse appellant. Hanc nonnulli *Panaces Heracleon* vocauere, nostri propriè *Millefoliam*. Cætera habet eadem quæ *Barbarus*.

Lonic. lib. 5. cap. 113. *Garben* aut *Schaafrisp*/duplex: maius *feldgarben*/großgarben, groß *Schaafrisp*/Græcis *Ἀχιλλεύς*, Lat. *Achillæa*, quibusdam *Veneris supercilium*, & *Veneris lumbus*: minus, *Garben*/Schaafrisp/Schaafragarben/feldsen/Græcis *στρατιώτης*, *χιλιόφυλλος*, Lat. *Militaris herba*, quibusdam *Millefolium*. Hæc duæ plantæ sunt vnius generis: vni flos rubet, alteri albus est: mas excresecit cum summatibus albis, sæmina manet parua & dicitur *Schaafragarb*: est præterea parua, quæ dicitur *Tausentblat*, *maffersbannen* & *wassersenchel*/Græcis *μυρριόφυλλον*; vulgo *Millefolium*. *Lonicernus* tres

Tom. III:

proponit vnius plantæ figuras: nec tamen suis descriptionibus bene distinguit: & ut verum fatear confundit suo more omnia: in posteriore descriptione fortè etiam miscet *Polygonum* *fæminam*.

Theod. Dorsth. p. 190. duas icones habet *Millefolii stratiotes*, sub his nominibus: *μυρριόφυλλον*, *Lonic. ner.* *Millefolium Veneris*.

Casp. Bauh. Phyt. *Millefolium* 2. siue maximum album, *umbella alba* ex horto Patauino, foliis duplò latioribus, quàm sint vulgatis, *Millefolium* 3. siue vulgare album *Millefolium* album, Brunfels. terrestre *Lobelio*: flore candido & subalbido. *Millefolium* 4. siue vulgare purpureum minus, *Millefol. vulg.* flore d. n. r. ruboris *Trago*, terrestre purpureis floribus *Lobelio*: Huius speciem proponit, sed sine icone *Tabernaemontanus*. *Millefol. 5.* siue vulg. purpureum maius, Gœpingæ in horto quodam collectum est, hoc vulgari albo simile quidem; sed ad binos ternosque cubitos excresecit, foliis ut in purpureo minore dispositis, umbellâ magnâ, floribus elegantissimi coloris.

Cluuius pro *Millefolio rubro* colore iconem proponit, quæ apud Lob. in Ic. Pl. p. 747. est pro purpureo.

Millefolium etiam nunc vulgè appellatur in *Hetruria*, *Cæsalpino* teste, in cæteris si nilis *Achilleæ*, sed foliis in longitudinem productis. *Dioscorides* pulcherrimè foliorum figuram expressit, *Cumino siluestri* comparans: si per *Cuminum siluestre* intelligamus *Anni*, quod inter *Cumini* genera recensetur à *Dioscoride*, cuius descriptio paruo *Millefolio* cõgruit, non magno: ut hinc colligere liceat reliqua genera *Millefolii* ad *Achilleam* pertinere. In paruo hoc *Millefolio* reperiuntur flores albi & purpurei, auctos autem non vidi, ait *Cæsalpinus* in *Tanaceto*, quod cum *Millefolio* maxime conuenit.

Hoc duplex *Millefol.* vocat *Schauenckf.* *Millefolium* terrestre album & purpureum.

Sed ut ad eum, quem transiimus, reuertamur, *Dodonæum*. Exhibet iis *Lobeli* vtramque iconem his titulis: *Millefolium siue Achillea*. Et: *Millefol. purpurei floris*. Cæterum, vnicâ descriptione, vtrumque delineat, ac ait. A recentioribus appellatur *Millefolium*. *Dioscoridis* est *Ἀχιλλεύς* & *Ἀχιλλεύς στρατιώτης*, Lat. *Achillea*, & *Achillea Sideritis*, quod conferenti hanc cum *Dioscoridis* descriptione, vel luce clarius est. Inuenit hanc, testè *Plinio*, *Achilles* d. *scipulus Chironis*, quæ ob id *Achilleos* vocatur, alii *Sideritis*, apud nos *Millefolium* vocant. Sunt tamen & alie *Sideritides*, aliud itè *Panaces Heracleon*, de quibus alibi. *Apuleius* varias huius appellationes adfert, quarum quardam inter nomenclaturas nothas apud *Dioscoridem* quoque extant ut, *μυρριόφυλλον* [aut *μυρριόφυλλον* *χιλιόφυλλον*, *στρατιώτης*], *χρυστή*: Lat. *Militaris*, *Supercilium Veneris*, *Acum*, [aut *Acorum*] *siluaticum*: *Gallis* *Bellocandum*, *Vigentiana*: hac ætate *Germani* *Garben* appellant/*Scharffgras*/*Scharffrip* [alii *Schaffgarb* & *Schaffrip*, r. litera omissa, malè meo iudicio] *tausentblat*, & ut *Wirsung*, in indice *Gerwol* & *Schabab*) *Belgæ* *Gerume*: *Galli* *Millefeuille*: *Hisp.* *Milbaya yerna*; *Itali* *Millefoglio* & *stratiote Millefolio*: *Angh* *yarrowe* nosse *bledc*: *Bohemi* *Rzebricef*: *Hungari* *Egbesfart*/h. e. *Muris cauda*.

Passim *Montbelgardi* prouenit flore albo & purpurascens; etiam in horto *Ill. E. C.* sponit

natum: flōrens adhuc Septēbri obseruari Monspeli: Genēx virentem Februarii principio, florentem Iunio & Iulio: Bailex adhuc Octōbri inter portam cineream & lapideam extra urbem, ad ripam Birsæ: in vrbe florentem Iunio Iulio & Augusto: multum serpit: asparagi acres sunt, vt in Petrinica Fuchsi. Album in Silehiæ pratis & agris plusquam notissimum: à Maio in multam ætatem floret: dilute rubens passim inter segetes, iuxta aruorum, pratorum, ac hortorum margines. Stratiotes Millefolium Dioscoridis nascitur in agris subasperis, præcipueque secus vias.

Vires

Herba est, authore Dioscoride, eximii vsus ad profluentem sanguinem, vlceraque tum vetera, tum recentia, atque etiam fistulas. Stratiotes terrestres, inquit Galenus, etiam quid adstrictionis habet, vt ob idem etiam vulnera glutinare possit, & vlcibus utilis esse. Quidam verò ipso etiam ad sanguinis eruptionem vtuntur & ad fistulas. Quod porro Millefolio sanguis è naribus irriteretur, astrictione contingit. Millefolium terrestre album, vt testis est Schvvenckfeldius, siccat, adstringit, & consolidat recentia vulnera. Herba recens tusa pubique illita mensium abundantiam compescit. Umbella candida ex lacte caprillo, vel propria aqua pota gonorrhœam in viris, in feminis alba vteri excrementa cohibet. Millefolium terr. purpureum valet

Menses.

Conuerſas

Dysenteria

Millefolium

Dentium dolor.

potum ad omnes sanguinis reiectiones commodèque dysentericis infunditur. Aqua stillatitia contra pestilentiam utilis. Scribit Matthioli dari vtiliter Millefolii succum ad sanguinis reiectiones. Idem præstare sicci farinam ex symphiti maioris, aut Plantaginis aqua potam. Eandem naribus inditam sanguinem inde fluentem sistere. Mirum in modum conferre eiusdem farinam ad sanguinis mictum, si vncie pondere cum Armeniæ terræ drachma ex vaccino lacte potui detur ieiunus: diebus tribus continuis: idque valentiùs efficere, si cum Corallio, Succino & Eboris scobe propinetur. Commanducata folia præsertim recentia dentium dolorem mulcere: idem efficere commanducatam radicem & diu sub dolente dente retentam. Dari herbæ decoctum cum Labruscæ floribus vtiliter potandum contra vomitum.

Millefolium Alpinum Clusio, paruum, nonnihil incanum, carneum.

Descriptio

Elegans est hæc plantula, dodrantalem, siue palmarem altitudinem non excedens, multis foliis circa radicem stratis, tenuissimè incisis, & veluti è multis minutissimis alatis foliolis constantibus, nonnihil incanis: candicantes cauliculi, satis crassi, huiusmodi foliis, iisque minoribus, & tenuissimè incisis obsiti: umbella flosculorum densissima, qualis in vulgari Millefolio, sed dilutiore rubro colore siue carneo nitentium: radix vix à vulgari differt, fibrosa admodum, & summâ tellure serpens.

Synonyma

Ab hoc tamen Millefolio Alpino Clusii in Pannon. p. 562. & Hist. post. pag. 331. differre visum est, quod in hortis alebat, cum in Belgica viueret, simili propemodum flore.

Millefol. illud Alpinum dicitur C. Bauh. Millefol. Alpinum incanum carneo flore.

Locus.

Spontè prouenit in Judenberg & Spital, Stiriz Alpibus, flores proferens Augusto: natalesne causa sint istius varietatis, an cultura, nequit Clusius.

MILLEFOLIVM ALPINVM INCANVM

flore specioso.

Palmaris est plantula, radiculâ simplici, ruffâ, ac penè nigra: è qua folia produnt duas aut tres vncias longa, rariùs pinnata, tomentosa, longiusculis ac serè vncialibus pediculis hærentia: Coliculis tomentosis item prædictis similia quoque hærent folia, sed aliquantò minora, breuioribusque pediculis donata: Eorum verò summitatibus flores



insident quinque aut sex, squammati, corymbati, vti ex sicca colligimus. Squamæ fuscis venis insignitæ florem speciosorem reddunt.

Legit Clariss. Platerus in Valesiæ montibus, ex cuius prototypo figuram nostrâ damus.

MILLEFOLIVM TOMENTOSVM

luteum.



Dodrantal est herba, multos ex radice crassa, durâ, repetè, fibris Heliebore æqualibus, quibusdâ minoribus, colore nigricante aut cinericeo foris, intus flauo, sapore dulcibus (in sicca planta) præditis donata: caules plures emittit rectos, satis robustos, in quorum cacumine

Descriptio

micant florum umbellæ Millefolii vulgaris terrestris, aureo tum foliorum, tum umbilici colore fulgentes: folia per coliculos tomentosos, Millefolii Stratiotis, sed multò minora, minutiùsque incisa, incano villo pubescentia. Tale est Millefolium Narbonense.

Simile si non idem dedit frater C. Bauhin. nomine Helichrysi, ex Tyrolensi ditione delat. Minus prædicto est, foliis non ita tomentosis, caule tenuiori, umbellâ magis diuisâ, capitulis minoribus ex longioribus pediculis dependentibus

bus, floribus luteis, qui pulchrè referuarunt colorem pluribus annis: an loci ratione differat à nostro asserere non ausim: accedit ad figuram Matthioli quamvis minor sit planta quam siccam habemus.

Tanacet.
lanuginosum
Dactyl.

Dalechampius Monspeulanum meum Millefolium vocabat Tanacetum lanuginosum. An Clusii in Hist. & Hist. post. Stratiotes millefolia luteo siue flauo flore?

Millefol.
minus siue
Stratiotes
Chelidophyl.
los. Dodon.

Dodonæus eadem plantam cum Clusio pro Stratiote Millefolio exhibet, quam ita cognominat. Millefolium minus, siue Stratiotes Chelidophyllon. De hoc autem ait. Rarius huiusmodi Millefolium reperitur: gignitur autem pingui ac lato solo, & subinde in pratis; Augusto mense flores eius præcipuè conspicui.

Synonyma

Gelærus ad meam plantam Monspeulanam adscripsit esse Stratiotes millefolium Dodonæi. Idem nunc hunc Millefolium luteis floribus à Dodonæo depictum nuncupat; Matth. in post. comm. cum mag. fig. lat. & ital. Helichrysum alterum; Camer. in Epit. & Hist. Matthioli. German. Helichrysum italicum; quod plurimum in Italia proueniat, & iisdem sic facultatibus præditum, quibus Helichrysum Dioscoridis; In horto, Helichrysum italicum Matthioli, Millefolium luteum; Lob. in Ad. ierf. Militarem, siue Millefolium luteum (& ita quoque in Obs. p. 43. v. b. & Achilleum luteo flore Clusii, & Icon. Plantar. p. g. 74. l.) Hist. L. gd. p. 77. Helichrysum italicum Matthioli; C. Bauh. phyt. Millefolium 7. siue luteum tomentosum.

Td. m.

Tabern. Ic. p. 137. Millefolium luteum, Geel garben; Hist. p. 163. Millefolium 4. luteum; Item Icon. p. 127. Heliochrysi altera icon [titulus transpositus, verior est Heliochrysum 2. Italia- nisch Goldb. um] Hist. p. 456 Heliochrysum 2. Icon Heliochrysi est ex Matthiolo: Tabern. non animaduertit esse Millefolii speciem: eam iungere debebat Millefolio luteo, cum quo eadem; aut eius saltem species.

Grand. la-
Bau.

Gerardo dicitur Stachas citrina. Is ineptè posuit iconem Tabernamontani Heliochrysi 2. pro Stachade citrina.

Locus &
tempus

Millefolium tomentosum obseruavi mense Iunio inter Nemausum & Valentiam. Nisi me impedirent notæ quædam, parum abesset, quin hanc pro Chrysocome exhiberem. Hoc in Tyrolensi comitatu cum Italiam peteret, collegit frater C. Bauhinus.

Chrysocome

MILLEFOLIVM CRETICVM.

Descriptio

Peregrina elegantia conspicuam hæc plantam etiam exercitatores Botanologi Chamæcyparissum esse dicerent. Et nos in ea dignoscenda primo decepti obcuri. Surculi quos hinc adseruamus pedales ferè sunt; incana lanugine toti vndique cum ipsis foliis obiti; ramulorum ac foliorum, ut dictæ Chamæcyparissi diuisuræ. Folia minutius dissecta ad costam hærent. Segmenta rursus in alia, minus tamen profunda diuisa. Vnde nomen illi inditum esse facile est conicere. Folia & segmenta temporis progressu in se retracta, caudæ Scorpionis in modum incuruantur. Florum corymbi in umbella positi, exalbidi, maiores quam in Millefolio vulgari. Sapore est amaricante, aromatico, ad Sanronici, seu Seminis contra vermes officii.

T. om. III.



prouenerat ex semine missò ex Creta nomine Millefolii veri per insignem Botanicum & Medicum Honorium Bellum.

MILLEFOLIVM ALPINVM.



quantum hirsuta.

Huic similis ac parum differens planta quibusdam lva Moschata, dicta montana, de qua capite sequenti.

Clusius suum Parthenium quod idem existimamus cum Millefolio nostro Alpino, ex quo etiam iconem proponimus, sic describit, tam in Hist. Pannon. quam in postrema. Multis ex fibrosa radice, Chamæmeli modo, fruticat ramulis, pedibus, viridibus, quos ambiunt folia Anthemidi prorsus similia, multiplici incisione diuisa, Cotula aut Matricariæ ferè odore, gustu calido, attamen non ingrato: extremis cauleculis multi flores insident umbellam congesti, Abinthii Alpini, quod post hac describemus, floribus proximè accedentes, hoc est, exigua capitella ex albo & pallido commixta, ambientibus ea senis aut octonis latiusculis albis foliis, eiusdem cum ipsa herbæ odoris: rami siue cauleculi humi procumbunt, & ex vna, ut dictum, radice prodeunt.

cinis dicti, saporem accedente.

C. Bauhin. phyt. dicitur Millefolium seu Creticū, quod in horto Magni Ducis Hetruriz, Florentiæ creuisse, & à Doctore Paschali Gallo accepisse ait. Mihi primum visum Basileæ in horto D. Jac. Zvingeri, virescens Nouembri, sed repositum, cui

Alpinum Millefoliū Militari siue stratiote minus est, paullo palmā longius, foliis con- sistens, umbella in caulis fastigio minore, cuius tamen flores singulares, quadruplo quintuploque maiores, foliis in ambitu radiatis, magnis, albis, apicibus in medio luteis, ex capitulo squarroto, nigricante, simbrato: planta ali-

res, subinde fibras agunt, & noua germina procreant. Hanc plantam montani venatores Vnser Frayß schwarz Rauch nomine donant, ad Ablinthii Alpini umbelliferi, de quo postea, differentiam, quod weiß Rauch appellant. Parthenium Alpinum Clus. vocat, à Dioscoridei Parthenii odore, ad cuius etiam descriptionem accedere videtur Clusio.

C. Bauh. Phyt. dicitur Matricaria 5. siue Alpina Chamæmeli foliis.

Locus & Tempus.

Millefolium Alpinum in peregrinatione Rhetica cum Gesneto inueni in monte prope mesen. Parthenium Alpinum Clusii inuenitur in Schneberg, Schnealpen, & Durrenstein iugis, magnâ copîa: floresque duntaxat Augusto: nam cum in accliuatibus, & circa serobes nascatur, quas diutius insidere solet nix, serius illud florere necesse est. Saepè illud cicurare voluit Clusius, translatum è loco natali plantis cum suo caespite, & in hortum illatis: sed ultra alterum annum non permansit: licet cominodo & naturæ eius apto loco reposuisset, & omni sollicitudine curasset.

MILLEFOLIO ALPINO AFFINIS PLANTA, quibusdam sua Moschata.

CAP. XXVII.


D Vos aut tres pollices alta est, paullo etiam amplior, *colicula* iuncto, simplice: foliis vestito Millefolii Alpini, licet non hirsutis, nec ita ad Millefolium vulgare accedentibus: flores plures quam Millefolio Alpino, umbellati, sed minores, rotatiq; agmine foliorum alborum magnorum circumposito, apicibus in medio numerosis, ex capitulo squamulis nigris Alpini Millefolii in modum compacto.

Millefolio affinem plantam voco à me collectam anno 1565. in Rhetia altissimo monte Braulio, florentem mense Iunio, quam tunc Iuâ Moschatam denominaui. Iconem huius adiecimus figuræ antecedenti à Clusio propositæ, eamque notauimus numero II. Rhetis insubria finitimis, Gesn. de hort. teste, dicitur Iua Moschata, & herbula montana Tanacetum cognata.

ACHILLEA MILLEFOLIA ODORATA.

CAP. XXVIII.

Descriptio



Millefolio terrestri cognata est Achillea, sic ut non omnibus obuium sit discriminem, *virgis* fruticat aliquando tricubitalibus, nonnunquam palmaribus, striatis: folia Millefolii vulgaris, seu terrestris, sed latiora, breuiora, multifida, colore non ita viridi prædita, sapore amaro, odore

valido aromatico: umbellas fert *corymborum* Millefolii iam dicti, foliolis candidis mediæ orbem aureum cingentibus: *radix* lignosa.

Hanc Dioscorides ita tradidit. Achilleam sunt qui etiam Sideritim vocent. Gerit autem scapos dodrantes, aut etiam maiores, fusorum ethigie, foliis circumdatos minutulis, ex obliquo crebras habentibus incisuras, Coriandro proximis, subfuluis, lentis (*χαίρα*, quâ voce vet. caret) odore multo, non insuauis, sed medicato: umbellam verò in cacumine rotundam, floribus candidis & aurum æmulantibus (*χρυσόχροα* addit vet.) Læto solo prouenit. Achillion inter nomenclaturas spiritus quidam Myriomorphon, quidam Chiliophyllon, quidam Stratioticen, quidam Sideritim Herculeam, & quidam Achilleam Sideritim vocant: Aphri Asterchilloth: Romani Supercilium Veneris, Siluestrem Acorum, Militarem herbam, & Millefolium.

Achilleos, inquit Plinius, ab Achille dicta est, Chironis discipulo: quia vulneribus mederetur: hac enim sanasse Telephum dicitur. Hanc apud nos Millefolium vocant, cubitali scapo, ramosa, minutioribus quam Fœniculi foliis vestitam ab imo. Aliud tamen idem Plinius Millefolium vocari in Hetruria testatur in pratis nascens, de quo antè dictum c. de Millefolio Stratiote pennato terrestri. *Achillea* herba, ut dictum, ab Achille primo eius inuentore, in Thessalia Centauri Chironis discipulo, sic dicta, quâ vulneribus medebatur, ne tantum in cuspide sua laudem & honoris titulum sibi perpetuum compararet. Nouerat is herbam minoribus quam Fœniculi foliis vestitam, ideoque *Chiliophyllon* [Millefolium] à multis vocatam: eandemque Stratioticen (*Militarem*) quod in castris & bellis multus eius usus esset. Nouisset etiam si tempora passa essent dicta à Romanis *Supercilium Veneris*, propterea quod, ut in ea parte humani vultus crebris pilis vestita veluti linea est, sic in Achillea herba minuta folia capillamenti modo caules eius vestiunt. Dixit hætenus Marcellus, quæ satis ad hanc historiam fore credidit. Cæterum, quæ ad eam complendam facere poterunt, ex aliis adscribemus.

Qui vulgaris usus Millefolium Achilleam esse existimant, inquit Matthiol. qui Achilleæ nomine eam describit & depingit, haud dubie meâ quidem sententia decipiantur. Siquidem id folia non profert crebris ex obliquo sectionibus, Coriandri similitudine, sed auicularum pennas æmulantia. Porro tametsi constet, Millefolium umbellâ coronari modò albâ, modò purpureâ: modò aureâ: non tamen propterea colligendum est Millefolium, & Achilleam vnam & eandem herbam esse. Quandoquidem non putauerim ego fuisse Dioscoridis institutum (ut Ruellio placet) quod hæc Achillea umbellam ferat candidam, illa verò purpuream, alia denique auream: sed quod omnibus in vniuersum Achilleæ plantis eadem infir umbella, quæ tantum prædictis coloribus distincta spectetur. Atque in hac persistam sententia, plantam hinc exhibitam esse legitimam Achilleam donec quis certiorum protulerit: quod hæc mihi planè omnibus notis Achilleam Dioscoridis repræsentare videatur. Cæterum in hunc fortè errorem ut crederent Stratiotes Millefolium esse Achilleâ, illos deduxit Plinius, qui l. 25. cap. 5. Achilleam Latinis Millefolium vocari tradit. Verum tamen is, quantum videre est eo in loco, non Achilleam hanc adscribit, sed eam omnino plantam, quam Dioscor.

Achillea
Matth.

Achillea
Matth.

Ruell. met.

Est Achil.
Diosc.

Dioscorides Myriophyllum appellat. Quare paulo post hæc uerba subiunxit. Sed alij, inquit, fatentur veram Achilleam esse scapo cæruleo, pedali, sine ramis, ex omni parte singulis foliis rotundis eleganter vestitam. Ex quibus verbis apparet dubitasse Plinium, qualis legitima esset Achillea: & ideo ita indeterminatè locutum fuisse, ut nihil in eo perpetuum statui possit. *Serapis*, autoritate Constantini Achilleam, quod [ut ipse ait, licet falsò] rubrum succum fundat, Sanguinem Draconis appellat. Sed fortasse hoc interpretis lapsu factum est. Siquidem succum rubrum fundere Achilleam non tradidit Dioscorides neque etiam [ut omnes compertum habent] lacryma, quam officinè Sanguinem Draconis appellant, herbarum succus est, sed Arabicæ cuiusdam inagnæ arboris gummi, vel, ut aliqui volunt, Draconis animalis est sanguis ab elephante colligi. Planta Græcis *Ἀχιλλεύς*, Lat. pariter & Italis Achillea vocatur: Arabib. Sichteris, & Egilosteius verò succus Demalochorten. Hactenus Matth.

Si in Thesalia Chironem illum laudatissimum Medicum, nec non & Achillem militem fortissimum videre contigisset Trago, non dubito quin ex illis verè Stratiotis, & Achilleæ nomina & vires addiscere potuisset. Quod quia denegatum illi fuit, inconsideratè sanè dixit, Nobile Millefolium [sic enim Achilleam millefoliam odoratam appellat] esse verum *χρυσόφυλλον*, seu *χρυσόφυλλον*, h. e. Millefolium, cuius in bellis olim sanandis vulneribus magnus fuerit usus, quodque Dioscoridi *στράτιotis*, & *εγίλοις*, h. e. Herba militaris, Millefolium, & Supercilium Veneris dicatur: & Plinius Panacem Heracleon, & Sideritim, & Millefoliam vocet: & Apuleius Melophyllum Chrysitum, Ambrosiam, Acorum filanicum, Vigentianam, Bellicocandium, & Diodelam à quibusdam appellatam tradat. Esse qui Arabicè Relicammolodictam contendunt. Si Achillem, inquam, Trago videre contigisset non tot nomina, & facultates diuersarum plantarum miscuisset.

Achilleam esse reuera Millefolio terrestri cognatam plantam contendit Cord. in Dioscoridem. Dodonæus gill. hanc Tanacetum minus, *Arbana sie blanche*, inscribit.

Quò citius, inquit L. belius in Aduers. quivis nosse queat, vel ab intuitu solo (quàm in recentiorum vel intempestiuas, vel salebrosas, vel confusissimas pedicas impingat) quid distet Achillea hæc Sideritis à Militari [rectius quàm à Plinio Millefolium] vocata, sic discernat: Achillea hæc multò procerioribus est scapis, numerosioribus, pedem & cubitum altis, & foliis tenuioribus, magis ac profundius incis; Artemisiæ tenuifoliae similitudine, muscaria congesta gerentibus, pusillis flosculis, dense numerosis, & quam Militaris maioribus, albidis, odorem medicatum spirantibus, Artemisia vel Matricariæ, cui etiam similis est, in æstatem duratura: radice fibrosa, lignosa: tota odore & sapore Matricariæ, sed minus amaro. Prædicta inibi habetur sub titulo hoc, Sideritis Achillea, lutea, odorata, Alba purpurea eadem. In Obs. p. 430. Sideritis Achillea Dioscoridis, Stratiotes Millefolia Dodonæi editione vernacula. Videat lectores an Dodonæus [ut Lob. vult. hanc intellexerit. meo iudicio intelligit aliam, nempe Millefolium luteum. In Icon. Pl. p. 750. Tanacetum minus candidis floribus.

Tabern. Icon. Achillea, Millefolium nobile, Tom. III.

Edelgarb/weisser Reynsfahrn. In Hist. Achillea 1. de qua ait. Non parum aberrant qui existimant Millefolium vulgare, veram esse Achilleam. Nec refert quod binæ hæ plantæ aliquam similitudinem in viribus habeant: ad euitandos plures & gravioris errores, præstat unicuique herbarum proprium suum nomen, quo à Veteribus appellatæ fuerunt, adscribere. Vocatur hæc græcè *Ἀχιλλεύς*, & *Ἀχιλλεύς Σιδιρίτης* & *Μυριόφυλλον*; latine Achilleia, Achillea, & Achillea Sideritis, Myriomorphum, Militaris; à Botan. Millefolium nobile; Arab. Egilos; Ital. Achillea; Africè Asterchilloch; Flammantis Veldgerwe/Germ. Edelgarb/feldgarb / & weisser Reynsfahrn.

C. Bauh. phyt. Tanacetum 5. sine minus: Candidis, purpureis, & aurum æmulantibus floribus dicit Matthiolus, cui Achillea, nec malè. An hæc sit Scopa regia Plinii lib. 21. cap. 6. frustra querit Frater.

An Cæsalp. Achillea, quam quosdam Fusum agrestem, sanguineum Succum, & Abrotanum siue stre vocare scribit? Se autem Sanguineum succum in ea planta quæ pro Achillea ostenditur nunquam animadvertisse iradit.

H. Lugd. p. 772. Achillea Sideritis Matthioli. Item p. 936. Tanacetum minus candidis floribus Lobelii. *Vnus* plantæ binæ descriptiones & figure diuersis titulo & loco.

Camer. in Epit. Matth. Achillea. In Hist. german. Millefolium maius, Stratiotes millefolia.

Achillea Montbelgardi in horto E. C. sata feliciter provenit: eam ego reperi inter Basileam & Hagene; & florentem prope prædium D. Plateri mense Augusto & verius Ormarum mense Septembri: Genevæ toto anno virentem in horto habui ubi primo anno caulem protulit, floruit Iunio & Iulio, semen maturuit Augusto: in Gallia Narbonensi inter Nemausum & Valentiam reperi secus vias florentem Iunio, parvam, foliis hirsutis & albidis; copiosam etiam reperi Patauii supra muros internos urbis & in montibus Euganeis inter Arqua & montem Gemulæ: Vidi etiam Lutetiæ. Frater C. Bauh. attulit mihi nomine Camphoræ Bononiensium. Solum in aruo edito amat pingue & lætum, cuiusmodi in Italia Romano & Tusco agro; & non procul Rioli, Pedemontis: Et passim etiam Galliarum Lugdunensis ac Allobrogum.

Coma huius trita, ut tradit Dioscorides, cruenta vulnera glutinat, & inflammationem arceat; sanguinis eruptiones inhibet, & eas quæ ex utero fluunt apposita in pello. Sed & decoctum ipsius paratur ad infensus mulieribus fluxione laborantibus. Bibitur ad dysenteriam. Quidam, inquit Galenus, vocant Achilleon Sideritim, quæ proposita quidem viribus non est dissimilibus; cæterum adstrictione exuperat. Quare ad sanguinis eruptiones, dysenterias & muliebrem profluvium congruit. Cæterum viribus est Sideritidis non dissimilibus.

PARTHENIVM *Παρθένηον*. CAP. XXIX.

H Erba hæc est sesquipalmari altitudine, radice parvâ, lignosâ, candidâ, parum fibratâ, ex qua cauliculi aliquot exungunt rotundi, aliquantulum rufescentes, in quibus, imâ præsertim & terræ vicinâ parte, folia sunt tenuia;

sceniculacea, foliis Abrotoni similia, vt ouū ouo magis simile non sit. In summis cauliculis umbellæ, & in iis st. sculi multi, albi, compacti, quales in vulgari Millefolio cernuntur, vt inspiciētes primā fronte facili deludat, Millefol. esse iudicatu- ros.



Plantæ sapor amarus est, & odor grauis, similis vulgari Parthenio, quod Matricariam vocat. Quare congeneres esse plantas Myconus putat. Et quia huius folia parua sunt cum vulgaris Parthenii [id est, Matricariæ] foliis comparata, existimat, si Veteribus planta hæc nota fuerit, Parthenium esse *συκερ- φυλλον*, cuius meminerit Hippocrates (licet non desint qui Cotulam fœtidam id esse velint) his verbis. Herba est paruis foliis prædita, cui nomen est Parthenium *συκερφυλλον*. Hæc verrucas de pudendo tollit. Quamquam id non asserit Myconus, sed doctis æstimandum relinquit. Quis enim sit eius vsus, & quo nomine ab incolis nuncupetur, nondum scire potuit.

Huius figura extat apud H. Lugd. pag. 954. hac inscriptione: Parthenium *συκερφυλλον* Myconi, restaturque hoc ex Hispania primò delatum. C. Bauh. Phyt. dicitur Matricaria 6. huc foliis Abrotoni maris.

habere discutiendi, & leuiter inflammatio- arcendi (legunt quidam *διφλεγματικῆ*, leuiter v- rendi, & inflammandi, quod conuenit voci Dioscoridis *πυροπικῆ*). Quæ vis contraria videtur ei quam Dioscorides *πυροπικῆ* dixit, id est, feruidâ & inflammantem. Quidam legendum censent, vt Sarracenus, *πυροπικῆν*, ad fots vtilem. Et hæc varietas alicui ambiguitatem parere posset, an Dioscorides & Galenus de eadem planta loquuti fuerint, præsertim cum etiam hodie dubitetur, imò controuertatur, quæ omninò illa existat. Cõsideratione tamen dignum hoc, an legi possit *πυροπικῆν*, calore fouentem, quâ lectione fortè tol- letur omnis difficultas.

Agerati nomine, quod sciam, donatæ sunt se- quentes plantæ. Herba Iulia à plerisque existima- tur Ageratum, de quo Veteres verba fecerint. Non rati etiam inueniuntur, qui pro Agerato Veterum, aliud Agerati genus tradant, minus ac etiam album. Ageratum purpureum Dalechã- pii, genuinum esse non credimus, sed alterius ge- neris plantam statuimus. Manifesto, in errore versantur, qui Stæchadem citrinam Germanicâ, volunt verum Ageratum. Nec minùs à vero aberrant ii, qui per Stæchadem citrinam angu- stifoliam Ageratum verum intelligi volunt. Oc- currit apud Hist. Lugdunensem planta quædam Stæchadi citrinæ athnis, quæ ab ipsa Ageratum aliud quorundam p. 778. cognominatur. Ageratum ferulaceum Dalechampi à superioribus diuersum esse, cognosceret is facili, qui descriptio- nes contulerit. Ageratum, aurbore Trago, sunt nonnulli imperiti, qui Thymbra vocent. A Marcello Virgilio, eodem Trago teste, Agerati nomen Satureiæ tribuitur. Marinelli Agera- tum, in mesuem de purgantibus, quod non abs- que ratione fortè reicitur à Matthiolo, Lectori- bus quale sit considerandum proponimus.

Ageratum plerisque.

Ageratum minus.

Agerat. purpur. Stachas ci. trina germ. sine latifol. Stach citr. angustifol. Stach citr. affinis.

Ageratum ferulaceum.

Thymbra

Satureia Ageratum Marinelli.

AGERATVM VETERIBVS.

CAP. XXX.

Descriptio

Ageratum ita describente Dioscoride, frutex est sarmentosus (è cremiorum genere, Sar- rac.) humilis, palmi altitudine [*πυροπικῆς*, *σπιθαμῆς*] simplex, Origano maxime similis, umbel- lam gerens, in qua stas aureis quasi bullis emicat, Helichryso minor (*ἡλατῆρ ἰσχυρότερον*, his vet. ca- ret) Agerati nomen illi inditum est, quoniam stas diutissime in sua coloris specie conseruatur. Vis decocti eius est feruida (*πυροπικῆς* sed Cord. & Ruell. calore fouente: Sarrac. fotibus apta.) Et ipsa herba suffita (Herba ipsius vstæ nidor, Sar- rac.) vrinam ducit, & duritias circa vterum emolliat.

Cæterum quamuis Lacuna in vetusto codice legat, pro *σπιθαμῆς*, *σπιθαμῆς*, hoc est, duum palmorum altitudine: Et ita quoque legi con- stet apud Orbasium: & Plinius lib. 27. cap. 4. Ageratum ferulaceum esse scribat, duorum pal- morum altitudine. Attamen viderint lectores, quàm rectè vox *σπιθαμῆς*, cum præcedenti vo- ce, *πυροπικῆς*, conueniat.

Plinius easdem vires Agerato, quas Dioscori- des, tradit.

Galenus verò Ageratum esse scripsit *διφλεγματικῆς*, *ἡ ἀρίστη πῦρ ἀφλεγματικῆς*, id est, vim

AGERATVM PLERISQVE, HERBA Iulia quibusdam.

CAP. XXXI.



Radice con- stat ligno- sa, minimi di- giti crassitudi- ne, variè im- plexa, ex qua complura sur- gunt virgulae, cubitalia & al- tiora, tenuia, colore alias subrubente, a- lias ex viridi pallescente, in ramos diuisa: foliis numero- sissimis ab imo ad summum stipata, Costi hortensis, vt odore, ita & formâ simili-

Descriptio

bus, sed duplò aut triplò minoribus, profunde ser- ratas: in summis ramulis corymbis emicant Mille- folii, sed colore luteo. Semen succedit, exiguum, oblongum, & paleaceum.

Præsentem plantam Tragus Eupatorii Mesuæ titulo pingit & describit, quod Norimbergâ ad se mis-

sed maiori Centaurea vulgari, minori tamen Amarantho luteo tenuissimis crenis & serraturis inciso, flore in cacumine capitulato, subluteo, & Amarantho per omnia consimili, odore Absinthium, gustu verò Santonicum representans. Et licet Eupatorii Mesue nomen huic plantæ indat, is tamen Amaranthi genus esse iudicat, nimirum id, quod *αἰχουρον* vocauit Dioscorides, aut certè Santonici genus. Vides quàm temerè & absque ratione Tragus de plantis iudicat.

Nascitur Ageratum passim in vniuersa Hetruria, inquit Matthiolus: foliis Origano proximis: floribus aureis: in umbellâ emicantibus Helichrysi modo, hoc Mesues Eupatorium existimat, & appellatur *Herba Giulia*. Is autem in prioribus commentariis figuram malam exhibet, quam in posterioribus abiecit, ut primo loco satis bonam substituit: quam autem secundo loco pinxit, eandem cum prima puto, sed paulò infelicius pictam: qualis autem in tertio loco depicta nullam describit.

Tragus ante Matthiolum pro Eupatorio Mesue descripsit, ac multò meliorem figuram exhibuit, quàm Matthiolus [meliorem etiam, quàm ea, quæ à nobis proponitur ex nostris empiricis] licet dicat Gesnerus: Huius qualemcunque ex Tragi libris iconem adiunximus; acuratiorem dedit Matthiolus: Iudicare poterunt, qui plantam præ manibus habebunt: fidem etiam facit mutata figura à Matthiolo in meliùs.

Eupatorium Mesue, ut Amari quoque fert opinio, & Rober. Constat ibi testatur, est Ageratum Dioscoridis. *Αἰχουρον*, inquit Amatus, vocatur lat. Ageratum, Eupatorium Mesue, vulgò *Eupatorio di Mesue* Ital. & *Herba Giulia*, German. Kunigundfraut / & *Wasserdost*. Hæc nomina Germanica sunt falsò addita, ac ad aliam herbam à nobis & aliis referuntur.

Plantam nostram describit Cord. hist. lib. 2. cap. 71. Mentha corymbifera minoris titulo, cui ut antè dictum, Gesn. figuram apposuit ex Trago, quam Matthioli iconem deterioreni falsò statuit. Herbam autem Iuliam, à Iulio mense, quo florere incipit, denominari ait, ac Costo hortensi, siue Mentæ græcæ vulgò dictæ cognatam esse scribit Gesn. de hortis.

Anguillara non vult certò affirmare an Ageratum sit *Herba Giulia*, i. e. Eupatorium Mesue, nec ne. Duo autem à Dioscoride silentio præterita id efficiunt, ut dubitet de dicta *Herba Giulia*: vnum est odor, alterum folia: quandoquidem se ignorare ingenuè fateretur an per hæc verba [*αἰχουρον μέλαινα οὐχ ὄνυχον*] sit intelligendum ramos & folia similia esse Origano, aut ramos solum & non folia. Si enim quis velit comprehendi his verbis folia. Ageratum non potest esse *Herba Giulia*, cum folia non habeat Origano similia.

Quod Græcis Ageratum dicitur, Italis, autore Fuchsio, Gratia Dei nominatur, ac in Diabacca maiore pro Eupatorio Mesue sumitur. Nobis autem nomen Gratia Dei huc pertinere non videtur. Meliùs lib. 1. de comp. med. cap. 4. fecerat Fuchsius, omittendo Ageratum vocari Gratiam Dei.

Lonic. Eupatorium Mesue & Ageratum inscribit, Herbamque S. Kunigundis cognominat, german. Odenmenig.

Castor Durant. p. 177. pro Agerato, quod & Eupatorium Mesue & Herbam Iuliam vocat, iconè habet alicuius Millefolii.

Lobelio in Adu. dicitur *αἰχουρον*, Ageratum, vel non Senescens, Mesue Eupatorium officinis, It. *Herba Giulia*. Hanc verò ait esse Ageratum Dioscoridis, eamque tueretur opinionem. Obs. p. 259. Ageratum Septentrionalium, Costus minor hortensis Gesn. & Dod. Mentha corymbifera minor Cordi. Icon. Plant. p. 439. Ageratum Septentrionalium & Anglicum. Item Obs. & Ic. Plant. Ageratum floribus candidis.

Dod. gall. Balsamita minor, perit C. q. in Languedoc *Herba D. Mariz*; in Italia *Herba Giulia*, quorundam *αἰχουρον*, Ageratum Dioscoridis, aliorum Elichrysum, Eupatorium Mesue aliorum: verum iuxta meam opinionem ad nullam harum pertinet. Hæc ille qui depingit & describit, etiam de flor. & Hist. lat. in foliam dicto titulo.

H. Lugd. p. 777. Ageratum Matthioli. p. 778. Ageratum tertium Matthioli. Historia præter bonam ponit ineptam iconem Matthioli, quam olim habebat.

C. Bauh. phyt. Ageratum i. siue foliis serratis, floribus communiter luteis, nonnunquam & candidis: quare duæ apud Lobelium figuræ.

Tabern. Icon. Ageratum, Eupatorium Mesuei. Histor. Ageratum i. Eupatorium verum Mesuei, *αἰχουρον* Dioscoridis & Galeni, Arab. *Gaser*, Ital. *Herba Giulia*, *Gulia*, *Giula herba*, *Agerato*, & *Eupatorio di Mesue*, Angl. *Madelin* & *Maudeslin* Belg. *Eleye* *Balsamcruyt*, *Lonninginnes fruyt* & *lewerbalsam* Germ. *Flainer Losenbalsam* & *leberbalsam*. Item: Ageratum 2. candidum, *Herba Iulia alba*, Ageratum album & *Méta costina alba*, Germ. *weisser leberbalsam*, & *Flainer weisser Losenbalsam*.

Camer. hort. Ageratum *Hein welsch framen muntz*: Hist. germ. Math. Ageratum Græcorum, Eupatorium Mesue: in Epit. Ageratum Eupatorium Mesue, *frembd leberfraut*. Item Hist. & Epit. Ageratum minus, *Hein frembd leber fraut*: de hoc ait. Varietas deprehenditur in Agerato. Nam quod spontè nascitur in Hetruria, multò minus est, nec adolescit tantopere, ut hortense nostrum, quod & surgit altius, & folia habet magis crenata, ut Crista Galli. Obseruatur etiam quædam Agerati species, quæ candidas prorsus umbellas gerit, sed rarior est cæteris.

Hæc in Enchir. Aliud Eupatorii genus, folio angusto, tenuibus crenis inciso, flore luteo ostenditur: nam est & Eupatorium Mesue, Italis *Herba Iulia* dicta, siue Gratiola foliis minoris Centaurii, flore aureo, quæ nonnullis Ageratum Dioscoridis dicitur. Considerent lectores Harchium scribentem de herbis sibi tantum nominatenus cognitis, bis eandem plantam describentem, & præterea Ageratum multis dictum cum Gratiola confundentem.

Apollinem & Cæsalpinum quod attinet, illi eorum opinionem oppugnant, qui Herbam Iuliam Mesues Eupatorium esse censent.

Nascitur in montibus: scribitur & à quibusdam in hortis, odoris causa, ut apud Belgas, apud quos floret Iulio & Augusto: in Germania nusquam sua sponte nata, quod sciat Gesnerus, inuenitur: facilè crescit, & fert Hyemem: anno secundo [ni fallitur] caulem & flores fundit. Visitur passim in vniuersa Hetruria. Montbelgardi in Horto Ill. E. C. semine deciduo se propagauit, ac nonnunquam Hieme valde asperâ periit. Olim vidi Tiguri in horto D. Gesneri, copiosè proueniens circa Monspelium ac florens adhuc mense Octobri; Parauit in horto publico

Trag. m.

Gef. m.

Herba Giulia.

An Ageratum
Eupat. Mesue.Balsamita
minor
Dedman.Hist. Lugd.
nat.

Hæc. not.

Locus &
tempus.

& D. Cortusi : Ferraria in horto Cœnobii S. Dominici à l'Angeli : Sturgardix in hortis Ducis, vnde semina attuli : Geneux Florens adhuc Nouembri in hortis, & Ianuario pulchrè virens : Basilex Florens in horto Plateri Iunio, & in horto patris mei Io. Bauhini Medici p̄ recordationis, Basilex celebris.

Vires

Vires & vsus Agerati ex Veterib. antè tradidimus : eam autem calidam & siccam esse secundo gradu, id ostendente odore & sapore amaro, tradit Dodonæus : ac easdem vires habere, quas Mentha Græca, siue Mentha corymbifera, de qua paulò post.

AGERATVM PURPUREVM DALECH.



Ageratū purpureum Herbariis quibusdā dictum [inquit Dalech. in H. Lugdun. p. 1184.) radice est breui, tapillatā, subflauā : foliis paruis, numerosis circa radicem sparsis, Agetato similibus, gustu subamaris, antroscū subobtusis : ob quā similitudinem Ageratū vocant : cauliculis plurimis per saxi crepidines pendulis, saxūmq; auleorum instar ornantibus & contegentibus : flore Violæ, purpureo, copiosissimo, suauissimè olente, vt vel eā solā dote mirum in modum placeat, tantā scilicet odoris gratiā Violis non postponenda : semine minuto, in oblongis vasculis.

Moschatella carulea
Ager. serratum Alpin.
Moschatellina Alpina.

Germani quidam Moschatellam caruleam vocant : C. Bauhin. Phyt. Ageratum ; siue serratum Alpinum : Gesnerus, cum apud illum essem, Moschatellinam Alpinam.

Copiosè obseruauī in montibus Saleue & Thuiri Geneux vicinis : in mea peregrinatione Rhetica prope Twesen Heluetiorum, florens Iulio, visu & odoratu gratum. Dalechampio autore in nudis ferè caulis gignitur, vbi putris saxi puluisculus subest, vel riuius aliquis illabitur, aut saturientis aquæ guttis, vel aspergine rupes madescit : cauliculis vt dictum per saxi crepidines pendulis, saxūque auleorum instar ornantibus & contegentibus.

HERBA DE LA ROTTA. CAP. XXXII.

Fvndit ex radice caules dodrante minores, glabros, per quos folia alternatim posita cernuntur ; Agerati foliis similia, vnciam longa, angusta, in ambitu serrata, glabra, gustu aromatico & subamaro, Tanacetū ferè : fastigia caliciformia in umbellas quodammodò abeunt *florulentum*, Millefolii Alpini minorum, foliis albis aspiciet circumstantibus, ex capitulis, quæ squamæ nigris lineis pictæ, componunt.



A Valeriano Dourez accepi plantam iam descriptā, cui hæc erant annotata : *Herba de la rotta* Alpinorū : lac concretum & sanguinè dissoluit.

De hac loquitur Cortusius in epist. ad Matthiolum in limine comment. post. Italicozum, vbi ait. Pulvis ossium leonis fœminæ curat febres mulierum, & leonis

Vires

maris, virorum : datur cum stillatitia aqua, vel decoctione illius speciei Eupatorii Meluei flore albo, planta odorata, quam iam tibi misi & in Pedemontio & alibi dicitur *Herba rotta*, abundat in Pedemontii valle di Lanzo, & in valle S. Fidei Patavinorum.

MENTHA CORYMBIFERA, SIVE Costus hortensis. CAP. XXXIII.



Obliquis agit radices, Mentha radicibus pæres, teretes, à quibus fibræ demittuntur multæ : caules cubitales & sesquicubitales, striati, hirsuti, ramosi & herbaceo colore pallescentes : folia Lepidii, eodem cum caulibus colore, per ambitum serrata, rariùs laciniosa, odore intenso Agerati,

Descriptio

sapore vehementer amaro : summis ramis insident corymbi aurei, Tanacetū.

Cæsalpinus lib. 6. cap. 2. Herbam Sanctæ Mariæ vocat, ac legitimū Melilotum putat : quam quosdam tradit appellare Mentham Sarracenicam.

Herba S. Mariæ
Cæsalp.

Apollinaris lib. 2. fol. 114. Costi hortensis figuram habet : verum ibi omnes Menthas miscet & confundit : nec eo capite figura ponenda videtur.

Apollinaris

Faciunt Costo affinem nomine Costum hortensem, quem vulgus Coquum (inquit Ruell. lib. 1. cap. 32. & cum eo Gerardus in defin.) alii Mariæ herbam appellant, simplici caule, sesquicubitum alto, foliis Betonicæ, nisi quodd castigatiora sunt, tenuiora,

tennora, ac magis odorata, capitellis fulgore auri flavescentibus. Subscribit eorum iudicio Florentinus agriculturæ author, qui Costum & Balsamum in hortis feri viuitadice, Nouembri mense prodit, odoratu perquam suauem: uti Sampfuchum Aprili & Maio.

Rheginus exerc. quoque Costum hortensem herbam (quam haudquaquam amaram esse ait) magis Piperitum, aut Siliquastrum Plinii & Pseudocostum Ruellii esse scribit.

Costum hanc plantam falsò appellari monuerunt Monachi in Mef. his verbis: In partibus Galliarum, & præsertim in monte Pessulano, pro Costo vtuntur aromatarii, Mentha Romana, quam & Costum falsò appellant. Et hi forsitan autoritate Platearii hoc faciunt, qui capitulo de Mentha dicit. Est & Mentha quæ longiora, acutiora, & latiora habet folia, & hæc Mentha Romana, vel Saracenia dicitur, id est, Costum vulgare. Hæc ille. Sed vt coniectamus, Platearius non dixit illud quasi affirmans ipsam Mentham esse Costum, sed volens declarare Mentham Romanam illam dixit esse, quam vulgares Costum falsò appellant, quia in capitulo de Costo nullam fecit de Mentha Romana, quæ vulgò Lasulata dicitur, mentionem.

In Piperitide & Siliquaistro iudicando errare Ruellium testatur Cordus in Diosc. lib. 2. cap. 191. Is ait lib. 4. cap. 55. Chrysocome quid sit ignoro: Saracenia Mentha sine dubio est Chrysocome cognata. Idem Hist. l. 2. cap. 117. describit dicens, Mentha corymbifera maior, quam vulgò Mentham Saracenicam appellant. Ibidem appositâ figura Tragi, ac additum: aliqui Costum hortensem, alii Mentham Græcam appellant.

Tragus hanc nomine Alismatis, frauentfraut depingit & describit, dicens. Quid in huius plantæ nomenclatura mihi videatur pronunciare non dubito, tametsi in reprehensionem quondam incidere sententiam meam non ambigam. Habeo itaque præ manibus verum Dioscoridis Alisma, quod ille quosdam Damasonion, alios Alceam, nonnullos Acyron; alios Lyron appellare tradit. Phrysiô linguâ Arabicâ Cazimbrium nominatur.

Nicolaus Myrepsus Costi herbæ appellatione [Latini codices omnes habent Herbæ S. Mariæ, inquit Fuchf. lib. 2. sect. 15. de compos. med.] innuere voluit, quam Dionysius Vticensis lib. 11. de re rust. cap. 28. Costum simpliciter, & alii cum adiectione Costum hortensem nominant: Hanc itaque alii, quod Ruellius quoque significauit, Mariæ herbam appellant, hodieque Mentha Saracenia, & Romana vulgò nuncupatur: Drabam Dioscoridis esse verisimile est. Non placet Fuchsiû Costum hortensem Drabam Dioscoridis absque ulla probatione statuere.

Herbam S. Mariæ (Coldenbergii verba sunt) eam esse, quam Saluiam Romanam & Mentham Græcam, seu Costum hortensem, ac Lasulatam Hetrusci vocant constat, à Mentha Saracenia diuersam. Qua in re falli Fuchsiû existimo, Mentham hanc Græcam cum Saracenia confundentem, eandemque facientem, cum diuersæ sint: cum Germanis aliquibus ita eam appellare placuerit, Itali tamen secus, qui hac in re quoque consulendi atque credendi sunt. Sed cur Coldenbergii cum Germanis tantum Mentham Saracenicam tibi nominari placet, & non item Italiam, vt Anguillara, Monachis & Matthiolo: cur quæso, quid ita, quamobrem? Mentha Saracenia (inquit Anguill. epist. 13.) est Costus hort.

Tom. III.

rensis Cassiani Bassi, qui etiam in Græcia nunc Costus dicitur, & in Italia Herba S. Mariæ.

Mentha Græca quæ Goritiensibus vulgò vocatur, in Hetruria Saluia Romana dicitur, quod potius solius Saluiam referat, quam Mentham, ait Matthiolus. Sunt qui Herbam diuæ Mariæ, qui etiam Lasulatam appellant. Valerius Cordus in suo dispensatorio in Vnguento Marciati magno [ubi eam describit] imponendam esse censet. Sed quoniam id nulla comprobatur auctoritate, vel ratione, eius sententiæ non tutum esse arbitror adstipulari: præsertim cum Nicolaus à Fuchsiô latinus factus, nullam huiusce Saraceniæ Menthæ mentionem faciat. Id, quod obiter dicam, facile nobis indicat, Cordi dispensatorium, quam plurimis scateat mendis. Plantam hanc (vt ipse scribit) Germani vocant Unser frauen münz, id est, Mentham S. Mariæ. Verum Fuchsius aliam eodem nomine ab hac longè diuersam ostendit. Qui verò horum errauerit, in hoc Germanicæ linguæ peritiores iudices erunt, quanquam si Hetruscis Germanicæ, vel Germanis Hetrusca nomina respondet, Cordo potius (quantum ad vocabulum spectat,) quam Fuchsiô accesserim, quod, vt modò dixi, herbam diuæ Mariæ eam vocent in Hetruria. Hæc ille, qui Menthæ Græcæ titulo eam pingit & describit.

Apollo rad. 2. in syr. Carioph. ait, Herba paralytis vulgo nostro Sancti Petri, vel S. Ioannis Herba nuncupata, quibusdam Menthæ, vel Saluia Romana, non Arabis.

An Siluio de morb. intern. de cur. Epilef. Herba paralytis, quæ Costus, Pipirella, Herba S. Petri, vel Pauli quoque vulgò dicta.

Amarus in Diosc. ait. Pro Costo amaro in officinis capiunt radicem herbæ, quam Hortulanam Romanam, siue Mentam Romanam aut Saracenicam Sepalsiatii vocant: plerique hortulanum Coquum, Herbarium quendam Florentinum imitantes appellant, vt apud Constant. lib. de agricult. legimus; qui Costum & Balsamum in hortis feri viua radice asserit: Castellanis hodie Costum dicitur: Ruellius eam Plinii Siliquastrum, siue Dioscoridis Hypropiper credidit: iudicandum eam Pseudocosti appellationem mereri.

Dodon. gall. Balsamitam maiorem [ita natiue Costum Hortensem inscribit] magnam habere similitudinem cum Panace Chironio Theophrasti existimat.

Lob. in Adu. p. 136. Hortorum Costus Cassiani Bassi, Menthæ folio, aut Lepidii. Hæc quod feruido esset gustu, aut Lepidii, à nonnullis recentiorum Lepidium putatur, quæ Mentha Græca pharmacopœis, & Saracenia quibusdam è libro *ἡ ἡμετέρα* dicitur, vtrisque non absque plausibili coniecturâ. Vulnereariam cureses Chirurgi, & mulierculæ citissimæ opis experiuntur: eoque *Baume* apud Gallos, id est, Balsamum vocitant. Obs. p. 137. Hortorum Costus. Icon. Plant. p. 322. Costus hortorum.

Et licet herba præsens Menthæ Græcæ, vel Romanæ, vel Saraceniæ nomine donata sit, toto tamen genere, authore Gesnero de hort. à Menthis propriè dictis differt, ideoque ab illis separari cupit. Idem ibidè Costum hortensem recentiorum quorundam, Mentham corymbiferam, *Unser frauen münz*, & *Sam heidnisch mundfraut* vocat. Ouariam tandem appellat, cum ait. Ouariam vernaculâ linguâ [*Eierfraut*] vocari audio herbam mihi incognitam in Saxoniz hortis & Fræcofordiæ, quæ dissecta aspergatur ouis frxis pro-

T

Mentha
Græca
Marth.

Cord repr.

Fuchf. mar.

Herba par
alytis
Herba S.
Petri &
Ioan.
Non Ara-
bis.
Pipirella:
Costus a-
marus.
Hortulanâ
Romana.

Balsamita
maior Dod.
Panace
Chironius
Hortorum
Costus Lob
in Adu.

Lobel. nor.

pter saporis acrimoniam.

Lonic. Menta Saracenica, *Fräwenmünz* / 08 *Mergenmünz* / *Fräwenfräut* / *Pfanfuchens* *fräut*. Toxot. in Onom. philosoph. p. 378. *Marienmünz* / *Mentha S. Mariae*, *Mentha sacerdotalis*.

Camer. hort. *Costus hortensis*, Item *Mentha Saracenica* siue *Græca dicta*.

Deus et
Plum.

H. Lugdunensis esse perhibet qui *Costum hortensem* [ita enim *Mentham corymbiferam* p. 678. inscribit] *Leucadem Plinii* esse velint.

C. Bauhin. Phyt. *Mentha 6.* siue *Græca corymbifera*.

Betonica
Sera.

Mulri tandem suspicati sunt, teste *Marantha*, veram *Betonicam* esse plantam hanc, quæ quibusdam locis *Menta Romana*, *Neapoli Menta Francesca* vulgò appellari solet: capti solùm ex odoris fragrantia. Sed hi dum odorem quærunt, multas alias notas se amisisse non considerant, ac præsertim, flores & radices, quæ nullo modo descriptioni *Betonicæ Diolcoridis* conueniunt.

Locus &
tempus

Mentha corymbifera hortensis est & passim in hortis colitur. Vidi *Monspeli* & *Genevæ* viridem mense Ianuario, Febuario & Martio: *Môtbelgardi* florentem Augusto. Apud *Belgas æstiu* mensibus aurei coloris umbellas promit.

Vires &
Temperat.

Tota *Costi hortensis* planta, autore *Matthiolo*, exalfacit, siccatur, appetit, attenuat, roborat, abstergit & prouocat. Auxiliatur vteri affectibus.

Hydropt

Medetur *Hydropicis*, & præsertim *anasarcâ* laborantibus: quia refrigeratum *hepar exalfacit*, & vasorum obstructions aperit. Illinitur ex oleo *irino* *lienosis*, & ex vino feruèfacto *vrinam* ægè reddentibus. *Lentigines*, *alphos*, & alia cutis vitia abstergit illitus noctu succus. Hic epotus *alui tineas* & *lumbricos* necat, frigido vtero subuenit: *ventriculum* roborat tam haustus, quàm illitus, & vomitiones compescit. Folia adduntur in *placentas*, quæ à mulieribus vteri affectibus obnoxiiis eduntur. Sunt qui ea tenui pulicula illita frigunt *parellis* in oleo aut butyro, & iis in cibis vtuntur. Tota planta, tum substraru, tû suffitu serpentes fugat, & eorum venenis resistit, quin etiam *infarctus* expedit, & caput roborat.

Lienosi
Vrina dif-
ficilis.
Cutis vitia

Vteri affe-
ctus.

Balsamita vtraque, maior scilicet (*Mentha corymbifera*), & minor (*Ageratum*) calida & sicca est, inquit *Dodonæus*, secundo ordine, cum amaritudine & adstringendi haud obscurâ facultate. Auxiliatur foliorum eius, quam *Conseruam* vocant, conditura, diuturnis capitis doloribus matutino tempore sumpta: defluxiones è capite reprimunt ac resiccant: crudos humores ad concoctionem perducit. Prodest item *cachexia* aut *leucophlegmatia* laborantibus præsertim in initio: ac omnibus quibus *iecur debile* ac refrigeratum est. Semen non secus ac *Santolinæ* *lumbricos* & *ventris tineas* expellit.

Serpentes
fugas

Temperat.
Dod.

Affectus
capitis.

Humores
crudi
Leucophle-
gmatis.

MENTHÆ SARRACENICÆ SPECIES flore *Anthemidis*.

Descriptio

Herba est cubitalis, interdum minor: ramulos è radicibus multos edit, aliqua ex parte per caulis longitudinem, velut striis ornatos, nò nihil lanuginosos, in quibus folia parua, breuia, non admodum lata, viridia, in ambitu serrata, odorata, medio inter *Ageratum* vulgare & *Menthastrum* odore, & tam simili *Mentha Romanæ* vulgò dictæ, vt hæc illi commodè possit succedere: flores in cacumine multi, *Anthemidi* similes, in medio luteoli, in ambitu candidi, odorati: radices subsunt candicantes.

Hanc *Myconus Mentha Romanæ* speciem esse credit, sapore, odore, & simili ferme foliorum figurâ inductus. A *Pyrenæorum montium* incolis, vbi frequens nascitur vocatur *Herba del Moro*, id est, *Herba Saracenica*. *Dalechampsio* apud



H. Lugdunensem p. 1169. videtur hæc *Myconi Mentha Saracenica* species eadem cum *Parmica Fuchsi*, vulgari scilicet folio longo serrato, flore albo, do qua mox agendum. Eiusdem sententiæ est & C. Bauh. *Mentha* (inquit in animaduers. in Hist. Lugd. pag. 33.) *Saracenica* altera species H. Lugdun. p. 672. & eiusdem *Parmica Fu-*

chsi p. 1168. vna est planta, vtrobique descripta. Ego tamen in *Parmica Fuchsi*, lanuginis nihil obseruo, nec odorata folia sunt, nec parua, nec breuia, nec admodum lata, sed longa & angusta, nulla etiam similitudine foliorum comparantur *Parmica* & *Mentha corymbifera*: *Medici Tholosares* *Scirpium studiosi*, poterunt nos monere an *Herba del Moro* *Pyrenæorum montium* eadem sit cum *Parmica Fuchsi*, vt volunt *Dalechampsius* & C. Bauhinus.

In *Pyrenæis* montibus locis frigidis maximè prouenit, in pratis iuxta fluentia: vix alibi: floret *Iulio* & *Augusto* mensibus. Iuribus carniū eam incoquunt ad saporis gratiam.

PTARMICA VETERIBVS. CAP. XXXIV.

Ptarmica, ex *Dioscoride*, frutex est parua, habens surculos paruos (λαοὺς μικροὺς, pro quo vet. cod. legit λωτοὺς, id est, tenues) multos & teretes, *Abrotono* similes: circa quos folia sunt oblonga, oleaginis proxima, multaque: ac in cacumine capitulum, vt *Anthemidis*, paruum, rotundum, acri odore, sternutamenta ciens, vnde etiam nomen accepit. Valent folia cum floribus illita ad delenda sub oculis fugillata: flores autem sternutamenta efficacissimè mouent. Nascitur in montosis, saxosisque locis.

Descriptio

Plinius huius non meminit. *Galenus*, & *Paulus Aegineta* eadem quæ *Dioscorides* posse eam testari, adiiciunt viridem totum fruticem, sugillata & reliquas sanguinis subter cutem effusiones discutere. Esse enim temperamentum ipsius calidum & siccum dum adhuc viridis secundò ordine, siccum verbò tertio.

Ex re nomen habet *Ptarmicæ*: ptarmion enim *Græci* sternutamentum vocant, in quo egregiam necesse est habere vim: ex quo tam præsentis salutis augurio & honore dignata eam *Græcia* est, vt quasi sternutatoria, ab effectu, quem exerit, appellata sit.

Licet autem in nullo [quod *Marcellus sciatis*] herbarum

herbarum censu sub hoc nomine Ptarmice sit, hodie tamen multæ plantæ sternutamenta cientes, Ptarmices, id est Sternutatoriar, siue Sternutamentariæ nomen sibi assumere videntur. Barbarus in Coroll. 395. testatur à quibusdam hanc ipsam Diptarmicem dici. Sed quam intelligat, me latet.


Sunt qui Luteolam velint Ptarmicam Dioscoridis, sed malè, siquidem Oleæ folia sive Ptarmicæ Dioscorides tribuat.

Matthioli in Diosc. Plantam pro Ptarmica pingit quæ an vera sit figura, an herba aliqua malè picta, perpendant alii. In post. comm. flores ei paulo aliter appingit, de qua scribens, multa omittit eorum quæ antea de ea protulit. An hæc Xeranthemum nostrum aliud vel cultum?

Xeranthemum credimus ab Aretio apud Gesn. hort. Ptarmicæ Monspelii dictæ veræ titulo tradi. Alypum Monspelienstem siue Montis Ceti Lobelio, de quo H. n. g. lib. 34. est Ptarmica quorundam. Ptarmica vulgaris folio longo serrato albo, de qua moragemus, Fuchsi & multorum Herbariorum sententia Ptarmicæ nomen adepta est. Ptarmicæ huius vulgaris est species quædam flore pleno.

Ptarmices Plinius & Theophrastus non meminerunt, inquit Dodonæus, quod suspicionem nonnullis adfert, nullam esse *πταρμική* propriè dictam, & eandem cum Struthio hanc esse: *πταρμική* siquidem generali voce Græcis dicuntur, quæcunque sternutationem excitant: inter quæ & Struthion.

PTARMICA VVGARIS FOLIO LONGO
serrato, flore albo.
CAP. XXXV.



Est vbi res superet cubitos, sepius minor, cubitali radice oblique acta, & veluti geniculata, fibris aliquot donata: caule singulari tereti; glabro; fistuloso, cui alterno posito adnata folia ab imo ad summum Draconis esculentis, argutis asperiusculisque denticulis circumquaque crenata, atro vi-

rore splendens, sapore Pyrethri, feruido: summus scapus nonnihil angulosus, & subhirsutus, in furculos aliquot diuiditur, qui umbellatim stergerant Millefolii terrestres, candidos, duplò aut triplò maiores, odore non dissimili, sed remissiore.

Descriptam à nobis plantam, Ptarmicem Ruellius vocat, Herbarii verò & officinæ in Gallia eodem authore, quòd gustum Pyrethri modo, quam micus, vellicet, silvestre Pyrethrum appellant.

Ptarmica hæc quæ sit [apud Veteres] ambigitur.

guum est, nomen tamen ei imposuit Cornarius, & ad græci similitudinem *Πιεθρα* appellavit. Hanc is depictam quidem vidit, sed viam aut nativam non aspexit, ita ut nihil pronunciaré ausus sit alioqui si talis fuerit, qualis à Ruellio descripta est, facile in ipsius sententiam concesserit.

Tragus hanc Tanacetum album, seu acutum, *weisen oder Spitzen Reinfahrn* appellat, eoque errare scribit merito, qui hanc stirpem ad Pyrethrum referunt. Existimant verò illi descriptionem Ptarmicæ apud Dioscoridem non ineptè accommodari posse, tamen non desint, qui Tragion secundum Dioscoridis velint. Lubens etiam Millefolii tertium genus faceret, nisi ali- quibus Ptarmicæ esset & Pyrethrum silvestre.

Ptarmicem (ita Fuchsi. præsentem plantam inscribit) nonnulli pro vero Pyrethro, seducti eius titillante acrimonia descripserunt. Germanis secundum Fuchium *wilder Bertram* appellari potest, Gallis *Pyrestre bastard*.

A Matthioli in priorib. comm. silentio involuitur: in post. verò Ptarmicæ nomine depingitur. In Hist. germ. cum addit. Camer. Ptarmica 1. *wilder Bertram*/Boh. Persam vocata: in Epit. Ptarmica, siue Sternutamentaria, Græcis *πταρμική*. It. Ptarmica, Germ. *Sorau* / vel *weisser Spitziger Reinfahrn*. Vires Camerarius Ptarmicæ Veterum adscribit, quas ei adscribendas non putarim.

Docti multi plantam Germ. dictam *wilder bertram* existimant Ptarmicam Dioscoridis, quorum diligentia & iudicium laudandum potius quàm improbandum: etsi duo hæc deliderem, inquit Turnerus. Nam Germanorum *wilder bertram* non est folio Oleæ, sed multò acutiore, tenuiore, longiorèque pro magnitudine sua, circumscissè crenato; adhuc provenit [quod adhuc observari] circa aquas, & pratis humentibus, non autem in rupibus & montibus. Non ausim ergo cum illis pronunciare veram esse Ptarmicam, etsi viribus parum aut nihil ab ea differat, aded ut ei rectè possit substitui.

Variis in locis variis appellationibus nominatur à Gesn. hort. ut Ptarmicæ, quam quidam sequuti Ruellium Pyrethrum palustre esse putant: Item Pyrethri cognata herba titulo, & Tarchi aquatici [vbi eos talli dicit; qui Ptarmicam putant: quòd Monspelii Serpentina vocetur].

Dodon. lat. in fol. p. 698. Draconem silvestrem siue Ptarmicon vocat. Lobel. in Adu. & Obs. p. 243. & Icon. Plant. p. 455. Ptarmica folio Taracomis, vel Sternutamentaria.

H. Lugd. p. 1168. Ptarmica Fuchsi, & ita Camer. hort. Ptarmica silu. germanica; Thallio. Ptarmica vulgaris seu pratensis, Clusio. Ptarmica 1. Sneeſelwoort / Gerardo. Ptarmica, & Sternutamentaria Castori. Ptarmica, Tanacetum album Tragi. Hort. Lusitano. Draco silu. Ptarmica Matth. Ptarm. silu. germ. *πταρμική* Diosc. Schvvenckfeldio. Ptarmica Rob. Steph. Brunfels. Bacch. Cordo, & Apollini.

C. Bauh. phyt. Dracunculus 2. siue aquaticus serrato folio: Brunfel. in 4. p. 257. Pyrethrum quoad iconem non descriptionem.

Lonic. wild Bertram / Ptarmice Diosc. vulgò Pyrethr. silvestre, Sternutamentaria, Ital. *Oliuella*. Miror Lonicerum dicere hanc plantam differre tantum magnitudine à Pyrethro, cum ex ipsiusmet figurâ contrarium appareat: tamola enim herba, folia non fomiculacea, radix

Tanacetum album / com mendum Trago

Tragium Millefolii

Ptarmica Fuchsi Error multorum

Ptarmica Matth.

Camer. nominat

Ptarmica Diosc.

Pyrethrum palustre

Dracunculus

Lonic. opinio refellitur

repens, & multa alia differentiam faciunt.

Passim Germaniæ Bohemiæ, Hungariæ, Austriæ & Moraviæ pratis obuia, similiter & Belgicis & Anglicis Clusio authore. Dodonæo verò in montosis, saxosis & circa margines agrorum, vel pratorum, locisque umbrosis nascitur: ad hortos verò etiam transfertur, in quibus citò multumque luxuriat. Cum flore Maio, Iunio, ac Iulio mensibus viget. Prouenit in horto Montbelgardum & Souchant, aliisque in locis. Videram primò Sturgardix in horto Ducis Wittemb. postea in horto Cælii Secundi Curionis præceptoris mei florentem Iulio: tandem spontè prope Wasserfal ad stagnum florentem Augusto. Repertum aliquando inter Viennam & Lugdunum. In Bohemia, Matthiolo teste, passim in hortis feritur, è montibus, in quibus nascitur, illuc translata.

Vires &
Vfus
Pulsus ster-
mutatorum.
Dolor den-
tium

Acetariis
additur.

Aperit Præmice, si Matthiolo credimus, discutit, prouocat, attenuat, & incidit. Sicca puluis naribus inditus sternutamenta mouet. Mafsa radix dentium dolores mulcet, & pituitam detrahit. Facultate & viribus, inquit Dodonæus, Draco siluestris hortensis (Dracunculo hortensi) non est inferior: excalfacit & resiccat: gustu acris & feruens. Adduntur verò & Lactucis, aliisque acetariis, huius folia, quorum frigiditatem, veluti Eruca & Draco, corrigunt quoque ac temperant.

DRACUNCVLVS HORTENSIS siue Tarchon.

CAP. XXXVI.

Descriptio



Fruticosa promit duorum cubitorum & ampliora virgulta, dura, gracilia, nonnihil angulosa, inconditis ramis diuisa: foliis primò orientibus induritis, ubi verò adoleuit, foliis onusta Lini folia æquantibus, aut Hyslopi Arabum, atroviuentibus, splendidis, omnis diuisionis ignaris, sapore acri aromatico, cù quadam dulce-

dine grata, Anisum conditum æmulante: corymbi eo ordine per summas ramos quo in Abrotano, apiculis florum vix conspicuis, quos semen excipit acerosum: radix perennis, nouam singulis annis stolonum sobolem emittit.

Draco
Hermol.

Eius gene-
ratio,

Hermolaus Coroll. 400. huius meminit his verbis: Oligores & Draconem vocatam ferunt, quam mirabili quodam modo nasci prædicant, ex Lini semine incluso Raphanis, aut Scillæ bulbis, atque in terra obruto. Pusilla herba, nigro minuto semine, folio tenui & oblongo, acris & utramque originem prodente, linguam & folio & radice amburens, & aceti & salis gustu. Pyrethrum

sunt qui à Veteribus appellatum falsò putent hanc inter olera acetaria gratissimam.

Ruellius hæc ad verbum recitat, quauis Hermodaum non nominet. Quædam tamen ita variat. Draconem vulgò vocatam inter acetaria olera gratissimam celebrant, quòd nec salem, nec acetum exigat, vtriusque saporem referens, vtriusque parentis dotes retinens. Syppontinus Pyrethrum à Veteribus appellari putat, falsus quædam saporum cognatione. Nam Pyrethrum, siluestre Daucum caule & folio imitatur: Dracopis foliis Hyslopum, vel Linum. Illud obrendit umbellam Anetini, circinata rotunditatis: Dracopis nullam, prorsus ostendit.

Corus hanc lib. 5. cap. 2. Draconem satium vocat. Amatus verò in Dioscor. lib. 2. enarr. 151. Draconem herbam, Draconeam, aut Dracontium appellari, ac Dracunculum hortensem in vniuersa Italia competiri, & ex semine Lini in Cæpa incluso quoque nasci tradit. Gesnerus contra negat prouenire ex semine Lini in Cæpe sato.

E Lini semine Dracunculum hanc nasci quoque negat Matthiolus. Ab omnibus, inquit, Dracunculis formà maximè differt hortensis Dracunculus, quo in acetariis vescimur, vtriusque ad intinctus acerrimo gustu, folio oblongo, radicibus humi repentibus, Graminis modo. Sunt qui asserant hanc plantam cultorum mangonio facultiam esse, & non sui natura prouenire: eam siquidem nasci putant Lini semine excavatis Cæpis imposito, ac deinde terrâ recondito. Sed hos falli crediderim, quòd facto periculo operam quidam perdiderint. Huius nec Græci, nec etiam Mauriani, quod sciam, meminere. Hæc ille, qui in suis comm. Dragoncelli nomine figuram dedidit. In Hist. Germ. cum addit. Camerarii hoc titulo, Dracuncellus, Dragoncellus, siue Dracunculus esculentus: In Epit. hoc, Dracunculus hortensis, Italis Dragoncello & Dragonne, Gallis Tarchon, Germ. Dragon / oder Dracuncul.

Draconem hortensem Dalechampi in Hist. Lugd. [quæ Matthioli verba recitat, licet paulò aliter ea narret] Chrysocomen esse Dioscoridis prodidit. Quam opinionem vel ipsa Chrysocomes historia falsam esse ostendit.

Gesnero verò, Matthiolo, & Hist. Lugdunensi, ac Dalechambio (qui vnanimiter fabulosum esse aiunt nasci hanc Lini semine Cæpa incluso & sic sato) se opponit Lobelius. Non est de nihilo (inquit in Adv.) quòd præterque holiores hanc ex Lini semine cuiuspiam cepacæ, aut tuberosæ radici inserto emergere affirmant: nam rametis nõ temerè cuiuslibet experienti cedat, relique ostendit, & euentus rarior fidem penè abroget, tamen si quis in asslatu maritimo & natalibus, squille nõ auulsa inserat, optato voto non frustrabitur, ut mihi assercbant quidam Lygures & Hetrusci herbarii non pauci. Idem euenire tradunt si in Raphano aut Cæpe foraminulo facto adigatur Lini semen: & argumento vtuntur saporis, quem salis & aceti vnâ mixti quodammodò præfert. Hæc ille, cui Lygures imposuisse & lulisse credimus. Vocatur ab ipso in Adv. p. 190. in Obl. p. 243. Dracopis ita in Icon. Pl. p. 455. aut potius Tarchon Symeonis Sethi & Auicennæ.

Draco herba, ait Dodonæus, existimatur Auicennæ Tarchon esse, de quo cap. 886. egerit. Sed quia brevis aded de hoc Auicenna est, ided certi affirmari nihil potest. Fertur & Dracone herba, quæ & Dracunculus, Glaucus olim in vitam restitutus: de quo in Erasmi Chiliadibus. Differen-

tem

Ruell. not.

Syppontinus
lappin.

Pyrethrum
non est.

Draco sati-
um Corde

Dracuncul-
lus Matth.

Dracunc-
ulus esculentus

Draco hor-
tensis Hist.

Lugd.
Chrysoco-
me Dal.

Nases Lini
semen ne-
gatur a
plurib.

Lib. ride-
tur.

Draco Lob.

Draco her-
ba Dod.

rem verò hanc à vulgari Dracone verisimillimum est.

Qui cum Dalechampio ad legitimam Chrysocomes historiam convenire putant vulgare Targum (Dracunculum hortensile) cuius in acetariis usus, quâ ratione ducti sic sentiant, Clusio non constat.

Tabern. Icon. & hist. Dracunculus hortulanus. C. Bauh. phyt. & apud. Marth. Dracunculus i. siue hortensis integro folio: Tarchon Simeoni Sethi de alim. facult. reliquis Græcis & Mauritanis indicta.

Locus & Tempus. In hortis colitur ac sæpius ramulis, quàm semine feritur. Totâ Ætate in multum Autumnû viget: Iulio autem flosculos facit Draco herba Dodonæi. Lugduni ceu & in Italia copiosissimè colitur, ut Veronæ in horto S. Dominici à l'Angeli. Montbelgardi ex hortulo meo transuli in hortum Ill. E. C. Monspelii & Basileæ provenit in hortis.

Vires & Vitis. Cùm insigni acrimonia planta tota sit prædicta, haud verendum est, quin valenter exalfaciat atque siccet, incidat, digerat, aperiat & pro nocet. Proderit igitur Tarchon iis, scribente Matthiolo, quibus ventriculus frigidior: appetentiam excitat, flatu dissipat, membris robur addit, urinam & menses citat, obstructions expedit, manum pituitam ducit & salivam iuvat Pyrethri, & hinc dentium dolores mulcet, & humidum cerebrum purgat. Ex Lobelio, acetariis Erucæ vicem supplet: ad pestis contagia maxime & prunæ laudis eius stillatitia apud Anglos, sudores cit, & crassam pituitam concoquit. Perpensâ huius herbæ acrimonia, quâ maxime linguam vellicat, eorum esse medicamentorum, quæ valentissimè exalfaciunt, faciliè conici potest. Nec alias huius vires aut usum novimus.

HELICHRYSVS, HELICHRYSO & Eleiochrysus & Eleiochrysus veteribus.

CAP. XXXVII.

A Theophrasto inter herbas, quæ ad animum & mores faciant, refertur. Quinetiam qui Eliochrysi [*ἐλειοχρύσι* Theodorus Aureliæ vertit, inepte Rob. Const.] flore coronatur, vnguento ex auro ignis experto (*μύρον ῥαδίον ἐκ χρυσοῦ ἀπὸ πυρρῆς*) gloriam arque existimationem bonam consequitur: Habet autem Eleiochrysos florem auro similem [auri colore], folium verò album, fructum tenue, durumque *φύλλον δὲ λευκόν* [pro quo legit Plinius *λεπλόν*, tenue: Diosc. *σπῆνδον*, angustum] *καὶ τὸν καρπὸν λεπλόν* [legendum *τὴν καρπὸν*, ut vult Corn. & Rob. Const. iuxta Plinium & Diosc. quod non animadvertit Theod.] radicè in superficie terræ, eandemque gracilem.

Helichryson, inquit Dioscorides, quidam Chrysanthemum; nonnulli & Amaranton vocant, quo etiam Deorum simulachra coronant: *ταμνίσμιον* habet ex candido virentem (cauliculis candidum, virentem, Cæsp. virgam albam, viridem Corn. Hermol. autem non *λευκόν*, i. e. candidum legit, sed *λεπλόν*, i. e. tenue: fortè quia repugnare videtur color candidus cum virente.) erectum & durum (solidum) *folia* ex intervallis angusta, Abrotono similia: *comam* in orbem circumactam, aureæ lucis fulgore (*χρυσόφανον*) umbellam rotundam, veluti corymbis aridis depē-

Tom. III.

dentibus: *radicem* gracilem. Nascitur in asperis & salebrosis.

Plinius, qui Heliochryson inter silvestres recenset lib. 21. cap. 21. Theophrastum secutus, inquit: Heliochryses florem habet auro similem; folium tenue: cauliculus quoque gracilem, sed durum: hoc coronant se Magi, si & vnguenta sumantur ex auro, quod apyron vocant, ad gratiam quoque vitæ gloriam pertinere arbitrantur. Et verni quidem flores hi sunt. Aliibi iterum eodem libro cap. 21. mentionem facit ex Dioscoride inquit: Heliochryson quod alii Chrysanthemum vocant ramulos habet candidos, folia subalbida, Abrotono similia: ad Solis percussum aureæ lucis in orbem veluti corymbis dependentibus, qui nunquam marcescunt. Quæ de causa deos coronant illo, quod diligentissimè observavit Ptolomæus rex Ægypti: nascitur in fruticibus.

Galenus Amarantum vocat; quia sc. non maturefcit: alia tamen est Amarantus apud Plinium de qua nos alibi diximus.

Paulus Elichryson vocat, plantamque coronariam esse ait, comam habentem auricolorem.

Helichrysum Plinius & Heliochrysum appellat, habetque utriusque vocis, teste Marcello, certam ex natura causam. *ἐλίοχρυσον* quidem & *ἐλειοχρύσον*, quoddam locis aquosis & palustribus, quæ Græcis *ἑλῖον* dicuntur, proveniat. *ἐλειοχρύσον* verò quoddam ad Solis, qui *ἥλιος* Græcis est, percussum aureâ luce flores huius plantæ fulgeant, quam ob causam Aureliam fortè interpretatus est Gaza. Refert præterea Dioscorides Amarantum ab aliquibus Helichrysum etiam dici, non quia spicatus flos sit, qualis est qui propriè Amarantus dicitur, de quo suo loco dictum est: sed ab eadem longioris sine detrimento vitæ natura. Summa enim eius natura in nomine est *ἀπὸ μὴ μαρῆναι*, à non marcescere.

Utuntur, inquit Theophrastus, eâ contra morbus venenatorum in vino: utuntur & ad ambusta, cinerem eius melle excipientes. Sed hæc [ut superius insinuatum est] commenta hominum esse planè videtur, qui suas artes magnificare, celebrareque cuperent. Nos reliquorum naturas viresque persequemur. Comam è vino potam contra serpentium ictus, coxendicumque dolores, urinæ stillicidia, ruptaque commodè auxiliari tradit Dioscorides: ciere autem menses, grumos sanguinis in ventre aut vesicæ liquare cum vino mulso potam, cohibere quoque defluxiones è capite trium obolorum pondere, ieiunij datam in vino albo diluro: Inferi etiam vestibis, ut eas ab egredientium iniuriis tucatur. Plinius eundem usum medicum partim ex Theophrasto, partim ex Dioscoride descripsit.

Galenus Elichrysum non habet, sed Amarantho tribuit, quod Dioscorides Elichryso. *Amaranthum*, ait, facultatis est incidentis & extenuantis. Coma igitur eius cum vino pota menses educit. Sed & grumos sanguinis liquare ac solvere creditur, non solum in ventre, sed & in vesica, sed tunc potius cum vino b. benda. Et omnes simpliciter fluxiones pota desiccant, stomacho infecta.

Quæ Paulus de viribus tradit, ea de verbo ad verbum ex Dioscoride sunt transcripta, quamvis antè sub Amarantho easdem ex Galeno dixerit.

Pro Helichryso hoc à Veteribus tradito, variaz circumferuntur. Multi enim existimant

T 3

esse Stœchadem citrinam vulgò Germanicam latifoliam. Quam C. Bauh. Phyt. Elichryson 5. siue Orientale vocat est nobis Stœchas citrina speciosa. Matthiolus in post. comm. eos errare dicit qui Stœchadem citrinam vulgò dictam, Helichryson Dioscoridis legitimum æstimant. Pro hoc verò inibi tradit Stœchadem citrinam tenuifoliam Narbonensem. Helichrysi nomine delineat Cæsalpinus Stœchadem citrinam tenuifoliam alterâ siue Italicam. Sed & Stœchas citrina tenuifolia tertia, siue Neapolitana Elichrysi nomen sibi apud C. Bauh. assumpsit. Stœchadi citrinæ æthinis capitulis parvis, vocatur à C. Bauh. Phyt. Elichrysum 8. siue silvestre angustifolium. Stœchadi citrinæ æthinis capitulis longis idem C. Bauh. Elichrysum 9. siue silv. flore oblongo cognominat. Stœchadi citrinæ quoque æthinis capitulis brevioribus appellatur ab eodem C. Bauh. Elichrysum 10. siue silvestri flore oblongo similis. Elichryson 7. eiusdem Bauh. Gnaphalium ad Stœchadem accedens existimamus. Quod Gnaphalium Fuchsi, vel Impiam Plinii inscripsimus, C. Bauh. Gnaphalium 3. vulgare, & Heliochryson silvestre Tragi nuncupat. Gnaphalium virgatum nostrum, Tragus Heliochryson silvestrem appellat. Heliochrysu quorundam, siue Abrotoni folio, de quo mox dicemus, Helichrysum Veterum à plurimis habetur. Helichryfos vel Helyochryfos Ruellii, est Chamæmelum inodorum, siue Cotula non fœtida, licet hæc opinio non placeat Gesnero. in cat. pl. Elixpous Suidæ, Hedera flos est Rob. Constantino. Apud Camer. hort. Helichrysi nomen attribuitur Tulipæ. Heliochrysum Italicum Matthioli, ni fallor, est Millefolium luteum. Elichrysum Dioscoridis est Ageratum quibuldam, quæ opinio nobis non probatur. Linariâ suam tertiam Tragus lib. 1. cap. 17. Heliochryson Dioscoridis appellat. Vide titulum, Heliochryfos Tragi, siue Linaria tertia, de qua paulò post.

an Gnaphalium ad Stœchadem accedens. Gnaphalium Fuchsi vel Impia Plinii. Gnaphalium virgatum. Helichryso quorundam fol. Abrotoni. Chamæmelum inodorum. Hedera. Tulipa. Millefol. luteum. Ageratum.

diofo: radix, ut ait Clusius, dura, lignosa, minimi digiti nonnunquam crassitie, quæ tamen singulis annis perit.

De hoc Matthiol. in Dioscor. ait. Caule const. recto, æquali, ac lignoso, cubitalem longitudinem non excedente: foliis per internodia emergentibus, Abrotoni æmulis: comantibus in cacumine floribus, aureo colore fulgentibus, & in orbem umbellæ modo coherentibus, corymbaceâ facie, veluti Myriophylli, vel Agerati, qui exsiccati aureum colorem diutius retinent. Hæc ille, cuius descriptio videtur potissimum ex Dioscoride desumpta: fides sit penes eos, qui sunt in Italia, an flos exsiccatu sit ita speciosus, ut mereatur reservari ad corollas, ut postea inter vires ex ipso dicetur. Icon quam Helichrysi nomine proponit, non placet, licet apud Amara Robertus Cœst. Matth. verum pingere Heliochrysu assimet. Robertus videtur plantam, quam Matthiolus pingit, æquè bene novisse ac ille. Meliorem figuram exhibet Camerarius in Hist. Matthiol. Germ. hoc titulo: Helichryson Dioscoridis: in Epit. hoc, Helichrysum Creticum, Italis Helichryso di Candia: In horto vocat Elychrysum & heliochrysum Matthioli secundum alios, quod Hispanis secundum Clusium Scoba hedionda, id est, Scopam fœtidam appellari scripsit.

Lacuna eandem cum Matthiolo nomine Elichrysi habet iconem, quod ait Græcis ΕΛΙΧΡΥΣΟΝ vocari, Cast. Manzanilla bastarda, Catal. Guinalda, Portug. Macela galega.

Dod. de flor. & mist. lat. in fol. Elichryson, quod Diosc. ΕΛΙΧΡΥΣΟΝ esse ait, ac nonnullos etiam Chrysanthemum: alios inter quos Galenum refert, quædam propter floris diurnitatem, appellare ait: Plinium verò & Theophrastum ΕΛΙΧΡΥΣΟΝ, quod Gaza Aureliam vertat. Hæc ille qui in H. Gall. Gnaphalium Fuchsi siue Germanicum olim Elychrysum Dioscoridis credebatur.

Clusius Dodonæi figuram habet, ac eandem cum illo tradit, eandemque de Elichryso suo opinionem tenet.

Tabern. in Icon. (apud quem transpositæ sunt figuræ) Heliochrysum 1. Item: Heliochrysi altera icon. Huius icon est pro Heliochryso ut videre est in Hist. eius l. 1. p. 456.

Gerard. Elichryson siue Aureus flos, Golden Moor wort. Item: Coma aurea Golden rust. Icones sunt Tabern. qui vnam non bonâ sumpsit ex Matthiolo, càmque posuit pro Elichryso 1. Verum Gerardus præter veritatem ponit pro Coma aurea iconem Lobelii, faciens è duabus iconibus vnius plantæ duas diuersas plantas.

Lob. Adu. ΕΛΙΧΡΥΣΟΝ, vel ΗΛΙΟΧΡΥΣΟΝ, siue aureus flos: falsò hic legitur Sileris flos) Chrysanthemum. Et hoc patet ex icon. Plant. pag. 746. vbi corruptam lectionem ita restituit. Elichrysum, siue aureus flos, Chrysanthemum. Obs. p. 430. ΕΛΙΧΡΥΣΟΝ, Gaza vertit Aureliam: Elichryson, Amaranthus Galeni.

H. Lugd. p. 776. Elichrysum Matthioli.

C. Bauh. Phyt. Elichrysum 1. siue foliis Abrotoni: quod Dioscoridis. Item apud Matthiol. Helichrysum Matthioli Castori, Helichrysum Creticum Matthiolo in compendio, sed figura transposita est. Goss. hort. Heliochrysus verus Italicus Kreichio.

Heliochrysum quorundam provenit Montbelgardi in horto Ill. E. C. vbi floruit adhuc Octobri mente. Heliochryson Matthioli copiosè prou-

HELIOCHRYSON QVORVNDAM folio Abrotoni.

CAP. XXXVIII.

Descriptio



gie, corymbos Agerati imitantes, vel disco florum Chamæmeli, lutei, odore valido & pertinaci, vehementerque nomine ingrato nonnihil & fasti-

Helichrysum Matthioli.

Matthioli.

Matthioli.

Scoba fœtida.

Lacuna.

Dodonæi.

Figura apud Tab. transposita.

Tab. 107.

Gerardus.

Lob. respicitur.

seprovenit in Hetruriz pratis in gracili solo, incultisque locis, siticulosis collibus, nec non etiam in fluminum alveis. Norimbergæ crescit & semine in alterum annum propagatur. In Belgii hortis floret Augusto, aut Septembri mense. Lato solo provenit, & copiosè circa Madritium inuere Complutensi, aliisque Hispaniæ locis, in agris, ubi Septembri & Octobri florentem videbat Clusius. Nicæ ad Tyrrhenum mare, Genuæ Lygusticæ, & in Galloprovincia asperis, macilentis consualibus, & desertis incultis, autore Lobelio, fruticat.

Cum tota hæc planta sit amara, facile eas facultates obtinebit, quas Elichryso suo Veteres tribuunt, inquit Clusius. Hispanis autem nullo est in usu, nisi quod Madrutiano agro mundatorias scopas ad ædes purgandas ex ea faciunt: & quibusdam aliis locis, illâ in fasciculos congestâ & colligatâ, formaceos, ut Pliniano verbo utar, parietes (quos Hispani *capias* vocant) integunt aduersus imbrium iniuriam: Quia exsiccati flores, ut vult Matthiæus, aureum colorem diutius retinet. Proinde commodè Hymæ quod eo tempore flores deficient, puellæ siccum Helichrysum coronamentis suis inferunt, quemadmodum & Amaranthum purpureum. Neglecto usu ad vires nos recipiamus. Pollet multum, si Lobelio credimus ad podagras & vlcerâ maligna, humorum impetum inuic tuerem reprenendo, lotium deriuando, & saburram vehementius impellendo: & eadem fermè, quæ Millefolium promittit. Multi Recentiorum plantæ, de qua hæcenus verba fecimus, Heliochrysi Veterum vires & facultates adscribunt, cui rei testimonium aut rationem non adiungunt, præter Clusium, qui amaritudinem vadem adducit, quæ nostro iudicio, non sufficit.

HELIOCHRYSOS TRAGI, SIVE Linaria tertia.

CAP. XXXIX.

Descriptio



EX duris fibrosis radicibus, nigris, perennantibus, singulis annis nouæ virgæ siue caules exeunt singulares cubitales: teretes, rigidi, fractu contumaces, crebris foliis Linariæ vulgaris, angustioribus, saturatiùs virètibùs, sapore subamaro & nonnihil aromatico præditis, ab imo ad

summum dense stipatis: cuius fastigium in complures abit surculos, non minùs foliosos, quibus corymbi insident lutei, circumquaque foliolis viridantibus obuallati, odore nullo commenda-

biles: succedunt *semina* inter pappos, quæ supernè villosa sunt, nigricantia, longiuscula, qualia ferè, inquit Clusius, Hieraciorum generi, pappi instar, quæ leuissimo vento excussa, eius arbitrio feruntur.

Est hæc Linariæ tertium genus Tragi, tertia Linaria vulgari similis, tertia Linariæ species, magnis illis corymbis, seu multiplicibus, & rotundis floribus, Amaranthum luteum imitantibus ornata, quam secundum descriptionem Dioscoridis Heliochryson appellaret, & ad illud ipsum Dioscoridis caput referret; propter folia acuta planè & astricta, non multò aliter quàm in Abrotano videre est: quod præterea non in siluis nascatur, sed in campis sub dio versetur, arenosis, humectisque incultis & apricis agrorù limitibus. Sed quæcunque tandem habeat apud Dioscoridem, is sanè nullum apud Germanos illius nomen nunquam cognoscere potuit, quapropter à forma lynfraut, hoc est, Linariæ, à floribus grossi Rheinblumen, id est, Amaranthi maiorem nuncupauit.

Lonic. lib. 5. cap. 170. Tragi figuram habet, ac quartam Linariam, dæo Diert lynfraut facit, Heliochryso ique existimat.

Lob. Obl. p. 223. Linosyris nupetorum, an Tripolii species? nunc Linariæ tertium genus Tragi? Item p. 224. Linaria aurea Tragi, Hysopus umbellifera Dioscoridis Guilandino: proflus eadem Linosyridi, quam in Iconib. Plant. omisit, ac p. 411. Linariam auream Tragi solùm exhibuit.

Tabern. Icon. & Hist. Linaria [tertia] aurea, Gulden leinfraut. Item Linaria aurea minor (Osyris Austriaca Clusii) Klein gulden leinfraut. Quandoquidem à Tabern. inter has nullum discrimen indicatur, præterquam magnitudinis, ego non separo.

Clusius in Pannon. p. 310. & Hist. post. lib. 3. p. 325. Olyridis Austriacæ titulo hanc proponit, quæ refert Viennenses Olyridem appellare. Sed ancum Olyride Dioscoridis conueniat, aliis discutendum relinquit. Tragum Linariam tertiam: nonnullos verò Chrysocomen Dioscoridis & Chrysin Aristotelis arbitrari idem autor est.

H. Lugd. p. 151. Linosyris recentiorum Lobelio: Item Linaria aurea Tragi, Heliochrysi genus, proflus genere eadem Linosyridi. Histor. duas habet figuras & descriptiones vnius plantæ, ut Lobelius.

Gerard. Olyris purpureocærulea: Item, Linaria aurea, Golde flaye. Absurdè ponitur à Gerardo pro Olyride purpureocærulea icon Linariæ aureæ minoris Tabernamontani.

C. Bauh. phyt. Linaria 16. siue folioso capitulo luteo, maior. Item: Linaria 17. siue folioso capitulo luteo, minor. Propter solam magnitudinem, ut dictum, non separandas iudico.

Linariam tertiam Tragi Tubingæ vidimus mense Septembri florentem: inter Basileam & Colmariam locis siccis. In horto Ill. E. C. plantata feliciter durat, à pluribus annis, florens Augusto & Septembri: hanc attulimus Sturgardiâ ex horto eiusdem Ill. Comit. Linosyrim nupetorum in collibus Narbonensis Galliz non procul à mari erutam meminit Lobelius, quâ ad balnea Frontignianum itur; Linariam verò auream Tragi in viroto D. Petri Brughelii professoris Louaniensis Æstare lætè florentem vidi; nec non apud Petrum Coudenbergium & Iaco-

Linaria 3i
Trago.

Linaria 4i
Lonic.

Linofyris
lob. Trigon
lis species.

H. Lugdun:
net.

Gerard. res.
preh.

C. B. net.

Humilior.
Maior.

cobum Plateau. Exit Olyris Austriaca Clusii non procul Phasianorum horto circiter miliare infra Viennam, edfioire quodam & sicciore prato, cum Lini siluestris generibus, sed humilior: secundum verò sepes atque inter frutices, maior & vberior. Inuenitur multis item Pannoniæ locis, etiam inter amnis supra Drauum flumē. Floret Augusto: semē maturum est mense Septembri.


Vires

Vires exploratas non habeo: Tragus tamen Helichrysi ei adscribit. An bene, examinent alii. Est acris gustanti, glutinosa & amaricans, Senz amulo sapore; ad Thymelzām accedente.

AGERATVM FERVLACEVM DALECH.

CAP. XL.

Descriptio



DAlechāpio Ageratum ferulaceum: herba est cubitalis, caulibus satis robustis, striatis, quos folia ornant, tenuiter Chamemeli modo dissēta, quæ quod magis superiora versus tendunt, eò sunt minora, minutiusque incisa: inferiora nāq; palmo longiora, Ferulaceis sunt proxima: caulis fastigiū

in pediculus frequentes abit, quibus incompositi flores umbellam mentiuntur, lacobæ floribus similes, minores, luteis foliolis radiati, staminibus concoloribus medium occupantibus, tandem in pappos faciescētib; radix longiuscula, medicris crassitudinis, fibrata: sapor huic nonnihil aromaticus.

Ageratum
ferulaceum
H. Lugd.

In H. Lugd. ita describitur: Ageratum ferulaceum Dalechampi p. 1184. Fruticat radice nigra, rugosa, contorta, lignosa, dimidii pedis longitudine: folio Ferulæ aut Fœniculi statim ab radice copioso, per caulem impari exortu disposito: flore aureo, inodoro, Senecioni simili in umbellæ rotunditatem formato, licet ramuli stilosulos sustinentes, & in umbellæ orbem coeuntes diuersis caulibus partibus attollantur: pertinaci in floribus aurei coloris fulgore, & gratia, vnde Agerati, id est, non senescentis nomen, gustu subamaris: odor foliorum, dum teruntur, Artemisiæ leptophyllon vulgarem refert. Est Ageratum secundum & ferulaceum Plinii.

H. Lugd.
error.

Cæterum non absque errore hæc eadem planta ab ignaro Hist. Lugdunensis Compilatore pro diuersa pag. 771. antè repetita fuit, nempe Achillea montana Penæ; cuiusque duas icones habet. Lobelius autem & Pena proposita icone tradunt suam umbellis aureis Millefolii lucentem, caulibus pedalibus: oblongo semine: vocant Achilleam montanā Arthemisiæ tenuifoliæ facie.

Locus &
Tempus

Quum hanc plantam vnā cum descriptione Gesnero misissem, eam curauit depingendam, & denominauit Chrysanthemum alpinum.

Florentem reperi in cacumine montis Esperoni mense Octobri dum Monspeßuli medico studio incumbere. Parum frequens fuit Lobelio nisi celsioribus Calcaris & Horri Dei montium Narbonensium iugis, vbi Iulio & Augusto floret. In Pinetis gigni traditur apud H. Lugdunensem arido macroque solo, florens Iunio mense.

CHRYSOCOME VETERIBVS.

CAP. XLI.

XΡΥΣΟΚΟΜΗ (οἱ δὲ χρυσόκομη καλεῖται, vet.) est frutex (Dalechampia, pro quo vulg. exempl. παῖδων ramulus) exiguus, palmi altitudine (dodrantalis, Cæsalp.) habens comam corymbaceam (ἡ χοῦρη κορυμβοειδὴς, pro quo κορυμβώδης legit Dalechamp. corymbis onustam) similem Hyssopo: radicem densam (δαρτήαν, non hirsutam vt legit Marcell.) instar veratri (Hellebori) nigri (μαλάνω, auth. Adn.) tenuem, gustui non iniucundam, non inuens quam Cyperi cum dulcedine subastringentē [non bene hic locus à quibusdam vertitur; Cypero æqualem magnitudine: ad gustum enim refertur æqualitas in codice Aldino,] nascitur in opacis & petrosis. Radix calfactoriam adstrictioramque (συμπικτή, πικρὴν vet. amaram) vim habet, hepaticis & peripneumoniacis accommodatam. Sed & eadem decocta in aqua mulsa ad purgandam vluam assumitur.

Appellatio
nisi spuria.

Sunt quibus Chrysocome inter spurias appellationes dicitur Chrysitis, quibus Chrysanthemum, quibus Amaranthus, quibus Diospogon: Latinis Iouis Barba, Aphris Dubath, siue Burchumath [Buchromat Marcell.] Sunt ibidem qui Chrysospetmōn vocent, quasi aureo semine præditam, alii Daplin, alii Origanon, alii Ariophthalmon, quasi vrsi oculum, Romani Aureliam.

Chrysocome, inquit Plinius, siue Chrysitis non habet Latinam appellationem: palmi altitudine est: comantibus fulgore auri corymbis: radice nigra ex austero dulci: in petrosis, opacisque nascens: radix calfacit & adstringit: datur potui ad iocinorum vitia: item pulmonum: vultu doloris in aqua mulsa decocta. Ciet mēstrua, & si cruda detur, hydropicorum aquam.

Mirum sanè, à Lobelio scriptum, de Chrysocomes foliis nihil à Dioscoride proditum fuisse, cum is disertè & apertè tradat, huic plantæ comam esse κορυμβοειδὴς, corymborum bullis insignē, Hyssopo similem.

Cæterum plurimis plantis attribuitur Chrysocomes nomen, & potissimum Stæchadi citrinæ tenuifoliæ Narbonensi & Italici. Stæchadi citrinæ Germanicæ. Stæchadi citrinæ Orientali flore maximo & specioso. Stæchadi citrinæ affini capitulis longis. Gnaphalio cuidam Stæchadi citrinæ accedenti. Gnaphalio Virgato. Anthemidi, seu Chamæleō vulgari. Guilandinus absque ratione nostro iudicio volebat Chrysocomen esse Linariam auream Tragi. Cordo authorē Mentha Sarraeenica Chrysocomen cognata est. Pulegium montanum ad Chrysocomen accedere vult Ruellius. Dalechampius ex Dracunculo esculento faciebat Chrysocomen Dioscoridis. Linaria quibusdam Chrysocomen existimata fuit, vt videre est, n. n. g. l. 29. Passerina quoque Chrysocomen dicta fuit, de qua iam dicto libro ageamus. Helianthemum quibusdam dici Chrysocomen retulimus l. 13. Quosdam ineptè existimasse Anacampterem esse Chrysoco-

Æquiuoca
Stæch. citr.
tenuifol.
Narbon.
et Ital.
Stæch. citr.
Germ.
Stæch. Ori.
ent.
Gnaphal.
Stæchadi
affine.
Gnaph. Virg.
gatum.
Chama.
mel. Vulg.
Linaria
aurea.
Mentha
Sarraeen.
Dracunc.
esculent.

Chrysocomen, patet ex lib. 35. De Orobáche tandem dictam fuisse Chrysocomen demonstrabitur lib. 38.

STOECHAS CITRINA GERMANICA
latiore folio.

CAP. XLII.

Descriptio



Stoechas citrina Germanica virgas habet dodrantales, aut etiā cubitales, canā lanugine vestitis, nunc singulares nunc plures: per quas folia tomentosa incana, latiora, multò quàm Stoechadis citrinæ Narbonensis, adedò ut quæ terræ proxima è radice statim pullulant ad vncialem ferè latitudinem accedant: extremis ramulorum immortalis auri fulgore resplendent conglomerati squammulis compactiles curvati: radix longa lignosa, fibrata: in foliis siccis decem annis post degustatis sapor nonnihil aromaticus.

Tragus hanc iconem proponit nomine Amaranthi; describit verò pro Heliochryso primo, ac inter nomenclaturas, quòd in regionibus quæ Rheno adjacent potissimum gignatur, Rheinsblumen appellari tradit; in Walgoia autem, quòd non senescat, nec marcescat, Züngling dici; aliis tandem Mottenblumen, hoc est, Tinearum & *quædam* nominari, quòd vestes à tinearum erosionibus vindicet: Multos in ea esse sententia, eam esse Aureliam Theoph. de qua tamè opinione nihil certi concludit. Duo autem huic non malè quadrare capita apud Dioscoridem, est ipsius sententia, nempe Helichrysi & Agerati. Eius autem Iconem ut fictitiam, præsertim quod pilos attinet, rescimus.

Fuchsius sub Amaranto luteo eadem ferè tradit. Amarantus luteus, inquit, Dioscoridi *ἡλίχρυς*, Galeno Amarantus, officinis & imperiis Stichas citrina, vel, ut ipsi loquuntur, Sticados citrinum, Gallis *Passenelurs iaulne*. Nomen gallicum non convenit, nec icon Tragi figurà melior, vel attestante Matthiolo, dicente. Helichrysum depinxit Fuchsius, folio Echii aculeato, & floribus Bupthalmi. Quam in pictura ipsum decipit suspicor, quòd ea Helichryso minimè respondere deprehendatur. Sed nec Matthiolo Heliochrysum Fuchsii cognitum fuisse iudico. Apud Amatum Elichrysi primi titulo est quoque icon Fuchsii addita per Rob. Constantinum, quam non probo.

Dod. gall. malam figuram Fuchsii habet sub his nominibus: Ageratum, Aurelia, Stichas citrina. Is Elichrysum Antiquorum statuit. Sed hanc sententiam retractat Hist. de Flor. & lat. in Tom. III.

fol. ubi meliorem imaginem habet, quam Stoechadem citrinam inscribit. Dicit autem: Fuchsius & Tragus [his adde Amat. Lonic. & Io. Agricola] Heliochrysum faciunt. Nil autem aut omnino parum, cum eo convenire palam est.

Ageraton esse etiam sunt (Tragus & Gesn. in cat. pl. ut mox parebit) qui sentiant, propterea quòd flos bullarum instar globosus sit, & non facile aut citò marcescat: *ἀγνὸν δὲ* siquidem flos *πυρροῦ* *ἀγνὸν δὲ*, id est, bullæ modo tuberosus est, & diutissime in sua coloris specie conservatur: sed foliorum Agerati, Origani folio simile est: tale autem nequaquam Stoechadis citrinæ, quod oblongum & angustum est, unde etiam non esse Dioscoridis Ageraton, evidens est. *Hæc ille* cui cum Chrysocomæ Dioscoridis plurimum similitudinis habere videtur. Is, uti antè dictum, proposuit olim iconem Fuchsii, quæ Tragi figuræ similis, quæ ut verum fatear non bene exprimit Stoechadem Rhenanæ, siue Germanicæ, in qua tomentum per pilos malè voluerunt exprimere pictores. Quam porò in postremis suis operibus proponit Dodonæus, ea Germanicam in latitudine foliorum superiorum quodammodo exprimit: an verò Germanica reperitur ramosa, uti pingitur à Dodonæo, nondum mihi compertum: Germanica quod ad folia attinet latiora per caules, multa habet communia cum Cretica: Dodonæo non fuit meo iudicio cognita Narbonensis angustifolia, ac quæ scripsit ex relatione aut libris potius, quàm ex autopsia habuisti mirorque, eum in gallica Historia scribere in Belgicis hortis seminari, in latinis nullam amplius facere mentionem.

Quidam, ait Turnerus, huius sæculi viri docti, Stoechadem citrinam officinarum, & Germanorum Rheinsblumen / esse Heliochryson censent. Verum non habet folia Abrotono aut Hysopo similia. Quare Stoechas citrina non est Heliochryson Dioscoridis.

Gesn. in cat. Ageratum, vulgò stichas citrina. Item, Stoechas, vel Stichas, vulgò Sticados citrinum. Et, *ἡλίχρυς*, vel *ἡλίχρυς* quibusdam, mihi potius Ageratum. Verumque falsum: nec enim Helichrysum est, nec Ageratum.

Camer. in Hist. Matth. germ. & Epic. Stoechas citrina.

C. Bauh. phyt. Elichryson 6. siue Stoechas citrina, latifolia vel Germanica. Non idem cum Stoechade gallica censei debet: hæc enim triplò, quadruplòve latioribus & etiam longioribus est foliis, nec ut illa excresecit.

Stoechas citrina hodie dicta, malè authore Emerico Cordo, à quibusdam inter Abinthii genera refertur.

Stoechadem Germanicam latiore folio reperi ultra Rhenum, non longè à Ratisat Marchionum Badensium, locis arenosis: curaram plantandā in horto Ill. E. C. Montbelgardi, verum non diu duravit. In regionibus, quæ Rheno adjacent, potissimum verò quæ intra Spiram & Wormatiam sunt, provenit in locis asperis, sabulosis, siccis & conuallibus: florens Iunio & Iulio mensibus.

Amaranthi flores, auctore Trago, calidæ sunt naturæ, id quod & sapor & odor arguunt, ideoque commodè possunt utrinque usurpari. Vino quidem decocti & poti, lumbricos ventris expellunt, quod Tragus experientiâ certum esse didicit. Eodem modo sumpti sudores eliciunt, quare hanc herbam obstructionibus hepatis, lie-

Elichrysum non est.

Ageratum non est.

Dod. not.

Stoechas citrina na Turn.

Gesa. error.

Locus & tempus


Amarantus luteus Fuchs.

enis, renum & vesicæ conferre existimat. In lixiuio decocti, si cum illo caput abluatur, furfures capitis & porriginem expellit, pediculofq; enecat. Vestibus appositi à tineis illas timent. Aqua decocti, vaporantibus & fomentis indurata ac tumentem matricem emollit.

STOECHAS CITRINA, FLORIS ET MAGNITUDE, & colore speciosa.

CAP. XLIII.

Descriptio



Tomento penitus obita & incana, ut & folia quæ crassa, & latiora multò quàm in Narbonensi, vnciâ vnam vel duas lata: *caulium* non ramosorû, cubitaliû, summum fastigium tenet *corymbi* multi, hilariter micantes, lutei, aurum prouocantes, maiores multò quàm Stœchadis citrinæ Germanicæ vel Narbonensis, Ciceris penè magnitudinae.

Camer. in Hist. Matth. Germ. & eiusdem Epit. huius florem pingit, quem stellâ consignauit, in tabella Stœchadis citrinæ, vocauitque priuatim in Historia, Stœchadem ex Creta missam, comas grandiores habentem, breuiusculam plantam.

Elychryson
Orient.
An chryso-
come.

Locus.

C. Bauhin. Phyt. Elychryson s. siue Orientale, An *Χρυσοκώμη* Dioscoridis, & Chrysocome siue Chrylitis Plinii? Eadem apud Matthioli. Helichryson s. Orientale, flore flauo, splendentique, corymbis auri fulgore splendentibus.

Basileæ frater C. Bauhin. Stœchadis citrinæ pulchram speciem dedit. Eandem dedit Iacob. Zvving. missam ex Creta ab Honorio Bello, qui Ageratum in Creta vocari tradit.

STOECHAS CITRINA TENUIFOLIA
Narbonensis.

CAP. XLIV.

Descriptio

Fruticosa est planta Stœchas citrina, radice mediocriter crassâ, lignosâ, simplicem, perenni, nigrâ, ex qua lignosi *stolones* pronascuntur, qui in virgulas creberrimas, pedales & cubitales, albidâ lanugine obsitas desinunt, quarum summum cacumen flores corymbaceos, luteos pallentisue, densè glomeratos sustinet, singulos crassiusculos, glomeratos & squammulis imbricatos, siccissimos, colore aureo fulgentes, non marcescentes per multos annos (si bene exsiccati & loco sicco reſeruati fuerint) odore vehementes cû iucunditate: *folia* per ramos ordine frequentia confcédunt, incana, villosa, magis tamen lubrûs, quàm suprà, admodû angusta, nec planè culmum dimidiatû lata: versùs superiora minùs frequen-



ter disposita: Lobelio auctore in mollicello vellere, pusillum *semen* Maiorana, sed exilius, ruffû, acre, odoratû: radix gracilis, gummi Elemiû, vel Cyperrum rotundû Syriacum redolens, vt flores & tota planta: gustu etiam aromatico, medicato, acuto & sequeſte, non tamen nimio feruore, subaltringere.

Hanc, inquit Ruellius, vocant imperiti Sticados citrinû: namque frutex ostenditur furculosus, odoratus, ramulis exilibus, foliis Hyssopi, gustu amaro, semine minuto, capitulis luteolis, ex concoloribus flosculis compactis, quare citrinum vocantur.

De hac Siluini in Pharmacop. lib. 1. Stœchas verò citria vel flaua, Dioscoridis Heliochrysum, & Galeni Amaranthus, coma floris aurâ, densâ, in Gallia Narbonensi & Aquitania, agro Burdigalensi plurima & præstantissima gignitur, odore Abrotoni maris, & etiam sapore, sed minùs amaro.

Hallucinantur (ait Matth. in comm. cum fig.) qui Plantam, quam quidam Stœchas citrinum vocant, legitimum Dioscoridis helichrysum esse censent. Siquidem folia illi tenuia Abrotoni modo non sunt, sed longa, albicantia & hirsuta. Hist. Germ. Rheinblum / Stichas citrinum, Amaranthus citrinus, quem voluit Dioscoridis helichrysum, & Galeni Amaranthum, quam opinionem nunc non oppugno, sed cum Pharmacopœis Stœchas citrinum voco, Germ. Rheinblum / quia abundat circa Rhenum, quibusdâ Mottenblumen, quia resistit blattis aliis Jüngling / quia flores non marcescunt. In histor. Germ. Matthioli, non videtur distingui Stœchas citrina latifolia ab angustifolia: dubius hæreo an bene cognita fuerit Matthiolo Stœchas citrina, & quam intellexerit: fortè Matth. Stœchas citrina potius eadem fuerit cum ea, quam Neapolitanam vocamus, siue tertiam tenuifoliam, de qua pòst.

Amar. in Dioscor. lib. 4. enarr. 60. Heliochrysum vocat: quem in eo oppugnat Rob. Const. dicens Stœchadem citrinam heliochryson esse non posse, quòd folia non habeat Abrotoni. Is verò Amaro apposuit iconem heliochrysi Fuchsi, cui sanè folia nihil habent cõmunis cum Abrotoni.

Lob. Adu. pag. 26. Chrylocome Dioscoridis, Stœchas citrina nostras, siue luteus Amaranthus, Angl. Gold flower / Germanicè Mottenblum / Rheinblum / Belgis Reijnbloemen / Mottenkruyt. Obs. pag. 156. Chrysocome, aureâ cõma, Amaranthus luteus Fuchsi & Tragi, & perperam heliochrysos, Linaria aurea, Turcaria. Hæc ille. Ego Amaranthum luteum Fuchsi & Tragi separe, non tantùm loci ratione, vt facit Lobelius, à Stœchade hæc citrina, sed etiam propter figuram, quâ multum

Stœchas citrinum.
Heliochryson non est

multum differt: folia huius Stœchadi citrinæ angustissima, Fuchsiæ Amarantho latissima: sunt & aliæ differentiæ. Figura apud Lobelium qualis Dodonæi, non placet in omnibus pro Germanica nec etiam pro Narbonensi, cui tenuissima folia, in eius autem iconē lata sunt: hoc etiam Monspelienſibus & Lugdunenſibus examinandum relinquimus quod antè in descriptione ex Lobelio dixi de tenuitate radicis & eius odore.

Chamaecrista

Clus. Hisp. p. 367. Chrysocome, vulgo Stœchas citrina, Murcianis Manzanilla, & nomine communi Chamæmelo vocata, sine iconē. Hist. post. Chrysocome 1. vulgaris, vulgo Stœchas citrina, appellata, multis prouinciis communis.

Elichryſum Creticum

Camer. hort. Elichryſum Creticum [Matthioli:] Stœchas citrina altera Lobelii odorata. Fratri autem C. Bauh. Elichryſum Creticum Matthioli diuersum est à Stœchade citrina odorata Lobelii, quod ego non negarim.

Tabern. icon. & Hist. Stœchas citrina, siue Chrysocome Mompeliaca, Reimblom Vom Mompelier. Compiler nullam proponit distinctam descriptionem: figura præterea non in omnibus conuenit.

Synonyma

C. Bauh. phyt. Elichryſon 4. siue Stœchas citrina, angustifolia uel gallica, Stœchas citrina Matth. Chrysocome Lobelio. Apud Matth. Gesn. Dod. Lac. Cast. H. Lugd. Stœchas citrina: Trago Heliochryſos 1. & Tinearia lutea: Amaranthus luteus, Fuchſ. Lacun. Lonicero: Amaranthus citrinus, Turnero: Helichryſum, Cordo in Diosc.

Gallica

& Cæſalpino: Ageratum Dod. gallico: Chrysocome Lob. & Tabernamontano, Coma aurea Icon. Plantini. Icon poſtea C. Bauh. apud Matthiolum pro Stœchade citrina non placet: est enim angustioribus foliis: ac miror eum non distinguere hoc loco Stœchadem citrinam angustifoliam, à Tragi, Fuchſii, & aliorum Stœchade citrina germanica latifolia, quamuis ipse in phyt. moneat, Tragi Amaranthum luteum multum differre à Stœchade gallica.

Locus & tempus

Gerard. Chrysocome siue Amaranthus luteus, Goldilocks Morhweed. H. Lugd. Stœchas citrina altera.

Copiose prouenit circa Monspelium, ubi florentem annotauit, Aprili, Maio, nec non Septēbri. Eadem ni multum fallor à me obseruata est florens Aprili, in monte Apennino inter Bononiam & Florentiam. Præstantior hæc autore Lobelio, & speciosior Norbonensis Gallo-prouinciæ & Hispaniæ aridis & petrosis, ubi odoratissima & plurima æstare, radice perenni. In Germania ad Rhenum, reliquaue Gallia paucior & inefficacior.

STOECHAS CITRINA TENVIFOLIA altera siue Italica.

Descriptio

Virga ramosa, quarum superiores partes albicant, lignosæ, in quibus folia similia foliis Stœchadis citrinæ Narbonensis, quæ tenuiora sunt, inferiora breviora, ut in illa, alia quædam longiora vnciæ: in singularum virgarum summitate, umbella parua corymbifera: corymbi parui minores quam in Narbonensi, longiusculis veluti paruis squammis constantes, qui se explicantes, discum faciunt, in quo st. sculi multis apicibus constantes: color qualis sit me latet: exterius in sicca ad straminis colorē accedere videtur.

Tom. III.

Hoc genus Stœchadis dedit mihi chariss. Frater anno 1595. nomine Heliochryſi Camerarii. Similem plantam virentem vidimus Sturgardiæ apud honestum Virum D. Seck anno 1608. florentem Iulio.

Locus & Tempus



Camer. in Epit. Matth. Helichryſi vocat, in Hist. germ. Stœchadem citrinam præstantiorem, de qua ait. Idem de Hort. Elichryſum Creticum (Matthioli videlicet) appellat, & Stœchadē citrinam alterā odoratam Lobelii, cuius iconem acuratiorem se dedisse ait in Matthioli editione. An autem Matthiolus in Epitome per Elichryſum intel-

Helichryſum Camer.

Camer. not.

lexerit, quod proponit Camerarius, iudicent lectores: si id intellexerit magna hoc loco instantia & incertitudo Matthioli: Hanc etiam quæ Camerarius pingit, non autem dicere eandem cū Stœchade odorata Lobelii, siue Narbonensi, quæ describit in Aduersariis. In Narbonensi flores non sunt minores, quàm in Germanica: nec eadem formæ sunt, quæ suam Stœchadem citrinam præstantiorem pingit Camerarius.

C. Bauh. phyt. Helichryſum 2. siue foliis longis copiosis: Dod. fol. lat. p. 268. Stœchadi citrinæ similis, sine iconē: in Epit. secundum edit. Cam. Helichryſum quoad figuram, non etiam descriptionem. Hoc ait se Frater ex Apennino habere. Quod verò ego descripsi, & cuius portionem suam magnitudine apposui depictam, dono habui nomine Helichryſi à D. Agerio qui in Apennino collegit. An verò hæc respondeat Stœchadi citrinæ simili Dodonæi adhuc dubito.

An Cæſalp. lib. 12. cap. 13. Helichryſon, quam recentiores Medici Stœchadem citrinam vocant, passim incultis, arido Solo nascens?

STOECHAS CITRINA TENVIFOLIA tertia, siue Neapolitana.

Helichryſum Creticum (ut videre est apud Matth. lib. 4. cap. 52. in edit. fratris C. Bauh.) planta est exilis, foliis longis, angustis, hirsutis, striatisque: caulibus angulosis, umbella in summitate aurea, diuulsaque: radice tenui ac superuacua. Nascitur in Creta.

Helichryſum Creticum

Ab. H. Lugd. p. 777. appellatur Elichryſum Creticum Matthioli: sine vlla descriptione. Item p. 779. Stœchas citrina Matthioli. Nescio quid in re differant Elichryſum & Stœchas Matthioli.

C. Bauh. phyt. Elichryſon 3. siue foliis oblongis paucis Stœchadi citrinæ angustioribus: Helichryſum Creticum Matthioli fol. lat. & Helichryſum eidem icon, quoad iconem non descriptionem: hoc in Italia prouenit inter Neapolim & Puteolos, ne quis cum prædicta [videlicet tenuifolia altera de qua præcedenti capite] ean-

V 2

dem censeat, illa enim numerosis angustissimis foliis: hæc paucioribus, longioribus, & illa latioribus est prædita. Apud Matthioli Elichryson, foliis Stæchadis citrinæ angustioribus: Elichrysum Creticum Matthioli & Lugdunensis.

Vires &
Vfus.

Flores de-
coctis
Obstruc-
tiones
Vermes.
Morbi ce-
rebro frigi-
di

Furfures
pediculi.
Vrina sup-
pressio.

Stæchadis citrinæ, si Matthiolo credimus, radix excalfacit & siccatur, aperit & abstergit, ut amarisculus indicat sapor: quin etiam nec adstringendi facultate vacat. Decocti flores, aut ex vino macerati, iocinoris obstructions aperiunt: proinde datur vtiliter corum decoctum, aut dilutū regio morbo, aut malo habitu affectis. Idem potum interancorum vermes necat. Medetur tota planta omnibus cerebri morbis à frigido prouenientibus, nempe pituitosis fluxionibus, diuturnis doloribus, comitialibus, resolutis, & id genus aliis, siue eius decoctum sumatur in potu, siue herba ipsa in puluerem trita ex rhodomelle bibatur, aut oxymelite: In lixiuo addita non solum præscriptis morbis auxiliatur, vbi eo caput abluatur, sed furfures quoque abstergit: & pediculos necat. Datur cum herba ipsa, tum eius decoctum ad vrinæ suppressiones, siquidem renes expurgat, & vrinam pellit. Adduntur flores in fomentis, quæ ad vteri morbos frigidos, & obstructions parantur. Stæchas citrina, inquit Lobelius, gustu est aromatico, medicato, acuto, & feriente, non nimio feruore subastringente: cuius doctiorum quorundam imitatione experta est admodum insignis vis, ad iccoris ex glutinosis succis ac vaporibus crassis intra tunicas discursantibus, diuturnos affectus. Pulmonibus verò inflammatis non impune dari meminisse par est, sed affluxu pituitæ acidæ, serosæ, vel salis calefactis aut erosus: eoque tutius vertissent interpretes Dioscoridis, pulmonariis, vel peripneumoniciis, quàm inflammationibus pulmonum.

& incipiente Vere in muris: item in colle circa Castelnouff. Suspiciabar hanc meam plantam eandem esse cum Lobelii Stæchade citrina altera: Verum dubium mouit mihi Clusius, qui has separare videtur.

H. Lugd. p. 778. dicitur planta nostra, Ageratum aliud quorundam, cui adscribit radicem candidam, tenuem, breuem, capillatam: corymbos aureos. Lugd.

An eidem p. 780. Stæchas citrina altera Penæ?

C. Bauh. Phyt. Elichryson s. siue siluestre angustifolium, quibusdam Chrysocome Dioscoridis & Plinii. Ageratum (inquit C. Bauh. in Animad. in Hist. Lugd.) aliud quorundam H. Lugdunensis sub Stæchade citrina altera Penæ denuo describitur, sed sine figura.

An Camer. apud Matthioli. in Hist. Germ. 1. 4. cap. 58. Stæchadis citrinæ species inodora, ex semine facile proueniens: nam quotannis se eo propagat: quidam Chrysocomen vocant. Puto Camerarium nostram intelligere: sed non placet inodoram & annuam dictitare.

An Cæsalp. lib. 12 cap. 14. Chrysocome in petris tantum nascens, copiosa in mœniis Pisanis: Fruticulus candicans, tenuis, ramosus: foliis Helichrysi, rarioribus: in cacuminibus ramulorum singula capitula oblonga, squammosa, sine flore, sed squammis ad Solis repercullum aureis: semine abeunte in lanuginem.

An Tabern. Icon. & Hist. Amaranthus luteus 2. geel Rheinblum. Suspicio Compil. Tabern. iconem esse malam ex mutatione Stæchadis citrinæ alterius Lobelii: Compilerator nullam proponit descriptionem.

Gerard. Amaranthus Galeni, Galeni Mothwoort. Mala figura Tabernamontani male ponitur à Gerardo pro Amarantho Galeni, quem non nouit.

STOECHADI CITRINÆ AFFINIS, CAPITULIS PARUIS, TARSIS, SQUAMMOSIS, IN PAPPIS EUANESCENTIBUS. CAP. XLV.

Descriptio



Citrinæ Stæchadis Narbonensis instar densè fruticat, virga ramen breuiore tomento candidæ, quas folia vestiunt Citrinæ Stæchadis, sed longiora subinde, non minùs angusta, inoffensa, marginum æquabilitate, tomento villosa subtus obliata: capitula singulorum ramulorum

extremis imposita, aut singularia, aut bina, ac etiam terna, semuncia breuiora, squammata: flores coloris sordidi & obsoleti non aurei, quorum apices medii in pappos degenerant. Huius plantæ idem ferè odor, qui dictæ Stæchadi. Monspeli hanc à me obseruata mense Septembri,

STOECHADI CITRINÆ AFFINIS CAPITULIS LONGIORIBUS. CAP. LXVI.



Pedalibus, interdum etiam cubitalibus, crebris lignosis fruticat virgis, in multos ramos ductis, albo villo testis: folia Stæchadis Arabicæ, infernè lanuginosa, incana, supernè ferè nigricantia, subinde videntur laciniata, in sicca plâta, fortè ex siccitate, ea corrugata sunt, sapore amaro: lingulorum ramulorum fastigio insidet modò vñ, modò bina, modò terna capitula, vnciam longa, teretia, squammis pulchrè scandulata, nonnihil rufescentia, papposum tomentum ipsius longius complexa.

Hanc Lobelius in Aduers. Stæchadem citrinam alteram, inodoram (& sic etiam in Icon. Plant. pag. 486. vbi eadem figura) appellat.

Clusius

Chrysocome
altera
Classa
Classus assumpta Lobelii icone in post. Hist. (vbi p. 327. Chrysocomen alteram inscribit) pag. 326. pro Chrysocome tertia, siue peregrina secunda hoc modo describit, Pedalibus, interdum etiam cubitalibus, affurgit ramis, candicantibus & lanuginosis, quos Olea similia folia, longa, mollia, cana lanugine tecta, per intervalla ambiunt: flores autem extremis ramulis pallentes, squammosi, ut Agerati ferè, insident: radices sunt nigricantes. Hanc alteram Chrysocomen Murciani *Mancanilla* nomine Chamæmelo comarum appellabant, Hispalenses *R. mero marino*, h. e. Libanotidem coronariam maritimam, Mauritani vrbis Granatenfis incolæ *Miscanin*. Bætiici referebant huius decoctum mitificè coli doloribus prodesse: qua facultate & præcedentem esse præditam verisimile est.

Libanotidis
marina
synonyma
H. Luper.
Inscribitur ab H. Lugd. p. 779. Stœchadis citrina altera, ac p. 780. pro Stœchade citrina altera inodora Penzæ describitur. Item p. 1387. pro Gnaphalio marino Dalechampi, vbi quaeritur num hac Impia Plinii lib. 24. cap. 19. potius fuerit. In figura Gnaphalii folia nimis angusta mihi videntur, nec etiam capitula omnia singularia, ut ab Hist. pinguntur, sed etiam bina & terna.

Tabern.
C. Bauh. phyt. Elichryson 9. siue silvestre flore oblongo.

An Tabern. Icon. & Hist. Amaranthus luteus 4. Geel Rhein blum. Suspicor Compilatores Tabern. malè suâ icone imitatum Stœchadem alteram inodoram Lobelii, cuius non tradit descriptionem.

Gerardo dicitur Helichryson silvestris, wildes goldlocke. Malè mala figura Tabernamontani à Gerardo ponitur sub falso titulo.

STOECHADI CITRINÆ ALTERI inodora Lobelii affinis, capitulis brevioribus.

CAP. XLVII.

Descriptio



A Nonymos ad fratrem C. Bauh. per D. Doldiū missa, sesquipalmari caule, incanâ lanugine obsito, in ramulos pænè palmares diviso, foliis vestito latioribus quàm Stœchadis citrinæ alterius inodora Lobelii, eodè tamen modo subrus incanis & tomentosis, suprâ nigricantibus, nonnullis etiam sinuatis, nisi corrugatio in sicca id videatur demonstrare: reliqua ramulorum pars palmo minor, foliis nuda, tenuis, in summo cacumine vnicum gestat capitulum dimidio brevius, quàm iam dictæ inodora Stœchadis, crassius tamen, squamulis nigrioribus, angustioribus, & brevioribus.

Tom. III.

uoribus compactum, pappo brevi nec extra prominente plenum.

C. Bauh. phyt. Elichryson 10. siue silvestre, flore oblongo, Elichryso [præcedenti] simile.

Ex Italia allatum: in montibus enim prope Terracinum, teste C. Bauh. provenit.

STOECHADI CITRINÆ ACCEDENS

Ialoux Paludano.

CAP. XLVIII.

Hoc nomine herbae cuiusdam summitates & flosculorum capitula nobis missa, ad Stœchadis citrinæ, vel potius Gnaphalii recti squammarum capitula accedentia, quæ ramen non citrina, sed cineritia sunt, ut Gnaphalii dicti, breviora tamen, pilisque albis confita. E quibus flosculorum foliola candidissima emicant. His etiam foliola quædam hærent, Serpilli minora, subrotundaque, aversa parte incanâ lanugine obsita, oppositâ obscurè virentia. D. Bernh. Paludanus misit cum hac inscriptione: Ialoux incognitum mihi.

GNAPHALIVM MARITIMUM MULTIS.



Radicem fixam, crassâ, longâ, lignosâ, paucis admodum fibris donata, nigrâ: quæ caules emittit complures, dodrâtales, crassiusculos, pios candidos, in quibus densò ordine stipata folia, oblonga, semuncialia, per extremum nonnihil rotunda, candida, quæ concepta in flosculos xylinae la-

Descriptio

næ penitus abeunt, olei in lucernis bibula: ramorum fastigiis capitula in umbellæ ferè formam digesta, crassiuscula, candida, villosa, in medio lutea, in quibus semen longiusculum, album, in arcus formam incurvum; nullam ego in hac planta saporem animaduerto, quamvis de sapore & odore dicat Lobelius. Astringit magnopere & desiccatur tota planta, nonnihil salsa, nec tamen ingrata, aut amara, aliquantùm aromatica odore, quadantenus citrinæ Stœchadis vel gummi Elemi.

Plantam à me descriptam, asserui quondam Monspelio reuerius esse Gnaphalium Dioscoridis, ob descriptionem scilicet, quæ tunc mihi convenire videbatur. Anno autem 1600. monitus per industriam virum D. Silvestrium Tedefchinum Pharmacopœum in Canna Cretæ, aliam plantam melius hanc cum Dioscoridis Gnaphalio convenire, lubens mutavi sententiam, ut qui similitudinis studiosus, & qui nolim ambitione & ci-

Sapet & odor
Gnaphalii
Dioscoridis
non est.

stantur. Ceterum plantam cum descriptione, & priori assertione (quam hic retracto) mihi olim Clariss. & gratiss. D. Præceptor Gesnero, à quo Camerarius figuram factam mutuo accepit, eamque, ut multas alias, apposuit Matthiolo, nusquam facta mei, aut Gesneri mentione.

De hac Lob. in Aduers. ait: Gnaphalium marinum: Coronaria vulgi. *Lydeus* dicunt Græci velletæ carperetæ lanas aut pannum, vnde Gnaphalion quod Romani Centunculum nuncuparunt & Tomentariam, ac Plinius Chamæxilon (sic enim emendo, quod omnes etiam recentiores legunt Chamæzelon) appositè dixit. Figuram exhibet, & in margine Bombacem humilem, Gall. *perit Coton* nominat. Obs. p. 254. Gnaphalium. Icon. Plant. Gnaphalium marinum, & Coronaria vulgi, siue Bombax humilis. Non placet Lobelium in Obs. ei vires adscribere, quas suo Gnaphalio Veteres attribuere.

Camer. hort. Gnaphalium marinum, planta tota albicans, exceptis floribus subluteis. In H. Matth. germ. itémque Egit. Gnaphalium: quod in Hist. ait latine Tomentum appellari. Tab. icon. & Hist. Gnaphalium marinum, See Gnaphalium. Clus. Pannon. p. 496. Gnaphalium legitimum in mediterranei maris littoribus nascens. Item Hist. post. Gnaphalium legitimum Dioscoridis. Hist. Lugd. pag. 115. Gnaphalium Matthioli.

C. Bauh. Phyt. & apud Matthioli. Gnaphalium 1. siue maritimum. In Animad. in H. Lugd. Gnaphalium Matthioli, pag. 115. figura posita absque descriptione. Gnaphalium marinum tomentosum p. 1387. figura cum descriptione.

Gesn. hort. Gnaphalium marinum, vel potius maritimum. Videtur ipsi autem, ut propria manu ad plantam meam adscripsit, Stœbe Galeni.

Marina littora Gnaphalio candicant [inquit Bellon. Obs. lib. 1. cap. 18.] nam quod ab Herbariis depingitur (de hoc mox dicemus) adulterinum est.

Gnaphalium marinum voco propter summam torius plantæ albedinem. Monspelii apud mare prouenit. Lugduni habui in horto. Vniuerso littore & sabuletis à Marianis aquis ad Geti mōtis radices & lacum plurima, alibi haud temerè occurrit Norbonæ. In Adriaticis littoribus non vidit Lobelius. Gnaphalium legitimum Clusii circa Calpen, Malacam, & Valentino regno mediterranei maris litore frequens obseruatur.

Sæpius vsus est Lobelius furculis cum elichniis, qui viuide alunt flammam. Olei quippe, cæterique pinguis liquoris potrix est.

GNAPHALIUM GERMANICVM.

CAP. L.

Gnaphalium hoc palmæ & sesquipalmæ altitudinem vix ferè superat, *caulis* pluribus donatum, partim rectis, partim in terram repandis, ramosis, canâ lanugine oblitis: quâ etiam pubescunt *folia*, Lauendulæ foliis paria, sapore citra mortuum siccante: *flores* tum in extremis ramulis, tum in ipsis angulis, quæ ramorum diuagationes deformant, sessiles ex luteo pallescunt, conferti: *radix* lignosa, alba, fibrosa.

Plantam à nobis descriptam, Herbam Impiam Plinii esse plurimorum consensu statuitur. Et imprimis quidem Matthioli testimonio confirmatur, dicentis. Fuchsius herbam quandam



pro Gnaphalio Dioscoridis ostendit, quâ idem fortasse Gnaphalium existimauit, quodd incana, tomentosaque conspicitur. Sed mihi planè eâ Fuchsius pro Gnaphalio depinxisse videtur, quam Plinius lib. 24. cap. 19. Herba Impiam vocari tradit: quæ meritò Impia Plin. dici posset, quod eius è Veteribus

nemo, quantum equidem legerim, præter ipsū meminere. De qua is differens loco modò citato, eam his notis descripsit. Herba Impia vocatur incana, Rorismarini aspectu, thyrsi modo vestita, atque capitata. Inde alii ramuli assurgunt, sua capitella gerentes. Ob id Impiam appellauere, quoniam liberi super parentem excellant. Alii potius ita appellatam, quodd nulum animal eam attingat, existimauere. Itaque de Impia Plinii Matthioli, qui in priorib. cōm. Gnaphalium Fuchsi nec depingit, nec describit, sed nec dum in post. comm. delineat, sed picturâ tantum exprimit, ac Gnaphalium vulgare vocat, ita ut vel hinc appareat, eum id non nouisse.

Camer. apud Matthioli. Germ. dicitur Impia Plinii, vel Centuncularis, Gnaphalium verum quorundam. In Egit. Matthioli. Gnaphaliū vulgare, Impia Plinii, Herba torminalis.

H. Lugd. p. 115. Gnaphalium vulgare Fuchsi. Gnaphalium Fuchsi. Gesn. hort. Gnaphalium, Impia: Impia Plinii, & Gnaphalium quorundam. Cordo in Dioscor. Tomentum siue Centunculus, Gnaphalium. Anguill. epist. 12. Impia Plinii, Carthophilago, quam quidam putant esse Gnaphaliū. Eur. Cordo Gnaphalium, latine Centunculus, Albinus etiam dicta. Lob. in Adu. pag. 101. [vbi ad Stœchadem citrinam potius hanc referendâ censet.] & Icon. Plant. p. 480. Gnaphalium vulgare, Filago, Centunculus. Obs. pag. 285. Gnaphalium vulgare, Centunculus, Impia Plinii.

Tabern. Icon. & Hist. & C. Bauhin. apud Matthioli. & phyt. (vbi tertium facit) Gnaphalium vulgare.

Dod. gall. lib. 1. c. 60. Filago, Herbe à cotton, Piloselle species quibusdam, *γυαδισ* Græcorum, Centunculum, Centuncularis & Tomentitia: Herba Impia Plinii. Dod. lat. in fol. Filago, siue Impia. Quam primo loco describit, ac nonnullos Pilosellam quoque appellare ait.

Tragus in Hist. lat. lib. 1. cap. 109. hanc secundo loco pro sylvestri Heliochryso describit & depingit: in Hist. germ. autem primo loco sub nomine Rburfrant pingit, & pro genere sylvestri Rheinblumen describit, atque à quibusdam feglin/ seu feldtsagen à colore & mollitie dici: ab aliis Rburfrant (hoc est Dysenterialem, gall. Herbe de la dysenterie) & hünshfrant / à taculratibus quas obtinet, appellari. Is inter vires alteram Amaranthi speciem in H. Lat. constituit.

Cz. alp.

Synonyma
Herba torminalis.

Tomentum
Cordo.
Carthophilago.

Albinus.
Stœch. citrinâ.
Filago.

Pilosella.
Centuncularis.
Tomentitia.

Heliochryso.
for. sylvestris.
Trago.

Bombax
humilis.

Tomentum

Gnaphal.
marinum.

Locus &
tempus

Cæsalp. Herba Impia, de qua Plinius.

An Ruellio Gnaphalium?

Bellon. lib. 1. Oal. cap. 18. fortè hanc intelligit cum ait. Gnaphalium depictum apud plantarum Historicos spurium est.

Gnaphal. spurium Brunfelsius quoque Tom. 1. in Obs. ex Scrib.

Bellon. Largo fortè de hac ait: *γρασάλε* Herba, Centunculus, vel Sorba, vel Siliqua Syriaca.

Sorba, vel Siliqua Syriaca Turn. part. 1. p. 119. Centunculus, Græcè Gnaphalion, Germanicè Rhusfrant, Anglicè alibi Cartaphilago, etsi alia sit vera Cartaphilago ab hac planta diversissima. In Eboracensi agro dicitur Eudmeed, vel Eudmure. In Northumbria Chasweede / quoniam ad intertrigines valet. Idem par. 2. fol. 11. Gnaphalium, Gnaphalium Dioscoridis, lat. Centuncularis, Anglis dommeede / vel Corneuede. Bis de eadem planta agit Turnerus.

Locus & tempus. Gnaphalium Fuchsi siue Germanicum puto me vidisse Monspehi verno tempore, & autumnali: Basileæ etiam ubi frater C. Bauh. duas esse species observavit: vnam flore albo, valde tomentosam: alteram flore luteo. Patavi vidi & Genæv virentem Octobri. Lugduni frequens est. Montbelgardi abundat in agris. Camerario auctore nascitur in locis sabulosis apricisque aggeribus.

Vires & Virtus Impia Plinii inter duos lapides trita feruet, præcipuo aduersus anginas succo, lacte & vino admisto. Mirumque traditur, nunquam ab eo morbo tentari, qui gustaverint. Itaque & subus dari, quæ id medicamentum noluerint haurire, eo morbo interire. Sunt qui, & in aurum nidis inseri aliquid ex ea putent, atque ita non strangulari pullos audius deuorantes: hætenus de Impia Plinius. Altera Amaranthi species [Gnaphalium Germanicum] auctore Trago, eadem cum Amarantho Tragi (Stæchade citrina germ.) obtinet facultates, & præsertim pecorū ac armentorum affectionibus, quas Germani dic hirsch appellant, succurrit. Resiccantem, ac nonnihil adstringentem facultatem Filago Dodonæi habet. Aqua ab hac destillata ad cancrum, præcipuè mammillarum, magni est usus: continet enim occultos caneros ne exulcerentur, cum lincolis semel in die imposita. Sunt verò & qui Asari foliis, huius aqua madefactis, non infelicitè ad caneros reprimendos vtantur. Qualitates & vires easdem huic adscribi, quas Gnaphalio veteres tribuerunt, testis est Camerarius. Herba contusa, inquit Lobelius, oleo mace-ratâ & coctâ, occidit Angliæ plebs, ad liuores, concussionem, cæsa, & verbera vtitur feliciter, menses etiam supprimit.

GNAPHALIO VVLGARI SIMILIS.

C A P. LI.

Descriptio Plurimos ex radice breuiusculâ, denso capillitio comatâ profert cauliculos, palmares, ramosos, teretes, villo incano pubescentes, & in his similiter lanuginosa folia, nullo ordine posita, vnciam longa aut breuiora, dimidium culmum vix lata, nervo secundum longitudinē decurrente, sapore citra morsum succante, inter quæ summis ramulis resident flosculi perquam pusilli, conferti, staminulis è viridi flauescensibus compositi, in pappos faciescentes.

Synonyma Lob. Icon. Plant. p. 481. Filago minor. Dod. gallic. & lat. in fol. Gnaphalii seu Filaginis tertia

species, lanuginosis coliculis, foliis, floribusque in cacumine priori similis [Gnaphalio virgato,] sed humilior ac multò minor: Filago minor: figura eadem cum Lobelii. C. Bauh. phyt. Gnaphalium 4. siue medium.

An Tabern. Icon. & Hist. Gnaphalium medium.

An Cæsalp. lib. 12. cap. 15. Herba Impia alia in montibus tenuior ac ramosior, tenuioribus corymbis?

Montbelgardi passim mente Iulio & Augusto floret. Filago Dodonæi minor cum aliis locis sterilibus, arenosis, subinde circa aridos fetos, in silvis & in neglectis agris: à Maio in Augustum vsque cum flore viger, atque his mensibus opportunum cum priore colligere.

Locus & tempus

GNAPHALIVM MINIMUM.

Lobelius in Obs. Belg. p. 566. hoc Gnaphaliū sequentibus verbis tradidit. Gnaphalium minimum (ita etiam inscripsit in Icon. Plantar. p. 481.) aller minste Ruer cruydt / palmi al-tu-

Synon.

dine, flosculi Abrotani maris, foliis albicantibus, & tomentosis.

C. Bauhin. phyt. dicitur Gnaphalium 5. siue minus. Nos quæ hoc sit, vt veritatem fateamur adhuc ignoramus, quia oculis nostris nunquam intui sumus. Si Lobelius natales in quibus collegit, annotasset, cultiores rei herbariæ stu-



diosi melius hanc inuestigare potuissent.

GNAPHALIVM VVLGARE.

tenuifolium.

Descriptio Ignescit radix multis fibris capillata, haud lecus ac Gnaphalio Germanico: caules multi, dodrantes, ramosi: folia vnciam longi, sili penè tenuitate, incondita, mollia, tomentosa, incana: flosculi & capitula per caules disposita, vt in prædicto Gnaphalio, sed pauciora, minoraque.

An Lob. in Aduers. p. 201. varietas germanici [Gnaphalii] maioris & secundum folia floridi, de qua ait. Interdū & aliam vidi in Germania Filaginem, etiam foliis & caule Stæchadis citrinæ & inodoram, alibi etiam flosculis non summo, sed inter foliorum intervalla passim secundū longitudinē, ortis. In Belg. p. 567. Ander Ruerfruyt, Filago Germanica altera secundum folia floridi.

An etiā Pl. icon. p. 481. Filago Germanica altera secundum folia floridi? An C. Bauh. phyt. Gnaphalium 6. siue secundum cauliculos florens.

Locus &
Tempus.

Gnaphalio Germanico siue Fuchsi affinem, dico plantam in segetibus à me Basilea inuentâ, & mihi à Petro Turnero allatam, à se Heidelbergæ collectam. Montbelgardi abundat in agris etiam Octobri.

GNAPHALIVM RECTVM.

Descriptio



Hic Gnaphalio caulis, rectus & rigidus, dodrâtem altus, teres, canâq; lanugine pubescens, nihilque secius folia, magis tamen auersâ quam aduersa parte, quæ in caule crebra, ordine nullo, nascuntur, vncias duas aut quatuor circiter longæ, vix culmum latæ ut plurimum, carinata, sapore præter siccitatem nullo euidente, ex quorum alis secundum caulem, ab eius medio, ad summum vique capitula oblonga, squammata, plura simul juncta, ex viridi nigrescencia, & nitida, in pusilla flamma ex herbaceo flauescencia dehiscunt: radix subest parua, nigra.

A Trago germ. hæc exhibetur sine descriptione sub titulo Rhutfranz. A lat. autem hoc nomen non tantum pingitur, sed etiam pro Heliochryso siluestri describitur, ut ego quidem existimo. An verò hanc, vel Gnaphalium Fuchsi [quod secundo loco pingit] Polium alterum Dioscorides appellet inter nomenclaturas, difficile est iudicare: videtur enim vtramque sub nomine Heliochrysi siluestris describere.

Matth. in post. comm. cum mag. fig. iconem huius apponit sub descriptione Leontopodii falsi.

Lob. in Aduers. dicitur Gnaphalium tertium Anglicum folio longiore, perperam Leontopodium alterum Matthiolo: astringit, nonnihil amari cat, multum exsiccatur. Obl. p. 256. Chrysocome germanica, Pseudoleontopodium Matthioli, & Heliochryso silu. Tragi. Icon. Plant. p. 482. Gnaphalium Anglicum vel Belgicum folio longiore. In Hist. Belg. pag. 567. Engelsch Ruers cruydt. Dod. gall. Filiginis (herbe à cotton) secunda species.

Hist. Lugd. p. 125. Chrysocome lanuginosa Dalechampii, quam quosdam Impiæ à Plinio memorate genus esse putare refert, quod doctis Herbariis iudicandum relinquit. Item p. 1344. Pseudoleontopodium Matthioli. Eadem planta bis describitur: prior descriptio seruanda.

Clus. Pannon. pag. 494. & Hist. post. Gnaphalii genus pedali aut ampliore caule, floribus à medio ad summum usque fastigium inter longiuscula, mollia, incanâque folia nascentibus.

C. Bauhin. Phyt. Gnaphalium 7. siue maximum virgatum. Frater Herbam Impiam in monti-

bus Cæsar. credit, quod asserere pro certo nondum queo.


Gnaphalium virgatum in montibus inter Bessfordiam & Malmunster abundat, & in monte Rossberg. Propè Montbelgardum eundo ad pontem Vauiaucourt. In monte Balen Augusto florens. In Alpium Pannonicarum variis locis, Clusio teste, prouenit. Tertio à Londino miliari opacæ siluæ claus multam alit, cis Tameisim.

Locus &
tempus.

GNAPHALIVM AD STOECHADEM

citrinam accedens.

CAP. LIII.



Descriptio

Radix huius specietur parum fibrosa, & nonnihil lignosa: folia gnaphalii, quædam tres vncias longa, alia breuiora, culmum, vnum, vel duos lata, tomentosa, incana, mollia: caules villosi, albi, recti, interdum ramosi, dodrâtales & cubitales: quorum fastigiis duntaxat floresherent, & capitula ad Stoechadem citrinam accedentia, vel ad Gnaphalium montanum, ex squammis lucentibus constantia.

An Chrysocome altera Clusio? An Lob. Ic. Plant. p. 485. Chrysocome & heliochryso siluestris? An Tabern. Icon. p. 386. Chrysocome, Amaranthus galeni, Stoechas citrina officinarum, Rheinblum / Mattenblum: Hist. lib. 2. pag. 103. Stoechas citrina; Hæc etsi fortè non sit nostra planta, malè tamen Tabern. accommodat multa nomina figuræ à Plantino desumptæ, quæ minime conuenit cum Stoechade citrina officinarum.

Gerard. Chrysocome galeni, Galeno Goidia loco. C. Bauh. Phyt. Elichryson 7. siue siluestre latifolium capitulis conglobatis. Monspelii Autumno à me fuit obseruata, ceu & in montibus circa Esperon. Eandem mi multum fallor Lutetia vidi in horto Monachi. Vessontii inter plantas siccas celebris Medici Casenat pulchram plantam reperi ad quam partim facta mea icon.

Tab. 100.

GNAPHALIVM VNICO CAULICVLO.

VNico assurgit gnaphalium aliud Plateau [3. in Hist. post. Clusio] cauliculo, aliquot ramulis in diuersa se contorquentibus prædito, quos hinc inde sepiunt latiuscula, mollia & incana folia: ad ramulorum internodia nascuntur, inter foliorum congeriem, quina, sena, aut plura capitella simul congesta, ex flauo canescentia, multâ lanugine plena: radix inutilis, sed deciduo semine, nouæ

Heliochryso silu. Trago.

Leontopodium falsum Matth. Gnaphalium Anglicum folio longiore Lob.

Filago.

Descriptio



ne, nouæ plan-
tæ singulis an-
nis renascitur
In sicciori-
bus (quantum
memoria Cla-
sio succurrit) a-
gris, præsertim
deuexis sege-
tibus, occurrit.

sam iconem à Matthioli figura posuit, quamuis
aduers. Leontopodium referat: in Belgicis ait
tantum siccam sibi visâ & prius à Clusio obseruatâ.

Gnaphalium alpinum [inquit Clus. in Pann.
& hist. post.] videtur ea planta, quam Matthiolus
pro vero Dioscoridis Leontopodio exhibet. Sed
sine dubio Gnaphalii duntaxat genus est.

Tab. Icon. & Hist. Leontopodium 10. siue al-
pinum magnum magis flore: Leontopodium
verum Matthioli, differens à Lobelii radice ma-
iore quasi squammosa, & foliis longioribus. Ea-
dem apud Matthiolum habet. Gesnerus ad her-
bam siccam propria manu scripsit: Gnaphalium
montanum vel petraeum dixeris.

Gnaphalium hoc Alpinum abundat in mon-
tibus circa Geneuam. In horto Ducis Florentiæ
collegit I.H. Cherlerus. Prouenit, in scopulis Pâ-
noniæ, Sneberg, Darrenstein & Erschberg iu-
gorum: floretque Iulio & Augusto.

Gnaphal.
Alpin. Clus.
Gnaph.
Matthioli
est Leontopodium.

GNAPHALIVM ALPINVM PVLCHRVM. CAP. LIV.

Descriptio



G Gnaphaliū
Alpinum
caulibus est pal-
maribus, do-
drantalibus, al-
tioribus etiam,
comætois, quos
folia vestiunt lō-
ga, angusta, vil-
losa, trium, qua-
tuorue vnciarū
longitudine,
culmo latiora:
summu fasti-
um flores gerit
atis magnos,
orymbatos,
papposos ex
staminibus lu-
teis atque splen-
dentibus con-
stātes, sessiles,

molli lanugine intertextos, in medio foliorum
xyl carptam lanam imitantium radiatorum: folia
propter terram multa, superioribus non multum
abimilia, statim è radicum satis crassarum, ni-
grarum multis fibris pullis capillatarum capiti-
bus oriuntur.

Thalera

De hoc Iohas Simler. de Alpib. wüllblumen
flos odoratus, est folio Pilosellæ, circa supremū
cauliculu folia multa, imparia, candicantia,
lanuginosa, medio orbe quinque vel sex flores,
inter quos medius plerumque aridus, & singulis
lutei apices: radix arida, parua, summo cespite
hærens: Tomenti speciem arbitror.

Non dubitat Matthiolus in post. comm. It. &
Lat. cum magnis fig. quin planta, cuius hic ima-
ginem damus legitimum sit Dioscoridis leonto-
podium, ideoque Leontopodium verū inscribit.

Lobel in Adu. p. 202. Leontopodium, siue Pes
leoninus dicitur propter villosam foliorū & flo-
rum effigiem cras pedi annexum aliquantum re-
ferentem. It. autem herbulam hanc montanam
iam inde à Brunfelsii, Germanorū aliorum Scri-
ptorum temporibus inuentam & descriptam, ait,
quæ non parum, foliis Rolam, seu Rorellam i-
mitetur. Ego autem eam non inuenio apud Brū-
felsium aut alios Germanos: in Obs. p. 255. diuer-
Tom. III.

GNAPHALII ALPINI PVLCHRI aliud genus.



Pingit hoc
Lobelius in
Icon. Plant. p.
484. hac inscrip-
tione. Leonto-
podium siue Pes
leoninus; In
Belg. p. 569. hoc
titulo. Löwen
Dort. Cetero,
Leontopodium
quod in Aduers.
Lobel. refert ad
Matthioli ab
hoc diuersū est,
quod crassam &
quasi ex squam-
mis compactam
habet radicem
ut rectius à Clu-
sio pingitur: cum
illi tenuius sit ut

recte in Phytopinace annotat C. Bauhinus.

Tabern. Icon. & Hist. Leontopodium, species
Gnaphalii, Löwenfūs.

GNAPHALIO ALPINO AFFINE Leontopodium paruum Lobelii. CAP. LV.



Dioscoridi
& Neote- Descriptio
ricis præterita
hæc huic [ico-
ni] effigie ha-
bituque toto
conuenit, sin-
gulari dodran-
tali cauliculo &
folio Gnaphalii
montani densā
lanugine inca-
nis: stolis lū-
mo caule luteo
pallentibus
Gnaphalii mō-
tani, exili li-
gneaque radice.
Et hæc Lob. in
Obs. p. 256. de
suo Leontopo-
X

dio paruo, cuius iconem eodem titulo in Icon. Plant. p. 474. in H. Belg. p. 569. habet, ut & Tabern. in Icon. & historia, ubi Gertr. Fleinen löwenfuss vocat. C. Bauh. Phyt. dicitur Gnaphalium n. siue Alpinum minus.

Gnaphalio Alpino affinem hanc plantam vidi apud fratrem C. Bauhin. inter eius plantas siccas, nomine Leontopodii parui.

GNAPHALIVM VMBELLATVM

minimum.

CAP. LVI.

Descriptio




Plantula hæc vix vniculæ magnitudinem superat. Ea aliàs unica & simplex, aliàs in plures veluti ocellos diuisa, ex foliis constantes candicantibus, hirsutis, inter quæ oculus conspicitur minimi digiti vnguem ferè latus, asperiusculus ex flauo vitelcens. Folliculus etiam foliola vestiunt, prædictis minoribus, quæ sculptor (quæ esse solet

torum negligentia, utinam non impostura) perperam secuit. Sed nec ocellum asperiusculum rectè ad pictoris manum imitatus est. Radix ex meris fibris constat, lignæ duriciæ, nigris, contortis, ipsâ plantulâ longioribus. An sit hoc idè cum Leontopodio Lobelii Obs. p. 255. quod iconem attinet, asserere nec negare possumus.

In montis Ceti arenosis & maritimis sabuletis Maio florentem collegit I. H. Cherlerus, eâ nimirum parte, quâ lacum traiciendo ad dextram recta versus tenditur.

GNAPHALIVM AMERICANVM.

CAP. LVII.

Locus.
Descriptio

ta, in acutam mucronem desinentia, supinâ parte

EX America delatum, indidè quæ denominatum Gnaphalium, ad cubiti altitudinè assurgit, procerius etiâ subinde adolefcit, caulibus crassiusculis, multo candido tomento obfistis, medullâ fûgosâ farctis, retetibus: quibus certâ serie folia adnascuntur, palmum circiter longa, semunciam lata, in acutam mucronem desinentia, supinâ parte

virentia, triplicique neruo secundum longitudinem decurrente donata, inferius verò villosa & incana: corymbi summis ramis insident, multi, cõferti, tomento obfisti, quorum singulares flores ex argenteis retortidis foliis compactiles, papposa in medio filamenta, coloris rufi, aut melini, vel subflauo Clusio, qualis ferè in Gnaphalio vulgari, comprehendunt, quæ tandem in pappum aut semè mutata abeunt: radix subest lignosa, exsucca, serpentes de se propagines & fibras promittens, minimi digiti crassitudinem ferè æquat, nigra, ex laterib. nouos singulis ânīs caules proferēs qui primum emergentes nihil nisi tomentum esse videtur: tota ætate flores producentes.

C. Bauh. Phyt. Gnaphalium Americanum Clusii. Item apud Matth. Gnaphalium latifolium peregrinum in horto Ill. D. Wirt.

Hanc primum vidi Pfortzheimiæ in cultiss. horto, quem excolebat Hôchstetterus anno 1593. cum copioso flore Nouembri. Mihi floruit Iulio & Augusto mensibus. Montbelgardi missa ab eodem Hôchstettero.

PILOSELLA MAIOR ET MINOR QVIBUSDAM, aliis Gnaphalii genus.

CAP. LVIII.

Pilosella minor.



Pilosella maior.



Hvmi fûdit circumcirca oppressa ferè terra folia oblôga, per extremum rotûda, incanâ lanugine obfista, inferiâ parte, inter quæ surgunt caules palmares, aut dodrantes, etiam cubitales, tomento fû, candicâtes, foliis vestiti longis, angustis: e quorum cacumine glomerati pendēt flores multi, iâ maiores foliolis exsuccis, squammulis latioribus & breuioribus contextis, speciosiores, iam minores, è minus pulchris squammulis angustioribus & longiusculis cõstantes, nunc candidi, nunc magis minûsue purpurantes, in medio apicibus multis, quibus lucrescunt longi pappi: radices fibrosæ

Descriptio

in fibrosæ repeant Pilosellæ vulgaris in morem,

Pilosellam minorem pingit Trag. lib. 1. c. 109.

Lagopi
Tragi.

Lagopi titulo, quem Bajenpforlin nominat. Fuchsius licet Pilosellæ alterum genus faciat, minoremque inscribat, quod tamen *muers de sit*, non concedit. Ex descriptione, inquit, Sole clarius fit, eam herbari, quæ à Græcis Myosotis, à Lat. autem Auricula muris dicitur, non esse Pilosellam: nam ut reliqua taceam, neque maior neque minor hæc Pilosella cæruleum flosculum velut Anagallis obtinet, ut non parum errent herbarii, qui Pilosellam alio nomine Muris auriculam appellari tradunt.

Lacuna Pilosellam aliam floribus purpureis appellat, negatque esse legitimum Holostium meritis.

Pilosellam
non Dodon.
Gnaphalij.

Dodon. gall. Pilosella minor, Auricula muris non tamen vera. Lat. in fol. Pilosella minor, prior: sunt qui ad Gnaphalii genus referant, & Gnaphalium montanum appellent, à quo non admodum differens: refertur etiam ad Leontopodium Dioscoridis cuius descriptioni non omnino respondet. Dodonæus Lobelii posteriores duas icones proponit, non tamen Iconum Plantinarum priorem.

Lob. in Adu. Gnaphalium montanum, purpureum & albū. Pilosella minor Fuchsi. In Obs. p. 255. Gnaphalium montanum Aduers. p. 202. Lagopus & Pilosella Tragi. In Icon. Plant. p. 482. Gnaphalium montanum album. Item p. 483. Gnaphalium montanum purpureum. Et Gnaphalium montanum suave rubens. Nulla figura placet: in priore flores non rite exprimuntur: aliter duæ pilos habent nimis magnos.

Gnaphal.
mont. 179
p. 482 Tab.

Tabern. Icon. & Hist. Gnaphalium montanum album, weiß Engelblum. Et Gnaphalium mont. suave rubens, Rot Engelblum. Figure hæc tres Tabernamontani nullum discrimen demonstrant: nostra ex Fuchsiæ eam in memoriam reuocat speciem, quæ flore minore est: altera autem nostras est eius, quæ speciosiore flore cernitur.

Thal. Pilosella minor Dod. floribus candidis & purpureis Clus. Pilosella minor. Is non describit, quamuis flore aut omnino albo, aut purpureo, aut ex albo purpurascens, siue carneo esse scribat.

C.B. her.

C. Bauh. phyt. Gnaphalium 8. siue montanum rotundior folio: Lagopus 2. Trag. lib. 1. cap. 88. Et Lagopus 3. cap. 109. Item: Gnaphalium 9. siue montanum longiore folio & flore. In foliis cum fratre non agnosco differentiam: in floribus potissimum discrimen obseruo.

H. Lugd. p. 1116. Gnaphalium montanum Dalechampi.

Locus &
tempus

Plantaueram in hortulo meo Montbelgardi Pilosellam minorem Fuchsi, quam collegi prope 3. Germani eundo Malmunster: Circa Genenam in montibus obseruaui, Basileæ in colle iuxta vetus Castellum mense Maio. Copiosam vidi in valle Griesbachiana florentem Maii principio, flore maiore & minore, albo & purpureo. Appellauit autem Gnaphalium montanum multis annis priusquam Aduersariorum auctores scripserint. Pilosellæ minoris Clusii mirioribus Hungariæ, Stiriz, Moraviz, Bohemizque montanis & collibus herbis duo aut tria genera inneniuntur. Quæ verò carneo dicitur flore, omnibus cædis & apertis per Germaniam siluis atque arenosis tumulis ferè est ubiua.

Gnaphalium hoc montanum, tamen si vsum in medicina nullum habeat, est tamen naturâ valde relicans & adstringens.

Fabriz.

BACCHARIS DIOSCORIDIS

Rauuolthio:



Peregrina & hæc quoque planta ad Libanum à Rauuolthio obseruata, cubitalis, foliis lanuginosis donata, Verbasci foliis, simili- bus tamen, & tantum in Tabaco, aut Hyosciamo Peruanico Dod. ample- xantibus. Sum- ma occupant flosculi albidis, purpurascen- tes, dense stipa- ti, ut in Ama- rantho luteo, aut Auricula

Locht.

Descriptio

muris Fuchsi. Radicula odorati Ellebori nigri similis. Rauuolthius sanè circa hanc titubare deprehenditur. Nunc enim (in Itiner. lib. 2. cap. 12. Dioscoridis Baccharin absolute pronunciat: nunc (parte sc. 4. in Icon. N. 289.) an Baccharis Dioscoridis sit, quæ à quibusdam Unser frauen handschuch (nostræ Dauræ chirothecam dixeris) nominetur, dubitat. Attamen plantæ hæc, quam se obseruasse in descensu montis Libani scribit Rauuolthius, quæque plurimum ad Dioscoridis Baccharin accedere ipsi visa est, ex notis quas illi tribuit, teste Clusio, potius ad ea Gnaphalii montani genera referenda videtur, quæ à Fuchsi & aliis plerisque Pilosellæ minores appellantur.

H. Lugd.
not.

In Hist. Lugd. in append. p. 33. Baccharis Dioscoridis titulo depingitur & depingitur. Hist. licet ex Rauuolthio sua dolumat, eum tamen non citat.

PILOSELLA PHLOMODIS

exotica:



Hæc pti- mum nobis visa apud Cl. Felicæ Platerum Archiatrum Basiliensem: Pedalis autem est, nec dum flores ferebat, sed florum tantum prima rudimenta. Folia ab imo statim lōgis & crassius pediculis annexa denso stipata oriuntur, quædam ouata, quædam rotundiora, crassa, carno-

Descriptio

X 2

sa: ipso exortu holoserico vellere donata, reliqua parte tota incana lanugine pubescentia, veluti Dictamnus falsus, aut Stachis, latissimo aspectu. Caulis etiam, qui vnicus est folia stipant alternatim haerentia, praedictis minora, longis interrim crassisque pediculis donata.

Picta erat ex Lobelio antequam nobis innotuerat planta. Quae Lobelii figura in hoc à Plateriana nobis iam descripta planta differt, quod ea nec rotundiora exprimat folia, pluribusque caulibus donatam scribat, nempe ternis quaternis, quadrangulis, genicularis. Radix durior, eodem teste, lignosa, fibris donata.

Synonyma Lob. autem Obi. p. 254. & Icon. Plant. pag. 479. suam plantam pingit hoc titulo. Pilosella maxima Syriaca. Tabern. Icon. & Hist. ita inscribit: Pilosella maior Syriaca, Pilosella 4. *Groß Syrisch Maussöphlin.* C. Bauh. Phyt. vocat Pilosellam 4. huc Syriacam nondum visam.

ABSINTHIA VETERIBVS

CAP. LIX.

Absolutionem Absinthii tractationem tradituris, Veterum de eo placita primo inspicere conueniat.

Passim autem à Theophrasto in historia plantarum his & similibus describitur. Quaedam amarae plantae, aut mali odoris, viles tamen: eodem modo & folia & caules, ut Absinthii & Cētaurii. hoc oues in nostro tractu non pascere quidam dicunt. Quae autem in Ponto pascunt & sunt pinguiore & pulchriore, & ut quidam aiunt, non habent fel (vna amaritudine, alteram pelente, inquit Tragus:) sed hoc non ad praesens institutum. Cur verò pecora maxime pinguescant hoc pabulo, id euenire videtur, quia effarctus liberet hepatis, unde facilius distributio alimenti. Est enim insignis hepatica Absinthium, quippe in hydropicis remediis ferè solennis. Absinthium, pergit Theophrastus, mutatur ratione cultus: loca argentia quaerit.

Bathypicr. Dioscorides Absinthium Bathypicron cognominat, id est, intensae amaritudinis, sed tanquam notam herbam non describit: praestantior ex ipsa esse tradit, quae in Ponto & Cappadocia in monte Tauro appellato nascitur. Absinthium inter spuria ab Aegyptiis Soma vocatur, à Romanis Absinthium rusticum.

Genera Absinthii genera sunt plura, inquit Plinius: Santonicum appellatur à Galliae ciuitate (regione Diosc.) Ponticum à Ponto, ubi pecora pinguescunt illo, & ob id sine felle reperiuntur, neque aliud praestantius multoque (multumque M.) Italico (Italicum, Celsus legendum putat) amari, sed medulla Pontici dulcis. Est & Absinthium marinum, quod quidam Seriphium vocant probatissimum in Taphosiris hanc Stephanus sic distat vult, quod Oliridis sepulchrum ibi esset, quasi Ostridis *no* [?] Aegypti. De usu Absinthii dicemus postea.

Absinthii probabilius genus esse Ponticum, affirmat quoque Apuleius, virtutis sc. acerrimae, feruentis & amarae: nasci locis incultis. Et hinc Ouidius:

*Turpia deformes gignunt Absinthia campi:
Terraeque de fructu quam sit amara docet.*

Pulchra similitudo Absinthium amarum esse pulchra similitudine ostendit D. Gregor. Nazianz. in Orat. Apolog. dum ait. Citiùs quis parua malicia abundare incipit,

quàm in virtutis cumulo vel parum proficitur. Quandoquidem & modicum Absinthium citò melli amaritudinem tribuit, mellis verò nec duplum Absinthio suam confert dulcedinem. Et conuerterunt, inquit D. Hieron. in Amos cap. 5. dulcedinem iudicii in Absinthii amaritudinem: assumentes iniquitatem & iustitiam derelinquentes. Item in Iob. cap. 5. Nonissima autem illius amara quasi absinthium: vide plura ibidem. Simile quid tradit etiam Lucretius.

*Ac veluti pueris Absinthia terra medentes
Cum dare conantur, prius oras pocula circum*

Aspergunt mellis dulci flavoque liquore.

Verebatur & Fab. Quintilianus ne liber suus parum mellis & Absinthii multum habere videretur, essetque salubrior studiis, quàm dulcior.

Fuit apud Veteres Absinthium herba funebris (autore Pierio in Hieroglyph.) ac idè eum in cœmeteriis plantabant.

Ad Galenū noster dirigatur gressus. Aliud est, inquit, ab Abrotono Absinthium, cuius tres statuendae sunt species, quarum vnam eodem, cum genere ipso, nomine appellant: cuiusmodi potissimum est Ponticum: alterum Santonicum: tertium Seriphium. Si verò aliud placet appellare Absinthium, aliud verò Seriphium, aliud autè Santonicum nihil interest. Quoniam haec tum specie seu formâ, tum gustu, tum facultatibus inter se diuersa sunt, non obscure vno, si ita lubet, omnia nomine nuncupes: verum exactè vires earum edoceas. Ac nos sanè sufficienter ipsas formas à Dioscoride explicatas esse, aliisque non paucis, iam diximus. His addit lib. 11. m. m. c. 16. Pontico adstringendi facultas non parua est: in reliquis omnibus amara quidem qualitas est vehementissima, adstrictio verò (quam saltem gustu agnoscas) aut planè obscura, aut prorsus nulla sentitur. Ponticum est tum folio, tum flore longè quàm cetera minore. Odor quoque huic non modò non insuauis, verum etiam aromaticum quid praefertens, reliquis autem omnibus est feridus. Libro tandem de Antidotis l. c. 4. ait. Pater meus mel quoddam habuit ita amarum, ac si in Ponto natum foret, eo in tractu, ubi ex Absinthio apes mel colligunt.

Serapio trium tantum meminit, quorum primum Absinthium vocat. Alterum Cretensè. Tertium verò est Santonicum: sed de his paulò post.

Praeter Absinthium [ita namque Monachi de eius generibus] Romanum (vulgare) nascitur etiam in maritimis & montibus aliud, quod à Dioscoride & aliis pluribus principaliter vocatur Absinthium marinum, & ab aliis Seriphium, siue Seriphium & Absinthium Ponticum. Est quoque & tertium apud Dioscoridem Absinthium, quod antonomastice vocatur Santonicum, seu Sardonicum, quia hoc vocabulum est etiam commune ad omnes Absinthii species, secundum ipsum Dioscoridem, & Plinium, & ceteros. Sicut *secha* apud Serapionem. Qui Serapio omnibus Absinthii speciebus *secha* nomē tribuit. Et haec duae vltimae species ab antiquioribus & recentioribus ita confunduntur, ut nemo impraestiarum audeat dicere absolute, quale sit illud. Diosc. nempe & Serapio, & alii plures tres tantum Absinthii species scribunt. Anticenna autem sex, dicens: species eius quinque sunt. Tarsensis, & Sufi, & Nabari, & Coraseni, & Romani. Et infra ait: Et est etiam ex speciebus *secha*. Et propter hoc vocauerunt ipsum quidam sapientes *secha* Romanorum.

Vel

*Absinth.
amarum
& ingra-
Theophr.
Absinth.
Ponticum*

*Absinthia
ria Gale-
no.
Ponticum.
Santonium.
Seriphium.*

*Pontici for-
ma
Absinthio-
rum odor.*

*Serapionis
Absinthia.
ria.*

*Absinthii
genera.
Monachu-
rum.
Marinum.*

Vel saltem ponit quinque species. Quia hoc ultimum fortan non intendit absolute esse diuersam Absinthii speciem: sed quod dicitur Absinthium Romanum, à sapientibus vocatum esse Secha. Verba etenim ipsius ad utrumque sensum possunt deduci. Platearius quidem duas tantum scribit Absinthium habere species. Sed Simon Ianuensis autoritate Galeni, & ex libro antiquo de simplici medicina, enumerat quatuor. Pandeclarus autem præter supra dicta, habet etiamnum Absinthium dulce, quod declarat esse Anorhum. Et Stricados citrinum, dicit esse Absinthium marinum. Item apud Hali filium Abbatem legitur Absinthium Græcum, quod si differat à Romano, nescimus. Et alii alia de Absinthio tradunt genera. Nos autem dimittis omnibus aliis tanquam dubiis & incognitis, solummodò primo genere, quod est vetustum, notissimum & præstantius cæteris, & pro Romano, & pro Pontico, & pro Santonico utimur. Hactenus Monachi. Absinthium secundum Mesuem Luminare maius ait esse multiplex. Ponticum quidem, vel commune, quod satis norum: melius esse illud, quod remotum sit ab odore Maris, & oriatur in terris liberis, & habeat folia alba, plana & læuia.

Tria Absinthii genera posuit Dioscorides: quoniam et si tertium genus cum primo conueniret: discrepabat tamen quoad facultates. Secundum etiam genus licet virtutibus cum tertio conueniat: in forma tamen minimè consentit. Primum verò à secundo & facultate & formâ dissentit. Et alibi. Nemo non cum Marcello consentit adscititium esse id, quod de Absinthio marino legitur apud Dioscoridem copiosissimum in Teueto monte iuxta Cappadociam gigni: quando clarum sit locum hunc longâ spatii intercapedine à mari distare.

Eandem hanc Marcelli opinionem, & veriorè meâ quidem sententia, ex Cornario tuetur H. Lugdunensis. Absinthii, inquit, tria sunt genera Dioscoridi. Vulgare, Marinum, quod & Seriphium nominant, tertium Santonicum in Gallia ad Alpes proueniens. Et totidem sunt Galeno, licet plura Plinius statuatur genera. Geographia peritus nunquam Gallicas Alpes in Santonum agro, vulgò *Saintonge*, existere credet, ubi crescat eiusdem nominis Absinthium. Adhuc in Aldino non *occurrit*, siue *occurrit*, sed *occurrit* legitur. Tertium hoc Pena vult ad Alpes Asiaticæ Galatiæ nasci, quas Sardonidas vocant.

Tanta est Seriphii, inquit Rocardus, & Santonici in qualitatibus similitudo, vt nisi forma discernerebatur, vix qualitatibus ipsis fieri posse, nisi ab expertissimis, arbitrer. Quemadmodum & in forma cum Absinthio tanta est Santonici affinitas, quæ multis etiam eruditis imposuit, nisi qualitatibus ipsis iudicarentur. Quare non mirum videri debet, si in Absinthiorum examine, multi errores, multæ confusiones & hæreses occurrant. Est autem Absinthium [quod aliqui Bathypicron ex Dioscoride vocant, Arabes Seha ac etiam Sihe] fruticosa planta, cuius tres species statuendæ sunt Galeno, quarum vnâ codicem, cum genere ipso, nomine appellitant: cuiusmodi potissimum est Ponticum Græcis & Latinis omnibus, ab Arabibus interpretibus Romanum, Cretense & Græcum ab Hali-abbate cognominatum. Alterum Santonicum, tertium Marinum, quod aliqui Seriphium cum Galeno (Sericam & Erison Serapio) vocant. Non defuere

Tom. III.

qui triplicem in species partitionem in dualitatem redigere conati sunt, similitudines illis multiplices tribuentes, quod cum præstare nituntur, in seipsis postea non constant. Quidam specierum numerum augent, fortè Auicennæ illius Arabis exemplo ducti, quem in simplicium doctrina confusum & præcipue in Seha & Absinthii consideratione, nullus est, qui non facile percipiat. Sic nouas eum species in medium protrudere conatur, genuinarum penitus ignari semper remanent. Quamuis porò Absinthio proprium conueniensque nomen inditum sit, Neotericorum tamen Commentatorum præcipua pars improprium esse arbitrata est, illique per Antiphrasim inditum, quod verò vt improprium à solo Dioscoride memoratur ex aliquorum ignorantia impositum Bathypicron proprium ac illi conueniens esse asserunt. Quamuis à nullo alio Priscorum receptum sit aut memoratum. In hoc errore versantur, qui Absinthium vulgare Gallicum à Pontico nullo modo diuersum comprobare nituntur. Nec minorem erroris sui causam nacti sunt in Absinthii Romani Arabum interpretum denominatione, qui à Romanis ruinis, quicquid Romano solo & sacris Romanorum ritibus deductum asserunt: quemadmodum & alii, qui ab austero & adstringente sicco sapore, quem quidam Ponticum vocant, Ponticum dici putant. Sunt & qui vi nulla, in Dioscoridis contextu particulâ illâ, quæ vulgaris notitiæ herbam dicit, vulgare Absinthium, idem esse cum eo, quod in Ponto incolis vulgare existit, persuaeant. Quibusdam etiam vulgare à Pontico differre placet, vt minutum Absinthium pro Pontico officinis receptum Ponticum esse probent, vulgari nostro, nullum aliud nomen tribuentes, quam, vulgare Absinthium. Nonne & in marini appellatione sese tacite opponere videtur, qui in Tauro mœre (à mari enim tanta itineris latitudine distat, vt quod in eo producit Absinthium marini denominatione indignum dici possit) & Cappadocia prouenire Seriphium putant, loci in Dioscoridis contextu permutationem non aduertentes? Nonne apertius se opponunt Antiquorum placitis qui Santonicum à Gallie Santonia ciuitate deductum esse negant, Sardoniumque Absinthiū vocari affirmant? Qui Santonicum nostrum vulgare à Pontico nihil specie differre, solùmque accidentibus quibusdam, odore sc. & sapore quodammodò & foliorum magnitudine [quæ Santonici à Pontico differentiam constituunt] quod soli natura & cæli eueniat, arbitrantur. Sic enim authorum placita contorquent. Quidam vulgare nostrum Absinthium non audent Absinthii denominatione priuare, sed Dioscoridem insimulant de eo locutum, dum herbam vulgaris notitiæ esse dicit, & de Bulgarico minuto, quum de Pontico mentionem facit. Alii Galeni textum in contrarium sensum auertere conantur, mechathe-
simque proponunt, vt vulgare Gallicum nostrum Pontico idem esse asserant, sed *in diuersa* obiciunt contra expressam Galeni mentem. Qui manifestam Absinthiorum differentiam deprehendunt optimo iure, in triplicem, nec multiplicem distribui oportere arbitrati sunt. Nec est quod nobis Auicennam proponant, in quinque species Absinthium Antiquorum autoritate, distinguat. Abrotonum a. cū Absinthio confundere videtur. Eum non secutus est Serapio, nec Mesues qui Pontico, quem Romanum vocat, contentus. In contrarium sensum dictum Bathypicron iudi-

X 3

Varia sententia est de numero specierum Absinthii.

Error quidam à rursus.

Platearius

Simon Ianuensis

Tria Absinthii genera posuit Dioscorides

H. Lugdunensis

cabimus. A quibusdam verò vnquam, sic vocatū fuisse nullus est qui memoriæ prodiderit, præter vnum Diosc. qui potius vt aliorum placita (vt sunt ferè Poëtarum, quidlibet audientium) se non ignorasse proderet, ab aliquibus Bathypicrō dici testatur. Cognomen hoc vt ascititium, minimèque Absinthii naturam exprimens reiiciendum putamus. Optima verò ratione à *ἄνθος* proprium & naturæ suæ conueniens ipsi nomen inditum fuisse *ἀνθὸς τῷ ἄνθει* quod est tangere & manibus tractare, non autem per antiphrasim. Porro nihil à nostra nos submoëbit sententia Bathypicri interpretatio, profundè amarum. Ponticum dicitur, non vt quidam Mesuxo improperare videntur, à Pontico illi aut potius interpreti appellato sapore. Mesue enim ratione Arabs, qui nunquam Absinthium Ponticum aut Romanum appellauit &c. Fortassis eorum excusanda potius venit opinio, qui Romanum ob id dictum fuisse credunt: quòd antiquis Romæ ruinis Absinthium copiosissimū proueniat, quàm eorum qui ex Romanorum sacris obseruationibus. Soli barbari interpretes, qui Arabum scripta Latine barbarè verterunt huius denominationis verba fecerunt, quod ipsi Rumi dixerunt sua lingua & Rom pronuntiant, hi Romanum perperam verterunt. Hali abbat is interpretis multò præstantius aliis Arabum interpretibus Rumi per Græcum vertit, quod alii per Romanum perperam exponunt. Est igitur Absinthium Rumi seu Romanum nihil aliud quàm Ponticum aut Græcum, quod alio nomine Auicennæ interpretes Nabathi vocat, sed malè, & Serapio quod deferretur à Gallicia, crassâ illarum regionum ignoratione. Dioscoridi Græco Absinthium Ponticum vulgare fuit, Græcisque vulgarem herbam esse dixit. At nostris Gallis Santonicum familiare, vulgare Absinthium dicitur: Italis etiam vulgare Absinthium est. Plinius herbam ob id facillimam vocat, quæ inuentu & vñu facilis existeret. Differunt tamen inter se species hæ, quantum à Santonico Absinthium. Illis subscribere non possum qui Centronicum, non Santonicum legere rectius putant. Et hæc Claudius Rocardus, qui longè plura habet.

Absinthium, vt ex Nonio Marcello de proprietate sermonum refert Thesaur. linguæ Latinæ, neutri generis est Lucr. lib. 4. Absinthia terra medentes cum dare conantur. Absinthius genere masculino Varr. Quinquatrib. Quid medico mihi est opus, nempe tuo, Absinthium vt bibam grauem.

Vires & Vñs. Ex Absinthio præstantius est secundum Dioscoridem, vt antè quoque dictum, quod in Ponto & Cappadocia in monte Tauro appellato nascitur. Vim habet calefaciendi, adstringendi, & biliosa quæ stomacho & aluo inhaerent, depurgandi. Ciet etiam vrinam & præpotum crapulam arceat. Sed & ad inflationes commodum est, & alui ac stomachi dolores, cum Sefeli aut Nardo Celtica potum. Quin & ciborum fastigia, & morbum regium sanat cremor aut decoctum eius. quotidie trium cyathorum mensura potum. Ducit & menses tum potum, tum appositum cum melle. Commodum est & ad strangulationes à fungis cum aceto potum: cum vino verò aduersus Ixiæ & Cicutam, & muris aranei morsum, & draconem marinum. Illinitur autem anginis cum melle & nitro; pustulis nocturnis cum aqua: sugillatis cum melle: similiter etiam ad hebetes oculos, & sanie manantes aures. At decocti ipsius vapor ad aurium & dentium dolorem confert.

Decoctum verò cum passo dolentibus oculis pro cataplasmate imponitur. Est & præcordiorum hepatisque ac stomachi cataplasma, in dolore & diutina affectione, tritum cum cerato cyprino: ad stomachum tamen cum cerato rosaceo. Conuenit & hydropicis & splenicis, ammixtis ad ipsum Ficubus, Nitro & Lolii farina. Paratur & vinum ex ipso, quod Absinthites appellatur, maximè circa Propontidem & Thracen, quo ad relata vtuntur, vbi febris abest: alioquin in zæstare propinant, sanitatem efficere id putantes. Videtur etiam Absinthium in arcas inspersum, vestes incortosas seruare, illitumque cum oleo, culices à corporis contactu abigere. Atramentum quo scribimus cremore Absinthii dilutum literas (*ῥαβδωμῶν* Lac. *ῥαβδῶν*) tuerur, ne à muribus (à muscis alii) corrodamur. Existimatur & succus eius eadem opera efficere: Verum in portiones ipsum improbamus, vt qui stomacho incommodus est, & capitis dolorem inducit. At quidam à murcâ coctâ ac ammixtâ succum adulterant.

Facillimam herbam dicit Plinius, vtilissimam, ac sacris Populi Romani peculiariter celebratâ. Siquidem, inquit, Latinarum feriis quadrigæ certant in Capitolio, victorque Absinthium bibit: credo sanitatem præmio dari honorificè arbitratis maioribus. Stomachum corroborat, & ob hoc sapor eius in vina transfertur: Bibitur & decoctum aqua. Vetustissimè in vñu est: Bibitur & madefacti dilutum: Tritum rarè in vñu sicut & succus expressi: inutilis enim stomacho, capiti que est, cum sit vñus decocti saluberrimus. Namque adstringit stomachum, bilémque detrahit, vrinam ciet, aluum emollit, & in dolore sanat: ventris animalia pellit, malaciam stomachi & inflationes discutit cum Sefeli & Nardo Gallico, aceto exiguo addito. Fastidia absterget, concoctiones adiuvat. Cruditates detrahit cum Rura & Pipere & sale. Antiqui purgationis causâ dabant &c. alii dabant contra Paralyfin: alii pueris folia in Fico: Sic vt amaritudinem fallerent. Thoracem purgat cum Iride sumptum. In regio morbo crudum bibitur cum Opio (Apio Dalechamp.) aut Adiantho. Aduersus inflationes calidum paulatim sorbetur ex aqua: iocinoris causa cum Gallico Nardo: lienis cum aceto, aut pulte, aut Fico sumitur. Aduersus fungis ex aceto: item visco, Cicutæ ex vino & muris aranei morsibus, draconi marino, scorpionibus. Oculorum claritati multum confert. Epiphorys cum passo imponitur: sugillatis cum melle. Aures decoctum eius vaporis luthu sanat, aut si manat sanies, cum melle tritum. Vrnam ac menses cient tres quatuorue ramuli, cum Gallici Nardi radice vna, cyathis aqne sex. Menses priuari cum melle sumptum, & in vellere appositum. Anginis subuenit cum melle & nitro. Epinyctidas ex aqua sanat: vulnera recentia priusquam aqua tangantur, impositum: præterea capitis vlcera. Peculiariter ilibus imponitur cum Cypria cera (lege cerato cyprino) aut cum Fico. Sanat & pruritus. Non est dādum in Febri. Nauy seas maris arceat in nauigationibus potum: inguinum tumorem in uentrali habitum. Somnos allicit olfactum, aut inscio sub capite positum. Vestibus infertum tineas arceat. Culices ex oleo perunctis abigit, & fumo si vñatur. Atramentum libratum ex diluto eius temperatum, literas à musculis tuerur: capillum denigrat Absinthii cinis, vnguento rosaceoque permixtus. Et alibi: Si nactæ sint erucæ, remedium est Absinthii succus, decocti

Hepar.
Stomachum
Hydrops.

Succi m-
cimentum

Roborat
stomachum

Purgat.

Thorac.

Hepar.

Fungi. Po-
nend.
Oculis

Aures.
Vrina.

Menses.

Angina.
Epinyctida

cocti inspersus. Item: Ex cæteris herbis sit Absinthii Pontici libra decocta ad tertias partes, vel Scopis Absinthii in vinum additis.

Absinthium inquit Galenus adstrictoriam & amarum, & acrem simul qualitates possidet, ex-calfaciens pariter & extergens & roborans & desiccans: proinde biliosos ventris humores per egestionem infernam propellit, ac per urinas e-uacuat. Magis autem quod in venis & biliosum per urinas expurgat. Calidum primò excessu, siccum tertio succus autem eius longè quàm her-ba calidior est. Nos, ait lib. xi. m. m. c. n. Si vel mi-nima suspicio sit iecur ventriculūque laborare, absinthium protinus oleo incoquimus, ac eas particulas perfundimus. Cū autem duplex in omni Absinthio sit facultas & qualitas, utriusque in Pontico adstringendi facultas non parua est: in reliquis omnibus amara quidem qualitas est ve-herementissima, adstrictio verò (quam saltem gu-stu agnoscat) aut planè obscura, aut protus nul-la sentitur. Proinde Ponticum ad iecinoris & ventris phlegmonas eligi præstat. Odor huic non insuavis, verū etiam aro niticum quid præferens: reliquis autem omnibus est sædus: quare hæc fugienda, illo autem semper utendum.

Herbæ Absinthii, inquit Apuleius, & Mar-rubii, & Lupinorum paria pondera in aqua mul-sa cocta, vel in vino austero, bis aut ter in um-bilico imposta, necant lumbricos. Commenda-taque idem Absynthii succum contra fungo-rum venenum: & surculi Absynthii & Marrubii gestationem contra intertrigines.

Ex Mesue. Absinthii vires & vltum perspicuè declarat Mesues. Absinthium, inquit, cū sit multiplex, Romanum eligimus, foliis albis, leuibus & pla-nis, non asperis, odore iucundo, Absinthium ina-rinum nihil imitante, lectu in terra libera, ca-lidū ordine primo, siccū secūdo, in quo etiam ca-let flos. Constat substantia duplici, vna calida, amata, nitrosa, purgante, obstructa liberante, al-tera terrea, styptica, partes cogendo roborante, largiore, præsertim siccato. Cū autem sub-stantia eius calida sit superficiaria, ubi sumptum est Absinthium, ab ea prior sit actio: à terrea sty-ptica posterior, per quam comprimendo soluere nonnulli malè sunt opinati. Bilem enim flauam & aquas, à ventriculo, intestinis, hepate, & venis vacuat, etiam interdum per urinas. Picuitam e-nim non vacuat, aut maximè paucam, licet phle-gmagogum quoque esse Auenzoar censuerit. Ab-sinthium à putredine vindicat, præcipuè potu quotidiano viciæ vnius, vel diuturni vini, aut a-quæ cui infusum aut incoctum fuerit; vel aquæ ex eo sublimatæ. Siccum idem pannis interpo-situm à tineis vindicat & turos reddit. Partibus attritis aut confusis præcipuè cum melle aut vi-no & pauco Cymino calfactum, & appositum mirè confert. Si vino, aut aqua, aut oleo, cui Ab-sinthium & radix Cucumeris agrestis incocta fuerint, spongia merfa & expressa temporibus alligatur, hemietariam sanat. Auris quoque subtea vino aut aqua, cui incoctum fuerit Absin-thium, dolore, tinnitu, sorditate liberatur. Ace-rum autem aut vinum cui incoctum sit Absin-thium cum cortice Citri, oris fetorem à gingi-uarum & dentium, vel materia rum in ventricu-culo putredine emendat. Idem præstat aqua ei-us distillata. Succus Absinthii cum nucleis Per-sicorum, vermes aurium & aliarum partium enec-at, & educit. Absinthium ventriculum & he-

par roborat, appetentiam excitat, obstructions tollit, & inde natos affectus, ut Icterus, Hydro-pem: febribus putridis etiam diuturnis confert. Absinthium innocenter sumitur, succo tamen lædit ventriculum, ob nitrosam saporem. Quia autem imbecilliter soluit, Rosa, Fumaria, Seruul-lactis, Spica, Vna passe purgate illi miscantur, ut melius & tutius purget. *Ex hac Mesues*, qui con-trariū in quibusdam esse videtur Galeno, ac eum propterea ita conciliare studet Siluius. Di-uerfus Mesues Galeno tantum est, quod siccum tertio gradu hic, ille secundo scribit. Quæ con-trouersia in aliis simplicibus multis est inter Me-dicos etiam doctissimos, quorum vnus in fine (verbi gratia) primi vel secundi, alter in princi-pio secundi vel tertii intelligit, quæ ambiguitas etiam Galeno ipsi est in Anecho, Prasio, Rura a-gresti & aliis permixtis. Nam quod succum e-ius dicit Mesues ob nitrosam qualitatem nocere stomacho ipsi Galeno id non aduersatur scribenti, succum longè ipsa herbâ esse calidio-rem.

ABSINTHIUM MARINUM VETERIBVS. CAP. LX.

Absinthium marinum, inquit Dioscorides, Aquidam etiam Seriphium vocant. Nascitur plurimum in Taphosiri Ægypti, quo pro Oleæ ra-mo Isaci vti-tur. Est autem *herba ex qua Isara est*, Abrotono paruo similis, paucis *feminibus* referta, submara, stomacho incommoda, odore graui, ad-stringens cu quadâ caliditate. Inter spuria Dios-coridis marinū Absinthium alii Santonicem vo-cant, alii Seriphion, Romani Santonicum. In Tauro circa Cappadociam monte, dicuntur pin-guescere eius pabulo maxime pecora. *Ex Diosc.*

Quod autem huius capitis initio habetur in Græcis codicibus, *ex τῇ πρὶ ἐπταπόρῳ τούτῳ*, alienum est ab hoc loco, & ex superiore Ab-sinthio huc translatum ac suppositum. Osten-dit id etiam Plinius, qui eā particula relicta, probatissimum in Taphosiri Ægypti esse ait. Si-cut autem hæc particula ad initium, ita alia ad finem accersit. *ἀπὸ τῆς δὲ μέλεις τῆς πρὸς τῇ νηφύτῃ*. Aut enim in totum hæc redundant: aut ad superius Ponticum Absinthium referenda sunt, quo pecora pinguescere ex Theophrasto ac Plinio ostensum.

Seriphium aliud à Santonico non solum vo-luit Paulus, sed & Galenus lib. 6. simpl. medic. & Plin. lib. 27. Nec te mouere debet Dioscorides, si Manardo credis, Absinthium marinum à non-nullis Seriphion, ab aliis Santonicon vocari scri-bens: scis enim quàm inconstantes sint huiusce-modi nomēclaturæ, ut pro lib to ab vnoquoq; cō-sistat: alioqui si vbique has sequemur Abrotonū idem dicemus quod Absinthium Ponticum, cū eodem Dioscoride autore, Romani sic Abroto-num vocent, atque idem quoque cum Santoni-co: quoniam, ut refert Galenus, Abrotonū à Ro-manis vocari Santonicum scripsit Pamphilus. Vocet igitur vnusquisque prout vult, ut ait Gale-nus, modò sciat res esse diuersas. Turius tamen est sequi Antiquorum, præsertim Galeni nomina, ne in rebus quoque ipsis labi contingat. Verū & Dioscorides ipse, si emaculatus sit codex, Santon-icum rem diuersam à Seriphio facit.

Hanc coctā per se, aut cum Oryza & cum melle acceptā, ascaridas & lubricos rotundos necare, &

Viris & Viris.

uiter alutū subducere, autor est Dioscorides. Posse & cum sapa, aut lenticula cocta eadem prestare. Hæc verò [Oves eā pastæ plurimū pin-guescunt] in hoc Dioscoridis textu redundant, & ad Absinthium Ponticum referenda sunt, vt habet Theophrastus & Plinius. Authore porro Galeno simpl. lib. 6. ipsum Seriphium Abrotono minus est calidum: verū calidius Absinthio, stomacho impendū inimicum, nempe cum amaritate falsedinem quandam præ se ferens. Sed & quandam, licet minimam, adstrictionem obtinet. Sic & Abrotonū, & Santonicum admodū infesta sunt stomacho. Solum autem inter ea Absinthiū, & maxime Ponticum, gratum est stomacho, quia plurimam adstrictionem continet. Idem lib. 8. Est Seriphium Absinthio tum specie, tum gustu simili: at tamen discrepat, gustu quidem, quando-quidem non æquē, vt illud adstringat, plūsq; exalfaciat, amaritatē, quē quandam cum falsedine respiciat: tum quod stomacho infestum sit, magisque Absinthio lumbricos necet, siue foris impositum, siue intrō in corpus assumptum. Et sanē exalfacere ipsum in secundo ordine intenso recensendum est, exsiccare in tertio. Stomachō autem esse inimicum, prodidit quoque Plinius: alium præterea mollire, pellerēque animalia interaneorum. Bibi cum oleo & sale, aut in fatinæ trimestris sorbitione dilutum; Coqui quantum manus capiat, in aquæ sextario ad dimidias.

DE ABSINTHIO SANTONICO Veteribus.

CAP. LXI.

Est & tertium Absinthii genus, inquit Dioscorides, in Gallia ad Alpes (ἐν τῇ ἑστῇ τῶν ἀλπεῶν γαλιεῖ, legit cod. Basil.) plurimū proueniens, quod vernaculā voce Santonicum (σάντονικον exempl. basil.) appellant cognomine ducto à Santonide (σάντονιδος) regione ipsum producente: Simile est Absinthio, non tamen ita semine referum, sed amarum & eadem facultate cum Seriphio præditum.

Galenus Santonicum à Santonia regione, in qua nascitur, appellationem habere dicit. Quæ de Santonico ex Plinio dicuntur, suprā recitauimus. Santonicum à Columella Santonica herba dicitur.

Illud autem notata dignum arbitratur Hermolaus, Santonicum Absinthio similis describi, quā Seriphium, aut, quod idem sit, marinum: quoniam marinum Abrotoni potius, quā Absinthii figura demonstratur, à Dioscoride & Plinio. Recentiores contrarium decernunt: & sanē videntur haud falsa dicere: marinum siue Seriphium docentes Absinthio quā Abrotono similis: Santonicum Abrotono quā Absinthio. Marinum certē id quod passim in littoribus & secus mare nascitur sapore salso, & folio albicante, notum omnibus, nihil ferē commune cum Abrotono habet.

Dioscorides ipse, si emaculatus sit codex, teste Manardo, Santonicum rem diuersam à Seriphio facit. Pro verbo enim Sardonium, legendum Santonicum. Quod nedum ex Galeni, Plinii, Serapionisque concordī sententia patere potest, sed etiam ex hoc quod nulla est in Gallia Sardonis regio, sed Santonis: estque Sardonion alia herba, de qua Dioscorides inter Batrachus species,

& l. 6. inter venena mentionem facit, à qua Sardonius risus Græcorum prouerbiū non bonæ famæ in vita, sicut Dioscorides, Paulusque testantur. Et lib. 4. Auicenna sub nomine Schardi, licet ignorauerit, de qua re scriberet, nec intelligi valeat quid scripserit, nisi ab iis qui ea quæ ille scripsit, alibi prius didicerint. Obscurius quoque idem Auicenna scripsit de Seriphio & Santonico, libro 2. sub Scher nomine, in capitis principio, aded vt ne diuinando quidem possis assequi quid voluerit: & ne in nostra tantū editione putes difficultatem, consule etiam Hebræam, atque maiorem, non modò æquam, inuenies obscuritatem.

Absinthium Sardonium licet multi vocent Santonicum, inquit Anguillara, non inuenitur propterea vllum Absinthium in ea Gallie regione, quod vel figura, vel qualitate huic sit simile: ac quod de Gallie alpihus legitur apud Dioscoridē, de Galarie Alpihus intelligendum censeat.

Eadem facultate cum Seriphio præditum, esse tradit Dioscorides. Ad cæterorum, inquit Gal. simpl. 6. Santonicum à Santonia regione in qua nascitur, nomen sortitur proximam habet facultatem. Seriphio paulo imbecillius in extenuando, & calfaciendo, desiccandōque. Peccant Recentiores, cum in Pontici Absinthii penuria Santonicum substituunt, vt docet Aug. Ferr. Castig. cap. 3.

ABSINTHIUM VVLGARE MAIVS.

CAP. LXII.



Vulgarissimum Absinthio caules plures, lignosi, incani, multis ramis fruticosi, cubitales & tricubitales, interdum & altiores: folia Artemisiz foliis paria, minutius dissecta, mollicella, tota incana, magis tamen pronā, quā lupinā parte, odore aromatico, gustu itē, sed cum pluscula amaritudine, coniuncta adstrictione aliqua: *corpus* longa serie vbertim in ramis vndique fuluo colore emicant, *semitæ* succedente minuto: *radix* crassiuscula, lignosa, abundē calfacit, aromaticā gratiā, sine omni amaro, totum os perfundens.

Icon nostra est ex Fuchsiānis, quæ ita empta: perplacet ea, quam habet Camer. in lib. 10. Matthioli & in eiusdem hist. germanica.

Ex pluribus Absinthii generibus, Ruellius hoc lib. 3. cap. 20. vulgare vocat, gallicè *absinth*, Ponticumque cognominari ait, quod à Ponto veniens, cæteris multo sit præstantius.

Eadem hæc pro suis recitat Tagault. L. 2. purg. simpl. cap. 10.

Cordus in Dispens. vocat Absinthium rusticū, calidiūque

Varietas
lectionis
Dioscori-
dæ

Santonium
herba Co-
lumbella.

Santonium
à Seriphio
differt.

Absinth.
Sardonium.
Anguillara

Vires &
facultates.

Descriptio

validiusque Pontico statuit, & nihil ferè adstringens. In H. Absinthium vulgare, & vbiq; nascens.

De hoc ita Sylu. de comp. medic. l. i. ait. Nostrum vulgare Absinthium, samentosum, folio & flore multò maiore quàm cætera tria Absinthia Veterum, inter quæ comprehensum non videtur, nisi esse velis Absinthium primum Dioscoridis, quod vulgò notum dicit, & *Sabinum*, vel potius *Cario* vocatur: vulgò Aloina & Forte. Id autem si primum in Dioscoride recipias, quænam alia in eo statues?

Absinthium hoc, vulgare quoque esse ait Cornarius, & à Germanis *werum* vocari, quasi impediens concitationem ad Venetum, ut quidam exponant. Hoc certè etiam nomine apud honestas fœminas, damnatum esse eius vsus, & maxime Vini & Zythi ex eo parati: nec facile hos potus maritis eas permittere. Idem alibi, Absinthium Ponticum à Galeno descriptum, à vulgari hoc nostro diuersum esse genere negat, sed specie saltem, & natali solo differre existimat.

Absinthium, quod Germani *werum* appellant, propter iniques quas obtinet facultates, rectius *weronum*, inquit Tragus, quasi dicas pellens tristitiam [nobis melius, prohibens alacritatem: *weren* enim, Germanis est impedire; *mut* verò alacris animus] appellari posset. Sic enim Ouidius 1. de Ponto.

Tristia deformes pariuur Absinthia campi.

Idem 3. Trist.

Canis prius gelido desinit Absinthia Ponto.

Mantuan.

Et quoniam tecum virosa Absinthia posant.

Lucr. lib. 1.

Sed veluti pueris Absinthia tetra medentes.

Non tamen negandum est Germanis quoque dici posse *werum* nomen duabus dictionibus, ut videtur Tragus nomen inde traxisse. Sed is auctoritatem pro se non habet. Cæterum lib. 1. cap. 111. vulgare Romanum, seu Ponticum Absinthium nominat, eoque Apiciū cōdimēta faciliare solitū fuisse tradit. De hoc tandem loquitur cap. 112. Absinthium quod Dioscorides in Ponto provenire scribit, hoc nobis in Germania quoque provenit.

Quod absolute dicitur Absinthium, notissimū est. Sed quia dicit Mesues in Sympo de Mentha: Recipe Absinthii Romani. Sciendum quod ferè omnes pharmacopolæ Romæ decipiuntur, sumentes pro Absinthio Romano, illud quod in muris vrbis Romanæ [de quo pōst] oritur, de quo minimè author intellexit quodque à petitis diuersæ Absinthii species iudicatur: Et in veritate est. Negligentes illud [de quo intellexit autor] quod in partibus Romæ propinquis oritur. Largo enim modo per Absinthium Romanū intelligitur omne illud Absinthium, quod spontè intra Italicum nascitur solum. Quia ut plurimum & Dioscorides & Galenus & cæteri autores, cum dicunt aliquid Romanum, intelligunt illud esse Italicum. Ut exempli gratia: Apud Dioscoridem cum citantur Romani, intelliguntur Latini, scilicet Itali, qui sunt veri Latini. Aliud efficacius exemplum: Scribitur à pluribus autoribus & præsertim Auicenna, Gentiana Romana, Pœonia Romana, Spica Romana, & alia plura, quæ non tantum Romæ non sunt, sed nec prope Romam ad multa miliaria nascuntur. Qua de re talibus in locis, necessariò pro Roma, Italia, & pro Romano, Italicum intelligendum est. Quod clariùs ostendit ipse Mesues, dicens Absinthium multiplex est, sed illud quod intendimus nunc,

Tom. III.

est Absinthium Romanum, melius, remotum ab odore maris, & quod oritur in terris liberis. Si igitur intellexisset pro Absinthio Romano, illud quod nascitur in ruinis vrbis, non dixisset: Melius est, quod est remotum ab odore maris, sciens Romam non esse in maritimis positam. Vnde necessarium est dicere omne Absinthium Italicum, etiam & quod oritur circa mare [non obstante quod sit non bonum] esse Absinthium Romanum. Et ex hoc sciendum est, quod murale iudicio plurimorum est malum: vnde pro Absinthio Romano accipiendum est illud, quod [ut dicit autor] nascitur in terris liberis, habens folia latiora lenia & plana. Quodque non est ita aridum, & pluribus Italiæ locis copiosè habetur, & hoc etiamnum à Romanis [teste Dioscoride] vocatur Absinthium rusticum, & Absinthium absolute vbiq; à Latinis, siue Absinthium Italicum, ut in Plinio legitur. Quod enim Plinius dixit Italicum, id Mesues, Auicenna & cæteri Romanum dixerunt. Nos dimissis omnibus aliis Absinthiis, tanquam dubiis & incognitis, solummodò primo genere, quod est præstantius cæteris, & pro Romano & pro Santonico utimur: sed illud quod oritur in terris mari non vicinis, & montanis, melius est. Amaritudo in Absinthio solummodò in superficie consistit, intrinseca est optimi saporis cum aliqua dulcedine, quod apparet in cauliculis mundatis à cortice. Hinc enim est quod aqua ipsius sublimata est dulcis. Hactenus Monachi.

Fuchsius ex Dioscoride & Galeno tria Absinthii genera statuit. Horum primum esse ait, quod Romanum, vulgare, seu commune vocant; id quod passim in Germania nascatur, quod Allobroges retento nomine vocant, *la Romanie*. Officinis etiam Absinthium Romanum dicitur. Huius generis esse quod à Ponto regione, in qua nascitur, Ponticum cognominetur. Is errare scribit Monachos, quando in Syr. de Absinth. vulgare & rusticum esse accipiendum Absinthium censent.

Absinthium Ponticum vocat Bellon. Obs. lib. 2. cap. 112. ac nulla in re differre ait à nostro hortorum, nisi quod albidius proveniat inter Heracleam & Iconium. Idem lib. 1. cap. 76. ait. Authores laudant Absinthium Ponticum, quod vidi venale & in usu in officinis Constantinopolitanis, quod respondet in omnibus Absinthio, quod in nostris hortis provenit, eo excepto quod Ponticum spontè proveniens reperitur. Admirandi nobis occasio, plurimos nostræ Europæ dubitantes de hoc Absinthio nolle pro vero uti: sed pro eo assumere malam herbulam, speciem Abrotomi, nullius efficaciz, derelicto nostro culco, quod verum Ponticum, quo abundant montes inter Ror & montem Sinai.

Prodidit Galenus m. m. lib. 11. c. 16. a. *Libro* Ponticum tum folio, tum flore esse longè quàm cætera minore. Equidem nullo alio discrimine alterū ab altero dissidere crediderim [inquit Math. in Dios. lib. 3. cap. 23.] quàm climatis temperie & foliis & floribus nostrate minoribus, & adstrictiore facultate & odore. Mesues, ut Syluius doctissime adnotavit, nescio tamen qua ratione ductus, Ponticum Romanum appellat. Monachi verò qui in eum Commentarios scripserunt, putant, magno quidem errore, id Mesue Romanum Absinthium esse, quod non modò in agro Romano, sed etiā in vniuersa Italia provenit. Plinius lib. 27. cap. 7. Ponticum scribit multò

Y.

Italico amarius esse: in quo sanè Galeni sententiæ & refragatur, & errat. Volunt Patres qui Medicinam commentati, tantum superficiem tenuis Absinthium vulgare amarescere, imis vero partibus dulcescere, ob idque gustui gratum esse. Vnde etiam aquam, quæ ab eo ignium vi distillat, dulcem potius quam amaram sentiri contendunt. Quia in re ipsa parum rem naturalem collere deprehenduntur: nam quod absinthii stillatitia aqua sit dulcis, non ex eo fit (quantum equidem sentio) quod Absinthium ipsum sit extrema parte amarum, medullitibus vero dulce: sed quoniam cum exteriores illæ partes, quibus amaror ille inest, admodum sint tenues, ac in vapore facile resolutibiles, ignis calore tenuiores factæ, non magno quidem labore resoluuntur: euenitque ab hoc, ut stillatitia, quæ inde fluit, æqua omnino sit amaritudinis experta. Præterea dulcedo, quæ in ipsa inuenitur, non ab intimis Absinthii partibus emanat, sed eam tantum à plumbeis instrumentis, quibus conficitur (ut diuturna docet experientia) provenire comperimus. Nam ipsius dulcedinis qualitas non modò Absinthii stillatitia aqua sentitur, sed etiã in quavis alia, quæ ex herbis temperamento calidis extrahatur &c. Mirari autem subit Matthiolum quoddam dicat Absinthium Ponticum non differre à vulgari, & nihilominus diversæ plantæ figuram ponat pro Pontico in Hist. germ. & post. comm. cum mag. figuris. Matthioli etiam censura in Monachos & ratiocinatio non mihi satisfacit: cum Absinthium non in vasis plumbeis destilletur, sed cupreis, cum quibus extrahuntur olea ex seminibus & herbis siccis aqua addita.

Monachi
contra
Matthiolum
defenduntur.

Absinthium vulgare, idem cum Pontico & Romano Absinthio esse, testatur quoque Amatus: in nihilo enim inter se quàm natali tantum differre scribit, & quoddam in Ponto tantum procerius crescat. Quod ultimum in Amato reprehendit Apollo rad. i. in Dialacca magna.

Absinthium tertium, Santonicum vocatum à Santonibus Galliarum populis, apud quos magno proventu gignitur, quemadmodum etiam hodie locis quàm pluribus nostris (inquit Cronenburg. de compos. med.) opinor Absinthium vulgare, quamvis id Sylvio inter tria Absinthii genera Veteribus enumerata, non fuisse comprehensum videatur. Avicenna lib. 2. cap. 1. quinque species recenset, sed obscurat magis, quàm illustrat.

Vulgare hoc Absinthium, inquit Turnerus part. 1. pag. secunda non esse Ponticum, docere potest [scilicet] Dioscorides non describat, tanquam passim notum] comparatio aliarum herbarum cum Absinthio, ut Abrotoni & Santonici. Idem probari potest ex Galeno lib. 11. Meth. med. & lib. 6. de simpl. facult. & ceteris. Cum vulgare Absinthium, maius sit & magis fœtidum reliquis, longissimè absit necesse est à Pontico, oportetque esse potius Marini aut Santonici Absinthii speciem, potissimum Santonici, quod Santonia propior sit Italiam, Germaniam & Angliam, quàm Pons, in quibus regionibus, propter vicinitatem, & cæli cõsimilem temperiem, verisimilius est maiorem esse debere Santonici, quàm Pontici Absinthii copiam. Errorem Matthioli securus est eius simia Amatus Lusitanus, atque in eodem luto hærent Monachi. Idem pag. 12. Si locus sit conjecturæ, nisi folia essent tam magna & fœtida, ego magnum hoc Absinthium [vulgare] censetum esse Santonicum, aut spuriam quandam eius speciem.

Vulgare
Absinth. nō
est Ponticum

Galen. hort. Absinthium commune [quod ad remedia vtilius est] sponte nascitur locis aliquot Helveticæ arenosis, ut circa Rhenum superiorem, & Saxoniæ montium, ut supra Riuarium lacum Wallestadii, alibique: item in altis quibusdam montibus Bernensium, sed multò minus, frigore, aut alimentum inopia: ita ut species diuersa videri possit: sicuti & aliæ multæ herbæ in montibus altis nascuntur, iis quæ humilioribus nascuntur, minores, solidioresque, & crassiusculis foliis sunt, ut Violæ nigræ, Bechium, &c. Coudenburg. in epist. ad ipsam scribit, se Absinthium Ponticum Veterum, ægrotis tam salutarem herbam hæcenus desiderare. Esse qui pro eo vulgare nostrum horridæ amaritudinis, & adstrictionis manifestæ nullius, accipiant: alios verò Romanum.

Absinth. hoc vulgare, non esse aliud à Romano & Pontico, sequentibus docet in Aduers. Lobelius. Noscitur & in his & in illis, quia id pecus non pascitur, neque ulli bibitur, unde & in his (non in illis) ut falsò errore typographi, hoc in loco legitur] dictum. Cuius veri non nisi duæ videntur differentie, tamen multæ sunt similitudines: quod namque vulgari & amarum est, sponte naturæ, vel cultum, Ponticum est, tum antiquis à præstantia & regione cognomine, tum recentioribus barbaris ab adstrictione, quam illi Ponticum saporem, suam, non latinâ voce appellant, quem laudabant in Absinthio Pontico, cuiusmodi est vulgatissimum, ubique peruium nostrum: sed natalibus commendatius. Et inter Arabes Mesues interpretis idem Ponticum atque Romanum esse verissimè literis mandauit. Vnde pharmacopœorum tam sedula Romani conquisitio & exploratio etiamnum durat. Romanum enim, i. e. optimum, uti Camomillam Romanam, ceteris præstantiorem & genuinam experunt. Quin et Barbaros istud nomen Romani commentos se ignorare conqueratur noster Vercellensis Apollo, sciat Romanum istud commendatissimum inter paucas herbas & sacrum plebi Romanæ fuisse, quod quidem victori sanitatis præmio & quasi omine fausto propinabant, ut Plinius auctor. Et quod nostro ævo in Romano agro, antiquisque ruderibus passim visitur, non aliud à nostro est, & verumque Pontico idem est, &c.

Absinth.
Pont. Mes.
sue.

Bauder. eorum opinioni adhæret, qui Absinthium nostrum vulgare, scribunt esse Absinthium verum Ponticum Dioscoridis, & Romanum Mesues, & quorundam, qui existimant Antiquum fuisse incognitum rusticum: Nostrum rusticum inquit, verum est Ponticum Dioscoridis & Galeni: pro Pontico aut Romano semper ponticum: poterit dici Ponticum rusticum.

Absinth.
vulgare
est Ponticum.

Absinthium Ponticum cum Absinthio vulgari contra Galeni sententiam cõfundit Matthiolum, inquit Guilandinus in Theor. Insignem, in hercule, nouitium istum herbariorum ducem, qui cetero temporis intervallo nodam didicisti, binas Absinthii Pontici nomine plantas auctoribus venire. Ex his altera cum Absinthio absolute prolato conuenit, quod, Dioscoride teste, optimum in Ponto oritur. De hoc intelligit Galenus, quando Absinthii, libro simplicis medicinarum sexto, tria tantum genera statuit, neque Ponticum ab absolute prolato distinguit. Altera, Absinthium propriè Ponticum appellatur, non quod laudatissimum Ponto proueniat, sed quod copiosissimum: quanquam & apud alias gentes nasci, nihil prohibet. Hoc Absinthium auctore Galeno, magis adstringit, quàm cetera, & amarum minus est. Adhæc aroma olet, reliquis fœtibus. Postremo, foliis

end, foliis & floribus longè, quàm alia Absinthia minoribus constar. Nec in Ponto tantum, sed in Pannonia quoque; Romæ item & variis in Latio locis copiosè exit. Et hæc ex aliorum sententia retulisse sufficiat.

*Alorum
sadicum
de Absinth.*

Reliquum est, ut nostram de Absinthio hoc vulgari maiore proferamus sententiam. Quin igitur nostri absinthii vulgaris meminerint veteres, vix dubitamus, his Argumentis nixi. Primum cum Theophrastus Absinthium recenset inter herbas mali odoris & amaras, ac sui tractus oues eam non pascere scribat. Quæ huic omnino competunt. Nec odor omnibus æquus: gratus vni, ingratus alteri. Itè quod Dioscorides vocet *Galbanæ*, vel, ut habet Apuleius, *Capsimæ*. Est enim tum multum amarum, tum etiam cum grauitate amarum. Si præterea cui Absinthio folia Artemisiæ similia, huic certè sunt, sed paulò maiora. Competunt etiam quæ in Abrotono de Absinthio dicuntur. Sed conuenit & illud nomen additum ab Apuleio, Absinthium rusticum. Nec illud quoque tenuit nomen à Plinio adiectum, Italicum: passim enim in Italia prouenit.

*Synonyma
Absinthium
abfynth.
Galbanæ
Algarb.
Cappimæ,
Romanæ,
Santonice,
Pumilum,
Lappaceum,
Ruellianum,
Alar.*

Absinthium dicitur Banfelf. Trago, Matth. Cord. in Diosc. & Hist. Lonice (cuius pictura non placet, & melius aridet quam posuit pro Abrotono,) & Celsipino: Absinthium vulgare Fuch. Geln. app. Lacunæ, H. Lugd. Cast. & Tabernamontanæ. Absinthium commune Geln. hort. (cui & Romanum) & Camerario. Absinthium Santonicum, Dod. gallico: Absinth. Ponticum Ruell. & Trineauellæ. Absinthium vulg. Ponticum Ruellii Lobelio Obs. p. 433. Icon. Plant. 752. Absinthium latifolium Dod. lat. in folio. Absinthium nostrum rusticum Thallio. Absinth. rusticum Apuleio. Absinthianus & vulgare Clusio. Absinth. commune rusticum Hort. Luf.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. Absinthium i. siue Ponticum, seu Romanum officinarum, seu Dioscoridis. Item phyt. Absinthium io. siue pumilum multifido incano folio: Geln. Alpinum humile: Pumilum Camerarii Clusio. *Varietas* est dependens solum à loco quare non separo hæc duò Absinthia: Gelnæ etiam non separauit. Gelnæ quoque commune minus, ab eiusdem Alpino humili distinguere nolo, id quod Frater fecit, ut sub Absinthio vulgari montano monebo. Absinthium tandem pumilum Camerarii Clusio, non separo ab Absinthio Vallesiano Gelnæ, cuius meminit Camerarius.

*Nomina
laguarum*

Alar Græcis, *απιδιον*, Comicis *απιδιον*, seu *Capsimæ*, & *αλβαν* nonnullis. *Laanab* Hebr. *Amos* & *Mirer* & *Meritura* Chald. Arab. Serapioni Absinthium, Stephano interpreti *Almacim*, aliis Medicis Arab. *Asensu*, *Sesurem*, *Ahanlais*, *Barus*, *Bulengi*, *Bululengi* & *Liembas*: ab aliquib' Zuriderdar, quo nomine alii Violas martias, alii Cydonia mala vocant. Quare videant, qui Arabes exponunt, ne quid pro quo interpretentur. Absinthium Lat. *Aloina* & *Absinthium*, ac *Herba fortis*. Egypt. *Somi*. Germ. *Wermuth* Elb. Elz. *Wiegens* fruct. / Vndt feld wermuth oder gemetner wermuth magis propriè: *Wermuth* quidem quod hominibus sua amaritudine omnem alacritatem adimat, aut Venerem inhibeat. Alii tenent nomen hoc à vi & facultate calfaciente adeptum esse, & hinc Saxones *Wermuth* vocant. Nonnulli tamen *Wermuth* appellant, abigens tristitiam, propter excellentes & multi-varias virtutes & operationes, quibus eam depellat. Belg. *Alfene*. Brabant. *Alsem* & *Alfsem*. Gallis *Alayne*, Tom. III.

*Erpni ger-
manicum*

del' Alaine, *Absinthe* & *Forté*. It. *Affenzo* & *Affentio*. Romæ *Nascentia*, Venetiis. *Ben Maestro*, & aliis Italix locis *Medico*, Tabern. Hisp. *Affentios*, *Alofona*, & *Alfina*. Angl. *Common wormwood*. Bohem. *Pelyutet*. Polon. *Piolam* oder *Piolin*. Hung. *Jróim* quib. etiam appellationibus reliquæ Absinthii genera plerumque donantur.

Absinthii verò nomen Græci ab *απιδιον* [*Alas* male legit H. Lugd.] id est, contrectando per antiphrasim deflexerunt, quod nullum animal ob eximiam amaritudinem hanc herbam attingat: quam ob causam etiam *Bathypicron*; seu *Barypicron* nōminata est. Veteres Græci Comicis *απιδιον*, quasi impotabilem dixerunt, quod hanc nemo propter insignem amarorem bibere possit.

Prouenit ferè vbique, & feritur, & per se quodque in hortis nascitur, autore Matthiolo; Clusio verò passim per Hungariam, Austriam & reliquas vicinas prouincias; Absinthium illud maius, quod reliquæ etiam Europæ familiare est. Saxosæ tamen amat, montosa, & inculta; teste Dodonæo: non ratò prouenit circa aggeres. Vbique & omnibus regionibus vulgare. Clusio allis locus in territorio Lingonensi, non longè à fluuio Alba, antiquitus dicebatur vallis absinthialis, propter abundantiam tunc ibi Absinthii copiam; ut legere memini in vita S. Bernardi l. i. cap. 51. Absinthium vulgare passim habetur in hortis & muris Castri, vnde transtuli in Hortum Ill. E. C. Montbelgardi, ubi copiosè colitur: optimum prouenit spontè in monte *Rochedes* ditioris Episcopi Potentrutensis non longè à Blaumontio: Monspelii in hortis, & spontè inter Monspelium & Lugdunum: in ditione Basiliensium inter *Liechstal* & *Wasserfal*: Basileæ quoque spontè in Sabaudia inter Lugdunum & Geneuam copiosè non longè à *Cormon*. Lugduni & Geneuæ, ubi vocant *du gros fort*, abundat in hortis, virens mense Nouembri; & adhuc Ianuario. Fallitur Turnerus, dum ait non prouenire in montibus. Absinthium, inquit, vulgare non in montibus, sed circa vrbes, fossas, vialque publicas, & locis cultis nascitur.

*Locus &
tempus*

Clusio

*Turneri
lappi*

Lectores videant vires attributas Absinthio à Veteribus ut Diosc. Galeno, & aliis, antè recitatas, quas existimamus respondere viribus nostri Absinthii latifolii. Ceterum, ut autor est Tragus, flores Absinthii vino decocti & poti, aut in Autumno vinum ex Absinthio confectum, quod Absinthites vocant, continuò vsurpatum, appetitum edendi facit & fastidia discutit, quod non ignorant vinosi, qui ut appetentiam cibi concilient, vinum eiusmodi potare consueverunt. Absinthium cum Romano Cymino in vino decoctum & calidum haustum ad tormina & stomachi dolores facit. Commemoratas facultates atque distillatæ adscribunt, quanquam non perinde validarum sit virium, quippe quæ infirmioribus & pueris [qui omnes fortes medicinas ferre nequeunt] exhiberi debeat, mensurâ quatuor aut quinque cochlearium. Absinthium contrarias habet vires, nam aluum durum emollit, laxam verò coercet. Opiliones flores Absinthii resiccatos, & cum sale tritos pecoribus & ouibus deuorandos obiciunt: nam ex longa obseruatione perceperunt, Absinthium omnibus internis affectionibus mederi, neque tantum dolores mitigare, sed & quæuis noxia expellere quib' nō nunquam pecora nō minus quàm homines infe-

*Vires &
Vfus.*

Appetitus

*Tormina
Aq. distillatæ*

*Defis
Vires con-
trarias*

esse dignum in Aëri confectionibus, nullam
fieri mentionem Absinthii, quod paucissima quo-
que dosi intermiscuit Marcellus. Imperator
Carolus, eius nominis quintus, quorannis vi-
num ex Absinthio parari iubens, libras xii. Absin-
thii, ad Amas binas multi apponit: huncque Ab-
sinthii vini conficiendi modum Dioscorideis
affinem tradit Cronemburgus. *Debent* autem in
factitiis vinis, semper vasa ad summum impleri,
alioqui vina in acorem corrumpuntur.

Oleum Absinthium sic parabis. & Comarum
Absinthii Vac. iiii. Olei oſaphacini lib. j. Inſolara
in vase vitreo, Absinthiumque mutato ter, velu-
ti de Mentha in oleo Menthae dicitur. Calefacit
ac toborat ea, quæ sunt refrigerata, potissimum
verò ventriculum, excitat appetentiam, obſtru-
ctiones auferit, lumbricosque enecat.

Sal Absinthii ita fit. Recipe Absinthii recentis
quantum vis, tere, distilla aquam per alembicum,
calcinata facies vase clauso, igne mediocri, quous-
que in cinerem siccum vertantur. Sitque ignis
cautio, ne materia priuatur propria & radicali
humiditate, quæ non posset amplius nisi vitifi-
cationem dare fusionem. Redde aquam suæ ter-
ræ, inhuma in fimo, vel balneo aliquot dies, ef-
funde cautè, ne facies turbentur, deinde filtra,
postremo enapora filtrationem. Omnibus ferè
morbis exhibetur vtiliter, præsertim in peste: a-
quam intercutem educit: urinam mouet, ventri-
culum corroborat: Gesnerus scriptum reliquit,
Theophrastum tria salis Absinthiaci grana cum
vino agris exhibuisse. Matthæus verò interdum
Arachnam dimidiam cum aqua Cardui Benedi-
cti, interdum cum extracto Angelicæ, vel syrupo
Berberorum, non sine magna vtilitate, exhibuit.
An verò sal Absinthii, theriacæ, aliisque probatis
anridoris præferri debeat, quod nonnulli statuere
videntur, id non facillè dixerit. Hoc equidem
affirmauerit, saltem Absinthii putredinem poten-
ter inhibere: à Theriaca verò mouendis ludori-
bus longè superari. Restat adhuc vnum, quod a-
riorum iudicio relinquit Matthæus, an sal
Absinthii fauces & palatum insipidum red-
dat. Habuit enim agros de eo conquærentes.
Certum equidem est, lixiuium, ex quo sal para-
tur, quemadmodum & alia vulgaria, manus ita
afflicte, ut sensum tactus ferè amittant, adeoque
suspiciari licet sal ipsum ingrato leuore fauces
oblinire, ut de saporibus exactum iudicium ferre
nequeant.

ABSINTHIUM VULGARE montanum.

Descriptio **V**ulgari Absinthio tam radice, quam cauli-
bus, nec non foliis, floribusque prorsus est
simile, sed exilius, ad summum duorum dodran-
tum altitudinem attingens, amaritudo illi, quæ
priori, sed gratior, & minus retro abominabili-
que odore commendatur. Nascitur in mon-
tibus pluribus in locis.

Camer. descriptionis autor in Epit. & Hist.
Matthioli vocat Absinthium montanum, Germ.
Bergwermuth, It. *Assenzo montano*, Hisp. *Alofena
montesina*, Gall. *Alayne de montagne*.

De hoc Dodon. in fol. lat. Absinthium latifo-
lium reperitur in quibusdam frigidis Helueticor-
um montibus, quod præ celi rigore non attol-
litur, sed per terram serpit, vnde Supinum à non-
nullis dicitur.

Tom. III.



ABSINTHIUM ARBORESCENS

Lobelii.

CAP. LXIII.



C. Bauh. phyt.
Absinthium g.
siue Ponticum
montanum, si-
mile vulgari,
nisi quod exi-
liora omnia, &
amaritudo gra-
tior: Absin-
thium monta-
num Camer. in
Epit. Matthioli
p. 453. Absin-
thium commu-
ne minus Ges-
nero.

Descriptio **V**ulgari
non ita fo-
lio & flore dissi-
mile, sed fru-
ticis arborei
habitu, Abroto-
ni modo homi-
nis procerita-
tem adipisci-
tur: candidio-
re & minore
paullo folio, sæ-
per virente. In
Belgio aliquan-
do emoritur, ob
Hyemis & cæ-
li inclementi-
am. Gustu amaro,
aromatico, o-
dore non ingra-
to.

Lobelio des-
criptori dicitur in Obs. p. 455. & in Icon. Plant. p.
753. Absinthium arborescens, *Absinthium del Co-
masco Anguillare*. Dod. lat. in fol. Abrotonum sæ-
mina arborescens. Camer. apud Matth. Absin-
thium arborescens, inodorum; dulce. Tabern.
Icon. & Hist. Baum wermuth; Absinthium ar-
borescens, Ital. *Assenzo*; de Comasco. C. Bauh. phyt.
Abrotonum 12. siue latifolium arborescens; An-
guillare Absinthium del Camasso, Lobelio Absin-
th. arborescens.

Absinthium inspidum.

Meminit huius Cordus in Hist. sua de plant. lib. 2.
cap. 82. his verbis. Absinthium dulce Artemisiæ
sapore æmulatur, figurâ verò Absinthium: radice
nititur similiter ut Absinthium perentii.

Tabern. in hist. part. 1. p. 26. de hoc ait: *Gauch
wermuth*/Veterebus incognitum, potest dici Græ-
cè *ἀνίσινος ἄπυρον*: Herbariis Absinthium insipi-
dum, saporis expers & fatuum. Ital. *Assenzo bar-
lerdo*: vulgari Absinthio in omnibus simile, ex-

Y 3

cepto quoddam destituatur omni odore & sapore: colitur in Belgicis hortis.

*Abinth.
spurius
Dod.*

Dodon. lat. in fol. Absinthium spurium exterum secundum, foliis, caulibus, floreque vulgare latifolium refert, sed odore & sapore destituitur, unde insipidum appellatur, inodorum, & faruum. Quibus locis aut quâ regione huiusmodi nascatur, nondum cognoui: in studiosorum tantum hortis à me repertum. si differt tantum odore & sapore à vulgari, ut Dodonæus & alii dicunt, quid opus erat figurâ, ac eâ, quæ ab aliis pro alia planta ponitur nempe, à Lobelio pro Artemisia specie.

Vidi (inquit apud Gesn. horti Coudenbergius) Absinthium in alieno horto, vulgato tota facie, ac colore aded simile vndiqueque ut ouum ouo, planè tamen insipidum.

*C. Bauhin.
bot.*

C. Bauhin. Phyt. Absinthium 4. siue insipidum primum Gesnero, & Lobelio insipidum, Pontico supino simile, sed gustu expers. Sed cur dicitur supino simile non video, quandoquidem præcedentibus, ut apud Gesnerum, vulgato simile dicitur.

Vires

Ut sapore & odore destituitur, ita vix vilius qualitatis calidæ, multò minùs expurgatricis facultatis aliquid possidet. Summopere cauendū esse monet Dodonæus, ne tale aliquod (si alicubi occurrit) pro legitimo colligatur. Odor perpetuò consulendus, atque vnà sapor.

Cautio.

ABSINTHIUM MARITIMUM LATIFOLIUM, siue Matthioli.



nec ingrato sapore: corymbi lutei, minores, quàm Absinthii vulgaris, semine minuto: radix lignescit.

An Hermolao Coroll. 452. Absinthium maritimum, siue Seriphium, Absinthio quàm Abrotono similis.

*Matthioli
Absinthii
marini de-
scriptio.*

Ἀψινθιον θαλασσιον, Absinthium maritimum, cum primum è terra erumpit, inquit Matthioli, folio est Absinthio simili, crassiore tamen. Sed postquam adoleuerit, & caules ediderit, mutatis in longum foliolis, illique præsertim, quæ vbiq; caulem ambiunt, Abrotonum æmulatur, non tamen foliolis est aded paruis. Semen profert exiguum, copiosumque, Abrotoni modo inter folia erumpens, atque in summitate caulis ferè racemosum, amari & adstringentis gustus. Eadem

in post. comm. cum mag. fig. In Ital. vocat Assenzo marino. In Hist. verò germ. ait. Meerwer-mur prouenit apud mare, minora habet folia cò-muni Absinthio, præcipuè in caulibus. Hæc folia magnas habent diuuras, cineritio sunt colore, & saporis amari, ab vna radice multos emittit caules, tenues, rotundos, albicantes, qui in extremitatibus ferunt semina densa, lutea, & amara, multò minora quàm in aliis generibus. Multas habet tenues radices, non profundas: tota planta grauis odoris, nonnihil adstringit. Eadem habet Matthioli in Epir.

Nullibi Absinthium maritimum vidi (inquit Turn. part. 1. p. 11.) tam lato folio, ut exhibet Icon Matthioli. Existimo cum loco Absinthii maritimi proponere legitimam Artemisiam, quàm in Italia in littoribus vidi.

*Contra
Matthioli.*

Lobel. in Aduers. Artemisiam marinam (ita quoque in Icon. Plant. p. 765.) vocat, eiusque semen similis Absinthio communi quàm Artemisia tradit. In Obs. p. 436. Seriphium vulgare, Dioscoridis perperam putatum: Artemisia marina tenuifolia. P. 441. picturam habet pro Artemisia marina Aduersariorum pag. 341. & duabus picturis foliorum varietatem demonstrat.

*H. Lugd.
error.*

Hist. Lugdun. pag. 943. Absinthium Seriphium, seu maritimum Matthioli. Pag. 946. Absinthium angustifolium Dodonæi, quod plerique Absinthium Santonicum esse volunt: alii Artemisiam marinam. Pag. 951. Artemisia marina Lobelii, quam pictam dedi nomine Absinthii angustifolii Dodonæi. *neus bone vir, si pictam dedisti, cur eam repetis?* tres figuras, tresque descriptiones, vnus plantæ habes.

An Clusio in Pannon. & H. post. Absinthium maritimum Patavinum.

C. Bauhin. Phyt. Absinthium 11. siue maritimum Lauendulæ folio, ludens foliis, in hortos translatum Patavii collectum.

Tabern. Icon. & H. Artemisia marina, Meer Beyfus. Item: Artemisia marina maior, folio Artemisiam angustiore & minore: Artemisia marina minor, folio Lauendulæ. Tabernamontanus habet figurâ tantum vnâ ex Matthiolinis, Absinthii eius marini folio non viso: an bene autem distinxerit iudicent Lectores.

*Locus &
Tempus.*

Absinthium maritimum vidi Esslingæ apud insignem pharmacopœum Volmarium, ex cuius ramo est pictura per Camerarium posita in Hist. germ. & Epir. Matthioli, ut iam dictum, in qua parte folia erant simplicia & non diuisa: Absinthium hoc Seriphium folia superiora habet Oleæ ferè similia, candida, hirsuta. Vidi Patavii in horto D. Cortusi in quo mirabiliter variant folia: quædam enim inferiorum non sunt diuisa, quædam verò sunt diuisa. Eadem varietas in superioribus quodque cernitur. Idem, ni fallor, cò-spexi in horto D. Robini hortulani regii Luretiæ, & postea apud Generos. D. à Schvvende in Bourque ad Rhenum, à quo habui plantandū in hortum Ill. E. C. Witt. Montbelgardi: vidi etiam Esslingæ. Si Matthiolo credimus, Seriphium prouenit in quàm plurimis tam Tyrrheni, quàm Adriatici Pelagi littoribus, præsertimque Aquilei-ensibus & Tergettinis.

Calidum siccum esse scribit Dodonæus, sed tamen haud intensè, multò certè minùs, quàm vel Absinthium, vel Lauendulam.

Absinthium Seriphium Turneri.

Absinthium vulgare, inquit Turn. part. 1. pag. 7. maius est, grauioris odoris, minùsque adstringens.

gens, quàm Seriphium. Cùm igitur Seriphium maius sit, minùs habeat adstrictionis, grauiorque sit odore quàm Ponticum, vulgateque in omnibus hisce superet Seriphium, necessariò sequitur Ponticum differre à vulgari, non tantùm aequalibus, sed etiam magnitudine, odore, adstrictione ac illud docetur falsum esse, quod ait Amatus, nempe Ponticum maius & procerius esse vulgaribus Absinthiis, cùm aperte Galenus contrarium doceat. Idem p. 9. Alterum Absinthii genus, dicitur à *ἄλσιν* *ἁλῶ* *ἀστὶ*, 9, Latinis Absinthium maritimum, aut Seriphium, etiam si in quibusdam codicibus inueniam Seriphium. Verùm cùm Seriphus ipsa insula sit, videtur Seriphium potius nominandum esse Absinthium; veluti ranam dicimus Seriphiam, hoc est, mutam, &c.

ABSINTHIUM PONTICUM
vulgare, foliis inferius albo.

Descriptio



Numerosissimas par-
git radices, par-
uas, & crebris
fibris inter-
textas, ligno-
sas, sapore a-
samatissimo præ-
ditas: caules
verò ex eadè
radice plures
erigit, cubita-
les & sesqui-
cubitales, te-
reres, glabros,
virescentes,
aut ex virore
rubescetes,
canescenti-
ne, frequentibus
adnatis, ab imo ad su-
mum usque
ramosos: folia
non minùs
tenuiter inci-
sa quàm Ab-
rotoni, sed
brenioribus,
concinriori-
busque segmè-
tis, breui la-
nugine pubes-
cunt; potissi-
mum infernà
parte, quæ &
magis canel-
cit quàm su-
perior, odore
suauis, sapore
subamaro: co-
rymbi quàm in
vulgari Absin-
thio minores,

mèlini, foliis vehementiorem spirant odorem.

Absinthii Pontici duplex genus tradit Clusius tam in Pannon. quàm Hist. postrema. Vnum enim planè incanum est, quo potissimum Viennenses officinæ vtuntur, tanquam nobiliore, ita

enim sibi, persuadent. Alterum purpurascens habet cauliculos, folia non adèd incana, sed internà parte viridiora: id à nonnullis superiori præfertur: existimo tamen naturales istam varietatem duntaxat parere.

An Syluio in Mes. lib. 2. cap. 12. Absinthium Ponticum seu Cappadocicum Dioscoridis & Galeni dicitur, Melue Romanum? An eidem de compos. med. Ponticum, quod Romanum Mesuem vocare scribit, quodque hodie passim videri testatur?

Cordo in Hist. nominatur Abrotonum candidum, seu fœmina, & hoc titulo ab eo etiam describitur. Gesnerus addidit figuram, quæ non satisfacit.

*Abrus. can-
didum seu
fœmina
Cordo.*

Absinthii multa sunt genera, inquit. Fuchs. de comp. med. lib. 1. vbi autem apud Veteres Absinthii mentio incidit, non vulgare & quod omnibus notum est, usurpandum erit, sed Ponticum: quod non est, nisi id quo hætenus Seplasiarii pro Abrotono fœmina ad sua medicamenta vsi sunt. Comam tantùm cum floribus ad medicamentorum confectionem adhibemus.

*Absinth. Ge-
nerum Fuchsio.*

Pro Abrotono minori describitur à Trago in Hist. lat. In Hist. verò germ. vocat *Ättn* (schön *Stabwurz*) existimauitque primò [& recte] esse Absinthium, nunc verò Abrotonum Theophrasti lib. 6. cap. 7. esse posse sibi (falsò) imaginatur.

*Absinth.
Pont. Ad
sthiol.*

Matth. in Icon. Absinthium Ponticum, Græcis à *ἄλσιν* *ἁλῶ* *ἀστὶ*, Ital. *Asens* *Pontico*, in Hist. germ. *Pontischer Wermuth*. Camer. ad Epit. Matth. ponit nouam iconem, Absinthii titulo; Ad eundè verò Hist. germ. duas icones, quas Matthioli figuræ non præferimus. Ponimus & nos duas, nò vt diuersarum plantarum, sed quia ita sculptas accepimus.

Gesn. de hort. Abrotonum fœmina à Cordo existimata, Absinthii genus potius. An eidem Absinthium Romanum officinarum Coudenbergio? Eidem Absinthium Ponticum Fuchsi, non multum amatoris, spontè proueniens Tubingæ, adstrictionis cuiusdam particeps.

Ex Galeni lib. 11. m. m. & 6. si. npl. patet, inquit part. 1. p. 7. Turnerus eam plantam, quæ in Anglia Occidentali *Herbe Cypres*, i. e. Cyparissus, vel Cupressus herba dicitur, circa Londinum Absinthium Romanum; Pharmacopœis Antuerpiensibus & Mesue Absinthium Romanum, Coloniensibus *Græne cruyt* / esse verum Absinthium Ponticum, neque magnum illud vulgatum fastidium Absinthium, esse Absinthium illud, quod pro Pontico proponit Galenus. Et post, si Matthioli, sicuti debuit, Galeni auctoritatem curasset, debuisset, quodlibet trium (præter vulgare Absinthium) Absinthiorum, aut duorum saltem pro Pontico recipere potius, quàm vulgare: cùm præsertim vidisset duo hæc genera, vnum quidem Romæ, alterum aut in Italia, aut in Germania, aut saltem apud recentiores Germanos, præcipuè Fuchsi, & Tragum, sub nomine Abrotoni fœminæ descriptum. Item p. 12. Herbâ illâ, quam olim Santonicum Absinthium credidi, puto fuisse Romanum mihi tum temporis ignotum.

Matth. in

Dod. Gall. Absinthium Ponticum. Lat. in fol. p. 24. Absinthium tenuifolium, quod ait vulgò Romanum Absinthium, & *Roosche Abs* seu appellari, & hoc nomine compluribus medicinam facientibus ac pharmacopœis innotuisse, qui hoc Absinthio Pontici loco vtantur. Videri verò Ponticum illud esse, quod à Galeno m. m. u. descriptum sit. Differens porro hoc Ponticum

esse, ab eo, quod à Dioscoride cōmendetur. Nam Dioscoridis Ponticum, ex primi generis, siue Latifolii Absinthii esse numero: Quod & Galeni 7. simpl. cap. de Abrotono asseruer.

*Absinth.
Romanum
Cronen-
bergio.*

Cronenburg. Absinthium Romanum, quod alio nomine Ponticum vocari ait, ac multo minus amarum dicit, in compos. med. accipit, simplicitēque Absinthium intelligi tradit.

Lob. in Obs. p. 436. pingit his nominibus. Dioscoridis Galatium Sardonium Absinthium, perperam Santonicum vulgi, est Absinthium Romanum falso creditum, Abrotonum candidum Cordi, & femina Fuchsi, foliis & similitudine quadam Achilleę, Ponticum Absinthium Dod. & Fuchsi. Santonicum Ruellii. In Icon. Plant. pag. 755. hoc titulo. Absinthium Galatium Sardonium Dioscoridis.

Catalpino dicitur Absinthium Santonicum virens in horto Pisano, allatum ex Gallia, ubi indigenat Abrotonum vocant.

Tabern. Icon. & Hist. Absinthium Ponticum Galeni, *Pontischer wermuth*: Absinthium minus, Absinth. tenuifolium, Auerthoe Absinthiu, *welschen wermuth* vnd *Grabkraut*.

*Locus &
tempus.*

C. Bauh. Phyt. Absinthium 6. siue Ponticum tenuifolium incanum.

Matth. not.

Horro Lusit. Absinth. Ponticum vulgare.

Absinthium Ponticum, inquit Matth. nascitur plurimum in Ponto: quin etiam in Vngaria & Bohemia. Temetē quidem meo iudicio asserit Matthiolus in Ponto prouenire, quasi ibi obseruaret. Idem forte facit Dodonæus, cum ait. In Mysia, Thracia, Pannonia, aliisque vicinis regionibus frequens: in Belgio & Britannia hortense est: Autumno flores, semēque profert, paulo post Hieme aduentante herba marcescit, vegeta interim radice, à qua Vere folia caulesque rursus exiunt. Nonnullis Germaniæ locis frequēs, teste Lobelio, in Flādiæ & Angliæ hortis copiosa, & vsu multo expertita. In Galliis etiam aud. o haberi in hortis copiosē. Tubingę spontaneum est, non longē à fluuio Nicaro. Florentiæ in horto Nicolai Ferrariensis: Lugduni in hortis frequens, vt & Geneuę, ubi vocant *du prin fort*: Montbelgardi *du petit Cypres*. Absinthium tenuifolium quod doctissimis Medicis & Pharmacopæis Romanum dicitur prouenit in Germania apud Wormaciam, non longē à pago *haseloch*, item circa Spiram apud locum dictū *heylich graben* / *anthore* Turnero. In Anglia verō, Frisia, & Germania inferiore, quod idem sciat, in hortis duntaxat nascitur. Spontē creseit non solum multis Pannoniæ, sed etiam Austriæ locis atque Viennensi agro, cum in saxosis, tum in salebrosis gramineisque desertis agris, auctore Clusio.

*Vites &
Vitis.*


Hydrep.

*Conserua
preparatio*

Ponticum Absinthium efficacem vim obrinet ad aquam intercutem, vt Matthiolus iam sapius experimento compertum se habere scribit. Equidem quosdam se nouisse ait hydropicos quasi deploratos, qui ex longo esu comarum eius, quæ ex saccharo adseruare fuerant, sanitati restituti sint. Eius parandi ratio hæc est. Sumito comarum recentium Absinthii Pontici libram vnam: Sacchari albißimi libras tres. Comas illas tundito in mortario lapideo: deinde iis optimē tuis saccharum in puluerem tritum adicito. Rursus omnia simul tantisper tundito, donec in vnū corpus redigantur: & deinde pixide vitreā recondita insolentur per mensem. Ex Absinthio ita saccharato, semuncia quotidie assumatur tribus

horis ante cibum. Lobelius ridens Matthioli ait: *Noomsche Alsen* conseruam, in officinis Antuerpianis & Belgicis paratam, mulierculæ multo medicæ & clinicæ libentius emunt, quā non ita amaram, facilius deglutiunt: Deceptæ quidē, nam si cetera amarore, igitur & facultate amica, & grato colore. Calidum est ac siccum, inquit Dodonæus, amaritudinis quoque, sed multo minoris, quā latifolium (Absinthium), adstringendi autem vis in eo superat. Vino impositam vetriculo vilem statuit Camerarius.

ABSINTHII SPECIES QVIBVSDAM, Chamæmelum Chrysanthemum Fuchsi. CAP. LXIV.



Descriptio

Simplice & singulari est caule, serē cubitali, tereti, glabro, per quem ex interuallis folia nascuntur, Chamæmeli nobilis similia, tenuiter incisa: paulo supra medium caulem summo tenus, alternatim pullulant flores, corymbis Abrotoni similes, inferiores quidē semunciales.

& longioribus pediculis nixi, superiores verō breuissimis hærent, & veluti cauli appropinquunt: radix lignosa, tortuosa, multifida, fibrata.

Chamæmelum chrysanthemū vocat describam iam plantā Fuchsius, cum apud eū esset. Vidi olim & collegi Esslingę in horto D. Volmarii Pharmacopæi.

*Chamæ-
melum chry-
santhemū
Fuchsi.*

Dod. in fol. lat. pag. 32. Reperitur in quibusdā frigidis Helueticorum montibus, quod præ cæli rigore non attollitur, sed per terram serpit, vnde supinum à nonnullis dicitur.

Lob. Obs. p. 434. Absinthium Ponticum supinum Herbariorum, catliculis procumbentibus, vnde supinum vocatur, folio & semine Absinthii arborecētis, odore suauissimo, gustu aromatico, amaricante.

*Absinth.
Ponticum
supinum
herbariorū
Lobelio.*

Tabern. Icon. & Hist. Absinthium repens, *friedender wermuth* / Absinthium arborecēti simile, Absinthium supinum siue minus supinum.

*Absinth.
repens
Tab.*

C. Bauhin. Phyt. Absinthium 2. siue Ponticum supinum, Gesnero supinum, & Lob. Ponticum supinum. Item Absinthium 7. siue Ponticum repens, Absinthium repens Tabern. quod Esslingę in horto D. Volmarii repentis nomine accepi, inquit C. Bauh. licet sint qui Chrysanthemum vocitent.

ABSINTHIUM PONTICVM ET ROMA- num quibusdā, aliis Scriphium, & variæ de eo sententiæ. CAP. LXV.

Absinthium hoc attulit mihi frater C. Bauhinus, qui Absinthium marinum ex Lio rōc denomi-

denominabat, ac aliquatenus nostrati simile aiebat, foliis minoribus, diuisuris longioribus, tenuioribus, & angustioribus multò, candidis.

Dedit hoc idem Meris D.S. Albinus Medicus insignis iâ dicto titulo. Claudius verò Rocardus insignis Pharmacopœus, qui libellum de Absinthii doctissimum conscripsit, Troiz mihi obtulit pro Pontico vero eandem plantam, & aliam pro Romano valdè similem.

Absinth. Seriphium Camer.

Camer. apud Matthiolum in Hist. germ. & Epit. Absinthium Seriphium vulgò dictum, habet folium si piratim pictum, quod responder Absinthii prædictis.

Absinthium murale Monachorum in Mef. dist. 6. cens. 179.

Turn. part. 1. p. 6. Alterum Pontici Absinthii genus in rudibus Romanis proueniens. Figuram autem habet, cui titulum fecit, Absinthii Ponticum Romæ natum, ex qua nihil certi colligere possum, quia mala: præterea eandem iterum ponit p. 10. pro Absinthio marino.

Absinth. Ponticum alium Turn.

Gesl. de hort. Coudenbergius in Epist. ad me: Absinthii Romani [inquit] ramulum, dedi olim Guill. Turnero qui Anglico suo herbario eius imaginem inseruit: sed perit mihi tam plâra absque semine, Hyemis iniuriâ, nec id deinceps quauis diligentia licuit recuperare. Forma rota cum vulgato Absinthio conueniebat, foliis tantum paulo minoribus. Romæ semen accepit.

Anguill. epist. 10. de hoc dicit: Absinthium Sardonium, quamuis multi Santonicum vocant: In ea Franciæ parte nullum inuenitur Absinthium, quod descriptioni Dioscoridis respondeat. Galatia est in Asia nunc Natolia dicta, in qua Sardorum regio: Absinthium ibi nascens idem est, cum eo quod inuenitur in Bosnia & in Hungaria, respondens descriptioni Dioscoridis. Hoc non reperitur, nec in Francia, nec in Italia.

Dodon. gall. Absinthium Ponticum quibusdâ, in his regionibus [in Gallia] in quorundam hortis.

C. Bauh. phyt. p. 670. Absinthium Ponticum Belli, Absinthium Creticum, de quo hæc Bellus ex Creta scripsit. Absinthium in hac insula frequentissimè prouenit, perpetuoque viret, odorem gratum spirat, nihilque amarum est, aut si quam licet amaritudinem habet (in viridi enim nulla percipitur) ea valdè obscura est. Ab asinis & pecoribus, omnibusque brutis valde expetitur. Folia tenuia profert & multum diuisa. Ego legitimum Ponticum esse existimo. Vocatur à Graecis Απθία, & non ἀσθία, quemadmodum Anguillarus in Græcia vocari aliquando perperam scripsit.

Absinth. montanum seu Romanum Tab.

Tab. Icon. & Hist. part. 1. p. 1. Bergwer muth / aut Römischer wermuth / Absinthium montanum, seu Romanum: differt tantum à vulgari paruitate: est enim duos aut tres palmos altum, eadem amaritudo, sed gravior, odor non ita grauis: prouenit passim in multis Germaniæ locis montosis, hoc esset semper à Medicis & pharmacopœis sumendum: eo tamen deficiente accipiendum quod supra muros prouenit, & in ruinis, aut saltem in agris siccis, & soli expositis. Absinthium montanum peritis Medicis, & circa stirpes bene versatis. Dioscoridi, Aërio, & Paulo Aeginetæ Absinthium Ponticum, Melue Romanum, Plinio Absinthium Italicum: & quamuis prædictis præferatur Ponticum. III.

cum, Romanum & Italicum, quod vnum & idè Absinthium est, nostrum montanum nihilominus formâ & viriditate non differt, nec necesse ex Ponto, vel Italia accersere. Errant qui discrimen querant. Serapioni cap. 14. simpl. & Mesarogie Arabico Medico apud eum Cuscute Romanum. Hæc Tabernamontanus, qui pro Absinthio montano, Lobelii figuram habet, cui titulus, Absinthium vulgare Ponticum Ruellii & Dodonæi Absinthium latifolium: quod Turnerus posuit pro Pontico & Seriphio, ponit pro Absinthio marino.

Synonima:

Tab. mar.

An Cels. p. lib. 12. cap. 2. Absinthii alterum genus in collibus argillosis, ubi alia nulla viuunt planta, frequens in agro Senensi: Hoc breuius, inquit, ac multò tenuius vulgari: paucioribus ramis, ac seminibus odoris minùs ingrati, ac saporis. Ex Dioscoridis, Galeni & Plinii verbis patet, Absinthium hoc exiguum, quod apud nos incultis nascitur argillosis locis, esse quale Ponticum traditur.

ABSINTHIUM SERIPHIVM TINVIFOLIUM marinum Narbonense.

CAP LXVI.



Absinthii quod Seriphium Dioscoridis legitimum mihi videtur, multis fruticat virgulis, cubitalibus, lignescens, incanis: per quos folia sunt crebra, tenuissimè dilaeta, latiora tamen quam Alpini Absinthii Gesneriani, cuius folia alioqui sunt satis similia, minùs tamen candi-

Descriptio

da sunt mei Seriphii, sapore salsuginoso cum amaritudine; at primùm pullulantiâ, succulenta sunt & viridia: senesce grauidum euadit minuto.

Clus. in Pannon. p. 554. & Hist. post. nominat Absinthium Seriphium Narbonense & hispanicum, ac id se nusquam nisi in mediterranei maris littoribus obseruasse meminit: hoc præterea graucolentiâ atque sapore Misnense superare ait.

Eadem ferè Dodonæus tradit. Absinthium Seriphium, inquit, circa littora exit maris mediterranei in plerisque Europæ prouincijs, veluti in Narbonensi Gallia, graucolentiùs est, ac minùs candicat, quam Seriphium Belgicum.

An Camer. ad Epit. Matth. p. 457. & ad Hist. germ. tabellam habet hoc titulo: Absinthii Santonici species maiuscula & longiusculis folijs.

Miror à Lobelio tum in Aduersarijs tum in Obseruationibus omissem nostram plantam, de qua hoc capite verba fecimus, nisi voluerit eam

comprehendere sub Seriphio vulgari: aie enim Absinthium Xantonicum vulgare in Gallia, non multum differre à Seriphio vulgari.

Dodon. Absinthium Seriphium, circa littora exeuns maris mediterranei in plerisque Europæ prouinciis.

An Cl. Roccardo Absinthium tertium marinum?

C. Bauhin. Phyt. Absinthium 13. siue Seriphium Gallicum, vel primum: Absinth. Seriphium tenuifolium Io. Bauhino libello de Absinthiis.

An Anguill Absinth. Seriphium & marinum? An Bellonio Obs. lib. 2. cap. 66. Absinth. Seriphium: cap. 95. & cap. 112. Absinth. marinum & Seriphium marinum? An Tabern. Hist. part. 2. pag. 28. Paruum genus Absinthii, pulchrum instar parue arboris, altitudinis tantum digiti, foliis similibus Absinthio montano, sed multo minoribus, quod quibusdam Tiberiadicum & Genezarechicum dicitur.

Ruellius, Cornarius, & Cordus aiunt, semen contra vermes, vel *Barbatinam* esse semen Seriphii, quod non impugnamus. Anguillara verò aie Herbam esse Abrotano similem quæ semen contra vermes ferat.

Absinthium Seriphium semine prægnans obseruari mense Augusto circa mare Mospelti. Vidi præterea Florentiæ in horto Nicolai Ferratensis.

ABSINTHIUM SERIPHIVM GERMANICUM succulento folio siue Misnicum.

CAP. LXVII.

Descriptio

Multifida habet folia, succulenta, non minus quam Absinthium marinum Patavinum incana, proximè ad Seriphii, in Belgicæ & Angliæ maritimis nascentis, folia accedentia, grauioris tamen paulò, & validioris, vt Clusio videtur (qui Absinth. marinum Misnense vocat) odoris, Seriphii Narbonensis & Hispanici graueolentiam quodammodò referentis, atque etiam saporem.

An apud Cordum Gesn. in annot. lib. 3. cap. 27. in Diosc. hoc intelligit dum aie Absinthium marinum referunt etiam in Germaniæ ora, vt Seeburgi inueniri? An eadem de hort. Absinthium Seriphium?

Absinth. Seriph. germanicum C. B.

C. Bauh. Phyt. Absinthium 14. siue Seriphium Germanicum vel secundum. Camer. apud Marthiol. in Hist. Germ. & Epit. pag. 456. tabellam habet sub titulo Absinthii marini, in qua portio picta notata littera H ac ibidem annotatum, Absinthium aliud Bononiæ marinum dictum, foliis minus candidis, saluginosis cum amaritudine, abundat seminibus paruis: cubitalis est planta, multos ramulos habens: folia primùm succulenta sunt & viridia, vt solet marinis stirpibus euenire. Considerandum an sit Absinthium Misnicum ex Clusio modò descriptum, vel Belgicum, de quo nunc dicendum.

Absinth. montanum Bononiæ Camer.

ABSINTHIUM SERIPHIVM BELGICVM.

CAP. LXVIII.

Misit hanc plantam nobis siccam ex Angliæ Londino, Medicinæ Doctor & rei Botanice studiosissimus Scotus, Iacob. Gargillus hoc titulo & hac descriptione. Absinthium marinum

Anglorum, admodum lanuginosum & incanum, diuina foliorum Absinthii Pontici seu vulgaris, sed segmentis concinnioribus, angustia Romanum dictum prouocantibus: sapor minime ingratus, aromaticus quodammodò, maiorem adstrictionem, quàm amaroem respiciens, eiusmodi ferè est Absinthii Romani vulgò dicti: odore nullum spirat: colit in horto Gerardus Chirurgus & Botanicus, cui nunquam floret.

Nos planè simile obseruauimus Lutetiæ in *seriphio* cultiss. horto Io. Robini hortulani regii año 1586. quod nondum florebat, id etiam aliquot annis post misit plantandum Montbelgardi in horto Ill. E. C. id veluti rependo se plurimum multiplicat, hiemem perferens non reconditum, vt pluribus annis durans.

Dodon. gall. lib. 1. cap. 2. Seriphium, *Aluine marine* inscribit, vocatque græcè *αἰθίνιον* & *αἰθίνιον*, ac dicit. Absinthium marinum incognitum Pharmacopœis, quamuis vendant quotidie semen, quod officinis dicitur Semen sanctum, Semen lumbricorum, & semen contra vermes: Absinthium marinum prouenit copiosè per totam Zelandiam, & in Flandria circa mare, & quibusdam Brabantia locis: albicans est, aut cinereum, multa folia habet, alba, similia Absinthio communi, sed multò minora, tenuiora, candidiora, tenuius incisa, multos flores paruis globulis similes & semina similia vulgari Absinthio: crescit ad altitudinem pedis & semis, ac etià altius: odore est graui, salis verò saporis, grati & amari, suo natali loco collectum, translatum verò in hortos & terram vbi aquæ dulces, multum variat saporem & naturam. Is in Hist. gall. in descriptione aiebat Seriphium suum esse odore forti, sapore salso, amaro, & ingrato, quæ conueniebant nostro Absinthio Narbonensi: In Hist. verò Lat. ea omittit [merito sane] nec repetit ex ea colligi semen contra lumbricos officinarum, rectè autem calidum quoque ac siccum naturà statuit. Omisâ insuper iconè sua priore, quam in Gallica exhibebat, ponit aliam quæ apud Lobelium nomine Absinthii Pontici Tridentini (Absinthii tenuifolii albi) habetur, & etiam est apud Clusium in Pannonicis pro Austriaco tenuifolio.

Ex his ita dictis patet, merito Lobelium in Aduersariis dixisse perperam fuisse agnitum Seriphium Dodonæo. Quàm verò aptè Artemisiam speciem constituat, iudicent alii. Seriphium vulgare [inquit in Obs. pag. 436.] Dioscoridis perperam putatum, Artemisia marina tenuifolia. Artemisiam tenuifoliam potius refert, minutissimis incisis foliis albis, semine & floribus: odore Lauendulæ & Abrotano proximis, vel Artemisiam marinæ. Et paulò post. Xantonicum vulgare, è Xantonum Gallorum agro, *Saintonge* vernaculè. Seriphio vulgari non ita absimile, longiore & viridiore folio, ingrati saporis, & grauioris odoris. Belgis hortense apud Io. Mutonum. Icon. Plant. pag. 755. Seriphium vulgare perperam Dioscoridis. Figura hæc Lobeli apud Platinum particularis & diuersa est, ab utraque à Dodonæo posita, ita vt me lateat, an Lobelius eandem intelligat, quam Dodonæus.

Clus. Pannon. & Hist. post. Absinthium marinum, siue Seriphium in Belgicæ & Angliæ maritimis. H. Lugd. pag. 944. Seriphium Absinthium Dodonæi. Tabern. Icon. & Histor. Absinthium marinum, *Neer wermur*. An huc referendum sit hoc Tabernamontani Absinthium, videndum ex eius Historia: figura est ex Turnero, qui bis eandem

Seriphium Dod. gall.


Seriphium Dodonæo perperam cognatum Artemisia species Lobelio

Xantonicum vulgare

Absinth. Seriphium

tandem posuit, ut dictum, semel pro Absinthio Pontico: secundò pro Absinthio marino.

C. Bauh. phyt. Absinthium 15. siue Seriphium Belgicum, vel tertium. Leuino Lemnio in herbis Biblic. cap. 17. Absinth. marinum apud Belgas in Oceani crepidine passim obuim.

An Cordo in Sylua Obs. Seriphium, i.e. Absinthium marinum ad lacum prope Seburgum? An Camer. in Hist. gerin. Matthioli, & eiusdem Epit. Absinthium Seriphium vulgò, illud scilicet quod hoc signo  notatum est?

Cronenburgum de comp. med. lib. 3. in syr. ex ex Absinthio hoc intelligere credibile est, dum ait: Seriphium nunc quoque passim nascitur, iuxta maris Hollandici littora, odore foetenti grauissimoque: eo plerique tineas & vermes necant, ob idque semen lumbricorum, ac mortem appellant: quanquam alii peculiariter eam vim Santonico attribuant: unde etiam Semen sanctum dici coepit. Fallitur Cronenburgius: semen quod contra vermes appellamus, non ex hac planta colligitur.

ABSINTHIUM VALLESIANVM tenuifolium candidum siue Herba alba. CAP. LXIX.



Quo tempore D. Gesnero Tiguri familiariter utebatur, Vallesiani nomenclatura Absinthium quoddam eapropter indigebat, quod in Seduno Vallesianorum vicinis collibus frequens oritur: lignosi rami tomento denso & albedo pubescentes, mollitie delicata, id quod in foliis quoque non

minùs obseruatur, ad Seriphii Absinthii folia; diuisionum minutis cæsuris, accedentibus, utriusque tamen angustioribus: flores, nisi quod magnitudine cedant, similes quoque: odor aromaticus.

Absinthii genus quod in Vallesia [Heluetiorum regione, inter Rhodani ortum & Lemanium lacum] in collibus apricis circa Sedunum (Herbæ alba nomine vulgari notum) nascitur Caphuræ quodam odore. Id ex semine facillè & pulchrè mihi prouenit, inquit Gesnerus de hortis. Floret eodem anno, quo satum, sed serò: nempe Autumnò, si Vere seratur, unde herbam annuam esse suspicatus sum: sed hæc dum scriberem in Iunii mensis fine, anni superioris Verè satæ plantæ nondum florebat: ut illas quæ primo Autumno floruerunt, præcoces & præperos flores edidisse existimem. Sata in fine Veris ad florem non peruenit. Absinthium Seriphium fœminam hoc appellari, vel mediterraneum: nam color albus, & vis aliquantò minor, quam maritimi (alioqui similis odore saporeq;)

Tom. III:

fœminam mihi designare videntur. Huius, quod sciam, hætenus nemo mentione fecit, multis autè quidem modis in re medica fœlicè eius vsuta esse posse experimento didici. Hiemes in hortis quamuis asperas perfert. Idem in app. Absinthium album è Vallesia appellat, & vix ultra biennium in hortis durare ait. Negat tandem in Epist. ad me esse Absinthium Ponticum, etque minorem, quam cæteris adstrictionem attribuit.


De hoc Dodonæus loquitur in Hist. lat. p. 26. ^{absinth.} ^{partum ex-} ^{tern. primu} ^{Dodonæus.} dicens. Ex Spuriis Absinthiis; quæ non abs re externa appellari possunt, *Herba alba* ab Helueticis appellata, vel prima occurrit: Tota hæc mollis, voluti lanuginosa atque albida est, & Seriphio siue Marino Absinthio assimilis, sed candidior, odore & sapore quoque satis refert, sed tamen aliquantò suauior, ad Caphuræ odorem accedens. In Vallesia prope Sedunum in collibus nasci scribit Gesnerus, &c.

C. Bauh. phyt. Absinthium 18. siue album foliis Seriphii.

Facultate Herba alba, ut Dodon. refert, caloris & siccitatis cuiusdam exiguae particeps est. ^{absinth.} ^{album foliis} ^{Seriphii C.} ^{Bauh.}

ABSINTHIUM AVSTRIACVM tenuifolium.

CAP. LXX.



Huius ^{caulis} ^{Descriptio} pedalem altitudinem plerumque æquat, nonnisi quam cubitalem attingit, firmus, canescens, multis foliis, marini Belgarum Absinthii foliorum quodammodo emulis, tenuioribus, prorsus incanis, quæ confuso ordine eum ambiunt, præditus, qui superiore parte

in multos ramulos, ex tenuiorum adhuc foliorum alis nascentes, diuiditur, plenos *flosculorum* propendentium corymbis: radix fibrosa est, & singulis annis nouos frequentioresq; producit: tota planta impensè amara est, sed elegans & rara.

Absinthium hoc tenuifolium Austriacum ^{absinthium} ^{tenuifolium} ^{Austriacum} ^{Clusio.} Clusii, descriptionis auctoris, crescit in collibus & apertis quibusdam locis Viennensi vici vicinis, atque à Rhizotomis promiscuè cum eo, quod vulgò Ponticum appellatur, ad Viennensium pharmatopolarum officinas adfertur. Hæc ex Clusio, cuius figura in Pannon. malè ponitur. p. 556. nomine Absinthii montani umbelliferi, quod pingitur p. 553. Clusii porro figura apud Dodonæum pro Absinthio Seriphio. Licet autem hæc nonnihil dubii nobis pariant, suspicatur tamen Tridentinum & Clusii tenuifolium idem esse.

Z 2

Cronenburgus lapsus.

Vallesianum ex Dodonæo.

Descriptio

Herba alba absinth. Seriph. fœmina. Plin.

Tabern. Icon. & Hist. Absinthium Nabathzum Auicennæ, Alexandrischer wermuth: foliis paruis tenuiter diuifis, albicantibus: odore grato, aromatico: sapore amaricante & adstringente: Hoc Medici Tridentini vtuntur pro Pontico, cuius loco etiam ponendum: quandoquidem Pontico viribus par est: apud nos spontè non prouenit: in Belgio frequens in hortis, prius vidi Bruxellæ in horto. Hæc Tabernamontanus, qui figuram Lobelii habet.

*Absinth.
Seriphium
Dod. lat.
quoad fi-
guram.
Atouentur
quodam
dubio.*

Dodonæo Absinthium Seriphium quoad figuram, non autem descriptionē, quæ est Absinthii Seriphii Belgici.

Casp. Bauhin. Phyt. Absinthium 17. siue tenuifolium albicans.

Considerandum proponimus, quantum & in quibus differat hoc Absinthium Austriacū Clusii, ab Absinthio Valesiano Gesneri. An Anguillaræ Absinthium marinum? An etiam Bellonii Obseru. lib. 2. variis capitibus Absinthium Seriphium: & Absinthium marinum?

LUMBRICORVM SEMEN.

CAP. LXXI.

Lumbricorum semen vulgare & Matthioli.

Descriptio



Lumbricorum semen Rauwolfii.



*Absinth.
Santon.
Rauwolfii*

Quod in officinis prostat Lumbricorum semen vulgè dictum, ex variis, minutissimisque surculis, foliis, & semine ipso coacervatū est. Semen parvū est, oblongū (maiora tamē inter ea Milio supparia, ex squarrosis tunicylis compacta,) pullū vel flavesces. At quæ minutula inter ea sunt foliola, striata sunt. Quædam etiā obleruantur trifida, angustiora, acuminata, videntur etiam adesse portiones tenuissimorum cauliculorum. Omnia facile digitis atteruntur, amara sunt cum acrimonia & odore grauiusculo.

Absinthiū Santonicum, inquit Rauwolfius prouenit circa Bethlehem & abundat in

Terra Sancta, foliis paruis, cinereis, nostrari Absinthio mediocriter accedentibus: ramulis multis tenuibus, cum copioso semine paruo, flavescente, grauis odoris, saporis amarissimi, acri cum salugine.

Cordo in Hist. Pl. lib. 4. cap. 80. ita describente. Absinthium Seriphium, siue marinum Absinthium, ramosa est herba, nostrari Absinthio similis, multò tamen minoribus foliis: semen habet paruum veluti Ammi, acerosum, colore flauum, gustu valde amarum, acre, vehementer tenue, & grauius, veluti si quis Santonicum Absinthio imisceat, & cum aromatica qualitate aliqua, odoratum. Eligito magnum, non puluerulentum, & odoratissimum. Nascitur maritimis locis in Aegypto, vnde ad nos affertur, Alexandrinum semen, aut Zinæ semen appellatum, aliud ab hoc est Santonicum. Absinthium verò hoc marinum, aliud esse ab eo, quod Matthioli pingit, notat hoc in loco Gesnerus. Idem Cord. in Dioscor. lib. 3. c. 27. de Lumbricorum semine hæc habet. Marinum Absinth. à Seriphio insula Seriphium dictum. Pharmacopolæ eius semen habent, quod Alexandrinum semen vocant, quidā etiam Sanctum semen, quod nomen à Sanctonico deductum est. Nam hoc marino Absinthio simile est, semine tantum exiliore. Nascitur hoc in Gallia & Germaniæ quibusdam locis, & semen eius ab Italis Sandonigo, à pharmacopolis Zinæ semen, vel Semen sanctum minus appellatur: Germani vtrumque wurmsamen & wurms frant vocant. Hoc etiam in loco annotauit Gesnerus huius semen, Semen Zedoariæ quosdam vocare. Cordus verò in Historia Seriphium suū, siue Semen sanctum facit simile Absinthio vulgari, quod nullus vnquam nobis persuadebit, propter foliorum fragmenta admixta, à seminibus longè diuersa. Quale Santonicum tradat, vt ingenue fatear, hæcenus me latet.

Seriphii semine Medici, id attestante Ruellio, tuncis vermibusque necandis insidias struunt, & ob id semen contra lumbricos vocant. Gallicum vulgus Barbotinam appellat, nonnūquam quoque mortem vermium. Officinæ iis vocant appellationibus. Hæc eadem Tagaultius de simpl. purg. lib. 2. cap. 10. non nominato Ruellio tradit.

Nonnulli, vt Fuchs annotat, Santonici à Santonibus Galliæ populis, dicti semen, corrupta voce Sanctum, cum Santonicum dicendum esset, appellant. Nisi id nominis ob insignem eius efficaciam, quam in necandis lumbricis obtinet, illi impoluerint. Plura vide inter vixes, vbi Santonicum & Seriphium diuersa statuere cernitur.

Tragus lib. 1. cap. 11. de hoc ita loquitur. Tertium Absinthium Dioscorides Santonicum à Santonibus Galliæ populis, nuncupat. Estque illud Lumbricorum semen, quod Rhizotomi & Pharmacopolæ ac Agyrtæ vendere solent. Multi putarunt à facultatibus illud vocari Santonicum, quare in receptis suis [vt vulgè loquuntur] Semē sanctum nominant, quod Arabibus Schea aut Schea dicitur. In græcis exemplaribus quibusdā scribitur, quod quā absurdum sit, & vitiosum nemo non videt, cuius rei Manardus Ferrariensis lib. 4. Epist. 1. meminit.

In Italia cum non soleat prouenire Semen sanctum, mirari subit Cornarium, cur Italicum vocet.

Nonnulli (quamuis falsè) opinantur Absinthium Santonicum esse plantam ferentem semen, quod vulgè Semen sanctum, & Sementi-

*Absinth.
Seriphium
siue mar-
inum Cordi*

*Semen
sanctum.*

*Sandonigo
Italarum.*

*Semen Ze-
doariae.
Cordus.*

*Seriphium
Ruellio.*

*Nonnulli
vix error.*

*Absinth.
3. Dioscori
du Trago.*

*Schea dicitur
Arabum.*

na vocatur. Sed hoc nobis [Monachorum in Mel. dist. 6. c. 179. verba sunt] videtur impossibile: quia Absinthium Santonicum nascitur, ut Melues tradit, non longè ab Alpium montibus eiusdem nominis, vnde & nomen, Absinthii Santonicum, sibi vindicauit. Semencina autem, siue hoc Semen sanctum vulgò dictum, quod aliqui etià falsò putant Sanctum a Santonico dici, quodq; Venetis non vili venditur pretio, ut scitur, Alexandria Venetias fertur. Quapropter non potest esse Absinthii Santonici semen. Quid autem sit incomperum habemus. Pluries illud sequimus, sed nunquam potuimus natum videre. Præterea Venetis etiam venundatur aliud semen, grossius eo, pro vermibus puerorum, quod nonnulli asseruerant esse semen Santonici Absinthii: sed neque de hoc adhuc potuimus habere certitudinem, quid propriè sit. Verumque enim non potest esse. Vnde necesse est alterum ipsorum esse falsum. Et fortasse [ut coniectamur] quod neutrum eorum est, verum Absinthii Santonici semen. Item nonnulli pharmacopœ Romæ pro Semine sancto vulgò dicto, vendunt semen cuiusdam plantæ similis Alexandrinæ herbæ, quam plantam scimus in partibus Apuliæ vocari vulgariter *Morulam*. Cuius quidem semen nunquam fuit sanctum, neque beatum.

Monachis se opponit Matthiolus his verbis. Sunt, qui putent semen illud, quod officinæ sanctum cognominant, quodque saccharo circumdatum uocandis interaneorum vermibus præbet, Absinthii marini esse semen. Attamen ut fatentur rei herbariæ petiri, qui ex Gargano monte Apuliæ, semen hoc ad nos comportant, à planta quadam profertur, Absinthio nostrati paululum absumili. Ex quo facile [ut mea fert opinio] confici potest, id potiùs esse Santonici Absinthii semen, quàm Seriphii: præsertim quòd Sanctum illud nomen non aliunde quàm à Santonico deductum esse videatur. Hallucinantur qui Canabel Serapionis interpretantur, cum Canabel terra sit, &c. Idem in Epir. excusa 1571. Semen sanctum, Ital. *Semen santo*, & *Semen zina*, planta est admodum fruticosa, caulibus & ramis numerosis referta, semine minuto oblongoque, racemarium prodeunte, amariuscule gustu, odoreque non insuauis: affertur ex Alexandria Ægypti, ac aliis meridionalibus locis. In Hist. germ. lib. 3. cap. 23. Absinthium Santonicum nomine tantum cognitum est, quamuis aliqui semen Sanctum officinarum, Santonici semen esse velint. In comm. cum mag. fig. Lat. & Ital. Sunt qui putent semen illud, quod officinæ Sanctum cognominant, Absinthii marini esse semen, sed ij planè decipiuntur. Si quidem legitimam seminis huiusce plantæ integram mitti ad me Patavio Iac. Ant. Cortusus, quæ à marino Absinthio longè distat: Item paulò post: Ægyptium Seriphium primum consequutus sum à Iac. Anton. Cortuso, è quo colligi quoque semen Sanctum quidam volunt, etsi quid certi de re hac affirmem, non habeam. Quam porro inconsideratè & ignoranter de plantis sibi non visis scribat Matthiolus, præallegata satis demonstrat. Olim Semen Sanctum accersebat ex Gargano, & potiùs Absinthii Santonici volebat: postea mutatà sententià asserri dicit ex Alexandria, proposità iconè nouà, sine foliis, non indicans ubi viderit plantam: tandem & postremò fatetur plantam integrà à Cortuso missam: verum ei addit folia quæ creuerunt in eius musæo, vel potiùs accreuerunt

Tom. III.

apud pictorem, quorum non meminit in descriptione. Pro conclusione præterea dubius hæret, an Semen sanctum sit ex Ægypti Absinthio Seriphio. Profectò magna est differentia foliorum eius Absinthii Seriphii, & eorum quæ minuta reperiuntur cum Semine sancto. Nos figuram assumptimus Rauuolfii, & portionem ex planta ab eo nobis communicata appinximus. Matthioli figuræ iungimus portiones seminis sancti, siue Lumbricorum officinarum.

De Lumbricorum semine variat Dodonæus, ait enim in Historia gallica. Secunda species Absinthii vocatur Seriphium, pharmacopœis incognitum; licet soleant vendere sub nomine *Mort au vers*, quod in officinis vocatur Semen sanctum, Semen lumbricorum, & Semen contra vermes. In Hist. lat. de Florib. cap. 75. Semen Santolinæ (quæ pleisque Chamæcyparissus), officinæ Semen contra vermes & Semen sanctum appellant, quod nonnulli ignorantes ex qua planta colligatur, Santonici semine esse existimant; alii Seriphii. Vtrique aberrant. In Hist. lat. in fol. mutata priori sententia hæc ait. Ad Absinthii genus contingit & referri, vulgò Sementinam dictam, inter spuria Absinthia, vel aliò referendam. Caule hæc assurgit mox in multas alas & ramos distributo, circa quos folia minuta, copiosiora verò semina, exigua quidem illa, sed aded frequentia, ut stirps cum ramis vniuersis semine tota turgida appareat. Peregrina est stirps: semine in calidatam regionum hortis satum non infelicitè prouenit: Gallis *Barbotine*, Ital. *Semen zina*, vnde & Latinis Sementina: Semen passim Semen sanctum, & Semen contra lumbricos, à quibusdam Semen Zedoariæ. Et hæc Dodonæus, qui in Hist. gall. pro planta, quam Lumbricorum semen ferre ait, Absinthium Seriphium Belgicum exhibet magno errore. Descriptionem porro, quam nimium securus ponit in Hist. lat. in fol. Dodonæus, existimamus factam ad iconem Matthioli postremam, quod displicet nobis. Si vidisset alicubi plantam qualem describit, locum procul dubio in quo obseruauerit, annotasset.

Lobel. in Aduers. p. 337. iuste negat Gallorum Barbotine, vel Belgarum Semen Zedoariæ, Semen sanctum, vel contra vermes officinarum, aut Santolinum dictum, esse aliquod trium Absinthiorum: nam tametsi nonnulla amaritudinis & figuræ similitudo illis interfit cunctis: tamen non aded plene sunt adulea horum semina aut horridè amara. In Obs. p. 437. figuram Matthioli habet, hac inscriptione, Semen sanctum, *Barbotine* Gallorum, Ital. *Semen zina*. In Icon. Plant. hoc titulo Semen sanctum.

H. Lugd. in append. p. 36. Absinthii genus, Arabibus Scheha: Semen Zina: Mercatoribus Semen contra vermes.

Huius plantæ figuram quam proponit Rauuolfius cæteris ab aliis traditis præfert Camerarius: sed non placet eum in Epir. Matthioli, eius descriptioni subnectere Rauuolfii verba, eo non citato.

Harchio dicitur in Enchir. Absinthii tertia species, Santonicum, proferens semen illud, quod vendi solet ad occidendos vermes. Carol. Steph. de hort. ut & Gorrhæo in definit. Absinthium aliud, marinum, Seriphium dictum.

Semen, quo vulgò vtuntur aduersus lumbricos, si credere fas est Lacunæ, est Semen Absinthii & non Seriphii, ut putant aliqui, differtque etiam à Canadel Serapionis.

Z 3

Santolinæ
semin.Dodon. trè
rari dnt.Semen lumbricorum
trium Absinthiorum
nullum est

Camer. not.

H. Brunn.
1866. not.

An Hleton. Herbario apud Brūfelsium Tom.
2. Abūnthium Santronicum, Germanis wurmser/
quod adfertur Geneuā vt plurimū, vbi proue-
nit, raro aliis locis? Videant lectores an forte
loquatur Hieron. de Chamecyparisso, quod etiam
Santronicum à quibusdam dicitur, vel de Semine
contra lumbricos vulgari: nescio an Geneuæ pro-
ueniat Semen lumbricorum.

Abſinthium Santonicum plurimum eſſe in Gallia teſtatur *Bacchanellus*, & eſſe iuxta *Matthiolum*, cuius ſemen vulgò dicatur *Sementina*. *Bacchanellus* aſſecſam habet *Dorſthenium*, qui tertium *Abſinthii* genus facit, & plurimum cum illo in Gallia ultra Alpes naſci, ſeménque eius aduerſus infantium lumbricos vendi tradit. Sed conſiderandum quale ſemen venderetur tempore *Dorſthenii*, ſi id quod nunc, toto cælo aberrat, qui putet in Gallia provenire.

Tertium genus Absinthii (Veterum puta) facit & Apollo, eoque Galliam Alpius finitimam scatere refert, idque patrio nomine Santonicum vocari, Sardonium vertere Anguillarium, quod in Aldino codice pro Gallia legatur Galatia, quâ incolant Sardi, hodie Natoliam, ubi frequentissimum, uti & in Pannonia, visitur, nec ullibi in Gallia &c.

Mizaldo in Alexikepo campo 6. area 1. Absinthium alterum, Seriphium vocatur, seu marinum cuius semen Gallicum vulgus Barbotinam & Vermium mortem nuncupat. Toxites in onom. philosoph. wurmfamen / wurmfraus / Absinthium marinum, Absinthium Seriphium, Semen lumbricorum &c. Venedisf sam / Babilonisf sam. Disp. Colon. Absinthii marini semen contra lumbricos.

Adolph. Occoni Absinthii Scirphium, i. e. semē
contra lumbricos, Barbotina quibusdam, aliis
Santonicum, & Cinæ semen.

De hoc Claud. Roccardus ait. Sunt qui nomi-
nis affinitate seducti Semen sanctum, officina-
rum semen contra vermes, & vulgò Barbarine di-
ctum, Santonici semen putant, quod Seha Cora-
sceni seu Carmeni Auicennæ iemen esse Bellu-
nensis testatur &c. Quod ex Corasceno regione
Indiæ finitima non ex Gallia ad nos adfertur. Si
quoddam Ablinthium marino quodammodo si-
mile fuerit, in eius serie collocandum esse puta-
mus. Huiusque generis esse, quod semē sanctum
profert, ac Seha Auicennæ affirmat Bellunensis
interpres.

Calepinum ignarum Botanicum esse hæc li-
quidò demonstrant. *Absinthium marinum*, in-
quit, *à la mort aux vers*, Gall. *la mort aux vers*, Bar-
barine: Hoc est *Scirpium* à nonnullis appella-
tum, de quo *Plin. lib. 27. cap. 7*. Est & *Absinthium*
marinum, quod hodie *Semen lumbricorum* vo-
cant.

Quis non nisi cæcus non videat ex sequenti-
bus verbis Eucharium Rœslin licentiosè scribere
quæ non intelligit. Semen lumbricorum, ait,
wurmfraut / wurmfamen, paruum est instar fe-
rè arenæ, coloris lutei, Croci modo, habet supra
semen siliquam rubram : tunditur herba &c.

Anguill. epist. 10. Abrotonum mas, cuius semē
adfertur pro Semine sancto, quod Arabes Semē
lumbricorum, & Auicenna Secha vocant.

An nomina hæc (welsamen/wurmsamen/Ab-
sinthium Seriphium, Santonicum) vni plantæ
conueniāt, vt sentire videtur Wirkung. iudicent
periti.

Tabern. Icon. & Hist. Sementina, Santonicū,

wormsamenfräut. Cür plantæ sibi non visæ ap-
pingit radices repentes?

C. Bauhin. Phyt. Absinthium 19. siue Seriphid Alexandrinum, Semen sanctum Matthiolo & Lobelio. Item Absinthium 20. siue peregrinum, unde semen lumbricorum colligitur, Scena a rabum Rauuolffi: vidimus apud fratrem Io. Bauhinum: an diuersum à superiore dubito:

Habes studiose Lector de Lumbricorum semine diuersas diuersorum authorum opiniones. Alii enim Absinthium alterum, Scirpium & marinum vocatum proponunt, pro planta Lumbricorum semine. Alii Absinthium Santonicū obtrudunt : alii ipsum Absinthium vt Lacuna. Aliud Absinthium tradit Matthioli, uti dictum. Pena addit Semen contra vermes officinarum etiam Absinthiorum nullum videri. Et huius sententia maxime nobis arridet.

De loco latis dictum; qui hodie nondum planè cognitus. Aliquoties seu semen lumbricorum Montbelgardi in horto Ill.E.C.& aliis locis, sed non mihi provenit, ita vt Lobelium vagum & inane in iactatorem dixerim.

Oblinitur passim faccharo à Pharmacopœis, daturque vtiliter infantibus & pueris ad intesti-
norum vermes. Sementinæ semen amarum ad-
modum esse scripsit Dodonæus, calidum & siccū
ea de causa facultate. Aduersus lumbricos, & in-
terantium vermes quoquo modo sumptum vti-
le. Vtilius verò futurum, si Rhabarbari nō nihil ei
addatur: ita enim non modò vermes interfici,
sed & per alium mortuos expelli. Nos hoc Do-
donæi consilium multū probamus, ac eo mo-
do feliciter soliti sumus exhibere à quadraginta
penè annis, non lecto eius consilio. Et sanè fi-
eri hoc omnino expedit.

ABSINTHIUM ÆGYPTIVM QVIBVSDAM.

САР. LXXII.



Folia ferè
palmaria, Descriptio
quæ sicca (ex
sicca describimus) aliquid
simile habent
cum Trichomanes, vel Scolopendrio &
Chamaecyparisso, in quibusdam iuxta
longum pediculum sunt
veluti foliola
mutuò se contingentia, cū
sinibris nonnihil serratis,
reflexis. Alia
autem folia
ex longiori

Absinthium Seriphium, -inquit Matthioli
in Epitom. Ital. Assenza Serphis, d'Egitto: pu-
mila

illa est planta, in Aegypto proveniens, foliis minutis Abrotoni feminae ferè similibus: surculis compluribus, gracilibus, brevibus ac foliosis; minuto semine, gustu amaro: non tamen vehementer aliis omnibus prædum est facultatibus, quibus & Italicum. Hæc Matthioli.

Claud. Roccardo autore Absinthium hoc, quod ex Aegypto translatus esse volunt, Polytrici folio ex Absinthiorum numero reiciendum esse, doctissimorum Herbariorum maius pars cenet.

Alfimb. Aegypt. Lob. Aliud peregrinum, siue Aegyptium, Polytrici formæ, foliis albis, alterno ita digestis, digitum altis, apud Gesnerum iamdiu, & post penes Valerandum Doures sicum viderantur [aiunt Lob. & Pena in Aduers.] infirmâ aut certe nullâ coniectura Aegypti cognomine inscriptum, & à quodam Herbario missum, qui ex hoc Semen sanctum produci donicetabat. Pingitur in Obs. p. 41. in Icon. Plant. p. 756. eodem titulo, quo in Aduersariis vltus est Lobelius.

C. S. m. Dodonæus lat. in fol. ponit figuram sine descriptione: dicit tamen Absinthium Aegyptium in Africa & Aegypto odore Seriphio potentius esse. Tabern. Icon. & Hist. v. Dodonæus, vocat Absinthium Aegyptium, Egyptischen wermut. C. Bauh. phyt. Absinthium duodecimum, siue Capilli Veneris folio. Quomodo autem propriè & absolute, possit dici Capilli Veneris folio, non videmus, quia Capillus veneris vulgò dictus, siue Adiantum verum, multum differt.

Marth. re. prob. H. Lugd. p. 49. Absinthium Seriphium Aegyptium Matthioli. Frustra Matthioli adductus ut crediderit [Epist. lib. 5. ad Cortusum] Absinthium hoc Seriphium, quod Alexandria Aegypti allatum esse scribitur, esse Seriphium genuinum Dioscoridis. Hanc autem perceptam opinionem, ut facilius sibi eripere non permitteret, Seriphii caput apud Dioscoridem pluribus in locis deprauatum esse scribit, quod vanum est.

ORIGANI FACIE CORIMBI.

CAP. LXXIII.

Tragorigani nomine misit plantæ cuiusdam cacumina D. Rauvolfius, quæ nonnihil similia Maro Syriaco, siue Origano Oniti Matthioli, candida admodum, parua, hirsuta: quorum capitula squamulis oblongis, in modum capitulorum Thymi Cretici dispositis, compacta, odore graui, sapore amaro, feruido, ad saporem Seminis contra accedente, ad eum ut de Seriphio aliquo suspicionem possit inficere. Eius figuram iunximus cum Absinthio Aegypto quondam.

ABSINTHIUM VMBELLIFERUM, Mutellina quibusdam.

CAP. LXXIV.

Descriptio **M**utellina nomine inter siccas nostras plantas Absinthii genus inuenimus, radice nitida crassa, perenni, ut videtur, caules emittente plures, palmates, & paulò maiores, per quos ut & in ipsorum fastigiis corymbi conspiciuntur, rariores, satis magni, & ni fallimur, lutei:

folia tenuia, Absinthii Seriphii diuisura, candidissima, hirsuta: sapore amaro, ingrato.

Hæc planta nobis communicata est, cura inscriptione harum nominum Gallieorum, Mure-

line blanche, Mure-
be de l'apostume:
videndum an sequentes
scriptores huius
stirpis meminertint,
sub sequentibus
nominibus.

Lobel. Obs.
p. 433. Absinthium
umbelliferum
alterum Italicum,
Ital. Assen-
zo ombellifero
nondum licet
proditum: quippe
non frequens
obuium, vel minus
notum: ortu colore
incano, & habitu ipso
non ita di-

uersum ab absinthio, albo, sed omnia exiliora multò, cauliculos plures spithameos emittit, sursum flosculos in glomeratis capitulis incanis gerens. Itali stirpem exploratores, à quibus studiose alitur, umbelliferum Absinthium dixerunt: folia amara Absinthium Ponticum Tridentinum (Absinth. tenuifolium album) non multum magnitudine superant.

Camer. hort. Absinthium paruum & incanum, Gesnero humile [nos hoc ad aliud referimus] In hortum à me translatus ex montibus Tyrolensibus, ubi copiosè crescens repertus, sed non diu culturam fert, nisi sepius transplantetur. Item apud Marthiolum germ. lib. 3. cap. 23. Absinthium paruum Clusio pumilum dictum, in Tyrolensium montibus, pulchrum, delicatulum, non facile ferens culturam.

Clus. Pannon. p. 554. & Histor. post. Pumilum Absinthii genus, viz palmi altitudinem superant, tenuibus admodum cauliculis, quos circa radicem multa exigua, multifida tamen & incana, ambiunt foliola, non iniucundi odoris. Id in summis cauliculis quaterna aut quina fert capitula in pallescentes flosculos sese explicantia. Norimbergæ alebat in fictibus C. V. Camera-rius.

C. B. phyt. Absinthii noni, siue montani umbelliferi, alterum Italicum, à montano umbellifero non multum diuersum, sed multò exilius.

ABSINTHIUM ALBIS FLORIBUS capitulis squarrois.

CAP. LXXV.

Plantula est semuncialis & dodrantalis, & media magnitudinis: caule incano, albo, per quem folia vncialia aut fescuncialia & ampliora, latiuscula, incano tomento obducta, in lacinias Absinthii vulgaris in morem diuisa, profundè lacinata, minora tamen multò, semunciam lata, unciam vnâ aut tres longa sapore amaricante: ex radice statim oriuntur alia per cauliculum.

Alfimb. paruum Camer.

Descriptio

in culis summo flores in umbellæ formam digesti, pulchri, magni, septem, vel octo, pediculis mediocribus hærentes, radiatis albis foliis constantes, Herbarum de la rocca aut Millefolii Alpini, vel etiam Tanacetii albi similibus, discum occupantibus multis apicibus, subnixa autem sunt capitulis squarrosis, lineis nigris variantibus: radix crassa, perennis esse videtur, cui radiculæ longæ, tenues, ac etiam capillares adnatae.



Eandem cum Clusio figuram exhibet Lobelius in Obs. p. 435. cum hac inscriptione. Absinthium album [ita quoque in Icon. Plant. pag. 753.] capitulis squarrosis, floribus albis, umbellâ Achilleæ montanæ, ac ait. Rarius multò hoc Absinthii genus in Belgio, Gallia, Anglia, & Italia, nullum memoratum Scriptori: vni C. Clusio agnitum, & D.

Dillio Viennâ Austriæ transmissum: folio Caryophylli diuisurâ, Arthemisiæ marinæ concolori, in cauliculo dodrantali: flos albus, Parthenii, in umbellis tenuis foliis: substringit, nonnihil amaricat.

Absinth. Pannon. flore albo Camer.

Agnouit hoc & Camer. de hort. dicens. Absinthium Pannonicum flore albo. Elegans planta quasi mediam naturam obtinens, inter Absinthium & Masticariam. Non lubenter hortum mansuecit, sicut nec aliæ alpinæ: quare collocandæ in loco umbrato, atamen aëri exposito, cum Solem minimè ferant. Astutus (vel potius ingratus) Camerarius est: In Epitomen, Clusii verba redigit, immutat, ac pro suis venditat.

Absinth. al. baum Tab.

Tabern. Ic. & Hist. Absinthium album weyscher wermut: Absinthium umbelliferum, Eronen wermut: Heluetic vocant Herbam albam, Gesnero teste, ea abundat in Valesia ab urbem Sedunum locis cliuosis, soli expositis. Sed quidquid statuatur Tabern. Herba alba Gesneri multum differt ab hoc Absinthio albis floribus, squarrosis capitulis, quod icona sua exprimit Tabern. Herbam albam Gesneri exhibemus pro Absinthio Valesiano inter præcedentia.

Absinth. mont. umbelliferum C. Bauh.

C. Bauhin. Phyt. Absinthium 9. siue montanum umbelliferum.

Hist. Lugd. pag. 946. Absinth. album capitulis scabris Lobelii.

Locus.


A plurimus annis habemus inter nostras plantas siccas: præterea frater C. Bauh. attulit nobis à D. Bechio sibi datas plures stirpes, qui eas collegerat in monte Baldo.

ABSINTHIUM MONTANUM FLORE

Chamæmeli.

CAP. LXXVI.

Eradice lignosâ, parua, nigra, fibrosâ, incana, lanuginosâ, tenuia emittit folia, incisuris pro-



fundis diuisa, media inter maritimum Absinthium & abrotonum marem in orbem disposita: Vere caules edit plures, lupinos, paucis in imo foliis hærentibus, æstate flores singulos, singulis caulibus in summo hærentes, Abrotoni femine modo, sed similes Chamæmelo potius, foliolis quidæ albis lutei um-

bones circūdantur. Sapore & gustu, atque odore Absinthium vulgare Ponticum refert hæc planta, ac idcirco potius Absinthii nomen indidit Columella quàm abrotoni femine, cui similior videtur, præsertim flore, qui longè ab Absinthii floribus abest.

C. B. Phyt. Absinth. 9. siue montanum Chamæmeli flore, atque medix esse naturæ inter Absinthium & abrotonum marem.

In excelso monte D. M. Virginis appellato noua & elegans, rarâque Absinthii huius species oritur, atque non nisi rimis saxorum sterilibus, ex quibus fruticat, exit.

ARTEMISIA

CAP. LXXVII.

Artemisia vulgaris.



Perennis fruticosa herba ex radice digitali, serpente, plurimis fibris capillata, lignosa, sapore subdulci & aromatico: canes surgunt duos, aut tres cubitos alti, fractu contumaces, canaliculati, subhirsuti, colore rubesciente plurimum, rarius cano aut viridi, alis multis, concavi: folia suaueolentia, sapore dulci-uscule & sub-

acti, alternatim caulibus & ramis adherent, inferius incana, superius viridantia, in acutiora segmenta, quàm Absinthii vulgaris, diuisa, ita ut summa sint veluti digitata: corymbi odorati, ad spicem vel Lauendulæ odorem quadantenus accedentes,

res incans, villosi, fibrillas luteas ostendant. Et hæc descriptio est Artemisiz vulgaris.

Tabern. Icon. & Hist. Artemisia rubra, Rotter Bessius. Item, Artemisia alba, weisser Bessius: differunt tantum colore caulium, vni albo, alteri purpureo [Braut.] Artemisiz volunt dictam ab Artemisia regina, vxore Mausoli, quæ multos hac herbâ curauit: alii ab Artemide venatrice, alias Diana. Appellatur aliàs à Græcis Ἀρtemisia ῥαβδωδής, i. est Artemisia latifolia, ad distinctionem cæterarum; Dioscoride & Apuleio ῥαβδωδής, ἰριώδης, ὀξύς (quali salutaris) ἁλὴ, λουκάρυξ ἁλὴ, ἀνθράκω, βαλάνω, λάχανο, χαστάδι, χαλάρυξ, λυθὸς, ἔλβε, ζεδιανθίωνες, ῥόνη ἡσάνου, τριβύλλω, αἰματζουπίτης, & ἡσθίς, vt testatur Plinius lib. 25. cap. 7. Dicitur à Latinis Canaparià à caulibus lignosis, cannabinis similibus, & Olus regium, & Herba regia à regina Artemisia. Similiter Rapium, ab Apuleio Siriu n. à Pythagora Perasis, Dioscoride & Apuleio Valentia & Valentina, à virtutibus & facultatibus quibus valet. Marcellus Empyricus scribit suo tempore à Gallis fuisse Bricumum appellatam: à

Mattheo Syluatico. Pandectarū autore Ierania & Ierania, potissimum autē radix eius. Vocatur aliàs etiā eodē referente, Bemakrum, Amaranthum, Amanina, & vulgo ab Herbariis Armolia, Valachus Quoste / Ziuoste & Syred: Arabibus Belengelit, Molular & Molulari: Haliabbate Bereniatum, Bereniascon & Beruemale cum Herbaris teste Aruchi Monasteri Chaladugub. Italis Artemisia, Venetianis Herba della madonna: Hisp. Artemisia & Alcanusa, Gallis de l'Arm. si, l'Herbe de Saint Iehan, & Armasse: Nuncupatur aliàs quoque ab Herbariis Mater herbarum, à Vegetio Dianaria, dubio procul à Diana: Polonis Bilitza / Bohemis Zernobyl / Zernobyl: Hungaris Jescs & Jrdm [h. e. nigrum absinthium] Aegyptiis Aneset & Neset: Belgis Byron & Sint Jans cruyt. Anglis Muggwort. Germani nominant Bessius / Buchen / Buchelen / S. Johans gurrel [Cingulum D. Iohannis] Sonnenwend gurrel & humelfher. Hæcenus de nominibus & Synonymis linguarum ex Tabernamontano, qui frustra ponit duas figuras Artemisiz vulgaris, cum colore caulium duntaxat, vt ipse refert, differant. Solo autem colore differre approbat Fuch. & ante eum Cordus, & Gesnerus.

Gerardus icones habet Tabernamontani (quæ non tanquam figurâ differentes, sed suo more propter colorem diuersum propoluit ac ratione iconum ita distinguit. Artemisia (latifolia) Mater herbarum, Common Muggwort. Item: Artemisia tenuifolia, Thnue Leofed Muggwort.

Lonicerus Artemisiam cum Absinthio & Abrotono comparat, eamque caulium coloris gratia in descriptione in rubram & albam distrahit, licet hanc pro tenuifolia, illam pro latifolia pingere videatur. Duas habet figuras malas, nō multum discrepantes: vna bona sufficeret.

C. Bauh. phyt. Artemisia 1. siue vulgaris maior. Item Artemisia 2. siue vulgaris minor. Non placet, Fratrem separare plantas sola quantitate differentes. Apud Matth. non fecit. Eam etiam, quam Artemisiam tertiam, siue montanam, facit, nempe Leptophyllum montanam Lugdunensis Hist. nondum sciungimus.

H. Lugd. p. 950 Artemisia prima, vulgaris. Item Artemisia Leptophyllum montana. Cuius nec figura placet, nec descriptio.

Tom. III.

Tragus qui vnicâ figura contentus [quam Artemisiam absolute inscribit] ait. Apud nos Germanos nulla ferè Artemisiz omnis differentia constituitur, nisi quod alia purpureo [Rotbuden scriptum habetur in margine] alia verò viridi ac subpalescente (weissbuden) caule sit. In reliquis, forma sc. odore & sapore similes videntur. Reliqua [à Tabern. omissa intelligi hinc nos volumus:] Artemisiz apud Dioscoridem nomina, hæc sunt. Anactarios, Chrysanthemum, Serpillum, Terrana, & Gallis Pona. Artemisiz nomen primum, ab Artemide, h. e. Diana impositum quidam credere reclamantibus ac affirmantibus hanc nomenclationem ab Artemisia Halicarnassi regina ortâ esse, cum prius Parthenis hoc est Virginalis Hædtraut Germanis vocaretur. Sed parum refert vnde nomen traxerit Artemisia, modò illa nobis cognita sit. Sunt qui illam Matricariam, h. e. Germ. Mutterkraut / appellaram velint, astringentes apud Hispanos altoliam seu altimiliam nuncupari. De altilia Neoterici varias habent opiniones, alii Rob, seu Sapam eam interpretantibus, alii Abrotonum siluestre esse dictitantibus. Verū à Arabs auicenna, Can. in Ther. Eldra licem dirimit, dum scribit, succum altiliz esse Albelengelit, & Abrotonum siluestre vocari. Atque hæc est quorundam Mater herbarum, seu Artemisia. Neoterici tres ponunt Artemisias, Monoclonon sc. quam Matrem herbarum nominant, deinde Tanacetum secundo loco collocant, tertio quæ dicitur ἀρtemisia λεπτοφύλλω. Huic sententiæ subscribit Apuleius quoque. Hæc ille qui Dioscoridis caput de Artemisia tenuifolia superfluum est. ait.

Prima duo Artemisiz genera [Dioscoridis] Hetruseis frequentissima sunt, neque in alio inter se distant, quam quòd in maiori omnes partes maiores spectentur, in minori verò minores: aliàs facie, & formâ similia constant, quinetiam idem sapor, & odor, eademque facultas vtrique inest. Quare equidem nescio, inquit Matth.) quæ ratione ductus Brassanolus pro certò crediderit, eam herbam minorem esse Artemisiam, quæ in Hetruria officinis Matricaria & vulgò mulieribus amarella vocatur. Sed eò magis virum hunc alioqui celebrem admirari subit, quòd tradiderit duas alias esse Ferrariæ Artemisiz species nullis prius notis distinctas præterquam quòd alteri vnus tantum sit ramus, alteri verò plures. Vide plura antè, vbi Ruellium, Monachos, & Fuchium notat.

Veram Artemisiam patum hodie esse notam, author est Turn. part. 1. p. 61. ac vulgarem quæ habetur nec Galeni, nec Dioscoridis, nec Plinii esse Artemisiam. Addens: Matthiolus, qui multos & quidem nominatim, acerbè taxat [quosdam autem merito] erroris de Artemisia, erat ipse, cum vulgarem pro vera exhibet, quæ nec natalibus, nec gradu coloris, nec formâ cum Dioscoridæ conuenit. Ait primas Artemisiz species ambas inueniri in Hetruria, easque nihil differre neque formâ, sapore, odore, neque facultatibus, exceptâ solâ magnitudine. Quod si verum est, altera species, non erit illa, quam Dioscorides describit: differt enim minor species à maiore flore sterido. Vtrum hic erret ille nec ne, iudicent alii. Ait primas duas species in Hetruria nasci, tanquam sibi notas: sed nec eas describit, nec vulgaria nomina recenset, nec denique natales, quod in aliis facit plantis. Quam ob rem & propterea, quòd

A 2

verum Ponticum Absinthium non nouit grauitérque in eo errat : verisimile est, illum neutram prunam Artemisiz speciem nouisse, ac æquè in Artemisiis errare, ac Plinius, Mufa, Fuchsius, Monachusque in his & aliis. Quod si vel Mufa ita nos docuisset, probè mihi nota est hæc planta, Ferratiz nascitur : vel Fuchsius, hanc noui, ac in Germania vidi : neque nomina Italica, Germanica, Herbariorum & Officinarum docuissent, multas potuissent effugere reprehensiones, quas nuper tulerunt, & quidem à Matthiolo, qui in postrema acie cunctans, in multis describendis plantis, quemadmodum & hic, effigium querit, tacitis & præteritis nominibus vulgaribus, natalibus, descriptione, & facultatibus, ne si in aliquo eorum errasset, conuictus deprehenderetur, quo ipse modo alios excipit. Ex *Turro* plura post ubi de *Amasi* opinione.

Cæterùm, Artemisiz nomine, quam colore
 Synonyma caulis & floris variare constat, aliqui inutiliter
 duas figuras proponunt, uti satis dictum. Nominatur Artemisia Gesnero (is diuidit in hort. in candidam & rubicundam; in cat. in Monoclonon & Polyclonon) Kybero, Cordo, Apollini, Rob. Stephano, Brunfels. Ræssino, Golio in Ono. Ruell. Fuchsi. [cui de comp. med. Artemisia fruticosa, Artemisia in offic.] Manlio in Lum. maiori, Goropio, Gualt. Ryffio, Had. Iunio, Wincklero (qui in chronica in Augusto de herb. albam & rubram vocat, ac in Augusto de florib. tres facit: quid autem velit, ipse videto.) Brasauolo, Fauardo, VVirfungio, Camer. hort. Anguill. Trago, Lob. in Aduers. (vbi in quibusdâ locis inauspicatæ telluris, adeò strigolam fieri tradit, ut alia profus putetur,) in Obs. p. 441. in Icon. Plant. pag. 764. [vbi & Mater herbarum,] Gottrao (qui duo genera facit Monoclonon & Polyclonon:) Car. Stephano, Corn. Lacunæ, Bapt. Fieræ, Monach. in Mef. (qui dicunt secundum rei veritatem esse triplicem, videlicet vulgò Canapariam, Matticariam, & Tanacetum.) Hier. Herbario, Agricola, Mizaldo, Reform. VVorm. Toxite [apud quem legitur etiam Arithemisia menodos: item Artimilia,] De Vigo, Pandect. Marchio [qui maiorem & minorem facit:] Castori (cui & Mater herbarum) March. & Tabernomontano. Dod. gall. Artemisia cõmunis, *ἄρτεμις κοινὴ*, quam quartam speciem ait Dioscoridis & tertiam Apulei. Lat. in fol. Artemisia latioris folii. Artemisia vulgaris Turn. Casalp. Thallio & Clusio. Amato Artemisia maior, Artemisia latifolia hortensis, apud quem malè ponitur eius loco Matticaria. Schuvenckf. Artemisia candida, *ἄρτεμις λευκή*, *ἄρτεμις παλαιά* Dioscor. Artemisia fœmina, Artemisia latioris folii Dodonæo. Item Artemisia vulgaris rubra, Artemisia mas. Nemo quod ego equidem sciam, ita distinguit, ut Schuvenckfeldius. Regino Artemisia *ἄρτεμις*, Artemisia, vulgò Cermisia.

Locus Quasunque regiones pergrauerim [ut cum Clusio loquar] nulla fuit in qua Artemisiam hæc vulgarem cùm candidiorem, tum subpurpurascensem, & vniuersè, ut puto, Europæ familiarem, crescentem non viderim.

ARTEMISIA VETERIBVS IN GENERE. CAP. LXXVIII.

Genera
 Duse.

Genera tria Artemisiz Dioscorides proponere videretur, nisi concludendo, utrâq; calfa-

cere diceret: verùm in quibusdâ codicibus Græcis, ut Goupili, Assulani, Cornarii (qui tamen in Latino omisit, sequitur & aliud caput de Artemisia, quod spurium videtur, quare Ruellius in sua interpretatione omisit: Marcell. Virgilius, ut ascitium damnavit: Cornarius ut supposititium, ex textu latino amouit: nec immerito [ut placet C. Bauhino] cùm nec apud Galenum, Oribasium, Paulum, Aetium: nec apud Serapionem de tertia specie quicquam legatur, cùm tamen hi omnes ex Dioscoride simplicia enumerare soleant. Verba eorum adscribamus.

Artemisia (infr. Diosc.) in maritimis plerumque nascitur, herba fruticosa; Absinthii similitudine, nisi quod est maioribus, pinguioribusque foliis: quanquam est quædam lætior, habitiorque; foliis virgultisque latioribus, altera verò tenuioribus. Flores sunt parui, tenues, candidi, & graucolentes. Aestate autem florēt. *Sunt* qui in Mediterraneis Artemisiam monoclonon appellant, herbulam gracili surculo, simplici caule donatam, valdè pusillam, attamen floribus referam tenuibus, & ad fuluum colorem accedentibus. Hæc quàm præcedens iucundiorē afflat odorem. Vtraque exalfacit & attenuat. Feruescit insidentibus fœminis profunt ad extrahendos menses, partus, secundasque, itémque ad vuluæ præclusionem & inflammationem. Valent etiamnum ad comminuendos calculos, remorantemque vrinam eliciendam. Quin etiam herba ipsa copiosior imo ventri imposita menses ciet. Succus ex eadem expressus: cum myrrha subactus, vuluæque subditus, eadem quæ infusus ex utero trahit. Sed & coma eorundem educendorum gratia ternis drachmis propinatur. *Abstrahitur* & Artemisia tenuifolia, quæ circa riuiolos ac sepes & in agris frumentariis nascitur. Huius flores & folia, si contriueris, Sampsuchi odorem expirant. Si quis igitur herbam eam tusam & cum oleo amygdalino bene subactam, more malagmatis, dolenti stomacho imposuerit, sanabitur. Quod si quis etiam neruorum dolore tentetur, eius contrita succo expresso & mixto cum oleo rosaceo, si eum perunxeris, curabitur. Et hoc Dioscoridis caput de Artemisia tenuifolia in aliquibus codicibus desideratur, & propterea à quibusdam ad notha transfertur, vbi hæc omnia leguntur. Artemisiam seu Polyclonon, à multiplicibus ramulis sic dictam, seu Monoclonon, à singulari rapulo, quidam Toxotin, alii Ephesian, alii Andorion, alii Sozusan, quasi salutarem, alii Læuem, alii Leucopin, à floris in ambitu colore, vel Lycophryn, quasi Lupi supercilium, Prophete Hominis sanguinem, alii Chrysanthemon vocant, Romani Valentianam ab efficacia, alii Serpillum maius, vel Herbam regiam, alii Rapium, alii Traganthien, alii Artemisiam, Galli Ponem, Daci Zuosten. Pro Toxoti [*τοξότης*, seu *τοξότης*, seu *τοξότης*, à iuuando partu, legendum suspicatur Sarracenus.

Plinius vbi de herbarum inuentoribus agit, inquit: mulieres quoque hanc gloriam affectauere in quibus Artemisia vxor Mausoli, a doptatâ herbâ, quæ antea Parthenis vocabatur. Sunt qui ab Arthemide Ithiya cognominatam putent, quoniam priuatiim medeatur fœminarum malis. Est autem Absinthii modo fruticosa, maioribus foliis pinguiusque. Ipsi duo genera. Altera [Altior CH.] latioribus foliis, altera tenuioribus, & non nisi in maritimis nascens. Sunt qui in Mediterraneis eodem nomine appellant, simplici caule, minutis foliis, floris copiosi.

Locus

Artemisia
 tenuifolia

Artemisia
 appellata
 her marta.
 Polyclonon,
 Monoclonon.
 Sozusan.
 Leucopin.
 Lycophryn.
 Valentianam.

Toxoti

plios, erumpentis, cum vna maritescit, odore nō inuicundo, quā quidā Bortyn[Bortynon CH.] Iulii Ambrosiam vocant. Talis in Cappadocia nascitur. In his autem Plinius cum Dioscoride consentit, nisi quod Artemisiam monoclonon Dioscoridi dictam cum Ambrosia confundit. Idem vsum eius medicum sparsim sic tradit. Artemisiam quoque secum habentibus negant nocere mala medicamenta bestiamue vllam, ne Solem quidem. Bibitur & hæc ex vino aduersus opium. Alligata priuatim potens traditur, potæue aduersus ranas. Strumis Artemisia operitur folio suo imposita. Eadem sinistra manu circumfossa adalligatur, custodienda sanatis, ne rursus fata ditto herbariorum scelere rebellet. Bellin cum hæc illitam, efficaciorē esse produnt.

Datur quoque contra calculos ex vino dulci, & ad stranguriam. Artemisiam & Elelisphacum alligatas qui habeat viator, negatur lassitudinem sentire. Artemisia vuluæ medetur trita, ex oleo scrino, aut cum Fico, aut cum myrrha apposita. Eiusdem radix pota in tantum purgat, vt partus enectos extrahat. Menses & secundas ciet ramorum decoctum insidentibus: item folia pota. Ad eadem omnia profunt etiā imposita ventri imo cum farina hordeacea.

Artemisia vtrāq; inquit Galenus, & modicē deficcatur, & est, quod ad calfactionē attinet, excessus secundi, quod verō ad resiccationē, aut primi intensi, aut secundi remissi. Est autem & modicē tenuium partium. Itaque ad renum calculos mediocriter commoda, & ad fatus vteri. Si secundæ statim à partu non exierint, omnibus præstare nouit Hippocrates herbam Artemisiam. Idem præterea quod Mercurialem præstare (videlicet tenuem biliosam purgationem educere in pello suppositam) & efficacius purgare.

Ad declarationem iam dictorum non parum iuuant, quæ Marcellus Virgilius olim præclarè scripsit. Certarunt, ait, pro Artemisia quondam tota Græcia & Asia, Gentes aliquot: nec aliter minorē studio, quā pro Athenis felici quondam, ingeniorum & doctinarum genitrice, cimitate, Pelagi arbitri Neptunus & mille optatum Dea Pallas fecerant, in vulgaris herbæ nomine gloriam affectauerunt: Contendentibus Caribus Halicarnassoque præsertim reginæ suæ adoptione notam gentibus Artemisiam esse. Quæ non contenta Mausoli coniugis sui fortunā & regno, quod ante se reges aliqui fecerant, glorioso adoptionis genere, in nomen & gloriam suam olus hoc traxerit, vt esset in Medicæ materiæ historia, etiam post diruta in vacuo aere pendencia Mausolea: & quæ victrix Rhodi trophæa mulier erexerat, diurnus & naturæ æqueum nomini sui in æterno olere monumentum. Contra verò nitentibus totā Græciā gentibus. Quæ aut mulieris gloriæ imidentes: aut, quod verō similis est, piā religionē salutis suæ numini gratias habentes: Non à regina Halicarnassi Artemisia: sed à Diana, quæ Græcis Artemis dicebatur, factum herbæ nomen testabantur. Salutaris parrurientibus Dea illa esse credebatur, ideoque quotidianis precibus & multo religionis ritu prægnantes & puerperæ nomen eius colebant, vt sine interiorum locorum noxa liceret, illis quem in vtero gererent, foetum excludere: & quemadmodum idem eius Deæ beneficio præstaret hoc olus, æquā numinis potestate parem illi nominis honorem etiam fecerunt: Quod enim Artemis Dea votis & precibus vocata tunc poterat. Idem

Tom. III.

adhuc herba Artemisia potest: menses, secundas, foetusque trahens, & præter hæc eiusdem partis præclusionibus, inflammationibusque vtilis. Ob quas vires in multo nominum ambitu & honore fuit. *Parrhenis*, i.e. Virginalis primò dicta, quod virgo, Dea se nomen illi dederit. Mox *ῥαδίαση λαχων*: regium olus. Tum ex eadem causa *Anactonium*: *Anactas* enim reges Græci vocant. Ephesia à regione dicta eadem est. Quemadmodum à præsentī remedio & ope Sozula salutaris. Romani regiam herbam Græcorum exemplo: & si recipiendum id sit à similitudine *Serpillum* maius dixerunt. Et hæc antiquioribus *artemisia* nomenclatura fuit. Ex posterioribus alii in *Cannabis* genere Artemisiam numerarunt. Congenerem illi facientes & eodem illi nomine eam indicantes. Alii *Matricariam* notum omnibus olus esse Artemisiam testati sunt. Quod non aliunde, vt credimus, quā ex duplici eius genere factum est. Quæ enim à Dioscoride *Monoclonos*, à Plinio autem simplicis caulis nominatur: non dissimili penitis figura: præsertimque ob singularem quem profert caulem, à *Cannabe* describitur. Quæ contra *Abinthii* modo fruticosa ab hoc & ab aliis traditur, facili ob quas habet vires ad nostri orbis & nostræ ætatis *Matricariam* transferri potuit: quod etsi Græcorum de Artemisia historiæ omnino non respondeat, nec certo aliquo auctore confirmari possit, non reiiciendū tamen penitus est. Egregia enim in Muliebribus (dico autem nunc muliebria, quæ Græci *γυναικία* vocant) Artemisias vis est: credendumque non aliunde quā à matricibus posteriori *Matricariæ* nomō fecisse posteriores: per matrices enim nunc passim Medicina vuluas & muliebres locos intelligit.

Idem de Artemisia tenuifolia addit. Desideratur, sed sine iactura aliqua, in vetustis Græcorum Latinorumque codicibus hoc caput, accreuisseque Dioscoridi inuoluntè multa indicant: Phralis primū sermonisque forma, quæ in Græcis à Scriptoris huius indole longè absunt: mox nullā eorum, quæ in eo iubentur necessitate. Satis enim ad constituendum vtrumque Artemisias genus fuerant, quæ de priori longius dixerat, præsertim cum moneret esse alteram Artemisiam speciosiorē, latioribusque foliis, & alteram tenuioribus: mox in Medicina vtrāque calefacere, extenuare &c. Quib' tam apertè à se decretis non oportebat addere: quæ certi, & vt quotidie solent Medici, remediū institutionem potius quā historiæ & vniuersarum vitium rationem haberent. Nec si quis Plinium de iisdem docentem contempletur, aliter censebit. Nobis tanti est antiquissimorū eodcum fides, præsertim accedentibus coniecturis aliis, vt non vereamur liberè eorum de Artemisia tenuifolia caput damnare, & ex aliorum ordine in ordinem reducere.

Tria inquit Matthiolus, à Dioscoride recensentur genera. Vt priora nullis inter se notis certant, nisi quod in vniuersum altera maior est, altera minor. Id quod etiā confirmat Plinius l. 25. cap. 7. Qui tamen in prioribus Artemisias generibus, nihil à Dioscoride dissentiat, dissidet tamen, & errat in tertio, quod in eius locum Ambrosiam sequenti capite ab ipso Dioscoride descriptam subiecerit, credideritque deceptus hic Ambrosiam, & tertium Artemisias genus, vnam & eandem esse plantam. Ceterum prima duo Ar-

At 2

Quantum potest Dea: tantum valeat herba.

Regiam olus.

Anactaria.

Serpilla.

Serpillum maius.

Cannabis Matricaria.

Artemisia duplex generis.

Artemisia tenuifolia caput Dioscoridi inuenitur.

Plinius l. 25. p. 7.

Tertium
Artemisia
genus an
asititum?

temisæ genera Hetruscis frequentissima sunt. Quare equidem nescio, qua ratione ductus Brasanolus pro certo crediderit, eam herbam minorem esse Artemisiam quæ in Hetruria officinis Matricaria, & vulgò mulieribus Amarella vocatur. Sed eò magis virum hunc aliqui celebrem admirari subit, quod scriptis tradiderit duas alias esse Fertariæ Artemisiz species, nullis prorsus notis distinctas, præterquam quod alteri vnus tantum sit ramus, alteri verò plures &c. de quibus antè ex Turnero. Ceterum (addit idem Matthiol.) credere nonnulli tertium Artemisiz genus in Dioscoride asititum esse: Quod in huius capitis initio non tria, sed duo tantum esse Artemisiz genera scribit Dioscorides: Quod præterea reperiantur huius auctoris codices antiquissimi, in quibus illa de tertio Artemisiz genere non leguntur. Sed nihil mirum videri debet, si in eius historia excurrit Plinius. Neque item mirandum est, si eius non meminerunt Galenus & Paulus. Non desunt insuper, qui Artemisiz tenuifoliz caput Dioscoridi accereuisse, atque adulterinum esse censent, hoc ducti argumento, quod cum priore capite de omni Artemisiz genere differuisset Dioscorides, absurdum quippe esset, quod seorsum Artemisiz genus aliud subiungeret. Addunt etiam quod huius Artemisiz inter simplicia nusquam meminerint Paulus, Oribasius & Serapio, qui tamen illa ex Dioscoride transcribunt. Horum sententiam etsi planè probandam existimem: cum tamen vulgati Græci codices hoc loco Artemisiz tenuifoliz caput habeant, illudque a quibusdam reddatur, nobis quoque adiciendum, cuiusque aliquà saltem mentionem faciendam, duxi: præsertim quod non desint, qui id Artemisiz genus inueniri tradunt. Siquidem Ruellius est autor, ipsu in Gallia nasci circa riuulos, aggeresq; item in frumentaceis agris, atque inibi vulgò D. Ioannis nominari. Verum eò in difficillimum esse putem, ut hæc planta ab aliquo cognoscatur, & legitime demonstretur, quod nullis prorsus notis depingatur, nescio equidem quomodo Ruellio, viro aliquin digno fide, in hoc quis rectè aditipulari debeat, aut merito possit.

Amatus
rel.

Amatus Lusitanus, inquit Turnerus, cum Dioscorides tria faciat Artemisiz genera, duo duntaxat facit. 1. Artemisiam hortensem. 2. vulgarem Matricariam: vnde planè discedit à textu quem interpretandum suscepit. Dioscoridem vnū habet Artemisiz genus, quod in maritimis proueniat, foliis & ramis magnis: alterum minus, paruo albo foetido flore: deinde meminit alterius cuiusdam speciei, nascentis in mediterraneis, paruo singulari caule: præter has omnes, de aliis agit, quæ Leptophyllos dicatur: cuius sit mentio in omnibus vulgatis Græcis exemplaribus & versionibus Dioscoridis, quæ nunc extant: Vetus etiam interpretes meminit trium, ut minimum, specierum, etsi Galenus duarum duntaxat meminerit. Vbi autem primam suam Artemisiam hortensem facit, Dioscoride in maritimis nasci scribente, Plinio in littoreos natales duntaxat assignate: rursum ab auctore suo discedit, quem interpretandum suscepit. Ceterum, ut probet contra Matthiolum Matricariam esse Artemisiam vnicaulem, varios citat auctores recentiores, suppresso tamen nomine, quos ipse interim variis in locis operis sui damnat, auctoritatēque pro arbitrio reicit. Nullam aliam hoc loco rationem adducit, quam quod foetida quædam herba, Chamæmelo simili-

lis, sit Parthenium non Matricaria, Ergo Matricariam esse Artemisiam monoclonon. Quam misera sit argumentatio, quilibet potest conspiciere. Repono, planta tribus quatuorue donata caulibus, non potest esse Artemisia monoclonos: at Matricaria tres quatuorue aut plures aliquando ramos habet, Ergo &c. Ego vnica duntaxat verè & legitimè Artemisiz speciem noui, quam in insula quadam prope Venetias inueni, foliis multo maioribus quam Ponticum Absinthium, calidum in secundo gradu completo, floribus mukdum ablimilibus Pontico, odore tamen non nihil, non penitus, simili. Testari id potest D. Wēdus Medicus Regius, qui mecum plantam examinauit. Possit Angl. appellari See Mugwort/ i.e. Artemisia marina. Qui igitur verè Artemisiz videndæ desiderio tenentur, conferant se Venetias, indeque paulullum in insulam Cherresā, vbi Cathulianorum monasterium: ibi eam videbunt per omnia descriptioni Dioscoridis conuenientem. Hæc Turnerus, qui non solum verè negat Matricariam esse Artemisiam veram, verum etiam Artemisiam nostram vulgarem esse legitimam meritò improbat, & aliam adstruit, de qua iudicent ii, qui Artemisiam suam vel viderunt, vel nouerunt.

Antequam verò ad æquiuoca Artemisiz deueniamus, notandum nullam reperiri stirpem, vni eo quæ sit ramo: ac propterea nonnullos Græcos Artemisiam ramolam *ῥαμώλαιον*, ut memoriz producit Adrian. Spiegelius, malè nominasse, atquo Recentiores quosdam, hos fortassis imitatos idem epitheton quibusdam herbis lapsu eodem apposuisse. Sed Græci illi rami appellationem in caulem transulisse videntur.

Ceterum, Artemisiz hodie plures nominantur, ut mox apparebit. Est siquidem Artemisia vulgaris rubra & alba: iterumque latifolia & tenuifolia. Artemisia marina Lobelio, nobis Absinthium maritimum Matth. latifolium. Artemisia tertia Dioscoridis leptophyllos Lobelio, nobis Artemisia leptophyllos, Artemisia tenuifolia prima Clusii, quæ eodem autore ad Dioscoridis tenuifoliam referenda. Artemisia tenuifolia secunda eiusdem. Artemisia tenuifolia tertia eiusdem Clusii. Quæ quibusdam Ambrosia dicitur, ab aliis Artemisia nuncupatur. Artemisiam dici de Abrotano apparet apud Tragum lib. 1. cap. 1. Botris à quibusdam Artemisia dicitur. Iua illa aruentis, quam Gesnerus Artemisiam heptaphyllon esse putat, Botris altera à nobis appellatur. De Artemisia marina Neoteri-
corum dicemus sub Iacoba marina siue cineraria. Artemisia 3. siue fatua Anglica Taberna-
montani est Tanacetum crispum. Artemisiz
tertiæ genus flore albo vocamus Tanacetum al-
bunt. Artemisiz terciæ quartum genus, Tanace-
tum fatuum & Tanacetum inodorum. Matricaria creditur à multis, esse Artemisia leptophyllos Dioscoridis. Senecio foetidus Dalech-
pii, à quibusdam Artemisia foetida appellatur. Camphorata Cusalpini, Ageratum nostrum, à
quibusdam Artemisia monoclonos cognominatur. Artemisiz speciem qui auctumant Florem
Aphricanum (Tagetem Indicam) non sunt audiendi. Scorodoti Artemisiz speciem consti-
tuunt Rustach. Roellin & Lonicerus, qui Ambrosiam vocant. Eupatorium siue agrumonia
aliqui falsè Artemisiam esse putarunt. Artemisiam monoclonon non desunt qui Tanacetum
vocatam statuunt. Artemisiam tenuifoliam odoratam

Artemisia
nomine do-
nata plan-
ta

Ambrosia
quibusdam
Abrotanum
Botris.

Iacoba
marina.
Tanacetum
crispum.
Tanacetum
album
Tanacetum
fatuum

Matricaria
Senecio al-
ter foetidus
Ageratum

Tagetes
Indica.
Scorodoti

Agrumonia
Tanacetum

dotatam Tabernamontani Matricariam adbra-
tum appellamus. Artemisia tenuifolia eiusdem
flore pleno, est nobis Matricaria flore pleno. Ar-
temisia ~~to~~ Dodonæi, seu Flos Iacobus
Thalio, à nobis Iacobæa vocatur.

Vires & vi-
tus

Artemisia

Artemisia rubra, vino decocta, adiectâ Mace-
multa, aut exigua prout volueris, per diē bis vel
ter super locos muliebres excoctat, autore Tra-
go, menses suppressos ciet & educit, nec non se-
cundinas, ac quæcūque id genus in internis ha-
rent vitia: aqua destillata paribus facultatibus
est prædita. Decocto Artemisiz, si id cum Sac-
charo vel melle temperetur, tussis mitigatur, len-
ti humores circum præcordia extenuantur, cal-
culi committuntur, pulmo mundatur, nec
nan renes & vesica, idque tam in mulierib-
us, quam viris, si decoctum istud per diem
bis vel ter bibatur, ita tamen ut a potu sum-
pto postea ieiunes. Flosculi Artemisiz siccati
omnium præstantissimi sunt, nec tantum Medi-
cinæ, sed & culinæ maxime idonei. Sunt, qui in
Autumno vinum ex Artemisia deferuere li-
nunt, illudque vinum postea ad dictas mulie-
rum affectiones usurpant: & ut paucis absoluiam,
Artemisia viribus ad Pulegium ferè accedit, &
quantum iudico, in omni cibo gratior. Artemi-
siaz flores cum Chamomilla & Eupatorio in
vino decocti ad nervorum & articulorum per-
fuctiones & dolores faciunt, si decocto illu-
rum succantur & cum illo confricentur
partes affectæ: præterea si quis longo itinere,
plus æquo defatigatus fuerit, ista aqua in qua Ar-
temisia decocta fuerit, pedes abluat, releuatio-
nem sentit: herba Artemisiaz vino rubro decocta
vinctur aduersus exitum ani, ut in locum suum
reponatur, vino autem decocto calidissimo insi-
dendum erit, ita tamen ut prius cum Myrrha &
Colophonia suffumigetur anus. Artemisia, si
Placario fides habenda, calida est & sicca in
quarto gradu, folia eius magis competunt viui
medicinæ quàm radices, & viridia magis quàm
sicca. Valet contra sterilitatem factam ex humi-
ditate: nā si ex siccitate esset, obellet: possunt autē
hæc satis perpendi ex complexionem mulierum,
sc. an sit corpulenta, vel macilenta. Datur au-
tem cum pulvere Bisortæ, & Nucis muschatæ
& Saccharo, per modum Electuarii. Aqua Ar-
temisiaz secundum Hier. Herbarium, somnum
inducit. Facit procreare barbam illita. Tineas
capitis extirpat. Ictericam expellit. Et hydropis
incipienti medetur. Venenorum quoque vnica
antidotus est. In dolore capitis à frigiditate Wir-
tembergic. Empiricus coquit Artemisiam in bo-
no vino, abluat caput, & calidè applicando su-
perligat, intra horam mitigare dolorem certò
promittens. Hæc autē docuit, & clariùs qui-
dem Arnold. lib. 1. de cur. morb. cap. 8. ubi ad hæ-
micraniam flores Artemisiaz in aqua coctos ap-
positos, abluto prius capite eā decoctione, mul-
tū valere prodidit. Inveniuntur carbonēs [in-
quit idem Wittenb.] sub Artemisia rubra, quos
dabis epileptico, & collo appendes: Mater
mea experta est in vxore mea & puero, qui cura-
ti fuerunt, ut propria manu scribit Guillelmus
Landgravius Hassiæ. Commendantur etiam ad
paralytim cum vino aut aqua lauendulæ. Hem!
quibus ceremoniis, quæ superstitione homines
non infirmis irretiti tenentur: contaminantur!
Sunt qui Artemisiam ceteris hortis & diebus ef-
fodere, ac sub ea carbonēs, seu (quod ferè di-

Tempor.

Artemisia

Artemisia
Superflua

xeram) stultorum lapides, aduersus febres inqui-
rere soleant. Alii ed stultitiz ac dementiz pro-
grediuntur, ut Artemisia se cingant, ac ex ea lecta
conficiant, quæ postea in ignem Diuo Ioanni sa-
crum, vna cum omni intortunio [ut sibi ce-
mentem imaginantur,] conficiunt. Nec des-
sunt qui [Plinio sc. ductore impio,] Artemisiam
cum Salvia secum deferant, credentes se nequa-
quam ex itinere defatigandos. Sed quis verè re-
ligionis sinceris cultor, his & similibus supersti-
tionibus fidem habet, quibus seductor ille spi-
ritus, Cacodæmon, nobiles Dei creaturas con-
purcatas decipere, deceptas tandem in ignem æ-
ternum abducere solet. Iacobus Vallick lib. de
sagis & lamiis, Artemisiam commendat aduersus
Satanam, & sagittam [vasorum eius] fuscina-
tiones. An verò herbas reformidet Satan, Theo-
logis disceptandum relinquitur. Mittamus nos
imposturas has, Ambros. Patæus multū n com-
mendat suā & aliorum experientia, Artemisiam
salem aduersus pestem: ut & Antonius Royet, nec
non alii. Veteres plurimum laudant Artemi-
siam contra serpentum morsus: idè probabi-
liter aduersus pestem.

AMBROSIA VETERIBVS.

CAP. LXXIX.

Ambrosiam, ut Dioscoridis palam fecit, alii
Botrin, alii Buri in Artemisiam appellant.
Est autem frutex exiguus, trium palmorum alti-
tudine, ramulos: folia circa imum caulem habet
exigua, ceu Rutæ, cauliculos [iuxta illd.] verò mi-
nutis seminibus, quasi racemulis, qui nunquam
florent, refertos: est is odore vinoso, ac suavis.
radix tenuis & duum palmorum longitudine.
Nectitur in coronas apud Cappadoces. Vis eius
reprimere, repellere, & illitu adstringere humo-
res, qui in aliquam partem incumbunt. Romani
Caprum siluaticum, aut Apium rusticum vocant:
Ægyptii Merseo.

Ambrosia.
Diosc. Ro-
m. Artemi-
sia.

Ambrosia, inquit Plinius, vagi nominis
est, & circa alias herbas fluctuans &c. quæ cum
Dioscorides habeat omittimus. Is tantum, inquit
Cornarius, vim reprimendi a Dioscori-
di dictam, in discutiendi vim ~~diagnosticam~~ appel-
latam commutauit. Nam & Galenus Ambro-
siam in cataplasmatibus vim adstringentem & re-
pulsoriam habere testatur. Sed Plinius uti di-
xit Ambrosiam cum Artemisia confundit. Nō
inter herbas aliquas fluctuans, & vagum nomē
tantum quondam Ambrosia fuit: sed quodcun-
que odoris aut cibi suauitate placeret, in Poëtis,
Scriptoribusque aliis eodem hoc nomine ab an-
tiquis dicebatur, & quasi immortalitatem vten-
tibus faceret, sic appellata illis fuit. Frequens &
notum vbiq; nomen, ignota tamen res, & in-
ter herbas non facilis inuentu: aliis aliter eam o-
stendentibus & cum Artemisia miscentibus fe-
rè cunctis. Quo fit ut in peregrina Italia herba
nihil pro comperto constituere audeam. Plinius
lib. 27. cap. 4. integrum Dioscoridis caput com-
mentationibus suis inseruit, cū tamen non
multo antè lib. 25. cap. 7. de Artemisia agens di-
xisset. Sunt qui in mediterraneis eodem Artemi-
siaz nomine &c. Ambrosiam vocent. Ex quo ma-
nifestè deprehenditur, quod paulò ante dixi-
mus vagum per multa Ambrosiaz nomen esse,

Plinius lap-
sus.

plantas, cibos, & pocula, eouſque vt Athenienſes hoc nomine omniſigenas fruges oleum, vinum, lacticeſque alios, quos diis in ara afferrent, Ambroſiam nominarent. Nobis inclinatur animus vt peregrinam noſtro orbi peculiarẽque Cappadociæ herbam exiſtimemus, inquit Marcell. Virgilius ex Ruellio, iuxta quem tamen, Ambroſia noſtiſſima eſt in Gallia naſcens inter ſegetes: Verũ eam in Gallia ſe nunquam vidiffe nec ſcire quid ſit reſert Bacchanellus, niſi ſit ſpecies Artemiſiæ de qua Dioſcorides & Galenus verba fecerunt.

Italiae nunc inquilinam reſert Hier. Cardanus lib. 8. de rer. variet. c. 44. dicens: Ambroſiam producere vitam in longiſſimum æuum plarique affirmant. Italia quoque hanc herbam, licet rarã, fert: ſed ſi ſeratur, non reſicet: facile dignoſcitur quod ſola ſuo ſemine quemadmod. copioſum fert vinum, ſuauius redoler: racemola eſt, Rutz folio, radicẽ valde longa exiliſque, nunquam floret. Vſus igitur herbæ huius vitam producere creditur: nec ratione caret, quod ex proprietate ſit. Qualis ſit Cardani Ambroſia perquirant poſteri. Itẽmquẽ qualis Bellonii Obſ. lib. 2. cap. 53. 56. & 112. vbi valde aromaticam eſſe tradit, his verbis. Dum ex Heraclea in Iconium, vulgò Cogne dictum iter facerem, nullam herbam inueni Ambroſia frequentiore, adeò odoratam, vt capitis grauedinem non minùs induceret, quàm ſi in cella vino muſto pleno verſatus fuiſſem. Incolæ lignis carentes, eam legunt ad ignem ſtruedum. In pago nomine. Sarameli vidi Scopas ex Ambroſia conſectas, cuius manipulum in Galliã retuli, pro re ſingulari: nam in Europa, quod ſciam, ſpontẽ non prouenit.

Hortus porro Sanitatis cap. 21. nomine Ambroſiæ habet figuram alicuius plantæ umbelliferæ, quid autem velit me latet.

Ambroſiæ nomine ſequentes plantæ paſſim apud autores inueniuntur. Artemiſia tenuiſolia, quam Matthiolus in prior. com. pro vera Ambroſia expreſſit. Ambroſia quibuſdam dicta, aliis eſt Artemiſiæ ſpecies, aliquibus Conyza Hippocratis. Quam lib. H. n. g. 28. Botryn inſcribimus, Ambroſia à pluribus cognominatur. Per Ambroſiam Rheginum exiſtimo intelligere noſtram Botryn alteram. Coronopus Ruellii vel Naſturtium verrucoſum Ambroſiæ nomen apud multos adeptum eſt. Toxites in Onom. philoſoph. Saluiam, Ambroſiam Deorum appellat. Ambroſiam quidam Tanacetum eſſe volunt, quibus reſclamat ipſamet Ambroſiæ & Tanacetum hiſtoria. Ambroſia Apulei cap. 88. Millefolium nobile Tragi, vocatur à nobis Achillea. Myriophyllum quod alii teſte Apuleio, Ambroſiam dixere, Millefolium ſive Myriophyllum Matthioli inſcribimus. Sunt qui Apium vulgare Ambroſiam vocent, ſed magno tum errore. Stirpis ramuſculum, quidam Ambroſiam eſſe cenſent, Matthiolus verò Polygoni eſſe genus credidit: cum officinis eam Centamgrana vocamus. Amato dicitur etiã Pyrola altera. Ambroſia Corinthiis autore Nicandro ex Athenæo lib. 15. cap. 11 eſt Lilium croceum minus. In Co Inſula ex Alexandri ſtatua enatam in capite Ambroſiam, quæ nihil aliud ſit quàm Lilium, Caryſtius, teſte Ruellio, memorie prodidit. Nec deſunt, authore Dioſcoride, qui Sedum maius Ambroſiam appellent, ſecundum nonnullos. Exiſtimo ego Apuleium ac Dioſcoridem vocaſſe Aizoum maius, arboreſ-

cens potiùs quàm vulgare. Ambroſiam multi vocant eam herbam, quàm nos Scorodotin nũcupamus. Toxites in Onom. philoſoph. Millefolium Ambroſianam cognominat. Ambroſia quoque de Agerato dici, liquidò conſtat. Ambroſiam quidam hürſchwurtz putant, ſed falſum eſt, inquit Cordus in Dioſcor. lib. 3. cap. 119. Hanc nos credimus eſſe Libanotim ſecundam Dodonæi. An Ambroſia Ruellii, quàm Bacchanellus ſe ignorare ſaretur, eſt Herba vinoſa?

AMBROSIA QVIBVSDAM. CAP. LXXX.



Compluribus ſcuticatur ſtatim è radice ortis virgultis, ſtriatis, rubentibus, ſubhiſtuſtis, in ramos multos diductis: ſolia ſuaueolentia, Abſinthii communis magnitudine & diuiſurã, albicantia, lanuginola, ſapore aromatico, amaricante, non ingrato: corymbi proximè ramulis annexi longam

ſpicam faciunt, quos excipiunt echini parui, muricati, quorum ſingulis granum ineſt vnicum, nigrum, gigatto virgineo ſimile & ſerè par. 74. dixiſſe, ſi nuplex, ſimbris aliquor capillata.

Lobelio dicitur in Aduerſ. Ambroſia: in Obſ. p. 442 Ambroſia ſatiua hortendiſ procerior: In Icon. Plant. p. 766. Ambroſia ſatiua hortendiſ.

Dod. lat. Ambroſia: Rauuſſolſ. in Itin. Ambroſia vera apud Jac. Renaudum viſa: Caſalp. Ambroſia, & Ambroſiana vulgò, (Videtur autè Caſalpino eſſe Ambroſiam Dioſcoridis, quæ opinio minùs placet.) Camer. hort. Conyza Hipp. ſecundum Anguill. Item: Ambroſia picta à Lobelio: Gerardo Ambroſia, Ofc of Cappadocia.

H. Lugdunendiſ mihi videtur quatuor figuras unius plantæ pingere, & tres deſcriptiones dare, quæ non placent, ceu nec in omnibus figuræ.

1. eſt p. 950. hoc titulo: Artemiſia monoclonos alia. 2. hoc: Artemiſia monoclonos quorundam, aliis Ambroſia. An 3. figura p. 950. hoc titulo: Artemiſia leptophyllos montana? 4. hæc inſcriptione p. 1148. Ambroſia hortendiſ procerior Lob.

Caſp. Bauhin. Phyt. Ambroſia ſ. ſive ſatiua, aliquando ramoſa, aliquando vncialis, hinc duæ icones apud Lugdunendiſ, p. 1148. & p. 951. 1. eſt Ambroſia 4. ſive polyſpermos, Lugd. monoclonos quibuſdam. Dubi ſumus nos, vt ex iam dictis patet, an H. Lugdunendiſ monoclonos figura non ſit mala, ac etiam deſcriptio, & fortè eadem cum Ambroſia ſatiua: ſi quis extat, qui plantam viderit, moueat.

Tabern. Ambroſien: oder ſlein traubentraut/ Græcè Αμβροσία, & Botrys αμπροσία, Ambroſia, Botrys, Artemiſia Botroides, Geſnero Herba vinoſa,

Artemiſia
tenuiſolia.
Ambroſia
quibuſdam

Botrys.
Botrys al.
tera.

Naſturt.
verruc.
ſum.
Salua.

Tanacetum.

Achillea.
Myriophyl.
lum Al.
ſibi.

Apium
vulgare.
Centam.
grana.

Pyrola al.
tera.

Lilium
croceum
minus.
Lilium
Sedum
maius.
Sedum ar.
boreſcens.

Scorodotin.

Millefol.
linum
Ageratum?
An Liba.
non ſecundum
Dodonæi
An Herba
vinoſa.

Deſcriptio

Synonyma

H. Lugd.
no.

rosa, Ital. Ambrosia; Gall. Minones, Egypt. Merico, Boh. Srozyrysta; Flammandis & Braban. hof Ambrosie; h.e. Ambrosia sativa seu horulana, & Eleya Truyenensys. Viderur Tabern. diversas plantas confundere. Nomen, Herba uinolæ, & Minones sunt apud Ruellium, quem de hac Ambrosia vix puto esse locutum. Tabern. si nouit, plantam quam describit, cur eam non quoque pinxit?

Ambrosia quibuldam dicta à nobis visa est Tiguri in horto D. Gesneri. Genetz in horto nostro florebat mense Nouembri & semine turgebat, deciduoque proueniebat Maio. Montbelgardi in Horto Ill. E. C. sæpius creuit: sed semen ad maturitatem non prouenit.

ABROTONVM VETERIBVS. CAP. LXXXI.

Abrotonum, ut Nicandri testatur interpret, inde nomen sibi usurpauit, quod conspectu tenerum, molle & delicatum appareat: δακτύλιος δὲ ἀπὸ τοῦ δακτύλου. Aut quod grauem acremque & difficilem halitum prospicit: ἀλυστὴ δὲ δὴ τὸ δύσπνευστον ἔχει.

Veterum verò omnium sententià Abrotonum duorum est generum. Theophrasto quippe 6. Hist. 1. Urbanum & [6. de caus. 24. sic C. Bauhino in phyt. scribente, quod nondum in illo capite legimus,] Agreste. Dioscoridi fœmina & mas: Sic quoque Plinio lib. 11. cap. 7. cui mas, Abrotonum campestre: fœmina verò montanum. Verùm quam Dioscorides fœminam fecit, eam Plinius Chamæcyparissi nomine lib. 24. cap. 15. donasse videtur, inquit Calp. Bauhinus.

Abrotonum, inquit Theophr. radice aut auulsiōne potius quàm semine germinat: semine enim difficulter exit. Seritur Æstate: friget enim vehementissimè: atque in totum morbo obnoxium est, etiam vbi Sol vegementer illucet. Sed cum conualuerit, treueritque magnum, robustum atque atboraceum constat, quemadmodum Ruta, nisi quod hoc lignosius, & siccus & squallidus est. Abrotonum quoque semine abundat, nec sine odore est, sed id radices rectas, altasque agit: est veluti vinispirs, crassa sc. illa radice: reliquis verò de ea exeuntibus spargitur. Abrotonum mitandum profectò apparet: cum enim calidum sit, loca aprica persequitur. Ratio in infirmitate est: vires enim tam contra frigus, quàm contra estum huic deficient. In totum verò calor inditus ad facile beneque germinandū haudquam præcipuus intelligitur: siquidem calida sunt quæ acra.

Abrotonum duorum traditur generum, inquit Dioscorides: ac fœmina quidem frutex est atboris specie, candicans, foliis circa ramulos Sestiphii modò minutim incisis, floribus refertos habens in summo quasi corymbos auri fulgores Æstate prouenientes, iucundi odoris cum grauitate quadam, ac gustu amaro. Hoc genus Siculum esse creditur. Alterum mas uocatur, samentosum, gracilibus ramulis velut Absinthium fruticosum. Plurimum in Cappadocia gignitur, & Galatia Asiatica, atque in Syria Hierapoli. Vtriusque semen seu fruesactum, seu crudum, tritum & ex aqua potum, orthopnoæ, ruptis, conuulsis, ischiadicis doloribus, vrinæ angustis & mensibus commorantibus auxiliatur. Est & in vino potum exitialium venenorum

exitialium venenorum antidotum. Rigore prehensis ex oleo vtiliter illinitur. Serpentes quoque cum substratu, cum etiam nidore fugat. Sed & contra morsus eorum cum vino bibitum prodest, priuatim verò pollet contra phalangiorum & scorpionum ictus. Subuenit & oculorum inflammationibus, cum Coroneo cocto aut pane impositum. Discutit quoque panos, cum farina hordeacea cruda tritum decoctumque. Miscetur denique & Olei irini compositioni. Olenum Abrotonium hunc in modum conficit Dioscorides. In olei ad Cyprinum conficiendum aromatibus imbuti libras nouem & quincuncem, Abrotoni foliorum libras octo immittit, ac posteaquam diem noctemque vnā macerauit, excolat. Quod si perennius & magis durabile conficere vult, abiectis prioribus foliis, alia apponit, & macerata exprimit. Vim porò habet castictoriam, ad vuluæ præclusiones & duritias efficacem, menstrua secundasque pellit.

De Abrotono passim agit Plinius. Nam lib. 21. cap. 10. huius primò meminit. Abrotonum, inquit, odore iucundè grani floret Æstate. Flos aurei coloris. Vacuum [vacuis, i.e. incultis, neglectisque locis legit Dalech. & hoc loquendi modo prædia vacuat, scripsit ac dixit Cicero] spontè prouenit. Cacumine suo se propagat [quoniam summis flos surculis exit, quo percunte semen succedit, & è vertice plantæ delapsum, terraque exceptum plantam suam propagat: Seritur autem semine melius, quàm radice aut surculo: semine quoque non sine negotio: plantaria transferuntur. Sic & Adonium. Vtrumque Æstate. Alliosæ enim admodum sunt: & Sole tamen nimio læduntur: sed vbi conualuere, ritu Vitis fruticant. Eodem libro 21. cap. 21. Abrotonum duorum traditur generum, campestre ac montanum: hoc fœminam, illud marem intelligi volumus. Amaritudo [Diosc. hoc de Helenio secundo, Dalech.] Absinthii in utroque. Siculum laudatissimum, dein Galaticum. Vfus est & foliis, sed maior semini ad excalfaciendum: ideo neruis vtile, tussi, orthopnoicis, conuulsis, ruptis, lumbis vrinæ angustis. Datur bibendum manualibus fasciculis decoctis ad tertias partes. Ex his quaternis cyathis bibitur. Datur & semen tritum in aqua drachmæ pondere. Prodest & vuluæ. Concoquit panos cum farina hordeacea & oculorum inflammationibus illinitur, Coroneo malo concocto. Serpentes fugat. Contra ictus earum bibitur cum vino illiniturque. Efficacissimum contra ea, quorum veneno tremores & frigus accidunt, vt scorpionum & phalangiorum: & contra venena alia, pota prodest, & quoquo modo algentibus, & ad extrahenda ea, quæ inhaerent corporibus. Pellit & interaenorum mala. Ramo eius, si subiiciatur puluino, venerem stimulari aiunt: efficacissimamque esse herbam contra omnia veneficia, quibus coitus inhibeat. Hæc Plinius, apud quem nonnunquam falsò legitur, Coquitur panis cum farina hordeacea: legendum enim est, concoquit panos. Est enim id quod Dioscorides dicitur & eundem dixit. Si quoque recta est Gazæ lectio & interpretatio, Plinii locum corruptissimum quidam merito sic restituit. Seritur autem viuiradice, ac surculo melius quàm semine quoque non sine negotio plantaria transferuntur: in Adonidis hortos, Æstate. Vtrumque alliosum admodum est, & Sole tamen nimio læditur: sed vbi conualuere, instar Rutæ fruticant. Sic enim

Plinius corrigendus.

ex Theophrasto legendum, ex qua sua partim mutatus est Plinius. Illa etiam verba, *ἀδωνίδης* aliter legisse videtur, qui Adoniū latinē reddiderit, perinde ac si herbæ cuiusdam peculiare nomen esset. Vocantur autem Adonidis horti, *ἀδωνίδης* & *ἀδωνίδης*, quales sunt qui testis ac hētilibus, ē fenestris ad Solem exponi solent.

Galenus tertio abscessu calfacere atque siccare Abrotonum dicit, habereque vim discutiendi ac siccandi, ut quod minimum acerbicatis habeat.

Quam potro in duobus Abrotoni generibus differentiā ex sexu Dioscorides indicauit, ex locorum, in quibus nascuntur, diuersitate Nicæder tradidit. Siquidem in Theriacis de eo ait. Et Abrotoni quod siluestre in montibus frondet. Hæc enim manifesto argumento sunt, montano oppositum campēstre & satiuum. Ita Plinius, & hunc & illum autorem secutus, utroque discrimine distinxit Abrotonum, duorum generum tradi dicens. Campēstre ac montanum: intelligique hoc marem, illud fœminam.

Abrotonō sunt qui Abutonō, qui Absinthium (ab amaritudine quam cum eo habet,) qui Heraclium ab Heraclea Ponti ciuitate, ad quam, totoque eius agro plurimum nasceretur, & probatissimum vocatum fuit:) qui Cholosæon, qui Procampylon (quod in terram se flectat, & cacumine suo se propaget. *προκαμπύλον* enim in plātis Græci dicunt, quæ cum se erexerint in terrā rursus se incuruant:) qui Cynanchitem, qui Thelithamnon, qui Dulcem Ancona (eadem ratione qua Procampylon: *δὲ καὶ* enim cubitos dicunt, quorum similitudine se flectit Abrotonum) appellant. Magi Neura phœnicos, Romani Absinthium Ponticum dicunt.

Cæterum cum voces hæc duæ *λεπνὴ* & *πικρὰ* (quarum hæc quod tenue semen habet, altera quod tenues ramulos & fruticosa est, significat,) in Abrotono hoc variē in Græcis legatur, & Dioscorides Absinthii modo *λεπνὴ* esse dixerit, fruticosum vertere cum Marcello legere maluimus. Fides penes Græcorum codices sit. Cur autem Aestate nasci Abrotonum Dioscor. dixerit, non multo ante ex Theophrasto, reddita à nobis causa est, quod alsioli herba sit, frigoriūque facillimē pereat. Obseruandum præterea, à Paulo Aegineta, Galeno, Serapione & plerisque aliis Dioscoridem in Abrotoni decretis legentibus, plerisque alias vires à cunctis & ab aliquibus eorum Abrotono decerni (ut ex Galeno patet,) quæ in Diosc. desiderari fortè possunt, temporum in uris & librariorum incuria omisse.

Pamphilus, autore Galeno, à quo etiam reprehensus, ut Hermolaus coroll. 45. testatur, Abrotonum à Romanis Santonicum appellari credidit. Abrotonum (ut vult. Rhegin. in exerc.) cū Absinthio marino vel Seriphio videtur Galenus facultatibus inter se confundere. Abrotonum nigrum Cordi, est nobis Abrotonū mas siue vulgare, Matthiolo hortense. Abrotonum siluestre, si Fuchsio credimus, est Barbaris Abrotonū, quo hodie passim pro mare vruntur officinæ. Pro Abrotono fœmina Dodon. pictam dedit plantam, quam H. Lugd. Abrotonū siluestre, Fuchf. Abrotonum marem, nos Abrotonum secundum nominamus. Abrotonum odoratum humile, dense fruticosum Lobelii inscribimus. Abrotonum cū pulchris corymbis. Lumbricorum semen dicitur Abrotonum mas Diosc. Anguillare, Artemisiā tenuifoliam quam vocamus, alii Abroto-

num campestre & siluestre vocant. Absinthii vulgare Ponticū, Abrotoni minoris nomine Tragus, Abrotoni siluestris siue albi Cordus, fœminæ Gesnerus & Fuchsius, intelligunt ac depingūt. Abrotoni fœminæ nomine (dicit author annot. in Cordi Hist.) aliqui depingunt Chamecyparissum de quo antè diximus, eiusque plures species constitimus. Numeratur, teste Cæsalpino, à Syluatico Tanacetum inter species Abrotoni. Abrotonum siluestre, sunt ut existimamus, qui Achilleam constituent, autore Cæsalpino. Abrotonum peregrinum Cupressi foliis, Sabinam Egyptiam vocatum à Lobelio, pertinere nos quidē crediderimus ad Arborem vitæ, de qua lib. 3. Abrotonum mas quidam volunt esse Absinthium Seriphium Egyptium. Wellsamen (Seriphium Germanicum, siue Sophia) siue species Absinthii, siue Abrotoni sit, parum interesse putat Tragus.

Abrotono deficiente, Syluius in Antibalomenis substituit Absinthium: idem Auicenna, Platoromus & Fauardus. Pro Abrotono Galenus in subst. accipit Organum, Abrotoni loco Polium quoque sumit Auicenna. Pro Abrotono inimicet Borgaruccus, ut apparet in eius Antibalomenis, Thus.

ABROTONVM VVLGARE.

CAP. LXXXII.



Crex radice lignosa frutescit *sarmentis*, tres quatuorue cubitos altis, duris, fragilibus, medulla albâ plenis, subrubentibus, lris, ramosis: folia per alas multa, renuiter dissecta, fœniculaceis paulo latiora, canescentia, odore vehementi, sapore amato & acri, atque inferiora quidem multitudine Chamaemeli modo, superiora, vno atque altero segmento diuiduntur, non raro nihil quàm vnicum tenue amentum sunt: flores secundū ramulos conferti corymbos Absinthii xmulantur, colore luteo lo præditi. Hoc Abrotonum videtur mihi cultura & pro anni

Santonium.

Absinth. maximum
Abroton mas siue vulgare.
Abroton siluestre.
Abrotonum secundum

Abrot. cum pulchris corymbis
Lumbricorum semen

Absinth. vulgare Ponticum.

Chamecyparissus.

Tanacetum.

Achillea An Arben.


Absinth. Aegyptium Seriphium Germanicum.

Substituta Absinthium.

Organum.

Polium.

Thus.



*Synonyma
Abrotonum*

*Abrot. vulg.
gare
Caphorata
diuina
abrot. an-
gram
abrot. mas
mas
abrot. a-
grifo*

anni tempore multum variare, ita ut videatur plurius esse specierum. Qui eas pin- gendas tres icones à nobis propositas, an per singulas Abrotonum intellexerint asserere non audemus: ita sculptras emimus, omnes vix placent pro Abrotono.

Quod nobis Abrotonum

vulgare dicitur, id Abrotonum appellat Corn. in Dioic. Wirsung. Kyber. Brunfels. Riff. Euch. Roesslin, Winklerus, Brassanola, Rob. Stephanus, Harchius, Gesn. in cat. pl. Casalp. & Apollinaris. Abrotonum vulgare Cronemb. de compos. med. & Cordus in disp. supra Martiatum ubi & Camphoratum Nicolai vocat. Abrotonum nigrum, seu masculum Cordus in Hist. (ubi figura appositae patum placet) & in Dioscoridem. Abrotonum marem Milzald. in Alexikepo campo 2. area 2. & de sect. hort. lib. 2. cap. 24. Toxites in onom. phil. (cui etiam Abrotonum agreste,) Lacuna, Lonic. H. Lugd. Had. Iunius in Nomocl. Amat. Worinationes, Car. Stephanus, & Matth. qui tradit esse vulgaris notitiae, hortense & per se in campetribus nascens tenuioribus & minoribus seminibus.

Abrotonum mas [inquit Apollo rad.] notissimum est ex Matthiolo in hortis. Ego tamen anguillarii opinioni potius adhaereo, quod vili- tatum sit femina.

Figuram, quam nomine Abrotoni ponit Tragus, non bene exprimit Abrotonum, sed potius Absinthium vulgare Ponticum foliis aliquo modo imitari videtur. Is Abrotonum duorum esse generum tradit. Minus totius, magis quam maius, cineraceis & incanum vestitum, adeoque Seriphio germanico plane similibus. Maius virgis vulgari Chamomillae quam proximis, odore grauiori, simulque graviori quam minus.

Figura quam habet Fuchsius minus placet, nec etiam placent nostrae olim per Fuchsum sculptrae: ut iam supra dictum.

Abrotonum duplex tradit Dodonaeus: Maius, quod femina: & Minus, quod Mas. Miror autem eum pro Abrotono mare assumere figuram Absinthii arborescentis Lobelii, & pro Abrotono femina figuram quam habet Lobelius pro Abrotono mare, quae nostri vulgaris Abrotoni: ac suspicor eum ignorasse verum discrimen inter Abrotona quae tradit, & per maius intellexisse id quod cultura in arborem erigitur: per minus vero quod cultura non erigitur, quo ad hortorum septa minora consilia vtuntur.

Abrotonum feminam Dioscoridis, nihil aliud esse scribit Anguillara, quam commune & vulgare.

Camer. hort. Abrotonum mas, ubique notum quilibet ramulis facile propagatur, semine vero Tom. III.

difficiliter prouenit.

Et paulo post: Abrotonum magnum, camphoratum, quibusdam Incensaria, admodum fruticat, & facile se ex surculis propagat, odoris grauis, attamen omnibus iucundi: Tragus appellat Gross Stabwurz. Eccc Camerarius separat suum magnum Abrotonum, à suo mare Abrotono, interposita Chamæcyparisso: praeterea Gross Stabwurz Tragi non differt ab Abrotono vulgari, quod proponit Camerarius pro mare. Id etiam ad Hist. Matthioli germ. hoc separat ab Abrotono Matthioli. In Epit. Matth. Abrotonum mas. Idem ibidem pro Abrotono femina Chamæcyparissum pingit.

C. Bauh. phyt. Abrotonum 9. siue mas angustifolium maius: maius Brunfelsio, mas Lobelio. Item: Abrotonum 11. siue latifolium: maius & secundum Trago, latifolium Tabernamontano. Cur separet frater C. Bauh. Abrotonum Tragi maius à vulgari & angustifolio non video: vel dicendum vulgare Trago non cognitum.

Tab. ait Legitimum Abrotonum in hunc usque diem nomen seruat: vocatur autem Abrotonum, vel vt subtiliores quidam Grammatici volunt Habrotonum, Colopxon, Procampylon, Cynanchites & Aurosum, a verbo Gallico *Aur. ne*. Arabi Serapiom de temp. simpl. cap. 306. Carsum: Auerth. *Halfia*: Ebenbitari *fusta*: *H. liabbati*, *Bereinaseton* & *Quisumum sebum*. Dicitur alias in libris Arabum *Aluife*, *Saguafara*, *Sanguasora*, *Sanamen*, *Sarion*, *Sekebinegi* & *Schebingi*, potissimum Almanfori Tract 2. Aliis tandem *Seise gutrab*, *Sgufera*, *Alfelisil*, *Cuifar*. Dalegensiter, *Halfia*, *Hanudab*, *Hebum*, *Kaisum*, *Kasum*, *Kisum*, *Kesimi*, *Kakilem*, *Kelilech*, *Naesul*, *Nanasar*, *Rurinas*, *Sachinabiam*, *Safara*, & *Sagarion*, Italianis *Abrotono*, *Abrotano*, *Bratano*, *Herba canfrata*. Plebi Ferratienli *Anrodono*. Hisp. *Abroton*, *Hierna*, aut *yernalumbriguera*. Galis *Anron*, *Aurone*, *Auronne*, *Auroesne*, *Ancronne* & *Bois de S. Iuan*. [item aliquibus *Garderohe*, quod Tabernion monuit;] Anglis *Sorthernwod*. Bohem. *Brotan* / *Bozedrzemfo*. Hung. *Obrata*, *Sepró ruta*, h. e. vt Car. Clusius interpretatur, *Scoparia Rura*, & *Istenfaya*, h. e. *Lignum Dei*. Belgis & Brabantis *Auerdone* & *Auercury*. Germ. *Stabwurz* / *Gertwurz*, *Garthagen* / *Astfusch* / *Ebrach* / *Garthan* / *Gertel* / *Gerteltraut* / *Gertseltwurz* / *Kutteltraut* / *Gansertraut* / *Gansferstraut* / ab odore, quo Camphoram æmulatur: *Abroten* / *Gertwurz*, & *Schoßwurz* / quod sagittas, spinas & id genus extrahat, si emplastri modo applicatur. Et hæc nomina Abrotoni sunt communia. Abrotonum enim mas vocatur græcè *ἀβρότον ἀγρὸν* Lat. Abrotonum masculum, Plinio Abrotonum montanum: Dioscoridi Abrotonum Cappadocum, Abrotonum Galaticum, & Abrotonum Asiaticum, quod copiose crescat in Cappadocia, in Asia & Galatia, Italianis ad differentiam feminæ (Chamæcyparissi) *Abrotono maschio*. Germ. *Stabwurz* / vel *Stabwurz* *Mänlin* / quibus nominibus vtrumque Abrotonum intelligitur, masculum sc. maius & masculum minus: ad euitandum errorem, in quem incidunt, qui Abrotonum minus, Abrotonum feminam esse credunt. Theophrastus & Plinius non conueniunt in plantatione Abrotoni: vnus vult felicius prouenire ex surculis, alter ex semine. Experientia docet ex surculis potius crescere. Et quamvis Theoph. lib. 6. cap. 7. & alii scribant, frigus ferre non posse, nihilominus Hie-

mem perfert. Abrotoni maris species minor, quæ etiam in hortis nostris vulgaris, vt maior, huic in omnibus similis nisi folia essent cinerea, & planta minor. Horum figuras ponit in Hist. & Icô. his inscriptionibus. Abrotonum mas Stabwurg. Mânlin: Item: Abrotonum humile, flein Stabwurg. Sed Tab. frustra duas figuras ponit, cum color, qui demonstrari non potest, & magnitudo, quam non ostendit, solum differentiam non constituent.

Locus &
Tempus.

Abrotonum passim in hortis & in campestribus nascitur: flores Augusto colligitur in Autumno, potissimum Septembri mense, hoc enim tempore, Fuchsius autore, semen profert. Ego tamè multum ambigo an Germania assiosum huic fructum in campestribus proferat. In hortis quidè Montbelgardi, Patavii, Genevæ, Tiguri, Heidelbergæ, in Gallia Narbonensi & alibi observavi.

Vires

Vires ex Veteribus videantè. Summæ propagines Abrotoni cum stoculis suis, vino, vel aqua decocta, adiecto melle, aut saccharo, perque dieter aut quatuor pota, non niu recta ceruice spirantibus & asthmaticis apprimè conducunt, si Trago credimus: nam vitia pectoris expurgant, cardiacæ medentur & rursi, lentosque humores pulmonis, renum, matricis & vesicæ incidunt, stillicidio urina succurrunt, & quosvis internos dolores sedant: aqua destillata, non est inferiorum virium, quæ etiam scorpionum & araneorum ictibus auxiliatur, loca muliebria mundificat, si illa colluantur, vel lintcolis in illa madefactis curentur: Qui plura desiderat, Tabernamontanum consulere velit qui plura de usu interno & externo, de aqua eius, vino, & conferva: itémque oleo stillatio & vnguento tradidit, quæ merito nos omittimus, ne in imminutum opus excreseat. Abrotonum, vt apud Camerarium inquit Horatius, ergo non audeat, nisi qui didicit, dare. Sed nostro seculo audaci quilibet non solum minime periculosa hæc medicamenta, sed etiam quevis validissima aliis obtrudere non erubescit. Vfus eius præcipuus in lumbricis, quod & Aelianus notavit. Aqua destillata cum momento pukeris nucis mollior optima in stranguria & dysuria. Externus imposita extrahit ferrum, & alia corpori infusa. Ceterum, Abrotonum calidum & siccum ordine tertio satis intenso assignat Dodon. digerendi quoque ac rarefaciendi, & vt vim.

ABROTONVM CVM PVLCHRIS corymbis.

Descriptio

Prædictis humilior est, folia habet maioris Abrotoni similitudine dissecta, sed minus candida, & odoratiora, quo Santolinam referunt: corymbi è ramulis copiosi ad lumen usque luteo splendent colore: semen admodum fecundum est: radix vtriusque.

Hoc Dodon. gall. Abrotonum tertium nominat, ac extra dubium Dioscoridis ἀβροτόνιον, Abrotonum Siculum propuntiat, testaturque Germanos mollicherendè Stabwurg, Abrotonum odoratum, vocare. Lat. Dod. Abrotonum odoratum humile inscribitur.

Lob. Obi. p. 444. Icon. Plant. p. 769. pingit hoc titulo. Abrotonum odoratum humile dense fruticosum.

C. Bauh. Phyt. vocat Abrotonum 10. siue mas angustifolium minus.

A. Fuchsius quum Tubingæ apud illum essem, mihi in herbo eius demonstratum, à vulgari di-



uersum. In hoc enim pulcherrimi corymbi, multo maiores quàm in vulgari Absinthio Pontico, & rariore, aurei: foliola circa flores latiora nonnihil, longiora, non ita dissecta. Frater mihi attulit à se Venetiis collectum. Belgis hortense est, id quod testatur Lobelius.

ARTEMISIA TENUIFOLIA, SIVE LEPTOPHYLLOS, aliis Abrotonum silvestre.

CAP. LXXXIII.



Artemisia tenuifolia longa pollicaris crassitudinis radice firmatur, cæq; multitudine lignosa, perenni: caules cubitorum aliquot altitudine emittit, qui vetustate in lignum solidum, durumque degenerant crassitudine digitali, alioqui tenuia Artemisias latifoliae similes, rigidi, r-

bentes, striati, medullâ albâ farchi, alis multis coccini: folia pilosa, albicantia, Seriphii Absinthii tenui diuisura, ad Abrotoni folia accedentia, colore viridi, vbi adoleuerint non multum dissentanea, odore autem multum ad Abrotonum accedente, corymbi rubentes, spicati in ramulis crebri, Abrotoni formâ & colore. Solet non raro ad ramulorum diuicationes musculosum squammarum excrementum ferre.

Tres Artemisias tenuifolias statuit Clusina. An autem commodè ad Ἀρtemisia λεπτόφυλλος, Artemisiam tenuifoliam Dioscoridis hæc stirpes seferri queat, peritioribus dispiciendum relinquo. Prior quodammodo ad eius historiam accommodari posset, quia odorata est. Aliæ, odore carent, aut, si quem habent, is valde tenuis est. Tertie etiam ingratus, quemadmodum & sapor.

An Ruell. lib. 3. cap. 62. Artemisiam quartam mentionem faciens, hæc intelligit, dicens. Artemisia genus aliud, quæ minutis foliis: vulgus Diui Ioannis herbam nominat.

Credide-

*Ambrosia
March.*

Crediderimus nos cum Doctiss. Dalechampio hanc herbam dici apud Match. in prior. comm. Ambrosiam : in post. verò ubi retinet priorem picturam, Ambrosiam alteram: ibidemque depingi: Et in suis illis commentariis, quos primum Italica lingua conscriptos ediderat, ingenue confessus esset, se nunquam vidisse Ambrosiam in Italia.

Gerard. de hort. Artemisia leptophyllos quædam circa Basileam sponte nascens. Gerard. Abrotonum campestre wilde Sothernwood. C. Bauh. phyt. Abrotonum 11. siue campestre tenuifolium.

Tabern. Hist. part. 3. p. 62. Abrotonum campestre, Abrotonum 3. in descriptione & inter nomina, ubi ait ad Herbarius vocari germin. felde Straburg/wild Scabwurz, & Besenfrant/ à copia virgularum, è quibus scopæ fiunt. Latinos quosdam appellare Herbam camphoratam. Idem p. 37. vocat Artemisiam minorem, Fleinen Beyfuss/ Artemisiam peregrinam: p. 38. inter nomina, Artemisiam quartum genus è Gallie provincia oriundum, Artemisiam minorem, & Artemisiam tenuifoliam minorem: Germ. melcher Beyfuss. Tandem p. 60. nominat Ambrosiam tertiam, daß drit Ambrosien fraut. p. 61. Ambrosia tertium genus & Ambrosiam tenuifoliam. Artemisiam igitur minorem Tabernamontani, eiusdemque Ambrosiam tenuifoliam non separo, ab Abrotono eius campestri, quia ex aliorum sententia de iis scribere videtur, nec earum picturas proponit particulares nisi Abrotoni campestri, quam etiam in Icon. p. 16. pictam exhibet.

H. Lugd. p. 950. Artemisia 3. leptophyllos Penz. Item p. 1148. Ambrosia altera Matthioli, quæ multis esse videtur Artemisia tenuifolia. Existimamus nos H. Lugdunensem ponere duas figuras vnius plantæ: ac eas quoque indistincte scribere lib. 10. cap. 31. de Ambrosia.

Artemisia tenuifolia Basileæ ad Rhenum quæritur in Krentzack, prouenit. Montpelii passim in sepibus & agrorum marginibus, ubi totam Hiemem fert, & Autumno floret. Mense etiam Septembri florentem obseruavi Lugduni: inter Mulhausen & Osmarsen in vitibus ad vias: in itinere Argentina versus Stutgardiam multis in locis: Bononiæ in Italia ad montes Apenninos. Reperi quoque in muris Castelli Sponeck Ill. E. C. ad Rhenum, plantam Montbelgardi in Horto eiusdem E. C. ubi Hiemem pertulit, foliis cineritiis, hirsutis, quibus mense Junio depositis, induit longiora & tenuiora. Brisaci abundat, florens adhuc Octobri & Nouembri, in collibus arenosis & secus vias profundas: & iuxta agrorum margines radiis Solis illustratas.

ARTEMISIAE TENVIFOLIAE SIMILE,
si non idem, Abrotonum inodorum Lobelii.

CAP. LXXXIV.

Abrotonum inodorum & insipidum, vultu, folio, flore, & semine Artemisiaz tenuifoliae è collibus Gallo-Belgii alunt Muzonius, Coudenbergius & Iacobus Plateau, harum studiosissimi & cultissimi, inquit Lob. Obs. p. 444. ubi figura cum hac inscriptione. Abrotonum inodorum. Eadem Icon. Plant. p. 769.

Dodon. lat. in fol. p. 16. iconem eandem habet cum Lobelio pro Absinthio inodoro & insipido. Tom. III.

do. Verum descriptio est alterius plantæ, de qua egimus post Absinthium.

Clusius quoque in post. Hist. eandem iconem exhibuit pro Artemisia secunda tenuifolia, cuius descriptionem antè posuimus ex ipso Clusio.

Tabern. Icon. & Hist. Breit Strabwurz/ Abrotonum latifolium: Abrotonum quartum, Abrotonum fatuum: Abrotonum inodorum. Merito nominat Tabern. Abrotonum fatuum. Est enim fatua figura ex Lobeliana nonnihil mutata: & cum latioribus foliis: fatua etiam descriptio & amplificata ex paucis verbis Lobel.

*Abros. lat.
visid. C. B.*

C. Bauh. phyt. Abrotonum 11. siue latifolium, maius & secundum Trago, latifolium Tabernamontani. Ego Tragi Abrotonum aliud non puto à vulgari, si hoc ei cognitum fuit. Et hinc diuersum Tragi statuo, à Tabernamontani latifolio.

Gerardus, qui Abrotonum inodorum vocat, Angl. Unsawrie Sothern wood/ imitatur Tabernamontani. Penz in Baldo, Abrotonum inodorum Penz.

RVTA SIVE RUTANON VETERIBVS.

CAP LXXXV.

Theophrastus de causis lib. 5. vult Rutam plantari, vt quæ sub vmbra Fici arboris libentius acquiescit, velut Palladius ait in Martio. Hoc mense Ruta sentitur locis apricis, foliis cineris insperione contenta. Loca desiderat altiora, vnde humor elabitur. Si ponas semina eius adhuc clausa folliculis, singulatum manu debbis aligere. Si iam minuta sunt, sparsa iactabis, & tastro obducta cooperies. Caules eius, qui inclusis seminibus nati fuerint, fortiores erunt, sed serò nascentur. Ramuli eius cum aliqua corticis parte conuulsi verno tempore pro plantis tenebunt: tota verò translata morietur. Nonnulli ramulos eius pertusæ Fabæ inserunt vel Bulbo, atque ita obruunt alieno vigore seruandos. Prosequuntur etiam maledictis, & maxime in terra soluti lateris ponunt: quod prodesse certissimum est. Sed (vt asserunt) melius turpina proueniet. Sub Fici arboris vmbra libentius acquiescit. Non effodi herba, sed optat auelli. Immundæ mulieris formidat attactum. Et hoc est, quod ante ipsum Plutarchus quoque scripsit: Cur autem dicatur *ῥιτάνον* declarat idem his verbis. *ῥιτάνον δὲ τὸ πικρὸν ἀπὸ τῆς συνήθους ἀπομά-
δαι: πικρὸν γὰρ ἐστὶν διὰ θιμωπῆς τὸ σπέρμα, ἢ ὅλως πολέμιον ἐστὶ ταῖς νύσσαις.* Aitunt facultate sua *ῥιτάνον* dictum, quod siccitate & calore coagulet & condenset semen. Hinc vterum gerentibus inimicum est.

*Ruta plant.
ratio ex
Theoph.*

Palladius.

Superfluo.

Rutam duplicem agnouisse videtur Hippocrates. Et quidem lib. 38. m. m. dicens. Actius subdititium ad menses efficies, si Brasica & Ruta vtriusque [*ῥιτάνον ἰσχυρὸν*] &c. Quales autem sint, non ostendit, id quod Dioscorides fecit.

Ruta inquit, montana & siluestris, satiuâ & hortensi genere aptior esui, quæ iuxta Ficos prouenit. Vtrumque porro genus vrendi vim habet, calfacit, exulcerat, vrinam ciet, menses ducit, at cum cibo, tum etiam potu alium sistit. Semen acetabuli mensura è vino bibitur contra lethalia medicamenta est pro antidoto. Quin & folia per se præsumpta aut cum nucibus iuglandibus aridisue Ficis, venena irrita & inefficacia reddunt. Sed & simili sumpta modo contra serpen-

Bb 2

biurum ictus valent: Genituram seu escaram, seu bibita Ruta extinguit: decocta vero cum Anetho tunc tormina potu sedat. Facit & ad pectoris laterumque dolores, spirandi difficultatem, tussis, pulmonis inflammationem, coxendicum, articulorumque cruciatus, & rigores febrium circuitu repetentes, pota velut ante dictum est. Idem ad inflammationes coli, vulvae, rectique intestini, cum oleo decocta & infusa. Vulvae etiamnum strangulatur medetur, si trita cum melle genitali sede tenuis imponatur. Feruifacit ex oleo & pota lumbricos expellit. Sed & articularis doloribus, ex melle: & aquae subter cutem fusc morbo cum ficubus adhibetur. His iisdem in potu auxiliatur itemque decocta in vino ad dimidias partes & affricata. Cruda quoque conditaque in cibo acie oculorum excitat: quin & oculorum dolores, imposita cum polenta lenit. Caput dolentibus cum Rosaceo & aceto succurrit, ac profluentem naribus sanguinem sistit trita & indita. Testium inflammationibus cum Laureis foliis imposita, & papularum eruptionibus cum Myrteo cerato prodest. Cum vino autem, Pipere ac nitro affricata, vitiligini albae medetur, & cum iisdem illita thymos ac myrmecias tollit. Contra impetigines cum melle & alumine vtiliter imponitur. Succus vero in Mali punici corio (calyce, Sarrac.) calfactus aurium doloribus efficaciter infunditur. Opitularur & aciei oculorum hebetiori, si additis Fomiculi succo ac melle, oculi ipsi eo intingantur. Erysipelata, herpes, & vlcera in capite manantia cum aceto, Cerussa & Rosaceo, inunctione sanant. Ipsa vero Ruta Alliorum, Caparumque grauem halitum emendat, si postea commanducetur. Ac montana si copiosius estur, interficit. Aque si sub id tempus quo florere incipit, ad muric conditura colligatur, cutem rubefacit, ac instat, cum pruritu ac vehementi inflammatione. Eam itaque vinctis antea manibus & facie colligere oportet. Tradunt & succum gallinaceis pullis inspersum feles arcere. Adiciunt vero, eam quae iuxta flumen Haliacmonem in Macedonia gignitur, comedentes interimere. Montosus autem is locus est, ac viperis abundat. At illius semen epotum contra interaneorum vitia est efficax: ideoque antidotis vtiliter immiscetur. Contra incontinentiam vrinae, tostum, septenis diebus potui dato, & cessabit. Ceterum (hic caret vet. usque ad finem) radix huius montanum Moly vocatur. Sylvestris itaque Ruta satius quodammodo similis est. Ac pota prodest comitialibus & ischiadicis: menstrua quoque mouet: ac partus enecat. Acrior vero est quam farina & maioris efficaciae. Attamen sylvestrem cibis abdicare oportet, quippe quae veneni noxam obineat. Plinius lib. 20. cap. 11. vinum & vsum Ruta medicum his verbis declarat. Quaecumque Ruta & per se, pro antidoto valet, foliis tritis, & ex vino sumptis, contra aconitum maxime, & viscum: item fungos siue in potu datur, siue in cibo. Simili modo contra serpentium ictus, & vipere cum mustela dimicaturae cum his, Rutam prius edendo se muniat. Valent & contra scorpionum ictus, & erancorum, apum, crabronum, vesparum aculeos, & cantharides, ac salamandras, canisque rabiosi morsus, acetabuli mensura succus ex vino bibitur, & folia trita, vel commanducata imponuntur cum melle & sale, vel cum aceto & pite decocta. Succo vero perunctos aut eam habentes, negant feriri ab his maleficiis. Serpentesque si vratur Ruta, nidorem fugare. Efficacissima tamen est sylvestris radix cum vino sumpta.

Pythagoras oculis fluxum purauit falsum, quoniam sculptores & pictores hoc cibo vtuntur oculorum causa. Cum pane quoque, vel Nasturtio satius & que sylvestris propter visum: Vt alunt, multi succo eius cum melle Attico inuncti discusserunt caligines, vel cum lacte mulieris puerum enixa, vel paulo succo angulis oculorum tactis, epiphoras cum polenta imposito. Lenit autem capitis dolores pota cum vino, aut cum aceto & rosaceo illita. Si vero sit cephalaea, cum farina hordeacea & aceto. Eadem cruditates discurit, mox inflammationes, dolores stomachi veteres. Vuluas aperit, corrigitque conuersas, illito cum melle toto ventre & pectore. Hydropicis cum Fieui, & decocta ad dimidias partes, potaque ex vino. Sic bibitur & ad pectoris dolores, laterumque, & lumborum tussis, suspiria pulmonum, iocinorum, renum vitia, horrores frigidos. Ad crapulae grauedines concoquantur folia poturis, & in cibo vel cruda, vel decocta, conditane prodest: item torminibus cum Hyssopo decocta, & cum vino. Sic & sanguinem sistit trita & naribus indita, sic & collutis dentibus prodest. Auribus quoque in dolore succus infunditur, custodito, vt diximus, modo. E sylvestri vero contra tarditatem & sonitum cum rosaceo, vel cum Laureo oleo, aut Cumino aut melle. Succus & phreneticis ex aceto trita instillatur in tempora & cerebrum. Adiecerunt aliqui & Serpillum, & Laurum, illinentes capita & colla, dederunt & lethargicis exolfaciendum: dederunt & comitialibus bibendum decoctae succum in cyathis quatuor: ante accessiones, quarum frigus intolerabile est, aliosque cruda datur in cibo. Vrinam quoque vel cruentam pellit, seminarum etiam purgationes, secundasque, etiam emortuos partus, vt Hippocrati videtur, ex vino dulci nigro pota. Itaque illini & vuluarum causa etiam suffire iubet. Diocles & cardiacis imponit ex aceto & melle cum farina hordeacea. Valet contra ileum decocta farina in oleo, & velleribus collecta. Multi vero & contra purulentas excreationes siccae drachmas duas, sulphuris vnam & dimidiam sumi censenti & contra cruentas, ramos tres in vino decoctos. Datur & dysentericis cum caseo in vino contrita. Dederunt & cum bitumine infriatam portioni propter anhelitum. Ex alto lapsis seminis tres uncias illinunt ex olei libra, vinique sextario. Illinitur & cum oleo coctis foliis, partibus quas frigus adusserit. Si urinam mouet, vt Hippocrati videtur, mirum est quosdam dare, velut inhibentem, potui, contra incontinentiam vrinae. Ploras & lepras, cum melle & alumine emendat. Item vitilignes, verrucas, strumas, & similia, cum Itrychno hircino & adipe suillo, ac taurino seuo. Item ignem sacrum ex aceto & oleo, vel Plymmithio: carbunculum ex aceto. Nonnulli Lascipitium vna illini iubent, sine quo epinyctidas pustulas curant. Imponunt & mammis turgentibus decoctam, & pituitae eruptionibus cum cera. Testium vero epiphoras cum ramis Lauri teneris, adeo peculiari in visceribus his effectu, vt sylvestri Ruta cum axungia veteri illitis ramices sanari prodant, fracta quoque membra semine trito cum cera imposito. Radix Ruta sanguinem oculis suffusum, & in toto corpore cicatrices aut maculas illita sanat. Ex reliquis quae traduntur, mirum est, eam fetuentem Ruta naturam esse conueniat, fasciculum eius in rosaceo decoctum addita vicia Aloes, perunctis sudorem teprimere. Itemque generationes impediri, hoc cibo, ideo profluuii genitrali datur, & Venerem crebro per somnia imaginantibus. Praecauendum

cauendum est grauidis, abstinere hoc cibo, necari enim partus inuenio. Eadem ex omnibus sanis quadrupedum quoque morbis in maximo usu est, siue difficile spirantibus; siue contra maleficorum animalium idus, infusa per nare ex vino, aut si sanguisugam exhauserint, ex aceto, & quocunque in simili morborum genere, ut in homine temperato.

Galenus breuius utriusque vires sic tradit. Ruta agrestis ex quarto est ordine excalfaciendum & siccantium, domestica vero ex tertio. Est autem non solum gustu acris, sed & amaro. Ea digerere atque incidere crassos lentosque humores potest. Ob eandem vim & vias mouet. Quin & tenuiam est partium, flatulque extinguit. Quare ad inflationes competit, ac Veneris appetitum inhibet, digeritque atque exsiccant sanè itrenuè. Est enim ex eorum numero medicamentorum, quæ valenter desiccant.

Sunt porro qui Rutam Rhyten, Aegyptii Epnubu, Syri Arnala aut Befala, Aphri Cutina dicant, teste Dioscoride inter notha. Meminerimus autem cum Dioscorides dicit Rhyten ab aliquibus vocari Rutam, Nicandrum Poetam & Peloponnesi incolas indicari. Siquidem Iolaus antiquissimus Graecorum scriptor, & cuius nomen vel olim tantum audiebatur, in Peloponnesiis retulit suis, quam tota Graecia Peganon vocabat, Peloponnesum Rhytem appellare. Nicander certe in Theriacis suis de Trifolio suo quod Menyanthes Graeci vocant, agens, id habere ait comam quidem Loto, odorem vero Rutæ similem. Ex his manifestum est, inquit Marcell. Virgilius, Rutam ab aliquibus Graecis *forma* dictam fuisse. Nec dubitandum alicui à Peloponnesiorum Rhyte, Latinos Rutham suam fecisse. Frequens enim graeca y. litera in latinam v. mutatio est, quoties seruatis ceteris transferendum à Graecis ad Latinos aliquid est.


Caeterum Rutæ cognominatæ plantæ sequentes nominantur. Ruta maior hortensis Aduers. Ruta sativa nostra. Ruta siluestris & agrestis Aduers. Ruta siluestris maior nostra, Ruta Gesneri. Rutula, Ruta minima, angustifolia, Aduers. Ruta silu. minor nostra, capitulo quadripartito. Ruta siluestris alia Dioscoridi, in Capadocia & Galatia Asiae Moly dicta, nobis Ruta quæ Harmala. Quam Rutam pratensem Lutetiae, aliqui vero circa Sabaudiam, non rectè Rutam caprariam vocant, nominamus nos Thalictrum Gesneri maius folliculis angulosis. Ruta pratenfis Lobelii Obs. p. 309. appellatur Thalictrum maximum, semine striato, folio ex caeruleo virente. Quæ Ruta foetida siue lutea ab Aduers. titulo de Sophia p. 328. nominatur, Thalictrum semine striato folio saturatus virente à nobis inscribitur. Ruta pratenfis minor quorundam, est nobis Thalictrum minus. Ruta palustris, Filipendula palustris Tabernamontani, dicitur Oenanthe. Rutam pedicularem Tabern. Fistulariam purpuream Schuvenckf. simpliciter Pedicularem appellamus. Rutam caninam Recentiorum, Scrophulariam tertiam Dodonæi cognominamus. Rutam caprariam vocari Galegam patet H. n. g. lib. 17. Rutam siluestem multi statuunt herbam quæ dicitur Hypericum. Ruta siluestris Dioscoridis, quam à Ruellio inter notha reiectam esse Placa dicebat, est Clusio Hypericum supinum, nobis tomentosum. Ruta capraria Gallorum Monspelii vulgo sic dicta, traditur H. n. g. lib. 17. pro fruticant.

Tom. III.

te, siue Polemonio Monspellano. Ruta vinacea quorundam Ruellio lib. 3. cap. 62. est nobis Botrys altera. Rutam lunariam, Rutam iecorariam Tabern. vocamus Lunariam minorem. Ruta parietum vulgi Gesnero de hort. vocatur à nobis Ruta muraria. In nothis Dioscoridis Romani statim satiuam appellant Rutam. Istam vero siluestem, Rutam minorem. Rutam tandem appellatio, quo pacto ad Tussilaginem peruenit, merito sane miratur Tragus. Vide Dioscoridem lib. 3.

Botrys ab
tera.
Lunaria,
minor.
Ruta mu-
raria.
sativa.
Tussilago;

RUTA SATIVA, VEL HORTENSIS.



I Vre inter frutices Rutam reponunt lignosi dense fruticantes rami, cubitos duos alti, maioresque, quos alæ diuidunt frequentes: folia vitoso odore, perindeque ingrato sapore, subcærulea, terna sexpè, vel plura, Trifolii fruticatis, flores stellati ex extremis ramulis breuib⁹ quinq^{ue} carinatis foliis, in quorū singulis singula stamina toridem intercedentibus, colore herbaceo ex luteo præditi, vinctone pyramidato ex atro virente, medium occupante: calice quadripartito, ac etiam quinque partito, in quo semina nigra.

Cordi diligentis Botanici descriptionem omnibus numeris absolutam merito subscribimus. Ruta sativa maior siue latifolia, inquit, frutex est caudice cubitali, aut altiore, crassitudine digitali, colore cinereo, in multos ramos diuisus: ex his Veris initio plures emittit, longos, teretes, egregie virides & flexiles furculos, in quorum summitate Veris exitu, & Aestate inæquali ordine flores sunt Leucois similes, minores tamen, quatuor aut interdū quinque, luteis & cochlearis modo concavis foliis constantes, sursum spectante eorum concavitate, in medio flore quadripartitum, aut nonnunquam quinquepartitum est capitulum, colore viride, exiguum quendam apicem habens, stamina ab ima eius parte exeunt lutea, octona aut dena in latitudinem resupinata: ex his medius numerus supra foliorum concavitate extenditur; reliqua autem quatuor foliorum spaciis interposita sunt, semen in mediis florum capitulis fert paruum, in rotundo modicè oblongum, colore nigrum, folia omnibus ramulis adnascuntur, in longis pediculis incerto ordine disposita, parua, in plures & inæquales partes secta, viridia, mollia, & pingua: ex his maxima pars semunciam longitudine non excedit, latitudine multo minore. Radice nititur ex vno principio multifida, numerosa, capillamentis fibrata, colore flaua: viret tota Hieme, non flaccescentibus foliis, antequam nouo Vere alia enascantur, quo tempore etiam surculi qui

Bb 3

semen protulerunt, in summitate exarescunt: coma eius acrem, aromaticum, interinque graue spirat odorem, eadem sapore amaro, seruido & tenui palatum excalescit, maxime vitidia adhuc florum capitula. Colitur in hortis.

Ceterum, est & altera Ruta satiuā, tenuifolia scilicet, quam ita Cordus ita describit. Ruta tenuifolia latifolia per omnia respondet, præterquam quod multo minoribus constet omnibus partibus: folia siquidem Fumariæ modo in exiles partes diuisa habet, non tamen in tantam latitudinem diffunditur: floribus & capitulis latifolia similiter respondet: semen habet oblongum, nigrumque gustu vehementer acre: reliquarum partium qualitas & sapor latifoliam æmularur. Scribiturque similiter ut illa in hortis, parce apud nos, sed frequentius Italis quibuldam locis, ubi hanc tantum Rutam nouerunt.

Rutam satiuā in latifoliam & tenuifoliam diuidit quoque C. Bauhinus. Tenuifoliam quidē vocat Rutam hortensem alteram, Rutam hortensem minorem Tragi, Rutam Matthioli. Anguill. Lacunæ, Cast. Rutam satiuam tenuifoliam Cordi: Hortensem nobilitate præstantem Gesn. hort. Tenuifoliam Tabernamontani.

Cornarius autem appellat hanc Rutam minoribus & herbaceis coloris foliis. Latifolia dicitur Cordo in Dioscor. Ruta & Ruta satiuā. In Histor. Ruta satiuā maior, siue latifolia, quemadmodum & Tabern. Trago Ruta domestica, Ruta vulgaris. Lobelio in Aduers. Ruta maior hortensis. Ruta hortensis in Obs. p. 306. In Icon. Plant. Tom. 2. pag. 42. Camer. hort. & Hort. Lusit. Ac Fuchsio. Ruta hortensis vulgaris Turnero. Ruta domestica Hier. Braun-schweig. Aliis ut Corn. simpliciter Ruta. Celsus. Ruta satiuā latioribus foliis. Dod. Ruta graueolens hortensis.

Nomina
linguarum

Ruta Gr. Ruta Lat. G. Rauten / & wein-rauten / sam Rauten. Belgis Ruyte / & wyn-ruyten. Gallis Rue, Rue de jardin. Itali Latinam seruant nomenclaturam. Hisp. Ruda, Aruda. Anglis Rue. Boh. Rauta. Hung. Zeges, Rurha, h. e. angulosa Ruta. Maurit. Sadeb, seu Sedab. Phrisius Hebreæā linguā Rutam *schafes* vocat, Chaldei & Thalmudistæ *Mechul* & *Pigam*. Quidam semen Rutæ *Bizeri Salgagel* dicunt.

Locus &
tempus

Rutam surculo nasci aliquoties compertum habemus. Hæc culta (ut se vidisse testatur Camer.) ita in altum crescit, ut etiam tres cubitos superasse visa sit, ac admodum est longæua, cuius radix tandem planè lignescit, quæ si accenditur suauem & tempore pestis vtilem emittit odorem. Ruta subsalso alimento redditur melior, ut Erucæ. Meminit Iosephus in Machæo Rutam fuisse regiam mirabilis magnitudinis, quæ à nulla Ficu, vel celsitudine, vel magnitudine vinceretur. Eam autem ex Herodis temporibus perseverasse. In Germania nostra moris est Rutam Saluæ adiungere, cuius hanc afferunt rationem: Buffones amare loca Saluæ confita, qui ut abigantur, Saluiam Ruta muniri oportere. Rutam satiuam vidi Monspelii, Lugduni & Bononiæ in hortis, ut in horro di S. Saluator al Burgo di S. Catharina, Geneuæ florentem adhuc Octobri, Montbelgardi Iunio, ubi gelu nonnunquam absumebatur, verum rursus facillè ex semine proueniebat.

Ruta, ut experientia testis est, ferculis abdicatur, nec culinæ seruit propter iniucundum, quæ habet odorem, & saporem quæm obtinet feruentem, quo homines grauiter afficit. Quia autem

omni penè veneno resistit, idèd peculiaris sit pauperum Theriaca. Est enim tantarum virium, ut eas neminè satis describere posse arbitretur Tragus. Attenuat, ut prodidit Matthiolus, incidit, digerit, resoluit, prouocat, & status potenter pellit. Rutæ vires in longum prosequitur Tabernamontanus, quas in gratiam germanicæ lingue ignarorum ita reddere studimus. Ruta facultatis est calidæ & siccæ, resoluētis, penetrantis, & digerētis. Est calida & sicca in tertio gradu, singularis & approbata Theriaca contra omnia venena, idèdque magna cum utilitate intrinsecus assumitur: extrinsecusque adinouetur. Herba vna cum floribus colligitur, & in vmbra siccat: Semen verò in Autumno, bene maturum. Nemo satis vires & facultates Rutæ inuestigare potest. Hoc siquidem impossibile ferè est. Et licet multa à veteribus de huius operatione & vlu sint prodita, attamen præterire nolui, quæ ipsemet expertus sum adscribere. Ruta igitur in subtilem puluerem redacta, drachmæ pondere calidè ex vino hausta, fugat dolorem capitis à causa frigida ortum. Recentis in mortario lapideo contritæ succus vnciarum quatuor, in eoque drachma semis Asæ fœtidæ dissoluta, calidè bibita, salutaris est medicina morbis caduci: sanat etiam clauum, diuturnum capitis dolorem. Soliti fuere veteres Rutam sale condire, annum seruare, eamque comedere, ut claros sibi compararent oculos. Quidam, quia quolibet anni tempore recens haberi potest, viginti diebus, quolibet die viginti foliola cruda, purgato tamen prius corpore, sumunt: vnde magnum iuuamen sentiunt. Alii siccam redigunt in puluerem subtilissimum, de quo drachmam in vino hauriunt. Quocunque verò modo usurpata dolorem oculorum à frigiditate & humiditate prouenientem corrigit. Cum a nerho exsiccat cocta, iusque colatum bibitum, mitigat dolorem thoracis, laterum, & tormina. Item difficultati spirandi succurrit, tussi & inflammationis pulmonibus. In quibus & similibus affectibus par est accipere hucus & Hyslopum. Hæc simul in vino cocta valent aduersus iccoris & renum vitia: item Ischiadicis affectus: menses mouent: horrores febrium abigunt. Alii accipiunt Rutæ manipulum vnum, coquunt in mensura vini ad consumptionem tertie partis, colant, in colatura dissolunt Sacchari Vnc. 4. De hac bibunt mane & vespere calidè Vnc. 4. Valet aduersus dolorem thoracis à frigiditate ortum. Folia Rutæ aut sola separatim, aut etiam cum semine in generoso vino albo ad tertie partis consumptionem incoquantur, sit colatura, quæ calidè bibitur. Pellit hæc à corde vapores, aperit, thoracem & pulmonem à frigidis crassisque humoribus obstructum, faciliat respirationem, vrinæ ciet, menses prouocat, secundinas & fœtus mortuos educit. Salutare est remedium contra hydropem. Ruta & Saluæ æquales partes contusæ & cum sale commantæ, subueniunt dolenti stomacho, repleto cibis crudis & incoctis. Pulueris Rutæ drachma semis cum vino calido pota confortat stomachum puerorum frequentiori vomitu debilitatum. Aut accipe Rutæ siccæ scrupulum vnum, Thuris albi grana octo, pulueriza, da infanti scpius euomēti cum syrupo rosarū rubrarum. Rutæ enim veteti vino coctæ iusculum colatum & ebibitum, medetur singultui à flatibus oborto. Idem potest Semen drachmæ vnius pondere dicto modo haustum. In oleo coctæ colatura bibita enecat vermes & lumbricos. Pulueris Rutæ & drachmæ pondere pota, idem

idem potest. Sed & herba in vino aut aqua co-
cta pota idem præstat. Vel coquantur Rutæ ma-
nipuli duo, Absinthii montani manip. i. in aqua
ad consumptionem medieratis, colaturæ manè
& vesperti propinetur cyathus vnus, calidæ. In
summa quoque modo sumpta Ruta non sine comodo
administratur. Hæc & alia quam plurima habet
Tabernamontanus, ex æmilio Macro in longum
translata, & passim inserta.

Ruta tandem quomocunque vsurpara, in-
ternè & externè oculos reddit acutos & claros,
lacrimaliq; exsiccat. Idem hoc monet Schola Sa-
lern. libro de conferu. valetudinis, his Versibus:

Nobilis est Ruta, quia lumina reddit acuta:

Auxilio Ruta, vir lippo videbis acutè.

Conuenientissimum tempus destillandi Rutam
est in medio Marii. Destillantur autem folia cum
cōmis minutim prius incisa in Balneo Mariæ.
Pro qualibet porro mensura aquæ, requiruntur
Vnc. 4. Rutæ recentiter exsiccatæ in puluerem cras-
sissimum contrita. Digeruntur hæc 24. horis in
in Balneo Mariæ, distillantur secunda vice, re-
tificanturque Sole. De hac aqua singulo mane
& vesperti, dūz aut tres vnciæ potæ medentur
vertigini frigide, morbo caduco, singultui, & de-
nique omnibus capitis affectibus frigidis: ene-
cant vermes; caleraciunt refrigeratum thora-
cem & pulmo rem: item stomachum, hepær & lie-
nem: sedant tussim à decidentibus humoribus o-
bortam. Obstructos pulmones aperiunt: diffi-
cultatem spirandi tollunt: flatūs dissipant, tor-
mina sedant, & murmura: menses promouent
& secundinas: Vitum acuiunt supra omne aliud
medicamen, ita quidem vt nonnulli testentur, vt
qui dicto modo hac aqua vtatur, stellas in celo
de die zquè clarè visurus sit, ac nocte. Huc spe-
ctare videntur versus hi:

Feniculum, Verbena, Rosa, Chelidonia, Ruta:

Ex his confice aquam, quæ lumina reddit acuta.

Resistunt porro venenis præsertim pesti mane
ieiunè Vnc. 2. aut 3. bibitæ. Medentur febribus
item canis rabidi morsui quadraginta diebus po-
tæ. Eos, qui castitatem deuouerunt & iurauerunt,
multam iurat quoridie Vnc. i. semis hausta. Os a-
quâ Rutæ, & gingiuar, sepius collutæ, vlcera
eorum sanat. Manus tremulæ hac lotæ, nec ab-
stergæ, à tremore liberatæ non raro obseruatæ
fuere. Polypum naribus indita curat, & cerebrum
purgat.

Vinum & Rutâ aliquibus quondam in vsu fuisse,
facile est colligere ex his, quæ sequuntur, Schol.
Salern.

Salvia cum Ruta faciunt tibi pocula ruta. h. e.

Salbey vnd Rauten vermengt mit wein

Lassen dir den trunck nit schädlich seyn.

Cæsar Constantinus lib. 8. de Agricult. ait vinum
Rutaceum, siue Peganites calidæ naturæ esse, ve-
nena sumpta expellere, & moribus venenato-
rum animalium resistere. Marcell. Empiricus
commendat vinum hoc contra dolorem infimi
ventris & colicam. Sed proficeret quoque iis,
qui castitati student. Quare si quis hoc expete-
ret, hoc vt alia vina, Absinthites nimirum, Sal-
tiatum &c. præparabit.


Rutæ conferua fit hoc modo. Recipitur co-
marum Rutæ recentis & foliorum Vnc. i. Sac-
chari albißimi Vnc. 3. Comæ cum foliis in lapi-
deo mortario tūduntur cum pistillo ligneo: dein-
de iis optime tulsis saccharum in puluerem tri-
tum aduectur: rursus omnia simul tantisper tun-
duntur, donec in vnum corpus redigantur, &

deinde pixide vitreâ insolentur per mensem. De
hac sume ieiunus contra pestem Vnciam semis.

Acetum ita conficies. Accipe comas cum
foliis, pone super linteam 24. horis vt aliquomo-
do staccescant, postmodum conscinde, phiolam
imple, superaffunde vini acetum optimum, ob-
tura, & insola: post duos menses cola, & serua
ad usum. Præstat tempore pestis in cibo vsurpa-
tum. Item labiis, naribus & temporibus illicitum.
Sic & spongiâ susceptum odoratum. Meminit
etiam Tabern. Rutæ succi inspissati ex ipsa her-
bâ sicca parati, vt eiusdem quoque extractum
paratur. Rutæ sal fit vt Artemisiæ. Eius vsus est
aut per se, aut cum aliis medicamentis permix-
tus.

Vt oleum conficias. 1. Rutæ recentis incise
& contusæ ℥iij. Olei veteris lib. i. Macera ad So-
lem aut in loco in calido aliquo, diebus quindecim,
deinde in duplici vase coquito, & abiecta
Ruta priori recentem iniicito, & iterum quin-
decim diebus macerato, postea simili modo co-
quito, & abiecta Ruta priori recentem iniicito,
& iterum quindecim diebus macerato, postea si-
mili modo coquito, & exprimito, & tertio re-
centem Rutam iniicito, macerato coquito &
colato. Est calidum aperitiuum, resolutiuum, &
mitigatiuum dolorum: calfacit renes, vesicam,
matricem: & sedat dolores eorum, & maxime
colicam, si venter vngatur, & fiat ex eo oleo cly-
ster: præterea opitulatur nervis, confert spasmo,
& expellit frigidos humores.

RUTA SILVESTRIS MAIOR.



Ruta silue-
stris ma-
ior, vt minora
multo tenuio-
raque habet
folia, quam
hortensis, ita
maiora quam
altera silue-
stris, quamuis
vtraque acer-
rimo ac viro-
so est odore,
quamque im-
pure tenellis
partibus ne-
nequaquam
adimoueris:
flores exci-
pientia ca-
pitula mul-
ta sunt, quam

in siluestri altera maiora, nec vt illius qua-
drangula. Hæc prouenit Montpelij cum se-
quenti.

Matth. in Dioscor. vocat Rutam siluestrem,
quam ait in Goritienfi agro inueniri copiosam.
Is in post. comm. pingit nomine Rutæ silu. re-
prehendens eos, qui Rutam hanc eandem purant
cum Hyperico. Vtrum autem Matthioli hanc
siluestrem intelligat, vel minorem asserere non
ausum. Figura demonstrare videtur maiorem.
Qui fuerunt in Goritienfi agro, aut adhuc sunt,
nos moneant.

Anguill. Ruta proueniens in montibus Apu-
liæ venenata. Item: Ruta silu. nota in Apulia

nomine Harmel, & Ruta saluatica, de qua satis Dioscorides: potest videri in horto Patauino.

An Turn. part. 2. pag. 121. Ruta siluestris ex semine, à D. Gesnero?

Dicitur Gesnero de hort. Ruta silu. maioribus foliis. Trago Ruta siluestris, quam ait in Germania non lepe vilam: Eius semen primum ad seminale Gesnerum, quod ubi seruisset, plantulam ipsi exiguam natam, quæ tertio primum anno flouerit. Quod ad formam pertineat, ad vulgare penè hanc accedere, foliis tamen, & nodosis floribus, ac semine multò illà exiliorem, teneriorem, molliorem, & magis incanum. Caule præterea præditam frequentiore & altiore, deinde & odore graniore, ita quidem vt etiam capitis dolores prouocet. Saporem obtinere ingratum & ad amariandam quandam vergentem. Augusto mense florere, Autumno verò maturefcere. Cuius semine dicitur *semen dycus*, non tamen eam esse quam Dioscorides ab initio capitis Androsæmon, Hypericon, Chamæpytin, Hederalem, Coriandron, & Churina seminaçed appellat. Fieri autem posse, vt ea sit quam dicant Harmalâ & Belasam, & quam Galenus Moly vociter, quæ optimo nobis non placet, licet eius figuram non improbenus.

Synon. &
Nomina
linguarum

Lob. in Aduers. Ruta siluestris siue ærestis. In Obs. p. 54. Ruta silu. montana. In Icon. Plant. p. 5. Tom. 2. Pegmon, Ruta silu. montana. Castori, Bursfel, Cordo, Carol. Steph. Bacchanello, Apollin, Dodo: gall. & passim Gesnero, Ruta siluestris. Latunc Ruta silu. prima. C. Bauhin. apud Matthioli. Ruta silu. latifolia. Tab. Icon. & Hist. Ruta montana, Germ. wild ramer, Belg. wilde ruyre / Gallis Rue sauvage. It. Ruta siluatica Phil. & da saluaga. Harmel Officinis secundum Lobelium in Obs.

RUTA SILVESTRIS MINOR.

Descriptio



Ruta siluestris altera, seu minor, cubito altiorē emittit caule, cuius scapus in furculos crebros, breues diuiditur, confertis floribus herbaeis onustos, quos delapsos sequitur capitula tetracocca, sed multò minora quàm præcedentis: folia satis crassa, tenuissimè dissecta: feruor & virus

siluestris maioris Rutæ.

Gesnerus de hort. vocat Rutam siluestem minoribus foliis: Tabern. Icon. & Hist. Rutam siluestem minorem. Rutam siluestem tenuifoliam C. Bauhin. apud Matthioli. Camer. & H. Lugdunensis. Rutam siluestem minimam Dodon lat. in folio. Lobelius in Aduers. Peganiū Narbonensium, siue Rutulam: In Obs. pag. 107. Rutam siluestem: In Icon. pag. 54. Tom. 2. Ru-

tam siluestem, Peganiū Narbonensium, siue Rutulam.

Lugduni habebam in horto. Multis in locis prouenit Mospeli, sed maximè propè Castelneuf inter saxa: flouet circa Aestatem, semina profert Septembri. Geneuæ habui in horto florentem Iunio, pulchrè virentem Nouembri & Ianuario.


Locus & tempus.

Ambæ Rutæ siluestris acerrimæ sunt & grauissimi odoris, quæ attractu cutem multum vitiât, maximè faciei, si attingatur etiam solum manibus eâ infectis. Narrabat præceptor Rondeletius peregrinum quendam Mospelium petentē, hanc nactum in itinere collegisse (quia audiisset pestem Mospelii) naribus appoluisse, diūque manibus retinuisse, vnde oborta sit maxima inflammatio.

Vires

RUTA QUÆ DICI SOLET HARMALA;

CAP. LXXXVI.



Ruticosa hæc est planta, multos ab vna radice emittens cauliculos, pluribus ramis donatos, pedales, ex viridi nigricantes: in quibus folia oblonga, densa, siue pinguis & carnosa, saturè virentia, multifida, Nappelli tenuifolia (quem quidam Antitorā vocant) foliis non valdè dissimilia, gustu

lento, gummoso, amaro, aliquantulum tamen mordaci: flores in summis ramis candidi, quinque foliolis constantes, multis in medio fibris luteis præditi: deinde capitula hortensis Rutæ capitibus maiora, molliora tamen quàm illa, & triangula, semine referta inæquali, anguloso, ex rufo nigrescente: radix dura est, minimi interdū digiti crassitudinem æquans, fibrosa, colore ex luteo pallescente. Tota autem planta graueolentis atque admodum ingrati odoris est: sic describit Clusius.

De ea autem hæc tradit Dioscorides. Vocant, ait, etiamnum siluestem Rutam, quod in Cappadocia & Galatia Asiatica Moly dicitur. Frutex est ab vna radice complures virgas proferens: foliis multò quàm alterius Rutæ longioribus ac tenuioribus, illisquæ graueolentibus, flore candido, capitulis in cacumine paulò quàm satioribus Rutæ maioribus: quæ quidem tribus maximè partibus constant: in quibus triquetrum semen subfuluū, gustuque perquam amarum recluditur, cuius etiam est vsus. Id Autumno maturefcit, tuncque conuenit ad retusam oculorum aciem, si cū melle, vino, gallinaceo felle, Croco, ac Fœniculi succo teratur. Sunt qui Rutam hanc Harmala vocent, Syri Belasa, Cappadoces Moly, quoniam quandam cum Moly seruet similitudinem: siquidem radice nigra est, flore verò candido. In

collibus

C. Bauh.
160.

collibus ac læto fecundoque solo provenit.

Moly Gal. Non esse autem verum illud Homericum Moly, hanc siluestrem Rutam, inquit Cornarius, Dioscorides aperte docet, dum ait Cappadoces ipsam Moly vocare ob similitudinem. Indicatur & ex eo, quod mox consequenter de vero Moly Dioscorides agit. Moly tamen, ut auctor est Galenus, quidam Rutam siluestrem nominant, alii Harmala, Syri Befala, sicut Cappadoces Moly, ed quod radice nigrum est, florem autem lactosum habet. Et rursus de Ruta agens Galenus ait. Quod in superioribus Moly, & Befala nominari diximus, fuerit etiam ipsum sylvestris Ruta. Hæc à Galeno ex Dioscoride transcripta, videntur partim indicare, Rutam illam siluestrem Moly vocari, ob similitudinem radicis & floris ad verum Moly: partim non aliud esse Moly, quam hanc ipsam Rutam silvestrē. Et hoc magis adhuc inde colligi potest, quod Moly non habet, sed Mylem vocat, quam Dioscorides pro vero Moly proponit.

Moly Gal. Plinius Rutam Galaticam vocat, sed eam Moly, aut aliis nominibus appellari non tradit: Moly tamen verum clarissime describit.

Moly Gal. Officinæ hodie Harmala appellationem agnoscunt, ipsamque ad Rutam silvestrem referunt. Multa porro hæc Dioscoridis capite leguntur, quæ ad Hypericum pertinent, de quibus alibi dicemus.

Nominat hanc Bellon. Obs. lib. 3. cap. 50. Rutæ speciem, Harmalam. Qualceb. Rutam silvestrem, quam ait Arabes Harmel, ut priores de ea scripserunt, appellare. Rutam hanc silvestrem Qualcebeni legitimam esse Harmalam rebus quoque probat Matthiolus, quum omnibus illi respondeat notis, eam pingens & describens in post. com Lat. & Ital.

Gesl. de hort. Harmel, Harmala. Item Ruta silvestris, Rutæ tertium genus apud Dioscoridem.

Hanc græcè *παραμαρι* appellari testis est Dioscorides, inquit Clusius: Cappadocibus autem *μυω*, alii *αμμολα*, Syris Befala dici: Latini Rutam silvestrem & Harmalam vocant. Castellani *Gamarfa*, & *Cog. mbrillos amargos*, id est, exiles Cucumeres amaros nuncupant.

Lobel. in Aduers. & Obs. p. 508. querit an Harmala Syriaca [ita enim hanc nostram præsentem plantam vocat] sit Sesamoides magnum Dioscoridis? Existimat autem non in scitè Sesamoidem maiorem vocari posse. In Leon. Plant. p. 95. vocat Harmalam Syriacam. Castor Rutam silvestrem alteram ut Camer. hort. In Epit. & Hist. Math. germ. Rutam silvestrem Harmolam. Hist. Lugd. Rutam Harmolam Matthioli. Cæsalp. Harmel Constantinopolitanum. Harmalam, Dod. lat. in fol. Clus. Hisp. & Hist. post. Tabern. qui & Moly Galeni vocat. C. Bauh. apud Matth. Rutam silvestrem magno flore.

Locus & tempus Bellonius Obs. lib. 2. cap. 21. ait arenosis circa Alexandriam locis Ægypti nasci. Plurimam in Castella nova circa Madritum & Guadalaiara, collibus & læto solo provenire prodidit Clusius florere Iulio & Augusto, semen. Septēbri maturescere. Sed & florere & semine prægnantem esse etiam Octobri. In Belgica satam aliquot nonnunquam annos perdurare, sed vix aut raro admodum ad florem peruenire, utpote quæ non secus ac Ruta montana, frigoris sit valde impatiens. Viennæ autem aliquot etiam annos semine natam se aluisse idem testatur, sēpif.


Tom. III.

simè egregiè florentem; aliquando etiam deceduo flore trigona capita proferentem, quorum tamen inane esset semen. Ruta, quæ Harmala à Dioscoride dicitur, ex semine copiose nobis provenit Lugduni, eius radix perennis est. Provenit etiam Genevæ semine ex Italia à Cortulso misso. Montbelgardi in horto E. G. W. semine quod receptum erat ab hortulano Ducis Florentiæ, quod floruit quidem, sed non maturuit semen, frigoreque hyberno periit.

Auctor est loco citato Bellonius, apud Arabes, Ægyptios & Turcas vario in usu esse: præsertim vero hanc apud eos inualuisse consuetudinem, ut eius summo singulis diebus manè suffiantur, sibi persuadentes, noxios spiritus hac ratione abigi. Quæ res illi herbæ, & eius semini, tantam celebritatem peperit, ut nullæ sint adeo viles Institutorum officinæ, quæ eam non habeant, tanquam preciosum aliquod medicamentum. Rutæ huius semen datur ad purgandum bilem atram magno auxilio, si Matthiolo credimus, paraturque potandum hoc modo. Coniiciuntur in mortarium seminis grana xv. prius clarissima aqua abluta, & deinde ligneo pittillo teruntur, affundunturque aquæ vnciæ iv. eodemque pittillo aliquantisper miscentur. Demum linteolo percolatur cremor, cui adduntur mellis optimi vnciæ tres, & olei Sesamini, aut Amygdalini vnciæ duæ: & id omne propinatur melancholicis: facit enim copiosas vomitiones. Nec est hoc medicamento aliud valentius ad comitiales. Scribunt Arabes huius Rutæ semine inebriari homines, adeo ut subinde diutius dormiant. Id quod maxime confert in eo melancholiæ genere, quod ii heros appellant. Recipitur etiam hæc ruta silvestris nec levis est momenti in Pylularum fætidarum dictatum compositione.

FVMARIA VVLGARIS.

CAP. LXXXVII.



FVmaria vulgaris Descriptio
gustu tota amaro radice est mediocriter crassa, albâ fibrosâ modicè: caules multi, brachiati, quadratique glabri, colore partim purpurante, partim in albo virente: *stia* ex longis pediculis latiusculis & angulosis, tenuissimè incisa, glauca: flores quasi in spicâ congesti, re-

nuës, oblongi, labellis duobus, ut plurimum purpureis aut violaceis, virore tantillo variegatis, inter quæ folia bina, alba inferiùs, apicibus atro purpureis cœuntia, in medio staminula quædam tenuissima, crocatis apicibus donata: alias flos

Cc

totus albus, alias purpureo-violaceus: semen succedit minutum: rotundum, ex distula & longa spica.

Fumaria
Diosc.

Fumaria Dioscoridi fruticosa est herbula (herba Ald.) Coriandri similitudine (in Hordeo nascentis, addit Lac. non necessarium cum ex alibi reportatur) præterea, solitis candidioribus, & cineracei coloris, vndique numerosis, flore purpureo. Hanc aliqui inter nothas appellationes Corydalion, à foliorum Coriandri diuisura, aut Corion, id est Coriandrum, vocant: alii Corydalion silvestre, alii vero Capnon in legetibus hordaceis nascentem. Plinius tamen adiecit & hortis, nec male, quoniam frequentior in hortis [in vineis & circa vias etiam non raro] quam in legetibus reperitur: alii Capnitea seu Capnion, alii marmariten, alii Capnogorgion, alii Chelidonium paruum, alii Peristemon, alii Cantharida, alii Calcochrum, Romani Apium seu Fumariam, Aegyptii Crix, alii Tucin.

Synonyma

Quia porro hæc passim nota, & ob id non longius tractanda: *Fumaria* dicitur Matthiol. Trago, Fuchf. Lacunæ, Cordo in Diosc. Gein. hort. (cui Capnium etiam & Capnus uti Galeno) Lonic. Dodon. lat. in fol. Hist. Lugd. pag. 1292. Camer. Epit. & Hist. Matthioli germ. Cæalp. & Tabern. *Fumaria* maior Castori. Fumus terre, Brunfels. Camer. hort. (cui & *Fumaria* vulgaris,) & Thaho. *Fumaria* herbariorum, & Cæfolium felinum Schvvenckfeldio. Capnos Turn. Dod. gall. Anguill. Lobel. Obseru. p. 427. Icon Plant. pag. 757. Aduers. p. 338. [ceu & *Fumaria*] & Clusio, cui & Fumus terre vulgaris. Capnos alia Plum Corn. in Dioscor. lib. 4. Embl. 94. & Capnion herba. *Fumaria* siue officinarum & Dioscoridis C. Bauh. Phyt. qui eam floris colore variare scribit, violaceo, pallidente & albo.

Fumariam inquit Marantha, flore purpureo depingit Dioscorides, sed candido etiam inuenitur, quæ tanquam meliote Neapoli (licet magno errore, si Meliæo credendum sit) vtuntur. Fortè & hanc nouit Dioscorides, sed quia putabat eandem esse noluit distinguere. Arabes valentior em esse existimant eam, quæ purpureo flore constat, ac cum experientia comprobassent, eam distinxerunt, & alius prætulit.

Apollinarem sub nomine Erdtrauch loqui de *Fumaria* colligere licet ex nominib. & facultatibus, non item ex figura, quæ quoniam sit referenda, nos latet.

Nomina
linguar.

Herba quæ Græcis *καπνός*, *καπνίον*, & *καπνίον* dicitur, Latinis quoque Capnos & *Fumaria* nominatur, sed potest & Fumus & Fumida dici. Hebræis *Nihilalimen*, Priso in synonymis, Arabibus *Schehiterig* siue *Saberegeri*, *Scheh erum* Trago, Officinis Medicorum Fumus terre, Germ. Erdtrauch / Daubentropf, Ninnenfrant / Cordo in Dioscor. Barzenförfel Trago, & Dod. Barzenforuel Lob. & Jeterfeld: oder wilde Rau- gen quibusdam Cordo in Dioscor. sed malè. Belg. Gryscem / Duyuefrietel, & Erdtrood. Gallis Fumeterre. Hisp. Palomilha. Ital. *Fumaria* & *Fumoterra*, itineque Fumoterno. Angl. Fumoterry. Bohem. Poluitrusta. Hung. Föd épéye, h. e. Fel terra.

Fumaria
cur dicta

Fumariæ autem herbæ notissima res fumus nomen quondam fecit: haud sanè quia tricliniorum parietibus eorundemq; cameris inducta nigredine notèat: Sed quoniam vis illi contra hominis oculos lachrymosa sit, qualis in fumo est.

Locus &
Tempus

Fumaria multis in locis in hortis ac secus vias spontè prouenit. Montbelgardi in horto acvi-

neis etiam Ill. B. C. floris Aprilis & Septembris flore albo & purpureo. Lugduni Maio, Basileæ Iunio, Geneuæ Nouembri ac etiam Ianuario.

Fumariæ succus, auctore Dioscorido, acris est, visum acuit, lachrymas proliet, vnde & nomen traxit. Illitus cum gummi, duplicatos palpebrarum pilos euulios renasci prohibet. Ceterum herba in cibo sumpta, copiosam bilem per vrinas trahit. Eadem planè de posteriore sua *Fumaria Plinius* habet lib. 25. cap. 13. Claritatem facit in oculis, delachrymationemque ceu fumus, vnde nomen accepit. Eadem euulias palpebrarum nasci prohibet. Et lib. 26. cap. 7. Capnon herbam qui edere, bilem per vrinam reddunt.

Galenus 71 simpl. non alias ei qualitates, viresque assignat his verbis: Acris simul & amara qualitatibus est particeps, neque tamen planè expertus est acerbæ: quamobrem vrinam multam, biliosamque prouocat, sanaturque iocinoris obstructions & debilitates. Succus eius oculorum aciem acuit nõ parum trahens lacrymarum, velut ipse fumus: nã hinc ei appellatio indita.

Arabes verò multò plures eaque insignes dotes ei tribuerunt. *Fumaria* [inquit *Mesues* lib. 2. simpl. cap. 14.] in superficie calida est, in profundo frigidiore non absolute frigida cum quibusdam, sicæ ordine secundo, Ab illa autem substantia calida [quæ semini maior inest] & amara & subacris, purgatoria, artenuans, obstructa aperiens. A frigida autem styptica constringendo ventriculum, Hepat & cetera viscera laxiora & molliora roborat. Quapropter ad actionem nullo externo eget auxilio, cum per se purget ac roboret. Purgat verò bilem & vltos humores etiam ex venis: clarum ob id & purum efficit sanguinem. Quare mirè prodest morbis omnibus hos humores sequentibus, lepræ scabiei, pruritus, imperigini, serpigni, & similibus cutis vitiiis. Quia autem obstructa liberat, morbos omnes inde natos sanat, vt febres biliosas, putridas, Herba est innocens, quia cameris magna vbique copia luxuriat, vilescit. Flore nunc est sub albo, nunc cinericeo, nunc pallido violaceo. Optima est viridis, tenera, foliis teneris, planis, non crispis, flore subviolaceo. Herba & succus eius Veris initio sit efficacissima: semen Veris exitu. Quoniam verò imbecillius purgat, fortior euadet cum Myrobolanis, Senna, Sero lactis.

Vuis passis exacinaris, & illarum melle. Succus datur ab vncia dimidia ad vncias duas: puluis à Drachmis tribus ad Drachmas quinque: decoctum ab vnciis decem ad vncias quindecim. *Antenna* frigidam esse primo gradu, siccam secundò statuit & reliqua quæ *Mesues* attribuit. *Fumaria*, sic *Tragus* addit, scabiei & morbo Neapolitano, quem Gallicum vulgò vocant, sanando accommodatissima est: quicunque enim huiusmodi morbos curare institunt, à aliquot diebus antequam ad curationem accedant, agrotis *Fumariæ* aquam destillatam Theriacè admixtâ bibendam propinant, & à potione sudare iubent, quo remedio sanguinem corrigi & mundari credunt. Eodem modo vsurpata aqua *Fumariæ* contra pestem præseruatio est optima, nec non aduersus venenosos & immodicos sudores prophylacticum est haud penitendum: multi antequam balnea sudatoria intrent, prædictam aquam par ratione vsurpant non infelici successu. Succus *Fumariæ* & radix Esulæ in putrem redacta, & preparata, equisportionibus, hoc est, pondere drachmæ ex calida aqua hydropicis, & quibus vomitiones citere volumus, vtiliter exhibentur aqua *Fumariæ* aphthis & oris exulcerationibus medetur,

Vires &
Vfus,

Temperamentum et
Majus,

medetur, collutu, decoctio Fumariz adhibito Funiculo, obstructions hepatis aperit, perque vnam icterum ducit. Seplasiarii ex ea syrupum coacere solent, qui medeatur scabiei & malis pustulis. Succus, vel aqua destillata, Fumariz oculis inditus caliginem illorum, scabiem & rubedinem discarit emendatque: succus Fumariz cum succo Lapathi acuti, admixto modico aceti & mellis temperatus, ita vt vnguentum fiat, omnis generis scabiem per sanat illius. Conferuantur flores saccharo, melancholicis affectibus salutare & Cachecticis.

FVMARIA MINOR, SIVE tenuifolia surrecta.

EX tenuibus radicibus surrectos producit *caules palmares vel dodrantales ac minores: folia minora ac tenuius dissecta quam in ceteris Fumariis à nobis visis: Clusio mollicella, capillacea, vulgaris foliis cadidiora, summos cauliculos exornant: flores in spicam breuem densamque compacti, visu pulcherrimi, colorum varietate: stigmata singulares* [qui non omnes pariter aper-
runtur, serius enim summi, citius imi] breues, hiantes, supremo foliolo coloris purpurascens carnei mucrone cucullato ex luteo viridantis: foliolo gemello subiecto, ceteroqui albo, mucrone atro purpureo: inum locum obtinet sub-
tentum foliolum, fili instar tenue, coloris carnei: Clusio tota amara est.



Tabern. Icon. & Hist. Fumaria tenuifolia, Fumaria tertia: Lob. in Adu. Fumaria minor in Narbonensi agro. Eidem Obs. p. 438. Capnos tenuifolia cauliculis surrectis. Icon. Plant. p. 757. Capnos tenuifolia. Figura eadem quæ Clusii Hist. & Hist. post.

Prodidi autem Clusius Capnon tenuifoliam quosdam in Hispania Sideritum tertiam facere voluisse, nescit quidem quibus indiciis ductos: vulgè à nonnullis Pallomilla & Palomina dici, nomine cum Fumaria vulgari communi.

C. Bauh. phyt. vocat Fumariam secundam, siue minorem tenuifoliam, cauliculis modò surrectis, modò procumbentibus & caducis.

Camer. hort. nominat Fumum terræ siue Fumariam tenuifoliam, Hispanicam, elegantissimè variegato ex rubro, albo, viridi, & luteo coloribus flosculo, ex semine plurimum propagandam, minùs amaram quàm reliquas Fumarias, pictam à Clusio & Lobelio.

Inuenitur autem plerisque Hispaniæ regionibus in aruorum marginibus & iuxta vias ac se-
Tom. HL

mitas: nonnullis etiam Narbonensis Galliz locis obseruare se meminit Clusius, præsertim supra Arelatem dum Massiliâ Montipelum rediret. Ego Monspelii florentem repeti mense Aprilis non longe à monte Seti prope lacum, Basileæ in horto Plateri mense Martio.

FVMARIA QVÆ SPLIT DICITVR

Numerosos rhenos & delicatos profert *caules dodrantales, per quos folia spectantur Radicis caua, vel Adiantli, sed minora multo, mollicella, glauca, potissimum parte inferiore, sapore insigniter acris, & fauces vellicante, pauco adiuncto amaro: Flores lutei, vel albi, cotinula relinquunt Fumariz bulbosæ, minora, semine plena nigro, nitido: Radix crassiuscula nigricat.*



Matth. in post. comm. & Camer. in eiusdem Epit. & Hist. germ. Fumaria corydalis.

Gesn. hort. de hac loquitur cum ait: Est & Fumaria quædam montana, quæ ab Illyriis Split, vel Split appellari audit. Incolæ montis Baldi ad Veronam nominant Chelidonium, videtur autem

Capnus, vel Chelidonia phragmites Actii esse.

Lobel. in Aduers. Fumaria lutea; montana & alba, siue Split Illyrica, an sit Actii Phragmitis & Corydalis Galeni, non absque ratione dubitat, scitèque coniectare quemlibet ait, esse Capnum siue Chelidonium phragmitin Actii; eos autem qui Galeni Coridaliin esse assueverunt, nimis anticipi uti argumento. Obs. p. 438. vocat K. 10. Fumariam luteam montanam siue Split, Chelidonium Capnites Actii, Corydalin Anguillaræ. Icon. Plant. p. 758. Fumariam luteam montanam.

Clusius Capnon tertiam vocat, Split Italis dictam.

C. Bauh. phyt. Fumariam 5. siue luteam. Anguill. epist. 12. Corydala Galeni, Fumaria, vel Fumiterræ species, in Græcia *καυδα* dicta.

Fumaria, inquit Marantha luteo etiam flore reperitur: Sed non nisi montibus, radice crassiore chordeque instar contorta, quæ montana Capnos dicitur, vulgè *split*, Et Diosc. & Arabibus ignota.

Tossanus Carolus misit ex Burgundia semen hoc titulo: Split flore albo & luteo: seu hoc Montbelgardii in horto E. C. ubi Martio mense dodrantalis erat altitudinis. Obseruavi etiam Ferrariæ in horto cœnobii S. Dominici à l'Angeli: prouenit in colibus cultis & agris præsertim in Illyria.

Præstat, si Matthiolo fidendum, vniuersa plantæ

Ce 2

ta ad colicos dolores, siue recens manducetur, siue sicca in puluerem sumatur, ex vino pluribus diebus. Vires, inquit Gesnerus in Epist. ad Craton. ei attributas cerebrum corroborandi exhilarandique misicē, in me experiendo, nullas deprehendi. Sed sic noua pleraque remedia *voluntatis* extolli videmus.

FVMARIA CVM CAPREOLIS.

Descriptio



Tenui est *radix*, sed satis longa, ramuli tenelli, clauicularum beneficio proximis circumuoluti eriguntur, folijs vestiti glaucis teneris, integris, tenuissimis pediculis harentibus: flores albicantes.

Hanc Dod. galli inscribit Capnon Plinii, Capnon Phragmitem, Pied de geline. Describit autē pro Fumaria

secunda, atque vocatam à Plinio Capnon & Pedem gallinaceum, ab Hermolao Capnon phragmitin, Lat. in fol. vocat Fumariam alteram: inibique Fumariam Splith dictam cum Fumaria hac confundit.

Gesn. hort. hanc intelligit, per Capnū Plinii, quam à Dodonæo pictam & sibi incognitam ait. Item per aliam Capnon Plinii, vel Phragmitem capreolis nitentem. Et per Fumariam alterā speciem, quæ Capnus vel Pedes gallinacii Plinii sit.

A. Lobel. pingitur Obs. pag. 438. hoc titulo: Capnos alba latifolia (& hoc etiam in Ic. Plant. pag. 758.) Split album quorundam. Clusio dicitur Capnos altera Belgica albo flore, viticulis seu capreolis sepibus vicinis se implicans.

C. Bauhin. Phyt. Fumaria 4. siue clauiculis donata, varians folijs latioribus & angustioribus, floribus albis & dilutè rubentibus.

Tabernaemontanus, utramque iconē expressit his titulis: Fumaria latifolia minor siue quarta, Item: Fumaria latifolia maior siue quinta.

In horto E. C. per me facta florens Iulio, Augusto, Septembri, & Octobri, proximo Vere ex semine deciduo iterum quorundam prouenit. Fumaria altera Dod. lat. in fol. circa sepes, senticeta, agrorum margines, quandoque & prope veteres muros exit. Prouenit, floret, vigetque eodē quo prior, anni tempore:

FVMARIA BVLBOSA, RADICE CAVA
flore purpurascēte & albo.

Fumaria bulbosa, quam hic exhibemus, *radix* est bulbosa, cava, lata & sessili, fibris aliquot donata, colore intus forisque luteo, sapore amaro, interdum non maior nucē Iuglandē, a-



hīs pugnacissimō maiori, quasi ex com- pluribus bulbis compacta, continuis tamen, cā formā quā brutorum renes non minus quam conspicuntur: hinc exurgit caulis vnus aut plures, teneri, & magna sui parte sub terra latentes, angulosi, compressi, dodrantales, & altiores, foris obsoletā purpurā colorati, intus

Descriptio

pallidi, neruorum agmine rubentium, in circulo stipati, succū remittētes, qui primo statim occur- su linguam cum amarore & acrimonia vellicat: folia in caule bina ortu inquali, pediculis crassis, cauli concoloribus & longis, colore glauco prædita, quæ trifariam rursū cum peculiaribus pediculis subdiuiduntur: singularia folia diuisurā Aquilegiæ minoris: à caulis medio ad summitatem vsque in thylis modū digesti flores, pulcherrimi, ex breuib. pedicellis, veluti Consolida regalis, calcaris extremo recuruo, & veluti nucleato, obtusō, ut in Aquilegia, purpurei, vel albi, labris vtrinque diuulsis rictum ostentantes, lingua tanquam in ore latente, binis foliolis ad capita coeuntibus, cannulatis, foris albis, intus puncto coccineo, saturo in summitate, notatis: id quod commune est, tam ei quæ flore albo est, quam ei quæ purpureo, sicut & crociatipices: quin etiam vtrique inter flores, quæ eorum pediculi ostuntur, pro singulis pediculis singula folia oblonga striata, mucronata, integra & modicè concava. Siliquæ macro ortu sequuntur oblongæ, in quib. semen paruum, nigrum. Plantula ex semine deciduo folium vnicum producit oblongum, subrotundum, simile Auriculæ leporis primum prouenienti.

Fumariam bulbosam radice causā magno errore credunt esse Aristolochiam rotundam: Bruniæ selt. Apollinaris, Corn. & Georgius Pictor.

Merito verò negant plantam hanc esse Aristolochiam Cord. in Diosc. Trag. Fuch. Matthioli. Turn. Lonic. Lob. Guiland. Tab. & C. Bauh.

De formā habet figurā Lonicæ. Dod. verò gall. dicitur Radix cava, quam ait diu in officinis Belgicis existimari Aristolochiam rotundam, & hoc nomine ab ignatis pharmacopœis adhuc usurpari: doctos quosdam putare Pistolochiam Plinii, quosdā Fumiterre speciem facere, Capnon phragmitē vocatā nonnullos ad Hyacinthos referre: alios *Veris* & plantā Veris existimare, cū quæ maiore habere similitudine credit. Eadem Lat. in fol. tradit, ubi Radicem cavam simpliciter inscribit, ac maiorem in descriptione cognominat: Germani inquit, holomr: Belge hoolworle: Galli Racine creuse, id est, Radicem cavam appellat. Officinas perperam hac pro Aristolochia rotunda vsas hētis est, quā referri, aut reselli debeat: & similiter eorum manifestus error, quæ temerè Pistolochiam iudicauerunt. Quo autem nomine

Pistolochia
lappas.Locus &
Tempus.

huic dici debeat (si modò Veteribus cognita fuerit) non parum ambigendum videtur. Sunt qui Leontopetali speciem faciant: alii Eriphion: nonnulli Thesium: plerique Capnos chelidonium.

Fumaria bulbosa Tabernam.

De fumaria bulbosa hæc prodidit Tabernamontanus. Ignari, inquit, & inexpecti Calentarii & Mulomedici Radicem cauam [die holmurtz] pro vera Aristolochia in officinis falso introduxerunt: qui error, quamvis aliis sapiens, à pluribus sit animaduertus, tamen adhuc hodierno die non evitatur in pluribus Officinis; quamvis Radix hæc cum Aristolochia penitus nihil commune habeat: Ita pro dolor! sit, firmamentum cœli contemplamur, & terrenæ non agnoscimus, quæ pedibus conculcamus, & scire ex officio deberemus. Est verb. cauâ hæc radix; Fumariæ species, quam Aëtius & Plinius describunt. Vocatur autem græcè *χελιδόνιον*, à Theophrasto *χελιδόνιον*: Latine Capnos chelidonia, Capnium chelidonium, Capnium Phragmites, Capnos sepia, ab Alexand. Bened. Pes gallinaceus, à Plinio Pedes gallinæ, ab Herbariis Fumaria bulbosa, Fumaria tabetosa Aristolochia concava, Aristolochia adulterina, Radix cauâ & Tonitruifugi, quod quamprimum tonitrua oriuntur, marcescat. Italicè *Capno Chelidonia*, Gallicè *racine creuse*, Belg. *Boalwortel*. Germ. *Holmurtz*, *hanenspor* & *donnerflug*. Dicitur porro his nominibus appellatur sequentes octo species. Ceterum nullam ego video distinctionis eius in octo species rationem, quippe quæ nullas notas diagnosticas ponat; præter eam, quam à colore sumit: ac Octo figurarum vicem abundè supplens unica, fideli manu facta.

C. Bauh. phyt. Fumaria 6. siue bulbosa maior radice cauâ, varians colore floris purpureo (quod si flos minor sit saturatius rubet & pro masculo habetur) pallido, sublauescente, albo. Schyvenekf. Fumaria bulbosa maior albo flore, *herzwurz*. Item Fumaria bulbosa maior flore rubente, *hanenspor*.

Tabernam.

Fumaria radice bulbosa & cauâ flore purpurascens ac albo abundat circa Montbelgardum & hortu Ill. E. C. florens Febuario, Martio, & Aprilis mensibus. Olim observavi flore albo & purpureo Basileæ versus Prætelon; Monspelii in montibus circa Gangem florentem Martio; Patavii in montibus Euganeis inter balneum Apenninæ & Arquam florentem Febuario.

FVMARIA BVLBOSA, RADIX CAVA viridi flore dicta Lobelio

Descriptio

Radicem huic adscribit Tabernamontanus integram, rotundam, præcedenti minorem, & multis donatam fibris: folia item iam dicta similia: caulium summitatibus foliola parua, dissecta, inter quæ flores prodeunt colore virides.

Dicitur descriptionis autori Tabernamontani in Hist. Fumaria bulbosa 9. siue flore viridi, Capnos chelidonia siue Fumaria bulbosa, viridis. Germ. *Brun holmurtz* & *grün hanenspor*.

Fumariam bulbosam viridi flore observavit Lobelius, cuius figuram in Icon. Plant. p. 760. Tom. III.



FVMARIA BVLBOSA, RADICE solida, calcari, & folio cristato.



proponit, hoc titulo: Radix cauâ viridi flore. Eadem verò hæc autore C. Bauh. in phyt. vel maior, vel minor, ratione loci naturalis est: huic folia angustiora: illi paulo latiora.

Fumaria bulbosa alia, radice est bulbosa, non cauâ, rotunda, Auellanae magnitudine, interdum maiore, non tam altè defixa, ut ea, quæ radice cauâ, membrana quæ facile trahenti cedit, inuestita, foris buxæ, intus subalba, amara, cui fibræ capillares aliquot adnatæ; planta sæpè palmaris & minor, interdum

dobrantalibus & pedalis, nec multo minor Radice cauâ, caule læui, subrubro, binis foliis prædita, ex oblongis pediculis cauli concoloribus, non aduersis, in tria alia subdiuisis, quæ tenuius deinde subdividuntur: iuxta radicem aut paulo altius folliculus vnicus carinatus, calcariis gallinaceis instar, membraneus, in quo aliorum foliorum rudimenta: externo cauli insident flore. Radicis cauæ, purpurantes, quæ pediculo mediocriter longo tenuique adherescunt albi, tres, quatuor, nouem, duodecim & plures conferti in spicæ formam; inter quos ad singulorum pedicellorum exortum, folium vnum dissectum variè, simbratum, & cristatum, succedunt siliquis, ut in præcedenti. In hoc genere albos flores nondum observavi.

Cordò in Diosc. dicitur Capni Plinii & Aëtii species minor. In Hist. [vbi pulchre describitur] Chelidonia phragmitis, quam ait Aëtium Capnium, Plinium verò Capnum phragmitem, & Pedes gallinaceos, appellare, propter folliculum gallinaceum calcariis similem. Nomen verò

Cc 3

verò suum inuenisse, quòd primo Vere circa hircundinum aduentum germinet ac floreat. Capnium & Capnium phragmiten dici, quoniam herba priuatim Capnus dicta floribus & foliis similis fit, quòdque circa sepes & dumos nascatur.

Gesn. de hort. Aristolochia vulgaris speciem solidam vocat. Tragus Aristolochia rotunda vulgarem radice solida. Dodon. gall. Radicis cauae dicta speciem plenam, firmam, & solidam. Lat. in fol. Radicem cauam minorem. Lob. in Adu. Fabaceâ radice Capnon, Belg. Boonfens holwoortele. In Obs. p. 439. in Ic. Pl. p. 759. Fabaceâ radice Capnon alteram. Clus. in Pannon. & H. post. Radicem cauam minorem, germanicis & belgicis Officinis apprimè notam. Tab. Fumariam bulbosam minorem decimam (ita enim inscribit, ac postea etiam tuberosam cognominat.) Casp. Bauh. Phyt. Fumariam 7. siue bulbosam maiorem radice non cauâ. Non separabimus nos vnquam has duas Fumarias radice solidâ non cauâ, liquidem magnitudine tantum variant.

C. Bauh.
m.

Locus &
Tempus

In sinibus comitatûs Montbelgardensis ad pagum Mandeure, non longè ab oppido Lisle iuxta viam ex Montenoy, Fumaria minor obseruata non profundâ radice: in silua rarior inter fruteta, vbi Fumariz bulbosâ nulla alia species inuenitur. In hortu Ill. E. C. maior plantata, citius siliquas producit quàm cauâ, florens Martio & Aprili. In Belgio, Germania & Sabaudia (etiam prope Ebrodunum) vti Genue, aruorum quorundam sepes & margines hac scatent. Meminit etiam Lobelius in Veganiis hortis Dei seeruisse. In Germania passim, cum in Belgica inter vepres & frutices nusquam in Pannonia videre, meminit Clusius.

Vires

Vulgaris Aristolochia rotunda ad internas quàm plurimas affectiones adhibetur. Sunt enim qui radicem eius in puluerem redactam aduersus venenum & pestem à vino bibendam exhibeant. Cum vino calefacto pota, si postea in lectû te componas, probè coniectum, sudores potenter elicit. Eadem vrinam trahit, & ad morbum facit regium è vino pota. Semen rufum ac sumptum quotidianis alui profluuiis auxiliatur, auctore Trago. Vt verò Lobel. scribit, facit ad vermes & maligna vlcera. Radix amara, excessu secundo calida & sicca. Digerendo, abstergendo, & defluxionem inhibendo, anginis & laryngum tumoribus gargarizata prodest, pituitamque extergit. Eadem ferè Dodonæus tradit. Radix caua inquit, anginas curat, tumoresque inueteratos amygdalarum, si ex eo aqua sola, aut aceto facta decoctio gargarizetur: humores crassos incidit, dissipat. Prodest & tumoribus palati & gingivarum, inspersus puluis eius. Cum vnguento populeo consumit hæmorrhoidas, earumque dolores sedat. Aristolochia rotunda vulgaris, cum habeat & in foliis & in radice acrimoniam, eamque leuem quidem: si genuina Aristolochia rotunda deest, sine omni discrimine illâ vitur Fuchsius ad omnia ea, ad quæ vera vsurpatur. Maiore commendatione est minor apud Chirurgos & mulomedicatrices mulierculas, quæ istius puluerem efficaciorum & delicatiorum ad lumbricos interrimendos prædicant. Radices cauae omnes, ex sententia Tabernamontani, calidæ sunt in secundo gradu, siccæ in tertio, abstergunt cum nonnulla adstrictione. Radix herba & flores quomodocunque vlurpata, in cibo etiam & in potu hepatis obstructionibus efficaciter medetur. Succus ex herba, radice, & floribus expressus, duarum

Vnciarum pondere potus, expellit vermes. Idæ præstat radix in vino sumpta: minor quidem iunioribus natu propinanda. Succus dicto modo manè & vespere adhibitus, cancro, fistula, ceterisque putridis vlceribus medetur. Vulneratis etiam vtiliter propinatur. Cæteram planta hæc, ceu Fumaria sanguinem purificat. Nec tantum prædictis affectibus vtilis est, sed & vlceribus obsecenarum partium occurrit, etiam brutorum. Radicis enim herba & florum decocto (dicto modo facto) hæc si sæpius lauentur, breui sanantur. Radix puluerizata, aceto in vnguenti consistentiam reducta, scabiem illitu, vlceraque capitis manantia sanat. Succus è floribus & herba expressus, si parum sacchari candi in eo dissoluatur, aliquoties de die in oculum instillatus, maculas eorum tollit, & visum acuit. Vlcera obsecenarum partium dicto decocto lora, puluis inspersus curat. Radix puluerizata & melle in emplastrum redacta contusionibus vtiliter imponitur. Radix cum herba in vino decocta, emplastri modo applicata lenit dolores podagricos, arthriticosque. Aqua stillaritia Fumariz huius bulbosæ in eisdem vsus adhibetur, in quos Aqua Fumariz vulgaris. Accommodatissimum autem tempus distillandi hanc, est finis Aprilis, cum floret. Distillatur integra planta in Balneo, rectificatur in Sole. Fit ex Capno bulbosa Capnitea vinum, vt Enulæ campanæ. Admodum salutare tempore pestis. In cura vlcerum, cancrorum, apostematum, morbi venerei, scabiei, & omnium cutis vitiorum, potius vice bibitu multum prodest. Conserua commendatur ad obstructiones viscerum, & sanguinis purificationem. Item pestem, manè ieiunè sumpta Castaneæ dimidiæ magnitudine, Melancholicis etiam affectibus vtilis est & cachecticis. Potrò, si quis velit, salem, syrupum, oleum, extractum, & cætera id genus, in prædictos vsus, conficere poterit.

MOSCHATELLINA FOLII FUMARIÆ bulbosæ, de qua Cordus.



Moschatellina Descriptio
radicem habet semuncialem & vneialem, candidam, pluribus squamulis, caninorum dentium instar habentibus, quarum inferioris cauum, superioris mucronem solidum excipit, fibris donatam circa superiora genicula, satis pro plantule proportionem longis, subdulo-
cem, pediculis duo, tres, molles & delicati, in viridi pallescentes, tenues & palmares, filia sustinent in viridi glauca. Fumariz bulbosæ diuisura: caliculus vt foliorum pediculis haud discolor, ita non

non multo altior, singularis, flosculos quinos sustinet, colore herbaceo, quinque foliolis constantes, in quorum medio *stamina* exigua ex herbaceo virore in luteolum dilutum farscentia, stylo viridanti: omnes flores simul sumpti tabum referunt: paulo sub flore, brevibus pedicellis appensa sunt folia bina, reliquis septadecimis, excepta sola quæ superantur magnitudine, similia: & flores & folia moschum spirant.

Cordo dicitur Bisensfrant à Moschò, non Besensfrant à scopis, ut perperam asseruisse Cordum falso scribit Cronenburgus. H. Lugd. p. 1296: Denticulata, à radice velut à dentibus parvis coagmentata. Sunt qui Alabastridem vocent, ob radicis ferè pellucidæ ac nitentis splendorem alabaistro similem.

A Lob. in Aduers. vocatur minimus Ranunculus Septentrionalium herbido multo colore: Item Leon. Plant. p. 674. & Mustatella Cordi. A Tabern. Fumaria bulbosa minima in Leon. & Hist. vbi quoque Fumaria vndecima bulbosa. C. Bauh. Ranunculus s. seu Ranunculo similis Moschatellina dicta, varians magnitudine.

Moschatellina Cordi folio Fumariæ bulbosæ Genæ copiosè in sepibus nascitur, in colle *la Bassie*, & alibi, mense Martio florens, lunii principio vix dum apparens. Copiosè quoque Montbelgardii iuxta *la Crête*. Basilea a se repertam scribunt Gesn. & C. Bauh. In Anglia provenire & circa Coloniâ assererat nobis coram Turnero. Ad fontium scaturigines, rivulosque prata rigantes, & in umbratis sepibus nasci primo Vere, statimque perire testis est Dalechampius.

MELANTHIUM VETERIBVS.

CAP. LXXXVIII.

Descriptio


Melanthium, ut memoriæ prodidit Dioscorides, *furculis* tenuibus, in binum dodrantum altitudinem, aut etiam amplius, assurgens, foliis veluti Senecionis, at multo tenuioribus, capitulo in cacumine parvo seu Papaueris, oblongo, intrinsecus dissipimentis quibusdam prædito: intra quæ semen latet nigrum, acre & odoratum, quod panibus inspergitur. Caput dolentibus illitum fronti subuenit, itemque incipientibus oculorum suffusionibus tritum cum trino & infusum naribus. Tollit & lentiginis, lepras, veteresque tumores ac duritias, et aceto illitum: circumscissificatos clauos excutit, cum vrina vetete impolitur. Dentium quoque dolori cum aceto & tæda coctum colutione prodest. Teretes itidem lumbricos expellit illito ex aqua umbilico. Tritum vero linteolo illigatum & olfactum destillatione laborantes adiuuat. Pluribus autem diebus continuus sumptum menses vrinasque ciet & lac augeat. Leuat & spirandi difficultatem addito nitro porum, auxiliaturque phalangiorum moribus ex aqua drachmæ pondere bibiturum. Incensum quoque serpentes fugat. Sed & ipsum tradunt largius eorum enecare. Ceterum, sunt qui Melanthion, Nigellam, Gith, & siluestre, & nigrum papauer dicant.

Melanthium etiam Melaspermon Græcis vocari Plinius, Latinis autem Gith, & de ipso planè eadem quæ Dioscorides prodit lib. 20. cap. 17. Galeno Melanthium calefacit ac licet tertio ordine: & vbi secare, extergere, siccate

ac calefacere opus est, vtilissimum medicamentum existit: in destillationibus & gradudinibus. Id nouit etiam Hippocrates, & ad veterinos affectus frequenter præscribit. Apud Theophrastum non reperiri Melanthium testatur Celsus nas quibus Theodorus Nigellâ dicat, quod Theoph. Anthemon vocat. Melanthiû eandem dictum putat Andreas Baccius de venen. & Antidotis, testibus Arabibus à proprietate sanandi morsus canis rabidi, quæ tamen Etymologia potius conuenit Alyssò, hactenus non satis cognito.

Quæ porro planta ex dicendis Veterum Melanthium hodie repræsentet, multi dubitant. Nominatur siquidem Melanthium capite & flore maiore, Nigella Damascena Cordi, Isopyrum Guilandini. Melanthium Hispanicum elegans flore simplici magno, Nigella Hispanica venusto flore Robini. Melanthium capite vel calyce & flore maiori pleno, Melanthium Damascenum Clusii. Melanthium calyce & flore minore, semine nigro & lateo, Nigella citrina Herbariorum. Melanthium capite minore, flore multiplicato, Nigella citrina, flore multiplice Lobelii, Melanthium citrinum multiflorum Tabernamontani. Melanthium siluestre siue argenteum, Melanthium siluestre capitulis testaceis Tabernamontani. Pseudomelanthium multis, sed perperam, nominatur Melanthium. Pro Melanthio Cyprio apud Hippocratem, legendum censet Cornarius Arramentum seu Spodium Cyprium, quam lectionem non probamus.

Aequiuoca

Melanth.
capite &
flore maioreMelanth.
Hisp. elegans flore simplici magnoMelanth.
capite vel calyce & flore maiore plenoMelanth.
calyce & flore minoreMelanth.
capite minore flore multiplicoMelanth.
siluestre argenteumPseudomelanthium
Daphnoides
Spodium
CypriumMELANTHIUM CAPITE ET
flore maiore.

Ad cubiti altitudinem excreuit, rigidis, striatis caulibus, quos folia ambiunt Melanthii cui flos minor, perquam tenuiter dissectus, sapore non nihil acri & nauleoso: flores longè maiores, nonnihil odorati, quinque constantes foliolis ex caruleo albicantibus, quæ totidem intercedunt

folia, qualia in caule conspiciuntur: medium occupant multa stamina apicibus viridantibus cum pericarpii rudimento quæ omnia cingit corolla ex bulgulis opercularis melleum liquorem continentibus: semen in pericarpis ventriosis: membranis dissipimentis distinctum, nigrum, odorum. Radix lignosa, colore buxo.

Cordus plantam à nobis hic depictam, describit in Hist. nomine, Nigella Damascena, vbi etiam figura à Gesnero posita ex Trago nomine Nigellæ. Fuchsius Melanthium hortense alterum inscribit, ac Nigellam alteram vocat, ger-

manicè Schwarz Coriander, quodd folia eius Coriandri foliis non dissimilia sunt.

Ifopyri & Melanthii siluestris nomine pingit Matthiolus. Gesn. hort. dicitur Nigella [alias Melanthium, Gith] Damascena. Hort. Lusit. Melanthium Damascenum, frembder schwarz ger Bümmel. Camer. hort. Melanthium Damascenum Cordi, flore cæruleo, nigrum, intipidū, & inodorum, quamuis vegetum semen gerens. In Epit. Matthiol. Melanthium siluestre. In Hist. eiusdem Germ. Melanthium siluestre primum. Dodon. Gall. & Latin. Melanthium Damascenum (hoc est Nigella de Damas.) Lonic. Melanthium secundum satium manus. Tabern. Icon. & H. Melanthium agreste, Nigella arvensis, wild Vardenfraut. Lob. in Aduers. pagin. 329. Obs. p. 423. & Icon. Plant. p. 740. Melanthium siluestre. C. Bauhin. Phyt. Nigella 3. siue flore maiore simplici.

H. Lugd.
nat.

H. Lugd. plantæ à nobis descriptæ tres proponit icones. Duas p. 813. his titulis: Melanthiū siluestre prius Matthioli. Et: Melanthium siluestre prius Matthioli secunda editione. Tertiam pag. 1020. hac Inscriptione: Ifopyrum Matthioli. Inter priores duas nullam ostendit differentiam. Quale verò sit Ifopyrum Matthioli satis dictū.

Arab. &
Tab. nat.

Lapsi sunt etiam Matthiolus & Tabernamontanus (quod rectè etiam obseruauit Lob. in Aduers. & C. Bauhin.) Melanthii speciem quandam pro Ifopyro pingentes.

Melanthium flore & capite maiori spòtè prouenit Montbelgardi, ubi floret Maio: Geneuæ in hortis Octobri & Nouembri mense, virens autem adhuc Ianuario. Basileæ florens Octobri & Iunio in orto patris mei, & aliorum: Patruus in orto nob. di. Musati Martio.

MELANTHIUM CAPITÈ VEL CALYCE & flore maiore pleno.

HOc alterum Melanthii flore maiore genus ramis striatis tenuibus, foliis tenuibus multipliciter dissectis, cum præcedente conuenit: verum huic flores non tantum multiplici foliorum fœtura luxuriant, colore vel herbaceo, vel albo, vel cæruleo, vel ex his mixtis variis: verum etiam singula floris folia profundis crebriusque cæsuris fimbriata sunt.

Est hoc Melanthium Damascenum pleno flore Clusio. Prosp. Alpino de plant. Egyptii cap. 41. Melanthium. Item Nigella. Caspato Bauhino Phytopomace Nigella 4. siue flore maiore pleno, solo flore à primo differens, qui penè circinate rotunditatus est.

Locus &
Tempus.

Montbelgardi in pluribus hortis, vt Ill. E. C. floret Augusto & Septembri.


usus

Nigella floribus maioribus ac numerosioribus foliis præditis semen in Aegypto in vfu est frequentissimo, inquit Alpinus, ad puerorum vermes necandos: contusisque seminibus cum aceto emplastri modo ad plures cutis infectiones vtuntur mulieres. Quæ verò non purgantur, eo si suffiantur, maxime iuuantur, vocantque hanc plantam Suneg.

Vermet
Cutis af-
fectus.
Menfes re-
tenti.

MELANTHIUM CALYCE ET FLORE minore, semine nigro & luteo.

Folia latiusculà diuisurà, licet singula interim segmenta culmum latitudine non æquent,



medium per-
currente sem- Descrip-
per nemo,
striatis pedali-
bus caulibus
hærent: flores
ramorum ex-
tremis hærent
singulares ex
albo pallêtes,
minores quàm
cærulei, equin-
que foliis cò-
positi, multis
apicibus me-
dium occupâ-
tibus, capitul-
umque cingê-
tibus, quod
delapso flore
minus quoque
apparet, quam
in Damasco

no quibusdam dicto, quinque aut sex corniculis præditum, semine refertum anguloso luteo, vel nigro odorato.

Hanc describit Cordus in Hist. sub titulo Nigellæ, quam duplicem agnoscit. Vnam semine nigro: alteram candido seu flauescente. Tragus vocat Melanthion satium, Salusandriam Dioscoridis, agreste vel nigrum Papauer & Nigellam, Germ. Schwarz Coriander, h. e. nigrum Coriandrum, Xanion Serapionis, & Scaunicem Auerrhois. A Fuchσιο Melanthii hortensis primi titulo pingitur, eiusque duæ species assignantur. Nigellam Romanam officinis dici testis est Cornarius. Melanthium satium appellat Matthiolus passim in suis comm.

Lacuna Matthioli signam & titulum retinet, atque vocari græcè Νύκτιδα, Gith & Melanthiū latinè, barb. Nigella, Castil. Neguilla aut Axennuz, Catal. Nigella, Portug. Aliprine, Ital. Girbene, Gall. Barbue, aut Nigelle, Germ. Schabab. Recipit & ipse duas species, Vnam semine nigro, & alteram citrino, dictam Herbarius Nigellam citrinam.

Cæterum, Camer. hort. dicitur, Melanthium, siue Nigella, Gith [quamuis desint secundū Dioscoridem folia Senecionis] flore simplici, semine nigro. Item Melanthium Damascenum semine pallido, quod ait Bononienses in suo Antidotario substituere pro Cardamomo maiore Arabum. In Epit. Matth. Melanthium satium, semine nigro, quandoque subflauo. In Histor. eiusdem German. Nigella satina.

Dodon. Gall. Melanthium satium, Nigella domestique gall. hoc est, Nigella domestica, & Salusandria, Belg. Vardus: semine nigro & subluteo, quod Vardus fact dicitur. Lat. in fol. Melanthium.

Wirsung. Nigella, Schwarz Coriander, & Nigella alba, Weiß Coriander. Gesn. hort. Nigella vulgaris semine nigro, & altera species semine subluteo.

Lob. in Aduers. (vbi florem purpureum ei tribuit, quod miror, cum potius ex albo ad luteum tendat) p. 429. In Obs. p. 427. Ic. Pl. p. 740. Melanthium siue Nigella Romana odora.

Tabern. Icon. & Hist. Melanthium satium vt & Castori. Hist. Lugd. p. 812. Melanthium satium Matthioli. Hort. Lusit. Melanthium vulgare satium.

Casp.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. Nigella 1. siue flore minore simplici, semine aliquando nigro, aliquando pallide flauente: luteo etiam in horto nostro Basileæ; rarius candido.

Schvvenckfeldio tandem Nigella Romana; *Μελανθία* Dioscoridis, *ἡ τὴν μέλαν αἶσαν*. Melanthium hortense. Item: Nigella citrina simplex, Melanthium citrinum flore simplici.

Melanthium flore & calyce minore, semine nigro in hortis facile prouenit, florens Augusto & Septembri. E semine luteo à fratre misso Geneuæ mihi crenit in horto, & Montbelgardi in horto Ill. E. C.

Locus & tempus.

MELANTHIUM CAPITIS MINORE flore multiplicato.

Descriptio



Ex radice exili, simplice caulis surgit singularis, cubicalis & sesquicubitalis, teres, striatus, hirsutus, inanis, in alas diuisus; alternatim folia oriuntur, longis carinatis pediculis appensa, colore ex viridi in luteum vergente, diuisura multo latiore, quam in vulgari Me-

lanthio, hirsuta: flores ex albo herbacei coloris, multiplici foliorum stipatu pleni, apicibus multis herbidis.

Hoc ita traditur, à Clasio: Melanthium odoratum pleno flore, virgis foliisque à satiuo, cuius semen odoratum, flosque è viridi candicat, nihil, vel quam minimum differt: flores tamen qui in satiuo triplices sunt, in hoc, triplici, aut quadruplici nouem aut decem foliorum serie constant, exurgentibus in medio staminibus, & pentagono hexagonæ capite in totidem cornicula inflexa superne diuiso, quod, intercurfantibus interne membranæ, plenum est semine rotundo, nigro, odorato, vt vulgaris.

Lobel. in Obs. Aduers. in fine, & Icon. Plant. p. 741. Nigella citrina vulgò vocata, flore albo multiplici. Celsalp. Nigella flore candido ex numerosis foliis constans, semine multum odorato. Schvvenckf. Nigella citrina plena, Melanthium luteum multiflorum, Melanthium flore pleno pallide luteo, doppel geel Römischer Coriander. H. Lugd. p. 812. Nigella citrina, flore albo multiplici.

Casp. Bauhin. phyt. Nigella 2. siue flore minore pleno: Cardamomi, species Lacunæ, Nigella citrina solo colore à nigro differens sine icone. Si solo colore differat à nigro, non video quomodo huic referri debeat, aut queat: Melanthium calyce & flore minore semine luteo, potius nominandum existimo.

Tabern. Icon. & Hist. Melanthium citrinum Tom. III.


multiflorum; doppel geel Tarden frant. Variat hæc figura à Lobelio.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. florebat Iulio & Augusto Melanthium hoc calyce & flore minore pleno. Melanthium odoratum pleno flore, in hortis cultum obseruabat Clusius, florens Iulio & Iulio: semen verò maturans Augusto.

Locus & tempus.

MELANTHIUM SILVESTRE siue aruense.

Descriptio



Hic cum Melanthio Damasceno magis quam cum ullo alio conuenit; sed longe strigolius natalis suos testatur, ad palmarem aut dodrantalem magnitudinem pertinens, caulibus modò simplicibus, modò à radice statim, quæ lignosa, ramosis, striatis: folia Anethina, vel potius

Damascenæ Nigellæ, sed non ita læta, rara, in tenuissima fila dissecantur: flores stellati quinque foliis constant, colore cæruleo, vel pallente, luteæ Nigellæ floribus non maiores, nullis foliorum tenuium barbulis, vt Damascenum, suffulti: hisce succedunt capitula Aquilegiæ, quinque corniculis in diuersa quidem superius abentibus, sed à medio ad imum vsque connatis: semen nigrum, exigui odoris.

Huius plantæ pictura exhibetur Nigellæ cornatæ titulo lib. 2. Hist. cap. 22. apud Cordum. Dicitur Nigella silvestris Trago & Lonic. lib. 5. cap. 49. Non placet autem hanc cum rursus dicta lib. cap. 78. sub falsa figura, quam S. Catharinæ blumen (Florem S. Catharinæ) inserit, inter Linarias reponere, cumque eis miscere & confundere.

Gesn. hort. in append. Nigella agrestis & sponte proueniens. Camer. hort. Nigella silvestris, in Fritico multum crescens. Melanthium silvestre Fuchsio (cui Nigella 4. & Cuminum silu. 1.) Castori, Dod. gall. & lat. in fol. dicenti. Silvestre Melanthium spurium est, ac à similitudine nomen inuenit. Germani quandoque S. Catharinæ blumen, id est, Diæ Catharinæ florem nunciant. Placet nonnullis istud esse Cuminum silvestre. Et potest non temere pro silvestri Cuminum altero haberi: Veterum breuitas sæpe in causa est vt certi definiri nihil queat.

Melanthium silvestre alterum Matth. in post. comm. cum mag. figuris lat. & italicis. Camer. in in eiusdem Epit. & Hist. germanica. Melanthium silvestre alterum Matthioli H. Lugdunensi p. 813. Lobel. in Adu. p. 329. in Obs. p. 428. in Icon. Plant. p. 742. Melanthium silvestre alterum, capitulis reflexis Aquilegiæ. Tabern. Icon. & Hist. Me-

Da

C. L. p. 741.

lanthium agreste altitum. Cordo in Dioscor. & Fuchf. in Icon. Cuminum nigrum, & Cuminum siluestre alterum. Clus. Melanthii Cretico [quod describitur, quod C. Bauhinus Phyt. Nigella sextam siue Creticam vocat,] valde simile vocat. Hort. Lusit. Melanthium siluestre, Nigellam aruensem. C. Bauhin. Melanthium siluestre siue aruense, Nigella aruensis.

Locus &
Tempus.

Melanthium siluestre obseruavi in agris Mœbelgardenibus; florens mense Septemb. In agris Basileensibus mense Octobri. Melanthium Cretico valde simile Clusi inuenitur in aruis post demissis segetes, totâ Pannoniâ, Austriâ, reliquâque Hungaria.

DELPHINIUM VETERIBVS.

CAP. LXXXIX.

Descriptio

Delphinium (ut Dioscorides prodidisse fertur) *ramos ab vna radice dubium dodrantum longitudine, & aliquando maiores profert*: circa quos *folia sunt tenuia, candida (carent hoc vocabulo quædam exemplaria,) prelonga, incisuris diuisa, Delphinorum figura, vnde & nomen inuenit. Florem fert Viola (alibi addunt quidam) similem, purpureo colore. Semina in siliquis habet. Milio aequale. Potum cum vino scorpiionum ictibus, ut quoduis aliud medetur. Fectant præterea admodum herbâ contactos scorpiiones languescere, torpidosque, & ad nocendum inutiles fieri: amora verò statim in antiquam redire naturam. Nascenti Delphinium hoc æspers locis. Est & alterum Delphinium, quod Hyacinthum aliqui, Romani verò Buccinum pariter vocant, in dicto simile, foliis tamen ramulisque multo gracilioribus: Vim etiam eandem cum prædicto habet, sed non ita efficax est.*

Cum autem Delphinium nec à Galeno, nec ab Oribasio, nec à Paulo, nec à Plinio, nec ab aliis tum Græcis tum Latinis describatur vsquam, multis, præsertim verò Cordo & Matthiolo, eius caput quoddam apud Dioscoridem habetur spurium & ascititium existimatur: Lobelius tamen aliud sentit, perquirendum suadens, num auctores illi classici alio fortè nomine de eo scripserint necne: nec parum placet nobis eius sententia, cum in tanta rerum obscuritate & opinionum diuersitate vix quicquam certi statuere liceat.

Senam autè Mauritanis vocatâ non defuere qui siliquarum conuexitate fieri & decepti [inter quos Marcellus] Delphinium esse crediderint: quorum grauis error ita euidentis est, ut iam ab omnibus explodatur: Idque non iniuriâ, quod in Delphinio, folia non siliquæ, quæ Delphinorum formam repræsentet, requirantur: tota denique Delphini facies ea depingatur, quæ cum Sena quàm maximè pugnet.

Existimant, inquit Lobelius, Herbarii Delphinium eam esse plantam, quæ à vulgò ipsorum Filius ante Patrem appellatur. Examinandum etiam in Aduers. proponit, An Antora nobis Antitora dicta [de qua dicemus l. 34.] sit Delphinium, cuius delineationem explere posse testatur.

Alii cum Lychnide, alii cum Lunaria conferrunt: Crato verò cum ea planta quæ à nonnullis *Noli me tangere* appellatur.

DE CONSOLIDA REGALI, EIVSQVE

speciebus. CAP. XC.

Consolidam regalem videntur Veteres inter flores coronarios habuisse, & quidem sub Hyacinthi nomine, siquidem Plinius lib. 21. c. 11.

ita discurrentes notas inesse dicat, ut græcarum literarum figura A. I. legatur inscripta: quod sane in Consolida Regali hortensi obseruare licet, quippe quod in floribus sit folium quoddam implicatum, quod in albo characteres habet occultatos, ex virgulis cæuleis duas literas A. I. aut tres A. I. A. exprimentes. Cuius Hyacinthi meminisse videtur Dioscorides lib. 4. in Delphinio altero, quod & Hyacinthum appellari monet. Ita videtur Consolida regalis hortensis *Hyacinthi* esse Dioscoridi, si modò vox *Hyacinthi*, non ad folia, sed ad flores referatur. Altero verò Delphinio seu Romanorum Buccino, Consolidam regalem segetum notare. *ut C. Bauh.*

Consolidam regalem esse Delphinium meritò negat Tabernamontanus, sed idem falsò Cuminum siluestre alteram Dioscoridis esse pronunciat. A Medicis & Herbariis Consolidam regalem siue regiam vocari tradit, à consolidandis vulneribus, Herbam diuæ Ontiz, & Florem diuæ Otiliz, Florem regium, Equitis calcar, & Calcar equestre, Florem equestrem, Pedem standæ, Corydalopodium, à Ruellio Cornuetam & Cornuetam, à Germ. Rittersporn / S. Orlentstaur, od Blum / Rittersblum, & Lerchenflanz. Belg. *Ridderspoorn*. Gall. *Pied d'aloëtre*, *Cornuetre*, *los regalle*. It. *Sperone di cavallero*, *Sproni di cavallero*, *Sprone di cavallieri*, & *Consolida regale*. Angl. *Lardes clawe* / *lardes spurre*. Boh. *Swalmyl frawlosky*. Hung. *Sarkas flu*.

Non multum tamen culpandi sunt, qui Delphinium plantam illam esse volunt, quæ Consolida regalis vulgò dicitur, quæque à Fuchio pro Eranthemone depingitur. Hi enim contextum tanquam deprauatum ita emendat ut similitudinem Delphini ad flores referant, non ad folia. Verum illi (qui Senam Delphinium esse contendunt) nullo pacto contextum imitantes, quod foliis tribuendum est, folliculis tribuunt. Qui præterea Eranthemon putant eam plantam, quæ Consolida regalis appellari solet, quoniam pacto excusari ab errore possint, non videmus cum Marantha. Hæc enim in figura floris multum distat atque alias fortè habet differentias.

Consolidam regalem Cornarius falsò Cumini siluestris Dioscoridis primum genus esse credidit. Cæterum de Consolidæ speciebus nunc ordine dicendum.

CONSOLIDA REGALIS FLORE

minore.



Generè hæc non est diuersa, ab ea quæ maiore est flore, post describenda, vetum spontanea cum sit, nulloque magis gonio latiore exculta, tota strigosior erudit, nec remèrè dodrantalem magnitudinem vnquâ, quoad sit ipsa est, ut diximus, nec adeo foliorum vel numero, vel latit.

Delphinium
Consol. ro-
galis.
Eranthemum

Consol. ro-
galis non
est Eranthemon.

lucumque luxuriat: magis etiam squalidus flos, & minor neglectior, et ita coloris carulei: semen in corniculis non dissimile, vel nec radice nisi quod ea horrensi habitior est.

Cordus in Histor. vocat Colcatrippam candidam, cui dicit florem in candido esse rubentem. Et Gesnerus apposuit figuram nomine Consolida regalis, & sic etiam vocat Apollinaris, qui vires tradit. Tragus Consolidam regiam inscribit. Violaque purpurea, simulque elegantissima, Martiam simulantem cognominat, testaturque Germanos Calcar equitis [Ritterspohn] quod forma calcar referre videatur, vocasse. Esse preterea, qui Hyacinthum, qui Vaccinium [quod libens non sine errore admittit] appellant: Orchonem Brunfelsium suspicatum esse hanc Aegylopa esse Dioscoridis &c.

Fachsius inter Anthemides seu Chamamelam hanc reponit, speciemque tertiam Chamamelae constituit: Reprehenditur autem à Dodonæo, qui eam pignit in Histor. gall. hoc titulo: Buccinum, Consul de royale sauage. In Hist. de florib. & in fol. hac inscriptione: Flos regius siluestris: Postea verò nominat Delphinium alterum. Lobel. in Obs. p. 425. & Icon. Plant. p. 739. figuram habet hoc titulo Segetum Consolida regia frigidior tota. Gesner. hort. Consolida regalis silvestre genus in aruis nascens flore caruleo. Consolida regalis Brunfels. Camer. in Epit. & Histor. getin. Matthioli. Eidem in hort. Consolida regalis, siue flos caruleo minore. Consolida regalis arvensis Tabern. Icon. & Hist. Consolida regalis, siue arvensis flore caruleo minore C.B. phyt. Cæsalp. Floris vulgò dicti in Etruria Capucio alterum genus: Delphinium minus Dioscoridis. Clus. Delphinium siue Consolida regalis vulgaris in ramos late sparsa, passim inter segetes sponte nascens, carulei coloris elegantis flore.

CONSOLIDA REGALIS ERECTOR, purpureo, siue violaceo flore maiore.



Hæc Consolida differt à vulgari carulea flore maiore, non enim ita ramosa, sed erectior multo. Color omnino differens: est enim purpureus, siue violaceus.

Huius, ni fallimur, meminit Cæsalpinus his verbis. Flos quidam vulgò in Etruria Fior Capuccio ob coloris gratiâ quæ etiam are-

factis seruatur: expetitur in coronas: caulis est cubitalis, rectus, paucis ramis rectis: foliis numerosis, in angusta, & oblonga folia diuisis, Fœniculo proximis: flores circa summas virgulas ini-

tiò: antequam dehiscant, effigie Delphinorum, virides: procedente tempore explicati, colorem purpureum elegantem contrahunt, tendentem ad caruleum, à tergo caudati: foliorum in his est quoddam implicatum, quod in albo characteres habet octoceros [de eo iam antè C. Bauhinus ex Plin. lib. 27. cap. 11] ex virgulis caruleis duas litteras exprimentes, A.I. aut tres, A.I.A. Siliquam fert oblongam, nigram, seminibus nigris, vt Melanthii, sapore ingrato, amaro: colitur in hortis inter coronarias, quamvis & sponte prodeniat in aruis. Recensetur à quibusdam non sine probabilizatione inter genera Cumini siluestris: ipse non dubito hunc florem inter coronarios habitum apud Antiquos sub nomine Hyacinthi; quem Poetæ fabulantur ex Aiæci cruore ortum.

Consolida regalis, siue Flos regius maior flore purpureo (vt testantur Camer. hort. & C. Bauh.) hoc habet peculiare, quod folium corniculo annexum si pandatur A.I. A.I.A. litteras inscriptas ostendat, vnde Cæsalpino Hyacinthus poetarum habetur, de quo Ouidius in Metamorphosi:

Ipse suis genitus foliis inscribit & A.I. A.I.
Flos habet inscriptæ, si neque littera ducta est.

Itaque Theocritus Idyll. 19.

Nunc hyacinthe fœnet tua littera, scilicet A.I. A.I.,
Nec tamen hoc satis est, A.I. A.I. plus ergo loquatur.
Litterulæque velis foliis inscribere plures.

CONSOLIDA REGALIS ERECTOR, flore purpureo siue violaceo pleno.




Sequitur cubitalibus caulibus a-
dolescit, erectis, tantillum hirsutis, foliis circumscripto tota, paulò duabus viciis maior, segmentis fissi crebris, breuib; angustis: flores ordine sesquipalmari digesti, pediculis hærent semuncialibus, hirsutis, Buccinum, antequam aperiantur, effigiantes, qui explicari, multiplici conspiciuntur foliorum fœturâ pleni, colore purpureo violaceo hilariori, apicibus luteis medium obsidentibus luteis, calcari longo: sequitur corniculum hirsutum, plerumque sine semine.

CONSOLIDA REGALIS MAXIMA villosa.

Caulis est longo, crasso, tortuoso, admodum villosus: folia fere palmu longa, pilosa, multifida, segmentis latis, non multo Peucedani foliorum segmentis angustioribus, pediculi per totum fere caulem ramisque, sursum reflexi, palmares, & minores, altioribus semper brevioribus, villosis, non sine oblongis quibusdam veluti

Descriptio



foliorum ligulis:
flos vnicuique pe-
diculo insidet v-
nicus, magnus,
candidus, quorū
calcar & folia ex-
tima foris, tomē-
tosa sunt, & viro-
re quodam varie-
gata: cornicula,
quæ succedunt,
densissimo villo
sunt oblita: Vnde
hanc nocti simus
non recordamur.

CONSOLIDA REGALIS PEREGRINA
paruo flore.

Descriptio



IN arcum fe-
rē curvis est
caulibus qui
vix pressu villo
inter chartas,
imposito quo-
que pondere
diriguntur, quin
subinde ad
curuitatem re-
deant: sunt ii
verò cubita-
les, aut paullo
etiam maio-
res, coloris ci-
neracei, sub-
hirsuti, ramosi:
folia priora
quidem latius-
cula, triparti-
tò diuisa, se-
gmentis lati-

usculis laciniatis, alia verò per ramos aut par-
tibus secta, aut omnino integra: flores strigolæ
illius aruensis pares, corniculati, cærulei, alter-
natim surgentes spicam efformant, quibus excus-
sis, singulis terna succedunt erecta simulque iun-
cta cornicula semine lactea.

Consolida regalis quam peregrinam voco
missa fuit fratri C. Bauhino (qui eam describit,
vocatque Consolidam regalem 5. in phyt. 2. apud
Matth. flore paruo,) Neapoli cum hac inscriptio-
ne à Ferd. Imperato. Delphinium Dioscoridis
mea opinione. Hæc Consolida flores habet cæ-
ruleos, similes minori Consolidæ. Et hanc a-
luit etiam hortus D. Iacobi Zvvingeri Basileæ,
qui mihi, pro singulari in me beneuolentia, eam
quoque communicauit.

CONSOLIDÆ REGALIS SPECIES ALIÆ.

Præter recensitas Consolidæ Regalis species
habemus Montbelgardi in horto Ill. E.C.W.
& alias: vt pote: Consolidam regalem mino-
rem, flore bicolore, cæruleo & albo. Consoli-
dam regalem minorem flore pleno, albo & cæ-
ruleo: cuius huc iconem damus. Consolidam



regalem flore
maiore dilute
purpureo, la-
bellio striato.
Consolidam re-
galem ramofi-
orem, flore ma-
iore, cæruleo &
albo. Atque Co-
solidam regalē
erectiorem flo-
re incarnato
pleno: quarum
Consolidæ re-
galis varietatū
descriptiones,
breuitati studē-
tes, exhibendas
non ducimus.

Traditis Co-
solidæ regiæ
speciebus, reli-
quum est, vt vi-
res breuiter
perstringamus.

Flores itaque sicut & aqua eius destillata ad cali-
lignem oculorum ferè adhibentur: tradunt e-
tiam aquam quasuis inflammationes internas &
externas iuuare potu & imposito: Auctor Tra-
gus. Chirurgi, teste Marchiolo, in potionibus
vulneratis vtuntur, consolidat enim & glutinat,
vnde & Consolidæ nomen est adepta: herba in
puluerem redacta, cum eiusdem aqua stillatitiâ,
pota confert cardialgiæ, quam Germani Sodb
vocant, calorem præter naturam extinguit, bi-
lem exstuantem reprimat, nec non tussim &
stillicidium, aduersatur venenis: succus ex in-
tegra planta expressus, recentia vulnera sanat:
flores continuo intuitu visum corroborant, vnde
quidam fasciculos in conclauibus suspendunt in
eius usum. Iidem contusi ex aqua rosacea, illieu
oculorum calores & rubores tollunt. Semen,
scribit Camerarius, aut succus plantæ expressus
vermiculos putridorum vicerum profligat: quæ
ille ex Lobelii Observationibus videretur mutua-
tus, à Lobelio, vt apparet, Sophiæ Chirurgorū
attributa, non Consolidæ regali proximè eam
sequenti. In coronas hodie ab amasii pluri-
bus in locis expetitur. Conseruam & è floribus
parari tradit Tabernamontanus, quam commen-
dat ad tormina infantium, Auellanzæ nucis ma-
gnitudine sumptam: Castanzæ verò ad cardial-
giam. Cæterum, miscet Tabernamontanus non
absque graui, mea quidem sententiâ, errore, vi-
res Consolidæ regalis & Cumini siluestris secūdi
Dioscoridis, quod idem simplex sibi falsò imagi-
natur.

Oculorum
calore
inflammatione

Vulnera
glutinat

Tussis
Venena

Tormina

Cardial-
gia.



HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XXVII

(633)

VMBELLIFERAE.



VTINAM benigna rerum parens natura quamque stirpem classem tam claro & insigni donasset cen communis generis societasque signo atque vexillo, quali umbelliferae deinceps producendas dilatauit; non prae seculo tantopere in clauibus instruendo & versis undu laboraremus. quamquam nimia etiam similitudo non rard in hoc genere exercit artissimum quemque fallere queat Umbellam dicimus in plantis, floris seminisve veluti pedamentum, in plures diuisum longiores pediculos: qui simul ex fastigiis eodem orti, in laeius continuè radiantur: singulique florem vel semen sustinent in orbem circumactum, quâ floris figurâ Fœniculum, Anisum, Scelis, Daucus, & cetera pleraque id genus sunt: quod quoniam umbella, quâ solem à vultu mulieres arcent, formâ est, ob latitudinem circinationemque suam ideo umbellâ hâcque decorata planta, umbellifera dicuntur.

FOENICVLVM SIVE MARATHVRM VETERIBVS.

CAPUT I.

Oleo Tibo
ph. & inf.
fores.

Dis. Sires

Lac. gema.
vat.

Nephrosi

Nausea.

Canum
morsum.
Pisum d.
cuius succum.



HEOPHRASTUS inter olera recenset, & suffrutices ferulaceos Fœniculum, eique caulem nervosum, ac semen nudum & suaveolens [Lob. &] attribuit. Dioscorides Fœniculum [Mæd. Spor] tanquam notissimum non describit. Herba huius, inquit, si edatur, mammas lacte replet, idem verò potest semen epotum, aut cum prillana decoctum. Comæ autem decoctum bibitum [Cordus in vulg. exempl. inopisum legitur, sed legendum potest, Corn.] renum ac vesicæ vitis [nis nephrosi] est utile, quippe quod urinam excieat. Convenit & à serpente demorsis, in vino bibitum, ac menses quoque ciet. In febribus nauseam & stomachi ardorem [additur in vet. sto Lacuna codice à, à d. l. m.] sedat, ex aqua frigida potum. Contritæ verò radices, & cum melle impostæ canum moribus medentur. Succus è caulibus & foliis expressus, & in Sole siccatus, oculorum medicamentis utiliter additur, quæ ad aciem visus excitandam reficiendamve præparantur. Extrahitur & ad eadem valens è recenti semine succus unâ cum foliis atque ramulis. Radicibus præterea primâ germinatione succus eodem modo exprimitur. Porro in Iberia quæ ad Occidentem spectat, liquorem etiam reddit Fœniculum, gummi similem. Caulem verò medium dum floret herba demetunt indigenæ, igni quæ admovent, quod facilius vi caloris

velut exudans gummi remittat. Id autem est succo ipso efficacius ad oculorum medicamenta.

Si secundis fœmina liberari nequeat, Fœniculum secundas ex vino & oleo, & melle fervefactum potui exhibere jubet Hippocrates. Idem etiam, si lac extinctum fuerit, Fœniculi semen & radices decorticas, simulque butyrum decoquit, cum verò decocta fuerint, refrigerata bibenda propinat. Cum autem emori & facile solubiles uteri fuerint, radices Fœniculi probè lavat, contundit, in ollam ad usum paratam immittit, & aquâ assusâ somentum parat, & admovent. Ex dictis itaque patet, nullo modo tolerandum esse errorem Bald. Ronsi, qui pro Fœniculi vino, oleo, ac melle fervefacti decocto, oleum sublimationis Fœniculi siliqui aut drachmæ pondere bibendum præbet. Ego tam calidi olei vix scrupulum propinandum suaderem.

Fœniculum, inquit Plinius, ferulacei generis est, anguibz gratissimum [hic forte deest syllaba, &] ad plurima condienda cum inaruit. Et perquam similis Thapsia. Item, Fœniculum nobilitavere serpentes, gustatu ut diximus, senectam exeundo, oculorumque aciem succo ejus reficiendo. Vnde intellectum est hominum quoque caliginem præcipue relevati. Colligitur hic caule turgescente. In Sole siccatur. Inurgitur ex melle. Ubique hoc est. Laudatissimum tamen in Iberia è lacrymis fit, & ex semine recenti. Fit etiam è radicibus prima germinatione incilis. Dixerat autem de serpentibus l. 8. c. 27. Anguis hyberno tempore membranâ corpori obdu-

et, Fœniculi succo impedimentum illud exiit, nitidusque vernat. Et paulò post: Idem hyberna latera visu obscurato, Marathro herba se se afficans, oculos inungit ac resovet.

Nicander.

Sed hæc, quæ de Fœniculo Plinius habet, Nicandro debet. Sic enim apud Poëtam legimus.

Τῆμ' οὐ τ' ἀλλ' ὅν φασιν εἶπε δὲ ποτὶ γὰρ αἶς,
Μῶλιν δ' αἰσέχων ὅ τι φασὶν εἶπε φ' ἄλ' γὰρ.
Ὁ μὲν αὖ φασὶν εἶπε φ' ἄλ' γὰρ εἶπε φ' ἄλ' γὰρ
Βασανίτις ἀνιῶτε καὶ αἰγύπτου πιδόση.

Cordus:

Dum tepido sub vere suum modo liquerit antrum,
Et caligante suo male cernit lumine, sed cui
Arrosus mox Fœniculi sua r' θόρα caulis
Atque navum reddit, qualis fuit ante, vigorem.

Quorum sensus hic est. Quo tempore relicta arefcentium squammarum senectute torpidus & seignis ingrediens, vernaque tempestate cavum suum fugiens, hebetibus oculis cæcutit: verum depastus Fœniculi comosus ramus celerem & claræ lucis eum efficit.

Medicinæ in sativo [*scil. Fœniculo*] pergit Plinius, ad scorpionum ictus, & serpentium, semine in vino poto. Succus & auribus instillatur, vermiculolusque in his necat. Ipsum condimentis prope omnibus inseritur: oxyporis etiam aptissime quin & panis crustis subditur. Semen stomachum dissolutum adstringit, vel in febribus sumptum, nauseam ex aqua tritum sedat, pulmonibus & jecinoribus aptissimum. Ventrem sistit cum modicè sumitur, urinam exciet, & tormina mitigat decoctum, in lactisque defectu potum, mammas replet, radice cum ptisana sumpta. Renes purgat, sive decocto, sive semine sumpto. Prodest & hydropicis radix ex vino cocta: item convulsis. Illinuntur folia tumoribus ardentibus ex aceto. Calculos vesicæ pellunt, genituræ abundantiam quoquo modo haustum facit. Verendis amicissimum, sive ad fovendum radice cum vino cocta, sive contrita in oleo, illitum. Multi tumoribus & sugillatis cum cera illinunt. Radicis succo, vel cum melle contra canis morsum utuntur & contra multipedam ex vino.

Galenus.

Tempera-
mentum.

Galenus Fœniculi facultates distinctius explicat, à Dioscoride tamen non dissentit. Fœniculum, inquit, tam valenter excalfacit, ut ex tertio ordine excalfacientium censeretur possit, desiccatur verò non æquè, sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit, quare lac procreat, quod si admodum desiccaret, non sanè efficeret, suffusus eadem ratione auxiliatur, urinæ mensæque ciet. Hæc Galenus.

Fœniculum nobilitavere & homines toto anno quondam viridi, sicco, servatòque sale, totaque mensa non ut nostra ætate sit in secunda & ad augendam sitim tantum, nec semine solum, sed comâ & caulibus utentes.

Dioscori-
dus.

Mense Februario Fœniculum serere præcipit Palladius, loco aprico & modicè, saxoso.

FOENICVLVM SILVESTRE, SIVE

Hippomarathrum, duplex, semine cachry simili, & rotundo, veteribus.

Diosc.

Ἰππομάραθρον, quod Μαράθρον est ἄζρον, inquit Dioscorides (apud quem inter notha aliqui Marathin vocant, Egyptij Sampson, Magi Thymarnolion, Latini Fœniculum erraticum, seu equinum, aliqui Meum, Galli Sistrameor.) fert semen Cachry simile, radix subest odorata, quæ pota urinæ stillicidium sanat. Eadem apposita menses ducit. Semen autem aut radix alvum sistunt potu. Auxiliantur etiam commotus à bestiis venenatus, & calculos atterunt & mor-

bum regium depurgant. At foliorum decoctum potum lac attrahit, & mulieres à partu purgat. Vocatur & alterum Hippomarathrum, quod folia habet angusta, parva, oblonga: semen autem rotundum, ad Coriandri semen accedens, acre, odoratum, calfaciendi vi præditum. Facultas hujus Hippomarathri superiori respondet, sed efficaciam debiliore.

Porro est & alterum Fœniculum Galeno, quod præ magnitudine Hippomarathrum nuncupant, cuius radix ac semen amplius quàm domesticæ, desiccandi vim obtinet: quocirca ventrem quoque eo nomine sistere videtur. Nec sanè manifesta illis inesse videtur adstrictio. Hujus non radix modò, sed & semen cachry assimilè est, potèstque & calculos frangere, & auriginosos sanare, mensesque & urinas movere, non tamen lac congerere, sicut illud superius. Aliud est Hippomarathrum, cuius semen rotundum est & acre, simile semini Coriandri, facultate quidem Hippomarathro simili, sed debilius. Hæc Galenus, qui dubitare videtur, quomodo ventrem sistat Hippomarathrum, cum manifesta ei adstrictio inesse non videatur, & causam attribuere desiccandi vi: ego autem alvum sistere existimo propter vim diureticam: dixit enim ante Dioscorides, radicem potam urinæ stillicidium [*φρυγανείαν*] sanare. Copiosas autem urinas alvum sistere docet Hipp. aph. 83, sect. 4. ubi ait. ὁρῶντες νικτὸς πολλὴν γενούσῃ σπινθὴν τῷ ὑποχόρῳ σπινθίνῃ. Unde etiam Galenus dicit in comm. In quibus enim supra modum humida alvus deprehenditur, iis potum minorem exhibemus, ac præterea illi viam ad vesicam parabimus.


De hoc Fœniculo silvestri hæc Plinius tradit. Est in hoc genere [*Fœniculum*] silvestre, quod alij Hippomarathrum, alij Myrsineum vocant foliis majoribus, gustu acriore, procerius, brachiali crassitudine, radice candida. Nascitur in calidis, sed saxosis. Diocles & aliud Hippomarathri genus tradit, longo & angusto folio, semine Coriandri. Hippomarathrum ad omnia vehementius [*quàm Fœniculum*] calculos præcipuè pellit. Prodest vesicæ cum vino leni, & seminarum menstruis hærentibus. Efficacius in eo semen quàm radix. Petridius, qui ophiaca scripsit, & Michon (alij Micon legunt) qui Rhizotomumena, adversus serpentes nihil Hippomarathro efficacius putavere. Sanè & Nicander non in novissimis posuit.

Silvestre Fœniculum semen ferens ut Cachry (inquit l. 3. c. 48. Ruell.) est tantæ amplitudinis in Mauritania ut caulis duodecim cubitis assurgat, crassitudine palmarum quatuor. Officina nominant agreste Fœniculum, sativo procerius, brachiali crassamento, foliis etiamnum majoribus, semine militaceo, radice albâ, odoratâ.

Cæterum, non amplius esse notum, quàm nomine Fœniculi silvestris, tum officinis, tum nostris, utrumque Hippomarathrum testatur Cornarius.

FOENICVLVM VVLGARE MINVS, acriori & nigriori semine.

IN TER Fœniculi genera, quod vulgatius est, ex radice digitali, aut majore si ramosior fuerit, rectâ, albâ, sapore cum quadam dulcedine aromatico, caulibus surgit tres aut quatuor cubitos altus, rectus, striatus, geniculatus, atrovirens, fungosâ albâ medullâ fardus, crebris alis concavus: pediculi ceu vaginâ caulem & ramos complectuntur, quibus folia insident in longa tenuissima filamenta dissecta, atrovirentia, sapore dulci,



dulci, odore suavi: umbellæ florum late, luteæ, odoratæ. semen oblongum, Anisi, nigricans, gracilius, sapore acriori, minus dulci.

Ruellius de quo Fœniculo loquatur l. 3. c. 48. minus patet. Nec inibi demonstrat, an de vulgari, vel dulci scribat. Vulgare hoc, Fœniculi nomen apud plerosque herbarios retinuit; apud Anguill. ep. 7. Fœniculi sortis live acris; apud Gesn. hor. Fœniculi communis; apud Ta-

bern. in hist. (ubi pro Fœniculo hoc vulgari ponit figuram, quæ in Icon. posita nomine Fœniculi Romani sive dulcis) Ger. & Lugdun. p. 689. Fœniculi vulgaris; apud Lob. in Adv. & Icon. Fœniculi sive Marathri vulgationis; apud Cæsalp. Fœniculi silvestris semine exiliori & acriori; apud Bauh. phyt. Fœniculi 2. sive vulgaris; apud eundem apud Matth. Fœniculi sativi minoris vulgati, quibusdam Hippomarathri dicti. In pin. Fœniculum vulgare duplex facit, scilicet Germanicum & Italicum. I. est Fœniculum, Brunf. Trag. Fuch. Dod. gal. Turn. Cord. in Diosc. & Tab. commune, Gesn. h. vulgare, Ger. quibusdam Hippomarathrum putatum, Camer. h. Huic accedit Mediolanense, quamvis vulgato germanico gratius sit. Variat foliorum colore: nam commune foliis est virentioribus; alterum subnigricantibus, rubentibus, aliis non differens: quare Fœniculum 1. & 2. facit Dodonæus. Fœniculum 2. sive vulgare Italicum semine oblongo, gustu acuto: Fœniculum, Matth. Lac. Cast. vulgare semine pallido sive luteo oblongo, Lugd. Fœniculum acce, Ang. Eid. B. in pin. Fœniculum 5. sylvestre: Fœnic. erraticum, Matth. Lac. sponte virens in agris Narbonensium. Est hoc Fœniculum Lobelio & nobis à vulgari non diversum. Præterea Matthioli suo more quæ non novit dicit omnibus nota, ut notum in omnibus Hetruria Fœniculum erraticum: interea non demonstrat an per id intelligat nostrum vulgare, semine amaricante, spontaneum: nec an sit Dioscoridis sylvestre.

Græcis Μαράθριν dicitur, Aethiario Μάλαθρον & Μαλαθριν; Latin. Marathrum & Fœniculum & officinis sine diphthongo Feniculum; Serapioni Rasieneg; Averrh. Halcazmeg; Apicenn. Baraline; Alfaberavic, Rasieneg & Razmog; aliis Arabibus Rasieneg & Rasieneg: cortex radices, Cotior Atala Rasieneg. semen Bizzeri Atafigeniti. Basara, Afifigeniti, & Beser Rasina. Germanis Fenchel: Belg. Vensel: Gall. Fenouil & Fenouil: Ital. Finocchio & Fenocchio: Hispan. Hinoio & Im zo: Lulit. Funcho & Funchio: Persis Berasme: Angl. Fench & Fensel: Bohem. Wlaszkyfopr & Kopr wlaszy: Polon. Wloszkyfopr: Hungar. Kömény: Cretensib. Marathra. Μαράθριν autem Græcis, ἀπὸ τοῦ μαράσσειν, à marcescendo dictum putatur, quod ejus cum inaruerit, multus sit usus ad condienda plurima. Fœniculum autem à Latinis, quod satum magno cum sænore semen reddat; vel potius Græcorum imitatione Fœniculum dictum, quod quasi sænum in hyemes arefactum & marcidum reponatur.

Tom. III

Fœniculum vulgare semine minori, acriori & ni griori Monspelij & Lugduni sponte passim provenire observavi; Genevæ in hortis folia Hicnem perferte; Basileæ adhuc Octobri florere; Montbelgardi in horto E. C. ubi à me satum primo anno non fert caulem, altero verò floret Julio. Ex semine deciduo multum se propagat. Nasctur locis calidis & saxosis, qualis est Monspelium & Lugdunum, juxta muros meridianos. Radix vivax est & in plures annos durat. Vere erumpunt folia, deinde caulis assurgit, sequuntur cum floribus muscaria. Semen sub finem Augusti ac Autumno perficitur.

Fœniculi semen per se mansum aut saccharo conditum, & continuo sumptitatum, lentam pituitam incidit, inquit Tragus, & excreabilem facit. Ad caliginosos oculos nihil efficacius hoc semine. Aqua fœniculi distillata manet & vesperi oculis indita; caligines eorum discutit, auribus instillata vermes enecat. Eisdem facultates obtinet succus expressus, & lachryma, seu, ut vocant, gummi Fœniculi. Cæterum, ut refert Dodonæus, Fœniculi vulgaris semen quidem calidum est secundum, siccum verò primo ordine. Ventriculum assumptum roborat, nausæam sedat, tormina mitigat, flatum discutit: In vino potum ad serpentum & scorpionum ictus ac morsus valet. cum saccharo pulvis hujus jejuno ventriculo assumptus, aciem oculorum conservat: lac quoque nutritibus augeat. quod & ipsius herbarum succus efficaciter præstat, tum & ipsa comesta ac in olere sumpta, quæ minus calida ipso semine. Vtilis verò renibus ac vesicæ. urinam cit & calculos expellit. Radices ad eadem valent, & potentiores, utpotè calidiores: proinde non modò urinam provocant, sed & hepatis ac quoque lienis infarctus expediunt, & viscera ab obstructione liberant: menses quoque promovent. Fœniculum eadem cum melle contritæ canum moribus mederi impositæ. Ipse Fœniculus (inquit Americ. Vesp. in præfat. suar. navig.) prius sumptus, esculentis odorem dat & meliorem digestionem facere assuevit. Fœniculi saccharo conditi semine, vel Zingibere cocto, vel aliquo alio simili dissipantur flatus. Quod si semen Fœniculi aceto infundatur, exsiccetur, & Cinnamon tantundem addas addito saccharo parti semi unius, sumendo de hoc fit mirabile in præservando visum & debilitatem reformando & in oculis octuagenariis jam obtenebrato visu, ut incredibile visum sit Arnoldo de Villa nova. Galenus, Paulus & alij Fœniculum statuunt calidum in tertio gradu & siccum in primo. Verum si rem penitus examinamus, comperimus (inquit Tabern.) esse calidum in secundo & siccum in primo ordine cum nonnulla adstrictione. quare aperit, discutit, & resolvit. Hodie non solum in Medicina expetitur, verum etiam in culina. Coqui & diligentiores matres familias variè ad usum præparant. Nonnullæ tenellis surculis cum sale ad carnes & allaturas. Nonnullæ miscent cum saccharo: alie acetariis imponunt. Quædam hos cum non bene maturo semine, sale & aceto condiunt, & post annum usurpant. Pisces assandi non temerè Fœniculo replentur & eo involvuntur. sic namque non solum iis gratus sapor conciliatur sed & superflua humiditas corrigitur, & sic salubriores redduntur. Quare ij quoque consultum faciunt, qui pisces cum Fœniculo in jure decoquunt. Hoc siquidem non tantum eorum humiditatem consumit, verum etiam ad concoctionem facit. Roberatenim Fœniculum caput, ventriculum, hepar, lienem, renes, vesicam & matricem, viscososque humores digerit. In

Locus & Tempus.

Vires & Vires.

Oculi caliginosi.

Gummi.

Temperamentum, Dod.

Viscerum in-

Digerit.

Antiqui: rum lapsus

In cibis.

Surculi tenellis.

Ad pisces assandos.

Roborat & sciat.

Panifcien additur. eundem usum tam comæ Fœniculi, quàm etiam radix in cibos additur, & semen in panem. Hoc pulverisatum, è vino potum, flatus discutit ventriculi & intestinorum. unde vericulus rhythmicus,

Semen Fœniculi referat spiracula cili.

Succus è radice recenter expressus, unciarum trium pondere potus cum vini generosi uncia una, nephriticis mirè subvenit. De Fœniculo hunc in modum cecinit Macer Æmilius:

Macer. Fœniculum Medicis calidum siccumque secundo
Dicunt esse gradū, Marathrum Græci vocat illud:
Veneris ob- Cum vino canctū obstat hac herba veneni,
stat. Hæc mansæ serpens oculos caligine purgat,
Indèque compertum est humanis posse mederi
Illam luminibus, atque experiendo probatur.
Radici succum mixtum cum melle recenti,
Pulsâ reddit eos omni caligine claros
Expressus Marathri viridi de semine succus
Solèque siccatum, magnum medicamen habetur,
A quo quisque veluti oculorum pellere morbos.
Auribus infusus vermes succum necat eiu:
Renibus in prisana radix decocta medetur,
Cum vino fugat hydropicos potata tumores,
Sicque venenatis obstat moribus illa,
Sic quoque pulmonis obstat, iecorisque querelâ,
Et sic nutriti sumpta, sit copia lactis.
Cum vino, vel aqua radice coctio sumpta
Nephreticis, & vesica morbis medicatur,
Vrinæ purgat, & menstrua sumpta resolvit:
Vel si trita super pectus hac herba ligetur,
Nausea cum vino sumpta sedabitur illa:
Fervorem stomachi cum lymphâ mitigat hausta.
Radix illius vino decocta dolores
Fomento curat: paritur quos virga virili
Hoc quoque, si iungas oleo, facit, hocque perungas
Ictus, vel factos subito quoscunque tumores,
Apponas tritam inuncto sedabit aceto.
Veneris Semen cum vino bibitum Veneri movet actus,
stimulat. Hæcque modo lateris viros sedare dolores
Dicunt, aut herba si sit decoctio sumpta
Tradunt auctores, eius invenescere gustu
Serpentes, & ob hoc senibus prodesse putatur.

Idem hoc testatur Serenus, dicens:

*Si tenebras oculi obducit pigra senectus,
Expressa Marathro gutta cum melle liquenti
Detergere malum poterunt.*

Et hæc sunt & plura alia, quæ in longum recenset
Tabernomontanus, qui præterea Fœniculi saccharati, seu Fœniculi saccharo obducti meminit, quod commendat ad jam dictos affectus, scilicet caliginem oculorum, dolores capitis; ad memoriam juvandam, vertiginem abigendam, lac & semen augendum. ad obstructions referandas, tussim sedandam, & dolores nephriticos curandos, corrigendumque aërem malignum, & ad halitum scetentem, nauseam, & similes morbos. Sed & vitænum fœniculatum, Mulsam, sive Aquam mulsam Fœniculi: Item Fœniculi decoctionis aquam, Fœniculi succum exsiccatum, Fœniculi extractum, radicis syrupum, & Syrupum extractionis Fœniculi, radicem conditam, Fœniculi salern, & oleum stillatium chymicâ arte extractum, ad omnes prædictos morbos.

FOENICVLVM VVLGARI simile, dulce.

THOMAS Platerus egregius Medicinæ candidatus misit anno 1595. semen cum hac inscriptione. Fœniculum dulce instar sacchari, cujus semen non differt à vulgari, nisi sapore dulci & grato; multò tamen minùs & nigrius quàm id, quod

Florentinum dulce cognominatur. Satum Aprilis multoties provenit & floruit in horto E.C. Montbelgar di.

FOENICVLVM DVLCE, MAIORE & albo semine.



Fœniculū dulce, eodem anno, quo satum est, semen proferens maturum, à vulgato radicibus, foliis, caulibus, & flore vix differre videtur, nisi fortè caule minùs procero & graciliore ac foliis minoribus. semina quidem multò sunt majora, striata, albidâ, dulcia, minùs acia: ceterum, si quando Hiemem apud nos perfert, & aliquot annis durat, videtur amittere dulcedinem,

& de albedine ac magnitudine minui. Icon præsens exhibet hujus Fœniculi semen dulce majus, & vulgare minùs: itemque rotundius.

Rationes porro quæ me movent, ut potiùs hoc Dioscoridis sentiam Marathrum, quàm vulgatiùs, sunt hæc. Primò quod seratur & non nisi cultum proveniat, ut etiam ostendit colendum Palladius, & sativum vocat Plinius. Secundò quòd semen hujus multò dulcius & minùs acre sit, quàm illius. Tertiò quòd minùs procerum, & folia minora conspiciantur. His adde locum, unde deferri dicitur.

Geln. h. dicitur Fœniculum dulce, vel Florentinum æstivum. Matth. Fœniculum sativum, sive domesticum in Hetruria notum. In epit. cum addit. Camer. Fœniculi quoddam genus dulciori & crassiori semine. Cam. apud Matth. german. de hoc ait: Fœniculum Italicum, Welscher Fenchel / Fœniculum dulce, fortassis hortense veterum: in nostris hortis cultum, non diu reservat naturam suam, verum uti sæpiùs expertus sum, solet postremò, nostro iterum simile evadere.

Casalp. sanè à nostra opinione alienus non est. Fœniculum hortense, inquit, caule cubitali constat, & paulò altiori, recto: umbellas fert latas; semen crassum, in rotunditate oblongum, candidum, sapore subacri, aromatico: seritur in hortis pro condimentis & obsoniis: sed anno secundo transit in silvestre. Fœniculum hortense Dioscorides Marathron vocat, Theophrastus Fœniculum inter olera, Plinius Fœniculum à serpentibus nobilitatum.

Lugd. p. 689. Fœniculum dulce vocat (ut & An. guill. epist. 7.) describit, sed non pingit. Tab. quam posuit figuram in hist. pro Fœniculo vulgari, in Icon. ponit pro dulci, quod Fœniculum Romanum, & Fœniculum Florentinum, Ital. Fenchio dolce, German. Süßen Fenchel / Römischen Fenchel & Florentinischen Fenchel / propter dulcedinem quam habet ex cultura Romæ & Florentiæ, cognominari ait.

Bauh. phyt. Fœniculum 1. sive dulce, caule vulgari breviori, semine majore albidò, foliis & semine dulcoribus. Apud Matth. Fœniculum sativum semine majore albidum, verum Fœniculum credi.

creditum, magis dulcescens, sæpius hortense, secundo anno in silvestre transeuns, quod in incultis montosis semine exiliori, radice crassiore nascitur: Eid. pin. Fœniculum 3. dulce, ut & Matth. Lac. Ang. Gesn. h. Lob. adv. Cast. Ger. desc. Fœniculum 3. Dod. solo sapore à primo distinctum. Fœniculum sive Marathrum vulgatus dulce, Lob. Fœnic. hortense semine crasso in rotunditate oblongo, Cxf. quod anno secundo in silvestre transit. Fœnic. dulci semine majore, gustu anisi, Lugd. Fœnic. Romanum semine pallidè luteo, Tabern. quod tertio anno in commune transit. Fœnic. majus, Cam. h. Hoc semine est vel rotundiore, quod Romanum & Florentinum dicitur; vel in rotunditate oblongo, quod omnium dulcissimum & gratissimum, & Bononia adfertur. Hæc frater. Mihi Fœniculum dulce, quod veterum existimo, non videtur simpliciter apud Herbarios Fœniculum vocari.

o. 2. sub.

Locu.
Tempus.

Fœniculum dulce Montbelgardi in horto E.C. ex satione provenit, quod Lugduno allatum erat. eodem anno caulem fert & semen: interdum etiam perfert Hiemem non perinde tamen ut vulgatus, nec perinde frequens feritur, utpote semine è Græcia aut Syria allato, teste Lobelio. Basileæ in horto patris habui semine maturo Augusto.

Vires.

Quia porro Fœniculum hoc à veteribus descriptum esse credimus, idèd ei quoque vires ab ipsis Fœniculo attributas convenire dicimus. Illas etiam huic adscribimus, quæ recentiores vulgari proprias faciunt.

FOENICVLVM ROTVNDIORI semine, quibusdam Hippomara- rathrum.

Hippomarathi ab antiquis prodi silvestris, semine præsertim à vulgari sponte virente diverso, plantam, quæ aptè respondeat, similem equidem habemus (inquiunt auctores Adversariorum) nullam, quale Guiliel. Dresch probus & peritus Pharmacopœus aluit superioribus annis Antuerpiæ, procerum, prægrandèq; Fœniculum, communi simile: caule ternum, quaternumve cubitorum, foliis brevioribus, aliquanto rigidioribus, albicantibus Corradæ. Semen par, aut paulò minus altero [dulci] rotundius, & Aniso propius. Isti Hippomarathi nomen secèrunt.

An B. pin. Fœniculum 3. dulce, semine rotundiore: de hoc vide in tituli præcedentis synonymis.



FOENICVLVM
rotundum flo-
re albo.

Radice nititur fibrosa, exili: caule minori & breviori: foliis latioribus ac etiam brevioribus, quàm vulgari Fœniculi: umbella alba, rotunda, primo anno flores & semē ferens, minus quàm vulgare Fœniculum, sublongum, & rotundum. Plantæ gustus & odor vulgari similis. Si semen hujus stir-

pis in Autumno terræ mandas, evadit tota planta procerior & efficacior, quandoquidem Hiemem faciliè perfert.

Tabern. descriptionis auctor, inscribit Fœniculum rotundum, propter semen oblongum & rotundum, quo à vulgari differe scribit. Mirari eum subit, cur locum, in quo hoc viderit, vel unde habuerit, non indicet.

B. pin. Fœniculum 4: semine rotundo minore: *Synon?*
Fœnic. rotundum vulgare, Ger. ic.

A vulgato sapore & odore non differt, sed humilior est, umbella candida, semēque vulgari minus & Carui formâ.

FOENICVLVM MAGNVM, sive Hippomara- rathrum.

ACCEPIMUS à Casabona anno 1594. Hippomarathi ex Cædia titulo, pulchrū semen album, duplex, cōpressum, latum, oblongum in quo tres costæ. differt à nostra Libanotide eachryophorâ dicta, & illi semina crassa, turgidave & non lata.

Considerandum an de hac planta hæc scribat Bellus in epist. ad Clusium. Hippomarathrum folia tenuia; Fœniculo

quodammodo similia, profert, eādem lævem, duos aut tres cubitos longum, minimi digiti crassitudine, geniculatum: florem luteum in umbellis, ut Anethum, semina magna, Cachry similia: radice nititur firmâ, magnâ, odoratâ. Vocatur *ματθιαννον*, quod *Platyminum* Latum Cuiusmodi.

C.B. in prod. Hippomarathi Cretici nomine ex horto Nicolai Contareni Senatoris Veneti, habet ramos cubitales, rotundos, læves, striatos, pallidè virentes, in alios brachiatis: folia Fœniculi modo, in tenuissima, sed longè brevissima segmenta divisa: caulium summitatibus, umbellæ parvæ insident: gustanti plantæ sicæ folia & caulem, de sapore nihil certè pronunciate licuit. In pin. vocat Fœniculum 6. Hippomarathrum Creticum.

CHAA, HERBA IAPONIA. ponia.


AD Fœniculum reducit C. Bauh. in pin. Chaa, herbam in Iaponia, ex cuius pulvere decoctum preciosum parant, & hospitibus dignioribus propinant: & olla in qua hujus herba decoctio facta, in eo apud ipsos precio habetur, in quo apud nos adamantes sunt: Lin-

scot. part. 2. Ind. or.
cap. 28.

ANETHVM. CAP. II.

Defor.

FOENICULO per simile est, caule fistuloso striato, folius tenuissimè in capillaria filamenta dissectis, odoratis, sed minus, quàm Fœniculum, gratis: flores



Synon.

in umbella lutei, quibus semina succedunt fœniculacea, latiora, sapore acri, minus grato etiam, quàm Fœniculi.

Anethum Theophrastus inter olea recenset. Hoc nec Dioscorides, nec Plinius describunt, sed ex aliis plâis Anetho cōparatis facillè colligitur, eā esse, quæ id nomen in hunc usque diem apud herbarios retinet.

B. pin. Anethū
i. vulgare: Anethū, Brunf. Matth.

Fuchs. Turn. Dod. Cord. in Diosc. Gesn. h. Ang. Lac. Lob. Cast. Lon. Czf. Lugd. Tab. Cam. & Ger.

Nomina
linguar.

Anethum sunt qui Polgion sive Polgida, qui Anicetum vel Anicethum vocent: Magi Cynocephali aut Mercurij genituram & Cynocephali capillum, alij Mercurij semen: Aphri Scyrtian [Sicilian Tragus] Aegyptij Arachu [Arach. Tab.] Daci Polpum aut Pulpum: Aegineta Enemion: Serapio Xeberh: Averih. Sienat. Bellunensis Alsebat: vetus Avicenna glossator Namlin ueber, Sebatum, leber, Seebot Sebes, Sebez, Seet, Aneide, Alsebere. Schar. Serb & Rau: Ioan. Bruyerinus Escarlata & Herba Tolofana: Germani Tilen/ Dylen/ Dillenfraut/ & Hochfraut: Belgæ Dille: Galli Anet & Anere: Itali Aneto: Hispani Eneldo, Aneldo, & Heneldo: Portug. Endros & Endres: Angli Dill: Bohemi Koprzahradni: Hungari Kapor: VVal. Poltum & Polpum: Poloni Siwoysififopr [& Anyz Tabern. sed quàm bene inducunt ali] Cretenses Agnith. Nicol. Myrepso caules dicuntur αινιδύρα: Fuchsius autem per αινιδύρα intelligit lignosas radices Anethi. Semina dicuntur Arabibus Besara sebez. Anidor quidem Græcis dictum scribitur ἀνιδιον, quod citò crescat. Alij tamen αινιδιον, quasi αινιδιον dictum volunt, quia appetentiam cibi excitet, sed etiam αινιδιον & congressus, & coitio Venerea est, ad quam lacessit Anethi esus, ut antiqui prodiderunt: tamen plurimo usu tandem genituram exhaustat, Dioscoride teste.

Locus &
Tempus.

Anethum in hortis copiosum Genevæ, Basileæ, Lugduni, & Montbelgardi, semel satum quorannis semine deciduo se propagat, testibili fecunditate. Sponte interdum nascitur in Anglia & Northmannia. Anethum, ut legimus apud Crescentium, desiderat communem hortorum terram, & feritur mense Februarii & Martii, Septembri & Octobri & in locis clementibus etiam mense Decembri per se & cum aliis herbis, omnem cœli statum patitur. Sed in tepidiori lætatur, rariùs feratur, & irrigetur si non pluât. Aliqui semen ejus obruunt, opinantes quod ab ave nulla tangatur.

Vires &
Vsum.

Andi Anethi comæ, seminisque decoctum, inquit Dioscorides, potu lac evocat, inflationes ac tormina sedat, alvum vomitionisque læves sistit, urinas ciet, singultus lenit, oculorum aciem habet atque genituram restinguunt assidue potum. seminis

vulvæ malo opportunis ad deflectiones utile. condylomata illitus ejus cinis tollit. Oleum sic conficitur. In olei libris octo & dodrante, floris Anethi libras undecim & bellem per diem macerato, deinde manibus exprimito ac recondito. Quod si bis macerare voles, rursus recentem Anethi florem eodem modo immittito. Potest mollire & aperire uterum. Convenit etiam ad rigores per circuitum repetentes, calefaciens & lassitudines solvens. Est etiam cōmodum ad articulorum dolores. Eadem serè quæ Dioscorides tradit, Plinius etiam habet. Anethum, inquit, ructus movet, & tormina sedat, alvum sistit. Epiphoris radices illinuntur ex aqua vel vino. Singultus cohibet semen feruens olfactum. Sumptum ex aqua sedat cruditates. Cinis ejus uvam in faucibus levat, oculos & genituram habet atque Anethum, authore Galeno, adeo exalfacit, ut habendum sit aut secundi ordinis incipientis, aut primi finientis. itaque meritò in oleo decoctum digerit, dolorem sedat, somnum conciliat & crudos & incoctos humores concoquit. fit enim ex eo oleum, cujus propinqua sit temperies pus moventibus & concoquentibus vocatis medicamentis, nisi quatenus paullo illis tum calidius, tum tenuiorum partium est, & proinde digerendi facultate præditum. Vsum autem tertij ordinis tum exalfacientium, tum desiccantium sit, & propterea ulceribus nimis humidis, molliùsque prodest, potissimum iis, quæ in pudendis consistunt. at quæ in præputio sunt inveterata, ea probè cicatrice concludit. Cæterum, viride humidius est & minus calidum: itaque magis quàm siccum concoquit, & somnum conciliat, sed minus digerit: idcirco mihi videntur veteres in conviviis usi esse coronis ex eo concinnatis. Ad crassorum humorum inflationes prodesse Anethum testatur Simeon Sethi. Prodidit idem quosdam sanè ipsum stomacho bonum esse, alios verò minime, dixisse. Illos quidem ad ejus caliditatem, & facultatem, quæ humiditatem concoquit, & flatu, qui sunt in ventriculo, discutiit, respexisse: eos verò ad substantiam ejus, quæ crassarum est partium, concoctu difficilis & nauseosa. Oleo incoctum porro discutere ait, & somnum conciliare. Inunctum tumores crudos concoquere. Inflationes quoque, quæ in ventriculo generentur, digerere. Corpus ex immodico labore defatigatum curare. Renes verò lædere secundum quosdam. Anethum sequentibus quondam celebravit Macer.

Macro

A Medicis calidum siccumque refertur Anethum. Et dicunt quod sit gradus huius in utroque secundus.

Lac das abundanter eius decoctio sumpta

Lac.

Nutriti, stomachique soles depellere morbos:

Stomachi
morbis.

Tres cyarhos eius tepida si sumpserit ager,

Indicio ructus sit, qui demonstrat apertum

Os stomachi, ventis quoque per hoc exisse notivum,

Atque gravibus ali sedatur nausea potu.

Provocat urinas, obstantia quæque repellens.

Mattricem iuvat, bene si foveatur eodem.

Cum tepido tritum patiens si poterit aceto,

Intestinorum curat, ventrisque dolorem.

Intestino-
rum dolor.

Hoc etiam potu digestior tarda iuvatur,

Vnde minor feri vis egestiva videtur.

Assidue bibitum visui nocet, & genit ale

Stomachi
morbis.

Clandit ster, siccans humorem seminis intus,

Vndeque si nimio turgens humore gravetur

Suspendit pulvis combusti seminis eius.

Appositis digitis, aut intus clistere susus:

Acrior esse eius radicum dicitur eius,

Cinis an-
ethi.

Rodit crescentes cinis hic in vulnere carnes.

Vulnera qua serpunt, & sordida vulnera curat,

Vulnera
& ulcera.

Ulcera præcipue membri curare vitili

Dicitur iste cinis infusus sapius illis,

Olfactu reprimis singultum semen Anethi,

Singultum

Assat um

pro quo valg. exempl. *subfulvum*] coloribus variis distinctus, & quasi studio & artificio limatus & expolitus. Nascitur in palustribus. Vulnere recentia ab inflammatione vindicat. seu vinde, seu etiam siccum ex aceto oblinatur. præcipitatis quoque ex alto cum aqua & sale potui datur. Millefolium nonnulli (inter quos est Apuleius) Melophyllon vocant, alij Stratiotiden, quasi Militarem, alij Achilleam, Romani Millefolium aut Supercilium veneris appellant, Galli Bellicocandium.

Plinius. Myriophyllon, inquit Plinius, quod nostri Millefolium vocant, caulis est tener, similis Fœniculo, plurimis foliis, unde & nomen accepit. Nascitur in palustribus, magnifici usus ad vulnera. Cum aceto bibitur ad difficultates urinæ, & vesicæ, & suspiria, præcipitatisque ex alto. Efficacissima eadem ad dentium dolores.

Millefolium cur dictum. Millefolium Plinius Myriophyllon vocat, haud sanè quia in græca voce certa ejus numeri vis & significatio sit, sed quod aptius non poterat in latinis nomen fingi: nec referebat, inquit Marc. Virgilius, in re incerta mille potius, quàm decem millia, infinitave folia illi tribuisse. Quod mutato tantùm accentu in græcis *μύριον* significant: quemadmodum nec malè penitus dixerit aliquis mille, pluribùsve, aut infinitis pilis constare hominis supercilium, ex cuius similitudine Veneris supercilium hæc ipsa etiam vocata à plerisque fuit: quoniam scilicet quemadmodum minuti densique pili eam hominis partem vestiunt: sic Millefolij hujus coliculos, minuta densaque vestiunt folia, quæ licet hîc Dioscorides Fœniculo comparaverit, non tamen eadem longitudine sunt. Hujus enim brevia admodum, Fœniculi verò longiora & quasi capillata. Quod comparatur, copia & exilitas eorum tantum est. Eadem ratio Stratioten & Achilleam vocari fecit. Brevibus enim & numerosis illæ etiam foliis describuntur & sunt, ut videre est H.n.g. lib. 25.

Dubium in Dico. Relinquit verò Marcellus constituendum in hoc Dioscoridis capite peritioribus, quod ultimum in eo legitur *bibi ex alto præcipitatis urisiter Millefolium*: præcipitatis legi ne, an aliter oporteat. Is *πύριον* in cunctis ferè græcis se invenisse ait, quam vocem nihil aliud quàm ex alto casus & lapsus quidem significare concedit. Inclinat ei tamen animus *πύριον*, i.e. inflationes legi posse, vidisseque in quo *πύριον*, quod est inflationibus laborantes legeretur.

Stratiotes aquatica. Stratioten aquaticum hodie ignotum esse placet Cornario: aut eum saltè esse, qui in Ægypto folium nascatur juxta Plinium. Sed cum hic Aizo similis, Stratiotes aquaticus, meo judicio, esse nequit.

Millefol. Stratiotes. Myriophyllon esse voluit Braslavola Millefolium vulgare sive Stratioten (de quo dictum H.n.g. l. 25.) sed hoc ei non concedimus.

Millefol. aquaticum. Lob. in adv. titulo de Millefolio aquatico altero Coriandri folio p. 334. habet nomen Myriophylli, ac ibi intelligere videtur Millefolium aquaticum, à Matthiolo in postr. comm. cum mag. fig. sine descriptione exhibitum. Quale autem hoc sit, nescio. videant igitur lectores, perpendantque an reperiatur planta, omninò similis figuræ Matthioli, & an non sit composita ex umbella Myriophylli Matthioli, de quo paulò post, & nostro Millefolio aquatico penato.

Millefol. aquaticum. Fœniculi facie. Millefolium aquaticum Fœniculi facie, umbelliferum, multis est Myriophyllon.

Millefol. palustre alterum Lob. Millefolium pennatum Lobelio & Clusio est Myriophyllum aut Marathrophyllum palustre.

Millefol. palustre alterum Lob. Est & Millefolium cognominatum Myriophyllon palustre alterum Lobelio.

Millefol. palustre alterum Lob. Habet Myriophyllum aliud Lucas Ghinus, de quo agimus sub Millefolio dicto Viola aquatica

lib. 38. descripta sub capite Polyanthemi tenuifolij. Fit & Myriophyllum, Millefolium marathrophyllum flore Ranunculi albo.

MILLEFOLIUM AQUATICUM, Fœniculo simile, umbelliferum.



Folia sparsa, lætè *Deser.* virentia, scæniculaceis perquam similia, cæsurâ non ita dissimili; prima & inferiora differunt nonnihil; segmenta sunt paulò latiora, in icone nostra non expressa, incuria prætoris: odore grato, sapore nullo insigni: flores gerit in scapo umbellatos, radices ad Hellebori albi radices quodammodo accedunt, fibrosæ, albæ, crebræ ex capite uno dependentes, palmo longiores,

cavæ; in quorum tamen medio reperitur interdum radix quædam primaria, minimi digiti crassitudine, fungosâ, & veluti concavâ.

Hanc pingere videtur Matthiolum nomine My- *Myriophyll.* *lum legit.* *ma, Matib.* riophylli, quod legitimum Dioscoridis constituit, ac se invenisse & læpè vidisse refert in vallis Ananiz palustribus, unico tantùm caule, innumeris foliis referto, capillaceis, Fœniculi modo, odore non ingrato. Figura Matthioli non undique placet, minus *Icon Mat.* *non placet.* etiam ea, quæ ad epit. & hist. germ. à Camerario addita est, eodem Myriophylli titulo, quod græcè *Μυριόφυλλον*, italicè *Myriophyllo*, germ. *Fendhelgarb* vocat. Emendavi ego Matthioli figuram per vetustam plantam ante 40. annos Patavij collectam.

Lob. in adv. p. 333. vocat Millefolium aquaticum *Millefol. aquaticum.* *Lob.* alterum Coriandri folium, ac de eo dicit. Quandoquidem hæc mutila aut depravata visa fuit lectio nobis, post multam perpensionem, animum advertimus hanc repetitam foliorum Millefolij cum Cummyro silvestri collationem, aptius nulli quadrare posse, quàm illi Millefolio in aquis nascenti, ejusdem cum isto speciei & faciei, cuius folia quàm plurima à media ad imum scitè exprimunt Cuminum silvestre aut Coriandrum: superiora verò sunt Fœniculi, sed tenuiora, delicatiora, molliora, uti aptè etiam quædam habet lectio: non Amaraci (ut falsè legunt) sed Marathri: reliqua minorâ, sed similia superne floribus Millefolij: unde perspicua supina commentatoris [Matthioli] somnolentia, dum usque & usque carpit hunc & illum, ipse carpendus & ridendus magis, qui non videat hanc neutiquam foliis esse Sempervivo majoribus, magisque refrigerantibus, sed potius Cumini silv. Coriandri, & Marathri, qualem ipse Senensis bellè pinxit. Umbella etiam hujus est Millefolij, aut silv. Cumini, cui hîc Dioscoridis confert, post sativum fuit Matthiolo expendenda. Hæc Lobelius, qui, dum Matthiolum *Lob. redig.* reprehendit, sibimet valdè doctus videtur, licet obscurius multò loquatur, quàm ut à quoquam intelligi posse queat. Sed quid mirum si volare cupientes absque pennis ipsi prius labant & titubent. Idem postea p. 334. Myriophyllum, aut Marathrophyllum palustre nominare videtur, Fœniculi folio in

fluitantibus aquis; lutea umbellâ emicans. In Obs. p. 460. & Icon. p. 789. Myriophyllum aut Maratriphyllum palustre, Adv. p. 333. & 354. Cæterum, videtur mihi Lobelius non noisse discrimen inter Millefolium aquaticum & Millefolium pennatum fluitans: quod describit secundo loco in Adv. Ei meo iudicio malè assignat umbellam, ut dicemus alio loco. In Obs. ponit figuram Matthioli, sed fluitantem facit, præter ejus mentem. Verum Millefolium Matthioli nunquam observavi fluitare, nec puto ipsum vidisse: conferatur ejus descriptio quam nos ponemus sub Millefolio pennato fluitante, videbitis id non respondere figuræ; ita ut non dubitem asserere, ab eo duæ plantæ confundi: si bene notas ambas habuisset, aut ipsi ad manum fuissent, non accepisset figuram Matthioli, cui tantopere insultat.

Millefol. aquaticum, Dod. Dod. lat. in fol. Millefolium aquaticum inscribit, ac à Millefolio stratiote differre rectè tradit. Expendant peritiores an Apollo rad. i. supra Martiatum, qui Myriophyllo huic videtur tribuere flores candidos, an ritè ab aliis Millefoliis distinguat.

Fœniculum aquaticum Taber. appellat Millefolium, Fœniculum aquaticum, Wasser Fenchel / Fenchelgarb. Bauh. phyt. Millefolium 10. aquaticum umbellatum; is Myriophyllum aut Maratriphyllum palustre Lobelij necdum vidit cum umbella. Idem apud Matth. vocat Millefolium 1. aquaticum umbellatum, Millefolium Cordi in Diosc. Mirari autem subit fratrem cur Millefolium umbellatum cognominet, cum is umbellam necdum viderit. Millefolium quoque Cordi in Diosc. l. 4. cap. 15. plurimum differt à Millefolio hoc Matthioli. Cordi namque est Polygonum scæmina, id quod indicant ejus verba, cum ait: tota herba nuper natam Abietem figurâ imitatur. B. in pin. meliora docet. Millefolium aquaticum 2. umbellatum, capillaceo brevique folio, est Myrioph. Matth. Lac. Cast. prius Matthioli, Lugd. Millefolium aquaticum, Dod. Myriophyllum aut Maratriphyllum palustre, Adv. Lob. Myriophyllum alterum, Cæs. Millefolium, Lon. Ger. Tab. cui & Fœniculum aquaticum.

Sciss. nat. Lugd. p. 770. Myriophyllum prius Matthioli. Schvvenckfeld. Millefolium palustre 1. *sciss. nat.* Myriophyllum, Matth. Cam. Myriophyllum aut *sciss. nat.* Myriophyllum palustre, Lob. Fœniculum aquaticum 1. Tabernomontani. An appellandum cum Schvvenckfeldio stratiotes Millefolium, considerandum: quia Dioscor. descriptioni non convenit.

An Cæs. dicitur Myriophyllum in palustribus Pisanis nascens; frequentibus foliis, mollibus, tenuissimè scissis, instar latæ avium plumæ: radice juncea, albâ, fibrosâ: caulem supra aquas tollens, nudum, tenerum, ac mollissimum supra dodrantem: flores circa summum per intervalla congestos, multo latiores Anagallide, colore ex albo modicè purpurascens: fructus quoque Anagallide majores, florens Vere.

Lac. & Temp. Millefolium Matthioli apud paludes circa fossas Paduz reperi. Mense Aprili vidi apud portam Livianam. Palustris est in Silesia & aquis non fluitantibus familiaris.

MILLEFOLIUM AQUATICUM foliis Coriandri Matthioli.

Syn. **M**atthiolo quondam dicebatur in epit. Millefolium aquaticum, It. *Millefoglio aquatico*. Eid. in Dioscor. Planta quædam Pisis missa à Luca Ghino, quam aquaticum Millefolium appellabat Ghinus, Matthiolus verò aquaticæ stratiotes genus aliquod esse putat. Lugd. p. 770. Stratiotes Millefolium aquaticum Matthioli. Bauh. phyt. Millefolium 9. seu aquaticum Coriandri folio, nondum visum.

Eid. apud Matth. Millefolium aquaticum à Matthiolo propositum & à Lugdunensis herbarij auctore sub Stratiote Millefolio aquatico Matthioli enarratum, hæcenus non visum. Veretur Bauh. ne duæ diversæ unâ figurâ junctæ ad commentatorem sint missæ. Siquidem caules optimè respondeant, si umbellâ adimas Equifeto olido. Idem ait in animadv. in H. Lugdunensem p. 38. Stratiotes Millefolium aquaticum Matthioli, an duæ diversæ plantæ unâ figurâ proponantur, considerent Botanici: caules conveniunt optimè Equifeto nostro olido, cujus etiam sit mentio in H. Lugdunensi p. 1070. sub Equifeto olido.

Ante multos annos annotavimus, nos suspicari iconem Matthioli compositam ex diversis plantis. *Antorum indicium.* Cam. in ep. ejusdem omisit & descriptionem & iconem: Ipsemet etiam Matthiolus solam ponit iconem in post. comm. cum mag. fig. nullâ factâ Ghini mentione: fortè composita icon ex umbella Millefolij aquatici folio Fœniculi, & Millefolio pennato, ac aliâ aliquâ plantâ: non autem existimo ex olido compositam Millefolio, quod frater Equifetum scetidum sub aquis vocat; de quo sanè meo iudicio Lugd. p. 1070. Nulla igitur animadversio in Lugdunensem hic cadere videtur, sed potius in Matthiolum; qui non descripsit & fortè confudit suâ iconem duas diversissimas plantas. Quare meritò censuram in Lugd. omisit idem Bauh. pin. vocans Millefolium aquaticum 1. umbellatum, Coriandri folio: Millefolium aquaticum alterum Coriandri folium, Adv. Hoc foliis Coriandri, & umbellâ subpurpurascens, necdum videre licuit.

DAUCUS PRATENSIS DALE- champi, folio Millefolij.



Donavit mihi Dalechapius Daucum, quem pratensem vocavit ac sic descripsit. Nascitur radicibus multis, candidis, rotundis, ab ima caulis parte in diversa sparsis, brevibus, dulcibus, odoratis, foliis proximè radicem sex aut septem, totidem digitos longis, foliolis per ordinem multis, orbiculatis cauliculos totos ambientibus, Myriophyllo similibus, mollibus, lætè virentibus,

caule medio Fœniculi, cubitali, in ramos duos, vel tres divaricato, foliis paucis vestito, interdum nudo, umbellâ per initium nonnihil rubescens, postea albâ, amarâ, subacri, odoratâ.

Lugd. p. 718. dicitur Daucus pratensis Dalechampi. Bauh. phyt. Daucus 9. (13. pin.) pratensis, Millefolij palustris folio. huc ait frater me ipsi communitalle. Mihi autem videtur potius esse folio Millefolij Stratiotes, quàm aquatici. Hic (inquit Bauh. pin.) foliis & umbellâ, quæ tamen albâ est, cum Millefolio aquatico Matthioli convenit, foliis tamen inferioribus, Coriandro similibus exceptis.

In montosis pratis nascitur, ut refert auctor, florens mense Mayo. *Lac. & Temp.*

DE

DE PANACE ASCLEPIO
veterum.

Diosc. Panaces Asclepium, ut memoriz prodidit Dioscorides, caulem de terra emittit, tenuem, cubitalem, geniculis distinctum, circum quem folia sunt similia fœniculo, sed majora, & hirsutiora, odorata [*male olentia, Diosc. Oris.*] & in summo umbella, in qua flores aurum referentes, acres, odorati. Radix est parva & tenuis. Vim flores & semina habent adversus ulcera, tubercula & phagedænas, si trita cum melle imponantur: contra serpentes cum vino bibuntur, & cum oleo illinuntur. Quidam etiam silvestre Origanum, aut Cunilam, Panaces vocant, velut de Origano dictum est.

Plin. De hoc Panace Plinius ait, Asclepion cognominatur, quoniam is filiam Panaceam appellavit: & ipsi succum attribuit, quem Dioscorides Heraclio adscripsit. Theophrasti descriptio non omnino consentit, cum Dioscoridis descriptione. Asclepium, inquit, radicem habet longitudine palmi, albam ac valde crassam: & corticem crassum ac falsum: caulem undique geniculatum: folium simile Thapsiæ, sed crassius: Commodum autem esse aiunt adversus serpentes, si derafum bibatur: & ad splenem, quum sanguis circa ipsum fuerit, ex aqua mulsa: & ad caput, si tritum cum oleo illinatur: & si quis aliâ quadam obscurâ parte doleat: & ad ventris dolorem vinum derafum. Item, ut quis longas ægitudines evitet. Postea verò etiam ad ulcera, ita ut humidis ficcum inspergatur, vino calido præelotus. siccis vino subactum imponatur. Galenus minus calidum quàm præscriptum esse dicit. Vnde ipso & floribus & semine, ad ulcera & tubercula & phagedænas utuntur melle mixto.

Auteurs non conviennent. Asclepij folia, quæ Dioscorides Fœniculo similia dixit, Theophr. lib. 9. plant. hist. Thapsiæ nullâ diversitate comparavit. Siquidem Thapsia Fœniculi folio est, teste Marcello Virgilio. Idem Theophr. radicem Panacis hujus candidam esse dixit & crassam valde [*πεχέια σπυδα*] & non tenuem, ut multi verterunt, & Dioscorides legisse videtur. Idem quoque radicem *εὐδρανταλήν* [*dodrantalem, aut longitudine spithame*] tradit: Dioscorides *μακράν*, i.e. parvam, etsi in melioribus codicibus *μακράν* [*longam*] legatur. Cogitandum itaque in radicis longitudine est, breviline an longa dicenda sit, quæ dodrantalis fuerit. Est autem Spithame Græcis & Latinis, auctore Plinio l. 7. c. 3. dodrans: longitudo & quod capit spatium humana manus à summo pollice usque ad summum minimum digitum extensa: quæ mensura quoniam in tres quartas humani pedis partes incurrit, dodrans dicta est. Sic enim veteres Romani novem in libra uncias appellaverunt. Variant Plinius & Plinium sequuti in hac mensura, nunc pedalem, nunc semipedalem, & aliquando palmarem vocantes: quæ etsi videatur descripto à nobis [*Marcello*] dodranti & spithamæ congruere, nihilominus utendum ea non est, ne concurret cum antiquo palmo, quæ quatuor digitorum in hominis manu, ut sunt conjunctorum sine pollice, mensura est, quæ sexies repetita cubitum Romanum constituit, qui ex 24. hujusmodi digitis conficiebatur. Nobis in radice herbar, qualis Panaces est, dodrantalis mensura, longior potius, quàm brevior videtur, & nihilominus mutare aliquid ausus non fuit: quoniam non sit facile certi aliquid constituere.

Æquivoca. De reliquo, Anguillara & Matthiolus pro Panace Asclepio Dioscoridis plantam exhibent foliis Ferulæ, flore luteo [*Panaces sil. nostrum Matth. si flore luteo, de quo mox*] quam in Candia Seteli, in Sicilia verò Peucedanum appellari aiunt,

Panacem Asclepiadem Lobelij Ferulæ facie diversam esse ab Asclepio Panace Matthioli asserere non dubito, ita ut eandem, Libanotidem quorundam flore luteo, appellare non verear.

PANACES ASCLEPIVM MAT-
thioli, flore luteo.

Patavio ad me misit frater plantam, quam Panacis Asclepij nomine pictam, nec descriptam, exhibet Matthiolus. folium dodrantale, palmum semè latum, pinnatim serè divisum, incisuris Millefolij militaris: segmenta extrema angustissima, brevissima, quæ ad Mei segmenta accedunt: flores umbellati, parvi, lutei, acri sapore linguam feriunt.

C. Bauh. plant. *Men arbor* tam hac dedit *matricum.* nomine Mei Athamantici Guilandini, Patavio delatam. Dedit & aliam portionem cum hac inscriptione Delambæ *Delambæ* rus. Verum quum *rus.* non sit mihi integra planta, accepi figuram Matthioli, & ad latus folium ex mea planta, & semen ex Camerarij figura apud hist. germ. Matthioli, nescio tamen an hujus plantæ sit.

Præfens porrò *Panaces æ* planta dicitur Matthiolo Panaces Asclepium, græcè *Asclepium,* *πανάξ ἀσκληπίου,* arabicè *Panax Aschiliber,* italicè *Panace asclepio.* Eidem in post. comm. cum mag. fig. *Aschil.* Panax Asclepium. Is in post. mutavit nonnihil figuram, non tamen reddidit causâ, mihi melius ardet prior. non describit, & in hist. germ. omittit. Et hoc etiam Cam. ad ejus hist. germ. annot. Panax Asclepium, inquit, pictum à Matthiolo sine descriptione, cui addit semen sibi missum pro Panace Asclepio.

An Gess. h. Panaces Asclepium, quod Patavij scribere scribit, quamvis ignoret quo proventu.

An Cæsalp. l. 7. c. 4. Dioscoridis Asclepium ex Sicilia allatum, foliis circa radicem stratis, densis: foliorum capitulis brevibus, subhirsutis, cauliculo tenui: umbellis luteis: seminibus compressis, magnitudine Fœniculi: radice digiti crassitudine, nigra.

Lugd. p. 719. Panaces Asclepium Matthioli inscribit, & ejusdem cum Ferula generis esse cum Pena tradit, nec item figuram dissimilem.

Tabern. Panaces Asclepium, *Beylwurcz* Asclepium. Ad aliam plantam, quàm hæcenus nominati hanc refert frater C. Bauh. Apud Matth. enim & in phyt. vocat Libanotidem, sive Libanotidi secundæ *Libanotid.* similem, seu Panax Asclepium primum. & ita etiam C. B. in Animadv. in Lugdunensem appellat, dicitque in ibi falsum esse quod diversi generis non sit à Ferula, id quod cum Pena statuatur Lugdunensis: se enim Panaces Asclepium Lugdunensis & Panaces Asclepium Lobelij in horto Patavino legisse, diversas à Ferula plantas: quod idem in notis in Matth. etiam monet. Debebat porrò is addere Lugdunensem figuram ex Lobelio Panacis Asclepij Ferulæ facie recepit. Non video tandem Lugdunensem in verbis *C. Bauh.* Penæ quicquam falsi dixisse, quæ sic habent. Panaces Asclepium, quod diversi generis non est, inquit Pena,

Pena, nec item figurâ dissimile, præsertim istud do-
 ctioribus verum putatum, fortè quale in Matthiolo
 pictum videtur. Sed id tantùm se vidisse ait Mat-
 thiolus effigiemque ejus pinxit, omisis notis om-
 nibus. Hæc verba sunt Lugdunensis. Considerent
 Lectores an falsitas non sit in animadversore: cur
 non reprehendit Matthiolum, qui suam non descri-
 bit, & Lobelium ex quo desumpta verba, posita ab
 Lugdunensi. Eid. B. pin. Libanotis Ferulæ folio 4
 sive Libanotidi secundæ similis: Panaces Asclepium,
 Matth. Lac. Cast. & Lugd.

MEVM VETERIBVS.
 CAP. VI.

Descriptio. **M**eu m, quod Athamanticum vocatur in Mace-
*Anetho-
folium.* donia & Hispania [non legit Oribasius, Matth.]
 nascitur, auctore Dioscoride, plurimum, caule & fo-
 liis Anetho simile, crassius tamen Anetho, ad cubi-
Yucca. tos duos [et in p. 112 Oribasius, inquit Matth.] insur-
 gens, sparsis radicibus tenuibus, obliquis & rectis,
 longis, odoratis, linguam calefacientibus. Quæ cum
 aqua coctæ, aut etiam citra cocturam, trita potæ, ar-
 ctas circa vesicam & renes affectiones mitigant, &
 urinæ difficultati commodant, stomachique infla-
 tionibus & torminibus, & uteri affectionibus ac ar-
 ticulorum doloribus. Thoracis fluxionibus cum
 melle trita, vice eclegmatis auxiliantur. Sangui-
 nem etiam ducunt per menses ad infusus decoctæ.
 Ad pubem verò puerorum impositæ urinas ducunt.
 Si verò plus quam oportet bibantur capitis dolo-
 rem inducunt.

Temper. Mei radices, ut ait Galenus, peritiles sunt, calidæ
Galenus. tertio ordine, sicæ secundo: proinde urinam, men-
Nux. sesqueciere volentes, hoc utuntur pharmaco. Sed
 si pluscule sumatur capiti dolorem mover, utpo-
 te cum pluscule sit calidum quàm sicum, quippe
 cum humiditatem crudusculem etiamnum & fla-
 tuosam caliditatem ad caput deferat, atque ita ipsum
 afficiat, lædâtque.

*Meu du-
plex Plin.* Meu, scriptore Plinio, in Italia non nisi à Medi-
 cis sentitur, & ita admodum paucis. Duo ejus gene-
Anisi folium. ra. Nobilior Athamanticum vocant, illi tanquam
 ab Athamante inventum: hi quoniam laudatissi-
 mum in Athamante reperitur, foliis Aniso [Anetho
 volens legendum, Corn. Lacuna & alij] simile, & caule
 aliquando bicubitali, radicibus multis & obnigris
 [aliquis puto legendum, ut Diosc. habet] quibusdam al-
 tissimis. Minus rufum quàm illud alterum. Ciet ur-
 tinam in aqua potum, radice trita ac [vel] decocta.
 Inflationes stomachi mirè discutit. Item tormina &
 vesicæ vitia, vulvarumque: & dolentibus articulis
 prodest. Thoracis item fluxionibus cum melle, in-
 tantibus eū Apio illitum, imo ventri urinas mover.

*Athaman-
ticum.* Cæterum, cur Dioscoridi Athamanticum dicere-
 tur, Plinius modò exposuit; nisi fortè Athamani-
 cum subtrahat & litera legendum sit, inquit Marcell.
 Virgilius, docueritque Dioscorides in Athamania
 nasci: cujus regionis gentem, auctore Bizantio Ste-
 phano, aliqui Thessalix, aliqui Illyrico assignant.
 Nec refert in Macedonia nasci Meon dixisse Dio-
 scoridem, cum non longè distent inter se Thessalia
 & Macedonia, mutatisque à regibus sæpenumero
 earum terminis, altera in alterius appellationem ali-
 quando trāsierit. Peregrinum autem semper, quon-
 damque rarum, nunc verò quod sciam nullum Ita-
 liæ Meon est: non quia quibus locis antiquâ ætate
 nascebatur: æterna enim plantarum genera voluit
 natura esse. Sed mutatz cum temporibus artium &
 doctrinarum rationes, multa quæ in nova medici-
 na diu neglecta sunt, ignota penitus nobis tandem
 evaserunt. Ex quo fit, nequid possit in eo dici, præ-

ter ea, quæ à Dioscoride, Galeno & Plinio jam tra-
 dita sunt.

Meum, nomen herbæ cujusdam à veteribus de-
 scriptæ, pluribus attribuitur plantis. Et imprimis, na.
 Meo vulgari, seu Radici urfinæ nominatæ.

Meo altero Italico quorundam.

Meo, Dauici Cretici facie.

Libanotidi quorundam, sive Ferulagini, foliis Libanotis.
 Fœniculi, floribus luteis.

Quod Anethum silvestre appellatur, ad Meu re-
 ducere conatur Cæsalpinus.

Fœniculum tortuosum nonnulli verum Diosco-
 ridis adstruunt Meum. Verum non sine errore.

Cicutaria latifolia à Cam. h. & C. Bauh. phyt. Meu Cicutaria.
 folio Cicutæ cognominatur.

Meum in quibusdam Belgicis officinis, teste Do-
 donæo, de Apio silvestri dicitur.

Invenitur Imperatoriam [Meisterwurze] esse à Imperato-
 ribus quibusdam Meu dictam.

Mei & Meu nomine, id attestante Cordo, Ange-
 lica à nonnullis exhibetur.

Mutellina, Gesnæro Caros, vel Daucus Alpinus, Mutellina.
 quidam visus, Meum, à C. Bauh. quoque nuncu-
 patur.

Meum quibusdam de Bunio Dodonæi dicitur, Bulboca.
 quod nos Bulbocastanen inscribimus.

Traditis ita Æquivocis reliquum est, ut Succeda-
 nea adscribamus. Meu itaque vero nos carere atte-
 statur Cordus, qui Sifonis semen (quod Sifarum, vel Sifen.
 Sifer, & Amomum dici ait) pro Meu sumendum
 præcipit.

Pharmacopola, si Meu caruerit, Galeni & Ægi-
 netæ consilio in suis antiballomenis, Myrobolano,
 i. e. Glande unguentaria uti debet.

Meu deficiente, Tractatus qui pro quo, Psyllium
 substituit.

Petrus Paduanus, Luminare majus, & alij plures
 volunt quod Mu Avicennæ sit Meu Dioscoridis:
 nec nos aliud esse (aiunt Monachi in Mef. distinct. 1.
 cens. 45.) putamus, adhuc tamen nobis incomper-
 tum. Quid sit Mu Avicennæ investigare posteri.

Quæ tandem sit radix ista grossa, quam Mona-
 chi in Mef. distinct. cens. 45. communiter à multis annis
 usque in hodiernum diem omnes Pharmacopolas
 falsò pro Meo usos esse scribit, ignoramus, nec ipsi
 id ostendunt.

MEV VVLGARE SIVE
 Radix urfina.



Descriptio. **H**erba hæc, cu-
 jus folia cubi-
 to ferè longiora,
 longos habentia
 pediculos, striatos,
 supremæ partes a-
 dmodum sunt si-
 miles foliis Fœni-
 culi, capillaceæ,
 molliores tamen,
 nec capilli usque a-
 deò longi, caulem
 edit similem Fœni-
 culo, minorem ta-
 men multò, striat-
 um, inanem, ra-
 mosum, umbellam
 florum alborum,
 Anethinis similiū,
 è quinq; foliis com-
 positum, odora-
 torum, semina ma-
 gna,

gna, longa. Radix interdum una, interdum plures, dodrante longiores, modò tenuiores, modò crassiores, à quarum lateribus, ut plurimum oriuntur oblique radices, satis longæ, quæ sursum interdum tendere deprehenduntur, nec passim in aliis radicibus sic adnatæ provenire solent. Cortice vestitur primò nigricante, vel potiùs cineritio, tenui: dein altero crasso, albo, gummoso: in ejus medio est matrix. Odore est satis jucundo, Paktinacæ ferè, magis tamen aromatico: sapore non ingrato, nisi quòd acris & non nihil amara. Quum verò radix hæc ex iis sit, quæ Hiemem perferunt, & alpina, magnas habet comas, capillatias, ex foliis arescentibus.

An Ruell. lib. 2. cap. 3. per Meu (quod officinis Anethum silvestre, quibusdam verò Herbariis Anethum tortuosum, appellari scribit) hanc plantam intelligat, judicatu admodum difficile est, cum nullas addat notas, præter eas, quas habet Dioscorides & Plinius, licet id cum voluisse scribat apud Matth. C. Bauhinus.

De hac Monachi in Mes. dist. 1. cens. 45. Meum sive Meu paucis ante annis invenimus ipsum in nostra Italia, videlicet in montibus Nursiæ, & ab incolis illius loci, Spicula vulgo dicitur. Et sine dubio est ipsum Meum à Dioscoride descriptum. Nam ad unguem omnes notæ de Meo à veteribus positæ, conveniunt isti plantæ. Reperitur etiam in Calabria & alibi, quam nonnulli Imperatricem, & Imperatoriam, sive Herbam Imperatoris nominant. Etiam in Hispaniis, circa montes Asturiz degentes, à quodam fratre nostri ordinis habuimus de radicibus plantæ veri Mei Hispanici: tamen ipse frater non vocabat ipsam plantam Meum, sed Sistrum. Sistra autem secundum Pandectarium, Simonem Ianuensem, & plures alios, est ipsum Meum. Dictas autem radices, Hispanià Romam nobiscum detulimus, & comparavimus ipsas radicibus dictæ Spiculæ, & ambæ ejusdem speciei esse, ab omnibus qui viderunt, judicatæ sunt. Quapropter non est necesse amplius ab Hispanis & Macedonibus ipsas perquirere. Et quamvis Dioscorides, Plinius, & cæteri laudent Athamanticum. *falsum quia* (ut putamus) non viderunt Meum Italicum: quoniam si viderent, judicassent ipsum optimum, quoniam certissimum est, terram regionis Italiæ non esse inferiorem, aliis Europæ partibus, in procreandis herbis, & cæteris rebus à summo omnium bonorum datore utilis hominum concessis. Et specialiter Plinius non vidit Meum in Italia sponte natum, quoniam ipse testatur, quòd tempore suo non nisi à Medicis ferebatur in Italia. Nec Dioscorides cum dicit, quod in Macedonia & in Hispania plurimum gignatur, negat in aliis Mundi partibus posse gigni. Dicit autem plurimum in Hispania & Macedonia: quasi dicat, in aliis regionibus non ita copiosè habetur. Ista autem radix qua communiter à multis annis pharmacopolæ pro Meu usi sunt, atque in hodiernum usque diem utuntur, minimè est Meu. Non enim Meu habet radicem grossam, ut est ista, quam ipsi vendunt. Non obstante quod in Serapione legatur: Et habet radicem non subtilem. Est ibi menda in codice: quia libratorum incuria, vel quomodocunque sit, illud non, ad textum authoris additum est. Debet enim dici: & habet radicem subtilem. Probatur, quoniam Serapio non à se: sed auctoritate Dioscoridis illud dicit. In Dioscoride autem patet contrarium, cum dicit Meon habere radices longas, tenues, &c. Præterea nonnulli hallucinati sunt in Sistra: ut sunt Petrus Paduanensis, postillator antiquæ Dioscoridis translationis, & Lumen Apothecariorum, & Thesaurus aromatariorum, & cæteri qui volunt ipsam Sistrum esse Phu, Valerianam, quod falsum est. Etenim in propinquitate vo-

cabuli erraverunt. Siquidem pro Sistrum, intellexerunt Sistrum: quoniam Sistrum est Phu, i.e. Valeriana; Sistra autem est Meu. Meon igitur sive Meum, Meu, *Anethum* Sistra & Spicula, idem est, quod etiam nonnullis *Sistrum* Anethum silvestre nuncupari non displicet. Hactenus Monachi, quorum opinio verisimilior videtur: quàm Cordi, qui verum Meum solo tantum nomine cognosci, & in calida Italia sponte vix nasci, ac propterea olim in Italia Medicos hanc herbam studiosè in hortis serere, testante Plinio, fuisse solitos ait. Et nedum in frigidiori Germania suæ spontis esse concedit. Sed argumentum Cordi ex Plinio desumptum non satisfacit. Nec Plinius asserit, non provenire in frigidis locis.

Tragus Meum vulgare inter Dauci genera reponit, Daucumque, Berwurtz / inscribit, ac pro Daucico Cretico, & Dauco primo describit, & post his nomenclaturis appellat. Primum genus: [Dauci] Daucus ille est Creticus, quem magni etiam viri Pasticinacis, sed non sine gravissimo errore annuere non dubitarunt. Nicander in Theriac. *Sauvagen* vocat, ex quo loco Marcellus Virgilius id emendat, quod malè in quibusdam græcis exemplaribus *dispergum* legebatur. Hieron. Braunschweig Fœniculum porcinum (germ. *Schwefelhel*) & Peucedanum vocat, alij Creticum Sefeli, quod alijs Tordylon, vel ut habet Eginera Gordylon nuncupatur, esse volunt. Nostri Rizophori Berwurtz / germanicè *Bers* voce, vel, quòd capillata sit [qualem descripsimus] *Wurtz*, aut, quia matricis suo loco motæ dolor, à mulieribus retentæ in ore hæc radice, quem patriæ voce *Bermüter* nominant, sedari credatur. Hæc Tragus l. c. 148. Idem l. 2. c. 120. Tordylon sive Gordylon non esse Daucum, quem Germani Berwurtz nominant, affirmat. Sed is, quam Germani *Berwurtz* vocant, ineptè Daucum appellat.

Daucum porro esse, & non esse (sui fortè oblitus) his prodidit Fuchsius. Mei radix officinarum (ait l. 1. c. 1. compo. med. cap. 8.) non est nisi ejus herbæ, quam Germani Berwurtz / Græci & Latini Tordylon & Sefeli Creticum nominant, radix, ac possunt officinæ illa pro vero Meo sine omni errore uti, donec verum ad nos advehatur. Siquidem Tordylon eadem quas Meum facultates habeat. Idem l. 2. supra auream Alexand. præter jam dicta ait, quosdam Libanotidem primam putare. Non est (addit in hist. c. 313.) cur τὸ δαυκὸν ἢ τοῦ δαυκὸς, ἢ οἰστέλι κρητικὸς, Daucum credamus. Cap. autem 85. ait: Daucus Creticus Dioscoridis, vocatur à Germ. Berwurtz / licet hujus semen hirsutum non sit, quale Dioscorides in Dauco Cretico desiderat. Sed quum alia omnia adeoque facultates respondeant, non est, cur una nota nos impediatur, cur minis Creticum Daucum credamus, aut saltè Germanicum, qui Cretico per omnia respondeat. Vel si prorsus alicui non satisfaciunt, quæ diximus, dicat planè hanc herbam esse Sefeli Creticum [sen etiam in Leon vocat.] Tandem in Apol. concludit, dicens. Ryff in Diosc. nostrâ usque est picturâ. Falsò autem eam herbam, quam Meum esse affirmat, germ. *Berwurtz* vocat [Corn. hu. labat etiam.] Quamquam typographi erratum suspicor, legendis pro Berwurtz / facili transpositionis errore. Non esse Meum ut Brunfels. Gesn. & post hos Ryffius censet, satis monstrat, quòd scil. ejus caules, ac potissimum folia, non sint Anethi foliis crassiora, sed magis tenuia. Erit itaque potiùs Creticum Sefeli. Fuchsius malè, nostro quidem judicio, & Daucum & Sefeli Creticum, vel Tordylon, præsentem plantam pronunciat. Discrepant enim jam nominatæ plantæ plurimum, ut conferenti eas facili patebit. Rationes quibus Meum esse negat, debiles sunt & infirmæ; quæ non refutandæ.

*Septasium al-
bicans radice.
Matthioli.*

*Imperatrix
Apulea.*

*Meum
Serum.*

Credidimus superioribus annis, inquit Matthio-
lus, legitimum Meon non oriri in Italia, nec eo
alunde advehi: primum quoddam Mei vice uterentur
seplatiarij quibusdam albicantibus radicibus, sa-
pore Pallinacæ simili: deinde quoddam etiam Plinij
tempore rarum esset in Italia. quippe qui scripserit
non ferri in Italia Meon, nisi à Medicis, iisque ad-
modum paucis. Quod procul dubio indicare vide-
tur, utque ad Plinij ævum peregrinum in Italia fuisse
Meon. Sed cum herbariorum quorundam dili-
gentiâ, quædam nuper reperta sit planta, quam
legitimum esse Meum, omnes ferè rei herbariæ pe-
riti unanimes affirmant, ne videar mordicus tene-
re opinionem, facere equidem non possum, quin
in eorum sententiam deveniam: tamen si in contra-
rium aliqua sese offerat ratio, quoddam scilicet hujus plan-
tæ radices odorem non usque adeo gratum spirent,
sed quadantenus graviter oleant, nec tenues cer-
nantur, ut Dioscorides inquit. Plinius Meo, folia
Aniso similia reddidit, vocum fortasse similitudine
deceptus. siquidem Dioscorides Anethi foliis
Meum oriri tradidit. Eadem in post. comm. cum
magn. fig. habet Lat. & Ital. ubi pulchriorem figu-
ram ponit, & addit folia Asparago magis similia,
quàm Anetho; Imperatricem vocari in Apulea:
Plinium dicere Meum folia Anisi producere; uti
etiam reperiatur in quibusdam Dioscoridis exem-
plaribus, quod dubitandi ansam præbeat. Idem
in Apol. adversus Amatum hæc tradit. Non cla-
mo in Italia Meum non reperiri, sed plura sanè
esse scribo, quæ me ancipitem reddiderunt, an
Meum quod nunc pro genuino sumitur, legiti-
mum fuerit. A Lusitano jam pridem non didici
in Italia quoddam circumferri Meum, cum ante
ipsam hoc sciverim. In hanc tamen inclinari me
dixi opinionem, illud à genuino ac vero Meo
mihi videri longè dissimile. Hoc etsi simplici-
ter à me esset dictum, ut meam hac in parte
solum exponerem sententiam, nescio tamen cur
accusandus magis illi videar, quàm admonen-
dus. At quoddam in hanc venerim opinionem, il-
lud in causa fuit, quoddam plures hujus rei mihi con-
starent rationes. Etenim est in primis quoddam vide-
rim nostratis Mei radices longè crassiores, vege-
tioresque, quàm genuini expetat historia: quip-
pe longas & tenues radices Meo reddidit Dio-
scorides. Est deinde quoddam eadem graviter po-
tius, quàm suaviter oleant, quum tamen Diosco-
rides in Meo radices requirat odoratas, non gra-
volentes. Est præterea quoddam mansæ parùm o-
mninò acrimoniæ respiciant. At quum Galeno au-
dore, Meum tertio excessu excalfaciatur, cur non
illud genuinum acriori vi pollere existimaverim,
quàm quod nuperrimè in usum Medicum con-
cessit? Est etiam quoddam extenti manuscripti Dio-
scoridis codices, qui Meum non Anethi, sed A-
nisi foliis, conferant. Quod & idem refert Pli-
nius, quem licet rejiciat Amatus, non tamen
sine ratione est adductus, ut scriberet non nasci
in Italia Meum. Nam cum non nisi à Medicis,
iisque admodum paucis ipsum feratur, magnum
& evidens est argumentum, non ibidem sua
sponte progigni. Quorsum velut peregrini-
um à Medicis excolebatur, si ubique in Italia
nunc illud excrecere videmus? His itaque pa-
lam est, ut non abs re in censendo Meo mihi
plurimum fuerit ambigendum, &c. Verunta-
men nolui id prætermittere, quin hujusce Mei
imaginem appingerem, non tamen, ut hoc tan-
tùm argumento fateri viderer, illam genuinum
referre Meum, sed ut illud nobis ante non igno-
ratum (ut opinari videretur Lusitanus) ostende-
re.

Tom. III.

Hic Matthioli argumentis, si nulla sint vali-
diora, faciliè est respondere. Primò, quoddam ve-
getiores sint radices, cum tamen tenues Dio-
scorides dicat, fieri potest, ut locis calidioribus,
ut in Macedonia tales sint: Præterea Meo nos-
tro non semper crassæ sunt, quod evenit ra-
tione loci & ætatis. Secundò dixit Dioscorides
esse, quod vocabulum pro odorato sim-
pliciter ut plurimum ab ipso sumitur. quin ad-
diderim habere nostras radices suavem odorem,
quamvis aliquid gravis habeat. Tertiò, quoddam
temperamentum attinet, acrimoniam sanè cum
amaritudine manifestam habet, ita ut si non ter-
tio gradu excalfaciatur, parùm absit à fine secun-
di, id quod aliis judicandum relinquo: ad-
diderim loci naturam ad id plurimum confer-
re. Quartò, de foliis facilis est lapsus, ut ait
Lacuna, legit fortè Plinius pro *anisi*, *anethi*, facili
errore. Quintò, ex Plinio majoris momeri
est argumentum, quod ita infringendum esse
centeo. Difficile esse ulli pronunciare, non
provenire plantam sponte in aliqua regione,
nisi quis diligentissimè omnia loca & minimos
ejus regionis (ut ita dicam) angulos perlustra-
rit, quod an Plinius in Italia præstiterit me la-
tet. Plinij tempore fortè sponte nata propter
Medicorum ignaviam nondum conspecta fue-
rat. Latitabant sanè plures, quæ nostris tem-
poribus indies manifestantur. Sed unde quæso
in hortos translata? Quod autem à Medicis cul-
ta fuerit, factum dixerim, quoddam digna fuerit,
quæ hortos exornaret, & non passim prove-
niret. quales hodie, exempli gratia, Asarum,
Pyrola, & similes plures coluntur. Non hæc
propterea dixerim, quod Vrsinam radicem, ve-
rum Meum asseruerim. Nam crassitudinem
caulium & altitudinem Meo à Dioscoride attri-
butam, hæcenus in Meo vulgari non observavi,
quamvis Matthiolus ei tribuat cubitalem, an vi-
sam, ignoro. Color etiam totius plantæ non con-
venit cum Anethi colore.

*Matthioli
argumenta
refutantur.*

Verum Meum in Italia nasci contendit Ama-
tus his verbis. Meum herba, in Hispania fami-
geratissima, tamen hæcenus à multis ignorata,
caule & foliis Anetho similis est, verum cras-
sior, radicibus comosis, obnigris, in obliquum
rectumque sparsis & frequentibus, qua de cau-
sa hodie multi Fœniculum tortuosum, sive tor-
tuosum Anethum appellant. Cæterum, hæc
radices, in medico usu à multis desiderantur,
quæ faciliè ex Hispania, & montibus Bononi-
ensibus in multas orbis partes vehi possunt. Nam
olim mihi, quosdam agitas convenienti, qui in
Antuerpiam, tanquam celebre emporium inter
alias quasdam radices adferre & ostendere solent,
suo nomine *Berwurts* appellatas: quas tamen Meum
esse herbarum, summopere contendebant: & quum ex
herba folia caulumque non dissimilia Anetho ha-
bente se collegisse affirmabant, eaque de causa,
ab officinis Germaniæ pro vero Meo habebantur:
cæterum, mirum ita se rem habere, illud mihi in-
dicabat, quoddam præter discrepantem figuram, non
erant odore *commendabiles* quem aromaticum
Meon Hispanum habet. Nam multi quoque Itali
pharmacopolæ pro vero Meo quasdam indicant al-
bas radices, Daucum odore referentes, quæ non
multum ab illis, quibus Germani utuntur, absunt.
At re vera, verum Meum in Italia nascitur, in mon-
tibus præcipuè Bononiensibus, ex quibus Her-
barum quidam digerunt, ad nos attulerunt, illi
non nisi à nobis in Hispania conspecto, simile,
quoddam Dioscoridis Iustou in universum respondet:

*Meum Se-
rum in Ita-
lia nascitur.*

B

nam radices exterius nigrae, intus vero albae sunt, quatum odor similis illi est, quem Fœniculum siccum ex se spirat, suavior tamen: eatum quoque sapor non admodum acutus erat, aromaticum quid præ se ferens: quæ in infima parte capillatæ, conatæve aded reperiuntur, ut Spicam Nardi quicumque has radices viderit, primo intuitu esse dicat. A quibus argumentum non mediocriter desumimus, quod Spica Nardi passim officinis obvia, radix potius, quam plantæ summitas sit, ut suo dicetur loco. Curabunt igitur deinceps pharmacopola, verum Meum non solum ab Hispania, sed etiam montibus Bononiensibus habere, quum ibidem verum & Athamanticum reperiatur. Nec enim veritas ipsa occultanda est hac de causa, quia Plinius scriptum reliquerit, suo tempore Meum in Italia non nisi à paucis Medicis feri, quem sequutus postea Marcell. Virgilius dixit: Nunc quod sciam, nullum Italix Meon est: Ob quæ verba Matthiolus in Italia quoque Meum non reperiri clamat. Imò contra Monachos acriter agit, qui in Calabria & Nursiæ montibus Meum nasci, & inde eradicasse se affirmant, quod ita esse crediderim, quum apud Bononiam quoque nascatur: ut testes sunt Nicol. Nicolucius pharmacopola Ferrariensis, & Gaspar de Gabrielis, qui publicè rem herbariam apud Ferrarienses proficitur. Accusandus igitur Matthiolus potius est, quam negligens in hac herba inquirenda fuerit, quàm diligentissimi patres, qui desudantes, Nursiæ montes, ut eam inde eradicarent ascenderunt. Interdum tamen avarus Pharmacopola si hac caruerit radice, Galeni & Aeginetæ consilio, Myrobolano, i.e. Glan-de unguentaria uti debet. Hæc Amatus, qui Meum vulgare pingit, & falsò in Germania provenire negare deprehenditur.

Meum verum Dioscoridis reperiri in Italia repetit Anguillara; in Calabria in monte Poline vocari Imperatrice; in Nursiæ montibus ad Castellum S. Angeli Spicura; in montibus Modenæ ad Castellum dictum Fioralbo, Finochiella.

De Meo ita discurrit Cronemburgius. Mei genus unum, quod Athamanticum vocant, à Diosc. lib. 3. refertur. Duo autem à Plinio lib. 20. cap. 23. Hactenus illo vero caremus: quo passim utimur, Pastinacæ odorem habet, & quibusdam Anethum silvestre vocatur, vulgo Germanico Berwurz. Sunt qui Siler montanum, sunt qui Amomum nostrum hic substituant. In Hispania nunc passim cognoscitur, ac quanquam Plinij ævo Italix fuerit peregrinum, utpote non nisi à paucis Medicis feri solitum, attamen nunc herbariorum diligentia reperitum frequens in montibus Bononiensibus, è quibus commodè ad nostrum usum transferri queat. Cæterum, cur negat Cronemburg. Germanorum Berwurz esse verum Meum traditque hoc in Hispania & Italia reperiri. Meum Hispanicum & Italum non videtur diversum, à Meo vulgari Germanorum, dicto Berwurz. Demonstrant hoc plurimorum autorum propriæ figuræ, quæ in omnibus conveniunt. Si igitur Meum Hispanicum genuinum sit appellandum, appellandum quoque erit verum Germanicum. Cronemburgius talia scribit, non qualia observavit, sed qualia ex Amato & aliis collegit.

Seseli Creticum Cordo vocatum, quod Berwurz Germani, Fœniculum porcerum Belgæ appellat, esse ipsissimum Meum, seu Meum Dioscoridis, Coldenberg. apud Cord. in Disp. supra Lithontribon, omninò sibi persuasum habet. Nec radicem ejus tantam, tamve crassam esse (natalibus præsertim locis natam) neque tam

graviter olere ait, veluti Matthiolus voluit. Quæ de Meo Asturix ac Sistra Monachi observarunt, & scribunt, approbat. Et si quispiam adhuc refragetur, pro Meo vero tanisper utetur, dum ipse Dioscoridis genus aliud proferat. Fuchsiū imprudenter Matthiolum carpere idem perhibet, quod ille cum Monachis, hanc herbam Apulis Imperatoriam nominari inquit, quam Angelicam esse (sic à Germanis appellatam) malè interpretatur Fuchsius: cum Imperatorix nomine ab isthoc Meo admodum diversæ à Germanis demonstrantur herbæ.

Meum tandem verum Radicem ursinam esse contendit in adv. Lob. Mei veri plurimas pissimè vidi, inquit, plantas, in Germaniæ, Italiæ, Galliæ, Hispaniæque locis Alpini: Radix est odore suavi, Spicæ, vel Angelicæ, caule & foliis Anethi, umbellâ candidâ, Junio & Julio florens. Semen Hippomarathri, odoratum. Eadem in celsissimis montium jugis sterilis Sevenæ, præsertim loco cui nomen gallice l'Esperon, i. e. calcar, monticolis Cestre nuncupatur vernaculo nomine, uti Platearij & Pandectarij ævo, cui nulla doctiorum omnium suffragio deest nota veri Mei Dioscoridis. Cujus etiam sententiæ est Turnerus qui in ora Septentrionalis Alpibus Cheveotici Scotiæ finitimis, magnâ ubertate scaterere hanc stirpem nos monuit. Vix enim ante annum 1560. primùm hæc planta Vênetis pharmacopœis innotuit: nam tamen radices ad Theriacæ confectioem ex Syria & Apulia advectas norant, & in singulis libras singulum aureum ducatum institorj pendebant, tamen exoticâ putabant, nec ullo loco Italix oriundam, ut qui neque caulem foliave vidissent, & Herbariorum Senensi dictatoris summi placitis acquieviscent. Hic enim Massiliensium & Monspelienisium Anethum Fœniculumve tortuosum, tortuoso errore, verum Dioscoridis Meum astruxerat, ansamque illis errandi præbuerat. Quin ne nunc quidem, ut errorem aut tegat, aut foveat in postremis commentationum recoctionibus atque recantationibus, nisi invitus hanc genuinam esse fatetur: Et fatali suâ modestiâ argutatur, odorem quadantenus virosum, folia non Anethi, sed Asparagi, radicibus non aded tenuibus; tum paulò mox subdit, Appuli Imperatricem vocant: quo quidem vocabulo, ubique ferme locorum ignara herbarum plebs solita est alicujus incognitæ plantæ eximium & gratum odorem & vires insignes signare: Sic enim vulgò etiam Angelicam Imperatricem vocant: alioquin Angelicæ, aut Imperatorix cum Meo nihil est affinitatis, nisi odoris, qui in Meo perinde jucundus est. Et petitis indicio est cum neque multas radices hujus eruisse, neque folia planè perspecta habuisse; sunt enim situ & similitudine Anethi, non Asparagi, ut asserit: cui etiam si essent similes, tamen ambitionem sic suam modis proderet: Asparagum namque ipsimet Fœniculo assimilât, & Anethum aded simile Fœniculo asserit, ut plerumque colligentes fallat. Ne porro in multò reconditionibus plantis, deinceps fallamur à Matthiolo, cautio una & summa erit, non temerè ejus argutis inductionibus, picturisve credere.

Dodon. gall. Meum vulgare inter Libanotides reposit, & perperam Libanotidis primum genus fecit, vocarique ait à Dioscoride Zea & Campsænema; semen à Græcis Canchrys aut Cachrys. Sed hanc suam erroneam opinionem, retractat in folio lat. & meritò.

An de hac loquatur Cæsalpinus, ut vult C. Bauh. dubito. Si enim hoc vulgare Meum intelligit, miror cum

Spica Nardi
di radices
amulatur

Matth. re-
preh.

Monachi
excusantur

Imperatri-
ce.

Finochiella.

Negat
Meu. Cron-
emburg.

Anethum
silv.

Substitutæ.
In Hispan.
meum Ge-
rum Meum.

In montib.
Bononiens.

Cronemb.
repreh.

Meu Diosc.
Coldemb.

Fuchsi, re-
preh
Matth ex-
cusatur.

Meum Ge-
rum, Lob.

Cestre.

Matth. err.
Fœniculum
tortuosum.

Imperatricem

Angelicæ

Meum A-
sparagi fe-
lio non est.
cuius Ma-
thiolum.

Dodon.

An Meum in
alp si laico,
Caf.

eum ipsi adscribere flores luteos. Meum, inquit, in Alpbis nascitur; foliis Anetho angustioribus, longioribusque & tenuioribus, crebrioribusque capillamentis: caule cubitali & altiore, flore luteo, semine Fœniculi oblongiore: radice nigra extenuis, in longas fibras divisâ: odore valido, sapore amaro: Quidam Imperatoriam vocant. Apud Plinium depravatè legitur pro Anetho Aniso.

Sym.

Trago, ut hoc breviter repetamus, Eur. Cordo (qui tamen dubitare videtur) Fuchsin sol. & in 8. in hist. dicitur Daucus Creticus. Lob. ic. p. 777. Daucus Creticus Fuchsin in Ic. & Lonic. Sefeli Creticum. Cord. hist. Tordylion. Dodon. gall. Libanotidis i. genus, & Fœniculus porcinius. Cordo in Diosc. Meum. Gesn. hort. Anguill. Lob. adv. & obs. Dodon. lat. Matth. Cast. Turn. Lugd. p. 758. Camer. h. Lac. & Tabern. Meum. Sylvio Meum Dioscoridis descriptionem explens. Ben. Aretio Meum quorundam. Clusio Meum vulgare tenuifolium. Bauh. phyt. & apud Matth. Meum i. foliis Anethi, Meum Dioscoridis & Plinij, Hordylon Nicandri, & Torgylon Eginetæ. Nimium securè. Eid. pin. Daucus alpinus, Gesn. col. Lob. ic. Meum, Lac. (cui & Anethum silv.) & Ger. Daucus Castæ.

Nomen
lugar.

Græcis μέν vel μέν. Lat. Meum. Ger. Bervurcz. [Radix ursina vel urfi] Sewfendhel [Fœniculum porcinius, Hier Braunschuy] & nonnullis ut Matth. in hist. germ. Bergwurcz & Bûrdillen. Ital. Meo & Finacchiella, Lobel. Hispanorum quibusdam Sistra, alius Pinello & Pinillo olor. s. Ang. & New. Bohem. Bospnyf.

Locum.

Ex dictis constat meum vulgare provenire in Hispania: montibus Bononiensibus in Calabria ad montem vocatum Polino: in montibus Nursiæ, ad Castellum S. Angeli: in Montibus Modenæ, ad Castellum S. Angeli: in montibus Modenæ, ad Castellum dictum Fium' albo: in Gargano Apuliæ monte: & monte Fracto addit Gesnerus. Fuchsin in Germania nusquam copiosius, quàm in Martianæ silvæ quibusdam pratis. Pannonicarum Alpium juga alere, sed nullibi gentium frequentius observare, quàm in Surenstein meminit Clusius. Nasci refert Dodonæus (ut & Lob.) in pluribus Italiæ, Germaniæ, Hispaniæ, ac Galliæ locis, montanis quidem, sed campestribus ac apricis; descendere verò & ad plana. Belgio rarum, sed tamen haud peregrinum. Laudari Athamanticum & in Hispania natum. Radicem restibilem novo Vere nova proferre folia: cauliculos postea erumpere cum umbellis: Julio flores, seminaque perfici. Ego in Germania variis in locis observavi, ut in valle Sebethal propè Massmünster/ ultra sodinas stadionum circa Plumbarias thermas; item in monte Rosberg: Tubingæ in horto Fuchsin: Basileæ in horto Zvvingeri. Monspelijs verò observavi in Sevenum monte Esperon Autumnino, virentem.

Tempus.

Vires.

Qui exstiment Radicem ursinam, verum esse Meum antiquorum, videant vires ex antiquis ante. Apuli hanc ad venenosorum serpentium morsus præferunt, autore Matthiolo; Gesnero Mei pabulo in Apulia vacæ plurimum & optimum lac reddunt. & inde Caseum caballinum dictum confici, se audivisse refert.


MEVM ALTERVM ITALICVM quibusdam.

Meum al.
terum, Mat.

Sunt qui plantam, quam secundo loco appinximus (inquit Matth. in Diosc. in comm. cum mag. fig. anni 1583.) pro meo usurpent, quod magis Anethum, quàm alterum referat, quorum sententia non mihi omnino improbanda videtur: siquidem priori Tom. III.

potius Asparagi, quàm Anethi folia insunt. Hæc ille qui omisit figuram, licet se eam secundo loco appingere scribat.

De hoc Meo hæc Lobel. in Obs. p. 450. Spucium Meum alterum Italicum, Meum secundum Matthioli, superiori Meo [vulgari] non ab simile: sed se-
lucum, Lob. & Lugd.



lia, caules cubitales, umbellæ, crassifloræ & habitioræ, subviroli odoris. Radix item major, foris pallida, Peucedani facie & concreuone, tetri & in jucundi, cum odoris, tum saporis, Et Huius Mei alterius (spuri) Italici Lobelij, cujus pictura in omnibus Matthioli editionibus omissa fuit, ex Lobelij ic. p. 778. exhibet Lugdun. p. 759.

Bauh. apud Matthioli. Meum 2. adulterinum & Ta-

bern Eid. phyt. Meum 4. adulterinum: Spurium Meum alterum Italicum Lobelij. Cæterum, Lobelius non tradit colorem floris Mei Italici, icon ejus videtur exprimere Apium silv. Dodonæi. Eid. B. pin. Meum 4. latifolium adulterinum.

Ponæ in Baldo Sefeli Massiliense genuinum frequentissimum: forte Meum Italicum Lobelij.

MEVM, DAUCI CRETICI facie.



Sunt qui Meum Sic depictum pro genuino habeant, quod in Allobrogum & Sequanorum montibus frigidissimis & altissimis nascitur, radice dimidio pede longiore, foris nigra, Dauci Cretici modo, intus candida, brachiata, odorata: cauliculis multis nervosis instar Fœniculi, tres aut summum quatuor digitos altis: foliis brevibus, capillaceis, Fœniculo similibus, flore candido, umbellis de-


sis: semine minutissimo, amaro, & suaviter olente. Et ita describit. Lugd. p. 759. sub titulo Mei alterius.

Sym.

Bauh. phyt. nominat Meum alterum umbellæ albæ. Eid. pin. Meum 2. Dauci Cretici facie: Meum alud, Lugd. An hoc intelligit Gesn. in descr. Montis facti lib. de Lunariis, ubi ait reperiri in eo monte Daucum montanum brevissimum & minutissimis foliis, quem quoddam nulla ratione Wolffwurz [Lupini radicem] vocare refert, nascique in summo loco, Wideschid appellato, tradit radice Mutellinæ simili dulciori.

FOENICVLVM TORTVOSVM.
CAP. VII.

Descri.



FOENICULUM tortuosum vocant Mōspelij herbam cubitalem interdum maiorem, caule striato, medulla alba pleno Clusio unico, interdum Cubitali, sed sēpissimē minore: mox à radice in varios contortos ramos firmos diviso, crassiusculo, brevibus internodiis intercepto. folia fœniculacea, nō ita tenuia, breviora, videlicet palmaria, rariora, duriora, colore ferē Anethi: Clusio Anethi

ferē exilia, & minutim incisa, Rutæ propemodum colore: umbellæ parvæ exiguis floribus, quinque foliolis albis: aut etiam Clusio purpurascens, constant: semina alba striata, Dauci mei glaucifolij seminibus omninō, uti & tota planta, similia, semen Apij Clusio: radix longa, alba, crassiuscula, digitalis etiam interdum crassitudinis Clusio, comata, aromatica: tota planta odorata est.

Seseli Mas.
siliense, Ca.
mir. & Lob.

Camerarius, qui figuram habet ex plantis nostris, communicatis D. Gesnero, in epit. & hist. vocat Seseli Massiliense nonnullorum, Gallorum herbariorum Fœniculum tortuosum: De hoc Lob. in aduers. ait. Seseli Massiliense, folio Fœniculi crassiore hoc titulo est in Icon. p. 785. planta est valde nota, Fœniculi tortuosi nomenclatura, quæ ad Theriacæ exquisitam confectiōem, Mōspeliensium Doctorum instituto, Rondeletij præsertim, additur, cuius sententiam non raro sequor. Neque quantum illic locorum est Massiliæ circum lustranti, ullam plantam videre est, quæ magis quadret Seseli, proindeque hallucinantis commentatoris [Matthioli] Tridentinum Seseli neutiquam genuinum esse quit: quid verò sit, cum ille describere non ausus sit, mihi ignorandum. Illud tamen ignorandum, me in Tridentinis Alpibus hanc plantam uspiam vidisse, ac ne in Baldo quidem monte longe illis feracior. Idem de Meo dicit. Senensis Massiliensium & Mōspeliensium Anethum, Fœniculumve tortuosum, tortuoso errore verum Dioscoridis Meum astruxerat, ansamque errandi Pharmacopœis Venetis præbuerat.

Fœnic. tortuosum,
Clus.

Memorat hoc Clusius hisp. & hist. cap. de Selino peregrino, his verbis. Selino non possum non adungere umbelliferam quandam plantam, quæ mihi plurimum accedere visa est ad Seseli Massiliensis historiam à Dioscoride traditam, quam Mompelianni Fœniculum tortuosum appellabant: Castellani verò Enxalmos.

Lugd. icon.
nes dua.

Hujus Lugd. p. 749. duas figuras exhibet, quarum neutra placet. Primam ita inscribit: Fœniculus tortuosus Dalechampi; Alteram sic: Seseli Massiliense Penæ.

Fœn. mari-
num, Cas.

Cas. pro Seseli Massiliensi describit, ac Fœniculum marinum appellari tradit, describiq; hoc nomine à Dioscoride: sed apud Theophrastum & Plinium mentionem quidem reperiri, non autem descriptionem: Aristotelem tradere cervas à partu Seselin herbam petere &c. Recentiores Medicos Se-

feli corrupto vocabulo Siseleos vocare, & Siler Siler camii quoddam campestre.

Bauh. phyt. Seseli 7. sive Massiliense Fœniculi folio: Seseli Dioscoridis habitum. Apud Matth. Seseli Massiliense nonnullorum, umbellis albis, rariis subpurpurascens: semine Apij formâ, acri, calido. In animadv. in Lugdunensem testatur Fœniculum tortuosum Dalechampi Lugdunensis, & Seseli Massiliense Penæ esse figuras unius plantæ, quarum neutra sit perfecta: ac idcirco se novam in Matthiolo proposuisse: cum priori figura multum convenire Meum aliud Lugdunensis p. 759. positum. Quam diximus ante à Camerario exhibitam ex nostris plantis, eandem assumpsit C. Bauhinus. Descrip-
ptio præterea Mei alterius non convenit huic: est Mei Dauci Cretici facie. Eid. B. pin. Seseli 9. Massiliense, Fœniculi folio, Seseli Dioscoridis creditum: Seseli Massiliense, Ang. Dod. Lugd. & Cas. Fœniculum petraeum [existimamus nos hoc Fœniculum esse referendum, ad Daucum glauco folio.] Tab. Variat in foliorum crassitie, tenuitate, longitudine, brevitate & divisurâ: in omnibus tamen glauca sunt.

Fœniculum tortuosum Mōspelij passim copiose provenit: florens vidi in superficie trium illorum admirabilium Pontium du Gab in rimis saxorum mense Maio & Septembri. Sunt qui propè colles oppidi Montisfiasco inter Senam & Romam observant. Copiosum in maritimis Pisani Salmanticensi agro observabat Clusius in vinetorum marginibus juxta vias & semitas, etiam agro Mompeliano, & toto illo tractu Massiliam usque.

Semen subamarum, calidum manifestè, non ineptè pro Seseli Massiliensi usurpandum esse, censet Camerarius.

DAUCVS GLAVCO FOLIO, SIMILIS FœNICULO TORTVOSO. CAP. VIII.



SAxorum inter-
Svenis pertinacissimè inhaerent radices albæ, minimi ferè digiti crassitudine, rugosæ, acriusculæ, cum levi amaro aromaticæ, ex pluribus coeuntibus conflatae, moxque in alias rursus post coitum divisæ, quæ caulibus committuntur Daucorum more capillatæ: caules verò plures bicubitales sunt & altiores, graciles, striati, subrubertres, medullâ albâ farchi, ramosi: in

quibus ad articulos folia Anethi, aut Fœniculi tortuosi, pediculis longis: particulae latiores, crassiores, rigidiores, quàm in Fœniculo, & veluti pungentes, colore glauco, sapore acri. umbellæ parvæ flosculorum perpusillorum primùm perpurascunt, explicte albescent magis, apiculis purpurantibus inter folia interjectis. Semina propiusquam maturescant quiddam purpurascens habent ea parte qua decidit flos, ubi maturuerunt, alba sunt, striata, & Fœniculi tortuosi seminibus similia, saporis aromatici cum quadam acrimonia. Tota herba omnibus partibus similis Fœniculo tortuoso rursus variat pro locorum ratione & anni tempore.

An Peucedanum, Gels. An Gels. coll. Peucedanum in horto meo, caule est dodrantali, foliis crassiusculis, per terram sparsis, umbellis albis. floret Maio.

Peucedanum Pannonicum, Clus. Clusius videtur nostram plantam describere pro Peucedano Pannonico, quod non multum differre putat à Saxifragia secunda Matthioli, idque frater C. Bauh. idem planè esse pronunciat. Quia autem planta, quam à fratre pro Saxifragia Matthioli accepimus, non parum à Dauco nostro glaucifolio differt, ut lectores rem possint diligentius perpendere, integram Clusij descriptionem hinc adscribimus. Peucedanum quod in Pannonia observabam, inquit ille, radicem habet, ut plurimum pollicaris crassitudinis, interdum minorem, nonnunquam etiam majorem, longam, crasso cortice, modò candicante, modò fusco & nigricante tectam, gustu initio Pastinacæ, deinde nonnihil acri, transversis & obliquis aliquot crassioribus fibris donatam, supremo capite hirsutam: ex qua quinque vel plura exeunt folia, Peucedano vulgari & legitimo ferè similia, sed minora & breviora, colore ex viridi cæruleo, non, ut illa, nigricante, subamaro sapore, & odore ferè ignavo, nihilque singulare referente: caulis inter illa assurgit cubitalis, rotundus, gracilis, in multos ramos divisus, in quibus umbellæ candidorum florum: semen Selini ferè, breve & crassiusculum, geminum ut in omnibus pæne umbelliferis, cineracei coloris, saporis verò aliquantulum amari & acris. Provenit multis Ungariæ & Austriæ inferioris locis, montium acclivitatibus petroso, & salebroso Solo, ubi Junio floret: at in illarum regionum Alpibus (ubi etiam nascitur) Julio & Augusto, & subinde semen ferè non desinit. Non multum differre videtur à Saxifragia secunda Matthioli.

Fenic. petraeum, Tabern. Tabern. Fœniculum petraeum, Steinfenshel & Bergfenshel / Fœniculum saxatile & montanum. Lugdunens. p. 766. Libanotis minima. Quia Dalechampius vocat Libanotin, ideo occasio suspicandi nobis offertur, eandem fortè tradi à Lobelio in advers. l. p. 351. pro Herbariorum Septentrionalium notiore Libanotide. quædam tamen nos dehortantur, ita ut cogamur separatim ejus historiam tradere, donec aliquid certius, de ea cognoscamus: Posset videri ab hac diversa Libanotis minima Lugdunensis: verum eam differentiam à loco pendere suspicamur.

An Bau apud Matth. phyt. & pin. Peucedanum 3. minus: Peucedanum Pannonicum Clusij: Saxifragia 3. Matth. Lugd. Cast. Saxifragum, Lac. Peucedanifacie pusilla planta, Lobel. ic. Peucedanum pannonicum, Clus. hisp. & hist. Matthioli Saxifragia 3. huc non referenda. Est enim diversa à Peucedano ejus tertio, sive minore. An Eid. phyt. Libanoti 5. sive minor umbellâ candidâ: Libanotis minima Lug. p. 766. quam multum cū Saxifragia Anglicana Lob. Icon. p. 784. convenire tradit. An Eid. pin. Libanotis Ferulæ folio 7. sive Libanotis minorum bellâ candidâ: Liban. Septentrionalium herbariorum, Adv. Libanotis minima, Lug. Nos de Libanotide Septentrionalium herbariorum, mox dicemus.

An Peucedanifacie pusilla, Lob. An Lob. ic. p. 351. & adv. Peucedani facie pusilla planta, an Pseudobunion Dioscoridis? Palmaris, Peucedani facie, foliisque, sed brevioribus, & ad Fœniculum tortuosum Sefeli Massiliense accedentibus, ramulis intortis latius, in alas sparsis, concoloribus: umbellâ exiguâ, candidâ, Anethi semine, Anisi brevioris, exiliore, gustu grato, aliquantulum acris: radice crassiore, comosâ supernè, gustu Oreoselini, non longâ, parvi Napi, crassiore, quàm pro sui parvitate, cibo idoneâ: qualem Bristolæ in Angliâ, ad rupem Vincentij, ipse primùm magna copia reperit, & iconè dat.

Tom. III.

Daucus glauco folio florens Junio & Augusto, semen maturans Septembri, provenit inter dumeta loco herbido circa patibulum Montbelgardense in colle. Item prope hortum E. C. parva admodum & palmaris, & magis glauca: locis enim siccis & Soli expositis delectari videtur: in hortos, ob magnitudinem quam in eis acquirit, translata, multum de forma mutat, ut quis diversam putet. Nascitur Fœniculum petraeum Tabernomontani locis saxosis, in montibus altis & rupibus, in Burgundia apud Musacon inter Dolam & Bizantium ad cautes sub Buxis, locis à Solle illustratis.

Fœniculum petraeum, inquit idem, vim habet ca-
Piræ. lesaciendi, ceu Fœniculum. calidum autem est in secundo gradu; siccum in primo. Calculum pellit & urinam movet.

DAUCO GLAUCO FOLIO FOR-
tè similis, Libanotis Septentrionalium, flore candido, semine ferè Ammi.

Herbariorum Septentrionalium notior Libanotis Lobel. Hanc Lobelius in Adv. Herbariorum Septentrionalium notiore Libanotide vocat, & hæc de ea scribit. Non perinde Libanotidi congruit hæc Ferulacea, quàm multi Herbarij horti, in Gallia, Germania, & Angliâ sovent: tamen caule gracili, recto, Mei, aut Anethi, striato, atrovirente, bicubitali sit, paucis alis & geniculis donato: in quibus, imis præsertim, Peucedani prolixiora folia, Fœniculi tortuosi, angustiora. Saxifragiæ Anglicæ, medio & superiore caule pauciora; umbellis & floribus pusillis & candidis, Mei: sed exiguum semen, sub Hyemem maturans, minus Carvi rotundi, ferè Ammi officinarum par; quod ne utique potest convenire Rosmarini fertilis Dioscoridis semini, Cachryn, aut Caneryn vocati, quia grano hordeaceo esset simile, aut potius quòd utentis facultatis cum esset, similem escaram inurebat cuti, atque pilula Cacti propterea ab antiquis vocata.

Descriptio hæc Lobelij habet multa, quæ conveniunt cum Dauco nostro glauco. quid autem velit per Carvi rotundum, nos latet: hoc epitheton nondum alibi legisse recordamur.

SELINUM MONTANUM PVMI-
lum Clusij, foliis Fœniculi aut Peucedani, flore albo, semine Selini.

C A P. IX.

Descriptio. ALIQUOT à radice spargit folia, Fœniculi aut Peucedani foliis formâ quidem similia, sed longè minora, & rarè pluribus, quàm quindenis foliolis constantia, è quorum medio dodrantalem, crassumque fert caulem, in multos tamen ramulos divisum, sub quibus alia foliorum alia minores nascuntur, novenisque duntaxat foliis constantes, latè basi caulem amplectuntur, Pastinacæ sive Staphilini gustu & odore: singuli rami exiguum florum quinque candidis foliolis præditorum cum totidem staminulis, & odoris expertium umbellulis sunt onusti: quibus succedit semen Selini semini non dispar: radix supremâ parte in crassum caput extuberat, multique villis (qui foliorum superioris anni fibræ sunt) hirsuta, brevis, quasi in orbem convoluta est, intus fungosa & alba, exterius fusca & rugosa, infernâ parte bifida plerumque & in raras fibras desinens.

Synon.

Clusius descriptionis autor vocat in pan. & hist. Selinum montanum pumilum. Tab. Oreoselinum, Apium montanum, Bergpeterlin / Bergeppich. Bauh. phyt. Peucedanum 4. live Peucedano similis, Selini semine, Peucedani facie pusilla planta Lobelij. An Selinum montanum pumilum Clusij? plurimum convenit cum superiore [Peucedano minore sive Pannonico Clusij] si non idem. Vix adduci possumus à C. Bauh. ut credamus, hoc Selinum montanum

C. Bauh.

Clusij esse idem, cum Peucedani facie pusilla planta Lobelij. Eid. B. pin. Daucus 4. montanus multifido folio Selini semine: Oreoselinum, Tabern. ic. & Ger. tertium, Tab. fol.

Selini genus hoc exile & pumilum Clusij invenitur quibusdam siccorum, desertorumque virentium tamen, agrorum marginibus, & in nudis gramineis; montibus inferioris Austriae & Pannoniae: florétque Maij initio.


Biennalis esse arbitratur, uti pleraque sunt umbelliferae, quae prolato semine perire solent.



Locus & Tempus.

SAXIFRAGA MATTHIOLI TENUIFOLIA & umbellifera.

CAP. X.



contra Dioscoridis morem proferatur: tamen id mihi dissimulandum non putavi, Saxifragae plantam habere, nosceréque Italiam, ejusque usum præcipuè expeti ad renum & vesicae calculos comminuendos, & ad urinam remoratae cierdum: Eam autem in Hetruria pluribus locis è durissimis erumpere saxi, foliis capillaribus, Epithymo non dissimilibus, præsertim Argentario promontorio in maritimis. Inveniri quinetiam in agro Goritienfi, quibusdam saxi enascentem, juxta Sontij fluminis ripam, qua Salicano rure itur Canalem. Sed aliquis fortasse objiciet, hanc plantam non esse legitimum

Saxiphragon à Dioscoride descriptum, quoddam ea nullis serè notis Epithymum repræsentet. Neque id quidem temerè obijciatur: etenim non video ego, quomodo Saxiphragon rectè Epithymo assimilari possit. quod illud frutex sit, hoc autem tantum ablit à frutice furculoso, ut videatur potius esse quoddam capillamentum. Idcirco faciliè adductus sum, ut suspicer codicem Dioscoridis depravatum esse: aut Saxiphragon frutex erit, qui foliis duntaxat Epithymum æmuletur, ut illa folia satis ostendunt, quæ in hac planta, cujus imaginem hic expressimus, capillorum instar tenuissima conspiciuntur.

Quam porro Matthiolus in priorib. comm. pro Saxifraga Dioscoridis habuit, eam in postremis rejecit. Præter Saxifragam Dioscoridis sive Vetonicam Pauli, tria alia Saxifragæ genera novimus (inquit in post. comm. cum magn. fig. ubi præsentem plantam Saxifragæ secundæ titulo pingit) quæ frangendis educendisque renum calculis plurimum præstare videntur. Primum illud est, quod antea Dioscoridis Saxifragam esse suspicabamur. Nascitur hæc in magnis, ac durissimis lapidibus, aut sicco, & admodum extenuato solo, foliis capillaceis, Fœniculi modo, sed longioribus, tenuioribus & rarioribus. Caule pariter prodit fœniculaceo, sed tenui ac pumilo; umbella in summitate emergente. Semine vulgaris Petroselinii æmulo, sed longiusculo, & odorato. Radice albicante, Pastinacæ sapore. Tota planta subacris est, & subdulcis. Eadem in Ital. comm. habet, ac pro Saxifragia pingit; ceu & in epit. cum add. Cam. ubi hæc adduntur vires. Radix urinam ciet & menses quovis modo sumpta: visum acuit, & obstructions reserat. In Hist. germ. cum ejusdem Cam. addit. vocat Welschen Steinbrech / Saxifragam alteram, atque esse foliis Fœniculi, aut Anethi, & talem etiam caulem, nisi minorem & laxiorem, umbellas parvas, & in iis semen. Hanc herbam utilem adversus icterum, incipientem hydropem, suppressa menstrua; diuturnum capitis dolorem, à pituita & frigidityte ortum: Succum foliorum in oculos instillatum albugines tollere & principium suffusionis, ac efficacius quàm Fœniculum.

Matthiolus olim pingebat suam Saxifragiam sine descriptione, quàm postea mirum evariat in post. etiam comm. omittit loca, in quibus viderit, quasi olim non ibi observasset. in epit. vires alias addit, alias item in hist. german. denique in tanta varietate versatur, ut quis jure merito dicere posset, eum non cognita, aut non experta, aut non ritè considerata scripsisse. Frater C. Bauhinus attulit mihi plantam foliis amplis, Anethi tenuissimè divisib. cum hac inscriptione: Petrasindula Itatorum Guilandino; Saxifragia Bononiæ, Daucus primus Dioscoridis: hanc asserit collectam in horto Patavino; Similis mihi planta crevit Genevæ, quam tunc oblitus sum describere aut saltèmicone exprimere.

De Saxifragia ferulacea Itatorum (quam eandem Saxifragiam cum Matthioli jam dicta suspicor) Lob. in advers. ferulacea p. 352. talia scribit. Quidam horti Italici, ut Urbini & Florentiæ, alebant Saxifragiam bicubitalem, foliis ferulaceis, aut Fœniculi, minus, aut minimè geniculatis, tenuioribus foliis, obscurè virentibus: floribus umbellatis, albidis, Mei, cujus videtur species. Radices albicant, Pastinacæ sapore.

Bauh. apud Matth. & in pin. Saxifragiam tertiam nominat, Peucedanum minus, & Saxifragam 3. Matthioli, Lugd. Cast. Saxifragum lacuræ, & Peucedanum Pannonicum Clusij. An verò Peucedanum Pannonicum Clusij, idem sit cum Saxifragia Matthioli, est quod dubitem. Peucedano Pannonico folia sunt minora & breviora, quàm Peucedano vulgari: sapor amarus: Saxifragiæ Matthioli folia Fœniculo longiora & tenuiora, sapor toti plantæ sub-

Locus.

Deser.

Vires.

Matth. in-
conflans.Saxifragia
ferulacea
Italorum,
Lob.Mei spe-
cies

C. Bauh.

subdulcis. Planta etiam quæ mihi data longa habet folia. Et hæc causæ sunt cur separarim Peucedanum Pannonicum à Saxifragia Matthioli, & junxerim illud Dauco glauco folio, donec aliquid certius addiscam.

An Cal. P. An Cal. l. 7. c. 15. de hac loquitur, cum ait. Est quædam pusilla, quæ in apricis asperis nascitur inter saxa: paucis foliis, rarioribus capillis, subcandidis: cauliculo exili non ultra duos dodrantes: ramis tenuissimis inftar filamenti, quibus flosculi candidi ceu flores arescentes in sparsis umbellis: semen in Autumno figura Apij, exilius, nigrum, & aromatum; acre: radix subrotunda, in tres aut quatuor ramulos divisa: sapore acri & amaro: Quidam Saxifragam vocant: arbitror Cuminum Aethyopicum dici. Hanc Cæsalpini plantam non audemus asserere eandem esse cum Saxifragia Matthioli: quædam enim notæ repugnare videntur.

SAXIFRAGIA MULTIFIDO
folio, Pannonica.
CAP. XI.

Def. **M**ULTO minor Peucedano [Pannonico dicto Clusio, quod nobis videtur Dauco glauco folio, similis Fœniculo torruoso] est Saxifraga Pannonica, & brevioribus foliis prædita, Capni foliorum ferè æmulis, quorum sapor & odor, Peucedani Pannonici foliorum odorem & saporem quodammodo referunt, paulo tamen acriora sunt: inter quæ cauliculi exēūt pedales, graciles, geniculati, aliquot exiguis foliis exornati, summo fastigio candidorū flosculorum umbellam sustinentes: radix Peucedani radici non multum absimilis, sed brevior, acrior, salivamque ciens, multa hirsuta capita superna parte producens, è quibus folia & caules emergunt.

Synon. Clusio pann. p. 694. Sax. fraga Pannonica multifido folio: Eid. hist. Saxifraga Pannonica. Bau. phyt. & pin. Dauco 3. montanus multifido brevior folio.

Loc. Inventa à Clusio descriptionis auctore multis Hungariæ & Austriæ inferioris locis, montum acclivitatibus petroso & salebroso Solo, præsertim verò in aperto & glabro illo monte, qui medium, quasi spatium, inter Hamburgum & Altenburgum Vngariæ urbes, occupat, etiam è mediis saxis plerumque erumpens. Sed & colliculo juxta Zimmerin, in hunc ad phasianorum; juxta Lachn, & plenisque aliis circa Viennam locis crescit. floret Julio.

SAXIFRAGIÆ TENVIFOLIÆ
affinis, quibusdam Caulalis.
CAP. XII.

Loc. **H**ANC Anguillara epist. 7. Caucalin vocat, ac nacta in Peloponeso & multis aliis locis in saxis prodit, folijs Fœniculi, caule cubitali, umbella alba, semine Ammi: comediri odorem habere Petroselinum,

vocari ab eis ἀγρον τάλιν, i. e. Apium silvestre: verba, quæ legantur in Dioscoridis quibusdam exemplaribus (folijs Apij similibus) superflua esse, ut appareat



ex textu græco & Plinio: Chrysipum vocasse Olus lalfuginosum: Videri se intellexisse in Apulia provenire plantam, quæ dicatur Pietra findula, quæ multum respondeat descriptioni hujus Caulalidis.


Plantam, quam Caulalidem Anguillara autumat, Lobelius jam dudum collectam in præruptis Specus vocati, ad farum Magdalene in Provincia Narbonensi pingendam curavit: est verò caule Fœniculi & folijs & divisurâ cubitum alta: umbella albet & odorata est: radix unica, recta, humi pacta, candida, sapore Pastinacæ.

Verum hoc magis placent vulgares Caulalides.

Lobelio in hist. Belg. p. 889. & Icon. p. 727. Caulalis dicitur. Lugd. p. 715. Caulalis Penz. Tab. Caulalis Anglica, Bletten Börffel. An verò nomenclatura hæc germanica converiat, judicet vel mediocriter doctus. Bauh. phyt. Peucedanum sive Peucedano similis: Caulalis 3. Tab. in fol. Eid. B. pin. Caulalis 12. folio Peucedani.

APIVM, QVOD PETROSELINVM
Dalechampi, folio tenui, Apij hortensis
semine, subrubro, amaro, radice nigra.

CAP. XIII.



RADIX longiuscula & crassa, foris nigricat, intus albet, capite comato, earundem more quæ plures annos perdurant, sapore amaro. caules inde pronascuntur plures, fungosi, striati, pedales, interdum palmates dūtaxat, folijs amicti, Dauco glauco folio similibus. caulū scapus tripartitus primū: laterales furculi umbellas gerūt flosculorum albicantium, parvas per florendi tempus, magis pa-

culas euntibus in semen floribus: medius furculus rursus trifariam subdividitur, umbellis similibus ornatus. semen Petroselini vulgaris.

Petroselinum hoc Dalechambio puratum, in saxis tumulis propè Gratianopolim nascitur, ut testatur p. 702. Lugdunensis.

Syn.

B. pin. Apium 5. montanum folio tenuiore, Petroselinum Dalechampi, Lugd. an Petroselini succedaneum, quod in Apulia Anethum silv. dicitur, Colum.

PYRETHRVM VETERIBVS.
CAP. XIV.

Dige.

Est Pyrethrum, autore Dioscoride, herba quæ caulem & folia velut Daucus silvestris & Fœniculum producit, umbellam velut Anethum rotæ similem [respondet cod. Bas. forte legendum respondet.] Radix est digiti magni crassitudine, gustanti servidissima, quæ pituitam attrahit. Quare etiam dentium doloribus opitulatur, si cum aceto colluatur. Ducit etiam pituitam commansa. Quod si cum oleo illinatur, sudores movet, faciens ad rigores diuturnos. Sed & ad corporis partes perfrigeratas, aut resolutas summè conducit.

Plin.

Pyrethrum Plinius non descripsit, sed semel tantum l. 23. c. 9. simpliciter nominavit. Galenus Pyrethri, inquit, radice maximè utimur, urendi vim habente, per quam & perfrigatorum dentium dolores mitigat, & ante rigores per circuitum repententes, cum oleo affricatur. Torpidis etiam ac resolutis utile est.

Zeguioca.

Ceterum, notum esse vulgò omnibus Pyrethrum, & maximè radice in dentium dolore usum contendit Cornarius. Sed longè aberrat, meo quidem iudicio. Plures enim hodie hoc nomine plantæ passim inveniuntur.

Pyrethrum
flore Buph-
thalmi.

Et primò Pyrethrum vulgare flore Buphthalmi de quo H. n. g. lib. præcedenti.

Dehinc, Pyrethrum umbelliferum Matthioli, de quo mox dicemus.

Item, Pyrethrum Gesneri.

Cotula ge-
nerum.

In Cotulæ genere in Gallia tradi radicem ferventis gustus, ideòque Pyrethrum vocari, author est Cæsalpinus. Quænam hæc sit nos hætenus latuit. Si locum adnotasset, posteri indagare possent, qualisnam esset, & supplere brevitate, propter quam Cæsalpinus meritò reprehendendus est.

Saxifragia.

Quam Saxifragiam hircinam majorem, aut saltè mediam putamus, eam alijs rei herbariæ prudentibus pro Pyrethro quodam ostendunt.

Ptarmica.

Pyrethrum nominant Ptarmicam, quod Pyrethri modo, quanquam mitius vellicet. Atque hinc est, inquit Fuchsius, quod nonnulli pro vero Pyrethro, seducti ejus titillante acrimoniâ, descripserint.

Dracuncu-
lus hort.

Radix pendè nulla Draconi [Dracunculus hortensis] eorum arguit temeritatem, qui Pyrethrum secere.

Tanacetum.

Apud Eucharium Roëlin Pyrethri vocabulo, icon Tanaceti posita est.

Valeriana
filv.

Pyrethrum de Valeriana silvestri dici, vide sub Pyrethro vulgari.


Staphysa-
gria.

Pyrethro substituere videtur Platocomusuvam Tamineam, i. e. Staphysagriam.

PYRETHRVM VMBELLI-
ferum Matthioli.

Pyrethri veri (ut Matthiolus ait) hæc est planta, cujus imaginem in post. comm. cum mag. fig. lat. l. 3. c. 71. ital. cap. 80. expressit, quàmque se non sine labore consequutum esse scribit. Sed unde, non ostendit, nec figuram eam describit. In epit. cum addit. Cam. Pyrethrum verum inscribitur, ac πυρεθρον præced. arab. *Machararabha*, seu *Hachararabha*, italicè *Pyrethro*, german. *Bertram* / hisp. *Pelstre* & gall. *Pyrethre* cognominatur, ibidè que ei Pyrethri

Dioscoridis descriptio, ac vires adduntur, non sine gravi lapsu, ut ego quidem existimo. In hist. germ. ejusdem, Pyrethrum alterum vocatur, ac præter dicta Bohemicè *Beltram* appellatur.



De Pyrethro altero, sic enim Lob. in Adv. præsentem hanc plantam vocat, hæc scribit. Pyrethri veri nomine donabat plantam Guilandinus, & alebat in Patavino horto, cui radices & folia Cotulæ scetidæ. Umbellæ ab uno quasi centro multis pedicellis innixæ, Venerei pedinis ritu, aut Anethi, candidis flosculis, servido & amariante gustu. Sed illud lectori Senensis, qui hæc non nisi labore arduo si-

Adv. Mat-
thioli.

bi comparatam, neque omnibus cognitam asserens, quasi invideret nobis cognitionem, aut metueret criticorum reprehensionem, tacendo docet, nisi quænam illa esset, non perspectum planè fuerit illi. Et sane minimè habet hæc alterius illius, [vulgaris, flore Beckidus] vires mirificas: ut neque nonnullæ aliæ, quæ quia gustu servido sunt, & nonnullam foliorum similitudinem sortitæ, illic ab intempestivis herbanis Pyrethri nomen accipiunt, quasi id præstaret Pyrethrum fervore tantum, ac non potius aliâ comite facultate. Quid velit Lobelius, assignans huic radicem & folia Cotulæ, nos latet. non videntur respondere picturæ, quam ex Matthiolo assumpsit. Cast. dicitur Pyrethrum alterum. Lug. p. 1170. Pyrethrum verum Matthioli. Taber. Pyrethrum, Bertram / Speichelwurz / Zantwurz.

Lob. nat.

De Pyrethro hoc Cæsalp. l. 7. c. 30. sequentibus egit. Pyrethrum apud nos, inquit, in palustribus nascitur radice nigra, brevi, divisa in fibras, specie Meu, odorata, amara, linguam non statim exurente, sed cum plusculum mania fuerit: folia fert Staphylii silvestris, tenuiora: caulem cubitalem, rectum, lævem, umbellæ tres aut quatuor, in cacumine: flore subrubente: semina compressa, & rotunda, figurâ Lentis, nigra & ferventia. Chinarum Incolæ Imperatoriam vocant: exhibent radicem in vine malvatico drachmæ unius pondere ad dolores colicos magna efficacia; nam vehementer digerit flatum, & urinam promovet.

Imperato-
ria.

Et hæc Cæsalpinus, quæ omnia Cam. apud Matthiolum germ. lib. 3. cap. 61. eo tamen non nominato transcribit. Quidam, inquit, describunt Pyrethrum in palustribus nascens, &c. quæ conveniunt cum figura Matthioli, quam posuit in lat. comm. nomine Pyrethri veri, sed ipse rem dubiam reddit, cum ait, se non sine labore eam iconem consecutum; & paulo post cum subdit, rei herbariæ indagatores novum quoddam Pyrethrum ostendere, foliis hortensis Pastinacæ &c. Ita Matthiolus. quamobrem posuimus ejus figuram hoc capite & appinximus semen nobis missum pro vero Pyrethro, nigricans cum margine candido, ut veritatem rei diligentius investigent rei herbariæ studiosi. Hæc Camerarius, qui, ut dictum, omnia ea, quæ ex Cæsalpino ponimus, transcribit, eo innominato. Ceterum, videtur is velle notare Matthiolum contrarietatis, quam non animadverto: quia olim priusquam picturam exhiberet

heret Pyrethri umbelliferi, scripserat de novo quodam Pyrethro, quod dicebat foliis hortensi Pastinacæ proximis, i.e. Germanicæ latifoliæ, & non 3a men Möthen oder gelben Rüben/ ut vertit Camerarius, quæ sunt Pastinacæ tenuifoliæ, sive Carotæ.

Synon. Patav.
rui umbell.
16.

Bauh. phyt. vocat Pyrethrum 1. sive umbellâ candidâ, quod ait se in horto Patavino collegisse; verum umbellâ luteâ, longioribusque foliis, quàm vulgò pingatur. Sed hanc suam assertionem omisit apud Matthiolum, ubi frustra quærit, an fortè sit Pyrethrum Cæsalpini. Eid. B. pin. Pyrethrum 2. umbelliferum: Fœniculum montanum, Trag. Pyrethrum verum, Matth. Lugd. Pyrethrum Italicum, Gesn. h. ap. Pyrethrum alterum, Lob. Cast. & Tab. sylvestre, Ger. Saxifragiæ species, Dodon. 8. Pyrethrum Dioscor. C. min. umbellâ albâ & luteâ.

PYRETHRUM GESNERI.

Defr.



Radice nititur longâ, simplici, modicè fibratâ, pallente, digiti crassitudine, fervidi & urentis gustus: folia Anetho similia produnt, caulis fœniculaceus, flos in umbella circinata rotunditatis, ut in Dioscoridis exemplaribus legendum sit, *aut ad p. reg. xvi. d. r.* i.e. capillaceâ umbellâ. Quare nullam prorsus notam deesse ad veram Pyrethri delineationem putat Gesnerus, qui plantam appictam Py-

rethri veri nomine ad Dalechampium ex horto suo Tigurenfi transmisit.

Lugd. p. 1170. vocat Pyrethrum Gesneri. B. phyt. Pyrethrum 2. (3. pin.) sive foliis Anethi. Nostro iudicio frustra quærit an Pyrethrum Dioscoridis.

CYMINUM, SIVE CUMINUM

lativum veteribus.

CAP. XV.

Diosc.

Dioscorides de sativo Cumino inquit: stomacho [*εὐστούχοι, n. mori, ut quidam codices habent*] utile est: sed multò magis Æthiopicum, quod Hippocrates regium appellavit. Secundum locum tenet Ægyptium: mox reliqua sequuntur. Provenit in Galatia Asiæ, Cilicia, & Tarentina regione, aliisque locis compluribus. Excalfaciendi, adstringendi & exsiccandi vi præditum est: ad tormina inflationisque convenit, seu coctum & cum oleo insutum, seu etiam cum hordeacea farina impositum. Datur & orthopnoicis, in posca: demorsis à venenatis belluis, in vino. Testium inflammationibus auxiliatur, cum uva passa & Fabarum [*vulg. exempl. a. i. r.*] lomento, aut cerato impositum. Cohibet & fluxum muliebrem, sanguinisque è naribus profluvia, in aceto contritum & admotum. Cæterum cutis colorem bibitum illitumve mutat in pallorem.

Thimbr.

Cuminum Theophrastus inter olera recenset. Semine, inquit, est nudo, angusto, instar lituræ (sic enim interpretandum verbum *παχυμύδον*, quod Gaza

canaliculatum vertit, nescit quâ ratione Cæsalp.) inter semina fecundissimum omnium Cuminum [*κυμινόν, Corn. legendum censet *ἀκμινόν*, ut Plin. habet.*] *Orym. pro Cumino.* Peculiare etiam quod de hoc dicunt: imprecari namque & maledicere ferendo oportere affirmant, quò lætius, copiosiusque proveniat. Difficile, ut ita loquar, omnia exsiccantur; Cumino excepto: quæ cortice continentur, difficilius exsiccantur, & inter ea maximè Ocimum. Pluribus constat generibus Cuminum (ait idem Theophr. hoc lib. 7. seq. cap. 4. Sed hoc loco legendum *κυμινόν*, ut post legitur.) Idem *Selinum pro Cumino.* Hist. lib. dicto cap. 8. ait. Quod statim ab radice Cumino subnascitur & Homodorum vocatur, unicaule constat, nec ab simili caule surgit: verum longè breviori & modo capitis superiore quiddam gerente: radice autem subrotundâ nititur. Tandem *Cuminum corruptum.* c. 10. Nonnulla scabie atque salugine pereunt, ut Cuminum.

De Cumino pluribus in locis plura scriptum reliquit Plinius. Ita namque l. 19. c. 8. scribit. Condimentorum omnium fastidiis Cuminum amicissimum. Nascitur in summa tellure vix hærens, & in sublime tendens. In putridis & calidis maximè locis, medio ferendum Vere. Alterum ejus genus silvestre, quod rusticum vocant, alij Thebaicum: si tritum ex aqua potetur, in dolore stomachi prodest. In Carpetania nostri orbis maximè laudatur, alioqui Æthiopico, Africòque palma est. quidam huic Ægyptium præferunt. Idem antea eodem hoc libro c. 7. dixerat. Quibusdam [*supple. sunt semina*] angusta & canaliculata ut Cumino, & nuda. Nihil Ocymo [*Cumino Theophr.*] fecundius: cum maledictis ac probris ferendum præcipiunt, ut lætius proveniat, sato pavitur terra. Et Cuminum, [*Et Cuminum, inquit Corn. est suppositum*] qui ferunt precantur ne exeat. Eodem l. c. 10. Necatur Cuminum ab imo dorso, nisi repurgetur. Est autem unicaule, radice bullo simili, non nisi in Solo gracili nascens. alias privatim Cumini morbus scabies. Lib. 20. c. 14. Sed & sativi [*Cumini*] magnus usus, in stomachi præcipue remediis. Discutit pituitas & inflationes, tritum & cum pane sumptum. Verumtamen omne pallorem bibentibus gignit. Ita certè ferunt Porcij Latronis clari inter magistros dicendi adlectatores similitudinem coloris [*pallorem*] studiis contracti imitatos: & paulò ante Iulium vindicem adfertorem illùm à Nerone libertatis captatione testamenti sic lenocinatum. Narum sanguinem pastillis inditum, vel ex aceto recens sistit. Et oculorum epiphoris per se impositum, tumentibus [*testiculis herniâ præferim aquosâ, vel statuosâ*] cum melle prodest. Infantibus impone in ventre [*ventrali Dal.*] satis est. Morbo regio in vino albo à balineis datur. Et c. 15. Æthiopicum [*Cuminum*] maximè in posca, & in ecleignate cum melle. Africano privatim urinæ incontinentiam [*ἀκοντιῶν. de hac facultate Dioscorides nihil prodidit, nihil quoque de Cumino Africano, Dalech.*] cohiberi putant. Sativum datur ad jecinoris vitia tostum, tritum in aceto. Item ad vertiginem. Iis verò, quos aciore vi urina [*actiorum urina CH.*] mordeat, in dulci [*πὺ ζαυκῶν, vino passo, Dalech.*] tritum vino. Ad vulvarum vitia [*ore sumptum, Dal.*] in vino: præterque impositis vellere foliis: testium tumoribus [*collectio-nibus, Diosc.*] tostum, tritumque cum melle, aut cum rosaceo & cera. Silvestre ad omnia eadem efficacius. *Cuminum silv.* Præterea ad serpentes cum oleo, ad scorpiones, ad scolopendras. Sistit & vomitionem, nausæaque ex vino, quantum apprehenderint tres digiti. Propter colum quoque bibitur, illiniturque, vel penicillis fervens adprimitur [*adstringitur M.*] fasciis ad strangulationes vulvæ potum in vino aperit, tribus drachmis in tubus cyathis vini. Aures in stillatus ad sonitus atque tinnitus cum sevo [*sebo CH.*] vitulino,

Cumini morbus.

Vires.

Pallorem inducit.

Urina incontinentia.

Cuminum silv.

vel

22
vel melle. Sugillaus illinitur cum melle & uva passa
& aceto. Lentigini nigra ex aceto.
Pallens Cuminum vocat & Persius Satyra 5. Item
Horatius lib. 1. epist. 3.

quod si
Pallentem casu, biberem ex angue cuminum.

CUMINUM SIVE CYMINUM

fativum.



CUMINUM,
Cita describen-
te Cordo, fativum,
sive ut aliqui scri-
bunt Cyminum,
parva & umbelli-
fera herba est, alti-
tudine raro pedem
excedens (Cæsalp.
annua planta bre-
vior cubito) tenui-
bus & in plures
angustas partes se-
dis foliis (foliis
paucis, raris capil-
lis, Cæsalp. & flo-
re candido) semine
in umbellis
(parvis & rotundis
Cæsalp.) oblongo, u-
trinque acumina-
to, anguloso carti-
lagineo, in cinera-

ceo colore subflavo, longitudine quartam uncie
partem æquante, gustu subamaro, tenui, mediocri-
ter acri, & cum gravitate suaviter odorato. Radice ni-
titur oblonga, tenui, & cum maturum semine, pereunte.

Ruell. l. 3. c. 44. Cuminum nominat, & tamen non
agnoscit. Cuminum, inquit, Latini juxta & Galli,
rura nostra Comin appellant. Ynicaule, frequen-
tibus ramulis brachiatum, folio penè Fœniculi, semi-
ne copioso & canaliculato, radice subrotunda, quasi
bulbosa. Suspicio Ruellium nescivisse de qua plan-
ta scriberet. Rura Gallie non ferunt Cuminum, sed
Carvi, quod multis dicitur Comin, si novisset disci-
men inter Carvi & Cuminum, annotasset capite de
Carvi dici Comin. & id in Gallia vulgare: præterea
ait radicem Cumini subrotundam, quasi bulbosam,
qui morbus est Cymini Plinio & Theophrasto,
quod ipse poterat observare ex verbis Plinij &
Theophrasti, quæ adducit.

Cuminum præsens, esse fativum verum Cumi-
num antiquorum, dubitarunt quidam. Et ex his e-
tiam Cæsalpinus est. Cuminum, inquit, vulgò ap-
pellatur semen, ex Orientalibus allatum. Quo mi-
nus fativum hoc affirmem, illud facit, quod non est
ori gratum (non enim legit Cæsalp. utrum stomacho gra-
tum: quæ vera & genuina Dioscoridi lecta est) ut pani-
bus spargi possit pro condimento: nec pusillum se-
men est, ut Theophrastus testatur, nec ullo pacto
conferri potest, cum Ammi, ut vult Dioscorides: id-
circo inclino magis in alteram sententiam, ut sit pri-
mum genus Cumini silvestris. Nobis contra Cæ-
salpinum nullo modo placet pro silvestri, quum alia
planta multò melius conveniat, ut ostendemus.

Non desunt etiam hodie, qui Cumini plura a-
gnoscant genera & recipiant. Et talis est Dalecham-
pius. Hodie (inquit apud Plinium l. 20. c. 15. ad Meli-
ta Cumini duo afferunt: alterum acrimoniae vhe-
mentioris, subnigrum, quod Cumini sive [Cumini m-
acri] vocant: alterum candidius, pusillus levioris,
subdulce, quod Cumini dux [Cumini dulce] appel-

lant, quod ab Hippocrate regium vocari ait Dio-
scorides.

Plura quoque genera Cumini sativi agnovisse
Lobeliū ex sequentibus ejus verbis colligere si-
cet. Cuminum haud sponte apud nos oritur, quod
quidem aliquantum diversum diversis è locis Syria,
Cilicæ, & Græciæ allatum observatur. Quod enim
albicat, hirsutumque est semen, præstantius habet-
ur, ac idem cum eo quod neutiquam hirsutum est,
apud nos feri & virere solitum. Nec item putandum
discrimen aliud fuisse Æthiopici, Gallative, quàm
loci prærogativa: visusque est Hippocrates fativum
istud albicans, hirsutumque, Basilicū, seu Æthio-
picum fecisse. Nec enim argumenti ullam umbram
habent Patavini quidam herbarij, cum alius gene-
ris semen pro Æthiopico Cumino ostendant. pusil-
lum enim valde est, acerosum, evanidum, virit ut
multum & odore à communi deficiens.

Cumini tandem plura genera tradidisse Theo-
phrastus scribit C. Bauhin. Sed hoc erroneum est. C. Bauh.
Theophrastus non dicit Cumini plura genera, sed
Apij, eo loco depravatè legitur pro Apij. id
patet legenti totum caput.

Diversas figuras habet Matthioli. Rejeclā enim
falsā (cā sc. quem in priorib. comm. exhibebat) meri-
tò in post. comm. aliam meliorem pinxit. Sed eam
maximè probamus, quæ est in ep. ejus & hist. ger-
cum addit. Camer. sub titulo Cumini sativi: nostram
sculptor miris felicitè expressit.

Dicitur Cuminum fativum, Brunf. Trag. Matth.
Cord. hist. (ubi Gesn. addit ex Tragi l. 2. c. 119. figu-
ram, quæ an bona sit, videant alij) Cam. apud Matth.
Dod. in fol. lat. Lac. & Castori. Cuminum fativum,
Matth. Lugd. p. 697. Cuminum Dioscoridis Lob. qui
in Obs. p. 428. & Icon. p. 742. figuram habet similem
figuræ Matthioli in post. comm. posita. Cuminum
Ruell. (ut videtur) Corn. in Diosc. Dalech. apud Pli-
nium, Turn. Lor. & Cæsalpino, cui & Cuminum of-
ficinarum, & Cumini silv. gerus Dioscoridis. Cy-
minum, Ang. Cord. in Diosc. (cui & Cyminum Ro-
manum) Tab. fativum, Cam. Cumirum æthiopi-
cum, Carnabadiū Cassi Bassi & Myrepsis, Guill.
Cuminum 1. sive Fœniculi folio Bauh. phyt. Eid B.
pin. Cuminum 1. semine longiore. Et, Cumirum 2.
semine rotundiore & minore: Cuminum dulce Me-
litenfium. Hujus plantam non vidimus: at cum Da-
lechampi in Plin. l. 20. c. 15. notas legissemus, ex Me-
lita duplex Cuminum, utpote acre & dulce adferri:
& apud Megiserum in Melita descriptione, idem
invenissemus, ejus nomine ut haberemus laboravi-
mus. quare, utriusque semen è Melita insula trans-
missum fuit: alterum longum, acuminatum, coloris
sord. di. graveolens & sapore acri, cui Cimonagero,
i.e. Cuminum silv. inscriptum erat: quod cum Cymi-
no Æthiopico officinarum convenit. Alterum verò
multò minus, Aniso simile, candicans, gustus lenio-
ris & subdulce, quod nomine Cimonagero dulce,
missum. Apud Melitenfes copiosè feritur, ad pa-
nem condiendum, & ad mercaturam cum eo exer-
cendam.

Græci Κίμινον vocant, & ad differentiam silve-
strium Κίμινον ἡγρον. Sic & Latini Cuminum, & Cu-
minum fativum: Offic. Cyminum. Germani Bym-
mel/ quidam etiam Bymmel/ Garten: aut Röm-
schen Bymel/ (Cuminum hortense, aut Romanum).
zamen garten Bymel/ Bramfummel/ & Fisseffer
Bummel. Belg. & Angl. Comin. Gall. Cumini. Mont-
belg. Sift. Ital. Comino. Hilt. Cominches. Bohem. Bim-
ru. Arab. Camin seu Kimin. Cuminum verò quasi
præparans à verbo ὁδὸ manasse putatur.

M. in insula gignere Cuminum, notam her-
bam medicinis & condimentis, author est. fr. lo.
Quint. Hedius, quod ait Solo græci gaudere. Duo
ejus

Genera
Lobel.

C. Bauh.
nos.

Matth.

Symon.

Nomina
linguar.

Locum.

Cum. a-
grum. ejus genera esse : unum magnâ gustûs acrimoniâ,
aromatum modo odoratum, Cuminum agrion vul-
Cam. a-
grum. gò vocatum : alterum per omnia referre Anethum
& Anisum : sativum utrumque. Cumino Aphrico,
quale hoc sit, palinam semper datam. In Chirman,
quæ regio est Persiæ optimum Cuminum crescere
testatur Linschottanus. Malayenses Indie Orien-
Delosm. talis *lentanyeran* vocare. Importari ex Ormusin
Dachem, & inde in Bantam, ubi satis charè diven-
datur. Cæterum, Cuminum sativum eligitur ple-
num, magnum, flavum, aut pallidum, purum, intus
pingue, veluti liquore aut oleo madefactum, mini-
mèque acerosum. Invehitur ex Vhsibona & Vene-
tius Antuerpiam, ac in reliquis urbes atque empo-
ria. Cyminum satum in horto E. C. mihi pro-
venit.

Vm. Meminit Tragus Cuminum sativum in cibo ve-
luti & Piper usurpari. sunt & qui cum cicere arietino
seu pisce concoquant, nec sine præcipuâ utilita-
te, siquidem inflationes quasvis & flatus ventris di-
scutit, phlegmata, lentosque incidit humores, sto-
Regim.
marum. machique nauseam tollit: sunt qui asserant hoc Cu-
minum cum vino albo à balneo potum, regium ex-
pellere morbum, nec non vertigini prodesse. Cu-
minum sativum ex vino dulci sumptum difficultati
& ardori urinæ auxiliatur. In oleo coctum ait Mar-
Vrina ar-
dur. thiolus, & clystere infusum, prodest torminibus &
flatibus corporis. contusum & ex passio potum, au-
Strangu-
ria. xiliatur stranguriæ. cum sicbus in vino coctum &
bibitum, tussim sedat, thoracem expurgat. in eun-
dem usum, cum aceto in aqua coctum assumitur.
utiliter pani incoquitur, & caseis inditur, ita conco-
Concoctio-
nem iuvat. ctionem juvat, & flatus dissipat. si masticetur, ha-
litusque in oculos insuffletur, iis claritatem concit-
bat. ad rubores oculorum discutiendos coquitur in
pane contusum Cyminum, panis clybano extractus
& dissectus, calidus ob oculos detinetur, tandem
humor qui oculis sese affixit, molli linteo abstergetur.
Nausea. ad ventriculi debilitatem, & nauseam conti-
nuam, recipe crustam panis, quam asperso pulvere
Cymini, calidam ventriculo applica. posset & panis
tostus sumi, qui aceto forti imbutus aspergendus pul-
vere Cymini, & Garyophyllorum, ventriculoque
Sugillata. imponendus calidus. ad suggillata ex quacunque
causa, valet Cyminum in pulverem tritum, & ceræ
ad ignem commistum. ardori urinæ, aliisque vesicæ
vitiis auxiliatur Cyminum in vino coctum, & um-
Collectio-
nis iustum. bilico calidè inductum. Cum farina Fabarum, teste
Camerario, utiliter collectionibus testium imponi-
tur: & tumentibus, dolentibusque equorum cruri-
bus frequenter inducitur. non pauci Cyminum in
columbariis suspendunt, odorem enim ejus se-
quantur columbæ.

CVMINVM SILVESTRE VE- teribus duplex.

Disco. 3 go-
ura. CVMINI silvestris duo genera describit Diofeo-
rides. Plurimum, inquit, & efficacius nascitur
in Lycia & Galatia Asiæ, & in Carthagine Hispaniæ.
Frutex est caule palmum alto, tenui, in quo foliola
sunt quatuor, aut quinque, teruia, velut terra inci-
Gingidif-
sa. sa, ad Gingidij modum: capita verò in summo habet
quinque aut sex, rotunda, mollia: in quibus semer
acerosum, gustanti acruis quàm sativum. Nascitur
Vires. in locis editionibus. Bibitur semen ad tormina & in-
flationes cum aqua: cum aceto verò singultus sed-
dat: ad bestias venenum ejaculantes, & stomachi
humiditatem cum vino. Tollit & sugillata comman-
sum, & cum melle, aut uva passa impositum. In-
flammationes etiam testium sanat cum eisdem im-
positum. Est & alterum genus silvestris Cumini, si-

mile sativo, quod ex singulis floribus sublimia cor-
ricula producit, in quibus est semen simile Nigellæ.
Hoc potum ad serpentium morsus optimum au-
xilium est. Opitulatur & urinæ stillicidio, & calculo-
sis, & his qui sanguinis grumos mingunt. Sed his
Apij semen servescit in super bibendum est.

Cuminum silvestre est prætenue, quaternis aut *plu.*
quinis foliis veluti serratis, inquit Plinius. Et paulò
post. Silvestre ad omnia eadem efficacius. Præterea
ad serpentes cum oleo, &c. Vide plura loco supe-
riori titulo citato, de Cumino sativo veterum. Ga-
lenus silvestre Cuminum præterit, & etiam Aëtius
& Paulus.

Primum silvestre Dioscoridis Cuminum Turne-
rus se videre non meminit. posterius putat se vidisse.
Itali quidam censent Nigellam citrinam esse Cu-
minum silvestre. Alij putant Nigellastrum esse Cu-
minum silvestre alterum. Sed nec Nigella citrina,
nec Nigellastrum esse potest. Cuminum silvestre,
nisi Nigella Romana hortensis sit etiam Cuminum
silvestre. Persimiles enim sunt formâ foliorum, se-
minis & odore. Cuminum alterum silvestre corni-
cula tert, in quibus semen, Nigellæ simile. Nigellæ
genera habent quidem Cornicula, nullum tamen
in iis semen; semen enim in medio capituli continetur,
tenuibus membranis distinctum. Nequit ergo
sive Nigellastrum, sive Nigella citrina esse Cumi-
num silvestre alterum. Assentitur Turnerus Gesne-
ro, qui Consolidam regalem esse Cuminum silve-
stre alterum arbitratur, quæ opinio displicet. De *Consolida*
regalis. Cumino silvestri primo odorato, globuloso nunc
dicendum.

CVMINVM SILVESTRE PRIMVM valdè odoratum, globulosum.



VARIè divaricatos ramos
dodrantalet, tere-
tes habet, medullâ
candidâ plenos:
folia palmum lon-
ga, pinnata. Pim-
pinellæ sanguisor-
bæ foliis similia,
foliola singularia,
profundè serrata.
extremis ramulis
hærent glomerata
capitula, è villosis
candidis penicil-
lis, quibus semina
adhaerent, conge-
sta, quibus subje-
cta sunt radiata fo-
liola, profundius
incisa & veluti spi-
nosa.

Matth. in Diosc. in post. comm. cum mag. fig. item *Synan.*
epit. cum addit. Cam. figuram habet sine descriptione,
in qua flores non bene exprimuntur. Is verò
cum Dodon. lat. in sol. nominat Cuminum silvestre.
Lugd. p. 677. Cuminum silv. Matth. Tab. Cumi-
num silv. erraticum. Castor. Cuminum silv. primum.
Lob. in Ad. p. 330. Cuminum silvestre Dioscoridis,
& etiam in Leon. p. 32. Pona. Cuminum silvestre
primum Dioscoridis. Ang. Cuminum silvestre.

Et sanè Cuminum de quo agimus, melius placet
pro Dioscoridis Cymino silv. primo, quàm Cumi-
num vulgare, quod silv. nullo suspicatus est Cxf.

An Cordo in Diosc. l. c. 69. Cuminum silve-
stre, quod habet summel à Germanis vocant, at,
quo-

Leptis cu- niam Avenæ modo glumofum fit. B. pin. Cumi-
bile. num 3. silvestre capitulis globosis: Lago chymeni,
i.e. leporis cubile in insula Lemno, Bellon.

Locus. Cuminum silvestre primum Dioscoridis, odora-
tum valde provenit mihi Lugduni in horto. Studt-
gardia mihi missum semen quondam per hortula-
num Ducis Florentini, qui Cuminum silvestre Can-
diz inscripsit, Montbelgardi satum in horto E.C. ex-
crevit.

Vires. Calefacit, authore Matthiolo, exsiccat, aperit, di-
gerit, incidit, resolvit, & provocat. Vires ex veteri-
bus præcedenti titulo adjecimus.

AMMI ANTIQVIS, ET IN genere. CAP. XVI.

*Diosc. ex-
plantis non
candens.* **A**MMI nonnulli Æthiopicum, aliqui regium
Cuminum appellant [ἄμμι ἢ τοῦτο Αἰθιοπικόν, ἢ
ῥα βασιλικόν κλινιστὸν καλεῖται. desunt hac in Ald. cod. & ad no-
ta relegantur. Alij etiam nonnulli codices hu carent, us-
que ad ῥα βασιλικόν, i.e. vulgo notum.] Alij alterius naturæ

Delebus. Æthiopicum Cuminum: & alterius Ammi esse pro-
diderunt. Vulgo notum est semen exile, multò mi-
nus Cumino, & Origani sapore. Eligito purum, mi-
nimèque fuscato sum. Vim habet hoc quoque ex-
calfactoriam, urentem & exsiccantem: valet ad tor-
mina, urinæ difficultatem, ac venenatorum morsus,
ex vino potum. Menstrua quoque ciet. Miscetur
& cutim erodentibus medicamentis è cantharide
paratis, quo resistat urinæ difficultatibus, quæ alio-
qui id genus medicamentis supervenire solent. Su-
gillata cum melle impositum tollit. Sed & potu ac
illitu colorem pallidiores efficit. Suffitum aut cum
uva passa, aut resina, vulvam purgat: Diosc.

*Ammi Plin.
Cumin Ac-
thiopicum
est regium
Hippocrati.* Est Cumino simillimum, quod Græci vocant Am-
mi, inquit l. 20. c. 15. Plinius. Quidam verò Æthiopi-
cum Cuminum id esse existimant. Hippocrates re-
gium appellat, videlicet quia efficacius in Ægypto
judicavit. Plerique alterius naturæ in totum put-
ant, quoniam sit exilius & candidius. Similis au-
tem & huic usus. Namque & panibus Alexandrinis
subditur, & condimentis interponitur. Inflationes
& tormina discutit. Urinam & menstrua ciet. Sugil-
lata & oculorum epiphoras mitigat. Cum lini semi-
ne scorpionum ictus in vino possum drachmis dua-
bus: privatimque cerastarum, cum pari portione
Myrrhæ Colorem quoque bibentium similiter mu-
tat in pallorem. Suffitum cum uva passa aut resina,
vulvas purgat. Tradunt facilius concipere eas, quæ
odorentur id per coitum.

*Gal. tempo-
ramentum.* Hujus meminit quoque Galenus dicens, Herbar,
quam vocant Ammi, semen maximè est utile: facul-
tatis est excalfactoriæ, & desiccatoriæ, tenuiumque
partium. Sed & gustu subamarum est, & acre: &
clarum est quod & digerat, & urinam moveat. Fue-
rit autem in calfaciendo, resiccandòque ex ordine
tertio intentio.

Marcell. Ammi peregrinum semper Græciæ & Italiæ fuisse
scribit Virgilius Marcellus: sive sui generis herba &
semen: sive Cymino congener sit, meliùsque & ef-
ficacius in Ægypto nascatur. Eàmque ob causam ti-
sam eo antiquam medicinam esse aliunde invecito.
Fuisse præterea in Ægypto quondam domesticum
Anmeos hujus & quotidianum usum: panibus e-
nim compitum & alimentis mixtum solitum fuisse
comprobare Plinium. Adhæc majore in extenuan-
do vi, quàm Cyminum esse. Quæ porro à principio
hujus capitis leguntur, vocare quosdam hoc Æ-
thiopicum & regium Cyminum, ex aliorum opi-
nione, non Dioscoridis decreto intelligenda esse.
Neque enim ipsius id probare: sed à quibudam sic

vocari, tantùm testari. Siquidem Æthiopici & regij
voces bonitatis à gente in Cymino notæ sint, non
generum diversitates.

Nos si nominum proprietates atque etymon ve-
stigaverimus, inquit Marantha; non dubium est,
quin multa nobis simplicia innotescant: quæ alio-
qui non innotescerent. Nominis namque proprie-
tas denotabit nunc medicamenti formam, nunc fa-
cultatem, nunc odorem, vel aliquid ejusmodi: ita ut
aliqua nota effatu digna medicamento addatur,
quæ faciliorem ejus cognitionem reddat, ut in ea
planta, quæ Ammi à Dioscoride appellatur, claris-
simè appareat. ex descriptione enim seminis (nam-
que id tantùm describit) forma nullo pacto sumi
potest, sed solummodo sapor, sive odor Origano
proximus, & quod exile sit semen: quam ob rem
diutius omnibus ferè incomperta fuit. Quam nam-

*Marantha
nomen
proprie-
tas atque e-
tymon in-
vestiganda
suadet.* que pro Ammi Fuchsius depingit, proculdubio ipsa
non est; nullum enim Origani saporem repræsen-
tat. quare alij aliud semen receperunt minutissi-
mum; cujus plantam in Apulia sæpissimè legi: & est
quam Senensis [Matthioli] depingit, quanquam
verum Ammi esse non consentit. redolet hæc mi-
rum in modum Origanum, & apud omnes ferè ma-
teriarum medicarum peritos (scio enim Fuchsium mutasse
sententiam, & cum cæteris consentire) pro vero
Ammio habetur. Verùm si rectiùs intueamur, ex
alio nomine, quo illam appellatam Dioscorides as-
serit, clarissimè colligemus, longè aliam plantam ef-
se Ammi: inquit enim à quibusdam appellari Æ-
thiopicum Cuminum. ex quo non obscurè colligi-
tur, Ammi semen, cum Cumini semine multam ha-
bere similitudinem; non enim ab odore esse potest
hæc similitudo, quia odor Origano proximus est,
non autem Cumino, sed à forma; quod & ostendit,
id quod subdit, semen est exile multò minus Cumi-
no; quasi vellet nullam aliam esse (quantum ad fi-
guram attinet) discrepantiam, nisi magnitudinis;
quod clariùs ex Plinio colligitur lib. & cap. citato,
ubi habet Est Cumino simillimum, quod Græci vo-
cant Ammi, quidam verò Æthiopicum Cuminum
esse existimant, &c. plerique alterius naturæ, in to-
tum putant, quoniam sit exilius, & candidius. quæ
verba longè clariùs ostendunt, id semen, quo pas-
sim pro vero Ammi utuntur, quòdque à Senensi
depingitur, non esse genuinum Ammi: est enim ni-
gri coloris, nedum Cumino candidius. At verò ve-
rum Ammi semen ad me misit Ghinus, Dioscoridis
& Plinij descriptionibus penitus consentiens. erat
enim Cumino simile, exilius tamen, & candidius,
odore & sapore Origani. Hæc Marantha.

*Appellatio:
nes varia.* Ammi, ut Tabern. memoriz prodidit, vocat Gal. 6.
simpl. ἄμμι, ἄμμιος & ἄμμιος. Lat. Ammi, Ami, A-
mum & Ammum. Herbarij Ammum Alexandri-
num, Ammum Syriacum, Caminella, Cuminella,
Cyminella & Muriola. Medici & pharmacopœi A-
meos, Amios, Ammeos & Ammios, in genitivo ca-
su indeclinabiliter. Serapio simpl. c. 287. Nanchach,
& Anazac; Avenhoes Nancha. Glossographus anti-
quus Avicennæ Alvenic, & Neraberti. Avicenna Ma-
nachne. alij verò Arabes Anemo sive Aneme, Ecindebel,
Leligan, & Leligan, Nachana, Nemicha. Nemichie, Ne-
nucha & Nenucha, addit. Matth. Nanchua sive Nana-
chue. Ital. Ammio, Ammi & Ammeos. Hisp. Ammi & Za-
nagria Gall. Ammi. Boh. Ammi Pol. Pol. Ammia. Ang-
li Ammy, ut & Belg. Ger. Ammey, Ammy & Am-
mey, fraur, & Alexandrinuscher Ammy.

Anmeos porro nomen sequentes assumpserunt
sibi plantæ.

Ammi odore Origani.

Ammi hunc tenuissimum & odoratissimo.

Ammi vulgare majus latioribus foliis, semine
minus odorato.

AMMI ODORÉ ORIGANI.

Dejer.



morum, albicantium, nec verò folis umbellis sunt subiecta tenuia folia, ut in Vifnaga, sed & umbellatum particulis lingularibus: semen succedat Anifi facie, sed minus, insigniter aromaticum: radix crassiuscula subest.

Amomum
quoddam
Mauri
causam.

Crediderim loqui de hujus plantæ semine, Anguillaram epist. 7. dicentem. Anno 1549. Maurus quidam appulit ex Alexandria Venetias secum habens duos saccos seminis, quod pro Amomo vendere volebat, quod mihi exhibitum fuit, ut judicarem an Amomum esset, necne. Ego gustato eo & ejus odore perspecto, dixi non esse Amomum, sed Ami. Quæ opinio cum ipso semine sparsa fuit in Italix varias partes. Vnde omnes reliquerunt Ammi M. Lucæ Gbini, & hoc omnes semper receperunt pro vero Ami. Id autem mali est, quod non existimem, amplius adferri, quod non nullum lucratus est mercator, qui emit, necis qui vendit. Hoc autem semen ex Alexandria allatum sapore & odore in omnibus respondet verbis Dioscoridis, excepta figura: non enim admodum simile est Cumino. Sed Dioscorides capite de Petrofelino dicit, semen ejus simile esse Ammi, cui respondet semen nostrum, & figura simile est Petrofelino, quod in montibus nascitur, quod multò minus eo est, quod colitur. Planta, quæ verum nostrum Ammi fert, folia prima similia habet, foliis vulgaris Nigellæ, sed crassiora, deinde alia subtiliora & minora. Caulem fert cubitum altum, cui infidet umbella similis Dauco Cretico, cum flore pallido. Vbi decidere flores, relinquit semen supra dictum odoratum & saporis Origani. Non provenit in Italia. nascitur quidem aliud simile sapore & odore: sed multò minus, quod etiam pro Ammi usurpari potest: quod aliud finito hoc Ægyptio haberi non poterimus, nisi alij fortè adferant.

Ammi
aliud

Ammi
Germanicam
Cam.

Non displicet figura à Cam. ad hist. Matthioli germanicam & ad ep. p. 522. posita, pro Ammi vero, non item pro Matthioli Ammi, quod à Cretico, seu vero diversum. Matth. in comm. post. cum mag. fig. plantam nostram Ammi Alexandrinæ legitimi & veri titulo pingit. In edit. C. Bauh. vocatur Ammi peregrinum ex Alexandria apportatum, Arabicum, Ammi 1. poniturq; fig. Ammi Cretici Lob. verum hoc Ammi miscetur meo judicio cum vulgari, & cum Matthioli Ammi, q; pingebat, quodq; tenuissimo est semine.

e. B. confu-
sum.

Cum
fatis.
Vam, Gaf.

Cumini sativi nomine describitur semen hoc à Cæf. Cuminū sativum, inquit, existimo semen quoddam exiguum, quod ex Orientalibus adfertur, Amicos nuncupatū in officinis; acre & jucundum: sed

Tom. III.

plantā videre ei non licuit: & ex hoc genere illam se putat, quæ fertur in Hispania. Vifnagā vocant.

Amomum
fa. 10, Amm.
co.

Ammi Amomum habitum fuisse, sed falsò. A natius quoq; novit. At enim in Diosc. enar. 63. Ammicus gignendi cibus, Ammeos est, semen album & exiguum est, quod Origani sapore & odorem habet, & nunc ex Alexandria adfertur, quod Amomum appellant, falsò tamen & corruptè, quum pro Ammi Ammomum pronunciant. nā Amomum, uti Lis. H. n. g. dictum, botriatum, tanquam uvam minuta est. Est enim semen Ammeos simile semini Anifi, quod ex Alexandria adfertur, sub nomine Amomi.

Turn. hoc intelligit per alterū illud genus, Amicos sc. quod verum esse ait, & nuper in Italia inventum, foliis multò minoribus, quàm ullum aliud, cuius semen adferrebatur tunc Francofurtum venale sub nomine Amomi: quidam tamē verū Ammi appellant, potissimū materialiter, ut vocant, Norimbergenses.

Gesl. h. vocat Ammi, Venetiū habitum ex Alexandria, nomine Amomi. Aniso simile. Amati Lusitani. Lob. adv. p. 323. Ammi ex Syria aut Creta. In observ. p. 414. & Icon. p. 125. Ammi Creticum Aromaticum. Lugd. Ammi Creticum aromaticum Lob. Tab. hist. Ammi 3. Creticum, seu Candiacum. Bauh. apud Matth. Ammi 1. semine Apij: Ammi, Lac. Cast. Cam. Eid. B. pin. Ammi 2. semine apij: Ammi majoribus & ferratis foliis semine apij, Gesl. h.

Lucas

Ammi plantam primò vidi allatam à fratre ex hort. Bononiensi. Ex semine ab eo Neapoli misso provenit Montbelg. in horto E. C. ubi cubitalis facta, copiam pluviarū perit: annua est: semen validi erat odoris & Origani. Hujus Ammi semen habui etiā à Valer. Dourez, cū præessem Lugd. & Genevæ examini Theriacis & Mithridatici, quod etiam in ea Theriaca impositum. Ammi semē, quod plusculis ab hinc annis ceptū fuit deveh. ex Syria aut Creta Venetias, hortē Apio par. sed flavū. gustu aromaticum servitum, Origanum præfens, saporis satū non victum, aut marcidum, delituit nos, inquit Lob. & meam suspitionē cōjicit, quā quidā nos monuerat. fieri posse ad Theriaca Venetæ mysteria, ut hebraeus mago, Cretensiū & Syriacū portuū telonarius decodione dilutōve semina maceranda mererit: sicq; cōpedit causa cū pharmacop. Venetis nō parū gratiæ inierit.

Vires
sterilitas
mulierum.

Ammi legitimum semē quod ex Alexandria affertur, misticæ præstat ad mulierū sterilitatē. Nā cōpertum esse scribit Matthioli in edit. C. Bauh. seminis auxilio, plures prolificas effectas. Siquidem si propinetur manē drachmæ pōdere ex vino meraco, aut carniū jure in tenuē pulverē contritū, alternis diebus, tribus horis ante cibū, futurā pollicetur prolē, sed oportet maritū cū uxore rē habere iis tantū diebus, in quibus illa semē nō biberit. Quod tamē diutius sumi nō debet, q̄ quatuor, aut quinque diebus, est enim ad sterilitatē præstanussimū auxiliū, & pluries expertū.

AMMI SEMINE TENVISSIMO
& odoratissimo.

Herba est pedalis, interdum bipedalis, caule tenui, fragili, sceniculaceo, medullā albā pleno: folia prima longa, profundè undiq; incisa: superiora sceniculaceis aut anethinis similia, paulò tamen tenuiora. extremitis ramulorū hærent umbellæ parvæ, inæquales, flosculis albis cōtextæ: semen minimum odoratissimum, calido & acro gustu: radix parva, gracilis, lignota, per ætatem in fibras diducta. sapore fortè Pastinacæ.

Amicos
cor-
recti
ca. 10, Amm.
co.

De Ammi hoc videntur hæc tradere Monachi in Melf. dist. 1. cent. 27. Non est hodie quod sciamus in Italia, qui Amicos certi veram agnoscat plantam. Vnde varij pharmacopolæ variis pro eo utuntur plantarum seminibus. Certè verum Ammi non est cognitū in Italia, neq; est, q̄ multò pejus est, qui

G



Ammi Monachorum descriptio.

Ammi verum plurimum.

An Ammi perpusillum, Lob.

Scam

Ammi Matth.

Legitimum ex Alexandria adfertur.

querat agnoscere. Omnes enim accipiunt, quod primum ad manum venit. Emunt & vendunt, sed quid emant, quidve vendant, ignorant. Pro Ammi autem confitemur, nos ambigere, an verum sit quo utimur. Attamen valde approximatur Dioscoridis & aliorum descriptionibus. Unde malumus (usque dum habeatur cognitio veri Ammeos) uti eo, quam tot di-

versis herbarum seminibus, non solum nobis, sed etiam Medicis peritioribus incognitis. Planta autem seminis, quo utimur, est exilibus foliis, tenerrimo ac minimo Fœniculo similibus. Hasta recta, duobus palmis ferè extollitur, gracilibus ramulis plena, in quorum summitatibus umbellulæ sunt breves. Daucos similes, multò tamen minutiores, in quibus flosculi albi, & semina minutissima insunt. Quorum odor Cumino sativo non absimilis est: sapor autem non (ut ait Dioscorides) Origanum (si tamen hoc quo utimur verum Origanum est) sed dicti Cumini sativi, acutior tamen, & quasi ad Piperis gustum trahens. Sed plus de Cumino, quam de Piperis sapit. Dictam autem plantam cum semine, foliis & parva radice (quæ alba est & lignosa) ostendimus pluribus probatis Medicis, ac eruditioribus viris, à quibus omnibus valde laudatum est tale semen, pro Ammi in confectionibus admittendum. Quod quidem semen plurimi credunt esse verum Ammi, quodque quibuscunque quotidie possumus ostendere: quoniam circa Romam, & pluribus aliis in locis provenit in inculto Solo, & juxta viarum semitas.

An Ammi hoc intelligit Lobel. in Adv. p. 323. per Ammi illud, quod in Patavinis hortis colitur, etiamque non præcui Ageno & Garumna in Aquitania se legisse refert, foliis & umbellis Dauci Cretensis, semine & radice hortensis Apij, nequaquam illis in Ammi semine viribus expetitis præditum. Lob. fig. in Obs. p. 414 & Icon. p. 725. nomine Ammi perpusilli, non multum placet: sed nec ea quam nos habemus ex Fuchianis quæ emendanda erat ad plantam; & flos & semine separatim ex Cam. ep. p. 522. pingendum.

Anguill. epist. 7. vocat Ammi aliud proveniens in Italia, cujus usum admittit pro vero Ammi.

Non negarit Matthiolus Ammi in Italia nasci, et si in officinis hætenus verum non repererit. Siquidem Anguillarius ex Patavio ad ipsum misit legitimum Ammi. Verum enim verò huic sanè illud non ad stipulari tradit, quo Monachi usi sunt, utpote qui suum Ammi (hoc sc. nostrum) nullo Origanum sapore commendari fatentur. Ait præterea Matthiolus in com. cum mag. fig. Non propterea dicam, non nasci Ammi in Italia, quum verum in officinis non reperitur, nuper mihi missum, in quo aliqua nota à Dioscoride descriptæ, quamvis sapor Origanum non ita manifestus, ut in eo quod nunc adfertur ex Alexandria legitimum & verum, cum quo non conferendum Italicum, quod adfertur ex Apulia minimum pauci vigoris si falsum vocandum Ammi. In editione C. Bauh. addit. Quod misit Anguillarius, caulè mitti fœniculaceum, foliis agrestis Pastinacæ, semine in umbellis exili & Cumino minore, Origanum re-

spiciente, odoratum & acutum. Nascitur in monte Gargano, quod Italum est: quod verò peregrinum ex Alexandria apportatur Arabicum est. Eadem ferè in hist. ger. & ep. cum add. Cam. leguntur. Cæterum, ut ex dictis colligere licet, diversa de Ammi scribit Matthiolus, figuram tamen eandem exhibet. Olim non descripsit, sed ab Anguillaria missum ait, ac legitimum putat. In comm. lt. cum mag. fig. non meminit Anguillariæ, & Apulum vocat in ep. descriptio, quam frater recepit, nescio cui competat. in hist. germ. alia descriptio diversa. Figura tamen est Ammi: non placet pro ea figura addita à Camerario, tum ad ep. tum ad hist. ger. Melius arridet figura Matthioli, potissimum inter minores figuras. Præterea plane nobis persuademus Ammi Monachorum non diversum à Matthioli, quamvis dicat non habere saporum Origanum: videtur quoque nobis tenuissimum illud semen habere saporum Origanum, contra gustum Monachorum.

Bauh. apud Matth. malè separat Ammi parvum foliis Fœniculi, ab Ammi Matthioli, quod idem cum jam dicto. Non absque titubatione quoque indigenam herbam Italiam dicit, delatam ex Alexandria. id enim cõpetit Ammi Cretico, quibusdã dicto: quamvis idem ante ipsum scripserit Dodonæus, nõ agnoscebat Creticum vel Alexandrinum. Verba fratris hæc sunt. Ammi 2. sive parvum foliis Fœniculi, herba est exigua, ex radice parva aliquot cauliculos tenues, brevè (que emittens: circa quos folia Nigellæ oblonga, tenuissima, capillorum instar dissecta, & sensim magis attenuata, umbellas habet parvas, candidas, exiguis flosculis quadrifoliis, quibus succedit semine minutissimum, acre & suave: ex Alexandria Egypti in Italiam allatum, nunc in hortis & Italiam (apud quos & in llyva provenit) & Germaniam facile provenit, quod pro Sifone aliqui habent. Eum autem separare Ammi suum parvum foliis Fœniculi, ab Ammi Matthioli, ita patet. Vocat Ammi Matthioli, Ammi 1. quod nos appellamus Ammi odore Origanum & Creticum quorundam, de quo ante egimus. Hoc verò Ammi, vocat Ammi parvum, Dod. gall. Ammi verum Gesl. Ammi perpusillum Lob. & Lugd. Ammi alterum parvum, vel tenuifolium minus Dod. in sol. lat. Ammi primum Alexandrinum Tab. Ammi, Cæf. Ammi simile, Anguill. Nobis autem dictorum autorum Ammi ab Ammi Matthioli, quod B. malè Ammi Creticum facit, in nulla penitus re differt. Ammi Matthioli & Creticum vocat Cam. h. sed nescimus an unã vel duas species existimet. Sed ipse Bauh. in pin. certior docet. Ammi 3. parvum foliis fœniculi, inquit, est Ammi, Matth. Ang. Lac. Cast. Cæf. Lug. & Cam. Ammi verum, Gesl. h. Ammi parvum, Dod. gall. alterum parvum, Eid. sol. Ammi perpusillum, Lob. Ammi 1. Alexandrinum, Taber. Lugd. vocat Ammi Matth. p. 695. & videtur secundã vice tradere p. sc. seq. 696. pro Ammi perpusillo Lob.

Videtur Tab. in hist. p. 366. per Ammi 1. Alexandrinum, nunc describere Ammi tenuissimo semine: sed nõ placet dicere Alexandrinum, & ex Alexandria Egypti delatum: quandoquidè in Italia provenit: nescimus præterea quid intelligat per Ammi Italicum, Apulum & Romanum. sive Ammi 2. nisi hoc idè, quavis pro diverso ponat. Estimamus Schyvet & feldum non distinguere verum Ammi Dioscoridis & Alexandrinum ab hoc, quod minimo semine est: considerent lectores an quæ scribit de sapore ipse suo gustu observavit. Ammi, inquit, Dioscoridis, Ammi perpusillum Lobelij, Ammi Alexandrinum Ethiopicum Cuminum, semen est gustu amarum, subacre & tenuium partium.

Ammi semine tenuissimo & odoratissimo, Cretico est multò minus odor quoque paulò infirmior: differunt etiam folia: satum in horto meo Genevæ florebat adhuc Novembri, & ex semine deciduo virebat parvæ plætæ. Lugduni copiosè habebat in horto, ut & Basil. Mont-

Matth. ex.

Ammi Monachorum idem cum Ammi Matth.

C. Bauh. error.

Ammi parvum foliis Fœniculi, C. B.

Sifon non nullorum.

C. B.

Syn. C. B.

Lug. lapsus.

Tab. met.

et hoc falsum.

Cuminum ethiopicum.

Locum & Tempus.

Montbelgardi in horto E.C. & meo satum florebat Augusto, semine quotannis se renovans: narravit mihi quidam Rizotomus, qui seminis magnam habebat copiam, abundare in Apulia. Solum requirit bene stercoreatum, soli expositum.

AMMI VULGARE MAIVS, LATIORIBUS FOLIIS, SEMINE MINUS ODORATO.

Defer.



Ammi Cretico, & Ammi semine tenuissimo majus est, caule crassiore, striato, foliis latiusculis, oblongis, crenatis, multifidis, ad Podagrariae folia quadrantem accedentibus, quibus tamen multo minora sunt superiora, in plures lacinias divisa. umbellae inaequalibus contextae sunt muscarius flosculorum alborum amplissima, longis pediculis, ad quorum coitum

folia circumjecta sunt longa, in tenues, lori instar lacinias dissecta: semen majus, ignavius, quam in Cretico & tenuifolio: radix gracilis, inutilis.

Celsalpini Caucalem (de qua l. 7. c. 19. sequentibus egit) diceremus esse eandem, cum Ammi hoc: quia autem horum quaedam repugnare videntur, illud asserere non audemus. Caucalem, inquit, ubique in arvis nascitur, similis Dauco campestri, sed foliis variè divisis, ut in Coriandro: nam prope radicem sectiones longae sunt, ac subrotundae, laxiter in ambitu serratae, ac leves; procedente tempore cum caulescit, folia tenuius & inaequaliter scinduntur, & tandem redduntur Dauco campestri similia, subcandida & subhirsuta, rariora quam Dauco: caulis candidus, ab imo ramosus, cubitalis & amplior: umbellas fert capillaceas, tactu aspero, quae nequaquam clauduntur, ut in Dauco; flosculi candidi: semina parva serè, ut Ammi; idcirco pro Ameos hodie à plurimis accipitur, sed pauca inest acro, cum aliqua amaritudine, non insuavi: radix candida est, ramosa & parva, gustui non ingrata, coquitur in cibis ut Pastinaca silvestris. Dioscorides de Caucalem inquit, ab aliis silvestrem Dauco vocari; Plinius edi & Caucalem Foeniculo simile. Theophr. Dauco recenset inter olera: Pes gallinaceus vertitur à Theodoro.

An de hoc loquitur Matthiolus, cum ait. Quamquam varia, ac diversa semina viderim, quae legitimum Ammi merentur; pullum tamen ex his hactenus sese mihi obtulit, quod animi ad credendum alliceret, verum Ammi ex Alexandria Aegypti ad nos deferri. Quod Ameos nomine in officinis passim habetur, cum probatissimum, Plin. teste, Cumino sit candidius, id nigricat, adeoque vulgaris Petroselinum semen emulatur, ut visu ab eo dignosci minimè possit, sed in hoc gustu consulere oportet. Nam cum haud leviter sit acre, facultatis discriminè gustu facile deprehenditur. Praeterea cum hoc nullum Origani saporè gustui repraesentet, quae tamen refertur verum Ammi Dioscorides est auctor, adhuc clarius sit, id non esse legitimum. Veruntamen contrarium sensisse videtur Ruellius: quippe qui minùs fortasse accuratè examinaverit, quae de Ammi Hippocratis testimonio, scriptis tradidit Plinius, de quibus ante.

Tom. III.

Videtur nobis Ruellius confundere cum vulgari Ammi, Sifonis semen, quod à quibusdam Ammi existimatur. Notum, inquit, officinis semen, Ameos nomine, quod Romanis Cuminum Alexandrinum dicitur. Quidam Aethiopicum Cuminum id esse putant, alij Regium Cuminum appellant: plerique in totum alterius naturae existimant Aethiopicum Cuminum ab eo, quod vocatur Ammi, exilius multo quam Cuminum, gustusque Origani.

De Ammi (ita namque inscribit praesentem nostram plantam) haec habet l. 2. c. 118. Tragus. Saepenumero eundem in hortis meis semen Ammios exiguum sevis, sed nunquam in his flores protulit, nisi an. 1536. quo haec scribo. Ac animadverti semen Ammios in fine Aprilis mensis terrae mandandum, quam requirit Soli expositam & apricam. Erumpit autem primo exortu binis exiguis & acutis foliolis, veluti Petroselinum vulgare, post quae alia subsequuntur, subinde auctiora & latiora, quorum nonnulla Foeniculi equini, aut Levistici aquatici foliis similia apparent, quamprimum in rotundos, concavos, geniculatos, & furculosos caules assurgit, in fastigiis magnas & perelegantes, candidoque flore resectas umbellas, Aniso serè aut Coriandro similes, Julio mense gerentes. Semen exiguum albicansque; Autumno appetente cum Foeniculo maturatur, gustu servidum & acre. Planta est alba, seu aestiva, ut quae quotannis semine seri necesse habeat, nam postquam defloruit, semenque maturavit, tota sua substantia, caulis, radix & folia pereunt. Proceritatem viri nonnunquam adipiscitur, multis ramulis & adnascens brachiatur; radicem habet rectam, candidam & lignosam. Hippocrates Ammi Cuminum regium appellavit, quod germanicè Seren (forte melius Bönigo) Bümme interpretari licet. Aegypto olim familiare fuit, panem enim compinsebatur, sicut apud nos Catos. Hoc pacto usurpatum tormina & inflationes ventris ledandi vi pollere traditur. Dioscoridi Ammi, Ammum Alexandrinum, Cuminum Aethiopicum, ger. Ammi rensmickl) nominatur. Recentiores & officinae Ammum & Ameos vocant, Germani Ammey. Ammi Serapionicae Nanochach, Anazue & Poonum ancherimon. De Ammi vide Gal. simpl. 6. Avic. l. 1. c. 61.

A

A

Turnerus quidem Ammi veterum esse negat, sed ejus loco hoc nos uti posse admittit. Ammi, inquit, Graecis & Latinis, quo nomine & Angl. potest appellari. Officinae Ameos nominant in gignedi calu. Herba Ammi in omnibus hodie officinis usitata, caule est longo, viridi, circa summum ramoso: foliis longis, tenuibus, crenatis: flore albo in umbellis Anethi, semine parvo, amaro, calido. Etsi pro Ammi possit substitui, sitque ejus species quaedam, provenit tamè in Italia genus quoddam nobilius, quod vidi: Cuius si copia esset, ejus usum, relicto hoc vulgari, cōsulerem. Nō enim invenio in vulgari calore illud & siccitatem in tertio excessu, quae requirit Galenus. Quamquam interim nō est contemnendum vulgare hoc Ammi.

A

Ruell. forte
Sifonis semen
fundit cum
ammi.

Ammi
Trag.

Semen in
fine Aprilis
terra man-
dandum.

Cuminum
regium,
Hipp.

Ammi Dio-
scor.

Ammi Creta
peregrinum.

Ammi rom.
mune, Dod.

Negat Am-
mi veterum
Turn.

Ammi fo-
et quod
melior
Sifonis

Ammi
gare

aridis locis, quales ut plurimum in Apulia conspiciuntur, inveniatur, dodrantali longitudine videtur, ut testatur Marantha: in pinguiori verò Solo, sesquicubitus aequat, exceditque.

Ammi Ge. rum esse negatur. Licet autem reperiantur, qui vulgari hoc Ammi, veri loco utantur, non desunt tamen, ut Monachi in Mes. dist. 1. cens. 17. qui non recipiunt vulgare Ammi. Et sane expendendum est pharmacopolis an usuale hoc veri notas exhibeat. Cronemburgius de comp. med. 1.1. ait se hactenus ejusmodi notas non deprehendisse, ideoque genuinum esse inficiatur, & meritis.

Synon. Fuchsius porro descriptam à nobis plantam vocat Ammi, quo titulo eam etiam pingit. sic vocat & Lon. & Gesn. col. Dod. gall. Ammi commune; lat. in fol. Ammi vulgare. Lob. adv. p. 321. in obl. p. 415. (hic querit, An Bubonium Hippocratis in morb. muliebr. Guiland.) in Ic. p. 710. Ammi vulgatus. Lug. p. 695. Ammi Fuchsi. Ger. Ammi vulgare, *Bischofs wees de.* H. Lul. Ammi Fuchsi & Tragi, Ammi vulgare. Tab. Ammi oselinum, Bubonium Hippocratis, *Ammeypeterlin*: Ammum adulterinum. Bauh. apud Matth. confundit Ammi vulgare cum Cretico. Ammi, inquit, triplex habetur, majus, alterum semine Apij, & tertium foliis Fœniculi. I. Ammi semine apij, Ammi Matthioli Ang. Lac. Cast. Lug. Ammi majoribus & serratis foliis, Gesn. h. Ammi Creticum aromaticum Lob. Ammum 3. Creticum Tab. Cuminum sativum Cæsalpini fortè. Confundit inquam C. B. Ammi vulgare cum Cretico. Matthiolus non loquitur de Ammi majoribus foliis, nisi intelligat id, sub officinarum Ammi: Anguillara non loquitur de hoc Ammi, nisi id intelligat per Ammi Ghini.

An Bubonium Hippocratis? Ammi Creticum Lob. Tab. & Cuminum sativum Cæsalpini est alia planta. Alia item Lacunæ & Castoris. Et hæc monemus, ut si post hæc de plâis scribat, confusionem suam agnoscat & emendet. Qui verò possibile est tantum virum tam graviter lapsus.

C. B. excus. Num bonus aliquando dormitat Homerus? An hunc errorem ex inanimadvertione, aut aliorum potius culpâ irrepsisse, vel ex eo cõjectari licet, quod monitus in pin. lubens sententiam mutavit? Ammi 1. majus (inquit) est Ammi Brunf. Trag. Turn. Cord. in Diosc. & hist. Gesn. h. Lon. & Lugd. Ammi commune sive vulgare, Dod. Cam. Ger. Ammi vulgatus, Lob. Ammi oselinum, Taber. Bubonium Hipp. quorundum; Bupleuron Plinii, aliorum. Variat foliis plurimum incisib. & nonnihil crispis.

Bupleuron Plinii Schövene. tractur. Ammi vulgatus, amarum est semen, & gustu ferve, ut tradit Schvv. Sed salitur, si gustus ejus non depravatus sit, aut eum penitus amiserit. Iudicent, hoc qui semen habent, an tali sit sapore.

An Corn. in Diosc. notum vulgò semen Ammi, officinis Ameos corruptè vocatum, Germ. Ammey samen, i. e. semen Ameos.

Locus cum tempore. Ammi vulgare, foliis, caulibus & umbellis maius Ammi Cretico, & Ammi cum minore semine, nec eo ita odorato, habebat Fuchsius Tubingæ in horto, cum ipsi conviverem, vocabatque Ammi majus, cujus faciebat & alteram speciem, quam vocabat Ammi medium tenuioribus foliis. Sed hæc fortassis à cultura varietas. Basileæ vidi in hortis florens mensibus Septembri & Octobri. Lugduni sponte proveniens in horto meo, florens Iunio. Montbelgardi in horto E. C. florens etiam Julio ac aliis mensibus, semine deciduo se propagans. unde annua est planta. Tragus, Fuchsi. & Dodonæus hanc in Germania tantum statim in hortis provenire serunt, faciliè tamen & magnâ copiâ, sic ut deinceps vix extirpari queat. Augusto mense

floret, ac deinceps ubi defloruit, semen abundè producit.

BVNIVM VETERIBVS.

CAP. XVII.

Bvniõ [βύων] caulem producit quadrangularem, prolixum, crassitudine digitali: folia verò stratur. [αὐτὸ τὸ πίζυ, radici proxima, Dod.] similia Apio [αὐλίσυ] sed multò tenuiora, ad Coriandri folia accedentia [τὰ τῷ κορίαν, Cod. Bas. τὰ τῷ τεύχον ἢ κορίαν, vet. Lac. τὰ ἀπρι.] florem Anethi: semen odoratum, Hyosciami semine minus. Ciet id urinas, exsiccatur, & secundas evocat. Spleni, renibus & vesicæ utile. Cæterum seminis tam humidi, quàm siccis, itémque succi ab eo unà cum radicibus, caulibus ac foliis expressi usus est ex aqua mulla. Bunion inter rejecta- Bunion Galienae Dioscoridis, alij Aton, alij Aetinen, alij Anemosphoron, Prophetæ Paradacry, Ægyptij Erxoen, Romani Scopam regiam vocant; Aphri Zigar, alij Thempso. Vinum Bunites fieri, si Bunij contusi drachmæ duæ in quatuor musti heminas mittantur, autor est Dioscorides. Commodum esse stomachicis & fatigatis ex armorum pugna, aut equitatione multa, idem prodidit.

Meminit hujus Plinius 1.20. c.4. Naporum, inquit, duas differentias & in Medicina Græci servant. Angulosi foliorum caulibus florentis, quod Bunion vocant, purgationibus seminarum, & vesicæ & urinae utile decoctum, potum ex aqua mulla, vel succi drachma. Semen dysentericis tostum, tritumque in aqua calida, è cyathis quatuor. Sed urinam inhibet, si non Lini semen unà bibatur. Alterum genus Buniada appellant, &c.

Bunion, quod aliquos Arction vocare scribit Galenus, ex calfacientibus esse ait in tantum, ut & urinam ciat, & menses ducat.

Bunion sunt qui Aron dicant, ut videre est apud Marcellum, sunt item qui Arction, &c. Alterum & primum in divisione Naporum genus Bunion hoc facit Dioscorides, ait idem Marcellus: describiturque à cunctis iisdem notis & viribus. Non tamen in sanitatis usu receptum, ut alterum illud est. Quod feminino genere Buniada Græci vocant, secundo volumine à Rapis statim, quasi ejusdem cum illis generis à Diosc. tractatum. Vtriq; radix crassior: sed cotta quàm in Rapis acuminatæ longitudinis: hinc etiam exilior, quàm Buniadis & minor. Nomen ambobus factum aliqui tradiderunt ἀπὸ τῆ βύωνος. Vocant autem Græci inter alia Bunos, tumentia & quæ in amplitudinem creverunt, quæ Naporum radices forma est.

Cur autem in Dioscoride legatur Scopam regiam Bunion à Romanis dici, ignotum nobis est. Nihil enim habet planta hæc quod scopis congruat: non surculosam naturam, non usum, non folia, non aliud quidpiam quod scoparum ratione indicet aliquam. Ignoræ alix appellationes etiam. Sola Arction ex similitudine facta est: quam nos Æginetæ auctoritate instauravimus. Non legitur in Barbari editione hoc caput: nec nos scimus, relictumne à librariis imprudenter in exscribendo fuerit: an potius quia de Napis à Diosc. secundo libro acem fuerat, ratus abundare, volens ipse & prudens id reliquerit. Siquidem in Corollario etiam nihil actum de Bunion ab eodem est. Veruntamen auctoribus Græcis omnibus recipiendum, & cum cæteris verendum fuerat. Qui enim de Pseudo-Bunion, i. e. falsa & mētē ēte Bunion, agi mox poterat, nisi de vero Bunion actū prius fuisset? Verè enim alicujus oportet falsâ & mētē in plâis esse.

PSEUDO-BVNIION VETERIBVS.

CAP. XVIII.

Pseudo-Bunion parvus frutex [βουκρίον] est palmi altitudine in Creta, folia, ramulosq; habes Bunion similia

Veri. similia [Apio, vet. ord.] Jacrigustu. Quaterni ejus ramuli ex aqua bibiti, tormina, stranguriam, laterumq; dolorem sanant: discutunt & strum is, si cum sale & vino tepentes imponantur. Romani pariter & Greci Pseudobunion vocant.

Plin. Pseudobunion ut refert Plin. l. 24. c. 16. Napi folia habet, truticans palmi altitudine, laudatissimū in Creta. contra tormina atque stranguriam, laterum, præcordiorumque dolores bibuntur rami ejus qui nū senive. Pseudobunion, auctore Galeno, similiter ut ipsum Bunium, calidum est.

Marcell. Quale Pseudobunion sit, præter Dioscoridem, Plinium, cunctosque alios, qui omnes Napo similem tradiderunt, nomen ipsum etiam indicat. Neque enim mentiri verum Bunion, nec fallere carpentes posset, nisi similis illi esset. Eaq; similitudine fallens, falsum, & mendax Bunion à Grecis dictum est. Monere aliud legentes in eo non oportet. Peregrina enim Italix herba est, & ex Creta repetenda, inquit Marcellus.

BVNION ET PSEVDVBVNION in genere.

Bunium i-
genium;
Corn. Ignotum hodie utrumq; Bunion, tum verum, tum falsum ait Cornarius. Vulnerariam præterea herbam esse negat: siquidem iis viribus nō sit prædita, quas Gal. Bunio attribuat, velut quidam opinati sūt. Idem Pliniū Bunion cū Buniade cōfundere scribit.

Male capi-
ti de Lam-
plana ad-
ditur caput
de Bunio. Monet auctor Lugdunensis, in quibusdam etiam veteribus grecis Dioscoridis exemplaribus l. 2. c. de Lampšana; caput de Bunio non rectè subditum fuisse à descriptore, nomen *Βουνιον*, i. e. Napi, & *Βουνιον* similitudine decepto, cū se ipsa diversissimæ sint plantæ. Nam præterquam quod absurdum fuerit ejusdem plantæ historiam diversis libris à Dioscoride conscribi, certè Raporum, Raphani, Naporum, & cæterorum id genus olerum descriptio, & natura à Bunio & Pseudobunio herbis insigniter medicatis omninò dissidet, nec rectè conjungi potest. Quare ex vetustiorum etiam codicum fide, rectè Bunij & Pseudobunij historia in librum quartum rejecta est. Eadem nominum affinitas multis etiam doctis herbariis, erroris causa fuit: primū Plinio, qui Bunium Napi genus fecit. Deinde Ruellio, qui capite de Pseudobunio *Βουνιον* *Βουνιον*, folia Napi convertit: item Orbasij interpreti, qui *Βουνιον* Napum interpretatus est. Huc etiam impegit Matthiolus, Bunium Napum silvestrem vocās, cū Napus silvestris Bunias sit, non Bunion. At *Βουνιον*, neque *Βουνιον* est, neque eadem figura, neque iisdem viribus, aut classe cum Buniade. Est præterea observandum, nec in exemplaribus grecis, nec in Orbasio in Bunij caule ramulos minutis foliis ac floribus scatere: itē folia Apio quidem similia legi, sed non proximè radicem. Quare necesse est, aut verba hæc reducere, aut Ruellium alio exemplari, quàm vulgato usum.

Plinij &
Ruell. err. Bunium non aliud agnoscit nomen, quod sciam, nec apud Græcos, Latinos, Germanos, aut Anglos: nusquam enim mihi (Turneri verba sunt) in Anglia, aut Germania conspectum, tantūque in Italia Bononiz vidi. Vocetur tamen, ne anonyms sit, wilde Parsely aut Square Parsely / à similitudine cum Apio. Matthiolus aut Bunium in Hetruria vocari Napum silvestrem, nusquam tamen describit, nec pingit, quod tamen facturum eum fuisse puto, si ei notum fuisset. Mirum est rusticis in Hetruria tam bene notam plantam, vocarique ab iis Napum silvestrem, cū Napus sativus (unde illi nomen mutuantur) nihil penitus habeat simile cum Apio aut Coriandri foliis, nec flores habeat Anethi, nec semen Hyosciami. Præceptor meus Bononiz Lucas

Turner. *Bunium Bononia.* *Napus silv.* *Hetruria.* *Marth.* Tom. III.

Chinus hæc plantam me docuit, portionemq; communicavit, quum etiamnum possum demonstrare. Cū Bunium Dioscoridi dicatur Bunion, eidemq; Napus vocetur Bunias, de quibus agat duobus diversis capitibus, differentesq; faciat plantas, alteriq; tribuat folia Apio, aut Coriandri alteri longè alia: si melior auctor sit Dioscorides quàm Plinius, illum potius Buniadem à Bunio distinguentem, quàm hunc sequendum censeo, aut Matthiolum etiam, qui unā cum Plinio utramque confundit plantam, ex duabus unam faciens, quæ tā longè descriptione, figurā & formā inter se differunt. Nominum fortè similitudo Plinio imposuit, ut has conjungeret, a hīs formā & viribus longè diversissimas.

BVNIVM DALLCHAMPII.



L Ocus saxosis, a. *Deser.* *Speris*, & à Sole illustratis Bunium Dalechampi provenit, radice candida, surculosā, odorata, festucis in summo villosā, foliis proximè radicem tam facie similibus Apio hortensi, ut spectantes fallant, tenuioribus ad Coriandri folia accedentibus, caule quadrato, procero, minimi digiti crassitudine, flore umbellæque Anethi, si mine odorato, quàm in Hyosciamo nunc.

Pingit hoc Bunium Dalechampi Lug. p. 774. v. *Bunium* *rūmque Bunium Dioscoridis, Plinij, & Galeni facit. Seram an-* *Sed descriptio Dalechampi nimis jeuna & potissi-* *mūm ex Dioscoride transcripta: regio ubi observa-* *ta, erat annotanda. Scirpium periti investigent* *quam plantā intellexerit Dalech. in Icone non est* *radix in summo villosa, ut in descriptione traditur.*

Bauh. phyt. vocat Daucum 8. (n. pin.) & Daucum *Daucum Co-* *Petroselinij, vel Coriandri folio, Bunium Dalecham-* *pij, quem multū convenire ait cum Dauco 7. sive* *campestri Apio folio [hunc nos Saxifragiam hircinam* *mediam credimus.] Verū in illo semen dicit, ut Anethi oblongum; in hoc Hyosciamo minus, ut in Bunio Dioscorides requirat. Ego non invenio Dale-* *championium dicere semen ut Anethi, sed semine mi-* *nuto: Icon parum habet similitudinis.*

BVLBOCASTANVM TRALLIANO. CAP. XIX.

*A*LEXANDER Trallianus empyematicis victus *Elymion.* rationem præscribens, inter alia meminit Bulbos, sapore gustūq; Castaneas sentē exprimat Verū Goupylus vocem hanc depravatam fuisse à descriptores annotavit, quod Castaneas neque ex Bulborum genere sint, neque Bulbis simile quicquam habeant, ex Glandium enim genere sunt, ex quo conjicit veterem scripturam fuisse *Βελαστρος* *Sed cū natura plantas proferat habitu & fi-* *gurā radice bulbos, sapore gustūque Castaneas* *sentē exprimentes, adhuc non video, cur Tralliani* *lectio sit immutanda.*

Sexu.

Et hinc Dalechampus proponit Bulbocastana, sexu discreta, unum mas, quod alij Bunium Dioscoridis faciunt, & nos Bulbocastanum inscribimus. Alterum femina, quod Oenanthem aquaticam cognominamus.

Habet & Camer. de hort. Bulbocastanum conio-phyllon, quod Cicutariam bulbosam odoratam vocamus.

Ornithogallum Ruell.

Dod. de florib. c. 57. ait Ornithogalum Ruellij descriptum l. 2. c. 77. Bulbocastanum quoddam esse videri, & non Ornithogalon.

Bulbina.

Bulbina quibusdam neotericis, teste Dodonzo, de suo Bunio dicitur, quod est Bulbocastanon. De Bulbina dictum H. n. g. l. 19.

Guilandinus non probat Andernacum & ante ipsum Goupylum (quos sequitur Matthiolus, ut prolixius videre est. l. 7. H. n. g.) pro Bulbocastanon, Balanocastanon (Castanearum glandes) substituentes, quod empyematicis nullam utilitatem asserere possint.

Castanea.

Trasi.

Bulbocastanum dici de Trasi, patet H. n. g. l. 18. c. de Trasi.

Cyclamini non sine errore.

Errant Angli multi, qui Cyclamini loco, Bulbocastanum sumunt, quod neque viribus, neque facie respondet Cyclamini descriptioni.

BULBOCASTANVM.

Descri.



Radix bulbosa, primo ortu Ervi magnitudine & rotunditate, interdum pyriformis, fibras tum ab imo, tum à lateribus promens capillares, alba, solida gustu subdulci, grato, folia profert bina, virore splendentia, sesquiuinciam longa, vix dimidium culmum lata, sapore ferè Petroselinii, sed multum ignaviore, quæ postea variè dissecantur, adeò Apii hortensis folia, mentientia, ut difficile ab exercitatis e-

tiam, nisi deesset saporis fervor, internosci possint. At adultiori radix in insignem augetur molem Iuglandis magnæ, inæqualiter tuberosa, membranâ nigrâ contexta: folia verò ex pediculis palmaribus & sesquipalmaribus purpurascensibus etiamnum tenuius dissecantur, ut Rutæ ferè pratensis tenuifolia, pinguis, crassa. caulis, in ramos aliquot divisus: umbellæ satis magnæ: flores albi: semen tenue, longiusculum, nigrum, sapore aromatico, & acro.

Symm.

Oenanthis species.

Guilandinus vocabat eum Patavij essem Bulbocastanum. D. Cortusus speciem Oenanthis faciebat. Insignis Medicus Petrus Turnerus, cum apud nos esset, dicebat patrem vocasse Apion. Is verò part. 1. appellat Apion, vel Chamæbalanon, quod à Theophrasto Ischas, Lat. Gazà interprete Caryca, Anglis Erdnut, vel Earhnur dici ait.

Chamæbalanus.

De hoc porro loquitur Guill. in epist. ad Gesn. inter epist. Matth. l. 2. *Bulbocastanum* Tralliani l. 7. *de quoniam* herbam interpretor, cujus semina ad te misi. in Græcâ Chia *apocynas* dicitur, Bizantini *apocynas*, Rhodij *Bulbocastanum* appellant. Ad stipulatur meæ sententiæ, aut ego potius suæ, Fallopius.

Guilandinum, quod novam improbat Tralliani lectionem, hallucinari scribit Matthiolus, nec ullo pacto censendum putat loquutum Alexandrum, de Bulbocastaneo Guilandino, cum nullus habeatur inter antiquos, nec inter recentiores Græcos, qui usquam Bulbocastanei meminerit. Miratur Gesnerum concessisse Guilandino radicem illam misam esse Tralliani Bulbocastanon. In hist. germ. pressens planta ab ipso Oenanthem inscribitur, quod figuram, quam ponit melius cum Oenanthem, quam Filipendula convenire tradit, ac propterea Oenanthem constanter, sed pertinaciter existimat. In post. com. cum mag. fig. Oenanthem primam fecit, quam Cortusum sibi misisse fatetur, quàmque pluribus notis genuinam Dioscoridis Oenanthem referre etiam adhuc asserit. In Compend. p. 545. ait. Si Oenanthæ huic caules inessent crassi, assererem profectò legitimam esse Oenanthem. Matthiolo autem non bene notam plantam esse, cujus figuram ponit, satis constat ex eo, quod non describit: si quis etiam consideret quibus rationibus motus Matthiolus, neget Filipendulam esse Oenanthem, iidem & hanc rejiciet: ubi enim folia Pastinacæ & semen Atriplicis.

De Bulbocastano (ita namque in append. horti, & de hort. ubi & Bunium Dodonzi nominat) Gesnerus Guilandino planè subscribit. In eo enim quod dubitavit an Mamiras Pauli fortè esset, planè ipsi satisfactum est, & plantas diversas esse agnoscit, & asserit à Guilandino veram lectionem Tralliani, & rem ipsam quoque demonstratam assentitur: sed quæ de facultatibus scribit Guill. non satis assequitur: siquidem Trallianus non quibusvis purulentis usum commendat.

Dod. gall. *Bulbocastanum* dicitur, latine Bunium. perhibet autem quibusdam Aton, Actine, Anemosphoron, Galeno etiam Arctium, in Zelandia Eleyndnoos re dici, & Neotericis, non sine tamen ingenti errore Apion, aliis Bulbinam, quibusdam etiam Meum. Idem de Florib. c. 53. Bulbocastanum aliud (sc. ab Ornithogalo Ruellij, quod Bulbocastanum quoddam esse credit) quod Tralliani Bulbocastano, live *apocynas* similem scribit, nuncupat. Lat. in fol. pingit Bulbocastani nomine, dicens: *Bulbocastanum* meminit Alex. Trallianus l. 7. inter ea, quæ purulentis utilia sunt, cibaria ipsum referens, &c. Bulbocastanum autem à formâ bulbi, & sapore Castanæ nomen invenit suum. Nostrâ ætate plerique *apocynas* nuncupant. Zelandi Eleyndnoos / Germ. Klein Erdmuss / Sabaudi Faverottes, Angli Bippernutz.

Lob. in Adv. p. 325. de Bulbocastano inquit. Verisio Pliniana imitatione oppido tuberosâ illius fortè Commentatori [Matth.] aut ejus Theseo Tridantino, adegitque ut Aristolochiæ rotundæ & adultæ perquam similem facie radicem adstruxerit: quæ ab Oenanthem tantum distat, quàm Bunium vel Bulbocastanum Tralliani à Filipendula, quod plebecula Gallica, Germanica, & Anglica eum monuisset. Illam enim Angli. Bippernutz vocant, quod opilionum Nucem sonat, quia illis cibo cedit. In Observ.

p. 429. inscribitur ab ipso Nucula terrestris, Apios Turneri Angli, an Bunium Dioscoridis: & Bulbocastanon Tralliani: perperam Oenanthem Matthiolo. In Icon. p. 745. Nucula terrestris Septentrionalium.

Lugd. tres historias & figuras unius plantæ habet. Prima figura est p. 773. hoc titulo: Bulbocastanon mas Dalechampij. Altera p. 774. hoc. Bulbocastanon grandius, Bunium Dodonzi. Tertia p. 782. pro Oenanthem 1. Matthioli. Nos ex tribus Dalechampij descriptionibus, adscribemus eam, quæ est. Bulbocastani maris Dalechampij, quod frater Bauhin. separat à Bunio Dodonzi, malè nostro iudicio. Eas habet. In pratis udis & riguis nascitur, radice bulbo-

Guiland. c. 7. G. J. n. v. m. Matth.

Oenanthem non sine gravi errore.

Matth. re. dargunur.

Bulbocastanum Gesn.

Bunium, Dod.

Apion, Bulbina, & Meum non sine errore.

Bulbocastanum unde dictum.

Matth. opilio refutatur à Lobelio.

Nux opilionum.

Matth. Nucula terrestris. Lugd. repetitio Gana.

C. Ramb. error.

bulbosâ nodis extuberatè, extrinsecus in nigro rufescente, intrinsecus candidâ, gustu Castaneæ. Prælongum quoddam & gracile veluti filum ex se mittit, sæpius intortum, paulatim crassescens in caulis origine: caulis cubito major est, rotundus, in quo folia pauca, Fœniculo similia, veluti & caulis ex articulis prodeuntia. umbella in summo candida. semen oblongum, capite gemino conspicuum, subacre. Dodonæo est Bunium Dioscoridis lib. purg. Bulbocastanum. Lob. Nucula terrestris, perperam Oenanthe Matthiolo: Bulbocastanum mas Tralliani. Lon. vocat Flein Erdrnuß / facitque speciem Ornithogali. Camer. h. nominat Bulbocastanum Tralliani, Oenanthe Matthioli, Erdfesten / Schâfernuß / Geranium i. Dioscoridis Cæsalpini. Tradit is & alterum Bulbocastanum maioribus foliis & bulbis, in tractu Rhenano frequens, quod quidam cum præcedenti Bunium Dioscoridis esse putarunt. Apud Matth. in hist. ger. Oenanthe Matthioli, vulgo Bunium & Bulbocastanum Tralliani. In epit. Oenanthe, Bulbocastanum Tralliani.

Tab. Bulbocastanum, Erdfestianien / Sew = Castanien. Bulbocastani altera icon, quam Turnerus communicavit nomine Apios, quâmq, depingendam curaverat ex veteri libro, & postea mutatâ sententiâ vocavit Bulbocastanum, cum quo convenit, si folia non essent ita crassâ. Herbarij vocant Castaneam terræ & Castaneam porcinam.

Bauh. phyt. Bulbocastanum majus folio Apij: Bunium Dod. Nucula terrestris Septentrionalium Lob. Item Bulbocastanum alterum folio Fœniculi, Bulbocastanum mas Tralliani, Lugd. Idem apud Matth. Bulbocastanum folio Apij, Oenanthe i. Matthioli, Panacæolus Cæsalpini. Quomodo autem Bulbocastanum possit esse Panacæolus Cæsalpini non videmus: huic enim folia Geranij, aut Anemonis: flores purpurei, quæ non competunt Bulbocastano: præterea non diversum, sed idem planè credimus Bulbocastanum mas Tralliani & Bunium Dodonæi. Ipse adhuc notat in animadv. in Lug. Bulbocastanum mas Tralliani Lugd. & Oenanthe Matthioli eandem esse plantas, sed illius figuram meliorem.

Dissipatis tenebris veritas tandem illuxit C. Bauh. in pin. Bulbocastanum i. majus folio apij (inquit) est Oenanthe i. Matth. Cast. Lugd. Bunium, Dod. gall. Lac. Gesn. h. Apios, Turn. Bulbocastanum, Gesn. h. Dod. Cast. Tab. Ger. grandius, Lugd. Bulbocast. mas Tralliani, Eid. Lugd. Nucula terrestris Septentrionalium, Lob. Panacæolus vulgo, Cæf. Eid. B. Bulbocastanum 2. minus; Ornithogali species, Lon. Bulbocast. alterum, Cam. Hoc ratione loci, foliorum incisuris variat: quod ex Anglia, ex Pyrenæis, & monte Calcaris habemus.

Bulbocastani Dodonæi nomine accepi semina & bulbos missos ex Champagnole Burgundiæ ab insigni pharmacopœo Toffano Carolo, qui plantati in horto E. Coptimè proveniêre, & semine deciduo se multiplicavêre, mense Martio producentes folia, ac flores Iunio; semen maturantes Iulio. Arva & pingua umbrosa amat, in Holandia & Anglia, teste Lobelio, plurima, præsertim ad pagum Clession prope Brisforam. Multis in locis Angliæ provenit, copiosissimè verò in Northumbria, Turnero id perhibente. Camerario copiosè crescit in monte S. Petri dicto prope Salinas Saxonicas. In editis Arvernorum montibus copiosissimè. Plurimum provenit ex semine per maturitatem sponte deciduo, quo tempore commodè seminatur. Vere ineunte terræ mandatum ægerimè pronalcitur, & interdum integro anni spatio delitescit, nec nisi altero demum prodit: radix diu vivit, nec semine maturi scente cassâ redditur. Tabern. in multis Germaniæ locis provenit in agnis frumentaceis, & vineis potissimum in Palati-

natu prope urbem Odenheim & locis vicinis: delectatur terrâ firmâ, præterea pingui

Bulbocastani radix, referente Dodonæo ex Tralliano, moderatè calida est & sicca, simul & adstrigens: semen verò calidius & siccus. editur illa cruda, sed suavis cocta, sanguinem spuentibus & mingentibus itilis. semen aperiendi vi præditum & drupæ esse videtur. Radices Lonicæ tradit dulces & gratas esse, ac propterea eas effodere pueros, coquere cum aqua & sale, & comedere, quosdam etiam crudas. Dioscoridis verba (de purgatione sursum & deorsum) scrupulum Turnero injecerunt, ut dubitaret, utrum suum Erdfhruit (i.e. Bulbocastanum) esset Apios, annon: cum multi totam (Bulbocastani) radicem comedant, imò interdum quinque aut sex radices, nullo vel vomitu, vel alvi solutione subsequente. Vtrum autem Erdfhruit (i.e. Apios) eas habeat facultates in Græcia; hic [in Angliâ] autem minimè, certò non affirmat. Id tamen conjecturâ commodi consequi posse ait, ut minore labore Apyon verum cognoscatur, si in id fortè incidatur. Hortatur tandem studiosos ut periculum faciant, an suum Erdfhruit (Bulbocastanum) alibi fortè in Angliâ, quàm ubi ipse fuerit, facultates eas habeat, quas illi tribuerit Dioscorides. Quod si non inveniant, discant ex hoc Erdfhruit / in indagandis plantis, non temerè de plantis pronuntiare ex forma sola externa, verum etiam ex viribus & facultatibus. Et hæc est de Bulbocastani viribus opinio & mens Turneri, cui si nota fuisset Apios vera Dioscoridis, non quæreret vim purgatricem in Nucula terrestris. Radix Bulbocastanei (inquit Tab.) excorticata cum modico pipere in jure carniū cocta, suavis admodum cibus est, multum nutrens & Venerem stimulat. Eadem in cibo usurpata, aut etiam medicamentis addita, cruenta mingentibus & etiam spuentibus auxiliatur. Convenit etiam purulenta excreantibus, id Tralliano testante. Hæc denique sues (cujus avidæ sunt) impinguntur, unde & Castaneæ suillæ nuncupantur.

VISNAGA. CAP. XX.

ICON I.



Scirce cubitalis Desf.

Scirciter est plâta, radice raris adnatis fissâ hærens, caule Anethi, striato, glabro, geniculato: folio Pastinacæ erraticæ, lavi, portionibus divisionis majoribus; umbellæ florum candent, tandemque in se contrahuntur, veluti caverna, mediam palationum sepimentò effingente: pediculi autem umbellæ, potissimum externi, palmo longiores, rigidi, durique sunt: singulique tam hi quàm

interni novam pedicellorum frequentium umbellam in summo gerunt. porro tam umbellæ singulares, quàm compositæ tota, subiecta habent adbasium foliola: semen parvum, Apij officinarum, acre.

Nostræ icones sunt ex Guarinianis, quarum secunda est apud Fuchium pro Sesele Massiliensi.

Gingidium Non desunt autem qui velint *Visnagam*, vel ipsi-
negamus sum legimum esse *Gingidium*, in qua sententia sunt
cura. Dod. *Dod.* & *Anguillara*, vel ejus alterum genus. Sed nobis
Ang. & *Castori* cum *Matthiolo*, non arridet eorum opinio. Sed nec ipsi *Matthiolo* & *Castori* subscribere
Nec est Pa- *possi* nus, potius esse existimantibus majorem *Pastinacam* silve-
stinacam silv. *stinacam* silvestrem. Sunt præterea qui *Gingidium*
Matthioli *Scandicem* esse putant. Sed erronea est eorum opinio.

Seseli Massiliense, Fuch.

Icon II.



Eid. & Danci tertium genus

Gingidium Ang.

Seseli Massiliensis titulo secundam hanc nostram iconem pingit *Fuchs* in hist. cap. 303. Verum descriptio non convenit figuræ, & multa nomina, quæ alterius sunt plantæ. Merito propterea mutavit sententiam in Iconibus, ubi *Danci* tertium genus facit, das drit ges schlecht deß *Danc* gulneßte.

Gingidium adhuc notum in Syria est, inquit *Anguill.* epist. 7. ubi eo vescuntur. Huic vires à *Dioscoride* ascriptæ conveniunt; vocatur *Visnaga* & *Busnaga*: pingitur

Fuch. conf. à *Fuchsio*, modò pro *Seseli Massiliensi*, modò pro *Dauco*: sed neutri descriptioni convenit. *Dioscorides* ex *Cratæa* corrigendus: amari est saporis, ut vult *Gingidium* esse *Galenus*.

Lepidion Syria, Dod. *Gingidij* & *Visnagæ* titulo plantam nostram pingit *Dodonæus* gallicus, vocarique ait in Syria *Lepidion*: ab aliis etiam teste *Dioscoride*, præsertim à Romanis *Bisacutum*: in Hispania verò *Visnagam*: incognitam officinistam Germaniæ, quàm Galliæ.

Synon. Lat. in sol. vocat *Gingidium* alterum. *Castor* p. 477. *Visnagam*, & *Pastinacam* silvestrem majorē. *Matth.* in post. comm. cum mag. fig. lat. l. 2. c. 131. Ital. c. 126. *Visnagam*, ut etiam in epit. & in hist. germ. cum addit.

Busnaga. Cam. ubi dicitur vocari quibusdam *Bisnagam* & *Basniaginem*. Tab. *Gingidium* 3. & *Bisnagam*, *Syrisc* *Börffel* *fraut* / *Zanscher* *fraut*. Idem apud *VVir-*
Cerastium Hispan. *lung*, *Gingidium* verum, Hispanorum *Visnagam*, & herbariorum *Cerastium* Hispanicum. *Cordus* in *Diosc.* *Gingidion*. In hist. *Gingidium*, *Syriacum* olus.

Bauh. apud *Matth.* phyt. & pin. *Gingidium* 2. sive umbellâ oblongâ: *Visnaga*, *Matth.* *Lob.* *Lugd.* *Gingidium*, *Ang.* *Cord.* in *Diosc.* & hist. *Dod.* *gall.* *Clus.* hist. cui & *Bisnaga*. *Seseli Massiliense*, *Fuch.* *Dod.* *gall.* Cumini sativi alterum genus, *Cæf.* *Gingidium* hispanicum, *Ger.* *Hort.* *Patavin.* *Busnagam*, aut *Visnagam* di *Soria*.

Lugd. 2 fig. *Lugd.* duas figuras habet unius plantæ: uni titulus p. 10. *Visnaga*, *Gingidium* *Matthioli* alteri p. 11. *Visnaga*, *Gingidium* *Dodonæi*. Sufficiebat prima icon, nullam enim inter utramque differentiam ostendit.

Matth. not. *Matthiolum* notat *Lobelius*, quodd *Visnagam* sibi peregrinam videri scribat, siquidem ipse multis Italici locis & Aquitanici viderit, & æquè bene possit congruere descriptioni *Gingidij*, atque ceterarum: quod de umbella nulla mentio in *Dioscoride* habeatur. In Obs. p. 419. in Icon. p. 726. vocat *Visnagam* & *Gingidium* *Anguillaræ*.

Satis ostendunt *Tragus* & *Lonic.* *Visnagam* non sibi notam fuisse. *Tragus* siquidem eam pro *Seseli*, *Lonic.* verò pro *Seseli Massiliensi* pingit, ac cum *Silere montano* præterea uterque confundit.

Visnaga annua planta *Montbelgardi* in horto *E. Calata* facile sæpius provenit, florens *Auguston-*
Tempus. ter alios semen misit nomine *Visnagæ* *Tossanus Carolus*. *Lugduni* & *Genevæ* copiosam habebam in hortis, turgentem sennine in Autumno, quo tempore perire solebat. Frater misit pro *Gingidio* *Dioscoridis*; *Bernh. Paludanus* verò nomine *Scandicis*, & *Gingidij* *Ægyptij*, cujus umbella & pediculi firmiores erant & majores, quàm in hortis nostris provenientis.

Pastinaca *Caribæa* *Matth.* *Dentiscab-* *pium.* *Pastinacam* viribus referre contendit *Matthiolum*, cujus rei, qui volet, periculum facere poterit. *Pediculi* pro *dentiscalpiis* multis in usum veniunt, præsertim verò Hispanis, ob suaveolentiam. *Cæterum*, vires *Gingidij* huic tam verè conveniunt, quàm verè *Gingidium* esse diximus.

DAUCVS CAMPESTRIS FOLIIS

Fœniculi, clausâ umbellâ.

Herbalæto Solo & in agrorum limitibus ubique frequens in Æstate: caule cubitali, crasso: frequentibus foliis, capillaribus, ut *Fœniculi*, crassioribus: umbellas fert latas, tres aut quatuor, initio convexas, capitulorum modo herbaceas, quibus postea flosculi insunt candidi: accedente autem ad perfectionem semine, concavæ redduntur, reflexis ad medium corymbis, ut in *Staphylino*, & tandem clausæ vasculum efformant, in quo multa semina continentur parva, in rotunditate oblonga, sapore acri & amaro: radix alba est, acris & odorata, sed lignosa.

Cæf. l. 7. cap. 18. vocat *Daucum campestre*, herbam quam modò descripsit, facitque *Dioscoridis* tertium *Danci* genus, & *Daucum foliis* *Coriandri* *Plinij*. Is nisi *Visnagam* tradidisset, eodem lib. cap. 14. existimarem ab eo hoc loco per *Daucum campestre* *Visnagam* describi.

DE SESELI MASSILIENSI, ÆTHIO- PICO, & PElOPONEsiACO, veterum sententiarum.

C A P. XXI.

Seseli Massiliensis *Dioscorides* assignat folia *Fœniculi* simili, sed crassiora: caulem etiam luculentiorē, & umbellam *Anetho* similem, in qua semen oblongū, angulosum, & statim ut editur acre esse dicit. Radicem longā & odoratam. Vim habere semen & radicē caletiacendi. In potu urinae stillicidium & erectæ cervicis spirationem sanare. Prodesse etiam ad uteri stragulationes, & ad morbum comitalem. Ducere quoque menses & sætus, & ad omnes internas affectiones facere, & tussis veteres sanare. Semen cum vino potum concoctionem adjuvare, & tormina solvere. Et epialis febribus commodum esse. Et ad frigora itinerum cum *Pipere* & vino bibi. Dari etiam capris & reliquis pecoribus in potu, ad partus facilitatem. At quod *Æthiopicum* *Seseli* appellatur, folia habere *Hederæ* similia, sed minora & oblonga, ad *Periclymeni* foliorum modum. Fruticem esse magnum, sarmenta ad duos cubitos extendentem, in quibus rami sunt duorum palmorum & capitula velut *Anethi*. Semen autem nigrum, densum, velut *Triticum*, acrius & odoratius, quàm *Massiliense*, vehementer jucundum. Quod verò in *Pe-*
Peioponese. *loponese* nascitur, folia habere *Cicutæ* similia, sed latiora

latiora & crassiora: caulem majorem quam Massiliense, Ferulæ figurâ. Et in hujus summo umbellam, in qua semen est latius & odoratum & carnosius. Vini habere eandem. Nasci in locis asperis & humidis, ac editioribus. Item in Ida.

Tordylon Tria hæc Sefelis genera à Dioscoride proposita, Plinius, ut etiam testatus est Cornarius, non habet, sed l. 20. c. 22. inquit. Adjicitur Tordylon. Est autem id semen ex Sefeli. Aliàs Sili vocare solet ac dicere

Sili pro Sefeli pro Sefeli, ut l. 24. c. 19. Tordylon alij semen Silis esse dixerunt, alij herbam per se, quam & Syreon vocaverunt. Neque aliud de ea proditum invenio, quam in montibus nasci. Et l. 22. c. 22. Elaphoboscum ferulaceum est, geniculatum, digiti crassitudine, semine in corymbis dependentibus Silis effigie. Et l. 14. c. 26. de Spondylis. Semen eodem nomine Silis speciem habet. Et l. 27. c. 7. de Absinthio agens, cum Sili inquit, & Nardo gallico, aceti exiguo addito, fastidia absterget, concoctiones adjuvat. Sefelim tamen appellat lib. 8. c. 32. de cervis loquens, semine ante partum purgantur herbâ quadam, quæ Sefelis dicitur, faciliore ita utentes utero. A partu duas habent herbas, quæ Aros & Sefelis appellantur. Et l. 25. c. 8. simplicius cervæ monstrare Elaphoboscum, de qua diximus. Idem Sefeli enixæ a partu.

Sefeli Aristoteli Hoc autem apud Aristotelem hist. animal. l. 9. in hunc modum legitur. Ferarum quadrupedum, cervæ maximè prudentiâ præstare videtur, quia cum peperit circa semitas, involucrum primum exedit, mox Sefelim herbam petit, quam cum ederet, redit ad prolem.

Gal temp. ramentum Galenus Sefelis radicem & semen ex calefacientibus esse ait, in tantum ut medicamentum sit, quod multam urinam cieat. Esse item partium tenuium, ut & ad morbum comitialem, & erectæ cervicis spirationem conveniat.

Sefeli varia appellatio Sefeli Massiliense, sunt qui Spagnon, qui Platycymion, i. e. latum Cyminum vocent. Æthiopicum verò Ægyptij Cyonophrice appellat, ut inter nothas Dioscoridis appellationes videre licet. Sefeli autem in genere, ut Gesn. in ascript. Dioscoridis perhibet, Ægyptij Caucalin vocant. Novisse Sefeli officinas, sed corrupto ex Sili nomine, Siler appellare, & montanum in super dicere, ut sit ab aquatico differentia, quod molle Virgilius dixerit, tradit Cornarius. Sed non demonstrat quam plantam intelligat. Nec est generum aliqua ipsi distinctio. Cum tamen Sefeleos nomine plures & diversæ proponantur plantæ, ut ex sequentibus fiet manifestum.

Sefeli Massiliense nomen Pro Sefeli Massiliensi legitimo exhibet Matthiolum plantam, quam Sefeli Massiliense folio aliquatenus Visnagæ, mox inscripturi sumus.

Visnaga Fuchsius Sefeleos Massiliensis picturâ Visnagam in hist. c. 303. expressit.

Sefeli montanum autem Clusii Sefeli montanum angustifolium 3. Clusio, Massiliensis Sefeli picturam apud Matthiolum (inquit ille) aliquantulum refert.

Libanotis cachryophora Quidam Sefeli Massiliense statuerunt (& sanè facultates respondere ait Lob. in Obs.) Libanotim cachryophoron.

Sefeli Siler Sefeli Massiliensis descriptionem à Dioscoride traditam Clusio plurimum accedere videtur ad Fœniculum tortuosum.

Panax Asclepias Panax Asclepias in Candia & vulgo in Creta Sefeli cognominatur.

Peucedanum Sefeli loco, quasi eadem esset planta Peucedanum, Peucedani semen substituit Dispens. Florent.

Ad Carvi Ad Sefeli posse referri Cyminum equinum (quod Carvi foliam magnam credimus) existimat Tragus.

Meum vulgare Meum vulgare, Sefeli, & quidem Creticum, à quàm plurimis cognominatur.

Siler montanum Siler montanum, Sefeleos Massiliensis cognomen sibi quoque vendicat.

Sefeli pratenfe Monspeliū, quod quidam Morpeliensium olim Sefeli Massiliense Dioscoridis putabant (teste Lob. in Adv.) an est Silaum?

Habet Sefeli quoddam, quod palustre appellavit, Camerarius de hortis.

Cognovimus autem hodie Sefeli Æthiopicum verum fruticosum, Periclymeni folio.

Et hinc fallitur Rauvolfius, qui pro Sefeli Æthiopico obtrudit Ligusticum folio Aquilegiæ.

Inquit C. Bauh. an Sefeli montanum 1. Clusij, non sit idem cum Ligustico altero Belgarum Lobelij in Obs. p. 457. Sed dubium hoc tollit seminis descriptio, quæ plurimum ab ejus delineatione differt.

Pro Sefeli Æthiopico Fuchsius in Icon. exhibet Libanotim Theoph. Dodonzi, Sefeli Æthiopicum Matthioli radice albâ.

Libanotis altera quorundam, sive Cervaria nigra, pingitur à quibusdam pro Sefeli Peloponensi.

Libanotidi 2. quorundam sive Cervariæ nigre, affinis, Valde bona flore pallido, est Sefeli montanum Clusio secundum sive latifolium.

Sefeleos Peloponensis picturam ponit Matthiolum suo more sine descriptione, non convenit tamen multorum judicio cum descriptione Diosc.

Quod Turnerus parâ Sefeli Peloponensis, quidam verò Petroselinum seu Apium montanum opinati sunt, nos Oreoselinum suspicamur.

Thapsia quorundam à nobis appellata, est multis Sefeli Peloponense.

Clusium mirari subit esse qui suæ Thapsiæ [latifolia] iconem ad Sefeli Peloponensis historiam, accommodare non sunt veriti, cum tamen facultates planè sint dissimiles.

Myrrhidem Anguillara, nullis, aut paucis adstantibus notis Sefeli Peloponense existimat.

Cicutaria, seu Cicutaria Myrrhis, quam Cordus olim Myrrhidem silvestrem nuncupavit, à multis credebatur esse Sefeli Peloponensi.

Camerarius horti nominat Daucum quandam, vulgari congenerem, quem Sefeleos Peloponensis nomine ex Italia sibi missum ait, semine perquam aromatico, foliis pulchrè virentibus nudissimis. Hæc quænam sit adhuc nobis non constat.

Sefeleos sed Cretici cognomen tribuitur Caulididi majori semine hirsuto.

Sefeli Cretici loco Dodonæus Caulididem Belonij, seu Caulididem nostram minorem pulchro semine exhibet, quod non probat Gesnerus.

Sefeli Massiliense ait Ruell. lib. 3. c. 42. esse Saxifragiam majorem officinarum & herbariorum, qui sanè pro suo more non descripsit eam ex autopsia: sed repetit Sefeleos descriptionem aliis verbis.

Quod Hippocrates tribit libro de fistulis, Sefeli radicem fistulis impositam earum callos eximere, id Paulus Spondylii radice tribuit.

Sefeli Creticum Dioscoridis verum dicitur Trag. Pimpinella lib. 1. c. 156. de sua Pimpinella tertia, quam l. 2. c. 120. rursus pro Sefeli tertio commemorat.

Sefeli Æthiopicum Dioscoridis dicitur quibusdam, teste C. Bauhino, de Perfoliata.

Filipendula (inquit Dorst.) est Sefeli Græcorum Laur. Phrisio. cum vinibus bene convenit, quamvis forma discrepet.

Sefeli tandem Cyprion in ascript. Diosc. (notante hoc Gesnero) legitur de Ricino.

SESELI MASSILIENSE NVPERORUM folio aliquatenus simili Visnagæ.

EX Italix orto Patavino attulit frater Casparus Deser. plantam folio dodrantali circiter longitudine & latitudine, tenuiter dissecto, cæturis Visnagæ utrunque latior-

An Silaum?

Sefeli palm. sive Cam.

Sefeli Æthiopicum

Æthiopicum

Sefeli montanum 1. Clusij

Libanotis

Libanotis

Libanotis altera.

Libanotidi 2. quorundam

affinis.

Sefeli Peloponensis

An Oreoselinum?

Thapsia

Thapsia latifolia.

Myrrhidem

Cicutaria.

Daucum

quidam

vulgari congener.

mer quid?

Caulididi

major semine hirsuto.

Caulididem

minor pulchro semine

Saxifragia


major.

Perfoliata.

Filipendula.

Ricino.

*Panacis A-
sclepiadis
Guillandi-
ni folio.*



*Trag. Sefeli
cum Visnaga
confundit.*

*Sefeli Mas-
siliense,
Matth.*

*Siler mon-
tanum.*

*Matth. ob-
servum.*

*Reprehen-
ditur a Lob.
Matth.*

*An Sefeli
Massiliense
Eob. obs.*

*Lob. redar-
gatur.*

lacionibus : affine
hujus folium cum
ejus plantæ foliis,
quam Panacis A-
sclepiadis Guillan-
dini nomine de-
scripsimus : tam fe-
lix nondum fui, ut
florentem obser-
vare potuerim aut
semen ferentem,
licet diversis in lo-
cis eam offende-
rim. semen Came-
rarius sic describit,
longius & latius
est quam Fœnici-
culum, odoris vehe-
mentis.

Tragus l. 2. c. 120.
Sefeli titulo pro-
ponit picturam si-

ne descriptione, quæ Visnagam exprimit. putabat
fortè semen Sileris montani in ea planta proveni-
re. Verùm non videtur ei cognita nec Visnaga,
nec Sileris montani planta, quas mirè inter se con-
fundit.

Sefeli hoc Massiliense ait Matthiolus Græcis *σίσελι*, Arabibus *Sesali*, Barbaris *Sisileos* dici : officinas
verò Siler montanum appellare : Germanos *ge-
meinen Sefel* & *Welsch Steinbrech* / Gallos *Ser-
montain* nominare. Legitimum autem esse Sefeli
Massiliense, & in omnibus ferè Tridentinis monti-
bus legi. Sed maximè advertendum esse, quod
quamquam in quibusdam Italiæ pharmacopolis ve-
rum sit reperiri Sefeli, in quàm plurimis tamen aliud
vendi, &c. Idem in post. comm. cum mag. fig. lat. l. 3.
c. 33. Ital. c. 58. Item in hist. germ. & epit. cum addit.
Camer. ait Sefeli hoc Massiliense, live Siler monta-
num provenire in Apuliæ Gargano, adferri tamen
semen in Germaniam abundare circa Massiliam. Sed
quis obsecro intelligit Matthiolum, quem non pu-
to ritè cognovisse quid scriberet, nec quid esset Si-
ler montanum officinarum. quam præterea plan-
tam pingat. asserere non auiam, quia non describit:
potest quoque ejus icon Visnagæ competere, licet
respondeat Sefeli Massiliensi multis vocato, potissi-
mum priorum comm. figura, quæ raelius posterio-
rum placet. Et hinc meritò reprehendunt quoque
Adversaria Lobelij Matthiolum, dicuntque titulo
de Sefeli Massiliensi folio Fœniculi crassioris [*de Fœ-
niculo tortuoso*] hallucinantis commentatoris Tri-
dentinum Sefeli neutiquam genuinum esse posse:
quid verò sit, cum ille describere non ausus sit, ipsis
ignorandum. Illud tamen asserendum, se in Triden-
tinis Alpibus hanc plantam uspiam vidisse, ac ne in
Baldo quidem monte, longè illis feracior.

An Lob. Obs. p. 457. Sefeli Massiliense Adv. p. 352.
Ferulæ aut Dauci Cretici facie, majoribus, crassiori-
bus, lationibus, latiusque sparsis Fœniculi foliis: cau-
le bicubitali & proceriore : semine in umbellis Mei,
compressis, Anethi carnosiore, gustu Sefeli Æthio-
pici, aut Peloponensis, valdè aromatico: Icon. p. 785.
Sefeli Massiliense nuperorum. Mirari subit hoc in
loco Lobelium, cur inter Ferulam & Daucum Cre-
ticum cum Sefeli hoc comparationem instituat, in-
ter quæ tamen videtur satis magna differentia. Si
Lobeleandem nobiscum intelligit plantam prætu-
lerim Lobelij figuræ eam, quam Matthiolus habet
in penultimis comment. quamvis aliquo modo re-
præsentet Visnagam. Cur ad Adversaria Lobelius
hanc referat, me latet. siquidem ejus non memine-
runt, nisi quatenus Matthiolum reprehendunt.

Dodonæus Sefeli Massiliense cum diversis plan-
tis confundit. Sefeli Massiliense, inquit in hist. gall.
(ubi figura Matthioli) appellata græcè *σίσελι* massi-
λιανική, latinè nonnullis latum Cuminum, i. e. græcè
κuminum, gallicè *Cumin large*. Offic. Siler mon-
tanum, ger. *Waldr Bümel*. Idem in fol. lat. ait, quod
σίσελι massιλιανική, Latini Sefeli Massiliense quoque
nominant, à natali loco cognomen accepit. à non-
nullis *σπίζον* dicitur. Recentiorum quidam Fœni-
culum tortuosum vocant. Vides Dodonæi chaos.
Quam porro in hist. gall. figuram exhibuit, in fol. lat.
tanquam falsam & imaginariam omittit.

Tab. Icon. p. 104. Sefeli Massilioticum; Siler mon-
tanum. hist. p. 178. Sefeli Massilioticum 1. *Marsili-
schen Sefel* / *Rosß Bümmel*. Item Icon. p. 105. hist.
p. 178. Sefelios Massiliensis icon verior. *Marsili-
schen Sefels* ein bessere Figur / *zummet*. Figuræ am-
bæ vix discrepant. nec video cur una verior, altera
dici possit. Adde & tertiam figuram his similem
Icon. p. 107. hist. 34. Libanotis, Rosmarinum herba-
ceum, Rosmarin Braut / *Weyrauchwurz*. An verò
hæc icon ex Matthiolo sit Libanotidis cachryophori,
anceps hæreo.

Bauh. phyt. Sefeli 6. live Massiliense Ferulæ facie,
Massiliense Lob. & Matthioli. Apud Matth. Sefeli 1.
Massiliense. Sunt, inquit ibidem, qui velint Mat-
thioli figuram Siler montanum officinarum expri-
mere, quibus non assentior. Notat frater Lugdu-
nensem quoddam Sefeli nullam addiderit descri-
ptionem, sed immeritò. Nā si Matthiolus posuisset
descriptionem, posita fuisset etiam à Lugd. carpen-
dus igitur potius Matthiolus, & ejus patrocinator,
qui etiam omisit. Eid. B. pin. Sefeli 8. Massiliense se-
culæ folio : Sefeli Massiliense, Lac. Gef. h. Lon. Cast.
& Lugd. Siler montanum offic. Ger.

Montbelgardi, Heidelbergæ, & Lutetiz in hortis
observavi.

SESELI MONTANVM ANGVSTI- folium 3. Clusi j, folio Sefeli Massilien- sis Matthioli, semine An- gelicæ.

Multæ sunt foliorum alæ Sefeli montano 3. Clu-
si j, Fœniculi foliorum instar in multa folia te-
nuia, illis tamen crassiora, & breviora divilæ, virides
admodum, mucrone omnium foliorum candicante
& duro, calidi gustus: inter quas enascuntur cubita-
les caules aut ampliores, digitalis crassitudinis, striati,
geniculati, in aliquot ramos secti, quos secundum
nodos alia minores amplectuntur foliorum alæ:
flores in extremo caule & summis ramis in umbel-
las distributi nascuntur albi: deinde semina gemina
conjunctim, ut in omnibus umbelliferis, striata, An-
gelicæ semini non disparia, gustu fervido: radix mul-
tis crassis & oblongis fibris latè & obliquè sparsis
constat, quæ singulis annis summo capite novas
propagines ad latera facit.

Clusius descriptionis autor vocat in pann. p. 691. *Synon.*
Sefeli 3. live montanum angustifolium. In hist. Se-
feli montanum 3. Ait autem hoc Massiliensis Sefeli
picturam apud Matthiolum aliquantulum referre,
ac nonnullos fortasse alteram Libanotidem Diosco-
ridis fructiferam potius esse contendere, à qua sanè
ipsi non multum differre videtur. Nullum porro
vulgare nomen apud earum provinciarum rusticos,
in quibus Sefeli hoc observabat Clusius, quod e-
quidem sciat, obtinuit.

C. Bauh. phyt. Sefeli 8. (10. pin.) montanum Fœni-
culi folio.

Nascitur in plerisque Austriæ inferioris & Sintiæ
montanis pratis, Iulio florens.

DE PEUCEDANO VETERVM
sententiz. CAP. XXII.

Disco. Peucedanum, inquit Dioscorides, caulem pro-
fert tenuem [*πενος, vet. hoc vocabulo caret*] graci-
lem, Fœniculo similem: comam verò habet circa ra-
dicem, copiosam ac densam: florem luteum [*μῆλον, vet. μῆλον*] radicem nigram, gravi odore, crassam, li-
quoris plenam. Gignitur in montibus opacis. Exci-
piendi liquoris ratio hæc est: Tenuis radix cultello
conciditur, statimque qui profluit è plaga liquor in
umbra reponitur. Sub sole siquidem canescit eva-
nescit. Verùm inter colligendum capitis dolorem
veruginemq; inducit, nisi quis prius nares rosaceo
peruxerit, eodémque caput irrigaverit. Quæ verò
radix liquorem fuderit, deinceps inutilis evadit [*ἐ-
πὶ τοῦ αἵματος, ἐπὶ τοῦ αἵματος, Corn. Lac. Sarrac. & vulg.*] Sed & è
caulibus, uti è radice & liquor & succus elicitur,
haud secus ac è Mandragora. At succus liquore in-
efficacior est [*ἡ πῶς ὁ σπέρμας ὁ πῶς χαλκός, ut Gal. & Se-
rapio: pro quo ὁ χαλκός ὁ πῶς, vet. cod. lat.*] ocyûsque ex-
pirat. Interdum etiã prius concreta reperitur la-
chryma, Thuris similitudine, caulibus, radicibusque
adherens. Porro præfertur liquor [*ex succo qui radice
incisâ manas, præstat Corn.*] qui è Sardinia [*ἐσθλὴν, vi-
detur cum Theophr. & Plinio legendum Apia-Sia, Corn.*]
& Samothracia petitur, odore gravi, fulvus, servens
que gustu. Ex aceto & rosaceo illitus prodest lethar-
gias, phreniticis, vertiginosis, comitialibus, diutur-
no capitis dolore vexatis, paralyticis, ischiadicis &
convulsis. Ac in universum omnibus nervorum vi-
tiis, ex oleo & aceto convenienter illinitur. Datur &
olfactandus in strangulatu vulvæ, pariterque pro-
fundiore somno sopitos excitat. Suffitu quoque ser-
pentes fugat. Quin & aurium dolori cum rosaceo,
utiliter instillatur, & ad mitigandum dentium dolo-
rem earum cavernis inditur. Sed & contra tiffim ef-
ficaciter ex ovo assumitur, itémque spirandi difficul-
tatibus, torminibus, inflationibusque subvenit, ven-
trem leniter emollit, lierem absumit, ac difficiles
partus egregiè adjuvat. Facit & potus ad vesicæ re-
nûmque cruciatus ac distentiones, vulvâque aper-
it. Radix ad eadẽm utilis est, at inefficior: e jus verò
decoctum bibitur. Arida quoque trita fordida pur-
gat ulcera, ossium squamas extrahit, veteraque ulce-
ra ad cicatricem perducit. In cerata denique & ma-
lagmata calfacientia additur. Radicem eligito re-
centem, minimè cariosam, solidam & odoris ple-
nam. Cæterùm, succus ad potiones amaris Amy-
gdalis, aut Rutâ, aut pane calido, aut Anetho resol-
vitur. Sunt autem, qui inter nothas appellationes
Dioscoridis, Sisonem agrestem, & qui Agnophyl-
lon vocent. Magi Bonum Dæmonem, Romani Pi-
nastellum, siue Satariam herbam dicunt.

Theophr. In Arcadia nascitur Peucedanum, inquit Theo-
phrastus: Radix durat [*ustilis est Cæsalp.*] quinque aut
sex annis: vim calefactoriam habet: quamobrem
quidam ex ea unguentum sudatorium faciunt: da-
tur & ad lienes: semen inutile est, nec succus ulla in
re prodest. An verò hoc dixerit Theophrastus, quia
facilè expiret & evanescat, ut Dioscorides testatur,
quærit Cæsalpinus. Cum & lachryma ob id infir-
mior succo habeatur ab eodem.

**Plin. de la-
ti.** Plin. l. 25. c. 9. Sed inter primas celebratur Peuce-
danum, laudatissimum in Arcadia, mox Samothra-
ce. Caulis est ei tenuis, longus, Fœniculo similis,
juxta terram foliosus, radice nigra, crassa, gravi odo-
re, succosa. Gignitur in montibus opacis. Foditur e-
xitu Autumni. Placent tererrimæ & alussimæ radi-
ces. Hæ conciduntur in quaternos digitos ossis
cultellis, funduntque succum in umbra, capite prius
& naribus rosaceo perunctis, ne vertigo sentiat.

Et alius succus invenitur caulibus hærens, incisusq; succi delo-
manat. Probatum crassitudine melleâ, colore ruffo, am.
odore suaviter gravi, servens gustu. Et hic in usu &
radix: & decoctum ejus plurimis medicamentis.
Succo tamen efficacissimo, qui resolvitur amaris Amy-
gdalis, aut Rutâ, bibiturque contra serpentes, &
ex oleo perunctos tuetur. Plura vide infra.

Fecit Pinus, ut Marcell. Virgil. annotat, quæ Græ-
cis πένος dicitur, Peucedano nomen: non congener
congeneri, aut similis simili planta, sed speciosa &
procera arbor parem folio tantum sibi humiliorem
fruticem, ut inter homines quotidie fit solâ ejus
partis similitudine in genus & nomen suum sibi a-
doptavit. Quod posteriores intelligentes Latini Pi-
nastellum eam vocaverunt. Cujus vocis auctor A-
puleius est. Sic enim emendanda est vox, quæ cor-
ruptè in impresso codice Pinaßgellum legitur. Idem
quod in Dioscoride simpliciter Agrion nominatur, præ.
ab eo Sison agrion dicitur: quasi ex similitudine
Peucedanus hæc Sison etiam diceretur, sed silve-
stre. Marcello videtur abs re non fore, si quis suspi-
cetur deesse voci illi Agrion, qui silvestre significat.
Marathrum: ut quoniam similes illi caules & capil-
lata folia haberet, silvestre Marathrum diceretur.
Quemadmodum quod sequitur Agriophyllum, a-
greste Fœniculum potuisse quondam legi. Suspicio-
nes tamen hæc sunt, neciple aliquid mutare ausus
fuit, præterquam ex Apuleio agrion, i.e. agrestem Si-
sonem vocari Peucedanum, inter alia dicens. Quæ
non tam à Peuce arbore dici in græcis potuit, quàm
ab amaritudine, quæ in eadem gente illâ voce indi-
catur. Et hinc fortè ait Phavorinus, Peucedanum a-
marum. Peucedanus adurens, calidus. vocat verò
hunc (sc. Homerus) Bellum, à πένος, Picea ad ustio-
nem apta. Moris autem est Homero, Bellum igni
comparare, eò quod pugnantium sanguis in peri-
cardio ignescat, incendaturque.

Peucedani nomen subsequenter attribuitur
plantis, sed à diversis scriptoribus.

Peucedano, Tragi (sc. Fuchij), Matthioli & alio-
rum, ut mox videre licet. Item Peucedano majori
Italico Lobelij.

Panacem Asclepiadem in Sicilia Peucedanum
vocari prodit Camerarius.

Peucedanum Pannonicum Clusij in hist. lib. 6.
cap. 17. suspicamur esse plantam, quam vocamus
Daucum glauco folio, similem Fœniculo tortuoso.

Quod Hier. Brunschweig apud Tragum l. 1. c. 148.
Peucedanum appellat, est nobis Meum vulgare.

Lonic. l. 5. cap. 32. ponit pro Peucedano figuram
plantæ, quæ ut dicemus non est Peucedanum, & in
Botanico Francosford. p. 40. dicitur Hippomara-
thrum. Est autem nobis Silaum quorundam. De his
præsentis libro.

Peucedanum aquaticum Tabernomontani, in-
scriptum Millefolium, siue Myriophyllum mara-
throphyllum palustre. De hoc lib. 38.

Peucedani semen sunt qui volunt dici silvestre
Levistici genus [*Phelandrum in Dod. nat. de quo hoc lib.*]
Sed nemini obcurum est (inquit Trag. l. 1. c. 141.) a-
liam esse & peculiorem plantam Peucedanum.

Libanotidem alteram Dodonæ, ait Matthiolus
in post. comm. It. l. 1. c. 15, contra ejus mentem in sua
hist. germanica errore typographi pro Peucedani
securâ specie esse exhibitam.

Peucedanum de Angelica silvestri dici legimus
apud Adamum à Bodenstein in Onom. Parac.

Quæ sit Romanæ illa prima species Anguillatæ,
quam ait in epist. 12. Herbarios Peucedanum & O-
popanacum vocare, nos latet.

Euch. Roßlin capiti de Peucedano ineptè jungit
Eberwurtz [*quæ v. x. sonat Chamaeleonem album*] & pro
eo iconem ponit Cardui acaulis.

Peuce-


Radices
quatuor
sive
f. l. v.

Peucedani loco sumi obscuras radices conquiritur Matthiolus in proœmio in Diosc.
Peucedanum, vocatur Cucumis silvestris (de qua diximus l. 16.) in aliopt. Diosc. autore Gesnero.

PEUCEDANVM.

PEUCEDANUM MINUS
germanicum.

Poser.



PEUCEDANUM MAIUS
Italicum.



Peucedani
genera duo.
Tragus

Tragus l. 2. c. 221. Peucedani duo assignat genera. Primum tradit radice prælongâ, & altè in terram demissâ, succosâ & amarâ, supra terram barbâ, seu comam canam setis porci similem obtinente: caule terete, foliis fœniculaceis, aut pincis potiùs (cum Pino enim plus similitudinis, quàm cum Fœniculo habent, vel Tragi iudicio) vestito: flore in mucillis luteo. Alterum illius genus, quod ad Rhenum in arena tenuissima reperit, foliis angustissimis, veluti Cuminum equinum. Existimat autem Tragus l. 1. c. 147. Peucedanum à Theophr. l. 9. c. 15. tradi pro Pastinaca in Achaja sive Patensi agro, radice nigra. At quandoquidem Theophr. l. 9. c. 15. & 21. ubi Pastinacæ nigrae meminit, Peucedanum etiam ibi tradit, non existimo ego eum eandem plantam nîdem locis diversimode nominasse.

Non est
Pastinaca
nigra
Theophr.
conferat
gu. 10.

Peucedano radix ex deciduis foliis comosa, crassa, altè depacta, cortice nigro obducta, substantiâ virefcete, succum, si vulneretur, remittens fulvum, odore piceo, viroso. caulis cubitum unum, aut alterum etiam altus, in aliquot ramos brachiatus, striatus; umbellæ insigniter latæ, tâta luxurie, ut interdum minutiores earum partes sobolem pariant, Anethi umbellæ parem: in quibus floſculi reflexis foliis flavescentibus constât, ita mutantibus longiusculis apices flori concolores sustinentibus. semen foliaceum Angelicæ. folia ampla trifariam dividuntur, singulâq; eorum segmenta trifariam deinceps dissecantur, divisionum partibus Linariæ folio latitudine & longitudine fere paribus. semen gemellum, foliaceum Angelicæ, longius, quam latius, itris exterioris quaternis ferè, interioris binis donatum, sapore acti & subamaro.

Apollinarem lib. 2. fol. 147. facile crediderim per *Harstrang.* *Harstrang* intelligere Peucedanum: verùm quid ineptâ figurâ indicet, planè ignoro.

Lugd. p. 46. tres proponit icones: Peucedanum *Lugd. 3 fig.* Matthioli. Item Peucedanum Dodonæi. Et Peucedanum majus Italicum Lobelij. At Peucedanum Matthioli & Italicum Lobelij idem sunt, teste C. Bauhino, at hujus *[italus]* figura melior.

Peucedanum nostrum prius, est Peucedanum *Trag. Synon. 14* gi, Fuchij, Corn. & Tab. qui & Caudam porcineam vocat. Peucedanum Argentoræ, radice ad duos aut tres cubitos longâ (ut se audivisse narrat) succi seu potiùs liquoris plenâ, sulphur olente, foliis oblongis, ternis ferè, Gesneri h. quod vulgè Fœniculum *Fœniculum* agreste *[wilden Fenchel]* vocari tradit. Eid. coll. *agreste.* Peucedanum Fuchij. Peucedanum Lob. in Obs. p. 451. quod in adv. p. 350. & Icon. p. 781. Fœniculum *Fœn porcinum* porcineum præterea nominat. Bauh. phyt. & pin. *num.* Peucedanum 2. Germanicum: Peucedanum, Trag. Fuch. Dod. Cord. in Diosc. & hist. Gesl. Turn. Lob. Lond. Lugd. Ger. & Tab. Is in figura Lobelij & Dodonæi in fol. radice comosâ requiri scripsit. Eid. apud Matth. Peucedanum Germanicum angustioribus foliis.

Posterior, Peucedanum Matth. in Diosc. hist. germ. & epit. cum addit. Cam. Item Ang. epist. 12. qui recordatur hoc usos fuisse olim Patavij, pro Silere montano & pro Sefeli. Peucedanum majus Italicum Lob. Icon. p. 782. Obs. p. 454. ubi Narbonensi quadruplo majus omni sui parte esse tradit. Peucedanum Italicum, Groſſer Sœwſenſchel Tab. Peucedanum 1. sive majus Italicum, Bauh. phyt. & pin. Peucedanum, Matth. Ang. Lac. Lugd. Cæſ. & Caſt. Peucedanum Italicum, Tab. Peucedanum majus Italicum, Lob. & Lugd. majus Ger. Peucedanum foliis longioribus, Dod. Eid. apud Matth. Peuced. Ital. majus, latioribus foliis. Libanotis nigra, Cæſ. *Libanotis nigra.* pin. l. 7. c. 8. Libanotidem nigram, Cæſ. (quæ nobis Peucedanum est) Bauhinus eandem facit in pin. cum sua Libanotide 3. fœniculi folio, semine foliaceo, quod idem statuit esse cum Rosmarino altero ferulaceo Lob. observ. p. 455. & Paracealepio, Ang. & Cam. itemque Libanotide 2. Dod. & Tab. quam nos Libanotidem quorundam flore luteo, semine ferulaceo interbimus.

Id est arvensis, & dicitur dicitur Grecis, & ut apud *Nomina* Dioscoridem Tragus legi testatur) *ἐγερν, ἐγερν* *or Synon.* *arvensis* Arab. *Harbatum.* Germani Peucedano varias tribuunt appellationes. Alij namque à coma, quæ supra radicem cernitur, *Harstrang*/quâ appellatione pilorum restis significatur, alij à foliis & facultatibus *Sœwſenſchel* / h. e. Fœniculum porcineum, vel tuarium; alij à croceo illo succo, vel à sulphureo radice odore (quod tamen Gesnerus improbat, *Sœwſenſchel*/quasi sulphuream radicem vocant. Belgæ *Leſſens Venſchel.* Galli *Peucedane.* Ital. *Peucedano.* Hisp. *ervadun y Fenchu de porco.* Angl. *Harſtrange.* Bohemi *Geleſq forſen.*

Nominatus verò, ceu ante quoque dictum, Peucedanus est à *μοῦν*, quæ Græcis Pinus est, quod folio sit Pinus: quare Apuleius Pinastellum appellavit. Vel à piceo fœtore: nam amarorem horrendum & fœtorem *μοῦν* / vox apud Poëtâs significat. Quod tandem Friſius Peucedanum Fœniculum agreste, Algul, Culaunon, Porcinum, & Herbaturum vocat, oſſet diſtipic (inquit Trag. hist. germ.) se non multum vidisse, sed didicisse à Petro de Crescentiis, quæ Peucedanum nominat.

Peucedanum Tragus in alus, umbrosis & opacis *Lacæ or* silvis, ut est Hercynia, & ea, quam Germani den *Tempus.* *Speſſart.* & quam den *Ydar* nominant, nec non in V Valgoria & monte Tomitru provenire tradit, item in hortis suis magna copiâ. Is radicem effoſſu diſſicnem

cilem ait, ac præterea dum effoditur, gravissimum spirare odorem, ita quidem ut nisi inuictus quis illam aggrediatur, odore suo deliquium animi inducere valeat, qua de causa veteres priusquam illam colligerent, caput & nares rosaceo perfundere solitos fuisse, ne capitis dolor illos premeret & vertiginem sentirent. Autumno mense efficacissimam credi, tum enim temporis non raro radici succum concretum quasi & Thuri penè consimilem adherere deprehendi, quod inde fieri credendum sit, quando per vermes, aut aliud quodvis incommodum radix vulnerata fuerit. Cæterum, liquorem hunc concretum in medicina præstantissimum esse. Quosdam radicem in particulas cultro concindere, alij integram illam in umbra siccare, quam rationem magis probat. Eandem, postquam effusa fuerit, nigram evadere, aliàs albicantem existeret, gustu acrem & amaram, instar penè Gentianæ. Nasu porro Peucedanum, prope urbem Argentinæ in pratis juxta Carthusiam, intellexit Gesnerus, ibidemque florere Augusto. Multum crescere in Italix Hætrusæ æstuosis atque Narbonæ plateosis collibus, præsertim in luci Garamontij aditu, & circum sentes, lumas & dumeta, author est Lobelius; in Ananien-sibus montibus Matthiolus. Clusius propositâ iconè Peucedani in hist. l. 6. c. 17. ait in omnibus, quæ adierit, locis sibi conspectum, nusquam tamen frequentius, quàm in pratis ad Danubium sitis, infra Ratibonam & Straubingam anno 1588. cum adverso flumine veheret Ratibonam. Observavit Turnerus non tantum in umbrosis montibus, ut Erenfelsij in Germania, sed etiam in pratis humidis juxta Vormaciam, aridisque, sed quæ Rhenus inundat aliquando. audit in Anglia quoque reperiri. Et certè non longe Bristolio in Rupe S. Vincentij radicem ejus invenit, squallidiorem germanicâ. Accepit ego Peucedanum à D. Schvartz, qui me monente collegit Tubingæ, ubi observaveram 27. annos ante, quod plantavi Montbelgardi in horto E. C. Stutgardix sponte provenit, florens sibi Julio & Augusto. Brisacæ radices maximas, nec ante tales vilas, cubito longiores, crassitudinis carpi commutavit Rhizotomus, qui affirmabat se collegisse in Marchionatu Badenensi in prato sicco, non longe à Baden versus Rhenu. Superius autem appendices quædam palmaris crassitudinis erant, ex quibus folia & caules.

Vires Peucedani veterum quasdam ante recitavimus, quasdam verò nunc adscribemus. Peucedani radice, inquit Galenus, quidem maximè, sed tamen etiam succo & liquore utimur. Sunt autem omnia hæc ejusdem speciei facultatis: sed valentior succus, admodum excalfaciens, discutiens & digerens. Quare affectibus omnibus circa nervos consistentibus convenire creditur, tum morbis in pulmone, thoracæque ex crassitudine atque viscositate humorum factis. Et intro quidem in corpus sumpta, sed tamen etiam olfactu profunt. Porro quod incidat atque extenuet, sæpè etiam dentium perforatorum dolores cavitati impositus protinus sedavit, quia videlicet est tenuium partiū & excalfactorius. Quinetiam lienes induratos juvat, nempe incidendo, digerendo, & extenuando crassos humores. Sed & radice adhæc uti licebit, quæ & squamas ab ossibus celerrimè detrahit, quia videlicet validè desiccatur (radix, dicebat alibi, calefacit secundo ordine completo, siccat tertij initio) minùs tamen, quàm succus excalfaciens. Et ulceribus malignis anda illa optimum est remedium: nupsa enim expurgat, carnem generat, & ad cicatricem perducit. Ex Plinio superioribus sequentia debentur. Idem [succus amarus Amygdalæ aut Rutæ resolutus] pectoris doloribus subvenit. Pituitam & bilem detrahit Peucedani radix. Eadem decocta leni & renibus prodest. Perungunt & Tom. III.

radicem sudoris causâ eliciendi, quoniam caustica vis ei est. Peucedano ad recentia vulnera tanta vis est, ut saniem ossibus extrahat. Cum semine Cupressi bibitur, si sanguis per os redditus est, fluitque ab infernis. Strangulatus vulvæ nidore usum recreat, laxanturq; suffocationes eo: sed quidam adhaescent in vino semen Cupressi contritum. Potum cum coagulo vituli marini æquis portionibus comitiales sanat. Succus infantium tramicis, & umbilicis eminentibus inungitur. Stranguriæ cum melle medetur. Item semine lethargici excitantur, & ut perhibent ex Ephorbio naribus tactis Peucedani succo. Ex quibus ita dictis Galeni, Plinij & Dioscoridis patet Peucedani radicem herbamve vi purgandi donatam fuisse, sed propter scetorem utriusq; in usum deducta. Peucedani radicem viscosos & lentos humores, nec non bilem educendi facultate pollere veteres prodidere, inquit Tragus. Quamobrem radix quidem Peucedani, vel vino decoqui, & bibi, vel in pulverem redigi & assumi potest, hoc enim pacto thoracis vitia purgat, lentos & frigidos extrahit à pulmone humores. Eadem succis in pulverem quoque redacta & usurpata est, imprimis verò tussim veteratæ, à frigore ortum trahenti utilissimus est. Succus melli mixtus, ac intro sumptus, stranguriæ prodest, serpentium quoque eâ ratione veneno adversari dicitur. Quisquis ergo ab his sibi timet, oleo cui succus Peucedani mixtus fuerit, corpus perugat, quod si fecerit ab injuria serpentium procul dubio tutus erit, nihil enim minùs ferre possunt serpentes, quàm Peucedanon. Radix in pulverem redacta & ex oleo & aceto illita, nervorum viriis unicè prodesse dicitur. Ischiadicis potenter auxiliatur. Qui spasmo continuo vexantur, succo & jus se perungant, & sanabuntur. Succus cum aceto temperatus, auribusque instillatus, dolores illorum mitigat. Succo naribus obiecto, aut pulvere indito, non tantum lethargici, sed & vulvæ strangulatus respirant. Radix & lachryma ejus recentibus vulneribus sanant dis experimento singulari conducunt, ita quidem ut vel ex ossibus purulenta extrahant. Radicis pulvis inspersus fordida ulcera purgat, & vetera cicatrice obducit. Hæc juvamenta à Trago ascripta, à veterum facultatibus, non nisi utendi modo aliquantulum evariare deprehenduntur.

PEUCEDANVM SICILIAE, FOLIIS hirsutis, floribus luteis.

Peucedanum in Sicilia nascitur, unde translatum ad nos (inquit Cælius) semen, quod plantam produxit aspectu similem Panaci Asclepio, & supra dictæ Ferulaginis [Libanotidis quorundam, sive Ferulaginis, foliis Faniculi, floribus luteis] longioribus tamen foliis, erectis, hirsutis, pediculis densis, ac brevibus eorum capillamentis: caulem tenuem ac lævem fert, cubitalem: flores luteos: semina oblonga, striata, in foliaceam latitudinem desinentia, sapore resinaceo: radix Pastinacæ figurâ, sed cortice atro: madet succo multo, qui concrevit in lachrymam, Thuri similem, non solum colore, sed & odore: at sapor acris & amarus est. in totum videretur Panax Asclepium Dioscoridis, nisi constaret grandioribus foliis, erectisque: caulem gignit, cum folia dimiserit, prope finem Æstatis: perficit adventante Hieme. Et hæc Celsipinus, qui tandem concludit esse Peucedanum veterum.

LIBANOTIDES VETERIBVS. CAP. XXIII.

Avthore Theophr. l. 9. c. 12. Libanotidum [Rosmarini Gazæ, sed multi] altera infusigilata est, altera

fructifera. Et altera etiam semine, & folio utilis est: altera solum radice. Vocatur autem semen Canchrys [καρχύς]. Habet fructifera folium simile Apio palustre [απιοῦ ἡλικίου] sed multo majus: caulem cubiti magnitudine, aut majorem: radicem magnam & crassam, albam, velut Thus olentem: semen album, asperum, oblongum. Nasitur maximè ubi squalidi ac petrosi sunt loci. Velis est radix ad ulcera, & ad menses ducendos pota in vino austro nigro. Semen ad urinae stillicidia, & ad aures, & argema, & lippitudines facit, & ut lac mulieribus inducat. At infrugifera folium habet simile Lactucae amaræ [σπυδιῶν τῆς ἀμαρῆς] sed asperius & candidius: radicem autem brevem. Nasitur ubi Erica [legendum enim ἔριχνη, & non ἔριχνη, ut prædicto loco Gaza vertit, Corn.] plurima. Potest purgare radix sursum & deorsum. Quod enim ad germen est, sursum purgat: quod ad terram, deorsum. Prohibet etiam vermes vestibus imposita. Colligitur circa Tritici messem.

Duplicem quoque Libanotidem tradit Dioscorides his verbis. Libanotis duplex est. Altera fructifera, ab aliquibus Zea, aut Campsanema vocata, cujus fructus Canchrys nominatur: folia habet Fœniculo similia, sed crassiora, & latiora ad rotæ formam, per terram strata, odorata: caulem cubitalem, & majorem, multas alas habentem, & in summo umbellam, in qua semen multum, album, Spondylion simile, rotundum, angulosum, acre, resnam redolens, dum manditur gustum adurens. Radix est alba, admodum magna, Thus redolens. Est & altera hujus species, prædictæ per omnia similis, quæ semen fert latum, nigrum, Spondylion simile, odoratum, non fervidum: radicem foris nigram, diffractam albam. Quæ verò infrugifera dicitur, per omnia prædictis similis, neque caulem profert, neque florem, neque semen. Nasitur autem in petrosis & asperis locis. Omnium in communi herba trita imposita, hæmorrhoidas sistit, & inflammationes sedis lenit, & condylomata ac strumas & abscessus egrè ad maturationem pervenientes, maturos efficit. At radices aridæ cum melle ulcerare purgant, & tormina sanant, & commotis à bestis venenatis commodant, cum vino potè. Menses item ducunt & urinas. Discutiunt & tumores veteres impositæ in cataplasmate. Succus autem tum radici, tum herbæ, visum acuit, si melle ammixto illinatur. Semen potum eadem facit. Auxiliatur & comitialibus, & antiquis in thorace affectionibus. Regio item morbo, si cum pipere & vino detur. Provocat etiam sudores, si cum oleo illinatur. Confert & ruptis, convulsis, podagricisque, tritum impositum cum liliacea farina & aceto. Vitilignes quoque deterit ammixtum acerrimo aceto. Semine in potionibus utendum est ejus Libanotidis, quæ non fert canchrys. Acre enim illud est, & arteriam exasperat. Theophrastus tradit cum Erica nasci Libanotidem, Lactucae silvestris amaræ similia folia habentem, candidiora tamen ac asperiora; radicem autem brevem. Et potam hanc sursum ac deorsum purgare.

At verò canchrys vim habet calefacientem & valde resiccantem. Unde in sinigmatum commodè miscetur. Et ad fluxione laborantes oculos capiti inspergitur, & post triduum defricatur. Hæc est Dioscorides. Eum autem non intelligimus, quid velit, cum ait, hæmorrhoidas sistere Libanotidem, si intelligit fluxorem sanguinis, quandoquidem Libanotides insigniter calidæ: inflammationes sedis lenire per acciden concedimus, si junctus fuerit œdematosis, vel flatulentis tumor.

Libanotis odorem Thuris reddit, inquit Plin. l. 19. c. 12. Et inde ei nomen ductum esse, evidens est. Libanotis enim græcè Thus est. Et subdit mox. Libanotis

locis putridis, & macris ac rosâdis feritur semine. Radicem habet Olusatri, nihil à thure differentem. Vfus ejus post annum stomacho saluberrimus. Quidam eam nomine alio Rosmarinum appellant. Et rursus l. 24. c. 11. Est & Rosmarinum, duo ejus genera. Alterum sterile. Alterum, cui caulis & semen resinaeum, quod canchrys vocatur, foliis odor Thuris. Et mox. Canchrys multa genera habet, ut diximus. Sed hæc quæ ex rore supradicto nascitur, si fricetur, resinosa est. Atque ita reddit vocem *πρωϊζου* apud Dioscoridem. Sed Cornarius de odore accipiendam putat. Dalechampius ipse hunc locum hæc sequentia annotavit. Libanotis Dioscoridi quadruplex: prima folio Fœniculi, semine, quod Cachryn vocant, & radice candidis: secunda folio similis, semine & radice nigris: tertia folio similis sed absque caule, flore, semine, & quarta Theophrasti folio Lactucae. Præter has Libanotis est coronaria, sive Rosmarinus [de quo H. n. g. l. 13.] quam Plinius confundit cum superioribus. Theophrastus duo tantum genera statuit, fructiferam, folio Heleioselini, semine & radice candidis: & sterilem folio Lactucae.

Gal. l. 7. simpl. Libanotides tres sunt, una sterilis, Libanotis duæ fructum ferentes: omnes verò ejusdem facultatis, emollientis & digerentis. Succus tû radici, tum herbæ, melli mistus obtusam oculorum aciem ab humorum crassitudine curat. Porro ejus Libanotidis, quæ ad coronas est utilis, quam Romani Rosmarinum nuncupant, decoctum regio morbo laborantes potum adjuvat. Omnes enim Libanotides abstergentis & incidentis facultatis participes sunt.

Commentarium Marcelli, ad faciliorem hujus capituli intelligentiam, auctorisque collationem, multum proderit, quod propterea dignum judicavimus, ut subscribamus. Libanotida, inquit, Romani Libanotida etiam dicunt. Duum generum Libanotis est: Fœcunda, fructumque ferens alia: Quæ secundâ divisione duo item genera facit. Eam sc. quæ Zea aut Campsanema vocatur, cujus fructus Canchrys dicitur, &c. Alteram dictæ similem, semine lato, nigro, odorato, &c. Quæ autem ex prima divisione sterilis & sine fructu Libanotis dicitur, est antedictis tota similis. Plures autem quondam non Dioscoridi tantum: sed cæteris Græcorum Herbariis & Medicis omnibus Libanotides fuerunt. ut eodem Thuris cognomine omnes: sic non eodem ejus odore insignes. Vna enim quæ Canchrys fert, primò & per se, quod radix ejus Thus olet, ab eo indicari merita est. Cæteræ autem congeneres, aut aliquâ parte illi similes, in censum & nomen ejus venerunt. Satisque earum certâ divisione hic usus posteriores Græcorum Medicos & Herbarios alios subscribentes sibi habuit. Siquidem omnes, exceptâ Coronariâ, quælibet ab ipsis describitur, tria ejus genera fecerunt, secundam, fructumque ferentem, & hanc duplicem: tum sterilem numerantes. Peregrinas ut ego credo Italiæ plantas, & quarum omnis miscetur historia, si Theophrastus audiatur, præsertimque in foliorum figurâ, quæ palustri Apio in primo genere; in sterili verò amaræ Lactucae similia ille facit. Cum Dioscorides Fœniculo comparet, & crassiora tantum latioraque esse dicat. Quæ una foliorum forma coronariam Libanotidem cognomen ille fecit. Alioquin nulla erat ex similitudine causa. Cur quondam Libanotis & nuntiosâ Græciâ Dendrolibanon, Coronaria Libanotis diceretur: nihil enim simile communè illi aliud habet. Quod facile ex historia earum intelligat aliquis, tota & undique diversa. Siquidem coronaria Libanotis, sive Rosmarinus, frutex magis quam herba ramos habet: hæc caulem, & quæ fructum inter has, ferunt umbellam etiam. Illa à terra erigitur: hæc per terram folia spargunt. Et ne longior sim,

Rosmarinum.
Genera 2.

Libanotis
quadruplex
Diosc. Dal.

Plin. lapsus.

Libanotis
triplex Gal.
lib.

Marcelli.

Duum generum
Libanotis
1. Fœcunda
2. Sterilis

2. Sterilis

Fœcunda
Libanotis
dum h. n.
via miscetur.

Hæc Libanotis
coronaria
nihil communè habet.

plu-

Canchrys
Apio palustre
Diosc. similis
folium
Zea.
Vires.

Libanotis
infrugifera
folio Lactucae
amarae.

Diosc.
Zea, Campsanema.
Plin. nomen.
Campsanema
folio.

Spondylii
semine.

Libanotis
altera.

Libanotis
infrugifera

Vires in
genere.
Hæmorrhoidas.

Diosc. n.

Libanotis
nomen inde
deducitur.
Plin.

plures habent hæc notas, quibus ab illa (coronaria) separantur. Quin etiam in foliis prius hoc genus suas habet itidem differentias. Quo autem maxime differunt, Cenchry est, quod in secundo utroque hoc genere in summo caule simile arborum cenchry surgit, in quo concipitur & maturatur semen. Quæ una nota à coronaria Libanotide reliquum orane hoc genus præcipue separat. Nec Nicander atheram signat in Theriac. *ἡ ἄρα καὶ χυμώτατος ἵστος ἐστὶν αὐτῆς πρὸς τὸν βῆλον*, q.e. Summo & calidam radicem, cenchry hoc ferentem: Libanotidis secundum illud genus significans. Rursusque *ἀμύρα καὶ χυμώτατος ἵστος ἐστὶν αὐτῆς πρὸς τὸν βῆλον*, q.e. Simul cum Libanotide cenchry ferente. Vnà autem hæc notā præcipue discernebatur Libanotis, quod in medicina cenchryos hujus, i.e. seminis, tantum usus esset. Eamque ob causam seorsum à reliqua planta Ægineta de eo egit, fructum seu semen Libanotidis vocans: virisque illi exteriendi, discutendi, & calefaciendi tribuens. Vfus illo etiam est ex oleo contra febrium perfrictiones, & cum tremore algores. Duplexque illud Libanotidis genus secundum ex cenchry hoc dictum est. Tertium enim, quia eo caret, idèd *ἀναπνῆ*, sterile & sine fructu à Græcis nominatur, prioribus, præterquam in hoc, simile. Quatuor Libanotidum genera his verbis Ægineta itidem numeravit. Libanotides tres: sterilis una: ferentes fructum duæ. dico autem ego fructum, quem græci *καρπὸν*, communi ad fructum & semen significatione. extergendi, discutendi, incidendi, molliendique vires habent. Succus earum hebetibus ex humorum crassitudine oculis ex melle medetur. Coronariæ verò Libanotidis decoctum, &c. Quæ portò de Cenchry, Libanotidis fructu, dicta ab Ægineta sunt, his etiam addere non piget. Ea hujusmodi sunt. Fructus Libanotidis Cenchry est. Habetis repurgandi, discutendi, & calefaciendi vim, idèdque comitialibus subvenit, & suffusus felle cum Pipere, & vino potum. Illinitur idem ruptis, convulsis & podagris utiliter, & ut ait Dioscorides, vulgines ex aceto extertit. Et hæc longius idèd repetita sunt, ut legentes pluribus in unum collatis, veterum ad eandem rem dictis, facilius & aptius de omni Libanotide censere possint. Licet autem testati omnes hæcenus Græci & Latini sint: quia Thus oleat Libanotis, quod Græci Libanon dicunt, sic dictam ab eis fuisse: Apulejus tamen tradit idèd sic vocatam, quod ante cognitum nostro orbi Thus, sustitu & vapore hujus herbæ pro Thure gentes usi sint: quod tamen parum verisimile est, nisi prius Libanotidis nomen fuisse dicamus, & quia Thus illi succellerit, Libanon id homines appellaverint. Plinius multis locis de omnibus his egit, sed tam incerto intellectu, ut non facile sit peregrinas Libanotides has à Coronaria & à Cunila in eo separare, eamque ob causam Marcellus (cujus verba hæcenus recitavimus) cum non allegat. Plinius, inquit C. Bauhinus, l. 19. c. 12. confusè agit de Libanotide, sicut & l. 20. cap. 16. eam cum conyzis miscens.

Præteribit ad venas hæmorrhoidales apertas occludendas, stringendasque Libanotidem Fel. Platerus. Sed quam stirpem intelligat, se non explicat. Novimus nos sanè ultra 27. plantas, Libanotides dici. Ex quibus quæ eligenda sit juveni practico, ab ipso scire optaremus. Nos quod attinet nullam stirpem ex iis, quas Libanotides denominari posthac ostendimus, novimus, quæ emplastica naturam, aut adstringentem habeat, quæ utilis esse queat, nimum fluentibus hæmorrhoidibus: licet Dioscorides quoque eam tribuat Libanotidi facultatem.

Quænam igitur ex dicendis, quæ diverſi admodum generis sunt, plantis, quæ Libanotidis appell.

Tom. III.

lationem sortita sunt, Dioscoridis & Theophrasti Libanotides sint, sicuti perdidit ele est.

Prima dicendarum occurrit Libanotis Matthioli & ejus sequacium flore albo.

Libanotidi secundæ similis, siye Panax Asclepium Matthioli.

Libanotidis nomine mihi sæpius missum semen longum & latum, foliaceum, Thapsiæ, quam glaucam voco, vel Ferulæ simile, cujus plantam, quæ in horto E.C. nobis provenit, Libanotidem quorundam flore luteo vocamus.

Quæ à Cæsalpino ad Ferulaginem refertur, & à quibusdam pro Meu falsò accipitur, ab aliis verò inter Libanotides reponitur, à nobis Libanotis quibusdam, siye Ferulago foliis Fœniculi, floribus luteis nuncupatur.

Libanotis nigra, Libanotidis fertilis alterum genus, vulgò accipitur pro Peucedano.

Cachryn veriore, Libanotim Galeni Lobelij, appellamus Libanotidem cachryophoron semine anguloso.

Seseli montanum angustifolium Clusij, flore albo, nonnulli alteram Libanotidem Dioscoridis fructiferam esse contendunt, à qua non multum differre existimat Clusius.

Siler Creticum quibusdam à nobis dictum, Libanotidem Theophrasti appellat Bellus.

Libanotidis nomen à quibusdam Thapsiæ glauca adscribitur.

Quam Herbarij Libanotidem minorem vocant, nos Daucum glauco folio conjectamus.

Libanotidis Dioscoridis primum genus Dodonæo, est nobis Meum vulgare.

Libanotis Theophrasti Dodonæi, siye Seseli Æthiopicum Matthioli.

Libanotis 4. siye latifolia, Aquilegiæ formâ C. Bauhini, inscribitur à nobis Ligusticum Rauvolfij, folio Aquilegiæ.

Libanotis altera Dodonæi, siye Daucus secundus Matthioli, & Tragi.

Libanotis alba minor, seu amara Thalij, an Apium montanum nigrum?

Libanotidis Theophrasti species minor nobis & Lobelio.

Libanotis in Mithridatio Cleopatri non significat Rosmarinum, sed, teste Cordo, Angelicam filvestrem minorem.

Libanotidi Theophrasti majori, siye Ligustico 2. Matthioli hunc titulum secimus: Ligusticum quorundam foliis Angelicæ.

Ligusticum vulgare Guiland. in Theone Theophrasti Libanotim esse retur.

Rosmarinus est Libanotis coronaria Dioscoridis, de qua H.n.g.lib. 13.

Libanotim primam Dioscoridis, Tragus existimat suam Spicam, quam quidam Spicam Nardi vocant, nos Pseudonardum appellamus.

Libanotidis species Rondeletio, est Tragoriganum nothum Dalechampio.

Libanotis dicitur Coniza minor Dioscoridi, ut legimus apud Tragam l. l. c. 54. Sed Plinius quoque Libanotidem cum Conyzis miscet.

An Conyzam majorem Matthioli intelligit Cæsalp. l. 12. c. 32. dum ait. Quæ vulgò Incensaria vocatur, hanc pro Bacchari quidam ostendunt: alij Libanotidem sterilem apud Theophr. esse censent. nec abhorret radicis odor.

Herbariorum Septentrionalium notior Libanotis Lobelij, an Daucio glauco folio fortè similis Libanotis Septentrionalium.

Plantam quandam Ligustico majori, quam eundem præ Libanotide Theophrasti ostendunt, Cæsalp. autè potius inter ejusdem Theophr. genera Panacis

D 2

recensendam æstimat, Ligusticum majus, sive Imperatoriam majorem flore luteo pronunciamus.

Libanotis
Sterilis
Theophr.
Saj. quat

Ut ingenuè dicamus, nescimus quam plantam intelligat Cæll. l. i. c. 4. dicens. Theophrastus sterilem Libanotem describit folio Lactucæ amaræ. eandem ex Theophrasto tradit Dioscorides. Puto Rosmarinum silvestrem intelligi. Comparatio cum foliis Lactucæ amaræ quadrare possit cum silv. Rosmarino, tum coronario, si per Lactucam amaram intelligamus Tithymalum.

LIBANOTIS MATTHIOLI, ET ejus sequacium flore albo.

Libanotis
Sterilis

Primum ac summum Libanotis sive Rosmarini genus, quod mas appellat, sub duplici diffrentia representatum à Dioscoride, aliquoties se vidisse Venetus scribit Matthiolus in horto Maphæi Medici, nullis sanè differentibus nous. Eandem nasci refert quoque in monte Gargano & agro Gortienfi. Figura autem, quæ est apud Matthiolum in comm. impressis Venetus apud Valgrisiolum anno 1559. ejusmodi est, ut mihi videatur vix posse dici, cujus plantæ sit, præsertim quia non describit. In post. comm. Ital & lat. cum mag. fig. itémq; hist. germ. figuræ appinxit semina, sed ea non manifestè demonstrat, ita ut qualia sint, non constet. Cam. in hist. germ. & ep. figuram mutavit, & semina Libanotidis Cachryophoræ appinxit, quem si sequamur, ut & C. Bauhinum, erit Libanotis Matthioli, Cachrys vector Lobelij, seu Libanotis cachryophoros. Verùm & hîc dubium est. flos enim Libanotidis cachryophoros est luteus: Matthiolus verò in hist. germ. tribuit ei florem album. In epit. est Dioscoridis descriptio, nullà factâ mentione umbellæ, cum flore albo. Lectores hæc diligentiùs examinent.

Primam hanc Dioscoridis fertilem Libanotidem (si Dis placet) ex Matthiolo pictam dat Lug. p. 764. eamque Libanotidem sive Rosmarinum Matthioli inscribit.

Liban. Ster.
Rosmarin.
Matth.
Lugd.

Tab. dicitur Libanotis, Rosmarinum herbaceum, Rosmarinifraut / Weyrauchwurz / Libanotis prima. Proponit aut Tab. descriptionem ex Dioscoride, additque umbellas pulchras & albas esse. Icon facta est ad figuram Matthioli. subdit se Libanotidem primam observasse in Ducatu Burgundiæ copiosè, non longè à Baurbon, in silva qua itur Ischurtiles. item in monte propè Vesuntium & aliis locis. Non facile nunc est divinare, quam Tab. intelligat plantam: vix credimus Matthioli Gargani Libanotidem in Burgundia ab eo fuisse observatam.

LIBANOTIS CACHRYOPHOROS quibusdam, floribus luteis.

Deser.

Cvbitorum aliquot est altitudine caulis, lævis, cramosus: folia Peucedani foliis similia, strigosa, teneriora; in longa, tenuia, segmenta divisa. umbellæ magnæ florum luteorum: quibus semina succedant semper gemella, magna, ventricosiora unâ parte, oblonga, canaliculata, & per extremum coronata, stilo ex utriusque committiturâ prominente, alba, aromatica, acris, amaricantia.

Deser. Caf.

Lubet subpicere descriptionem ex Cæsalpino. Semen est, inquit, crassum, & rotundum, ac striatum, olivæ cortice candido, quo fracto nucleus intus apparet albicans, multò amplior, quàm in Erichmo, serventi gustu & resinoso: radix unica est, profunda, & candida, acris: folia ab radice non in longitudinem extensa, lateralibus tantùm ramis, ut in Peucedano, & Ferulis, sed in orbem triparuta, assidue,

sessiorem in tenuitate Fœniculo crassiorē, crassa, & prædura, ut integrum folium turbinis figuram referat, in his lachryma cor crescit propè pediculum, ruffa, odoratâque: caulem ipsi videre non licuit, quamvis permultis annis vixerit in horto Pisanò ex semine ex Sicilia allato orta.



Nos Lobelij cachrys nem assumptum, eiq; semen ex sicca plâta appropinquamus. Ei dicitur in Obs. p. 455. Cachrys vector (& hoc titulo est etiam in Icon. p. 83.) Libanotis Galeni, semine terebenti, oblongo, strobilo, sive nucleo Pini subpari, gustu aromatico, acris, resinaceo, caule cubitum & sesquicubitum æquante: foliis Fœniculo crassioribus, pallidè virentibus. Quidam Sc.

verunt. Et sanè facultates respondent, uri & Rosmarino secundo, cujus semen Cachrys dicitur, & appositè substitui possunt. Belgis hortet se. Cæll. 7. c. 7. Libanotis candida, cujus semen Cachrys vocatur. In descriptione Libanotidis fertis Dioscoridis dissonat Spondylii similitudo, nam depressum ejus semen in foliaceam tenuitatem, huic rotundum & plenum, ut Crithmi, & Hippomarathri, quæ Dioscorides Cachryi comparat. An satis est magnitudine Spondylium æmulari? In hac planta dicere possum sterile quoddam reperiri, quod neque caulem, neque florem, neque semen ferat, in cæteris illi simile, quod fertile est, ut tradit Dioscorides, quod & multis aliis contingit, non propter speciei diversitatem, sed affectionem quandam. Sed apud Theophrastum tum sterile, tum fertile aliter describuntur.

An Ang. epist. 12. Rosmarini prima species in Apulia, Peucedano & Oppoparaco vocata, foliis in quibusdam partibus Peucedano similibus, sed rotundis. Optaremus hanc ab Anguill. descriptam, & colorem floris expressum.

Cam. ad hist. Math. germ. Libanotis. In epit. Rosmarinum. Figura alia à Matthiolina. Nam semina particulatim appicta respondent plantæ, de qua hoc capite agimus. non describit plantam, sed tantùm peregrinam dicit, quæ in hortis Germaniæ facta, secundo aut tertio florebat anno, & rarè maturum semen producat. Item hort. Libanotis prior, vel Cachryfera, rotundis foliis orta è semine, cum pleræque alia umbellifera oblongis oriuntur.

Bauh. pin. Libanotis 1. sive Ferulæ folio, semine anguloso, (crasso in phyt.) Libanotis seu Rosmarinum Matth. l. c. 4. p. 436. Lac. & Lug. Rosmarinum 1. Ang. & Cast. Libanotis 1. Dod. vel cachrytera, Cam. Rosmarinum ferulaceum fertile. Diosc. cujus semen Cachrys dicitur. Advers. Cachrys vector, Libanotis Galeni, Lob. Eid. B. apud Matth. Libanotis Ferulæ folio, semine crasso: Libanotis seu Rosmarinum, Matth. Lac. Rosmarinum 1. Cast. Figuram Lobelij frater Matthiolo appingit, ejus omisâ icon. separatim quoque semina addit, quæ mihi dis placent, quàm Camerarij. Ante diximus nos non posse asserere Cachrym Lobelij eandem plantam cum Matthioli Libanotide, quia icon non respondet, nec

nec etiam floris color. Frater præterea putat Libanotum alteram Camerarij, semine lato, nigricante, odorato, esse eandem cum hac præfente. verum ego dubius hæreo, quia Camerarius præfentem alio nomine tradit, ut jam dictum. Lugd. p. 764. dicitur Cachrys verior, Libanotis Galeni.

Libanotum cacyophoron frater C. Bauh. Patavio attulit, ejusque semen mihi communicavit, quod plantavi in horto E. C. Misit etiam sub hoc titulo: Rosmarinus cacyophorus legitimus Imperati. Simile accepi à Calabria missum cum hac inscriptione. An Rosmarinus Theophrasti Candia? D. Cortusus aliquando obtulit, hoc titulo: Basilisco costi chiamato in Paglia. Gener Cherlerus attulit ex Italia nomine Cachrydis. Hanc Libanotidem, ni multum fallimur, alit D. D. Fel. Platerus Basileæ in horto suo à plurimis annis, & erat adhuc anno 1606. mense Junio sed eam nondum florentem vidit. Hanc aliqui sibi persuadent Peucedanum, cum tamen non assit, nec odor, nec sapor scetidus.

LIBERA MAXIMO SEMINE, quibusdam Cachrys Hispanica.

ῥαπυῖς
C. *ῥαπυῖς* recordamur, unde acceperimus Cachrys
paniceæ inter umbelliferas & ferulaceas
maximum semen quod hactenus viderim.
Sunt ungue longius, crassum, duplex, tribus
foliaceis constans, & duabus juxta commissu-
re, album, ad Crithmum non nihil formâ acceden-
te, sed plurimum magnitudine differente, aromati-
ci & grati saporis cū acrimonia & levi amaritudine.
Hoc idem, ni fallor, semen est, quod frater Bauh.
misit cum hac inscriptione: Fœniculi 2. species Dio-
scoridis, præcedenti semine simile, nisi paulò latius,
& paulò brevius esset. Nos de Fœniculo, ejusque
speciebus egimus hoc libro c. 1.

LIBANOTIS QVIBVSDAM, FLORE luteo, semine Ferulæ.

Defr.



Sæpius mihi in
horto montbel-
gardensi E. C. pul-
chrè provenit Li-
banotidis nomine
missa planta, folio
Ferulæ ferè pari,
minutiùs diviso, ri-
gidiore, odoris non
ingrati, pediculis
solidis, minimèque
fungosis nixo, cau-
le procero, ramoso,
striato: flore um-
bellato, luteo, par-
vo: semine raro per
spatiam umbellam
foliaceæ Ferulæ,
longo, duplici, albi-
cante, potissimum
quod foliaceum in
illis est, striato infi-

genter amaro, & veluti resinoso.

Panax A-
sclepias
Camer. h.
Seseli Peu-
cedanum
Panacis Asclepiadis nomine hanc sibi missam ait
Camer. h. folio Ferulæ tenuiore & Fœniculi cras-
siore. Nasit in Creta, ubi Seseli vulgò, & in Si-
cilia, in qua Peucedanum vocari testatur, quàmvis
hæc appellationes propriè alijs plantis conveniant.
Ad hist. Matth. ger. & epit. hujus semen exhibet no-
Tom. 111.

tatum litera C. pro semine Panacis Asclepij, vide-
turque ipsi Panax Asclepium Ferula facie Perax, cui
à Valerando ex Itria delatum scribit.

Bauh. phyt. Libanotis 2. Ferulæ folio, semine la-
to: Panax Asclepias Theophr. & Plini. Eid. apud
Matth. Panaces 1. Asclepium alterum: Libanotis
Ferulæ folio, semine plano. Panax Asclepium. Lob.
Cæs. Panaces Asclepium, Camer. in suo Matthiolo,
Calt. Tab. Panaces Asclepium ut existimatur Dod.
in fol. Libanotis altera semine lato, Cam. Ego Pa-
nax Asclepium Tabern. hic non refero, sed ad Mat-
thioli Panaces Asclepium: Vix etiam puto Libano-
tidem Camer. p. 28. cui semen nigricans: quia p. 116.
Panacem Asclepiadem vocat, ni fallor, de qua hic
agimus. Eid. Bauh. Libanotis 2. ferulæ folio & se-
mine: Panax Asclepium ferulæ facie, Lob. Panaces
Asclepium Dod. Cæl. & Tab. Eid. Bauh. Libanotis 3.
fœniculi folio semine foliaceo: Rosmarinum alte-
rum ferulaceum in Diosc. Lob. obl. Panax asclepium,
Ang. Cam. Libanotis 2. Dod. Tab. Libanotis nigra,
Cæl. Est hæc in bu Peucedanum.

Anguill. epist. 12. de hac ait. In Candia & Sicilia Pa-
nax Asclepium folio semine minoribus, crebriori-
bus, durioribus: caule quatuor cubitorum, flore
luteo, semine compresso, anguloso. simili Ferulæ, al-
bo. apud Dioscoridem malè legitur *μαρὰ* pro *μαρὰ*:
pro *Λαδὴ*, Orbisius legit *Λαδὴ*. vocatur in Can-
dia Seseli, & in Sicilia Peucedano: licet aliud sit Peu-
cedanum.

Lobel. in Adv. & Ic. p. 783. Panax Asclepium Feru-
læ facie nominat, ac dicit. Nec diversi generis est A-
sclepium Panax à Ferula, nec item figurâ ab simile,
præsertim istud doctioribus verum putatum, fortè
quale in Matthiolo pictum vidimus, qui in patris
commentatoris officio functus. Ex Illyrico tamen,
cui Histrix nomen, asportavit Valerandus Insulanus
pharmacopœus plantas, quibus multa cum Pa-
nace affinitas, quas in horto Iouberii sevimus. Et
inter has Ferulæ similis erat effigie, sed multè mi-
nor magnitudine: semine ut Ferulæ lato: folijs &
floribus haud dissimilibus caule & radice magnitu-
dine atque similitudine Anethi odorato. Obl. p. 495.
Panax Asclepium.

Habeo ego à Valerando Dourez plantam nomi-
ne Panacis Asclepij, respondentem picturæ Lobeli.
Est talis eam attulit mihi frater C. Bauh. nomi-
ne Libanotidis primæ. A Rasso olim eadem missa,
ni fallor, Lutetia, pro Libanotide Dioscoridis tertiæ.
Præterea frater attulit plantam ex Italia, quæ multò
melius exprimit Panacem Asclepium Matthioli,
quàm hæc. diversa etiam erat à Matthioli planta,
quam ostendebat Valerandus. diversam quoque
figuram ab illa Matthioli ponit Lobelius.

An Gesn. h. Libanotis quibusdam existimata, Ar-
gentinæ in horto ultra annum 14. vivax. Hæc Feru-
lane sit, aut Libanotis, aut ejus species inquirendum
proponit. Is Libanotidem potiùs, quàm Ferulam
esse putat. Item hort. Libanotis primæ Dioscoridis,
quàm Ferulaceam cognominat, quamque etiam
quoddam in Italia Ferulam credere audit. In appen-
hort. Libanotis Volmario. De coll. stirp. Libanoti-
dis species ex Italia floribus luteis, Libanotidis feru-
laceæ genus.

An Cæs. l. 7. c. 4. Panax Asclepium folijs subcan-
didis, floribus luteis: seminibus raris in umbella,
Thapsiæ albæ similibus, candidis & striatis, radice
albâ, crassâ admodum, sed brevi. Theophrastus de
hoc genere Panacis tradit, folio esse simili Thapsiæ,
sed crassiore. Plinius eadem ferè refert, radicem scil.
multi succi & salis, ex qua succus extrahitur Opopa-
nax. hanc sententiam sequutus videtur M. suec. Dio-
scorides tamen ex alio genere Panacis scil. Hercu-
leo, haberi Opopanacem testatur.

*Panaces A.
sclepium,
Dod.*

Dod. gall. & in fol. lat. Panaces Asclepium ut existimatur, Dioscoridis, cui folia assignat minora, quam Fœniculi, hirsutiora, & odorata, flores auricolores, odoratos, aliàs *sclepium*: Theophrastus folio Thapix esse dicit, sed crassiore: incognitum istud est: Matthiolus iconem exhibet, sed descriptionem nullam addit: proponit & haud dissimilem, si non eadem est, Lobelius, quæ in adv. lacteo succo multo turgere scribitur, velut Ferulæ, sed minus quam hæc sapore sit acti. Ego contra Dodonæum Matthioli figuram differentem facio à Lobeliana. Idem mecum facit & frater C. Bauhinus.

*Dod. spinis
reprobatur.*

Tabern. hist. p. 385. dicitur Libanotis 2. Rosmarcintraut: Libanotis herbacea altera, Rosmarinum umbelliferum alterum.

Libanotidis nomine sæpius missa planta, quæ mihi provenit in horto Montbelgardenfi, flore luteo. Valerandus reposuerat nomine Panacis Asclepij Dioscoridis. verum differt ab Asclepiade Panace Matthioli, cui folia aliter divisa & molliora. quantobrem dissentio à Lobelio qui in adv. p. 351. ait, Panax Asclepium Ferulæ facie, quale in Matthiolo pictum vidimus, & Valerandus ex Illyrio attulit. Bene Lob. fecit, qui in obl. p. 455. plantæ, de qua agimus, figuram posuerit, quæ est Panacis Valerandi, & non Matthioli, quæ alia planta, ut suo dicemus loco.

LIBANOTIS QVIBVSDAM SIVE Ferulago, foliis Fœniculi, floribus luteis.

IN montibus nascitur radice non brevi, ut Dioscoridis Panax Asclepium [*Libanotidem quorundam, flore luteo, semine Ferulæ, intelligimus*] quod ostendo, inquit, Cæs. l. 7. c. 5. sed profundâ, cubitali, crassâ, candidâ, medullâ intus flavescente: caulibus ab eadem radice pluribus, rectis, striatis, bicubitalibus, ex viridi pallescentibus: foliis capillaribus, figurâ Fœniculi, ut supra dicta: floribus luteis: seminibus nigricantibus, depressis & oblongis, ut Ferulæ scæminæ.

Hanc quidam pro Meu falsò accipiunt: nonnulli verò inter Libanotides reponunt: ego potius ad Ferulaginem refero: huic enim magis convenit conditio tradita à Theophrasto & Plinio; nam Ferulæ comparata, cui similis est, parva dici potest, & humilis, ait Cæs. alpinus. Nos verò latet quoniam hæc planta adhuc sit reducenda: an porro aliquis alius ejus meminerit, considerent lectores.

Alen falsò.

Ferulago.

FERULA ET FERVLAGO VETERUM.

CAP. XXIV.

Theophr.

Magnitudine tantum differt.

SEd primum de eo, quod cômune omnium constat, dicendum est, authore Theoph. l. 8. c. 2. de Ferula scilicet atque Ferulagine [*ραφάνιον & ραφάνιον*] seu idem genus differens magnitudine tantum, seu etiam alterum sit, ut nonnulli. Ergo natura earum, quæ conspici possit, consimilis certè sentitur, præterquam ratione magnitudinis: Ferula enim grandis admodum surgit, Ferulago autem humilis. Sed uni caules ambæ geniculatæ sunt. Folia & cauliculi quidam geniculis erumpunt, ac alternatim exeunt: folia alternatim, inquam, quod non ex eadem parte geniculorum, sed permutatim caulem magna ex parte amplexa, sicuti harundinea proveniunt, nisi quodd deflexa hæc magis molliciei, magnitudinisq; causa: folium enim grande, molle, multifidum, ut capillamenti modo serè inspicitur, maximaque terræ proxima, & reliqua subinde ad portionem: flos melinus, semen obscurum [*ἀμύρανιον*] Anetho simili-

le, sed majus, finditur cacumine, inq; stipites quoddam haud magnos dispergitur, quibus flos, semenque insidit: nec flore fructuque laterales caules carent, sed modo Anethi ferunt; annuo caule constat. Et geminatio in Vere primum foliorum, tum caulibus, ut etiam in cæteris fieri solet: radice altè descendit, eademque singulari innititur. Talis Ferula est. Hæc loco citato Theophrastus, qui c. 3. ejusdem libri 6. Laserpicio caulem ascribit quantum Ferulæ, & crassitudine serè proximum.

Plinius hæc brevius l. 13. c. 22. sed nihilo clariùs. Et Ferulam, inquit, inter externas dixisse conveniet, arborumque generi adscripsisse, quoniam quarundam naturæ, sicut distinguemus, lignum omne corticis loco habent, hoc est forinsecus, ligni autem loco fungosam intus medullam, ut Sambuci: quoddam verò inanitatem, ut Harundines. Ferula calidis nascitur locis, atque trans maria, geniculatis nodata scapis. Duo ejus genera: Nartheca Græci vocant assurgentem in altitudinem. Nartheciam verò semper humilem. A genibus exeuntia folia maxima, ut quæque terræ proxima. Cætero, natura eadem quæ Anetho, & fructui similis. Nulli fruticum levitas major: ob id gestata faciliùs, baculorum usum senectuti præbet. Plinius repetit de eadem l. 19. c. 9. Ferulæ duo genera in fruticibus diximus. Semen ejus in Italia cibus est. Conditur quippe duratque in urceis, vel anni spacio. Duo ea genera, caules & racemi. Corymbiam hanc vocant, corymbosque quos condunt. Et rursus l. 20. c. 23. Ferula semen simile Anetho habet. Quæ ab uno caule dividitur in cacumine, scæmina putatur. Caules eduntur decocti, commendanturq; musto & melle, stomacho utiles. Sed plures sumpti, capitis dolores faciunt. Et subdit hæc usum medicum, serè ut Dioscorides habet. Radix [*me. Ferula*]

Plinius.

Lesum.

Nartheca.

Narthecia.

Ferula dicitur.

Ferula scæmina.

me. Ferula

[*denarij pondere in vini cyathis duobus, bibitur adversus serpentes. Et ipsa radix imponitur. [semen potum Diosc.] Sic & torminibus medetur. Ex oleo autem & aceto contra sudores immodicos [sudores ciet, cum oleo peruncto corpore, Diosc.] vel in febribus proficit. Succus Ferulæ alvum solvit [sistit, vet.] Fabæ magnitudine devoratus. Et viridi Ferula ramusculus, utilis est ad omnia ea vitia [Et viridi medulla, vultui utilis est & ad omnia eim. M.] Ad sanguinem sistendum decem grana seminis bibuntur, in vino trita, vel medulla. [ad cruentas excretaiones medulla pota confert: maribus indita a sanguinem erumpentem sistit, Diosc.] Sūt qui comitialibus morbis [bū] dandum putent Luna quarta, sexta, septima, ligulæ [lingula, CH.] mensura. Natura Ferularum murænis infestissima est: tactæ siquidem ea moriuntur. Castor radicis succum [*Sagapenum, de quo suo loco*] & oculorum claritati conferre multum putavit. Idem l. 21. c. 9. de honore coronarum, ait. Utuntur è Ferulis & corymbis. Tandem l. 24. c. 1. Ferulæ asinis gratissimæ sunt in pabulo, cæteris verò jumentis præsentaneo veneno: qua de causa id animal Libero patri assignatur, cui & Ferula. Lib. 26. c. 13. Ferulæ cineri tantam vim tribuit, ac etiam carboni, ut quamvis recenti gladiatoris vulnere illigata [*illit, CH.*] sanguinem claudat: fungum verò, quem secundum radicem ejus nasci perhibet, id efficacius præstare scribit.*

Ferula corymbis cunctis adhibetur.

Nartheca scæmina.

Ferula racemosa quid

Ferulæ racemos, ut testatur Dalechampius, umbellas adhuc compressas & nondum explicatas vocat Plinius. Corymbiam verò Ferulam, quam in caulem surgere mittebant, ut corymbos, sive umbellas nascentes ad condituram colligerent. Nam alioqui caulem gliscentem, tenellum, & adhuc convolutum demetebant, ut vel recentem comederent, vel in condimento servarent.

De Ferula inquit Dioscorides. Hujus, dum adhuc viridis est, medulla pota, sanguinem spuentibus & cæliaci prodest: & commorssis à vipera datur cum vino

vino: & sanguinis è naribus eruptiones sistit. Senectuti potum torminibus auxiliatur. Movet & sudores, cum oleo illinatur. Caules in cibo accepti, capiti dolorem inducunt. Idem etiam muria concutuntur. Caulem autem profert Ferula sæpè trium cubitorum. folia habet Fœniculo similia, sed multò crassiora & majora.

Galenus Ferulæ semen calefacere & attenuare dicit. Internam autem partem adhuc viridem, quæ medulla dicitur, adstringentem quandam qualitatem habere, ob quam sanguinem spuentibus & coëlis, spoliat. Ex his itaque aliquam Ferulæ notionem accepimus, & nostris penitus ignotam esse, cognoscimus.

Ferula, quæ species fruticis est, lignum pro cortice, & medullam pro ligno habens, calamumque fungit, Græcis Νάρθηξ dicitur, inquit Olivarius. Et hinc factum adagium est. Tanquam de Narthecio, pro eo quod est ex parato & ad manum. Narthecium autem Ferulæ calamum significat. vel, ut opinatur Roterodam. pyxidem, quâ olim pharmacopœe medicamenta servabant, unde tanquam ex promptuario quodam post ea depromebant. Inde Cicero de finib. bonor. lib. 2. ait. Iam doloris medicamenta illa Epicurea, tanquam de Narthecio promant, si gravis, brevis: si longus, levis. Fabulantur etiam hoc calamo ignem fuisse servatum, & hinc fabula est, Prometheus è ferula surripuisse ignem. De Narthecio Corn. in lib. 6. Galeni de compos. pharmac. d. illentis his verbis, Sorani rap. d. citat Aëtius l. 9. c. 44. Arbitror autem receptum fuisse morem Græcis Medicis, ut libros suos medicamentarios rap. d. & rap. d. inscriberent. atque sic etiam illud Ciceronis 2. de fin. accipio. Iam doloris &c. Et certe consentit etiam Martialis Poëta in Apophor. qui ejusmodi Narthecia capsulis eboreis inclusa fuisse dicit. Hæc ille. qui quâ ratione ducatur, haud scimus. Narthecium [rap. d.] pro repositorio medicamentorum positum, etiam si ex alia materia factum fuerit, placet Thesauri linguæ latinæ: quod id genus ligni accommodatum sit ad servanda medicamenta. Idem Ferulam Narthecem penult. producit vocat, à nominativo Narthex, quem masculini generis statuit.

Extat & aliud proverbium, Marum Ferulæ subducere. Ferulam non minus à servendo, quàm fenendo dictam, vult quoque Dorsthenius, qui eam Hippocratem Pleslinga vocasse scribit. Et nos manum Ferulæ subduximus, inquit Roterodamus, est dicere, & nos literas didicimus & præceptorum operâ usi sumus. Nam antiquitus literatores discipulorum manus Ferulâ cedebant. Est autem Ferula fruticis genus, quo non aliud levius, ut indicatum ex Plinio. Græcis rap. d. dicitur, utilis ad fulcior dos vacillantes ætate senes. Unde & Baccho Silenôque sacer, ut vino titubantes fulciat, nec oneret tamen. Est enim ligno durissimo foris, licet intus lignum non habeat. Hæc exceptum ignem ælestem Poëta fingunt Prometheus deposuisse in terras. Hinc quoque facta sceptrâ pedagogorum, quò terreant magis, quàm lædant, appellat Martialis. Notavit id eleganter Columella in canine,

Nec manibus mites Ferulas.

Et ibid.

— Ferulaque minores

Plantantur.

Unde manum Ferulæ subduxisse dicuntur, qui desierunt in ludo literario versari, neque jam pueri docendi, sed utique docti sunt. Juvenalis in 1. Satyra,

Et nos ergo manum Ferulæ subduximus, & nos

Consilium dedimus Syllæ.

Hieronymus. Sublaximus accipere videtur pro eo, quod est subjecimus, suppositimus. Sic enim scribit ad Donatium: Et nos didicimus literas, &

nos sæpè manum Ferulæ subduximus. Nisi forte manum Ferulæ subducere pueri dicuntur, quum metu plagæ subtrahunt manum. Est similis apud Græcos sermonis color. citatur apud Athenæum lib. 13. Timocles,

— Opus esse adhuc

Trepidare & alapis cedi. & in teneram manum

Recipere plagas, res profectò suavis est.

Ferulæ porro nomine duas plantas à veteribus esse insignitas, Ferulam & Ferulaginem, ex hæcenus dictis manifestò colligere licet.

In ascriptiis Dioscoridis utramque rursus cum Thapsia confundi clarè patet.

Ferulæ præterea titulo sequentes cognominantur plantæ. Ferula folio Fœniculi semine latiore & rotundiore.

Ferula folio glauco, semine lato, oblongo, quibusdam Thapsia ferulacea.

Galbanifera Ferula, quam cum Galbano paulo post tradituri sumus.

Quam Ferulam Coli nonnulli vocant, nos Thapsiam sive Turbit montis Gargani opinamur.

Thapsia Carotæ effigie, Ferula sagapenisifera à multis vocatur.

Ferula Hammoniæ, ex qua Ammoniacum liquor habetur.

Ferulæ cujusdam succum esse Assam foetidam [de Assa foetida hac H. n. g. lib. 9.] innuere videntur Adversaria p. 349.

Isdem Adversarius p. 350. è Ferulæ cognatis est Peucedanum.

Spondylia affinis Panax de Ferula dici, suo ostendemus loco.

Ferula, quæ à nonnullis vulgo existimatur Libanotis prima Dioscoridis, ab eruditis quibusdam in Italia creditur, id referente Gesnero.

Euphorbij plantam, ferulaceam arborem non desunt, qui statuunt.

Tinctorem florem (Gälsferberblumen) Tragacanthæ. Ferulam nominat, dicens videri eam significare Columellam l. 10.

Tormentilla à plerisque etiam Ferula dicitur.

Quò plantam referre debeam, quam Goropius in Hist. lib. 2. Ferulam nominat, nondum mihi constat. De hac autem agit, ubi de monte Baldo locutus est. In montis, inquit, Fœnicularij jugis Ferulæ genus inveni, quod si Laserpitum non est Cyrenaicum, certè Laser Alpinum dici potest: tanto succo Laser alpini optimi odoris in radicibus maximis & crassissimis abundat, ut alterius locum supplere possit.

FERULA FOLIO FOENICULI, semine latiore & rotundiore.



Ad quinq; aut sex cubitos excrefcit, caula crasso, furgosa, medullâ pleno, ramoso: folia amplissima diviturâ fœniculacea, sed segmentis latioribus, Ferulæ glaucæ similia, sed magis etiam virentia: umbellæ latæ florum luteorum, quibus delapsis semen supervenit magnû, foliaceum, semunciam latum, paulò longius, per extremû latefcens,

geminum semper, exteriori parte triplici lineâ clatiore striatum, quâ gemina semina conjunguntur, fibrâ unicâ longâ donata sunt. radix vulnerata lachrymam fundit lacteam. odor plantæ nonnihil gravior videtur quàm Ferulæ glaucæ: sapor acris.

De ferula hac à nobis hîc descripta hæc habet in adv. Lobelius. Quemadmodum *Narthe* virgultum, thyrsus, aut bacillum Græcis signat, sic Ferula latine à ferendo, quod illius scapi pedamenta fruticibus, & senibus pedum ac scipiones essent. Quinâ cubitorum caulis, radix magna, recta, & altè in saxorum commissuras hiantes rimas descendens, evulso difficilis, candida, lacteo, pinguique succo turgida, odorem vehementem vibrans. folia Fœniculi majora, pinguiora, crassiora ut & caulis: umbellæ prægrandes Anethi, Junio & Julio flosculis luteis defluentibus. Semen foliaceum, compressum, oblongum, rotundum Angelicæ fermè, duplè majus. Idem postea ait. Dioscorides videtur agnoscere Ferulam eandem esse atque Sagapenum: nam è radice Ferulæ lauciata manare Sagapenum primùm dixerat: deinde inferiùs, quasi superiùs nihil dixisset, alteram plantam ferulaceam docet, ex qua alius generis Sagapenum effluat: quæ arguunt potius succos ipsos agnitos illi quàm plantas. Quippe Plinius etiam Sagapenum in Ferula oriri tradit, fortè quia eandem plantam cum Ferula vulgari putavit. In adv. huic titulum fecit, *Narthe*. Ferula & Ferulago, Hisp. *Cananbeia*. In Obsp. 430. Ferula, It. *Ferula*. Gall. *Ferule*. In Icon. p. 778. Ferula. Fallitur Lob. Dioscorides non tradit ex hac Ferula Sagapenum excipi. Neque etiam alibi hoc docet. Verùm ex Ferulacea herba in Media Sagapenum fieri prodit, ut suo loco certius patebit. Si Lobelius etiam in Obsp. non posuisset figuram Ferulæ, dubius hærerem an in adv. per Ferulam eandem nobiscum traderet, quia descriptio seminis pro ea non placet. particulare etiam semen in Obsp. & Icon. appictum, non videtur hujus Ferulæ esse.

Errat plurimùm & Lonicerus, tradendo ex Narthece, sive Ferula, ut vocat, Sagapenum colligi. Eam se curasse affirmat depingendam flore luteo, semine Anetho paulò majore. Sed si semen vidit, miror eum dicere paulò majus. oportebat scribere multò majus.

Euchar. Roëll. Ferulam Birdmurg vocat, verùm non describit. Ast quantum ex viribus colligere possum, existimo eum intelligere Tormentillam, de qua alibi agit, cui etiam potuisset hæc jungi, si non eadem.

Cæsalp. l. 7. c. 3. nomine Ferulæ maris aptè descriptam plantam, de qua hîc agimus. per feminam autem fortè intelligit nostram Ferulam folio glauco. Ejus verba hæc sunt. Ferula altitudine caulis, & crassitue formæ specie arboreâ constat: nam ad quina & sena cubita adolescit, crassitudine brachij, foliis latissimis, tenuiter incisis, ferè capillamenti modo, ut Fœniculi, pediculo caulem vestiente, ut in Harundine: umbellas fert laticas, convexâ superficie, ut Anethi: flosculos pallidos: semen latum & depresso, subnigrum, unguis magnitudine, acre: radicem crassam, ramosamque, lacteo succo manantem. Ejus duo genera. Mas [Ferula hæc] crassior, & brevioribus internodiis: latiore semine: radice candida foliis tenuius scissis: caulis, ut & semine [hæc] in deserti præviam poterit ledor perere, sub titulo Ferula glaucifolia. cùm exaruerit, laxissimus est, quia fungosus, addèd tamen robustus, ut sufficiat pro baculo ad sustentandam senectutem: exarescit autem profecto semine in Æstate. Theophrastus genus ferulaceum inter suffrutices recenset. hanc [Marem] quidem Ferulam, alteram verò [Faminem] Ferulaginem vocans, ut Theodorus verit: gizec enim hæc Narthex, illa

Nartheceia vocatur. Ex ejus verbis conijcere licet, Ferulam illum intellexisse, quam ego marem appello. Ferulaginem autem, aut feminam, quamquam in lato Solo, non solum non est humilior mare, sed & altior, gracilior tamen, aut aliud quoddam humilius genus exdicendis. Plinius in delineanda Ferula Theophrastum sequitur. Dioscorides Ferulam tantum describit. Hæc Cæsalp. qui Lobelij errorem sequitur, dum Dioscoridem ex hac Sagapenum fieri scribit.

NARTHECIUM, THEOPHR.
Ferulago, Gazz.



nonnihil odorata cum manditur: caule Fœniculi, striato, ramoso, inani intus; folio quoque Fœniculi, ampliore, minore quàm in Ferula, ad ramorum exortus prodeunte, alternis nunc ex hac, nunc ex illa parte, gustu subdulci & suavi: flore luteo in umbellis, amaro, & subacri, odorato: semine oblongo. Liqueat itaque duo Ferulæ genera esse, unum *Nartheceia*, alterum *ferulaginem*, quam Ferulaginem vertit Gaza. Sunt etiamnum hodie, inquit ex autoritate Penæ, duæ in Herbariorum hortis hujus classis, naturæ & similitudinis plantæ, quas idcirco Ferulagines vocant. Ez videntur tantùm distare culturâ, staturâ, elegantia, & succi copiâ, ut nactæ fuerint radices arvum aridum, magisque excoctum, sub cælo sudo & fervidiore, ut in Africa, Media, Cyrene, & alibi.

Matth. in suis comm. Ferulam nominat, ut & in epitubi ita delineat. Ferula, grandis admodum surgit, unico tantùm caule ac geniculato: folia grandia, mollia, multifida aded, ut capillamenti modo ferè spectentur, præsertim quæ terræ proxima sunt. flos melinus: semen obscurum, Anetho simile, sed majus. In hist. germ. vocatur Ferula quoque sive Narthex, semine Anethi aut Fœniculi, sed paulò majus. Is in comm. figuram habet non bonam, nihil particulare & certum demonstrans, sine descriptione si eandem plantam nobiscum sentit, non convenit dicere semen Anethi & paulò majus. Cam. ad epit. & hist. Matthioli germ. posuit figuram, quam probamus semine lato & rotundiore.

Bauh. phyt. apud Matth. & pin. Ferula 1. semina Phlog. Ferula. Matth. Arg. Turb. Lac. Cordan. Diof. Gesn. h. Lon. Lob. Dod. in sol. Cast. Lugd. Tab. (cui & Ferula major & Canna Ferula, *Canna* Serapionis, *capata* Glossographi Avicennæ, & aliorum Arabum *Ala* germ. Ferulifera & *Streptocera* Cam. Ferula mac. Cal. Libanotis 1. Dioscoridis ferulacea Gesn. h. Eid. phyt. & pin. Ferula 3. sive Ferula, o

Lugdun. p. 754. Lug. 2. fig.

Ferulæ titulo mancam Matthioli figuram exhibet, additque; aliam pro Nartheceio Theophrasti, Ferulagine Gazz. Hæc licet nesciamus cujus plantæ sit, ac imperfecta videatur, eam tamen hoc loco prædam damus, ne quid temerè omitamus. Eam autem sic describit. *Nartheceia* Theophrasti, Ferulago Gazz. in iisdem locis nascitur, in quibus & Ferula. Ad hominis altitudinem crescit, radice dodrantali, pro magnitudine plantæ totius exigua & gracilior, candida, parùm fibrata, gustu subacri,

Nartheceia
Ferula

Deser. Lob.

Can. ov.

Tormentilla
Euchar.
Roëll.

Ferula maris
Cæsalp.

Nartheceia

Ferula
Matth.

Synon. C. 2.

tenuiore folio: Narthecium Theophr. Ferulago Gaz. Lugd. Ferulago, Tab. Si per figuram Lobelia-
nam appositam Matthiolo intelligitur eadem Fe-
rula nobiscum, non quadrant semina appicta, quæ
nihil videntur sequentis Ferulæ folio glauco. Gelse-
rio non negarim esse posse de hort. Libanotidem
primam Dioscoridis. verum ea quæ scribit eo loci,
possunt etiam convenire Libanotidi tenuifoliæ, se-
mine Ferulæ. Vidi aliquando Gelsemium annotasse
plantam hanc Libanotum dici. Quod Cæsalp. citatur
facit pro nobis, qui semen dixit latum unguis ma-
gnitudine: cur potius Ferulam Plinij vocet, conside-
ratione dignum videtur. Narthesium Lugdunensis
non separo à Ferula Matthioli, quia imperfecta fi-
gura, nullam plantam demonstrans.

Anguill. epist. 12. Ferula nota in Apulia, Calabria
& Sicilia, ibidemque nomen retinens.

*Lani cum
semper* Ferula, quæ depingitur à Matthiolo Monspelij
in hortis habetur, ut in horto Castellani Monspel.
pharmacopolæ ad altitudinem quinque, vel sex cu-
bitorum, mense Aprili florens. Patavij apud Cortu-
sum vidi gummi, quod ex Ferulæ annoz vulneratâ
radice effluerat. Lugduni magnas habui plantas
in horto, & magnam quoque observavi in hor-
to Trivelfani Patavij; Basileæ in horto F. Pla-
teri parvas. Item Ferrariæ in horto Principis; Flo-
rentiæ in horto Nicol. Ferrariensis, & Montbel-
gardi in horto E.C. & nostro. Ferula plurima & pro-
cera in Galloprovincia & Narbonensi Gallia, præ-
sertim illis rupibus, præruptisque laxis prope sub-
terraneas Cryptas, via qua Monspelio Frontigna-
num itur ad dextram: iidem in celsis squalidisque
faxorum sinubus, qui Soles ætivos & fervidos to-
tum ferme sovent diem, prope oppidulum Rochæ-
ve Castrum vocatum qua Austrum vergit umbellæ
Junio & Julio florent, Lobelio. Ferula, inquit
Matthiolus, æstuosis nascitur locis: ideoque nil mi-
rum, quod Apulia Ferularum sit maximè ferax.
Quinetiam frequens provenit in Romano agro
Tyrrheni maris contermino, præsertim apud Cen-
tumcellas, & in Hetruriæ maritimis. Exarefcit, au-
thore Cæsalpino, perfecto semine in Æstate. vivit
radix diutius: Autumno & per totam Hyemem fo-
lia à radice emittit: ineunte Vere caulescit: paulò
ante Æquinoctium veluti ovum producit: gaudet
regione calidâ & læto Solo: frequenter in Sicilia, &
apud nos in Italia in monte Argentario.

*Vires,
Marb.* Viribus à veteribus Ferulæ assignatis, has in super
addit Matthiolus. E Ferulis prima tantum in germina-
tione corculum quoddam pastores eximunt, ovi lu-
teum induratum referens, quod sub cineribus assa-
tum, prius tamen chartâ, aut linteo madefactis con-
volutum, mox pipere & sale conspersum, non mo-
dò gustui gratissimus est cibus; sed etiam ad excitan-
dam venerem valentissimus. In insula quadam ex
fortunatis nomine Morion, Ferulas in arborum am-
plitudinem grandescere, scripsere quidam. Apuli li-
gnorum vice, quibus maximè carent, Ferulis ad
ignem utuntur.

FERULÆ FACIE THAPSIA, sive Turbit Gallorum.

Thapsia **D**E Thapsia, sive Turbit gallico, Turbit cineri-
tio Officinarum ut vocat Lob in adv. hæc tra-
dit. Potuit dici Thapsia non solum ut placuit Dio-
scoridi, à Thapso insula cognomine, quæ una è Spo-
radibus est: sed etiam propter flammeum calorem,
quem corpori adnota inmeret, adeoque eliminis.
præsertim adverso statu spectanti. Valdè quàm simi-
lis Thapsia habitu toto & viribus, tamen usu mul-
tò præstantiore atq; purgatior vi. In Aquitania ma-
culæ nigris montibusque squalidis inventam no-

bis dedit præceptor Rondellatius, propè vadum
qua traiecit in Hispaniam, tunc ad radices Pyre-
neorū, non procul




Perpignano ur-
be: crassior radice
cortex, fusco foris
colore, intus pal-
let, succoque mul-
to gliscit lacteo,
gummeo, sed inibi
loci neglecto: cau-
lis Peucedani gra-
cilior, quàm Feru-
læ, foliaque Fœni-
culo latiora, bre-
viora, in umbellis
semen Ferulæ mi-
noris, oblongum,
angustius, monta-
ni Sileris. Merito
desita ex istius suc-
co purganti anti-
quis consueto, ut
quo multum no-

ceatur præcipuis visceribus, & tormina dira inter-
dum excitentur. Verum siquidem miscentur levio-
ribus, & naturæ amicioribus, proderit Sarcocollæ,
Hammoniæ, Turpetive succi modo. Nec Ferulæ,
Peucedanique succis gummeis defunt vires purga-
trices: verum tum quia planta, tum succus sætidus
cerebro adversatur, idè non correctæ plus disci-
minis inferret. Et hæc tradit p. 350. ubi paulò post
Thapsiam Aquitanicam nominat, cujus radice uti as-
serit plerisque omnes officinas Septentrionales. *Aquitania*
p. verò 311. vocat Thapsiam vernantem multum in
Aquitania Vasconum. In lc. p. 79. Thapsiam Dio-
scoridis. Lug. p. 756. Thapsiam Penæ veram.

Bauh. phyt. Thapsia 1. sive Fœniculi folio: Thapsia
Diosc. Adversariorum. Eid. in pin. Thapsia 4. fœni-
culi folio: Thapsia Diosc. Lob. & Lugd. Thapsia 2.
vel tenuifolia, Clus. hisp. & hist. Thapsia angustifo-
lia, Tab. tenuifolia, Ger. Nos quoque debeamus refer-
re Thapsiam hanc Lobelij, incerti sumus. multa
quidem habet communia cum Ferula glauco folio,
jam dicenda: verum Rosmarinum Ferulaceum Lo-
belij, melius adhuc cum ea convenit.

FERULA FOLIO GLAUCO, semine lato, oblongo: quibuldam Thapsia Ferulacea.



MIRUM quàm desit.
grādescat hu-
jus radix: caulis hu-
manam procenta-
tem multum exce-
dit. folia majora, fe-
rulacea, minus ad
Fœniculum acce-
dentia, quàm præ-
cedens Ferula, co-
loris glauci, potissi-
mum subtus, quo-
rū singula segmen-
ta latiora breviora
que sunt, quàm fœ-
niculacea aut feru-
lacea, succum la-
cteum manantem, o-
dore gravi, sapore
seri. Fœni-
colore sublateo se-
men

men magnum, compressum, striatum, nigrum, angustius quam Ferulae.

Ferula foemina, Gal. Celsipinus, si nostrum nos non fallit iudicium, Ferulam foeminam vocat, eique radicem tribuit exterris nigram. Ego hanc saepius habui, verum radicis colorem non observavi. Is autem de Ferula foemina (quam C. Bauh. ad galbaniferam Ferulam refert) sic differit. Foemina Ferula, mare [*Ferula folio Foeniculi, semine lacture & rotundioris*] est erectior, geniculis magis distantibus; foliorum segmentis angustis quidem, non tamen capillaribus, ut maris: radice nigra exterris: caulis huius, ut maris, cum exaruerit, levissimus est, quia, ut maris, fungosus, adeo tamen etiam robustus, ut sufficiat quoque pro baculo ad sustentandam senectutem. exarescit autem per seoto semine in Aestate. ejus substantia igni familiaris, nam instar fœniculi ignem conceptum tam diu servat, donec totus contabescat. Vivit radice diutius: Autumno & per totam Hyemem folia ab radice emittit: ineunte Vere caulescit, sed paulo tardius mare: gaudet regione calida & lato solo: frequens in Sicilia, & apud nos in Italia in monte Argentario.

Ferulago GAZA, Narthecia Theophr. Theophrastus hanc Ferulaginem vocat, ut Gaza vertit: græcè verò Narthecia vocatur. Ex Theophrasti verbis (quæ ante recitavimus) conicere licet, aut Ferulaginem intellexisse, quam nos Foeminam appellamus, quanquam in lato Solo, non solum non est humilior mare, sed & altior, gracilior tamen, aut aliud quoddam humilior genus ex dicendis. Plinius Theophrastum sequutus inquit. Narthecia semper humilis, &c. quæ ab uno caule dividitur in cacumine foemina putatur.

An Rosmarinum ferulaceum, ferule Dioscor. Lob. An Lob. in adv. p. 351. hanc titulo Rosmarini ferulacei, ferulis Dioscoridis, cujus semen Cachris dicitur, intelligit, de quo ait. Diversi admodum generis plantæ Libanotidis appellationem asceverunt, ob odorem quem spirarent, quidam sui parte Thuris quadantenus æmulum, cujusmodi primæ Libanotidis radicem olere Dioscorides auctor est: qui idem à Theophrasto quandam Libanotidem memoratam, cujus folia agrestis Lactuce amaræ candidiora, asperiora, radice brevi narrat. Nobis autem nulla hodie planè innotuit Libanotis è tot ferulaceis, quæ vulgo Libanotides putantur, perinde descriptioni consona, ut hæc, quam Patavinus olim habebat hortus, quæ etiam nunc ineunte Hyeme lata virebat Londini in horto Io. Riccij, pharmacopœi.

Semine Fraxini. Surrigit ea caulem quindum, aut senum interdum cubitorum, fœniculaceum, aut Ferulæ nitidum, obscurè viridantem, alis multis & ramulis divisum, è nodosis geniculis exeuntibus, foliisque gerentibus crebra, Fœniculo crassiora, Cotulæ majora, averfa, virore czsio & glauco, umbellas per Aestatem latiores Ferulæ, aut Thapsiæ, floribus luteolis referatas, & semina Fraxini, foliaceæ, oblongiora quam Ferulæ, & Cucumerino semini majora, compressiora, striata, acerosæ, resinaceum, aut thureum halitum dum fricantur, Sileris montani, aut Peloponensis Sefeli dantia, mansuæque os resinaceo & thureo sapore complentia, aciora: reliqua planta tenera, calidiuscula, sed non ingrato holeraceo & Smirni gustu, quo quidem faciliè dignoscitur à Ferula: nam alioqui lacte multo turget tota, uti Ferula, sed albidior & minus fervido, aut gravi odore, quin potius odore. In hac quidem Lobelij descriptione nihil invenio, quod non conveniat cum Thapsia nostra glauca. Videtur etiam cum hac non malè convenire Thapsiam, Turbit gallicum, Turbit cineritum officinarum, sive Thapsiam Aquitanicam (his enim nominibus unam eandemque speciem appellat) Lob. in Adv. p. 350. Verum quia dubius sum, eam separatim præmittere volui.

An Thapsia major, L. Off. An Cordus in hist. l. 4. c. 63. Thapsia major umbel-

liferæ & ferulaceæ herba: radice grandi, longâ, crassitudine manum complente; foris nigra, aut fusca, intus autem candida, crasso, carnosoque cortice, & lignosa, simulque fungosa medulla constante: guttus acerrimâ, linguam exurente, plurimam salivam provocante, ingratiissima. nauseosa, & sauces veluti strangulationis comminatione afficiente: odore viroso, rancida, & vetustissimæ cupuldæ, rancidæque pinguedinis qualitates referente. Natalis in Italiae calidioribus regionibus, unde in Germaniam pro Costo ab impudentissimis impostoribus quondam missitari cœpta est, execrabilis, periculosissimo, ac capitali pœna digno dolo ac impostura. Gesnerus apposuit figuram Matthioli. Cordus verò Thapsiam majorem advehi pro Costo albo, seu Arabico, monet etiam c. 60. ejusdem libri, & in dispensatorio. Est eidem Cordus in Diosc. l. 4. c. 157. Ferula nostra glauca, dicta Thapsia, ferulaceæ & Fœniculo similis planta. Hoc loco annotatum est à Gesnero, Thapsiam esse duplicem, unam minorem: alteram majorem, quæ pro Costo interdum afferatur, & hac foris quidem Costi loco uti licet, intus non item. Thapsiam autem pro Turbith, licet Turbith durius sit, interdum advehi notat. Thapsiam verò suam minorem Cordus in hist. l. 4. c. 74. ita describit. Thapsia minor, æquæ ut major, ex umbelliferarum & ferulacearum herbarum genere est: radicem habet longam, satis magnam, crassitudine digitalem aut pollicarem, nonnunquam etiam crassiotem, vel gracilior, foris nigram, intus candidam, carnosam, crassoque cortice constantem, qui exempta interiori, nervosaque medullâ affertur, substantiâ tener, in farinam friabilis, levis & liquorem ruffum, exiccatum, guttatim dispersum continens. Saporem habet, cum exsiccatum ad nos pervenerit, primum ferè insipidum, aut farinæ Tribuli aquatici similem, mox tenuem aliquantulum, postremò mediocriter acrem & ferventem, ob excrementi huiusmodi humoris copiam, non è vestigio, sed tardius acrimoniam suam linguæ ac palato imprimentem. Eligendus cortex ejus magnitudine mediocris, crassus, siccati liquoris guttarum plenus, & à vernibus nondum corrosus, quod faciliè fit ob crassæ humiditatis copiam. Hucusque Cordus. Sunt autem qui aliò referant hanc Cordi Thapsiam minorem, mihi tamen consultus videtur huc referre, neque consilium mutare, donec rationibus convincar, alio loco locandam. Scimus etiam C. Bauhinum Thapsiam majorem Cordi ad Turbith gargaricum, de quo post, reducere.

An de hac nostra Ferula glauca loquitur Matthioli in Diosc. l. 4. c. 151. quando ait. Thapsia plurima nascitur in Apulia, præsertim Gargano monte, inter complures ferulacei generis plantas. Provenit & in nostris maritimis locis adeo Ferulæ ad similes, ut non faciliè, nisi à rei herbariæ peritis, una ab altera dignoscatur. Visitur etiam hodie in hortis ad spectaculum plantata. quâ ratione jam sermè omnibus innotuit in Italia. Cæterum, non desunt impostores, qui Thapsiæ radicem cortices pro Turpeto vendunt: quæ quidem à peritis seplasiariis in ea medicamenta jure optimo addi possunt, quæ Thapsiam exposcunt: sed in Turpeti locum non sunt, meo iudicio, recipiendæ. Quapropter maximè in hoc, à Fuchsiò dissentimus, qui Turpetum à Mesue descriptum nil aliud esse censet, quam Thapsiæ radices. Hactenus ille, qui suam Thapsiam non describit. Ea potè figuram Thapsiæ titulo passim insignita, nullam ferulaceam plantam ritè exprimit. Patroni idem ejus, Lob. Cam. & C. Bauhinus alias figuras pro Thapsia Matthioli præporunt, quæ tamen & ipsæ aliarum sunt plantarum, & ab illa valdè diverfæ, ut suis dicentibus locis. Figuram Matthioli assumpsit Lacuna, qui notat, pharmacopœes capitali errore in diatag. calide *pharmacopœes* Avi-

Tharfa
N'ogom
Safaru.

Cæsar claritatem ei dedit initio imperij, nocturnis grassationibus converberatam faciem illinens sibi cum Thure cerâque, & sequuto die contra famam cutem sinceram circumferens. Ignem Ferulis optimè servari certum est, easque in Ægypto præcellere. Libro 19. c. 9. Thapsiam inter ferulacei generis plantas quoque nominat, eâque perquam similem Fœniculo dicit.

Galea 14-
20.

Thapsia, autore Galeno, acrem habet ac valenter exalefacientem facultatem cum humiditate conjunctam. Quamobrem ex alto violenter extrahere, Scipsum quod extraxit, digerere scribit. Verum plusculum ad ea efficienda tempus postulari, ut quæ larga humiditate impleta sit, ob quam celeriter corrumpatur.

Verba ap-
pellantes

Thapsiam porro sunt qui Hypopion, qui Pancranion, qui Scammonion, qui Thelypterida appellant. Aphri Bœden, Romani Ferulaginem, sive filvestrem Ferulam dicunt.

Cognomines diversis locis Thapsi urbes, insulæ, chersonesique aliquot, Thapsiæ huic ab earum aliqua primò quondam sic appellatæ diversos natalès & diversas bonitatis laudes fecisse videntur. Nican- der in Theriacis ex Sicilia Thapsiam in primis con- tra venena laudavit. Nunc age composita te malo-

Trinaria.

rum remedia docebo: Trinacriam [*Semacellu*] sumito, Thapsiæ radicem, quæ corpori medetur, &c. Plinius contra Thapsiam in Aphrica vehementissimam esse dixit. Hoc quem plures alij sequuti sunt in Thapso insulam primò inventam fuisse ait, nec bonitatis, majoritque in ea efficacis discrimina aliqua numeravit. Ex eo fit, ut credam, (inquit Marcellus) primam Thapsiæ inventionem Thapso, quæ una ex

Exyria.

Sporadibus infulis est, deberi. Hanc veteres Hypopion vocabant, accipiti, nisi vitium in Theophrasto sit, & rei, & nominis significatione. Pro qua intelligendum est, significare Græcis Hypopion, cui in ultima syllaba i, non y sit, sanguinis ex ætu, seu tūve, aut injuriā aliquā aliā, in quampiam corporis partem concursum, integrāque cute in eo loco cessante, & quod extra venas sit quasi mortuum. Audita itaque Hypopij hujus voce, nihil aliud Græci intelligunt, quàm cessante sanguine nigrescentem cutem. Nec dubium est, his mederi Thapsiam, & ab eo remedio, nomen hoc factum illi esse. Siquidem hic ait. ὑπόπια πᾶσι ἐξ πλινίας, h. e. hypopia & livores delet. Et Plinius rem augens ait. Nero Cæsar claritatem ei dedit, initio imperij nocturnis grassationibus verberatam faciem illinens sibi cum Thure cerāque & sequenti die contra famam, cutem sinceram circumferens. Solus Theophrastus aliter Hypopia, quibus ea medetur, intellexisse creditur. Verba ejus sunt. Thapsiaz autem vomitoria vis est. quod si quis eam retinuerit, per inferna pariter & superna purgat. facit & Hypopia, veruntamen candida [ὑπὸ πινίας ὅποι: ἀλλὰ ἑκαστα.] Ex his ni vitium in hoc scriptore sit, maculas, quæ in cute albicant, hypopia intellexisse oportet. Et si recipiendum in Theophrasto hoc est, ad aliam Thapsiaz naturam referenda res erit, ad pallorem sc. à quo Thapfinus color in Phocione à Plutarcho, dictus est, & à Theocrito in pharmaceutria. ἐξ ἡμῶν χρῶς μὲν ὁμοῖον ἐξ ἡμῶν πολλόν ἐστι, h. e. Et corpus meum Thapso simile factum est: nullā aliā quàm coloris significatione, qui color Thapsiā fiebat. Consueverant enim veteres ad excusandam valetudinem, corporisq; morbos non aliter, nec alio eventu quàm Cymino, Thapsia se inungere, potuitque Theophrastus hypopia candida, pallores Thapsiā factos indicare. Quod legentibus significasse satis sit. Et si sciamus Theocriti interpretes & alios Græcorum scriptores Thapson Chryseylon, i. e. aurei coloris lignum, non herbam hanc interpretari solitos. Scammoniam vocari ab

Señorío.

aliquibus Thapsiam in Cioscoride legitur Veruntamen non potuit ad Thapsiam Scammonium, nisi ex pari in purgando vi, trahi. Romani ex totius plantæ similitudine (quoniam ut Plinius ait, Thapsia sine dubio Ferula est) Ferulaginem, & silve- *Ferula.*
stem Ferulam vocaverunt.

Barbarus in colligendo Thapsiz liquore, quo-
rundam codicum (quos & se vidisse Marcell. testa-
batur.

Thapſon verò inſulam, ſi non Siciliæ, ac certè à *Thapſon*:
Sicilia non ita longè diſtiam, innuit Dioſcorides.
Nam & idè Nicander in Theriac. radicem Thapſiæ
Trinacriam cognominavit. Siciliam verò etiam Tri-
nacriam olim dictam fuiſſe conſtat, deductà appel-
latione à tribus jugis, ſeu promontoriis, quæ in ea
inſula præcipua ſunt.

Thapsiam, inquit Cæſalpinus, Theophrastus ſimili modo radicem Thapſiæ, quo ego, candidam ſcribit, caulem ſerulaceum, ſolum Fœniculo latius. Dioſcorides verò Thapſiam paulò aliter delineat, ut videatur non hanc [*Thapſiam Ilva, ſemine candido, croſſ.*] intelligere, ſed Perularinem, quam Ferulam

foeminam appello. Melius procul dubio utrumque Turkish
Mes-
genus Thanix Turkish appellat: inquit enim Tur-

genus Turbini. Turbinu appenat: inquit enim, Tur-
bith est radix herbæ, cujus folia sunt, sicut folia Fe-
rulæ, minora tamen, & est ex habentibus lac. repe-
ritur silvestre, & domesticum: & ex eo etiam est ma-
gnum & parvum: & adhuc aliud album, aliud citri-
num, aliud nigrum. Quod in locis siccioribus nasci-
tur, sit gummosius propter spissitudinem lactis e-
jus; in humidioribus e contra, quod de fieri à septem
conditionibus, quæ bonitatem ejus ostendunt, ut
Canderio-
nes 7 boni
Turbini.

le. sit album, & concavum, harundinolum & gum-
molum, & sit cortex ejus cineritius & planus, & sit
recens, & friabile: citrinum verò malum est, & ni-
grum pejus; crassum est non bonum, & similiter
quod tenue est, nam imbecille: & rugoso cortice, &
quod interius, dum frangitur, nervos habet, silve-
stre est & malum: quod non est gummolum, imbe-
cille est & ventris conturbativum. adulterant tu-
per illinentes gummi dissolutum: deprehenditur
fracturis; nam caret gummi. quod est nimis recens, *Autro-
frans ut a
prehenda
tore.*

est conturbativum, & subversionem facit viscerum:
vetustum imbecille est, idèd eligitur id, quod in me-
diocritate consistit: evacuat humores tenues: quod
si addatur Zingiber, educit humores crassos, & vi-
scosos à partibus longinquis, & articulis, & locis
profundis. pondus ejus contriti exhibetur à dra-
chma una ad duas: decoctionis autem à drachmis
duabus ad quatuor.

Ex his patet indicari à Mesue nomine Turbith ^{Nigrum} nigri, Thapsiam Dioscoridis, quod genus improba- ^{Thapsi D} tur; Turbith autem album Thapsiam esse Theo-
phraasti. Tam Dioscorides quàm Mesues, corticem
radicis assumi testantur, conveniunt & in facultate,
nam & superius & inferius purgant, ut Græci asse-
runt: quod Mesues inquit purgare cum subversione
& nausea. Ille hilem ducere: Mesues humores te-
nues scribit, de pondere excludendo non conve-
niunt Dioscorides & Mesues, quia hic nigrum, ille
album assumit: Dioscorides radicis obelos tres,

1921

lactis obolum unum, si amplius periculosum esse: Mesues radicis drachmam unam usque ad duas exhibet, succum solum non exhibet. Galenus maximam differentiam esse recentis ad vetustiore[m] testatur: vis enim huius pharmaci post annum multum exsolvitur, atque amplius adhuc post duos annos, ad triennium penitus inutilem esse audent proferre. Mesues recentem abdicat ob vehementiam, veterem, ob ignaviam. Testantur qui Turbith ex Apulia ferunt, radices esse Thapsiaz, ut ex his satis liceat idem esse Turbith, & Thapsia. Alia tamen est sententia apud Aetnarium inter Græcos recentiores; nam Turpetum (sic enim appellat) Titimalis ascribit: album quidem esse Alypiz radicem; nigrum verò Pythyusz. Ac longè diversa est Serapionis opinio: putat enim Turbith esse apud Dioscoridē Tripolium: sed radix, quæ in hunc usque diem pro Turbith venditur, nec Tripolio convenit, nec Alypiz, nec Pythyusz, de quibus suis locis erit manifestum. Thapsiaz succus, aut lachryma, quod Cæsalpinus monet, non adfertur hodie, neque etiam in Italiam, quamvis radix succosa, & sincera habeatur, etiam ex Orientalibus, sed ob vetustatem infirma, ut eum usum præstare nequeat ad extrahendum ex alto, quem sinapismi, & cataplasmata ex succo Thapsiaz præstabant apud antiquos. Hæc Cæsalpini argumenta & rationes, quibus Turbith Thapsiam esse contendit, doctiorum iudicio pensanda relinquimus. De Turbit plura ex professo H. n. g. lib. 34. dicemus. Iouberti stat sententia Thapsiam à multis loco Turbith perperam usurpari.

Turbith gummosum. *Thapsia alia* (inquit Fallop. de purg. simpl. c. 49.) deservit ex Siria, quæ vocatur Turbith gummosum, eod quod concreverat circa oculos radicis Thapsiaz, & est gummi acre: solet tamen & gummi quoddam apponi à nebulonibus, ut decipiant homines: sed detegitur fraus, quia gummi quod addunt, non est acre. Et hoc deservit ex monte Gargano, qui mons nunc vocatur, mons S. Angeli, & dicitur Turbith ex monte S. Angeli. Quamvis autem utrumque bonum sit, semper tamen accipiendum ex Siria delatum, quod validius est & minus cariosum, ut ortum in loco calidiori. aliud verò ex Gargano monte allatum, ut plurimum est cariosum, & est debilius, quoniam oritur in loco frigidiori: & idem etiam in conficiendo oleo pro defluvio pilorum, hoc non, nisi in defectu illius, utendum erit.

Cardan. Actinoniam tandem si quaeris in Thapsia, nihil est quod statim degustata, te invenire posse credas: sed si commanducetur. Illud silentio hic non prætereundum, si Thapsia loco superposita fuerit, ac vesicæ & ædemata excitata fuerint, eadem illiæ theriacæ solvi, aut etiam Cumino, aut aceto superposito, ut l. 8. cap. 44. rer. var. scriptum reliquit Cardanus.

Piperia. Thapsiam apud Tragum l. 2. c. 8. Arabes Thestic cognominant, ut Avicenna l. 2. c. 10. Iacobus Manlius autem Piperiam nuncupavit.

Thapsia Euchar. Quam plantam intelligat per Thapsiam Euchar. Roëlin divinari non possumus, nec eum etiam agnovisse credimus plantam, quam sequentibus tradidit. Thapsia, Wilder (silvestre) Turbith folio est Fœniculi, flore albo, semine lato, Levistico simili: radix alba, crassa, cortex crassus, acuti odoris.

Thapsia in diamarg. calido, pro Capsia, sal. v. Lacuna in annot. in præfat. Diosc. ait per totum mundum præparari diamargaritum calidum Avicennæ cum Thapsia, quod diamargaritum perimat multos. Historiam recitat mulieris, quæ eo assumpto in convulsiones & gravia symptomata incidit: se vidisse Avicennæ exemplar manu scriptum apud Vincentium pharmacopæum Romanum in quo legabatur Capsia pro Thapsia, & in margine annotatum fuisse, Capsiam esse Cassiam ligneam sive Catom. l. l.

nellam. Idem rursus l. 4. c. 159. in Diosc. repetit se in præfatione summum errorem, qui à pharmacopæis præparatis committatur, ostendisse, dum in diamarg. calido Avicennæ Thapsiam loco Cassia, quam Cavellam dixit, ponant. Thapsia adferri magnam copiam ex Apulia Romam nomine Turbith. Errorem hunc augeat VVeckerus Cordum secutus, addendo in diamarg. dicto radicis Thapsiaz, quum alij simpliciter habeant Thapsiaz pro Capsiaz, sive Cassiaz, ut ritè monet Lacuna. Quare meritò Fuchsius in hæc prorumpit verba. Id errore non caret & quidem maximo, quod Cordus in diamarg. calido Thapsiaz radicem subiecit, quæ intra corpus exhiberi non debet. est igitur ex contextu rejicienda.

Apollo rad. i. redarguere conatur Fuchsium dicens: Fuchsius Cordum taxans, non leviter criminandus est, quod ipse, non Cordus, ab Avicennæ præscripto, longè recesserit, dicens Thapsiam à contextu ejiciendam, nec intra corpus exhibendam, contra Dioscoridis, aliorumque sententiam. Sed non video cur Apollo ita culpet Fuchsium & excuset Cordum: qui sanè neglexerit monere errorem in interpretatione Avicennæ periculosissimum. Quod autem dixerit intra corpus non exhibendam, non malè fecisse videtur & potissimum in cardiaco medicamento. Ille Apollo dehortari debebat ejus usum, quando quidem ipsemet testatur pessima symptomata assumptam adferre.

Thapsia sit qualiscunque herba velit (inquit Aquicola) quam hodie sic appellant, constat non esse veram Thapsiam, de qua veteres loquuti fuere. Thapsiaz verò nomine sequentes circumferuntur plantæ.

Herbariorum Thapsia vulgaris, Thapsia Carotæ folio à nobis incognita. *Thapsia Carotæ folio.*

Thapsia latifolia Clusij, Thapsia quorundam si- *Thapsia latifolia.*

Considerandum an nostra Ferula folio glauco, de qua ante egimus, sit Thapsia Matthioli quam *An Ferula folio glauco.*

Thapsia, Turbith gallicum & Turbit cineritium officinarum Lobelij, est Ferulæ facie Thapsia nostra, sive Turbit Gallorum. *Ferula facie Turbit Gallorum.*

Thapsia tenuifolia, Thapsia 2. Clusij, fortè Thapsia angustifolia Cam. hort. *Thapsia 2. Clusij.*

Thapsia 3. Thapsia Salmanticensis Clusij, an Cicutaria maxima Brancionis, an num potius Cicutaria nostra maxima, foetida. *Thapsia 3. Clusij.*

Thapsia quarta Clusij in agro Salmanticensi Tuerro vocata. *Thapsia 4. Clusij.*

Thapsia, sive Turbit Gargani montis, de qua mox. Thapsia Asclepiadis est Rubia sativa. Traditur hæc H. n. g. lib. 36. *Thapsia Garg. montis Rubia sativa.*

Vesalius in paraph. in Rhazæ lib. 9. c. 7. nominat Lepidium. Thapsiam Indam, quæ interpretatur Lepidium. Vide H. n. g. lib. 22.

Thapsiaz succo Sylvius in Antiball. substituit Nasturtium. lib. 22. *Nasturtium.*

Thapsiaz succo Nasturtij & Erucæ seminis pondus æquale, licet illa sint multò inferiora Thapsia, subornat Galenus lib. 1. cap. ph. *Erucæ cum Nasturtio.*

Pro Thapsia imponit Nasturtij semen Fuchsin antiballomenis. lib. 22. *Nasturtij semen.*

Pro Thapsia foris adhiberi semen Erucæ, testatur in ant. phar. Sylvius: utinque Fuchsin antiball. lib. 22. *Erucæ semen.*

Thapsiam Indam Simonis Iannensis vocant Nasturtium aquaticum. Trag. l. 1. c. 26. *Nasturtium aquaticum.*

Thapsia hinc loco Sylvius in antiball. itemque Chamæle Tractatus qui pro quo. succum Chamæleontis (nigri Sylv.) substituit. lib. 26. *Chamæle Tractatus.*

Thapsia loco accipit Trad. qui pro quo, succum Glycyrrhizæ. lib. 27. *Glycyrrhizæ.*

Cassia li-
gnea.

Non desunt, qui Thapsia loco Cassiam ligneam supponant, ut dictum lib. 4.

Cardamo-
mum.

Pro Thapsia Gesnerus Capsicum legendum censet, quod Adolph. Oeco Cardamomum Arabum interpretatur, ideoque in diamarg. cal. Avic. utrumque Cardamomum ponit. lib. 15.

Thapsus
barbatus.

Confunditur Tapsus cum Thapsia à nonnullis, præsertim Port. phyt. lib. 3. cap. 36.


Ruta

Rondeletius in praxi cap. de Alopecia, Pulegium regale, & corvinum, Erysimum, Nasturtium, Abrotanum, & Rutam loco Thapsia in usu admittit, si eodem modo adhibeantur. Tandem notat esse semina ejusdem facultatibus prædita, ut Erucæ, & Rutæ, non autem Cicutæ, ut Valesc. Tarantam ausum dicere prodit. De Ruta lib. 25. de Cicuta lib. 27.

Cicutæ

THAPSIA SIVE TURBITH Garganicum semine latif. simo.

Ruta



A MELA & pulchra sunt hujus folia, glabra, pedem longa, in alas per certa intervalla, ex adverso sitas eleganter divisa, atque ex rursus in segmenta alternata vel fortuita subleantur, Peucedani ferè segmentis singularibus similia, nisi & latiora & breviora essent: caulis crassiusculus, desinens in umbellam magnas, quæ iterum dividuntur in parvas, luteas, quibus semen succedit longè maximum, unciam longum, paul-

lò minus latum, labiis præditum magnis, foliaceis, per extremum bifidum, simile Thapsia latifolia Clusij, sed duplo ferè majus.

Thapsia da-
labensis si-
ve Garga-
næ.

Plantam à nobis descriptam misit frater C. Bauhinus in inscriptione, Ratissinæ Patavij Thapsia sive Turbith Garganij. Nos ad hanc referimus Thapsiam sive Turbith Gargani montis Gesneri, & non ad Thapsiam Carotæ facie (ut facit frater C. Bauh.) cui non competit. Est siquidem semine latissimo.

Thapsia lati-
folia Imp.

Eandem quoque nobiscum intelligit Ferd. Imp. l. 28. c. 1. per Thapsiam latifoliam, qua utuntur in Sicilia insula pro Turbith felici successu, ubi vulgo dicitur Ferulaculæ eodem authore. Ejus etiam usus est in Gallia pro Turbith. Folia huic Thapsia, inquit Imperatus, sed latiora: flos luteus, semen longum, latum, sapore medicamentofo: radices crassæ, lac habentes, externæ nigrae; internæ albæ, amaræ cum aliqua acrimonia. Idem postea vocat Thapsiam latifoliam, à multis pro Turbith usurpatam.

Trinac-

chria

Turbith

Ferula coli.

Ang. epist. 14. dicitur Thapsia Trinacchria, abundans in Apulia & Sicilia, ubi eam vocari refert Turbith & Ferulam coli.

Gesn. h. Thapsia Rurpodij, Thapsia vera in Gargano Apuliz monte, semine inter ferulacea latissimo: cujus radice aliquos abuti pro Turbit, ac propterea Turbit montis Gargani vocari testatur.

Cam. ep. p. 948. & h. u. l. 3. c. 139. juxta figuram Thapsia à Gesnero exhibita, figuram habet signatam num. 5.

Frater, uti dictum ante, mihi pulcherrimam hanc plantam inter ferulaceas, ex Italia allatam communicavit unà cum semine, quod ferui in horto E. C. Montbelgardi, quod tamen ad frugem non pervenit, licet Gesnerus olim sibi Tiguri provenisse à semine dicat, sed quæ primà Hyeme perierit. Hanc in regni Neapolitani monte Virgineo Campaniz, & in monte Gargano Apuliz reperiri refert Imparatus.

DE GALBANO VETERVM.

CAP. XXIV.

G Albanum liquor est nascentis in Syria Ferulæ: *Disco-*
tid nonnulli Metopium vocant [succum est Feru-
la in Syria nascentis, quam quidam Metopium vocant,
Corn. Et hac lectio verior videtur, ita enim græca sonant.
Χαλκάβη ὀπὸς ὁπὲρ τὰς ἄλλας ἐστὶν Συρία ἡ συνήθης τῷ μάρτυρι
καλῶν.] Est in hoc genere probatissimum, quod *Delectus*
Thuris, aut Hammoniæ [hoc vocabulum in *Disco-*
exempl. non legitur, sed à Sarraceno additur, cuius hac
versio est.] præbet effigiem [speciem, melius legit
Corn. in Græco est χαλκάβη.] grumofum [χονδρῶδες]
purum [καθαρόν] pingue [λίαντον] minimè ligno-
sum [ἀξύλον] nonnihil retinens admixti seminis,
ac ipsius quoque Ferulæ [καὶ τοῦ ῥαβδίου τῆς ὑπερῆς]
odore gravi, neque valdè humidum, neque etiam
penitus aridum. Admixtis resina, Faba stefa & *Adulter-*
Hammoniaco adulteratur. Excalfacit porro Gal-
banum, urit, attrahit, atque discutit: menses ac
partus trahit appositum vel suffusum: lentigines cum
aceto & nitro illitum tollit. Devoratus autem
ad tussim veterem, spirandi difficultatem, suspi-
ria, rupta atque convulsa. Cum vino quoque
[aceto leg. οὐδὲν] & Myrrha [καὶ μύρρα] epotum
toxico adversatur. Sed & simili modo sumptum
partus mortuos extrahit. Imponitur & lateris
dolori atque furunculis. Comitiales, vulvæ stran-
gulatus & vertiginosos olfactu suscitatur. Si ura-
tur, fugat nidore venenatas bestias, ac perun-
ctos itidem ab illarum morfu vindicat: serpentes
cum Spondylis & oleo admotum necat. Den-
tium dolorem oblitum, aut cavernis inditum se-
dat. Prodesse quoque difficulter meientibus ex-
istimatur [δοκεῖ δὲ καὶ δυσμενέσθαι πρὸς αὐτὴν] sed & ad
potiones, amaris Amygdalis & aqua, aut Ruta,
mulsæve aut calido pane resolvitur: aliàs verò
Meconio, æræve usto, aut felle liquido. [aliàs ve-
ro in Meconio &c. legendum se speciatim Marcell.] Porro *Purgati-*
si Galbanum purgare voles in ferventem aquam
demittito: nam ubi liquatum fuerit, lordes ex par-
te fluitabunt, quas ita faciliè separabis: dein Galba-
num ipsum mundo, raròque linteo illigatum in æ-
rea pyxide aut fictili vase ita suspendito, ut ne fasci-
culus nodulòve vasis inum contingat, opertum-
que vas in servidam aquam demittito. Sic enim
quod utile præstantiusque fuerit, veluti per co-
lum eliquescet [ἀποσπῆσθαι. pro quo Lac. ex ver. cod.
ἐκ τοῦ ἀγγ. ἀποσπῆσθαι] lignosum verò quicquid
fuerit intra linteum remanebit. Arborem autem
Galbani & non ipsum Galbanum (ut Sarracen. in
Dioscor. legit.) Metopium vocari, testatur ipse
Dioscorides lib. 1. cap. de Metopio. Preparatur,
inquit, & in Ægypto unguentum, vernaculo no-
mine Metopium dictum: scilicet propter Galbani
permissionem. Lignum enim è quo Galbanum
manat, Metopium Ægyptiis vocatur. Ex oleo
omphacino & Amygdalarum amararum [ἀμυγδα-
λῶν πικρῶν] Cardamomo, Schœno, Calamo, mel-
le, vino, Myrrha, Balsami semine, Galba-
no, & resina [Plin. Terebinthina] componitur.
Proba-

Purgati-
GalbaniVernacu-
lum Meto-
pium.

Delictus: Probatur quod graviter olet, ac pingue est, quodque Cardamomum & Myrrham potius quam Galbanum respicit. Vehementer autem calcacit, adurit, ora vasorum aperit, attrahit, ulceraque expurgat. Ad nervos & musculos præcisos efficax est, itémque ad aquosos ramices, septicis [*vulg. cod. omittit. sed cum Corn. omittit ex Pal. cod. legendum & subintelligendum quod dicitur*] emplastris adhibitum. Malagimatis etiam ac ceratis inseritur. Rigoribus quoque ac retrorsum curvato corpore convulsis conducit. Ciet & sudores, atque uteri vasorum oscula reserat, ejusdemque duricias laxat. Atque in universum molliendi vi præditum est.

Plinius: Dat & Galbanum Syria in eodem Amano monte è Ferula, quam [*hanc vocem omittendam censet Dalech.*] ejusdem nominis resinæ modo [*hic omittam vocem, quam reperit Dalech.*] Stagonitin appellant. [*Ferulam hanc Theophr. l. 7. c. 9. paco vocari tradit.*] Quod maximè laudant, carulaginosum, purum ad similitudinem Hammoniæ [*Thuri D. si.*] minimèque lignosum. Sic quoque [*si hoc*] adulteratur, faba, aut Sagapeno [*Hammoniaco Diosc.*] Synerum si uratur, fugat nidore serpentes. Permutatur in libras v. [*U. M. & C. H.*] Medicinæ hoc tantum: Plinius l. 12. c. 25. Et l. 24. c. 5. de Galbano dicit: Neque humidum, neque aridum probatur, sed quale docuimus. Per se bibitur ad tussim veterem, suspiria, rupta, convulsa. Imponitur ischiadicis, lateris doloribus, panis, surunculis, corpori ab offibus recedenti, strumis, articularum nodis, dentium quoque doloribus. Illinitur & cum melle capitis ulceribus. Purulentis infunditur auribus cum rosaceo, aut Nardo. Odore comitialibus subvenit, & vulvâ strangulante, & in stomachi defectu. Abortus [*immaturus parvus Dalech.*] non exeuntes trahit appositum vel suffitu item ramis [*radiculis, Dal.*] ellebori circumlitum atque subiectum. Serpentes nidore urentis fugari diximus. Fugiant & perunctos Galbano. Medetur & à scorpione percussis. Bibitur & in difficili partu fabæ magnitudine in vini cyatho: vulvæque conversas corrigit. Cum myrrha autem & in vino mortuos partus extrahit. Adversatur & venenis, maximè toxicis, cum myrrha & in vino. Serpentes oleo & Spondilio misto tactu necat. Nocere urinæ existimatur. Idem dixerat l. 19. c. 10. culices Galbano accenso fugari.

Galenus: Galenus, Galbanum succum plantæ ferulaceæ esse dicit, mollientis & discussoriæ facultatis, quod sit in calefaciendo, ex tertij ordinis initio, aut secundi complementi in siccando verò, ex secundi initio. Et hæc tradit lib. simpl. Libro verò 1. de antid. c. 2. ait. Cæterum, Panacis succus simile quicquam non habet Chalbanæ particulæ cuidam albiori. Nam Chalbanæ pars quædam revera in Sagapenum transit, quæ spumosa est & lævis. Quædam verò Chalbanum optimum est Sagapeno æmulum. Densum autem hoc est, & reliquo Chalbano longè magis compactum, quo uti debemus, ceu optimâ Chalbanæ particulâ. Quoniam verò ad Sagapenum ex Chalbano transire diximus quodcumque spumæum, constans & album est, humorique immixtum faciliè diluitur.

Marcellus: Ubique, ut suavi carmine cecinit Lucretius, surgit amari aliquid, quod in ipsis floribus angat; neque habet natura aliquid tam amabile, aut fortuna tam lætum & hilare, ut non contiguum, conjunctum, hærensve aut mixtum illi sit, quod ingratum corpori, aut animo triste, malo doloris sensu hominem torqueat. Et ostendit ea hoc in voluptatibus: ostendit & in Galbano, quod in Syria nascens, odoramentorum omnium secundâ genitrice, ingrato odore hanc regionis ejus felicitatem turbavit. Nisi sortè, quæ in agendo sagax natura est, Galba-

num Balsamo, Cassiæ, Cinamomo, Calamo, Iuncto, aliisque odoratis pluribus, miscuerit, itèdèque locis nasci voluerit, ut quantum ingrati odoris ex terra Galbanum in se traxisset, tantum purioris odoris illis relinqueretur, damnareturque una Galbanæ ferula, ut feliciùs cætera agerent. Quod & hortos conferentibus consilium aliquando est, malè & graviter odoratis plantis eodem loco confitis aliarum odores augere. Nihil tamen sic etiam à natura damnatum inutile homini penitus genitum est. Habet enim, ut cætera relinquam, inquit Marcellus, suas vires & laudes Galbanum, solum, auctore Theophrasto, graviter odoratum in Syria nascens, potènsque præter alia, quæ illi à Dioscoride, Plinio & Galeno tribuuntur,

Galbanoque agitare graves nidore chelydros,
ut Maro cecinit Georg. l. 3. & Nicander. Item Georg. 4.

Hic iam galbaneos suadebo incendere odores.

Potuit quondam etiam, ne bellorum & fortunæ gloriæ & honoribus careret, oppida expugnare, illitumque liquore suo sacibus Hispaniæ oppidum frustra diu oppugnatum, succendere, eaque victoriâ Romanis civibus gentile nomen exsedare, quod non multò post à Domitij Neronis turpi & superbo principatu inter Cæsares coleretur, essentque à Galbano, quo usi in incendio oppidi in Hispania fuerant, Galbæ Romana gens per Cæsarem suum toto orbe clari. Ex quo non parvum Galbano honoris accessit incrementum.

Nos hæcenus à fortunæ gloria laudatum Galbanum ad naturam transferimus. Primumque illud legentes monemus, non Thuri tantum, sed Hammoniaco quoque liquori simile Galbanum Plinium dicere, indèque fieri, ut deesse Dioscoridi id suspicemur. Quod præterea in hoc autore legitur, Toxicum aceto [*αὐτὸν*] mederi, ex veterum meliorumque codicum fide cum vino verti, persuadente id Serapione, Avicenna, & maximè Plinio. Fecit etiam hujus scriptoris auctoritas, accedente eadem veterum codicum fide, ut quod erat *δακτύλιος* *δὲ σπονδυλίου*, quod significare videtur, facere ad urinæ angustias, ad contrarium sensum deriveretur, indicaretque urinæ nocere, & ejus angustias facere. Et præter Plinium, meliores græci codices his verbis remdocent. *δακτύλιος δὲ σπονδυλίου*, q. e. credi urinæ angustias facere Galbanum. Ostendunt præterea iidem antiquiores Græci, non legi *πυκνόν*, q. e. fordidum, sed unâ tantum mutatâ literâ, *λυγρόν*, q. e. pingue. Variat tandem à Dioscoride Plinius. Hic enim cartilaginofum dixit, quod is *γρόνδρος*, gumosum ac granosum vocavit. Et tale sanè Thuris speciem refert. Hic per se bibi ad tussim veterem dixit, quod is devorari scripsit. Neque enim per se bibi potest. Hic serpentes oleo & Spondilio mixto tactu necare dixit, pro eo quod in Dioscoride legitur, *αὐτὸν ἀνὰ ὀλέον* *δὲ σπὸνδυλίου*, *ἐπιπλάττειν*. Et ex neutro satis intelligitur justus usus, quomodo vel tactu, vel *ἐπιπλάττειν*, serpentes necet. Quare Cornarius vel *ἐπιπλάττειν*, vel *ἐπιπλάττειν* legendum arbitratur, ut de Galbano cum oleo & Spondilio resperso accipiat. Sed nunc & illud patet, Dioscoridem, Metopium esse lignum, ex quo Galbanum generetur, dixisse. Et postea, Ferulam in Syria nascentem tradidisse, quam Metopium aliqui vocent, ejus liquor sit Galbanum. Hæc autem Plinium palam arborem fecisse. Sed hujus verba l. 12. c. 23. sic jacent, ut ea arbor non Galbanum, sed Ammoniaci lichrymam stillare intelligatur. Quomodo denique à Galbano Metopium unguentum appelletur, ambiguum est cur oleum amygdalinum Metopium vocari alibi dixerit, q. Galbanum non recipit. Nec aliud sanè putavit esse Netopon Cornar. ad

Veterum auctorium collato.

Metopium lignum Metopium Ferula.

Ammoniacum cum.

Netopon

Hippocratem sæpè usurpatum, quàm hoc Metopium unguentum, etiam si alijs ipsum Galbanum eâ voce accipiendum censeant. Illud verbo dicendum, Dioscoridem *συντάξι* emplastra erodentia appellasse. Præter *Λιχνοειδής* videtur legisse Serapio *ἡ ἀμμοειδής ἐμφορής*. utriusque enim & Thuris & Hammoniaci meminit. Sed & Plinius quoque Galbanum vult esse ad similitudinem Hammoniaci. Fortasse autem in dictione hac (*τοῦ σπέρματος ἢ τοῦ γάρβου*) rejecto *ἢ*, legendum *σπέρματος ἢ γάρβου*. Nam & Aëtius in electione simplicium, probatissimum censet Galbanum, quod seminis aliquid admixtum retinet, neque *τοῦ γάρβου* mentionem facit. Ac ut verè dicam, ait Sarracenus, pugnantia scribere videtur Dioscorides, dum probat id Galbanum cui aliquid Ferulæ sit admixtum, cum antea probasset *ἄζυλον*, h. e. minimè lignosum, seu, ut Celsi verbis utar, quod est sine furculis: nisi *ἄζυλον* dici velimus, quod minimum habeat lignorum seu furculorum. Galbanum ab odore gravi [*ὁσμή βαρεῖα*] quo præditum est, Nicander in theriac. *βαρύδμον* cognominat. Lectionem *δυσκείαν*, pro *δυσκέρει* *πατέω*, sc. Lacuna quoque in veteri codice legisse annotat, neque hanc lectionem ratione carere subdit: quandoquidem quæ vehementer diuretica sunt, uti etiam Cantharides, interdum lotium supprimunt ratione exulcerationis, quam vesicæ ipsiusque collo imprimunt. Equidem quamvis præterea Serapionem, eodem quo illi modo legisse animadverterem, de immutanda vulgata lectione malui liberum esse suum cuique iudicium. Marcellus denique & Lacuna ex antiquioribus codicibus pro *ῥυπαρὴν, λυπαρὴν* restituendum existimant: maximè cum pinguiâ, tanquam æthereâ, ferè supernarent. Sordes verò, cum terrenæ substantiæ magis participes, gravitate suâ subsidere soleant. Sed quoniam in Galbani, quantumvis legitimi, sordibus exiguum lignorum, furculorum, cæterorumq; id genus suâ naturâ levium, non minimam portionem conspicimus: non est dubium, quin si Galbanum aquæ ferventi demergatur, ejusmodi levia unâ cum pinguitudine quadam fluent: id quod ex *αἰσθησέ* facile est unicuique animadvertere. Quamobrem nihil immutatum. Legit ultimò Lacuna veteris cujusdam codicis autoritate fretus *ἡ εἰς ὁδόν τινος καὶ τὴν ἀφ' αὐτῆς*, &c. quippe Dioscoridē existimat præter illam priorem, alteram hoc loco purgandi Galbani rationem tradere, quam ceteri cum superiore cōfundant. Verùm equidem unicam in toto Galbani cōtextu purgandi rationē à Dioscoride describi existimaverim. Scilicet, ut primùm in aquam ferventem conjiciatur Galbanum, quò quicquid est stipularum aut lignosorum furculorum aquæ innatet, conchæque aut alio id genus instrumento facile detrahi possit: deinde verò reliquum quod subidet in imo, rejectâ sc. aquâ, ad separandam denuò terram, arenam, lignum dēsius, aliudve ejusmodi crassamentum, in vas aliquod per linteum rarum excoletur, juvante in id aquæ calore, quæ in vase duplici effervescat. Tū enim purius Galbanum per linteum in vas subditū excolabitur: crassior verò sordities intra linteum remanebit. Neque verò sit verisimile, quod verba Dioscoridis innuere videntur, id tantum quod innatat exolari debere, ut pinguitudo fluentis à sordibus ipsis secernatur. quippe cū in eo quod subidet, sordium etiam ac crassamentorum non minima portio resideat. Cæterum, pharmacopœia, immo laboriosè ac forsâ apertius, Galbanum purgabunt: dum aceto aliòve accommodato liquore ipsum dissolvunt, dissolutum colo transfundunt, transfusumq; tandem igitur lento decoquunt ad justam spissitudinem. Metopium unguentum modò quod attinet, id totidē verbis ab Aëtio i. Tetrab. serm. i. describitur, itēmq; à Nicol. Myrepsō sc. 16. quot à Dioscoride. At Ægineta l. 8. de re med. singu-

lorum ingredientium pondera & mensuras adjicit. Dubium autem est, utrum ad hujus confectiōē assumantur ipsæ Amygdalæ amaræ, an verò oleum ex iis expressum. Hoc enim posterius mihi magis verisimile videtur, ac Nicolai quoque Myrepsi interpres hoc modo intelligendum existimavit. Quod si ita est legendum hîc velut habetur apud Aëtium, *δ' ἰ- λαινοειδὲς καὶ ἀμυγδαλῶν πικρῶν*, &c.

Cæterum, non possum non illis assentiri (inquit *Nicopon.*) qui hoc unguentū illud ipsum esse asserunt, quod ab Hipp. tum lib. morb. mul. tum etiam sexcentis locis alijs *νεπών*, seu *νεπών* nomine tantopere celebratur: quippe q̃ in uteri affectibus ad induratas vulvæ cotyledonas emolliendas & obstruētas aperiendas, itēq; ad secundas pellendas plurimū ab illo commendetur. Hesychn. in suo Lexico sic quoque habet. *Νέπων, νεπών μύρον συνπιθόμενον ἐκ πολλῶν μέλισσων. ὃ δ' ἐμπεπνισμένον*. Erotianus autē in vocib. Hipp. *νέπων* (sic enim lego, *νὸ νέπων*) exponit, *τὸ ἐκ καρπῶν πικρῶν ἔλασιν*. Galenus in vocib. Hipp. quod ē spinæ Ægyptiæ flore parabatur oleum *μεπών* dictum existimavit, idēmq; *Αἰγυπτιῶν μύρον* Hippocrati dictū. Sed præter Hesychnij auctoritatem, vires quas *μεπών* tribuit Dioscorides, ac eæ quas *νεπών* suo itidem ascripsit Hippocrates, cū eodem planè spectare videantur, *μεπών* seu *μεπών* Dioscoridis, ac *νέπων* seu *νεπών* Hippocratis unum & idem fuisse unguentum evidentissimè testantur. Diosc. cap. de Galbano, non ipsam arborem, lignosamve plantam, è qua Galbanum emanat, sed Galbanum ipsum, h. e. liquorem Ferulæ cujusdam in Syria nascentis, Metopium nonnullis dici refert. Capite verò de Metopio unguento, lignum ipsum è quo manat Galbanum, ab Ægyptiis Metopion appellari admonet. Cæterum *ξύλα* nomine significare videtur *ξύλα* significatio lignosum corticem, qui in ferulaceis cernitur, ipso- rum teneritudine processu temporis in lignum abeunte. Quamvis & pro arbore hoc loco, ut alijs ple- rumque, *ξύλα* vocabulum accipi potuit: nam propter lignosum illum corticem, arborum etiam generi adscribitur Ferula: ac propterea Clearchus inter ænigmata aliam Ferulam dixit esse, *ξύλον ὃ ξύλον*.

Et hæc de Galbano monuisse sufficiant. hoc tamen hîc obiter monendum, ut canes uno loco mingant, locum confricandum esse Galbano, si lac. Faulloux de venat. cap. 8. verum dicat.

Quænam porrò sit Lobelij Ferula galbanifera, nihil certi habemus. De hac verò mox agemus. *Ferula galbanifera. Lob. qual?*

Galbani deniq; nomine plura denotari pro confesso habetur. Tacamahaca liquidem à quibusdam Galbanum dicitur & idem existimatur. De Tacamahaca diximus in H. n. g. lib. 9. circa finem libri. *Tacamahaca.*

Galbanum quoque vocatur genus vestimenti delicatorum, à colore albo ac sub lucido, quod nullos habet pilos: Vnde Juvenal. Satyr. 2. *Galbanum vestimentis genus.*

Carulea indutus sicutulara, aut Galbana raso.

Et hinc Galbanatus nomen simile participio formavit Martialis, i. e. Galbano indutus accipiturque pro homine molli & effeminato: lib. 4. 40.

Lacet occupat Galbanatus in lecto.

Tractationi de Galbano finem imposituris, ejus substituta annotasse quoque conveniat. *Succedanea.*

Sylvius in antibal. Tract. qui pro quo. & Placotomus in pharm. inter alios loco Galbani Sagapenum, de quo hoc libro dicturi sumus, accipiunt. *Sagapenum.*

Holerius in inst. Chir. l. 1. c. 2. scribit, Galbani loco Propolis, veteres Propoli usos fuisse. *Propolis.*


GALBANVM ET GALBANIFERA

Ferula.

Galbanum colore est flavescens, intus forisq; Galbani Unguibus subinde ex albo viridanibus, seu asper. cotnei

Diosc. sibi
conferat.

Purgandi
Galbani
ratio 1.

Doler.
plant.

cornei coloris asperis, substantiâ molli & ceræ instar ductilis, sapore amaricante cum acrimonia, odore vehemente & cum gravitate quadam viroso.

Galbaniferâ Ferulam sic describit Lobelius. Oritur in hortis nostris hæc pervenula planta semine copioso lato, foliaceo, aromatico, reposito Antuerpiæ in Galbani lachrymâ. Tota facie Ferulam refert: folia ex lia: flosculi item

in umbellis hilarioribus: radix crassa, succo prægnans.

Hanc in Obs. p. 451. item in Ic. p. 779. Galbaniferam Ferulam vocat. Quænam autem sit hæc Lobelij planta, nondum perspectum habeo. Frater C. B. refert, ni fallor, ad eam, quam vocamus Ferulam glauco folio, quod ego asserere non ausim.

Apud Lugd. pingitur p. 755. hæc inscriptione: Galbanifera Ferula Lobelij. Pona tradit hanc Galbaniferâ Ferulam Lobelij in montis Baldi horto repertam.

De Galbano autem à nobis descripto loquitur Cord. in Diosc. l. 2. c. 97. Galbanum verum, inquit, eodem nomine à pharmacopolis cognoscitur, estque Ferulaceæ cujusdam plantæ, Metopium appellatæ, liquor. Corn. in Diosc. l. 3. c. 85. Officinis & notum & in usu est Galbanum veteri sua appellatione conservatum. C. Bauh. phy. & pin. inter succos inspissatos secundo loco vocat Galbanum, ut & Clus. in fine Dod. gallici.

Cels. l. 7. c. 51. ait Galbanum succum esse pinguem, non tamen oleo solubilem, sed aquâ: mediâ quodammodo naturâ constantem inter gummi & resinam: accendi enim igne, ut resinam humore aqueo solvi ut gummi: tactu mollescere ut ceram: colore esse ex rufis sublivido, odore valido, medicato. Adferri autem ex Orientalibus. Dioscoridem succum Ferulæ vocare.

DE AMMONIACO VETERVM. CAP. XXVII.

Diosc.

Agafylla.

Thrausina.

Phyrama.

Fucus.

EST & Hammoniacum, Dioscoride ita referente, Ferulæ liquor, quæ in ea gignitur Africæ parte, quæ est juxta Cyrenen. Totus cum radice frutex Agafyllis appellatur. Maximè probatur, quod bene coloratum est, ligni & calculorum expers [& ἀγύλλης ἡ ἀγύλλη. hu. veteres quidam codices carent] Thuris glebarum granorumve similitudine, sincerum ac densum, nullâ sorde spurcatum, Castoreum odore imitans [vet. ἀγύλλης τῆς ἰσχυρῆς ὁδὸς ἐστὶν] & gustu amarum. Hoc genus thrausina, quasi fragmentum, seu friaturam dicas, appellatur: alterum, quod terræ calculorumve est particeps, phyrama, id est, mixtura seu miscella. Gignitur verò succus is in Libya, juxta Hammonis templum, è ferulacea stillas arbore. Vim habet molliendi, attrahendi, calfaciendi, atque duritias & panos discutendi [& παραπληρῶν, διασπαστῶν, vet. pro hu. diu. vultu cunctum legit.] Potum alvum subducit [Lact. n. legit ex vet. cod. παραπληρῶν, διασπαστῶν] partisque extrahit: lienem verò consumit cum aceto drachmæ pondus.

Tom. III.

dere haustum, & ab articularum convulsiōumque doloribus liberat. Auxilio quoque est anhelantibus, orthopnoicis & comitialibus: item quibus humor intra pectus hæret, si ex melle delingatur, aut cum pituitæ succo sorbeatur. Cruentæ etiam urinas pellit; nec non & oculorum albugines abstergit, & genarum scabritias absumit. Tritum autem ex aceto & impositum [vet. ἀγύλλης]. In quibusdam codicibus legi annotat Marcellus πῶς δὲ Thenis, jocinorūque duritias emollit. Sed & tophos seu nodos dissolvit, qui circum articulos occalluerunt, cum melle adhibuitum, aut etiam pici admixtum. Facit & ad lassitudines, & ischiadas si additis aceto, nitro & cyprino oleo acopi vice, perungantur.

Æthiopiz subiecta Africa Ammoniaci lachrymam stillat [inquit Plin. l. 12. c. 23. inde & nomine etiam ab Ammonis oraculo, juxta quod gignitur arbor, quam Metopion vocant] resina modo aut gummi. Genera eius duo, Thrausina, masculi Thuris similitudine, quod maximè probatur. Alterum pingue & resinosum, quod Phyrama appellant. Adulteratur harenis velut nascendo apprehensis. Igitur quàm minimis glebis probatur, & quàm purissimis. Idem Plin. l. 24. c. 6. de eodem repetit, usumque medicum his verbis recenset. Similis Ammoniaci natura, atque lachrymæ probatio ut diximus. Mollit, calefacit, discutit, dissolvit. Claritati visus in collyriis convenit. Pruritus, cicatrices, albugines oculorum tollit. Dentium dolores sedat efficacius accensum. Prodest dispnoicis, pleuriticis, pulmonibus, vesicis, cruentæ urinae, lieni, ischiadici potum. Sic & alvum solvit. Articulis & podagræ, cum pari pondere pici, aut ceræ, & rosaceo coctum. Maturat panos, extrahit clavos cum melle. Sic & duritias emollit. Lienem cum aceto & cerâ cypria, vel rosaceo efficacissimè imponitur. Lassitudines perungi cum aceto & oleo, ex quoque nullo utile.

Ammoniacum succus est Ferulæ cujuslibet, inquit Galenus. Habet hoc mulieris diuim interitum, ut & articularum tophos dissolvat, & lienes induratos sanet, & strumas dissolvat.

Ammoniacum tunc qui Agafylla, qui Cnotheus qui Ehustru appellant, teste Marcello. Romanæ Guttam ammoniacam dicunt. Habet verò salem, habet & liquorem medicina Ammoniacum. utrumque ab harenis, sed diversâ ratione dictum illud quidem quod sub harenis concreseat & inveniatur. Hunc quod in harenosa Libya ad Ammonis Iovis templum ex Ferula in harenas destillet, & ut in Thure sit, concretis grumis inter eas inveniatur. Græci ab harenis, quas ἀγύλλης dicunt, utrumque indicaverunt, sed illud salem, hunc liquorem Ammoniacum, quasi arenosum vocantes: gravi periculo miscendi simul diversa, nisi eorum exemplo discrimen aliquod ex rei substantia addatur. Quod timens Marcellus, ut illum salem suo loco: sic hunc Guttam Ammoniacam vocat: quasi & hic quemadmodum Thus stagonias aliquando dictus fuerit, quæ vox in græcis stillicidium & guttam significat. Plinius Ammoniaci lachrymam eiusdem rei significatione appellat; Græci Ammoniacon simpliciter, ut tunc erat eius vocis æstimatio, vocant: fugiensque æquivoca appellationis periculum Marcell. Guttam Ammoniacam dixit lachrymam, liquoremque significantem Ferulam quæ privatim in Libya ad Ammonis Iovis templum tunc nasci ferebatur. Quæ sive ab harenis, sive ab Ammonis Iovis templo vocari dicatur, eandem rationem habet. Quoniam & Deus, qui inter eas arenas colebatur, mortalibusque respondebat, ab illâ arenis nomē à Græcis invenerat, idemque Cnotheos à forma eius, qui auctu-

no capite pingebatur, eadē hæc Ferula liquorque eius pariter dictus est. Ceteræ eius appellationes barbaræ sunt, idemque omnibus incognitæ. Posteriores Græci

Guttam ammoniacam, Marcellus. Cnotheus. Cnotheus.

inter odoramenta, & quæ ad odorem vaporarentur, numerantur *Thymiamata*, *Thymiamata* vocabant. Quod in antiquis variat in Ammoniaco, hoc odor est, quem castoreum sentire Dioscorides ait; Galenus verò *Castoreum*, i.e. Coriandrum, nisi ex vicinitate vocis in alterutro vitium sit. Vtebatur hoc remedij genere multum antiquitas, contra durities, panos, furunculos, & inguina. Patetque hoc ex eo, quod Dioscorides non procul à fine dixit. *ἀντιπυρρὸν ὁ καὶ τῶν ἐν τῇ ἀντιπυρρῷ, &c.* q.e. ut Marcell. & nos vertimus, finire tritum ex aceto impositum, &c. nisi antiquiores græci codices non *ἀντιπυρρὸν*, sed *πομπῶν* [*posandum*] haberent. Nos contra cum nunc aliorum lectionem nihil mutavimus, reliquimusque Medicis de diverso remedij ejus usu etiam post hac censendum.

Notandum tamen hoc quoque, Metopion arborem à Plinio dici, ex qua Ammoniaci lachryma distillat: quum Dioscorides Ferulam, ex qua Galbani succus est, Metopium appellari dixerit. Deinde vocem *ἀντιπυρρὸν* in Plinio, & *ἀντιπυρρὸν* in Dioscoride, nihil nisi fractum, fragmentumque ac fracturam significare: sicut *ῥιζώματα* mixturam, à qua nihil decessit, teste Cornario.

Miratur Brassavolus in exam. simpl. Paulum Aegietam, qui inter odoramenta Ammoniacum numeraverit, quod odor ejus gravis sit. Nescire se quoque fatetur, cur Galenus odorem Coriandri dixerit, cūque Paulus ad odorem Ammoniacum accendat.

Diversum tandem putat Ammoniacum Pauli & Galeni, à Dioscoridis, quod gravem odorem ut Castoreum habeat. Et sanè quod de re diversa loquantur, hoc signum est: quia in simpl. med. facult. ea dicunt, quæ à Dioscoride in Ammoniaco tractantur. Ammoniacum apud Averroem calidum est in prima parte tertij ordinis, & siccum in primo. Avicennæ autem calidum in fine tertij. sed Averrois potius favere statuit Brassavolus, qui verum Ammoniacum nobis non deesse scribit, quamvis antiquum fortè esse & adulteratum non neget. Quod verò officinarum Ammoniacum adulteratum esse quis suspicari possit, frustra illa faciunt, quæ in modum massæ cujuscumque composita à pharmacopolis ostenduntur, non ad Thuris similitudinem in grumos concreta, & in minutas glebas (ut Diosc. scribit) coacta. nisi fortasse Dioscoridis verba ita intelligenda sint, quod particulæ illæ ex quibus Ammoniacum, quale in officinis habetur, diversitate quadam, quæ in eo est, Thuri comparatum, illius similitudinem representet. Sed argumenti hujus solutio (ut ipse Mundella fatetur) ingenium magis quàm veritatem ostendit.

Nunc quod ad Armoniam pertinet, barbarè quidem Armoniacum dicitur. Rectius autem dicendum est Ammoniacum, ab Ammone, juxta cujus oraculum &c. Sed notandum quod hoc nomen, scilicet Ammoniacum, est commune ad plura. Unde etiam quoddam sal Ammoniacum dicitur, de quo nobis sermo non est. Et licet Ammoniaci succus à Romanis Gutta dicatur: tamen pro Gutta simpliciter scripta à doctis secundum Monachos, non Ammoniacum quod malè ol. t.: sed stræte sive styax liquida intelligitur. Et non per hoc, quia ipse Dioscorides dicit, quod ex Ammoniaco fit Thymiamata, intelligatur, quod Ammoniacum suavè oleat: quoniam antiqui in Thymiamatis compositionibus, multa olfactu horrida immiscebant. Et ipsemet Dioscorides declaravit malum odorem, dans Castorei similitudinem. Et res ipsa olfactentibus maximum veritatis rei præbet testimonium: ex quo igitur non dubitant Monachi ipsum esse verum, quo utebantur, adulteratum tamen supplerendum volunt.

Ceterum, quando absolutè scribitur Ammoniacum, Gummi non sal accipiendum.

Ammoniaco thymiamate deficiente, substituit *Propolis*. Fuchsius L. de compos. med. in succed. Propolim.

Pro Ammoniaco thymiamate quidam intelligunt Anime in Castilia dictum, Lat. in Diosc. l. 3. c. 92. De Anime H. n. g. lib. 9.

Ammoniacum misceri à quibusdam cum Benzoino, palam fecit Levin. Le. an. de herb. bibl. cap. 21. his verbis. Gutta, thymiamata Ammoniacum, Cyrenaicum, vel Syriacum succus, quem Benzoi vocant, &c.

AMMONIACVM.

Ammoniacum in magnas glebas coactum advehitur, ex grumis magnis congestum, unguibus lactei coloris nitentibus, aut rufis, permittis per substantiam coloris obsoleti & ferè fuscis, ut Benioini mistioni & unguibus non ineptè possit comparari, sapore amariante, odore Galbani virosiore. sub dentibus facile deducitur sibi coherens, magisque albescit: carbonibus injectum in flammam exardet. puræ adferuntur massæ, nunquam aut rarè quicquam sordium admistum habentes, rarenter enim invenitur semen foliaceum Anethino majus, & plantæ fragrantia nervosi, sed mollæ.

Ammoniacum hî à nobis descriptum, quidam genus esse negant, quidam verò probant, quorum sententiam ut vetiorem & nos cum Aloisio Mundella, Corn. Cæf. & Cordo amplectimur. Mundellæ verba ante adscripsimus, Cordi verò sic habent in hist. l. 4. cap. 105. Hammoniacum, seu gutta Hammoniaci, à veteribus etiam Hammoniacum Thymiamata appellatum, nunc verò corrupto nomine Armoniacum, ferulaceæ plantæ Agasyllus nominata, & in Lybia harenis, atque circa Hamonis Iovis delubrum nascentis densatus liquor est, densis solidisque grumis, in massas compactus, Thuri non dissimilibus, foris flavis, rufis, aut in fusco flavis, intus autem candidis, aut subcandidis, nitidis & splendens. Odore ferè Galbarum paucos Castoreo mixtum referens, gustu amarum. Eligito sincerum, minimè harenosum, omninò purum, majoribus grumis, foris flavis aut croceis, intus verò candidioribus congestum, cum accenditur, claram flammam alens, & repentino ictu propter densitatem aridiorem in plures splendas, nitentesque micæ diffiliens, & cum manibus tractatur, cum lentore mollescere, quod hujusmodi fuerit Thrausina à Dioscoride vocatur, quæ verò minoribus micis est, & arenis plena, ab eodem Phyrama dicitur. Affer-

tur ad nos sincerum & valde purum, omnibusque bonitatis notis commendabile: nonnunquam tamen semine suo permixtum, quod latum, duplexque est, veluti Anethi semen, sed majus. Resolvitur ad medicamenta quemadmodum Lacerpitium. Hæc Cordus loco citato. Is in Diosc. l. 3. c. 98. interpretes illos erroris arguit, qui apud Galenum duas has distinctiones, *Ammoniacum* & *Duplex*, virgulâ distinguunt, diversas res falsè intelligentes.

Ammoniacum (inquit Cæf. l. 7. c. 52.) inter succos pingues est, aquâ solubiles, consistentiâ aridioris ceræ, exterius flavum, intus candidum, crassius guttis constans. Sapor inest primo gustui suavis, postea subamarus, odor incensibilior Galbano. hujusmodi affertur inter merces orientales. Dioscorides tradit succum esse Ferulæ aut Ferulaceæ arboris.

Paulus, Aëcius & reliqui Medici Græci, attestante hoc Cornario, Ammoniacum Thymiamata vocant, Latini Guttam dicunt: In officinis nomen retinet, etiam si quidam barbarè Ammoniacum pronuncient. Arab. appellatur *Raxach*, aut *Azch*. It. *Ammoniac* & *Armoniac*. Hisp. *Aguaxaque*, & *Armoniaque*.

Ammo-

Ammoniacum hoc illegitimum censet Matthi-
lus, dicens: Ammoniaci lachrymam officinæ, muta-
tâ unâ literâ Armoniacum vocant. Cujus tamen
sincerissimæ parum ad nos [*Senenses*] convehun-
t, qui ex Alexandria Egypti cum mercimoniis Vene-
tiæ redeunt. Quandoquidem rarissimum Ammo-
niacum vilitur, quod suis minutis glebis Thus refe-
rat. Nam omne ferè quo officinæ usuntur, picæ re-
sinæ modo in massam compactum cernitur, impu-
rum, ac quàm plurimis impostorum adulteris vi-
tium. Ut hinc facile dici posse putaverim, hoc vel
illegitimum, vel saltem deterius esse, idque fortasse,
quod Dioscoridi Phryana nuncupatur.

syn. C. B. Bauh. pin. Succus inspissatus 1. Ammoniacum ut
Cz. Ammoniaci lachryma, Matth. Ammonia-
cum officinis & Gummi ammoniacum.

DE DAUCO VETERVM. CAP. XXVIII.

Daucus ut refert Dioscorides, ab aliis Diræum
vocatur [*δαίρειον* si *δὲ* *καὶ* *καρπὸς* *ἀνθρακῶς*. *Matthell.*
Trag. Corn. legit δαίρειον, Daucis m.] At Creticum
quidem foliis est Fœniculi similitudine, ac minori-
bus atque tenuioribus [*κατὰ πλάτος*. *Plin. legit ἀλόπερα*]
caule dodrantali, umbellâ Coriandri, floribus can-
didis; atque inter hos semine aceti, albo, hirsuto, ac sua-
vis in mandendo odoris [*ἐν τῷ δαμακκῶδαι καὶ δαΐδαι*.
cod. Basil. & Matth. verum cat. legit δαΐδαι ἐν τῷ δαμακ-
κῶδαι καὶ δαΐδαι.] Radix est digitali crassitudine, &
dodrantis [*palmi Corn.*] altitudine. In saxosis aprici-
que locis provenit. Alterum verò genus est Apio
silvestri simile, aroma olens, acre, odoratum, serven-
tisque gustûs. Probavissimum est Creticum. Ter-
tium præterea genus est, floribus Coriandri, albis,
capite & semine Anethi [*καρπὸς* *ἡ* *δὲ* *ἔχει* *καὶ* *καρπὸς* *ἀνθρακῶς*.
Matth. σπέρμα *ἔ* *καρπὸς* *ἀνθρακῶς* *αὐτὸς* *ἴσθαι*] umbellâ
verò in capite seu Pastinacæ [*καρπὸς* *ἀνθρακῶς*] semine re-
fertâ oblongo [*ἐν τῷ δαΐδαι*. *hæc contra venit semine An-*
ethi] seu Cumini, aceti. Omnium semen excusfaciendi
vim habet. Potum mentes, partus [*ἡ* *δὲ* *ἔχει* *καρπὸς* *ἀνθρακῶς*.
Plin. viderur legisse δαΐδαι, q. asi secundas Corn.] &
urinas pellit, torminibus liberat, veteremque tussim
mitigat. Subvenit & à phalangio demoris in vino
potum, & impositum œdemata discutit. Servinis
duntaxat ex aliis usus est: at ex Cretico & radicis,
quippe quæ maximè contra venenatorum injuriam
in vino bibatur.

Dauci genera ita distinguit Plinius l. 25. c. 9. Dauci
genera quatuor fecit Petronius Diodorus, quæ per-
sequi nihil attinet, quum sint differentia duæ. pro-
batissima in Creta, mox in Achia, & in siccis ubicun-
que nata, Fœniculi similitudine, candidioribus foliis,
& minoribus, hirsutisque: caule pedali recto,
radice suavissimi gustûs & odoris. Hoc genus in sa-
xosis nascitur meridianis. Reliqua genera ubique
nascuntur terrenis collibus, limitibusque, nec nisi
pingui solo, foliis Coriandri, caule cubitali, capitibus
rotundis, sæpè pluribus quàm ternis: radice li-
gnosâ, & quum inaruerit supervacuâ: semen ejus
Cymino simile, prioris Milio, album, acre, odora-
tum omnibus & servens. Secundum priore vehe-
mentius est, idèoque parè tumi debet. Si jam ma-
ximè tertium genus facere libeat, est simile staphy-
lino, quod Pastinacam erraticam appellant, semine
oblongo, radice dulci. Omnia hæc & Hyeme & Æ-
state sunt intacta quadrupedi, nisi post abortus. Ex
aliis usus seminis, ex Cretico & radicis, & magis ad
serpentes. Bibitur è vino drachmâ unâ. Datur &
quadrupedibus percussis. Idem l. 26. c. 5. Daucum &
mentes & secundas potum facillimè pellit. Et ante
l. 19. c. 5. Est & quartum genus [*Pastinacæ*] in eadem
similitudine Pastinacæ, quam nostri Gallicam vo-

cant. Græci verò Daucon: cujus genera etiam qua-
tuor fecerunt.

Et Galenus 2. de alimen. Daucum quosdam silve-
strem Pastinacam dicere testatur. In simpl. verò cen-
su a c. Daucus quem aliqui Staphylinum vocant,
silvestris esui minùs aptus est, quàm sativus, sed in
omnibus vehementior. Sativus autem edi quidem
potest, sed debiliior est. Habent acrem & calidam
vim, & propterea attenuantem Hippocrates m. m.
à in partu, aut ex partu uteri humores contingant,
Dauci Æthiopici radicem ex vino albo, grati odoris,
jejunæ præcipuè præscribit. & paulò post semen, ac
mox etiam Daucum.

Daucon apud Dioscoridem inter appellationes
malè legi vult Marcellus, idèoque ex N. candro in
Theriac. Daucon emendandum. Fuisse præterea
tradit etiam ex antiquis, qui Daucum scriberent,
duòque ejus tantum genera facerent, Creticum &
Asiaticum: Dioscoridem tamen tria. Plutarchum ve-
rò plura. Masculino genere & neutro Daucum dici.

Quia porro non semper, quod Flaccus ait decies
repetita placebunt. Sunt enim quæ iterum tantum
dicta fastidium afferunt, & si quam habuerunt gra-
tiam amittant. Siquidem sumus hoc ingenio om-
nes, ut nihil unquam tam gratum, aut novum sit, ut
non statim placere desinat, & exolevisse credatur.
Et ob hanc causam plura hîc de Dauco non dice-
mus, siquidem non multò post in agresti Pastinaca
tam longè tractetur ex Marcelli sententia, omnis e-
jus historia & ratio. Ex qua poterunt volentes, quæ
in Dauco exiit hîc poterant, novisse omnia. Neque
enim congener, sed idem illi est, & nomine tantum
diversus, si Galeno credendum est. Cordus tamen à
Dauco Pastinacam distinguit.

Nunc verò quod dicendum restat, Dauci nomen
plures sibi vendicant plantæ. Quales sunt: Pastina-
ca silvestris, Daucus vulgò dictus.

Carota secundâ aliquos est Daucus Theophr. Carota.
l. 9. c. 15. & Daucus Staphylinus Gal. lib. simpl. 6.

Antriscus Dalecha npij semine longo Cicutariz,
est Daucus lepiarius Gesn. de coll. stirp.

Daucoides minus Cordi in hist. l. 2. c. 41. sive Dau-
ci genus asperiusculum Gesn. de coll. stirp. putamus
esse eam plantam, cui titulum fecimus, An Antrisco
affinis, semine aspero & hispido.

Caucalidem, teste Dioscoride, aliqui Daucum sil-
vestrem vocant.

Daucus silvestris quorundam Dodonæi gall. l. 5. Lappula
c. 49. ab ipsomet Caucaus dicitur, à nobis Lappula
canaria flore magno.

Daucus *ἐχινόκαρπος* aut *ἐκατόκαρπος* major Cordi
& Thalijs, an Lappula canaria flore minore.

Daucus similis Pastinacæ silvestri quis sit Mat-
thiolo, videant lectores.

Dauco vulgari congener Sefelios Peloponnes-
sis nomine ex Italia Camerario hort. missa, perquam
aromatico semine, foliis pulchrè virentibus, niti-
dissimus an est Sefeli?

Daucus *λαπύλας*, cui Dauci angulosi Cordi
notas plures congruere scribit Thalius, quis sit col-
ligere nondum potuimus.

Dauci genus tertium Fuchsj in iconibus (qui
eandem figuram habet cum Sefeli Tragi) Vîsnagam
existimo.

Daucus tenuifolius Cordo in hist. l. 2. c. 75. (ubi
annotatum, quærendum esse, an hæc sit Caucaus
Matthioli, de quo dubito) qualis sit, ignoro.

Quem Dauci Cretici titulo insignire cum aliis
visum fuit, Daucum Cretensem verum Dioscoridis
esse, plures conjiciunt.

Est nobis Daucus quidam Tiburtinus, de quo se-
orsim dicturi sumus, & ejus folium ad Dauci Cre-
tici radicem separatim pingimus.

*Alou Gul-
gare.*

Cūl Meo vulgari semen sit hirsutum, non est cur Daucum esse credamus.

Mutellina.

Mutellinam esse Dauci aut Cari montani genus credidit Gesnerus.

Quid?

Per Daucum montanum, quem quosdam nullā ratione Wolffewurz (Lupi radicem) vocare refert quid intelligat Gesnerus in descr. mont. Fracti lib. de Lunariis, nos latet.

*An Saxif.
media?*

Daucus Selinoides Cordi, an est Saxifraga media nec est Saxifraga minor, ut voluit Gesnerus.

*An Saxif.
minor?*

Daucus coriophyllus ejusdem Cordi, an est Saxifraga minor?

Quid?

Daucum Cyanopum Cordi, existimat Gesn. esse Pimpinellæ Tragi tertiam & minimam speciem. Sed ejus opinio non approbanda videtur, imò res diligentius perpendenda proponitur. Nostra siquidem est opinio non esse Saxifragam hircinam minimam.

Quid?

Optaremus ut aliquis Apollo nobis diceret, quænam sit planta Daucus coriophyllus Cordi in hist. l. 2. c. 124.

Quid?

Tradit Gesn. de hort. in append. Dauci silvestris genus, quod quale sit, nobis non constat.

*An Pab.
naca jlv.*

Daucus silvestris Galeni Anguillaræ, an Pastinaca silvestris germanica?

*An Cicuta
ria simili.*

Daucoides Cordi minus Thalio, an Cicutariæ similis?

*An Cicut.
latifolia.*

Daucoides minor Cordi Lobelio, an Cicutaria latifolia?

Cicuta fatua.

Dauci inutilis genus in arvis foliis Coriandri Gesn. hort. est Cicutaria fatua.

*An Apium
petraum
Levisticum.*

Daucus angulosi caulis Cord. hist. l. 1. c. 53. an Apium petraum quoddam?

*Libanotis
Theoph.
Dod.*

Dauci secunda species fortassis est Levisticus vulgaris secundum Manardum, & Fuchsum.

*Libanotis
altera Dod.*

Dauci Dioscoridis alterum genus Fuchsi in hist. inscribimus Libanotidem Theoph. Bod.

*Silaum
quorundam.*

Dauci Dioscoridis tertium genus Fuchsi, est Libanotis altera Dodonzi.

*Apium silv.
Dod.*

Dauci speciem, Daucum asininum quibusdam Cordi, vocamus Silaum quorundam.

*An Carus.
folia magna.*

Daucus quidam palustris Gesneri, videtur respondere Apio silvestri Dodonzi, sive Thyrselino quorundam cum lacteo succo.

Hippuris.

Dauci tertia species Tragi (quam sibi nondum cognitam ait) an Carvisolia magna?

Cymidium.

Apud Plinium l. 26. c. 7. Caucon de Anabasi legitur, quam Hermol. coroll. 657. in aliquot codicibus Daucum vocari scribit, ac Hippurin significari.

Dauci semine deficiente, Tract. qui pro quo, Cymidium accipit.

DAUCVS CRETICVS SEMINE hirsuto.

Deser.

DODRANTALI aut altiore est caule, tereti, striato, hirsuto: umbella mediocrius magnitudinis summo caule ramisque extremis infidet florum exiguum, candidorum, pedicellis canescentibus, hirsutisque harentium. semen longum, incanum, villosum, acre, aromaticum: folia lanuginosa, cinerea, minutissimè dissecta, sæpè mihi etiam penitus glabra visa, atrovirentia: radix longa, digitali crassitudine, terram versus comata, sapore Pastinacæ germanicæ. Fuchsiana figura, quia minus bona erat, idèd aliam ex ep. Camerarij parandam curavimus, cui nos solum in inferiore parte adjecimus Dauci Tyburtini.

Lenes.

*Daucum
Matth.*

Daucum vocat Matthiolus in prior. com. legitimumque facit, cumque ex Creta tantum adferri existimavit, ac ait *Daucus* Græcis, ut etiam Daucum Latunis appellari Mauritanis *Ducus*, *Gezar* seu *Ciezar*:



It. *Dauco*: Ger. *Beerzwurz*: Hulp. *Dauco Cretico*: Gall. *Carote sauvage*. In post. com. cum mag. fig. lat. c. 79. Ital. c. 78. eadem nomina habet, sed Daucum primum inscribit. In hist. ger. cum addit. Camer. Daucum inscribit (& sic etiam in epit.) ac silvestris Pastinacæ genus (ein Geschlecht der wilden Pastinachen) constituit, vocatq; Bohem. *Qayworet* aut *Olesnyk* & Caprehungido. Ceterum, is olim non describebat. In hist. germ. & epit. descriptio concinnata potissimum ex Dioscoridis delineatione. Figuram in post. comm. mutavit nonnihil. Nomen germanicum *Beerzwurz* & gallicum *Carote sauvage* non assumendum pro Dauco. Suspicio autè Daucum Matthiolo non bene perspectum fuisse & cognitum, quicquid ejus patrocinatoris statuât de Matthioli Dauco, quasi sit pictura exotici Dauci, & diversi à Dauco Cretico nostrarum Alpium.

Sic namque ait ad hist. Matthioli Camerarius. *Ha-Camer.* bêt offient & Dauci Cretici nomine semen, cujus figuram exhibeo, ut discrimen appareat, inter Matthioli figuram & hanc, quæ provenit in Sabaudicis montibus, non tamen differt à Cretico, nisi quodd minus acre semen sit, nec ita efficax. In epit. p. 536. dicit. Ad Daucum hunc facultates refer, quas Matthiolus suo adscribit, nam figurâ non differt à Cretico, qui ad nos affert solet, viribus tantum eo paulò inferior. In horto nominat Daucum Cretensem vulgarem.

Porò, Matthiolus etsi de tribus loquatur generibus Dauci, unus tamen solummodo figuram proponit, quæ an primi, an secundi, an terti j Dauci sit, non indicat. Non differt tamen à primi descriptione, inquit Turnerus, si odorem, saporem aliâque Dauci vires habeat. Quòd si Italicum sui Dauci nomen posuisset, facilius in ejus cognitionem lenisset pervenire, verùtne an falsus esset Daucus judicare. Ego quidem Daucum primum non memini me videre.

De Dauco Cretensi vero Dioscoridis (ut vocat *Daucum* in adv. p. 323. & Icon. p. 22.) hæc prodidit Lobelius. *Uten sit.* Vt naturæ sic appellationis cum Caucalide videtur particeps Daucus, quem etiam *Diaplyon* vocatum, *Dauphion* à feminis in umbella quasi sursum verruculas & aspergines ostentantis effigie, à qua & viribus communis

munis nomenclatura fuit, diverso alioqui folio à Daucis est: nam quod primum designat Creticum vocatum Dioscoridi, à Selinoide non parùm differt, nectamen id sola Creta fert, quippe germanicæ Alpes non modò, sed etiam Genuensium colles, & Genevensium circa Iuram rupes, hoc Cretico abundant, unde Lugdunum atque alia ad emporia hodie venum deferitur eòq; pluris emitur etiam Venetiis, quia ad Theriacam & similia antidota efficacius est, quovis alio congenere Dauco, cujus folia exilia, inter Fœniculum & Carottam media sunt, umbellis candidis, paribus Anethi: copiosum semen, oblongum, ut Cumini, sed lanugine albidum, gustu acre, odorum, & cujus usus potissimum est: usui etiam radix, quæ Pastinaca minor, gustu fervidiore & odoratio. Huic, quod minus sit Creticum, si quid deest, Solum, Cæ: ùnve erit. Sanè effigie nihil, viribus autem perparum abest. Quo tempore Senensis commentabatur in Dioscoridem in Patavino vireto unam aut alteram plantam alebat, unde ille habuit, quod opinionem illi faciebat, non nisi in Creta oriiri. Hæc Lobel. qui in Obs. p. 416. Daucum Creticum vocat, ut & Pona in Baldo, Calzolar. Ges. h. & ap.

Sed & Cæ. l. 7. c. 15. Daucum Creticum nominat. Semen est, inquit, ex Creta nuper allatum, longius & angustius Fœniculo, candicans, lanuginosum, acre, odoratum: sed ejus plantam adhuc videre non licuit. Describit autem Dioscorides in hunc modum. Daucum aliqui Daucium vocant. Ac Creticum quidem est foliis Fœniculi, &c. Plinius de eodem inquit, probatissimum in Creta, &c. Hoc genus apud nos in collibus saxosis nascitur, herba Fœniculo simillima, brevior, candida: ramis in latera tendentibus: flore candido: semine fæsto, brevi, vulgo Fendifaxum vocant: utuntur pro Saxifraga. Hæc Cæsalp. quem non intelligimus. Si Plinius cum Dioscoride de eodem Cretico intelligendus, de quo ipse, cur novam posuit descriptionem, quæ vulgare Fendifaxum describitur: nec demonstratur qua in re differat ejus semen à Cretico, vel an sit planè simile. considerandum an per Fendifaxum intelligat Daucum Creticum cognominatum licet apud nos proveniat semine non minùs lanuginoso vel hirsuto, quàm ejus quod in Creta crevit.

Lugd. p. 716. Daucus primus Matthioli. Clus. pan. p. 700. Daucus Creticus, cinerei coloris folio, & viribus cum eo, qui in Creta insula provenit, proculdubio conferendus. Cast. *Daum*, Daucum, *Bernur*, germ. *Carotes sauvages* gall. Figura Castoris non placet quamvis fortè verum Daucum intelligat, nomen gallicum & germanicum non convenit.

Ignarus homo Euch. Roësin nescit quid scribat, confundens diversas plantas, wild Moren / Daucum silvestrem & Daucum Creticum. Icon repræsentat Carotam, quæ ante pro Baucia domestica exhibebatur.

Tab. Daucus Creticus, *Candisch Mörenkümel* / *Daum*, *Sauvage*, Arab. *Cefs*, Glossographo Avicennæ *Algufarel*, cæteris *Gezar*. Lat. *Daucus*, *Daucum*, & *Daucium*, (cujus semen Arab. *Beser Algufarel*) Ital. *Dauco* & *Hisp.* Gallis verò *Panet sauvage*. Bohem. *Sayworec* & *Czapü hnyšdo* Belg. *Groenfenecruyt*, Germ. *Mörenkümel*. Daucus Creticus dicitur Serap. lib. de temp. simp. c. 254. *Cartit. n.*

Bauh. phyt. & pin. Daucus 1. sive foliis Fœniculi tenuissimis. Daucum 1. Match. Lugd. Daucum Creticum vocatum. Daucus, Lac. Creticus. Cast. deser. Gesn. & Tab. Daucus Cretensis verus Diosc. Adv. Lob. ic. & Ger. Eid. Bauh. phyt. Daucus 2. montanus [*unde fido l. neque t. 113. addit in pin.*] umbella candida: Daucus Cret. Gesn. h. Cam. apud Matth. & hort. Clus. pan. non solum in Baldo, sed & alpinis Helvetiorum collectus. Daucum montanum, Cæ. Eid. a-

pud Matth. Daucus 1. sive folio Fœniculi: Daucum 1. Matthioli, Lugd. Dauc. Creticus, Cast. Tab. Cæ. Daucus Cretensis verus Dioscoridis, Lob. Item; Daucus 2. sive Dioscoridis, quem Lobel. id Adv. non solum ex Creta legitimum adferri, sed & Alpes Germaniæ eo abundare statuit, ideòque placuit Dauci hujus figuram à Cametario propositam adjicere, quam Daucum montanum umbellâ candida nominò, & Daucum secundum Dioscoridis cenfeo. estq; Daucus Creticus Gesn. & Clusij, Daucus montanus Cæsalpini. Cur Daucum Creticum Matthioli & Lobelij frater Bauh. separet à Gesneri & Clusij Dauco Cretico, rationem non habet, siquidem discrimen non ostendit. Fecit sanè hoc contra mentem Lobelij, id quod ex ejus verbis ante recitatis constat. Variant quidem aliquantulum: nam qui in Baldo foliis est brevioribus compactionibus: qui verò in Helvetiorum alpinis & monte Wasserfall / longioribus & rarioribus: & hujus Gesn. in ap. meminit, quem cum eo in Baldo eundem, aut certè similem, & earundem virium scribit.

Daucus Creticus Montbelgardi in horto E. C. à *Locus cum tempore.* me plantatus semen maturum produxit, quod decidens produit, sequenti anno: satus etiam sequenti anno provenit. Copiosè in monte Salene, & aliis Genevæ vicinis, ubi in horto virebat Februario & Martio, florebat Majo, semen habebat Junio. Inbizarotomus quidam vocabat *Re à l'our & Pausalle saunage*, quod interpretor Radicem ursi & Pastinacæ silvestrem. In præruptis item montium altissimorum rupibus ad Meridiem vergentibus propter S. Vrsinum semine maturo Julio, & in vicinis montis rupibus Sainct Bre vulgò vocant, evulsimus tam glabro, quàm hirsuto folio, Majo florètem & jam tum semina satis magna ferentem. Reperi in monte Wasserfall in descensu versus Balstat / & prius in monte Rhætiæ Braulio florentem Junio, ubi degustatâ radice, videbatur mihi odor & sapor Pastinacæ germanicæ. In montibus Vicentinis hic Daucus plurimus provenit. In Baldo plures legerunt. In Durrenstein frequens, autore Clusio, & Etlichero ubi inter saxa, tenui Solo aspersa, nascitur, ut difficulter ejus integra radix erui possit. Si Tabernomontano credimus, in Italia abundat in monte S. Angeli, Gargano & aliis pluribus. Quæ Lobelius de loco prodidit, vide ante. In montis Iuræ altissimis illis rupibus occurrit, quibus in monte Ducatu Neocomensi Falcones nomen imposuerunt & illis, qui Bernatum ditioni subjacent, & suchet cognominantur.

DAUCVS TIBVRTINVS quibuldam

STUTGARDIA in horto Ducis VVirtembergici S. D. Schvartz demonstravit herbam umbelliferam parvam nomine Dauci Tiburtini, tenuibus foliis, ut Daucus Creticus. Tostanus Carolus pharm. Burgundus misit semen dicti Dauci, quod h. s. fatum erat, ut Dauci Cretici, sed tenuius mihi videbatur. Hoc satum Montbelgardi in horto E. C. non provenit.

Figuram folij Dauci hujus Tiburtini exhibemus cum Dauco Cretico, quod separatim pingi curavimus in inferiore iconis parte.

DAUCVS TERTIVS FOLIO Coriandri flore luteo.

DAUCUS tertius, folia Coriandri, sed minora & Deser. crass. aliquantulum profert, caulem sesquicubitalis longitudinis, flores luteos in umbellis ut Auc-



Synon.

Anethum, seménq;
Cumini. Vere manduntur radices & folia, quæ aromatici gustus sunt. Vulgò appellant *κνρόν*, quod Cornicis pedem significat, ut Bellus ex Creta ad Clusium in epist. scripsit.

Dauci hujus tertij Belli iconem exhibemus ex Ponz Baldo. B. pin. Daucus 12. sive Creticus nodosus umbella lutea: Daucus 3. Creticus Belli, Ponz & ep. ad Clusium.

DAUCVS PETRÆVS GLAV- cifolius.

Deser.

Radix capillata ex defluxis recentibus foliis sapore accedit ad Staphylinum sive Carotam, cum aliqua acrimonia: folia profert tenuiter divisa, sed rarius glabra, colore glauco, è mediocriter brevibus pediculis pendentia: caulis unicus ut plurimum, pedalis ac etiam cubitalis, tenuis per quem plerumque tria parva folia, pediculo caulem amplectentia, ramosus interdum (præsertim si planta sit minus novella) in tres ramulos divisus, in quorum extremitatibus umbellæ parvæ flosculorum alborum, quos subsequitur semen parvum, per maturitatem rubrum, ad Ammi vulgare accedens, aromaticum, cum aliqua acrimonia.

Provenit locis siccis & petrosis, ut in comitatu Montbelgardenfi la Roche Bavam ad Dubium qua itur Ille, abundans semine maturo Septembri & Octobri.

DAUCVS ΛΑΣΙΟΚΑΤΑΟΣ Thalij.

Deser.

Radice nititur candidâ, palmari, quandoque pedali, unicâ deorsum descendente, nonnunquam in duas tresve partes equaliter crassas oblique divulsâ, minus crassâ parvo digito, odore Aprij sativi, ac sapore etiam, sed fervidiore, diutius linguz inhzrente. Caulem depromit cubitalem & majorem, quandoque bicubitalem, infimâ parte terè digiti crassius, geniculatum, nonnihil teretem, sed plurimis striis evidentioribus angulosum, pilosum valdè. Folia ad singula genicula latâ alâ caulem ambiunt, quæ deinde in pediculum carinatum, oblongum, pedalem in inferioribus foliis diducitur, asperum & pilosum: cui in anteriore sui parte ad latera bini semper ex æquo sibi correspondentes, alij breviores pediculi, in brachiorum modum & ipsi canaliculati appenduntur, folia continentes, sicut & reliqua principalis pediculi pars, flavescentia ut plurimum ex viridi, in ambitu profundè incisa, simili modo quo folia Carotæ nostræ sativæ dividuntur, sed in latiores tamen aliquanto particulas: suntque hæc atra & quidem mollia, hispida tamen leniter, præsertim in dorso ac ambitu. Porro intra singulas foliorum alas adnata nova emergunt, hispida, & ipsa geniculis intercepta, juxta quæ genicula latiori alâ brachiolum amplexante pediculi canaliculati, prio-

ribus similes, sed breviores prodeunt, foliis consimilibus præditi, sed quæ subinde etiam breviora sunt, quo magis in plantæ cacumen devergunt. Præterea etiam ex qualibet alâ fermè foliorum, tam caulis, quàm brachiorum, folliculus protuberans emergit involucri obiectus oblongo, ex quo demum sicuti & in caulis summo eodem modo prorumpit cauliculus, sex oblongis ac imbricatis foliolis constans, quibus diductis fasciculus exeritur plurimorum petiolorum, leniter striatorum ac pilosorum, agminatim caliculo inhzrentium, quorum singuli expandunt parvam, & convexam umbellam, candidam aut flaventem quandoque leviter odoratam: sequuntur quemlibet flosculum bina semina, sibi invicem cohzrentia, subrotundiora in ambitu, aliàs verò alterâ parte lata, echinata, sulva, similis Carotarum seminibus.

Dauci angulosi Cordi [*An Apium petræum quod- An Dauidam?*] notæ plures huic congruunt, sed non omnes. Folia profundius usque ad pediculum dissecantur, in ambitu tamen serraturam nullam habent, nisi dentatas paucas impressiones. Deinde Cordus procul dubio non præterisset, ejus evidentissimam pilositatem caulis, cum aliàs singula diligenti industriâ prosequatur. Præterea caulis licet sit striatus, tamen non circa radicem triquetram figuram ostendit. Demum nihil villorum circa radicis caput ex amissis foliis obtinet. Sed hæc omnia potius (ut & aliæ Daucæ anguloso attributæ notæ) in Libano-Libano tude amara reperiuntur, quam tamen seorsim Cordus alicubi descripsit, in libello cui titulus fuit, *Libano-Libano tude amara* Cordi. *ber 1.1.* quem ipsius Cordi *αὐτὸς γὰρ* olim apud Amilium vidi, qui nondum editus est, licet quædam capita inde desumpta quatuor stirpium libris sint inserta. Tamen non dubito nostram Daucum (inquit Thalij) Cordo fuisse cognitissimam.

Nascitur maxima ex parte in eriectis, locis apricis, Locum præsertim in montibus circa Gorenrodam: imò etiam Stolbergæ in monte urbi proximo ad dextram ante portam Septentrionalem firm Kaltenthaltem in loco pratensi Hareynæ dicto auff der Langen.

Quis Daucus hic Thalij sit, hætenus divinari nondum possumus, idèoque natalum ejus incolæ, aut saltè qui hujus cognitionem habent, rogatos volumus, ut de eo nos moneant.

Quia Daucum suum Thalij cognitum affirmat Cordus, non autem pronunciat quo nomine, idè si Ioanni Schrab credunt lectores, Daucum hunc Thalij, Daucum selinoidem Cordi judicabunt, de quo mox.

B. pin. Pastinacæ 3. sylv. hirsuta echinato fructu: C. Bauh. Daucus *λασιόκαυλος*, i. e. hirsuto caule, Thal. an Daucus angulosus, Cord. hist.

DAUCVS TENNIFOLIUS Cordi.

DAucus tennifolius primo anno, quo è semine prodit, folia tantum profert, silvestri Pastinacæ similia, multò tamen minora, glabra & per terram strata. Sequenti postea anno caulem erigit præcinctum singulis, iis quæ circa terram sunt minoribus, umbellam in summo caule æstate unam atque alteram fert, minimis, candidisque flosculis plenam: quibus singula succedunt duplicia semina ante maturitatem superius rubentia, sativo Petroselino æqualia. Radice nititur annuâ, admodum gracili & subflavâ, quæ gustu aliquantulum acris est. folia silvestri Pastinacæ similem saporem habent. semen verò fervore ceteras partes vincit.

Nasci-

Lerm. Nasceitur asperis, apricis & editis locis, plurimùm-
que quâ ex Hildesheimia Hanoveram itur, unius
milliaris germanici spacio Hildesheimia.

In Cauc. Gesneri opinione *Caucalis* *Matthioli* fuerit, *Dau-*
de Mart. *cus* hic *tenuifolius* *Cordi*. Nobis verò inclinât ani-
mus esse *Daucum* nostrum *petrzum* *glaucofolium*,
iudicium tamen esto penes alios.

DAUCVS SELINOIDES
Cordi.

Peper. **F**olia à radicis capite emittit utrinque à pediculis exeuntia, Apio similia, paulò tamen oblongiora, necita splendida & glabra, sed aliquantulum rugosa, ambitu incisa, & per terram sparsa: è quofum medio caulis affurgit cubitalis, gracilis, striatus & geniculatus, singulis foliis geniculatim vestitus, prioribus multò tenuius incisis. habet adnata & ramulos aliquot caulis, in quorum summitatite parvæ sunt umbellæ, Æstate candidis flosculis plenæ: quibus succedunt exigua, oblonga & in fusco rubentia semina, singulisque flosculis bina, & sibi invicem conjuncta. Radice nititur duorum plerumque dodrantum longitudine, minimo digito paulò graciliore, terete, colore candida, & perenni.

Nascitur campestribus lutosisque locis, ac pratis.
Radix gustu acris & fervida est, quæ si diutius (cuius recens adhuc est) attrectetur, manúsque ad os & nares ferantur, eas partes quibus admotæ sunt manus, leniter exulcerat, idem efficit decoctæ vapor & halitus, insuper etiam capitis gravedinem, attractoriâ vi, quam efficacem habet, facit. odorem spirat similiter acrem. Semen utraque facultate radici respondet.

Daucum hunc Selinoidem Cordi putat Gesnerus esse Saxifragam minorem, Pimpinellæ similem [*Saxifragiam hircinam, Pimpinellam minorem*] cujus iconem dedit ex Trago. Nos contra Saxifragiam mediam conjectamus. Ioannes Schwab tamen asserit esse Daucum *λασίοκλων* Thali, quem autores incognitum sibi fatentur. Et certè descriptio respondere deprehenditur, licèt Thalius de gustu & facultate radiceis sui Dauci talia non prodiderit.

DAUCVS CORIOPHYLLVS
Cordi.

Folia circa radicis caput profert, partim Coriandro, partimque Pastinacæ similia, per terram strata, à quorum medio caulis exit pedalis, aut nonnunquam cubitalis, gracilis, teres, solidus, geniculatus, subtilibus striis sulcatus, & in purpura (cum in consistentia est) rubens umbellis, stoculis, eorūque colore & semine, Dauco Cyanopo [*de hoc mox dicendum*] similis existit. Radicem habet pedis, aut nonnunquam duorum dodrantum longitudine, Selinoide graciliorem, teretem, candidam, & perennem. Sapore * odore exulcerante. acrimonia tota herba Selinoidi Dauco respondet.

Nascitur ubique in cultis campis, & secus vias,
Solo qualicunque.

Si conjectura nostra non fallat, erit *Daucus* hic
coriophyllus *Cordi*, *Saxifragia* minor.

DAVCVS CYANOPVS CORDI.

Foliis, caulibus, umbellis earumque colore, seminibusque Selinondi similis est, præterquam quòd caulis brevior & magis teres sit, & vix evidentibus strus sulcetur: lanugine etiam tam caulis, quàm fo-

lia tenui brevique vestiuntur. Radice nistitur perenni, paulò minore, quàm Selinoides Daucus, foris nigra & aliquantulum tuberosa, intus autem candida, quæ præcisa, aut abrupta omnino cæruleum liquorem remittit. Sapore & odore Daucum Selinoidem æmulatur, sed paulò imbecillior existit.

Nascitur alperis, arenosis, sabulosis & aliquantulum editis locis, congestisque arenâ tumulis, & aggeribus, plurimûsque VVirtembergæ.

Daucum hunc *Cyanopum Cordi*, existimat Gesnerus esse *Pimpinellæ* (melius, si vis, *Saxifragæ*) tertiam & minimam speciem. Nos autem hanc opinionem non recipimus. nec descriptiones respondere videntur. Daucum verò *Cyanopum* cognominat à caeruleo radicis liquore prædicto (*Dauco Selinoide*) similem, sed minorem.

DAUCVS CONIOPHYLLVS
foliis Cicutæ, Cordi.

DAucus Coniophyllus caulem habet Dauco Selinoidi similem, folia verò in brachiatis utrinque pediculis producit in latitudinem explicita, & Cicutæ modo in tenues partes incisa, adnata caulibus à geniculis emittit longa, in cacumine laciufculas umbellas candidis flosculis ferentia: quibus semina succedunt Selinoidi similia. Radice nititur candida, Coriophyllo Dauco æquali, aut nonnunquam majori & perenni. facultatibus Selinoidi respondet.

Nascitur umbrosis, herbosis atque oditis locis,
descriptore Cordo autore, Solo pingui.

Optaremus, ceu ante quoque diximus, ut nobis
aliquis Apollo diceret, quænam sit hæc Daucus Co-
niophyllos Cordi.

DE PASTINACA, SIVE STAPHYLINO
lino veterum, silvestri & sativa, quæ
etiam Daucus quibusdam
Græcis dicitur.

С л р. XXIX.

Pastinaca silvestris [*αειλινθος*] folia habet *Diasc. 6. 4. 10*
 Gingidio similia, at latiora & subamara [*αειλινθος*].
κατα, pro quo vet. αειλινθος, male. Sarrac.] caulem re-
 ctum, scabrum, umbellam similem Anethi, in qua
 flores insunt candidi, ac in medio exiguum quid-
 dam, colore purpureo & serè ad croceum inclinan-
 te. Radix est digiti crassitudine, dodrantalis, odora-
 ta, & si decoquatur, esculenta. Hujus semen potum,
 subditumve [*αειλινθος, vet. care.*] mensis est. Con-
 venit & agrè meientibus, hydropicis, atque pleu-
 riticis, in potione: nec non & venenatarum bestia-
 rum moribus ichibulque prodest. Sed & aiunt, qui
 illud præsumperint ab illis minimè ladi. Conce-
 ptum quoque adjuvat. Radix autem quæ & ipsa u-
 rinæ pellit, venerem præterea stimulat, & partus
 appolita ejicit. Folia verò trita & cum melle im-
 posita phagedænica ulcera repurgant. Horter sis verò
 Pastinaca [*αειλινθος*] cibo optior ad ea-
 dem pollet, attamen viribus inefficacior. Cæterùm,
 Pastinacam silvestrem inter nothas appellationes,
 sunt qui Ceras, qui Comen [*αειλινθος, Cerascomen*
legit Sarrac.] vocent. Romani Carotam, vel Pesti-
 nacam rusticam [*erraticam, Marcell.*] Ægypti Babiby-
 ron, Aphri Sicham.

Theophrastus (juxta opinionem Cæsalpini) Pa- *Theophr.*
stinacem sativam Daucum vocavit, quam Theodo-
rus simpliciter Pastinacam vertit: Inquit enim in
Arcadia nasci colore croci [*κροκεύου*] specie Lauri [*δρυ-
φιδίου*]. Ita namque Cæsalpinus quoque legendum
monet.

monet. Et sarè verbum *daucus* postponendum erat, ut herbam propriam significaret, nec conditio foret Pastinacæ, quæ enim Lauri similitudo esse potest in ullo genere Dauci aut Pastinacæ? nisi Pastinacam germanicam intelligat; latifolia enim est, ut particulæ quandam Lauri speciem habeant. Scribit præterea Theophr. in agro Prateni præstantiorem cæteris nasci; huic vim calfactoriam esse; radicem nigram. Et alibi l. 9. c. 22. Pastinacam in agro Spartensi Achajæ laudatissimam referri, naturâ calfactoriam, radicem nigram. Quibus verbis insinuat illud genus, quod sanguinei coloris est, inquit Cæsalpinus. niger enim appellari solet hujusmodi color, ut uva nigra & vinum nigrum.

Athenam. Diphilus apud Athenæum l. 19. Pastinacam esse tradit acrem, satis alere, mediocriter juvare stomachum, alvum pellere, inflare, ægrè coqui, ciere lotium, satis ad venerem stimulare, ideòque à nonnullis Philtron vocari. Numenius etiam in Piscatorio silvestrem Pastinacam nominat. Sed & Nicander in Georgicis Pastinacæ in arido solo radicem figentis meminit, Staphylini sc. agrestis, in alperis locis frequentis. Phanas lib. 5. de plant. de Staphylino ita scribit: Ejus plantæ quam Pastinacam vocant, semen aiunt [*hunc locum Dalechampiis ait valde corruptum, sed in quibus non offendit*] contra sepas esse utile. Primo verò libro: seminis exortum Petafo similem, & instar umbellæ Anisi. Staphylinum Diocles lib. 1. de tuenda valetud. etiam Astaphylinum nominat, eum nimirum, quem Caroton [*alijs Cod. legunt Caroton, alijs Caron. n. s. inquit Dalechampiis, adhuc Carote.*] vocant (magna est ea, proceræ, sativæque Pastinacæ) succi melioris, quàm silvestris, quæ magis calfacit, & pellit urinas: stomacho sativæ grata est, ac faciliè digeritur [*Dalechampiis & ist. Dalech.*] ut Diphilus asserit. Et hæc apud Athenæum de Pastinaca leguntur.

Plinius. Ex his [*qua lignosa sunt reliquis in hortu nascentibus in cartilaginum genere, à nobis, ait l. 19. c. 5. Plinius, posita quibusque, quod mirum, vehementia saporis inest*] Pastinacæ unum genus agreste spontè provenit, Staphylinos Græci dicunt. Alterum sentitur radice, vel semine, primo Vere, vel Autumno, ut Hygino placet Februario, Augusto, Septembri, Octobri, solo quàm altissimè resosso. Annicula utilis esse incipit, bima utilior, gratior Autumno, patinisque maximè. & sic quoque virus [*vis, M.*] illi intrastabile est. Hibiscum à Pastinaca gracilitate distat, damnatum in cibis: sed medicinæ utile. Est & quartum genus, in eadem similitudine Pastinacæ quàm nostræ Gallicæ vocant. Græci verò Daucon, cujus genera etiam quatuor fecere. Scribitur autem & Pastinaca utroque tempore, Vere & Autumno magnis seminum intervallis, non minùs quàm ternorum pedum, quoniam

Pastin. ma. spatiosè fruticat. Nervus autem Pastinacæ majori, at duntaxat anniculæ, idem [*cum Silere*] longitudine inest, qui decoctis extrahitur, amantudinis tamen magnâ parte relicta: quæ multo in cibis temperata, etiam in gratiam vertitur. Idem l. 20. c. 4. Pastinacæ simile Hibiscum [*Pastinacam pratensem vocat, l. 21. c. 15. verius oblectamentum, quàm cibum, quod Molochen agriam vocant, & aliqui Pistolochiam, hunc ceribus cartilaginis, & ossibus fractis medetur. Folia ejus ex aqua pota alvum solvunt, serpentes abigunt. Apum, vesparum, crabronum cibus illita medentur. Radicem ejus ante solis ortum erutam involvunt lana coloris, quem nativum [*is aut niger est, aut fuscus, pau. Dalech.*] vocant, præterea ovis, quæ seminam peperit, strumisque vel suppuratis alligant. Quidam ad hunc usum auro effodiendam censent, cavendûmque ne terra attingat. Cellus & podagris, quæ sine tumore sunt, radicem ejus ex vino decoctam imponi jubet. His addit c. 5. disti libri. Alterum genus est Staphylinos, quod Pastinacam*

erraticam vocant. Ejus semen contritum, & in vino potum, tumentem alvum, & suffocationes mulierum, dolorisque lenit, in tantum ut vulvas corrigit, illitum quoque è passo ventri earum prodest: viris verò prodest, cum panis portione æqua tritum, ex vino potum contra ventris dolores. Pellit & urinam, & phagedænas ulcerum sistit, recens cum melle impositum, vel aridum farinâ inspersum. Radicem ejus Dieuches contra jocinoris ac lieenis, ilium, tumorum & renum vitia, ex aqua malsa dari jubet. Cleophrantus & dysentericis [*dysentericis vet.*] veteribus. Philistio in lacte coquit, & ad stranguriam dat radicis uncias quatuor: ex aqua hydropicis, similiter & opisthotonicis, & pleuriticis, & comitialibus. Habentes eam, feriri à serpentibus negantur, aut qui ante gustaverint, non lædi. Percussis imponitur cum axungia. Folia contra cruditates manduntur. Orpheus amatorum inesse Staphylino dixit fortassis quoniam venerem stimulare hoc cibo certum est: idè conceptus juvare aliqui prodiderunt. Ad eliqua & sativæ pollet. Efficacior tamen silvestrisque in petrosis nata. Semen sativæ quætra scorpionum ictus ex vino, aut posca, Radice ejus circumscalpti dentes, dolor tur. Et hæc Plinius.

Galenus simpl. 6. inquit. Daucus, quæ Staphylinum nuncupant, agrestis quidem, cominùs est esui idoneus. cæterum, in omni hementior: at domesticus esui aptior, scilicet acrem & calefaciendi facultatem o proinde etiam extenuandi. Certè radix præcomprehensa, flatuosum quiddam habet reum. Semen autem domestici quidem quandam ad venerem ciendi potentiam præ. Agrestis verò planè flatu caret, quod *ægypti* vocant, ac proinde urinam mensèque ciet. Idem 8. simpl. Staphylinus sativus imbecillior, agrestis ad omnia potentior est. Vnâ mensèque provocat cum herba quidem tota, tum maximè semen ac radix. Habet porro etiam absterforium in se quippiam: quamobrem ulcera phagadænica quidam foliis ejus viridibus cum melle, quo pura reddant, illinunt.

Plinium à Columella nonnulla mutasse, ex *Col. sativæ lumellæ* verbis patet. Potest, inquit, duobus temporibus Pastinaca, Autumno nimirum & Vere. Autumno circa calendas Septembris, vel melius Vere ante calendas Martias, Februario. Locis verò siccis, aut tepidis, qualia sunt Calabria, & Apuliz maritima, potest circa Idus Januarij terræ committi. Convalescit altè pastinato & stercorato loco, sed quàm rarissimè ponenda, ut majora capiat incrementa.

Si liceret in plantis, quod in Republica sit aliquando, mutato nomine legentes fallere, exiguus in Pastinaca labor modò nobis esset, inquit Marcellus, nec præteritam à peritioribus Pastinacam à Dauco secerneremus: liquidem Pastinaca eodem cum Dauco nomine gaudet. Sed cogunt diversæ gentium in plantis appellationes, ob diversas quidem vires, neque eadem penitus notas, earum discrimina, quæ alioquin unum idemque sunt nominibus, tradere, dubitareque quid Dauco cum Pastinaca idem nomen apud antiquos fecerit, & an sit Staphylinon (quàm Romani Pastinacam dicunt, *Staphylinon sativum & silvestre*) cujusque duplex genus, sativum scilicet & agreste: rursumque agrestis multiplex potius divisio quàm genus) agreste, eadem cum Dauco, an alterius generis herba? Sciendum igitur illud est, Staphylinum à Græcis simpliciter Pastinacam dici olus, & oleris notissimam & quotidiani usus radicem, nullaque adjectâ notâ aliâ sativam semper intelligi: sic Columella canit:

Latescit, mollemque sinum Staphylinum ini muret: Staphylinus.

Seren-

intelligat Saxifragia n majorem, ut nobis sit verisimile.

Brancam ursinam, quam Pastinacæ genus credidi Tragus, Spondylium inscribitur.

PASTINACA SYLVE-
stris, sive Staphylinus
Græcorum.



IN promptu est sylvestris Pastinacæ ex sativa dicenda faciem novisse: radix minor, acrior: caules altitudine pares, sesquicubitales, striati, hirsuti, in alas divisi: folia minutum dissecta, similiter, atroviresentia, hirsuta: flores in umbella consimiles, candidi: at flosculus umbellæ medius purpuræ rubet: de lapsis floribus succedunt semina brevia, striata, hirsuta; tum verò convo-

luta umbella, cavitatem ceu aviculæ nidulum in medio deformat.

Baucia se- Pastinacæ sylvestris in pluribus locis memine-
quidam runt Monachi in Mesuem. Et primò quidem disti-
Manacher. cent. h. his verbis. Baucia licet nonnullis variè exponatur, secundum tamen Dioscoridem, Serapionem & quamplurimos auctores, imò secundum veritatem, est Pastinaca sylvestris. Est etiam Carvi agreste, sive sylvestre: quoniam tria hæc sc. Baucia, Pastinaca sylvestris, & Carvi agreste, sunt unum & idem. Et cent. 41. Non de sunt, & præcipuè recentiorum, qui Bauciam & Daucum, unum & idem esse affirmant. Etenim Serapio de eis separatim capitula facit, & Bauciam inter plantas calidas in secundo, Daucum verò inter calidas & siccas in tertio scribit: ergo non sunt idem. Dioscorides quidem sub nomine Bauciz caput non habet, sed sub nomine Staphylini, sive Pastinacæ erraticæ. quod idem est. Ut patet concordando caput Serapionis de Baucia, cum capitulo præfato Dioscoridis de Staphylino. Et infra ipse Dioscorides habet cap. de Dauco, quod concordat cum capitulo de Dauco Serapionis. Marcellus autem super capitulum Dioscoridis de Pastinaca erratica multa dixit: ultimè conclusit idem esse Daucum & Pastinacam erraticam: & quod Dioscorides non à diversitate rerum, sed à varietate locorum & virium varia de eis scripsit capitula. Nos autem salvà semper veritate, sicut de eis Dioscorides, Plinius, Serapio, & alii fide digni auctores diversa faciunt capitulanta credimus & absque dubio tenemus res esse differentes. Præterea nonnulli dicunt, quod

Daucum nō Daucus sit semen Bauciz, quod non ita esse, facile
est semen probatur per Avicennam in 5. canone, videlicet in descriptione, quæ intulatur, Ars Scoriz decoctæ: & est prima descriptio, in qua habet semen Bauciz, & semen Daucim immediatè unum post alterum. Si autem Daucus est semen Bauciz, ad quid iterum posuit semen Dauci? Nunquid reperitur semen de semine? Ut possit stare Daucus pro semine Bauciz: & semen Dauci pro semine seminis Bauciz?

Non obstante, quod ipse Avicenna in descriptionibus suis de Dauco, & Baucia seipsum confundat. Sed nota, quod Avicenna scribit caput Bauciz, in litera g. sub nomine Gezar, quod quidem Luminare majus minimè animadvertit: quia in Diacurcuma magna, declarans Daucum, asserit capitulum Bauciz, Avicennæ non reperiri. Insuper autem multa fuissent tanquam necessaria interferenda, pro tot diversitatibus opinionum doctorum de Dauco, & Baucia declarandis: sed ut ne lectionis prolixitate legentis animus fastidietur, curiosis lectoribus omnia perscrutanda relinquimus. Hoc tamen non prætereundum existimamus. Quia cum sint plures Dauci & Bauciz species, & inter se Daucus & Baucia sive Pastinaca parùm differant: non pro multo inconuenienti tenemus, administrari alterum pro altero. Sed quia Daucus Creticus est cæteris laudabilior, si potest haberi, apponatur tam pro Dauco, quàm pro Baucia. Apud nos quidem tres tantum species Bauciz, seu Pastinacæ, id est, Staphylini reperitur: duæ sylvestres & una domestica Carota nuncupata: sylvestrium autem una elevatur in cubitalem altitudinem, & aliquando plus vel minùs, secundum loca, quæ in medio umbellæ floridæ & albæ habet aliquid parùm cærulei, seu violacei coloris. Quam equidem speciem, pro Baucia, sive Pastinaca erratica, sive Carvi agreste, recipimus: quia Dioscoridis descriptio & aliorum de Pastinaca erratica, & descriptio Serapionis, & cæterorum de Baucia, magis conveniunt huic, quàm alteri, Dauco scilicet Cretico. Hucusque Monachi, qui Bauciam, Pastinacam sylvestrem & Carvi agreste unum & idem esse statuunt. Ab iis quoque re-
Marcellus
reprehendit
disert.

herditur Marcellus, quod Daucum & Pastinacam erraticam esse concludat, idque firmis ostendunt argumentis, ea scilicet inter se differre. Notant præterea Avicennam quod ea confundat. Sed etiam ab iis taxatur Luminare Majus, quod caput Bauciz apud Avicennam non reperiri dixerit, cum tamen id ab eo nomine Gezar describatur. Plura tamen satis obscura hinc ab iis scripta sunt, quæ diligentius consideranda. Si quis caput Serapionis de Gezar, sive Baucia conferat cum Pastinacæ sylvestris capite Dioscoridis, inveniet unam eandemque esse plantam, ut etiam merito asserunt Monachi, qui ante dist. 1. cent. 8. in hæc verba prorumpunt. Secundum Haliabbatem, qui (si non est additio interpretis) asserit absolute Been esse Pastinacam sylvestrem, potest poni ipsa Pastinaca sylvestris. Ait enim in 2. Practicæ, 43. Been quoque duæ sunt species, est enim rubeum & album & est Pastinaca sylvestris, &c.

Item

Error qui

rundam se

cundum

Matthioli

Daucus

Veld Mören & Vogelnefte/ Avium nidos, vocare refert.

De Pastinaca erratica, sive Pastinaca sylvestri (ut

vocat) hæc scribit Matthiolus. Falluntur qui Dauci loco, agrestis Pastinacæ semen accipiunt, illius scilicet, in cujus florentis umbellæ medio exiguum quid purpurei emicat. Aliud enim est, à Pastinaca erratica Daucus. Nam licet tam ex Dioscoridis, quàm Galeni sententia, Daucus à sylvestri Pastinaca parùm, vel potiùs nihil viribus differat, ob idque alterum alterius vice in medicinæ usu capi possit non tamen rectè dici potest, Daucum erraticam esse Pastinacam. Eadem serè repetit Matth. dicto lib. 3. in Dioscor. cap. 69. his verbis. Tametsi nonnulli inveniuntur, qui Daucum ab erratica Pa-

stinaca-

finacea, nihil prorsus differre contendat, affirmantes hoc idem tenuisse Galenum, & post ipsum Paulum; ij tamen manifestè falli deprehenduntur. Nam et si rectè dici possit, Daucum esse sylvestris Pastinacæ genus; non ob id tamen illa fuerit unquam sylvestris Pastinaca, cujus meminit Dioscorides. Quandoquidem si unam & eandem plantam esse Daucum, & agrestem Pastinacam credidisset Dioscorides, de us sanè seorsum non differuisset, neque alterum ab altera propriis capitibus disjun-

*Galeni de-
finiuit
ter Da-
cum & Pa-
stinacam.*
xillet. Cæterùm, cum non desint, quibus videatur Galenus inter has plantas nullam facere differentiam, videndum est, an ita se res habeat. Mihi quidem inter eas discrimen fieri voluisse Galenum, illud maximum argumentum est, quòd Dioscoridem secutus, & ipse varias utrisque tribuerit vires, easque diversis locis descripserit. Dauci siquidem lib. 6. Pastinacæ verò lib. 8. simpl. mentionem fecit. Hinc itaque sit ut apertè conijciam, Galenum inter illa discrimen novisse: atque eos decipi, qui in hoc Marcellum & Ruellium secuti, contrarium asserunt. Quorum præterea sententiam, ipsius Galeni testimonio, facile explodi posse putaverim, nec solum quòd diversis capitibus utriusque vires speciatim tractaverit; sed quia lib. 6. simpl. Daucum non esse Pastinacam clarissimè ostendit, cum inquit. Daucus, quem quidam Staphylinum nominant, agrestis quidem domestico minus est esui idoneus. In quibus sanè verbis Galenus perspicuè satis declarare videtur, Daucum non sibi, sed aliis Pastinacam agrestem appellari.

Lon. s. c. 303. hujus meminit nomine Staphylini & Pastinacæ sylvestris & erraticæ: verùm illam confundit cum Pastinaca Germanica sylvestri, sive Elaphobolco Matthioli.

*Dodonæus,
tertius,
Dodonæus.*
Dodonæus gall. hanc describit & depingit, pro Dauco tertio genere (sc. Dioscoridis) Carotte sauvage, quam ait officinis Daucum appellari, aliis etiam Daucum Creticum. Lat. in sol. vocat Pastinacam sylvestrem tenuifoliam, atque officinas pro Dauco habere, ejusque loco nec malè, nec infelicitè uti. Nam & Galenum suo tempore pro Dauco habitum fuisse testari; & Dauci à Theophrasto dicti sylvestre genus esse. Sed mirari subit, Dodonæum hanc in hist. gall. secundà vice describere & depingere sub titulo Staphylini sylvestris, ubi vocari ait præter dicta, Pastinacam rusticam, Carotam, Babyron & Sieha.

Trag.
Trag. lib. c. 147. pro Staphylino 2. sive sylvestri describit: cap. autem præcedenti 146. hujus figuram nomine Pastinacæ exhibet. De Staphylino autem sylvestri ait. Galenus & Aegineta, necnon Averrhoes Daucum erraticum seu sylvestre Pastinacæ genus esse dixerunt. Dioscorides sentit Pastinacam erraticam & Daucum unius & ejusdem esse generis. Sylvestre verò Staphylini genus Cerascomen, Latinis Rusticam Pastinacam, aliquibus Carotam, Aegyptiis Babyron, Aphris Sticham vocitari tradit. Theophrasto Brassica sylvestris, Apuleio verò Ceras, & Vdonaution, aut ut aliis legendum videtur, Daucion dicitur; Averrhoi Halgazar, quibudam Bancia, & eum condita fuerit, Algingibel appellatur.

Fuch.
Fuch. hist. Pastinacam erraticam appellat, quam Staphylinum Græcis propriè nominari ait, In Leon. Pastinacam erraticam magnam.

Lob.
Lob. adv. p. 17. Pastinaca sylvestris tota similis est Carotis, seu Dauco, cui Galeni Pastinacam sylvestrem succedaneam faciunt, etiam nunc Pharmacopœi. Idem rursus de Baucia vocat Dioscoridis Pastinacam sylvestrem Pharmacopœorum, quam pro Dauco substituant ex Galeno. Item p. 123. Vitiatus Daucum officinarum inter Caryotam & Pa-

stinacam sylvestrem [offinarum sc.] radice lignosiore & minore quàm Carotte; cui multum similes, eamle cubitali, foliis latioribus, hirsutis, Cotandinis, ad Bauciam accedentibus: umbellis albidis & semine. Miramur dicere Lobelium hoc loco folia habere Coriandrina, ad Bauciam accedentia, cum ei Baucia sit Pastinaca Germanica sylvestris sive Elaphobolcum. In Obs. p. 416. vocat Pastinacam Dioscoridis, Carottam sylvestrem vulgi, Daucum officinarum & Sifer Lacunæ. p. 417. num Carota sylvestris, sive Daucus officinarum, sit Dioscoridis Pastinaca sylvestris, querit. In Icon. p. 722. genuinam sylvestrem Pastinacam Dioscoridis esse affirmare deprehenditur.

Staphylini sylvestris, quem vulgo Pastriccianum *Pastriccianum
num vulgus
Cas.* vocari scribit, plures extare differentias, ait Cæll. 7. c. 21. sed magnitudinis tantum & parvitas: id autem quod maximum est, Daucum marinum vocari: hujus seminibus officinas pro Dauco uti: Dioscoridem huic folia assignare Gingidij: Plinium Pastinacam erraticam vocare: Galenum verò de aliment. Daucum.

Theod. Dorst. pro Dauco sylvestri habet iconem *Dorst. lib. 1.* Carotte sativæ, quod non placet. Tabern. nomi. p. 151. nat Pastinacam erraticam. Clus. pan. & hist. Daucum vulgarem, quem ait in Pannonia in officinarum usu esse. Castor. & Cam. epit. & hist. Pastinacam sylvestrem. Lugd. p. 717. Vitiatiorem Daucum officinarum Galliar, Germaniar, & Italiæ: Pastinacam sylvestrem Dioscoridis, sive Carotam sylvestrem vulgi. Item p. 720. Pastinacam sylvestrem Matthioli una eademque planta.

Bauh. phyt. & pin. dicitur Pastinaca 1. (1. apud *Synon. C. E.* Matth.) tenuifolia sylvestris Dioscoridis vel Daucus officinarum: Daucus agrestis Gal. de alim. Dauci tertium genus, Dod. gal. Thal. Pastinaca erratica, Plin. Fuch. Cord. in Diosc. Tab. Staphylinus sylv. Trag. Dod. gall. Cæll. Pastinaca sylv. Matth. Lac. Lon. Cast. & Lugd. sylv. tenuifolia. Dodon. Ger. Pastinaca 2. Turn. 4. Plinij, Cam. Differt magnitudine & parvitate: sic & ratione umbellæ in cujus medio aliquando macula purpurea, subnigræ, aliquando crocea: foliis etiam, aliquantum latioribus, in altera multò tenuioribus: quare Thalius illam Daucum 3. Dodonæi, hanc verò Daucum 3. tenuifolium nominat.

Σταφύλιος ὁ δρυς, Pastinaca sylvestris, sive Staphylinos Græcorum, Germ. Wild Pasteney / *Dor lingua.* gelneß / Belg. Vogelneß / Croonkens cruyt / wilde Pastenaken aut Carote. Gall. Pastenade sauvage. Ital. Pastinaca salvatica. Hispan. Canahoria salvaje. Angl. Wild Carot. Boh. Plane Pastinaß.

Passim in Pannonia. Frequens etiam in Italiæ arvis etiam in gracili solo & saxoso. Pastinacam sive Staphylinum sylvestrem observavi Basileæ florentem Junio & adhuc Octobri, qua itur Montes, & ad montem prope Krenzach, & ad ripam Bursæ inter urbem. Monspelij, Genævæ & Montbelgardi, etiam in horto E. C. sponte.

Pastinaca sive Staphylinus sylvestris in media sua umbella profert rubentem flosculum, qui si maturient, & serapii unius pondere pueris morbo comitiali laborantibus exhibeatur, nullum magis præsentaneum ad vertus epilepsiam remedium esse dicit egregius Botanicus Arnoldus Gellennus ex auctoritate Medici Germani, qui Staphylinon sylvestre distinguebat in marem & feminam, quam aiebat esse, quæ flore rubente careat. Ut porro virum citius & fortius inebuet, Pastinacæ sylvestris semina quidam in potum addunt. Radices diutius clau-

xx more Carotarum in patinis hiemali tantum cibo parantur.

confundit Pastinacam germanicam cum Carota, nec agnoscit, quam pingit ex Matthiolo, Carotam esse. Libro verd 3. c. 55. Staphylino sativo quatuor tribuit colores, ac quatuor constituit species. Quorum tres primæ à Trago enarrantur, alba scilicet rubra, & crocea, quartam ait totis nigram, intus sanguineam. Miror eum inter figuras retinuisse Matthioli figuram Pastinacæ sativæ ac omisisse Carotarum effigiem.

Trag. l. i. c. 147. de Staphylino egit hunc in modum. Staphylinorum fecit mentionem Colum. l. i. c. 3. licet ignorem, utrum eo loco intellexerit Pastinacam ^{Staphylinum} germanicam intelligit Trag. an verd ea raporum genera, quæ nunc commemorabo. Triplici autem colore distinguuntur hæc rapitæ radices. aliz enim croceæ sunt coloris, aliz candidæ, aliz postremo purpureæ. Galenus & Aegineta, necnon Avertthoes Staphylinum, sativam Pastinacam dixerunt. Quia autem Dioscorides scribit Pastinacam habere asperum caulem, umbellam Anethi, & in medio florum purpureum quiddam : & hæc in tribus Staphylinis nostris (quos Germani, Gele Ruben / Korbe Ruben & Weisse Ruben vocitant) omnia appareant, maxime verd posterius, quod omnes fateri necesse est, manifestum esse puto, nihil cum Daucis, quibus nullæ ex prædictis novis insunt, Pastinacæ esse commune, sed has plantas juxta Dioscoridem Pastinacas, seu Staphylinos hortenses appellari, quarum mentio facta apud Plin. l. 19. c. 5. cum scribit Pastinacæ quatuor esse genera, tertium ex his Hibiscum, quartum verd Gallicanum Pastinacam, Græcis Daucion. Iac. Manlius existimat luteum Staphylinum, qui Germ. Geel Ruben dicitur eam esse, quæ Chariota & Lezar. & à Lombardis *Guss* nuncupatur. Platina candidam & rubram Staphylinum Cariotam vocat. Libro autem 2. c. 60. hæc habet Tragus. Sunt qui per Siser luteam Pastinacam sativam intelligant, & credo Plinium Pastinacæ jam dictæ mentionem fecisse, cum scribit Siser Tiberium omnibus annis à Germania flagitasse. Hæc ille, apud quem notandum in hist. germ. lib. i. c. 147. pro Korbe Ruben / Pastinacæ sativæ rubræ malè positam esse figuram Betæ, radice rubrâ, errore Typographi.

Pastinacæ vulgo Carotæ dictæ, tria genera reperiri tradit Gesn. hort. radicibus scilicet luteis, purpureis, & albis : Carion vocabulum accedere ad vocabulum Cariotæ vulgaris, esse quæ Pastinacam magnam, ac fortè Pastinacam vulgo dictam, à Carotis diversam. De coll. stirp. vocat Pastinacam.

Anguillara ait Pastinacas sativas à sylvestribus tantum cultu differre, quia illic omnia majora sunt; Nicandrum eas Daucum vocasse. item Theophrastum l. 9. c. 22. [ubi sane Daucum nihil aliud est, quam Carota] item Dioscoridem de Salubribus.

Dodonæus existimat Pastinacam rubram & croceam esse Daucum Galeni lib. 6. simpl. Cujus etiam opinionis est Anguillara, qui Been album & rubrum Galeni Daucum existimat. Dodonæus quidem in hist. gall. describit & depingit, duas figuras Fuchij assumens. *Carota sativa* Pastinaca sativa: Neotericiis, inquit, Staphylinus luteus, germ. 3am Pastency / 3am Pastinaden / & geel Ruben / gall. *Pastinade saulne*, Belg. Geel Peen / Pooten / & Geel Wortelen. Secunda species etiam Staphylinus sativus, & Staphylinus niger dicitur, gall. *Pastinade rouge*, Germ. Korh Pastency / Belg. Caroten. Hæc duæ Pastinacæ videntur Theophrasti Daucus l. 9. cap. 15. & Gall. lib 9. simpl. *Carota sativa*. Daucus Pastinaca. Latini scilicet duas icones Lobelij assument & describit, his titulis: Pastinaca tenuifolia sativa. 2. Pastinaca sativa rubens. Est verd hæc proprie à Græcis *Carota* dicta. Hæc autem sativum genus *Carota* dicta. Latini Pastinaca l. Tom. III.

tiva dicitur. Theophrastus autem lib. 9. stirp. hunc Staphylinum Daucum nominat, & apud Arcades nasci refert : ac in Sparteni Achaia laudatissima, radicemque ait *luteam*, i. e. luteam esse : exemplaria quædam *luteam* legunt, quod de altera specie veritatem habet. Galenus de simpl. Daucum quoque facit, sed tamen non simpliciter Daucum, sed composito nomine Daucum Pastinacam appellat. Nos autem hanc Pastinacam tenuifoliam, ad differentiam alterius latioris & candidæ radice vocavimus. Priorem autem harum Germani 3am Pastenaden / & geel Ruben appellant. Brabant. geel Peen / geel Pooten / geel Wortelen. Gall. *Pastinade saulne*. It. *Pastinaca*. Hisp. *Canabala*, *Pastinagues*, & *Cenoura*. Alteram vulgo Carotam vocant. Iacob. Manlius Caryotam, & Pastinacæ, cujus radix citrina est, speciem facit. Veteres autem Caryotam inter Palmæ fructus numerant. Carota autem hæc Pastinaca dicitur, à germanica voce *gar roth* / quod est, in totum de *didia*. rubens : quæ non modò ad Brabantos, verum & ad Italos, Galliosque vox pervenit.

Lonic. l. 5. c. 303. hanc depingit & describit, non distinguens tamen à Pastinaca Germanica sativa. vocat Staphylinon & Pastinacam : inquit alba, turbræ, & luteæ.

Euch. Roëll. his nominibus *Noren* / *Nurelen* / *Roeslschad* / *Nurelen* / *Besienaw* / 3am *Norchlen* / Baucia domesticam pingit p. 35. iconem Carotæ seu Staphylini sativi, quam postea p. 80. repetit pro Daucio sylvestri & Daucio Cretico, wild *Noren*.

Lob. Adv. de Pastinacis, sive Carotis hæc scriptis mandavit. Fecit similitudinis cognatio, quæ Daucus cum Carotis intercedit, ut Theophrastus hanc Daucum nigrum censuerit. Est tamen duplex à colore radice differentia Carota : isthæc namque flavet, altera purpureum atrum remittit succum : medietate videntur inter Daucum & Pastinacam naturæ : utrique congenetas : neutra tamen dici possunt. His qui Behen album & rubrum augurantur, suo ex Lobelio respondeunt loco. Istis nomenclatura indita fuisse videtur, ab illa, quam cum Carvi similitudine & cognatione sortitæ sunt. In Obs. p. 416.

Pastinaca sativa Dioscoridis, Daucus Theophrasti (ita etiam in Icon. vocatur p. 723.) Geel Ruben & geel 3am Pastency / Belg. geel Peen & geel Wortelen / Gall. *Pastinades* & *Carottes saulnes*. Item p. 417. (in Ic. p. 722.) Pastinaca sativa atrorubens : Daucus niger Theophrasti, Belg. absolute Caroten / Gall. & Gallo-Belgis *Pastinades* & *Carottes rouges*, Germ. Korh Ruben & Pessency.

Cæsalp. Carota vulgò in Etruria appellatur radix Pastinacæ similis, colore sanguineo intus & extra. itemque & Buxei coloris : foliis prælongis, crassius divisilis, quam Fœniculi, tenuius quam Cicutæ, subhirsutis : caule cubitali : umbellis clausis, vasculi modo : flore candido : semine parvo, ut Anethi, hirsuto, subamaro. hæc ab antiquis non describitur, quia fortè illis, ut nobis, notissima erat inter olera. puto autem apud Græcos Staphylinum sativum esse, sic appellatum à colore uræ nigricantis. De hoc inquit Dioscorides eandem vires habere, quam Staphylinum sylvestrem, sed minus efficaces, & cibo aptiorem esse. Plinius Pastinacam vocat, quod Græci Staphylinum. Theophrastus hanc ut puto Daucum vocavit, quam Theodorus Pastinacam vertit, colore Croci in Arcadia, in Agro Præteni, ut & alibi in agro Sparteni, radice nigra.

Lugd. p. 722. Carota vulgaris. Item : Carota Matthioli altera. Sufficiebat una figura color, in quo Carota rubra & lutea differunt, sculpturâ non potest demonstrari. Callon dicta Carota.

Bauloy. phyt. Pastinaca 2. sive tenuifolia l. 3. c. 2.

tiva radice lutea. Item: Pastinaca 3. sive tenuifolia. sat. radice alba. Et: Pastin. 4. sive tenuifolia. sat. radice atro-rubente. *Eid. pin. Pastinaca 5. tenuifolia sativa radice lutea, vel alba. Staphylin. sativus & Daucus domesticus, Galeno. Staphylinus 1. & 2. Trag. luteus; Dod. gal. Sifer, Lac. alterum, Matth. Tab. Carota crocea malè Sifer, Guil. Pastinaca sativa 1. Fuchf. sativa, flava, Lon. Pastinaca sativa 1. & 2. Tab. Pastinaca radicibus luteis, vel albis, Gesn. hort. Pastinaca sativa Diosc. Lob. Cord. in Diosc. Pastinaca tenuifolia sativa, Dod. Ger. Carotta vulgaris radice flava, Adv. Carota radice buxei coloris, Cælex albo flavescens, Cast. nostra lutea, Cam. Pastinaca 6. Daucus Staphylinus altis & hortensis, vulgo Carotta, Cam. h. Variat solum radicis colore, quæ vel alba, vel pallidè lutea, vel lutea est. Itè: Pastinac. 6. tenuifolia sativa, radice atrorubente. Staphylinus sativus Dioscoridi. Daucus radice nigra, Theophrasti. Pastinaca sativa, Plinij. Staphylinus 3. Trag. niger, Dod. gall. Carota, Matth. altera, Lugd. radice sanguinei coloris, Cef. radice rubra, Cast. Pastin. sat. altera, Fuchf. prima, Turn. sativa rubens, Dod. Tab. atrorubens, Lob. Daucus niger Theophr. Carotta vulgaris, Ad. Pastinaca radicibus purpureis, Gesn. h. Been rubrum & album, an Daucus sativus & sylv. Galeni, Ang. Carota Italica radice rubra & alba, Been rubri & albi *an Carota* esse volunt aliqui, non malè, Cam.

Seritur Carota passim inter olera. Monspelij quidem rubra & lutea radice, copiosè. ibidem rubra in tantam magnitudinem excrevit, ut vix duabus manibus comprehendi possit. Patavij abundant, Lugduni, Basileæ. Genevæ (ubi vocant *Patenalles rouges* & *raulnes*) & Monthelgardii.

Vires & Vsu. Facultas Carotarum ad caliditatem & humiditatem inclinat. Ventrem emolliunt, angustiam pectoris adimunt, rursique medentur, melle aut vino dulci coctæ & comestæ. Vrinam provocant & menses, sedque non fortiter. Semen in caliditate radici præstat, inquit Matth. in hist. germ. cum addit. Cam. In ejusdem verò epitait: semen & radices, pares cum domestica Pastinaca facultates habent. In cibis sumpta radix inflat, & concoctu non aded facilis est. Rubra coquitur in aqua, & deinde tessellatim inciditur, & in acetariis cum Pipere estur. Alba verò Rapi, aut Napi modo in carniū jure coquitur.

PASTINACA SYRIACA, SIVE Secacul Arabum quibusdam.



Deser. **E**dulis est planta, & proin hortensis jure dicenda, licet in silvestribus proveniat. Radice nititur exterius cinerea, intus candida, lævi, tenera, digitum crassa, sesquidigitum longa: ex qua fibrarum loco noduli ceu verrucae prominent: sapore dulci, Carotæ simili; quibus caule, foliis, ac umbella (flosculis exceptis, qui penitus flavi sunt) haud ab similes sunt, auctore Rauvvolfio.

Hic in Itin. parte 1. c. 4. Secacul vocat. Parte verò *synon.* 2. inter Icon. num. 71. inscribit genus peregrinum Rapuncolorum Rieblin dictorum Germanis *Geselen* / Arabibus & Mauris Secacul. Bauh. phyt. Pastinaca 2. sive Syriaca: Lugd. in app. p. 23. Secacul Arabum, Pastinaca Syriaca (hoc titulo pingitur pag. seq. 24.) Germanis *Geselen* / sive *Siferis* species. Eid. Bauh. pin. Sifarum 2. Syriacum: Secacul Arabum & Maurorum, sive Pastinaca Syriaca, Rauvvolf. Lugd. ap.

Iuxta sepes & hortos urbis Halepi, locis præsertim apricis, ut sub arboribus observavit Rauvvolfius. Item inter segetes.

Sapori grata est, ideoque Rhizotomi illius regionis hujus radices in taleolas sectas filo trajiciunt, & magnâ abundantia passim venundant.

MUTELLINA.



Deser. **S**taphylini silve. Siltris folia habet, minora tamen, minutiusque incisa, trium circiter digitorum longitudine totâ, glabra: caulis brevis uncias aliquot altus, umbellam gerit parvam, radix propter terram capillata, satis longa, & crassa, exterius nigricans, odoris & saporis Mei vulgaris.

Hanc plantam à nobis in itinere Rhetico à quadraginta serè annis delineatam ita describit frater, apud

Meum alpinum C. B.

Matth. Meum 3. Alpinum umbella purpurea (purpureascente, in pin. ubi quærit an sit Daucus montanus, Cluspan. & hist. At florib. purpureis, in phyt.) ex radice simplici, oblonga, nigra, parùm fibrosa, aliquando minimum digitorum crassitie æquante, circa caput barbata, Mei serè figurâ, sed infirmiore, odorata & acri, folia prodeunt Mei foliis latiora: caulis item unus vel alter, lævis, striatus, umbellam sustinens florum purpureorum, vel etiam ex alba purpureascentium: quibus succedunt semina, oblonga, facisque magna.

Bened. Aret. in descr. Stochornij & Nelli mont. Bern. lib. de hort. Germ. vocat Mutrinam radice minimâ, digiti crassitiem quandoque æquante, ut plurimum tamen minore: umbella Pimpinellæ rubescente.

Mutrina Aretio.

Mutellina dicitur vulgo in Alpibus, nomine sc. à Mutri vel Mutteren deducto, Gesnero hort. teste, cui Caros Alpinus videtur: radicibus serè Mei figurâ & sapore, sed infirmioribus. Idem in descr. montis Fracti lib. de Lunar. Dauci aut Cari montani genus esse confirmat, radice simplici, nigra, oblonga, & circa caput setosa.

Mutellina. Caros alpinus.

Ex his perspicue licet cognoscere C. Bauhinum descriptionem suam ex Aretij & Gesneri verbis concinnasse, quamvis eos silentio prætereat, nec fortè unquam suâ manu plantam ipsam collegisse.

Camer. hist. germ. Mutellinam similem ait Meo vulgaris, sed folia latiora & flores magis rubicundos: Gesnerum existimare posse allumi pro Dauco Cretico. In epit. vocat Mutellinam, Meum Alpinum, vel

vel Carum Alpinum, & Sefeli Creticum quorundam. Descriptionem quam ponit, ex aliis mutuo accepit, ut & figuram, licet eorundem non meminerit.

Ponæ in Baldo dicitur Mutelina Gesn. & Camer. Meum Alpinum quorundam.

Mutelina mihi denominata est hæc planta in monte Rhetio prope Burmum Iunio collecta.

Ver.

Facile autem conjectu fuerit, hujus plantæ radicem, cum aromatica sit, excalfacere posse, proindeque Dauci Cretici loco usui valere, Gesnerum recte collegisse in itinere nostro, utpote quo efficacior censuit. Condiunt hæc lactarij colostræ & recoctam suam Glaronenses & Valsij. Ejus pabulo (ut etiam C. Bauh. intellexit ex pastoribus Bernensibus) in montibus vaccæ plurimum & optimum lac reddunt, sicut & Mei pabulo in Apulia.

DAUCVS MONTANVS CLVSII

flore carneo, semine Selino hortensis æquali.

Def.

HVC ex radice prodeunt quinæ aut senæ tenuiorum foliorum alæ, Sefeli prætenfis (quod abundè in totius inferioris Austriæ pratis nascitur) alatis foliis penè similes, sed longè minores, neque palmi amplitudinem excedentes, sed proximè ad Acus pastoris vulgaris folia accedentes, admodum virides: inter quas caulis prodit pedalis, nudus, striatus, satis gracilis, qui summo fastigio binas aut ternas sustinet parvas, & bene confertas umbellas flosculorum è rubro dilutè purpurantium, sive carnei, ut vulgò loquuntur, coloris, quinque foliolis constantium, quos excipiunt Selini hortensis æqualia semina: radix digitalis est longitudinis, cortice foris nigricante, rugoso, & multis tenuibus fibris prædita.

Tota planta Daucum vulgare quodammodo redolet, & illius gustum etiam refert.

Locus cum tempore.

Elegans hoc Daucigenus in Alpium Austriæ, & Stiriz sublimibus pratis nascitur. floret Iunio, in hortis etiam Majo, descriptore autore Clusio.

DAUCVS MONTANVS, SEMINE

Cretico simili, non lanuginoso, valdè odorato, specie Staphylini, umbellâ clausâ.

Def.

DAUCUM montanum apud nos, inquit Cæsalpinus, in Alpibus nascitur; semine alioqui Cretico simile, sed nequaquam lanuginosum, acre, & valde odoratum: ejus planta foliis constat non capillaribus, ut Fœniculi, sed specie Staphylini longo pediculo in adnexu folioso, prædura hæc & odorata: caulis striatus, cubitalis, reperitur brevior, non ultra dodrantem: umbellæ clauduntur, ut Staphylini: radix singularis, in altum descendens, ut Pastinacæ.


Daucum hunc montanum Dioscorides inter genera Dauci, secundo loco describit; Plinius verò tertio recenset.

PANACES ASCLEPIVM GVIL-

landino flore albo folio aliquatenus Carotæ, sed tenuiori.

Def.

Folia habet divisurâ ferè Carotæ vulgaris, quorum tamen segmenta tenuiora, delicatioraque sunt & rariora, nequaquam, ut illa, hirsuta. caules canaliculati, tenues: umbellæ Ammeos vulgaris pares, in quibus flosculi minuti, albi: semen foliaceum, geminum, oblongum, Thapliæ quorundam seauit



simile, minus, candidius, aromaticum, amarum, tres quatuorve costas exterius, interius quoque lineas, sed pauciores, nigricantesque habens.

Frater C. Bauh. attulit plantam ex horto Patavino nomine Panacis Asclepiadis Guilandini.

Possit pro hac summi figura Lobelij in Obs. p. 452. titulo Thapliæ Carotæ effigie, licet descriptione aliam intelligat plantam.

PANACES ASCLEPIVM ALTERVM Dalechampi.



PAnaces Asclepium alterum Dalechampi in asperis locis & tumulis propè Monspelium provenit, ut legimus apud Lugdunensem p. 740. radice Apij, candidâ, tenui, acri, odoratâ, folio tamen Apij aut Coriandri potius, quàm Fœniculi, hirsuto; flore luteo in umbellis circinnatæ rotundatatis.

Bauh. phyt. inter Libanotides (Fœculæ folio scilicet ut patet ex pin. ubi

quinto loco ponit, eique umbellam luteam tribuit) quarto loco refert, & Panax Asclepium alterum, Lugd. facit.

PANACES CHIRONIVM VETERIBUS. CAP. XXX.

PAnaces Chironium [παῖνες χηρόνιον. Cat. ἀσπὶν Diosc. ci δὲ χηρόνιον.] in Pello monte maxime provenire scripsit Dioscorides: solus esse Amaraco [ver. quidam Origan. Theophrastus etiam Lapathos, Sarrac.] similibus, floribus aureis: radicem tenuem [ἀσπὶν. Theophr. παραπλὸν longam. Plin. parvam] & non altam [profundam Corn.] gustu acrem. Vim habere radicem potam, serpentium veneno resistentem. ac impossitam quoque comâ contra illud ipsum efficacem esse.

Tertium Panaces Chironium cognominatur, inquit Plinius, ab inventore. Folium ejus Lapathos simile, majus tamen & hirsutius: flos aureus, radix parva. Nascitur pingvibus locis. Hujus flos efficacissimus, eoque amplius quàm supra dicta prodest. Ita Plinius ex Theophrasto, ut apparet teste Cor. Theophr. natio, cujus verba hæc sunt. ἔχει τὸ χηρόνιον ἀσπὶν ὁμοίαν

rd locis copiosum & frequens. Ex iis tandem, quæ de Caro Paulus dixit, ratiocinatur & colligit vulgarem & quotidiani usûs radicem fuisse, Pastinacis congenerem, aut illis non dissimilem.

Arquifolia. Guajacum, quod Lignum sanctum vocant, ab *Guaiacum.* Avicenna l. 2. sui Canonis Caron vocari ait Amatus.

Carota. Redarguer di Monachi qui in Mesuem commentati, credidère Carum esse semen rubentis illius radice, quæ vulgò Carota vocatur, de qua ante dictum.

Pastinaca germanica. Pastinacam majorem sive germanicam, Gesnerus in Cat. pl. Caron cognominat.

Mutellina. Mutellina, vulgo in Alpibus Nuttri vocata, Caros Alpinus à quibusdam habetur.

Gingidium. Gingidium, quibusdam teste Cordo in Diosc. Carui de Syria nuncupatur.

Cacalia. Cacalia Plinio, officinis Carvi agreste dicitur, auctore Ruellio.

Substituta. Carvi loco, Anisum ponunt Collegium Florent. *Anisum.* Borgarucus, & Monachi in Mesuem.

Daucum. Carvi loco Daucus à Colleg. Florent. & Borgaruco substituitur.

Cyminum. Carvi loco Cyminum Tractatus qui pro quo sumendum præcipit.

Nigella. Carvus, Carvi & Carvia non est Nigella quod Pandectarius prodit.

Piper. Carvi loco Piper à Tractatu qui pro quo præscribitur.

Cardamum. Nonnulli Iuniorum, ut Simon Ianuensis, Pandectarius, Luminare majus & cæteri confundunt Cardamomum, quod Carvi agreste falsò interpretatum legitur.

Bacca Lauri. Careos loco Baccas Lauri Tractatus qui pro quo quondam admittit.

CAROS.

Deser.



CArum ex radice singulari, longa, crassitudine pollicari, & majore, rugosa, adnatus quibusdam & fibris aucta, alba, sapore aromatico & acrisculo ut Pastinacæ, caules proferunt multos, cubitum & sesquicubitum altos, striatos, geniculatos, in ramos subinde divisos: folia longocarinato pediculis, sed angustis, partim à radice, partim ex ramulorum alis enata, Staphylini foliis similia, sed per

longiora intervalla alas proferentia: in ramulorum extremis umbellæ non ingrato odore: flores singulares albi, aut rubescentes, ex quinque foliolis cordatis, non nihilque ad fissuram cuspis compositi: ex quorum umbilico virenti stamina tenuissima exeunt albicantia apicibus virentibus: semen succedit oblongum, striatum, sapore acris & aromatico.

Carvi Siliqua, Masc. Carum officinis vulgo Carvi dicitur, inquit Matthioli, semen omnibus notum. Planta nascitur in pratis & collibus, præsertim in montibus & convalibus, Pastinacæ silvestris non absimilis, caulibus ab una radice pluribus quadrangulis, cubitalibus: umbellæ floribus candidis referta, semine Aniso lon-

giore, anguloso, subnigricante. Radice longâ, sapore mariesculo simul & acris. Sed maximè, meo quidem *Afonach* *rum error.* judicio, redarguendi sunt Monachi illi, qui in Mesuem commentarios ediderunt: quippe qui non sine magno errore & aperto crediderint, Carum semen esse rubentis illius radice, quæ vulgò Carota vocatur. Quandoquidem Carotarum semini nulla Cari qualitas inest: id enim ad eam acris non est, ut tertio calfacientium ac exsiccantium ordini adscribi possit, quod tamen de Caro testatur Galenus.

Cuminum pratense vocat Bauh. apud Matthiolum, seu Carum, à Caria regione, ubi laudatissimum nasci scribit. Hujus verò inter Staphylinos Athenæum meminisse putat: sed multum aberrat. Athenæus, ut aliàs quoque monuimus, Pastinacam Carotam dictam intelligit, quæ culturâ & foliis & semine vegetior redditur.

Ceterum cujus nomen græcum est *καριον* & *καριον* & *καριον* & apud Aëtiū *καριον*, apud Simeonem Sethi *καριον* & *καριον*, hoc Latinis (ut Ruell. Brunf. Trago, Dod. gall. Gesn. h.) Caros dicitur, & Carus (ut Lac. Cord. in Diosc. & h. st. Dod. lat. Lob. Cast. Lugd. Tab. & Cam.) itémque Careum (ut Fuchsio, qui secutus est Plinium) & Carum (ut Turn. Cord. in Diosc. Matth. Lac. Ang. Lob. Dod. Cast. Lug. Tab. & Ger. inquit C. Bauh. in pin. ubi vocat Carni i. & Cuminum pratense.) officinis & herbariis (Lon. Adv. Caf. & Thal.) paterno ut plurimum casu cognitum Carvi vocatur, quo tamen nomine semina omnes uno ore vocitant, licet non desint qui Careo semen appellent. Sed & Carium & Caroum, Carnabum ac Carnabadium Simeonis Sethi seu Actuarij, ad differentiam Carnabadium Nicolai Myrephi, quod Cuminum est Arab. Serapioni Carvia & Carvium. Averrhoi *Nauoca* [*Navoca* Tragus] & aliàs *Karavia*, *Karvi*, *Carguet*, *Karma*, *Altorsili*, *Harunij*, *Zanarbi* & *Carunacari*, videturque quod Græci recentiores nomen Carnabi & Carnabadij ab Arabibus desumpserint. Hebræis *Kammon*, Chaldæis *Kemona*. Sed dubitat Tragus an ad hoc Cuminum, an verò ad Cyminum Romanū hæc appellationes pertineant. Is sibi falsò persuadet hanc plantam Athenæum Pastinacam majorem vocasse. Germ. *Seldtsümmech* / *Wisenkummel* / & *Mattenkummel* / (Cuminum pratense hæc verba sonant) Item *Bim* / & *Bimmel* / quæ tamen nomina de Cumino propriè dicuntur. *Wegkummel* / quoniam nonnunquam ad itinera & vias reperitur: Iuliacensibus & Colonienensibus *Fischkummel* / & *Speiskummel* / quod eo in cibis & præsertim in piscibus coquendis id adhibeant. Belg. *Carue* / *Euyderpeen* / *Suercepen* : Fris. *Hoffhuym* : Gall. *Carvi*, *Cumin* & *Sise* : Ital. *Caro* : Milanensibus *Carlo* : Vicentibus *Carvin* : Venetis *Carvi*. Hisp. *Caravea* & addito articulo *Alcaravea*. Angl. *Carumayco*. Boh. *Kryn laucny*.

In pinguibus ac latis campis herbosis & pratis, *Loem camp* *tempore.* quæ subinde rigantur, apud Germanos Bohemosque frequens nascitur, à Maio mense usque ad Augustum & flores, & semen proferens. Sicciora Hungariæ prata hoc abundant, & magnam copiam in quotidianum usum singulis annis suppeditant. Copiosè cretat in Frisicæ pratis inter Marien-Hoff & Werden proximè litus. Basileæ, Tiguri, Montbelgardi & Ebroduni passim in pratis provenit florens Maio; Genevæ in principio mensis Aprilis. In horto E. C. latum eo anno nec caulem, nec florem protulit.

Hodierno die, auctore Trago, semen Cari panis *Vires* *et* *visu.* adiectum apprimè conducit, cascisque quoque appositum jucundo illos commendat odore, sicut & omnes alios cibos. In sacculo lineo semen calidum impositum vetri, flatus disciunt, à purgatione in colica passione. Passim semen hoc in Germania usu

fre-

venienter vendito eo olere filium in summa paupertate educasse. Nec antiquæ hominis paupertati illudentes, sed ad virtutem in angusta re studium admirantes totis sublellis au lito versiculo illo exultabant. Nota tunc omnibus Scandix erat, vulgare & sponte sua nascens, locis plerumque incultis olus, plebis cibis & quotidianum pulmentum, & acetarium quo ad sanitatem magis, quam quæsitis toto mari & orbe obsoniis proficerent. Sed quod utilissimum in ea est, urinam cit & renes egregie laxat, id quod veteres Græci testati sunt, utiturque ad eas difficultates sepius Ægineta, jubetque in primo si non justè quotidie purgetur aliquis Scandice, Apio, Asparago, similibusque aliis sollicitandam esse urinam. Plin. l. 22. cap. ejusdem numeri, inquit Marcellus, multis Scandicem prosequitur, peculiarèque illi laudem tribuit, quod venere fatigato corpori succurrit, marcescentisque senio jam coitus excitat. Quo magis mirum in tanta morum ruina & labe in nullo honore esse herbam, neque ab herbariis nostris penitus cognosci. Græci nunc etiam Scandicem appellant, nihilque in eorum gente notius, sed non congruentem antiquorum notis ostendunt. Quam enim illi Scandicem modò appellant, latiori & quasi Betæ folio est. Antiquiores autem, ut in re nota, nullas ejus certas notas tradiderunt. Veruntamen ut ex multis conicere licet, tenui & quasi capillato folio Plinius esse prodidit. Coniunxit enim, ut verisimile est, congeneres plantas (Scandicem, Caucalum & Tragopogon) in foliorum figura, quæ tenui folio, & capillaceo sunt. Et hanc ob causam non abs re penitus fuerit similem in foliorum figura illis credere.

De Scandice hæc posteritati reliquit scripta Hermol. coroll. 371. Scandix olus est sylvestre Plauto quoque dictum. Eademque erat, ut Theophrastus ait, Enthussicon: sive ut A. henæus & Plinius Anthriscum, si tenuiora folia odoratoraque haberet. Differt Scandix à Sandice, quod Scandix herba est, Sandix metallica. Scandix aliter non describitur, quam quod olus est sylvestre, gustu acri subamaroque, foliis Anthrisci, sed majoribus & minus odoratis. In exemplari græco Dioscoridis appictam vidi Scandicem Fœniculi folio serè cum corniculis, in summo floribus luteis sive albis. Hæc ipsa specie in silvis quoque visitur, frutice odorato, flore candido. Paulus, Aëtius, & si rectè memini, inquit Barbarus, Galenus, similem Gingidio fecere Scandicem.

Sin autem inter Scandicem & Gingidium similitudo est, velut Galenus dixit, & Gingidium Pastinacæ sylvestris simile est, velut Dioscorides affirmavit: sequitur etiam Scandicem Pastinacæ similem esse, & nostrum olus Bersel dictum, inquit Cornarius, referre: atque sic tres herbas inter se similes esse, nec Galenum à Dioscoride dissentire.

Quænam hodie Scandix sit, his est inter authores. Est enim Scandix quibusdam, herba ex quam plurimis apicibus coagmentata.

Scandix multis est, quod Pecten veneris eum quam plurimis inscripsimus.

Alia est Scandix semine rostrato, quod Pecten veneris paucioribus rostris appellamus.

Scandix Cretica C. Bauhino, Pecten veneris Creticum cognominatur.

Scandicem Creticæ similem ejusdem C. Bauhini dicimus Pecten Veneris tenuissimis foliis, Anthriscum Plinij.

Scandix Turnero, est Lappula canaria dicta flore majore.

Scandix dicitur quibusdam de Gingidio Matthioli, quam Vitragam credimus.

An Percheper Anglorum sit Scandix quærit Lobelan Obi. p. 419.

Pandectarius (authore Cronemburg. de comp. med. in dialatyrio) insigni errore Raphanum à Galeno 8. simpl. Scandicem appellari ait.

Hermannus Comes à Nevenate Isatidem Scandicem, licet falsò vocari prodit.

Tragopogon etiam Scandix à Plinio vocatur, nisi, quod suspicatur Hermol. coroll. 376. depravata existat apud Plinium lectio.

Differt tandem Scandix à Scandice, quod Scandix herba est, Sandix metallica.

SCANDIX. QVIBVSDAM, VMBELL- la ex quam plurimis apicibus coag- mentata.



Radice est Pastinacæ sylvestris similis, amara & subacri, eodem serè sapore, qui & in radice Smyrni, sive Pastoselini Macedonici deprehenditur: foliis Pastinacæ sylvestris latioribus, ad Apii folium magis accedentibus, candidis, minimè hirtis, & caule per intervalla sic prodeuntibus, ut in corticosam membranam delatatum prope caulem folium alterum intra se cõ-

cipiat, & foras protrudat: caule striato, cubitali: flore in umbella candido, non Fœniculi modo & aliarum id genus plantarum, quæ umbellam gerunt, pediculis rotatim constructa, sed quamplurimis apicibus ex candido herbaceis velut coagmentata, peculiari quadam compositione, in nullis aliis perspecta. Hætenus Lugdunensis, qui herbam hæc depictam & descriptam Scandicem vocat p. 712. Bauh. phyt. & pin. Scandix umbella ex apicibus coagmentata.

PECTEN VENERIS.



Pecten veneris vulgaris ex radice exigua, interdum culta serè minimi digiti crassitudine, dulci sapore prædita, caules producit ternos, dodrantes, hirsutos, iuxta terram rubeantes, superius virentes strisque ut plurimum rubris, distinctos, in ramos divisos; folia longis serè pediculis appensa, Coriandridivisurâ tenui, sapore subdulci, subacri & nonni-

hil nauseoso; Dodonæo folia tenuiora, quam lutea

radicis Pastinacæ, latiora verò crebriusque dissecta, nigriora item, minutiusque odorata quàm Chærefolii; flores umbellatim positi colore albo, ad Myrthidis flores quàm proximè accedentes, nisi quòd incerti minime sunt, ut illi, pediculisque longioribus ceu corniculis, quod siliquis est rudimentum, insident, ad parvæ umbellæ basim quina folia caulem latis brevibusque pediculis amplectuntur, quæ postea minutim, reliquorum instar, dividuntur: semen longum in mucronem extenuatum rostellis, aut citius, ut inquit Dodonæus, crassis magnisque acubus simile: rostra matura semine dissiliunt in duas partes, manente in medio membranâ tenui, albâ, simili quodammodo acui Tritici aut Hordei.

Ang. negar Scandicem esse. Non desunt, inquit Anguill. epist. 7. qui velint plantam, quæ dicitur Pecten veneris esse Scandicem: sed deficientibus facultatibus, nescio quomodo possit defendi illorum opinio.

Scandix est Dodon. Scandix quidem creditur à Dodon. tam gall. quàm lat. in folio. Inscrubitur autem in hist. gall. Scandix, appellaturque & Herba scanaria, Acus pastoris, aut Acula, à semine acum referente, idèoque gallicè *aigne de Berger* appellatur, belg. *Maelde Berol* His additur in fol. lat. Scandicem Latini appellant, à Græcis mutuato nomine. Inter nothas autem voces reperitur Romanos Scanariam herbam & Aculam, ob rationem dictam, aptè vocare. Ruellius hanc sub Pectinis Veneris nomine describit: apud Hispanos alibi in forum venalis infertur, ac editur: *Quixones* vocant: Angli *Pinke neldes* & *Storres byll* appellant. Hæc est, inquit Plin. l. 22. c. 22. quam Aristophanes Euripidi Poëtæ obicit joculariter: matrem ejus ne olus quidem legitimum vendidisse olim sed Scandicem. Hec ille qui iconem habet, hoc titulo: Scandix, Pecten Veneris.

Pecten Vern. Lob. De Pectine Veneris hæc scribit Lobel. adv. p. 24. Si quid conjecturæ captari potest, cujusmodi plantæ fuerit Scandix, id sanè ex capitum consequutione [apud Dioscoridem] stirpiumque cognatione accipiendum videtur. Descriptio enim non tam ambigua, quàm nulla est. Hæc tria [*Gingidium, Cerefolium, & Scandix*] serie recensita olera sylvestria; vix dum innotuere ulli, propterea quia incertis & paucis, partim etiam nullis verbis designata sunt. Nam Pecten veneris, Fumariam gustu, foliis & vlu repræsentat: vulgus Pharmacopæorum etiam Veneris putat & usurpat. Acrimonie verò & amaroris ejusdem momenti sunt argumenta, qualia sunt Galeni de Fumariæ acrimonia: quam sententiam merito docti viri vellicant, & ipsa reclamant res. Hæc ille, qui Scandicem vocat, & rursus titulo de Myrthide, Scandicem vulgarem oleraceam, ac Myrthidem Plinianam suspicari aliquem meritis posse dicit. In Obs. p. 419. (ubi dubitat an sit Scandix) itemque in Icon. p. 726. appellat Veneris pecten Plinij.

Scandix Hermolai, March. Matthioli existimat Hermolaum per suam Scandicem Pecten veneris intelligere, quod admodum difficile est credere. Nos equidem Scandicem Hermolai ignoramus, ejusque descriptionem ante posuimus. Matthioli autem verba hæc sunt. Quamquam Scandix antiquis fuerit stirps notissima: cum tamen hætenus eorum repererim neminem, cui fides sit adhibenda, qui Scandicem notis aliquibus, vel lineamentis describeret, nesciverim per se quonam pacto, quave ratione asserere possit & in Italia Scandicem nasci, & pariter dignosci à conspurcibus. Cæterum scribit Hermolaus se videri Scandicem in exemplari græco Dioscoridis appictam foliis Fæniculo proximis &c. Hanc ipsam ego quoque sæpius vidi, mihi tamen magis Fumariam & quadantenus An-

themidem referre videtur, quàm Fæniculum. Flores gent Chærefolio proximis, albicantesque, è quibus tandem prodeunt cornicula tenuia, longiuscula, recta, acuminata, acubus, quæ in Geranio emicant, non dissimilia, quemadmodum & in Chærefolio visuntur, licet huic longè tenuiora, & fragiliora innascentur. Quo sit ut rectè intuentibus specie videntur, non autem genere differre hæc plantæ haud dubiè appareant: quod etiam indicat eorum sapor. Quapropter in eorum sanè rem sententiam, si hæc, quam Scandicem putant, tantum acrimoniæ & amaroris gustantibus relinqueret, quantum in Scandice veteres inveniri prodiderunt. Verùm cum eas non obscuras quidem qualitates, quas veteres verè Scandici assignant, in hac, ut ita dicam, nova Scandice nunquam ego repererim, cogor omnino eorum sententia refragari, & ab ipsis dissentire. Quapropter nisi regionis & climatis ratione, & locorum mutatione eveniat, ut hæc stirps omnem tum acrimoniam, tum amarorem exuerit, non facile quidem adduci poterò, ut credam hanc esse Scandicem. Neque ab hac mea me deterret opinione Hermolaus, quòd viderit is Scandicem hanc in græco Dioscoridis codice appictam: quippe quum inter omnes rei herbariæ scriptores nullus, quod equidem sciam, reperitur, qui per notas aliquas Scandicem describeret, nesciverim ego quamam historiâ, & ratione fretus aliquis unquam illam picturâ expresserit: nisi fortasse Dioscorides ipse manu propria eo in libro ipsum appinxerit. Plinius Scandicem Anthriscæ similem reddidit. Sed cum ignotum per ignotius describeret, nihil nobis luminis his in tenebris affert. Sed ex Galeni verbis de Scandice, etiam manifestè colligere licet, plantam quam pro Scandice accepit Hermolaus, quàmque pro eadem plerique recentium hodie ostendunt, nullo pacto legitimam esse Scandicem. Quandoquidem ea non tantam acrimoniam, nec amaritudinem gustui repræsentat, ut dici possit primum caliditatis & siccitatis gradum excedere, id quod Galenus de Scandice prodidit. Cæterum, si nulla est planta, cui hæc comparari possit, eam ad amissim mihi quidem referre videtur, quam (apud Plin. l. 24. c. 19. à pectinum similitudine, Veneris pecten appellant, ei jus radix cum Malva tusa, omnia corpori infixæ extrahit. Siquidem hæc radice nititur candida, cauliculis semipede majoribus: foliis silvestris Pastinacæ, vel ferè Anthemidis, exilibus: floribus albis, tenuibus, emicantibus, summatim ab eodem capitello compluribus, acuminatis rostellis, inter se disjunctis, quæ pectines planè referunt, quibus linum mulieres concinnant. Quæ certè omnia reperiuntur in hac vulgari Scandice. Hæc Matthioli, qui Pecten veneris inscribit, ac in epit. germ. wild Mören in hist. verò *Bechelsam* appellat. Testatur Camer. ad hist. Matthioli germ. Pecten veneris Italos vocare adhuc Aculam hodierno die, quo nomine veteres Scandicem vocarint, ita ut non planè cum Matthiolo sit negandum esse Scandicem. In hort. Scandicem vocat & Pecten veneris, quo nomine & Cast. appellat. Lugd. Pecten veneris, Scandicem quorundam. Geln. h. Pecten veneris sive Scandicem; In cat. Scandix olus sylvestre, quod imprudenter inter Dauci genera officinas referre prudenter notat. vocat germ. wild *Böble fraut*, gall. *Cerfeule sauvage*. Lac. Scandicem, Scanariam & Aculam quorundam. Clus. hist. Pecten veneris vulgi, sive Scandicem silvestrem. Tab. Scandicem, i. herbanu

Chærefolii angere

Scandicem veteris negat March

Pecten Vern. Plinij

Scandix nō neganda

ham Scanariam, *Madelförffel / Venus Strell.*
Non est An- Bell. in epist. ad Clusium ait Pectini veneris vul-
divisum. gar non convenire vires à Plinio tributas Antrisco.
Pecten Ge- Nam Pecten veneris neque odoratum esse, neque
neris. ab ullo comedi: vocari autem *ἀνθρίσκου*. Scandicem
Scandix in- verò legitimam dici *καὶ τὴν ἀνθρίσκου* & *σκανδίν*, quæ
guisam. comedatur quidem, sed ipsa neque venerem exci-
 tet, neque fatigato venere corpori succurrat. unde
 appareat error Andreæ Tiraquelli comm. in legem
 connubialem, qui Scand. ci hoc tribuit, quod Plin-
 ius Antrisci peculiare esse scripserat. Hæc Bel-
 lus, qui Scandicem à Dodonæo affabrè pingi testat-
 ur. Eum autem non intelligimus dum scribit Pec-
 ten veneris à nemine comedi: contrarium asse-
 rente Dodonæo: nec scio quam plantam intelligat
 Bellus per Scandicem legitimam, & per Scandicem
 à Dodonæo affabrè pictam: is enim pro Scandice
 nihil aliud pingit, quàm Pecten veneris.

Scandix
Gulga Aci-
cala, C. 4.

Scandicem vulgò Aciculam ab Italici dicit refert
 Cæsalpinus; frequentem in agri inter segetes, frut-
 ticofam foliis minutissimè scissis, ut Chamæmeli: in
 cacuminibus esse flosculos candidos, longis veluti
 stilibus insidentes, similitudine acis: in his detracto
 putamine semen contineri nigrum, & oblongum,
 gustu non insuavè, ut neque folia. Dioscoridem
 de Scandice dicere esse olus silvestre, &c. Galenum
 eadem confirmare, conjungentem cum Gingidio,
 sed plantam neminem describere. tantùm reperiri
 apud Theophrastum Scandicis mentionem inter
 eas plantas, quarum caules humi procumbunt:
 quo in loco non *ἐν τῇ καυλῇ*, i.e. anni caulibus legem-
 dum putat, sed *ἐν τῇ ῥίζῃ*, i.e. humicaulibus, ut op-
 ponatur eis, quæ dixerint testicaulia & nervicaulia.
 Plinium Scandicem inter olera silvestria recensere
 & vilia. Aristophanem objicere Euripidi matrem
 Scandicem vendidisse non olus legitimum, Anthri-
 sco similem esse. Hermolaum appiētā vidisse
 Scandicem in vetusto codice Dioscoridis, folio serè
 Fœniculi, &c. hæc ipsa specie in silvis reperiri: frut-
 tice odorato: flore candido. Ex his significari plan-
 tam Scandicem [*Pecten veneris*] nam & inter anti-
 qua nomina apud Dioscoridem Aciculam appel-
 latam esse à similitudine acus. Hæc Cæsalpinus,
 qui Pecten veneris Scandicem antiquorum esse re-
 tur, sed non absque errore.

Scandix
antiquo-
rum Caf.
non sine
errore.

Bauh. pin. Scandix 2. semine rostrato vulgaris:
 (an Pecten veneris Plinij: inquit in phyl.) Pecten
 veneris, Matth. Ang. Geln. h. Adv. Lob. Cast. Lugd.
 Cam. & Ger. Scandix, Dodon. Lac. Cord. in Diosc.
 Geln. h. Cæf. & Tab. Pecten veneris, *ἀνθρίσκου*
 vulgò dicta, Hon. Bell. ep. ad Clus. Apud Matth.
 Scandix 1. semine rostrato vulgaris: 1. Pecten vene-
 ris. Scribitur in fine verborum Matthioli C. Bauhi-
 ni Scandicem appellari It. Scandice: Pecten veneris.
 Ital. *Pectine de venere* Germ. wild Möhren. Sed po-
 strema hæc nomina non invenio in meis exempla-
 ribus Matthioli.

Lacum cum
tempore.

Pecten veneris, quod Plinij non negarim, pro-
 venit circa Monspehum passim in segetibus, florens
 mense Martio, & Aprili siliquas ferens, quotannis
 ex semine deciduo sese propagans. Observavi hoc
 Montbelgardi in agris prope vineas la Chau, in
 horto E. C. Patavij, Veronæ in Cœnobio di S. Io-
 anne del monte, passim circa Tigurum in vineis,
 Tubingæ, Esslingæ, & Genævæ in agris Februarij
 mensis principio, mense Maio cum siliquis. Basileæ
 in segetibus prope S. Iacobum collegit C. Bauhinus;
 Poræ in monte Baldo; Dodonæus in arvis purgui-
 latæque Solo, & non rari inter ipsas segetes non
 modò in Italia, verùm & in Belgio, Maio & Junio
 mensibus præput vigens.

Pecten
et
8/100.

Pectinis veneris radix cum Malva tusa omnia
 corporis infixa extrahit, id quod ipsa natura ostendit.
 Tom. III.

disse creditur in acubus seminum. Eadem cum her-
 ba & floribus in patella calefacta ex vino albo me-
 raco & butyro una cum hortensis Petroselini foliis,
 pubique adhibita, remorantem urinam, pueris per-
 serum provocat, authore Matthiolo. Quidam an-
 tequàm floreat, & tenebra est, cum butyro & oleo, &c.

Primum
est.

PECTEN VENERIS TENVISSIME dissectis foliis, Antriscus Ca- sabonæ.



EX radice tenui, *Desit.*
 Eparum fibrosa,
 caulis unus, vel
 plures, tenuis exit:
 folia ad radicem ex
 longiusculo pedi-
 culo tenuissima,
 Mei serè divisura,
 quæ per caules pe-
 diculi sui vagina
 eos complectuntur:
 indidemque ap-
 pui seorsim pediculi
 prodeunt dulum,
 triumve unciarum,
 quorum extremis
 hærent in minima
 umbella flosculi,
 qui post se radiata
 relinquunt corni-
 cula, Pectinis ve-
 neris, uncia circi-
 ter longa, at breviora & tenuiora quàm in illa, qui-
 na plerumque ubi parvæ plantæ, ubi majores, plu-
 ra. Hæc, ni multum fallor, Montbelgardi pluri-
 mum degeneravit, & excrevit in caules cubitales,
 crassos, ramolos, in quibus rostra sive cornicula
 plura non minora, imò majora, quàm in Pectine
 veneris vulgari, se in latera incurvantia, mense Au-
 gusto pene matura. Primum autem semina acce-
 pit ex Stutgardiano horto E. C. VVirtemb. quo
 missa fuerunt per insignem hortulanum Magni Du-
 cis Casabonæ, titulo Antrisci Plinij Candix. An-
 no sequenti 1595. cum essemus Heidelbergæ siccam
 plantam dedit D. Sprengerus valde parvam, uncia-
 rum circiter sex, eodem, quo Casabona, titulo. An-
 no verò 1598. pro Scandice Cretica pulchram plan-
 tam multo majorem, pedalem serè accepi Basileæ à
 D. Richnero: similem nobis dedit anno 1599. frater
 C. Bauhin. sed minorem nomine Antrisci ex Creta
 transmissi.

Anthriscum
Plin. Caf.

Scandix
Cretica.

De hoc Pectine veneris, sive Antrisco Casabonæ
 agit Honor. Bellus in epist. ad Clusium, his verbis. *Anthriscum*
 Anthriscus herba similima Scandicæ legitimæ [*Pecti-*
ni veneris] est, folia ferens tenuiora, crebrius divisa,
 odoratiora multò; cauliculi ejus dodrantes, flo-
 res in umbellis albi, semina longa, sed minora quàm
 Scandicis: tota planta suavissimi gustus est: prove-
 nit latis collibus, locis siccis, & inter saxa: mandit-
 ur in acetariis Vere, & maximè appetitur. Vene-
 rem mirum in modum excitat & adjuvat, ideo *ῥιζο-*
λεπιδία nomine obscuro vulgò vocatur, quod
 vulvæ purgamentum significat. Meminit Antri-
 sci Plinius l. 22. cap. 22. his verbis. Eadem erat An-
 triscus, si tenuiora folia & odoratiora haberet, &c.
 quæ quidem verba corrupta sunt & hoc modo le-
 genda: Eadem erat Anthriscus, nisi tenuiora folia
 & odoratiora haberet. Nam si legatur *si*, & non *Plinius cor-*
rigitur. nisi, Anthriscus esset Pecten veneris vulgaris, cui
 non conveniunt vires à Plinio tributa Anthri-
 sco.


Anthriscum Clusius etiam hanc intelligit, cum ait. A nullo recentiorum hactenus descriptam arbitror Anthrisci Plinij historiam, quæ nata Lugduni Batavorum in Academico horto anno 1595. semine è Cretæ Cydonia ad me misso à docto viro Honor. Bello, ejus urbis Medico. Dodrantalis est planta, statim à radice tenui, longâ, albâ, paucis fibris donatâ, multa folia in multitudine, tenuisque alas divisa proferens, præne instar foliorum Scandicis, non injucundi, si terantur, odoris, neque, si gustentur, saporis, qualis serè Chæresfolij vulgaris, inter quæ breves prodeunt cauliculi, quadam tenui lanugine præditi, qui in breves, vides, gracilesque ramulos dividuntur, sustinentes umbellulas, quatuor, quinque, aut sex flosculorum, quinque foliolis albis præditorum, in quorum medio exile quidpiam ex purpura nigricans: flosculis succedunt, seu verius flosculi sustinentur, à stilibus quibusdam gracilibus, qui paulatim in uncialem longitudinem succrescentes, formam referunt thecarum seminis Pectinis Veneris vulgè vocatæ plantæ, sive Scandicis silvestris. Flores & semen, sed immaturum protulit Junio.

Syn. C. B. Bauh. phyt. Scandix 5. sive Creticæ similis: Ex radice gracili, oblonga, candida, caulem palmarem, tennem, angulosum, hirsutum potissimum parte infernâ emittens, foliis Scandicis vulgaris, sed tenuioribus, flore pusillo albo in exiguis umbellis, cui succedit semen oblongum ut in Cretico Pectine veneris, sed brevius & paucius etiam in apice bipartitum, subhirsutum. Hanc Casabona Anthriscum Plinii vocat. Huic figura Apij silvestris Dalechampi apud Lugd. p. 700. per omnia conveniret, si semen responderet, & caules hirsuti mentionem faceret. Eid. B. pin. Scandix 4. Cretica minor: quæ 3. & 5. in phyt. at 2. in prod. Anthriscus Plinij, Clus. hist. Anthriscus vulgè *τρίανθοις*, quod vulgè purgamentum significat, cum venerem excitet, Belli ep. 1. ad Clus. an Scandix legitima quæ *κατάρκιν* & *αυανθία*, quæ comeditur, Eid. lib. 1. Anisomarathrum Apulum, Colum. & Clus. hist. ap. alt. an Apium silv. Dalech. Lugd. Duplex est odora & inodora.

PECTEN VENERIS FOLIO TENUIORI, paucioribus rostris.

Def. C.

Hæc palmaris est, radice parvâ, albâ, fibrosâ, Hex qua cauliculi terni, quaternique procumbentes prodeunt, circa quos folia Scandici vulgaris similia, sed tenuiora: umbellæ minores, floribus succedunt semina oblonga acubus similia, non tot ut in Pectine veneris vulgaris, ubi communiter octo observantur, sed bina, terna, quaternave, & illa hæc longitudine media superant.



Syn. Hanc vocat Bauh. phyt. descriptionis autor Scandicem 3. sive semine rostrato Italicam. Apud Matthioli. Scandicem 2. Italicam. Miror ego tantam hirsutiem à fratre appingi siliquis & nullam ejus fieri mentionem in descriptione. Eam misit ait per Doldium Norimbergæ, cujus semen Neapoli

missum fuerit. Hanc C. Bauh. eandem facit in pin. cum præcedenti: an bene considerent alij.

PECTEN VENERIS CRE- ticum.



Def. C. Folia hujus inferiora subrotunda, per oras sunt obliquè dissecta, Saxifragæ minoris Lobelij similia, sed nigriora leviter hirsuta, superiora verò formâ Scandicis vulgaris dissecta. Caulis cubitalis, angulosus, striatus, subhirsutus: umbellâ parvâ sparsâ floribus albis, at latioribus, quàm in vulgari foliis, quibus succedit semen rostratum, decem, duodecim & pluribus rostris simul jun-

ctis: cuilibet rostro apices duo quasi aculei rigidi præfiguntur, quod & in Chæresfolio observare est. Patavio à Doctore Zvingero accepta.

Bauh. descriptori est in phyt. Scandix 4. sive Cretica. apud Matth. Scandix 3. Cretica. Miror autem cum pilorum in siliquis non meminisse in descriptione. Eid. B. pin. Scandix 3. Cretica major: quæ 4. in phyt. 1. in prod.

PERCHEPIER ANGLORVM quibusdam.



Def. C. PLANTULA est plurimum bicuncialis aut tricuncialis, paucis culmulis. Est &, quod numerosa coliculatorum palmarum luxuriat, quos ex geniculis crebris ad summum usque foliola stipant subrotunda, tripartita serè, profundè laciniosa, ad Geranei columbini folia quadrantenus accedentia, licet minora, hirsutaque, inferiora quidem pediculis donata, superiora perbrevis aut

nullo. Inter quæ flosculi delitescent exigui, herbidi, ac nisi rectius intuearis, vix conspicui. Radicula nigra, cava, flexilis, tenax atque dura, in fibras oblongas terminatur.

Tabern. vocat Scandicem minorem / *Hein nadel Scandix* del Bôrsfel / *Hein nadel Möhren* / quæ nomina germanica non conveniunt. nulla enim in hac herba acus observatur. C. Bauhin. in append. phyt. Scandix 6. sive minor Saxifraga (quia

(quia vehementer & repente urinas movet) dicitur. Eid. pin. Chærophyllo 3. sive Chærophyllo nonnihil similis: Percepier (i.e. Saxifraga) Anglorum; Scandix minor, Tab. Alchumilla montana minima, Col. Lob. adv. p. 324. Percepier Anglorum, quo nomine inscribitur etiam in Icon. p. 727. & Obl. p. 419. ubi dubitatur an sit Scandix. De hac autem adv. Qui Percepier Anglicum probe perspectum habent, harum duarum stirpium utriusque [Ceresolio & Scandici] simile esse sciunt, & nequaquam iisdem viribus secundum; amaror etiam & acrimonia in eo percipitur, & passim valetudinis causa olere manditur: Figura ei Ceresolij nuper nati proxima; sed herbula semper est, nusquam spithamæo adultior, toto anno suapte sponte erumpit, arido & trito solo luxuriat, sine caule, foliulis herbaceis. Hanc plantam propono magis, quam assero: quia herbariis non valde notam, neque quod sciam descriptam. Figura proposita à Lobelio vix demonstrat similitudinem cum Ceresolio: appertus etiam caulis, quem ei negat. Considerandum an intellexerit forte plantam diversam à sua figura & nostra.

Lugd. p. 793. intitulat Percepier Anglorum quibusdam. Pona in Baldo Percepier Anglorum Penæ.

Arvis agrisque suapte sponte primo Vere prorumpit, ut etiam in agris Montbelgardi. Circa Patavium inter segetes observavit quoque H. Cherlerus.

Nequaquam Ceresolio viribus est secundum. Amaror etiam & acrimonia in eo percipitur, & passim valetudinis causa olere manditur. Vehementer & repente urinas ciet. muriâ conditum servatur: & ex ea aqua stillatitia magno usu elicitur. Angliæ Bristoiz frequentissimo apud mulierculas usu recepta est.

CHÆREPHYLLON.

CAP. XXXIV.



Vide appellat Chæresolij herbam, radice nitentem albâ, minimi digiti crassitudine, sapore serè Pastinacæ: cujus folia Apij hortensis foliis similia, non ita longa, argutiùs divisa, aversâ parte hirsuta, nonnihil subinde rubentia, sapore aromatico, pediculis sæpè rubentibus, nonnihil hirsutis: caules plures ab eadem radice exsurgunt, ramosi, concavi, striati: in

quorum extremis, ut & ramulorum, flores in umbella rara; parvi, albi, quinque foliolis cordatis toudemque staminibus albidis constantes: semen oblongum, tenue, sapore dulci & aromatico.

Tom. III.

Quæ vulgò Chærophyllo vocatur, Ruellius Gingidium appellat. Hunc sequitur Fuchsi. Geln. in catal. pl. & C. Bauh. qui in phyt. Gingidium 5. vocat, & Chærophyllo Columellæ. An autem Plinij Ceresolium sit, propter breviter asserere non vult. Ipsi potius videtur Anthriscus ejusdem, & fortè *inhusia*, quod Enthusicum vertit Gaza, Theophrasti.

Quum juxta Dioscoridem & Plinium, Scha-phyllo sive Pastinacæ silvestri simile sit Gingidium: & nullum apud nos olus Pastinacæ similis sit, quàm quod vulgò Bersel & Berselfraut vocant: mihi quidem verisimile sit, inquit Cornarius, hoc ipsum olus Gingidium esse. Quamquam ipsa appellatio Chærophyllo refert, & ex ipso corruptum esse videatur. Recenset autem & Chærophyllo inter folia Plinius l. 19. c. 8. his verbis. Rursus alio comitatu, Equinoctio Autumni scribitur Chærophyllo, quod Paderota Græci vocant. Nam verba quæ sequuntur ad Sinapi pertinent. Meminit & Chærophyllo in carmine Columella l. 10. Iam breve Chærophyllo inquit, circa Calendas Octobris obori oportet non frigidissimo loco. Habet & Palladius l. 3. c. 24. Nunc (in Februario) Ceresolium locis frigidis post Idus seratur. desiderat agrum lætum, humidum, stercoreatum. Fieri igitur potuit, ut hi Chærophyllo appellarent, id quod Dioscorides & Galenus & Medici Græci Gingidium dixerunt, ita ut hi Syrorum voce usi sint, illi Græci: & quamquam Palladius ex græca & latina particula compositam vocem usurpet. Sed hæc quidem ex conjectura dico. Quod verò nostrum olus Bersel dictum, refert appellatione Chærophyllo, negari non potest. Quod autem Gingidio illud simile sit, aspectus indicat Pastinacæ penitus referens. Obstat tamen Plinius, qui diversis locis, tanquam de diversis, de Gingidio & Chærophyllo tradidit. Attamen ne hoc infrequens apud ipsum est, ut de eadem re, diversis locis & nominibus agat. Ceterum, quod Galenus & Paulus Scandici simile Gingidium dicunt, id ita accipiendum videtur, velut Gingidium proprium Syrorum fuerit, cujus similitudinem in Asia ac Græcia Scandix habuerit. Hoc enim verba ipsa Galeni declarant: *πλεον ἐν τῇ Ἀσίᾳ τῇ Ἰνδίᾳ οὐται καὶ ἡβρώσονται, παραπλήσιον τῇ τὰ ῥοιὶ σκόνδι.*

Possit itaque etiam ipsa Scandix, nostrum Chærophyllo esse, ut id quod Syris est Gingidium, Asianis & Græcis Scandix, Latinis Chærophyllo & Chæresolium, Germani Latinos æmulau Bersel dixerint. Profectò Dioscorides etiam Scandicem, velut simile olus, mox post Gingidium posuit, non tamen velut Galenus, similitudinem expressè dixit, sed eundem usum ipsi attribuit. Hæc Cornarius, qui Chærophyllo Gingidium aut etiam Scandicem esse frustra conjectatur.

Hujusce sententiæ esse comperiuntur Ruellius & Fuchsius (licet non planè adstipuletur) nec non etiam recentiorum alij in hoc consentiunt, quod Gingidium ea sit planta, quam nos (Itali, inquit Matth.) vulgò Ceresolio, illi verò Chæresolium. Veruntamen cum hæc radice nitatur, quæ nihil amara sentitur, sed potius acris & odorata, quemadmodum & folia; idcirco eorum opinionem non equidem (ut dicam quod sentio) probandam putaverim. Sed ex Galeni verbis de Gingidio facile comprobari potest, Chæresolium non esse Gingidium, quod in ipso Chæresolio ex amaroris & adstrictionis qualitates.

quas Gingidio Galenus adscribit gustu haud manifeste deprehendantur. Idem in post. comm. addit. Non potui unquam eorum subscribere opinionibus qui plantam *Cerofolio* vulgè vocatam Gingidium esse censent. Plin. Chærephyllon, quod Pæderota Græci vocant, acerrimum sapore, ignei effectus, saluberrimum corpori, nostrum esse non potest, quod tam vehementi acredine non sit præditum. In epit. cum addit. Camer. non deesse scribit, qui vulgare Cerofolium Myrrhidem faciant. Verum cum caulis Cicutæ non sit, nec radicis usus: sed foliorum: us profectò subscribendum non esse. Hæc Matthiæolus qui sua ex Hermolao accepit, licet ejus non recordetur. Myrrhidem (inquit Coroll. 730.) sunt qui per Chærephyllon modo nominatum, in hortis passim nascens, intelligant. Plinius (cujus verba postrema de Sinapi dicta videri possunt, de quo it. m. idem loquitur) Chærefolium aliud videtur accepisse. Et certè quæ à Plinio dicuntur de saporis acrimonia, non debent quenkum in eam pertrahere opinionem, ut ipsis fidem habeat. Plinii Chærefolium diversum esse, Plin. verba legenti apparebit.

Oreofelinum, Anguill. Anguill. Oreofelinon, statuit epit. 7. his verbis: Oreofelinum i. e. Apium montanum, nihil aliud est, quàm commune *Cerofolio*, quod quidam Gingidium putant, quod non verum. Theophrastus & Plinius dicunt habere folia Cicutæ. Nunc adhuc in Græcia Apii species existimatur, & in quibusdam locis dicitur *ῥῖσανον*, i. e. Apium montanum.

Negat esse Gingidium & Oreofelinum Dod. Dodon. gall. & lat. in fol. figuram habet Fuchsi, quæ est in leonibus. Negat esse Gingidium, ut plerisque visum fuit. haud amarum siquidem sit, sed grato jucundoque sapore commendetur. Negat quoque & mentè Oreofelinon esse; hortense siquidem sit, non montanum; semen etiam non acre, aut Cumino gustu simile, veluti Oreofelini esse scribatur. Plinii locum de Chærefolio admodum corruptum esse ex Cornario monet, qui & Macro imponere potuerit.

Pro Myrrhide ad m. posse videretur Trago. De Chærefolio hæc scribit Tragus. In initiis P. trofelinon prope simile est, sed tenuius, plumbusque incisuris dissectum, ut eo nomine cum Cicutâ majorem affinitatem contraxisse videatur. Sin autem Chærefolium Apii genus fuerit, quemadmodum Constantinus & alii multi opinantur, jure equidem post Apia proximum locum occupavit. Quod in Dioscoride habeat nomen, non satis constat, ut sunt variae de ea re autorum sententiæ. Ego certè propemodum mihi persuaseram Chærefolium esse Oreofelinon, scilicet montanum Apium, sed non prorsus cum herba ipsa cõvenit historia. Extant autem duo alia apud Dioscoridem capita, quæ satis Chærefolio quadrare videntur, nimirum caput de Silone, seu ut vocavit Hippocrates, Sinnone. Et alterum de Myrrhide, quod Brunfels. ad Chærefolium retulit, quod mihi nequaquam improbat. Nam Chærefolium hoc sativum odoratum est foliisque per omnia excepto odore & sapore Cicutæ similitimum. De hoc autem non facili contenderim, tametsi enim, quod ad odorem, formamque attinet herbæ, descriptio Myrrhidis satis respondeat, tamen radice, quam habet breviusculam Chærefolium ab eadem Myrrhide discrepat. Sed uti aliàs semper inculco, sentiat quisque quod vult, nemini enim erroris causam præbere volo, meam duntaxat indicans sententiam. Columella Chærephyllon appellavit.

Plinii & Apulei Chærefolium. Plinius & Apulejus longè aliud describunt Chærefolium. Apulejus namque Chærefolium suum Bootes, Bootis, Arctophyllon, & Pederos nuncupat. Sed & Plinius Pæderota nominari scribit. Gesn. in cat. Gingidium Dioscoridis esse statuit, quæ sententia uique probanda videtur assensiente

Ruellio. Hæc Tragus, apud quem in margine notatum à quopiam, Chærefolium Apulei esse Acatham Dioscoridis, quæ Pæderotis dicatur, Plinium l. 17. c. 6. & 9. Pæderotas dicere gemmas esse, sed nihil Chærefolium gemmis est commune.

Anthriscum. Toxicès in Onom. philosoph. Harchius in Enchir. Hadrian. & Heltricus in Nomencl. itémque C. Bauh. aliique nonnulli, Anthriscum eandem herbam putarunt, cum ea quam Chærephyllum Columella dixit. Quidam, inquit Lugd. l. 6. & 48. pertinacius contendunt Anthriscum Plinii esse Chærephyllum nostrum. Idem Lugdunensis Chærephyllum Plinii à Cerofolio nostro planè diversum dicit, sed cur, rationem non assignat.

Hoc & Plinii Cerofolium idem esse conjicit *Chærefolium Cæsalp.* Cæsalpinus, quæ ratione non docet. Cerofolium, inquit, vulgè appellatur à recentioribus inter Apia cõnumeratum: peregrinum est apud nos: feritur in Gallia pro oleris: Plinius cum nullas Chærephylli notas tradat, non licet nisi ex nomine conjectari hanc esse, quæ in hunc usque diem Cerofolium vocatur. puto apud Dioscoridem Oreofelinon esse, itémque Theophrasti (apud quem Theod. Montapium vocat) ac Plinii, qui eadem recenset ex Theophrasto, & Galeni.

Ceterùm, Chærefolium dicitur Brunfels. Dod. lat. *Synon.* in fol. Chærefolium Trago, quod sativum cognominat, ut patet. Cerofolium, Matth. Lud. p. 711. Cerofolium, Dod. gall. Lob. Adv. p. 324. Icon. p. 280. Lonic. Taberr. Camer. & Cæsalp. Cerofolium, Gesn. hort. Gingidium, Ruell. Fuch. Lacunæ & Gesn. in cat. pl. Gingidium 3. & Chærephyllum Columellæ, C. Bauh. Eid. pin. Chærephyllum 1. sativum. Gingidium 5. in phyt. Gingidi species Lob. Obs. p. 419. Oreofelinum Anguillæ.

Cerofolium itaque Latinis dicitur, & ut nonnullis placet, Cerofolium per o secunda syllaba, itémque Chærefolium & Chærepholium, Cerephyllum & Chærephyllò (*χαίρεφυλλον*) Nominari autem sic putatur, quod multis foliis gaudeat: vel potiùs quod gaudium ac hilaritatem excitet. Germani Bõrfel-fraut/ aut Bõrbelfraut: Belg. Beruel: Galli du Cersueit: Itali Cerofoglio: Hisp. Segun algunos. Angli Cheruel: Boh. Trebule a nebo Berblqf: Hung Olaz salata, hoc est, italicam Lactucam vocant.

Passim in hortis colitur: terrâ stercoreatâ & aliquantulum humente lætatur. Vere satum celeriter in caulem assurgit, esuique citò parum idoneum redditur: Sed quod Angusto feritur per totam insequentem Hiemem ac etiam Ianuario virens, florens mense Aprili & Majo, utile est.

Succus foliorum Chærefoli sicuti & aqua destillata; sanguinem ex casu, contusione, aut plagis concretum dissolvit: posset fortassis non sine utilitate ad calculum renum mensisque muliebres ciendos in cibo & potu usurpari. Si quis in discutiendis concretis sanguinis grumis efficaciorē delideret medicinam, is oculos cancerorum & carbonēs Tiliz in pulverem redactos in succo aut aqua Chærefoli de stillata imbibat. potit & ad pleuritē seu pũcturam laterum hocce remedium facit. herba Chærefoli adhuc teneri inter olera mansa stomacho & capiti conducit, ob odorem quem habet gratissimum, Chærefolium tusum ac emplastrum modo foris impostum empes tumores & intra cutem carnemque calu, contusione, aut quacunque tandem ratione concretos sanguinis grumos discutit, non aliter atque Sigillum, ut vocant, Salomonium: Auctor Tragus: Quibus addit Matthiæolus. Calidum primo gradu, medio se habet modo inter humidum & siccū. Comestum urinam promovet, & obstructionem solvit. idem facit decoctum. herba conducit stomacho. vinum in quo coxerit Chærefolium, haustum, utilissimum

Linguarum nomina cũ Ethyma.

Locum cum tempore.

Vires & usum. Sanguis concretus.

Pleuris.

Tumores.

Temperamentum.

utilissimum est vesicæ, menses ciet. ad icterum, acci-
pe succi Chærefolii cochlearia octo, quibus infunde
drachmam triu. Marrubii, & calidè propina diebus
aliquot continuis. Cum melle remissus succus & bi-
bitus confert tussi. Ad inque succus ex decocto hor-
dei cum saccharo sumptus, pleuritidi benefacit. pul-
vis herbæ cum melle mistus cancrum incrementa
capere prohibet. planta integrain aqua decocta, cui
admixtum sit acetum, si abluatur eo caput meliceri-
des & lendes curat. Et hæc leguntur in historia ger-
manica. Inlat. inquit. Tota planta dulcis est & o-
dorata, acriusculo quodam accedente sapore, vix se-
rè sensibili: quod fit, ut aliis oleribus addita, ea gustui
gratiora reddat. Estur cruda in acetariis una cum a-
liis plantis ad hoc idoneis, ac etiam cocta cum Beta,
aliisque oleribus. Camerario apud Matth. germ. suc-
cus è Chærefolio expressus ex iusculo gallinæ aut
carnium sumptus torminibus ventris succurrit. in
primis verò si in butyro frigatur herba & abdomini
superponatur, certum est contra tormina remediū.
Chærefolium, inquit inter alia Dodonæus, tempera-
tè excalfacit, modicèque desiccatur, multoque minds
quàm Apii genera. Flatulentum verò etiam aliquid
obuncet, quamobrem & venereim promovet.

MYRRHIS VETERIBVS ET in genere.

CAP. XXXV.

Dioc. MYRRHIDEM, quam alii Myrrham, nonnulli
Conilam, Romani verò pariter cum Græcis
Myrrhida appellant, Dioscorides similem esse tradit
Cicutæ caule foliisque: radicem verò habere oblon-

Plin. gam, teneram, rotundam, odoratam, cibo non insua-
vem. Hanc potam in vino, phalangiorū moribus
auxiliari. Ciere verò menstrua & scæminarum pur-
gationes à puerperio trahere. Eandem decoctam &
in sorbitione datā, phthisicis subvenire. Tradere &
nonnullos eandem bis in die: erve potam ex vino
in pestilenti constitutione ita salutarem esse, ut ar-
ceat morbi contagia.

Plin. Myrrhis (inquit Plinius l. 24. c. 16.) quam alii
Smyrrhizam [aliq. Smyrnezulam, Dalech.] alii Myr-
rham vocant, simillima est Cicutæ, caule, foliisque
& flore, minor tantum & exilior, cibo non insua-
vis. Ciet menstrua & partus cum vino. Aunt quoq;
eandem potam in pestilentia salutarem esse. Subve-
nit & phthisicis in sorbitione. Aviditatem cibi facit.
Phalangiorum morsus restringit. Ulcera quoque
in facie aut capite succus ejus in aqua triduo mace-
ratæ sanat. Hæc ille, qui l. 26. c. 11. Geranium Myrrhin
appellari ait.

Galen. Myrrhidi 7. simpl. Galenus has reddit vires. Radi-
cem, inquit, habet odoris jucundi, & dulcem, quæ
menses movet, & ea quæ in thorace ac pulmone
sunt, expurgat. Itaque ex secundo ordine fuerit ex-
calfacientium, adjuncta quadam partium tenuitate.

A myrrha Verissimile autem est à Myrrhæ odore Myrrhi-
odore forte da & Myrrham dictam fuisse, inquit Marcellus. Nul-
dula. lus tamen quod inveniunt; aperte id testatus est in
Græcis aut Latinis. Odoratā siquidem radice à cun-
ctis describitur, potuitque illi ab ea nota nomen
hoc factum fuisse.

Alqui- Ceterum, quia Cicutæ similem scriptores tra-
voca. diderunt, idè aliqui Cicutariam eam dici cre-
Cicutaria. diderunt.


Geranium. Myrrhidem dici de Geranio patet ex Plinio, ut
copiosius indicabimus H. n. g. lib. 30.

Chærefolii Chærefolium quibundam censetur Myrrhis, ve-
rùm notæ non respondent.

Sunt qui pro Myrrhide Angelicam accipiant, *Angelica.*
quæ opinio suo loco refutatur.

Ea nobis Myrrhis sive Myrrha vera videtur, quæ *Myrrha*
semine est magno, longo, sulcato & dulci, de qua *Sera*
jam dicemus.

MYRRHIS MAGNO SEMINE, longo, sulcato.



MYRRHIS ra- *Descri.*
dicem habet
insigniter crassam,
adnatis plurimis
& crassis donatam,
albam, sapore dul-
ci, subacri, grato, a-
romatico, qualis
est seminis Anisi
sapor: caules surri-
git aliquot proce-
ros bicubitales, &
tricubitales, brac-
chiatos, hirsutos,
fistulosos: folia
magna, pinnata,
Cicutæ soliorum
facie, magis albi-
cantia, & albis ma-
culis subinde res-
persa, tactu mol-
lia, nervis aversa
parte pilosis, sapore

Anisi, pediculis fistulosis: flores in umbella gerit cæ-
didos, leviter odoratos, quorum singuli foliis qui-
nis constant bifidis, seu cordatis, extimo intus
duobus oppositis simul utrisq; maiore, lateralibus
binis mediò modo se habentibus bifurcato stilo
albo cum staminulis albis medium occupante par-
ticularium umbellarum basim sustinet seminum ra-
diorum stella: succedit semen notatu dignum, ma-
gnum, longum, angulosum, sulcatum, sapore Anisi
dulci & jucundo.

Si Myrrhis hæc nota fuit Matthiolo cur nihil de *Matth.*
ea tradit præter Dioscoridis descriptionem factam
per Ruellium ex Plinio. Gignitur, inquit, in quàm
plurimis Italiæ locis planta quædam Cicutæ faciem
representans, minor tamen, minimèque graveolens,
Cicutaria vocata, quam quidam legitimam Myrrhin
esse censent. Sunt deinde qui pro Myrrhide Ange-
licam vulgè appellatam accipiant. Alii verò, ut Ma-
nardus, Chærefolium. Ceterum, si Myrrhis in Italia
provenit, nulla sanè mihi (Matthiolo) sese obrulit
planta, quæ magis Myrrhidi Dioscoridis respondeat,
quàm cujus effigiem Myrrhidis titulo pinxi. Hæc il-
le, qui imperfectam iconem proponit, quemadmo-
dum & Patrocinator ejus C. Bauhinus. A Camer. in
cp. & hist. Myrrhis inscribitur. Lugd. p. 760. dicitur
Myrrhis Mattholi.

De hac Myrrhide ait Lobel. adv. p. 327. Odoratam *Cicutæ odo-*
hanc, sive salubrem & esulentam possit quis voca-
re Cicutam, quam Myrrhidem sive Myrrham pro-
pter suaveolentiam, quiddam Myrrhæ respicientem
dixerunt. Cerefolii nomen apud Germanos ab hinc:
vocant enim wild Keruch. e. silvestre Cerefolium, *Cerefolium*
quod odore, saporisque jucunditate imitatur, e *Sylvestre.*
trámque facultatibus diureticis: facie verò est Ci-
cutæ renellæ hirsutæ Pastinacæ refert: Ferulæ aut
Pastinacæ esulentæ saporem & odorem, sed magis
medicatum: & ad Smyrnum accedentem repræ-
sentat. Hæc etiam Myrrhis Pliniana videtur, *Myrrhis*
Pliniana.

Scandici
spat.Myrrhis,
Lob.Cerefolium
hispanicum.

Synon. C. B.

Linguae
nomina.Locus cum
tempore.Vires et
usus.Tempera-
mentum
Menses cit.
Tabes.

Pestis.

Epilepsia.

quam ortâ confusione à Geranio odore, Myrrhidem Romani perperam faciebant: unde quispiam Scandicem vulgarem oleraceam merito suspicetur, aut illius aliquam speciem. Hæcille, qui in Obs. p. 423. vocat Myrrhidem adverb. p. 327. & Sefeli Peloponense Anguillare. In Icon. p. 734. Myrrhidem. An verò sit Sefeli Peloponense Anguillare dubitamus.

Gefn. h. Myrrhis quam aliqui Italicam cognominant; Alii verò Cerefolium hispanicum. Czf. Cicutaria tertia, odore & sapore Fœniculi, indeque Alpina *Finochiella* vocata, à Dioscoride & Plinio Myrrhis. Bauh. phyt. Myrrhis. sive maior, vel (addit in pin.) Cicutaria odorata: Myrrhis, Matth. Cord. in Diosc. Gefn. h. Lac. Ad. Lob. Dod. Cast. & Lugd. sativa, Cam. Sefeli Peloponense, Ang. Cerefolium hispanicum, Tab. Cerefolium magnum & Cicutaria tenuifolia, Ger.

Græcis Μύρρις, welscher Förbel/ wilder Förbel/ Matth. Belg. wilde Feruel. Gall. *Cicutaire* quibusdam & *Perfil d'asne* (quæ tamen nomina vulgaria Lobeli mihi non placent.) Ital. *Murrade* & *Finochiella*.

Myrrhis nobis provenit in horto Genevæ secundo anno à satione, ubi Hiemen pertulit. Patavii mense Januario & Februario vidi in horto D. Cortusii. Montbelgardi si semina quàm primùm maturata sunt in terram recondantur, prodit Vere, sed ante secundum annum caulem non profert. In Ober-Engingen prope *Nirringen* Ducatus Vuirtembergi in horto D. Iacobi Præfetti pagi vidimus mense Octobri. Is vocabat *Chærephyllon* maximum, folium autem ita variabat, ut aliam penè existimarem plantam, nisi semina misisset. In Hassia circa Cassellâ sponte provenire Myrrhidem referebat Gillenius. Hæc, ut ait Lobelius, non adeò frequens aut procerâ occurrit, sed rarior & in pratis, vel germinosis marginibus etiam olitoribus ad vascendum in Belgio multa colitur & estatur in jussulis Cerefolij vice. Fertur autem apud Germanos in pratis alicubi nasci, Dodonæo perhibente, cum apud Belgas hortensis tantummodo sit. Majo mense flores profert: Iunio & Julio semen maturascit. radix singulis annis primo Vere regerminat, post seminis perfectionem restans.

Myrrhidis porrò folia non minùs quàm Chærefolij edulia sunt, in eorundemque locum quandoque assumuntur. Myrrhis (ut apud Matth. germ. cum addit. Camer. legitur) calida est secundo ordine, & partium subtilium. Radix cum vino pota medetur morsui araneorum. A partu purgat mulieres, & mēstrua promovet. Cum melle cocta & sumpta tabidis conducit. pectus & vasa respirationi dicata à viscosis humoribus purgat. Cum vino cocta, & bis aut ter in die de hac pota à peste præservat. Herbam & radicem decoquunt ad urinam provocandam. Fit quoque extractum ex herba & radice contra pestem & puerorum epilepsiam. Radix tribus diebus in aqua macerata, fac iēque hanc lotâ ulcera ejusdem curat. Plura qui volet, legat quæ ante è veterum sententia protulimus. Plantam siquidem à nobis traditam eorum Myrrhim esse statuimus.

MYRRHIS BROCCENBERGENSIS

foliis Myrrhidis Italiz, flore albo, radice crassâ, nigrâ.

Descr.

RADIX crassâ, profundâ, nigrâ: caule sesquicubitali, cavo, hirsuto, quem folia nigriora, palmari ferè pediculo, eoque imbricato amplexantur membraneâ veluti vaginâ, similia Myrrhidis Italicę, seu Apii alicuius multum incisi: è membrancearum

autem vaginalium medio, exoritur subinde alius eodem modo foliosus pediculus, qui tandem ubi folia ei esse incipiunt, aliam peculiarem vaginalum protrudit, ex qua deinceps prorumpit densa, orbiculatâque umbella, duas uncias non multum excedens, conferta exiguis flosculis candidis, muscosisque. Loco uliginoso fruitur.

Thalio descriptionis authori dicitur Myrrhis *Synon.* Broccenbergensis. Bauh. phyt. Myrrhis 3. (c. pin.) Quænam autem sit Myrrhis hæc Thalio nos cum fratre C. Bauhino adhuc latet.

GINGIDIUM VETERIBVS,

& in genere.

CAP. XXXVI.

GINGIDIVM ait Dioscorides alios Lepidium *Diosc.* vocare; nasci autem plurimum in Cilicia & Syria; herbulam esse Pastinacę [*saxulifera*] silvestri similem, sed tenuiorem & amariorem [*πικρότερον*, cod. Basil. *μικρότερον*, antiq.] radicem habere parvam, subalbidam, amaram [*πικρὸν πικρὸν*, cod. Basil. *πικρὸν πικρὸν* Matth. Trag.] edi crudum & coctum & sale asservatum. Esse autem stomacho commodum, ciere urinam. Et decoctum ipsius potum cum vino, vesicę utile esse. Idem postea Staphylii silvestris folia Gingidio similia esse tradit.

Plinius l. 20. c. 5. Gingidium hoc modo depingit. *Plinius:* Syria in hortis operosissima, (unde quoque est proverbium Græcis, Multa Syrorum olera,) simillimam Staphylino herbam serit, quam alii Gingidion vocant. Tenuius tamen & amarius, ejusdemque effectus est, coctum crudumque stomachi magnâ utilitate. Siccat enim ex alto omnes humores ejus. Et hæc Plinii dicta cum Dioscoridis descriptione conveniunt.

Plurimum, inquit Gal. 2. aliment. in Syria Gingidium nascitur & editur, simile apud nos Scandici. *Galenus.* Est autem Stomacho valde commodum, sive crudum, siue servectum edere ipsum velis: longiorem autem cocturam non sustinet. Quidam edunt ipsum cum oleo & garo: quidam etiam vinum aut acetura addunt; & multò magis commodum est, & averfantis cibum appetentiam facit, si cum aceto edatur. Et satis clarum est hanc herbulam medicamentum potius esse, quàm alimentum. Nam & adstringendi vi, & amaritudine manifestâ nõ modicâ participat. De hoc itaque ut medicamento rursus agit 6. simpl. ubi ait: Gingidium quemadmodum gustu, amaritudine & adstrictione participat: ita temperamento, caliditate & frigiditate. Iuxta ambas autem qualitates siccat. Caliditatem equidem non ita manifestam possidet, siccat autem ordine secundo. Atque hoc modo etiam Paulus l. 7. c. 74. Gingidium Scandici simile esse dicit, adstringentemque & amaram non parvam habere qualitatem, stomacho accommodatum esse, edique in fame & à jejuniis utiliter ex aceto, non tamen magnopere nutrire.

Dicta autem hæc sint, ut fortè aliquis sagaci ex Pauli historia conjecturâ quale Gingidium hoc sit, invenire possit, quod tamen difficile admodum videtur. Siquidem Plinii ac etiam Dioscoridis tempore Græciæ & Italiz peregrinum fuisse conjicimus. In Syria enim Galenus, Plinius & Dioscorides nasci & feri dixerunt; & hic quoque in Cilicia. Quod porrò Dioscorides & Plinius Pastinacę [*saxulifera*] simile dixerunt; Paulus verò Scandici, ad faciliorem herbę propositæ cognitionem parùm confert, cum hæc duo simplicia nihil commune habeant.

Dioscorides quoque Lepidium ait à quibusdam ob similitudinem dici, ita ut minùs miretur aliquis ignotari nostrâ ætate, quodnam olus Gingidium sit. *Aequiva.*

Celnerus

Gesnerus siquidem in catalogo suo plantarum, referente etiam Trago; Chærefolium Gingidium Dioscoridis esse statuit, quæ sententia probatur etiam à Ruellio.

Gingidium Dioscoridis verum Rauvvolffi, inscribitur à nobis Anetho similis planta, semine lato, pulchrè laciniato.

Quam Caucalidem Syriacam maximo semine intitulavimus, Lobelius Gingidium foliis Bauciz Syriacum cognominat.

Visnagam quidam volunt legitimum Gingidium, quorum opinio non placet.

Gingidii nomenclatura à Dioscoride tribuitur Lepidio.

Hippuris vocatur Gingidium à Gesnero in ascriptis Dioscoridis.

Gingidium allatum ex Syria nullus certò pro Dioscoridis Gingidio ausit asserere. Ego Gingidium Matthioli voco quidem, sed Lappulam canariam flore majore esse potius judico.

Cæterum, refertur in nothis Gingidium Dorifastru Egyptios vocare: Syrios Adonin: Aphros Turicam: Romanos Visacutum. Sed & hæ appellationes incertæ, quòd barbaræ, & ex nullo auctore alio auditæ sunt.

GINGIDIUM MATTHIOLI.

Def.



LEGITIMI Gingidii plantam è Syria allatam sibi missam à Cortuso scripsit Matthiolus, Pastinacæ sylvestri haud absimilem, amariorem tamen, caule ramoso, rotundo, sesquipedali, striato, subnigricante, geniculatòque umbellâ in cacumine alba, minoribus circumquaque comantibus foliolis: è floribus semen prodire, quo maturecente umbellæ in sese contrahantur (ut in Pastinacæ) & tactu glutinosè sentiantur: radicem habere candicantem palmari longitudine, subamaro sapore. In hist. germ. cum addit. Camerarij ita describitur. Gingidium herba est habens folia ut Pastinacæ sylvestris, sed minora, amarioræque. Ab una radice procedunt caules multi, parvi, rotundi, concavi, sesquipedales, adnatis & albis umbellis, quæ circum circa exilibus, & viridibus foliolis donantur, profundius incis, cauli adherentibus. Umbellæ semen proferunt Anmi, quod si maturum est, clauduntur, tractatæque digitis adhærescunt: radix est subalbida, spithamea, amariuscula.

Def.

Nascitur ut plurimum in Syria & Cilicia, unde semen in Italiam infertur, ac in hortis seritur. Et ita verum Gingidiû innotuit, quo nomine Ceresolium falsò intellexerunt nonnulli. Hæc Matthiolus, qui Gingidiû vocat, eique Gingidii facultates adscribit.

Quale autem hoc sit Gingidium judicent qui viderunt: Figura habet multa communia cum Lappula canaria flore majore. Interea quæ considerandum an utraque descriptio non sit partim ex Dioscoride, partim ex dicta Lappula canaria & Visnaga composita: quid de figura Camerarij, quam & nos

Tom. III.

hic proponimus) in hist. & ep. Matthioli dicendum sit non habeo. mutavit is unam umbellam, fortè ad descriptionem. Tabernomontanus cur majorem mutationem in icone sua exprellerit, me latet. Hoc ei tamen commune non ignoro, quod quidem laudabile foret, si è plantis ipsas mutationes sumeret. vocat Gingidiû Dioscoridis, Syriacè Bôrffelfraut.

Lobelius videtur existimare Lappam agrestem Tragi esse pro Gingidio Syriaco exhibitam.

Cast. & Cam. dicitur Gingidium. Lugd. p. 710. Gingidium Matthioli. Bauh. phyt. & pin. Gingidium 3. foliis Chærefolii: Gingidium Matth. Lugd. & Cast. primum Tab. & hinc apponit ad Matthiolum figuram illam Tabern. nomine Gingidii primi, non parùm mutatam fortè in deterius.

LAPPULA CANARIA FLORE pulchro magno albo.



Radix tenuis, alba, subdulcis cauliculû pedalem aut majorem interdum emittit, in ramos divisum aliquot, partim rectos, partim procumbentes, striatos, hispido, purpurascens, geniculatos, multisque alis concavos: folia Pastinacæ tenuifolia, vel Carotæ, hirsuta, Classio Apii ferè, umbella florum alborum, quorum folia externa aliis duplo majora,

speciosa, quibus succedunt lappulæ oblongæ, sulcatæ, hispide.

Tab. plantam à nobis traditam vocat Caucalidem, Apium sylvestre, fletten Bôrffel/ Acher Peterlein/ Acher Bletten. Dod. Caucalidem, quem Daucum sylvestrem à nonnullis vocari refert; à rure verò Hetruriz Petrosello salvatico, & spuris vocabulis, xxi. m. u. v. i. v. à Democrito Bpior: Latinis Pedem gallinaceum, Pedem pulli: Egyptiis Sefesin.

Lugd. p. 715. Caucalidem Dodonzi (& ita etiam vocat Gesn. h.) Item p. 761. Myrrhidem lappam Dale champii: ponit duas figuras unius plantæ, quarum posterior multò deterior, quàm ea quam hic ponimus, quæ minùs tamen placet.

Trag. Germ. l. i. c. 158. Myrrhidem Sylvii. Item l. 2. c. 104. Lappulam campestem, & ruralem, Acher Bletten/ feld Bletten. Retur hanc esse agrorum Tribulum Virgilij l. i. Georg. aitque Sylvium Myrrhidem Galeni existimare. Sed qui Tribulum verum noverunt & veram Myrrhidem, hanc negabunt vel Tribulum, vel Myrrhidem. picturam malam habet Tragus, quæ non exprimit pulchros flores magnos, nec folia. Si non descripsisset, existimassem eum pingere Lappulam canariam cum flore minore.

Lonic. figuram habet malam ex Trago, quam inscribit Acher Bletten/ Tribulum terrestrem & Lappam campestem. Anguill. vocat epist. 12. Lappulam canariam Plinii, & Italicorum Pedochi di cani.

De hac ait Lob. adv. p. 324. Multi iam sunt anni cum pharmacopæus Martynellus nobis Gingidiû

Gingidium
Maritimum
Lob.

ex Syria allatum asserere ausus est, sed contra nos esse indigenam plantam meminimus, & biennio post magnâ copiâ in vinetis & segetibus inter Pisâ silvestria & Caucalides crescentem vidimus: quæ et si facie & viribus ad *Gingidium* alludat, tamen ex Dioscoride nullus ausit pro *Gingidio* asserere: Planta enim est Caucalidi natalibus & facie eadem, folio tamen longiore & angustiore: illi umbella candida, semen hirsutum, odore Pastinacæ silvestris. Item p. 329. Caucalidis duæ sunt in nostris vinetis & segetibus differentia, altera enim candida, foliis minoribus, sed caule proceriore. Et hæc Matthioli *Caucalis*. In Obs. p. 420. ut & in Icon. p. 728. pingitur hoc titulo: *Caucalis albis floribus, vulgaris: Lappa agrestis* Tragi. Lobelius suâ iconne proponit nostram *Lappulam canariam* magno flore albo, quæ non potest esse Matthioli *Caucalis*, ut dicitur capite de *Caucalide* Matthioli: videtur Lobelium velle dicere *Gingidium Syriacum* Matthioli idem esse cum *Lappa agresti* Tragi, de qua nos proprio capite.

Negatur
esse Cauca-
lis Mar-
itimi.

Gingidio
congener,
Caj.

Cæs. l. 7. c. 23. dicitur quidam in collibus asperis nascens semine grandi, prope nuclei Olivarum magnitudine, striato & valde hispido, colore candido, medullâ intus non in jucundâ: ejus planta brevis est, dodrantalis: foliis Staphylino minutionibus, & tenuius scissis, ferè vt Fœniculi: umbellis parvis *Gingidio* similibus: floribus candidis, latifoliis hanc congenerem *Gingidio* statuit, quamvis particularem *Gingidii* mentionem apud authores non reperiri scribat.

Caucalis
albo fl. Clus.

Clus. hist. iconem exhibet, ac *Caucalis* albo flore titulo donat & describit, videturque illi hæc proximi ad Dioscoridis *Caucalidem* accedere.

Syn. C. B.

Bauh. phyt. & pin. *Caucalis* 4. sive arvensis echinata magno flore: *Lappa agrestis*, Tragi. *Lappula canaria* Plinii, Ang. *Caucalis*, Dod. (& *Daucus* syl.) Gesn. h. Tab. Eyst. *Caucalis* alia vulgaris, Lugd. *Caucalis* albis floribus vulgaris, Lob. Ger. *Caucalis* coronatâ umbellâ, Cam. *Myrrhis lappa* Dalechampi, Lugd. *Dauci* genus arvense, Gesn. cat. *Daucus* à *καρχαριος* seu *καρχαριος*, sive *καρχαριος* minor, Thal. *Echinophora* *καρχαριος*, an *Gingidium* Diosc. Col. Testatur frater in animadvers. in Lugdunensem *Caucalidem* Dodonæi & *Myrrhidem* Lappam Dalechampi, utrinque describi, illius tamen figuram esse longè meliorem.

Pona in Baldo vocat *Lappam* agrestem Tragi, & *Caucalidem* albam Penz. D. Zvvinckerus misit Basilea pro Myrrhide Monspelienfi.


Lappa cum
tempore.

Lappulam canariam flore majore reperi inter Esincourt & Adincourt pagos Montbelgardenses florētē, & semine maturo Augusto. Abundat etiam in planitie versus Matta flores copiosè Septembri & circa *Columbier Saunreux* Junio & Julio; In Gallia Narbonensi circa Nemausum; Genevæ in segetibus. Sata Montbelgardi florebat & echinata semina producebat Majo & Junio. Basileæ frater observavit prope S. Iacobum in segetibus. Tiguri multam vidi, ut & in agris inter Nauppen/ & Boffordiam eundo in Masmünster, in arborum marginibus atque inter segetes, vineæque. Clusio etiam teste. Cæterum flos in umbellis habet aliquid simile cum flore Sambuci aquaticæ: in medio flosculi minimi albi, in circuitu sunt magni succedunt lappæ longæ magnæ echinatae & duplici semine similes *Lappulæ canariæ* flore parvo, de qua jamjam dicendum.

LAPPVLA CANARIA FLORE minore, sive tenuifolia.

Deser. SIMPLICEM parvâmq; habet radicem, à qua statim pullulant caules plures, sesquipediales ferè,

brevi mollique lanugine leviter hirsuti, nonnihil angulosi: foliis utrumque dissectis Caucalidis albæ pilosis, seu *Lappulæ canariæ* flore specioso, magis tamen mihi videntur concinna & ferè tenuius dis-



secta: flores umbellati, parvi, ex albo purpurascētes: lappæ seminales canaliculatae, spinis rigidulis, atropurpureis per costas dispositis, muricatae, in binas partes finduntur, totidem semina cōtinētes.

Fuchsius, cum *Synon.* essem apud illum Tubingæ, vocabat *Gingidiū*. A Grieningero habui pro *Caucalide* Hispanica; à D. Sprengero pro *Lappula canaria* Candia. mihi etiam missa pro

Lappula Cretica. Bauh. phyt. *Caucalidem* quintam vocat, sive arvensem echinatam parvo flore.

Hanc florentem vidi & semina habentem mense Majo inter Monspelium & Lunel, & prope Castelnœuf, si bene recordor. Item in pago Leurach uno miliarigermanico à Basilea mense Junio, & in colle prope Castellum Hermes florentem Majo. Montbelgardi in agris ad Dubim ultra *Adincourt* nō longè à domo D. Dancurtii. Vidi insuper in horto Grieningeri Pfortzhemia: provenit mihi in horto E. C. ex semine misso pro Cretico, quæ multum excrevit cum multis brachiis. folia hujus propter culturam minus tenuia evadunt.

LAPPVLA CANARIA LATI- folia, sive Caucalis.



MIIndus obvia nostro solo est hæc Canariæ *Lappulæ* species, cujus radix *Deser.* simplex, alba, lignescens; caulis cubitalis, ramosus, striatus, tactu alper: folia pulchra, palmū circiter longa, perquam hirta, quatuor aut quinque foliorum conjugationibus, extremoque impari constant, singularia folia profundè serrata Pentaphylli recti foliis singularibus similia, ut-

cunque tamen minora, umbella divisa succubio infidet peculiari, palmo longior: lappula magnæ, oblongæ, horridæ, nigricantes.

Exhibetur apud Lugd. p. 762. pro *Lappa* bona Plinii. Lobelius in advers. p. 425. vocat *Caucalidem* alteram purpurascētem foliis latioribus & crassioribus [*Caucalide candida*, sive *Matthioli*] semine etiam majore. In Obs. p. 422. ubi figura, *Caucalidem* flore rubro,

rubro, folio latiore. Descriptio Lobelii non male convenit nostræ Lappulæ canariæ latifoliæ, non item figura, quæ mihi videtur composita ex Matthioli: fortè non bona, & aliis feminibus: præterea minùs distinctè de his plantis videtur scripsisse Lobelius.

Lacm. Observata hæc aliquando erat à me in agris inter Stutgardiam & Pforzen. Copiosam quoque I. H. Cherlerus observavit in agro Narbonensi, circa Monspelium præsertim & Nemausium, & inter segetes; sed perpetuo purpurascens flore. D. Renzius medicus admirabilis balnei dedit collectam prope montem Flaconem, quæ erat flore rubro.

LAPPULA CANARIA, SIVE Caucalis maritima.

Defor. **R**ADIX Caulalidis utriusvis segetum, gracilis, longa, alba: caules vix palmares molles canescunt lanugine, internodiis gravissimis distincti, & quibus exeunt rami caule longiores, nudi, lappas in umbella gestantes lateas, Caulalidis alba arvensis: folia mollia, villosa, luteola, Pectinis veneri d.lectionibus.



Lacm. In arenoso quodam maritimi tractus Narbonensis & finitimis subule-tis perram observavit Cherlerus, unde vix unam, aut alteram ad nos invexit plantulam.

CAUCALIS VETERIBVS ET in genere. CAP. XXXVII.

*Diose lectis
Garsae.* **C**AUCALIDEM, quam aliqui Daucum sylvestrem vocant, ac etiam in nothis Myrta, Democritus verò Brion quasi Muscum, Aegyptij Seselum, Romani Pedem gallinaceum, sive Pedem pulli, cauliculum esse dodrantalem aut etiam majorem tradit Dioscorides, subhirsutum, folia habentem Fœniculo similia cum multis incisuris (ἐκτομή) ἔχοντα, ὅμοια πολλοῦ σελίνου. Scita Basil. cod. ita Cat. teste Matth. ut vult Lacunà, cui Ruellij lectio non placet, quæ sic habet: φύλλα ἔχον σελίνου ἰμφοῦ, ἢ ἀπὸρ διμασθροῦ, Apio similia, in summo verd' Fœniculum referentia.] hirsuta: & in summo umbellam albam, odoratam. Et hunc olerum modo crudum ac coctum edi. Ciere autem urinam.

Plinios. Estur & Caulalis, inquit l. 22. c. 22. Plinius, Fœniculo similis, brevi caule, flore candido, cordi utilis [quæ sequuntur apud Dioscoridem cum non legantur, ea ex Petrico Plinium sumpsisse conjectatur Dalech.] Succus quoque eius bibitur, stomacho perquam commodatus & urinæ, calculique & arenis pellendis & vesicæ pruritibus. Externuat & lienis, rectoris, renumque pituitas [obstructiones à pituita factas, Dalech.] Semen menses feminarum adjuvat, bilémque à partu siccit [biliofam purgationem provocato locheio, Dalech.] Datur &

contra profluvia genituræ viris. Chrysippus & conceptionibus cam putat confutare multum: bibitur in vino jejunis. Illinitur & contra venena minorum, sicut Petricus in carthine suo significat. Eandem recensuit L. 21. c. 13. inter herbas sponte nascentes, quibus præterque gentium utantur in cibis, maximèque Aegyptus, frugum fertilissima.

Theophrastus similiter Caulalidem [Pedem gal- *Theophr.* linaceum vertit Gaza] inter olera recenset hist. l. 7. c. 7. Sed nec his appellationibus perspicuum sit, quæ herba, aut olus, aut, ut Dioscorides ait, qui cauliculus sit Caulalis.

Caulalidem verò aliquos Daucum agrestem vo- *Galenus.* care testatur præter Dioscoridem etiam Galenus, qui ei (Dauco, sc. sylv.) hanc & sapore & facultate similem esse scribit: calefaciat siquidem ut ille, & siccet & urinam cieat, & muriâ condita reponatur.

Genus herbarum l. 7. c. 7. de plant. hist. facit *Olus in ar-
Gm sponte
nascent.
Marcello.* Theophrastus, quod ἀνὰ ἄνθος vocat i. e. in arvis sponte nascent, inquit Marcellus, statimque in eo Caulalidē [Pedem galinaceum Gaza] numerat, nullis aliis adiectis notis. Nec parùm, si quis rem justè æstimet fuerit tam certè à tam gravi auctore Caulalidis natale Solum, & ubi querenda sit, audisse. Id enim additum his, quæ Dioscorides, Plinius, & Galenus tradiderunt, facillimam ejus inventionem nobis efficiet. Nota enim, tam Apij, quàm Fœniculi folia, quibus similia Caulalis sua habere fertur à nonnullis. Altitudinem deinde, hirsutam lanuginem, & cordi li floris umbellam oculus deprehendet, invenietque tam Daucum similem herbam, ut ut silvestris Daucus sit, aut rudimentum naturam Dauci facere condiscere. Qualis autem uterque Daucus sit, in eo certius cognoscetur. Nullibi non Caulalis nascitur, præsertimque in novalibus antequam novâ aratione renoventur. Galenus Daucum Caulalidem sapore & viribus similem ait. Dioscorides tamen ex similitudine figuræ ab aliquibus agrestem Daucum potius appellari insinuat. Habet enim & hæc & Daucus folia incisuris divisa. Habent ambo & candidi floris umbellam.

Potuit tandem dici Caulalis, Lobelio autore, à Caulalis feminum effigie, quæ valcula oblonga & semispha- *cur dicta
Lob.* rica imitantur, aut cum præarida strepitum edunt hæc semina ventis concussa, vindemiis exactis. Et sanè luxata videtur lectio Dioscoridis, aut quis- *Diose. lectio
luxata.* piam non imperitus videtur oræ codicis hæc verba, *foliis Apij similibus*, adiecisse, quæ postea in contextum latinum irreperint: nam nostris [Lobelij & Penæ] grecis exemplaribus desiderantur, & etiam supervacanea videntur, ut vir magnæ sedulitatis & exercitæ cogitationis Anguillara annotavit.

Cæterum, audaciùs herbarij aliquot Caulalides *Alqui voca-
Caulalides
Matthioli.* exhibent. Habet suas Caulalides Matthiolus, de quibus mox agemus.

Antriscus quorundam à nobis inscriptus, semi- *Antriscus
ne asperso hispido, à quibusdam Caulalis cognos-
quorundam.* minatur.

Caulalis nodoso echinato semine, Antrisco hispido affinis est, si non ejus varietas. *Caulalis
nodosa.*

Caulalis Hispanica semine rugoso depingitur *Caulalis
hispanica.* ac describitur à Camerario.

Caulalis minor pulchro semine, sive Bellonij, *Caulalis.
minor.* dicitur à nonnullis Sefeli Creticum.

Caulalis major semine minùs pulchro, hirsuto, *Caulalis
major.* est Sefeli majus Creticum Lobelio.

Caulalis major Clusij, quæ sit, cogitandum.

Caulalis Syriaca cum maximo semine, est Gingi- *Caulalis
syriaca.* dum primum Dodonæo in fol. lat.

Caulalis omnium minima. De hac, ceu & aliis *Caulalis
minima* hic nominatis, ordine dicemus.

Lappulam canariam flore pulchro, magno, albo, *Lap cana-
ria minor.* vocat Caulalidem Dodonæus & Lobelius.

- Lap. can.* Lappula canaria flore minore, sius tenuifolia, est Caulalis quinta C. Bauh. in phytopinace.
- Lap. can. latifolia.* Lappulam canariam latifoliam appellat Caulalis alteram Lobelius.
- Lap. canar. maritima.* Lappula canaria, siue Caulalis maritima. De hac Lappula ceu & alius Lappulæ speciebus pauld ante egimus.
- Saxifraga hircina.* Merito rejicienda eorum opinio, qui Saxifragiam hircinam maiorem, siue Pimpinellam, de qua infra tractabimus, Caulalidem esse affirmant.
- An Saxifraga.* Caulalidem Lobelij an audemus appellare Saxifragiam Matthioli tenuifoliam & umbelliferam?
- Matthioli. Vismaga.* Caulalis depicta à Matthiolo videtur, quod ad figuram attinet, Vismaga.
- Solanum.* Caulalis pro Cuculo, vel Vva lupina apud Sylvium dicitur de Solano. l. 34.
- Myrrha genus.* Caulalis est Myrrhæ genus Dioscoridi.

CAUCALIDES MATTHIOLINÆ.

Locum.

VISITUR (inquit Matthiol. in Diosc. l. 2. c. 133. in edit. anni 1554. & 1559.) Caulalis in Hetrurie cæ-



pestribus, inculto præsertim Solo, ut & Ananiensi tractu in Tridentino agro, nullis reclamantibus notis: Ruta nostra hanc *Petrosello salvatico* vulgò appellant. Quippe quod folia quæ per ima prope radicem exeunt, Apium quadantenus effigie referat, quod vulgò *Petrosello* dicunt. Etsi quæ superiore parte prodeunt per ambitum sint Fœniculi modo capillamentis divisa. Caulem

mittit Pastinacæ: in cujus cacumine umbellam gerit floribus candicantem, odoratam, Dauco non absimilem. Idem in epit. lat. impressa anno 1571. ait. Caulalis, Italis *Petrosello salvatico*: caule exit dodrantali & sæpè majori, Dauci, aut Pastinacæ simili, subhirsuto, foliis Apio similibus, sed quæ in caule ac ramis sunt, Fœniculi modo per extrema multifidis hispidisque: candida umbellæ: semine odorato. Cæterum, Matthiolus iconem habet, cui folia tenuia, quam autem intelligat, judicent Hetrurienfes Medici & Pharmacopæi, & considerent, quæ planta sit *Petrosello salvatico*. Matth. enim in comm. cum mag. fig. Ital. c. 128. Lat. cap. 133. pro Caulalide aliam longè diversam habet iconem, ab ea quam in epit. exhibet, quamvis eandem descriptionem retineat, quæ etiam extat in hist. germ. l. 2. c. 68. ubi ait, *wilder Peterfilg* / *Caulalis*, *Caulalis* Diosc. in Hetruria inter fluvium Tiberim & Macra, Italis *Petrosello salvatico*, i.e. *wild Peterfilg* / aut *Peterlin* / ut Germani circa Tridentum vocant, quidam *wild Vogelneß* dicunt. Caulis Pastinacæ, palmatis, vel etiam major: folia juxta radicem similia *Petroselino*, unde huic nomen. superiora Fœniculo similia, ita multifariam dissecta; præterea aspera & hirsuta: umbellæ florum alborum, grati odoris. Hæc ille, quem existimamus nescivisse, quid traderet iconem & descriptionem, quarum priorem suspicamus fidam fuisse ad descriptionem Dioscoridis, quales fœditas plu-

res olim habuit & habet adhuc si ei nota planta fuit, cur non reddat rationem mutationis iconum; cur semen non describit? Considerandum porrò an icon postrema non habeat aliquid commune cum Antrisco quorsudam semine aspero. Cam. ep. Matth. posuit postremam (ut & nos) iconem, eandemque etiam in hist. vocans *wilden Peterling* / *Caulalis* dem, *Pedem gallinaceum*, & *Perr. sello salvatico*.

Caulalidum Matthioli talibus meminere Adversaria Lobelij & Penæ p. 325. Caulalide Anguillare magis placeat vulgares Caulalides, quia sunt caule, foliis, umbellæ, & semine hispidis, eoque magis congruunt verbis Dioscoridis. Dux namque sunt in nostris vinetis & segetibus differentiz: altera enim candida, foliis minoribus, sed caule proceriore, & hæc Matthioli. Altera purpurascens umbellis, seu floribus, folia habet latiora & crassiora: semen majus. Est istud semen argutum & elegans: nam triquetram, oblongam, & spinulis horridam glutinam, Glycyrrhizæ quadantenus similem, vestibus mordicus hærentem, eâ exuta granum oblongum, Avenæ exantheratæ modo cernitur, haud gustu insuave: quæ quidem satis expressâ notâ insignivit Caulalides Dioscorides & similibus discrevit. Has Caulalides imagine expressit Lobel. in Obs. p. 420. his titulis: *Caulalis albis floribus*, vulgaris Advers. p. 324. & 325. *Lappa agrestis Tragi*; Item *Caulalis flore rubro latiore*. In Icon. p. 718. his nominibus: *Caulalis albis floribus*; Item, *Caulalis flore rubro, folio latiore*. Cæterum, Lobelium intelligere non possum per *Caulalidem* Matthioli, quam dicit flore albo, semine hispido, pro qua in Obs. & Icon. exhibet *Caulalidem* Dodonæi & *Lappulam agrestem* Tragi: ubi nam Matthiolus eam plantam tradidit pro *Caulalide*? Præterea iconem quam Matth. in post. comm. cum mag. figuris exhibuit pro *Caulalide*, Lobel. exhibet pro *Caulalide flore rubeo*: mutans nonnihil semina, quæ pauld majora pinguntur cum pauca hispiditate.

Clusius habet iconem Lobelij cum inscriptione *Caulalidis rubello flore*, ac dicit: *Caulalidem saturè rubente flore*, similem *Caulalidi albo flore* exhibitæ à Dodonæo, majoribus alatisque foliis atque ad *Pimpinellæ Germanicæ* folia magis accedentibus, agro Francofurtensi abundanter nascentem observabam, florem variantem, qui major erat & æqualis magnitudinis, folia obtinebat, saturè rubente colore.

Lugd. p. 714. postremam iconem Matthioli habet, inscriptione *Caulalidis* Matthioli, sub quibus verbis ejus etiam meminit Pona in Baldo.

Bauh. phyt. *Caulalis* 1. *Apij folio*, *Caulalis* Matthioli. Item *Caulalis* 3. *latifolia altera semine aspero*: *Daucoides* majus *Cordi*: *Caulalis flore rubeo*, folio latiore Lobelij. Eid. pin. *Caulalis* 2. *lato apij folio*: *Caulalis*, Matth. Lac. Cast. & Lugd. an *Caulalis*, *Cordi* in Diosc. *Daucoides* majus, *Cordi* hist. & Thal. *Caulalis vulgator*, Ad. *Caulalis flore rubro folio latiore*, Lob. *Caulalis rubello flore*, Clus. hist. *Gingidium*, Czf. Idem apud Matthiolum ait: *Caulalidis* diversas proponit Matthiolus figuras. Aliam similem ei, quam pro *Vismaga* dedit: aliam in majoribus iconibus, quam *Caulalidem* latifoliam alteram nominamus, estque *Caulalis flore rubro*, folio latiore Lobelij, fortè *Daucoides* majus *Cordi* & Thalij. Hæc frater. Nos uti nolumus negare *Caulalidem* Matthioli & Lobelij eandem esse cum *Daucoide*, ita etiam adhuc asserere non possumus eandem cum nostro *Antrisco* semine aspero, quod videtur idem cum *Daucoide* *Cordi*, uti dicitur suo capite, ubi proponimus considerandum an *Gingidium* *Cæsalpini*, *Matthioli* *Caulalis* esse possit.

Antriscus

ANTHRISCUS QUORUNDAM semine aspero, hispido.

Deser.



PERSIMILIS est Anthriscus Dalechampi, caule sesquicubitali, hirsuto, aspero, geniculato: folia Anthriscus parè eadem, hirsuta: umbellæ parvæ, albicant, vel ex albo rubescunt: semen Coriandro par, minus rotundum & Lappulæ canariæ instar echinatum, asperum, striatum, duplex, interdum nigrescens, nonnihil amarum. Radix alba, odorata & aromatica, Pastinacæ silvestris modo.

An Daucoides majus Cordi

An planta à nobis tradita, est Daucoides majus Cordi, de quo ait in hist. plant. lib. 2. cap. 41. Daucoides majus folia habet per terram strata, Apio, aut Selinoidi Dauco (i.e. lausolio) similia, hirsuta & per terram strata: è quorum medio caulis exit sesquicubitalis, aut aliquando major, aliquantulum asper & geniculatum foliis vestitus, iis, quæ inferius sunt, minoribus, in summo caule umbellæ sustinentur. Æstate in candido rubentibus flosculis plenæ: quibus singulis binæ, subrotunda, crassiuscula & Lapparum modo aspera, & prætereuntium vestibis adhzrentia semina succedunt. Radice nititur oblongâ, candidâ, tenuique, antequam caulem proferat, carnosâ, gustûque cum acrimonia subamarâ, quæ maturo semine perit. Semen tritum odore cimices & buprestides imitatur, gustûque admodum ingrato est. Nasitur declivibus, campestribus locis inter fruteta. Hæc ille.

Gingidium
Caj.

Gingidium, si non aberro, vocatur à Cæsalp. l. 7. c. 22. quod hisce ab ipso traditur. Gingidium apud nos est sylvestre quoddam olus, quod passim oritur in rudibus & vineis, lappas ferens, quæ vestibis pertinaciter hærent. herbula est parva, foliis Staphylini, longè minoribus, ac minus hirsutis, odoratis, quæ pro Apio aliquando venduntur: cauliculum habent tenuem, cubito brevior, hirsutum: parvas umbellas, flore candido: semina Fœniculo proxima, in rotunditate oblonga, hærentia vestibibus. extat & hujus differentia quadam magnitudinis & parvitatibus, inter quas una est, quæ fructus inhzrentes ramis fert nullo pediculo, quam aliqui Cicutiam vocant: nam foliola magis ad Cicutæ incisuras accedunt. Et hæc de suo Gingidio Cæsalpinus, qui Gingidium antiquorum retur. Nobis non bene constat, quam plantam velit: videtur tamen accedere ad nostrum Anthriscum quorundam semine aspero. Considerandum etiam an possit esse Caulalis: animadvertendum etiam an aliquid commune habeat cum Caulalide hispanica semine rugoso Camerarij.

Caulalis
hispanica.Dauci ge-
nus.Daucoides
Cordi.Dauc asper
Gessneri.

Gessn. h. vocat Dauci genus parvum asperiusculum, circa sepes & muros nascens, inutile. Thal. p. 8. Daucoides majus Cordi, quod Daucum asperum Gessneri existimat, ut p. 35. declarat.

An Bauh. phyt. Caulalis 3. latifolia altera semine aspero; Daucoides majus Cordi; Caulalis flore rubro, folio laurore Lobeli. Item Caulalis 7. semine

ad caulium nodos echinato. Apud Matth. Caulalis Matthioli in comm. cum major. iconibus: Daucoides majus Cordi & Thalij. Sunt quadraginta anni ex quo misi omnes meas plantas cum descriptionibus, clariss. diligentissimoque Botanico, præceptoris fidelissimo, D. Gesnero: huic autem plantæ cum ascriptissem, Caulalidem esse quorundam, ille Daucoides Cordi in sepibus fore putavit. An frater intelligat plantam, de qua hic agimus, nondum planè nobis constat. Suspiciamus etiam ejus Caulalidem 7. esse hujus variationem, non asserimus tamen, donec viderimus ejus plantas: Matthioli quoque Caulalidem non possumus adhuc dicere, nolumus tamen inficiari, ut ante hortati sumus cap. de Caulalidibus Matthioli.

Anthriscus affinem hanc vidi Genevæ. Abundat ea Montbelgardi in sepibus, ut alia Anthrisci species, florens & semina producens Augusto. Copiosè conspicitur extra urbem juxta la Crote.

Locus cum
sempore.

CAUCALIS NODOSO ECHINATO semine, Anthriscus hispido affinis, si non ejus varietas.



Ex radice oblon- Deser.

Ega, tenui, alba, bini ternive caules, qui dein in alios dividuntur, rotundi, striati, asperi, quorum alij semipalmares incurvi, alij bipalmares erecti prodeunt, quos folia Pastinacæ similia, breviora tamen & pauciora, multoque tenuius divisa, aspera ex virore nigricantia ad caulis singula penè internodia. flosculi exigui brevissimo pediculo insidentes, quibus succedunt semina plurima, parva, echinata, conglobata.

Ita quidem describente C. Bauhino, qui in phyt. sibi hanc missam ait nomine Lappulæ caninæ Cortusi. Is verò loco citato facit Caulalidem 7 cognominatq; Caulalidem semine ad caulium nodos echinato. Apud Matth. verò Caulalidem 2. (In pin. facit Caulalidem 8. at 1. in prod. Scandicem Colum.) nodoso echinato semine quam à nemine descriptam gloriatur. Suspicio ergo hanc esse varietatem nostri Anthrisci semine hispido, videnda tamen fratris planta & conferenda.

Hanc ipse in horto Patavino anno 1578. se collegisse scribit.

CAUCALIS HISPANICA semine rugoso.

Semen habemus rugosum nigrum. Caulalidis nomine missum, non recordamur unde. ejus plantam depinxit Camerarius, ac sic descripsit.

Superioribus (Caulalidi flore minuto & alteri coronatâ umbellâ. est hæc nobis Lappula canaria flore majore & minore) ferè similis, non tamen spinoso semine, sed rugoso nonnihil, eoque elegantissimo, sed pusillo flore in umbella incondita. Tota planta lac habet dulce in modum Chæresolij, sed copiosius, q; etiâ ex immaturo semine coacta permanet.

Radix

Caulalis
hispanica.

Radix tamen eo caret, nisi fortè initio antequam caulescat planta etiam lactescat, quod tamen nondum observavi. Sapor est Apij.

Huic autem plantæ titulum hunc fecit: *Caulalis hispanica*: quo etiam in Icon. p. II. eam iconne exhibuit. Bauh. in phyt. *Caulalis* 8. (9. in pin. ubi & *Caulalis hispanica*, Camer. Clus. hist. Gingidio congener, Czf.) peregrina semine rugoso.

Considerandum nos proponimus,

an *Gingidium Czfalpini* l. 7. c. 22. aliquid commune habeat cum hac *Camerarij* *Caucalide*: & an sit *Antrifcus* quorundam semine aspero. Historiam *Czfalpini* posuimus sub *Antrifco* quorundam semine hispido.

Caulalis
hispanica,
Clus.

De hac loquitur *Clusius* hist. l. 6. c. 24. A prima [*Caucalide maiore*] inquit, non valdè differt ea, quæ semine ex Hispaniis allato nata mihi est aliquando, cum apud Belgas, tunc Viennæ Austriæ: cauliculos enim habebat striatos & asperos, umbellas verd candidorum flosculorum minores, & quasi in orbiculare caput coactas: semen etiam crassiusculum, valdè striatum, non hispidum. Annua etiam est plantamam maturo semine perire solet.

SESELI CRETICVM, TORDYLIVM veteribus. CAP. XXXVIII.

Tordylon.

NON habet certum in antiqua etiam Medicina *Tordylon* hoc nomen, nec certam penitus historiam: aliter alius id appellatibus & de eo tradentibus. Sunt enim qui cum *Dioscoride* *Tordylon*; sunt alii qui *Tordylum*, & qui *Creticum Sefeli* vocent: Romani pariter cum Græcis *Tordylon* dicunt. *Dioscorides* hoc in *Amano Ciliciæ monte* nasci scripsit, et eque herbam sarmentosam [*brevem & fraticosam Marcell.*] habentem semen rotundum [*parvum addit Marcell.*] duplex, scutis, sive clypeolis simile, subære, & aromaticum. Bibi ad urinæ difficultatem, & ad menses ducendos. At succum caulis, & seminis adhuc viridis, trium obolorum pondere potum, cum passio per dies decem, nephriticos sanare. Radicem etiam efficacem esse, educentem quæ in thorace hæreant, si cum inelle delingatur.

Plinius.

Plinius non satis cognovisse rem videtur diversas ante se scriptorum sententias tantum referens. Adjicitur *Tordylon*, inquit l. 20. c. 22. Est autem id semen ex *Sefeli* [*Tordylum* quidam *Creticum Sefeli* vocant, *Diosc.* Et si vehementior somnus lethargicos premat, cruribus aut etiam capiti illinitur cum Fico ex aceto. Veteres dolores thoracis, lumborum, coxendicum, humerorum, & in quacunque corporis [partè, C.H.] ex alto vitia extrahenda sunt, illitum causticè vi emendat, pustulas faciendo. At in magna duntia sine Fico impositum: vel si vehementior urigo timeatur per duplices pannos [*inter duplicem pannum, Dalech.*] Utuntur ad alopecias cum rubita, psoras, lepras, phthiriales, lithanicos [*terranicos, alius,*] opisthotomicos. Inungunt quoque scabras genas, aut caligantes oculos cum melle. Suc-

cusque tribus modis exprimitur in fictili, calefactusque in eo in Sole modicè. Exit & cauliculo succus lacteus [*salsum hoc. non enim planta hac lacteum succum fundit, Dalech.*] qui ita cum induruit, dentium dolori medetur. Semen ac radix, cum immaduere musto, conteruntur, manisque plenè mensurà sorbentur ad firmandas fauces, stomachum, oculos, caput, sensusque omnes: mulierum etiam lassitudines, saluberrimo genere medicinz. Calculos quoque discutit potum ex aceto. Illinitur & livoribus, fugilatisque cum melle & adipe anserino, aut cerà Cypria. Fit & oleum ex semine madefacto in oleo, expressoque, quo utuntur ad nervorum rigores, lumborumque & coxendicum perfictiones. Idem l. 24. c. 19. *Tordylon* alij semen *Silis* [*Seselis ver.*] esse dixerunt: alij herbam per se, quam & *Syreon* vocaverunt. Neque aliud de ea proditum invenio, quam in montibus nasci. combustam potu ctere menses, & pectoris excreationes, efficacior etiam num radice: succo ejus ternis obolis hausto renes sanari: addi radicem ejus & in malagmata.

Paul. Aegineta *Gordilon* non *Tordylon* vocat, *Gordilon* *Paulo*. facili tamen & lubrico in una tantum litera ad vitium lapsu. Ceterum easdem huic cum *Dioscoride* vires adscribit.

Alii tæminino genere *Tordylè* vocaverunt: alij *Tordylè* *Seselis* semen *Tordylj* nomine censerì voluerunt: alij sui generis herbam Græciæ & Italiæ peregrinam, ideoque parùm notam. Nec *Marcellus* quod pro ea dicat, aliud habet, quam *Seselis* genus esse; ex eo quod *Dioscorides* eam statim ab omni *Seseli* descripsit, propriumque & privatim ab illis aliud, à gente, in qua nasceretur, nomen sibi invenisse. *Galenus* in simplicium censu *Tordylon* præterit, velut de quo in *Seselis* mentione egerit. *Cornarius* officinis suisque sæculi scriptoribus ignotam esse scribit. *Aequifolia*

Lob. Cam. C. Bauh. & Schvvenckf. *Caucalidem* majorem semine hirsuto, *Seseli* majus *Creticum* vulgè cognominant. *Caulalis* *maior*.

Seseli *Cretici* loco *Dodonæus* *Caucalidem* *Bellonij*, seu, ut nos vocamus, *Caucalidem* minorem *Caulalis* pulchro semine, exhibet, quod non probat *Gesn. h. minor*.

Seseli *Creticum* *Dioscoridis* verum dicitur *Trago* de sua *Pimpinella* tertia. *simpinella*

CAVCALIS MINOR PVLCHRO semine, sive Bellonij.



Tenuem ligne scetem albam radicem demittit & simplicem: caulem habet pedalem aut majorem, striatum, hirsutum. folia per conjugationes, longo pediculo adnata, subrotunda, serrata, aspera & pilosa, minora quam sequentibus quibus peniculis similia etiam sunt ea, quæ ramorum divaricationi adnascuntur, utcumque minora, nihilque cum superioribus *Caucalidis* majoris foliis habent simile: flores in umbellam digesti similes, candidi, quorum etiam flosculi exteriores majores habent

Desf.



geniculis interceptos, & in plures ramos divisos: sub quibus latâ sede adnascuntur magna, alataque folia, in ambitu incisa & serrata, instar foliorum Angelicæ, ex atrovirentia; summis ramis adnascuntur umbellæ candidantium florum, subtus nonnihil purpurascens, & ad carneum colorem accedentium: quibus succedunt lata semina, serè ut in Spondilio vulgari, subhirsuta, & summo mucrone bifida, aculeataque instar spinarum: radicem habet albam, durum, lignosam, raris fibris præditam.

Synon.

Hanc descriptionis auctor Clusius denominabat *Caucalidem* majorem, qui verò eam ad ipsum mittebat Iacobus Plateau, dubitabat, an propter semen gemellum, ad Tordylii genus aliquod potius referret. Bauh. pin. est *Caucalis* i. maxima, *Spondilij* aculeato semine.

Locus cum tempore.

Scribebat porro Iac. Plateau, mense Septembri esse lerendam: nam illicò emergere, viridèmq; deinde permanere totâ Hieme, quam percommode ferre potest subsequenti anni Iunio flores producere, deinde maturum semen, sub exitum Iulij & Augusto: tandem perfectò & ad maturitatem perducto semine totam perire.

CAUCALIS SYRIACA CVM maximo semine.



Plantulae & bipalmatis, radice simplice, tenui, albâ: coliculus hirsutus, stigmatus, atrovirens: tortuosus: folia Bauciz, sive Pastinacæ germanicæ, alata, rotundiora, & foliis singularibus conferta, plerumque terna, crassiuscula, crenata, hirsuta, subsæpta: flosculi albicantes, apiculis saturatâ purpurâ tinctis, umbellatim quidem, sed sparsim dispositi: longis foliorum segmentis protensis obvalantur, odore nullo eccellente: quibus etiam nondum delapsis, præcoci ortu succrescunt semina simul juncta, multa, incana, villosa, lata, compressa, per maturitatem pulchrè peltata, duplicia, multò maiora, etiam triplo, vel quadruplo, quam præcedentium duorum, quibus similia, cuspidâ albaque fimbriâ, umbonem cinericum circumdante. In his ex duæ, nonnihil nigricantes, quales serè Spondilio vulgari: saporis aromatici.

Cæterum, si viva planta ex horto vel sicca pictori exhibita fuisset nobis absensibus per amanuensem, melius picta fuisset: inter alia enim semen multò majus erat pingendum.

Hæc autem est illa, quam Dod. in foliat. p. 690. *Synon.* *Gingidium* primum inscribit; Lobel. verò in Obi. p. 419. & Icon. p. 723. *Gingidium* foliis Bauciz Syriacum. Lugd. p. 710. *Gingidium* foliis Bauciz Lobelij, quod ait Venetias Alepo Syriæ missum Sequini Martinelli operâ. Tabern. *Gingidium* latifolium 2. Syriacæ Borsfel mit breiten bletern. Bauh. phyt. & pin. *Gingidium* 4. foliis Pastinacæ latifoliz. *Gingidium* 2. Tab.

Caucalidis Syriacæ maximum semen mihi misit insignis Medicus D. Doctor Leonh. Rauvolf. hoc titulo: An *Spondylium* ex Syria. Frater C. Bauh. misit simile omnino semen nomine Tordylii majoris, *Tordylium* ex quo planta mihi provenit in horto E. Principis Montbelgardi, maturans semen Iulio eodem anno, quo facta, quæ deinde perit.

CAUCALIS OMNIVM MINIMA.

Tota plantula cum radice & caule unciam non superat, tantumque ejus serè in terram descendit, quantum supra eam extat. est autem radícula simplex, albâ; coliculus tenuis, hirsutus, in summa parte rubens, in cacumine nescio quid minutissimi capitelli exalbidi gerens, quod solum contingit videre. folia statim à radice pluscula emergunt, pari cum coliculo altitudine surgentia, aspera, hirsuta, incana, pediculo propter terram rubente; ex foliorum serratorum binis conjugationibus, imparique extremo segmento composita, ad *Caucalidis* latifoliz (si parva licet componere magnis) foliorum figuram accedentia.

Prope Nemausum in hiulcis saxorum rimis collegit gener I. H. Cherlerus.

CORIANDRVM VETERIBVS & in genere.

Meminit Theophrastus sparsim *Coriandri*, hæc *Coriannum* l. 7. hist. suæ c. 1. scribens. *Coriannum* proventu contumax est, quippe quod si novum sit, nasci recuset, nisi convolvatur. Et c. 3. Lignosæ radices in summa omnibus multi-caulibus datæ sunt: habet enim & *Coriannum*, quæ unistrips est radicem lignosam, & non proliam, neque fibris multis subnixam: multis caulibus, multisque ramis consistit: quapropter ejus pars superior, pro ratione inferioris non extat. Et post. cap. 5. *Coriannum* sub canis ortum lalescit. Libro tandem caul. 4. c. 3. ait: *Coriannum* in ortu ab aliis oleribus discrepat: difficile siquidem provenit: haud enim germinat, nisi aqua præmaceratum. Causam duritiæ habet. Cæterum, 7. hist. 4. *Coriannum* inter ea recenset, quibus minime plura genera sunt, quibusque diversitatem generis omnino deesse volunt.

Sic & Dioscorides (cui & alij veteres) *Corianni* unius duntaxat meminit etque multas plantas comparat, tanquam plantæ notissimæ: ipsam tamen non describit: ei vim refrigeratorem tribuens, ut inter venena reponatur. Quare illuc cum pane aut polenta erysipelatæ & herpetes sanare auctor est; cum melle verò & uva passa pustulas nocturnas (epinyctidas) testium inflammationes, carbunculósque, cum Faba sicca strumas & tubercula discutere. Lumbicos semen cum passo [paucum præponit Cornar.] potum pellere & genituram augere, largius

gius autem sumptum, mentem periculosè movere, quapropter uberiores & assiduum ejus usum vitare oportere. At succum cum Cerussa & Lithargyro [aus spuma argenti, Corn.] necnon aceto & rosaceo illitum ferventes in summa cute inflammationes sedare. Et hæc de Coriandri viribus Dioscorides perhibuit. De quibus deinceps ed diligentius disserendum, quò major est de iis inter probatissimos auctores controversia.

De Coriandri namque facultate refrigeratoria dubitat Galenus. quoniam & effectus caliditatis in eo videt, ut 7 simpl. scribit. Vetiustiores, inquit, Græci Coriannum nominant, recentiores omnes Medici Corion, sicut & Dioscorides [nomen hoc in Diosc. codicibus non legi, nec Corion ab eo vocari, refert Marantia] refrigeratorem esse herbam dicunt, sed perperam. Siquidem ex contrariis constat facultatibus, plurimum habens amaræ essentia, quam ostendimus esse tenuium partium & terrenarum, nec modicum etiam aqueæ humiditatis obtinet, quæ est facultatis tepidæ. Habet autem & adstrictionis auxilium. Ex quibus omnibus variè quidem agit ea, quæ scribit Dioscorides, sed non tantum ex refrigeratione. Ceterum, ego cujusque particulatim actionis causam enarrabo, tametsi propositum fuerat mihi, meam unius duntaxat hoc in libro sententiam expromere, sed fortè nihil obstat, imò, si verum fatendum est, proderit nonnihil superiores methodos, quæ ad hunc modum in paucis medicamentis sunt dictæ, hic repetere. primum ergo non Dioscorides tantum, sed & alij complures Medicorum indeterminatè de morbis pronunciant, sicut sanè hac quoque tempestate non paucos invenias Medicos vel insignes, præter alia, hac in re turpissimè hallucinantes. interdum enim atrà, lividà, frigidàque reddità parte, quæ erysipelas habuit, nec amplius refrigerantia poscente pharmaca, ceu antea, sed ea, quæ infixum parti præter naturam humorem vacuant, quidam tamen refrigerare perseverant; alij ad digerentia quidem transeunt, ceterum ea erysipelas sanare dicunt. Quanquam scribunt, incipientibus etiamnum atque gliscentibus crescentibusve erysipelatis alia esse medicamenta, alia verò jam declinantibus ac flacciscentibus. sed ita res non habet. Neque enim erysipelas etiam vocari debet, posteaquam inflammatio ejus, & fervor, ac biliosum illud abierint; neque facultate frigidà, quæ ejusmodi affectus sanant, existimandum est esse: sed veluti si vel initio protinus aut percussis, aut alia de causa quavis tumor in parte quapiam aut lividus, aut niger extiterit cum esse frigidum affectum existimabis, & quæ digerant, excoquantque medicamenta poscere: ad eundem, opinor, modum, si calida affectio in frigidam reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alio appellanda nomine; aut si displicet nominis mutatio, saltè sicut quidam alij scribunt principi, alta declinationis remedia, haud amplius frigida esse autumares declinationis remedia: concedendum sanè est, si cui ita placet, ut talis affectio etiam erysipelas vocetur: sed eam etiam calidà dicere ubi jam refrigerata est, id verò neutiquam concedendum: itaq; ne quod tunc ei auxilio est, refrigeratorium esse credamus, sicuti Dioscorides Coriandrum, qui cum pane aut polenta, inquit erysipelas curare illitum. Nam quod ad unguem est erysipelas, quod utiq; inflammatum est & flavum, haud unquam sanare queat cum pane Coriandrum, sed illud quod jam refrigeratum est. Et mox: Exactum erysipelas haud unquam ab antedicto cataplasmate curari potest. voco autem exactum, cum à biliosa fluxione pars impleta fuerit. porro quidd longè à refrigeratione absit Coriandrum, vel ex iis quæ ipse scripsit Dioscorides, discere liceat. Nam char-

radas sive strumas, cum erazmo, sive lomento, inquit, dissolvit: porro quidd nullum refrigerandum medicamentorum idoneum sit dissolvendis charadibus, vel ipsum Dioscoridem non dubitaturum arbitror, quippe qui sexcenta scripserit medicamenta charadas sanare potentia, quæ omnia tum temperie calida, tum actionibus digerentia esse in confesso est. Hæc in Dioscoridem Galenus; Pro Dioscoride tamen pugnat Avicenna lib. 1. Canon. cap. 144. Scripsit Galenus Coriandrum esse compositum ex diversis facultatibus, etsi terræ facultas in eo cæteris excellat, simul cum aquea quadam tepida, & adstrictoria pauca. verum, ut ego, conjicio, aqueitas, quæ in ipso reperitur, absque dubio frigida, non quidem tepida existit: nisi ei forsan admisceatur aliquid excofacientis substantiæ, quæ sui tenuitate velociter in auram evanescat. quapropter dixit Hunaym, remover Galenus frigiditatem à Coriandro & Dioscoridi repugnat. at ego quidem aliter sentio, cum frigidæ ejus substantiæ meminerint Archigenes, Rufus & aliorum posteriorum nonnulli. frigidum igitur est Coriandrum natura in fine primi, & usque ad principium secundi, & siccum in secundo: quanquam, sententia mea, & siccum est, & ad caliditatem aliquo modo vergit. Sed Galenus ipse sentit, Coriandrum esse ex omni parte calidum. Id quod fortasse evenisse putandum ex ea caliditatis particula, quæ dum bibitur, aut comeditur, ab ipso disperditur. aliter nec necessarium foret, si homines suâ frigiditate interficeret, ut in multa exhiberetur quantitate. Illud præterea subdidit Galenus, si Coriandrum strumas dissolvit, quonam igitur pacto frigidum erit? Cui facile responderi potest, id agere Coriandrum suâ quadam occultâ facultate, ac formâ; aut quod reperitur in eo aliquatenus facultas, quæ in profundum penetrare possit, frigidâ substantiâ exterius relicta. sed cum bibitur caliditas illa resolvitur. quo fit, ut sola frigida remaneat & in corporibus agat. Hactenus Avicenna, qui non sine ratione refragatur Galeno.

Dioscoridi consentanea serè scribit Plinius lib. 20. his verbis. Coriandrum inter silvestria non invenitur. Præcipuum tamen esse constat Egyptium. Valet contra serpentium genus unum, quod amphispænas vocant, potum impositumque. Sanat & alia vulnera. Epinyctidas, pustulas tritum. Sic & omnes tumores, collectionesque cum melle, aut uva passa. Panos verò [Charadas, ad-nr.] ex aceto tritum. Seminis grana tria in tertianis devorari jubent aliqui ante accessionem: vel plura illini fronti. Sunt qui & ante Solis ortum cervicalibus subijci efficaciter putent. Vismagna ad refrigerandos ardores viridi. Hucera quoque quæ serpunt [herpetas & ignes sacros sanat cum pane & polenta: item testes inflammatos, Di. sc.] sanat cum melle vel uva passa: item testes, ambusta [igneis ambusta, summa cutis inflammationes, Diosc.] carbunculos, aures: cum lacte mulieris epiphoras oculorum: ventris & intestinorum fluxiones semen ex aqua potum. Bibitur & in cholera cum Ruta. Pellit animalia interancorum, cum Mali Punici succo & oleo semen potum. Xenocrates tradit rem, si ventris est: menstrua contineri uno die, si unum granum biberint scemina: biduo, si duo: & totidem diebus, quot grana sumperint. Marcus Varro, Coriandro subtrito cum aceto, carnem incorruptam æstate servari putat. Meminit idem Plinius Coriandri lib. 19. c. 7. ubi ejus semen nudum esse ait. Eodem hoc libro c. 8. dicit in aliquo comitatu æquinoctio Autumni feri Coriandrum. Tandem c. 17. Coriandro in seminis permutatione majorem firmitatem esse testatur.

Pina Valerianus. Eiusdem etiam sententia est cum Galeno Plinius Valerianus: Non dubitanter Coriandro retri-
g. matrix potestas datur, non tamen simplex, ut
prudentissimè Galeno videtur, sed cui quidam
porcio austeritatis immixta sit, inde quod quidam
ex eo vitia curantur, quæ nunquam omnino cura-
ret, si solâ virtute frigida niteceretur. Cum melle &
uva passa tritum & impositum, omnes tumores col-
Testium dolores. lectionesque compescit, præcipue tamen illo gene-
re medicaminis doloribus testium subvenitur. Suc-
co Mali Granati & oleo in potione permixtum, a-
Animalia interanea. nimalia interaneis innata persequitur. Semen ex
aqua potum solutionem ventris stringit. scriptum
à multis legitur, etiam Coriandri grana tertianas ex-
cludere, ante accessionem si fuerint devorata.

Simeon Se. stu. Stomacho bonum est, auctore Simeone Sethi,
& eundem corroborat. cibos in ventriculo, donec
probè concoquantur, retinet. tostum igne ventrem
sistit. prodest ad phlegmonas & calidas temperatu-
ras. sanguinis profluvium potum, & si imponatur,
Lumbri. compescit. cum vino potum lumbricos educit: im-
modicus tamen ejus usus delirium facit. hujus et-
iam succus potus venenum est & occidit, qui eam
hunc bibunt, muti fiunt & desipiunt.

Macr. De viribus à veteribus Coriandro attributis, ex-
tat non inelegans Macri poësis, quæ sic habet:

Tinea. Frigida vis herba Coriandri dicitur esse
Austeraque simul quiddam virtutu habere:
Hancque Galenus ait perquam depellere ventre
Lumbricos sineâque soles si trita bibatur.
Cum vino, vel si mixta s. matur aceto,
Vnâ cum passa Coriandrum me. quæ sugatur
Sed abunt varios superaddita trita s. m. res:
Præcipue testes tumidos iuvat hoc medicamen.
Illius semen ventrem stipare solutum
Fertur, aqua iunctum si fuerit si sapius haustum.
Argenti spumam Cerissa continere mixtam
Hu tritu succum Coriandri iunge & acetum
Quatuor hu roseum miscendo iugabo olivum,
Ista ferendo simul præpositum confici unguen,
Quo sacros ignes pellas, calidosque tumores.
Si tibi difficile confectio tanta videtur,
Succus cum solo pr. dest. commixtus aceto:
Et si frumenti panis mundissima munda
Iungitur huic succo, sedat quemcunque dolorem.
Huic succo si iuncta faba sit sola farina,
Stroph. Et superaddatur strophium, medicabitur illis,
Et cederet feruens emplaastro pustula tali.

Febris tertiana. A multis scriptum legitur, febris ante tremorem
Si trita grana vorer Coriandri semina ger,
Evadet febrem, cui das lux tertiana nomen
Præstat idem lectum Coriandrum manè, priusquam
Sol surgat, cervicali si subditur agri.
Xenocrates scripsit ter idem cessare diebus

Menstrua. Menstrua, quot mulier Coriandri grana vorabit.
Aspidium quidam condemnat illius usum,
Nempe putant mortem quemvisve parare dolorem.

Nova. Traditus ita Coriandri facultatibus, superest ut
noxas ejus, atque alexipharmaca subscribamus,
quæ Dioscorides hunc in modum lib. 6. cap. 9. pro-
Vocem rancidam. sequitur. Coriandrum propter odorem latere non
potest: epotum vocis raucitatem facit, atque in-
fantiam, qualis ex vinolentia proficiscitur, ita ut
qui sumpsere varia dictu pudenda blaterent; to-
to verò corpore Coriandri odor sese prodit. His
post vomitionem oleo irino concitatum, uti re-
latum, metum aut per se, aut ex absinthio po-
tum auxiliatur: item oleum ovæque in eo exina-
nita [in id à suo putamine effusa, Lac.] si tepelacta
cum muria sorbeantur. Sic & epota muria, &
jus salsum gallinæ & anseris: passum quoque cum
lixivio sumptum. Variat ab hac Dioscoridis le-
Diets lectio varia. ctione, versio Marcelli, maximè autem in his.

Bibuntur contra Coriandrum etiam ovorum putamina
in seipsa confecta tritaque & cum muria diluta. Et
hanc lectionem in qua cum aliis non convenit,
ex Nicandro & Egineta ita stabilire conatur, ut
quæ Dioscorides *ovæ putamina* dicat, Paulus ova o-
mni intussecum humore vacua appellet, & non
cum aliis intelligat, ova depleti oportere, & quod
ex eis depletum sit, subigendum esse, & cum sal-
sugine sorbendum. Sed contra illi videatur, non
quod in ovo clauditur, quærendum esse: sed deple-
tus omni suo humore ovis eorum putamina cum sal-
luginè subigenda. Vtuturque ad hanc suam sen-
tentiam confirmandam his rationibus. Quod in
constituendo ovorum usu Dioscoridi & aliis satis
fuerit ovis uti præcepisse. Quod autem in illis u-
sum plerumque habeat, interiorem liquorem esse:
& si hac magis, quam illâ parte uti voluerint, tunc
vitellum, aut albumen leorium upperaller. Hoc
autem loco cum Dioscorides jubeat depletis, i. e.
vacuis ovis contra Coriandrum uti, putamina co-
rum suinenda tantum imperet. In hancque sen-
tentiam cum primum traxit Egineta, qui *ovæ putamina*
dixit, id est, ovæ, evacuata ova, & in
se ipsa trita & infusa dixerit. Traxit & Nicander,
qui in Alexipharmacis suis inquit: sepiusque galli-
narum mollem partem evacuans, spumam super-
infundens, &c. Quibus cum manifestè jubeat cre-
dit, gallinarum ova deplenda esse, depletisque his
nihil superesse, quod intelligi possit, quam putami-
na. Accedere his ait communem quoque sententiam,
in quo auditis depletis ovis, nihil quam putamen
intelligi relinquatur.

Coriandrum in hunc usque diem etiam apud *Nomen*
vulgares Medicos & Pharmacopœos vulgatum &
antiquum nomen sibi servat. A Græcis quidem vo-
catur, *κοριανδρον*, *κοριανδρον*, *κοριανδρον*: Lat. Cornum, Coria-
num, Coriannum, Coriandrum & Coliandrum:
Arabib. ut Serapioni de temp. simpl. cap. 34. *Kusbar*:
Averrhoi *Kusbara*: Avicennæ Glossographo *Kulbar*:
Glossographo Hahabbatus Stephano, *Quesbara*,
his etiam *Cassibar*, *Azbar*, *Alkabar*, *Kuzbara*, & *Ka-
zbara*: Laurentio Phylisio lingua Hebraicâ *Dysba-
ra* & *Dysbara*: Semen arabicè *Besar Culbar*: Agy-
ptiis *Osh un*: Aphris *Gued* & *Gord*. Germ. *Coriander*/
Coliander & *Wangendill*: hoc est, Anethum cimi-
cum, vel Cimicium, ob foetorem herbæ, quæ con-
trita contritos cimices olet. Belgæ Germanorum
appellationes tenent. Galli *Coriandre* appellant,
Itali *Coriandula*, *Coriandro*, & *Pisartina* Romæ, Ta-
bern. *Hup. Culantro*, *Culatro*, *Culandre*, & *Cilian-
dro*: Portug. *Centro*: in Candia *Coriandro*: Angl. *Co-
riander* sive *Coliander* & *Colander*: Bohem. *Cos-
ryander*: Poloni *Polskipiera* & *Coriander*. Credi-
derunt aliqui, inquit Marcellus, è Græcis cimices
nomen secisse Coriandro, quod eos folia ejus o-
leant & caules. Et quoniam infestum hoc Græci *Ca-
rin* vocent, idem olentem eos plantam *Corion* no-
minaverint. Sunt contra qui quod Coriannon *Coriannon*
Græci frequentius, quam *Corion* Coriandrum vo-
cent, non à cimicibus: sed quasi *Coriambon*, i. e. he-
betantem oculorum pupulas, dictum fuisse velint.
xoplos enim oculi pupulam, & *epibasis* hebetare ii-
dem Græci dicunt. Quod quàm verum sit, peritio-
res intelligent. Ab antiquis enim scriptoribus nihil
quod ad oculos privatim pertineat, in Coriandro
decernitur. *Corion* appellatio omnium frequen-
tior est in Dioscoride & aliis Medicis scriptoribus.
Coriannon verò in communiori sermonis usu fuisse
indicat in equibus suis Aristophanes.

Annotasse hic conveniat Coriandrum triplex ef-
se, Coriandrum nobis absolute dictum, quod C. B.
majus vulgatum cognominat: Secundum Corian-
drum minus, odoratum, C. Bauh. testiculatum appel-
latum:

latum: Vltimum silvestre, in Hispania nuper reperi-
tum, licet Plinius l. 20. c. 20. & Theophr. 7. hist. c. 4.
inter silvestria non inueniri scribant, & Dioscorides
(cey & alij) veteres) unius duntaxat meminerit: attamen
Nicandri scholiastes sativum & silvestre pro-
ponit. De his igitur nunc dicendum.

CORIANDRVM.

Deser.



RECTA & sim-
plex tenuisq;
est radícula, omni-
nò paucis fibris do-
nata, candida: cau-
lis bicornibalis &
major, gracilis,
striatus, solidus: fo-
lia primum Anisi,
aut potius Petrose-
lini, progressu
temporis tenuiter
dissecantur, ut ad
Chamaemelina ac-
cedant, sapore ter-
do intolerabili ci-
micum: umbellæ
florum Petrose-
lini pares, sed colore
propemodum car-
neo, magis tamen
ad album vergente,

quorum media foliorum pars quintuplo aut sex-
tuplo reliquâ amplior est: semen exactè rotundum
striatum, dissepimentis intrinsecus distinctum, a-
liohui vacuum, odore & sapore gratissimo, aspi-
matico.

Sym.

Coriandrum, planta à nobis descripta, ab omni-
bus herbariis appellatur, excepto C. Bauhino, qui
Coriandrum i. majus vocat, cui in calidioribus re-
gionibus semina majora esse, & in viridantiis Ale-
xandriæ ubique provenire, & Cusbara nominari
trahit. Tragus l. c. 36. notat aniculas agri Metensis
& Trevirensis hujus semen Anis / h. e. Anisum ap-
pellare: esse hoc Coriandrum antiquorum.

Coriandrum à cimum putore, aut potius Ci-
cutæ sœtore viroso, & consimili facie nominatum
testatur Lobelius, qui & Cicutæ similibus, ut Dio-
scoridem innuisse ait, viribus cognatum dicit.

Matthioli cum Cornario Coriandrum omni-
bus notissimum scribit. Brassavolum præterea in
hoc errasse, quòd, cum nesciverit Coriandrum in
Hetruria passim in pratis & campestribus suâ spon-
te nasci, asseruerit in suo simplicium volumine, sa-
tivum tantum reperi Coriandrum. Cæsalpino
quoque incompertum fuit Coriandrum silvestre
passim in Hetruria oriri, ut quidam testantur, nisi
per Coriandrum intellexerit eam plantam, quæ vul-
gò Verdemarcum [Thalictrum] appellatur.

Lug. p. 735. dicitur Coriandrum sativum Matthioli.
Guil. Coriandrum, quod recens frigidum, exsicca-
tum verò calidum. Turn. Coriander.

Lug. &
Temp.

Coriandrum ubique vidi in hortis florens
mensibus Maio, Iunio ac Iulio, quo etiam tempore
semen maturabat. Lugduni & Genevæ in horto
meo Novembri ex semine deciduo pulchrè vire-
bat, ac etiam Ianuario, & florens Maio & Iu-
nio.

Frey
v.

Ex veteribus, Dioscoride, Plinio, Galeno, Avi-
cenna & Simeone Sethi, vires ante scripsimus,
recentiores sequentia tradunt de iis. Matth. In
Coriandri facultate indaganda Galenus produ-
Tom. III.

ctus est, ut longum sermonem faceret contra Dio-
scoridis sententiam 7. simplicium. Quæ in re el
maximè refragatur Avicenna, qui in ipsum aper-
tè invehitur lib. 2. c. 144. cujus verba etsi aliquid in
se rationis ac veritatis habere videantur; tamen
cum omnibus compertum putem, Galeno nemi-
nem adhuc parem extitisse, qui diligentius strig-
pium tum naturas, tum facultates investigaret, par-
tim saporis gustu, partim odoris olfactu, partim
substantiâ, & coloribus, partim denique ex lon-
ga experientia profundissimæ Philosophiæ con-
iuncta, operæ pretium est ejus potius acquiescere
sententiæ, quàm reliquorum omnium. Verun-
tamen Brassavolus in hoc maluit fortasse cum A-
vicenna errare, quàm cum Galeno rectè senti-
re. Cæterum, quòd Dioscorides auctor sit, Co-
riandrum sumptum mentem non sine periculo
commovere, quòdque alij tum ex eo, tum ex
Mauritanis memoriæ prodiderant, ejusdem suc-
cum potum interimere; idè factum est, ut il-
li, quorum ego sententiam antehac secutus sum,
Coriandri usum proflus damnaverint. Sed id
nunc certè mihi videtur injustè factum. liqui-
dem Coriandrum mentem non commovet, nisi
largius & immoderatè sumatur. Quid quæso mi-
rum erit de Coriandro copiosius sumptum, si vi-
num etiam, cujus tamen est usus quotidianus, li-
beralius epotum, dolores, morbos graves, stran-
gulatus & mortem denique inferat: quod si mo-
deratè bibatur, præter alias utilitates, quas hu-
mano corpori præbet, ventriculum roborat, con-
coctiones adjuvat, excrementosa pellit, cor exhi-
larat, intellectum acuit, spiritus claros reddit &
vivificat. Quare non equidem video, quid ob-
stet, quo minùs simili ratione credamus, tan-
tum abesse, ut Coriandri semen noceat, ut etiam
maximè proliet, si tamen parè & modicè sumat-
ur. Quippe ab ejus usu moderato non abhor-
ruisse Galenum puto: nam l. b. 8. cap. 4. de comp.
med. sec. locos ex Archigene refert, ructu acido at-
fectis Coriandrum cochlearis mentura exluben-
dum esse. Galeno autem appetitissimè ad stipula-
tur è recentioribus Græcis Symeon Sethi, utpote
qui in Coriandri mentione scribat, id stomacho
bonum esse, & eundem corroborare: cibum in
ventriculo retinere, donec probè concoquatur.
Quæ auctorem hunc de temperato Coriandri
usu tradidisse, nulli dubium est. Ex his igitur
facile colligamus licet, quod non sit admitten-
da, sed potius explodenda illorum recentiorum
opinio, qui Coriandri usum omninò fugiendum
esse censent: nos enim jam non omnem ejus
usum, sed immoderatum tantum vitandum esse
existimamus. Semen tritum & recentibus carni-
bus aspersum prohibet ne putrescant tam citò,
quàm solent, ætatis tempore. Ex aqua autem
potum cæliacos juvat, & alvi fluxiones cohibet,
Attamen semen in ciborum, aut medicamentor-
um usum admitti nunquam debet, nisi priùs tri-
duò aceto fuerit maceratum. Matthioli præ-
terea certum inquit experimentum esse ad im-
modicas vulnerum hæmorrhagias, Coriandrum in te-
gula tostum & vulnere inspersum, desectoque Dio-
scoride, Galeno adhæret calidum statuenti, quam
controversiam componunt auctores adversario-
rum in hunc modum scribentes. Coriandrum si-
milibus, ut videtur innuisse Dioscorides, Cicutæ
vinibus cognatum. Cujus sententiam si accuratius
subduxisset Sonensis, non quidem jam commen-
tator, sed Dioscoridis immerentis defensor, neuti-
quam tam multas sarragines in suas paginas conva-
lasset. Quin potius quod solertis interpretis & can-
didi est, à veritate, Dioscorideq; steriles, neq; nostræ

Brassavo-
lus errat.
inf.Abusus e-
st in andm.Rustic
acidia.Stomach
corroborat.Putredi-
nem arce.

Alvi fluxum

Hæmorrhæ-
gia.

Matthioli

delusa spectatione sic nihil docendo, elapsus abiisset. Decuit enim Medicum doctum hunc ad modum pauca differere: Coriandri aut herbam totam, aut semen in usum ut plurimum venire: & ejus quidem aut aridi, aut virentis: neque tam multis rixis, sed multiplici experimento, & antiquorum certissima observatione, ejus expressum succum herbamve contusam, illitu tumorum fervores compescere; semen verò stomacho multis de causis proficuum, concoctionem juvare, vaporum sursum eruptionem, flatuumque impetum sistere, temperatæque qualitatis alimentum esse, unde sanguinis, seminisque incrementum, ac ne quidem correctum prodelle, ne tantoperè avertentur illud meticulosi isti declamatores: cum quisque pharmacopœorum, aut etiam è plebecula quotidianis epulis aut medicamentis correctum miscet, nullo inde percepto nocumento. Plerumque etiam illud saccharatum officinarum, neutiquam correctum est: nisi putes saccharo, igneque: igitur non aceti frigiditate, sed potius seminis siccitate & tenuitate, virus, fetidumque spiritum abstergi putandum. Rationis subductio igitur hæc est: Coriandri herbam præsertim succo frigidam esse, adeoque nonnullis in locis, Arabum testimonio, ejus succum epotum exitio esse, quod de Hiulca recentiores etiam exploratum habent: Herba nempe velca & boni alimenti, cujus succus hominem necat. Quapropter & sacris ignibus illitus reprimet succus inflammationem, exceptus medullâ panis polentâ, quam Galenus haud rejiciet, ut qui libello de paratu facilibus, ex antiquis doceat hordei farinam polentam panemve & similia addi solita, non tam quò agant, quàm ut agendorum succorum vires excipiant. Tamen si videntur etiam juvare digerendo, & siccando, ut hordeacea, aut etiam demulcendo, ut medulla. Atque hinc responsio eruenda objectioni de strumis: multa namque sunt non calida, quæ strumas incipientes discutere valent: eoque hîc farinam fresa Fabæ addi vult Dioscorides, tum excipiendo medicinam, tum etiam juvando actionem: Digerit namque Fabæ, cumque Coriandri succo mixta moderatè repellit exsiccano: quâ etiam vi testium phlegmonibus opitulatur: sicca enim optimè id præstare, modò modicè refrigerent & discutiant, præsertim initio, methodus Galenica docet: sic Plantago etiam Dioscoridi, sic capilli veneris strumas discutunt. Et hæc Adversaria. Galenus igitur acerbior in Dioscoridem invehitur, cumque vehementius agit, atque inestatur, quòd Coriannum cum pane, aut polenta erysipelas curare illitum tradiderit: neque quodnam erysipelas curet, manifestaverit. siquidem plures hic tumor habet differentias: quarum ratione variam curationem fieri necesse est. debuisset enim adjuvare Galenus, authore Maranthâ, illud erysipelas sanitati restituere non posse, quod jam planè refrigeratum est. quia ei, quod verè est erysipelas, nempe inflammatum, & flavum, ut in principio esse solet, non solum non curaret, sed potius intensius redderet. Hic igitur morbi tempus declarari à Dioscoride desiderat: quia nimirum pro temporis varietate, causa etiam morbum procreans varia sit. Innoxium esse Coriandrum Lobelio contra Sethi certum se habere asseruit D. Dionysius Thomas Lusitanus apud Antuerpienses Medicus, qui eam virentem Cerefolij & Selini ritu jusculis suis & suorum inferuerit, nullo percepto incommodo. Traggo, semen Coriandri per noctem vino, vel aceto maceratum, rursusque desiccatum, stomacho in primis confert, venenatas enim ejus exhalationes, ne caput tentent, reprimat: quare ex Coriandro pro stomacho præstantissimus pulvis confici potest, qui tamen pro voluntate cujusunque communicetur,

& vel saccharo condiatur, vel non condiatur. admonendi sunt hoc loco Sepiasarij, ne semen cuiquam, nisi prius eo, quo diximus, modo præparatum (ut isti loquuntur) fuerit, vel cum saccharo vendant, nisi venenum loco remedij exhibere velint. Coriandri semine subtrito cum aceto, caro salsa non solum à tarmis [forte tinea] sed & sœtore vindicatur, & longo tempore odorata conservatur. Hæc Traggo, cui eadem stat de Coriandri venenatâ facultate, quæ Matthiolo sententiâ, proindeque ei eadem quæ huic debetur ex Lobelio responsio. Empir. Virtembergicus capitis destillatione laboranti, post cibum accipienda præcipit 20. aut 30. Coriandri grana pulverizata & cum saccharo permixta. Ego tamen hoc medicamento propter malignam vim, quæ Coriandro à multis, dubio procul non absque experientia tribuitur, potissimum non præparato, non temerè utendum discerno. Coriandri solia odore ingrato ac pertinaci mitatit Casalpini in Hispania expeti in cibis, tum cruda, tum cocta, quæ in Italia vehementer sœtent. Dicitur gentes hoc cibo quidem somnum conciliant, sed capitis gravitatem & vertiginem sibi excitant. Scribit Camerarius ex Coriandro oleum destillari, ex quo fiant tabellæ cum saccharo, ad podagræ præcautionem: catharticos enim siccare.

De Coriandri facultate venenata, si placet, audi Alpinum de plant. Ægypti c. 42. itemque Guilandinum sic conferentes. Alpin. Vbi que in viridariis Coriandrum provenit copiosissimum, quod omnes Cusbara appellant. Herbaque virentis usus in cibo est apud omnes Ægyptios familiarissimus. Etenim ferculum non parant sine foliis Coriandri, quamquam ingrato oleat. Guill. Quid audio? nonne ipsi mandantes maxime læduntur, & ab ejus usu in phrenesim labuntur? quod Dioscorides, Avicenna, tum multi alij tradidère. Alpin. Ridiculum. quis unquam vidit aliquem, Coriandrorum causa (quæ in usu apud quosque tum sanos, tum ægrotos familiarissimo existunt) læsum fuisse, aut ei aliquos sensus turbatos, nisi immoderatè eis fuerit usus? quid miraris? quasi ejusdem cum Galeno non sis sententia, qui Coriandrum calidum, resolvens ac modicè adstringens statuit. nonne demonstrat Dioscorides vel hanc ejus facultatem fateri, cum dixerit, charadas Coriandro cum lomento sanari? Quod nunquam à frigidis frigidi tumores discutiantur, ac curentur; cum medicamenta aliâ à Dioscoride ad sanandos duos tumores charadasque præsertim memoriæ prodita, calidâ facultate fuerint. Neque videtur planè hoc siluisse Avicenna, cum dixerit, charadas Coriandro sanari, vel ex proprietate, quam ad illum sanandum tumorem habet, vel ex partium substantiæ tenuitate, quâ permeat profundè tumidam partem. Sed quis ignorat nihil à frigido resolvi, et si multa fiat permeatio partis tumefactæ, sed omnia solventia calida esse? Guill. Veram sententiam rectè defendisti, quam quis modo negabit, sciens ex te Ægyptios virentem Coriandri herbam in cibo sequi citra aliquam noxam? multò minùs seminum siccatorum usus erit exinde timendus. Hincque extrahisse non parum Arabes liquidè constabit, qui Coriandro frigidam facultatem narcoticam, stuporem inducentem, atque sensusurbationem concitantem, ac exitium tribuerint. Herbam in aqua elixatam illi estant. Sed eâ multò plus semina ad roborandum stomachum valere iij affirmant, debiles enim ventriculos, usu seminum assiduo maxime roborant, ejusque calorem ipsa sovent, augent, flatûsque resolvunt, ac discutunt, proindeque in colico dolore, atque aliis à flatulento spiritu concitatis usum seminum sequuntur: ipsis sc. vel in pulverem reductis, vel ex ipsis parato decocto, utentes. Quo

Tumores.

Ignis facer.

Diosc. paracelsus.

Causis.

Capitis destillationes.

Somnum inducit.

De Coriandri facultate ex Alpin.

Charadas.

Arabum error.

Flatum.

*pieri frigi-
dum
Gonorrhoea.* Quo uteri quoque frigiditatibus & humiditatibus
occurrunt: praesertimque ad menses immodicè
fluentes, & ad gonorrhoeam firmandam, quod in-
si illi quoque facultas adstringendi, ex quo puto
apud eos plantam quoque emplastri modo, ad po-
dagricos & alios articulorum dolores in maximo ibi
esse usu, quod eas partes adstrictione, ne humorem
partes recipiant, roboret, atque etiam contentos
resolvat, discutiat, vel exprimat. Confectum Co-
riandri vocatur Coriandrum saccharatum, vel sac-
charo obductum, quod parabis hoc modo. Recipe
Coriandri, à sordibus, pulveribus, festucis, lapillis, &
pediculis, cribrando, ventulando & seligendo re-
purgati & ab omni humiditate exsiccati lb. ij. Po-
nantur in zneum vas pensile duabus ansis suspen-
sum, & super carbones hinc inde, antrorsum, retror-
sum, dextrorsum, sinistrorsum agitentur: nunc in
orbem volvuntur, nunc instar Avenae, in vannis
moventur, donec calefiant. Calcactus infundatur
parum sacchari, ad debitam, & quodammodo perfe-
ctam consistentiam, i.e. propemodum ut ad morsu-
los & orbiculos cocti cochleari ferro non procul ab
extremitate perferato, & continuè agitentur, do-
nec siccetur saccharum: deinde aliud affundatur, ut
prius, idque tantisper fit dum justam acquirat ma-
gnitudinem, quae in duplici differentia consistit.

Nunc enim tam crassè saccharo obducitur semen
hoc, ut Pisi hortensis magnitudinem vel etiam ma-
jorem acquirat. Nunc quàm paratissimè saccharo
circumdatur, & in officinis Coriandrum primà tu-
nicà nuncupatur. Superficies plerumque laevis est,
nisi singulari artificio asperior, seu (ut vulgo lo-
quuntur) crispata sit, videlicet ex alto saccharum fun-
dendo. Si materia conglobatur, vel saccharo con-
ferim infuso, vel negligenter moto, manu affricatà
dissolvuntur nodi. In fine confectura exactè siccen-
tur: deinde in locum calidum & siccum cribro im-
posita reponantur. Coriandro primà tunicà prae-
cipuè utimur in medicina ad trageas grossiusculas
conficiendas. Per se & absque aliis rebus usurpatur
utiliter ad confortationem capitis, cerebri & me-
moriae. Medetur vertigini post cibum sumptum
dimidio cochleari. Paralyti jejuno stomacho
comestum, & post prandium & cenam devora-
tum. A cibo usurpatum corroborat ventriculum,
orificium ejus superius claudendo. quare sedat vo-
mitum, fastidiumque ciborum, praeipue autem post
febres, concoctionem adjuvando. corrigit anhelu-
tum fortentem, praecavet ebrietatem, inducit som-
num, dolorem ventriculi à flatibus concitatum cu-
rat: venerem extinguit, humiditates absorbit, ubi os
aquà & sputo abundat. Admodum vulgare est Co-
riandrum saccharo largius obductum in conviviiis,
commellationibus, & comotationibus nocturnis.

Multum commendatur à Marcello Empyrico &
Nicolao Myrepsio Mulla coriandrata in apostematibus
& pleuriide: sed neuter eorum confectionem
ejus docet. Cui itaque animus est parandi hanc, is
praeparatum Coriandrum, ut monet Tabern. prius
in aqua coquet, ac octo partibus aquae colatae par-
tem unam mellis immiscebit, post igne lento ad
consumptionem dimidiae partis ea simul decoctur-
us, despumaturus, ac cocta colaturns ad usum. Co-
riandri decoctionis aqua laudatur in quolibet alvi
profluvio, etiam vomitione assidua conjuncta, Cho-
lera morbus dicta. Conducit in calidis capitis affe-
ctionibus sicut & in aliis, in quibus vinum hand
cōceditur. Haec, Cinnamomi aquae loco pauperibus
concedatur, quibus fortuna Cinnamomum persol-
vere denegavit. Paratur autem hoc modo: Accipi-
tur Coriandri praeparati: unc. semis: Aquae fontanae
lb. viij. Coquuntur haec in vase stanneo bene obtu-
rato, alteri vasi aqua pleno impolito, ad quatuor

horas. Ab igne verò remota & frigefacta coatur, &
fugido loco reponitur ad usum. Quidam sic. huius
addunt, alij verò uvas pallas, utriusque pro copia
que libitu. Herbae Coriandri aqua stillatitia multo
plus ferè est usus, nisi in extrinsecis quibusdam affe-
ctibus, seu dolore oculorum pulsatorio, guttatim
nonnunquam instillata. Quod medicamen effica-
cius redditur, si lac muliebre immisceatur. Linteol-
um quoque in hac madefit, & tepidè superponitur.
Fit autem hac ratione. Herbam ac unà caules colli-
ge cum maximè floret: inciduntur omnia simul mi-
nutim, & in Balneo Mariae distillantur. Coriandri
seminis aqua stillatitia maximè salubris est in hepa-
tis apostematibus, uncia pro dosi cum alia conve-
niente permixta & epota. Potest etiam aliàs ejus u-
sus esse ad praedictos affectus. Epithematibus cum
aliis inservire potest. Hanc ita parabis. 2. Corian-
dri praeparati 3. viij. Contunde crasso modo, affu-
de lb. v. aquae limpidae: macera in Balneo Mariae a-
lembico caeco contexto, horis octo: dein igne len-
to per cineres alembico vitro distilla & repries a-
quam saporem & odorem Coriandri repraesentan-
tem, si in sole, ut moris est restificetur, seu memoriae
prodidit Tabern.

CORIANDRUM MINUS
odorum.

IM A folia habet Deser.
In minutius incisa,
& semen habitius,
copiosius, in pluri-
bus spithameis p-
cumbentibus cau-
liculis: aliter in
horto Jacobi Pla-
teau exoticarum
stirpium avidissi-
mi, teste Lobelio,
cujus iconem hic
pictam damus, ju-
xta quam tamen
posuimus parvam
plantam, florem &
semina Coriandri
nostri communis.

Huic Dod. in fol. Synon.
lat. titulum fecit
Coriandri altera
icon. Lob. in Obl.

p. 404. in Icon. p. 706. Coriandrum alterum mi-
nus odorum: Lobelij, Lugd. p. 735. Bauh. phyt. Corian-
dum 1. Apud Matth. & pin. Coriandrum 2. minus
testiculatum: Coriandrum 2. in odorum, Tab.

CORIANDRUM SILVE-
stre.

Silvestri Coriano radix est singularis, tenuis, non
Saluds demissa, cui radiculæ aliquot tenues adna-
scuntur. Haec caules multos edit, quinque angulis
constantes, solidos, geniculatos, ramuli incerto or-
dine similiter solidi à singulis geniculis produunt,
folia ferentes summis prioris Coriandri foliis simi-
lia, sed minora, in quorum cacuminibus unum bellè ve-
luti in altero Coriandro, floribus ex purpureo can-
dicantibus, referte, quibus discussis semen oritur ro-
tundum, id peculiare habens, quod in singulis re-
diculis duplex fit, atque unum alteri junctum. O for-
tior plantae gravior, quàm sativi Coriandri, & ca-
put magis tentans.

Symb.



Nicandri scho-
liastes in Alexi-
pharmac. silvestre
hoc Coriandrum
sativo simile de-
pinxit, sed latiori-
bus foliis, & multò
longius, multa ha-
bens adnata, mul-
tòsque flores. Cu-
jus cum latiora fo-
lia esse dicat, soli
naturæ id tribuen-
dum cenlet Myco-
nus, qui minora
hujus folia depin-
xit referente Dale-
champio.

Lugd. hanc pi-
ctam dat p. 736. ti-
tulo Coriandri sil-
vestris Myconij,

ceu & Ponain Baldo. Bauhin phyt. & pin. Corian-
dum 3. silvestre vocat; apud Matth. Coriandrum
silvestre nuper in Hispania repertum.

Clarum itaque jam est dari Coriandrum silvestre,
licet Plinius inter silvestria inveniri neget. Nos non
vidimus, habemus tamen munere Doct. Jac. Zvin-
geri Coriandrum silvestre.

Locum.

Nascitur locis quadantenus siccis, marginibus &
limitibus terrenis. Vberius tamen pullulat & altius
adolefcit Solo humidior.

ANISVM VETERIBVS ET IN genere. CAP. XL.

Defini.



Anisi folia pri-
ma longis hæ-
rent pediculis, sim-
plicia, aut trifida,
circumscriptione ro-
tunda, profundè
ferrata, uncia ma-
jora, albicantia, o-
dorata, superiora
Petroselinii foliis si-
milia & tenuiter in-
cisa. caulis rotun-
dus, concavus, Apij
cauli similis, hirsu-
tus, nonnihil stri-
atus, è cuius genicu-
lis rami enascun-
tur multi, Corian-
dri modo, quorum
extremis hærent
umbellæ latæ, mi-
nutis candidisque

floribus constantes, ad Pimpinellæ Saxifragiæ flo-
res accedentibus: semen parvum, minus quàm Ci-
cuta, colore serè cinericeo, odore ac sapore grauis-
simo, dulci, cum jucunda quadam acrimonia: radix
gracilis, inutilis, modò simplex, modò multifida.

Anisum semen est Cæsalpino Fœniculo minus,
veteribus indescriptum, sed nihil seciùs vulgo no-
tum. Quam ob rem ejus historiam longiori sermo-
ne prosequi, non est operæ pretium. B. pin. Ani-
sum i. herbariorum, majore semine & minore, quod
& apud Bohemos habetur.

Nomen
linguar.

Græce vocatur ἄνισον, ἄνισον, ἢ, Γαλακισον: Latine
Anisum & Anelum omnibus authoribus, solo ex-
cepto Eutachio Roëssin, cui Abinthium dulce &

I. her. Braunschweig, cui Fœniculum Romanum, &
innominato quodam, cui Cuminum dulce (q. e.
Germ. Suffer Bummel) & Fœniculum dulce (q. e.
Suffer Fenchel) dicitur. Plinio tamen Anicetum
pro quo fortè Brunfels. in herb. germ. malè legit A-
nacetum. Arab. apud Serap. lib. simpl. c. 242. *Anisum*,
Anesim & *Ancusum*, quæ appellationes dubio procul
à Græcis mutuatae sunt. Haliabba *Drosatum* & *Abie-
zatum*, ejus verò Glossographo Stephano *Nizarum*,
Orezatum & *Anexissum*: Ger. *Anis* & *Enis*: Belg. *An-
nye*: Gall. *Anis*: Ital. *Aniso*, & semen ejus *semente d'An-
isi*: Hisp. *Matahuala*, *Metahuala*, *Mathuala*, *Mara-
lahuga* *Terva dolce*, *Terva buona*, & *Anise*: Angl. *Anise*
& *Anyse*: Boh. *Anis*: Poln. *Anise*: Hung. *Anis*.

Ceterum, ut nostrum sequamur institutum, non
est à nobis silentio prætereundum, malè quosdam
apud Dioscoridem capitis principium de Aniso,
quod inter nothas appellationes aliqui Sion vo-
cant; cum sine prioris capitis de Sifone commixtum
esse, quod ad historiam attinet. Nam si eadem est
herba Sifon & Anisum frustra diversæ vires eis af-
signantur.

Anisum vulgare, quod quidam in Candia Glyca-
nison vocant, diversum inter alios ab Aniso Græco-
rum Silvius esse statuit.

Sunt, ut refert Levin. Lemnius de herb. Bibl. c. 41.
qui Anethum, quod Christ. Matth. 23. concioni ad-
hibet, malè Anisum credant, quum sui generis her-
ba sit.

Anisum vocant Coriandrum dictum aniculæ A-
gri Metensis & Trevirensis.

Ex Orbe Atlantico inter alia apportatur lignum
quod Anisi odorem ita spirat, ut Anisi lignum, teste
Goropio, meritò nuncupetur.

Anisi saporem, nostro judicio, refert Sassafras.

Zingi fructus stellatus Anisi sapore, dicitur Ani-
sum Philippinarum Insularum Clusio. De his tribus
proximè nominatis, consule lib. 4.

Sed ne quid intactum relinquamus, substituta
annotemus. Avicenna quidem pro Aniso & Dau-
cum, & Samplicum substituit.

Sed & Anisi loco secundum Avicennam à Mona-
chis dist. 8. cen. 255. Carvi ponitur.

Nunc si natales quaras, in Creta, Syria, Aegypto,
aliisque Orientis regionibus secliter gignitur: Sen-
tur quandoque in Angliæ, Silesiæ & Germaniæ hor-
tis, ubi Julio ac Augusto floret, ac semine prægnans.
Monspelij floret Maio. Genevæ habuit sapius in
horto suo Moletus pharmacopœus, sed semine te-
nuiore, quale fuit, quod nobis Montbelgardi in
horto E. C. provenit sapius difficilè maturefcens. ad-
fertur etiam ex Germania Anisum minus plenum,
quod magis acerosum & minus aptum ad extrahen-
dum oleum.

Superest, ut deinceps de Anisi viribus dissera-
mus. Anisum igitur, ut præcepit Dioscorides in uni-
versum vim habet exalfaciendi, exsiccandi [*Examar-
vle. vet. mittit.*] odoris halitum [*Idem. gratè legi-
tur, quam vocem sic Plin. reddit & eum secutus Ruell. &
Sarrac. At Corn. & eum secutus Dalech. facilem spiratio-
nem vertunt. Et sanè utrumque intelligi posse videntur.*
Nam & asperam arteriam repurgando, spiritum facilem
reddit: & odore suo ei ndem iucundam efficit. Corn.] ju-
cundiorum facendi, dolores mitigandi [*Idem. Da-
lech.*] digerendi [*Idem. ex Corn.*] urinam
ciendi, ac denique discutiendi, dissipandi que [*Idem. ex
Corn.*] Hydropicis potum tum arceat. Pro-
dest ad venenata animalia, & ad inflationes. Al-
bum & album mulierum profluvium sistit. Lac ad
mammas elicit, & venerem subulat. Sulfurum natu-
bus dolorem capitis sedat: tritum & cum rosaceo in-
stillatum aurium medetur rupturis. Præstat autem
quod recens est, & plenum & non fursurosum,
odore

odore validum. Principatum obtinet Creucum. Secundum locum tenet Egyptium. Hæc Dioscorides, quæ particulatim & pluribus verbis declaravit Plinius. Anisum adversus scorpiones in vino bibitur, Pythagoræ inter pauca laudatum, sive crudum, sive decoctum. Item viride, aridumve omnibus quæ condiuntur, quæque intinguntur desideratum: panis etiam crustis inferioribus subditum. Saccis quoque additur. Cum amaris nucibus vina commendat, quin ipsum oris halitum jucundiores facit, scæto remque tollit manducatum matutinis cum Smyrno, & melle exiguo, ore mox vino colluto: vulum juniorem præstat. Insomnia levat suspensum in pulvino, ut dormientes olfaciant. Appetentiam ciborum præstat, ob has causas quidam Anicetum id vocare. Dolores capitis levat suffitum naribus. Epiphoris oculorum è vino radicem ejus tusam imponit lollas. Ipsum cum Croco pari modo, & vino, & per se tritum cum polenta ad magnas fluxiones, extrahendisque, si qua in oculos inciderint. Natium quoque carcinodes consumit illitum ex aqua. Sedat anginas cum melle & Hysopo & aceto gargarizatum. Auribus infunditur cum rosaceo. Thoracis pituitas purgat costum: cum melle sumptum melius. Cum acetabulo Anisi nucis amaras L. purgatas terere in melle ad tussim. Facillime verò Anisi drachmatres; Papaveris duæ miscentur melle ad Fibæ magnitudinem, & ternis diebus sumuntur. Præcipuum autem est ad ructus, ideo inflationibus stomachi & intestinorum, & cæliacis medetur. Singultus & olfactum, decoctum, potumque inhibet. Folus decoctis digerit cruditates. Succus decocti cum Apio olfactus sternutamenta inhibet. Potum somnum concitat. Calculos pellit. Vomitiones cohibet, & præcordiorum tumores. Et pectorum vitis, nervis quoque, quibus succundum est corpus, utilissimum. Prodest ejus & capitis doloribus instillari succum cum oleo decocti. Non aliud utilius ventri & intestinis putant, idè dysentericis, & in teneismo datur costum. Aliqui addunt & Opium pilulis in die ternis Lupini magnitudine in vini cyatho dilutis. Dieuchet & ad lumborum dolores succo usus est. Semen hydropicis & cæliacis dedit tritum cum Menta è vino, radicem ad renes. Dalion herbarius parturientibus ex eo cataplasma imposuit cum Apio; item vulvarum dolori. Deditque bibendum cum Anetho parturientibus. Phreneticis quoque illinunt, vel recens cum polenta. Sic & infantibus comitiali vitium aut contractiones sentientibus. Pythagoras quidem negat corripì vitio comitiali in manu habentes. Ideoque quamplurimum domi ferendum. Patere quoque facilius olfactantes. Est statim à partu dandum potui polenta aspersa. Solimenes contra omnes duntias ex aceto usus est eo: & contra lassitudines in oleo decoquens addito rutro. Semine ejus potio, lassitudinis auxilium viatoribus sporodit. Heraclides ad inflationes stomachi semen tribus digitis cum castorei obolis duobus ex mulso dedit. Similiter ad ventris aut intestinorum inflationes. Et orthopnoicis, quod ternis digitis apprehenderit seminis, tantundem Hyosciami cum lacte asinino: multi vomituris acetabula ejus & folia Lauri decem trita in aqua, bibenda inter cœnam suadent. Strangulationes vulvæ, si manducetur, & hauratur calidum, vel si bibatur cum Castoreo, in aceto & melle. Vertigines à partu cum semine Cucumeris & Lini pari mensura tegnum digitorum, vini albi tribus cyathis discurit. Tlepolemus ad quartanas ternis digitis seminis Anisi & Fœniculi usus est, in aceto & mellis cyatho uno. Lenit articulares morbos, cum amaris Nucibus illitum. Sunt qui & aspidum venenis advertari naturam ejus putent. Urinam ciet. Sium cohibet.

Venerem stimulat. Cum vino sudorem leniter præstat. Vestes quoque à tinea defendit. Efficacius Deleat. semper recens & quo nigrius. Stomacho tamen inutile est præterquam in flatu. Hæc Plin. l. 20. cap. 11. Qui libro præcedenti 19. cap. 3. Anisum ceu & Anethum culinæ & medicinæ nasci dixerat. Licet autem Dalion apud Plinium præscripserit radicem parturientibus, nos tamen nihil facimus, est enim tenuis radix, & nostro judicio inutilis. Quid si Dalion aliquam aliam radicem intellexerit? Nos id facile credimus, Solomenis remedium orthopnoicis, Anisum sc. cum Hyosciamo fore proficuum. Si mulier posse velit à concēptura sit, Anisum ex aqua quàm tenuissimè tritum, Hippocrate præceptore, bibat & dormiat. quod si quidem pruritus circa umbilicum eam corripiat, concipiet: sin minus minime. Prodest, referente Simeone Scithi ad vetustas ex frigore jecoris affectiones, & ad spirandi difficultatem, quæ ex pituita proficiscitur. Flatus, qui in ventriculo sunt, digerit. Obstructiones tollit, & lactis copiam facit. Galeno l. 6. de simpl. med. facult. autore, Anisi semen maxime utile est, acre & subacidum, ut prope ad urentium accedat caliditatem. Est autem & in siccando tertij ordinis, sicut & in calfaciendo. Proinde & urinam ciet, & digerit, & flatus ventris reprimunt. Hæc Galenus, cui consentit Paul. Ægineta l. 7. Nos Anisum quod in Gallia & Germania provenit minus calidum existimamus, quàm Galenus tradat, & poussimum germanicum. Alii non inficias minus temperamenti hujus varietatem ex natali Solo dependere. Cum & Dioscorides & Plinius Creucum ratione loci principatum obtinere dicant. Galeno Anisum calidum & siccum est in tertio. Verum id, quo in Anglia utimur, inquit Turnerus, non ita calet: Quare suspicor esse melius quoddam genus, quàm quod venale communiter ad nos affertur. Etiam si interim utendum nobis est hoc vulgari, quod mihi videtur, vix calidum in initio secundi gradus. Galenum, ut contendit Lugdunensis, de Aniso in Syria aut spontè alibi in regionibus calidis nato loquutum esse æstimandum est. Magni fuit olim Anisum antiquis, inquit Loban Adv. præsertim Pythagoreis: non modò quia cibi appetentiam revocaret, unde Anisum & Anicetum dictum putant, sed ut verisimilius est, animi tranquillitatem, remittit & laxat tensiones flatulentas internas & externas. Et si è nullum è cæteris flatum emittentibus oleraceis seminibus gratus est ventriculo, mirus habet acrimonia, aut plus suavitatis, quàm istud semen, quod nequaquam, ut ex Dioscoride Galenus arbitratur, tertio gradu hodie gustatu apparet calidum: nisi quia ruri raro, aut nusquam apud nos visitur, in hoc us verò ubique gentium etiam Septentrionalium, ut Germaniæ & Angliæ provenit, cultu & Solo non hil deponat caloris. Anisi semen recens melius esse, plerum, non fuisse fuscum, odore præstanti, inter prima verò laudatum è Creucum, pro vimo loco Egyptium, ad triennium usque non inefficax testatur Apollo, dicens: In siccando tertij ordinis, sicut & in calfaciendo statuitur ex Galeno. At Avicenna duplici errore, in secundo siccum distat ex utroque, etsi qualitatibus gradu relicto, hoc pacto senbat Dioscorides. Anisum in summa calefacit, exsiccat, & c. id amarus fecit Galenus, propterea non strum esse, & amarum, i. e. dulce Actuarij, crediderunt non ulli. quum nostrum fuisse, rosam nunquam sic. Attractionem vaporum Aristorum bullitorum per nares, sedate lodam [frigida videlicet, i. e. dulci capite frigida] perhibet Bayus. Semen Anisi vim soda obtinere scribit Tabern. calfacientem, siccantem, & dissolventem, tam intrinsecus, quàm extrinsecus: herbam præterea raro in usum venire, radicem tantum inuilem, nunquam. De semine hæc tradit Vlsur.

Conceptio-
nis futura
signum.

lecor fr.
ridum.

Tempera-
mentum,
Galeno.

Anisum &
Anicetum
unde da-
tum.

Galeno, ut.

Avicenna
Lapsus.

Glyceris
Actuarij.

Soda.

*Pani addi-
tur.* Vsurpatur hodie non solum in medicina, verum et-
iam in culinā apud Germanos ut olim apud pri-
scos. Mulierculæ nostræ pinfant hoc in panem, ex
quo Biscoctum parant. hoc enim ei non solum la-
porem gratum committit, sed ob id etiam pani
Inflatione. utiliter conceditur: quippe in inflatione ventriculi,
lienis, & intestinorum: similiter in dolore laterum
*Morbi frigi-
da.* & renum; itemque ventris torminibus, colica, hy-
drope, omnibusque frigidis jecinoris affectibus, &
obstructionibus, in lapide renum, in sterilitate seu
infecunditate mulierum. Cibi Aniso concocti non
absque commodo propinquantur vertiginosis, & ca-
tarrhis frigidis laborantibus, ex cachexia, ictero, hy-
drope & aliis supra enarratis affectibus. Confectum
*Confectum
Anisi.* Anisi, Anisum sc. saccharatum, vel saccharo in crassa-
tum urinam movet, digerit, flatūsque ventris discutit,
oris halitum commendat, aliāque plurima præ-
stat. Maxime autem hujus usus intempestivus est,
in conviviis & comotationibus luxuriosis; & volup-
tuosis, tam apud pauperes, quam apud divites. Fit
autem hoc modo. Semen Anisorum optime munda-
torum lb. ij. Inde in vas æneum pensile, ut in
Confecto Coriandri, & super ea infunde saccharum
lavis coctionis in principio, & bene manibus duc
per vas æneum, usque ferè sint cooperta, benèque
*Anisum la-
gu & aspe-
ritum.* exsiccata ad omnem manum sacchari: & hoc continua-
tusque in finem, si solidos, seu laves Anisos facere
velis. Si verd asperos & crispas, postquam cooperta
erunt, affunde saccharum cum cochleari ferreo,
abalto, in & sit fortis coctura: deinde vas hinc inde
agita, ut in Coriandris est dictum. Anisi quantò mino-
res, tantò pulchriores: & quantò duriore, tantò
laudabiliore. Duri enim sunt & non solum Anisi,
sed & cætera alia confecta, si bene siccantur ad om-
nem sacchari affusionem. Aqua stillatitia florum
Anisi conducit in omnibus iis morbis, ad quos se-
men per se commendatur. Facies hæc mediocriter
lota, & per se resiccata, clara redditur: immoderatè
verd adhibita subflavum & morbosum inducit co-
lore m. Ejus etiam in epithematibus usus esse po-
test. Aquam de Rosculis ita parabis. Anisum florens
collige unā cum foliis & caulibus. Incide omnia mi-
nutim, distilla in Balneo Mariæ, rectificaque in sole.
Si fortiozem desideras, contunde seminum uncias 3,
affundendo aque hujus libras tres aut quatuor,
progredere ut in aqua Coriandri componenda te-
locuimus. Anisites, vel Anisatum vinum, ut Fœni-
culatum faciendum. Laudatur in omnibus affecti-
bus, quibus semen ipsum medetur. Constantinus
L. 8. c. 4. de Agric. si semen Anisi vino inditum sit, id
succurrere urinæ difficultati, omnibus intestinis
conducere narrat. Anisata multa dupliciter fit. Vel
enim semen crassiusculè contunditur, & unā cum
multa fermentari sinitur. Vel semen prius in aqua,
de qua multa paranda, coquitur. Admodum utilis est
longo tempore tussientibus, difficulter spirantibus,
itemque rautati. Calefacit pectus & pulmones,
medeturque earundem partium frigidis aff. ctibus.
vires quoque easdem obtinet, quas vinum. Pro iis,
quibus vinum morbus denegat, aut pro absthemiis,
aut etiam pro iis, qui vinum per se bibere non con-
sueverunt, paratur Anisi decoctionis aqua, eo mo-
do, quo Fœniculi, accipiendo tamen pro uncia se-
minis libras octo aquæ, quæ coquuntur in vase du-
plici. Dianisum recipit sem. Anisi 3. ij. 5. G'ycirrhizæ
ræz, Mastice, singul. 3. i. sem. Carvi, sem. Fœniculi,
Mace, Galangæ, Zingiberis, Cinnamomi, singul. 3. v.
Piperis nigri, albi, longi; Cassiæ lignæ veræ, Pyre-
thri, Calaminthæ, singul. 3. ij. Cardamomi majoris,
Caryophyllor. Cubebar. Croci, Spicæ Indicæ, singul.
3. j. semis. Sacchari albi 3. ij. Mellis despumati quan-
tum sufficit. fiat EleQuantum. Intemperiem frigi-
dam ventriculi à pituita cruda, vel etiam flatibus la-

nat, & tussim diuturnam à frigida causa genitam,
Mesue. Trochisci de Aniso sanant obstructiones
hepatis, & alios ejus morbos, & inde natas febres
antiquas. Eorum compositio hæc est. Anisi, succi
Eupatorii, singul. 3. ij. sem. Anethi, Nardi Indicæ,
Mastiches, Folij, sol. Absinthij, Alari, Apij, Amygda-
larum amararum, sing. 3. semis. Aloës, 3. ij. Syr. Ab-
sinthij, quantum sufficit, formentur trochisci, sic-
candi in umbra. Anisi seminis extractum pondere
anisi scrupuli, cum vino, aqua Anisi, aut aliquo a-
lio convenienti liquore propinatur in iis morbis,
quibus semen. De Anisi decocto, sale & oleo, vide
Querc. defens. Herm. c. 41. Nos in doloribus ventri-
culi à flatibus & pituitosis humoribus ortis, Oleum
Anisi magni facimus, exhibitum cum juleculo, modo
paucè dentur guttulæ, tres sc. aut quatuor, quod
tum in nobisipsis, tum in aliis sumus experti.

Decoctum quoque multum æstimamus, & plu-
ris facimus, si febrile quid morbo conjunctum
sit. Aquam etiam, quæ parando oleum extrahi-
tur, multum probamus. Colicos cruciatos quos
non potuit sanare, oleo chymico Anisi perlanavit
Heurnius. De sale Anisi hæc scribit Tab. Herbarum
semen & radicem exsicco, comburo, & ex cinere s. a.
salem elicio. Utiliter adhibetur in hydrope, opila-
tione renum & vesicæ, per se, aut cum alijs medica-
mentis permistus.

VISNAGA MINOR QVORVN-
dam, Selinum peregrinum Clusio,
semine hirsuto.

CAP. XLII



*Caulis surgit cu-
bitali & sesqui-
cubitali, striato, te-
nui, meduloso &
ramoso. folia cujus-
modi Pastinacæ Ger-
manicæ silvestris pri-
mò provenientes,
vel Sanguisorbæ, aut
Saxifragiæ hircinæ
minoris, vel Cauca-
lidis majoris & mi-
noris, vel, ut ait Clu-
sius, Coriandri, ex
duabus, tribus, qua-
tuorve foliorū con-
jugationibus, unò-
que impari ad co-
stam hirsutam alli-
gatis componitur:
singularia verd so-
lia, subrotunda, as-*

pera, subhirsuta, potissimum inferiā parte, profun-
dè circumquaque serrata, pollicis unius, aut duo-
rum latitudine. per tetram strata: folia verd per cau-
les accedunt ad Ammi folia vulgaris majoris. Foliis
sapor nonnihil aromaticus cum acrimonia. umbel-
læ parvæ ex muscariis in aquahbus contextæ, flo-
sculis minimis, quæ constant quinque foliis bipar-
utis singulis, & apicibus albis, vel ut dicit Clus. can-
dicantibus: si men exiguum, sublongum, hirsutum
duplex, Apij vulgaris officinarum seminis ferè par-
majus quam Ammi minoris, vel Clusio autore, Pe-
trofelini vulgaris simile, gustu acri, odorato, Clus.
aromatico: Radix illi alba, oblonga Pastinacæ Ger-
manicæ, vel Apij hortensis, cum nervo in medio,
sapore valdè ingrato, acri, Clusio odorata, Selini sa-
por.

Clus. hist. & hist. Selinum peregrinum 1. Cxcl. 7. c. 1. Saxifragia 3. quam exillimae forte dici posse Cumminum silvestre primum Dioscoridis. At enim ante caput ejusdem libri posse pro Cumino Dioscoridis sive tri semen hirsutum ostendi, quod verius accedens dici possit, ut ejus quæ inter Saxifragias numeretur, exili semine, ut Ameos, valde hirsuto, & vehementis acedinis. An idem loco priori jamjam citato hujus Vlnagæ varietatem intelligit, per Saxifragiam quartam, quam in totum tertia similem ait, & solo semine discrepare, quod paulo crassius sit, nequaquam lanuginosum & infirmius.

Bau. phyt. Apium 7. (9 pin. cui & Daucus 3. Diosc. 2. Plinij. Col:) sive peregrinum foliis subrotundis appellat, atque Guilandinum, cum illi in horto medico Patavino ostenderit, Daucum secundum nominasse.

Item cum tempore. Vlnagæ minor quorundam mihi provenit in horto E. C. Montbelgardi. Lugdunum mihi semen mittebatur nomine Vlnagæ minoris. Idem hoc inibi Rizonotus quidam anno 1566. exhibuit nomine feminis Petroselinum Macedonici, quamvis fateretur non verum Petroselinum Macedonicum. Frater attulit ex horto Patavino pro Saxifragia Bononica. Semen accepi à Tossano Carolo ex Burgundia nomine Dauci veri. Hortulanus misit Ducis Florentini nomine Dauci fervidi Candia. Provenit satum in horto D. Frid. Meier Argentinae, qui vocabat Panacem. Habui tandem siccam plantam à Sprengerò, qui Panacem Asclepiadem cognominabat.

In Salmanticensi agro sponte nasci Selinum peregrinum in vinetorum marginibus, juxta vias & semitas, auctor est Clusius: Florere autem mense Julio: semen Augusto maturum esse.

APIVM, SELINVMVE VETERIBUS. CAP. XLII

Apj. Cxcl. apurina. NE Apij nomenclatura ignatis imponat, statim in limite hos admonendos necessarium esse duximus, eam equivocam esse, & duas diversissimas plantas denotare. Apium scilicet Schias, &c. cognominatum, de quo Diosc. 4. scripsit, & nos suo loco dictum sumus. Alterum verò Selinum dictum, de quo hic nobis sermo est, & Dioscorides hæc memoriz prodidit. Apium hortense [*σέλινον κηπεύσιμον*] ad eadem ad quæ & Coriandrum coavenit: prætereque ad oculorum inflammationes, cum pane aut polenta polline imposita. Estuans quoque stomachum demulcet, & mammas grumoso lacte turgentes reprimat: ciet & urinas, sive cocta, sive cruda edatur. Decoctum ejus radicumque potum, venenorum noxæ resistit, dum vomitiones excitat, alvum quoque cohibet. At semen potentiùs urinas pellit, & à venenata bestia demorsis, hisque qui argenti spumam hauserunt, opitulatur, ac denique status discutit. Sed & utiliter admiscetur medicamentis, quæ dolorum levamenta præstant, itemque theriacis ac tussicularibus. Hæcille.

Apj. diff. recentia ex Theophr. Apium sub nomine Selini videtur passim intellexisse Theophrastus. Et quidem 7. hist. c. 4. inter ejus genera ex foliis & caulibus differentiam fecisse, his verbis: Pluribus & caulibus differentibus, ut Radix, &c. Cumminum [*κμήνη*: legendum *κμήνη*, Apj ut ex sequentibus apparet] Apiorum verò [*σέλινον*] cum in foliis, tum in caulibus discrimen utique constet: aliud enim folio spisso, crispo, densoque: aliud rariori, latiorique, cauleque majori. Horum iterum aliud candidi caulis, aliud purpurei, aut versicoloris: verum ad summam ejusmodi omne silvestri proximum est. Idem caul. 5. c. 6. ait, figuram & speciem [*μορφὴν*] suam mutare, si satum conculetur, cylin-

droque superinvoluto coercetur. Fieri etenim crispum, quoniam intrementum transire facili nequeat, & vasis quoque, in quo positum fuerit, speciem imitari: & hoc propterea evenire, quia nutrimentum, cum prohibetur arcereturque à vase circumveniente, feratur ad id quod avocet, libertatemque permeandi concedat: fieri enim velut rivuli ejusdam deductionem. Itaque speciem vasis ambientis capessere. Evenire hoc idem quodammodo & generi animalium in magnitudine, parvitate, brevitate & longitudine. Quippe illa spermata jam esse hæc verò cum generentur, formam recipere. Quapropter cum Apium hoc transferre oporteat, palum designandum tantum præcipere aliquos, quantum Apium efficere libeat. Radicem enim totum locum implere facile posse. Et hist. 2. c. 5. Fit & in oleribus cultura tantæ mutatio, ut Apium, si satum conculetur, cylindricumque spissetur, consequeturque, crispum inquit provenire. Mutantur item regione, tellureque mutata, ut etiam cetera. Hist. 1. c. 9. Olerum autem major ferè pars radice coheret singulari, ut Apium, quod tamen propagines magnas suggerit, quæ quidem pro corporis sui ratione altius, quam arborum sanè radicanturn. Hist. 7. c. 4. Inter radices Apio carnosæ est: ista namque ne siccata quidem omnino durebit. Caul. 6. c. 22. Ex dulcibus nullum ferè bene olet, & ed minùs quod dulciora sunt. Ratio, quod succus dulcis crassior, atque terrestrior est, præterum cum mistus fuerit in fructu. Odor autem humoris tenuioris, siccioris aptique diffusi potius est. Verum odor & foliorum, & raiorum, & in totum arborum atque plantarum in eisdem generibus est, in quibus aliquid acedinis aut pinguedinis inest: quemadmodum certè in genere herbarum, quas coronarias appellamus, & oleribus quoque, cum Apio. Siccitas enim, & acritas, vel acerbitas his innotescit non in fructibus, neque in cæteris, quæ humoris ejusmodi sunt: In omnibus verò odoratis redditum illud per definitionem omnino inest, ut demissum sicco, quod sapidum est, vim aliquam pariat odoris. Prorsus odoratis, suavioraque, rari tota, quam particulatim locis placidi spiritus, ac siccis proveniunt: scilicet exhausto humore aquoso, excoctoque reliquo melius. Siccitas enim odori convenientior est, & omnia odorata ed potius vergunt. Argumento etiam illud est, quod tractibus æstuosis plura, melioraque odoratorum genera prodeunt. Melius enim ibi concoquitur, & quædam siccata olent. Hist. 7. c. 1. Omnium difficillimè Apium nascitur: quadragesimo enim die affirmant, qui celerimum ejus proventum tradidit: sed sunt qui quinquagesimo velint, quod etiam omnibus sementibus feri potest: quidam enim omnibus id adjuvant. Ad summam quæ locis pluribus feri patiuntur, hæc nihilo celerius ex maiore parte Æstate proveniunt: quod mirum, si tempus, ærve, nihil confortat ad celeritatem. At si improbo, frigido, cæloque tristi circumdata sunt, ferius prodeunt: nam & tempestas, serenitasve sementi succedens, facit ut aliàs ferius, aliàs maturius germinetur. Discrimen illud quoque in sementibus singulis, quod locis apricis, temperatisque, maturissimè proventus fieri solet: causas enim eorum in pluribus constare credendum est: exempli gratia, in seminibus ipsis, in cælo, in tempore, quo singula fieri placuerit: adde tempestates, serenitatesque. Sed hoc amplius in præcedentibus, in quibus tempora differant, atque in quibus conveniant: radicem enim tertio die tam Æstate, quam Hyeme quidam provenire affirmant. Adhæc temporum diversitate plurimum dissident. Ergo tempora germinandi hæc & sunt, & singulis addicuntur. Refert ad celeriores, ferioresque proventus, & feminum ætas: quædam enim maturius

ex recentiore semine exsunt, ut Porrum, &c. Contra quædam ex vetere celestis, ut Apium. haud enim omnia omni melius è recentiori possunt. Apium verò non anno tantùm fructificat, verùm etiam bi-mate, quod quidem vel plus temporis edurare potest. Nec annum dici debet: major enim ejus pars simulatque semen perfectum est, exarescit. Semen-tes porro hortensium, quibus feri singula solent, tres certè notantur, una hyberna, alia æstiva, tertia quæ inter eas cadit, post hybernium solstitium: quas ita appellant: non ratione satùs, sed ortùs, usùque cujusque. Satus enim in contrariis ferme constitit temporibus. Quippe hyberni principium post æstivum solstitium est, mense Julio, quo Brassicam, Radiculam, Rapam, & quæ sementis postera vocant, cæu Betam, Lactucam, &c. ferere assolent: primamque sementem istam appellant: secunda post brumam Ianuario incipit mense, qua seminant, designantque Porrum, Apium, Gethyum & Attiplicem. Tertia quam æstivam appellant, mense Martio agitur, quæ Cucumis, Cucurbita, Bitum, Ocimum, Portulaca, & Satureia feruntur. Hist. cap. 15. Virent ex suffruticibus herbiisque perpetuò, Ruta, &c. Apium. Sed hoc cacumine perdurat, amissis reliquis. Huc usque Theophrastus: Quem sequutus Plinius, hæc l. 9. cap. 36. scribit. Et lativi autem differentia in folio densio, crispo, aut rariore, & leviori [latiore Theophr. Item caule tenuiore aut crassiore. & caulis aliorum candidus est, aliorum purpureus, aliorum varius. Idem l. 20. c. 11. Apio gratia vulgo est. Namque rami largis porcionibus per jura innatant, & in condimentis peculiariter gratiam habent. Præterea oculis illitum [inflammari, Diosc.] cum melle, ita ut subinde foveantur ferventi succo decocti, aliisque membrorum epiphoris, per se tritum, aut cum pane, vel polenta impositum, mirè auxiliatur. Pisces quoque si ægrotent, in piscinis, Apio viridi recreantur. Verùm apud eruditos non aliud erutum terra in majore sententiarum [noxium sit, an innoxium. Dalech.] varietate est. Distinguitur sexu. Chrysippus fœminam esse dicit, crispioribus foliis & duris, crasso caule, sapore æcri & f. rvido. Dionysius nigriorem, brevioris radicis, vermiculos gignentem. Anibo neutrum ad cibos admittendum, imò omninò nefas: nam id defunctorum epulis feralibus dicatum esse, visus quoque claritas inimicum. Caule fœminæ vermiculos gigni. Ideoque eos qui ederint sterilesce, mares fœminæque. In puerperis [puerperæ M. & CH.] verò ab eo cibo comitiales fieri [Galenus in consilio pro epileptico, Apium in comitiis alibi & laudat & imperat. Dalech.] qui ubera hauriunt. Innocentior tamen esse marem. Eaque causa est, ne inter nefastos fructus damnetur. Mammæ duritiæ [lacte concreto rigidarum, x. d. c. 10. Diosc.] impositis foliis emollit. Suaviores aquas potum coctum præstat. Succo maxime radicis cum vino lumborum dolores mitigat. Eodem jure instillato gravitatem aurum. Semine urinam ciet, menstrua ac secundos partus. Et si foveantur semine decocto, sugillata reddit color. Cum ovi albo illitum, aut ex aqua coctum potumque renibus medetur. In frigida tritum oris hucce-ribus. Semen cum vino, vel radix cum veteri vino vesicæ calculos frangunt. Semen datur & arquis ex vino albo. Et ita Plinius de Apio disseruit.

Arnobius.

Arnobius l. 5. advers. gentes, ubi oblivioni sacra Corybantia donanda monet, mysterium hoc sanctum credi refert. Fratrem trucidatum à fratribus, è cujus interempti sanguine Apium natum sit, ideoque prohibitum mensis olus hoc apponi, ne à manibus mortui inexplabilis contraheretur offensio.

Apud Plutarchum Timoleontis milites ad pugnam castris educti, mulis Apium ferentibus obviis auspiciis augurium putavere, quoniam Apij co-

rone sepulchris imponerentur, unde proverbij specie Apio egere dicitur, qui periculosis ægrotat, & cui vitæ periculum imminet. Subest autem adagio locus, alludens ad coronas victorum, quæ ex Apio hebant, præsertim in ludis Isthmiis, teste Diphilo apud Athenæum lib. 6.

Super Apio certamus, ut solet Isthmiis.

Super Apio certamus:

Silentiò hic non involvendum & illud Adagium, Ne inter Apia quidem sunt, pro eo quod est, ne ingressum quidem, aut initium rei attigerunt. Sumptâ metaphorâ ab iis, qui hortos ingrediuntur. Nam antiquis extremis ille hortorum ambitus, Apio conserebatur: quem qui nondum præterissent, velut in horti limite adhuc esse videbantur. Aristophanes in vespis:

In Apio nondum est vel ipso: sed nec in Rutis adhuc.

Hoc est, ne initium habet eorum quæ sunt futura. Interpres & aliam quandam hoc loco refert sententiam, volens adagium ad gymnicum agonem pertinere, ad quod qui præpararent infantes, statim ut essent nati, in Apio collocare consueverunt. Itaque perinde dictum videtur, Ne in Apio quidem: quali dicas ne in primis quidem rudimentis.

Porro morem Apio coronandi putant jam olim ab Hercule inductum, post interfectum Nemeæ leonem: quod & Pindarus indicare videtur alicubi: nam in Nemeis hymno quarto dicit, *ἦν ἐν ἀγῶνι βαρυπύρρον δῶλον ἔχον δῖος στήθεσσι*, i. e. Vbi in certamine tumultuosi, floruit Corinthiaci Apis. Significat quendam in certamine Neptuni Isthmico coronatum fuisse à Corinthiis. Virg. in Bucol.

Floribus atque Apio crines ornatus amaro.

Honorem in Achaia fuisse, Apio coronare victores sacri certaminis Nemeæ demonstrat etiam Juvenal.

Græque Apium mernisse corona. Horat.

Quis uis deproperare Apio coronas, cur ævæ Myrto.

Apium tandem Galeno & simp. usque aded calidum est, et urinas & menses ciet tradatur: status quoque discutere, & magis semen, quàm herbam ipsam. Idem 2. de alim. familiarissimum, jucundum & stomacho gratum esse scribit. Apium, inquit 2. de dicta Hippocrates, magis urinam ciet, quàm alvum movet & radices magis, quàm ipsum alvum movent. In libro de intern. affectionibus, ubi à pituita in aquam intercutem transitus fit, ex oleribus Raphanorum & Apij usum præsentat. Item morbo mulieb. si ex partu uteri inflammationem conceperint, Apij [ov. qu. loco tamen non malim legere, quod videtur melius. contra inflammationem convenire, quàm Apium] lacum intra pudenda emittit.

Galenus tempera. mentum.

Vinam et, etiam Simeone Sethi authore, obstructions tollit, non inflat, magis verò status discutit & menses ducit. Difficulus autem concoquitur, atque ob eam causam oportet ipsum in medio ciborum sumi. Paululum quid ventrem sistit. Proprietate verò quadam comitiales lædit, & oportet hos omninò abstinere. Sæpe enim quidam qui ferè ex hoc morbo convalescere, parati autem in eum incidere, ex ejus usu iterum comitiales facti sunt. Obscendit etiam testes. Semen autem quàm folia validius & efficacius, & eo radix. Prodest ad singultus à crassis excrementis prosectos. Abstergit renes & vesicam. Obstructions in venis & arteriis factas aperit. Semen præsumptum, ebrietatem arceat. Conferat etiam ad bonum corporis [oris, aliis.] odorem, multique crebriore hujus usu gravem corporis [oris] odorem abegerunt. Mulieres ad rem veneream promptiores facit. Si in hujus decocto calculosi desistant, ut ferunt, ejicit, & difficultatem urinæ sanat & renes curat. Lactantes mulieres oportet ab ejus usu abstinere, quia etiam lac.

Sim. Sethi

Comitiales lædit.

Obscendit testes.

Obscendit testes.

Ad rem veneream promptiores facit.

Etymo.

Etymologiam Apij docet Macer sequenti Poëmate.

Est Apium dictum quod apex hanc ferre solebat
Victus, ut erum fieret dum more triumphus;
Ipse sibi talem prior imposuisse coronam
Dicitur Alcides morem tenere sequentes.
Ast alij dictum credunt, quod apes vehementer
Illum soleant avidè decerpere flores.

Hanc herbam etiam solet Attica dicere linguat
Virtutis calida, sicca quoque dicitur esse;
Tertium à Medicis datum est gradus huic in utroque.

Illi succo si candida mica terendo;
Panu jungatur, oculi sedare tumorem
Dicunt, emplastri noctu superaddita more:
Sicque ferunt mammas prodesse tumensibus illam.
Sedat fervorem stomachi, pellitque tumorem,
Et quicquid venci creat, includit atque nocivi
Desiccans poris assumpta repellit apertu,

Provocat urinas hac cruda comesta, vel hausta,
Sed magis radicem facit hoc decoctio sumpta.
Hoc idem semen operatur fortius haustum.

Tota venenata occurrit moribus herba:
Sed semen potius vel apozema proderit eius,
Et bibitur, rufumque modo sedabit eodem,
Ventrem constringit, vomitum potius coarctat.

Lympha commixtum quoque si jungatur acutum.
Agris amissum fertur reparare colorem,
Cruda à jejuni fuerit si sapè comesta.

Vnaquaque die vexantem corpore febrem,
Cum lympha potat a fugat febres aures tremorem.
Hydropicos, & splen tumidum juvat illa, jecurque,
Si cum Feniculi succo contrita bibatur.

Hæcque superposita turpi lentigo fugatur:
Illi succum sarru cum polline mixtus
Atque ut lachrymâ, vulnus bene purgat & ulcus,
Si superaddatur emplastri more frequenter.


Finem huic de Selino tractationi imponeremus,
ni ex Columellæ lib. 12. soliorum discrimina, quæ a
Theophrasto nativa superius numerabantur, cul-
tura & artificio humano fieri quoque posse, do-
cendum foret. Apium etiam possis plantis ferere,
nec minus semine. Aqua præcipue lætatur, &
ided secundum fontes commodissime ponitur.
Quod si quis id velit latifolij facere, quantum pos-
sint tres digiti seminis comprehendere, raro linteo-
lo illiget, & ita in areolas dispositum religet: Vel
si crispæ frondis id fieri malueris semen ejus indi-
tum pilæ & saligneo palo pinsitum expoliatum-
que, similiter in linteolis ligatum obruas. Potest
etiam circa hanc operam fieri crispum qualitercun-
que satum, si cum est natum, incrementum ejus
supervoluto cylindro coarctas. Et hæc omnia
de sativo hoc Apio intelligenda sunt, ideoque lon-
gius à nobis repetita, ut sciant, meminerintque
legentes, sperandum homini, ut labore & diligentia
sua naturam in ruris disciplina, non imitari tantum,
sed etiam æquare possit.

Coronidis loco lector monendus erat aliud
esse *Απιον* pyrum, fructum Pyri arboris, quæ Græ-
cis *ἄπιον* dicitur. Item aliud *ἄπιον* herbam. Et hanc
rursus duplicem. Vnam quidem *ἄπιναν* &
ἰσχιν cognominatam, de qua agemus H. n. g. lib.
34. sub titulo *Απιος*, quo in loco etiam adscribemus
Apij æquivoca. Alteram Apium sativum Græcis
ἄπινον dictum, quod quidam Melissophyl-
lon, Magi verò Sanguinem ori appellant.

APIUM HORTENSE MULTIS,
quod vulgo Petroselinum, palato gra-
tum, planum & crispum.

RADIX adultior magnitudinem interdum asse-
quitur Pastinacæ Germanicæ, alba, acriscula,
Tom. III,

APIUM HORTENSE
Fuchij.



PETROSELINUM VULGO,
planum et crispum.



non ingrata. caulis
cubitalis & major,
in fastigio & ramu-
lorum extremis flo-
res fert in umbella
parvos albos: semen
oblongum, strigo-
sus quàm Fœnici-
li, multo majus
quàm Apij officinis
dicti, sapore grato.
folia duarum aut
trium unciarum in
alas divisa, legimen-
tis laciunculis, laci-
niatis, minutis lais,
quàm Apij palu-
stris, ori gratis.

Folia hujus inter-
dum crispâ, rotun-
diora, pulchrè cre-
nata, frequentiora,
sapor & odor idem
cum vulgari jam di-
cto.

Icon prior ex em-
ptus mihi placet
pro Apio hortensi
vulgari. Altera de-
sumpta tum ex viva
planta, tum ex epitome
Camerarii, exhibet
Petroselinum vul-
gò dictum, planum
& crispum.

Putarunt autem
dubio procul om-
nes ferè priores æ-
tatis Medici, inque
præsertim, qui diu
versati fuerunt in
simplicium medica-
mentorum inquisi-
tione, quique mul-
tum laboris ac stu-
dij impenderunt, ut
hæc Medicinæ par-
tem per se abolitam,

restituerent, nil aliud apud antiquos fuisse sciri, si A-
pium, quàm vulgare hoc nostrum Petroselinum, hodie
hortis omnibus frequentissimum. Et hanc quidè sen-
tentiam unanimi ferè consensu comprobant, præsertim
quod omnibus notis nostra hæc planta sit prædita,
quibus constare Apium veteres tradidit: quippe quod
nobis omnium olerum familiarissimum in ciborum con-
dimentis perpetuo habeatur, & recentiores quoque
Apium comitalibus interdant. Quæ sanè de Apio
veteres memoriæ prodiderunt. Cum igitur huius
rationibus, tum auctoritatibus, notis præterea iustifi-
cantibus constet vulgare Petroselinum legitimum
esse Apium, mirari subit Anguillaram epist. 7. in Ang. notæ
hæc verba temerè prorumpentem. Qui existimant
vulgare nostrum *Persimola*, vel *Petrosella* esse A-
pium & Selinum antiquorum, errant. *Persimola* ni-
hil aliud est, quàm verum Petroselinum antiquo-
rum, sed cultum, hodie adhuc nomen servans, sed
nonnihil corruptum. In Sio [Chio fortè] nunc vo-
cant Condimentum, ut fecit Græcos, qui ait
παρασκευασμένη τὸ ἀπὸ ἀπίου. In insula Zante & Mo-
reæ vocatur *Petroselinon* in Candia *Macedonisi*.

Inter omnia Apiorum genera, vix aliud est usi-
tatis eo, quod officinæ vulgo, sed non sine errore, Trago.
Petroselinum vocant. Nam nullam in Germania

nostra, inquit lib. i. cap. 154. Tragus) culinam reparias, in qua herba & radix hujus Apij hortensis, suum locum inter præcipua olera non occupet, ita ut non solum divitibus, sed & pauperibus variis cibis condiendis magnopere quærat. Sed quid de Germanis dico, an non & ipse Apicius ac Platina summo loco Petroselinum semper habuerunt? Proinde neminem esse existimo, cui usitatissima planta non sit cognita, qui non etiam vires ejus perspectas habeat. Quanquam quod mirari satis non possum, quod notior aliqua herba vulgo fuerit, eò plerumque forma, & nomen illius ignota existunt. Quot enim putas in numero illorum esse, qui Petroselinum, Chærefolium, Cicutamque differentias proprias cognitatas habeant, aut nomina sciant. Quemadmodum enim, quod ego vidi, Cicutam Chærefolium, rursus verò herbam Germanis Gleiß [hanc Tragus vitium Petroselinum esse, aut certè aliquà ratione ad Cicutam pertinere arbitrat.] dictam Petroselinum dicere quidam ex his audent, ita fieri faciliè possit, ut idem Petroselinum Cicutam, rursus autem Cicutam Petroselinum appellare non vereantur, Petroselinum enim & vitium ejus Gleiß dictum [Cicutaria quæ Apij vitium] cum adoleverunt (nam conjunctum, iisdem locis natalibus gaudentes proveniunt) tantà affinitate copulantur, ut discerni vix possint, nisi coloris differentiam probè animadvertas. Petroselinum namque dilutè & gratà viriditate præditum est, alterum verò vitium nigricat magis. Caulem etiam rotundum utraq; planta habet, sed in eo rursus differunt, quod altero demùm anno Petroselinum excaulescat & floreat: illud verò primo statim anno caulem & florem in umbellis album, & semen Cumino simile proferat. Iam & in umbellis, quas habet in flore subluteas, & semine magis exiguo, odorato, gustuque aliquantulum acri, à vitio illi diffidet Petroselinum, ut interim de radice nihil dicam, quæ vitio illo non ultra dodrantem longa, ac ingrati planè & fædidi odoris est, huic verò odoratissima ac prolixa ceu Fœniculi. Isidorus porro & Platina in ea sunt sententia, ut existiment Petroselinum nostrum vulgare esse Petrapium, seu Apium saxatile, h. e. (si germ. exprimere velimus) Stein Eppich / aut Stein Peterlin. Atqui manifestum est nostrum vulgare Petroselinum; non in saxis, sed hortis plantatum provenire, licet quandoque illud viride in muris reperiatur, id quod vento tribuendum est, qui plantarum semina hinc inde non raro dispergit, difficitque. Quod si verò eam ob causam Petrapium esset dicendum, quod inter petras interdum inveniatur, multa sanè haberemus Petrapia, quando luce clariùs est multas plantas saxis & petroselinis delectari. Sed ut tandem nostram de hac planta proferamus sententiam, eam σέλιον κηπάριον, Apium hortense, h. e. Germ. Garten Epff / Garten Peterling / & Zam Peterlin / Dioscoridi vocatam omnino judicamus. Quod autem vulgare nostrum Petroselinum, nihil aliud sit, quàm Apium hortense, non solum experientia, herbæque ipsius apud Dioscoridem historia, verum etiam Constantinus & Manardus Ferrariensis 6. Epist. med. epist. 8. testatur. Ex his itaque, quæ adduximus, satis liquet, nos quoque hodie veterum habere Apium, quod quocunque modo alij vocitent, parum sumus solliciti, modò sciamus illud hortense esse Apium.

Petroselinum
cum Chærefolium
folio & radice
eius affinitas
est.

Apium saxatile non
descendit.

Est Apium
hortense.

Monachi
negant esse
Petroselinum
antiquorum.

Apium hoc hortense, sive Petroselinum vulgare, non esse Petroselinum Dioscoridis & Galeni (ut Anguillara, non sine tamen errore, sensisse videtur) docetur à Monachis dist. 1. cens. 25. his verbis. Secundum Dioscoridem & ferè omnes Doctores, Petroselinum [in Diacalameto] non est istud quod pro

manibus habemus, & in hortis ubique feritum, quodque vulgi corruptela Petroselinum falsò appellat. Cum separatim omnes faciant capitula de Petroselino, & cæteris generibus, sive speciebus Apij: quod quidem Selinum est, est verè nostrum vocatum Petroselinum. Et nota quod in hac descriptione [Diacalamenti] etiam habetur Apium, quod est propriè ipsum Selinum. Apium itaque simpliciter scriptum, ut in descriptione Diacalamenti Galeni, semper (testantibus pluribus fide dignis authoribus) de Selino est intelligendum, scilicet de nostro vulgò nuncupato Petroselino. Quæ quidem species, Selinum vocata, à Dioscoride anteponitur omnibus aliis descriptionibus specierum sui generis. Et etiam si scribatur Apium hortense, sive sativum, illud idem intelligitur Selinum, seu Græcè Selinon. Vnde in Diacalamenti descriptione duas Apij species posuit Galenus, Apium petræum sc. & Apium sativum, quod propriè est nostrum vulgò Petroselinum nuncupatum.

Cæterum, planta à nobis tradita Apium dicitur à Monach. & Turnero. Apium hortense, Matth. Dod. gall. & lat. Lob. adv. p. 314. & Icon. p. 706. Lugd. p. 700. & Castore. Apium sativum, Sylvio de compos. med. & Tab. hist. Eid. Ic. Apium, Selinum, sativum, domesticum. Apium domesticum, Cæf. Apium verum, Schvv. Apium commune vel mas Plinij, Gesn. h. Apium montanum, Fuchf. Icon. & hist. eidemque in fol. Oreoselinum. Apium hortulanum, Brunf. Apium i. sive hortense, seu Petroselinum vulgi, Bauh. apud Matth. & pin. ubi & Petroselinum, Cord. in Diosc. & Ang. Petroselinum vulgare seu sativum, Lon. Petroselinum syl. Fuchf. ic. vulgo Apium veterum, Gesn. h. Apium hort. Ger. Apium commune, non rectè Petroselinum, Gesn. h. Petroselinum vulgi, Petroselinum verum priscorum, Guil. Apium sativum vulgare, sive Petroselinum, Col. Eidem phyt. Apium i. Selinon seu Apium Theoph. & Diosc. & Apium mas Plinij: Selinum, Turn. Selinum hortense, Lob. Obl. p. 405. Petroselinum officinis, Trag. & Brunf. Petroselinum vulgare, Ang. & Guilandini, qui cum Petroselino antiquorum non absque errore idem esse statuunt. Petroselinum silvestre, Fuchf. Ic. & hist. Et hi omnes Petroselinum planum intelligunt.

An autem Petroselinum crispum Trago fuerit Petroselinum notum, asserere non aulam, existimari potius incrispum. Huic enim non sunt folia Fœniculi, quale ait esse crispum. Hoc vocat Lob. adv. Apium crispum, ut & Lugd. p. 700. Bauh. apud Matth. phyt. & pin. Apium 2. vel Petroselinum crispum, ut & Cam. Apium hortense crispum, Adv. Lugd. Apium sativum Sardum, Col. Apium crispum & Apium multifolium, Brauser Peterlin / gesulter Peterlin / Tab. & Ger. Apium crispum, σέλιον παλάφυλα, & Petroselinum crispum, gesulter Peterlin / silge / Schvv. Matthioli in comm. post. ex Columella meminit Apij crispum, ostendens dein arte fieri ab hortulanis. Apij verò crispum nomine herbam sativam veteres intellexisse tradit Gesnerus. Plinium quidem lib. 20. cap. 11. per Apium sceminam, quod mare nigrius, acrius, & crispus facit, hoc intellexisse, ita ut generis unius duas species proximas statuerit. Theophrastum autem hæc duo Apia non aliter quàm cultu differre, ostendere. Quæ de re consule veteres.

Apium hoc hortense, Petroselinum vulgò dictum, Græcis propriè dicitur σέλιον & σέλιον κηπάριον. Germ. Peterle / Peterlin / Peterfil / & Garten Eppich. Belg. & Flammendis Petercelie / Petroselie & Peterfelie. Gall. Persil, du Persil, Persil de lardin, & Persil

Synon.

Linguarum
nomina.

de Persil domestique. Ital. *Petrosella*, *Petroselino*, *Petroselino domestico*, & *Apio domestico*; & *Petrosimolo*. Hisp. *Perexil*, *Iuluerr*, & *Salsa*. Angl. *Perseley* & *Garden Parsely*. Boh. *Petrusel*. Hung. *Selinum hortense*, *Petrishyom*. Slavon. *Petrezylia*. Offic. & vulgo *Medicorum Petroselinum*, *Petrosilium* & *Perilium*. Serap. de temp. simpl. cap. 280. arabicè *Karphs* & *Karphi*. Averrhoi *Alcarphas*, Avicennæ *Glossographo Alcarafs*, & aliàs etiam *Charfs*, *Charfi*, *Chares*, *Carphi*, *Alcarpse*, *Carafs*, *Alkarapfe*, *Karfi*, *Carafcu*, *Harps*, *Naru*, *Querassum*, *Querassum*, *Querferum*, *Kerph* & *Sasneck*.

Deerz.

Licet autem plurimæ nationes nomina sua à Petroselino declinent, non est tamen verum aut legitimum Petroselinum, quod in petrolis gignitur: unde nomen accepit, & in Macedonia præstantissimum est. parùm rectè idcirco sentiunt, qui hortense Apium hoc, à Petroselino genuino solà culturâ differre existimant. & nihil aliud interesse, quàm quodd hortense imbecillius sit, silvestre verò potentius: solent enim silvestria facultatibus, sativis superiora esse.

Confusa
Guilardi.

Minimè igitur audiendus est Guilandi Theon, Dens ille caninus, qui in explicatione Petroselini, & Selini, h.e. Apij huius sativi Matthiolum frustra hallucinatum esse falsò scribit, dum plantam, quam vulgus Petroselinum vocat, verum præscorum Petroselinon non absque gravi errore autumat, tum quodd à descriptione nihil abhorreat, tum quodd nomen suum non in Græcia solum & Italia, sed in tota etiam Europa fervet, tum quoque quodd Cyprij geminas vulgò plantas agnoscant quæcum vnam Selinon appellant: quam is pro antiquorum Apio interpretatur, alteram Macedonium, quod nostrum Petroselinon esse ait. Hic autem cum allectam neminem, præter comitem invidiam habeat, meritò dente suo canino ab omnibus roditur, dilaniatur, dilaceraturque.

Lacus cum
tempore.

In hortorum arcis feritur, calida ac frigida sustinens loca, modò vel humidum naturâ Solum sit, vel sæpius rigetur. Loca siquidem amet humentia, aquâ lætetur, atque idcirco circa fontes commodè proveniat. Fuchsius in palustribus nonnullis Germaniæ sponte reperi scriptum reliquit. Tempèstivè feri potest, sed tardè erumpit: Æstate læpilis tonderi ac demeti potest: caulem altero anno profert: semina verò Iulio, vel Augusto ad maturitatem proveniunt. Hortulani nostri primùm Aprili mense, aut potius appetente Majo, secundum doctrinam Palladij: deinde verò, quod sequenti anno in Majo tenerum Petroselinum, quod maximè cibus expetitur, habere possint, circa festum D. Laurentij & Bartholomæi tertæ mandare solent.

Vires
sum.

Petroselini vulgò dicti herbam & radicem, non solum coqui, sed & Sepalsarij hodie usurpant, magis verò semen, quod calidius est, & ad ciendam urinam efficacius. Porro possunt utiliter omnes partes Petroselini, utrinque corpori adhiberi, id quod ex veteribus antè pluribus ostensum est. Radix & herba verò potissimum ad culinas spectant, utriusque sunt, in omni cibo. nam inflationes stomachi deprimunt, urinam & menses cient, jecur & lien ab obstructione liberant, hydropicis & ictericis conducunt. Radix & semen omnibus medicamentis adversus venena, tussim & aquam intercutem facientibus misceri possunt. Sunt qui decoctionem contra aquam intercutem, morbum regium, & calculum renum, hoc pacto conficiant. Accipiunt seminis Petroselini, Fœniculi, Anisi, Cari, singul. Vnc. j. Radicis Petroselini, Pimpinellæ & Cari, singul. Vnciam unam, aut Vnciam & semis. Hæc omnia in mensura vini albi per

Tom. III.

noctem macerant, alteroque die ultra tertias decoquant, vespèrique ac manè ægris propinant, ita tamen ut à potu jejuset æger tres horas. Hac decoctione obstructions jecinis ac lienis tolluntur, aqua inter cutem atque icterus per urinam expellitur. Eadem juvamenta aquæ stillatiz à Trago ascribuntur. Hortensis Apij calida quidem ac resuscans est facultas, sed magis exsiccans ac siccans semen, quod ad secundum caliditatis & tertium ferè siccitatis ordinem attingit. radix moderatam etiam caliditatem obtinet. Folia in condimentis singularem gratiam habent, per jura, ut Plinius l. 20. c. 11. largis potionibus innatant, in quibus præter quodd grato sapore ipsa coniungunt, ad aperiendum obstructa, urinæque promovendas, etiam non exiguum conferunt. Quod & radices juri similiter incoctæ haud segniter præstant: deinde & ori ventriculoque gratæ sunt. Semina medico usui utiliora, extenuant, aperiunt, urinas ciunt, calculos coherentes dissolvunt, flatu discutiunt, conveniunt hydropicis, menses promovent, secundas & fœtus mortuos expellunt: commendantur & contra veterem tussim eclegmatis permixta, aut incocta: venenis etiam adversantur, atque idcirco Theriacis miscetur, Dodonæus. Contra æstus & calores febriles maximopere commendatur Apij sativi succus, oleo olivarum commixtus, si eo membra totius corporis illinantur, id quod non latuit Serenum, qui usum hunc sequentibus versibus est testatus.

Tragacem.
peramici.Calculus.
Hydropr.

Tussis.

Febriles
lores.

Sin aut em calida depascent corpora febres,


Tunc Apij succus levi solvatur olivo:

Membra line, forique feru mulcebitur ignis.

Majori tandem experimento, quàm quod de Amygdalis amaris vulgò fertur, Apij sive Petroselini vulgaris semen ante potum comestum ebrietatem remorari & arcere testatur Bernh. Desen. in Athanasia magna. Christoph. Mylæus l. 1. de scribenda universitatis rerum historia, hirundines à nidis suis blattas & alia animalia asperso prudenter Apio prohibere scripsit. Vinum selenites cibi appetentiam facit, atque stomachicis atque urinæ difficultate laborantibus auxiliatur, halitum quoque commendat, authore Dioscoride, qui sic faciendum tibi præcipit, ut demittas seminis Apij maturi, recentis & cribrati, acin lincolo colligati, in musti amphoram Vncias novem.

Ebrietatem
remoratur.Pinum seu
lunares.

APIUM HORTENSE MAGNUM,
vulgari hortensi sive Petroselino vocato, sapore idem, sive Anglicanum quibusdam.



Anglicanum Apium quibusdam dicitur, folio Apij vulgaris, majore, densiore, gustus gratioris, ejusdè pene cū Apio hortensi, quo etiam majus & spissius: caules in laterales ramos eodè modo dispositi, quo in Eleosino: flores umbellati, albi: seminum multum differens ab Apio vulg. sive Eleoselino, longius & majus quàm in Apio hortensi, sive Petroselino vulgari, uti & tota planta multò major.

Disfr.

I 2

Selinon Cy.
priorum,
Gaul.

Hoc est Guilandini illud, Cypriorum Selinon, quod perperam adversus Matthiolum pro antiquorum Apio est interpretatus. Ang. ep. 7. verum & legitimum Apium, quo aliud per totam Græciam & potissimum in Chio, Creta, & Cypro haberi negat. Camer. Apium verum Anguillaræ. Bauh. apud Matth. Apium 3. sive hortense maximum: itemque phyt. ubi præterea Apium Anglicanum vocat, dubitatque an fortè sit Anguill Selinum Græciæ? Apium hortense maximum à C. Bauh. ita describitur. Ex radice oblonga, albida, & pro magnitudine plantæ, tenui, folia prodeunt pediculis palmaribus, & sesquipalmaribus, striatis, pallidè virentibus, tripartitò primùm divisa, quorum quodlibet rursus tripartitur: ipsæque particule triplo, quadruplòve quàm in Petroselinon vulgo dicto majores, per ambitum incisæ, pallidè virentes; inter hæc caulis exurgit cubitalis, & sesquicubitalis tenuis, striatus, in cujus summitate folia oblonga, angusta, minimè incisa. Umbellam habet parvam, albam, exiguis flosculis refertam, quibus succedunt semina Petroselini formæ, sed duplo, triplòve majora, gustu nonnihil aromatico odorata. Nomine Apij Anglicani primùm apud nos factum. In pin. Apium 4. hortense, latifolium: an Apium verum, Ang. an Apium sativum Anglicanum Col.

An Matthiolo epist. lib. 3. ad Cortulum, Apium Orientale? An Cæsalp. Apij domestici, vulgò Petroselini vocati alterum genus, peregrinum, odoratius, latiore folio, tum ab radice, tum in caulibus, ac brevioribus pediculis: semine paulò ampliore, multò actiore, & subamaro: caule breviori, candidiore; radice crassiore, diutius vividâ? Putat autem hoc Theophrastum sub nomine Selini, cum Apio sativo intellexisse, & apud Galenum & Dioscoridem genus hoc Apij latifolij, quod peregrinum ait in Italia, Petroselinon appellari. Sed difficile est ex solo semine, quod solum ab iis describitur, conjectari; judicanda enim est planta aliqua à tota facie.

D. Christophorus Schvvarz ostendit mihi plantam in horto Ducis VVirtembergici pro Apio Anglicano. Hujus plantæ semina accepi Basileâ missa per elegantem Medicum Thomam Platerum, cum hac inscriptione: Apium maximum nondum descriptum. Hoc satum Montbelgardi provenit in horto. E. C.

APIVM PALVSTRE, sive Helioselinum veteribus.

CAP. XLIII.

Diosc.

HELEOSINON [ἐλεοσίνον] quod in nothis Dioscoridis, alij Pedinon, alij Hydroselinum [silvestre add. Corn.] Romani rusticum Apium & palustre dicunt, in aquosis locis nascitur, & sativo Apio grandius est: sed ad eadem, ad quæ & illud efficax est.

Plin.

Apium palustre itaque ἐλεοσίνον Græcis est, & ita quoque à Plinio appellatur, qui Helioselino vim privatam contra araneas esse dicit: & à reliquis generibus ita distinguit. Id, inquit, quod sponte in humidis nascitur, Helioselinum vocatur, uno folio, nec hirsutum. Hæc Plinius de Theophrasto transcripsit, apud quem 7. hist.

cap. 6. ita legitur. Equapium, Paludapium, Montapium, tam inter se distant, quàm ab urbano plurimùm differunt. Paludapium enim quod apud aquæ ductus & in paludibus provenit, folio raro, nec hirsuto consistit, sed simile quodammodo Apio est, odore; sapore, figuræque. Ex his autem Theophrasti verbis clarè patet Plinium per hoc verbum ἐλεοσίνον deceptum esse, & non absque errore ἐλεοσίνον legisse; ac malè pro raro folio, uno folio convertisse. De Apio palustri Palladius in Aprilii sic ait. Eleoselinon molli folio & caule tenero, quod nascitur in lacunis.

Nos Apium palustre inscribimus Apium vulgare ingratius. Et de hoc mox tractandum.

Fuchsius pro Apio palustri pictum dedit Sion odoratum, de quo suo loco dicendum.

Ruellius plantam ab Italis Macerone vocatam, Paludapium esse contendit, sed præter rationem.

APIVM VVLGARE ingratius.



NON dispari aded vultu ab hortensi, Apium vulgare, pedali & altiore caule, striato, crassiore: foliis latioribus, gustu servidiore, ingratiore: flosculi in umbella candidi, quinque partiti: quibus semen succedit dimidio minus, ingrato, acri sapore. radix subest hortensi similis.

Hoc quidem est Paludapium illud, quod vulgus prædicantium, Mulomedici, &, ut cum

Tabern. loquar, Calendariorum fabri, pro Apio veterum, quod Petroselinum nostrum est, receperunt, & multis annis pro eo compositionibus falsò immiscuerunt. Et hæc eorum sinistra mens, aded profundas apud eos egit radices, ut obsecratam, pertinacem, imò phantasticam eorum opinionem nemo eruere, erutamque extirpare possit. Sic, sic est in eorum capitibus ob calendaria concinnanda, mola pneumatica eversa, ut cum vagis & oberrantibus planetis & stellis, in tantum quoque aberrant, ut Majoranam ab Vrtica, Roremmarinum à Iupipero vix discernere queant. Quare quando invenitur scriptum in Diacalamento descriptione Galeni Apium palustre, sive Apium aquaticum, accipienda est, id vel Monachis in Mel. annotantibus, species ista, quæ simpliciter, tum à jamdictis Mulomedicis, tum vulgaribus seplasiatis vocatur Apium.

Quod porro præcedenti capite, tum rationibus, tum auctoritatibus, notisq; præterea suffragantibus constat,

constet, vulgare Petroselinum legitimū esse Apium, putandum quidem hic fuerit, quin potius affirmandum, teste Matthiolo, id quod officinis omnibus sativi Apij vicem explet, nil aliud esse quā Paludapium, sive Apium palustre, Eleoselinum Dioscoridi vocatum, de quo Theophr. l. 7. cap. 6. disserit. Hinc itaque fit, ut Matthiolus Ruellio minimē ad stipulandum censeat, qui plantam Italici *Macerone* vulgō appellatam, Paludapium esse putat. Quippe (ut dicitur) non parva sanē inter vocatum *Maceronem*, & Eleoselinum intercedit differentia. Ceterū, hac in re Fuchsius etiam apertē errasse deprehenditur. Nam et si in hist. rectē scribat, illud, quo officinā hodie pro Apio hortensi utuntur, non esse nisi Eleoselinum, i. e. Apium palustre; tamen postea de compos. med. perperam scriptis tradidit, Petroselini semen Sepalsius, Apij semen vocari, atque in ejus locum usurpari. Etenim Eleoselini semine, non Petroselini, quod haecenus, duce Matthiolo, desiderari existimo, Apij seminis loco utuntur omnes ferē Pharmacopoei, idque etiam Apij semen nuncupant.

Apij genus in horto, & in Cas. Celsus de Apio nostro vulgari ingratiore hanc l. 7. c. 38. annotat. Aliud, inquit, genus Apij spontē nascitur in Italia locis humectis & umbrōsis, quod in officinis vulgō Apium vocatur, eoque pro Apio sativo utuntur, quamvis à plerisque Eleoselinon, i. e. Paludapium censeatur, quod minimē negaverim: paucā enim notā, quā Eleoselino traduntur, huic non desunt: tamen ab eadem non video nequaquam abhorrerē Hipposelini descriptionem apud Dioscoridem & Galenum, non autem apud Theophr. & Plinium.

Eleoselinum lingua, cum Syr. Græcis vocatur *Ἐλεοσέλινον*, ἢ *Ἐλεοσέλινον* sine & cum aspirationis nota. item *Ἐλεοσέλινον*, & Homer. Iliad. B. ἐλεοσέλινον. Lat: Eleoselinum, Elioselinum & Eleoselinon, ut Ang. Turn. Fuch. icon. & hist. Ger. (ubi tamen Sion odoratum umbelliferum exhibet) Lon. Dod. gall. & lat. itēque Lob. in Obs. p. 405. Icon. p. 707. (quibus etiam Paludapium) & Nomenclatori Pannonico. Apium rusticum, Apium aquaticum, Apium palustre: & sic Corn. & Cordo in Dioscor. (secundū tamen annotatorem, Apium sativum lasifolium. Eid. hist. secundū Gesnerum, qui ex Trago Apij vulgō dicti figuram addidit, Apium sativum; juxta C. Bauh. verō & melius, Apium agreste) Monach. in Mef. dist. 1. censet. Ang. Matth. Lac. Cast. Gesn. h. Lon. & Schvvenckf. Apium vulgare Sylvio & Trago, & simpliciter Apium officinis, Brunf. Lon. & Fuch. in sol. Paludapium Gazz. Lob. adv. p. 315. & Tab. Apij alterum genus, Cels.

Apium 9. (4. apud Matth.) sive palustre, Hipposelinon Dioscoridis, & Apium latiore folio, caule versicolore Theophrasti, Bauh. in phyt. Eid. pin. Apium 11. palustre, & Apium officinarum: Apium palustre, Fuch. ic. Apium sativum & palustre, solā culturā differens, Cord. in Diosc. & hist. Eleoselinum spontaneum, Col. Apium palustre Matthioli, Lugd. p. 701.

Apia aqua. Propolis vidi. Apud Amilium à Georgio Pictore pro Apio inceptē ponitur figura Rubi. Videndum etiam an Apium aquaticum intellexerit Amilius, ut ibidem Pictor innuit. Vocatur tandem etiam aliquibus Apium aqua & Pupilla oculi. Arabibus, ut Serapioni (ex relatione Tabern.) lib. simpl. cap. 28. *Asali*; Bellunenfi, *Chare Alham*, & ab aliis *Asari*, & *Asali*, & *Asals*, Lacunæ. Germ. *Eppe* / *Epffich* / *Eppe* / *Epffich* / *Bawren Epffich* / *Wilder Epffich* / *Eppe* / *Wasser-Epff* / *Merck* / & *Wassermereck* ac *Eppe*. Belg. *Eppe* & *Zonffrommereck*. Gall. *Asche*, *Ache*, *Perfil de l'eau* & *Perfil de l'alpe*. Ital. *Apia*, *Apia palustre*, *Apia aquatica*, *Petrosella aquatica*, & *Petrosella*. Tom. III.

molo del aqua. Hisp. *Apio* & *Perexil d'agon* Catal. *apt.* Angl. *Smalage* / ut *Marche*. Bohem. *Wodni Petruzuel*. Nomencl. Pannonico *Apion*.

Humentibus locis Apij hocgenus nasci gaudet: *locus cum tempore.* transfertur verō & ad hortos. Cum hortenfi Apio viget ac viret: altero quoque à satione anno caulis ejus assurgit, ac semina fert, quæ post Solstitium matura fiunt, autore Dodonæo. Ego quidem Apium officinis vulgō dictum, immeritō tamen, vidi Patavij in hortis, Lugduni, Monspelij, & Basileæ, ubi florebat Novembri. Gesneva mihi virebat tota Hieme. Montbelgardi in horto meo & E. C. semine deciduo quotannis se renovabat. Satis copiosum observavi juxta thermas in Canstat urbe, quæ non longē à Stutgardia est in Ducatu VVirtembergico. Turnerus saepenumero vidit ad rivulos, nec non in insula Frisiæ Orientalis, Nordenia appellata, ad litus. In Italia sponte nasci locis humectis & umbrōsis, alicubique feri in hortis, sed infirmo odore & sapore refert Celsipinus.

Et si porro Dioscorides easdem habere facultates Paludapium dicat & Selinon: Selini tamen potius quā Paludapij usum consuluerit Turnerus, quia epilepticis suspectum, ejus rei testes habemus Leonellum, & Scholia Holeriana. Licet autem multorum sententiā hujus vires cum Apio domestico conveniant, ingrati tamen est tum odoris, tum saporis, acutioris & gravioris, quo caput ferit, unde etiam à cibis abdicatur, neque ad condimenta utile habetur. Facultate autem & temperamento & calidius, sicciusque est, & ad pleraque efficacius. Hinc succus ejus ad multa conf. ut: exterget enim, aperit, crassa attenuat, obstructions tollit, & urinas movet, Dodonæo & Schvvenckseidius testibus; atque idcirco Scrapia dicta, quæ hunc permixtum habent, veluti Byzantinum, joci-noris, lienisque obstructions aperiunt, & diurnis, sive tertianis, sive quartanis febribus, omnibusque et causa frigida, tum & obstructions, enatis, auxiliantur, ac regio morbo succurrunt. Idem succus oris tonsillarumque etiam *Oris ulcera* maligna ulcera cum Hordei decocto, addito melle rosaceo, gargarizatu ad sanitatem perducit. prodest verō & omnibus externis ulceribus & sordidis vulneribus cum melle: cancris etiam exulceratis *Vulnere.* confert: tam tametsi hos curare nequeat, putredini tamen resistit, ac scætores eorum reprimat. Semen Medicinæ etiam haud inutile habetur, sed ad eadem, id quæ sativi Apij commendatur, minus tamen tutus usus ejus est: nam comitiali morbo obnoxij, uti dictum, ab hoc offenduntur, ut e videtur experimentis compertum legitur & observatur. Ut cognoscat utrum masculum an femininam prægnans in utero habeat, Apium cum radice capit. ejus Priscianus, apud Harm. Gynæc. part. 1. cap. 4. apponit, & si prius masculum nominaverit, dum loquitur, masculum; si verō femininam, feminam utero gerere, concludit: quod nobis sanē fabulæ, aut Græciæ mendacij specimini propius esse videtur, quā vel rationi consentaneum, aut etiam experientiā comprobatum. Aquæ destillata peculiaris vis contra hydropem à vulgo ascribitur. *Hydroph.*

SELINUM TUBEROSUM.

Nominabat Selinum tuberosum, sive Baselin (speciem Horor. Bellus, semen minus rufum sapore aromatico, & Apij hortensis, vulgo Petrosella.

lini vocati, quod & Creta Cydonia dicta inscriptione transmisit. Hoc commissum terræ Montbelgardi in horto E.C. non provenit.

DE APIO SIVE SELINO, QVOD Petroselinon antiquis dicitur.

CAP. XLIII.

Dioc. **A** Pium, quod Petroselinum dicitur, provenit in Macedonia præruptis in locis, semine Ammeos, at odoratore, acri [*Scrub. Lac. legit in vet. cod. acriori*] & aroma olente. Urinas id, menstruaque pellit: contra stomachi & coli inflationes, ac tormina prodest. Succurrit & lateris, renum, ac vesicæ doloribus, in potione sumptum. Admiscetur & antidotis urinas cientibus.

Plinius. Plinius ubi de Apij generibus egit, alio genere, inquit, Petroselinum quidam appellant in saxis natum, præcipuum ad vomicas, cochlearibus binis succi additis in cyathum Marrubij succi, atque ita aquæ calidæ tribus cyathis. Et subdit mox: prævalet contra serpentes, potum, & litum.

Galenus. Petroselini semen, ex auctoritate Galeni, maximè in usu est, quum tota herba unà cum radicibus similis quidem, sed debilioris sit facultas. Est autem sicut in sapore acro, cum amaritudine, ita etiam in operibus calidum, simulque siccandi vi præditum. Et ob id menses & urinas largè propellit. Flatus item discutit. Fueritque itaque tertij ordinis calefacientium ac siccantium. Ceterum, quod sit verum Petroselinum, lib. de Antid. docet similibus verbis. Petroselinum ab omnibus laudatum est Macedonicum, quod etiam quidam Estreaticum vocant, nomine à loco, in quo nascitur, imposito. Est autem omninò modicum, quod in illo nascitur, qui præruptus est, & non magnus. Estreaticum itaque Macedonicum, quod ex Macedonia ad omnes gentes deferitur, paucum & ipsum in Macedonia gignitur. Quare quod circa mel Atticum & vinum Falernum contingit, id etiam circa Petroselinum hoc accidit. Nam quemadmodum illa duo, Mel Atticum & vinum Falernum, per universæ ferè orbis terrarum oppida à mercatoribus deferuntur, velut ea ipsa sint, quæ propriè ita vocentur, quæque à genibus requirantur, licet interim in parvo natali modica nascantur, ut vix illis sufficiant, ac propterea à calidis hominibus ad illius similitudinem efficta duntaxat divenduntur apud externos. Ita etiam Macedonicum Petroselinum, quod in Epitho pluvium nascitur ac inde in Macedoniam prius d. ferat, & plurimum ac ferè totum in Thessalonicam, æque illinc velut Macedonicum exportatur, quamvis illuc [*in Macedonia*] non tantum nascatur, ut omnibus gentibus sufficere possit. Quod si tamen Estreatico Petroselino carueris, nihilo deterius fore putes Theriaces medicamentum, si alterum injeceris. Non enim velut quoddam adversus venena, aut bestiarum venenum ejaculantium plagas commodum sit, injicitur, sed ut stomacho debili, & hydropicis, & aliis hujusmodi affectibus utile, non juxta principalem Theriaces promissionem. Facit autem amarissimam antidotum Petroselinum Estreaticum, & maximè si recens fuerit. Præstat enim sicut acerrimum præ aliis Petroselinis, ita etiam amarissimum. Et hunc in modum de Petroselino discessit Galenus, quem non intelligimus, nec videmus cur propter parvam quantitatem Petroselini amarior reddatur Theriaca, quæ tot alia valde amara recipit.

Acquisita. Petroselinum antiquorum non est Apium sativum, seu Petroselinum vulgo vocatum, hæc Martellus hæc non alià quàm natalium ratione inter se differre, cum Anguillara & Gulandino credat.

Apij, sive Petroselini Macedonici planta multis, Apium Maced. incultum.

à nobis mox tradetur. Saxifragiam majorem quidam Neoterici Petroselinum Macedonicum Dioscoridis volunt.

Apium montanum nigrum Lob. Obs. & Ic. Petroselinon appellavit.

Apium sive Petroselinum suum habet Dalechampi, quod tenuifolium cognominamus.

Herbam Gleyß [*Cicariam sativam dictam*] Petroselinum dicere quidam audent.

Adversaria cur suum Oreoselinum [*Apium montanum*] Petroselinum dicant, videant lectores.

Petroselinum Macedonicum non est Olusatrum, vel ut corruptè pronuntiant Oluxatrum, aut Alexandrum, ut dicemus capite de Macerone.

Pro Petroselino Dioscoridis & Galeni pinxit Fuchs Sison, ut postea demonstratur.

Petroselinum quidam putant Ostrutium esse, referente Lacunà, qui hoc separat ab Imperatoria, quod considerandum, quam privatim etiam aliquos Petroselinum esse censere narrat.

Ceterum, Petroselino deficiente sumendum præcipit Tract. qui pro quo semen Apij.

Petroselinum si desit, Cuminum substituit Collegium Florentinum.

APIVM SIVE PETROSELINVM Macedonicum multis.



QVOD hodie Descri.

Macedonicum petrum Apium putatur, foliis est quàm Apij hortensis majoribus, firmioribus, nigridis, atrovirentibus, quorum sapor ignavior, quàm hortensis nostri videtur: caules striati incanè pubescent lanugine: umbellæ candidæ: semè striatum hortensis & sativi Apij ferè par, tomento obductum est albicante.

Inscribitur hoc apud Matt. in com. cum mag. fig. hist.

germ. & epit. cum add. Cam. Cast. Ger. Lob. ad v. p. 315. Obs. p. 406. Icon. p. 708. Tab. (hoc titulo in Ic. p. 87. est non conveniens figura: ea enim transposita est sub titulo Hipposelini in eadem tabella.) Petroselinum Macedonicum. A B. phyt. (ubi plures plantas confundit) Apium sive Sium 13. & Petroselinum Macedonicum Dioscoridis. Eid. apud Matthiol. Apium 5. sive Petrof. Macedonicum. In pin. Apium 12. Macedonicum: Apij alterum genus peregrinum. Catalp. Daucus 2. Dioscoridis. Col. A Schwenckf. Apium Macedonicum. A Luz. p. 703. Petroselinum Macedonicum Matth. A Dod. lat. Petrof. brum Maced. ex Lobelio.

Germ. vocatur Stein Eppich / Apium Petrum, Nomen aut Stein Petelin. Belg. Steen Eppe. Gall. che, ou Persil des rochers. It. Petr. selino Macedonico, Petru- leis Petr. selino Macedonico. H. p. Apio que crece en las piedras. Angl. Steen Petelin.

Ex semine per latrem C. Bauhinum allato ex horto Patavino provenit Montbelgardi in horto E.C. sed sine caule primo anno, & vix Hiemem ferens.

rens. Argentinz semine maturo conspiciebam Octobri in horto D.Meieri. In Silesia referente Schwenckfeldio, frigoris impatiens ex semine hortus Medicorum familiari.

APIVM MONTANVM, SIVE

Oreoselinum veteribus.

CAP. XLV.

Duse.

Oreoselinon, autore Dioscoride, caule est dorantem alto, qui quidem singularis ex gracili radice assurgit: ambiunt verò ipsum ramuli & in summo capitula [*καυδία, & κεφάλια*. Lacuna tamen legit *καυδία* & hæc lectio Theophrasti & Plinii quidem autoritate comprobatur.] Papaveri [*μυκάνη*] similia, at multò tamen tenuiora, in quibus semen oblongum, acre, tenue, odoratum, Cumino simile. In petrosis montosisque locis nascitur. Et semen & radix urinam ciendi vim habent, si in vino bibantur, ac menses etiam trahunt. Antidotis quoque & urinam ciendis atque excaustoriis medicamentis inferuntur. Neque verò nos oportet in eo errore versari, ut id Oreoselinon existimemus, quod in saxis provenit: aliud enim est Petroselinon.

Theophr.

Montapium ab urbano majoribus differentiis, quàm vel Equapium, aut etiam Paludapium, distat: referente namque Theophrasto, folio Cicutæ simili constat: radice tenui, caule Anethi, minutioni tamen, datur in vino austero menstruum gratia.

Plinius.

De Oreoselini folio, radice & caule eadem habet Plinius l.19.c.8. ubi Apium tertium constituit. Is rursus l.20.c.11. ait. Quartum genus ex Apio faciunt aliqui Oreoselinon, palmum alto frutice ac recto, semine Cumino simili, urinæ & menstrui efficax. Sed & semina eo purgantur ex vino.

Auctoritas
veterum
collata.

Ex his itaque palam fit, à Theophrasto & Plinio folio Cicutæ hoc Apium describi: A Dioscoride autem nihil de foliis agi: sed à tenui radice singularem prodire caulem, circa quem ramuli sint & capitula, ut in quibusdam Græcis legitur, *μυκάνη* (& non *μυκάνη*. Opro) *καυδία*, Papaveri æqualia, multo ad hanc rem sensu. Quandoquidem comparanda inter se plantarum capitula, non liquorum similes vires. Quam ob causam cum Hermol. in Theophrasto legit *καυδία* & *κεφάλια* *καυδία* *καυδία*, folio namque Cicutæ simili constat, vertit *καυδία* *καυδία* *καυδία*, capitulis Cicutæ similibus, ratus corruptum locum esse, & pro *καυδία*, quæ Cicuta est, malè *μυκάνη*; qui Papaver est, legi, inutit, absurdæ conjecturæ: siquidem *μυκάνη* legendum est, & de Papaveris ramulis ac capitellis accipi debet, & non de foliis. Immeritò igitur legendum arbitror cum Theophr. & Plinio *καυδία*: facilius fieri potuit, ut *μυκάνη* syllaba à voce *μυκάνη* dempta & *καυδία* vocabulo ad finem *α* additum sit. *μυκάνη* autem nullo modo legi potest, dum nulla sit ramulorum & capitellorum ad Papaveris succum similitudo. Videtur itaque non posse, quod Theophrastus de foliis docet, ad capitula Dioscoridis referri: nec Cicuta semen in capitulis, sed Fœniculi modo in umbella habere describitur. Si tandem cum Corn. & Lacuna pro voce *καυδία* legendum foret *καυδία*, lectio illa manca foret & imperfecta, persuadetque id quod mox sequitur, capitula illa papaveraceis multò tenuiora esse, & in illis contineri semen, quod foliis à natura negatum est.

Galenus.

Galenus porrò Oreoselini similem Apio vim esse ait, sed robustiorem. Ceterum, vox ipsa montanum Apium indicat, & Dioscorides à Petroselino apertè distinguit. Sunt tamen qui hoc, agreste Petroselinon vocent. Ægypti verò Anonim.

Aquilosca.

Lacuna tandem Apium montanum incognitum esse ait. Sed nec Cornarius reperit aliquem, qui vel

ipse viderit, aut ex alio naturale, aut pictum monstravit.

Oreoselinum tamen Græcis, auctore Anguillara, *Charophyllum* est *Charophyllum*, de quo ante egimus.

Habet Apium suum montanum Dalechampius.

Est & Apium montanum, Oreoselinum Sequanorum, folus Cicutæ semine oblongo, nigro, Cymini.

Oreoselinum nigrum, sive Apium montanum nigrum.

Oreoselinum album, Apium petrzum, sive montanum album.

Oreoselinum quoque dicitur de Saxifragia hircina. Sed nobis nulla harum plantarum descriptioni Dioscoridis respondere compertum est, proindeque aliquam ex prænominais Oreoselinum antiquorum esse non possumus asserere.

APIVM MONTANVM DA-

lechampij.



Radice crassâ, Deser.

longâ, extrinsecus nigrâ, intus candidâ, acti, odoratâ, aromaticâ, foliorum densâ comâ circa radicem humi jacentium, Apio hortensi similem, sed latiorum, jucundè olentium in pediculis insertis rubentibus: caule cubito altiore, è medio foliorum ambitu proficiente, serulaceo: flore in umbella candido, semine Apij, acti, odorato & amaro.

Cum Apium hoc montanum Dalechampij in quibusdam Dioscoridis historiæ repugnet, pater Oreoselinum Dioscoridis haud esse nuncupandum (ut quidam vocant, aut etiam Oreoselinum majus appellant) ac propterea depravatos esse Dioscoridis codices asserendum. Hanc verò eandem numerò esse cum Apio montano nigro concludere non audemus, licet id asserat C. Bauhinus.

Provenit in asperis saxosis, lapidosis, apricis: non nunquam etiam ex saxorum rimis emicat. Floret Julio mense.

APIVM QVOD OREOSELI-

num Sequanorum, foliis Cicutæ,

semine oblongo, nigro,

Cymini.

PROPONUNT alij aliud præter jam dictum *Lacuna*. Oreoselinum, in Sequanorum montibus, ad pratorum saxos nigras nascent, caule & foliis Cicutæ, nunc humile, nunc procerum pro loci natura: radice tenui, candidâ. Flore in umbella albo, semine oblongo nigro, acti, odorato, Cymino simili, referente id Lugdunensi p.702. Quæ hæc stirps sit indagandum relinquimus iis, qui plantam natali loco collectam, imagine exprimendam curabunt.

APIVM MONTANVM
nigrum.

Def.



O Oreoselinum seu Apium montanum, foliis est per terram expansis, Apij hortensis, nigrioribus durioribus, modicè acris & amaris, odoris nonnihil aromati & quasi vinosi, pediculo membranaceo purpurascēte caulem amplexis procerum, multiplicem, non multum crassum, solidum, striatum, nonnihil rubentem, ramosum: in quo umbellæ florum albeant; seminæque

post se relinquunt longè foliis acriora, compressa, lata, & ferè orbiculata, colore ante maturitatem plenam modò rubentē, idque intensius, remissiusve, modò viridi. radix insigniter crassa, mollis, supremâ parte capillata, intus forisq̃ue albida, sapore acti, amantissimo, ingrato nonnihil, succum è vulnere remittens, lactescētem, viscidum, resinofum.

Polychrestum Cord.

Plantam à nobis delineatam Cord. hist. l. 2. c. 125. vocat Polychrestum, ac sic describit. Foliola à radicis capite emittit comam, undiq̃ue per terram sparsim. ipsa autem folia non simplicia atque individua, sed multifida, omnium ferè umbelliferarum modo: siquidem pediculi tenues à radice exeunt, crebrò articulis intercepti, qui in singulis articulis in ternos surculos sæpius & multis vicibus subdividuntur. ultimus extremus, minimisque pediculis folia insident exigua, in multas tenues partes secta, & crebris incisuris, partim Conandro, partim sativo Petroselinio similia, cum fructificare inceperit, arefcentia. Caulem è media foliorum coma erigit unum atque alterum, aut nonnunquam plures secundum radicis ætatem, cubito plerumque proceriorem, teretem, modicè striatum, longo intervallo geniculatum, intus fungosum, atque per omnia Anetho similem, paulò tamen tenuiorem, folia è geniculis proferentem, inferioribus similia, sed multò pauciora minorâque: in cuius summitate umbella expanditur lata, quinque aut sex unciarum latitudine, quadrantibus plerumque surculis constans, candicantibus flosculis plena. siquidem singuli umbellæ surculi, in plures tenuiores surculos subdividuntur, minoris umbellæ speciem referentes. semina singulis floribus succedunt bina, conjunctâque, tanquam unum sint, Anetho latiora, crassiorâque, colore subfusca, sub ipsa umbellâ, tenuia, oblongâque exeruntur seu folia. Radice nititur tricubitali, aut nonnunquam pro ætate, longiore [Mirum hoc, cum caulem dixerit unum cubito duraxat, plerumque proceriorem esse. Gesn.] breviorēve, superius crassitudine digitali, candidâ, carnosâ & perenni, quæ præcisâ lacteum remittit liquorem. saporem radix habet Pastinacæ sativæ similem, simulque amarum & subacrem. semen gustu radici respondet. Lacteus verò liquor cæteris partibus efficacior est: folia imbecilliora sunt: flores postremò mediam tenent inter folia & radicem temperatam. Nasquitur asperis, tabulosis, arenosis campis,

humilis & arvis, plurimùmque in VVierembergen-si Electoratu. Hæc Cordus, apud quem Gesnerus, Cord. vel alius hæc annotat: Nomen unde incidit Cordus, ex descriptione non video: si nomen fingendum sit à foliorum crebris incisuris, aut surculorum, qui umbellam constituunt, divisionibus, Polynietum fuerit dicendum, non Polychrestum. Fortè Vielgutha, i.e. Valde Bona: et si alia videtur Valde Bona Italicorum: & Tourte bone, i.e. Tota Bona Gallicorum.

An Monach. in Melsch. cens. 25. Petroselinum & Apium petra, in montibus Rhetianis & supra Palumbariam inventum? De hoc Apio petra Monachorum hæc Matth. in Diosc. l. 3. c. 64. An legitimum Petroselinum Macedonicum vocatum in Italia proveniat, non equidem asserere ausim, et si Monachi se in Romanis quibusdam montibus invenisse testentur. quod tamen (si vera referunt) Romanum quidem, non Macedonicum appellandum fuerit: An rursus c. 65. vocat Apium montanum & Oreoselinum?

Gesn. h. dicitur Apium montanum, i.e. Oreoselinum, persimile specie saporeque Petroselino vulgaris, nascens in colle primo juxta Rhenum, horæ ferè supra Basileam itinere ad sinistram, superficie simillimum illi, quam Cervicariam radicem nigram Germani vocant, lacteo liquore manans, ob quem Enopium [i.e. Enopium, licet hæc vox in usu non sit] Oreoselinum nuncupare licet: sicut & Ὠρεοσέλιον. An eidem stirp. app. Apij crispî nomine herba ex Italia missa, silvestris, ut apparet, nec Apij seu Petroselini vulgaris odore æmula? An præterea de Apio petra loquitur Gesn. in epist. ad Io. Fabricium, epist. lib. 3. cum ait: Ex tribus illis herbis, quas misisti, Altera Apio sativo similis est, & nulla apud nos: memini tamen circa lacum à felibus dictum, invenisse: Seseleos speciem neque ipse putarim. Nam omne Seselel radices vegetas & satis validas habet, & caput radicis setosum, quod & aliis quibusdam umbelliferis, sed paucis contingit. Sed neque Petroselinum Macedonicum. hoc enim in petris quidem montium præsertim Macedonia nasci scribit: sed ad eò medicatum & vehemens, ut nullum Apij genus, acris, amantissimæque reperiatur, quibus etiam qualitatibus, universam Theriacam inficiat. Ego Astrantiam in ejus vicem suppono. Oreoselinum appellemus licet, quod & montosa sit herba, & Selino perquam simillima. Semen ejus maturum ad me mitti cupio, ut certius judicem. Tribuit enim & Dioscorides semen Cumini, oblongum, acre, odoratum, tenue. Novi & alias duas Oreoselini species. Existimandum est autem nullas propemodum herbas esse, quæ non genus aliquod constituent, in duas aut plures species diversas dividendum.

Oreoselinum Parisiense ad hoc caput refero, donec mihi constet quantum differat, ab Apio, quod montanum nigrum voco. Parisienses (inquit Lugd. p. 702.) pro Oreoselino plantam monstrant ratam & nobilem in fabuloso Surenzî montis vertice, nec usquam alibi nascentem, radice longâ, crassâ, acris, odoratâ, sapore & odore Empetro nostro simillimo, comâ Apij, humi procumbente, densâ: flore in umbella candido, semine acris, & odoris suavis.

An Czfalp. l. 7. c. 33. hoc intelligit per Seselel Creticum, de quo ait. Apud nos in silvis nascitur, tractu maritimo, & collibus arenosis: pauca fert folia, inflexa ad terram, Apij modo divisa, parvis & raris segmentis, crassis & præduris, quæ ex prælongis, & parulis pendent pediculis: caule singulari constat, rotundo ac subnigro, cubitali: in cacumine duas, aut tres umbellas gerit: flore ex albo subrubente: semina fert in rotunditate compressa, magnitudine Lenticulæ, circulo quodam foliaceo circumdanto, sub-

Polynietum

Vielgutha. Valde Bona.

An Apium petra. Almonachorum?

Apium montanum, Gesn. h.

Apio sativo similis.

Seselel speciosus.

Petroselinum Macedonicum.

Oreoselinum.

Oreoselinum Parisiense, Lugd.

An Seselel Creticum, Czf.

hubulva, acria, & odorata: radice constat singulari, in altum demissa & odorata, & albâ. Altera est in montibus similis prædictæ, sed pluribus ab eadem radice caulibus, ltratis: foliis longioribus, tenuius incis, subjectis: radice constat in multos ramos distributa, & subnigra: semina in totum similia: idcirco & hanc Tordyllo congenerem statuo. Hæc ille de suo Sefeli Cretico, quod videtur in multis convenire cum nostro Apio montano nigro, non audemus tamen idem asserere. Alterum quale possit esse nobis non constat. Stirpium periti confiderent, an aliquis præter illum ejus meminerit.

An Thalia Libanotis alba minor seu amara, foliis latoribus, & profundius dentatis, radice resinoso succo turgente, thus spirante, flavescenteque, ac amarâ, candidâ, multifidâ læpè, & crassâ?

Oreoselinum. Clus. pannon. p. 695. & hist. Oreoselinum, ut & Ger. primum, Tab. Lob. adv. p. 315. Obs. p. 406. Icon. p. 707. Oreoselinum, sive Petroselinum. Dod. lat. Oreoselinum sive Veeltgutta, ubi describit ac ait: Oreoselinon quale quidem à veteribus describitur, innotitiam hac ætate pervenisse non constat. A montibus autem apud Græcos *O'ρεοσίλων* nomen est, quod Latini idcirco Apium montanum & Montapium appellant. Dicitur verò & idem, ut inter rejectaneas voces reperitur, *πτερόσιλον* & *ζυγιν*, & Latinis Apium: Sed Dioscorides Petroselinum ab Oreoselino diversum statuit. Veeltguttam verò Latine Multihonam quis dixerit, hoc enim nomen accepit, quod ad multa utilis & commoda habeatur. Non omnino verò improprie & hæc Oreoselinon nuncupatur, nam in montibus gignitur, & Apio non dissimilis est. Desideratur semen Cumino simile tale si haberet, Oreoselinon legitimum esse, quis negaverit?

Daucus. Bauh. phyt. Daucus 6. montanus Apii folio minor: Apium montanum & Oreoselinum nigrum, Gesn. h. Dauci 2. Selinoidis varietas, sive Selinoides Cordi Lobelio Obs. p. 414. sine icon. an Daucus (addit in pin.) selinoides latifolius, Cord. an Apium sylvaticum, Thal. Eid. B. Apium 9. (6. pin. ubi & Apium montanum, Cast. Lugd. Variat ratione loci, nam foliis tenuius divis, in pratis udis Michelsfeldæ reperitur.) montanum folio ampliore: [Apio, Petroselino Dalechampii tenuifolio.] Apium crispum, Thyselinum Plinij & Agrioselinon [falsò enim legitur ibi Agrioselinum.] Galeni Guilandino: Oreoselinum sive Petroselinum Lobelij. Miramur C. Bauhinum diversum tradi Oreoselinum Gesneri ab Oreoselino Lobelij, quum manifestum sit eandem esse plantam consideranti descriptiones & iconem: præterea Oreoselinum Gesneri non convenit cum Dauco Selinoide Cordi. Eid. pin. Apium 8. montanum nigrum: Oreoselinum Parisiensium, Lug.

Schvvenckf. Apium montanum: *O'ρεοσίλων* Dioscoridis, Clusio: *O'ρεοσίλων* & *ζυγιν*, seu *ιγρον*, Gesn. Polychrestum Cordi: Polymetum Gesn. Montapium. Vielgutt / Augenwurz / & Berg Peterlin / Silesius: radice longissima. Nos latet ubi Clusius asserat esse Oreoselinum Dioscoridis: vellemus locum annotatum.

Apium nostrum nigrum, denominavi Oreoselinum, non quoddam descriptioni Dioscoridis respondeat, sed propter natalem locum. Basileæ locis montosis ad meridiem sitis provenit: in Alsatia copiosè prope S. Thamarin in pratis siccis & arenosis, non longè à Bassfordia florens Junio & Julio secus viam: in Rhetia Junio prope Cunam in pratis: Geneva in monte Thuri: Lugduni frequens: Montbelgardi in arida planicie. Veeltgutta Dodonæi in iis montibus provenit, qui Silesiam à Moravia, olim Marcoman-

norum provincia, dirimunt; tum & in aliis montibus ac collibus. Meminit verò Dod. olim hanc ad se missam à Martino Tulemanno, qui in montosis apud Eburones ac Tongros, nunc Leodios, hanc repertam in horto suo Trajecti ad Mosam studiosè alebat. In monte, qui Badensibus thermis imminet & in aliis vicinis collibus, atque urbi Viennæ Austriæ proximis vulgare esse Oreoselinum refert Clusius. Ratius occurrit Lobelio nisi in montosis Lugduni, prope sequanum & in valle Ostensi Pedemontana. Amat in summa montosos arenososque tractus. Abundat in Silesia propè Gryphibergum in pratis ad Quissum fluvium. Julio & Augusto flores in umbella, cum semine Anethi nigricante, ostendit, Schvvenckf.

Radix, inquit idem, calida & sicca est tertio recessu [secundo ordine intenso, Dod.] Extenuat, aperit, incidit, urinas movet. Calculos dissolvit, menses provocat, jecinoris & lienis obstructions solvit, regio morbo auxiliatur. Manducata dentium dolores mitigat, ac salivam ciet, torminibus ventris succurrit, visum exacuit, & alios multos usus præstat.

virtu.

APIUM PETRÆVM, SIVE montanum, album.

Apium hoc petræum folia habet dodrantalia, pulchrè in alas oppositas divisa, atque hæc rursum in opposita segmenta, Apij nigri montani segmentis similia quodammodo, quæ mirè variant pro locorum diversitate: quædam enim valde tenuia quasi crispæ:



caulis tereticus, cubitalis, medullâ plenus. umbellæ parvæ, floribus albis contextæ: semina Apij hortensis, longiuscula, hirsuta, striata, cum amatore, aromatica, eodémque sapore, ferè ad Apium vulgare accedente prædita. est radix perennis, crassiuscula, alba, comata.

An Cord. hist. l. An Cord. i. c. 53. vocat Dau- cum angulosi caul- is, quem sic descri- bit: Daucus angu-

losus dum è semine nascitur, primo anno caulem non fert, sed folia undique circa radice caput per terram strata, eâ ratione, ut multa folia singula constituent, pedibus enim & canaliculatis pediculis utrinque apposita sunt duarum unciarum longitudine, folia ab utroque latere profundius usque ad suum quoque pediculum in partes per ambitum serratas dissecta: ex his maxima sunt quæ posteriori pediculorum parte exeunt: minima verò, quæ anteriore. Caulem altero & nonnunquam tertio anno erigit tripedalem, minimo digito graciliorem, angulosum & juxta terram ferè triquetrum, nisi plures intercederent minores anguli, solidum & geniculis præcinctum. folia è geniculis se proferunt inferioribus similia, breviori tamen pediculo: & ex horum alis pedales, ac plerumque individui ramuli, angulis striati: in quorum cacumine æstate singulæ sunt umbellæ, formæ convexæ, den-

Apium crispum Thyselinum Agrioselinum C. Bauh.

Schvvenckf. mor.

Loco cum tempore.

An Cord. i. c. 53. vocat Dau- cum angulosi caul- is, quem sic descri- bit: Daucus angu-

sz & candidæ, minimisque floribus factæ, melleo liquore veluti confersæ, quibus odor est luxur aut saponis, sive mellis calce mixti. semen

Radice nititur diuturna, pedali, pollicis aut digiti crassitudine, candida, circa caput propter amissorum foliorum vestigia & nervos pilosa & villosa: in crassiores fibras dilacta, per quam lignosus descendit nervus. ea gustu acris est, salivam provocat, diuque fervorem in gustantis palato relinquit: folia acrimoniz mixtam quoque amaritudinem habent. Semen verò

Nascitur asperis & editis locis: copiosissimaque lenæ, in vinearum inculis calculosisque partibus: & V. Virtembergæ in tumulis quibusdam sabulosis, qua ex urbe versus Septentrionem itur. Et hæc de suo Dauco angulosi caulis scribit Cordus, apud quem in annotatione quærit Gesnerus, numquid cum Oreoselino, h. e. Apio montano, commune quid habeat hæc herba. Nos quidem diversam existimamus, ac fortè non malè sequi posse credimus hoc Apium, Pimpinellam tercia Tragi, sive Pimpinellam crispam Taberno montani, cujus descriptionem ponimus cap. de Saxifrag. minore.



ratâ: folio Apij hortensis, perquam tenui: caule palmum alto: flore pusillo, albo, in exiguis umbellis, quas herbacei cortices glumis spicarum non dissimiles sustinent, & subtus ambiunt, semine minutulo. In asperis collibus provenit.

Apium verò silvestre quod Dodonæus exhibuit, longè aliud est ab Apio silvestri Dalechampij, ut inferius demonstraturi sumus.

Apium m.
caulis
montani.
Gefn b.

Gefn. verò de hort. vocat Apij montani genus aliud amarum, Legarij montis ad Badam Helvetiorum, radice multis annis durante. Hoc Oreoselinum anopum, quodd liquore resinoso careat, si libet, cum Gesnero nuncupemus: sicut & ἀχύνω græcè: et si in usu non sit.

An Thalis
Libanotis
alba minor.

An Thalis Libanotis alba minor, seu amara, foliis contractionibus, & frequentius, succinctiusque incisus? Cum hac plerisque notis congruere descriptionem Dauci angulosi apud Cordum testatur Thalius quidem, sed tamen Dauci angulosi radices saporem acrem esse, huius verò amarum.

Locus cum
tempore.

In petrarum rimis ante quinquaginta annos Basileæ provenire observavi in Marchionatus monte prope pagum Krenzach, & Badæ in Helvetiorum monte, cum & Basileensium prope Wasserfall / florens mense Augusto: in monte Mafni inter supra Sebenthal pagum, ultra stagnum magnum: reperiuntur prope S. Hippolitum in monte attuli Montbelgardum plantandam in horto E. C. ubi primo anno caulem non proferebat. Frater attulit ex Italia pro Apio Guilandini, Petroselino Cortusi. Eandem rursus dedit pro Dauco tertio Dioscoridis, & Pyrethro vulgari Patavinorum Cortusi. Sed duæ sunt plantæ distinctæ. Vereor ne hæc tres diversæ confundantur plantæ, quas distinctas habeo. Apium enim Guilandini est Oreoselinon, vel Pyrethrum alterum Plantini p. 775. Daucus verò tertius Dioscoridis Guilandini, multum differt, folia habens multo latiora, non ita copiosa, nec in tot ramos divisa. Pyrethrum etiam habeo, quod ab his duabus plantis diversissimum & à Guilandino Pyrethrum i. Mathioli vocabatur, & à Cortuso Pyrethrum Brunfelsij. Qualis autem sit illa, quam scribit me Dornaci observasse, nescio, nullam enim ex his tribus Dornaci observavi, quod recorder, nisi plantam videam. Si frater volet

tres has diversas plantas, Deo dan

te, ex meo herbario illi

mittam.

UMBELLIFERA ALSA-

tica magna, umbellâ
parvâ sublu-
teâ.



INDICTA, quod sciam, herbariis est hæc planta, ptoeritate hominem æquans, aut major, caule rubente, striato, geniculato, inani, firmo satis, & in ramos diviso: ad cuius singulos nodos pediculi, caulem cum vagina amplectentes, oriuntur, longi cubitum unum, ex cuius lateribus alij breviores prodeunt folia sustinentes Sileris aut Apij petrai modo dissecta, sapore amaricante & aromatico prædita: umbellæ pro plantæ ra-

tionem parvæ, Apij umbellis pares, ex floribus conflantur luteolis, quorum singulos componunt foliola quinque cum apice longiusculo in medio: semen gemellum, Anechino simile, foliaceum, latum, striatum, sapore aromatico, subacti & subamaro. radix lignosa, rugis arata, vegetiore sapore prædita est quam semen.

Anno 1592. in fine Novembris inter Colmar & Sultz inter dumeta reperit, hominis altitudinem excedentem, radice perenni, ut puto. Eodem anno Basileæ ejus nomen à me inquirebat frater C. Bauhinus, qui collegerat in Alsacia. Cum flore & semine maturo observavi 1597. Octobris 5. inter Ruffack & Colmar.

Locus cum
tempore.

APIVM SILVESTRE DA- lechampi folio perquam tenui.

APIVM silvestre [οἰανον ἀγριον, cujus meminere Theophrastus & Dioscorides] hæc ex Dalechampij opinione olim depictum, descriptumque, radice est gracili, longâ, candidâ, odo-

SISON VETERVM. CAP. XLVI.

SISON exiguum semen esse, & in Syria nasci, Apio simile, oblongum, nigrum, & ferventis gustus, constat ex relatione Dioscoridis. Bibi verò contra lienis vitia, & urinæ difficultatem, itemque ad comorantes

morantes mentes evocandos. Eo ipso indigenas cum Cucurbita in acetococta condimenti vice uti. In cacuminibus ceu granula multa gerere, ἵχτι δι' αἵς καὶ πολλὰ ἐπ' αὐτῶν. Sed his verus caret. Ceterum, sunt à quibus *σίσην* & *Sinnus* & *Sinnon*, sive *Sinon* in notis vocetur. Romanis panter cum Græcis *Sisona* & *Sinnona* dicitur.

Appellatio-
nei. *Sisona*.

Cognovit & Hippocrates *Sinnon*. Sic enim eum appellat: cognovit & Paulus *Æglneta* & ante eum *Galenus*, qui *Sisonem* calidum & subamarum gustantibus esse testatus est ideoque & urinam ciere, & concoctiones adjuvare mentesque provocare, & omnes circa viscera obturationes [σπλάχνα Græci dicunt] referare. Sed novit & Cornarij vetus *Plinianus* codex l. 27. c. 13. qui *Sinon* habet. ubi in vulgatis simul legitur, & quod sequitur ad *Sison* pertinet, *Smyrnio* attribuitur. Locus is est. *Sinon* concoctiones facit, sapore simillima *Piperi*. Eadem in dolore stomachi efficax. Quod verò sapore *Piperis* esse ait, respondet voci *πυρρῆς*, quam *Dioscorides* usurpat, servidū esse scribēs. Porro *Dioscorides* exigū semen in *Syria* nasci dicens, importunè relicta herbā historiam & caput hoc à semine ejus incepit. Oportebat enim (quod etiam *Marcellum* remoratur & suspendit) à planta descriptionem incipere: nisi fortè in re tunc nota, satis fore credidit ex eo quodd in usu erat, totam indicasse plantam.

Diff. ut a-
tar.

Fuerunt tandem ex posterioribus aliqui, quoniam *Apio* simile *Dioscorides* esse dicat, silvestre *Petroselinum* esse affirmare non dubitarint: quod parum verisimile est, cum hoc *Dioscorides* in *Syria* tantum nasci testetur.

Petroselinū
non est.

Charesfolium. *Tragus* *Charesfolium* satis quadrare credit *Dioscoridis* capiti de *Sisone*.

Retentiores Medici, qui barbaro adhuc seculo vixerunt, *Olsatrum*, quod *Macerone* inscribimus & *Sinon*, idem esse putarunt, sed malè.

Macerone.

Ammi minus. *Ammi minus* quod vocamus, à *Coldenbergio* *Sison* appellari, testatur *Gesnerus* hort.

Saxifragia
hinc mi-
nor.

Ait *Dodon.* gall. doctos quosdam *Saxifragiam* minorem, *Sisonem* *Dioscoridis* nuncupare.

Corn. in *Diosc.* l. 3. c. 54. semen quod vulgò *Sine* appellatur, & ab officinis semen *Zedoariae* dicitur, ab aliis autem, ut & nobis semen *lumbricorum*, verum *Sinon* esse arbitraretur, ex appellatione indutus, nisi usus vulgatus repugnaret.

Idem lum-
bricorum.

Nos contra *Amomum* officinarum *Sison* esse tenemus, de quo mox agemus.

Collegium Florent. in antiball. *Daucum* pro *Sisone* substituit, ceu & *Antid. Romanum*.

Ast *Aetius* *Tetrabibl.* 3. *Serm.* 2. cap. 21. pro *Sisonis* semine, *Ligustici* semen admittit.

Baud. pharm. l. 1. sect. 4. in pulvere *Diaprasii* *Nic.* confundit *Sison* cum *Apio montano*, quod *Oreoselinum* Græcorum esse ait, ac diversum facit à *Petroselino* *Macedonico* contra *Pandectarium* & *Platearium*, ejusque lequaces.

Apium mo-
tano.

SISON, SIVE OFFICINARUM Amomum.

Sison caulem producit gracilem, teretem, medulliflorum, cubitalem & altiore: cujus folia longa, pinnata in *Pastinacæ* Germanicæ morem; singularia tamen folia, *Sisari* foliis similia, tenera, oblonga, circumcirca crenata, aliquando & laciniata. Flores in umbellis parvis candidi: semine subsequente perpusillo, fusco, liriato, gustu acriusculo, aromatico. radix gracilis, fibrosa.

Matthiolus licet *Sison* semen esse in *Syria* proveniens ex *Dioscoride* testatum reliquerit, nobisque propterea incognitum dixerit: ut qui plantam, quæ

Sison est
Dioscoridis
contra
Matthiolū.



illud profert, apud nullum authorem descriptam inveniri crediderit. Nos tamen *Sison* à *Dioscoride* propositum hac figurā exhiberi credimus, & à sequentibus autoribus, eo, quo dicimus, modo tradi.

Semen peregrinum, officinarum *Amomum*, hieme ferre non potest, i- deo mihi (*Trago* in hist. Germ. l. 1. c. 154.) nullum erit *Apium*. Existimo *Sison*, nec ita aberrare possum ut ij, qui vendunt pro *Amomo*. veteres vocarunt hanc herbam *Sinon*, *Senon* & *Silon*.

est sanè minimum *Apiorum*. Idem in hist. lat. ait: *Amomum germanicum*, *Petroselinum peregrinum* appellatur, nos illud *Sison* hortense dicimus. Minimum quoddam *Apiorum* genus esse videtur: venditari solet semen contra veritatem pro *Amomo*. Hæc ille qui sibi contrarius est, *Apium* quoddam esse modò negando, modò concedendo.

Amomum
officinarū.

Amomum
germanicū,
Trago.

Tragus sibi
contrarius.

Fuchl. in Icon. vocat *Petroselinum Macedonicū*, *Welsch Petersilgen*. In hist. c. 254. *Petroselinum* & *Apium saxatile*. Germ. *Frembd Petersil* Gall. *verd Persil de Roches & lieux pierrenx*, aut *Macherons* nominari commodè posse ad *Oreoselini* differentiam putat, ac ait: *Officinæ* hujus herbæ semine pro *Amomo* utuntur, non tamen sine magno errore, quum constet omnibus *Amomum* ab hac herba esse diversissimum. Ego ut tandem scirem de qua stirpe semen hoc decerperetur, terræ illud mandavi, & hæc cujus pictura formam ostendit, herba erupit, quam ego verum esse *Petroselinum* credo, cujus brevis delineatio est apud *Dioscoridem* atque imperfecta, ut nihil mirum sit, me hæcenus quod verum esset *Petroselinum* non potuisse cognoscere. Meritò itaque hoc loco, ut compluribus etiam aliis, *Dioscorides* negligentia in simulari potest, ut qui mancas ac mutulas plerasque posteritanti relinquere stirpiū historias voluerit. Si verò quispian pauca etiam has notas expendat haud dubiè herbam hanc *Petroselinum* esse comperiet. Semen enim ejus *Ammi* tam simile est, ut ab eo vix discerni queat: odoratus etiam existit & acris, ac aroma olet. In summa, nulla est nota quæ illi non respondeat ut hoc nomine verum *Petroselinum* esse credam.

Petrosel.
Macedoni-
cū, Fuchl.

Officinā
error.

Petroselinū.
Dioscoridis.
Fuchl.

Diosc. taxo-
nū.

Quinetiam tota hujus herbæ forma, quæ non multum à *Germanico* *Petroselino* abest, atque odor, *Selini* speciem esse docent, ut pro *Petroselino* usurpare hanc ipsam officinæ tutò possint: semen enim quo hodie utuntur, non *Macedonicum* *Petroselinum*, sed *Hypposelinum* existit. Sunt porro qui hanc herbam *Sisona* pro *Petroselino* esse putent quorum sententiæ cur non magnoperè repugnem, facit imprimis *Dioscorides*, qui *Sisona* perinde atque *Petroselinum* suis notis haud descripsit. Deinde quod viribus non discrepent, atque adeo in usu hujus aut illius nullum sit periculum. Ego tamen meam sententiam propter jam adductas rationes deferere, nisi evidentibus convictus argumentis, non possum. Hæcenus *Fuchlius* qui herbam quidem depingit, sed non describit, ita ut meritò de eo dici possit, quod ipse de *Dioscoride* protulit. Eum sc. hoc loco non sine occasione negligentia inhi-

Selini
spec.

Sison.

Fuchl. to
darguitur.

mulari posse, ut qui mancas ac mutilas plerasque posteritati stirpium historias relinquere voluerit, easque turpiter confuderit.

Petrosel. Dodonæus gall. Petroselinū Macedonici titulo pinxit, verūque Petroselini nomine delineavit ac dixit: Petroselinum hoc exoticum appellatum est, Græcè *πετροσέλινον*, & quia abundè crescit in Macedonia, *πετροσέλινον μακεδονικόν*, Petroselinon Macedonicon: lat. Petrapium, Apium saxatile, & Petroselinum: Gall. *Persil de ruches*: Germ. *Stein Epfsich*/aut *Stein Peterlin*. Belg. *Green Eppe*. Vocatum est etiam ab ignaris pharmacopolis Amomum: Brabātis *Vrande Peterselic*/ h.c. Petroselinū peregrinū: quod tamen dubio procul est Petroselinum verum, nominatum à loco, in quo abūdat, Petroselinū Macedonicum. In fol. lat. appellat Petroselinum Macedonicum Fuchsj, ubi eos hallucinari scribit non parum qui plantam hanc Amomum esse velint. Is verò eam pro Petroselino amplectitur, eodem sanè errore, quo Fuchsius, ac etiam ij, qui Amomum esse pronunciant.

Petrapium Apium saxatile. *Petrosel. Maced. Fuchsj, Dod. lat.*

Petrosel. peregrinū.

Petrosel. Maced. Fuchsj, Dod. lat.

Fuchsj. Dodonæi lapsum.

Lonic. vocat eodem lapsu Petroselinum Macedonicum Dioscoridis, quod ait officinas assumere pro Amomo, & vocare Amomum Germanicum. Debat is ad hanc plantam referre caput Sinonis, sive Sifonis, quod malè Cicutæ Giless adscribit.

Lonic. nota. sur. Spum.

Geln. in app. hort. dicitur Amomum officinarum falsum. Volemarij. Cordo de artif. extra. Ammi Amomum appellatum. Matth. in Diosc. l. i. c. 14. pumilum semen, colore nigro, odore Melanthij, quod quosdam stirpium impostores, ex Gargano Apuliz monte profectos, Amomi vice supponere solet.

Spum.

De hoc loquitur Apollo rad. 1. supra Diatrion-piperinon. Semen quoddam exiguum, nigrum, & inodorum, à pharmacopolis publicè vendi, pro Amomo scribit Brassavolus: hoc idem Matthiolus, sed aromolere, acreque esse, secus quàm dicit Brassavolus, ut alterum aberrare necesse sit: quod tamen apud illustres aromatopæos, sæpè, ac sæpius explorare potui, acre quidem conspicuè apparuit, ut Piperis leviculam præ se ferret acrimoniam, nullo tamen aromatis odore.

Ang. Sifon.

Ang. ep. 12. nominat Sifon, ac à quibusdam, potissimum verò ab herbis Bononiensibus, *Sinula* vocari scribit. Cord. in Diosc. & hist. Sifon & Sinon. Lugd. p. 709. Sifon & Petroselinum Macedonicum Dodonæi. Cæs. & Bauh. tam apud Matth. quàm in phyt. & pin. Sifon Dioscoridis: Sifon, quod Amomum officinis nostris: Amomum germ. Trag. Amomum offic. falsò dictum, Geln. h. Sifon, Ang. Geln. h. Lugd. Tab. & Cam. Ammi parvum, Geln. h. Sed & Sifonis (quod Plinio & Græcis multis, tam veteribus, quàm recentioribus, Sinon vocari ait) descriptioni nihil accommodatius Turnerus invenit Amomo vulgò dicto: quod & nonnullis Apium nigrum (Anglis *Black Perselic*.) Circa sepes nascitur, foliis Pastinacæ Germanicæ, radice eleganti, longâ, dulci, gustu nonnihil calida, semine nigro, calido certè, sed non fervido. Quò fit ut verum Sifon non ausit pronunciare, sed solùm fieri posse dicat, ut ejus sit species aliqua.

Dodonæi lapsum.

Sifon Monbelgardii in horto E. C. per plures annos colui, ubi facillè hiemem ferebat, & semine deciduo se propagabat, florens, & semina maturans Junio, Julio, & Augusto, virens sequenti anno mense Februario. Habuit idem Lugduni & Genevæ virens Ianuario. In locis humidis nascitur, non tamen in aquis: semen affertur ex Orientalibus, quamvis passim apud nos (inquit Cæs.) oriatur in foveis.

Pires & n. lous.

De Sifonis viribus & usu diximus ante ex veteribus, quos lector consulere velit.

PIMPINELLA IN GENE-

re dicta.

CAP. XLVII.

PIMPINELLÆ nomen non solum Sanguisorbæ, *Pimpinella* & Saxifragæ attribui, ut ait Dodonæus, sed aliis *nycten lard* etiam quibusdam plantis adscribi, jamiam est demonstrandum. Extat autem vetus versiculus, qui Pimpinellam Saxifragam à Sanguisorba Pimpinella differre ostendit, qui talis est:

Pimpinella pilos: Saxifraga non habet nllas.

Nos quidem relicti aliorum Saxifragæ differentis, eam quadruplicem agnoscimus.

Harum prima est Saxifraga hircina major, quæ quibusdam Pimpinella major Germanica dicitur. *Saxifraga hircina major.*

Altera Saxifraga hircina media, quæ videtur Daucus selinoides Cordi. *Saxif. hirc. media.*

Postrema Saxifraga hircina minor, foliis Sanguisorbæ, sive Pimpinella minor Germ. acris, aliis hircina. *Saxif. hirc. minor.*

Ultima Saxifraga hircina minima, Pimpinella crispa Tragi. *Saxif. hirc. minima.*

Pimpinellæ Sanguisorbæ sunt duo genera; una minor, Pimpinella Italica vulgò dicta, nec non Gallis. *Sanguisorba minor.*

Altera Sanguisorba major flore spadiceo, Pimpinella major multis. Et de his quidem mox ordine partrastabimus. *Sanguisorba major.*

Aliæ plantæ, quæ Pimpinellæ nomine donantur, sunt hæc.

Caucalis minor Bellonij pulchro semine, quam *Caucalis minor Bellonij.* Cæsalpinus Pimpinellam Romanam vulgi vocat.

Caucalis major est Pimpinellæ alterum genus silvestre Cæsalpino. *Caucal. major.*

Poterium quorundam, ut dictum lib. II. nuncupatur Pimpinella (pinola). *Poterium quorundam.*

Anagallis, ut videre est lib. 29. est Pimpinella Anglice piebecula. *Anagallis.*

Pimpinella crispa, sive Petrea Tabernomontani, An Apium petreum quoddam. *An Apium petreum quoddam.*

Pimpinella major Brunckhveig, An Pastinaca silvestris Germanica. *An Pastin. silv. germ. Elatium.*

Sunt, teste Matthiolo, qui aberrantes Pimpinellam, Elatinen putant.

Chij, Rodij, Peloponenses, Corcyrenses & cæteri Græci, ait idem, Pimpinellam hodie Sideritidem vocant. *Sideritid.*

Sideritidem alteram, Pimpinellam in Italia dici, tota Græcia dicitur, inquit Guilandi Theon. *Sideritid. altera.*

Pimpinellam apud Dioscoridem Tragium dicitur putat Cæsalpinus. Sed is videtur duas plantas confundere. *Tragium Dioscoridi.*

Pimpinellæ vetus nomen se quidem ignorare fatetur Geln. sed tamen ad Oreoselinum referendum putat, ut legimus, epist. 13. ep. ad Bened. Arretum. *Oreoselinum.*

Illud tandem silentio non involvendum, quod Pimpinella quæ à Germanis passim quidem & vulgò Pimpinella vocatur, relictis aliis gentes, Saxifragam seu Saxifragiam (à facultate calciorum à renibus expellendorum) cognomine hircinam, appellare. Contra verò quam Galli, Itali, & Hispani Pimpinellam dicunt, propriè Pimpinellam vocari, & à nobis Sanguisorbam vel Sorbastrellam (quod sanguineos fluxus sistat.) appellari. *Germ. Saxif. Italorum. Hispan. Sorbastrellam.*


Cæterum, Pimpinellæ, & Pipinellæ, à foliorum binis ordinibus, pennatis sive plumatis digestis, nominatæ, veteribus indistinctè existimantur: quæ etiam Bipennulæ & Pampinellæ vocantur.

Saxifraga

SAXIFRAGIA HIRCINA

major.

CAP. XLVIII.



EX radice digiti crassitudine, alba, sapore fervido, caules surgunt recti, tres cubitos, latiore Solo, superantes, inanes, striati, angulosi, geniculati: folia si odorati umbelliferi, atrovi-
rentia, splendens, sapore ignavio-
re multo quam radix: umbellae flosculorum candidorum, quinque foliolis constantium: semen pullum, striatum, oblongum, acce, aromaticum.

Hæc est illa, quam Ruell. Saxi-

fragiam majorem officinarum & herbariorum vocat: itemque Sefeli Massiliense, & Siler montanum. Puto autem Ruelliam existimasse Siler montanum esse semen Saxifragæ majoris, ac ita confundere duas plantas: nec me movet ejus descriptio, quæ nihil aliud quam Sefelos repetita delineatio, non facta ad plantam: quales solet plures habere descriptiones. Tragi vero aliam esse opinionem scio.

Fuchs. ic. & hist. inscribit Pimpinellam majorem, cujus icon (qualem etiam nos proponimus, quia jam sculptam emimus) destituitur prioribus foliis, quæ solent ad Pastinacam Germanicam accedere. De hac autem majori Pimpinella, ut & minori (hanc enim duum generum esse tradit) in genere ait. Ut appellata sit Græcis aut Latinis herba hæc, quam hodie vulgus herbariorum & officinæ Pimpinellam vocant, nondum mihi certò scire licuit. Sunt qui Pampinulam, & Bipennulam nominant. Mirum autem in modum errant, qui Sanguisorbam cum Pimpinella confundunt.

Leonellum Favent. de med. morb. c. 39. per Petram Findulam [vel ut legendum puto Petrasfindulam, non autem Filpendulam, ut quidam corrigunt] apud Simonem Genuensem, quam speciem Saxifragæ ait, nostram plantam intelligere credo, licet id non demonstret.

Cordus in Diosc. nominat Daucum omnium maximum, & Pastinacam gallicam Plinij, itemque Pimpinellam germanicam. An præterea alibi Caulidem germanicam, Rauch Bibinellam? An etiam in hist. Daucum solinoidem? Aliter autem concludunt autor annotationum (qui figuram Tragi apposuit.) Lob. adv. & C. Bauh. apud Matthiolum.

Trago germ. dicitur Pimpinella maxima, qui de ea talia in genere scribit. Multi se torserunt docti, nec ullus indicavit certò, quæ planta fuerit antiquis. Hermol. vocat Bibinellam alius Pimpinellam, Pampinellam, Pampinulam, Bipennulam, Sanguisorbam. Simon Ianuensis Petramfindulam & Saxifragiam: Platina Bibinellam. Est autem Macedonicum Petroselinum, de quo veteres scripsere. Petrapio hoc utendum in comp. Philantropos, Au-

reque Alexandrina Luminaris majoris. De hoc Apio montano Berg Epff (Pimpinella sc.) Theophrastus n. l. 7. c. 6. intelligo potissimum autem de hac majori. Ed. hist. lat. (ubi trium generum esse tradit) Pimpinella major, Pimpinella sine icon, ubi præter d. hæc profert. Simon Ianuensis Petramfindulam & Saxifragiam appellat, & rectius quidem meo iudicio alij omnibus, his enim nominibus non solùm in historia Pimpinellæ, verum etiam vires respondent. Nam Pimpinellæ hujus radix sæpe penetrat ut dixi, & ad curandam urinam, ac, quemadmodum testatur Platina, ad calculos facit unguentum. Ego, ut de hujus plantæ appellationibus, meam dicam sententiam, si cum Manardo Ferrario esse n. ubinam Pimpinellam in Dioscoride nascatur, illi indicare non gravaber. Hæc ergo Macedonicum Petroselinum est. Quid vero huic ipsi aptum Pimpinellæ huic accommodari poterit? An non hanc ipsam ordo, descriptio, & vires, quæ apud Dioscoridem de Petroselino Maced. habentur, testantur? Quare hanc à Theophrasto sub nomine montani Apij (Pimpinellæ) describi puto. Radix ejus gustu & viribus, ita Piperi respondet, ut Piper germanicum non ineptè dici possit. Hæc ille, qui mirum in modum errat, Sanguisorbam cum Pimpinella confundens ut postea ex viribus patebit, Sanguisorbæ etiam nomen huic convenit.

Matthiolum, qui l. 4. c. 15. Pimpinellæ duo genera agnovit, & hanc majorem cognominat, ab iis cap. 4. planè dissentit, nec absque ratione nostro quidem iudicio, qui putant Tragium Dioscoridis secundum hanc esse plantam, quam quidam ab odore Saxifragiam hircinam appellant. An idem l. 3. c. 71. vocat novum quoddam Pyrethrum, passim ferè in pratis nascens? Figura à Matthiolo olim posita, eaque unica ad minorem accedere videtur, quam verò in postremis comm. (ubi major) intelligat, me latet. Camerarius novam effigiem posuit ad epic. & hist. ejus germanicam.

Lacuna figuram habet nomine Bipennulæ (quam duplicem assignat) quo loco eum majorem intelligere suspicor. Cornarius Pimpinellam vulgi herbariorum vocat.

Nullam se novisse plantam scribit Turnerus, quæ cum Dauco secundo rectius conveniat, quam hanc, quam à germanicis quibusdam scriptoribus Pimpinellam germanicam vocari refert, & ab Italis nonnullis Saxifragiam, et si id nomen alteri quoque plantæ tribuant. Daucum tamen secundum verum asserere non audeo.

A Gesn. coll. appellatur Saxifraga hircina major, Pimpinellæ similis. Ab eodem hort. Pimpinella Germanorum vulgo dicta, aliorum Populorum Saxifraga, Italorum cognomento hircina. Item Saxifraga hircina, vel simpliciter Saxifraga, radice ferè hircum olente, major, floribus albis, locis humidioribus & pinguioribus; in Alpibus species quædam flore rubente.

Dod. gall. inscribit Saxifragiam majorem, ac dicit vocari lat. Saxifragiam & Saxifragam, Simon Ianuensis Petramfindulam, alius Bibinellam, Germ. Bibinellam & Feld Mören: Belgæ Beuernæet & Beuernelle. Est etiam quoddam qui Bipennulam, Pimpinellam & Pampinulam appellant, sed hæc nomina propriè debent Sanguisorbæ, huicque nuntimè convenire: Et hoc antiquum hunc verum aperte demonstrare.

Pimpinella pilos: Saxifraga non habet ullos.

Esse siquidem Sanguisorbam, quam Pimpinellam vocet, non nihil huius futam: Saxifragam verò hanc nequaquam.

Petroselinum. Sciolos potè alios modernos velle reducere Saxifragiam ad aliquot capita Dioscoridis, appellantes Sison parvam Saxifragiam, magnam verò Petroselinum Macedonicum, & tertiam [hircinam minimam.] speciem Dauci. Et hæc in hist. gall. quorum non meminit in lat. ubi hanc Saxifragiam magnam appellat.

Daucus. *Saxif. magna Dod. lat.* *Clus. diff.* Saxifragæ, Pimpinellæ Germanorum majoris, ut vocat Clusius varias inveniri differentias prodidit, tamen si magna ex parte foliorum formâ non variat, (omnia enim in ambitu serrata esse, & per alas ordinè disposita tradit) unum tamen genus ex atrovirentia ea obtinere & splendentia, alia minimè: genusque aliud inveniri, cujus folia in lacinas sint divisa: præterea Escherum montem àlere, cujus flores eleganter ex purpura rubescant, cum reliquorum sint candidi. Pimpinellam verò hanc germanicam ubique nascentem, & Italiam Pimpinellam hircinam dictam, Tragium alterum Dioscoridis esse suspicari testatur Fabium Columnam.

Tragium alterum Dioscoridis Columna. *Bipinnella saxif. major, Lob.* *Phellandrium Plinij.* *Petroselinum lat.* Bipinnellam saxifragam majorem à minori, Lob. adv. sic distinguit. Major in silvis & umbrosis pratis, minus acris, fervidave, & folio longo propius exprimit Apium, quam Pimpinellam [Sanguisorbam intelligit] proindeque nulla magis Pliniani Phellandrii opinionem tuetur. Isthæc autem neutiquam à viroso hircumque olente odore Hircinæ dicitur (Dauci namque, Pastinacæ, vel Ligustri quiddam, nec insuave redolet) sed quia illâ adulti hirci, eo quo docent Practici modo, sanguis & carnes eximium sint calculosis præsidium, etiamque iſtericis & hydropicis. Petrosindula verò vocatur etiam eadem prærogativâ. Icon Lobelij placet, quæ in Obs. p. 473. Pimpinella major Fuchij (ita etiam in Icon. p. 720.) & Saxifraga magna vocatur. Quod autem Petrosindulam ob prærogativam frangendi lapides vocari ait, minus prudenter judicat. Ob eandem siquidem facultatem etiam Saxifragam appellari sequeretur. Sed calculos, quos lapides vocamus, quis petras unquam, aut saxa nominabit?

Nominatur à Camer. h. Pimpinella saxifraga major, quam ait Marantham in suo lib. de Theriaca conjicere non malè pro Oreoselino Dioscoridis posse accipi. Eid. apud Matth. Pimpinella major: In epit. Pimpinella saxifraga: item Pimpinella, sive Saxifraga hircina, Ital. *Saxifraga di Decco*. Si Cæs. Saxifraga vulgè ab odore radices, hircina cognominata. Thal. Pimpinella nostras communis major, circa Ilfeldam & VVernegerodam, sed rariùs, vulgari in omnibus similis, eademque nisi quoddam majora, latioraque aliquantulum folia contineat. Lugd. p. 786. Pimpinella saxifraga, major Matthioli. Videtur asserere esse Thaliætrum Rondeletij, & Naticem Plinij Guilandini & Anguillæræ. Esse præterea herbariorum quosdam, qui velint Pseudobunium Dioscoridis, sed alios botitùs credere esse Phellandrium Plinij.

Tragoselinum majus Tab. Tab. in ic. & hist. hujus imaginem dat, titulo Tragoselini majoris, quam etiam Pimpinellam majorem vocat, Ital. verò *Pimpinella maggiore & Petrosella salvatico maggiore*, Gall. *Pimpinella grande*, Angl. *Great Saxifrage*, Belg. *Groot Beuernel* & *Beuernaert*, Germ. *Groß Bibernell* & *Groses* seu *Wosß Peterlin*. In genere autem de omni Saxifraga hircina ait: Pimpinella à veteribus non aliter, quam Petroselinum appellatur: est enim verum Petroselinum. Vocatur hoc à Nicolao Myrepto Penpinela; à Ruellio Pampinaria; Hermolao Bibinella; ab aliis Pimpinella, Pampinula, Bipennula, Bipinnula, Pampinella, Pimpinella & Bipinella; Sim Ianuense Petrasindula & Saxifraga; Ab Herbariis & Botanicis Tragoseli-

num, Apium hircinum, Petroselinum hircinum, Pimpinella hircina, propter gravem odorem & ad differentiam Sanguisorbæ, quæ etiam Pimpinella cognominatur. Item Saxifraga hircina, Pimpinella alba, & Pimpinella saxifraga. Ab Arabibus, ut Matthæus Sylvaticus perhibet, *Hallmach*, *Kezai*, *Kezar*, & *Neselach*, quæ nomina apud nullum unquam Arabum legi. Italiam *Pimpinella* & *Petrosella salvatico*: in Candia sive Creta *Pipinella*: Gall. *Pimpinelle*: Bohem. *Bodruyck*: Polonis *Biedrzynek*: Hung. *Chaba ire*: Angl. *Saxifrage*: Belg. *Beuernel*: Germ. *Bibernell* / *Bibennell* / *Stein Peterlin* & *Wosß Peterlein* q. c. *Tragoselinum*. Hæcille: Ast nobis Bibinella Hermolai alia est planta, nempe Sanguisorba.

C. Bauh. phyt. facit Pimpinellam i. majorem ^{synon. C. B.} umbellâ candidâ: is varietatem adverti tradit in foliis, ex Clusio, quem tamen non nominat. Folia (inquit in pin. ubi ipsi est Pimpinella i. Saxifraga major umbellâ candidâ: Pimpinella, Brunf. Cord. in Diosc. Lon. Trag. Fuch. Turn. Gesn. h. Lob. & Cast. Pimpinella saxifraga, Matth. & Ger.) in una atrovirentia, splendentia: in altera minimè: inveniuntur & in lacinis divisa. At præterea ad hujus radicem quibusdam in locis, grana reperiri, quorum medulla in colorem rubeum mutetur, cujus ad tincturam Carmesini usus sit, Lacunâ momente, in quibus vermiculi, Costæo autore, nascantur, ideoque Coccum radicem dici posse. Ego quidem ita denominavi ad meum Lacunam grana illa, provenireque in Pimpinella hac dixi, non autem Lacunâ. Quam potè Clusius vulgaris hujus Saxifragæ varietatem duntaxat asserit, is tanquam diversam specie separat, vocatque Pimpinellam i. saxifragam majorem umbellâ rubente: Saxifragam majorem in albis fl. rubente, Gesn. h. Pimpinellam majorem umbellis purpureis, Gesn. fruct. Idem inter Saxifragiam & Sanguisorbam non bene distinxit. Est præter alias notas Saxifraga hircinâ, sive Pimpinella Germanorum, planta umbellifera; Sanguisorba autem, sive Pimpinella Gallorum, Italicorum ac Hispanorum præsertim, capitosa, corymbiferaque

Fragosus l. 3. c. 15. videtur Cocchenilla existimasse: Cocchenilla, inquit, quædam grani species adfertur ex Peru, quod nascitur in ceruis plantis parvis, Pimpinellæ vulgari similibus, cujus radicibus adhæret, similitudine uvæ silvestrium: quidam putarunt falsè, esse Coccognidium verum: alij esse Chermes Arabum, à Cocco Baphico Græcorum different, quod manifestè falsum est: hæcille. At Oviedus, ex arbore colligi vult.

Schvvenckf. dixit Pimpinellam majorem, groß Bibernell / Wosß Bibernell & Stein Peterlein: item Pimpinellam majorem splendentem, gleisfende Bibernell; ratiorem vulgari, at ejusdem usus.

Saxifragiam hircinam majorem Basileæ observavi prope Montes: florentem & semina ferentem Oßobri; Tiguri & Genevæ in hortu meo ex vicinis montibus allatam, Majo; Montbelgardi passim in pratis, Junio & Augusto. Hortis est molesta ob radicem, quâ se multum propagat. Vulgaris potè admodum est per Hungariam, Austriam, Syriam, vicinasque provincias, Clusio in pratis apricis, & arenosis agrorum limitibus, mense Majo caules proferens, Trago.

Saxifraga

SAXIFRAGIA HIRCINA
media.

Defr. **D**VVM generum habet folia, inferiora quidem ad minorem Saxifragiam accedentia, superiora verò Majoris foliis similia, oblonga, in acumen definentia, profundè crenata. radix proluxa. medio-
An Dauci
selinoides
Cordi

crater crassa. caulis striatus, cubitalis; alis aliquot brachiatas, umbellas gerit albas, majusculas.
An est Daucus selinoides Cordi, cujus descriptionem lib. 2. hist. cap. 121. talem dedit: Daucus selinoides folia à radicis capite emittit utrinque à pediculis exeuntia, Apio similia, paulò tamen oblongiora, nec ita splendida & glabra, sed aliquantulum rugosa, in ambitu incisa, & per terrâ sparsa: è quorum medio caulis assurgit cubitalis, gracilis, striatus & geniculatus, singulis foliis geniculatim vestitus, prioribus multò tenuius incisis. habet adnata & ramulos aliquot caulis, in quorum summitate parvæ sunt umbellæ, æstate candidis flosculis plenæ: quibus succedunt exigua, oblonga, & in fusco rubentia semina, singulisque flosculis bina, & sibi invicem conjuncta. Radice nititur duorum plerumque dodrantum longitudine, minimo digito paulò graciliore, terete, colore candida & perenni. Nascitur campestribus, lutosisque locis ac pratis. Et hæc descriptio Cordi videtur nobis melius respondere huic nostræ Saxifragiæ mediæ, vel etiam majori, quàm minori: quamvis aliter sentiat Gesnerus, qui ad minorem refert. Frater C. Bauh. aliam etiam pro Daucò hoc selinoides Cordi proponit, videlicet Apium montanum nigrum Gesneri, à quo nobis tamen diversa videtur, licet id certò affirmare non possimus.

An Dauci
genus
Dalechampi
Dauci
secundum
di generum
Dalechampi
propter
descriptio
Luc.
An est Lugdunensis p. 717. Dauci secundum genus Dalechampij, quod *ayemaium* dici refert auctore Dioscoride cap. de Hippolefino. Hujus historiam hanc habet. Gignitur in glareoso campo, quem Dravus irrigat prope Gratianopolim, radice albâ, odoratâ, acri, paleis in summo capillata: caule cubitali, nonnunquam altiore, anguloso: folio prope radicem terræ instructo, latiore, Hippolefino simili, in exilibus ramulis tenuiore, magisque dissecto. Apij modo: umbella Apij, flore candido: copioso semine, minuto, oblongo, acri, odorato. Et hæc est hujus Dauci descriptio, quem quia frater à Saxifragia separat, eum nos hic integrè ex Dalechampio delineare volumus. Sed Medici & Pharmacopœi Gratianopolitani nos monere potuerunt, an eadem, vel diversa ab hac Saxifragia hircina media, sit planta: & si diversa, in quibus differat. Nos interea suspensum tenebimus lectorem. Vocata autem C. Bauh. Dauci genus Dalechampij, Daucum 7. (10. in pin.) live campestris Apij folio.

Saxifragiam hircinam, quam mediam voco, observavi Tubingæ, ubi cum essem, Fuchsius Pimpinellam mediam denominabat. Eandem quoque observavi in monte Wattwiller.

SAXIFRAGIA HIRCINA
minor, foliis Sanguisorbæ.

Defr. **S**A X I F R A G I A minor dodrantali, aut cubitali. Sest caule, rigido, solido, in ramos diviso, in quibus pauca, eaque tenuissima folia: reliqua enim ex radice statim orta & numero plura & latiora sunt. Sanguisorbæ foliis proxima, quorum singularia folia tripartita ferè semper sunt, & in ambitu serrata, rigida, glabra, sapore acri. flores umbellati.
Tom. III.

Leon Fuensis.

EFFIGIES MELIOR
nostras.

quàm Fuchsi, non tamen in omnibus probatur. Ceterum, tam in hist. germ. quàm lat. vocat secundam Pimpinellæ speciem, quàm sic de Pimpinella lineat. Altera Pimpinella fervore & acrimonia primum genus superat. Nascitur in arenosis agrorum limitibus, in asperis montibus ac saxis, radice saxorum rimas angustissimas penetrante trium quandoque palmorum longitudine, rectâ ac tenui, ut vermis rudimentum quasi exprimat. Folia, caules, flores, & ipse color, & forma cum primo genere prorsus conveniunt, nisi quòd hæc totâ substantiâ minor est; coliculis interdum & venis foliorum purpurascens: flores appetente Mayo mense: semina Ammii semini simile habet.

Matthioli nomine Pimpinellæ saxifragiæ minoris passim obvia descriptio, & hircum redolere ait, ac Tragium negat. Huic in epit. & hist. germ. Camerario figura additur.

Dod. gall. Saxifragiam minorem, petite Saxifrage inscribit, ac esse ait, qui Sison appellant: esse præterea in Belgio valde communem. Exhibet is iconem Fuchsi, quæ ut dictum, nullo modo placet. Hanc autem mancam esse monere debebat, quandoquidem vulgarum in Belgio dictu, in

li, Saxifragiæ majoris, candidi, minores: radix longa, rugosa, simplex, quàm Majoris minor, sapore magis vegeto, fervido.

Quia autem si Leon Fuensis gura Fuchsi, quam in ic. & hist. Pimpinellam minorem inscribit, omnino displicet, ut quæ potius ad majorem accedat, nec tamen etiam conveniat (siquidem Saxifragiis folia non sunt brachiata) aliam fieri curavimus, quam secundo loco pictam damus, ut ita herbarum studiosi discrimen habeant, quo veram à falsa imagine discernere discant.

Fracafor. lib. 3. Oenanthilla de contag. morb. facit Oenantes speciem, vocatque teste Camerario, Oenanthillam.

Rusellio dicitur Saxifragiæ minor officinarum, eamque accedere ait Napi secundæ specie, sive Bunio.

Icon apud Tragium l. 1. c. 136. titulo Pimpinellæ licet hujus plantæ videatur, meliusque placeat

Icon Trag.

Pimpinella alia Tra.

Pimp. saxifrag. minor

Saxifrag. minor Dod.

Dod. saxifrag. minor

In fol. lat. Saxifragam parvam vocat, & pro secunda describit acat. Minorem saxifragam hircinam quidam appellant, alij Pimpinellam saxifragam minorem: Brabantii Benevillae. Qui autem Saxifragam hanc, Pyrethrum esse existimant, non parum à verò recedunt. Quod si autem ad aliam quam Dioscoridis referenda videatur, cum nullo titulo, quam cum Bunio convenire poterit. Caulis siquidem angulosus est, & majoris Digitalis fere crassitudinis: folia inferiora Apio comparari possunt, superiora longè tenuiora: flores in umbellis Anetho similibus: semen odoratum, minus quam Hyoscyami, acce ac exaltaciens, quale Bunio esse Dioscorides ostendit, de quo suo dicemus loco.

Geln. coll. dicitur Saxifraga hircina, Pimpinellæ similis, minor. In cat. Napi species altera. Item, Daucus selinoides Cordi [Nos Cordi Selinoidem Daucum aliam suspicamus plantam, congenerem tamen.] Tandem h. Saxifraga hircina minor, siccis asperis & saxosis locis, in collibus & circa muros Tiguri abundans.

Cordo in Diosc. l. 2. c. 169. est Pimpinella Germanis vulgo dicta, quam Daucum veterum autumat. Idem lib. 3. cap. 53. meminit hujus plantæ nomine Dauci, & Pimpinellæ in Germania. An Eidem hist. Daucus coriophyllus, quem ex eo ante descripsimus.

Lob. adv. p. 321. de hac potissimum loquitur, cum quaerit, Bipinella saxifraga utraque, an Phellandrium Plinij? Quia, inquit, Saxifragæ nomenclatura planè diversa genera notat herbarum & perquam diffusa, vulgoque indita, nolui ita nominis aurâ sonore abripi, ut naturæ vel cognatas classes, vel cognitioni mutue accommodas, faciliè divellerem. Harum autem novissima hircina, nonnullis Bipinella [quæ ipsi est Sanguisorba minor] cujus folio aded similis exit, ut eadem planè putetur: nec eas semper pilis discernere est, ut putat verficator: nam eodem proximè loci tractu videre memini Saxifragam foliorum internâ superficie pilosa: nullos tamen in Pimpinella, Sanguisorba, vel horrenti videas. Anne non foliis innatos: sed inter frangendum tractos villos, tenuissimave & sermè Arachnea stamina innuit, qualia in Scabiosa animadvertas?

Casalp. vocat Saxifragiam alteram minorem, cauliculo constantem dodrantali: foliolis ab radice Pimpinellæ, sc. subrotundis & circumferratis, in simplici pediculo dispositis: ramis autem tenuibus divisis, ut Sisonis: semine odoratiore & aciore priore [Saxif. majore] nigriore & tenuiore: aded ut cum Petroselino Macedonico congruere omni ex parte ipsi videatur, & magis quam vulgare Petroselinum latifolium, de quo egimus.

Lugd. p. 786. Pimpinella Saxifragia minor Dodonæi & Lobelij. Habet figuram Fuchianæ similem. Dodonæi etiam & Lobelij icon Saxifragiam hirc. minimam potius exprimit, meo judicio, quam minorem hanc.

An Fid. p. 717. per Dauci tertium genus Dalechampi in laxo colle Gratianopoli imminente nascens, radice ex flavo candicante brevi & exili, festucis in summo villosa: foliis prope radicem Coriandri similibus, in plantæ vertice ad tenuitatem sceniculaceorum gracilescens, caule Apij, flore candido: semine oblongo, Anethi æmulo, saporis acris, qualis in Cumino gustanti percipitur? Figura videtur respondere Saxifragæ minori, verum semina non sunt Anethi: Anetho simile & oblongum mihi contraria penè videntur. verum ea contrarietas ex descriptione Dauci tertij Dioscoridis desumpta est.

Tab. Tragoselinum minus, Pimpinella minor, *Tragoseli.*
Blein Bibernell/Blein Stein Peterlin: à Medicis & *num. misal*
pharmacopœis simpliciter Pimpinella vocata. *Tab.*

C. Bauh. phyt. Pimpinella 2. major altera, Pimpinella secunda species Trago, sine icon. Nos nondum percipimus cur dicatur sine icon, nec cur major. Icon Tragi nobis videtur demonstrare minorem Saxifragiam. Eadem etiam fuit opinio Gesneri. Apud Matth. Pimpinella minor; Daucus selinoides Cordi. In animadv. in Lugd. p. 36. Dauci 3. genus p. 717. Eadem est cum ea quam Pimpinellæ hircinæ nomine describit p. 787. Figura autem eo loci posita removenda: frustra duæ descriptiones unius plantæ. Item in animadv. p. 39. Pimpinella saxifraga minor Dodonæi & Lobelij p. 787. [Lugdunensis] Longè alia est figura Lobelij, quam Dodonæus postremâ editione habet. quare Lobelij assumenda tanquam melior. vel servanda Lugdunensis p. 717. quæ nomine Dauci 3. Dalechampi pingitur & describitur. Diximus nos ante Daucum selinoidem Cordi ab hac diversam nobis videri plantam. Pimpinellam etiam saxifragam minorem tam Lobelij, quam Dodonæi lat. quoad figuram huc non referimus, sed ad minimam. Quare rectius in pin. Pimpinella saxifraga minor, Ger. Cauliculi & foliorum venæ, interdum purpurascent: hæc servore & acrimoniâ primum genus superat.

Columna pro Tragio pingit, de quo hæc scribit *Tragium.*
Tragij nomen adepta est planta hæc, ed quodd, ut *Columna.*
Dioscorides ait, folia Autumno hirci odorem emittunt. Differt autem à primo Tragio, nam illud non hirci virus olet. Tragij alterius descriptioni plantam à me propositam respondere demonstrabo: quæ radicem habet Raphano silvestri similem, vel Pastinacæ erraticæ, pede longam, minimum digitorum crassitie æquantem, albam, raris fibris divisam: folia emittit petiolis ex adverso hærentia, quaterna, & in extremo unicum, Sideritidis secundæ Dioscoridis modo, Pimpinellæ vulgò nobis dictæ (ob cuius similitudinem, & hanc Pimpinellam hircinam vocant) rotundiora, atque magis & profundè divisa: sed si semine leras primum bina emittit folia singulis petiolis hærentia, rotunda Coriandrinis similia, deinde bina singulis petiolis, & postremo quaterna, sibi ipsis adversantia, in quorum extremo unicum inest. Caules emittit tenues admodum, pedem & sesquipedem altos, binis ternisve geniculis interceptos, ex quibus folia admodum tenuia exeunt: in summo verò eorum umbellæ insunt floribus refertæ albis, quibus succedunt semina oblonga similia Aniso, sed minora multo colore ad viridem tendentia, atque hirsuta. Floret Æstate, Autumni initio semina perfecta inveniuntur. Oritur in montibus, saxis, & locis terrenis: in monte D. Mariz Virginis appellato excelso & frigido frequens. Folia conficata virus olent hirci, sicut tota planta. Gustu acri atque *tragoseli.*, non solum Autumni tempore, sed semper. Quare fieri potuit, ut Dioscorides, vel is à quo transcripsit, plantam hanc Octobri mense viderit, tunc enim hic [Neapoli] sine umbellis, & caule corrupto invenitur, nova proferens folia, quo tempore magnam habere cum Scolopendrij foliis similitudinem conspicitur caule existens vidua: atque ita eo tempore tantum folia naribus admovet, atque ignorans, an toto anno eundem remitteret odorem; tempus Autumni tantum, quo ipse invenit, atque consideravit (ut in aliis multis, quæ sine caule, & sine flore descripsit) posteris tradidit. Eo enim tempore propter humoris abundantiam folia magis virus olent, sicuti in planta Androsamo vetus putata, Siciliana dicta simili & conge-

hære [in Siciliã, & Siciliã aliaminore scetida] observatur, cujus folia quæ jam sicari incipiunt, non hirci virus, sed vini odorem remittere videntur. Obstatet plantæ huic aliquorum sententia forma foliorum, quam dicunt non esse Scolopendrij foliis similem: quam sententiam ita rejiciendam duxi. Asplenium folio constat Polypodij divisurâ, quod est Filici simile Dioscoridis sententia: sed axioma est, quod ea quæ uni data sunt similia, ad invicem similia esse dicuntur: ergo non sine ratione & similitudine necessaria, plantæ hujus folia sunt Asplenij foliis similia, cum Filici Polypodium sit simile, atque idem Dioscorides Filici Sideritidem secundam, & Trichomanes comparat: quod utrinque folia ex adverso posita Lentis si similitudine habere ait. In Sideritide ait οὐ μὴ ἴσως τοῖς τῆς σκιδρόης, quia sola divisura similia sunt: in Trichomane, τριχουάνη, & ἴσως τῆς σκιδρόης, quia & foliorum substantiâ & divisurâ Filici est simile: ut & Dioscorides ἐν οὐ μὴ ἴσως σκολοπενδρίῳ, ut hirci, quod tantum de foliorum divisura est intelligendum, ut de Sideritide secunda dicitur, quibus foliorum Filicis figuram representat utrinque digestorum: longaque differentia est inter habere folia similia Scolopendrio, Scolopendrij sc. foliis, & similem esse Scolopendrio; quod ultimum de substantiâ & de forma totius plantæ intelligitur, ut dicitur de Doryopteride & Trichomane. Obstat dicunt aliqui, quod de Filice scemina Dioscorides scripsit, οὐ μὴ ἴσως τῆς σκιδρόης, & tamen substantiâ & foliorum divisura similis est Filici mari: ad quod respondere pro me Dioscoridem dico, & sic. Filix scemina quamvis mari similis sit substantiâ & divisurâ foliorum, positum tamen foliorum valde dissimilem habet, nam scemina est ramosa, & non uno petiolo constat, ut Filix mas, sed pluribus alis; ideoque cum plantæ maximè similitudine foliorum & divisurâ dignoscantur, majori notâ, quâ facilius dignosci poterat, descripsit: atque folia similia Filici habere ait, cum plantæ habitu differret: ramorum sc. multitudine. Præterea Raphano similem radicem, nullam ex Filicorum genere plantam habere adhuc compertum est, sed obliquam, ut Polypodium; reliquos verò capillares. Nec de floribus est dubitandum, ut aliqui dicunt, qui à Dioscoride tacentur, nam hoc fuit, quia eo tempore caule & floribus viduam plantam conspexit, quod mulus plantis evenit, quorum flores non descripsit, & tamen illos habere certò scimus: aliquibus penè abstulit: illasque flore carere dixit atque hinc etiam oportebat, ut flores negarentur, scribere; & hanc flore carere, si flores non emitteret. At potius credendum est plantam hanc à notiore notâ describere voluisse, ut facilius cognosci posset, à formâ & divisurâ foliorum, & ab hirci olentia. Quibus sic cognitis, jam videtur plantâ à me propositâ [Saxifragia hircina minor] dubijs soluta Tragij nomen assequi debere, cujus Dioscorides meminit. Hæc Columna, qui plantam à nobis in præsentî delineatam, Tragium Dioscoridis credit, cujus opinio non placet.

Schvvenkf. Pimpinella minor. Pimpinella simpliciter officinarum Lobelio: Petrisindula, Saxifragia hircina, Tragofelinum minus, Bleene Bibinell/ Bode Peterlin.

Saxifragiam minorem hircinam folio Sanguisorbæ observavi Genevæ florentem mense Majo; Basileæ Octobri, idque copiosè qua itur ad S. Iacobum, & inter portam cinericeam & lapideam dictam. Item itinere versùs Crenzach. Iuxta Castellum Blumberg / sive Florimont copiosè, florens & semen maturans Octobri. Veronæ in Theatro si rectè recordor. Montbelgardi

Tom. III.

frequentem circa urbem in colle versùs patibulum. Schvvenkf. asperis & saxosis montium delectatur locis.


Sapor manis sed atque ætorem & validiorem majore Pimpinellâ habere efficaciam. Calefacit & licet 3. ordine. Vfus ejus frequens ad sudores eliciendos, tormina ventris, calculum & menstruum retentionem. Ictericis, hydropicis, & ijs qui angustiam præcordiorum ex scabie repercussa sentiunt, eximium præsidium: Schvvenkf.

SAXIFRAGIA HIRCINA

minima, Pimpinella crispâ

Tragi.

AN SAXIFRAGIA
Species minima.



RADICE, caule, Descrip. flore, semine, odore, & sapore planè similis est iam dictæ. uno hoc nomine ab eadem differens, quod foliola habet minutissimè dissecta ac serrata, ita quidè ut à Caro discerni ac Pimpinella esse vix credi possit, nisi gustatâ radice.

Est hæc Pimpinella 3. itémque Pimpinellæ crispæ genus Trago. l. c. 156. Vocat hoc idem l. 2. c. 120. Seseli 3. inter descriptiones; 4. inter nomenclaturas, ac etiam Seseli Creticum verum, quod alibi test. Dioscor. de Tordylion, traditur, vel ut habet Egineta Gordylon vocari refert.

Gesnerus apud Cordum in hist. l. 2. c. 122. querit an hæc Pimpinellæ (nunc Saxifragæ) Tragi tertia & minima species, sit Daucus Cyanopus Cordi, quæ à cartileo radicis liquore sic cognominare ait. Nos Daucum cyanopum Cordi (quia quis sit is, nobis nondum constat, licet Gesnerus suspicatus sit, esse Pimpinellam 3. Tragi) suo capite descripsimus, donec quid melius nobis innotescat.

A Dod. gall. appellatur Saxifragia parva altera, Saxifragia 3. quibusdam Dauci species existimata. In foliis. Saxifragia parva, quoad iconem. Miramur Dodonæum olim scripsisse duas minores valde vulgares in Belgio conspici, nunc autem unius meminisse, quasi de incognitis sententiam tulit. Stipium peritis considerandum relinquimus an duæ sint minores Saxifragiæ specie differentes, vel an sit variatio quædam ratione loci & temporis.

Iconem eandem habet Lobelius, cui in Obs. p. 411. hunc titulum apposuit. Bipinella saxifragia hircina minor Adv. p. 321. Thaliistrum Rondeletij: Natrix Phnij Guilandini & Anguillare Item: Minor Saxifragia folijs rotundioribus Pimpinellæ proximis in agro Britanno & Belgio. Icon quidem hæc Lobelij respondet descriptioni Pimpinellæ minimæ Tragi, sed non Lobelij in Adversariis. Ea quæ dicit de folijs rotundioribus conveniunt descriptioni Saxifragiæ minoris in Adv. & cum Tragi Pimpinella altera, quæ est minor nostras.

K 1

Saxif. Dodonzi & Lobelij figuram pictam quoque dat Clusius in hist. quam sic inscribit: Saxifragia Pimpinella germanica minor. Saxifragia autem vulgaris à Germ. Pimpinellæ nominatæ varias inveniri differentias foliorum formâ inter se discrepantes, præsertim in minore, autor est idem Clusius (etiam in pann.) qui ait eam interdum folia singula lacinia- ta habere, aut angustioribus & oblongis incisuris divisâ: quando folia Petroselinî.

Pimpinella Tab. dicitur Pimpinella, crispa sive petræa. Tra- goselinum petræum, Stein Bibernell / Stein Peter- lin / Maur Peterlen / & Brauß Bibernel. Is hanc radicibus, caulibus, floribus, seminibus, odore & sapore cum Trago secundæ similem ait, sed hanc actiorem & inter omnes Pimpinellas acerrimam pronunciat: foliis interim tenuissimè sectis & pul- chri è crispis, ut ferè Petroselinî crispis.

Saxif. par. Schvvenkf. Pimpinella minor crispa: Pimpinella petræa seu saxatilis: Saxifragia parva Dioscoridis; Bräuspe Bibinell / Stein Bibinell. B. phyt. Pim- pinella 4. minor. Ed. pin. Pimpinella 4. saxifra- ga minor: Pimpinella minor, Fuchsf. Turn. Cam. ep. Pimpinella saxifraga minor, Lugd. Cam. Pimp- inella nostras communis minor, Thal. Bipinella, Saxifraga hircina, Adv. Saxifragia 2. Cels. Saxi- fraga hircina minor, Geln. h. & Cam. Dancus seli- noides, Cord. hist. Tragium Dioscoridis Col.

Lacum. Provenit plerumque iis locis, quibus minor, in saxosis videlicet montibus, præcipue in ru- pium fissuris, in veteribus muris & ruderibus, qui- bus radix ita inhaeret, ut nunquam integra evelli possit. Sic evulsiße eam longitudinis cubiti & se- mis, nec tamen integram, testatus est Tabernomon- tanus. Schvv. petrosolis & arenosis delectatur.

Idem cum priore pollet viribus, eodem Schvv. authore.

PIMPINELLA SAXIFRAGA tenuifolia.

EX radice oblonga, caulis viridis, lævis, striatus, geniculatus, statim ad radicem in ramos, & hi in tenues alas divisus, exurgit: folia habet in tenues primùm, dein penè capillaceas partes divisa: stoli- culi exigui, pauci albicantes, in parva umbella: semen non vidit autor C. Bauhinus, qui copiosè ad lacum Genevensen provenire scribit. Vocat in pin. Pim- pinellam s. Saxifragam tenuifoliam.

VIREN ET USUS IN GENERE.

Tempora- Tradiis ita Saxifragiæ differentis, reliquum est, mentum ut vires & usum adscribamus. Pimpinella, inquit Pimpinella Junst. siccata radix Pa- peru loco co- sedatur. Radix siccata loco Piperis in cibo usurpari posset, nam gustu & viribus ita Piperi respondet, ut Piper germanicum non ineptè dici possit. Et meo certè iudicio utilior ac salubrior est omni Piperi, quod ego experientiâ longâ didici. Herba Pimpinellæ radix & semen, Petroselinî facul- tatibus pollent, sed in expellendo, ac sedando dolo- re efficacioribus multò. E radicibus pastillis confici possunt, stomacho frigida intemperie, crassisque ac viscosis humoribus laboranti, passioni etiam colicæ & matrici, quàm utilissimæ. Radix quæcunque ratio- ne sumatur, sive in pulverem redacta, sive in potio- nibus, aut ecligmatis adversus omne venenum fa- cit unicè, dolorem intestinorum lenit, calculis re- num prodest, menses ciet: & si quæ alia per urinam evocanda sunt. Hæc omnia de semine quoque in- telligenda sunt. Nam & Norimbergenses seplasiu] saccharo hoc semen, quemadmodum Foeniculum & Anisum, condiunt. Aqua distillata eandem planè

facultates obtinet, diebus aliquot continuis mensu- ri trium, aut quatuor cochlearium pota. Castoreum in aqua Pimpinellæ decoctum, ac potum, spasmo laborantibus auxiliatur. Tradunt nonnulli [hæc de Tragi l. 1. Sanguisorba potius dixerim] vulnerariam esse her- bam Pimpinellam, capitique maximè vulnera quamprimùm glutinare, si succus herbæ expressus instilletur vulneri: Id verò Pimpinellam præstare

galli gallinacei mortales primùm docuerunt. Nam cranio illorum tubulâ perforato ita tamen ne cere- brum læderetur succum herbæ instillabant, ac her- bam ipsam tusam foris imponebant, quo facto intra paucos dies sanatum est vulnus, unde conjecturâ factâ, capitis vulneribus eam herbam imprimis con- ducere creditum est. Aquâ Pimpinellæ si per ali- quot dies facies abluatur, ea maculas ejus detergit, eamq; claram reddit. Atque hæc à Trago de Pimp- inellæ saxifragiæ facultatibus perhibentur. Quum autem acrimoniam non exiguam in gustu præ se fe- rat, haud dubiè in secundo ordine calida & sicca erit: imò secundum calefaciendi ordinem excede- re credidit Fuchsius, & ad tertium ferè accedere.

Pimpinellæ succus bibitur contra serpentium ictus. Evino pota calculos terit. Stranguriam etiam de- cocta levat. Succus ejus potus omne venenum dis- cutit. Et hæc sunt Facultates, quas illi antiquus her- barius, teste Fuchsi, tribuit. Alij tradunt succum ejusdem faciei maculas detergere posse: Est autem radicis Pimpinellæ tum ulus præcipuus, quum læ- vientis populatim pestilentie contagia arcere co- namur: unicè enim venenis adversatur, & corpora ab hac lue vindicat, ut adfirmant, si tantum in o- re teneatur. Quid certè non potest ea, quam hodie Sanguisorbam vocant, herba. Quare mirum in mo- dum errant, qui hanc cum ea confundunt. Matthio- lus ait radicem, ceu in qua vis tota consistat, exal- facere, siccareque ordine secundo completo, aut tertio incipiente, aperire, provocare, attenuare, di- gerere, atque incidere: Gattinaria & Pandectarius commendant contra phthisin sequens experimen- tum. Recipe Pimpinellam minutissimè tritam, ex qua & saccharo Rosato fac Electuarium, de quo singulis diebus ægroto propinabis, ac insuper Vnc. octo aquæ ejusdem Pimpinellæ, quæ tamen annum non excolescit. Mulieres quibus menstrua retardantur bis quotidie, manè sc. & vespere in in- gressu lecti bibant mediocrem haustum de hujus aqua, in quem Croci modicum sicut & sacchari im- ponant, & menstrua movebuntur. Fracastorius l. 3. de morb. contag. extollit Syrupum Pimpinellæ in febribus malignis, ut sunt in quibus petechiæ appa- rent. Radix pulverizata utiliter propinatur cum vi- no, cerevisia, aut aqua contra quosvis casus & con- tusiones. Dodonæus Saxifragiæ semen ac radicem vehementer & tertio ordine exalfaciens ac resic- cans ait, & partium unâ tenuium. Vtramque urinas movere, stranguriæ ac ischuriæ mederi, calculos co- hærentes dissolvere ac expellere, præsertim si in balneo horum pulvis aut decoctum propinetur: movere easdem menses, ac secundas pellere: joci- notis lienisque obstructions aperire: ventriculi cruditates emendare: tormina colique dolores se- dare: status discutere. Radicem commanducatam dentium dolores sedare, & multam ex ore pituitam elicere. Non secus porro ac Eringij radicem conditi refert Lobelius, ad juvandam concoctionem ven- triculi & viscerum. Colicis affectibus, diuturnæ fe- bri, convulsis, comitialibus, & à serpente demorsis auxiliari, fortiusque mortuos pellere. Potam ex acco- to magnæ commendationis ad pestiferos morbos esse: bonus & ulceribus sordidis succum & folia co- modè illiniri. Palmerius tandem de morfu canis rabidi affirmat Pimpinellam ad præcavendam hy- drophobiam

Galli galli- naces docue- runt mortales.

Faciem redi- dat claram.

Temp: ex Fuchsi.

Stranguria? Succum ad- versus ven- enas.

Error quo- rumdam. Temp. Matth.

Phthisis?

Menstrua retenta.

Syrup. in febribus malignis.

Casus & contusiones. Temp. Don- dan. Ischuria.

Secunda? obstru- ctio. Tormina. Dolor denti- um.

Colica. Fe- bres diu- tina.

Fetus mor- tui. Fiera fer- dida.

drophobiam tantam vim obtinere, ut quicumque eam aliquot diluculis vel in acetariis, vel alio quovis modo apparatus comederit, nihil inde incommodi sentire possit. Io. Bokelius lib. de pest. c. 17. parium virium cum Angelica & Zedoaria radicem Pimpinellæ esse concludit. Sed ego mihi vix persuadere possum hircini odoris & acerrimi saporis Pimpinellam parium esse virium cum grati & aromatici odoris Angelica & Zedoaria: nunquam vidi imponi ejus folia in vinum, ut gratum odorem & saporem acquirat, ut idem censet, sed ut utile tempore infecti aeris efficiatur. Et in hunc finem etiam saccharo conditur, ut gratiam adipiscatur, ac manè jejuno ventriculo facilius masticetur & assumatur, non solum pesti efficaciter resistens, sed & aithmaticis & calculosis utilissima. Curetiam Saxonia de plica cap. 39. in sua aqua ad pestifera, quæ potissimum constat frigidis & temperatis assumat Pimpinellam germanicam, fervidam & scetidam, nescio: melius placeret Pimpinella gallica sive italica, quæ dicitur Sanguisorba, cujus folia grati sunt odoris & saporis. Pimpinellam germanicam, Saxifragiam dictam, non solum formâ (umbellâ sc.) verum etiam facultatibus, à Pimpinella italica seu gallica, Sanguisorba cognominata, his differre ostendit Gesnerus. Quæ à Germanis vulgo Pimpinella dicitur, ab Italis rectè Saxifraga hircina vocatur. Pimpinella autem verâ alia est, Sanguisorba nimirum Fucij, cui à Peponis seu Cucumeris odore nomen inditum puto (inquit ille, epist. ad Cor. Holz.) M autem literam ante P, recentiores indocti sæpè ponunt, & Græci hodie præsertim: quare pro Peponella, Pimpinella ab indoctis vocata est. Vitræque autem vires adversus pestilentiam habere videtur non vulgares. Posterior enim Tormentillæ & Pentaphylli facultatibus insignis est: siccatur, adstringit, roborat & refrigerat modicè. Prior autem (h. e. Saxifraga hircina) calida est in tertio gradu, sicca in secundo, meo quidem judicio, minimè astringentia, tenuium partium, incidens & aperiens, diuretica admodum, & calculos vel arenas potius propellens. In receptis latinè scriptis pro Pimpinella, eam quæ propriè sic vocatur, ponerem. In germanicis verò, vel è germanico sermone translatis, Saxifragam hircinam (i. e. Pimpinellam à Germ. falsò sic dictam) ponerem, ut in Eleotuarij etiam de ovo compositione, si fortè in descriptione vestra ingrediunt. Audivisti fortè rhythmum illum è celo, sc. delapsum:

Nemind Bibernell/
So gnâsend Ir schnell.

Vbi omnino Saxifraga hircina intelligitur. Verba verò germanica sic sonant. Accipitote Pimpinellam & confestim sanabimini. Vulneribus maximè utilem esse prodidit Chabarex, Attilæ regis minor filius ex Honorij Cæsaris filia, qui post parentis mortem (cùm universum regnum Hungariæ intestino bello concuteretur, atque acre prælium commissum esset, quòd inter se dissentirent, cuius filiorum Attilæ regnum cedere deberet, eo quæ prælio omnes Hungari occubissent) solus superstes remansisse fertur cum 15000. virorum, & illis quidem omnibus vulneratis, quos hæc herbâ curasse dicitur, unde factum est, ut postea Pimpinella germanica, Saxifraga dicta, ab eo apud Hungaros, Chabarex, h. e. Chabarex emplastrum appellationem sumplerit. Superfluit paucis referenda, quæ particulatim de usu & viribus scriptis mandavit Tabernomontanus. Amarus & acriter calidus sapor Pimpinellæ satis indicat, eam calidæ & siccæ naturæ esse; prætereaque vim habere attenuandi, detergendi, & aperiendi. Est autem Tragofelinum majus calidum & siccum in principio tertij gradus; minus verò, ac etiam petræum [Saxifraga major, minor, ac minima] calidum

Tom. III.

& siccum in tertio gradu. Herba radix & semen loco Petroselinij Macedonici in compositiones medicamentorum admitti possunt, præsertim autem minora duo, quorum petræum [Saxifraga minima] præstantius est, ideoque præ aliis eligi debet. Pimpinella viridis & tenera in acetaria venit, quæ stomacho appetitum pristinum restituit, & quævis ejus viscosas humiditates consumit. Radix pulverizata, & drachmæ pondere pota in vino, excalfacit thoracem, tussim frigidam levat, ac excretionem juvat. Pimpinella unâ cum radicibus & herbis mense Majo colligenda est, contundenda atque in balneo Mariæ distillanda, & conservanda per annum. Calculos expellit: renes mundificat: menses ciet: pestilentia medetur, &c. De vino è Pimpinella, mulla & succo exsiccat. itemque extracto, extractionis syrupo, radicibus & seminibus saccharo incrassatis, tabulis, seminis oleo expresso, ceu & stillatio, atque sale, plura ex eo adscribere super sedemus, tum quia ingratiore nobis creduntur, tum quia & rariora sunt, nec in officinis communiter parari soleant. De Saxifragæ viribus, Tragij nomine hæc prodidit Columna. Recentiores negant Tragium nostrum dysentericis opitulari; tantumque agnoscunt, ad calculos frangendos aptum esse, & urinas eliciendas, atque ob id contrarium potius dysentericis judicant, ad quos tamen Dioscorides Tragium commendat. Sed si consideretur plantæ substantia & qualitas, gustu percipietur acrimoniam quandam habere cum quadam odoris gravitate, & adstrictione non carere, qua dysenteriam prohibere poterit, præsertim si viscerum imbecillitate proveniat (multæ namque sunt causæ) corroborans jecur, & infirmas partes, per urinam evacuant, & siccant, divergensque humorem, adstringere fluxionem. Quam facultatem etsi recentiores non sint experti: Galenus non denegat, atque propter adstrictionem, quam habere Tragium ait, posse dysenteriam, & similes fluxiones sistere. Et sic calidæ facultatis poterit incidere, & abstergere, calculos minuere, & urinas movere; siccantis & adstringentis, dysenteriam & alias fluxiones à contraria causa effectas emendare. Quorum exempla non pauca apud Dioscoridem & Galenum extant, ut eadem calculos frangant, & menses moveant, eademque dysenteriam & diarrhæam sistant propter adstringentem facultatem, calidæ vi mixtam. Sed hæc Medicis sunt relinquenda. De Dauco selinoide (quem ad Saxifragiam mediam referimus, vel etiam ad majorem) hæc scribit Cordus. Radix, inquit, gustu acris & servida est, quæ si diutius, cùm recens adhuc est, attrectetur, manûsque ad os & nares feratur, eas partes, quibus admotæ sunt manus, leviter exulcerat: idem efficit decoctæ sapor & halitus: insuper etiam capitis gravedinem attractoriâ vi, quam efficacem habet, facit: odorem spirat similiter acrem: semen utraque facultate radici respondet.

SANGVISORBA MINOR.

CAP. XLIX.

RADICE longâ, fusâ [Matth. lignosâ, subruscenscente, & adstringentis gustus] cum amarore aliquo adstringente, tenui, ex pluribus in unam coëuntibus compositâ nititur, ex qua caules attolluntur pedales & cubitales, spadiceî, angulosi, in quibus capitula glomerata, pluribus flosculis cōsertim congestis, quorum singuli, ubi quaternâ foliola, extra purpurascentia, intus virefcentia explicaverint, flamma numerosa ostendant, nunc lutea, nunc purpurantia, breviora aliâs, aliâs mucoso barbuto, vincti



circiter dependentia [Matth. capitula squammola, sub-puniceo colore] in his deinde semen.

Folia [Matth. ab una radice numerosa, complura ab uno tenui pediculo utrinque prodeuntia, humi jacentia] Melonis odore, saporeque cum adstrictione, pinnatim disposita in pediculo tenui, rubescente, hirsuto, exigua, subrotunda, circūquaque profundè serrata, supinā parte atrovirentia, pronā glauca.

Saxifraga Nos hanc Sanguisorbam, sicuti & sequentem non umbelliferam, hic reponimus post Saxifragiam hircinam, quia uti illa à Germanis Pimpinella vocatur, ita hæc Gallis & Italis, seu jam aliquoties monuimus, etiam Pimpinella nominatur, maximā æquivocatione, unde insignes errores oboriuntur.

Affinitas Quanquam autem forma radice, soliorum, & *signa cum* caulium in herba, quam modò describendam sumpsi- *mus.* mus, Pimpinellæ quadantenus respondeat, tamē si & odorem & gustum spectes, plus illa cum recenti glande, quam Pimpinella affinitatis habere certò cognoscitur. His addit Tragus quòd folia hujus ad cæsum quodammodo inclinant colorem, ac molliora, tenerioraque sunt quam Pimpinellæ. Quòd caules habet purpurascetes, læves ac tenues, veluti culmus, modicæque lanugine hirsutos, qui non umbellis, uti in aliis Apiorum generibus videre est, conspicui sunt, sed potiùs gerunt in fastigio capitellā rotunda, foraminulenta, ut earatione rudimentum savi satis exprimant.

Sanguisorba minor. Fuch. Sanguisorbam minorem foliis minoribus, cauliculis autem majoribus esse tradit, quam majorem. An autem hæc à Fuchsiò ritè observata sint, judicent Botanici. Is enim jejuniè has duas plantas describit & distinguit.

Antiquis Antiquis porrò, referente Lobelio, putatur indi- *dicta.* dictæ omnes Bipinellæ differentiz, idque recens nominis adeptæ à soliorum binis ordinibus pinnatim, plumatim, tarsiue effigie digestis: cujusmodi Filipendulæ. Harum autem minima, frequentissima ruri & domi notissima est pedem aut cubitum alta, exili radice, exiguis Pentaphyllis, sed numerosis & teneris turionibus, oleraceis multis foliolis, æquis spatiosis Chamedri vel Eufrazie similibus, ambitu crenatis, & binis ex aduerso positis: summis in caulibus rotundi flosculorum glomeruli muscoli, interdum puniceo ex candido, interdum subfulvi insunt, qui floribus elapsis Adonidis, vel Mori fructum exprimunt.

Saxifraga Cæterum, hujus videtur meminisse Hermol. co- *roll.* roll. 625. his verbis. Quinti Saxifraga eadem est, *Quint.* aut proxima ei quæ Pampinula, Pimpinella, & Bi- *Marcell.* pennula, & Sanguisorba ruri dicitur: quoniam vul- *Pampinula* neribus injecta ferrum & spicula faciliè ac citra sensum doloris exigit. folio parvo, orbiculato, & extremitatibus serrato: quod & mandi soleat parata oleo, sale, aceto, surculis ab eadem radice pluribus, atque densis, rubentibus cum radice, ut ferunt. quibuldā locis vermiculus eruitur, sericis tingendis idoneus, &c. Vide H. n. g. lib. 7. de Cocco radicem.

Videtur autem Hermolaus non novisse discrimen *Hermol. non* inter Saxifragam & Sanguisorbam: nos intelligere *caus.* non possumus, quomodo herba insigniter adstringens spicula extrahere possit: ea etiam opinio displicuit Fuchsiò.

Dum Ruellius aliorum scripta, ut Hermolai, pro *Ruell. sibi* suis vendicat, sibi contradicit, confunditque plan- *contradict.* tas, ut ex modò allegandis locis patebit. Elatine *Elatine pā* pampinaria (inquit l. 2. c. 336.) si alia est ab ea, quam *pampinaria.* nostrates Galli Pimpinellam, aut potiùs Pampinulam dicunt, germanum certè genus illi fuerit. Enimvero Pampinulæ folia latè crenantur, thyrsuli quoque flosculis micant, ex cæso candicantibus, in quæ nascuntur capitella rufescentibus punctis maculata. Nonnullis Bipennula & ruri Sanguisorba dicitur, &c. Idem l. 3. c. 94. Non sunt audiendi, qui Pimpinellam vulgò dictam esse existimant Elatinem, *Elatine non* cum etiam natales situs aduersentur: nam in pratis *est.* incultis, nec vltquam subactò Solo nascitur, imò potiùs horret sativa, nec ramulis exit à radice foliosis. Est autem folio piloso, latè crenato, exili, in rotundum oblongo, thyrsuli foliis emicant ex cæso candicantibus, &c.

Teucrium Brassavol. in exam. simpl. Teucrium Dioscorides *Dioscoridis* facit, negans, & meritò, esse Thryallidem. Ejus ver- *Brassav.* ba hæc sunt. Pimpinellam apud antiquos nunquam inveni. Hermol. lib. 4. sui coroll. cap. de Saxifraga eam mirè describit, quæ hydropicis multum valeat. est valdè similis Saxifragæ, unde carmen:

Pimpinella pilos Saxifraga non habet ullos.

Gaza Theophrasti interpret per Thryallidem, Bi- *Thryallis* pinellam interpretatur, si autem per Bibinellam *Gaza.* hanc intelligit, quam Pimpinellam Ferrariz dicimus, in acetanis gratam, longè errat. Nam constat *Gaza or.* Thryallidem herbam, Pimpinellam non esse: semina in morem Mori rubi facit, dicitur etiam Pampinula, Bipennula, & à rusticis Patavinis Sanguisorba, à Ger. Bibernell. Si Thryallidem conferamus, ut Dioscorides pingit in Phlomide, nullam habere Pimpinellam cum Phlomide similitudinem statim constabit. Verum si Theodorus hoc nomen Bibinella Thryallidi tribuerit, ut linguam latinam ampliare, encomio dignus est. At ex altera parte arguendus, qui inepta nomina sequatur, cum apud nos id nomen Thryallis in usu sit, ut apud Plinium constat virum Latinum, idèd non est opus in herbis ita temerè nomina immutare. Idem: Pimpinellam suspicor Dioscoridis Teucrium esse, & figura illi satis affinis est, imò vires quoniam lienosis & venenatis succurrit. Hæcille. Nos Thry- *Thryallis* allidem Theophrasti, quam Gaza Bibinellam *Theophrasti* interpretatur, diversam existimamus à Dioscoridis Thryallide, sive Phlomide, aut Verbasco, cui non ipica Plantaginis, qualem requirit Theophrastus. Nolumus etiam dicere Pimpinellam, sive Sanguisorbam esse Thryallidem Theophrasti: Teucrium, quod à Neotericis, ut Fuchsiò, Cordo in Diosc. Matthiolo, Dod. gall. Lac. Lon. Lob. Cas. & Castore, itèdque aliis, proponitur, melius convenit cum Dioscorideo, quam nostra Sanguisorba.

Pimpinellam Germanorum sive Saxifragiam, *Agricola* cum Italarum Pimpinella hæc, sive Sanguisorba *sejam.* nobis videtur confundere Agricola: dicens: Brassavolo Thryallis non est Pimpinella, sicut Gaza in Theoph. vertit: Pimpinellam quidam Pampinulam, Bipennulam & Sanguisorbam vocat. Idem alio loco, Teucrium Pimpinella est. Idem rursus, Pimpinellæ nomenclaturam vide in dictione Teucri: Manardus Saxifragiis connumerat, calculos enim comminuit, urinam supressam ciet, stranguariam solvit, & venena peste insectorum arceat à corde.

Quodnam gentium Pimpinellæ hujus Italice *Pimpinella* (quod Pimpinellæ Italice primum genus vocat) & Ital Trago *ital Trago* sequentis,

sequentis, nomen sit, scire nondum potui, inquit Tragus. In agro VVormatiensi & Spirensi, Bergoto Bärlein/h.e. Barbulam Dxi, illas vulgò nūcupant, fortassis à spadiceo colore. Ego in ea aliquando e-ram sententia, cum Pimpinellæ similis sit, ad Apia referri posse, verum multa sunt, quæ repugnant. Nec desunt, qui dicant eam esse veram Italicam, seu hortensem Pimpinellam, qui mihi certè neutiquam satisfaciunt, neque enim illorum sententiam probare possum. Hæc Tragus. Cur autem illorum improbet sententiam, qui Pimpinellam hanc Italarum esse censent, rationem non habet. Quandoquidem planta, de qua hic agimus, à multis in Italia & Gallia excolitur nomine Pimpinellæ.

Quum porro ignoraret Fuchsius, quo nomine stirpem hanc veteres Græci & Latini (si modò iis cognita fuit) appellarent, maluit quidem vulgari uti nomenclaturâ, donec aliud certius nomen inveniretur. Interea tamen Elatines esse judicaret, si folia pusilla, pilosa, & rotunda obtineret. Nunc quum neq; pusilla, neq; pilosa, neq; rotunda; sed mucronata esse videantur, certi statuere nihil potest. Sanguisorbam verò dictam esse ait hanc herbam, non quòd vulneribus injecta ferrum & spicula faciliè & citra sensum doloris (ut habet Hermol. & ex eo Ruell.) exigat, ut nonnulli arbitrentur: id ipsum enim non posse, mirificam, quæ illi inest, adstringendi facultatem abundè ostendere: sed potiùs quòd ei in sistendo sanguine, undecunque emanarit, mira admodum insit efficacia, adeò ut hunc ipsum quasi absorbere videatur. Erroris autem huius nullam aliam causam esse, nisi quòd hanc stirpem multi cum ea, quæ hodie Pimpinella Germanis vocatur, confundant: quæ certè propter caliditatem, quam obtinet haud exiguam, quandam etiam trahendi facultatem habere videtur, adeò ut infixâ corpori extrahere faciliè queat. Quòd verò cum Pimpinella confuderint non alio factum est nomine, quàm quòd huius folia proximè ad Pimpinellæ folia (quæ itidem ut hæc serrata sunt) accedere videntur. Sed hæc confusio non caret errore. Germanis hæc herba *Kolbles Fraut* à capitellis, quæ rufescentibus punctis maculata sunt, dicitur: Quibusdam etiam à sistendo sanguine, *Blut-Fraut*. Bona pars Gallorum *Pimpinelle* eam vocat.

Si Corn. in Diosc. l.4.c. 123. per *Bleine Bibernell*/Pimpinellam minorem, quam quosdam herbarum peritos hodie Polygalon esse velle scribit, Sanguisorbam intelligit, nobis erronea eorum opinio videtur.

Sideritidem alteram, Pimpinellam in Italia dici, totam Græciam dictitare prodit Guiland. in Theone. Chios, Rhodios, Peloponenses, Corcyrenses, ceteros Pimpinellam, hodie Sideritidem nominare. Sed se nescire fatetur quod monstrum, magnus ille *Amari peccatorum expiator*, pro Sideritide asserat.

Cordus apud Diosc. Pimpinellam hanc Italarum, quam germ. *Bluttröpflein*/h.e. Guttulam sanguinis appellat, rectè à Pimpinellis Germaniæ diversam ait. Huius etiam duas esse species tradit, unam purpureo, alteram pallido; cum floret, capitulo. I-tem in Dispen. ad unguent. Mart. mag. Nicol. Alex. totateo loci Pimpinellam non significare germanicam, h.e. Saxifragiam, sed Italarum, Sanguisorbam dictam, cui radicem tribuit rubram, Tormenthille sapore. Nasci in pratis unam ejus speciem, alteram in montibus: Italos acetariis miscere, habereq; Cucumeris odorem. A Cordo circa Pimpinellam in dicto Unguento dissentit Fuchsius, qui Nic. Myrepsum non Italicam, sed Germanicam intelligere contendit, quòd huius facultas in præsentì unguento a-riis potiùs, quàm alterius adstrictoria requiratur.

Fuchsius autem oppugnat Coldembergius his verbis: Fuchsius per Pimpinellam in Vng. martiato non Sanguisorbam Germanis vocatam, cum Cordo hic intelligendam esse vult: idque ea propter, quòd adstrictoria suâ facultate huic medicamento malè convenire existimet, quasi verò nihil unguentum hoc præterea recipiat, quòd adstringat atque etiam refrigeret. Cùm Italia multò priùs quàm Germaniæ unguentum istud innotuerit, Pimpinellam Italarum hic intelligendam esse censeo. Adolph. Occo contra utramque admittit, non sine errore, nihil certi concludens, nec differentiam inter has fortassis agnoscens.

Quomodo apud Græcos, aut Latinos sit appellata Pimpinella, inter autores non convenit, id quòd partim ex dictis constat & partim ex mox dicendis patebit. Ruellius enim loco supra citato Elatines pampinariz, Cronemburgo etiam referente, germanum genus constituit: Brassavolus Dioscoridis Teucrium suspicatur: Sunt qui Tragium contendunt, quàm autem verè, judicent, quibus est exacta rerum notitia: Falluntur qui cum Sanguisorba, Onochelone vel Alcibiadione conjungunt. Tragus inter Apij genera Dioscoridis, jure maximo numerat, peculiariterque Petroselinum in Macedonia nascens, sive Apium saxatile, sive Petrapium judicat, cui Cronemburgus (cujus verba hic recitamus) acquiescit.

Meminit hujus Apollo Rad. in Elect. ad pestem, nomine Bipinellæ, quam testatur corruptè Pimpinellam, quibusdam Solbastrellam, aliis autem Sanguisorbam dici: perbellè pingi ab Hermol. & sui Coroll. cap. de Saxifraga, cujus speciem aliqui conceperint, hanc tamen depilem esse, illam verò nequaquam: quumque Dioscoridis Teucrio aliquantulum alludat, idem esse suspicari, alios Elatinem, quamvis reverà vel antiquioribus incomperita existerit, vel Syderitis altera Dioscoridis sit, de qua l.4. et si Matthioli à Luca Ghino, obrepticam plantam sibi transmissam, latino volumini appingat: Bipinella tamen meminisse Theophrastum 7. hist. c. 10. in jugis Crepacorianis.

De hac loquuti sunt Monachi in Mef. dist. 11. cent. 382. de mistura ad vulnera sananda. Pimpinella, sive Pampinulla, aiunt, herba est ita ferè cunctis viventibus notissima, sicut & prisca fuit incognita. Abundè recentiores de ipsa tractarunt: tamen nullus ipsorum valuit apud quempiam priscorum invenire. Vnde quasi omnes tenent hanc cum aliis pluribus veteribus fuisse incognitam. Quòd quidem valdè mirandum est. Neque nos etiam hucusque potuimus ipsam apud aliquem antiquorum capitulare. Sed omisissis aliorum omnium judiciis, nos putamus vel ipsam propriè Saxifragiam, vel speciem ejus esse. Nam & in saxosis libenter crescit, & ad calculos in vesica frangendos valdè efficax est, ut pluries expecti sumus. etenim cùm plures sint Saxifragiæ species, inter eas non est absolum & Pimpinellam connumerare. A nonnullis etiam Sanguisorba appellatur. Et à Pandeatio in litera F, Fillum Indicum, Pimpinella interpretatur. Fuchsius inter Sanguisorbam & Pimpinellam fecit differentiam, & utramque duplicem pinxit. Hæc illi viri reverendi, qui si discrimen inter Pimpinellas Italicas & Germanicas noverunt, cur non demonstrarunt, quam Pimpinellam intellexerint. Pimpinellam Italicam nunquam crediderim dici posse Saxifragiam, multò minùs calculos frangere in vesica, quicquid jactent salacem suam experientiam, & quòd majus est, tantùm abest ut adstringentem Sanguisorbam frangere calculos vesicæ credam, quia firmiter mihi persuadeo nullo medicamento posse frangi quòd hætenus observare potuerim.

Apia.

Trag. refertur.

Contra Hermol. & Ruell.

Error multorum de spicula extrahendis unde procedat.

Polygalon

Sideritidem altera.

Amari peccatorum.

Cordus sanguinis.

Dispen. totateo loci Pimpinellam non significare germanicam, h.e. Saxifragiam, sed Italarum, Sanguisorbam dictam, cui radicem tribuit rubram, Tormenthille sapore.

Videtur admittitur.

Cronemburg.

Lappus quæ-rundam.

Apollo.

Solbastrellam.

Matth. cap. 11.

Monach in Mef. Pampinulla.

Saxifragia

Fillum Indicum.

Noverunt culpantur.

Pimpinella 7. Sunt (autore Matth. in Diosc. l. 4. c. 31.) qui Italianam Pimpinellam, tertiam faciunt Sideritum, quibus ille haud adstipulatur: quippe quoddam illi folia Coriandri non sint, nec eadem circa caules orientur, sed pinnata, è longo utrinque pediculo exeant. Item quoddam caules præduros gerat, non teneros, ac etiam quoddam flores, capitulaque, nec amaro, nec leni gustu habeantur, sed adstringenti & austero. Sed Matthioli in gustu sibi contrarius, ipsemet scribit mansuetiorem copiam præbere: Fuchsius quoque viscositatem præ se ferre prodidit. Matth. porro c. 36. refert quosdam Elatines Dioscoridis dicere, sed sibi eam opinionem non placere: siquidem Pimpinella, aliàs Sanguisorba dicta, ramulis exeat longè pluribus, quàm lenis (præter Dioscoridis mentem) in terram procumbentibus, & folia habeat undique in ambitu laciniata, Asterisci modo. Idem c. 45. Pimpinellam aliam vocat, diversam à Pimpinella Saxifraga, Italiam vulgò Solbastrellam nominatam.

Sideritis 8. Ang. epist. 14. facit Sideritum secundam Pimpinellam Italianam communem, ex opinione Hermodori Listarii, acin Chia adhuc vulgò Sideritum vocari perhibet. Idem postea nominat Pimpinellam vulgarem, edilem in acetariis, ad cujus radices colligi ait Chermes quibusdam dictum.

Oenanthe 9. Fracast. l. 3. de contag. morb. l. 6. ad curationem febrium, quæ Lentulæ dicuntur, præscribit syrupum de Pimpinella, quam ait ad Oenanthem genus referri posse, & appellari Oenanthillam. Nobis autem nondum constat, quâ ratione ad Oenanthem genus sit referenda.

Carol. Steph. in hort. Bipinnellam vocat, præterque hætenus dicta, ejus contrafactum caulem, veluti nervum quendam habere narrat, cujusmodi in Plantaginis folio contrafacto apparere solet.

Lonic. 10. Lonic. qui non distinguit duas species, dicitur Pimpinella 4. & Pimpinella Italica, vel sch. Bubenell. Cast. Pimpinella sanguisorba. Gesn. cat. Elatine pampinaria: Eid. h. Pimpinella minor silvestris, quam in collibus siccis crescere tradit hirsutam modicè: Haberi & sativam lavem: non aliter, ut opinatur, quàm cultu à silvestri differentem, teneriorem, & acetariis expetitam, in quem usum, silvestrem adhuc teneram substitui posse concedit.

Pimp. minor 11. Dod. gall. hanc Pimpinellam minoris titulo pictam dedit, lat. verdè Pimpinellam sanguisorbæ quæ non parum differat ab ea Pimpinella, quæ Saxifraga vocatur. Esse autem ait hujus duo genera, unam minorem, ut plurimum hortensem, alteram majorem, totâ naturâ silvestrem. Folia hortensi esse oblonga, ex pluribus ad unum pediculum congesta, quorum singularia subrotunda, ambitu crenata; non nihil hirsuta: inter hæc caulem non omnino foliorum viduum, aliquantulum striatum, in cujus fastigiis capitula rotunda, quæ exiguos flosculos purpureos, deinde angulosa proferat semina simul contrafacta. radicem subesse longam. odore hanc Pimpinellam peponem aut cucumerem aliquo referre modo. eam recentiores Pimpinellam appellare & ad differentiam alterius, Sanguisorbam, quamvis & seorsim Sanguisorba & Sanguinaria nuncupata reperitur. Gesnerum Peponellam dicere maluisse, à Peponum odore.

Duple 12. Alios Pampinulam, aut Bipennulam, plerisque Solbastrellam nominare; Germ. Negelkraut/ Gall. Sanguisorbe, Pimpinelle cultivée, h. e. Pimpinellam hortensem: Angl. Bûrnet. Cæterum cum altera Sideritide Dioscoridis, inquit, convenit: solum (& præsertim minoris hujus) simile est Trichomanis, quod ex Filicum est genere, & *Wiem* quoque appellatur: semen angulosum rotundius est, & durius quàm Betæ; respondent & reliquæ ac simul facultates, ut

Sanguinaria 13. Peponella. Peponella.

Sideritis 14. Quid. Sideritis.

ex ipsa Sideritidis alterius descriptione satis manifestum. Potest verdè & eadem hæc esse, quæ à Plinio l. 24. c. 17. Sissiepteris in Perside nominari traditur, quoniam hilarentur ea. Eandem & Protomediam appellat, ac Casigneterem, tum & Dionysionympha. de n. quoniam vino mirè convenit, cui quoque hæc Pimpinella, suavem gratiam confert: Nec repugnat, quod de Sideritidibus alio loco Plinius egerit: Non rarò siquidem evenit, ut de eadem stirpe sub differentibus nominibus diversis locis agatur; quod tunc citius accidit, quando ipsis scriptoribus stirpes non satis notæ sunt: veluti Sideritidem Plinio non satis cognitam fuisse, vel ex eo apparet, quoddam non nisi aliorum de hac sententias adferat.

Pimpinella recentioribus vulgò apud nos Italos (inquit Cal.) Sorbastrella, à sorbendo dicitur; nam sanguinem ex vulneribus sorbet & vulnera glutinat: in cauliculis cum acuminibus capitula ex granis congestis habet, quibus flosculi insident constantes ex quaternis foliolis herbaceis, media quadam lanugine rubra: fructus angulosi, asperi, duri, quibus bina semina continentur: radix unica est Raphano similis. Extant ejus aliquæ differentie magnitudinis & parvitat. Fama est alicubi cum ejus radicibus vermiculum erui. &c. Pimpinella sapore constat astringente, cum quadam dulcedine subacri. Apud Dioscoridem Tragium dici puto, quod secundo describit. folia in Autumno hircum redolent: unde nomen Tragij. Quamvis autem hirci odor in Saxifragia manifestus sit, quæ & Pimpinella ob foliorum similitudinem dicta est: facultas tamen astringendi & usus in cibis huic inest non Saxifragiæ. Hæc ille, qui quamvis videatur discrimen facere inter Solbastrellam Pimpinellam, & Pimpinellam Saxifragiam, apparet tamen eum tribuere Solbastrellæ, quæ ei non conveniunt: sed potius Saxifragiæ Pimpinellæ nempe radicem Raphano similem & odorem hirci: planè etiam displicet opinio de Tragio: suspicamur omnino eum duas confundere Pimpinellas: præterea differentie Sorbastrellæ non solum consistunt in magnitudine. De vermiculis ad Pimpinellæ radices nascentibus, in lib. de stirp. nat. pertraxit Costus, & nos H. n. g. lib. 7. copiose egimus. Adrianus autem Spigel. Itag. l. 1. c. 7. radicem Pimpinellæ in Polonia non vermiculos, sed granula quadam rubra, quibus lanæ purpureo inficiantur colore, proferte perhibuit.

Columna Pimpinellam vulgò Italiam dictam, Sideritidem secundam Dioscoridis credidit. Thal. Pimpinellam minorem passim in Hircynia nasci prodicit. Cam. h. Pimpinellam sanguisorbam minorem nominat: ut & in hist. Matth. germ. In epit. Pimpinellam sanguisorbam. Textor l. 1. de peste c. 7. Bipennulam & Bipinnellam, eam verdè non distinguit. Robert. Const. Myosotim Sylvi.

Lob. adv. p. 320. Pimpinellam aut Bipinnellam antiquis jure merito indictam dixit, vocarique ger n. Blutwurze / i. e. Sanguinariam, vel Sanguisorbam. Idem tamen rursus p. 322. videtur Sanguisorbam bipinnellam Sideritidem alteram Dioscoridis credidisse. At enim: Cunctas ejus partes si Dioscoridis contras descriptioni, nihil planè deesse, nihilve superesse facile intelligas: quin qui in eum sentiunt doctores, narrante etiam in Chio insula Sideritidem vernaculo adhuc supersiste nomine dici. Senenseni inscitia specimen dedisse clamant, ubi carpetur quosdam, qui Pimpinellam hanc, tertiam Sideritidem autumant. Atqui nullum in seipsum putamus, quin facile videat, cum tertia nihil prorsum, sed cum secunda penitus quadrare Pimpinellam. Inconstans Lobelius ipse inscitia nota se defecit, nunc concludendo, Sanguisorbam antiquis indictam, nunc querendo, adhuc etiam in Obs. p. 440. n. Sideritis

Sideritis altera Dioscoridis sit? Sed quid tergiversatur adhuc Sideritum alteram Dioscoridis asserere? si cunctæ, ut ait, Sanguisorbæ partes, Sideritidi alteri Dioscoridis adsint, nullæque supersint? Cur in Obf. p. 412. Pimpinellam & Bipinellam, Sideritum Ang. & Guilandini inscripsit, & non potius Sideritum alteram Dioscoridis? Cur in Ic. p. 718. simpliciter Pimpinellam?

Thylli
Theoph.
Porta
Pimpinella nobis vulgò dicta, inquit Porta Villz l. 10. c. 19. si divinare licet, *Thyllis* est Theophrasti, nam ejus interpretes Gaza Bibinella vertit. Dioscoridis autem *σίδιρις τεύλη*, quam Cratevas Hieracium vocat; Plinius spicatorum genus & Thryallidem. Sed quis sanæ mentis Philosophus cum Porta concludat hoc modo? Interpretes Thyllum Theophrasti vertit Pimpinellam, ergo est Pimpinella. Quæ quæso necessitas consequentia? Concedéne Porta tale Enthymema: Quidam te indoctum dicit, ergo es indoctus. Agnoscis credo errorem. Cum Sideride, nihil communis habere docent, præter Matthiolum & Lobelium utrorumque descriptiones.

Sanguif.
minor Tab.
Sorbaria
minor
Pimp. (an-
guinaria
Sorbariella
montana.
Tab. ic. dicitur Sanguisorba minor (ut & Schvven.) Sorbaria minor: Eid. h. k. Sanguisorba minor, Sanguif. 2. Pimpinella Italica minor, Pimpinella sanguinaria minor, & Solbastrella montana; Germ. *Blein welsch Pimpernell / Flein Sperbentfraut / Flein blut fraut / Flein Bergottebärtlin / Flein Folblanß fraut / Flein blutetropfflein / & Negelfraut*: Belg. *Eleyne Pimpernelle*: Gall. *Sanguisorbe & Pimpinelle*: Ital. *Pimpinella minore, Solbastrella & Serella minore*: Angl. *Lytle burnet*.

Pimp. mi-
nor Ital. &
Gall. & Sa-
guisorba
Germ. Clin-
th.
Clus. Pimpinella minor Italicorum & Gallorum, Sanguisorba Germanorum. Lugd. p. 1087. Pimpinella minor Mathioli. Bauh. phyt. Pimpinella 6. five minor hirsuta; Pimpinella Italica 1. Tragi. Item: pimpinella 7. five Sanguisorba minor lævis, cultu ab illa solùm different. Eid. B. pin. Pimpinella 7. Sanguisorba minor hirsuta; Pimpinella Italica minor, Thal. Pimpinella silv. hirsuta, Gesn. h. Pimpinella hortensis, Ger. Sideritis 1. Diosc. minor, Col. hæc apud Monspelienfes minor & valdè pilosa reperitur. Eid. rursus Pimpinella 8. sanguisorba minor lævis, Gesn. h. Cultura solùm à priore differre videtur, cum in usum acetariorum ab Italis in hortos feratur.

Lami.
Invenitur hæc planta in limitibus agrorum aridioribus ac asperioribus: in cultis item agris & campis, maximè verdè iis, qui aprici existunt, soli sc. expositis, unde colligit Fuchsius non esse Elatines. Exit præterea petrosis & montosis asperis locis, veluti etiam in æditis, plerisque Bohemæ, ac Belgij, itémque Germaniæ locis, per Hungariam, Austriam & Styriam etiam in pratis, florens Majo & Junio. In hortis quoque studiosè nunc feritur cibi gratiâ: quamvis quoque lucis & opacis affatim citra cultum erumpat. Ferrariæ quidem in hortis habetur magna copia, sicut etiam Monspelij, Lugduni & Patavij in horto Iesuitarum: Venetiis ad litus maris: Genevæ virens Hyeme: Basileæ in urbe ad fluvium Birsæ, & in pratis, ut circa castellum Hermes, florens Majo: Montbelgardi passim spontanea & hortensis: prope Malmünster in monte Rößberg. Pedum calcatu nobilis evadit, quo pressa Peponis odorem in nares ejaculatur, qui minimè olfactus sensum vibratus offendit, sed quadam jucunditate recreat. Pimpinellæ herbæ folia cum ramulis & scorsum semina servanda. In hortis semel lata diutius durat & ex semine se propagat.

VIREB ET USUS.

Tip. Tragi.
alibi sola.
ta.
Profluvia
refringunt.
Reliquum est, ut de Sanguisorbæ viribus agamus. Hæc planta, inquit Tragus, & sequens ad calidam accedunt temperaturam, quare adversus quotidiana alvi profluvia usurpari fortè possint. Tradunt non-

nulli in suppressendis ac restringendis sanguinis profluvii, dysenteris, aliisque alvi fluxionibus, necnò & muliebribus profluvii, esse efficacissimas stirpes, aded ut quidam constanter asserant, etiam manibus gestatas sanguinem undecunque manantem sistere. id quod experiatur, quisquis volet. Nos etiam considerandum proponimus, an hæc & sequens planta non accedat potius ad frigidam temperaturam, quàm ad calidam: Schvvenckseam siccat tertio; refrigerare autem secundo gradu dicit. Quia autem gustantibus adstrictionem haud vulgarem ac viscositatem (authore Fuchsio. Matthiolo enim non est lento gustu) herba hæc præ se ferre videtur. Ea propter siccam admodum consistentiam nacta est, simulque corpora contrahere, & constringere potest: atque aded emplastice, ed quod glutinosa, sit, facultatem obtinet. Ex his itaque abundè constat, utramque Sanguisorbam in restringendis ac suppressendis sanguinis profluvii esse efficacissimam. Experientia certè compertum est, ad muliebri profluvium sanandum nullum posse reperiri præsentis his stirpibus remedium. Glutinant etiam vulnera illarum folia; carcinomatibusque & fistulis medentur. Generosum denique ac strenuum præsidium easdem esse ad dysenterias, & reliquos ventris fluxus, si ex aqua aut vino bibantur, nemini non notum est. Quid multa? Elatines herbæ, cujus hæc stirpes genus esse videntur Fuchsio, iis facultates earum attribuit. Quare toto celo errant qui herbas has cum Saxifragia confundunt; à quibus, viribus longè distant, teste etiam Matthiolo, qui hanc gustatam non leviter adstringentem percipi refert, & mansam lentoris copiam præbere, glutinare, siccare, & resolvere & cohibere. Vnde facile conjequitur eam esse adstrictoriz facultatis. Hinc itaque fit ut præter quod sanguinem undecunque manantem, etiam biliosas vomitiones reprimat. Herba ipsa vulnera & ulcera sanat, misceturque unguentis, quæ tum ad capitis vulnera, tum ad carcinomata parantur. Natat sæpè in poculis vino repletis, quod gratiam quandam, jucunditatemque potantibus afferat. Hæc Matth. Curtius contagiosis pestilentibusque febribus maximè commendavit.

Emplastica
tu.
Pulvera.
Carcinoma.
Error mul-
torum.
Pocula.
Febres po-
stul.
Brassavolus autem lienosis succurrete & incipientibus ascitis proficere prodidit. Ego tamen non facile præscriberem in liene indurato: plurimum siquidem adstringit: an porro utilis in ascite & quæ ratione considerandum. Non suaderem præterea statim ab assumptò veneno exhibendam: verùm si dysenteria à veneno orta diutius perseverarit. Moccus in Analceve morb. cap. de phthisi meminit Eleuati de Pimpinella Sardi, quam fieri ait ex pulvere foliorum cum melle vel saccharo, de quo ægroto sumendas præcipit omni manè Drach. duas cum Vnc. tribus aquæ Pimpinellæ recens destillatæ. Per Pimpinellam autem Sardi nos intelligimus Sanguisorbam. Modum Sanguisorbam administrandi sequentibus docuit Dodonæus: Sanguisorba Pimpinella, aut Peponella, inquit, præter eximiam refrigerandi ac astringendi facultatem, refrigerat quoque mediocriter: habet verdè & minor superficietenus quandam leviter odoratam & temperatam qualitatem, quam in vinum in jecta deponit: hæc nec arida herbæ adest, nec succo, aut decocto communicatur. Ad vulnera autem Sanguisorbæ vis singularis est (quod & de Sideritide altera Diosc. asserit) & à quam plurimis laudata: sanguinem supprimit (Sanguisorbæ inde nomen accepit) æquè intro ac foris adhibita. Datur autem vel succus, vel decoctum, vel ipsius herbæ foliorum aridorum pulvis forinsecus contusa imponitur, vel aliis externis remediis admiscetur. Poculis tandem herba virens gratiam conciliat inter bibendum, sapore & odore aromatico & vi-

Authorum
conjectura
de tempera-
mento.

Emplastica
tu.

Pulvera.
Carcinoma.

Error mul-
torum.

Pocula
tu.

Febres po-
stul.

Brassav.
notat.

Phthisis.

Temp. Dis.

Vulnera.

roso, quoddammodo Melonis: nec minus in acetariis expentur: ex oleo namque sale & aceto à Belgis, Anglis, Gallis & Italis non insuaviter editur minor, quibus ad hilaritatem facere creditur. Peramica porro visceribus, hepati, cordi, & præserim spiritibus perhibetur: magnæ commendationis etiam ad pecculentes morbos, ut cuius succo etiam abigantur febres exitiales. Astringentia vi & exsiccante pollet, citra mordacem vellicationem: eoque internis & externis sanguinis eruptionibus opitulatur. Fernel. 4. m. m. 5. Pimpinellam ad virulentarum bestiarum ictus commendat. Lib. autem 3. cap. 20. calidam siccanque ordine secundo, absterfionis, adstrictionisq; participem ait, ac tabidis aptissimam: cruentas excreationes sistere, sordidas ac purulentas expurgare, ulcera detergere, misce siccare, & agglutinare. His addit cap. 25. ex vino potam calculos terere. & stranguriam decoctam juvare. Libro 6. cap. 13. hæc habet. Pimpinellæ folia tula aut etiam cocta, si aperam venam attingant, protinus sanguinem sistunt, quod & radix luculentius efficit: eadem quoque modo sumpta sanguinis vomitiones excretionisque supprimunt: subdita verò mulierum purgationes, hæmorrhoidalesque cohibent. Ex his Fernelij verbis apparet ipsi non fuisse notam differentiam inter Pimpinellam hæc Italicam seu Gallorum, quæ Sanguisorba dicitur, & Germanorum, quæ Saxifraga hircina vocatur, de qua ante. Ictibus virulentarum bestiarum nolim applicare Sanguisorbam: ea non abstergit, nec expurgat sordidas & purulentas excreationes, calculos non terit. hæc omnia referenda ad Germanicam Pimpinellam: cætera verò quæ de Pimpinella scribit, conveniunt Gallicæ. Anod Fel. Platerum sunt qui Pimpinellæ succum in febre hæctica coramendant. Quo loco ego Sanguisorbam intelligo, quamvis ipse Pimpinellam in alia significatione sumat, ubi ad pestem utramque præscribit: in hæctica enim usque adeo calida & sicca radix, ut Saxifraga, non convenit. Platina quoque confundens duas Pimpinellas, Italicam & Germanicam, malè Italicæ caliditatem tribuit, ac lapides comminueredicit lib. 4. de honesta voluptate & valetudine, vel de obsoniis, & arte coquinaria cap. 10. de conditura Pimpinellæ. Pimpinellæ, inquit, quæ & Bibinella græcè dicitur, vis calida & sicca inest. Ob hæc rem tardè concoquitur, voluptatem edentibus affert. Collecta ac lota in patinam, ac suomet caule, si tenera est, reponi debet, sale, oleo & aceto condiri, si prædura fuerit, folia tantum sumantur. Aperit hic cibibus jecinoris fibras, urinam provocat, ac lapides, ut Saxifraga, non tamen adeo comminuit. Sequens remedium jactatur tanquam certum ad vinæ incontinentiam, quod recipit Manipul. quatuor Pimpinellæ, qui coquantur ad tertias in viniboniphyalis quatuor, & datur bibendum ægro. Idem secretum hoc ait ad quartanam expertissimum. Estate sumit Manip. unum Pimpinellæ, verno tempore radices cum foliis præsentibus, tenuiter incidit, coquit in aquæ mensura ad tertias, dat per triduum manè haustum tepidum, & affirmat, non sensurum agrum paroxysmum, expertumque esse in multis personis. Palmerius de morsu canis rabidi, Henrici 2. Galliarum regis venator bona fide asseveravit Pimpinellam ad præcavendam hydrophobiam tantam vim obtinere, ut quicumque eam aliquot diluculis, vel in acetariis, vel alio quovis modo apparatus comederit, nihil inde incommodi sentire possit. Purpuram incomparabilem ex vermiculo ad radicem Pimpinellæ & Sanguisorbæ, quidam carmesinum appellat colorem, fieri perhibet Gesn. Aquat. lib. 4. De aqua hujus stillatiæ, syrupo & conserva consule Tabernæmonianum.

SANGVISORBA MAIOR

flore spadiceo.



Toto vultu cū Pimpinella sanguisorba minore convenit: verum folia, quæ novena, aut undena ad unam costam alligantur, plusquam duplo sunt majora, Betonicæ foliorum æmula, profundè serrata, glabra, odore & sapore eodem cum minore: caules verò ex radicibus fibrosis bicubitales & altiores assurgunt, læves, striati: capitulum oblongum: strobiliis vaginæis spadiceis quadrifoliis, apici-

bus concoloribus contextum.

Planta à nobis hic exhibitæ & descriptæ, est Pimpinellæ Italicæ genus alterum Tragi præcedenti per omnia simile, sed elegantius planè atque grandius, floribus spadiceis coloris.

An bene hæc tradatur à Fuchsiò, qui Sanguisorbam vocat majoribus foliis ac longioribus, colicistamen tenuioribus, aliis dicendum relinquitur.

A Cordo vocatur Pimpinella Italicorum capitulo purpureo. Matth. in comm. cum mag. fig. Pimpinella major. In comm. apud Bauh. Pimpinella 3. sive Sanguisorba major. In hist. germ. cum addit. Cam. Pimpinella Sanguisorba major (ita etiam vocat Cast. & Cam. h.) In epit. ejusdem, Sanguisorba, seu Pimpinella major. Lugd. p. 787. Pimpinella sive Sanguisorba major Matthioli. Dod gall. Pimpinella major lat. in fol. Pimpinella silvestris, Sanguisorba major, capitulis obscurè purpurascens, odoris gratià destituta. Gesn. h. Pimpinella major. Clus. Pimpinella Italicorum & Gallorum major, Sanguisorba Germanorum. Bauh. phyt. Pimpinella 5. sive Sanguisorba 1. Eid. B. pin. Pimpinella 6. sanguisorba major: Pimpinella Italica major, Thal. Sanguisorba major, Cord hist. Pimpinella syl. Ger. Sideritis 2. Diosc. major, Col. Schvvenckf. Sanguisorba major, ut & Tab. apud quem hæc reperiuntur nomina. Sanguisorba 1. vel major vocatur à Botanicis & Medicis Solbastrella major, Sorbastrella major, Sorbaria major, Sorbus pumila major, Barbula Christi major, Solbastrella pratensis, Sanguisorba pratensis, & Pimpinella sanguinaria major. Pimpinella verò nominatur, quoniam Itali pro Pimpinella, hæc utuntur. cætera nomina accepit serè omnia, ab Aris Theophrasti foliis, quæ hujus foliis similia sunt. Germ. vocatur groß Sperbenkraut / groß blutkraut / groß welsch Dimpfneul / groß Böhlblutkraut / groß blutropflin / & tourm wurz / quod ulceribus vermiculosis equorum medeatur: reliquas appellationes à similitudine foliorum Pimpinellæ Saxifragæ sortitur, & à sanguine sistendo: sed appellatur etiam Drachenblut / h. e. Sanguis Draconis. Belg. groete Dimpfneul / Ital. Pimpinella, Solbastrella, & in Florentina Alex Bened. èto telto, Strella. Gall. Sanguisorbe grande & Pimpinelle grande Angl. Great Burnet / Bohemicè Zrnawke Boreng.

Lobelius

*Sanguifor-
ba altera
maior, Lo-
belia.* Lobelius Sanguiforbam alteram maiorem sive Pimpinellam, pictam dat in Obs. p. 412. in Icon. p. 719. De ea autem hæc ejus est opinio in Advers. Hæc tamen natalibus differt, & plus quam cultu, contra quam nonnulli arbitrantur, tamen quanta est major multo, sic similis est. Folium interdum Betonicæ par: in alis & caule dudum, triūve pedum alto: capitulis itemisdem, sed longioribus rufescentibus, semine anguloso, triangulari.

Loco. Fuchsius, uti ante retulimus, scribit Sanguiforbam maiorem nasci locis incultis, & aridioribus, & soli expositis. Sed quam bene facile eritis, qui eam sepius collegerunt, indicare. Pinguia & lutosa præta ac palustria magis amare, & non modò apud Mediatrix, sed & in Germania, Bohemia, Hungaria, & aliis locis potius crediderim, quamvis & Tragus quoque & Clusius in aridioribus etiam locis provenire tradiderint. Observavi Burmij in Rhætia & Tiguri florentem Junio & Julio, itemque Augusto.

*Vires & s-
im.* Hujus vires licet videre in præcedentis Sanguiforbæ historia. Eadem enim, ut vult Matthiolus, utrique facultas, sed hortenli, juxta Lobelium, gravior & potior. Is tamen suavem & maiorem vino mesam meminit in Angliæ Northamptoniæ.

*Plu. dyse-
nterici op-
culatur.* Schvvenckf. particulatim florem hujus siccompulverizatū ex vino dysentericis opein ferre prodidit.

PIMPINELLA SANGVISOR- bo inodora.

Hæc à Sanguiforba minore vulgata, differt foliis & odore: nam in hac folia longiora sunt, quæ in illa magis rotunda: sunt in hac inodora, in illa odora. Hanc Pimpinellæ minoris hispanicæ nomine Gillenius misit C. Bauhino, cui est in pin. Pimpinella. 9. sanguiforba inodora.

APIUM MAGNUM, SIVE HIP- poselinum, ex veterum sententia.

CAP. I.

Smyrniū. **H**IPPOSELINUM, ut refert Dioscorides, alij Gri-
lon [Γρίλον] alij Apium agreste [ἀγροκόλινον] alij
Smyrniū vocant, quum tamen aliud sit, quod prop-
riè Smyrniū dicitur, velut suo loco dicturi su-
mus. Est autem grande Apium, eodem autore, ma-
jus & candidius, quam Apium hortense, cujus cau-
lis cavus, altus, tener, velut lineas habens: folia verò
latiora, subpuneia: in quibus est coma, velut Rol-
marini [ῥολμάρια] os. vet. non habet] flore plena, in
corymbis prius quam efflorescit, compacta. Semen
est nigrum, oblongum [ἐπιμήκης, vet. ἐπιμήκιστος]
solidum, acre, aroma olens. Radix odorata, alba
[λευκή, vet. λεῖτη] ori grata [εὐσμεος. Cat. εὐσμεαχος, sic
& Lac.] non crassa [παχυντα, vet. non legit.] Nascitur
in locis umbrosis & juxta paludes. Oleris modo e-
ditur, velut Apium. Sed & radix tum cruda, tum co-
cta editur. Et folia cum caulibus cocta eduntur: &
tum per se, tum cum piscibus præparantur. Sed
& cruda muria condita servantur. Vim ducendi
menses semen habet in vino mulso potum. Ca-
lescit etiam rigore prehenso, tum potum, tum
illitum. Urinz quoque stillicidio opitulatur. Et
radix eadem facit. Hipposelinum Latinis vocari
Olus atrum ait Plin. l. 10. c. 11. his verbis. Olus a-
trum, quod Hipposelinum vocant adversatur scor-
pionibus. Poto semine torminibus interaneis me-
detur, itemque difficultatibus urinz semen usus de-
coctum ex mulso potum. Radix ejus in vino cocta
calculos pellit, & lumborū ac lateris dolores. Canis

Tom. III.

rabiosi moribus potum & illitum medetur. Succus
ejus argentes calefacit potus. Cæterum, hoc in loco
Plinius argentes dixit, quos Dioscorides πυγρῆς, i. e.
frigore, aut rigore prehenso. Nam de utriusque in-
telligi posse videtur, tū his qui ab externi frigidi æ-
ris conversatione frigus contraxerunt, tum his qui
rigorem, febres maximè tertianas, præcedentem, &
cum ipsis irruentem habent. Est autem hic rigor ma-
jus quiddam horrore: sicut horror majus quiddam
frigiditate.

Plinius Buselinō tanquā ab Hipposelino diver-
sum habet. Idem l. 19. c. 8. ex Theoph. Olus atrum
miræ naturæ esse ait Hipposelinum Græcos vocare,
alios Smyrniū. E lachryma caudicis sui nasci. Senti &
radice. Succum ejus qui colligant, Myrrhæ laporem
habere dicere: autoremque esse Theophrastū Myr-
rha satā natum.

Galenus de aliment. nō Hipposelinū, sed Smyr-
nium Romæ Olus atrum vocari dicit. Idem Hippo-
selini & Oreoselini similem Apio vim esse ait, sed
debilius Hipposelinum, robustius Oreoselinū esse.
Verū amplius add. eodem lib. αὐτῶν κατὰ τέρας bul-
las in alopecia excitatas noctu, inanè compun-
ctas Buselini foliis integendas esse, ex Archigenis
traditione.

Theophrastus passim de Hipposelino hæc pro-
dit. Perpetuò viret in suffiucū genere Equapium,
cacumine perdurans amissis reliquiis, radice carno-
sa. Equapium [ἰπποκόλινον] à Paludapio & Montapio
tam distat, quam ab urbano plunmum differt. Folis
quidem vicinū Paludapio est, sed hyrsutum [& sic
etiam ἄλυσον vertit Celsus. alij tamen vertere densum]
& grandi-caule constat, & radicem crassam modo
Raphani agit, nigram: fructū quoque nigrum produ-
cit, magnitudine Ervo [ἑρβῶ] ampliorem: ambo utiba
referunt ad urinz difficultates ex vino dulci albo, &
ad pellendos calculos. Nascitur omnibus locis, &
lachryma ex eo similis Myrrhæ defluit. Lachryma
autem ejus in radice consistit, ut & Scammonia, &
aliorum multorum, vim medicam gerentium. Equa-
pij ergo lachryma Myrrhæ similis constat quamob-
rem cum quidam hinc nasci Myrrham audivissent,
Equapium apud se provenire putarunt. Scitur
Equapium etiam suā lachryma [ἀπὸ δακρύου] Non in-
telligimus quid velit Theophrastus per se scitur
confiderandum an hic aliquis error.

Crediderunt autem, ut Marcello videbatur, non-
nulli Equapium Hipposelinon vocantes fieri in
plantis à natura posse, quod fabulosè à Poëtis ali-
quādo ad delectationem fictum est, ut, quemadmo-
dum illi in Thessalia hippocentauris, equis insitos
homines, duplici natura, ut Lucretius ait, & corpore
bino, ex alienigenis membris compactos finxerunt,
sic nos non dissimili ratione in hortis etiam nascent-
es aliquot plantas, equis insertas, audientes sal-
tē admiraremur, crederemusque Hipposelinon
hoc ab equis aliquid habere, unde portentoso, &
ut in hippocentauris, admirabili nomine, etiam no-
strā ætate judicarentur, essetque quasi eques plan-
ta, Equapium hoc. Quod si verò humilior fuerit
hæc planta, nec supra congenere sibi, aliud à
terras erexerit: non malè forsitan (si joculari a-
liquando liceat) ex tractata aptius venere, eam se
nominis notam, licet ex turpi re, invenisse aliqui
dixerit. Siquidem Martialis non semper pius vates,
nec ubiq; Placbo digna locutus in Epigramate suo
iussit parvas & brevi corpore amicas ad venerē vehi
equos: subjecitq; statim longissimam nunquam Che-
baidem hecstoreo ruptam relictū equo: sed quo-
niam congeneribus suis omnes, grandiores sunt,
nullamque more hominum venerem exercere
nec possunt diversi generis duo simul in natu-
ra coalescere: cogitandum constituendumque, quis

L.

Hippo. grandes sint & comparatae congeneribus suis longo intervallo eas superent, idem sic quondam appellatas fuisse. Coniuncta enim illis Hippo græca vox, quæ in communi significationis æstimatione equum indicat non id animal, sed ab eo, magnitudinēque eius, proceriorem in illis altitudinem significat. Nec quia Hippofelinon commune, simile, coniunctumve, aut necessarium equis aliquid habeat, sic dictum à Græcis fuit. Verum quia altitudine congeneres sibi plantas superaret, id nomen invenit. Significare autem proceriorem habitum, & maiorem altitudinem, Hippo Græcorum vocem, præter rem ipsam Æschylus in tragædiis autor est, qui ad augendam rerum & carminis sui maiestatem Hippætos, Hippalestrionas, aliāque huiusmodi multa finxit grandes aquilas, grandēque gallos tantum vocibus illis indicans. Testis Aristophanes in fabula quæ inscribitur *ranæ* *ῥῖπας* *ἰππὸν* *νῦν* *dicens*, i.e. verba rupium modo grandia: & *ῥῖπας* *ἰππὸν* *νῦν* *dicens*: i.e. voces equestres & idem grandes: ob id se. quod qui vehuntur equis, aliū à terra sese extollunt. Testis item Sophocles in furioso Ajace: is enim tragædiæ titulus est, in qua Chorus loquitur: *ἵππους κατὰ χεῖρας ἡμῶν ἐστὶν ὀφθαλμοὺς οἱ τῶν ἰπποδρόμων* &c. quā voce grandem hominis furorem significavit & supra modum furem hominem: id enim ea vox potest. Quam viam videtur habere etiam Maronis in Georg. & Theocriti in pharmaceutria Hippomanes: nec aliter, quā adjectivi nominis modo, quod grandem furorem faciat, indicare. Ex qua significatione Marcellus grande Apium, Hippofelinon hoc dixit: monente id etiam re ipsā. Siquidem comparatū aliis hoc Apium arborefcit. Et hæc ratio nominis in Græcis est, & non ab equo derivata, ut Gaza credidit, qui Equapium id dixit. Latini à radice colore nomen Hippofelinon fecerunt Olus atrum vocantes; quemadmodum omnes Smyrneum à similitudine Smyrnij. Qui agreste Apium id nominaverunt, nō aliā ratione, quā quod agrestia & erratica in generibus aliquibus aliū sativis extolluntur. Deerat tandem in lectione Dioscoridis adverbium *ἰνδῶν*, quod intus significat, sensu & re ipsā id indicantibus: foris enim nigro, intus candido colore grandis Apij radix est: unde & Romani Olus atrum eam vocaverunt, ut Plinius; Columella Olus pulum; Gaza barbarè Equapium: interpres Nicandri in Ther. ut Rob. Const. in Lexico retulit *ἰνδῶν* & Anacreon vocari.

Apium grande. Ceterum, Smyrneum perfoliatum, sive Creticum, Hippofelinum agreste Galeno 8. simpl. vocatur.

Equapium. Dicitur Hippofelinum de Macerone, ut suo loco dicemus.

Olus atrum. Hippofelini loco Matthiolus pingit Ligusticum vulgare.

Olus pulum. Tragus l. 1. c. 144. ait Theophrastum l. 9. c. 1. inter succos plantarum Hippofelinum, vel, ut Gaza transferat, Equapium nominasse & hoc Smyrnon Galeni & Dioscoridis esse, pro quo is Imperatoriam picturā expressit.

Columella. Testatur Io. Agricola Hippofelinon non esse Angelicam, quod opinari Brassavolus refert.

Copium. Spondilium, quod Tragus Brancam ursinam Germanorum vocat, Hippofelinon Theophrasti esse falsò credidit.

Anacreon. Lacyna tandem prodidit Theophrastum confuisse Smyrneum cum Hippofelino.

LIGUSTICVM VVLGARE

foliis Apij

CAP. LI.

Deser. VVLGARE Ligusticum caulem habet hominis altitudinem excedentem, crassum, geniculatū,



cavum, striatum; folia pedalia & amphora, in alas divisa, quarū extremæ divisiones ad folia Apij palustris aliquatenus accedūt, sed longè majores, obscuro virore splendentes, odore validiorami umbellas gerunt amplas florum luteorum; semen majusculum compressum: radix est crassa, rugosa.

Hæc est illa plā-
ta quam Ruell. Le-
visticum officinarū
vocat, & Ligusticu
antiquorū esse non
absque ratione ne-

gat. licet simillimam naturā esse scribat. Brunfels. & Cornarius Levisticum appellant, ac cum Ligustico Dioscoridis & Galeni gravi errore confundūt. Eiusdem etiam opinionis Tragus est, licet descriptionem in Dioscoride non in totum convenire cum nostro Ligustico fateatur. Sunt qui putent Cheismi, seu Keismi Arabum esse Levisticum. Alij alia quoque nomina Levistico tribuunt, nimirum Thalaspium Thalapis, & Scandilatum. An autem hæ nomenclaturæ huic Ligustico convenient, aliorum esto iudicium. Dorsth. putat quosdam plantam nostram non abs re Panariam sive Panacem vocare, quandoquidem & radicem; & caulem, & vires Herculeo Panaci similes esse sibi imaginatus est. Quod quā erroneum sit, facilè cuivis patet.

Eos porro apertè falli, vel Matthioli fert opinio, qui herbam vulgò hodie Levisticum nominatam, putant esse Ligusticum à Dioscoride re præsentatū, quod Galenus vnius literæ mutatione Libysticu appellavit. Siquidem Ligusticu Dioscoridis caule assurgit tenui, & foliis Sertulæ campanæ similibus. Hoc verò caulem habet hominis altitudinem excedentem, &c. Is autem Hippofelinum legitimum censet, addens alibi Fuchsum deceptum: quippe qui legitimum Hippofelinum Levisticum vulgò vocatum, Smyrnij loco depinxerit. *ἵπποφελινον* id græcè vocari, quod etiam latinè Hippofelinon: Arab. *Saliz*. It. *Hippofelino*: Germ. *Liebsteckel*. gall. *Ache* & *Ache large*. In hist. germ. addit vocari *Groß Eppich*; Hippofelinum vulgò Levisticum. Sed Hippofelinon, vulgari huic Ligustico non consentire, velex nuda seminis figura doceri atque convinci potest. Guilandinus in Theone stirpem hanc Theophrasto Libanotidem dici retur: etiam interim non deesse sciat, qui Silphion esse defendant, numismatum antiquorum auctoritate roborati, quam equidem sententiam nec probat, nec rejicit. Quin & Gesnerus se audivisse refert Silphij plantam in Africa huic simillimam inveniri.

Ang. in Italia herbam esse peregrinam Levisticum ab aliis Hippofelinum, ab aliis Smyrneum dictum, credidit. Idem etiam horum descriptiones non convenire testatur. Lasertij speciem esse concedens, è monte Parnasso, cuius meminit Theophrastus.

Lob. adv. p. 313. censuit esse Lasertium germanicum, idemque cap. de Hippofelino vocat Levisticū vulgare. Matthiolū increpat, qui hanc Hippofelinū, sive Selinū majus fecerit. In obs. p. 401. addit esse Lasertium

Ligusticum
antiquorū
non est.

Error Brun-
felsii &
Cornarij

Cheismi A-
rabum.

Thalassiu.
Thalaps.
Scandilatu.
Panaria.
Panax.

Lapsus
Matthioli

Hippofelinū
legitimum
Matth.
Fuchsius
notatur.

Matth. re-
futat
Guilandinu.

Libanoti
Theophrasti
Guiland.

Lasertij
species Ang.

Lasertiu.
german.
Lob.

Lasercitium Dioscoridis Guilandini, dubitatque an Lasercitium Theophrasti Anguillaræ.

Lasercitium Tab. olim etiam existimavit esse Hippocelinum Dioscoridis, Ros & Eppich. sed postea conclusit verum Lasercitium, si non Dioscoridis, saltem speciem: nam convenire ait cum descriptione Theophrasti l. 6. hist. Facultate etiam non cedere vero Lasercitio: esse itaque Theophrasti *Ξιλαριον*, Hippocriti *Λάσσιον Γαλάτιον*, Lasercitium Gallicum Ruellij, Herb. Lasercitium Europæum, Laser Gallicum, Silphium Europæum, Lasercitium Germanicum, Levisticum seu Lybisticum adulterinum.

Levisticum Levisticum vulgè appellatur, quia pro Ligustico aliquando accepta est, inquit Cæsalpinus. Censet hic apud Theophrastum Libanodem fertilem esse [Rosmarinum ferule vertit Theod.] & Rosmarinum alterum Plinij, cui & caulis, & semen resinaceum, quod Cachrys vocatur.

Ruellia Ruellia dicitur Levisticum officinarum: Brunf. Levisticus: Matth. Dod. in fol. lat. Lac. Geln. & Cam. h. itémque epit. Matth. (ubi & Hippocelinum) Cæf. & Bauh. phyt. & apud Matth. (Aptium sextum facientem) Levisticum vulgare: Fuchf. Libisticum vulgare. Eid. B. pin. Libanotis 7. Ligusticum vulgare: Dod. gall. Geln. & Camer. h. ut etiam Guill. Ligusticum vulgare: Cordo hist. & Trag. Ligusticum sativum. Lob. adv. p. 413. Obs. p. 401. Icon. p. 703. Levisticum, Germanicum Lasercitium: Tab. ic. Ligusticum Lasercitium adulterinum: hist. Ligusticum adulterinum: Cam. apud Matth. germ. Hippocelinum vulgè Levisticum: Lugd. p. 703. Hippocelinum Matthioli, sive Levisticum vulgare: Smyrniun, Fuchf. in fol. & Lac. Levistici loco habita herba, Ang. Ger. Lasercitium, qui iconem ex Tab. habet.

Nomina Auctor porro est Tabern. vocari Germ. Liebs *linguatum* stöckel / & Badfraut / quòd in balneis hoc usurpant plurimum soleant: Belg. Lauesche / Lauerse / & in Holandia Lauas: Gall. *Livesche*: Angl. Louage: Hung. Levesticon.

Locum Ligusticum vulgare hætenus tantum in hortis *et* observavimus, utpote loca pingua & humentia non nihil amant. Æstate floret; Augustomagna ex parte semen ad maturitatem pervenit: primo Vere germina erumpunt. Pona in monte Baldo ait reperiri Smyrniun Lacunæ. Semen quod accepi à fratre C. Bauh. sub inscriptione Sileris montani Bononiæ, satum Montbelgardi in horto E. C. produxit Levisticum.

VIRIS ET USUS.

Temperam. Ligusticum ex ordine exsiccantium & exsiccantium esse prodidit Tragus, & ad venena propulsanda utilissimum, non minus atque Angelicam. Ejus porro radicem siccata ac in pulverem redactam, condimentum esse optimum, quo cibi codiantur, non minus atque Piper. Utilem esse Stomacho frigido, concoctionem adjuvare, omnesque superfluas humiditates consumere: internos sedare dolores in vino potam pondere dimidiæ [Integræ, Tabern.] drachmæ: venenum educere, urinam & menses trahere, & ad omnia, ad quæ Angelica facit, usurpanti posse: Aceto & sale conditam conservari posse, uti Helenij, aliarumque herbarum radices. Tusam ac impositam (cui & semen) tibus atque moribus serpentum, viperarum, araneorum, scorpionum, & canis rabiosi mederi, dolorem namque mitigare & venenum educere. Ligusticum adhuc infestationibus & balneis adhiberi videtur, ad sciendam urinam, calculos ac menses, nec non ad exsiccanda omnia interna membra. Puerperas hujus herbe radices, folia, & semina in cibo & potu suo usurpare.

Tom. III.

debere, & balneis sudatoris suis adhibere: ut à partu rectè purgentur. Aquam distillatam discutere, & la-
Aqua di-
stilla.
nare anginam, & pleuriticum morbum, gargarissatam & potam: impositam tu nenti capiti utilem esse, & gutturi vulnerato apprimè conducere gargarissatam: claram reddi & puram faciem, & vitia cutis deformis ac nigra maculas & suppurata, cicatrices etiam à scabie & abscessibus relictas exteri & emendari, si ex aqua per aliquot dies colluantur.

Eandem ad oris & colli, ani & locorum muliebrium exulcerationes & vitia utilem esse, si lineis pannis aqua affectis partibus imponatur. Anginam etiam sanari Ligustico, si per caulem ejus continuò bibatur. Est Levisticum, auctore Dodonæo, & radice & semine exsiccans ac resiccans ordine tertio incipiente, & tenuium admodum partium. quo fit, ut aperire, incidere, digerere & provocare valenter possit: perinde ac Selinorum genera, inquit Matthioli.

Dodonæus porro radicem siccata cum vino bibitam ventriculo prodesse scribit: crudorum item humorum concoctionem promoveri, ac præter cetera sudores elicere: semen eadem posse, ac præter alia adversus uteri strangulatus prodesse. Non piget calatino sermone reddere, quæ Tabern. germanico idiomate de hujus facultate & usu scriptis confirmavit. Suavis odor herbe, inquit, radices, floris, & seminis; ad hæc etiam validus & acris sapor Ligustici adulterini, satis ostendunt, id calidæ & siccatæ naturæ, proprietatisque esse in tertio gradu. Surculi novelli, Vere prorumpere soliti, in cibus à quibusdam assumuntur, & præsertim in a-cibus sumuntur.

ventrem autem emolliunt, viscososque humores educunt, ac serofos. Radix quovismodo usurpata oppilationes reserat hepatis & lienis: resistit veneno assumpto, aëri infecto, ac pestilentia; qui namque de hac frustulum manè assumit, securus est eo die, gratia DEI adjuvante, ab infectione. Per Urinam & sudorem expellit omne venenum. Medetur tussi à viscosis frigidisque humoribus ortæ. Pectus expurgat & excreare facit. Confortat cor & stomachum. Dissolvit concretum sanguinem. Respirationi difficili succurrit, appetitum excitat, concoctionemque adjuvat, sive in vino, cerevesia, aut aqua decoquatur; pro ratione morbi, ægerque jus colatum bibat, etiam adversus venenatorum animalium morsus. Ad morbum regium accipe seminis Ligustici, Selini, & Fœniculi singul. Vnc. semis. Rasuræ Eboris drach. sex: pulveris eribrenturque e libro setaceo angustissimo. De quo pulvere propina drach. unam in jure Cicerum, aut aqua Fœniculi: hoc facto æger sudet, in, aut extra balneum, continuis aliquot diebus, & felicem successum deprehendes.

Seminis dux partes cum parte una Cuminij in pulverem redactæ, aut Drachmæ pondere cum vino potæ frigidos stomachi dolores sedat, itemque tormina intestinorum. Semen Drachmæ pondere potum ex vino necat lumbricos, & menses cit. Radicis pulveris drachma semis cum drachma una Theriacæ Andromachi ex aceto calidè hausta per sudorem pestilentiam avertit & expellit. Cum vino albo seminis triti drachma una & semis sextum mortuum ejicit. Herba vulneraria est. Vinum vindemarij tempore contra pestem à radice concisa parari posset, ut Helenius. Herba distillatur in Balneo Mariæ, cum flore in Augusto, unà cum radice, caulibus & floribus.

Paratur ex hac etiam extractum ad supra dictos usus, cujus dosis scrupulus unus, in suo menstruo, vino, aut alio aliquo liquore. Lasercitij Europæi oleum ex sicca herba, radice, floribus & semine extrahitur arte chymica, ut ex Absinthio. Dantur autem hujus olei stillantij guttæ dux, aut

L. 2

Sal.

tres cum vino, aut succo aliquo convenienti. Præstat in dictis affectibus præcipue verò in colica. Sal contra quævis venena commendatur, itemque æreim pestiferum, pondere granorum decem, aqua appropriata. Quæ ex Tabernomontano omnisimul vertere, jam ab aliis ante recensita sunt.

SMYRNIUM VETERIBVS.

CAP. LII.

Petroselinum **SMYRNIUM**, quod in Cilicia Petroselinum vocant, plurimum in Amano monte gignitur, auctore Dioscoride. Caulem habet Apij, copiosâ cinctum agnatâ sobole: folia verò latiora ad terram, infra, subpinguia, robusta, odore medicato, & cum quadam acrimonia jucundo, colore denique in luteum languesciente: habet & umbellam supra caulem, qualis Anetho inest: semen rotundum Brassicæ simile, nigrum acre, Myrrhæ sapore, ita ut alterum alterius qualitatem repræsentet: radix verò acris est, odorata, mollis, succosa, faucibus inordens, cortice prædita foris nigro, intus verò pallido aut subpallido. Nascitur in saxosis, collibus, locis aridis & incultis angulis. Vim habent radix, herba, ac ipsum quoque semen excaustorium. Folia quoque muria condita olerum instar in cibos veniunt, alvumque sistunt: radix verò pota prodest contra serpentium morsus, tussis & orthopnæas mitigat, ac urinæ difficultatibus medetur: imposita verò recentia cedemata, inflammationes duritiæque discutit, & vulnera ad cicatricem perducit: servata autem subditaque abortum infert. Semen renum, lienis ac vesicæ vitiis succurrit, menses & secundas pellit: ischiadicis utiliter in vino propinatur, & inflationes stomachi lenit, sudores item ciet atque rufus. Peculiariter verò potui datur contra hydropem ac febrium circuitus.

Plinius **Plinius** Smyrniū describens in paucis evariat à Dioscoride. Smyrniū (inquit. l. 27. c. 33.) caulem habet Apij, folia latiora, & maximè circa [caulem, addit vet.] stolonem multos, quorum à sinu exiliunt pingua [subpinguia, &c. Diosc.] ad terram infra, odore medicato, & cum quadam acrimonia jucundo, colore in luteum languesciente, capitibus [umbella, Diosc.] caulium orbiculatis, ut Anethi semine rotundo, nigro, quod arescit incipiente Æstate. Radix quoque odorata, gustu acti mordet, succosa, mollis. Cortex ejus foris niger, intus pallidus. Odor Myrrhæ habet qualitatem: unde & nomen. Nascitur & in saxosis collibus, & in terrenis. Vñus ejus excausticare, extenuare. Urinam & menses ciet folia, & radix. Semen alvum sistit. Radix collectiones & suppurationes non veteres item duritiæ discutit illita. Prodest & contra phalangia ac serpentes, admisto cachry, aut Polio, aut Melissophyllo, in vino pota, sed particulatim, quoniam universa vomitionem movet. Qua de causa aliquando cum Ruta datur. Medetur tussi & orthopnææ semen, vel radix: item thoracis, aut lienis, aut renum, aut vesicæ vitiis. Radix autem ruptis convulsis. Partus quoque adjurat, & secundas pellit. Datur & ischiadicis cum Crethmo in vino. Sudores ciet & rufus: idè inflationem stomachi discutit. Vulnera ad cicatricem perducit. Exprimitur & succus è radice, utilis seminis & thoracis præcordiorumque desiderijs: [Vitiis, morbis. In græco fortassis in tribus,] pro quo legit Plinius in tribus remediis. ad movendis thoraci & præcordijs, Dalech. calfacit enim & concoquit & purgat. Semen peculiariter hydropicis datur potu, quibus & succus illinitur, & malagmate [malagma, Dal.] è corti-

ce arido. Et ad obsonia utuntur cum mulso, & oleo, *Ad obsonia*. & garo, maximè in elixis carnibus simul. Concoctiones facit, sapore simillima [simillimo, vet.] Piperi. Eadem in dolore stomachi efficax. Et hæc ex meliorum codicum lectione, juxta quos etiam verba, quod arescat incipiente Æstate legenda sunt, quale Brassicæ est: quanquam neque in ipsis integra sit hæc lectio. Idem rursus ait lib. 19. cap. ultimo. Et Smyrniū olus feritur iisdem locis, Myrrhamque radice relipit. Et hæc de propriè dicto Smyrniō cum Dioscoride loquitur. Rursus tamen Hippofelino, quod & ipsum improprie Smyrniū appellatur, tribuit Myrrhæ saporem. Atque ita verum Smyrniū cum Hippofelino confundit, Theophrastus in hoc sequutus. Vtriusque verba capite de Hippofelino adscripsimus. Plinius Smyrniū etiam Myrrham appellavit, ut vult Cornarius l. 19. c. 12. ubi tamen Myrrin quidam legendum censent. Libanotis ait, odorem Thuris; Myrrha Myrrhæ habet. Galenus de Smyrniō scripsit ut alimento, & ut medicamento, quæ occasio quod Cæsalpinus eum de duabus distinctis plantis egisse credidit. Et quidem omnibus hisce de Olusatro, quod Macerone inscribimus. Smyrniū (inquit l. 2. alim.) non est insuave, ideoque Romæ plurimum vñit, appellaturque vulgè non Smyrniū, sed Olusatrum. Multò autem acrius est & calidius, quàm Apium. quin & odorati quippiam habet. Quapropter efficacius urinam, quàm Apium, Hippofelinum, & Sion, mensesque mulieribus movet. Veris tempore caulem producit, qui crudus edendo est, haud aliter quàm folia, quæ sola per Hiemem inhaerent plantæ nondum caulem habenti, sicut neque tum Apium habet. Postea verò accedente tota planta jucundior redditur, siue quis crudam ipsam, siue coctam mandat, siue ex oleo & garo, siue acetum, siue vinum velit adiacere. Et l. 8. simpl. Smyrniū quidam Hippofelinon a grece cognominant. Ex eodem genere & ipsum cum Apio est, & Petroselino, sed Apio quidem validius, Petroselino autem imbecillius; menses itaque & urinas movet, calidum, siccum in tertio ordine. Et hæc de suo Olusatro intellexit Cæsalpinus, quod Macerone est. Sequentia verò Galeni verba ad Smyrniū Creticum refert. Cilices in Amano monte nati; Petroselinum vocant; est quidem & ipsum Smyrniū, minus verò acre Petroselino & Smyrniō; idè ulceribus commodum, quia siccac sine molestia. Sed & digere, quæ & indurata sunt, potest. Reliqua vis Apio & Petroselino similis est; quare & semine ejus utimur ad menses, urinas & asthmata. Hactenus Galenus.

Smyrniū porro non meminit Theophrastus, nisi cum Cæsalpino & Marcello dicamuseum id Hippofelini historiâ assignasse, cujus verba suo adscripsimus loco. Cæterum, sentiebat jam tum, cum scriberet Dioscorides, à gravissimis authoribus confundi cum Olusatro. Smyrniū, miscerique simul communicatâ invicem appellatione similes quidem & congeneres, non tamen easdem plantas; idèque in Olusatri historiâ aperte omnes monuerat, aliud esse Olusatrum ab eo quod propriè, verèque Smyrniū diceretur. Et in Smyrniō hoc eas numeravit natalium, virium, seminis, foliorum, aliarumque partium notas, ut his, qui Olusatrum noverunt, nihil facilius post hac sit, quàm alterum ab altero secernere, præsertimque ex Myrrhæ gustu: idèque pari & promiscuo alterius uti. Miscuisse autem veteres invicem similes & congeneres plantas, in Latinis Columella testis est l. 12. c. 3. scribens. Atrum olus quod quidam Græcorum vocant Hippofelinon, nonnulli Smyrniō. In Græcis testis Nicander in Theriacis suis, qui Smyrniō vocat

*Smyrniū**vis**Phalangia**Tussis**Secunda**Nona**Succum**Plinius**Hydraps**Plinius**Plinius**Myrrha**Galenus**Roma**Plinius**Olusatrum**Caulis**sup.**Hippofelinus**Macerone**Smyrniū**Creticum**Theoph.**Smyrniū**meminit**Olusatrum**non est**Columella**Nicander*

ὅδ' αὖτ' αἱ συρμητὶς ἀνέβη, , Sec. adjectivâ formâ
 συρμητὶς Hippofelinon vocans hoc, sc. ut ab illo
 separaret: addiditque interpres ejus, magno Apio,
 i.e. Hippofelino simile esse Smyrniū, vocatūque
 Smyrniū, quoniam Myrrham odore refert:
 Vocari & Coptium auctore Anacreonte in comm.
 de radicū sectione. Similitudo hæc miscet, & in ve-
 terum historia cōfundi cogit, alioquin diversa sunt,
 ut ex Dioscoride & aliis etiam Marcellus docet.

Hippofela. Ex hæcenus dictis constat, Smyrniū quosdam
Hippofeli- Hippofelinum stature ac vocare.

Petrofelinū. Necdē sunt, inter quos recenset Cilices Galenus,
 qui Petrofelinum dicant.

Olasium. Alij verò Olasium non absque errore, nostro
 iudicio, asserere student.

Smyr. Smyrniū Creticum perfoliatum, pro Smyrnio
Cret. per- vero probant non pauci.

foliatum Macerone multorum sententiâ, Italorum autem
Macerone. præcipue Smyrniū pronunciat.

Imperat- Quidam etiam sibi imaginati sunt Imperatoriam
ria. esse Smyrniū, sed frustra.

Angelica. Reperiuntur adhuc hodie, qui sibi persuadent,
 & quidem non sine occasione Angelicam vulgò di-
 ctam esse Smyrniū Dioscoridis & Galeni.


Ligusticum Lacunæ tamen opinione Smyrniū est Ligusti-
virgare. cum vulgare folijs Apij.

Spondyliū. Euchar. Roëslin in herb. Spondylium malè vo-
 cat Smyrniū.

Sesim. Cornatij Plinianus codex lib. 27. cap. 13. Sinon ha-
 bet, ubi in vulgatis simul legitur, & quod sequitur
 ad Sinon pertinens, Smyrnio attribuitur.

SMYRNIVM CRETICUM perfoliatum.

Deser.



HILARI virore
 perfusa folia
 producit nitidāq;
 pedem longa, lōgo
 nixa pediculo, quæ
 in oppositas ex ter-
 tis intervallis alas
 dividuntur, atq; hæc
 rursus in alias, ut
 subsecciones parti-
 culares, haud malè
 Apij palustris folijs
 possint comparari,
 altiusculè incisæ,
 crassæ latis; atq; hæc
 quidem statim à ra-
 dice pronascuntur.
 nā quæ ramorū di-
 varicationibus sub-
 sunt, immane quā-
 tum ab hac forma
 discedunt, circinatæ

serè rotunditatis, Perfoliatæ foliorum modo à caule
 ramisq; transversæ, fescunciam aut uncias duas lata
 & interdum gemina, alterum alteri impositum, um-
 bellis (ut testantur Adversarij) est Anethi aut Perfo-
 liatæ, floribus albicantibus, aut pallentibus. semen
 fuscum, subrotundum, Brassicæ par & simile, quale
 nobis aliquoties missum.

Smyrniū hujus (ut nostra fert opinio) in folijs ex
 ætate variationem agnovit Marantha Meth. l. 2. c. 3;
Smyrniū so- dicens: Smyrniū folia Apio comparat Dioscori-
lia dupli- des, latiora esse inquit & subpinguia: ac rectè
cia. quidem respondet comparatio, si folia caudici, seu
 radici proxima assumantur: nam quæ Colones cir-
 cundant ac caules, rotundantur, nullam præ se fe-
 rentia divisuram, ita ut Aristolochiæ, aut oblongæ

Hederæ figuram potius, quàm Apij retineant.
 Idem cap. 8. Smyrniū cum per se provenit in col-
 libus, ac limitibus terrenis, folia exigua profert:
 cum verò in hortis ferit, & accolitur: præter id quod
 folia multò latiora habet, ad majorem multò altitu-
 dinem assurgit.

Matth. in Diosc. cum mag. fig. vocat Smyrniū *Smyrn.*
 Creticum, semine haud Brassicæ simili, sed rotundo, *Creticum*
 anguloso, & in acutum desinente, ac propterea *Matthioli.*
 Smyrniū suum [Macerone] magis admodum ad
 historiam Smyrni accedere assent; quæ à Diosco-
 ride describitur. In epit. & hist. germ. cum addit.
 Camerarij (qui refert putari Smyrniū alterum *Smyrn. al-*
 apud Plinium & Dioscoridem, quod in monte A- *ternū Dio-*
 mano Ciliciæ provenit, & ad nos ex Creta adfertur) *quibusdam.*
 Smyrniū Creticum. Cur autem hoc Smyrniū
 Creticum perfoliatum non potius Dioscoridis di-
 catur, quàm Macerone, ut vult Matthioli, non vi-
 deo. Quæ obsecro Smyrniū Itali sive Maceronea
 seminis similitudo, cum Brassicæ semine quod cras-
 sum, & angulosum? Matthiolo apparet non fuisse
 nota semina Smyrniū Cretici, quæ multis numeris
 magis accedunt Brassicæ quicquid ille dicat: du-
 bito an inferiora viderit: ea namque quæ pingit pa-
 rum conveniunt. Vires & qualitates eodem teste
 non differunt, à viribus Smyrniū Dioscoridis, apud
 quem non invenio fieri mentionem duorum gene-
 rum Smyrniū

Itaque in procinctu fuerit vera Smyrniū cō-
 gnitio, & cum Hippofelino ac Levistico distinctio,
 cui nota sit illa planta multis jam diu Belgiz & Gal- *Matth.*
 liæ hortis enata. Commentator commentatorum *caus.*
 Senensis, morosè nimis, in hoc exquirendo Smyr-
 nio semen Brassicæ satagit, lectorem seque intri-
 cando suo more. Nam & illic paucis interje-
 ctis sibi refragatur, & Brassicæ semen negat
 (quia, ut semine ejus omnia, emendicatam habuit
 plantam, radice mancā, umbellis semineque char-
 tis fortè appressis, eoque minus exactæ cognitioni
 aptis) nec quicquam melius indicat, ut ait Lo- *Smyrniū Lo-*
 belius, qui in adv. p. 316. Smyrniū in Icon. p. 709. *belij.*
 Smyrniū; in Obs. p. 407. Smyrniū Advers.
 Gall. *Smyrniū de Candia* aut Creta; Ital. *Smyrniū di*
 Candia vocavit. Idem cap. de Hippofelino, Mat-
 thiolum increpat dicens, eum Doctorum o-
 mnium iudicio in veri Smyrniū loco melius non
 sufficere

Dod. in fol. lat. inscribit Smyrniū Amani mon-
 tis, ac differens tradit ab Hippofelino, quod etiam *Smyrniū A-*
 Smyrniū vocat: In Cilicia verò olim Petrofelinum *mans mon-*
 nuncupatum fuisse, testibus Dioscoride & Galeno, *in Dod.*
 credit.

Confarciator Lugdunensis unius hujus plan-
 tæ dat tres figuras & tres descriptiones, summo er-
 rore. Prima est p. 707. hoc titulo: Smyrniū verum *Figura 3. a*
 Dioscoridis & Dodonæi. Altera hoc: Smyr- *pus Lugd*
 niū Creticum Matthioli. Tertia sic inscribitur
 p. 791. Perfoliata altera. Et hæc pessima
 est.

Tab. hanc plantam Smyrniū inscriptione pictam
 dedit, vocavitque græcè *Σμύρνη*, & *πτεροφύλλον* καὶ *καλὴ*
νύκτα. Petrofelinum Cilicium: itémque Murthar *Smyrniū A-*
 Plinij l. 19. in fine; Herbariorum Smyrniū Diosco- *mans mon-*
 ridis, Creticum & Candiacum ad differentiam *in Dod.*
 Smyrniū Galeni, aliarumq; Pseudo Smyrniū plat-
 tarum, quibus hoc nomen falsò & unimodò applicari
 solet. Adhæc appellat Senirvion & Smirnon Sera-
 pionis de temp. simpl. c. 280. Sumion Avicennæ,
 & Seruion Sumion. Sumion. Surarion, Surati-
 ron, Zimirinum & Zimirion aliorum Arabum, quæ
 nomina à Græco mutuata & depravata esse ait.
 Germ. appellat *Smyrnen*: aut *Myrrbenfrant* à
 Myrrhæ odore.

Olusatrum
alterum
Casalp.

Cas. Olusatrum alterum constituit, ac Olusatri genus peregrinum nominavit, utpote quod nuper ferri cepit. Hoc ita describit. Foliis exit à radice longè exilioribus, quasi Apij tenuifolij, in caule autem sensim grandioribus segmentis, adèd ut propè ramulorum cacumina, nulla ex parte scissa sint, sed rotunda, caulem ambiant formà acetabuli, ut in Periclimeno, colore pallecente: umbellas fert luteas, & semina altero [Macerone] minora, ac rotundiora, similiter dura ac nigra, odore semè Styraeis: radix brevior, ac tenuior, gustu suavior, simili modo cute nigra, intus lactei coloris: floret Vere: Hoc autem Smyrniij genus, Galenus ait Cilices Petroselinon vocare, &c. De hoc Plinium eandem semè ad verbum descriptionem cum Dioscoride habere.

Petroselinum.

Smyrni
per
grinum
C. Bauh.

Bauh. phyt. Apium 15. & Smyrnum verum peregrinum, vel Smyrnum Dioscoridis: Smyrnum Creticum Matthioli, cujus figuram quo ad partem superiorem bonam esse ait, at quo ad inferiorem vitiosam. Quare adprobat Dodonzi & Lobelij iconem: Hoc autem non animadvertisse notat Lugdunensem, ideoque vitiosam proposuisse Matthioli iconem p. 707. ac dein bonam Lobelij. Idem appellat Perfoliatam 3. sive alteram geminato folio. In Anmadv. in Lugd. p. 35. ait, Smyrniij figuram Dodonzi bonam esse cum descriptione ex Pena: ex Matthiolo verò vitiosam: quia folia interna non sint Apij: hanc cum descriptione Matthioli omitti debuisse. Miror ego fratrem non assecutum esse ex historia Perfoliatæ alterius Lugdunensis, eam eandem esse cum Smyrno Cretico, sed malam iconem, ac propterea non diversam ab eo statuendam, ac separandam. Erd. B. pin. Apium 14. Smyrnum peregrinum rotundo folio: Smyrnum Creticum, Matth. **Cas.** Lugd. Cam. & Ger. Smyrnum Creticum putatum, Col. cui Hipposelinum aliud Diosc. Smyrnum, Dod. gall. Ad Lob. Tab. verum, Geln. h. & Lugd. cui & Perfoliata altera.

Perfol. altera
geminata
folio eiusd.

S. Bauh.

Smyr.

Smyrnum Creticum missum Stutgardiam per hortulanum Ducis Florentiæ, seminavi in horto E. C. Montbelgardi, ex qua postmodum descripsi. Miram inesse Smyrno Cretico proprietatem refert Camer. de hort. Altero, inquit, anno à satù prodiit foliis geminis, ut locustarum serè alas repræsentent, quæ paulò post marcescunt. Interea sub terra latitat radix rotunda Ervi magnitudine aut paulò grandior. Sequenti postea anno folia protrudit instar Ammi vulgaris, ut in pictura Matthioli apparent, radix verò tenuis sit & oblonga, quæ rursus per Hiemem ita perdurat. Primo denique Vere tandem emergunt folia Petroselini, quæ Dodonzius suo Smyrno rectè appinxit, caulisque enascitur circumdatus foliis perfoliatæ. Hæc planta semina maturaprofert, quæ excidunt, & anno sequenti proveniunt.

Vires
u/m.

Quia tandem Smyrnum hoc Creticum, idem cum Smyrno Dioscoridis esse credimus, idèd hîc ejus vires & usum repetere superfluum fuerit, ut de quibus ante satis superque ex veteribus dixerimus.

SMYRNIVM PEREGRINVM folio oblongo.

Deser.

HVIUS inferiora folia ex radice prodeuntia, Apij foliis similia sunt, in complures particulas oblongas divisa, oblongis pediculis donata, per ambitum profundius laciniata, pallidè virentia, quæ verò in caule sunt cubitali, striato, non subrotunda, nec duplicia; ut in communi Smyrno peregrino, sed eorum primum, uncias sex longum, tres latum, per ambitum profundius incisum; superiora verò, per quæ caulis ad exortum transit, & simplicia sunt,

uncias tres longa, duas circiter lata & superna quæ leviter crenata sunt, sensim minora sunt: caulis in summo brachiatus, & cuilibet alæ, ramuli quaterni, rarius quini, biunciales insident, festucis aliquot, umbellam exiguum stoliculorum luteolorum sustinentes: quibus semen nigrum, subrotundum, lucidum, radicem non vidit autor C. Bauh. cui Doldius ex horto Camerarij transmisit. Vocat in pin. A. *Smyr.* *pin.* 15. Smyrnum peregrinum folio oblongo: pingit hæc Columna sub utulo, an Hipposelini non.

MACERONE, QVIBVS dam Smyrnum, semine magno, nigro.



MACERONE *Deser.*
dicta herba radice nititur crassa, foris & intus albâ: odoratâ, acricum quadam amaritudine: caules edidit plusquam bicubitales, farctos, ramulos, striatos, nonnihil rubentes: folia Apij palustris, ampliora, atrovi-rentia, sapore ad Apium hortense accedente, subdulcia: flores in umbella è quinque aut sex foliolis ex albo vire-scentibus, totidem-que apicibus con-loribus compositis:

semen crassum, nigrum, angulosum.

Hæc est illa planta, quam Corn. in Diosc. officinas quasdam pro Petroselino Macedonico ostendere, vulgusque germanicum, Petroselinum Italicum vocare scribit.

Petrosel.
Macedon.
in Ital.

Cord. hist. describit nomine Hipposelini, cui Geln. addidit figuram ex Trago. Is in Diosc. & di. *Hipposel.*
Cord. spél. supra diacat. Mes. vocat Olusatrum, Olixatrum, & Alexandrum, carpitque officinas, falsò Petroselinum Macedonicum appellantes. Eodem hoc errore culpandi sunt adhuc hodie Ebrodunenses, apud quos dicto nomine passim in hortis conspici-tur.

Pingitur à Trago pro Petroselino Alexandrino, a quo Macedonicum multum differre ait, ita ut Alexandrinum id sit semen magnum, sc. & nigrum, quo Sepalsarios uti scribit, quod genus lubens sub Hipposelino Dioscoridis comprehendi censet: siquidem magnum Apium esse statuit, & neque descriptionem reclamare: rursus verò ut Macedonicum minus sit genus, quemadmodum sub Pimpinellis & Apis fusè docet. Sed clamant contra Tragus. Manlius & Matth. Sylvaticus, dicuntque Olusatrum, aut ut ipsi loquuntur, Olixatrum esse Petroselinum Macedonicum & Alexandrinum, quæ ab invicem non distinguunt.

Petrosel. A-
lexandri.
in Trago.

Inclamat.
Trag.

Hipposelinum seu Olusatrum inscripsit Fuchs. cujus semine perperam officinas pro Petroselino Macedonico uti attestatur, statuitque esse Hipposelinum antiquorum. Hunc sequitur Lonc. Geln. cat. (ubi & Apium grande vocat) itémque de hort. (ubi & Olusatrum) Dod. gall. & lat. Ang. Lac. Lob. Tab. *Hipposeli-*
nus que an-
tores an-
trane
Apium gr.
Olus atrum.
Cas. & Bauh. itémque Turnerus, qui lecto Matthiolo suam opinionem, tanquam falsam, meritò retractat ut paulò infra dicemus.

Subscribamus

Hippofelinum Subſcribamus nunc eorum placita, qui Macerone *appellatur* Hippofelinum conſtituunt, vocantque græcè *ἵπποφελινον*; germ. groß Eppſich aut groß Eppich; Belg. groote Eppe; gall. *Ache*, aut *Ache large*, itemque *grand Perſil*. Lon. groß Peterlin auß Alexandria; Geſn. in cat. plat. etiam Myrthor & Myſcheron Alexandri. Turn. angl. Alexandre. Dod. belg. Peterselie van Macedonien/ Peterlin van Alexandrien; Hiſp. *Perexil Macedonico*.

Hippofelinum Amagnitudine (inquit Dod. qui Hippofelinum *unde dicitur* inſcribit) quâ reliqua Apia ſuperat, Græcis *ἵπποφελινον* dicitur, à Gaza Equapium: Appellatur verò & Olus atrum; & à nonnullis *χίνλον* & *ἀγροκόλον*, h. e. ſylveſtre Apium: Galeno verò & aliis quibuſdam [*Theophrasto ait in hiſt. gall.*] etiam Smyrnum propter ſuccum ab ipſo profluente, qui Myrrham, h. e. *σμυρνίαν*, reſert: offic. (addit in gall. hiſt.) non ſine errore Petroſelinum Macedonicum, cum quo nullam ſimilitudinem habet.

Hippofelinum Ang. epiſt. 7. hanc quidem pro Hippofelino recipit, Theophrasti ſc. non autem Dioſcoridis, aitque nihil aliud eſſe, quàm vulgare Macerone & Aleſſandri, & Scribonij Lari Olufatrum.

Macerone Lacuna reſutans eorum opinionem, qui Macerone Smyrnum eſſe volunt, vocat Hippofelinum, quod Apium beſtiale aut valdè magnum denotare ait, ſcribitque quosdam excellentes viros intelligere plantam, quæ ſine ratione dicatur Petroſelinum Macedonicum, unde corruptè in Italia dicta ſit Macerone: quorum opinioni aſſentitur, quamvis alij exercitati viri cenſant eſſe Smyrnum.

Hippofelinum Lobelius (qui ad v. p. 315. Hippofelinum, ſive Olufatrum appellat, addēs in Obſ. p. 407. & Icon. p. 708. Dioſcoridis; Macedonicum Belgarum) reprehendit Græcos nuperos, ac Matthiolum, quod perperam Smyrnum eſſe crediderint, his verbis. Perquam ſimiles Olufatrum & Smyrnum, aded ut minus circumſpectè utrunque exploranti, altetutrum utriuſvis poſſit veram delineationem repræſentare; ac cui utraque planta viridis præ oculis, atque deſcriptio non item. Magis conſpicuæ differentiz ſunt hæc. Iſtud genus, quod plebecula frequens eſtat, præſertim primùm aſparagos dum promit, vocitatque Macedonicum, vel Alexandrinum, ut Angli, in hortis copioſiſſimum, cui ſemen copioſum, atrum, unde illi Olufatrum, plenum, grave, ſemiſphæricâ figurâ, ſed paulum quid utrinque reſuſa in baſi, medicato guſtu acri, ad Smyrnum accedente. Marcell. & Braſſavola eſſe verum Hippofelinum aſſeruerunt, quod qui reſpuunt, anili proſum argumento, non ut veritati, ſed ſuz potiùs dignitati conſulunt, ne & Leviticum vulgare abjurent, pro majore Selino, nève verum Smyrnum: doctiorum omnium judicio, melius & repertum poſterius in Italia, in hujus locum ſufficiant. Sicq; volens vidensque errores ingeminat, cudit, & tegit Senenſis dictator, in ſaceto hoc ſæculo plaudente. Virgilius Marcellus ipſi perverſus interpres immeritò videtur, quippe hoc non eſt pervertere, ſi radices foris nigras, intus albas in quopiam non viſo ipſi codice aut exemplari legit, & ſcripſit. Perverteret autem, ſi contra, quàm autor innuerit, ſenſum exprimeret, atqui ſi, ut ipſe (Matth.) vult, Dioſcorides nullibi meminit, igitur, nec adverſatur, nec Matthiolus meritò Hippofelinum verum averſatur. Quod tamen vulgus Italorum avidiſſimè expetit in acetariis, non ſecus atque Germanorum, Anglorum & Græcorum, qui etiamnum, ut jam tum tempore Dioſcoridis, cum Smyrno confundunt,

Olufatrum quod Apium beſtiale aut valdè magnum denotare ait, ſcribitque quosdam excellentes viros intelligere plantam, quæ ſine ratione dicatur Petroſelinum Macedonicum, unde corruptè in Italia dicta ſit Macerone: quorum opinioni aſſentitur, quamvis alij exercitati viri cenſant eſſe Smyrnum.

Matth. v. 708. Lobelius (qui ad v. p. 315. Hippofelinum, ſive Olufatrum appellat, addēs in Obſ. p. 407. & Icon. p. 708. Dioſcoridis; Macedonicum Belgarum) reprehendit Græcos nuperos, ac Matthiolum, quod perperam Smyrnum eſſe crediderint, his verbis. Perquam ſimiles Olufatrum & Smyrnum, aded ut minus circumſpectè utrunque exploranti, altetutrum utriuſvis poſſit veram delineationem repræſentare; ac cui utraque planta viridis præ oculis, atque deſcriptio non item. Magis conſpicuæ differentiz ſunt hæc. Iſtud genus, quod plebecula frequens eſtat, præſertim primùm aſparagos dum promit, vocitatque Macedonicum, vel Alexandrinum, ut Angli, in hortis copioſiſſimum, cui ſemen copioſum, atrum, unde illi Olufatrum, plenum, grave, ſemiſphæricâ figurâ, ſed paulum quid utrinque reſuſa in baſi, medicato guſtu acri, ad Smyrnum accedente. Marcell. & Braſſavola eſſe verum Hippofelinum aſſeruerunt, quod qui reſpuunt, anili proſum argumento, non ut veritati, ſed ſuz potiùs dignitati conſulunt, ne & Leviticum vulgare abjurent, pro majore Selino, nève verum Smyrnum: doctiorum omnium judicio, melius & repertum poſterius in Italia, in hujus locum ſufficiant. Sicq; volens vidensque errores ingeminat, cudit, & tegit Senenſis dictator, in ſaceto hoc ſæculo plaudente. Virgilius Marcellus ipſi perverſus interpres immeritò videtur, quippe hoc non eſt pervertere, ſi radices foris nigras, intus albas in quopiam non viſo ipſi codice aut exemplari legit, & ſcripſit. Perverteret autem, ſi contra, quàm autor innuerit, ſenſum exprimeret, atqui ſi, ut ipſe (Matth.) vult, Dioſcorides nullibi meminit, igitur, nec adverſatur, nec Matthiolus meritò Hippofelinum verum averſatur. Quod tamen vulgus Italorum avidiſſimè expetit in acetariis, non ſecus atque Germanorum, Anglorum & Græcorum, qui etiamnum, ut jam tum tempore Dioſcoridis, cum Smyrno confundunt,

Hippofelinum Tab. Hippofelinum confirmat, ac in Iconibus ſuis (ubi figura tranſpoſita eſt, ſub Petroſelino Macedonico) adhuc Apium Hiſpanicum vocat, hæcque in hiſt. de eo ſcriptus mandavit. Nonnulli præſentem

plantam abſque ullo diſcrimine Smyrnum aliquod eſſe contenderunt, nec longius in eo aberrarunt, quàm quod Smyrnum Dioſcoridis æſtimarunt. Qui ſi Galenum, Aëcium & Apulejum hac de re conſuluiſſent, animadvertiſſent hanc ſtirpem non Smyrnum Dioſcoridis, ſed Galeni, Aëcij & Apulei eſſe, quod Dioſcorides Hippofelinum & Olus atrum nominavit, quodque Smyrnum ab aliquibus vocari retulit. Quæ Galenus, Aëcius & Apulejus de

Smyrno ſcriptis prodiderunt, ea de Petroſelino Alexandrino intellexerunt. Et hoc diligenter obſervandum eſt, ne binæ hæc ſtirpes inter ſe confundantur, id quod Plinium & Theophrastum feciſſe legimus. Poſito enim uno abſurdo, plura neceſſariò ſublequentur. Quæ verò Dioſcorides de Smyrno dixit, ea de Cretico intelligenda ſunt. Apium Alexandrinum vocatur Græcè à Dioſcoride *ἵπποφελινον*, *Γελόν*, & *ἀγροκόλον*: à Galeno cen & aliis *σμυρνίαν*. Lat. Hippofelinum, Olufatrum, Grielum: Galeno Aëcio & Apuleio Smyrnum: Gaza Equapium: Herbariis Smyrnum Galeni, Smyrnum holeraceum, Apium Hiſpanicum, Perſicum, grande, Alexandrinum, & equinum, Herba Alexandrina: Petroſelinum Alexandrinum, & equinum: Sorano Ephelio Alexandrum, Olyſatrum, & Olixatrum: Chyruſgis & pharmacopœis Petroſelinum Macedonicum nō ſine errore: Serapione lib. de temp. ſimpl. cap. 280.

arabicè Samarinion: Ital. Macerone: Venetiis Herba Alexandrina: Neapoli Alexandro: In Candia Macedonico: Gall. Macero: Hiſp. Perexil de Macianto, & Apio Macedonico: Egypt. Deuteroboni: Polon. Gies: Angl. Alexandre: Belg. Peterselie van Macedonien/ & groote Eppe: Germ. Alexandrinſcher Peterlen/ aut Peterlen auß Alexandria/ Roß Peterlen/ Roß Eppich/ Spaniſcher Eppich/ Perſiſcher Eppich/ & Alexander.

Cæſalp. dicitur Olufatrum, & vulgò corrupto vocabulo Macerone, ut putat à Macedonico Petroſelino: quia ejus loco aliquando acceptum eſt: alij Alexandrinum vocant: ſert luteum florem, radicem nigram. Galenus, inquit, reſert Romæ plurimum vendi appellarique vulgò Olufatrum. Iterum in ſimpl. cenſu Smyrnum quosdam Hippofelinon ſylveſtre nominare; Theophrastum verò Hippofelinon, quaſi equinum Apium, & ut Theod. vertit, Equapium, ſoliis vicinum Paludapio, hirsutum, & e radice nigrâ, quod quidam in totum Myrrham eſſe aſſerunt. Plinium tandem Olufatrum & Hippofelinon & Smyrnum vocari tradere. Hæcille. An verò ubique Macerone proveniat radice albâ qualis eſt noſtra Montbelgardi, non obſervavimus. Si Equapium ſive Hippofelinum Theophrasti eſt hirsutum, non poteſt eſſe Macerone: ſed interpretandum fortè *ἰσχυρόν*, non hirsutum, ut tranſtulit Gaza & eum ſequutus Cæſalp. ſed denſum. Theophrasti locus eſt ſub Apio magno, ſive Hippofelino.

Bauh. eſt Hippofelinum vel Smyrnum vulgatum apud Matth. Ac præterea Apium 14. in phyt. Eid. B. pin. Apium 13. Hippofelinum Theoph. vel Smyrnum Dioſc. Petroſelinum Macedonicum verum, Ger. Smyrnum, Matth. Cord. in Dioſc. Geſn. h. Caſt. Lugd. Col. qui Dioſcoridis vult. Alexander, Tur. Echi uno ore Hippofelinum eſſe aſſerunt, ſed item diſcrepant, dum pars Hippofelinum Theophrasti, pars Dioſcoridis, pars Galeni, Aëcij, & Apulei, aut aſſerunt, aut negat.

Matthiolus Smyrnum eſſe contendit, ac ait. Si Smyrni ſingulæ notæ, quæ illi à Dioſcoride tribuuntur, rectè diligenterque expendantur, facile quidem percipi poterit, Smyrnum ei herba ſimilimum eſſe quæ à noſtris in Hetruria vulgò vocatur Macerone. Siquidem hanc naſci clarum eſt eo modo, ut notæ ſerè omnes, quas Smyrno Dioſc. red-

Dioscor.

Respondio.

didit, convenient. Verum quispiam, cui fortè hæc mea sententia minus arrideat, obtrudet nobis semen, ut quod Maceroni nostro non infitrotundum, Brassicæ modo. Huic illud responsum volo, quodd cum ceteræ in universum notæ illi respondeant, faciliè in seminis delineatione mendum subesse potest. Vel quodd non in rotunditate, sed in alio uni cum altero semine intercedat similitudo. Porro quamvis memorie non prodiderit Dioscorides, quodd Smyrnium seratur in hortis, in quibus hodiè, nostrum hoc seritur, sed quodd sponte in Amano Ciliciæ monte gignatur, tum etiam in collibus incultis, ac saxosis locis, Plinij tamen ætate passim in hortis ferebatur, id quodd ipse Plinius manifestè demonstrat l. 9. c. ult. ubi Smyrnium inter hortensia refert. Idem quoque testatur Galenus, quodd ipsum lib. 2. de aliment. facult. inter olera connumeret. Ex cujus sanè verbis liquidò apparet, Smyrnium veteribus etiam inter olera fuisse receptum. Galeno verb ad stipulantur ea, quæ de Smyrnio mihi retulerunt Siculi, namque ij affirmant, plantam Maceronem appellatam passim coli in suis hortis, atque eam Veris tempore (ut etiam Galenus perhibet) caulem teneri minimum emittere : qui non solum edendo sit, sed gratiam quoque ineat cum ore, præsertim si cum sale & Pipere Cinaræ modo comedatur. His itaque fortasse, vel etiam validioribus rationibus adductus Manardus, Smyrnium esse nostrum dictum Maceronem constanter asseruit. Quo fit, ut minùs dubitem Ruellij opinionem improbandam esse, quodd suspicetur Maceronem esse P. ludapium. Smyrnium verb eam esse stirpem certò putet, quam in Gallis vocant vulgò Lyeecchia, h. e. Ligusticum vulgare.

Ruellij opi-
one impro-
bando.Smyrni-
um
Galenus.

Camer. apud Matth. germ. vocatur Olusatrum si-
ve Smyrnium, quæ etiam inscriptione pictum dedit
in epit. Idem h. appellat Smyrnium Matthioli, ubi
ait Hippofelinum cum Smyrnio confundi, non esse
novum patere ex Hesychio, apud quem legimus
σμύρνιον τὴν ἰσχυροτέρην τὴν καὶ ἀγριὴν ἢ βοτάνην. Sed
patere etiam ex Galeno & Dioscoride docet.

Tatler.

Tandem Macerone non esse Hippofelinum o-
rendit sequentibus Turnerus. Præceptores meos
in simplicium cognitione, Antonium Musam, Fuch-
sium, Ruellium viros extra aleam doctissimos, se-
quutus, vulgare nostrum Alexandre / Hippofeli-
non Dioscoridis credidi. Sed lecto Matthiolo de
Hippofelino, descriptioneque diligentius perpen-
sà, notas quasdam deprehendi à Dioscoride Hip-
pofelino tributas, quas in Alexandre nostro non
est reperire. Tribuit enim Dioscorides Hippofelino
radicem albam gracilem, plantamque altiorem Se-
lino; foliaque in purpureum colorem vergere. No-
strum autem Alexandre. radicem habet magnam
nigram, plantaque tota, si intuearis, Selino nigrior
est, nihilque habent purpurei, etsi talis colore in o-
culis appareat primùm erumpentibus. Non est ergo
Hippofelinon Dioscoridis. Credo tamen Smyr-
nion, sed non illud à Dioscoride descriptum; ut vult
Matthiolus, sed illud, quodd rejicit Dioscorides, tan-
quam improprie dictum Smyrnium, quodd tamen
alii Græci, ut Galenus & Aëtius Smyrnion nomi-
nant. Hoc autem Smyrnion, ut ut à Dioscoridis Hip-
pofelino diversum est, existimo tamen esse Hippo-
felinon Theophrasti & Aëtij, & plantam eam, quam
Galenus de alim. fac. testatur suo tempore vocatum
Olusatrum. Quodd autem nostrum Alexandre non
sit Smyrnium Dioscoridis. hæc quæ in Smyrnio re-
quirunt Dioscorides & in Alexandre non reperiun-
tur, docent. Smyrnium Dioscoridis folia habet colo-
re in luteum languesciente : nostri Alexandre folia
sunt nigra. Smyrnium semen habet Brassicæ rotun-
dum, nigrum : nostri Alexandre semina oblonga

Nō est Hip-
pofelinum
Diosc.Smyrni-
um.Hippofel.
Theoph.

Olus atrum.

Smyrni-
um
Diosc. non
est.

sunt nullo modo Brassicæ similia, sed Selini, nisi
quodd multò sunt mitjora & nigriora. Radix Smyr-
nij intus viridis est, aut subalbida. Alexandre, nisi
fallit memoria, non habet radicem intus viridem,
neque subalbidam, sed penitus albam quantum me-
mini. Smyrnium Dioscoridis saxosis nascitur & col-
libus, atque squalidis & juxta semitas. Nostrum
Alexandre in opacis provenit, & humidis, & insu-
lis mari ambitis, ut in insula quadam inter Somer-
setensis agri ultima & V. Valliam. Quare Alexandre
nostrum non est Smyrnion Dioscoridis. Quodd au-
tem sit Smyrnium Galeni & Aëtij, ac Olus atrum, cu-
jus meminit Galenus, fuitque Romanis usitatum
in cibis, atque etiam Hippofelinon Theophrasti, se-
quentes rationes aut penitus, aut ex parte evin-
cent. Aëtius de Smyrnio hæc scribit, Smyrnion
aliis Hippofelinon dictum, ejusdem generis cum
Selino & Petroselino, sed semen habet nigrum, &
multò majus. Ex quibus verbis colligo, Smyrnium
speciem esse Selini vel Apij, & cum genus maxi-
mum, mentò Hippofelinum vocari posse. Discimus
etiam ob id Selini esse speciem, quoniam simile
habet semen figura & viribus; neque esse posse Apij
seu Selini speciem, plantam cujus semen cum Apio
nihil habeat simile. Ex quo colligimus Ligusticum
vulgare, cujus semen nullo modo Selino simile est,
neque Oreoselino, neque Petroselino, non posse
esse Hippofelinon Dioscoridis, nec Smyrnium Aëtij,
nec Smyrnium Dioscoridis. Galenus de aliment.
fac. de Selino, Hippofelino, Sio & Smyrnio, scribens
inquit, Omnia vim habet djureticam, &c. Hæc verba
Galenij perspicue docent, plantam quam ipse vocat
Smyrnium, esse nostrum Alexandre. Sed quæ mox
apud ipsum sequuntur, faciliè probabunt id ipsum a-
pertius, atque etià quoddà esse Hippofelinon (quodd
mihi est Dioscoridis, nō Theophrasti) quodd nequeat
esse nostrum Alexandre; nec non nostrum Alexandre
veteribus Latinis Olus atrum dictum fuisse. Galenij ver-
ba sunt, sed Hippofelinum & Sion contra comedun-
tur, &c. Videamus jam porro an probare possimus
prædictū Smyrnion, si ve Olus atrum esse Hippo-
felinon Theophrasti. Theophr. Hippofelinon suū ita
describit; Folia habet Eleoselini &c. In qua descri-
ptione nihil video, quodd nō cum Alexandre nostro
conveniat. Habet enim folia Apio palustri similia fi-
gurà, maiora, nec ita lævia. caulis magnus quoque; ra-
dix crassitie Raphanum æquat, nigra. semē nigrum,
magnitudine Orobi, sed alterius figuræ. Quodd ad
natales, copiose in qualibet Angliæ provincia na-
scitur. Nihil video igitur causæ, quo minus Hippo-
felinum Theophrasti sit nostrum Alexandre. Quo-
niam autem opinati sunt nonnulli Myrrham, Græ-
cis σμύρνη, ex radicibus Hippofelini exstillare, existi-
mo postmodum plantam hanc Smyrnij nomen a-
deptam. Quodd si quis obijciat Theophrastum & Obis-
tin. Galenum Hippofelino & Smyrnio folia tribuere
toto anno virentia. Respondetur Theophrastum,
sicuti ait Hippofelinum folia habere virentia, ita i-
dem de Selino dicere, & iis quæ in summitate viren-
tia sunt, i. e. folij extremos nam caules qui semen tu-
lerunt, Hyeme pereunt. Sed cum Selini duo sint
genera, 1. Fœmina secunda. 2. aliis Virgo, Viduum
dictum, quodd aut nunquam semen tulit, aut cau-
lescere incipiens decerptum est, antequam semen
maturum ferat, ut in Apio hortensi, quodd Æstate
vel Autumno semen tulit, nulla habet Hieme folia,
sed duntaxat Apium à Virgine nomen adeptum.
Ita quoque de herba Alexandre dicta se res habet.
Tamen enim non qualibet nostrum Alexandre ra-
dix folia habet Hyeme virentia: locis tamen cali-
dioribus Alexandre radix folia habet per Hyemem,
secus ac Apium hortense tenellum. Et hæc Turne-
rus de Macerone nostro iudicio scripsisse videtur.
Quodd

Smyrni-
um
Galenus.Ligusticum
vulgare nō
est Hippofe-
linon.

Myrrhæ

Obis-
tin.

Respondio.

Selini, ge-
nera.

Quod Macerone Italis, quibusdam verò Smyr-
nium semine magno nigro vocatur, dicitur pluribus
Gallia in locis, ceu & aliis multis adhuc hodie Pe-
trotelinum Macedonicum

Lam. Oritur Cæsalpino in umbrosis hortis prope ma-
ceres pingui Solo: lxtissimum autem in cœmeteriis.
Tempus. Vide ego passim in hortis. Genevæ florebat Aprili
& Majo, primo anno non producens caulem, Hie-
me virescente multiplicat semine deciduo, petire so-
litum postquam caulem produxit.

Virus. Valde familiare olus multis in locis, alit be-
Lin. ne & præstat eadem, quæ Apium, sed efficacius.
Calidum & siccum. Venit in cibum cruda & cocta,
tum radix concisa, tum folia tenella & caulis ex ace-
to & oleo. Radix Autumno eruta, ac in arena per
Hiemem conservata tenerior evadit, aptiorque a-
cetanis redditur, Ioanne Schvab referente, qui co-
piosam alit Ebroduni in horto. Radix Apij, quæ A-
lexandra multis in locis vocatur (inquit Ioub.) ante
coctionem præmacerari debet per novem aut de-
cem dies, affusâ quotidie recenti aquâ, ut condian-
tur radices.

SILPHIUM SIVE LASERPI- tium veterum.

CAP. LIII.

Silphium **SILPHIUM**, Dioscoride ita tradente, nascitur in
Diosc. Syria, Armenia, Media, & Lybia. Caulis ejus
Masp. Maspetum vocatur similis Ferulæ: folia habet Apio
similia, semen verò latum [foliaceum, Plin. & Onb.
Virus. qui addit καλῆται μαγδαλῆς] Radix exalfacit, æ-
Lin. grè concoquitur, inflationes facit [sic habet uterque
codex, teste Goupylo. at in vulg. exempl. desideran-
tur, nec etiam Corn. legit.] ac vesicæ quoque noxia
est. Strumis atque tuberculis cerato excēpta & su-
gillatis cum oleo illita medetur. Ischiadicis cum iri-
no aut cyprino convenit: excrefcentia circa sedem
tollit, tegmini Mali punici incocta cum aceto & im-
posita: venenis eadem pota resistit: nec non & in-
tundibus salibusque admista ori grata est. Colligi-
Liquor. tur & liquor è radice atque caulibus incisis. Præfer-
tur is modicè ruber atque translucens, Myrrhæ æ-
mulus, odoréque valens, minimè porraceus, neque
saporis immitis & asperi: qui denique dum liquecit
Syracensis. ac diluitur, faciliè albescit. At Cyrenaicus etiam si
tā illū quis ipsum degustaverit, madorem toto cor-
pore ciet, estq; odore blādissimo: adeo ut ne os qui-
dem gustanti nisi paululum spiret. Medicus verò &
Medic. Syriacus vinbus annis valent, & magis virosum
Syracensis. reddunt odorem. Porro liquor omnis anteaquam
Adulterat. siccecat addito Sagapeno aut Fabæ lomento [Faba
fracta, Plin.] adulteratur: quod maleficium gustu o-
dore, visu, ac diluendo quoque deprehendes. Sunt
verò qui caulem, Silphium, radicem, Magudarim, &
Partes ap- folia, Maspeta vocaverint. Efficacissimus est liquor,
pebationes.] mox folia, postremò caulis. Est autem ille acris, in-
flationesque facit, alopecias cum vino pipere & a-
ceto perunctas sanat: cum melle illitus oculorum
aciem exacuit, incipientemque suffusionem dissipat.
In dentium doloribus cavernis ipsorum inditur,
aut cum Thure linteolo illigatus circumponitur,
aut denique cum Hyssopo & Ficis in posca deco-
Animantia ctis colluitur. A rabioso cane commoriss prodest
Virus. vulneribus impositus, itidémque valet ad omnium
quæ virus ejaculantur animantium, venenatorum-
que telorum ictus, seu potus, seu etiam illitus. Scor-
Contra pionum plagis oleo dilutus circumlinitur gangræna
obfessis paribus, prius scarificatis, infunditur: nec
Celli. non & carbunculis, cum ruta, nitro & melle, aut
etiam per se: clavos callolique prius circumcis

extrahit, siquidem cerato, siccorumve Ficium car-
ne subactus antea fuerit. Sanat & lichenas recentes
ex aceto: itidémque sarcomata & polypos, si cum
atramento sutorio aut æruginè per dies aliquot illi-
natur: verum extuberantia forfice extrahi oportet.
Arterlis quoque longo tempore exasperatis opitu-
latur, ac vocem quæ derepente irraucuerit aquâ dil-
utus sorbitione confectum expedit. Quin & uram
illitus cum melle reprimat, ac in anginis cum aqua
mulsa utiliter gargarizatur. Vescitibus lxtiorem
colorem conciliat, ad tussim commodè in sorbili
ovo datur, itémque pleuriticis in sorbitionibus. I-
cterici verò & hydropici cum aridis Ficis utiliter
exhibetur. Rigores etiam cum pipere ac thure in
vino potus discutit. Tetano, opisthotonôq; distentis
oboli pondere devorandus datur: hærentes gulæ
hirudines gargarizatus cum aceto decutit. Quibus
haustum lac intus concreverit, & comitialibus, sum-
ptus ex aceto mulso succurrit. Potus verò cum pipe-
re & myrrha menses ciet: celiacos in acino uvæ
sumptus adjuvat: denique in lixivio potui datus
repente convulsis prodest. Ad potiones autem A-
mygdalis amaris. Ruta aut pane calido dissolvitur.
Cæterum, foliorum succus eadem præstat, ac liquore
multò ineffaciùs. Estur porro utiliter cum aceto
mulso ad purgandas fauces, maximè verò cum sup-
pressa interceptæ vox est: vescuntur & ipso cum
Lactucis, Erucæ loco. Sed & altera fertur Magudaris
in Lybia nasci, radix Laserpitio similis, at minùs
crassa, acris verò ac fungosa, nullòque prægnans
succo: ejusdem tamen cum Laserpitio facultatis.

De Laserpitio [λασπίδιον] nunc indicandum est ex
Theophrasto: Silphio radix multa, crassaque: caulis
quantus Ferulæ, & crassitudine ferè proximus; foli-
um quod Maspetum vocant, Apio simile est; semen
latum, foliaceum, sc. quod Folium appellatur, caulis
annuus, sicuti Ferulæ [ραβδόνη] Ergo Vere ineunte Ma-
spetum hoc exit, & pecus eo purgatur, pinguescitq;
vehementer, & carnes mirabilem in modum suaves
redduntur. Posthac caulem edit hominum cibo ido-
neum omnibus modis, elixum, assumque: corpora
eo quoque purgari ferunt, quadraginta diebus. Suc-
cus capitur duplex, alter ex caule, alter ex radice: plu-
qua de causa alterum Scaparium [σκαπίον] alterum
Radicarium [ρίζιον] vocant. Radix nigro cortice te-
gitur, eumque detrahente solent. Sunt veluti certæ
mensuræ cædendæ radices, quibus quantum con-
ferre putetur ad futuram cæsuram reservantes, reli-
quum abscindunt. Nec enim deviè [nec enim alio
pacto, fortè melius leg.] neque plus constituto cæ-
dere licet: corrumpitur enim putrescitque, si diu
mansit [si in exercitatum, aut iners diu mansit, ex
græco.] Præparant id conficiuntque in Pyrazum por-
tum advectum hoc modo: Cùm in vasa conjecerint,
farinamque admiscuerint, quatiunt crebrò & diu:
hinc etiam colorem capefuit & conditum jam incor-
ruptum perdurat. Præparatio, cæsuræque ita se ha-
bet. Locum Africæ amplum occupat, ampliorem
quàm quatuor studiorum millia. In hortis Hesperidi-
um ferunt ejus magnam partem colligi, sed ma-
jorem apud Syrtis. Peculiare hujus, culta fugere loca
proditur, quam obrem si colatur, mitescatque solum,
deviat [in deserta fugit, rectius ex Plinio. græcum
verbum est ἐξαναχέσθαι] atque omniò degenerat,
utpote naturâ culturam aspernans, ferocitatisque
constans vernaculum [serum ac contumax Plin.
ἐπὶ τοῖς ἀγρίοις] Cyrenentes annis septem prius, quàm
ipsi urbem habitarent, Silphium [Laserpitium] red-
dit Gaza] xutille assument: habitant verò annos
maximè uercentos usque ad Simonidæ Athenis ma-
gistratum. Illi sic referunt. Abj radice Silphij cubi-
talem esse tradunt, aut paulo majorem. Hanc in

Vou ranea

Angina.

Hirudines.

Foliorum
succus.

Maguda

ra.

Silphium
Theoph.

Succus du-

plex

Scaparium.

Radicarium.

Theoph. ro-

stus.

Succi præ-

parati.

medio extuberare in caput, quod sublime penitus extat, ut ferè supra terram esse appareat: unde primum [*ἡ δὲ* sub. *καυλὸς*, ex quo capite] quod lac appellant, erumpit, dein caulis assurgit, Magydarum nuncupant, ex quo nascitur id quod Folium [*φύλλον*] vocant. Folium id semen est, quod cum Auster vehemens [*λαμπρὸς*] post caniculam flaverit, difficitur, atque ita Laserpitium nascitur eodemque anno radix consummatur, & caulis. Sed hoc haudquaquam peculiare notatur, nam aliis quoque idem tribuitur, ni dixeris, quod diffictum id protinus nasci potest, ortum peculiarem sortiri, supradictisque propterea diversum intelligi posse. Adhuc circumfodiendum id quotannis censent: nam si cultura ea pramittatur, semen universum caulem, que totum proferri, & deteriora tam hæc, quam radicem reddi existimant: defossa autem fieri meliora, sc. Solo subacto, benèque gluto. Hoc autem repugnat eorum sententiæ, qui culta fugere volunt. Mandi quoque radices ex aceto recens decisas referunt. Folium colore aurum æmulatur. Sicalienum etiam quod pecora folio esitato purgari narrant. Nam & Vere & Hieme, pecus ad montem dimitti affirmant. Depasci verò à pecore non solum hoc, sed etiam alterum quoddam Abrotono simile auit. Vim ambo calefactoriam sortiri planè videntur, & purgandi quidem vim non habere: exsiccare autem, & concoquere unice posse. Quod si qua pecus ægrescens, aut aliis minùs bene se habens ingressa sit, mox eam sanari, aut mori ajunt, sed magna ex parte posse servari. Hæc igitur utro tandem sint modo, quærendum. Quod verò Magydarum vocant, alterum est Silphij genus, nimirum à primo differens: tenerus enim, minusque vehemens id lenitur & sine Lasere est. Expertis verò vel ipso aspectu & figurâ planè dignoscitur. Nascitur in Syria: nam apud Cyrenem, & monte Parnaso largè provenire eandem affirmant. Sed quidam Silphium id appellant. An culta id quoque Silphij modo fugiat, quærendum. Quin & si quid simile, aut proximum habeat, ad folij, caulisque rationem, & si quam ullo pacto emittat lacrymam, id investigandum. Ergo naturam ferulaceam, hisce contemplari oportet. Et hæc habet Theoph. l. 6. hist. c. 3. Capite verò tertio l. 7. Silphij semina, Atropiciis seminibus oblongis, neque laus, neque foliatis, similia esse ait. Libro 4. c. 3. refert in Cyrenensi omnium maxime peculiare Silphium esse namque id quoque copiosum eam regionem proferre, odorèque suavissimum. Idem 9. cap. 1. è caule & radice è Silphio succum elici tradere deprehenditur. itemque lacrymam ejus acrem esse, ut ipsum Silphium: quod verò vocat *ἡ τοῦ τοῦ εἰλείου* lacryma est. Et cap. 2. Quorum autem & caulis, & radix inciditur, horum caulis antea ferum recipit, ceu Lasere. Eorum denique succum alterum Cauliam, alterum Radiciam vocant: præstantior Radicias est: purus enim translucidus, & sicior. Caulias verò humidior, & idèò farinam ei inpergunt, ut satis coagulari possit. Incisuræ tempus idoneum Pœni novere. Lasere enim illis legendum natura largita est. Quin & radicum cæsores, & qui succos medicos legunt, caules liquare antea solent. Ad plenum verò, & qui radices, & qui succos legunt, omnes tempus suum cuique observant: ergo commune id esse omnium constat. His addit cauli. l. c. 5. Sponte illa exeunt, quæ minora consistunt: & maxime quæ annua herbaceæque naturæ sunt. Cæterum evenit, ut etiam majora interdum ita gignantur, cum aut imbres frequentes fuere, aut peculiaris aliqua occasio in celo, terræque consistit. Sic enim Silphium exortum in Aphrica ferunt, imbre piceo quodam, crassoque. Item 3. cauli. Et omnino vis omnis medica, vel radice, vel fructu, vel ramo, re-

spondent iis, quæ in gustatu quandam vehementiam monstrant. Quo in genere Capparis quoque enumeratur & Lasere [Silphium] quod aut nullo pacto locis cultis provenit, aut vitiosè, quia copiosiori, humidiorique alimento vescitur, proptereaque non æque vehemens est. Tandem 6. c. 18. Frons quia humidior, ac pensilis est, moderationem aliquam obtinet, quod etiam in Silphio, atque aliis plerisque acerbis patet. Folium enim Silphij suave fructusque leves propter humorem,

Plinius l. 19. c. 3. dixit autoritate clarissimum Laserpitium, quod Græci Silphion vocant in Cyrenæica provincia repertum, cujus succum vocant Lasere, magnificum in usu medicamentis, & ad pondus argentei denarii pensum. Multis jam annis in ea terra non invenitur: quoniam publicani qui pascua conducunt, majus ita lucrum sentientes, depopulantur pecorum pabulo. Vnus omnino caulis nostræ repertus memoriæ, Neroni principi nissus. Si quando incidit pecus in spem nascentis, hoc deprehenditur signotove, cum comederit, dormiente protinus, caprâ sternuente [sternutante, M.] Diuque jam non aliud ad nos invehitur Lasere, quam quod Perside, aut Media, aut Armenia nascitur largè, sed multò infra Cyrenæicum: id quoque adulteratum gummi, aut Sagapeno, aut Faba fracta. quo minus ostendendum videtur, C. Valerio, M. Herennio Coss. Cyrenis advecta Romam publicè Laserpitij [Lasere Dal.] pondo XXX. Cæsarem verò dictatorem initio belli civilis, inter aurum argentumque protulisse ex ærario Laserpitij [Lasere Dal.] pondo cxi. Id apud autores Græciz evidentissimos invenimus natum imbre piceo repente madefactâ tellure, circa Hesperidum hortos Syrtinque majorem, septem annis ante oppidum Cyrenarum, quod conditum est urbis nostræ anno cxi. vim autem illam per quatuor millia stadium Affricæ valuisse. In ea Laserpitium gigni solitum, rem feram ac contumacem: & si coleretur, in desertâ fugientem [*ἡ γὰρ χαρὸν*, evanescentem exarescentem desertâ derelictâque sede Theoph. Dal.] radice multâ crassâque, caule ferulaceo [magnitudine Ferulæ par, Theoph. Dal.] haud simili crassitudine. Hujus folia Maspetum vocabant, Apio maxime similia. Semen erat foliaceum, folium ipsum Vere deciduum, cni. Vesci pecora solita, primòque purgari, mox pinguescere, carne mirabilem in modum jucundâ. Post folia amissa, caule ipso & homines [post emissâ caulis ipse (sub. prodit) quo & hom. Theoph.] vesciebantur decocto, asso, elixoque: eorum quoque corpora xl. primis diebus purgante à vitiis omnibus. Succus duobus modis capiebatur, è radice atque caule. Et hæc duo erant nomina, Rhizias atque Caulias, vilior ille ac putrescens. Radici cortex niger, & ad mercis adulteria. Succum ipsum in vasa conjectum, admisto fursure [farina Theoph.] subinde concuendo ad maturitatem perducebant: ni ita fecissent, putrescentem. Argumentum erat maturitatis, color, siccitasque sudore finito [cum habitu osus vapor omnino discussus manare cessasset. Dal.] Alij tradunt Laserpitij radicem fuisse majorem cubitali, tuberque in ea super terram. Hoc inciso, profluere solitum succum, ceu lactis, supernato caule [supernasci caulem, vet.] quem Magydarum vocant. Folia aurei coloris pro semine fuisse [In Silphij planta *φύλλον* significat nunc foliorum eorum, quæ aureo colore est: nunc foliaceum semen, *τοῦ σπέρματος*, quod Austro post caniculam flante decussum novellas Silphij plantas gignit. Ea significationis varietas Plinium decepit. Dal.] cadentia à canis ortu. Austro flante. Ex his Laserpitium nasci solitum, annuo spatio & radice & caule consummantibus se. Hoc & circumfodi solitum prodidere. Nec purgari pecora,

Loco.

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Lasere

Perficum
Silphium
plus corri-
giur.
pecora, sed agra sanari, aut protinus mori, quod in paucis accidere. Persico Silphio prior [posterior legit Dalech. Nam priorē narrationem convenire Libyco, sive Cyrenaico, aperuisse Theoph. indicat. Perficum vocat, quod in Armenia & Media Persiarum imperio subditis nascitur. Dal.] opinio cōgruit. Alterum genus est, quod Magydalis vocatur, tenebrius & minū vebemēns, sine succo: quod circa Syriam nascitur; non proveniens in Cyrenaica regione. Gignitur & in Parnasso monte copiosius, quibūdam Lasepittum vocantibus: per quā omnia [per quod omnino. Vet.] adulteratur rei saluberrimae utilissimaeque autoritas. Probatio sinceri prima, in colore modicē ruffo, & cū n frangitur, candido intus, mox translucēte: gutta aqua, salivāque liquescit. Vſus in multis medicaminibus. Haecenus ille, qui ūsum ejus medicum l. 22. c. 23. proponit, pleraque juxta Dioscoridis praeſcriptum tradens, his verbis: Imbre provenit & Silphion. Venit primō ē Cyrenis, ut dictum est. Ex Syria nunc maximē importatur, deterius Parthico, sed Medico melius. extincto omni Cyrenaico, ut diximus. Vſus Silphij in medicina. Nam folia ad expurgandas vulvas, pellendōsque emortuos partus decoquuntur in vino albo, odorato, ut bibatur in mensura acetabuli à balineis [acetabuli. Ad hienas radix. M.] Radix prodest arteriis exasperatis, & collectionibus sanguinis illinitur. Sed in cibis concoquitur agrē. Inflationes facit & ructus. Vtinae quoque noxia. Suggillatis tum vino & oleo amicissima, & cum cera struunt. Verrucarū sedis crebriore ejus suffitu cadūt. Laser ē Silphio profluens, quo diximus modo, inter eximia naturae dona numeratum, plurimis compositionibus inferitur. Per se autē algores excaſcit. Potum nervorum vitia extenuat. Feminis datur in vino. Et lanis mollioribus admoveatur vulvae ad menses ciendos. Pedum clavos circumſcarificatos ferro, mistum cerā extrahit. Vrinam ciet Ciceris magnitudine dilutum. Andreas spondet, copiosius sumptum, nec inflationes facere, & concoctioni plurimum conferre senibus & ſceminis: item Hyeme quā Aestate, utilius, & tum aquam bibentibus: cavendumque ne qua intus sit exulceratio [quam acris thonia suā cum tenuitate partium junctā irriter. Dal.] Ab. agitudine recreationi efficacis in cibo. Tempestivē enim datum, cauterij [Cauterium licenter vocare Plinius hic videtur medicamentum Graecis dictum *μυστικόν* & *μυστικόν*, quod habitum & structuram corporis ac fabricam mutat; nempe quod ad motum suā caliditate & insigni tenuitate humores evocat ex alto, cutisque poros aperit: & intro sumptum sanguinem ac humores potenter in habitum corporis diffundit & dispergit. Dal.] vim obtinet: asuetis etiam utilius, quā expertibus. Ad externa corporum indubitatas confessiones habet. Venena telorum & serpentium extinguit potum: ex aqua vulneribus his circumlinitur: scorpionum tantum plagis ex oleo: ulceribus non matureſcentibus cum farina hordeacea, vel fico sicca. Carbunculis cum ruta, vel cum melle, vel per se visco superlitum ut haereat: sic & ad canis morsus. Excreſcentibus circa sedem cum tegmine [germine M. & CH.] punici mali ex aceto decoctum. Clavis pedum, qui vulgo Morticini appellantur [Morticinum (hominem sc.) per conviciū & contumeliā Plautus in Persa vocat, exanguem, tetrū, pallidū. Dal.] nitro misto, ante subactum. Carnes [vel ulcera cava explet, vel corpus obesum reddit, & ut alibi ait, pingue facit. Dal.] replet cum vino & Croco, aut Pipere, aut murium fimo & aceto. Perniones ex vino sovet, & ex oleo coctum imponitur: sic & callo [& clavis add. Dal.] Clavis pedum supertasis praecipue utilitatis. Contra aquas malas, pestilentes tractus, vel diex. In tussi,

uva, felis veteri suffusione, hydropisi, raucitibus: confestim enim purgat fauces, vocemque reddit. Podagris in spongia dilutum poscā lenit. Pleuriticis in sorbitione vinum potius datur, contractionibus, opisthotonicis, ciceris magnitudine cerā circumlitum. In angina gargatizatur. Anhelatoribus & in tussi vetusta cum potro ex aceto datur: & que ex aceto his, qui coagulum lactis [coagulatum lac, vet. Alij colostrā lactis. Dil. quibus lac potum coagulatum est] sorbuerunt. Praecordiorum vitis, syntectis, comitialibus, in vino [in cibo, CH.] in aqua mulla lingua paralyti. Coxendicibus & lumborum doloribus cum decocto melle illinitur. Non censuerim, quod auctores suadent, cavernis dentium in dolore inditum [cavernis Dioscorides indit, aut cum thure in linteo circumligat. Interim distinguendam causam doloris censemus. In frigida quid ni confectat? In calida quid non obſit?] cerā includi, magno experimento hominis, qui se ea de causa praecipitavit ex alto. Quippe tauros in flammā natibus illis: serpentes avidissimas vini admistum rumpit. Idē nec iungi suaserim cum Attico melle licet praecipiant. Quas habeat utilitates admistum aliis, immentum est, referre: & nos simplicia tractamus: quoniam in his naturam esse apparet, in illis conjecturam sapientis fallacem, nulli satis custodita in misuris concordia naturae ac repugnantia. Nec plura Plinius.

Hipp. lib. 4. de morb. rationem reddit, cur in Libya Silphium sua sponte nascatur: quum ut in Ionia & Peloponeso nasceretur, à multis frustra tentatum sit.

Galenus de Silphio 8. simpl. brevibus scripsit. Li-
quor, inquit, calidissimus est, imō & folia, & caulis, & radix lat strenuē excaſciunt. Sed omnia flatulentiae magis essentiae sunt, ac proinde coctu difficilia: foris tamen imposita corpori efficaciora, & omnium potissimum liquor, admodum trahentem facultatem habens, attamen & excreſcentias ameliandi, & liquandi vim quandam propter propositam temperiem obtinet. Haec ille.

Serapio Silphium in simplicium censu praeteriit. nisi Altiht & Anjuden nomine, de quibus mox particulatim dicturi sumus, historiam ejus tradiderit, ut plurimi, non sine ratione quidem, putarunt.

Strabo succi Cyrenaici defectus causam, in Barbaros, non in Publicanos rejicit his verbis: Cyrenis finitima est regio, quae Silphium gignit, & Cyrenaicum succum, quem Silphium posterius effert. vertendum, quem liquorem Silphium fundit. Interpretes enim non viderunt *ἐκείνῳ ἀπὸ τοῦ σιλφίου* duci, nec adverbium esse. Idem Strabo lib. 15. scribit Alexandro ab Arachosia transeunti ad Bactrianos per iter nudum arboribus, copiosissimum Silphium occurrisse. Id propemodum defecisse cum aliquando Barbari odio quodam ingruissent, ac radices ejus penē omnes eruisent.

Columella l. 12. c. 57. in Moreto Oxyporo, vel ut alij, Oxyparo componendo, requirit Laseris radicis, quod *εὐλαγία* Graeci vocant, fescunciam. Infra in pretiosiore Oxyparo faciendo. inquit: quod si etiam cum Laser non habueris, pro Silphio, mellis adicies pondo semunciam.

Antiphanes apud Athenzum Deipnos. l. 1. 1. Silphium ter alias res etiam excellere putat Silphium sive Maspetum ē Carthagine. Et lib. 14. in Philothe-
bo.

Libycus caulis Silphij

Adſtat divinis areſcitur radiis.

Phaverinus in Lexico suo Graeco ait Silphionem speciem esse plantae suaveolentis: & maximē Cyrenaicum. Et: Silphium esse radicem bene olentem,

Contra
Dysenteriam.

Hippoc.

Calenus.

Serapio.

Strabo.

Apud Ba-
ctrianos.

Columella.

Silphium
praefat
Carthagi-
na.

Amuletum. amuletum de collo suspensum. Idem Magydarim appellat, ac succum Silphij facit. alij verò, aliud à Silphio esse dicunt. Priscianus l. 7. cap. de Accusativo inquit. Magydaris significat fugis, i. e. caulis genus, qui nascitur ex ea parte, cujus radix Silphij avellitur. vel, ut alij volunt, Siliginem. Hactenus Priscianus. Hanc, caulem Lacerpitij quidam existimant. Plaut. in Rudente:

Seu tibi confidis fore multam Magydarim.

Rob. Steph.

Robert. Stephanus in Thesauo ling. lat. vocat Lacerpitium, *σίλπιον*, virgultum herbidum, ejusque succum Lacer, subjungens in Dioscoridis de Lacerpitio capite, cōmentariū Matthi. Rob. Const. in Lex. græco ait. *Σίλπιον* planta est ferulacei generis, folius *Απί*:

Rob. Const.

in agro Genevensi primū à nobis multis ostensa est. Ex Cyrenaica laudatissima, culturamque naturā effugiens. Latinis ipsa Lacerpitium dicitur. Lacer verò, id est, *σίλπιον* *καυκάσιος*, & *σός* simpliciter per excel-

Silphium
Genevensis.

lentiam, apud Hippocratem, lacteus ejus succus est, liquorque qui ex radice, vel caule scarificatus effluxit, ob idque *καυκάσιος* vel *ρίζας* vocatur: vulgò

Opop.
excellentia.

Beniovincē, sepiāriorūque est Asia duleis, ut Asia foetida, siue Iteucus diaboli, i. e. *σπίλον* *πυθικός*, succus sc.

Beniovinc.

ex deteriore genere Silphij, vitulos, foetidusque admodum, præsertim dum sufficit. Silphij folium à Dioscoride & etiam à Plinio Maspertum appellatur.

Corrig.
Pollux.

Corrigendus igitur Pollucis liber, ubi scriptum *σίλπιον* τὸ *φύλλον* *δασύπτερον* dici. Radix Silphij sola ab Hippocrate *σίλπιον* nominatur, teste Galeno in glos-

Pollux cor-
rupto legis
Mandarn.

sis: *ρίζας* καὶ *καυκάσιος* à Nicandro: *μαγυδάριος* à Dioscoride, quod tamen controversum: aliis, ut Theophrasto & Plinio caulem (qui & *καυκάσιος* simpliciter dicitur ab Hippocr. & Polluce κατ' *ἔξοχην*) vocantibus *μαγυ-*

δάριος semen. Pollux τὸ *μίστυ* *σίλπιον* τὸ *μὴ σπέρμα* καλεῖται *μάγδαριος*: corruptè pro *μαγυδάριος*. Apud Theophrastum 6. hist. 3. locus etiam corruptissimus, ita restituendus est, autore Plinio. Hoc incisio, profuere solitum succum, ceu lactis, supernato caule, quem Magydarim vocarunt: folia aurei coloris pro semine fuisse, cadentia à canis ortu, Austro flante, &c. *σπέρμα* *εὐδαίμων*, folium Laceris.

Adagium.

Occurrit hic illud Adagium *Batti Silphium* (*Βάττι σίλπιον*) Græcis novum & rarum quempiam honorem significaturis dici solitum. Aristoph. in Pluto:

Nec si mihi donaveris

Ipsūque Plutum, ipsūque Batti Silphium.

Negat se lycophanta quieturum, etiam si præmūmqua ntumvis magnum detur. Idem in equitibus:

Nostine stipitem illum

Qui dignus Silphio habitus est: notur quidem est ille mihi.

Historica
relatio.

Interpres diversam originem adagij scribit. Battus à Thera juxta Cretam insula, profectus, oraculo monitus Apollinis, vel (ut alij tradunt) domestica pulsus seditione, Cyrenen condidit. Cui quum Atri beneficij memores summū honorē habere studerēt, donarunt illi Silphium herbam apud illos omnium pulcherrimam: simulque numisma ferientes, in cujus altera parte, regia facies erat insculpta, altera Silphium, quo fuerat à civitate donatus. Cujus rei meminuit & Aristoteles in Republica Cyreneorum. Sed fusiū narrat Herodotus in Melpomene, addēs, apud Libyas regem Battum appellari, & hoc nomine compellatum ab oraculo, significante fore regem. Sunt qui dicunt imaginem fuisse datam: sunt rursus qui anulum, in quo civitas erat expressa, regi Silphium deferens. Porro Silphium inter herbas primam gloriam obtinet, cujus & folia, & fructus, & caulis, & succus pretiosissimus sit. Vnde Ampeliotz (ea gens quædam est Africa) Delphis Silphij caulem consecratum suspenderunt, ut author est Alexander. Hæc ferimè adfert in Plutum: nec dissident,

quæ Suidas memorat. At idem in Equites scribit Silphium fruticem esse inamœni odoris: rursus juxta alios amœni, & ad medicamenta utilem: cujus usum primus invenisse creditur Aristæus Apollinis & Cyrenæ filius, qui & mellis invenisse traditur. Illud quid sibi velit nescio, inquit Roterodamus: Aristophanis interpretæ ait; in altera numismatis parte insculptam *Βασιλειαν*, i. e. regnum, seu regiam, si transferas tonum: pro eo Zenodotus legit Ammonem: sic enim habet. καὶ τὴν *βασιλειαν*, ἐπὶ τὴν *βασιλειαν* *Ἀμμων*, ἐπὶ δὲ *βασιλειαν* *ἑστῶσαν*. i. e. Numismatis altera parte Ammonem, in altera Silphium expresse- rant. Ammonem, ut arbitratur Erasmus, sentiens Iovem regnorum largitorem, si quidem Homero credimus. Hujus Batti meminit & Pindarus in Pythiis: Respondit habitatori Batto frugiferæ Africæ. Eruditi quidam putant Silphium Lacerpitij genus esse.

Theophrasto, Strabone, Plinio, Columellâ, Græcisque Medicis & Herbariis de Silphio tradentibus, diligentiū auditis, omnique ejus in antiquis scriptoribus medicinâ & historiâ contemplatâ: non erit ut cum Marcello credimus, Silphij Ferula hæc, Balsami arbusculâ vilior, nec liquore liquor etiam inutilior. Siquidem peregrina Græciæ & Italiæ, ideòque

in majore dignitate, ceu illa semper fuit ac certos, privataūque sibi à natura traditos natales locos, quæd omnibus eam fecit optabiliorem, acceperit: ad

Cyrenem sc. latiores campos, etsi postea extinctum omne illud Silphium fuerit. Et ne longiores simus, ob raritatē, & quas habet, ad utramque valetudinē, egregias utilitates, gentibus ad spectaculum, & in

Deorū templis ad religionē & anathemata, proposita diu fuit. Cyrenes Delphis Apollini quotannis Silphij caulem ex agri sui opibus offerebant, Ferulamque hanc suam tantopore amaverunt, ut Con-

ditori Batto perpetuum cum ea honorem habuerint. In gemma, qua publicè in signandis epistolis civitas utebatur Battum gentis suæ auctorem ostendētes: cui mulier quo decebat corporis ornatu & habitu Silphij caulem porrigebat, fortunæ simul

naturæque pro suis opibus gratias agens, gloriam, felicitatēque suam: gratâ utriusque beneficij memoriâ sic ostentans. Id cerè maximum precij & honoris in Ferula hac argumentum fuerit, quod e-

gregium, rarum, amabile, preciosūque aliquid Græci significantes, non aliter quàm ut in dicto proverbio sit, Battu Silphium jactabant: neque immeritò tanta fuit quondam, utroque tempore, morbo-

rum & sanitatis, ex ea humano generi voluptas, simul & necessitas, tamque quotidianus & amabilis cunctis usus. Ob quam causam omnes plantam, partēque ejus, longiore historiâ illustrarunt, quàm

legentium aliquis æquo animo ferre potuerit, ab ipsis & à nobis dicta. Sed non inutilia, ut quæ causa sint, ut certius intelligi possint. Cyrenæico autem agro probatissimum nascebatur, tantūque illi ex ea laudis & honoris acceverat, ut Catullus unâ hæc notâ Cyrenem illustraverit, Lacerpiciferas in epi-

grammate suo Cyrenas vocans. Noverant enim tunc omnes quod ubique nunc ignoratur, eratque in quotidiano ciborum usu Silphium, quod grato sapore & odore commendabant. Miscebatur id ut indicat Columella Oxyporis: & ut plures alij testatur

Lacerpitiatum acetum in multo usu erat. Et ne huic de Silphio tractationi aliquid desit, illud quoque dixisse conveniat, quod Martialis de Simila ait.

Nec Laceru dotes per scriis numerare, nec ius:

Cum medico sortens cum sit & æquo sortens apium

Utebatur eo passim antiquitas, nunc autem tantū abest, ut nostrorum temporum Silphio uti gaudea aut medicina possit, ut rem ipsam utraque ignoret, nec conjectura saltē ostendere possit. Nove-

tunt

Martialis.

Liquor
Cyrenaei
nomen
tam notum.

sunt quidem nostrae ætatis Medici, inquit Marcellus, Opon Cyrenaicum, sed nomen tantum, & id quidem nomen longissimè ab antiquo Opo Cyrenaeico differt. Idem enim Opos Cyrenaicum & Laserpitium hoc quondam fuit: nunc autem in Asa foetida eadem uoce utuntur, quæ tetræ & ingrati odoris sensu tantum à Laserpitio differt, quantum venisimile est, quondam discrepasse eorum usus.

Aquatica.

Ex hac varia Silphij apud veteres historia, iudicatu perdifficile est, quænam sit hodie planta, quæ Laserpitium dici possit.

Macrone.

Macrone quidem non esse Silphium, cum aliunde tum ex semine (quod Silphio lacum & velut foliaceum tribuunt, coniecit Gesnerus.

Ligusticum

vulgare.

Silphium

Generis

quid?

Ligusticum vulgare nonnullis censetur Silphium, quorum opinio non placet.

Tradit Rob. Constantinus Silphium quoddam agri Genevensis. ejus autem verba hoc capite habentur. Quare lectores investigent, quam plantam intelligat.

Angelica.

Angelicam quidam faciunt Laserpitium Gallicum, de quo hoc libro agimus.

Imperatoria.

Imperatoria quibusdam est Silphium Cissalpinum sive Laserpitium, non absque errore.

Silphium

Massiliæ.

Silphij & Laserpitij nomine suam plantam habet Lobelius, quam ante circa Massiliam reperiri, de hac mox dicturi sumus.

Benivinum.

Benivinum non est Laser, vel Silphium, ut multi voluerunt, de quo H. n. lib. 9.

Asa foetida.

Plurimis Asa foetida est Silphij sive Laserpitij succusque duplex sincerus & impurus.

ALTIHT ET ANIUDEN veteribus.

CAP. LIIII.

Aniuden
Serap.
Alid.
Maharoch.
Tempus.

ANIUDEN est folium arboris Asæ Isaac E-benamtram apud Serapionem, & gummi ejus Aluht dicitur, & radix Maharoch. Abugerig Asam statuit calidam in quarto gradu, & nocivam stomacho & hepati, positamque in dente corrosa, eum frangere. Melangia Asa foetida est subtilior, & calidior, fortiorque odonifera. Aben Mesuz est bona pustulis intrinsecis & confert ventositati hæmorrhoidarum & stringit ventrem. Azaravi repent Asam multum bonam in ægrotantibus nervorum phlegmaticis, & non comparavit aliquid ei in calefaciendo, & in inducendo febrem, deditque ex ea ægroto in quantitate Fabæ manè, & tantundem vesperti, in potu vini boni, quia inflammatur corpus ejus statim. Radicem appellavit Abohanisa Almaharet Anjuden & unà Almohorocha, quam nasci in arenis tradidit. Almaharoch autem, juxta Melehah, est minor quam Asa in virtute sua, & juvamentis suis, & in nocumento, quod ipsa infert stomacho, & est facilioris digestionis. Rasis Almaharoch ait calidum & siccum, confortare stomachum & hepar, conferreque digestionem. Fusior de Almaharoch est Habix. Est, inquit, calida in quarto gradu, appropinquat operatio ejus operationi venenorum, & est mala hepati & stomacho, & quando imponitur denti corrosa frangit eum, & ipsa habet odorem fortem multum, & caliditas ejus est prope caliditatem Anacardi. Et dicunt quidam quod aliquæ gentes, cum non possunt præservare fata sua à rebus nocivis sine ipsa, quia ipsi suspendunt Asam ligatam in petia, in campis suis super bladum, & super flumina, quoniam ipsa occidit, & fugat suo odore canes fluviales, & omne quod ge-

Tom. III.

neratur in seminibus, ex vermibus & aliis nocivis, & homines quidam Armeniæ, quando inveniunt, quiddam vulneribus suis, quæ fuerunt à sagittis, apparet venenum, & opterea quoddam sagitta fuerit toxicata, apponunt in vulnere Asam, & evadunt à veneno illo sine nocumento. Et hæc de Asa & planta ejus Anjuden Arabes apud Serapionem perhibent. Is autem præterea hæc capite Laserpitium Dioscoridis & Galeni miscet & confundit, nonnihil varians à Dioscoride, & præcipue in fine capitis de Magudari altera in Libya nascente, ubi ait: Comeditur autem & radices pars interior cujusdam plantæ, quæ Moly dicitur, quæ assimilatur radici Anjuden, nisi quia est minor eadem, acuti saporis, non habens lacrymam quidem, sed easdem cum Silphio operationes. De hac planta vide Avicennam l. ii. c. 52.

Aluht porro Arabum plurimis est Laserpitium sive Asa foetida officinarum, Silphium Medum à quibusdam appellatum.

Pro Asa foetida quid pingat Euch. Roesslin ne scimus: signum putamus.

Asa foetida Castori dicitur de Xyride, sive Sphacula foetida.

Asam dici de Angelica, post apparebit.

Monachi in Mesuem dist. l. c. 55. notant, nonnullos decipi, Asarum pro Asa intelligentes.

Idem eodem loco referunt, aliquos Hæsec, quod est Thymus, dum legant Asæ, intelligere.

Alios etiam quandoque pro Asa, rem combustam intelligere. Ut e. g. quando legunt Galhani, Myrrhæ, Asæ, &c. intelligunt Myrrham crematam.

Scribit Fuchsius de comp. med. l. 2. sect. 15. ol. 54.

supra Oleum Itrinum Nicol. Myrepsi, falsò in lat. exemplaribus legi Asæ, pro Asæ.

Colleg. Florentinum in Antball. pro Asa admittit Sagipenum, seu Ammoniacum.

Tract. qui pro quo substituit ex Galeno pro Asa foetida Serapinum.

Asa dulcis multis est Laserpitium sive Silphium, quod Benivinum putant, de quo H. n. lib. 9.

Glycyrrham vocari à quibusdam Asam dulcem, dictum est H. n. lib. 17.

ASA FOETIDA, NO- tas officinarum.

LENT A & sequax est Asa, compactæ substantiæ, colore ruffo, glebis satis magnis coacta; odorem nobis virosam, Allij ferè, vehementiorem, magisque abominandum latè spirans, & nares acriter feriens: sapore primum amaro, postmodum mordaci, in officinis sæpè impura, ad nota igni flavescens.

Venisimile esse ait Cornarius Silphium Medicum & Syriacum esse hodie Officinarum succum, quem aliqui gummi esse putant, dictum Asam foetidam: Nam Dioscoridem virosi & graveolentis odoris esse testatum esse. Asam vocem esse ex Latere corruptam, minime dubium esse: foetidam propter graveolentiam Germanos vulgo Diaboli merdæ appellare.

Asam porro foetidam eandem esse cum Laserpitio, placet, ni fallor, etiam Garcie, Matth. Catal. francosurtensi, Clus. Lac. Amato, Monachis, Rob. Constant. Apoll. Dod. Disp. Col. Cam. Costæ, Lugd. Had. Junio, Bellon. Lob. Czf. & C. Bauhino. Hos igitur de hac re differentes audiamus.

Tanta est in nominibus Aluht, inquit Garcias, Anjuden, Asa foetida, Asa dulcis, sive odorata, & Laserpitium confusio, ut via explicare me possim.

M

quandoquidē haecenus neminem invenire licuerit, qui plantae, ex qua hoc gūmi profluat, nomē indicare, aut formam describere mihi potuerit. Illud autem certum est, hoc gummi *Aluht* Arabibus dici, non-

Antit. Im- nullis *Antit*: nam cuiusque Arabi gummi lingu-
gu. Impara. aut *Impara* ab indis vocatum ostenderis, statim id

Aluht sive *Antit* esse pronuntiabit. Planta ex qua hic liquor emanat, incolis Anjuden, quibusdam Angeidan dicitur. Sed quoniam hoc gummi ē longinquis, ut dicitur, adfertur regionibus, veram plantae descriptionem habere difficile est. Is vero ut paulo post dicemus, Asā solā saepius videtur, & retulit sibi narratum esse succum hunc ex planta quadam foliis Coryli extrahi, conciso caule, dein in bubula coria conjici, prius illita sanguine cum Tritici farina permixto, conservationis gratia: eāque ob causam si quid in Lasere futuribus simile conspiciatur, non adulterationis, sed puritatis potius esse indicium. Multis ab Avicenna l. 2. c. 53. nominibus insignitum est hoc medicamentum, veluti est *Aluht Almaharut*, *Almharut*, propter linguarum in regionibus, unde advehitur, varietatem. Quid autem interpretem movent, cum Asam vertit, ignoro, nisi quod verisimile sit eum non Asam, sed Laser vertisse; idque vocabulum deinde temporis injuria in Ala depravatum esse. Porro dicit aliquis *Aluht* non esse nomen plantae Lasericiferae, sed ipsius potius succi concreti & coacti: cujus sententiae esse videtur Gerard.

Almaharut.

obicitur.

Responsio.

Cremon. comm. in Rasin, cap. de diminutione coitus, lib. Divisi. c. 79. Huic sic responsum volo, Gerardum veram linguam Arabicam ignorasse, cum ex Baetica Hispaniae oriundus fuerit; lingua vero, quā Avicenna scripsit, legitima est Arabica, quā videlicet Syri, Mesopotamij, Persae & Tartari utuntur, apud quos Avicenna natus creditur urbe Basora (quae nonnullis Babylon fuisse putatur, certo tamen scilicet Babylonem non esse eam, sed proximam huic fuisse cujus nulla nunc extant vestigia) in provincia *Uzbeque* sita, quae pars est Tartariae. Eam igitur linguam vocant illi *Araby*, i. e. Arabicam, quā videlicet scripta inveniuntur Galeni, reliquorumque Philosophorum, & falsi Prophetarum opera, Nostrorum vero Mauritanorum linguam *Magarabi* nuncupant, quasi dicas, eorum qui ad Occidentem habitant; siquidem *garby* Occidentem arabice sonat, & *mae* eorum. Est itaque *Aluht* nihil aliud, quam ipsa planta Lasericifera, veluti plerumque sumitur gummi pro ipsa planta. Verum obicitur aliquis: Si *Aluht* non est Asa dulcis, quid est Asa dulcis? Asam dulcem apud nullum probatum auctorem, sive Arabem, sive Graecum, sive Latinum, legisse memini. Sed cum Arabes liquorem eam vocent; eum vero qui probe coctus sit & densatus *Robalanz* (Rob enim arabice densatum sonat, & *Al* est articulus genitivi apud Arabes) hinc de promptum esse nomen Asae dulcis verisimile est. Ceterum, *Aluht* Arabum, esse Laserpitium Dioscoridis & Plinij, tamen nemo legitimum Arabum (qualis est Rasus & Averrhoes) ejus usquam meminerit, satis ostendit Serapio lib. simpl. c. 251. qui de *Aluht* agens, ad verbum ea refert, quae Galenus & Dioscorides de Laserpitio scripsere. Cadit ergo eorum opinio, qui multis argumentis probare conantur, Asam fetidam à Laserpitio differre. Nam quod Laserpitium veterum in cibos admissum esse ajunt, Asam vero fetidam medicamentis solum utilem, idque raro; in cibis vero planè damnari ob tetrum odorem, plurimum à veritate aberrare mihi videntur, ut postea inter vires fusiùs dicetur. Mirari subit Ant. Mulam, qui adeo credulus fuit, ut his fidem adhiberet qui Benivy

obicitur a

la.

Responsio.

Error quorundam.

(quod veteribus fuit ignotum) plantam consimilem Silphio affirmant. Sic Ruellius Angelicam esse Laserpitium gallicum sibi olim imaginatus fuit, cujus opinio l. 9. H. n. g. cap. de Benivino convellitur. Eiusdem sententiae fuit aliquando (ut sc. Benivinum Laser esse putaret) ipse etiam Matthioli, veritate tamen coactus, sententiam mutavit. Hæc Garcias.

Succum Syrenaicum longè alium fuisse, & Benzoino vocatò excelluisse in promptu est nosse: cum legenti, alterum Ferulaceae plantae, alterum verò arboris proceræ multò suavissimum excrementum esse; tum etiam facultates, qualitatesve explosanti, quæ gustui in Benzoino, neque fervorem in intima seledantem, neque in corporis meatu pervadentem; sudoresve affatim cientem exhibet. Ac tamen Syrenaicum illud celeberrimum jam tum defecisse Plinij ævo assentior, inquit Lobelius, non tamen prorsum nullum extare in naturæ familia Laser persuadeor. Præter enim quàm quiddam speciem nullam penitus posse interire docent Metaphysica dogmata, tum verò mihi suppetit Asa fetida, quæ potius est Syriaci, Armeniaci & Lybici Laleris opinionem sustinere. Si porro quis duplicem Asam meminerit, alteram dulcem, alteram fetidam, is nosset, mitiorem illam, quæ dulcis dicitur, minus aut nihil additum habere fetidi Sagapeni, aut allicujus consimilis gummi; Fetidam verò multum. Quod sit ut interdum liquidior, lividior, rubicundior, remissiorque cernatur, prout mixta, recens aut vetustior fuit, neque dum exaruit, cujusmodi interdum videre est in rancidis officinis.

De Asa sive Ala hæc adferunt Monachi. Asa secundum aliquos, & secundum alios (quod putamus rectius) Asa, dicitur illud quod à Græcis Laser appellatur, ut patet concordando capitula Serapionis & Avicennæ de Asa, cum capitulis Dioscoridis & cæterorum de Lasere. Sunt aliqui, qui in duas species dividunt Asam, sc. in fetidam & odoratam: & sunt qui addunt & tertiam, sc. dulcem, quæ parum habet de amaritudine. Quorum opinio nobis non displicet. & quoniam scripta doctorum de Asa & Lasere, tradita sunt, ea hic brevitate causâ repetenda non sunt. Hoc tamen dicimus, quod judicio plurimorum hæc, quæ hodie communiter utimur, tenetur esse vera species Asae fetidae. Quod nos non audeamus affirmare, nec possumus reprobare, quia adhuc non vidimus plantam ejus, neque ab aliquo qui viderit, ejus formam discere valuimus. Dum ergo non habemus certiorē notitiā de ipsius Asae speciebus, liceat nobis hanc communem odoriferam & usualem, tam pro fetida, quàm pro odorifera, quàm etiam pro dulci in medicinis ponere. Dulcem quippe Asam adhuc non legimus in proborum authorum compositionibus. Odoriferam autem simul & fetidam Avic. can. 5. in oleo lerbuet descripsit. Nec miretur quis, quod diximus pro odorifera apponendam esse fetentem, tanquam suum contrarium: quia similiter Avicenna in fine sui cap. posse fieri notavit, ut loco fetidae, æquale pondus de odorifera ponatur. Si ergo fetidum & odoriferum contrariantur ad invicem, hoc in loco Avic. malè scripsit. Quod absit. Item dicit forsitan aliquis, quod ponere olemtem pro fetida (sicut Avic. dicit) est bonum, sed non contra. Ad hoc respondemus, quod de consimilibus idem est iudicium. Quod præterea sit melior odorifera, ut idem Serapio autoritate Mesurigiæ dicit. In permutatione autem ponere speciem meliorem

Nov. notat.

Non est Benzoinum.

Syrenaicum succum.

Monachi.

Asa species tres.

Asa fetida supplet dulcem & odoriferam.

Epist.
Manardi
de Asa
dulci non
confat.

meliozem sui generis, non est nisi bonum. Præterea nos huc usq; non vidimus propriam & veram odoriferam Asiam. Et quamvis aliqui, ut Manardus & Bravolus, velint Benzuin vocatum, esse Asiam odoriferam, tamen hoc nobis non clarè constat. Vnde putamus pari modo, ut dictum est de dulci, dicendum esse de odorifera, sc. quod illa quæ minimum habet fœtorem, respectu fœtentioris vocetur odorifera. In quo videntur convenire verba Avicennæ, qui ait: Alia est odorifera, non fortè habens odorem, &c. Odor enim in bonam & in malam partem capi potest, i. e. multoties ponitur odor pro fœtore. Ex quo etiam verba Serapionis conveniunt, cum dicit illam Asiam, quæ nascitur in Syria habere pejorem odorem. Pejus quidem non nisi à malo comparatur. Quibus visis, concludendum est bene posse poni Asiam fœtidam pro odorata. Insuper est advertendum, quod nonnulli ob ignorantiam & affinitatem vocabulorum multoties decipiuntur, & pro Asa intelligunt Asiarum: & aliqui Hæce, quod est Thymus: Alij etiam quandoque rem combustam, ut fusiùs ante diximus inter æquiva-

Esfer m. Apollo rad. 1. per Laser Medicum aut Syriacum, quod minùs valere, virosùmque odorem præ se ferre scripsit Dioscorides, quodque etiam tunc temporis, ut hodie Sagapeno adulterabatur, Asiam fœtidam intelligendam comprobatur & accipiendam. Is monet ab infitoribus aded adulterari ut potius Sagapeno variis suppositum fucis videatur.

Asiiden. Anviden. Latinos Silphium vocare testatur Pand. Mor. cap. 48. esseque genus Ferulæ, cujus gummi Asa fœtida dicatur, quam duplicem statuit, odoriferam sc. & fœtidam.

Abi d. Camer. apud Matth. germ. deprehenditur approbare sententiam Garcie, videlicet Altiht Arabum esse Laserpitium Græcorum.

Aspiden. Costa Ital. cap. 62. scribit in Altiht, Anguiden, Asa fœtida, dulci, & odorata dissidere autores: esse gummi, existimarique proprium ejus nomen esse Lasen. Iis autem qui dicunt Asiam fœtidam dissidere à Laserpitio, quia Asa fœtida usque sit tantum in Medicina, respondet (cum Garcia) magni usus in cibis esse apud Indos. Fallit Sepulveda

Aspiden. Fallit Sepulveda propterea, licet Guainerus & multi, solum in compositionibus recipiant: Matthæum Sylvaticum venenum dicere Galenum adducentem: quod quidem apud illum, nec ullum Græcorum reperitur: rem non bene considerasse Matthæum.

Lug. planè assentituriis, qui Asam Laserpitium esse censent. Ac propterea rectè scribere Garciam errare verò eos attestatur, qui Asam fœtidam & Laserpitium differre putant.

Almajemur. Bellonio de medicato funere, Almajemur, quod Serapio in cap. de Mumia sua citat, apud Galenum videtur Silphium esse, quod Romani Laserpitium vocent, officinæ Asiam. Insuper si Serapionem capite de Ajouden legamus, Almajemur Mesues, cum Serapionis Almajemur prorsus convenire, nos deprehendere. Cum itaque Mesues seorsum Mumiam ab Asa descriptam habeat, quæ idem est cum Almajemur, liquere sanè ex eo quod Mumiz vires non confundat cum

Mesues. Silphio, neque sui Silphij vim suæ Mumiz eum tribuere voluisse, ut à Serapione, aut ejus saltè interpreti immeritò accusatur. Itaque si quem fortè apud Arabes similem errorem comperias, eum in interpretem, non autem in ipsam authorem conferre debebis. Non enim Arabes Mumiam intellexisse Silphium esse, neque Silphij vim suæ mumiz eum tribuere voluisse, usquam legitur. Si quidem vires, quas Græci Silphio tribuerunt, Arabum. III.

bes Asa adscribunt, non autem Mumiz, prout utrumque bene descriptum habeant. Ne autem aliorum opinio nos conturbet, ista de Mumia & Asa, & de Ajouden & Almajemur dicere voluit Bellonius. Ergo qui temerè bonos viros citant, atque eorum sententiam non tenent, reprehensione non carent. Quod si Avicennam, Serapionem, Mesuem, Rasim, omnes denique Arabes capite de Ajouden legeris, in eo Silphij vires seorsum à Mumiz viribus descriptas esse videbis. Arabes, cum sua lingua scriperant, à nobis non essent magno Græcorum & Latinarum literarum, sed Arabicarum acervo corripendi. Nam quum eorum sententias omninò non teneamus, neque Arabicam linguam intelligamus, eos fortè infontes accusamus.

Esfer m. Laser à recentioribus Medicis Asa vocatur, distinguentibus in odoriferam & fœtidam: ut per odoriferam succus Cyrenaicus significetur, ut vult Cæsalpinus: per fœtidam Medius & Syriacus. tamen in officinis non reperitur nisi fœdissimum genus, quam Asam fœtidam vocant. Mirum autem si in Aphrica copiosum est Laserpitium, non afferri succum Cyrenaicum, qui ob excellentiam simplici nomine Succus appellatur, græcè Οὐρί. cum ex eadem Cyrenaica regione Ammoniacum habeatur, teste Dioscoride: idè quærendum inter eas merces, an cum Ammoniaco feratur. Hæc Cæsalp.

Et hi sunt, qui Laser seu Laserpitium Græcorum, Altiht & Anjuden Arabum, Asam fœtidam officinarum esse argumentis & rationibus comprobare conantur, quos cum aliis quibusdam sequuntur ij, quos supra commentoravimus.

Contraria stat sententia Brunf. tom. 2. In exeg. in Diosc. dicenti: Quamquam & Medici & officinæ pro Laserpitio Asa fœtida utantur, quæ pravissimi odoris est, tantum tamen differt à Laserpitio, quantum à melle fel.

Asam quoque non esse Laser aut Laserpitium concludit Agricola in med. herb. qui alibi ait, Laserem Medicum & Syriacum gravioris odoris existere, & hinc quoddam elicere Asam fœtidam Tabernarum, hos succos dici posse: Asam Arabibus corruptè dictam esse credi posse pro Laser: Virosùm habere odorem & putrilagine resipere, adulterari addito Sagapeno, &c. Cyrenaicum esse non posse hanc fœtidam Asam, Diabolicum stercus Germanis appellatum.

Montanus Asam Aromatariorum fœtidam nihil aliud esse concludit, quàm Laser putrefactum. Sed Asam fœtidam puram, qualis non rarò occurrat, nullo modo Laser putrefactum concesserimus, quin melius de ea sentire Garciam existimamus.

Disp. Colonienſe de Asa fœtida sibi non constat, dans p. 27. esse Laserpitium, Syriacum, aut Medicum; negans verò p. 46. ubi hæc habentur. Asa fœtida etiam est liquor Laseris Parthici & Persici, seu cum Mesue Medici & Syriaci, sed virus & putrilagine resipiens: atque nostra Asa fœtida, porraceum quid potius resipit & olet quàm virus & putrilagine. Videtur itaque alterius peregrinæ plantæ, quàm Silphij lachrymam, aut succum esse.

Eluchases Tabern. duas habet diversas figuras, quid intelligat autem, hætenus divinare non licuit. 1. Asa folia. 2. Asa melior ex Carmania. Sed & Hort. sanitatis cap. 46. figuram proponit fœtidam.

Nunc ad Synonyma, nominaq; varia intèdendum. Oὐρίς, Μανδινός, Σερπάρης, & παφίς dicitur Græcis, quem plures Asiam, ut Monachi, Scalig. & Manlius;

Asam & Azam simpliciter nominant; Asiam scetidam Garc. Lang. Lob. Bellon. Amat. (qui & virosum Laserpitium) Bacchanell. Rob. Const. Apollo, de Vigo Chir. Dod. VVirfung. Vesal. Platear. Costa Ital. Lugd. & alij. Asiam scetidam, Agric. Corn. Clus. Catalog. francofurt. Lac. Lonic. Toxit. Euchar., (qui scetidam habet figuram) Disp. Colonienſe, Hort. sanit. Adolph. Tab. & C. Bauhinus. Asiam scetidam, Rhegin. in exerc. Azam scetidam offic. Tab. apud VVirſ. Asiam scetidam officinarum, Ruell. Corn. Cölleg. Florent. (qui duo tamen Asiam scribunt simplici, ut etiam Cord. in Diosc. Cat. francof. Clus.) Matth. Fuchſ. Bacchan. Dod. Vesal. Succum aut liquorem Syriacum, Medicum, & Particum atque Persicum alij; nonnulli etiam Cyrenaicum. Laser Medicum, Syriacum & scetidum alij. Lacrymam Syriacam, Medicamque quidam. Guido Chir. Gummam scetidam. Laserpitium, Clus. Laser, Lac. & Cæl. Laseris alium liquorem, Harcho. Laserpitium & Silphium Diosc. Bauhinus. Eid. B. pin. dicitur Laserpitium veterum: Silphium Diosc. & Theoph. Laserpitium. Plinij: Althit Avic. Asa quorundam. Nec desunt qui Scordolasarum: Nicol. Myrepl. referente etiam Tabern. Scordolasarum: Alex. Bened. Opoparthicum, Opoparthiam & Scordolasar. Germ. Teuffels dreck. Belg. Duyuels dreck & Fieris Ien fonsa. Poloni Eżareic. Stercus & Merda Diaboli ob insignem foetorem appellatur.

Nomen.

Locum.

Volunt nonnulli ex Corasone ad Ormuz, & inde in Indiam deserti alij ex Guzarate, tamen si istic ex regno Deli adferri vulgo asserant, regione admodum frigida, quæ ad Corasone usque & regionem Chirvam ex Avicennæ testimonio extenditur. Frequens verò est, Garcia referente, in Mandou, Chitor, & Deli; præterea ex Ormuz advehitur in Pegu, Malaca, Tanasirim, & regiones alias vicinas.

Vires & usus.
In medicamentis
& cibis.

Nullum medicamentum simplex per totam Indiam majore est in usu (fas enim credere est Garciz) quam Asa scetida, cum in medicamentis, tum condendis cibis. Eam enim pro suarum facultatum modo sibi emunt, cuiusmodi sunt Baneanos (qui neque occidunt rem aliquam animatam, nedum eam vescuntur, ut in longum eos apud Garc. describit Clusius.) & omnes gentes Provinciæ Cabayæ, quos Pythagoras imitatus videtur. Solent illi Asam suis jusculis & oleribus commiscere, conficato primum ex ea lebe, nec alio condimento utuntur omnibus in cibis. Bajuli & huiusmodi tenuis fortunæ homines, quibus duntaxat panis est Cepe, non nisi summa in necessitate eam utuntur. Commendant mihi multi condimenta istorum Baneanum, cum à saporis, tum ab odoris suavitate. Horum oratione persuasus aliquando ejusmodi condimenta degustavi, quæ tamen sic satis palato aridebant, non tamen adeo ut illi prædicabant; quoniam fortè neque jusculis, neque condimentis valde delector: odore certè suo non erant molesta; tamen si nullus odor exquæ mihi infestus sit, atque Asa scetida. Sumunt verò nonnulli Asam, ut dejecti appetitus fastidia tollant initio enim aliquantulum amara est Asa, ut sunt Olivæ conditæ; deinde devorata mirum in modum illis bene sapit. Solent etiam plerique eam solâ ad stomachi corroboracionem, flatuque discutiendos, medicamenti loco uti. Quamobrem multi hallucinantur, qui Sepulveda secuti nullo esse in usu medico asserunt, nisi alius medicamentis permixtam. Lepidam porro historiam, quæ in Bisnager contingit, præmittere nequeo. Lusitanus quipiam istic vivens equum habuit maximi pretij, quem illius provinciæ Rex libenter emisset; nisi multis flatibus obnoxium comperisset. Lusitanus Asam farinæ permixtam

Fastidium.

Historia
lepida.

equo præbet edendam, & flatuum morbo liberat. Equum jam sanum emit Rex, & qua ratione curatus sit, percontatur. Respondet Lusitanus, Imgu, sive Asam edendam dedisse. Tum Rex: haud sanè mirum si curatus, cum Deorum cibo illum paveris. Ad hæc Lusitanus, sed missitans, ne exaudiri posset, & Lusitanico quidem sermone, verius Cæcodæmonum cibum nuncupasset. Sed non possum non mirari Matth. Sylvatici cap. 17. de Anjuden oscitantiam, qui Galenum citans, venenum esse asserit. Nam neque Galenus, neque Græcorum quispiam id unquam scripsit, cum omnes uno ore Laser magnopere commendent adversus venena, pestis contagia, lumbricos, & scorpionum plagas. Solent Indi cavernis dentium indere in dolore, quam facultatem etiam illi tribuit Dioscorides, tamen si Plinius id non censeat, exemplo cujusdam, qui hac de causa sese ex alto præcipitavit. Sed is forsitan cachexiâ laboravit, & medicamentum eos humores, qui turgebant, nimium commovit. Magni apud Indos est pretij, quod eo plurimum utantur etiam in venere proritanda. Radicis verò aut foliorum apud eos nullus est usus; sunt enim illis incognita. Succus conciso caule extractus in bubula coria conjicitur, prius illita sanguine cum Tritici farina permixto, conservationis gratiâ: eamque ob causam si quid in Laser futuribus simile conspicitur, non adulterationis; sed puritatis potius est indicium. Atque interrogatus doctus quidam Baneanus, cur Asa velleteretur, quandoquidem admixtus esset bubulus sanguis? respondit ejusmodi esse medicamentum, ut hæc regula minimè in illo observanda sit. Porro Laseris duo genera ad Indos adferuntur, alterum sincerum & translucens; alterum turbidum & impurum, quod à Baneanibus repurgatur ante quàm in cibos admittatur. Sincerum colore est puro, Electro simili, id Gurazate convehitur ex Chitor, ut ajuat, & ex Patane & Dely. Impurum ex Ormuz adfertur: majoris pretij est sincerum, neque facillè mercatores impurum emunt (solet autem id magna parte in tenuiorum cibos & medicamenta cedere) nisi purioris defectu. Sincerum validioris est odoris, quàm sordidum, utrumque tamen scetet, sed id magis quod sincerius esse putatur. Qui verò ejus usui assueverunt, sincerius, odoratius esse asserunt; quod quadam consuetudine fit. Neutrum verò Porrum redolet, sed ad Myrrham non nihil accedere videtur. Hinc factum puto, ut Avicenna Asam diviserit in scetidam & odoratam, quod scetidam porraceo odore esse assereret, cum non ita sit. Siquidem veteribus odoriferum dicebatur, non quod suaviter oleret, sed quod validè esset odoris. Hactenus Garcias.

Dolor dentium.

Proritas
venere.

Laser duplex.

Nefas fore duximus non subscribere eam, quæ Tabern. germanico idiomate de Asa scetida usu & facultatibus perhibuit. Asthamati cum ovo sorbili sumpta medetur. Drachmæ pondere cum aqua bibita coagulum lactis in ventriculo dissolvit. Contra mandragoram & opium sumptum laudatur electuarium, quod recipit Asa scetida, granorum Juniperi, & Castorei ana Vnc. semis. Hac pulverizata cum mellis Vncis quatuor & semis componunt Electuarium, de quo propinant in vino nucis Avellanæ magnitudinem. Ad uteri strangulatam accipe Asæ & Castorei ana grana xii. Duarum drachmarum pondere cum vino venerem stimulat. Hirudines casu poti ejiciuntur Asa cum aceto potata. Succo mali Punici hibitur contra contusio-
nes. Sæpius odorata à suffocatione matris liberat. In collo suspensa anginam curat & affectus gutturis.

Venena.

Vires stræ
calam.

Cicufina.

Angina.

ris. Cum ruta & pipere in vino pota nervorum affectibus medetur, & paralyſi. Odorata parum accelerat. Si sanguifuga deglutita hæreat in faucibus, ægrum suffumigat Guido cum Aſſa.

LASERPITIVM E REGIONE

Maſſiliæ allatum.

CAP. LV.



A docto Pharmacopœo Iacobo Raynaudo, unde & Pena & Lobelius, Maſſiliæ ante annos multos Laserpitium accipi, cui caulis præaltus, ſtriatus, geniculatus, fungoſus: folia in alas dividuntur è regione oppoſitas, quæ in minores rursû subdividuntur: folia ſingularia nullis hærent pediculis, ex adverſo ſita triplice ſerè per extremû diviſura, Spinæ albæ foliorum æmula, craſſiuſcula & fir-

ma, averſâ parte rari pili, rigidiusculi. umbellas tradunt Adverſaria prægrandes eſſe Ferulæ, aut latiores quàm Anethi. ſemen Angelicæ foliaceum, rotundum, compreſſum, odoratum & colore buxo. radicem prægrandem, intus albam, foris cinericeam, ſucco prænantem, mollem, pinguem, odoratam, majorem quàm Thapſiæ aut Ferulæ.

Synonyma.

Lobelius vocavit. adv. p. 313. Laserpitium è regione Maſſiliæ repertum in Icon. p. 702. Laserpitium & Silphium. Lugd. p. 731. Laserpitium Penæ. Bauh. phyt. & pin. Laserpitium 12. gallicum: itémque apud Matth. Tab. Laserpitium Maſſilioticum.

Ferulacea hæc planta Rondeletio viſa fuit Laserpitio aptius congruere, quàm quævis alia ex multis, quas ille vidit, Ferulis.

Loco.

Laserpitium hoc vidi Lutetiæ in horto Robini menſe Auguſto, qui miſit E. Comiti plantandum in hortum Montbelgardi.

LASERPITIO LOBELII SIMILIS anguſtiſolia.




QVAM Laserpitio Lobelij ſimilem, ſed anguſtioriam cognominamus, vidimus in horto Robini Lutetiæ, qui ſibi miſſam affirmabat nomine Dau-ci montani. De hac plura ſcribere non poſſumus, cum eam nullibi obſervaverimus, nec quiſquam autorum, quantum ſcimus, ejus mentionem fecerit.

Tom. III.

IMPERATORIA.

CAP. LVI.



POLICARI Deſcr.

cracſitudine nō nunquam eſt radix, ſenſim gracileſcens, ruſſa & lateralib⁹ fibris, quibus ſe propagat donata, ſummâ tellure oblique acta, carne albâ, aromaticâ, acrimoniâ vehemēter linguam vellicante, totūque oſ calfaciente: folia terna plurimū juncta, Macerones, acutioria, rigida, quorū ſingula ruſſum in tria ſegmenta ſerrata, aliàs levius, aliàs profundius dividuntur: cau-

les cubiti & ſeſquicubiti altitudinem aſſequuntur, ſtriati, inanes, in alas diviſi: umbellæ ſtorum alborum Myrrhidis, latæ: ſemen Anethi ſerè, ſed paulò majus, candidum, plenum & latiufculum.

An veteres hanc noverint, aut ſub quo nomine intellexerint, necdum hodie apud Medicos & Pharmacopœos conſtat. Multi namque veteribus incognitam dicunt, Agricola hanc re ſequentes, quorum opinioni & nos facile adſcripſerimus.

Tragus ad Smyrniū commodè referri poſſe exiſtimat, de quo Dioſcorides l. 3. Et Theoph. hiſt. l. 10. c. 1. inter ſuccos plantarum Smyrniū Hippoſelinū, h. e. Equapiū, quemadmodum Gaza tranſtulit, vocat, quodque Cilices authore Dioſcoride Petroſelinum dicunt, appellatūve ſit ab Anacreonte Copium, referēte Marcello. Serapionem dicit cap. 350. tertium Apij genus Senirvion appellaiſſe, quo loco Smyrniū legendum eſſe putat Tragus. Idem ait de Smyrniū hoc diligenter ſcripſiſſe Plinium l. 17. c. 15. Cum iis tamen nequaquam contendit, qui cum Ruellio Silphium ſeu Laserpitium Dioſcoridis eſſe volunt. Ex hoc numero eſt Fuch. Turn. & Lemnius: itémque Solerius & C. Bauhinus.

Non eſt ſilentio diſſimulandum, inquit Ruellius, præcipuè cum in nonnullis compoſitionibus, veterinarie medicinz authores, Gallicum requirant Laserpitium, aliquando in Gallia produiſſe. Et jam quibūdâ in locis apud nos [Paris] invenitur in hortis hæc ſpecie. Radix craſſa eſt & multa, foris nigricans, intus candida, tuber in ea, quæ ſuper terram eminet. caulis ei ſceniculaceus, folium Apij in auri colorem languēſcens. ſemen foliaceum, latum, nempe quod figurâ exile ſolium exprimit, mirâque fragrat jucunditate. Cum vulneratur caulis proſluit lentor modicè ruſſus. Tam radix quàm lachryma, ſemenque ſua-viſſimum ſpirant odorem. Cui, ut rei magnæ authoritatis, illuſtria indiderunt nomina. namque modò Angelicam, modò Sancti Spiritus radicem, modò Imperatoriam appellant herbarij, eique calfacientem, ſiccatoriâque vim in tertio ſignant abſceſſu, &c. Vides hunc plurimâ à Medicis & Herbarijs, qui de ea periculum fecerunt, ſatis Laserpitio congruere. Si ergo Gallicum Laserpitium, cuius veterinarij Medici meminerunt. Vereor ne Ruellius Imperatoriam & Angelicam inter ſe confundat.

Indiſſa Ge-teribus.

Smyrniū Dioſc. Tra- go. Hippoſel. h. e. Equapiū, quemadmodum Gaza tranſtulit, vocat, quodque Cilices authore Dioſcoride Petroſelinum dicunt, appellatūve ſit ab Anacreonte Copium, referēte Marcello. Serapionem dicit cap. 350. tertium Apij genus Senirvion appellaiſſe, quo loco Smyrniū legendum eſſe putat Tragus. Idem ait de Smyrniū hoc diligenter ſcripſiſſe Plinium l. 17. c. 15.

Smyrniū.

Silphium Dioſc. Ruell. & alii.

Gallicum Ruellio.

Angelica. S. Spiritus radix. Imperatoria.

Ruell. ut. l. 10. c. 15.

M 3

Lasertium. *Silphium* Græcis, *Lasus* & *Lasertium* Latinis dicitur, si *Fuchio* credimus, vulgò & officinis corrupta voce, de flexa tamen quadam à *Lasertio* pristini nominis umbrâ, *Ostertium* vocatur. Primum siquidem *Lasertium*, dein depravata nomenclatura *Ostertium*, postremo *Ostrium* cepit appellari. Qui sanè lapsus facilis admodum fuit. Abjecta namque primâ literâ, *Austertium*, & dein a mutato in o, *Ostertium*, ac postremo magis concisè *Ostrium* nominare ceperunt. Veteribus Germanis haud dubiè *Lasus* vultus dicta est hæc herba, quam quidem vocem, utpote semilatinam, posteri non rectè intelligentes in *Meisterwurz* mutarunt, Ex hujus quidem descriptione luce clariùs constat esse *Lasertium*, saltè Germanicum. His accedit, quòd facultates *Ostrij* nominati, à *Lasertij* viribus non discrepant quemadmodum postea patebit.

Turn. Lasertium. Non memini, inquit *Turnerus*, quenquam videre aut legere ex recentioribus, qui ausit affirmare se verum *Lasertium* *Theophrasti* & *Dioscoridis* vidisse. Putat *Ruellius* *Angelicam* esse *Lasertium* Gallicum. Si quod est in Gallia aut Germania *Lasertium*, malo *Imperatoriam* pro eo sumere. folia enim *Apio* similiora quàm *Angelica*.

Turn. refutatur. Quod triviali voce *Ostertium* ac *Magistrantiam* dici refert *Lemnius* de occult. l. i. c. 17. id *Silphium* *Casalinum*, & *Lasertium* vocat. *Solerius* verd nominat *Silphium* Gallicum, *Imperatoriam* *Ruellij*, & *Alegros Delphinatum*. Ex *Solerij* autem verbis colligitur *Ruellium* per *Silphium* Gallicum non *Angelicam* ut vult *Turnerus*, sed *Imperatoriam*, quam modò quoque *Angelicam* dici testatus est, intellexisse.

Silphium non est. *Error multum.* Ceterum, qui plantam *Imperatoriam* vulgò vocatam, legitimum esse *Silphium* asserunt, nostro iudicio plurimum aberrant. Siquidem jam olim *Plinij* temporibus, unicus solummodo *Silphij* ramulus inventus fuerit. *Imperatoria* quoque nullus autorum alteram speciem assignavit. Postremo *Silphij* caulis inflationes facit (sic dicitur quoddam, inquit *Diosc.*) *Imperatoria* autem flatus discutit, ut postea suscitetur.

Struthium. *Cordus* hist. *Struthij* hodie vocati nomine describit, cuius etiam inscriptionis titulo *Gesnerus* figuram apposuit ex *Trago*. *Cornarius* quoque *Ostrium* (*Imperatoriam* nostram intelligit) esse *Struthium* vilibus conjecturis ostendere conatur, non approbans eorum opinionem, qui officinarum *Ostrium*, sive *Astrutium*, aut *Magistrantiam* appellatam, esse *Sphondylium* eonstanter asserunt.

Sphondylium negatur. Nolo, ait, hic præterire, eam quæ apud aliquos *Imperatoria* nomen accepit, à *Mauritanis*, & ipsos sequentibus officinis, *Struthion* appellari *Conditi* in *Macri* verd vulgato libello *Ostrium* vocari, & ipsi omnia, quæ *Dioscorides* & *Plinius* de *Struthio* habent, adscribi. Vnde postea *Astrutium* & *Astrens* & *Astrantia* vulgò dici cepit. Hanc itaque ut verum *Struthium* esse credam, vel hinc maximè inducor.

Struthium non est. Suffragatur autem etiam usus ejus vulgatus. Hæc *Cornarius*, cui scribere maximè veremur, quòd *Imperatoria* herba ad lanas purgandas, lavandasque hodie nullus sit usus, qualis erat *Struthio* tempore *Dioscoridis*, qui propterea quoque *Radiculam* & *Lanariam* herbam, *Struthion* appellavit. Ad *Sphondylii* porro descriptionem melius accedere videtur multis ea herba, quam multi imperiti apud Germanos *Brancham* ursum falsò vocarunt. de hac infra agemus.

Astrantia nobilis. *Lasus Gal.* *Angelica* *Heister.* Nunc considerandum an *Smyrni* Græcorum convenire possit, id quod *Trago*, uti ostensum, ac etiam *Gesnero*, irémque *Lonicero* placet. Nobilem *Astrantiam* appellat *Gesn.* in compositione casei *Claronensis* [*Syger* Germani vocant, ni fallimur]

ac ait; Sive *Lasus* hanc Gallicum dicas, ut *Ruellius* *Angelicam*, cuius hæc ferè species videri potest, ita ut sexu aliqui tantum discernant, nam & *Lasus* duo referuntur genera; sive *Oreoselinon*, sive *Petroselinon* *Macedonicum*, haud multum retulerit. Mihi ad postremum animus inclinât, cuius argumenta plura sunt. Primò à nomine, quia veteres *Estreaticum* nuncupabant. Secundo à natalibus, in præruptis enim montium & petrosis, quamvis & in pratis montanis exilit. Tertio à sapore, quem inter omnia *Apiorum* genera, acerrimum amarissimumque habet: ita ut *Galenus* universam ejus amaritiam inficerebat. Quartò ab odore, est enim odoratum admodum. Quintò à figura, quam folijs & umbella quodammodo similem *Apio* habet. Ab effectibus, qui eidem omnes, quos veteres adscriperunt, & præterea multò plures à nostra gente ei attribuntur. Quæ facultates omnes etiam *Smyrni* magna ex parte attribuntur, & *Cilices* *Smyrni* in *Amano* monte nascens *Petroselinon* indigerant. Est tamen infirmius *Petroselino*, & *Apio* vehementius, teste *Galeno*. Et hæc idem prolixius recensuit *Gesnerus*, ut caseum *Claronensem* commendaret, quem etiam cum *Lasere*, i.e. *Batti Silphio* viribus excellentia quæ certare scribit.

Ceterò, *Tragus*, *Gesnerus* & *Lonicerus* ex recentioribus, hallucinantes contendunt, plantam *Imperatoriam* vulgò vocatâ legitimum esse *Smyrni*, argumento quòd ejus radices externis nigrescant, interius verd virecant, inquit *Matthiolus*. Quibus addimus, quòd natalis & vires correspondere videantur. Verum iij ex eo aperte decepti deprehenduntur, quòd non animadvertierint, an hæc plantæ ceteris inter se notis conveniant, cum vel solum semen apertissimum discrimen manifestet. *Smyrni* Græcorum semen habet *Brassicæ*, rotundum, nigrum, &c. *Imperatoria* semen *Anethi* ferè, sed paulò majus, candidum, plenum & latiusculum. Dicos porro viros sibi falsò imaginari *Imperatoriam* dictam esse *Smyrni*, testatur etiam *Lacuna*, qui *Ostrium* ab *Imperatoria* diversis capitibus separât, quàm bene considerent periti.

Si vires hujus plantæ contemplemur & formam, maximè convenire videbitur cum *Panace*. Si igitur *Rosa aurea* *Herba* renæ inesset, constanter affirmaret *Casalinus* *Panacem* *Chironium* esse. at eadem difficultas contingit in *Panace* *Herculeo*; quæ enim in *Alpibus* etiam *Pisanis* oritur, in ceteris omnibus convenit cum descriptione ab antiquis tradita, excepto floris colore luteo; cum in *Herba* renâ sit albus.

Dod. gall. tenet sententiam eorum, qui *Struthion* Græcorum asserunt, ac propterea latine vocat *Lanariam* & *Radiculam*, Arabicè *Conditi*, quam ait esse veram *Herbam* fullonum & *Saponariam*, idèq; *Ostrium* inscripsit, gallicèq; appellari posse cõcedit *Herba à fontem* germ. wesch Braut & Seiffen Braut Belg. Seepcruyt, sed non absque errore, in quo tamen non perseverat, sed eum agnoscens ingenuè retractat. Differt (inquit in sol. lat.) multum à *Struthio* sive *Lanaria* herba. Non autem amplius *Ostrium* sed *Astrantiam* nominat. Alij verd *Astertion* sive *Ostertium* legere malunt. qui voces hæc à *Lasertio* depravatas volunt, & *Astrantiam* *Lasertium*, vel ejus speciem esse. *Lasertium* autem caule describitur ferulaceo, i.e. magno atque procero: hujus autem tenuis ac brevis est cauliculus, qui solus à *Lasertio* differentem esse satis ostendit.

Ignoranter quidam *Imperatoria* tribuit *Mactroni* nomen Italicum, alterius plantæ. *Herb. antiq.* *Cubæ* & *Euch.* *Roeslin* malè nominant *Meu* & *Anethum* agreste.

C. Bauh. *Imperatoriam* medicæ esse naturæ ait in-
ter

ter Lasepitiū & Pānaces, vocatque inter alia synonyma Ligusticum Anguillaræ (ex Lobelio) magno errore. Ligusticum enim Anguillaræ, idem est cum Cæsalpini Ligustico, & Ligustico altero Matthioli, quod in Liguria Imperatoria dicitur, diversaque est ab Imperatoria fratri dicta. Potent itaque si quædoque de stirpibus tractare cogitaverit, errorem hunc animadvertere ac corrigere, debuissetque hoc in descript. Baldi inter spontaneas Ponzæ jam olim observasse, monuisseque in pin. ubi est Imperatoria major.

Imperatoria, quæ ob raras & præstantes facultates sic nominata fuit, dicitur Matth. Lac. Gesn. h. Lob. Adv. Cast. Cam. epit. & hist. & Tab. Imperatoria Matthioli, Lugd. p. 727. Imperatoria Ostentium, Lob. Obs. p. 398. & Icon. p. 700. Astrantia, Brunfels. Gesn. de lacte & operib. lactariis, itemque h. Clusio, & Dod. lat. in fol. Magistrantia. Cam. & Offic. germ. Lasepitiū germanicum, Fuchl. Smyrniū, Lon. Smyrniū hortense, Trag. Herba Rena, Cæf. Struthium hodie vocatū, Cordo. Ostrutium, Dod. gall. & Lon. Aliàs vocatur etiam Ostrutium, Astrencium, Ostentium, Asteritium & Astrutium corruptis nominibus dubio procul à Struthio Dioscoridis, quandoquidem multi hanc Dioscoridis Struthium esse falsò existimarunt. Germani vocant. Meister wurtz/, quasi omnium radicū Magistrā & Reginā appelles, Beyser wurtz/ Astrenz/, & Magistranz/. Belg. Meesterwortel: Galli Orruche & Imperatorie: It. Imperatoria, Angli Peultorye of Spayne: Boh. Wssedobr.

In nonnullis Italiz montosis gignitur præstantissima verò & frequentissima in Ananienlib. montib. supra Tridentinum tum & apud Germanos, quibus tamen sæpenuerò, veluti & Belgis aliisque nationibus, hortensis est. Producit etiam in pratis ad radices montium, Alpibus Austriacis & Striacis vicinorum magnā copiā. Junio flosculi apparent, quibus decidentibus semen succedit. hiemis patiens radix, multo tempore vivit, serpendo progrediens.

Sed posteaquam de Imperatoria herba incidit mentio, prætereundum sanè more nostro non duximus, quin non hîcejus quoque facultates & usus subscriberentur. Radix itaque gustu admodum acris deprehenditur, mordax, subamara & odorata. Ex quo non temerè aliquis conijcere potest, Imperatoriz radicem excalescere tertio excessu completo, vel quarto inchoante: fîccare verò secundo. Dîscutit hæc mirificè tum ventriculi, tum intestinorum, tum etiam uteri flatus. Quapropter colici cruciatibus ac ventriculi torminibus maximè utilis est: Cit item menses atque urinam. Povenit ejus decocto utiliter in dolore dentes, præsertim si in vino austero radix decoquatur. Eadem ex vino pota, uteri stranguationibus prodest. conceptum adjuvat, quem frigiditas intercipit: concoctionem roborat. Com-manducata est veluti præstantissimus apophlegmatismus, ut quæ efficaciter cerebri pituitam expurget. In pulverem contrita, vinòque subinde pota, frigidis occurrit morbis. Quamobrem resolutis, committalibus, convulsis, auxilio est. Ajunt nonnulli quartanā eos sanari, qui pulveris cochlearis dimidium horā unā ante accessionem, ex mero biberint. Oris halitum commendat, & omnes roborat sensus. Epidemiis morbis, venenis ferè omnibus, ac venenosorum animalium tum morsibus, tum ictibus opem præstat. Asthmaticos seu anhelosos juvat, obstructions aperit, aqua intercute laborantes sanat, itemque liene affectos. In summa excalescit universas corporis partes, quas frigus occupavit. Vt hinc palam fiat, herbam hanc non immeritò sibi Imperatoriz nomen ascripsisse, cum tot tantisque viribus

præstet, authore Matthiolo. Ferventis admodum Tæq. Dod. facultatis Astrantiz radicem testatur etiam Dodonæus, sed excalescentem ordine tertio, nec minùs resiccantem tenuium similiter partium esse: incidere, attenuare, digerere, sudores ac urinas movere, crassos frigidosque humores concoquere, aliàque omnia posse, quæ Matthiolus de ea scriptis mandavit. Fuchsius præter dicta hæc habet. Lasepitiū germanicum pestilentiz populariter grassantis accet contagia: tussi quam frigus attulit medetur. Crassa enim, quæ in thoracē coeunt, discutit. Coloris corporis bonitatem iis, qui eo velleuntur, efficit. Concretum in corpore lac & sanguinem resolvit. Stomachum esu corroborat. Pituitam ventriculi de-jicit, & elaguescentem appetentiam invitat. Rabioli canis morfu, aut serpentis ictu liberat, si contrita folia vulnere indantur. Hypochondriorum vitis auxiliatur. Item lumborum doloribus. Carbunculos cum polenta tritum & impositum sanat. Herba ipsa in vino & aqua cocta vulnera interna glutinat: & in terna. summa omnia quæ Angelica, & majori efficacia potest. Vt hinc etiam constet Osteritium nominatum easdem habere, quas veterum Lasepitiū, inefficaciores tamen facultates. Quare cum metus sit ne Lasepitiū adulterinum, aut saltē non optimum ad nos adferatur, præstat Lasepitiū germanico uti, quodd sc. exigua admodum pecunia comparari possit, & viribus satis efficax sit. Nam eadem quæ Dioscorides & Plinius Lasepitiū assignant, recentiorum testimonio præstare valet. Hæc ille. Ego cum Lugduni publico stipendio donatus in crudelissima peste profliganda occuparer, in officinis magno pretio Imperatoriz radix pro Angelicā vendebatur, leviori multò errore, quàm illorum, qui Napellum inibi pro Elleboro divendebant, publicā pœna digni. Tabernomontanus cum Fuchio Imperatoriam in universum calidiorem atque acriorem Pipere ipso, adeoque calefacere & exsiccare radicem in tertio ordine, succum verò ad quartum usque statuit: semen cum radice folia & caulem superare, ita ut in ea efficacissimus omnium aliarum partium sit liquor, secundo loco radix & semen, tertio folia, & postremò caulis. Ex his particulatim radicem & semen piscibus coquendis præ cunctis aromatibus commendat Succum porro cum præfert, qui è radice & herbâ siccâ exprimitur, eo modo, quo de Absinthij succo monstravimus. Convenientissimum tempus aquam distillandi, est mensis, quo in flore est, in balneo Mariæ, cum radice, foliis & floribus, omnibusque ejus partibus. Fit vinum ex Imperatoria Radicis conserva (cujus dosi drachmæ duæ) Extractum (hoc scrupuli pondere in menstruo suo ser-vata) extractionis Syrupus (qui præparatur in modum Syrupi de cinnamomo, exhibeturque de hoc pro vice cochleari unum) Sal, & Oleum stillatitium, chymica arte extractum. Quæ omnia ad enumeratos affectus unice conducere à multis experta sunt.

IMPERATORIA ALPINA.

Minor quàm præcedens est, omnibus suis partibus, nam & angustiora folia & pedicellos teneriores profert ex radice non absimili jam dictæ Imperatoriz, & æquali etiam, gustu acriori & magis urenti.

Hanc quidam volunt Astrantiam marem nominari, ut refert descriptionis author Camer in hist. ubi Imperatoriam Alpinam, Astrantiam Alpina & Astrantiam silvestrem vocat, ceu etiam in epit. Germ. Bergsirenz & Bergmeister wurtz. C. Bauh. apud Matth. Smyrniū 4. & Imperato-

Imper. mon. riam Alpinam: In phyt. Imperatoriam sive montanam: pin. Imper. minorcm.

Imper.



Imper. mon.

Imper.
Quartana.
Partus
Mortuus.

sedandos, ut quod vulgaris quoque Imperatoria, auctore Camerario, praeitare potest.

Hanc Camerarius in Alpibus apud Helvetios provenire ait. Sed miror, cur non annotarit particulatim locos Helvetiae ubi ab ipso observata fuerit.

Calida est & sicca ut vulgaris Imperatoria, quae superior esse facultatibus omnibus videtur & ad agendum promptior. Utuntur hac planta ad quartanas, partus eruentes & cerebrum expurgandum, flatus discutiendos, colicosque dolores

terdum ad dodrantem, tam longitudine, quam latitudine accedentia, & tota Hieme virentia: sequenti aut tertio anno caulis e medio foliorum assurgit, *Canis.* dum aut nonnunquam trium cubitorum altitudine, crassitudine pollicem plerumque superans, teres, geniculatus, glaber, in candido livente & abstergu facili polline veluti conspersus, & concavus, geniculatim foliis ornatus, praedictis multo minoribus. habet ramulos & adnata aliquot caulis, in quorum summitate magnae sunt umbellae, quinque aut sex unciarum latitudine, formae convexae, candicantibus flosculis plenas, quibus bina succedunt semina, invicem conjuncta, oblonga, angulosa, paleacea & in candido cinerea: oblongum, planum, foris nigrum, intus candicantem & cartilagineum nucleum, paleaceo & anguloso cortice claudentia. Umbellae antequam enascantur, in posteriorum foliorum parte instar utriculi tumidae continentur, quae intra ipsum utriculum auctae, rupto utriculo, erumpunt, quandam conferti racemi speciem referentes, donec in modo dictam formam adolevant. Radice nititur antequam caulis enascatur crassitudine plerumque manum complente, nonnunquam etiam crassiore; oblonga, in multas dodrantes aut pedales partes distracta, foris nigricante, intus candida, carnosae, molli, succosaeque: quae praecisa flavum liquorem seu lachrymam ab interiori corticis parte remittit, cui similis liquor etiam in foliorum venis continetur, sed aquosior. Cum vero caulis maturo semine perit, ipsa quoque radix putrescit. eadem quamvis tempestive effodiatur, ob excrementitij humoris copiam facile ab innascentibus vermiculis perfunditur. Saporem radix, semen & folia habent *Sapor.* acrem, fauces scarificantem, subamarum, tenuem & aromaticum: odorem similiter acrem, vehementem, *Odor.* medicatum, atque aromatum similem. Efficacissimus omnium partium liquor est, mox semen, deinde radix: flores & folia postremum locum tenent.

Umbellae.

Semina.

Nucleus.

Radix.

Lachryma.

ANGELICA.

CAP. LVII.

ANGELICA SATIVA.



Defon.

Succus.

Angelica sativa radicem altè demittit, interdum multo plusquam brachiali crassitudine, cum multis adnatis pollicari crassitudine & fibris rugosae, cuticula in cinereo rubescente nonnihil obtectam, pulpa alba, gustu admodum calido & aromatico, acri & amaro, odore suavi, succum ex incisione remittentem croceum, ejusdem saporis: ex qua surrigitur caulis crassus, ad terram purpureus, geniculatus, concavus, striatus, bicornitalis, multis alis donatus. folia e vulgari se proferunt convoluta in pilam quasi, multa, quae ubi se explicaverunt, in ambitu crenata, mollia, supernè virentia, infernè dilutiora, formae, ut fors tulit variæ, semper tamen oblonga sunt, sed multo gibbo inaequalia, modò continua, modò disiecta, sapore & odore minus aromatico, quam radix. Quia autem nec flores, nec semina à nobis delineantur placet Cordi diligenter Botanicis descriptionem integram hic referre. Angelica primo anno cum e semine prodierit, pediculos emittit cubitales, crassitudine digitales, teretes, teneros, glabros, & in terram repandos, utrinque in binos, ternos, aut nonnunquam quaternos, minores pediculos, seu brachia divisos & expansos, in quorum extremitate folia sunt figuræ Apij solius similia, sed multo majora, in ternas plerumque turbinatas partes antrosum spectantes secta, propius ad Aceris cinerem folia accedentia, in-

ANGELICA OFFICINARUM.



Ceterum, prostat in officinis radix Angelica, quae non parùm distat, à praecedenti. Quia autem haec à nobis non integra visa, dubitamus an sola cultura differentiae causa sit. ea enim constat plurimis, tenuibus, longis, nigrisque fibris, ex uno capite Ellebori albi modo.

Quamvis porro Angelica, nostro quidè judicio, nobisque ad stipulantes Braunschweig. & Tabernemontano ab antiquis non describatur, nihilominus tamen non desunt alij qui Silphium, vel eidem congenerem esse asserere non dubitant. Reperiuntur etiam qui Smyrnon Dioscoridis esse perhibeant. Nonnulli Panax Heracleum statuunt, aliis interim Panacis speciem tantum indicantibus. Myrrhis etiam à quibusdam dicta olim deprehenditur. De his itaque fufius indicandum est.

Silphium itaque Dioscoridis dixisse videtur Ruelius esse Angelicam, quam tamen cum Imperatoria surpiter

Angelica offic.

Antiquis

Silphium
Diosc. E.
surpiter

Defon.
Cordi.

Angelicae
enascantur.
Pediculi.

Folia.

Ruell. prob. re-turpiter confundere deprehenditur, ut precedenti capite, ubi ejus verba adscripsimus, annotavimus. Nemo enim præter ipsum Angelicam Imperatoriam vocavit, præterquam cum secutus Lonicerus. Angelicam tamen ab Imperatoria vel Silerius distinxit utramque Silphium appellans. Silphium autem esse non potest, inquit etiam Fuchsius, quod folia Apij habere minimè deprehenditur. Gucias quoque Ruellium lapsus redarguit, qui Angelicam Laseris genus putavit & Belzuinum, uti indicatum H.n.l.9.c.de Belzuino.

Silphii congener multum in Silphij speciem Dodon. Silphium congenetem fecit Geln. h. & C. Bauh. phyt. itemq. Dod. & Cæsalpinus. Σιλόη, sive Lasepitij species esse apparet, inquit Dodonæus, si non ipsum genuinum ac legitimū Lasepitium fuerit. Nam si cum eis conferatur, quæ ex Theophrasto prolixè satis de Silphio adscripsimus, respondere comperietur. Radix namque crassa, superius veluti in caput extuberat: caulis quantus Ferulæ, cibo idoneus; qui post seminis maturitatem perit: folium Apij divisurâ, sed longè majus, semen vento facilè abripitur, latum ac foliaceum; unde aliæ stirpes rursus progignuntur: amat silvestria loca. Quale omninò Silphium à Theophrasto esse traditur. Iam & memini olim me à Cortuso Lase accipere, odore ac colore succo è radicibus Angelicæ incisis profluente, simile: quod Angelicam Silphium esse quoque adstruit.

Angelica alpina Cæs. alpina. Cæsalpino Angelica vulgo appellatur in Alpibus caule bicubitali, crasso & concavo, odorato: foliis Olusatris, oblongioribus, læviter serratis, mollibus: umbellas ferens latas: flore candido: semen candidum, oblongum, striatum, quod in foliacea quædam labia dilatatur, valdè odoratum, quasi Moschum redolens, sapore acris: radicem palmi longitudine, crassam instar Napi, candicantem, fungosam, succosam, jucundissimè olentem, acrem & subamaram: Lachryma concreta pullefcit: descendit & in plana juxta aquas, locis umbrosis brevior: folio nigriore: radice minori, figurâ tenuioris Napi, quæ in plures radículas desinit, odore infirmo ad Pastinacam vergente: caules recentes & tenelli, & folia utriusque gustui grata sunt. Celebrant radicem ad venena & pestilentiam. Extat & sativa quæ colitur in Germania: radice nigra, in multas fibras diducta, Elebori modo, gustu suavior. eruitur antequam caulescat. hanc ad Lasepitium referri posse reor, quod Græci Silphion vocant, licet in Italia non ad eam magnitudinem crescat, neque ea sit succi ubertas, quæ in Aphrica & calidioribus regionibus, ut multis aliis contigit. Theophrastus de Lasepitio inquit, folium Maspætum vocant, caulem verò Magydarin & folium &c. Dioscorides verò ait caulem Maspæton vocari, radicem aliquibus Magydarin; caulem Silphion & folia Maspætum: hoc Lasepitium in Syria, Armenia, Media & Lybia nasci tradit: Alteram præterea in fine capitis Magydarin assignat in Lybia nascentem, &c. Patet nostram Angelicam non multum discedere à Lasepitio Cyrenaico, aut saltem ab altera Magydari: immò Angelica montana & magnitudine, & odoris suavitate, & acrimoniâ, & succo maximè ad Lasepitium accedit: Altera verò ad Magydarin: Lase à recentioribus Medicis Asa vocatur. Hucusque Cæsalpinus, cujus Angelica Alpina videtur nostra hortensis: per eam verò quæ in plana descendit, fortè intelligit aquaticam nostram, de qua post. per sativam verò Germanicam nostram polyrrhizon, de qua dubitamus an sativa: facilè credimus cum Matthiolo potiùs silvestrem.

Angelica sativa, ubi polyrrhiza Lasepitium. Angelica sativa, ubi polyrrhiza Lasepitium.

Angelica sativa, ubi polyrrhiza Lasepitium. Angelica sativa, ubi polyrrhiza Lasepitium.

Angelica sativa, ubi polyrrhiza Lasepitium. Angelica sativa, ubi polyrrhiza Lasepitium.

Angelica sativa, ubi polyrrhiza Lasepitium. Angelica sativa, ubi polyrrhiza Lasepitium.

dentissimum esse convincitur, quod Angelicæ folia sint sativæ Pastinacæ similia, non quidem multifida Cicutæ, qualia Myrrhidi Dioscorides adscripsit. His addit Matth. in post. comm. cum mag. fig. Angelicæ esse plura genera: namque aliam sativam, aliam domesticam, aliam silvestrem, & aliam in aquis provenientem tradit. Sativam radices habere nigras, atque fibratas, odore aded eximio, ut meritò Angelicæ sibi nomen comparaverit: Domesticam vocatam sponte per se nasci ipsdē in montibus in quibus silvestrem, sed foliis, caule, umbellâ, semine, & radice longè grandioribus: radicem huic esse succosam, subalbicantem, & suaviter odoratam. Sylvestrem autem pumiliorem esse, sed viribus omnium præstantissimam: radice niti pollicis crassitudine, & sæpè majore, succo flavescente refertam, gustu acerrimo & odore præstanti: Aquaticam cæteris grandiorē esse, & viribus longè imbecillioribus. Idem in Hist. germ. Angelicam triplicem agnovit, majorem & minorem, sive silvestrem, utramque in montibus altis habitantem, & tertiam aquaticam. Majorem, Costi loco medicamentis admiscere jubet. Minorem sive silvestrem, majori in omnibus similem nisi quod minor, aliquos Libanotim carchyosorā esse statuere perhibet. Aquaticam, formā primæ similem, odore tamen & sapore imbecilliori multò, ad aquarum ripas & umbrosis locis gaudere. In Epit. Angelicam duū esse generum, sativam & silvestrem, assignat. Sativam semine Lentis modo compresso, radice crassâ: sericoliq. in Germania in campis, præsertimque in Misnia & Saxonia. Sylvestrem pumiliorem esse omnibus suis partibus, sed viribus longè præstantiorem: radicem proferre minorem, paucis fibris donatam. nasci plurimam in altissimis montibus, in pratis & pascuis, amœnis locis acerrimi gustus. Quam bene Matthiolum dicat Angelicæ semen Lentium modo compressum, judicent periti. Olim unicam tradebat speciem & figuram exhibebat, quæ silvestri potest competere, quæque in posterioribus modò pro minore pingit. modò meminit unius tantum, mox quatuor, iterumque trium, tandemque duarum, non ritè distinguens, neque describens. Quam pinxit pro sativa in comm. Lat. cū mag. fig. & in Ital. pro domestica, in Hist. germ. pro majore, & epit. pro sativa, eadem nobis videtur cum hortulana & crassiflore radice, cujus Fuchianam exhibemus figuram. Acerrima illa minor silvestris pumilio sanè non convenit cum officinarum illa Angelica polyrrhiza quoad iconem, nec cum vulgari silvestri quoad descriptionem. Quam porro dicit ad aquam provenire fortè referenda ad silvestrem, de qua post.

Est Angelica Smyrnum Dioscoridis Euricio Cordo, ejusque filio Valerio Cordo, dicenti: Pater Angelicam esse dixit, Smyrnum Dioscoridis. Et hac in re dubium non est. Ruellius non scivit Smyrnum hodie Angelicam vocari, alioqui non affirmaret. Angelicam Lasepitium gallicum esse, ut temerè fecit. Sed filius Val. Cordus parentis Euricij Cordi opinionem sequutus, eodem quo parens errore notatur. Neque enim Smyrnum est, Fuchsius etiam teste, quod sc. umbellam Anethi, & semen rotundum, aliæque multa, quæ descriptio requirit, non habeat.

Panacis speciem facit Brunfelsius, qui silvestrem & sativam agnoscit, quam multos Germanorum Buchholtz (Valerianam puto) vocare refert. hujusque radici saporem negat, contra veritatem. Nulla nobis nota Angelica, cui radix sit insipida. Radici, inquit nullus sapor, nisi decipiantur ementes, & vendatur sylvestris Angelica pro vera. Cæterum, testatur Radicē Sancti Spiritus doctissimos existimare esse Mei Dioscoridis. sed nō cōvenire descripuoni.

Panas Hanc nostram Angelicam Panaces Herculeum
Herculeum Dioscoridis esse sentit, & ut ita iudicet, plures cau-
Trago. sas adducit. Non enim tantum similem esse ait An-
Trag. re- gelicam Levistico, sed etiam rocentis adhuc folia
prehenditur. thus optimum redolere: vires habere adversus om-
Tragura- ne venenum efficacissimas. Sed ipse veterum scrip-
factum. ta aut non legit, aut negligenter & obiter per
transennam quasi vidit, ac propterea magno cum
errore *παύανος ηράκλειος*, insolenter, præter simpli-
cium cognitionem, quam ex veterum scriptis hau-
rire debebat, asserere non dubitavit. Vbinam folia
alpina, in terra jacentia, & multum ad ficulnea ac-
cedentia? ubinam in umbella ceu Anethi oblonga,
flores lutei tubinam liquor radices candidus, amari-
simus, atque graveolens? Non certè hæc Angelicæ
nostræ competunt, quæ tamen Panaci suo Heracleo
Dioscorides inesse scriptus comprobavit.

Vix igitur credi par est nostrates Angelicas, in-
dicis etiam delitis & præsidus nequitiam postha-
bendas, antiquitati notas fuisse: nec enim siluissent
tam divinam fragrantæ gratiam, & vicarias divinæ
beneficentiæ vires, inquit Lobelius, triplicis nostrat-
is Angelicæ. Quarum quæ procerior, binum trium-
ve cubitorum, radice crassâ, intus candicante, foris
pullâ, odore perquam suavi, floribus luteis. Non-
nullis in hortis Londini, Antuerpiæque visitur alia,
tota minor, suaviori odore, folijs imis ex purpura
rubelcentibus, supernis autem ex rubore virescen-
tibus: umbellis, cæterisque similibus. Tertia est An-
gelica sylvestris, de qua postea seorsum pluribus di-
cetur. Idem in Obs. appellat Costum nigrum nu-
perorum. Sed quibus ita appelletur, aut quam ob-
rem non ostendit.

Angelica. Angelica dicitur Brunf. Ruell. Eur. Cordo, Trago,
Brunsch. Fuchf. Corn. Solerio, Ang. Gesn. Lon.
Marth. Dod. Lob. in Adv. p. 311. Obs. p. 388. Icon.
p. 698. Czf. & alijs plerisque cum Officinis. Smyr-
Smyrni- nium, Corn. Lac. Schvenckf. Euric. & Valer.
Angelica Cordo. Angelica sativa, Lon. Hort. Lustano,
facta. Brunf. Trago & Fuchfio. Angelica hortensis,
Angel. hor- Lac. Angelica major, Dod. lat. Angelica odo-
rat. rata, Cam. h. Silphium, Gesn. in cat. plant. Dod. &
Silphium. Czf. alp.
Lugd. novat.

Lugd. p. 724. pro sativa Angelica ponit duas figu-
ras, unam quidem Angelicæ sativæ Matthioli titulo;
alteram Angelicæ sylvestris Dodonzi inscriptione.
Sufficiebat autem una figura. Nam Dod. non posuit
pro Angelica sylvestri, sed pro sativa.

C. Bauh. Angelica sativa Laferpitio cognata: va-
rians radice, crassiore, quali est nostras, & minore,
quali est Bohemica. In animadvers. testatur Lugd.
duas figuras Angelicæ unius dare, quæ nullam sati-
væ differentiam ostendant. Eid. B. pin. Angelica 1.
sativa: Angelica odorata, Gesn. coll. & Cam. Lafer-
pitium, Lac. Variat radice; nostra enim crassior,
Bohemica minor & nigricans: illa citius, hæc tardius
corrumpitur. Huc referenda est Angelica Scan-
diaca, sive Archangelica Tabernæmontani, quæ um-
bella est flava, semine rotundiore, & ex Norvegia
& Pomerania adfertur. Nos hanc infra seorsum de-
scribimus, nec huc referendam ducimus.

Angelica Schvenckf. Angel. alpina 2. vera, nobilior: An-
alp 1. gel. montana, C. Bauh. sativæ Angelicæ similis, Rhi-
zotomis Silesius, at tota minor, folijs ex atro viren-
tibus, radice in pauciores, sed crassiusculas fibras di-
varicata, in præruptis montium jugis & saxorum
Angelica fissuris. Angelica alpina 3. montana Silesiaca; Ca-
alp 2. merario Angelica sylvestris montana; Adversarijs
Angelicæ varietas, Silesius in montibus frequentior,
Solo pingui inter saxa, herbidis locis: radice acerri-
mi gustus, luteo & lento turgente succo, ideoque
valentior cæteris omnibus, quæ mania os, linguam
& fauces maximè urit & inflamat: calida & sicca

ad quartum ferè gradum: corrigitur aceto macerata.
Item Angelica hortensis, Smyrniacum Cordi, Angeli-
ca major Matthioli & Dodonzi, gustu acris & ama-
riuscula, suaviter odorata, calida sicca in tertio.

Angelica, sativa præcipuè, dicitur ab aliquib⁹ Ger-
manorū Angelica ab alijs deo Heiligen Geistsburg
i.e. Radix S. Spiritus, à suavissimo ejus odore, quem
radix spirat, aut ab immensa contra venena faculta-
te, appellatur. itémque Brustburg & Engelburg.
Belg. Angelysa. Gall. Angelic. & Angelique. Ital.
Angelica. Hisp. Angl. Angelica. Boh.

Angelica sativa Montbelgardi à nobis sativa pro-
venit copiosè in horto E. C. ac alijs, se ipsam sentine
propagans, nec faciliè proveniens vere: recentis si-
quidem semine disseminari cupit. Nostra valdè ma-
gna est, ad eam quam pingunt pro Archangelica ac-
dens, valdè odorata: sed crassæ radices, non tenues
quales sunt ejus Angelicæ quæ solet Basileæ & pas-
sim vendi. Vidi Angelicam Florentiæ in Cernobio
à Innocenti. Genevæ sativa vere provenit, sed pauca:
caulem incipiebat producere sequenti anno, Fe-
bruarii principio: florebat junio, semineque decide-
bat Iulio. Dum autem ex semine plantatur, ex hu-
mo primum prodire solet folijs primis Petroseli-
naceis similibus; transplantandæ dum in tenera
sunt adhuc ætate, inquit Tragus; altero, aut tertio
demum anno caulem emittit: multi hodie venditare
non dubitant Angelicam veteribus incognitam,
sed à neotericis herbariis in altissimis montibus
eam fuisse inventam. Angelicam sativam Matthio-
lus passim feri scribit in Misnia & alijs fortasse Ger-
manicæ locis in campis, colique diligenter, quod in-
de non mediocrem recipiant proventum. Erui ter-
tio à sativa anno: Domesticam sponte per se nasci
iisdem locis, in quibus sylvestrem; aquaticam in
aquosis. Item Angelicam majorem & minorem
provenire in alijs montibus, Soli expositis, ut in
Kisenberg Bohemæ: in finibus Silesiæ, ibi utram-
que speciem effodi; interdum Angelicam proveni-
re ad ripas aquarum locis umbrosis copiosè in-
veniri in Norvegia, Islandia, Pomerania & Hel-
vetia. Angelica procerior & minor Lobelij, cel-
los utraque montes, gelidæque amat juga, colitur &
in hortis in Gallia, Anglia & Belgio.

Angelica, authore Trago, valet adversus omne ve-
nenum tam internis quàm externis in partibus corpo-
ris, præsertim vero contra ictus & morsus serpentū
& canum rabiosorum, quod ille ipse quoque expe-
rientia didicit: venenum educit, sanguinem dissolvit,
& corpus exalfacit. Eadem potest aqua ex radice,
non herba, distillata. Si qui peste, febre repentinâ,
aut cum sudore immodico corripitur, is radice
Angelicæ in pulverem redactæ drachmam dimi-
diam cum Theriacæ drachma misceat, in tribus aut
quatuor cochlearibus aquæ ex radice Angelicæ di-
stillatæ, bibat, deinde in lectum se componat, seque
probè contegat, ac ad minus tribus post horis jeju-
net: quod si fecerit, incipiet sudare, & (Deo favente)
periculum omne evadet, morboque liberabitur.
Quod si Theriaca non suppetat, tunc pulveris ra-
dicis drachmâ integram, cum aqua distillata sumat,
ut jam dictum, pari ratione liberationem sentiet.
Radix in aceto macerata, & tempore pestis odora-
ta, & nonnunquam aceto illo etiam poto, si jejunus
sit, præservat à lue pestifera corpus. Aqua radice di-
stillata, aut radix ipsa in pulverem redacta ac cum
vino pota, tormina ex frigore orta sedat, modo nul-
la illis alvi adstrictio adjuncta adfuerit. Breviter
omnibus internis affectionibus prodest aqua di-
stillata, & radix in pulverem redacta, nempe pleuri-
tico morbo incipienti, nam collectiones eiusmodi
discutit, ruptis & pulmonis vitiis, unde cusses ple-
rumque gravissimæ oriuntur, torminibus, stillicidio

*Urinae mo-
do.* urinæ, & stranguriæ, mensibus movendis, sætibus
trahendis, internis denique quibusvis tu moribus &
Dysent. fluxibus discutendis. Ad omnia illa possunt deco-
ctiones & potiones ex Angelica confici, si vel vino,
vel melle, prout ratio ægri orum postulare videbitur,
decoquatur radix. Succus Angelicæ cavis dentibus
Succus. inditus, dolore liberat. Aqua distillata auribus indi-
Aqua. ta, idem potest. Succus etiam & aqua distillata, ocu-
lorum aciem illitu excitant, claritatem adjuvant,
pelliculasque oculis obductas, unde caliginem sequi
necesse est, rumpunt. Ex Angelica & pice optimum
hic emplastrum contra bestiarum morsus, quæ in ra-
biem efferuntur. remedium præstantissimum est a-
qua distillata, succusve instillatus, aut pulvis radi-
cis in perlus inveteratis & profundis ulceribus, illa
enim mundat, & nudata corpore ossa operit. aqua
distillata podagricis, ischiadicis, illitu prodest, dolo-
rem enim sedat, & collectos ac lentos humores dis-
solvit. semen ejusdem cum radice est efficax. Syl-
vestris Angelicæ radix & semen non tantarum sunt
virium, hodie illis in vino decoctis in vulneribus re-
centibus sanandis utuntur. Et hæc de Angelicæ facul-
tatibus memoria prodidit Tragus, quæ Fuchius a-
liter ita recenset. Calfacientem & desiccatoriam vim
in tertio ordine ei assignant herbarij recentiores.
Aperit, extenuat, discutit. Vnicè venenis adversatur.
Pestilentia populatum lævientis arcet contagia.
Corpora à lue pestifera vindicat, si tantum, ut adfir-
mant, in ore teneatur. Per Hiemem cicenis magnitu-
dinè cum vino, per Æstatem ex stillatio Rosarum
liquore sumpsi ille satis est. Nec sensurum eo die con-
tagationem pollicentur, quo quis devoravit nam uri-
na & sudore venenum abigit. Lentitiam pituitæ di-
gent, quapropter tussi, quam frigus attulerit, mede-
Tussis fr- tur. Crassa, quæ in thorace coierit, discutit. Herba i-
gida. pla in vino & aqua cocta, vulnera interna glutinat,
concreta sanguinem resolvit, stomachum esu
Sanguis corroborat, cor recreat, pituitam ventriculi deiecit,
cum vitis. salubria ciborum discutit, & elanguescentem invitat
appetentiam. Rabiosi canis mortui, aut serpentis ictu
liberat, si contrita cum ruta & melle sola indantur,
dein cocta in vino bibantur. Libidinem extinguit
ore jejuno sumpta. Lassitudines reficit, thoracem
expurgat. Supra febrientis caput imposita, fertur
ad se fervorem elicere. Valere contra fænationes
adjuvant, si quis eam secum gestant. Angelicæ vires
& usum sequentem in modum tradidit Tabern-
montanus. Angelica, præsertim hortensis vim habet
calefaciendi, aperiendi & desiccandi, & est calida in
tertio, & sicca in secundo gradu. Semen in opera-
tione sua radici simile est, seu etiam Angelica mon-
tana minor. Aquatica parva & ea quæ ex Northve-
gia adfertur, non excedunt secundum caliditatis
gradum, sic neque primum siccitatis. Herba tam
hortensis quam silvestris Angelicæ, minus etiam ra-
dice calida est. Vtræque vulneraria, tam intro assump-
ta, quam foris admota ad curanda vulnera in po-
tionibus & emplastris. Angelica masticata, nonni-
hilque deglutita oris fætentem halitum emendat.
Nonnulli folia in fassamentis adhibent, ad crassos
humores dissolvendos, concoctionem adjuvan-
dam, itemque oris fætores corrigendum, pectus
expurgandum, & appetitum excitandum. Sallamen-
ta hæc apud Anglos in frequenti sunt usu: Sed etiam
potagia ex tenella herbæ foliis, præsertim silvestris
Angelicæ, parant. Magnæ uterq; cibis pestis tẽpore
commendationis. Radix cor confortat ex frigida
causa laborans, maxime quæ conducit in vertigine &
animi deliquis quovis modo usurpata. E radice
Angelicæ pulveris parte una cum mellis despumati
partibus quatuor salutare componitur electuarium
contra quovis thoracis & pulmonum frigidos affe-
ctus, unde & Brustwurz / Pectorana radix, nun-

cupatur. Et hinc radix in vino decocta ac cum melle
despumato dulcorata manet & vespertinè aut
sex unciarum pondere pota pectus calfacit & pul-
mones, medeturque difficili respiratori. humectat
enim & dissolvit viscositatem omnem. Hæc ille, qui
plura alia de Angelicæ facultatibus adscribit, quæ
datà operà lubentes omittimus, tum quodd ex alio-
rum sententia ea jam recensuerimus, tum quodd
compositionem medicamentorum concernant, de
qua nos hic agere ex professo non statuiamus. Sunt
autem inter alia succus exsiccatus, qui & cum aliis
medicamentis, & per se etiam usurpatur ad supra
dictos affectus. paratur ut succus Absinthij, etiam
ex sicca radice, qui præstat. Aqua variè distillatur.
Nunc enim accipitur herba & radix, minutim con-
ciditur, distillaturque vase vitreo in Balneo Mariæ,
igne lento. Et ita vulgaris aqua conficitur. Si præ-
stantior requiratur, capitur pulvis radice pondere
unciarum quatuor, cui affunditur prioris aqua men-
sura una, maceraturque in Balneo Mariæ die natu-
rali, distillaturque. Alij accipiunt herbam & radi-
cem, contundunt, conciduntque minutim, mace-
rantes in vino veteri aliquot diebus, distillantque.
Alij radices exsiccatas eligunt, grosso modo pulve-
rizes, ac in vino veteri macerantes aliquo tem-
pore, ex qua infusione eliciunt aquam, Aquæ vitæ
similem, fortem multum. De Angelicæ vino, Mulla,
Extracto, radicum conserva, Syrupo extractionis,
Oleo stillatio, radicibus conditis, Angelica saccha-
ro incrassata, tabulis ex Angelica & Sale idem Ta-
bern. plura scripsit. Septentrionales sativæ Angelicæ
caule detracto edunt cortice, ut ab ipsis accepit
Dodonæus, quos in Islandia peregrinantes hæc
velci alterius cibi quandoque coegit inopia. ferunt
autem lapidum esse & palato esurienti gratum.

ARCHANGELICA.



DE hæc variè
sentunt au-
tores, adeoque sin-
gulorum placuit
subscribere opi-
nionem.

Archangelica (i. Archange-
lica Lob.)
Obf. p. 309. in Icon.
p. 701.) dicitur Gal-
lo Belgis Angelicæ
de Norwegen / so-
liis sativæ multò
majoribus, atro-
virentibus, latiq.,
humifusis, aversà
parte glaucis, pri-
mo pululatu ru-
bris. Caulis multis
concavus alis, pro-
ceritatus humanæ,
imò rubens. In lata

umbella flores luteoli & semen foliaceum Angelicæ
sativæ, majus & rotundius. Radix alitè depacta, pa-
rum odora: ex Norvegia Belgio inquilinam si clam
asserunt. In hist. Belg. p. 850. vocat Archangelicam,
Noormeechische / Angelicam, vilam Antuerpiæ, de-
latam ex Norvegia, & in Doornick apud Muttonum.
Item Archangelicam cum duplici corona, quam ha-
buisset ait Dominum à Reinoutre.

Matthiolus & Gesnerus aquaticæ cujusdam An-
gelicæ meminere, sed quandoque eam non de cri-
psere, sulmicatus est Dodonæus eandem hanc esse,
quam ipse Archangelicam nominavit & sic descripsit: *Archange-
lica Dod.*

Est hæc & foliorum amplitudine, sativa haud inferior, sed tamen singularium frequentia numerosior: in plurima enim folia, hujus diducuntur. caulis crassus, quandoque unâ cum foliorum pediculis rubens, geniculatus quoque, valde ramosus, & singulis siquidem geniculis tres aut quatuor alas promit; multis idcirco undequaque umbellis cingitur, quarum flores candicans: semen latum, longius & crassius quam Angelicæ: alta radix & albida, exigui odoris, majoris tamen quam folia, vel caulis, quæ nullius aut admodum obscuri. Nobis Gesneri aquatica Angelica non est diversa à silvestri, ceu post quoque moncbimus. In Matthiolo autem omnia obscura fatemur. Dodonæus Archangelicæ flores candidos tradit; Lobelius autem luteolos; quibus visâ dijudicent. Dodonæus separat ab Angelica Norvegica; Lobelius verò eandem facit: quare rem diligentius inquirant stirpium periti.

*Dod. nota-
tur.*

Clusius.

Clusius in pannon. Archangelicam à nonnullis appellatam & ipse amplioribus quam Angelicæ foliorum alis esse refert, & teneris adhuc existentibus, subpurpureis: caule humanam altitudinem superare, brachiali, aut ampliori crassitie: frequentissimam in montibus arci Greben, sitæ in interamni Pannonia, quam Germani Windischlandt appellant: expansa enim est inter Dravum & Savum flumina: solere eam quemadmodum & Angelicam perducto ad maturitatem semine perire, atque illo in terra sinum sponte recepto renasci. Eadem habet in hist. post. ubi Archangelicæ titulo iconem etiam apposuit.

Camerarij verba de Angelica Norvegica & Archangelica vide titulo de Angelica, sativa scilicet. In horto dicit Archangelicam depingi à Lobelio & Clusium in pannonicis ejus meminisse.

*Angelica
Scandiacæ*

Tabern. appellat Archangelicam & Angelicam Scandiacam, *Norwegisch* & *Pomerisch* Angelica. Ejus figura facta ad imitationem Archangelicæ Lobelij, additis in summitate ejus, alterius foliis & radice: verum Lobelius in Ic. & hist. Belgica sativam separat ab Archangelica Norvegica.

*Angel. silv.
montana,
G. Bauh.*

C. Bauh. phyt. Angelica 4. (s. in pin.) sive silvestris montana, Archangelica, Clus. pan. Angelica, Cæf. Angel. minor montana, Tab. Item Angelica 5. (6. in pin.) sive aquatica, Gesn. h. Archangelica, Lob. Dod. Clus. pan. & hist. Cast. Lugd. & Camer. Angel. altera, Cæf. Cur frater in phyt. separaret Archangelicam Clusij ab Archangelica Dod. & Lobelij; eademque iterum in pin. ad duas referat, me latet: sibi constare non videtur nam omnes eandem iconem habent. Gesneri verò Angelicam non statuo diversam à silvestri.

*Angelica
alpina.*

Schvvenckf. Angelica alpina 1. Angelica Silesiaca maxima, Archangelica auff der Zserwiefe / caule brachij crassitudine, tricubitali: radice longiore, crassâ, paucioribus fibris donata. ad ripam Heræ fluvij majoris.

ANGELICA SILVESTRIS magna vulgarior.

Diffr.

CVM sativa Angelica multas habet notas communes silvestris, aded ut ex illa hæc non sit cognitu difficilis: radix similiter rugosa, crassa, sed minus quam sativa, sapore non minus vegeto, imò interdum luculentius exaltante, verum cum minore suavitate: caules bicubitales & tricubitales, nonnihil hirsuti & alicubi subglaucci, atque folia similes, quemadmodum & folia, utunque tamen minora & imbecilliore sapore prædita. umbellæ candidæ minores, semen

*Trag. nota-
tur.*

Hanc cum sativa similem facit Tragus, quam bene ostendit descriptio nostra. Angelica silvestris, un-



quit, sativæ per omnia similis est, nisi quoddam nonnunc candidum fert florem, odor illi nec non & sapor non perinde vehementes: Germanis wild Angelica / & nonnullis wunderfraut / h. e. Vulneraria dicitur, quod vulneribus mundandis & sanandis conducit.

Cord. in Diosc. vocat Angelicæ genus in uliginosis. Cordo hic adscripsit Gesnerus Angelicam silvestrem vulgò dictam ali-

quos putare esse Libanotidem primam, Cordum ipsum in Disp. sequutus supra Mithrid. dicentem: Libanotis hic non significat Rosmarinum, sed Angelicam silvestrem minorem. semen autem ejus accipi debet, quod Cachrys vocatur.

Libanotis

Matthiolum memò Cordum in suo dispensatorio hallucinatum credidit, quippe qui existimaverit silvestrē Angelicā esse Libanotim. Matthiolum autem, cujus verba ante adduximus, olim videtur hujus Angelicæ figuram exhibuisse sub solo titulo Angelicæ, ut videre est l. 4. c. III. & postea in comm. cum mag. fig. Lat. c. III. It. c. II. titulo Angelicæ silvestris; in hist. germ. Angelicæ minoris; in ep. Angelicæ sylvestris pumilioris: Glossator & patrocinator pro silvestri. Iam itaque illi patrocinentur Matthiolo & apud eum demonstrent discrimen inter silvestrem minorem & in aquosis provenientem. qualis ea cujus nos figuram Fuchianam exhibemus: eos demonstrasse velim an Matthioli Angelica ad aquaticam ripas proveniens non sit ea, de qua hic agimus, quamque Fuch. in Ic. & hist. Angelicam vocat; itemque Lonic. (qui in edit. anni 1571. iconem malam exhibet) Lob. adv. p. 311. in Belg. p. 850. in Obs. p. 399. (ubi affirmat Guilandino Phellandrium Plinij esse) in Ic. p. 699. Thalius & Hort. Lusitanus.

*Cord. re-
prehenditur.*

Gesn. Angelicam aquaticam, serulaceam herbam, hortensi similem, circa rivos sponte crescentem, & restibili fecunditate durantem. Tabern. Ic. & hist. Angelicam minorem aquaticam.

Dod. Angelicam silvestrem sive minorem, cui radicem tribuit tenuiorem & minus oleosam aut odoratam, passim in utraque Germania locis humidioribus provenientem, præsertim silvestribus. An autem illa sit quæ à Theophrasto *μαρὴν*, Magudanis à Latinis appellatur, altera videlicet Læserpitij species, expendendum & considerandum proponit. Quamvis autem, uti à nobis dictum, Matthiolum de Angelica aquatica sylvestri obscure scribat, nihilominus tamen haud puto diversam à silvestri, de qua hic nobis sermo, nec etiam Gesneri, ut ante diximus: Dodonæus in hist. gall. olim Fuchij figuram habebat, quam in Lat. mutavit licet sit ejusdem omnino plantæ.

An Magudanis

Cam. h. Angelicam silvestrem montanam, in locis humidioribus nascentem, foliis tenuioribus, sat tamen odoratis: frequentem ubique Norimbergæ circa urbem in locis palustribus, & alibi.

Duas icones unius hujus plantæ, ut opinamur pictas dat Lugd. p. 725. primâ interibit Angelicam silvestrem Fuchij; alteram Angelicam silvestrem Matthioli;

*H. Lugd.
notatur.*

thioli. Nec ostendit quomodo differant Angelica silv. Fuchij, & Angelica silvestris Matthioli, ut animadvertit in Luedunensem C. Bauhinus. Sed ioseph met patrocinator Matthioli bene fecisset, si ostendisset, quam plantam intellexerit Matthioli sua iconne. Is in phyt. & pin. appellat Angelicam 2. silvestrem majorem. Scheyvneck. Angelicam aquaticam, wasser Angelick & wild heylic geiswurgel.

Phellandrium
Punq.

Ponæ in Baldo dicitur Phellandrium Plinij Guilandini; quam ab Herbariis Angelicam silvestrem vocari ostendimus, atque Cordum Smyrniū fecisse, quod apud hunc nondum legimus, si non fallit memoria.

An Czfalp. Angelica descendens in plana, juxta aquas locis umbris: Descriptionem Czfalpini videre est capite de Angelica sativa.

Lern. &
temp.

Angelica silvestris magna Montbelgardi abundat in horto E. C. & alibi, florens Augusto. Vidi in Italia inter Veronam & Castelfranc: Bononiam & Geneva ultra Rhodanum ad ripam virentem mense Aprili. Basileæ frater observavit in pratis propè Münchenstein, & ad Rhenum extra portam Richem. Illam, quæ Archangelica Gesnero dicitur, ut ipsemet annotavit, ipse vidit Bailex extra portam lapideam, & in monte Moutes mense Octobri, & in monte wasserfall, florentem Augusto, ad altitudinem hominis magnam, cum succo odorato, acri, amaro, & croceo in radice. In Ducatu VVirtembergico locis vicinis & fonti & balneo admirabili, & ad rivum prope fontem medicatum, vicinum pago Zell copiosè provenit, ubi cum flore & semine Augusto observavi. Angelicam silvestrem rariùs hortis, sed sæpiùs uliginosis, pratensibus, locis frigidis gaudere scribit Lobelius, cuiuslibet notam in Anglia: In Silecia passim in pratis secus fluentia occurrere testatus est Scheyvneckfeld.

V. m.
Morbo peco-
rum.

Hospes quidam in Zell pago in Ducatu VVirtembergico Angelicam silv. celebrabat in morbis equorū, pecorum & suum exhibitam viridem in potu, vel siccam. Narrabat autem laborare sues morbo paucis cognito, unde sæpè sine auxilio intra octiduum moriantur: morbum quidem vocari fāsem, & esse internum in ore tumorem ad maxillam durum, crassitudinis pollicis, qui si non tollatur, excrescat, & eos suffocet. Se mederi hoc modo, ac si filum per tumorem traducere, ut cum filo possit eum tenere & elevare, deinde novacula auferre totum tumorem, mox dare in potu hanc Angelicam & subternere Artemisiā & Ebulum. Hanc ob acrimoniam minorem cibis condiendis aptiorē statuit Scheyvneckfeldius, corrigereque proventum, sabutramque crassorum & viscidorum humorum, atque fetidum halitum emendare terti spiritus ex prava concoctione manantis.

Salubre
crassorum
humorum.

ANGELICA SILVESTRIS repens.

Defec.

Hæc duos cubitos superat, caule tenui, striato, rubente, fistuloso, alis concavo, ex radice tenui, fibrosa, longè, lateque reptante, odore & sapore quadantenus Angelicæ, sed multò infirmiore: folia Angelicæ sativæ minora, atrovirentia, Sisari sapore. umbella Angelicæ rudem minor, odorata. semina bina juncta, oblonga, striata.

Elaphobos-
ium.

Cordus in Diosc. ad Elaphobosci descriptionem satis accedere hanc herbam dicit, quam à Germanis Girsche/ aliàs etiam Gersse/ vel Strenzel appellari refert. Cordum sequitur Toxites in Onom. philosophico.

Vinum de-
gelica Tra-
go.

A Trago inter Angelicas recensetur, ac tertio loco Vini Angelicæ titulo describitur, flore in umbel-
Tom. III.



lis candido, radice per terrā sparsa ut Lohū, unde Mediomatrices maternā linguā wasserlewerisch nominare ait & Synfuo. Idē alibi silvestre Oste-ritij genus, Oste-ritio quā Angelicæ similis, & germ. wilde meiserburg appellat. Tragi nomen, Vinum Anglice usurpat & Lon.

Gesn. h. negat veterum esse Corchorum, licet intem Corchorum quorundam, Apij genus vitiosum, & Caccotelinā quod-

Corchorus
quorundam.

dam appellet.

Cam. h. dixit Angelicam silvestrem communem & Pestem hortorum. Apud Matth. germ. Imperatorix, Ost. itij vulgè speciem silvestrem, quam alios ad Angelicam silvestrem aquaticam refert testatur, ac Belgas Podagrariam vocare, ab utilitate ad podagran, ac etiam ad coxendicis dolorem.

Podagraria
ria.

Thalys ac eum sequutus Scheyvneckfeldius Angelicam erraticam nominat, & Giersā, i. e. Giersing Giersig/ & Giersich; itēque zipperlin Fraut/ eiq; odorem satis fortem adscribunt.

Angelica
erratica
Giersa.

Dod. gall. & lat. Astrantia secundam speciem constituit, silvestrem scilicet, vocatque Herbam Gerardii (Gerard Brabantii dicunt, & Senenblat/ qui privatim in hist. gallica, Græci in ἡρώδου & Septifolium, h. e. Herbe Gerard & Septifolles; folijs, floribus in mucanis candidis, latè serpentibus radicibus, Astrantiam referentem, omnibus tamen minoribus.

Herba Ge-
rardii.

Septifolium.

Lob. hanc inscripsit adv. Podagrariam Germanorum, quam odore & viribus quadatenus ad Ebulum accedere tradit, ac propterea plebeculam ratam Ebulum esse, usam diu fuisse, etiamnumque experiri ad ischiadicos & podagricos optimè facere, vocatque hinc Belgas Slerancruyt i. e. Podagrariam. In Obs. p. 398. Icon. p. 700. Podagrariam, Germanicam aut Belgicam appellat.

Podagraria
Germano-
rum.

C. Bauh. phyt. dicitur Angelica 3. silvestris minor, sive erratica, mirè varians foliorum incisuris: & Pycnocomos Brunfelsij in fol. p. 165. & in 4. p. 243. Icon quidem apud Brunf. est hujus Angelicæ silvestris, non autem descriptio. In pin. addit Castorem vocare Podagrariam; Ægopodium, Tabernemontanum.

An Czfalpinus plantam nostram intelligit lib. 7. cap. 46. ubi ait. Per alterum Pharnaceon, à Pharnaceo rege cognominatum [apud Plinium] tenuioris solij, intelligi puto herbam in omnibus ferè alpibus frequentem, quæ & in plana descendit, umbrosis tamen locis, Imperatorix similimam, sed sine odore, foliis tenuioribus, mollioribus, pediculis non rotundis, sed excavatis: radice brevi: umbellā candida: seminibus gustu insuavis: hanc Pseudo-Ligusticum appellari posse cōfeco, cujus semine adulterari legitimum Ligusticum testatur Dioscorides.

An Pharnaceon
Czfalp.

Angelica silvestris repens Patavij proveniētem vidi, & Bailex in hortis, & ad fluvium Eurse: Lugduni florentē Majo, Genevæ Iunio. Montbelgardi variis in locis, ut in colle cundo Adincourt florentē Julio. In Ducatu VVirtemberg. nō lōgè à Fonte Admirabili in monte Eichelberg. In horti granatoli, quibus nasci gaudet, semel plantata, suo reptatu

Locis
reptans.

odiofa est: nam aboleri difficillimè potest. Aded restibili & importuno proventu juxta sepes hortorum & parietes udis umbrosisque locis pinguibus luxuriat, ut vix inde possit radicibus deleri.

Vfus. Odor huic satis fortis, multò tamen imbecillior Angelicà. Adduntur folia recentia tenera oleribus. Radix aliquot diebus ex vino pota febres putridas sanat. Vulneraria est. Podagricis optimè facit, autore Schvvenckfeldio.

ANGELICA SYLVESTRIS

hirsuta inodora, C.
Bauhini.

Disca. **R**ADICEM habet crassam & fibrosam, foris pullo cortice testam, intus albam, redivivam & odore medicato; caulem cubitalem, in breves alas brachiatum parte inferà, paucissimis pilis cinctum, nigrum; folia Angelicæ sylvest. sive Podagrariz æmula, in alas, modò binas, modò ternas, easque aliquando uncias quatuor longas, tres latas, aliquando vix unciales, divisa, in ambitu profundè incisa, atrovirentia, hirsuta, quorum pediculi hirsutie aspersi sunt: umbellam habet parvis floribus albis repletam, quibus semen oblongum nigricans succedit. Hanc ex Lusatia, nomine herbæ podagrariz cognatæ, D. Francus misit, cujus in horto Lusatiæ meminit.

LIGUSTICVM VETERIBVS.

CAP. LVIII.

Ligusticum Dio. **L**IGUSTICVM, Dioscoride ita referente, plurimum in Liguria nascitur, unde & nomen traxit, in monte sc. Apennino dicto, Alpibus contermino. Ipsum incolæ Panacæ haud abs re appellant, quoniam & radice & caule Heracleotico Panaci simile sit, paribusque viribus præditum. Gignitur in altissimis, asperisque montibus ac umbrosis, maximè verò juxta foveas & scrobes. Cauliculum profert tenuem, ceu Anethi [Margo recens Selini] geniculatum, circa quem folia sunt Meliloti, at teneriora [Ald. longiora] & odorata, prope verticem graciliora, pluribusque incusuris. In cacumine umbella, è qua semen dependet nigrum, solidum, oblongum, Fœniculo [Anetho. vet. Margo] proximum, gustanti acce & aroma redolens [vet. *τυντικόν* tantum legit] Radix est candida, Heracleotici Panacis similis & odorata. Seminis, radicisque vis excafactoria & concoquens: siquidem profunt ad interaneorum dolores ac tumores, itémque ad juvandam concoctionem. Valent & ad inflationes præsertimque ventriculi, nec non & ad venenatarum bestiarum ictus: urinas quoque ac menses pota trahunt. Sed & apposita radix idem præstat. Ipsa porro æquè ac semen utiliter oxyporis & concoquentibus medicamentis admiscetur. Hoc verò stomacho perquam utile est: quare Piperis loco id indigenæ oblonus immiscet. Adulteratur autem semine quodam consimili, quod tamen gustu facilè discernas: amarum enim est. Alij quoque seminibus Fœniculi, aut Sefeli simul admixtus fraudem faciunt.

Ligusticum Plinio. Ligusticum (inquit Plin. l. 19. c. 8.) silvestre est. In Liguria lux montibus feritur. Vbiq; suavius sativum, sed sine viribus. Panacem aliqui vocant. Crætevas apud Græcos Cunilam 'bubulam eo nomine appellat. Et rursus lib. 20. cap. 15. Ligusticum aliqui Panacem vocant, stomacho utile est, item convulsionibus & inflationibus. Sunt & qui Cunilam bubulam appellaverunt, ut diximus, falsò.

Galenus *λεγιστικόν* vocat, si scriptura non fecerit. Lib. 1. *lib. 1. com.* Cornarium, cujus radicem & semen ex genere ex-Galeno. calfacientium esse ait aded, ut menses ciant, & urinas provocent, statusque discutiant.

Credimus cum Marcello, Ligusticum hoc esse quod Columella l. 12. Panacis nomine Autumno & Vere feri jubet leni & subactà terrà, raris intervalis, quò majus incrementum capiat. Idem ultimo ultimi libri capite Oxyporis misceri Ligusticum jubet, & qualia antiquis Oxypora essent, & quo modo conficerentur longissimè etiam docuit, sic dicta quòd aceto condita ad intinctus servarentur. Cornario tamen *εγύρον* à celeri transitu appellata videntur, ut etiam videre est apud Aëtiū l. 6. c. 10. & 9. c. 24.

De Ligustico, non autem Smyrnio, quod cum Ligustico turpi errore confundit Pistorius, Macer hæc prodidit.

<i>A Ligurum Patria sumpserunt Ligustica nomen, Copia quòd major ibi nascitur illius herba.</i>	<i>Erymon.</i>
<i>Tertius huius gradus est calidi, sicque vigoris:</i>	<i>Temperamentum.</i>
<i>Major radix tu est, & seminis ejus,</i>	
<i>Es par est illi tu in mednamine quovis:</i>	
<i>Inflato stomacho cum vino sumpta medetur,</i>	<i>Inflatio stomachi.</i>
<i>Et tali potu tu digestiva juvatur.</i>	<i>Aperit.</i>
<i>Omnibus & morbu sic prodest interiorum:</i>	
<i>Urinas sic sumpta movet, & menses purgat.</i>	<i>Morbus venenari.</i>
<i>Tota venenatu medatur morfibz herba,</i>	
<i>Sic bibitur bene erit a prius, vinòque soluta,</i>	
<i>Et pars contrita ponatur desuper herba,</i>	
<i>Non modicum colicu prodest hac mansa, vel Colica.</i>	
<i>hansia,</i>	
<i>Vel si radicis elixatura bibatur,</i>	
<i>Nec solum colicu decoctio proderit ista,</i>	
<i>Sed supradictu medicabitur omnibus hansia,</i>	
<i>Digestibilibus semen bene jungitur ejus</i>	<i>Digerit.</i>
<i>Omnibus antidotis, quòd sit huic pepsiæ virtus.</i>	
<i>Hanc oculu Strabus, potuque & odore nocivam</i>	<i>Oculis nociva.</i>
<i>Afferit, antidotu ejus tantum modò semen</i>	
<i>Misceri insit hoc verum dixerit à se,</i>	<i>Strabus notatur.</i>
<i>Aut à doctorum libris non est mihi notum:</i>	
<i>Hoc scio, quòd veteres non parvis laudibus istam</i>	
<i>Attollunt herbam, nec me legisse recorder</i>	
<i>Vllum qui Strabi sermonibus astipuletur.</i>	

Ligustici nomen pluribus plantis attribui comperimus. Est enim Ligusticum multis, quod vulgò Levisticum dicitur. de quo ante post Apia.

Ligusticum Rauvvolffij folio Aquilegiæ paulò post referemus sub eo titulo.

Ligusticum de Sefeli alpino, sive montano Clusij dicitur, de quo paulò ante.

Sefeli sive Siler montanum quibusdam dicitur de hoc Ligustico. de eo egimus supra.

Est Ligusticum alterum Belgicum Lobelio, de quo mox dicemus.

Vocatur quoque Ligusticum quorundam (ut Matthioli) folius Angelicæ.

Ligusticum Matthioli & Lobelij quo referendum sit nondum videmus.

Myrrhidem alteram parvam Penæ, ali j pro Ligustico genuino in pharmacis ponunt. De hac post latifolia. Cicutaris, Cicutariz latifolia titulo dicemus.

Ligusticum quorundam opinione, Imperatoria est. statuitur, sed non absque errore.

Pro Ligustico Dioscoridis sumit in antiball. Collegium Florentinum Cuminum.

Sylvius in Antiball. phar. pro Libystico substituit semen Dauci.

Ligusticum sive Libysticum idem ab eodem interpretatur semen Staphylini, s. e. Pallinacæ, præterquam agrestis.

Ligusticum

LIGUSTICVM QVORVN-
dam folijs Angelicæ.Ligusticum
alterum.Ligusticum
Belgicum.

Cera.

Effigies.

Libanotis
Theophrasti
Lugd.Lugd. la-
pina.Taberna-
montani.Imperato-
ria vulgo
Casalpina.

Locum.

Ligusticum
Anguillæ.

C. Bauh.

MATTHIOLUS in post. com. cum mag. fig. lat. l. 3. c. 51. & Ital. c. 53. Ligusticum alterum vocat, cuiusque imaginem pingi curavit missum ab amicis. Verum non magis Ligusticum Dioscoridis ipsi referre videtur, quam ejus primum Ligusticum, de quo paulo infra.

Camer. apud Matth. in hist. germ. & epit. inscribit Ligusticum Italicum, welschen Liebstöckel, notatq; Matthiolus, quod si-

guram ponat sine descriptione; quibusdam in locis existimari verum Ligusticum. Is autem exprimit figuram suam plantam, quam habemus siccam Cera nomine, odorem spirantem Mei, folijs nonnihil accedentem ad Angelicam: comam valde capillatam ad radicem ex foliorum antiquiorum reliquiis, quæ bene exprimitur effigie ex ipsa planta à Camerario proposita notataque litera A. Hanc unde acceperim, vel ubi collegerim, non recordor. Iconem Matthioli apud Camerarium denotat litera B.

Libanotidem Theophrasti majorem (inquit Lugd. p. 775.) monstrat Lobelius folijs magis carnosissimis: Hæc secundum est Ligusticum Matthioli. Fallitur autem, Lugdunensis, confunditque duas plantas. Alia enim est Libanotis Lobelij major, & alia Ligusticum secundum Matthioli.

Mihi videtur Tabernamontanus descriptionem suam accommodasse ad iconem, quam Ligusticum tertium herbariorum inscribit, & non ad plantam visam.

Subnectendam hic duximus diligentem Casalpini descriptionem. Ligusticum, inquit, in Alpibus Liguriz vulgo Imperatoria vocatur: folia à radice, rotundo pediculo & ferè lignoso, ac tripartito gerit, figura herbæ S. Mariz, sed magis in acutum desinentia, magisque serrata, terna in singulis pediculi ramulis, odorata, prædura: caulem cubitalem altioremq; paucis folijs: semina in umbellis, figurâ & magnitudine Fœniculi, nigra, odorata & acia: radix candida, pollicis crassitudine, in duas aut tres prælongas desinens, odore jucundo, sapore acri: oritur in Alpibus propè rivulos: utuntur semine in obsonijs, & radice ad stomachi dolores, & imbecillitatem, ac omnes ferme internorum noxas. Dioscorides inquit de Ligustico plurimum in Liguria nasci, &c. Plinio Ligusticum silvestre est & in Liguria suæ montibus feritur, &c. Eandem puto apud eundem inter Panaces appellari Pharnaceon, à Pharnace rege cognominatum, longioribus quam cætera folijs, serratis & levioribus.

Ligusticum Anguillæ epist. 12. nihil aliud existimat, quam plantam hanc, quam in Liguria montibus reperiri, & dici Imperatoriam refert, folijs Angelicæ, caule bicubitali, semine nigro.

C. Bauhinus per Ligusticum alterum Matthioli & Castons, Angelicæ aliojus silvestris figurâ proponi censet. Retulit autem Ligusticum Anguillæ ad Imperatoriam vulgare, cum sit eadē cum Ligustico Matthioli.

Tom. III

LIGUSTICVM ALTERVM

Belgicum, folijs ferè Absinthij, semine rotundo.



LIGUSTICVM al: Locum
Lterum Belgicū, non inelegantē plāta, multis jam annis à Lobelio reperta in Taurinis amēnissimis collib. non procul à Padi fluētus. In hortis Belgicis altit, caulem promens cubitalē & sesquicubitalē, quem ambiunt folia rutacea, Sileris mōtani latiora, rotundiora, Absinthij fruticis ferè paria. Flores & semen rotundum, nonnihil aromaticum in umbellis Smyrniij Cre-
tici. Vocat hoc
Synonyma.

Lob. in Obs. p. 457. Ic. p. 786. Ligusticum alterum Belgarum, Lugd. p. 744. Ligusticum alterum Lobelij. Tab. Ligusticum alterum Herbariorum. C. Bauh. phyt. Sefeli montanū i. vel Alpinum Clusij, idem fecit cum Ligustico hoc Belgico, ut & in pin. ubi vocat Sefeli montanum, Cicutæ folio glabrum, notatque differentiam latiorū foliorum ex horto Cl. Cōtarenī.

LIGUSTICVM, MAIUS SIVE
Imperatoria major flore luteo.

QUADAM in montibus nascitur Ligusticum [al: Defcr.
tero folijs Angelicæ] major: folijs latioribus, rotundioribusq;: caule crasso, proximo Ferulæ, umbellam ferens luteam: semina compressa & rotunda, candicante, Sphondilio minora. Radicem candidam, Ligustico crassiorē.

Hanc quidam, Casalpino autore, pro Libanotide Theophrasti ostendunt: non tamen odor adeo insignis inest. Centeret potius apud eundem inter genera Panacis recenseri, cum inquit sunt & aliæ quædam Panaces: una folio tenui alia latifolia: ut Ligusticum significet & hanc, quæ latiori folio constat, quasi Ligusticum majus dici possit, & Imperatoria major.

Libanotis
Theophr.LIGUSTICVM MATTHIOLI
& Lobelij.

AN hoc intelligit Cornarius in Diosc. quando ait. Verum Ligusticum etiam hodie Liguribus notissimum, & in cibis condiendis familiarissimum, tale depingunt, quale ipsis Dioscorides descripsisse videtur. Imò quale est id quo hodie Ligures utuntur, & quale etiam reliqua Italia novit.

Legitimum ac verum Dioscoridis Ligusticum in Ananien sibus & Coriutien sibus montibus nasci scripsit in priorib. comm. Matthiolus, itemq; Venetijs in horto Maphei, ac etiam in Liguria, cujus Metropolis sit Genua. Id autem sibi vulgari notum ait, ut cujus semine passim utantur incolæ in ciborum condimentis. His addit in post. comm. cum mag. fig. lat. & Ital. hujus plantæ imaginē amicos ubi nihil, priusque hoc Ligusticum magis quàm secundum referre sibi videret, sed velle, ut sit quoq; aliud judicium. In epit. cum addit. Camer. vocatur Ligusticum.

Ligusticum
verū Diosc.
Matthioli.

N 2

Germ. wilder Diptam & Ross kummich; aliis wilder Galgant. In hist. germ. Fremder Liebstockel/ Dioscoridis Ligusticum. Annotatum legimus à Dalechamptio cap. de Ligustico apud Matthiolum, plantam hanc in Allobrogum montibus frequentem nasci, ab incolis dici *Sermontanum*, eam Libanotim fructuosam esse se putare. Si porro Matthiolo erat notum semen, quod ait sibi vulgaris notitiae, cur non descripsit, ut melius innotesceret, cur in postremis non repetit nasci in Ananienfibus & Gortienfibus montibus, si olim vera & perspecta scripsit? Icon Matthioli videtur nobis representare *Siler montanum*, sicuti & Icon nova à Camerario exhibita, semen tamè quod imagini ejus appinxit, differt. *Sileris* enim semen magnum & foliatum est.

Matth. 14. natur. Matthiolum autem de *Silere montano* loquutum esse, asserere non aulim. quandoquidem Lobelius tradit plantam nasci in Liguria *Sileri* similem: præterea Matthiolus in Diosc. l. 3. c. 54. *Seseli* pharmacum [i.e. *Siler*] cimum sctorum representare scribit.

Siler Mas. filenfo. Pona in descr. montis Pilati narrat nonnullos Ligustici. Matthioli pro *Silere* aut *Seseli* Massiliensi uti. Contra Dodonæus, Guilandinus, & C. Bauhinus volunt Ligusticum Matthioli esse *Siler montanum*, quorum opinio non placet, ut suo loco diximus.

Lacuna no. natur. Lacuna habet iconem Matthioli, nihilque præterea, quam autem plâtam intellexerit, dubitamus. Si *Siler montanum* voluit, improbamus ejus conjecturam propter semen.

Tabern. 14. natur. Tabern. quoque imaginem Matthioli pingi curavit, historiamque ex Dioscoride & Matthiolo concinnavit, quam pro vera venditat. Non existimo illum scripsisse, quid scriberet. Nec scio an *Siler montanum* intellexerit. Si ita, semen non convenit cum Dioscoridis Ligustico.

Lacuna. Si quis Genua itinere terrestri Savenam proficiat, & paulum ad levam Austrum, marè versum defleat, inquit Lobelius, magnam copiam videbit Ligustici, inibi præpmodum, ubi Saliunca visitur oriunda: verum illic unde nomen habuit apud Ligures, neglectum habetur: universo illo tractu maritimo reperitur hæc; cujus semen fuscum odorem, Fœniculi semine, velleum est, multoq; usui illis montium accolis, Mei simile & par umbellis, caule ferulaceo, alis diviso, folia ferentibus angustiora Galegæ aut *Sileris*, radice Panacis odorâ: Pingitur hoc in Obs. p. 408. pro Ligustico Adversariorum.

LIGUSTICVM RAVVOLFFII, folijs Aquilegiæ.

Descr.



RADICZ est crassa, fibrosa, tortice. inæquali, quasi rugis transversis asperata, fusciq; coloris, medullâ candidâ, amatâ, modicū quid Aroma & Aristolochiam sapore redolens: ad cuius caput, pili tanquam veterum foliorū defluxorum fibræ solidiores & nigrescentes, enim folia, quæ numerosa ex radice capite longis pediculis emergunt, unâ parte quasi vaginato exortu (niam cum ea quæ crassiora &

laticiora sunt, ut & ea, quæ ex caule prodeunt) eadem, tanquam membranacea siliqua circumdant, articulo crassiore, lineaque transversa: quæ crassa sunt, rigida, glabra, viridia & (plendentia, subtrus candicantia, fibris majoribus subpurpureis transcurrentibus, quæ licet instar foliorum Aquilegiæ dividantur, non tamen omnia in pares lacinias (Aquilegiæ lacinij laticiores) fissa sunt inferiora namq; in vegetiore planta, plerumq; quinque folia habent, ex triplicirami divitura aliâs tria tribus pediculis insidentia. Caulis unicuſ est, cubitos tres quatuorve superans, rotundus, striatus nodis distinctus, subalbicans, puniceo colore aliquando admixto, in tria, quatuor, vel quinque brachia distributus, quæ umbellam magnam, ex longissimis festucis & floribus albis parvis cõpositam, sustinent: semen succedit longum, latum, striatum, geminum, puniceum, gustu subamarum, Cumini saporem imitans, aromaticum, modice excalescens, & salivam ciens. Hoc D. Doldius Norinberga ex D. Camerarij horto, nomine *Seseli Ethiopici* folio *Aquilegiæ* misit, cujus Camerarius, (sed sine descriptione) in sui horti Catalogo, sub *Seseli Ethiopico* altero meminit, & semen odore & sapore aliquantulum Cinamomum representare scribit.

Est autè descriptionis auctori C. Bauhino in phyt. Libanotis latifolia 4. aquilegiæ formâ: Eid. in prod. Libanotis 1. (6. in pin.) latifolia, aquilegiæ folio.

ELAPHOBOSCVM VEL terum.

CAP. LIX.

ELAPHOBOSCON caulem habere Libanotidi aut Fœniculo similem, angulosum; folia duorum digitorum latitudine, satis longa, velut Terebinthi, contracta & aspera quodammodo, auctor est Dioscorides. Habere & multas propagines ipsum caule, quas ait umbellâ habere Anetho similes: flores submelinosos (ὑπόμελινος, vet. quidam caret.) & semen Anetho simile. Radicem esse trium digitorum longitudine, crassitudine autem unius (sc. digiti. πᾶσι δ' ἀπὸ τοῦ. Matth. end. πᾶσι δ' ἐν τῷ αὐτῷ. Ald.) albam (ὑπόλευκος, Ald.) dulcem (ὑπόδουλος, Ald.) edilem. Sed & caulem olerum modo edi, dum recens est. Tradere quosdam cervas hujus herbæ pabulo resistere serpentium moribus. Vnde & semen ejus commorlis à serpentibus dari cum vino bibendum.

Elaphoboscon cervas monstrasse ait Plinius, qui l. 22. c. 22. sic describit. Elaphoboscon ferulaceum est, geniculatum, digiti crassitudine, semine in corymbis dependentibus Silis (*Sileris*) effigie, sed non amarum: folijs Olusatris. Et hoc laudatum in cibis. Quippe etiam conditum prorogatur ad urinam ciendam, lateris dolores sedandos, rupta, convulsa sedanda, inflammationes discutiendas, coli quoque tormenta. Contra serpentium, omniumque aculeatorum ictus. Quippe fama est, hoc pabulo cervos resistere serpentibus. Fistulas quoque radix Nitro addito illita sanat. Siccanda autem in eos usus prius est, ne succo suo maceat, qui contra serpentium ictus non facit eam deteriore. Et hæc verioris Plinij codicis lectio est.

Galenus calidam & tenuium partium vim habere tradit, & propterea etiam siccantem secundo ordine. Nunc quod silentio non prætereundum, sunt qui Elaphicon, qui Nebrium, qui Ophigenium, qui Ophioctonon, qui Herpizen, & qui Lymen vocent. Egyptij Chemin: Aphri Aldruachu? Romani Cerviocellū dicūt. Quæ Elaphobosci appellationes unâ, eandemq; causam & originē habēt, Verba autem ea quæ Dioscorides nō procul à fine capitis, & Plinius 22. volumine ejusdem numeri capite retulerūt. Quoniâ sc. fama sit hoc pabulo cervos resistere serpentibus;

Temper. ex Galeno.

Nora appell. Latines.

eam denominationem expriment quæ prima in Notis Dioscoridis auditur. Elaphicon sc. i. e. Cervinam herbam. Max Nebria ex eodem eventu: *Nebria* enim cervorum inulos. Græci vocant. Ophiogenium itidem & Ophio & non: quarum altera ab enebris serpentibus manifesta habet significationem: altera quod serpentes aliquo hujuscemodi mlo vexet. Corrupta enim est, ut ait Marcellus, nec licuit eam instaurare: quemadmodum & eam, quæ sequitur Herpixon, suspicari tamen in hac licet *Herpixon*, quæ Græcis reptilia & serpentes sunt, aliquid fuisse. In Romana etiam Cervicocelli voce certum aliquid non est, credimusque Græcaram harum modo corruptam esse. Siquidem in græca Elaphobosco nihil est quod oculum aut ocellum indicet, quodque in ea auditur cervorum tantum pabulum ostendit.

Pastin. Tandem, ut ad Elaphobosci æquivocationes de-
germ silv. veniamus, Pastinaca Germanica silvestris plerique hodie Elaphoboscum censetur.

Pastin ger. Aliorum fiat sententia Pastinacam Germanicam
silv. sativam esse Elaphoboscum.

Staphyl. Euchar. Roëlsii variorum plantarum nomina
silv. confundens, videtur pro Elaphobosco pingere Staphylion silvestre.

Sisyr. Iudicent penitus strepium, quàm concinnè Cæsalp. Fab. Columna, & C. Bauhinus Sisarum, Elaphoboscum Dioscoridis & Plinij esse statuunt.

Caucalis minor Bellonij semine pulchro à nobis dicta, creditur ab Anguillara Elaphoboscum.

libanot. Difficile est judicare, quàm plantam per Elaphoboscum Plinij, missum Florentis, intelligat Caucariensis. Is enim eum non describit in hordis.

libanot. Cornarius arbitratur esse eam herbam Elaphoboscum, quam Germanos *weyße Surzmuertz* appellare ait. De hac agimus sub Libanotide altera Dodonæ.

libanot. Credit esse Elaphoboscum Dioscoridis Lonicerus, quàm Libanotidem Theophrasti Dodonæ, sive Sesele Æthiopicum Matthioli inscribimus.

Angel silv. Cordo in Dioscoridem ad Elaphobosci descriptionem satis accedere videtur herba, quàm Anglicam silvestrem repentem appellamus.

Auricula Leporis. Elaphoboscum, aliqui faciunt plantam à nobis Auriculæ leporis imagine propositam.

Auricula Leporis altera. Montpellierium Pabulum cervinum [Auriculam leporis alteram sive rigidior] Elaphoboscum putatum; multum abesse à veris notis perhibet nobiscum Lobelius.

Allium. Elaphoboscon cognominat Allium Gesnerus in ascriptum Dioscoridis.

Salvia. Loco jam citato Salvia quoque de Elaphobosco dicitur.

AGRIOPASTINACA Cretensium.

CAP. LX.

Descript. **A**GRIO PASTINACA vulgariter hodie vocatur in Creta herba quædam Petroselinum vulgari simillima, nisi quod minor est, foliaque eadem etiam incisuris prædita licet habeat, minora tamen & aliquantulum crassiora profert, caulis Petroselini est, flores in umbellis sibos sustinens, quibus succedunt semina Petroselini, sed minora, colore ad atrum accedentia: radice nititur unica pollicis magnitudine, semper figurâ longâ; cortice tenui tectâ, qui digiti attritu facillimè à radice separatur, quæ candida, edulisque est, Bulbocastani gustu: totâ Hyeme viret, semineque Majo profert, postea tota arefcit præter radicem, quæ tenâ latet, & pri-

Tom. III.

mis Autumni nubibus germina protrudere incipit, inquit Honorius Bellus in epistolis ad Cæcium missis. Hæc stirpis duo repenuntur genera, colore corticis radicem tantum differentia: nam alius rufus, alterius niger conspicitur. Nigrum genus in montibus totius Crete, & etiam in Dalmatia provenit. At rufum abundantissimè tantum in scapulis Crete propinquis inter sita, & copiosè admodum in quadam insula parva, Grabussa vocata Occidentali Crete patet sita, ubi arx munitissima exstructa est, quàm insulam unam ex tribus Mussagoris olim à Plinio appellatis esse judicat Bellus. Hæc herba ad Baselinon à Plinio l. 20. c. 12. descriptum ipsi accedere plurimum videtur, siquidem differat brevitate caulis & radicis colore rufo à Petroselino. Porro ut ait à Seplasiensis pro Saxifragia usurpatur, & Saxifragia vocatur, à rusticis verò *Agriopastinaca*, à silvestris Pastinaca, à qua tamen longè differt, Pastinaca silvestris adhuc in Creta legitimum nomen retinet, nam eam *capulacis* vocant, frequentissimèque radice, & herba cocta, verno tempore, vescuntur rustici.

Hanc anno 1697. semine sibi datam refert Clusius, sed eum valde serò germinasset, & maxime renella adhuc esset planta, Hiemem proximè sequentem corrupisse, ut observare nequiverit: fuisse verò ejus folia ex atro-splendens, non minus quàm Eleotini. Plura nobis hæc de planta non constant. Bauh. in pin. vocat Apium; sive Petroselinum Creticum: Agriopastinacam vulgò in Creta, Bell. ep. 5.

PASTINACA GERMANICA Silvestris, quibusdam Elaphoboscum.

CAP. LXI.

GUAR.



NEQUA QUAM alter quàm cultu nobis videtur à sativa, de qua mox agemus; differre, formâ partium omnium eadem, sed coarctiore, saporeque vegetationi.

Cæsalpinus Pastinacæ vulgò ap. *Descript. c. 1.* pellatæ titulo sic describit. Folia fert simplicia pediculis, longitudine duorum dodrartum, sectionibus oblongis, latitudine tertium digitorum, circumscissis, hirsutis, frequentibus; caulem crassam, bi-

cubitalem, & ampliorem, striatum umbellâ summis ramis insidentes latas, flore luteo: semina in rotunditate depressa, laeta, candida: radix singularis in altum demittitur, vasa, cubitalis, suppalida, cortice carnoso nervo intus duro.

Matthioli & eum imitatus Lacuna solam rationem pro legitimo Elaphobosco proponunt: suspicamur autem plantam eam non fuisse cognitam Dod. gall. eam Elaphobosci inscriptione præstam dedit, refertque ad officinis paratæ suæ Romanam urtinam, aut Bauciam appellari: gall. *cherry*

N 3

Matth. & Lacuna no-
tamus.

saunage: Germ. & Belg. wilde Moren: Græcè *ἰλαρόβοσκον*. Lat. in fol. Pastinacam latifoliam silvestrem vocat, sativam foliis, caule, umbellâ; flosculis luteis semine plano, rotundoque referentem; sed radice tenuiore, duriore, ac lignosiore, esui minus idonea. Silvestre hoc Pastinacæ genus, quosdam hæsitantes ac ignorantes quo referri posset, Panacis speciem esse finxisse: nonnullos verò Bauciam, alios Branciam leoninam vocasse; Bauciam autem, auctore Mâlio in Luminari majore, Pastinacæ esse Dioscoridis & reliquorum veterum, tenuifoliam videlicet dictam. A veteribus autem, ac præcipuè Dioscoride, Pastinacam hanc Græcè *ἰλαρόβοσκον* nominari: id quod conferenti Elaphobosci descriptionem cum hac mox fiet manifestum. Radicem verò & esui idoneam esse, ipsum etiam Dioscoridem agnoscere. Dicit verò istud etiam *ἰλαρόβοσκον*, *νίφρον*, *ἑρπύλλον*, *ὀριον*, *ῥόπον*, *ῥοπον* *λύμην*, & Latine Cerviocellum, ut inter nothas ascriptum reperiri testatur.

Lonicerus hanc habet malè pictam sub nomine Pastinacæ sylvestris (wilde More) & pejùs descriptam, confundens eam cum Carotis.

Anguill. ep. 7. c. de Elaphobosco hujus meminit, dubitat tamen an verum Elaphoboscum & vocat Pastinacæ speciem. De eadem autem cap. de Pastinacis ait, sativas non differre à silvestribus nisi culturâ. Item cap. de Cimino silvestri, ubi Pastinacam silvestrem nominat. Hanc fortè eandem vocat ep. 5. Been album Actuarius in Diasatyrio, & Galeni Daucum silvestrem.

Tamet si non esse figurâ diversam à sativa Pastinacam, sed viribus duntaxat ignavioribus ex Dioscoridis oratione non liquet, inquit in Adverf. Lobelius: tamen, quia posteritatis consensu & multo usu ista recepta est, idè ut congenerem agnoscere visum est, sylvestrem Pastinacam, sive Bauciam officinis dictam, luteis florib. & radice sativæ Pastinacæ concolore, & ejusdem saporis. Vocavit hanc idem alibi Pastinacam silvestrem Arabum, Bauciam pharmacopæorum, si quæ cum Elaphobosco Dioscoridis conferas, nihil prosum esse ait, quod requiras. Nominatur in Obl. p. 468. Baucia, dubitaturque jam an Elaphoboscum.

Trago dicitur Pastinaca 2. sive sylvestris, & Pastinacæ sylvestre genus. Cornario Pastinaca sylvestris, qui malè existimat Staphylinum, sive Pastinacam veterum. Fuchfio in hist. Sifarum erraticum, silvestre. In Icon. Sifer silvestre. Lacunæ Sifarum tertia species, & species Elaphobosci silvestris. Cam. apud Matth. in hist. germ. & epit. Pastinaca sylvestris.

Lugd. p. 721. Elaphoboscum Dodonzi seu Baucia. Item inibi Elaphoboscum Matthioli. Historia duas figuras habet unius plantæ. Cæterum, esse ait qui Pastinacam pratensem Plinij esse velint, quam etiam Hibiscum, Pastinacam appellat, & *μαλαχὴν ὀρεῖαν*. Lugdunenles rusticos vocare *Panex* & *saunage*, i.e. Pastinacam silvestrem, ejusque radice vesci ut hortensis.

Tab. Icon. Elaphoboscum erraticum, Branca leonina, wilde hirtz Pastenach / wilde Morelle. Item hist. Elaphoboscum 2. erraticum. Item Elaphoboscum 3. Matthioli, falsch hirtz Pastenach. Matthiolum ait ponere pro Elaphobosco plantam aliam quod cogatur facere, quia verum Elaphoboscum posuerit pro Pastinaca domestica, quænam verò sit planta sibi non constare. Sed miramur Tabernæmontanum non animadvertere Matthioli Elaphoboscum non differre à suo Elaphosco errático, ac dicere falsum esse: quum ipse eundem proponat pro Elaphobosco suo errático, licet figura Tabern. minus placeat. Malè quoque à Gerard do sub titulo Spondyli ponitur icon Elaphobosci erratici Tabernæmontani.

Elaphobosci Dioscoridis descriptio nostræ Pastinacæ maximè quadraret tum flos, tum folia, caulis & semen, inquit Cæsalpinus, at radice brevitæ nequaquam, nisi genus silvestre assumatur, cui radix brevior multò quàm sativæ, ac flos luteus. Ad id nequaquam disjungendum videtur à sativa cum solo cultu differat.

Elaphobosci hujus effigiem & Lacunam & Castorem poposuisse, & Tabern. nomine Elaphobosci Matthioli meminisse testis est. C. Bauh. qui vocat Pastinacam 2. sive silvestrem latifoliam: Pastinacam. Brunf. Sylvestrem, Trag. Ang. Cord. Geln. h. Thal. Cam. Spontè natam, Cæf. Sifer sylv. Fuchf. Turn. Elaphoboscum, Matth. Dod. gall. Cast. Sylvestrem, Lac. Bauciam, Pastinacam sylv. Arabum, an Elaphoboscum, adv. Elaphoboscum erraticum; Tab. Pastinacam sylv. gallicam, Cord. in Diosc. Pastinacam latifoliam sylv. Dod. Spondylium, Ger.

Pastinaca Germanica sylvestris, quæ quibusdam Elaphoboscum dicitur, provenit Monspelij & Genævæ: Basileæ inveni florentem Octobri ad ripam fluminis Birsæ in urbe. Montbelgardi frequens est, prope Arbonam pagum, florens Julio & Augusto. Matthiolum sæpe vidit tum in Tridentino, tum in Gontuensi agro. Passim provenire ait Tabern. inter silvestres plantas in collibus agtorum & vinearum, herbosis locis & siccis pratis.

PASTINACA SATIVA LATIFOLIA, Germanica, luteo flore.

GUAR.



CVLINIS notis. Dæm. Cum Pastinacæ hujus radices in Germania, singulares, longæ, minus crassæ, albæ, in medio nervo duro donatæ, magis grato, quàm Sifarum, sapore: ab his caulibus surgit bicubitalis & procerior, striatus, inanis, multis alis concavus: folia Pimpinellæ majori non ineptè compares, sed multis numeris majora, atro-virentia hirsuta, sapore grato & aromatico quoque: flores in ampla umbella lutei, quorum singuli

li quinque foliolis reflexis umbilicum medium viridantem circumstantibus constant. Semen latum, foliaceum, duplex, compressum, Angelicæ vulgò dictæ semini simile.

FIBVRA æ nobis primo loco exhibitam ex Sifarum / lacinum / majus / Fuchfio. Fhibuit Fuchfius Siferi sativi magni titulo, dixitque *ἰλαρόβοσκον* Græcis, Sifer Latinis, vulgò autem Pastinacam, quod ei congener sit, appellari. Esse qui ex tritis prioribus literis diminutrice formâ, Serullum, aut Servillam, aut Chervillam, pro Siferculo nominent. Germanos ad corruptam hanc appellationem respicientes Gerlin & Geirlin, Gallos Chervy aut Giroles vocare.

A Trago hæc appellatur Pastinaca 1. sive sativa. Pastinaca. Sunt, inquit, qui Staphylinon & Pastinacam domesticam appellant, quod equidem per me illis licebit, modo

modo non offendantur, si, quod ad me attinet, Pastinacam Elaphoboscum (quod Dioscorides alios

FIGURA ALIA.



Elaphicon, nonnullos Nephtron, alios Ophigenion, quosdam Ophioctonon, aliquos Herpiceen, alios Lymen, Romanos Cerviocellum, Aegyptios Chemun, Aphros Ascaucau nominare dicit) appellaverim. Sed si quis miretur, quæ sit causa, ob quam Pastinacam Elaphoboscon nuncupare voluerim, is herbam ipsam cum historia Elaphobosci consecrat, & videbit dubio procul quid me permoverit, ut Pastinacam sic vocarem. Sin verò aliqui sint,

qui Pastinacam Sisarum interpretari velint, non est illis impedimento, ea tamen lege, ut Rapunculos ab ea appellatione nequaquam excludant. Hæc ille, qui figuram falsam addit: nec enim hanc suam descriptione tradit plantam, quam icona representat sub Pastinacæ titulo.

Lacuna confundit hanc Pastinacam cum Carota, eumque forte sequutus Oliverius in Theat. agric. dicens Pastinacæ & Carotæ (Pastinades & Carottes) inter se differunt tantum colore, uni color ruber, alteri albus. In Languedoc & alibi Carrose vocat Pastenille blanche: hæc duo vocabula confunduntur in multis partibus hujus regni, ut Lutetia, ubi indistinctæ hæc radices nominantur Pastinades & Carottes. Manifestum itaque ex dictis Oliverij sit, ipsi non fuisse notam Pastinacam Germanicam sive latifoliam foliis multum differentem: miramur etiam cum non meminisse Carotarum lutearum.

Et quoniam fortassis in Gallia Pastinaca sativa (ita namque vocatur Matthiolo) non feritur, Ruellius manifesto errore putavit, Carotas vulgò vocatas esse Pastinacas. Ut hinc maxime admirari subeat Ruellium. Siquidem hætenus nemo inventus fuerit, Matthiolo etiam annotante, rei herbariæ scriptoribus, tam Græcæ, quam Arabicæ familiæ, qui cum Ruellio memoriæ prodiderit, Pastinacam sativam radice niti ad eam rufam, ut sanguineo succo madaeat. Idem Matth. alibi dixit. Non desunt qui crediderint, album quoddam Carotarum vocatarum genus, legitimum esse Sisere. Cæterum eos hallucinari putaverim, Plinij testimonio ductus, qui lib. 19. cap. 5. hæc habet. Inest Siserebus longitudine nervus, &c. Id quod in hisce Carotarum radicibus haud quaquam reperire licet. Hæc ille, qui quamvis L. c. 107. Carotam pro Sisere depingat, suspicamur tamen eum per Carotam albam intellexisse Pastinacæ Germanicam, quæ radice albâ, & Carotarum modo venditur, & editur in Germania, diciturque quibusdam Sisere. In hac sanè Pastinaca nervus & amaritudo quædam. Ipse Matthiolus fortè confundit Carotam cum hac Pastinaca, & ex præstremis comment. satis apparet eum nescivisse quid tunc scriberet. Omisit siquidem ea, quæ in prioribus de Carota alba scripserat.

Dod. gall. videtur Pastinaca vulgaris esse carota, h. e. Pastinacam Galeni 8. simplicium. Latinus in fol. Pastinacam latifoliam sativam contra negat esse

Tom. III.

verè & propriè Staphylinum veterum, videturque Elaphoboscum concludere.

Lonic. hanc confundit cum Carotis, quas Pastinacas vocat, ad hanc Staphylinon facit, & Pastinacam albam vocat sine pictura. Anguillara aut Pastinacam Græcos Staphylinon vocare, domesticamque hanc à silvestri cultu solummodò differre.

Lobelius in Advers. Pastinacam domesticam appellat, Dioscoridis Pastinacam esse existimans, absque ratione. In Obs. p. 467. & Icon. p. 709. vocatur Pastinaca domestica vulgi. Lugd. p. 719. Pastinaca sativa vulgi Matthioli. C. Bauh. Pastinaca, sive sativa latifolia: Pastinaca sativa, Trag. Lac. icon. Lugd. Geln. h. & Cam. Pastinaca vulgaris, Dod. gall. & Cels. Pastin. domestica, Matth. Ang. Cast. Ad. Lob. Pastin. latifolia sativa, Dod. Latifolia sylv. Ger. Sisarum sativum magnum, Fuch. Turn. Sisier Dioscoridis, Col. Elaphoboscum sativum, Tab.

Cæsalpinus statuit Theophrastum Daucum vocasse, quam Theodorus Pastinacam vertit, Lauri facie, colore Croci, sed verbum inibi positum Daphnoides postponendum putat, ut herbam propriam significet, nisi Pastinacam hanc nostram intelligat Theophrastus. Latifolia enim est, ut particula quædam Lauri speciem habeant. Idem Cæalp. ait Pastinacam vulgò appellatam, radicem vastam, in hortis feri solitam, cibi gratiâ. Plinium hujus meminisse nomine Pastinacæ majoris, cui nervus insit, ut Siseri, sed tantum anniculæ. Athenæum de magna Pastinaca dixisse, quod Caros vocetur, magnam esse Pastinacam, quæque faciliè auceatur, meliorem habere succum, quam Pastinacam. Profectò si aliqua magna dici debeat, hanc cognomen id mereri, sed apud Dioscoridem quo nomine donata sit, incertum esse: neque enim in genere Staphylini, neque Dauci ponendam videri: cum totius plantæ facies longè discrepet: neque cum Sisere, cui valde affinis sit, convenire: nam Plinium Pastinacam majorem se junxisse ab eodem: alioqui Sisaris facultates, quas Dioscorides & Plinius tradunt, maxime convenire cum hac Pastinaca: & vulgò cognitum tradit Sisere, ut apud nos Pastinacam. Videri autem Plinium per Germanicum Sisere aliam intellexisse ab hac Pastinaca, quam marem Pastinacam vocavit.

Sed ex Dioscoridis, Plinij, Galeni, & Columellæ de Sisere verbis corrigere conatur Columna plantam hanc à nobis propositum Antiquorum Sisere esse absque dubio ullo. Radicem namque Pastinacæ lativæ similem formâ & sapore, verum amariore, atque odoratiore, omnesque Pastinacæ generi adscripsisse, atque Pastinacam vulgarem sive domesticam appellasse. In hac radice nervum inesse longitudine, qui eximatur, postquàm elixata fuerit radix, non solum dulcedinis causâ, sed quia tenerior sit pars reliqua exterior, ciboque aptior, atque gratior: hoc & in Pastinaca sativa vulgari & Raphano perspicui, præsertim cum radices sint bene adultæ, duriores enim tunc continere nervum cibo ineptum. Hanc postremò pro Elaphobosco aliquos depingere, ab illius quidem descriptione longè alienam: differre namque radice forma, sapore atque semine Anetho dissimili, foliaceo, compresso. Quamobrem non fore verendum dicere non esse Elaphoboscon, atque Siseri perquam congruere, cum sapore, formâ, atque usu antiquorum monumenta etiamnum retineant.

Elaphoboscum sativum hanc inscripsit Tabern. hæcque de eo tradidit. Multiplex opinio de hac herba habetur. Postquam enim quidam animadvertierunt cum Pastinaca Dioscoridis & veterum eam convenire non posse, Sisarum latuerunt, non minori lapsu id asserentes, quam ij qui Pastinacam concludunt. Si planta hæc cum Elaphobosco Dioscoridis

Nomina
Varia.

scoridis & Plinij descriptione conferatur, nulla nota deesse deprehendetur, quæ huic non conveniat. Apud Dioscoridem itaque nominatur *ἐλαφοβόσκον*, *ἐλάβορον*, *ἐλαφόνιον*, aut *ὀφιογενίον*, *οφιοκτόνον*, *λύχιν*, *ἐπιζήν* aut *ἰππίζην* & *νέφριον*. Apud Latinos Elaphoboscum (vel ut Hesychius & Varinus legunt *ἐλαφοβόσκος*, Elaphoboscus in masculino, nomine Oxytono) Elaphicū, Ophiogenium, aut Ophigenium, Ophioc-tonum, Nephrium & Cervicellus. Apud Herbatos Pastinaca domestica latifolia, ad differentiam Pastinacæ Dioscoridis tenuifoliæ, Pastinaca cervina, O-luscervinum, Herbacervina, Pabulum cervi; & Matthæum sylv. Cervaria; Turnerum Pastinacam adulterinam. Quia autem spontè hæc in agris nascitur, eaque quælibet paupercula gens pascitur, Lobelio Pastinaca dicta videtur, quemadmodum etiam Staphylos à radicis rapo Bryonice (quæ *εὐρυκας* etiam vocatur) non ita ab simili appellationem traxit potuit. A Germ. dicitur Pastenachen / Pestinaken & Pasteney / Moren / weiß Moren & Zam Moren / Dod. Burgmorellen / Birgaug / birz Pastenach & hirsfrant / Tab. Belgis Tamme / Mooren. Brabantis Pastinaken / hoffs Pastenaken & Moren xan die Houeniers. Gallis *Pastinades* & *grand Chervycultrud*, Dod. gall. Ital. *Elaphobosco* & *Pastinaca domestica*. Hisp. *Canaboria blanca*. Arab. Iezar, Gezar, seu Giezar. Egypt. Chemus. Africanis Afeaurau, Afeancau, & Aldruachu. Angl. Persenippe. Boh. *Pastirnaf*.

Locus.

Pastinaca Germanica sativa flore luteo, vulgaris in hortis Môtbelgardi, ut etiam in horto E.C. in quem hortulanus introduxit genus crassiore radice. Geneva meo tempore pauci habebant in hortis. Seritur hæc semine, & postquæ exierit, ut major efficiatur radix, transfertur, alitè tamen prius resosso atque stercoreato Solo, atque rariùs ut cætera olera deponuntur. Dalechâpius alios sequutus, quia planta à se descripta plures habebat radices, putavit atq; scripsit, non semine, sed radice ferit: sed hallucinatus est, quia sequi voluit Matthioli scripta, quæ à Marcello Virgilio, qui verbis tantum Dioscoridem commentatus est, ea transcripsit. Nequè animadvertit verba illa Plinij: [*Oculus ex radice excisus, ut Harundo feritur,*] Inulæ factum, inquit Columna, non Sisere demonstrare, de qua verba faciebat. Idemquæ postea Inulam, Siser & Pastinacam eodem tempore magnis seminum intervallis feri; Siser verò transferri melius. Quod Neapoli quilibet Olitor facit, priùs verò semine ferit, deinde opportuno tempore prius altero Solo resosso & stercoreato, ut melius convalescant, atque grandiora fieri possint, radices transfert. Locus amat pratenses. Augusto mense semen perficitur. Pastinaca latifolia sativa Dodonæo Julio aut Augusto florem profert. semen deinde perficit, & altero ex quo vel lata, vel enata est anno. Radix Autumno & Hieme usque in proximum Ver elui aptissima est. Qui Hieme colligunt radices caveant à Cicuta vel Cicutaria. Dum sum Montbelgardi vidi duas familias in quibus qui decepti edebant pro prædicta Pastinaca penè extincti erant, sed sublevati vomitu, Theriaca & Saxonico pulvere, itemque purgantibus, salvi evaserunt.

Tempus.

Quantitas.

Vires & usus.

Cognoscendi modus.

Hujus radiceis sapor est Pastinacæ (veterum, intellige cum Columna) amarior atque odorator, aromaticum quid amplius habens, gustu gravior, quapropter etiamnum à multis sentitur, & præsertim in Gallia Cisalpina, ut ab illius provincie incolis amicis accepit Columna, in cibo avidissime expetitur, atque ut palato gravior fiat, illam ita parare solent. Radicem adultam accipiunt lavantque, fibras parvas cultro excidunt, postea elixant, atque cum r. fixerint, per longum dividunt, nervumque eximunt, atque in frustra dissectam, patella oleo serventi ple-

na, farina prius obductam pilcium modo frugunt: & evadere sapore aiunt, ut nec pilces bene conditos eâ mensâ degustare comedentibus placeat amplius. Non igitur mirum, si Tiberius princeps, ut à Plinio fertur omnibus annis è Germania affecti jubebat, cum sit ita palato & stomacho grata atque utilis. Ex his itaque notum esse ait Columna, plantam hanc antiquorum usum Sisereis, atque vires ab illis tributas retinere, quare alias plantar ab alijs descriptas minimè Sisereis vires atque gustum & usum referre judicavit. Pastinacam autem venire in cibos elixam exempto nervo plures alij testantur, dein frictam more fungorum verno tempore: refert quoque Cæsalpinus ex eadem cum saccharo Eleætiarum confici ad vires recreandas convalescentibus, & puerperis, communissimum rusticorum remedium: appetentiam quoque præstare. Tabernæmontanus inter vires multa recenset imaginaria. Ego naturali anthipathia aliquando abhorui, cogente tamen patre p. m. Ioanne Bauhino Medico, tandem comedi & nunc sapiunt, à jure tamen adhuc abhorreo, nec sine nausea assumo. Incidendi tandem, attenuandi, detergendi, obstructions aperiendi facultatem inesse, sapor, odorque demonstrant.

Elect. marj.ß.

DE SISERE VETERIBVS.

CAP. LXII.

Dioscorides Siser notum esse proposuit, ut *Diosc.* cujus radix cocta ori grata sit, & stomacho comoda, & urinam ciet, & appetentiam ad cibum provocet.

Plinius Siser duplex statuit. Inter medica (inquit *Sifer duplex Plin.* lib. 19. cap. 5.) dicendum Siser & ipsum Tiberius princeps nobilitavit flagitans omnibus annis à Germania. Gelduba appellatur Castellum Rheno impositum, ubi generositas præcipua. Ex quo apparet frigidis locis convenire. Inest longitudine nervus, qui in decoctis extrahitur, amaritudinis tamen magnâ parte relicta, quæ mulso in cibis temperata, etiam in gratiam vertitur. Nervus idem & Pastinacæ majori, duntaxat anniculæ. Et lib. 20. cap. 5. Siser erraticum sativo simile est & effectu, stomachum excitat, fastidium abstergit. Ex aceto Lasepitiato sumptum, aut ex Pipere & mulso, vel ex garo. Urinam ciet, ut O-pion credit, & Venerem. In eadem sententia est Diocles. Præterea cordi convenire convalescentium; aut post multas vomitiones perquam utile. Heraclides contra argentum vivum dedie, & veneri subinde offensanti, ægrisque se recolligentibus. Hicetius idem stomacho utile videri dixit, quoniam nemo tres Siseres edendo continuaret: esse tamen utile convalescentibus ad vinum transeuntibus. Sativi privatim succus cum lacte caprino potus, sistit alvum.

Galenus de Sisere, quod inter alimenta omittit, *Galenus.* 8. simpl. hæc tantum tradidit. Sisereis radix cocta stomacho grata est, urinam movet: secundo ordine calfaciens, adjectam habens amaritudinem quandam, cum laxi adstrictione.

Columella de hortorum cura agens ait, Pastinaca *Columella.* convalescit alitè pastinato, & stercoreato loco, sed quàm rarissimè ponenda, ut majora capiat incrementa. Palladius quoque velut de nota radice tradit. Iis, quæ ante ex Plinio adduximus, hæc adjungimus. Sisereis satius mensibus Februario, Martio, Aprili, Augusto, Septembri, & Octobri. Idem paulo post. Seritur & Siser, & Pastinaca utroque tempore, Vere & Autumno, magnis seminum intervallis, nec minus quàm ternorum pedum, quoniam spatiosè fruticant. Siser autem transtectur melius.

Sisarij

- Asquidacea.* Sifari nomenclaturam variis adscribi plantis nos
Erica. minimè latet. Ac primum quidem Sifarum dicitur
 de Erica H.n.g.lib.16.
Sifarum De Sifaro mulus dicto, quamprimum posthac
multis. pluribus dictum sumus.
Carota. Alij Pastinacam tenuifoliam propriè Carotam
 appellatam ad Sifarum, vel Sifer referunt.
Pastin. fil. Sifarum verò alij Pastinacam silvestrem Græco-
Gracorum. rum esse statuunt.
Pastin. lati- Pastinacam lativam latifoliam Germanicam luteo
va Germ. flore, quidam Sifarum esse contendunt.
Pastina. Siferis tertiam speciem credidit esse Lacuna Pa-
germ. fil. stinacam Germanicam silvestrem.
Rapunculum. Tragus non vult Rapunculum à Sifari appella-
 tionem excludi.
Barbades Bathades Indica seu Ges vocata ab Adversariis in-
Indica. ter Sifarum refertur.
Oenanthe Sifer palustre. H. Lugdunensis an est Oenanthe
aquatica. aquatica?

SISARVM MULTIS.

Def.

RADIX propter maiorem suavitatem cupediis
 magis expetita, quam Pastinacæ latifoliæ Ger-
 manicæ, quæ non ut in ea unica, sed ex uno capite



plures pendulæ,
 glandulosæ, tene-
 ræ & fragiles, rugo-
 sæ; cortice tenui,
 pallidoque obdu-
 ctæ, pulpâ candidâ
 digitali crassitudi-
 ne, pedales quæ-
 dam, aliæ multò
 breviores, dulci &
 grato sapore, non-
 nihil aromatico;
 caulis surgit sesqui-
 cubitum altus, sin-
 gularis, genicula-
 tus, striatus: folia
 pinnatim disposita,
 Bruciæ minora, te-
 neriora, acuminata,
 argutis per ambi-
 tum denticulis cre-
 nata, umbella can-

dicat suaveolentium flosculorum, quorum singuli
 quinque foliolis, totidemque apiculis constant. semen
 in umbella produci Petroselinii modo,

Temp.


Figura nostra ex Fuchianis minùs congruit, ac
 propterea aliam pingendam curavimus.

Pastinaca
exigua.

Commemorat plantam à nobis descriptam & i-
 cone meliøre propositam Tragus lib. 1. cap. 146. di-
 cens. Summè mihi placet, quoddam Pastinacas exiguas,
 quæ Germanis Berlin dicuntur; ad Sifer, seu Sifa-
 rum aliqui referant, hoc enim verum illud hortense
 est Sifarum; quo Tyberius Cæsar delectatus fuit. In
 Hist. germ. ait. Quæ Plinius lib. 19. cap. 5. de Sifaro di-
 cit, quod Tiberius à Germania accerserat intelli-
 go Pastinacam minorem, Germ. Flein Moresen/
 Breitzel & Noren aut Berlin vocatam. Alibi Sifarum
 Columellæ esse Rapunculum hortense docet. An
 autem Columellæ sit Sifarum dubito, quia me latet
 an bis in anno feri possit.

Sifarum.
Cordo.

Sifer feri solitum fuisse olim in Germania cibi
 causa, eamque quotannis à Germanis flagitasse Ti-
 berium Cæsarem, vel Cordus in Diosc. quoque te-
 statur, qui licet se ignorare falsus sit, quid sit, Brun-
 sellio tamen omnino subscribit, esse sc. illud olus,
 quod Germani Bieren / vel Gerele & Gergele vo-
 cant; Hest Flein gel & Noren; alij Breitzel Noren. In



Dispenf. supra dia-
 corum & in Tri-
 phera Sarracenicæ,
 Secacul, verum, ef-
 fe Sifer, quod Ger-
 mani Grizelmos-
 ren; Bavan & Tude/
 Suevi Geyele vo-
 cant, concludit. Se-
 cacul autem non
 esse, negat Col-
 denbergius, & cum
 eo Dodonæus, di-
 cens: Serapionis Secacul Ss-
 autem Secacul; de rapionu
 quo cap. 89. ut nō
 nulli existimant,
 haudquaquam est:
 Secacul liquidem
 folio describitur
 Iulben, i.e. Pisi, in-
 terprete Matthæo

Sylvatico: & fructum fert nigrum Ciceris magnitu-
 dine, humore plenum, ac sapore dulcem: qui gra-
 num Culcul dicitur. Pisi autem folium non habet Si-
 farum, nec fructum: nec granum fert nigrum, Ciceri
 simile. Vnde satis constat, Sifarum à Serapionis Se-
 cacul plurimum differre: tantum abest, ut idem sit.

Matth. in Diosc. est Sifarum alterum. In post. *Sifarum*
 comm. cum mag. fig. Lat. & Ital. Sifer primum, quod *alterum*
 Dioscoridis, Plinij, Columellæ, Marcelli & *at athusa.*
 Ruellij ait. Nec obstat unicus illi tantum scru-
 pulus, quod in hoc nostrate Sifere nulla ferè
 percipiatur amaritudo, cum tamen Galeno & Pli-
 nio Sifer amarore non vacet. Verum hoc à tua cum
 non deducit sententia, quod regiones sæpè plan-
 tis immutent saporem; non tamen legitimum fa-
 cit Sifer. Epist. ait, si huic nostro Siferi folia essent
 Pisi, non Pastinacæ; semen rotundum, nigrum, non
 latum ac foliaceum Lentis ferè instar, ut in Spondi-
 lio, cum Cordo sentirem esse Secacul, Serapionis sc.
 ut vult etiam Hieron. in epist. ad Matth. itemque Ar-
 noldus referente Fæbio in Pharm. sect. 7. Caterum si
 Matthiolus vidisset semen Siferis longum, non fo-
 liaceum, non diceret latum, ut in Spondilio: nec pi-
 ctura ejus tale demonstrat: in Epit. melius dicit
 esse Petroselinii modo. Mirum Tragus alioqui dili-
 gentem in descriptionibus dixisse latum: quæ sequi-
 ti fortè Cæsalp. & Dodonæus etiam latum scripsere.

Matth. no-
tatur.

Tam Fuchsius, quam Matthiolus duo Siferis ge-
 nera proposuerunt; sed ut in secundo consentiunt,
 ita in primo dissentiunt. Cum enim Fuchsius pro
 primo exhibet Pastinacam lativam Germanicam,
 Matthiolus Carotam pingit. Descriptio interim, quæ
 subjungit, figuræ Sifaris minimè respondet: ita e-
 nim describit: Sifer habet folia Olusatris, &c. Quæ de-
 scriptio non convenit primo Sifaro, non enim fo-
 lia habet Olusatris, sed Carotæ. Neque etiam se-
 cundo, cuius radices non sunt dodrantes, sed vix
 palmares. Plinij auctoritati de Sifaro si standum sit,
 cum nec Pastinaca Germanica dicta, nec Carota Si-
 fer fuerit, inquit Turnerus. Vtramque enim se gu-
 stasse affirmat, sed nullam unquam in ulla amari-
 tudinem deprehendisse, sive in matrice lignosa, sive
 cortice. In radice hujus Sifari levem quandam ama-
 ritudinem quidem perlesuisse, sed non quantam
 Plinius requirere videatur, ac rior emque quàm ama-
 rior emque quàm amari-
 tudinem deprehendisse, talibusque facultatibus præ-
 ditam, ut certò ausit Sifari genus pronunciare. At
 Pastinacam Germanicam quemadmodum Sifer Pli-
 nij esse non posse contendit, ita se non videre ait,
 cur [hac lego, ut Turnerus inter Sifarum non di-
 stinguat] Sifer Dioscoridis esse nequeat, nisi quid

Fuchsius ex
at Matth. fide
congruitur

impediat ingens dulcedo: siquidem quæ insigniter dulcia sunt appetentiam non excitare, sed proittere consueverunt. Et hæc Turnerus, qui Sisarum Dioscoridis, a Sisaro Plinij differre velle videtur, contra veritatem.

Cordus reprobatum. Turpiori errore, inquit, rad. i. Apollo, Secacul ad veterum Siser revocat Cordus, minus sanè quum Rheni accolis in Germania vulgatissimum sit & hortulanum folio Olulatri. Ex Plinio l. 19. c. 5. Geldubz speciei est Pastinacæ, Gheldrap, sive Poten vocata.

Synonyma. Lacuna exhibens figuram Matthioli, vocat Sisarum alterum, Siseris secundam speciem, & Siser. Dioscoridis.

Sisari imagine exhibetur à Lobelio (qui quondam ambigit, an Heliodi Asphodelus) in Obl. p. 498. in l. c. p. 710. Camer. hort. & Epit. Matth. Gesn. h. Dodgall. & Lat. in foliatæque Tabernamontano. A Camer. in hist. Matth. germ. Siseris alterius titulo. Siseris latini minoris inscriptione à Fuchsi & Turnero. Siseris hortensis à Gesn. de coll. stirpium. Ab H. Lugd. p. 724. Sisari majoris Matthioli. Sisarum hoc hortense Occo, hoc annotante Gesnero, non rectè Sesarum inscripsit.

Anguilla refutatur. Miramitaque subit Anguillaram epist. 7. qua fronte eos errare dicere ausus sit, qui putarunt Sisarum pictum à Fuchsi cum radicibus Asphodeli, esse illud quod proveniebat in Gelduba. Imò annotavit Gesnerus in suo Anguillara hoc verum esse Sisarum.

Siser germanicum. De Siser germanico (ut vocat) hunc in modum scribit Cæsalpinus. Folius constat Pastinacæ, tenuioribus ac minus hirsutis, Sio proximis: flore candido: seminibus latis: radiculis quasi acervatis bulbis, ut in Asphodelo suberosæis, quæ coctæ in cibos veniunt. Puto apud Dioscoridem Elaphobosum vocari, quasi Cervi Pastinacam: nam græcè βίον pascere est: unde Pastinacæ nomen derivatum videtur. In Dioscoridis descriptione flos luteus non convenit Siseri germanico. Sed Siser germanicum non solum colore floris non convenit cum Elaphobosco, sed etiam semine, quod non latum, quod dicit Cæsalpinus, nec Anetho simile, ut tradit Dioscorides, vel Ferula ut Plinius: folia etiam non hirsuta, ut Cæsalpinus, vel aliquantulum aspera, ut annotavit Dioscorides. Patet itaque quam verè dixerit C. Bauhinus cum Elaphobosco Diosc. & Plinij Sisarum hoc multum convenire.

Sisaron lingua. Sisaron autem Græci vocant: Latini pariter Sisarum, vel etiam Siser, aut Silar, & Iac. Manlio auctore Sesarum: posteriores nonnulli Servillum, aut Chervillum, vel Servillam. Arabes, ut Avicenna l. 2. tract. 2. c. 940. Sesarum. alij Culas, Sesarum & Sisarum. Germ. Gierlin/ Gierlen/ Geyerlein/ Gierlin/ Gierlin/ Blin/ gelrublin/ Garten Kapungel/ Jam Kapungel/ Flein/ Morelen/ Blingel/ Möhren/ Gurgele/ Gurgelein & præter ante dictas appellationes Zucker wurzel. Belg. Suysen wortelen & Serissen. Galli. Robertto Stephano referente, Escherus, Chervits, Chervy, & Gyrolex, Matth. Gyrolex, Tabern. Itali sisarum. Flap. Chervias, Chirvias, & Chirimas. Angli Ceyret, Bohemi Nisew.

Sisaron. Sisarum hoc in hortis feritur semine, sed radice potissimum: nam maioribus ac crassioribus sublati, minores iterum in terram desiguntur, quod Martio & Apuli opportunè sit, priusquam caules assurgant: atque hoc tempore exemptæ radiculae coctæ eduntur. Veteres autem & majores radices si quadragesimali tempore non adimantur, corrumpuntur, novæque juxta oculos radícula mense Martio quandoque tota protrudere observavi.

Sisaron. Cordus omnium radicem, quæ vescendo sunt saluberrimam Siseris radicem animat. Sisari autem

radicula Dodonæo moderatè calida sunt ac humida: facile concoquantur, non tardè descendunt: nutriunt mediocriter, nec pravi sunt succi: flatulenti autem quiddam etiam obtinent, venterem promovent. Eduntur coctæ, & quandoque cum aceto, sale, & exiguo oleo, acetarij in modum: quandoque verò in oleo, aut butyro frigida apparantur, & alijs modis. In Suevia, ait Hier. Heroldus, mulieres præparant maritis suis, atque usum norunt. Radicem autem primò decoquant, dein butyro frigunt, pipérque postremò addunt. Cibus est gratus, excitat maritos, promovet urinam, alvumque solvit.

PANACES VETERIBVS & in genere.

CAP. LXIV.

QUOD Græcis Panaces dicitur, ejus à Theophrasto sex species assignantur in universum. Primum Syriacum c. 10. hist. 9. de quo ait. Sunt verò quorundam omnia commoda, & radix, & fructus, & succus, ut Panaxis. Et paulò post: Panaxis quoque pleaque assignantur commoda, nec omnia ad idem fructus, sed ad abortus, & distentiones, & ejusmodi genera dolorum, item ad aures & vocis languorem. Radix ad partus, & mulierum profluvia, & ad jumentorum morbos, necnon ad irinum unguentum utilis, addit enim suavem olentiam, sed fructus radice validior est. Nasitur circa Syriam, secatur per mensem Tritici. Idem c. 12. Panaxis quoque genus multiplex redditur. Panacem enim appellant primam, quæ in Syria nascitur, de qua jam ante retulimus [quæ qualis sit à Theophrasto non exprimitur] secundam Chironiam, tertiam Asclepiam, quartam Herculanam [de Panace Chironio, Asclepio, & Heracleio privatim dicemus ex veteribus] Præter hæc verò & unum Latifolium [πλατύφυλλον] & alterum Tenuifolium [λεπτοφυλλον]. Ex his constat Theophrastum sex Panaxis species in universum assignasse Dioscorides autem trium tantum meminit, Heraclei, Asclepij & Chironij, de quibus suo, ut promissimus, loco scripsimus.

Quamvis autem Theophrastus quale sit Panaces Syriacum, non expresse, attamen Plinius l. 12. c. 26. foliis illud esse refert ampla magnitudine rotundis. Sed suspicatur Dodonæus hæc ex Heraclei Panaxis descriptione translata esse. Idem l. 25. c. 4. Panacetum unum Asclepion cognominat, alterum genus Heracleion vocat ab Hercule inventum: alij Origanum Heracleoticum silvestre, quoniam Origano simile est: Tertium Panaces Chironium, & quartum genus Panaxis ab eodem Chirone repertum, Centaurion cognominatur, sed & Pharnaceum nominat, cujus genera duo secere, alterum levioris folij [crassioris legit Dalech. ταχέως] alterum tenuioris.

Theophrastus itaque sex agnovit Panaxis genera, tria suis nominibus describens, quæ sola etiam Dioscorides delineavit, Chironium, Asclepium, Heracleum, duo nulla recta appellatione tradens πλατύφυλλον & λεπτοφυλλον, & unum Syriacum appellans. Plinius septem genera statuisse deprehenditur, Panaces Syriacum, Asclepion, Heracleion, Chironium, Centaurion, & duplex Pharnaceum.

Gesn. in cat. Plant. Panaces communem esse pluribus herbis nomenclaturam, Centaurio, Ligustico, Tithymalo & Origano Heracleotico testatur; Dioscoridi tamen privatim sic nominari tria solum genera, jam memorata πέναντες ηράκλειον, cujus succus Opponax, ἀσπληνισμός, καὶ χερύδιον, incognitam herbam.

Panax Heracleum Ferula varia. Ex his tribus Panacis generibus, Heracleum tantum, quod meminit Io. Agricola, se vidisse refert Ferrariz in horto Iesuitarum, ex quo Opopanax manet, licet Mesue alterius sit sententiz.

Pinea nuci simililaca Pineæ nuci simili laca Panacis nomenclatura à Canarinis adscribitur.

DE PANACE HERACLIO veterum.

CAP. LXV.

Disse. variè illustratur. **P**ANACEIS Heracleum [vet. inserit, ὁ δὲ ἵταυ λεγάταιναις ὡς δὲ ἡρόδοτος] ex quo Opopanax colligitur, plurimum auctore Dioscoride, nascitur in Bœotia, & in Psophide [vet. ὀψίδη. Plin. Phocidæ] Arcadiæ nascitur, ut etiam de industria in hortis colatur, ob accedentem ex liquore quæstum. Folia habet aspera, ad terram depressa, valde viridia ad *Fici folio.* Fici [vet. margo omne] folia accedentia, per ambitum *Ferula caulibus.* quinque fissuris scissa: caulem ut Ferulæ altissimum, qui lanuginem habet albam [ἵχτη χιτὼ λευκόν. pro quo Ald. ὑπὲρθεον. alias ὑπὲρθεον ἐκτός. al. λυγρόν.] & folia circum se minora [vet. σικκιδότατα.] Umbellam in cacumine [vet. delet. neque habetur apud Orisbal.] qualis Anethi est: florem melinum: semen odoratum & fervens, radices ex uno principio plures albas [vet. inserit ἡ καὶ ὑπὲρθεον] graveolentes, crassum corticem habentes, eumque gustu subamarum. *Succum Opopanace.* Nascitur in Cyrene Libyæ, & in Macedonia. Colligitur succus ex radice incisa, dum recens adhuc germinant caules [fructus vet.] Remittit succum album, qui siccatus in superficie Crocum colore refert. Excipiunt ipsum effluentem substratis foliis in excavatam terram, & siccatum tollunt. Colligunt & ex caule succum incidentes ipsum per messem, & quod defluit similiter excipientes. Ex radicibus meliores sunt, quæ extenter sunt & albæ, aridæ, non corrosæ, & gustu ferventes ac aromaticæ. Semen ex media Ferula idoneum est. Quod enim ex propaginibus prodit macilentum est. Ex succo præstat, qui gustu amarissimus [amarior Onib.] est, intrinsecus quidem albus, & subfulvus [vet. delet.] extrinsecus Crocum referens, lævis, pinguis, friabilis [vet. delet. & qui faciliè diluitur, & graveolet. Nigri & molliis vitiosus [ordines, vet.] est. Adulteratur enim Ammoniaco, aut Cerâ. Experimentum sumitur si digitis conteratur in aqua. Qui enim adulteratus non est, resolvitur & lactescit. Vim habet calefaciendi, emolliendi, attenuandi. Vnde convenit ad febres per circuitum repentes, rigores, convulsa, rupta, laterum dolores, tussis, tormina, urinæ, stillicidia, vesicæ scabiem cum aqua mulsâ, aut vino [vet. caret] potus. Ducit & menses, & sætus enecat, & inflationes in utero ac duritias discutit, cum melle dilutus. Illinitur & ex ipso coxendicum dolor. Miscetur quoque acopis & compositionibus capitalibus. Abrumpit & carbunculos. Et podagricis convenit cum uva passâ impositus. Eximit & dentium dolores cavernis inditus. Visum acuit oculis illitus. Ad picem ammixtus emplastrum est optimum aduersus rabidi canis morsum. Quin & radix rasa ac utero apposita sætus educit. Facit & ad ulcera vetera, & ossa denudata carne obducit, trita, inpersa, & cum melle illita. At semen ipsius, cum Absinthio acceptum, menses ducit. Cum Aristolochia verò aduersus bestias, venenum ejaculantes convenit, & ad uteri strangulationes cum vino bibitur.

Panax Heracleum Theoph. De Panace Heracleo Theoph. lib. 9. hist. ita scribit. Panax Herculeana constat folio magno & amplo, ut quoquo versus tres palmos perficiat, radice crassitudine propè digiti, bifida aut trifida, gustu

subamarâ, odoratu sincerum Thus redolente, utili Radice contra morbum comitiale potâ, coagulo vituli marini admisto, ad quartam partem: & contra tormina è vino dulci: commoda etiam ad vulnera sicca, ex melle ad madidâ.

Panaces, inquit lib. 25. Plinius ipso nomine omnium morborum remedia promittit, numerosum & Diis inventotibus adscriptum. Et mox tria genera, Heracleum sc. Asclepium & Chironium exponens, Asclepio attribuit, quod Dioscorides Heracleo adscripsit. Ejus verba sunt hæc. Vnum quippe Asclepion cognominatur, quoniam is [Asclepius, vet.] filiam Panacem appellavit. Succus est coactus Ferulæ [succus ex eo cogitur, ut & Ferula, vet. Ex inciso Ferulæ caule Sagapenum fieri Dioscorides monstrat lib. 3. Potest etiam lectio retineri, quandoquidem Plin. l. 12. c. 26. Panacem esse Ferulam sui generis tradit, si legamus, appellavit. Opopanax succus est coactus Ferulæ, &c. notando tamen errore Plinij, qui ex Asclepij Panace fieri tradit opopanaxem, cum is fiat ex Heracleo. Dalech.] qualem diximus, radice multi corticis & salis [radicis cortice multo (crasso) & salso, Theoph.] Hac evulsâ scrobem repleti vario genere frugum [placenta mellita ex omni genere frugum. Theoph. c. 9. l. 9.] religio est, ac [ad Vet.] terræ piamentum. Vbi, & quo fieret modo, & quale maximè probaretur, inter peregrina docuimus. Id quod è Macedonia affertur, Bucolicon vocant, armentariis sponte erumpentem succum excipientibus: hoc celerrimè evanescit. Et in aliis autem generibus improbat [probatu? CH. contra veritatem] maximè nigrum ac molle. Id enim argumentum est Cerâ adulterati. Alibi, lib. sc. 13. ita de Panace tradit, nulla appellationum distinctione facta. Panacem & unguentis eadem gignit, nascentem & in Psophide Arcadiæ, circaque Erymanthi fontes, & in Africa, & in Macedonia. Ferula sui generis quinque cubitorum, foliis primò quaternis, mox senis in terra jacentibus, amplâ magnitudine rotundis, in cacumine verò oleagineis, semine in muscariis dependente, ut Ferulæ. Excipitur succus inciso caule messibus, radice in Autumno. Laudatur candor ejus coacti. Sequens pallido statera.

Ex Heracleo autem Panace fieri Opopanaxem refert quoque Galenus, radicibus & caulibus ipsius incisis. Est verò utilissimus Opopanax, calefaciens, & molliens, & discutiens: & posuerit quis ipsum in calefaciendo ordinis tertij, in siccando secundij.

Cæterum, Spondylium majus hodie quidam Panax Heracleum esse crediderunt, quod tamen nos affirmare non ausimus.

Ab aliquibus, ut Trago, Angelica putatur esse Panax Herculeum Dioscoridis, Plinij, & Theophrasti.

Achillæam vocatam fuisse Panacem Herculeon scribit Plinius.

Millefolium Stratiotes nonnullos Panaces Heracleon vocasse refert Ruell. l. 3. c. 92.

Panax Heracleum Anguillaræ, inscribimus nos H. n. g. lib. Geranium sanguineum.

Cornarius licet omnia Panacis genera incognita esse asserat, tamen haberi hodie Opopanaxem notissimum officinis haud negat. De hoc succo igitur posthac nobis agendum erit.

OPOPANAX.

PANACEIS liquor Opopanax est. grumi sunt Pisci circiter magnitudine, aut sabuli crassioris, multo etiam aliquando utroque majores, coloris rufi, foris, qui dissesti intrinsecus ex flavo albescunt, sapo-

re acti & aliquantum amaro, eo ferè qui in Ligustico nostro observatur. Sordidissimæ quoque subinde adferuntur glebæ, caulium festucis & assulis remissis, succo concreto, qui admiscetur, ex ruffo nigricante. Sunt porro mihi à quadraginta ferè annis grumi & lachrymæ majores, quibus remixta suis magna fragmenta, similia Ferularum aut Fœniculi, ligiosis caulibus, fungosa, alba semina oblonga, Ferulæ glaucæ seminibus magnitudine ferè similia, tenuia, & ferulacea, valde striata. Qua magnitudine reperimus, curavimus appingenda Galbaniferæ figuræ Lobelianæ, separatim: non tamen propterea dicimus eadem, sed ibi locavimus, quia nondum nobis constitit, de Opopanacis planta.

*Panaces
Heraclei
in Apulia.*

Matthioli licet Panaces Heracleum [Spondylium majus] in Apulia frequens nasci dicat. Verum non ob id affirmaverit ejus lachrymam, quam officinæ Opopanacum vocant, excipi in Italia. Nam quam Venetus reperiri scribit, ex Alexandria Egypti convehi refert. Legitima porro, sic ipse narrat, non desit, etsi adulteratæ frequentior sit usus. *Οποπανάξ* gummi, vocatur Lat. Opopanax, Ital. Opopanaco, Hisp. Opopanaque. Anguillara verò epist. 12. vocat *Rampa d'orso*, dubitatque meriti an sit Panax Heracleoticum, siquidem odore non convenit cum Opopanace, quod hodie affertur.

*Opopanax.
Rampa
d'orso.*

*Panax He-
racleum
Matthioli
fert Opo-
panacem.
Cordus la-
psus.*

Panax autem Heracleum [Spondylium majus] non proferre Opopanacem, sed Panax Siculum, quamvis parum, testis est apud Matthiolum Camerarius in Historia ejus germanica. Labitur itaque Cordus, qui ex Panace Herculeo, quod in Italia feri audit, radice incisâ, liquorem manare perhibet, qui Opopanax & Opopanacum vocetur, cuiusque frequens usus sit in Medicina. Nec scio quomodo possit demonstrari ex Spondylia majore parari Opopanacum, id quod somniat etiam C. Bauhinus.

*Panax flo-
re candido
ex semine
candido
hirsuto.
Mesues mo-
tatur.*

Panaci (inquit Cæsalp. lib. 7. cap. 53.) ex Sicilia flore candido, semine candidâ lanugine hirsuto, magis congruit Panax Herculeum: ex quo Opopanax fuit radice incisa. Habemus Opopanacem inter merces externas, quem Mesues inter medicamenta purgantia ponit, at plantæ figuram aliter tradit, ut Aldepius Plinij & Theophrasti videatur intelligere.

*Turquet.
repreh.*

Videtur inscienter liquores cum gummi confuisse Turquetus, qui Opopanacem inter gummi recenseret, cum nomen ipsum inter liquores referendum esse demonstret.

*Vires.
Error quo-
rundam.*

Mesues tandem scribit Opopanacum, hoc habere peculiare, quod concitet situm, longè ergo aberrant à suo proposito, qui ubi sitis urget, id præcipiunt. Panacis Heraclei defectu optimi chirurgi, cum denudata ossa carne explere volunt, radicum segmenta, quæ lachrymæ compacta reperiuntur, seligunt, & ad hunc usum in pulverem redigunt.

*Ossa denu-
data.*

SAGAPENV M VETERVM

C A P. LXVI.

*Locum.
Delebitus.*

Vires.

SAGAPENV M succus est herbæ ferulacæ in Media nascentis. Præstat ex ipso quod pellucidum est, extrinsecus fulvum, intus album, odorem inter Silphij succum & Galbanum medium habens, acri sapore. Facit ad thoracis & lateris dolorem, rupta, convulsa, tussis veteres. Crassa in pulmone hærentia repurgat Datur & comitialibus, opisthotonicis, splenicis, paraliticis, perfrigeratis, in febribus per circuitum repetitis in potu. Sed & in urgentis commodè adhibetur. Ducit & mentes, & ferius corrumpt cum aqua nulla potum. Auxiliatur com-

moris à bestiis venenatis cum vino sumptum. Excitat eas, quæ ab utero strangulantur, si cum aceto ipsam olfaciant. Deterit cicatrices oculorum, & visus hebetudinem & quæ pupillis tenebras offundunt & suffusiones. Resolvitur ut Silphij succus, ruta & aqua, & amygdalis amaris, aut melle, aut pane calido.

Inter Sacopenium & Sagapenum Plinius distincti-
onem facit, ita l. 20. c. 18. de ipsis loquens. Sacope-
nium quod apud nos gignitur, in totum transmarino alienatur. Illud enim Ammoniæ lacrimæ simile Sagapenum vocatur. Et subdit mox medicum usum, partim ut Dioscorides habet. Prodest laterum & pe-
toris doloribus, convulsis, tussibus veteribus, ex-
creationibusque, præcordiorum tumoribus. Sanat
& vertigines, tremulos, opisthotonicos, lienes, lum-
bos, perfrictiones. Datur & olfaciendum ex aceto in strangulatu vulvæ. Cæteris & potu datur, & cum oleo infricatur. Prodest & contra mala medicamen-
ta. Iuxta hanc itaque distinctionem, videtur etiam lib. 19. cap. 18. Sacopenium legendum esse, non Sagapenum, ubi ait, Sagapenum & ipsum in hortis quidem nascitur, sed Medicinæ tantum.

*Sagapenu
distingui-
tur a Saco-
penio.*

*Vires ex
Plinio.*

Galenus stirpem ipsam Ferulæ similem, Sagapenum primariò vocari dicit. Abusivè verò ipsius succum quem rectius esset, non Sagapenum, sed Sagapeni succum dicere. Addit idem eam stirpem debilem & inutilem esse: Succum autem calidum & tenuium partium, sicut alios succos. Idem lib. 1. de an-
tid. Sagapenum probari dicit, si aquâ, aut vino tige-
tur. Quod enim verum est, dissolvi non liquecente eo, quod tale non est. Non autem referre sive quis Sagapenum simpliciter, sive Sagapenu succum no-
minet. Esse enim revera cujusdam Ferulæ succum, quæ Panaci similis sit. Cornarius adhuc hodie no-
tum esse ait officinis, sed corruptè Serapinum vocari. Hoc itaque notis suis sic delineamus.

*Ferula si-
milis sup-
er Galeno.*

*Sagapeni
Vires nota.*

*Sagapenu
succus*

*Serapinum
officinarium
Cornario.*

SAGAPENV M.

SAGAPENV M gnttis constat magnis, veluti Thuis mammosi, aut masculi (interdum in glebas deseri-
magis coactum) Opopanacis modo, rufescentibus, intrus corneo quodammodo colore præditis, sub dente, vel etiam digito, lentescuntibus albescen-
tibusque, mordaci, acriusque sapore, odore viroso, candelæ, ad motus flammam concipientibus. assulæ rariùs in massa inventæ, substantiâ fungosâ, albâ, foris purpurascente, rariùs adhuc caulibus ipsius por-
tiones juxta, digitalis crassitudinis, striatæ, fibris longis contextæ, quarum spatia opplet fungosa, laxaq; substantia. semen quoque gemellum, Ferulaceo par, semenciâ longius, semenciam ferè latum. impu-
rioris sunt glebæ, quarum vix grumos inter noscas, ita omnes sunt concretæ veluti fusæ, colore sordido, sapore & odore simili.

Valdè inscienter Turquetus Sagapenum, quod Turquetus non gummi, sed liquor Ferulacæ fruticis est, cum gummiis confundit.

Herba Costa, autore Cæsalpino, indicatur à quibusdam non immeritò Ferulæ genus esse, quod Sagapenum fert de quo Diosc. Mesues & cæteri Arabes paulò ante verba fecerunt.

SPHONDYLIO, VEL POTIVS

Pastinacæ Germanicæ affinis Panax,
live Pseudo-Costus flo-
re luteo.

PVLCHRE in Montbelgarden si viridatio viget, Deser.
foliis sesquicubitalis longitudinis, latitudinis cubitalis, asperis, hirsutis, atro viridibus cum nitore quodam, in alas divisis ex adverso litas, easque fur-



Semina.

bus paria compressa, lata, fibrariam albam habentia, cum in medio nigricent, acia & linguas mordicantia.

Impostura.

Non defuisse jam olim Matthioli temporibus impostores, qui ex Gargano Apuliz monte quotannis ad Senenses advexerint Pseudocosti hujus radices, amari saporis, quæ facie quadantenus Rhodiam radicem repræsentarint, ipsemet passim suis in comm. conquestus est & contestatus. Hæc, inquit, pro legitimo Costo vendunt nostratibus pharmacopœis, is præsertim, qui in rei herbariæ cognitionem negligentius incumbunt. Plantam nos habere, atque etiam depingi curavimus (ea enim alioqui non est vulgaris judicanda) ut ex ejus imagine discant imperiti, cujus plantæ sint radices ritz. Hinc fortassis fiet, ut si illi imposturam hanc omnibus cognitam esse intelligent, eam deliniant posthac facere. His addit in post. comm. cum mag. fig. Lat. & Ital. Pseudocosti radicem vegetam, esse crasso cortice, carnosoque vestitam, colore cinereo splendente. In hist. etiam Germ. cum addit. Camerarij Pseudocosti nomine, ut & in Epit. ejusdem, pingitur ac describitur, cognominaturque Costus vulgaris, officinis Costus, sed perperam: Ital. *Costo bastardo & Costo di Puglia*. Olim autem Matthiolus nullam habebat descriptionem, sed figuram duntaxat, ad hanc fortè plantam factam: non placet in versione germanica folia dici den gelben Ruben similia, h.e. Carotæ luteæ, sive Pastinacæ Græcorum luteæ salutaris, cum quâ nulla similitudo ejusmodi sit.

Pseudocostus.

Costus vulgaris offic. Alacch notatur.

Panace species Dodonæ. Panaces peregrinum.

Dodonæus in fine, sive Epilogo libri de floribus pro Panace specie hanc pingit: In fol. lat. pro Panace peregrino, quod ubique describit, ac præterea dicit. Ex hujus vulnerato, præsertim circa radicem, quæ longa & candida est, caule, succus æstivis mensibus manat, sponte concreescens, Opopanaci colore similis, odoris quidem exigui sed gustu exalfaciens. Non modò aut in Italiz, aut aliarum calidarum regionum hortis, ubi quandoque sentur, succus è vulnerato caule exit, verum & in Belgio observatum est, Æstate fervida hujusmodi quoque lachrymam incito seapo effluxisse. Atque hic quidem succus Panaces genus hanc stupem esse evidenter ostendit: Quod & semen confirmat in Panace lachryma reperiunt, ex quo Petro Coudenbergio pharmacopœo Antuerpiensi hæc primùm in Belgio enata stirps est: Cum autem Panace multa existant genera, quodnam ex his sit considerandum occurrunt.

Panaces genus concluditur.

Tom. III.

Non autem Heradium Panaces, nec similiter Aële-
pion esse satis patet, relinquatur ergo, ut vel Chironium, vel Syriacum sit. Chironium autem Panaces folium habet Amaraco simile, florem aureum, radicem tenuem, non altè descendantem, gustu acrem, ut quidem Dioscorides. Cum quo & Apulejus convenit: Panaces chironium, ait, folia habet Amaraco similia, flores aurolos, radicem tenuem, non altam, acerrimam. Theophrasti verò descriptio ab horum multum differens est. Chironium, inquit, folium habet simile Lapatho, majus ac densius, sive hirsutius, *ἰσχυρότερον*: flores verò auricolores: radicem longam: amat loca pinguis, *καὶ ῥιπία*. Eadem & Plinius lib. 25. cap. 4. nisi quodd radicem non longam, sed parvam tradat, facili lapsu ex *μακράν* in *μικράν*. Tet. p. 101. tium, ait, Panaces Chironium cognominatur ab inventore. Folium ejus Lapatho simile, majus tamen ac hirsutius: flos aureus, radix parva nascitur pinguibus locis. Nicandri interpretes verba Theophrasti de Chironio adferens, non Lapatho, sed Amaraco simile tradit. Chironium, ait, simile Amaraco, majus tamen ac hirsutius: flos aurei coloris: radix longa, loca maximè amat aquosa. Ex his cognoscere est, veterum auctorum loca quadam esse corrupta, veluti Plinij & interpretis Nicandri: Deinde duo esse Chironia, n-
num folio Amaraci; alterum Lapathi. Prius Panaces humilis ac tenuifolia stirps est. Amaracus siquidem (cui simile esse scribitur) herba est ramosa, per terram serpens; folia habens hirsuta, ac rotunda, tenuifolia Calaminthes æmula, valdè odorata quæ coronis adduntur, ut Dioscorides sub sampluchi nomine describens, testatur. Theph. l. 7. Amaracum inter urbana coronaria reponit, quæ lignosa, tenuifolia, & ideo ad suffruticium naturam accedunt. Alterum verò, quod folia habet Lapathi, majora ac hirsutiora non temerè Helenium esse videtur: Apuleio enim auctore, Panaces Chironium Inula campana quoque appellatur. Nec refert quod Dioscoridis adferens descriptionem folio ipsum esse tradiderit Amaraci. Non animadvertisse enim potuit aliter à Theophrasto, quàm à Dioscoride describi; ut multa valdè oscitanter à multis veterum, & observata & posteritati commendata, atque ab ipso Apuleio, sunt. Cum neutro autem horum, Panaces hoc peregrinum convenit, neque enim tenuifolio suffrutici Amaraco simile est, nec folium habet Lapathi majus; sed si particularia segmenta considerentur, multò minora. Iam & vulneratum æstivis mensibus (ut dictum) lachrymam istud effundit, qualem à Chironio Panace profluere, à nullo veterum memoriæ proditum reperitur. Ex quibus sanè constat peregrinum hoc Panaces, non esse Chironium, & iidem de causis Syriacum illud esse, unde Opopanax colligitur, vel maximè apparet: Nullius enim alterius, præter enumerata, apud veteres memoria extat. Effluere autem ex Syriaco lachrymam Plinius lib. 12. cap. 26. apertè scribit: Theophrastus verò innuit, dum per messem, ipsum secari (succum videlicet colligendi gratia) refert. Quodd autem succus hujus peregrini Panace in Belgio, eo qui in officinis reperitur, minùs odore aut sapore præstet, regionis frigidas in causa est: In calidis etenim regionibus omnia odorata & fortiora; in frigidis verò minùs odorata, ac viribus imbecilliora gignuntur. Hæc in longum Dodonæus, cujus figura & Lobelij, satis exprimit nostram plantam, si folia non essent ita acuta & serraturæ adessent, & non nimum Lapatho similia, saltem si eandem plantam, quam nos intelli-
git

Emulacrum Panace.

Chironium Panace non est.

Panace Syriacum est.

Icon Dodonæi.

Panax al- Lob. adv. p. 312. vocat Panacem alterâ recentiorum
tera Lobe- Olusatrâ aut Pastinacæ facie, de qua ait. Veneto-
li. rum quidam peritiores, etiâque Leo ille circula-
Deser. tor, alebant & ostentabant quandam Panacis spe-
ciem, ferulaceo caule, binâ & ternâ & quater-
nâ cubitorum, multos in ramulos supernè diviso,
ferulaceis autem folijs, squabris, asperiorib. in sin-
gulis petiolis, singulis prodeuntibus, amplis, tharsi
instar plumatimque ex intervallis æquis, positu
Pastinacæ, & folijs constantem multis in uno petio-
lo, oblongo, Africani fermè floris: floribus luteolis
aut pallentibus, in umbellis Pastinacæ aut Bauciæ,
quam etiam assimilât tota planta hirsutæ incanâ,
radice longiore, albida, nec ita dissimili. In Venetis
& Flandriæ hortis hanc meminit Lobelius se de-
gustasse gustu aromatico, calfaciente & digerente,
gummeo, opopanaceum succum redolente: quare
putavit hanc, ut si quam aliam, Panacem legiti-
mam. Senensis [Matthioli] porro in post. comm.
plantam hanc insertam, Costi nomine ipsique sæ-
pius ab Herbarijs Illyricis ostensam, quia nihil Co-
sto dignum habet, sed potius facie Elaphobosci
Costi sp-
Costi est, illuc rejiciendam censet Costum hunc spurium
Costi Matthioli. In obs. pingit p. 400. Panacis alterius
Costi titulo, ibique Costi hujus spurij Matthioli varietate
Costi m assignat folio rotundiore, hirsutiore, breviorè,
Costi Pastinacæ vulgari, sive Elaphobosci, odore potio-
Costi re. Idem Lob. in Icon. p. 701. appellat Panacem
Costi alteram recentiorum, Olusatrâ, aut Pastinacæ
Costi folio. Et nos in hac planta varietatem quidem
Costi observavimus non parvam. Vere namque quan-
Costi do provenit folia habet talia, qualia in Costo de-
Costi scribit Lobelius, sed postea mutat.

Herba Co- Herba Costa vulgò appellatur, auctore Cæsal-
Herba pina, quia radices pro Costo in usum venerunt: so-
Costa lia sunt ab radice humi strata, initio lævia, sed pro-
Costa cedente tempore horrescunt: caules fert bicubita-
Costa les, pallescentes, hirsutos unde emanat lachryma,
Costa aurei coloris, odorata, acris. flores lutei, radices cras-
Costa situdine baculi in diversas partes tendentes, nervo-
Costa sas, exterius subrufas, gustu fervente. Iudicatur à qui-
Costa busdam non immeritò Ferulæ genus esse, quod Sa-
Costa gapenum fert, de quo ante ex veteribus abundè sa-
Costa tis diximus.

Panax Panax Chironium Dodonzi, Lugd. p. 741. &
Panax Pseudocostus Matthioli, p. 758. unam eandemque
Panax æstimamus plantam. Neque duas sequentes Ta-
Panax bernæmontani stirpes separamus, donec nobis
Panax melius constet, qua in re differant. De Panace
Panax Herculeo 1. quod Panax murgesii aut Seylfraut
Panax vocat, veteres nihil scripsisse ait, videri tamen,
Panax sibi potissimum, Opopanacum confici ex hac plan-
Panax ta: eam peritos Medicos & se recepisse pro pana-
Panax ce Herculeo: habere enim succum gravis odoris,
Panax ut Opopanacum: coluisse in horto Philippum Ste-
Panax phanum Sprengerum, ex qua curarit depingen-
Panax dum: vulgarem alioqui esse in Belgicis hor-
Panax tis. Alteram, Panaces Costinum nominat, Costen
Panax Seylburgi, affirmatque hujus radicem falsè pro
Panax Costo vero vendi, cum quo nihil habeat commune:
Panax Herbarijs Costum Illyricum & Costum adulteri-
Panax num dici.

Panax He- Gerardo dicitur Panax Heracleum majus, Her-
Panax culæ great woondwort. Bauh. phyt. & pin. Pa-
Panax nax 1. (quasi πᾶσι ἴσως, omnibus remedium adfe-
Panax rens) Pastinacæ folio, an Syriacum Theoph. Saga-
Panax penum existimatum, Gesn. h. Panaces peregrin-
Panax um, Dod. Panax altera recentiorum Olusatrâ
Panax aut Pastinacæ folio, Ad. Lob. Panax Chironium,
Panax Lugd. Herculeum 2. Tab. Herculeum majus,
Panax Ger. An Panacis Heraclei alterum genus, Cæsalp.
Panax Sagapenum Diosc. Item, Eid. Panax 2. costinum:

Costus, Matth. Lon. vulgaris, Cam. ep. Costus
(spurius Matthioli), Lob. obs. & Cam. Pseudocostus,
Matth. Lugd. Herba costa, Cæsalp. Panax chironium
Theoph. Cam. Panaces costinum & costus Illyri-
cus, Tab. Vnam enim non duas credimus plantas.
Panacis Heraclei genus alterum Cæsalp. huc non re-
ferimus, sed mox seorsim tradimus.

An Gesn. hort. Panaces Heracleum, purcherri-
ma planta, Ollingero, Kreichio, Coudenbergio: ex
eo colligitur Opopanax dictus succus pharmacopo-
lis. Vidit hoc aliquando in Italix hortis, aliqua cum
Spondylia similitudine, uti narrat. An Cordo in
Diosc. Panaces Herculeum, in Italia à quibusdam o-
stentationis gratia feri solitum?

Montbelgardi in horto E. C. ex semine natum
pertulit ab aliquot annis Hiemem & semen tulit,
folia producentis Martij principio, flores Junio, se-
menque maturans Julio, semen tamen suspicor
non proliferum futurum, videtur enim medullâ de-
stitui.

Excalfacit & siccât ordine secundo completo, au-
thore Matthiolo. Apert, abstergit, incidit, atte-
nuat. Amara est & acris. Præstant (ut referunt, qui
comportant) Pseudocosti radices ad omnes ce-
rebrî, & nervorum frigidos affectus, ad pectoris vi-
tia, & ad ventriculi cruciatus, & viscerum om-
nium obstructions, & ad renum, vesicæ, & uteri
morbos. Ideoque auxiliantur diutino capitis do-
lore affectis, vertiginosis comitialibus, stupidis, ve-
ternosis, convulsis, resolutis, asthmaticis, tussienti-
bus, ictericis & hydropicis. Eadem status pel-
lunt, vermes necant, urinam ducunt, calculos pel-
lunt, menses & partus cient. Infunduntur earun-
dem decocta ad colicruciatus & coxendicum af-
fectus.

PANAX SICVLVM SEMINE hirsuto, folijs Pastinacæ sativæ.

PANACIS Herculei alterum genus ex Sicilia
ad nos (inquit Cæsalp. lib. 7. cap. 53.) tranflatum,
folijs constat in terra stratis, initio quasi Pastinacæ
sativæ, lævibus, sed procedente tempore in vastam
amplitudinem dilatantur, simul & asperitatem in-
duunt, segmentis amplis, se tangentibus, ut unicum
solum integrum figurâ cruciformi ad amplitudinem
cubitalem accedat; vere caulem attollit, anno se-
cundo aut tertio, bicubitalem, rubentem, lævem,
in quo lachryma concrevit colore flavo, idem
procedente tempore subhirsutus redditur: umbel-
læ insident amplæ: flore candido: semine crasso
& oblongo, candidâ lanugine hirsuto: radix
non magna, candida, quæ perfectò semine exa-
rescit.

Dioscoridis descriptio huic magis congruit, quàm
Spondylia majori, quæ quibusdam Panax hercu-
leum dicitur.

SPONDYLIVM EX VETE- ribus & in genere.

CAP. LXVII.

SPONDYLIVM [spondylium] ex Dioscoridis
sententia, folia quidem habet Platano [πλάτανος]
vulgatam autem hanc lectionem veram esse, ex
Plinio facillè intelligi potest, Goup. tamen vet.
quidam ad marginem *μαρτυρο* legit, sed perpe-
ram.] quadantenus similia, ad Panacis foliorum fi-
guram

guram accedentia : caules verò cubitali altitudine, aut etiam amplius assurgentes, sceniculaceos, semen in cacumine Sefeli simile, duplex, verum latius, candidius, & magis acerosum sive palaceum, gravis odoris: flores albos (Ruell. addit, aut pallentes) radicem nitidam candidam, Raphani similitudine. Nascitur in palustribus & aquosis. Semen ipsius [calidè, Ald.] potum pituitosa per alvum excernit, ac medetur etiam hepaticis, ictericis, orthopnoicis, comitialibus & vulvæ strangulatiui. Profundiore verò somno captos suscitum revocat. Ex oleo commodè irrigatur in capita phreneticorum, lethargicorum, itemque caput dolentium. Cohibet & herpes cum Ruta adhibitum. Radix autem regio morbo laborantibus ex hepaticis exhibetur. Circumrassa eadem & indita fistularum callos exedit. Recentis verò floris succus, exulceratis purulentisque auribus accommodatur. Ceterum, reliquorum etiam succorum modo insolatus ad usum reconditur.

Spondylium Plinius l. 13. c. 26. ubi de Panace, Ferula sui generis egit, inquit. Ab hac Ferula differt, quæ vocatur Spondylium, folijs tantum, quia sunt minor, & Platanì divisura. Non nisi in opacis gignitur. Semen eodem nomine Silis speciem habet. Idem l. 24. c. 6. usum medicum Spondylii, planè juxta Dioscoridem præscribit. Spondylium, ait, unà demonstratum, infunditur capitibus phreneticorum, & lethargicorum: item capitis doloribus longis. Cum oleo vetere bibitur, & in jocinerum vitijs, morbo regio, comitialibus, orthopnoicis, vulvarum strangulatione: quibus & suscitum prodest. Alvum mollit. Illinitur ulceribus serpentibus cum ruta. Flos auribus purulentis efficaciter infunditur. Sed succus, cum exprimitur, integendus est, quoniam mure appetitur à muscis & similibus. Radix derafa & in fistulas conjecta, calum earum erodit. Auribus quoque instillatur cum succo. Datur & ipsa contra morbum regium, & jocinoris vitio & vulvarum. Capillos crispas facit peruncto capite. Nec plura Plinius.

Galenì juxta traditionem, Spondylii semen acrem & siccandi vim habet: Quare ad anhelationem, & morbum comitalem, bonum est medicamentum. Prodest etiam morbo regio. Sed & radix similem vim habens in iisdem convenit. Infusperque callos ex fistulis aufert. Verum derafam indere oportet. Sed & floris succus reponitur, ad diuturna aurium ulcera.

Nomenclatura varia. Σπονδυλος sive σπονδυλος, & σπονδυλον, sunt qui Araneum, qui Phalangium, qui Asterion, qui Spondylida, qui Chordanon, qui Oenanthem vocent. Egyptij Apsapher, Magi Osyrida, Romani Herbam rutinalem dicunt. In animalium autem dorso, Spondylos Græci primum, privatimque in homine viginti quatuor vertebrae, quibus tota eorum spina constat, appellaverunt, inquit Marcellus. Quarum septem in cervice numerantur. Scapulares duodecim sunt. Lumbares verò quinque: omnes, uti dictum, viginti quatuor, quas sacrum excipit, quod ex spondylis simul concretis constare videtur. Quo nomine non tantum os hoc ex concretis simul quasi Spondylis constans, appellatur, sed quod utrinque illi connotum est, latum & grande. Spondylorum huiusmodi, quos latini vertebrae dicunt, nota omnibus forma est, tereti structurâ per media foramina à cerebro descendente medulla. Ab eorum figura & similitudine iudem Græci in muliebri lanificio & opere Spondylos vocaverunt pondera, quibus mulieres in ducendo ex colo in filum li-

no aut vellere aliquo fusos suos tam diu libranti, donec multo filo graves alterius ponderis ope, ut ad rectos angulos descendant; non indigent. Ab his rursus ad plura translatum nomen hoc est, quæ brevitatis causa relinquimus, & à quotidiano notæ rei spectaculo multarum rerum descripta, signatæque forma & eventus est. Quod evenisse & factum ab antiquis in Spondylio hoc credimus, cujus semen Dioscorides Sefelis semini simile dixit, quod in Peloponnesiaco Sefeli latius ceteris & carnosius describitur, mox *Arachne*, quod non est simpliciter duplex, sed latum & grande. Id enim in Græcis ea vox aliquando significat: quemadmodum in Latinis Maro etiam dixit in Georgicis suis.

-----duplici aperitur dentalis dorso.

Nec multò post: duplex per lumbos agitur spina.

Vbiq; enim ea vox latum & grande significat. Quod ad Spondylos manifestè pertinet, multoque certius, quod Dioscorides ait, Sphondylium hoc à quibusdam Arachnen, Phalangium & Asterion vocari. Sunt enim in Phalangiorum genere decem ab antiquis privatim suis nominibus numerata. Inter quæ etiam est, quod acino uvæ simile vocatur. Descripsitque id Nicander in Theriac. in media alvo ex inferiore parte os habere. versiculus ejus est.

Ταρίξ δὲν μεσότην αὐτοῦ ἰσχυρὸν ὀδόντι.

Quod est, ut Plinius de eodem agens lib. 29. cap. 3 ait, Ore minimo sub alvo. Quæ acini rotunditas in ea, & in media alvo minimum os quasi pervium foramen muliebri vertit, illi formam effingit. Eamque ob causam Arachne, Phalangium & Asterium vocatur. Totius enim generis prima illa duo nomina sunt: Asterium verò ex eodem genere ab eodem Nicandro privatim descriptum. *Arachne* δὲν ἄλλο περιέχει, &c. Dictumque ab eo hoc est habere in tergo pingue quoddam splendens, discurrentesque in eo lineas quasdam fulgentes: à quorum non omnium similitudine, sed à priore illo quod acino uvæ Dioscorides semen primum, mox ex semine plantam, Araneum, Phalangium & Asterium Spondylium herbam vocari ait. Nec obstat quod aliis & non *Arachne* illi comparaverit. Ab imperitis enim, & qui tantum in genere araneorum id esse scirent additæ appellationes hæc fuerunt. Ex quibus non suspicari tantum, sed ratiocinari licet non aliunde plantam hanc Spondylium, quam à Spondylorum in spina & phalangij illius forma dictam fuisse. Siquidem rotunditate duo hæc similia inter se sunt, & ambo pervium concavitatem habent, quæ muliebrium furorum verticillis similia etiam sint. Eodem pertinet, & quæ sceminino genere Spondylas sequitur. Ceteræ appellationes incertam, Marcello referente, habent significationem: nec Græcæ magis, quam Latine, ob quam causam nihil ultra de eis dicitur. Reliquum autem est, ut quibus plantis Spondylii, sive Spondylii nomen adscribatur, annotemus.

Spondylii igitur, sive Spondylii nomine sequentes donantur plantæ.

Branca urfina Germanica à plerisque & sere omnibus censetur Spondylium veterum, de quo mox.

Spondylium etiam dicitur præcedenti similis, alijs Panax Heracleum, de quo postea sub Sphondylio majore, sive Panace Heracleo.

Spondylium crispum, & aliud alpinum parvum C. Bauhini.

Spondylium aliud alpinum glabrum.

Spondylii quorundam sive Branca urfina
Spondylii maxime sive Panax Heracleo
Spondylii crispum
Spondylii glabrum

Spondylia Spondylia affinis Panax quibusdam, de quo jam ante diximus.

affinis Panax. Quidam, ut Gerardus, qui pro Spondylia posuit iconem Elaphobosci erratici, vocant Pastinacam Germanicam silvestrem Spondylium. de hac dictum ante.

Angelica. Non defuerunt, nec defunt adhuc hodie, qui Angelicam Spondylium existimant.

Imperatoria. Spondylium quidam putarunt Astrantiam vulgò dictam, de qua antè titulo Imperatoriae.

Scolymi caprea. Spondyli & Sphondyli sunt capita Scolymi de quibus H.n.g.lib.

acer. Apud Galenum lib.8.med.par.pro *spondyliu* [Aceris] putat Cornarius fortè substituendam vocem *spondyliu*.

Plures Spondylii significationes, paulò antè ex Marcello hic adduximus.

SPONDYLIVM QVIBVS-

dam, sive Branca ursina Germanica.

Spondylium caulem profert rectum, cubitalem & bicubitalem, striatum, hisurum, geniculatum, intus concavum: folia Acanthi, altius plerumque laciniosa, & ex pluribus foliis singularibus, in alam digestis, costæ adhærescentibus composita, tam pronà, quàm supinà parte, tenera lanugine oblecta, sapore dulci: flores umbellæ lationis orbem circinant: candidi, minimùm odorati, quorum singulares flosculi, quinque cordatis foliolis cōstant, hosce semen excipit geminum, oblongum, sapore acriusculo. radicem verò demittit altè actam, crassam, rugosam, carne albà, succum remittentem subcroceum, fervido & subama-

GVAR.

Deser.



ro sapore, linguam vellicantem.

Mathioli ait semen Selseli non ab simile, latius tamen squammosum, sapore in jucundo, ut quod cimices semine respiciat: radicem gustu non ingrato.

Cordus in Diosc. l.3. c.19. testatur hanc vulgò vocari in Germania Brancam ursinam: à Nicandro & Plinio Bupleuron, & à veteribus Græcis etiam Bupleuron. Capite verò 55. Italos quosdam Panaces Herculeum esse putare, nobis quæ Germanis semen ejus, seu rei exoticæ mittere, cum tamen apud nos nihil hac vulgari Branca ursina ex ferulaceis herbis inveniatur. Item cap. 56. ait Spondylium Latinos verticillarem vocare, hodie autem ignotam plantam esse. Ruellium tamen eam cognovisse, dixisse quæ à Gallis Panacem silvestrem appellari. Sed annotavit quidam apud Cordum, Ruellium procul dubio, seu de hac herba, quam multi imperiti apud Germanos Brancam ursinam falsò vocent.

Branca ur Tragus l.n.c.145. Brancam ursinam inscribit, *sua l.rago.* ait quæ Germanos non abs re ita dicere, cum foliorum formà, quæ grandis habet, aspera, nigricantia,

& dissecta, anterioribus urforum pedibus satis respondeat. Re ipsa autem Pastinacæ genus aliquod mihi videretur (mox subjungit) nisi in præsentia Olusatrum (quod apud Dioscoridem Græcon, Apium agreste, & apud Columellam Smirnon: Theophrasto verò *ἰπποσίλων*, h.e. Equapium, Germ. Grosse Eppich aut Noß Eppich cognominatur) vocare liberet. Hic verò clamabunt adversum me lac. Manlius & Match. Sylvaticus, dicent quæ Olusatrum, aut ut ipsi loquuntur, olusatrum esse Petroselinum Macedonicum & Alexandrinum, id quod lubens illis concesserim. Siquidem Petroselinum Alexandrinum à nostra Branca ursina haud multum differt. Quam ob rem Brancam nostram ursinam modo Olusatrum, Hipposelinum Germanicum, aut saltè Pastinacam erraticam nuncupabimus. Idem cap. 146. Branca ursina nihil aliud est, quàm erratica Pastinacæ & Apiorum maximum genus: Pharmacopœi Germanici vocant Bauciam. Hæc Tragi mens est. Sed is apertè hallucinari deprehenditur. Nec enim ullam nomenclaturam ex veteribus, ab eò plantæ, de qua hic agimus, attributam quemquam intelligentem, veritatisque studiosum, approbaturum speramus, quod nulla conveniat.

Spondylii semine uti quosdam Selseli vice, quod alterum alterius effectus præstare existiment, refert Mathioli. Ipse porro Fuchius meritò non videtur Sphondylium novisse, quod ipsum una cum Acantho depingat, vocetque in hist. Acanthum germanicam, in Icon. Acanthum vulgare. Huic autem facillè imposuisse officinas Germaniæ, quæ foliorum similitudine deceptæ, pro Branca ursina Sphondylium usurpant.

Apollo rad. 10. supra Martiaton scribit Manardum lib. 18. epist. 4. Brancam ursinam à Galeno 6. simpl. Bunion & Arction, nunc Arcticum, vocari putare, in quem errorem quomodo delapsus sit, vix sibi fidere posse, ut quod Sphondylium aliquod silvestre pro Branca ursina à Germanicis officinis usurpetur.

Dodon. gall. inscribit Brancam ursinam germanicam gall. *Branche ursine bastarde*, Pseudoacanthum, ait quæ hodie existimari esse *spondyliu* Græcorum. Lat in fol. non amplius existimat, sed appellat ac facit *σπώνδυλον*, seu ut in Galeni exemplari legi ait, *σπώνδυλον*. Germaniæ autem ac Belgij Officinas taxat, quod Brancam ursinam olim (quod ipse in Hist. gall. fecit) appellarint, & pro Acantho in decoctis ad enemata temerè acceperint: atque inde perperam Germani Berens clauvi Brabantii Beerendclauw & Galli *Brance ursine* vocarint. Extare hujus inter spurias voces, hæc ejus nomina *Αράχνη*, *καλαχνη*, *νίσυρος*, *σπώνδυλος*, *χρόδος*, *ακανθ*, *ακανθ*, Herba rutinalis. Et sic etiam appellat Carol. Steph. in horto, qui cum Angulara testatur Spondylium, sive Sphondylium, visam esse Panacem, aut ejus speciem.

A Lobel. in Adv. appellatur Spondylium, Germanis falsò Acanthum. Nulli, inquit, non regioni sponte oritur, & pro Spondylia etiam vulgò noscitur: siquidem præter odoris gravitatem, à qua propter virorem, Spondylium, qui iudem sætet & radici similis est, dicta videtur: etiam nulla prorsum deest nota, aut adversatur descriptioni. Universe nonnihil sætidi olet: & ab Acantho vero non modò viribus, sed etiam toto genere differt: nec enim spinosa uspiam: aut perinde emolliens est. In Obs. pag. 401. in Icon. p. 75. vocatur Spondylium, Acanthus germ. Fuchij. Acanthum autem Germanicum Fuchij non esse

Acanthum

Olus atrum
Græcon.
Apium a-
greste.
Smirnon.
Hipposeli-
um.

Hipposel.
germ.
Pastinaca
erratica.

Apium ma-
cedonicum
Baucia.
Tragus re-
prehenditur.

Spondyliu
Match.

Fuchius nota.
u-car.

Bunion.
Arction.
Manardi
error.

Branca ur.
sina germ.
Dod. gall.
Pseudoaca-
thum.
Spondyliu
Dod. Lat.
Officin.
la-
psim.


Appellat.
spurra.
Rutinalis
herba
Panax.

Falsò Aca-
anthum.

Spondyli
infestis ge-
nam gravi
odori.
Ab Acantho
differt.

Spondylium
est. & u-
canth cetera
Fuchijum.

Engl. 100
1000


QUANTUM ex Desf.
 herbæ parti-
 bus, quas fratris
 munere siccas ha-
 beo, possum con-
 jicere, procerâ vi-
 detur herba, cau-
 le canaliculato,
 quem latus utri-
 culi instar comple-
 ctitur foliorum pe-
 diculus: sunt ea
 verò duorum cir-
 citer palmorum
 longitudine, pa-
 riq; latitudine, cir-
 cumscriptioe fe-
 rè rotunda, nisi
 quinq; aut sex laci-
 niis rotunditas in-
 terrumperetur, ser-
 rata, minus as-
 pera, minusque
 hirsuta, quàm Spho-
 dylij nostratis: flores veluti in Angelica utriculo
 comprehenduntur, quo disrupto in umbellam ex-

plicantur latam, florum alborum, cordatorum, quos excipiunt semina nostratis Sphondylii, nisi essent paulò majora, plana itidem, ut illa, duplicia, alba, foris quatuor striis nigricantibus, internà facie duabus donata, gustu acri & aromatico, non tamen jucundo. Videtur à priore in eo potissimum variare, quòd speciosior & major.

Heracleum.

Patavio attulit frater Panacis Heraclei nomine; iudicasset Sphondylium, si nomen non fuisset adscriptum.

Panaces

Heracleum

an sit Mar-

tialis

An hoc intellexit passim in suis commentariis & Historia germ. itémque Epit. cum addit Camerarij, per Panaces Heracleum, de quo ait. Panax Heracleum in Apulia frequens nascitur, quemadmodum in Apennini jugis, & in Argentario in nostris maritimis Senensibus. Habetur in quàmplurimis Italiz viridaris; ubi summà diligentia colitur ab his, qui simplicium medicamentorum studio, ad suum aliorumque commodum innumera plantarum genera suis in hortis, ac viridaris serunt ac colunt. Verùm non ob id affirmaverim, ejus lacrymam, quam officina Opopanax vocant, excipi in Italia. In Panacis historia apertissimè aberravit Melues, quippe

Melues re-

prehenditur.

qui initio capitis omnia ejus genera confundat. Quod omnibus jam notius est, quàm ut ostendi debeat. *πανάκι η δούλιον* ut Græcis, sic etiam Latinis Panaces Heracleum nominatur: Arab. Steusir, Ieusir, sive Glausir: Italis Panace Heracleo. Ceterum,

Matth. no-

tatur.

Matthiolum non describit in comm. suis: descriptio verò quæ est in ejus hist. & epit. cum addit. Camerarij, ubi flore ait luteo, est ex Dioscoride: si ei nota fuit planta, cur non descripsit? Considerandum etiam relinquo lectori, an non figura efficta sit, ad Dioscoridis descriptionem. An deniq; Spondylium majus intellexerit necne, me latet: intellexit certè glossator & patrocinator.

An de hac Anguilla ait epist. 12. Anno 1541. in Bononiensi Apennino in Alpibus Sclarum, inveni plantam foliis per terrà expansis, in quinque partes divisis, Fico similibus, asperis, caule albo, ferulaceo, in cujus summitate umbellæ seminis lati, cōpressi & albi: radicibus multis, crassis. Tota planta odoris gravissimi. Postea multis in locis, ut in Norfz montibus, & di Viso, & in Abruzzo supra petram Camella, ubi vocatur *Rampa d'orso*. An autem sit Panax Heracleum dubito, quàmvis multum conveniat, cum descriptione: Opopanaci quod adfertur, non respondet odor: semen non acre, nec lanugo in caule, quam expetit Dioscoridis. Hæc ille, quem minor, quòd non annotaverit colorem floris.

Lecum

Rampa

d'orso.

An Pan-

heracl.

Panax He-

racleum.

Heracleo.

Heracleo.

An Lobel. adv. p. 31. Panax Heracleum, Herculeum sive Heraclea, fronde Pastinacæ? De hac ait. Dixi Panacis nomenclaturam communem fuisse pluribus plantis, quæ neque inter se facie, nec planè viribus similes essent, magnæ tamen celebritatis commendatione *κατὰ τὸ πανάκιον*, seu quemlibet morbum, doloremve abigerent, dictæ fuissent. Hanc autem etiam Herculis nomine claram difficilè noscitur sit, quia quàm multis, quas novi, in nostro cælo oriundas, effluat nullus succus, tamen non desunt, qui quandam in hortis coli non ita diu captam, mihi etiam (commonstrante doctore Aflatio) ruri lectam, veram asserunt. Verùm permultæ sunt aliz huic nullà dote, aut notà inferiores: radix exigua nimis videtur, dudum cubitorum, caule ferulaceo enim (Lob. in Obs. p. 399. legit dudum enim cubitorum caule, lanugine quadam incano) foliis quadantenus Smyrni aut Imperatoriz, sed laciniis, ambituque magis circumato, viridis, pallentisque coloris, rigidis, & leviter hirsutis. Radix non perinde succulenta Lugdunæ, vel Angelicæ, umbella lata, floribus luteis. Crevit sua sponte in illo saxoso colle, qui Fontignana redeunt Montipellum ad Ixram est, propè aut ponè Sacel-

Deser.

Lecum.

lum dirutum, ut me monuit Doctor & Prof. flor Monspelienfis Aflatio: sed studiosorum accursu, qui avidè istam plantam in chartis servabant, deleta illic fere fuit. His addit in Obs. p. 399. (ubi vocat Panax Heracleum, ita etiam in Leon. Plant. p. 701. inscribitur, Herculeum sive Heracleum, fronde Smyrni, vel Imperatoriz) in Belgij hortis flores qui dem albos promere: meminit tamen se vidisse Venetus Panacem, facie non diversam in Franciscanorum Paradyso floribus luteis. Nos, ut verum fateamur, non intelligimus Lobelium: si ille Panax suum icone non exprimeret, affereretque Spondylium alterum esse Dodonzi, nos aliam intelligeremus plantam. Hist. etiam Lugdunensis credidit esse Spondylium Matthioli, quæ est Branca ursina germanica.

Flora albo.

Flora lutea.

An Ponx in Baldo Panax Heracleum Herbariorum in horto proveniens.

Clusius apud Dod. gall. in fine Historiz lib. de gummis cap. 9. figuram habet ex Matthiolo, quam nò describit, vocans solummodo *πανάκι η δούλιον*, & Panax Galeni.

Clus. nota.

Dod. lat. in fol. Panaces Heracleum, vel potius Spondylium alterum inscribit, ac descriptioni Panacis Heraclei Dioscoridis respondere ait, excepto foliorum floris colore in Belgij hortis subinde reperti, quem Heracleum Panaces vocant. Spondylion autem hoc adeò simile esse affirmat, ut majus, vel alterum genus esse appareat. Ostendi hoc, uti dictum, pro Panace Heracleo, tamen si flos non luteus, verùm candidus sit: Lobelium tamen se floribus luteis istud vidisse scribere: Matthiolum & tale aliquod picturà exhibere, quod in Apennini jugis, in Argentario promontorio &c. Sibi non constare Panaces depictum legitimum, idèd maluisse Spondylium alterum aut majus appellare.

Panax Ga-

leni.

Spondyl al-

teru Dod.

Panac. Ho-

racleum.

Spondyliu

maius.

Gesneri in app. hort. Panaces Herculei planta, sibi à Calceolaria missa, fortè fuit Spondylium majus, de quo fortasse quoque scribit de hort. vocans Panaces Heracleum, visum aliquando ab ipso in hortis Italiz, aliqua cum Sphondylion, dicto Branca ursina, similitudine, majus. Videndum tamen an Spondylion affinem intelligat Gesnerus, de quo postea dicturi sumus.

Gesn.

Traditur à Casalpino pro Panace Herculeo, vulgè ab Italis Panacea vocato, Ferula in Alpibus. Is autem asserit Panacis Herculei Dioscoridis descriptionem, præter floris colorem candidum, & caulis altitudinem in cæteris conditionibus huic convenire, sed magis adhuc Panaci alteti ex Sicilia translato, nempe Panaci Siculo semine hirsuto, de quo suo loco.

Panacea I-

talarum

Casalpini.

Lugdunæ duas icones ponit, quas ejusdem plantæ existimant Cam. & frater C. Bauhinus, mihi tamen adhuc non certè constat, an Panaces Heracleum Matthioli, quod Lugd. p. 736. pingit, idem sit cum Panace Heracleo Lobelij, & Sphondylion altero Dodonzi: cujus iconem dedit Lugd. p. 740.

Panax: sive Sphondylii folio (inquit C. Bauh. phyt.) quod Panaces Heracleum Matthioli & Lobelij floribus est albis: luteis Dioscoridis, quales se vidisse testatur Lobelius. Apud Matth. ait. Panax & Panaces Heracleum, Matth. Gesn. h. & ap. & Cordi in Diosc. Hujus plantæ densata lachryma seu liquor Opopanax dicitur. Gesnerus autem an hanc plantam intellexerit, consideratione dignum fieri potest, ut eo modo quo dictum, continetur sub Panace. Cordum hanc plantam vocasse Panacem Herculeum non facile crediderim: ex Sphondylion colbgi Opopanax non video quomodo monstrari possit.

C. Bauh.

Panaces tandem Herculeum Matthioli Lugd. p. 739. & Panax Heracleum Lobelij p. 740. duas distinctas esse plantas in Animad. non agnosco, sed Lobelij figuram

figuram meliorem tradit, qualemque Lobelius describit, talem in viridarius Italix se legisse testatur. Eid. B. pin. Panax. 2. sphondylii. folio live Heracleum. Panaces Heracleum, Matth. Ang. Gefn. h. Lac. Cat. Lugd. Panax Heracleum, Lob. Dod. Ger. Pan. herculeum, Cx. l. Primum, Tab. Sphondylii alterum, Dod. 8. Nobis tamen uti dictum, haud est apertum, an Matthioli Panaces idem sit, cum Lobeliano.

Tabern. dicitur tam in Icon. quam in Hist. Panax Heracleum, aut Herculeum 1. Panax fraud oder nurtzel. Item in Icon. Sphondylium 2. Beerenclaw. In Hist. Sphondylium 2. speciosius, pulchrius & majus. Icon Sphondylii primi fortè facta est ad imitationem Panacis Heraclei Lobelij: miror autem eandem herbam duabus imaginibus diversis locis exprimi: descriptioni Panacis Herculei non responderet: mutatio in numero & transpositio est fortè ex errore Typographico.

Tabern. natura. Gerard. appellat Panax Heracleum *Herculeo* Alpeale. Schvvenck. Panax Heracleum, Brancam ultimam alpinam, grosse Beerenflaw.

Locus. Hoc Sphondylium non est ita vulgare, ut prius. provenit in pratis humidis [in montibus herbis locis fructat, Schv.] chvofis: meretur autem plantationem in hortis, ubi pulchrè evadit, in tertium utque annum durans, semenque proferens maturum.

SPHONDYLIVM CRISPVM.

Deser. SPHONDYLII Brancæ urtinx dicti magnitudinem nō excedit, verū folia paulò minora sunt, nec ita aspera, crispa, visu amœna: in cæteris, ut caule, flore & semine, itémque radice Spondylia respondet.

Locus. Nec ita frequens occurrit, Spondylium 3. sive crispum Tabernæmontani, qui id mediocriter abundare tradit, ad Sarz fluvij ductum, inter Saralben & Sarbrucken in pratis.

An C. Bauh. pin. Sphondylium 2. hirsutum foliis angustiorib: hoc in prod. pro primo sic descripsit. A vulgari foliis folium differt: nā cum vulgare folijs sit amplis, plerumque ex quinque partibus latis subrotundis compositis: hoc folium habet, in laciniis oblongas, angustas, acuminatas, hasque in alias, inordinatè tamen divisas, & per marginem crenatas, Hoc in pratis alpinis Rhæticis observavi: dein ex Lusatia à D. Franco accepi.

SPHONDYLIVM ALPINVM parvum, C. Bauhini.

Deser. EX radice caulis assurgit pedalis, qui in summo in alterum ramulum triunciale, dividitur: quem folia cingunt pallidè virètia, longis pediculis donata, quæ in partes tres, vel etiam quinque alias subrotundas, alias acutas, per marginem crenatas & hirsutas dividuntur, umbella flosculis candidis, latis tamen, summo cauli insidet, quibus semen plenum, latum ac tenue, succedit. Tota planta levissimis pilis pubescit. Ex Austriæ alpihus, D. Burserus misit auctori C. Bauhino, qui secundum facit in Prod. & tertium in pin.

SPHONDYLIVM ALPINVM glabrum, Ejusdem.

Deser. RADICE est crassa, eaque albâ. caule bicubitali, geniculato: folijs siculneis, glabris, quæ absque

Tom. III.



pediculo, palmum longa, dens loca sunt, continenter tripartitis, sed non usq. ad pediculum divisas, per marginem crenatis: quorum interiora pediculis palmaribus, hirsutis & subspiculis donantur: caulis summo, umbella flosculorum candidorum, sed quam in reliquis speciebus minorum, insidet: semen succedit subrotundum, planum, ejus summitati apex insigitur. Hoc folium in monte V. Vallerfall & quid-

dem ab anno 1595. usque ad præsentem annum 1618. Julio mense & florentem & semine præstantem, observavi inquit C. Bauh. qui in Prod. pro tertio Sphondylia describit, & quartum in pin. facit, & in phyt. sub 2 proponit.

TATARIA HUNGARICA E. dulci: Panacis Heraclei folio, semine Libanotidis cachryferæ.

Deser. NON vulgaris est planta, quæ radicem habet crassissimam & longissimam: nam brachialis crassitudinis, & cubitalis longitudinis, ant etiam ampliores aliquot accipere meminit Clusius, hujus historix author, ab Ill. Dn. Balthasare de Bathyâ, qui in ejus gratiâ ex Vngaria trans-Danubiana adferri iusserat, ut in suum hortum Viennæ transferret. Illis autem folia emiserunt Rapi foliis non valdè dissimilia incisuris & laciniis, breviora tamen, & vetus ad Panacis foliorum formam accedentia, rudi atque asperâ lanugine prædita, ex viridi pallè scentia, deinde paulò majoribus incisuris divisa, nec minus aspera, inter quæ assurgebat caulis cubitalis aut amplioris longitudinis, pollicaris verd crassitudinis, striatus, concavus, & nodosus, perinde asper ac scabellus: quem lato pediculo amplectebantur minora folia & multifida, asperâ etiam lanugine obsita: summus caulis in umbellam desinebat, Panacis Heraclei umbellis similem, in quibus flores & summa parviores, & colore, quibus evanidis, succedebant rarâ (nam singuli flores non sunt fecundi) semina, valdè crassa, nec valdè absumilia semini illi magno & striato Libanotidis cachryferæ. Biennio quidè eas radices aluit Clusius, ante quàm una illarum & caulem & semen proferret: deinde corruptæ sunt, tamque fetidum odorem exhalarunt, ut horro fuerint ejiciendæ.

C. Bauh. pin. Panax 4. sive Panaci Heracleo similis Vngarica.

Hujus porò radice Vngari Agriæ vicini, atque etiam ulterioris Daciæ continentini, in annonæ caritate & inopiâ, vescuntur alterius panis injuriâ, ut Clusio asseriebant non modo Heros ille Illustris, sed etiam alij nobiles viri, qui in ea provincia vixerant. Quia adeò res effect, ut dulcius esset, an eodem esset, cum Baltacran in Tartaria nascente, de qua mox agendum.

Maximo est in usu apud Tartaros hæc planta. nam absque eâ, per magnas illas solitudines, in qui-

bus nihil edule reperitur, iter facere non possent. itaque ea nata suas peregrinationes instituire solent.

Tataria. A Tartaris fortè hujus radices usum edocti sunt Vngari, propterea que Tataria nomen illi dederunt: Tatrèn enim, ut & Germani, vulgò appellant, qui nobis Tartari dicuntur.

Chara raris. An verò huic similis, radix Chara, quæ læti admittit, Cæsaris milites inopiam levasse legitur. Indagandum proponit Clusius.

LIBANOTIS THEOPHRASTI

quorundam, siue Sefeli Æthiopicum

Matthiolo, Cervina alba.

CAP. LXVIII.

Deser.

GUAR.



verso sita subdividuntur. umbellæ latæ. flores albi. semen gemellum, octo angulis donatum, cum quadam acrimonia & amaritudine.

Sefeli Æthiopicum Clusius sic describit. Sefeli Æthiopicum Matthiolo nuncupatum, uberrimè nascitur per omnes Vngariæ, Austriæ & Stiriac silvas, ubi illius folia in tantam amplitudinem interdum evadunt, ut palmum æquare possint: habent verò magna ex parte singulæ foliorum alæ quina duntaxat folia, uno extremam alam occupante, per ambitum serrata, supernè atro-virentia, infernè subcineracei quodammodo coloris: caulis bicubitalis est, aut amplior, geniculis interceptus, & supernè parte in aliquos ramulos divisis, sustinentes exalbescensium flosculorum umbellæ, qui in oblongiusculum & angulosum semen transeunt. Cuminum aut Sileris montani semen odore & sapore referens: radix pollicaris aut amplioris est crassitudinis, crassioribus aliquot fibris prædita, & crasso cortice, sapore incho dulci, deinde amaricante, supremo capite hirsuta (veterum foliorum, quæ marcidæ evanuerunt, fibræ eam hirsutiem facientibus) perennis.

An Sefeli An est Trago Sefelis genus, quod in silvis Germaniæ provenit, caulèque fundit procerum, eumque non aliter, atque anethum in fastigio umbellæ ferentem in quibus semen à maturitate videre est oblongum, & angulosum, gustanti acere veluti Gingiber. Radix hujus prælonga est, sicut Pimpinellæ magnæ, odoris gratissimi, gustus verò acris: Sefeli hoc secundum, quod oblongo prægnat semine, Dioscoridi *σέφι τριανταφυλλεύ*, in c. Sefeli

Massiliense, & *σαφύρι* dicitur Hippocrati Seli, & Sili appellatum. Hoc in Gallia Saxifragia major ab herbariis existimatur, teste Ruellio l. 3. c. 42. Germani Sefel/aut Zangen wald fummel/h. e. Cyminum silvestre oblongum vocarunt, inquit Tragus, cujus verba ut verum fateamur, de qua stirpe accipienda sint, aut possint, ignoramus! suspicamur eum de non bene nota planta dicta hæc tradidisse: nec existimamus appellatam esse Saxifragiam majorem.

A Fuchsi. Is inscribitur Sefeli Æthiopicum, *weiss Fuchsi. Natur.* murtz: In l. st. Danci alterum genus, ubi icon sine descriptione, præterquam ex Dioscoride proponit, quæ nullo modo convenit: nulla folia Apij, huic Dauco secundo Fuchsi.

Matth. in suis comm. etiam cum mag. fig. itèmq; hist. germ. & epit. cum addit. Camerarij sub titulo Sefeleos Æthiopici ponit nudam figuram suo more, quasi nunquam viderit plantam, quam tractandam suscepit.

Lon. l. 5. c. 305. vocat *weiss Birgzmurtz*/ Elaphoboscum Dioscoridis, Pabulum cervi, Ocellum cervi, Gratiæ Dei & Copariæ. Idem cap. præcedenti hujus aliam habet iconem sub inscriptione Sefelios secundi, siue Sefeleos Æthiopici, ita ut duas imagines unius plantæ diversis capitibus exhibeat.

Dod. gall. facit tertiam speciem Libanotidis, nominatque Libanotidem Theophrasti, quod sc. is hanc descripsit, cuiusque semen Canchryn aut Canchryn appellaverit. Lat. in fol. Sefeleos Æthiopici herbæ titulum ei fecit, cognominatque Sefelios hoc genus, Sefeli herbaceum, quo nomine etiam describit, ac dicit: Depinxere istud pro legitimo Æthiopico [Sefeli sc] Fuch. Trag. & quandoq; Matthiolo: ut verum ac legitimum Æthiopicum, fruticans solummodo est. Herbaceum ad Theophrasti Libanotidem citius referendum, quod folia ait habere *σάφύρι*, i. e. palustri Apio majora, caulem ad magnitudinem cubiti: fructum candidum, *τοκχύρι* live asperum, & oblongum, quale herbacei Sefelios semen. Dod. gall. scripsit radicem albam: verum ibi nulla descriptio, præterquam Dioscoridis, sed sola icon. Vbi Tragus hanc depinxerit nomine Sefeleos Æthiopici me latet.

Lob. adv. p. 33. non multum videtur abesse à Theophrasti Libanotide, quam Commentatorem, si vidit tamen haud rectè descripsisse ait, verum suo pictori præcepisse, ut pro Æthiopico Sefeli sculperet, qui perperam amulatus sit iconem ex commentariis Dodonæi, cujus mentionem nuspiam cur non fecerit, facile subodorari. Lobelius autem hinc ait Theophrasti Sefeli herbam memoratam, sibi nunquam visam. Idem p. 281. de Sefeli Æthiopico vero ad finem dicit adversus Matthiolum, quod si verum Sefeli Æthiopici, ut falsum hoc in Dodonæo pictum, vivum in agro vidisset Commentator, lubens & volens sufficisset in locum hujus plantæ, cui videtur postposuisse: est enim hæc non frutex sed herba, quam recentiores Libanotidem Theophrasti prodiderunt, viribus & figurâ aliena à Sefeli Æthiopico, quod fruticem, adeoque magnum, Dioscoridis correctior codex esse statuit. In obs. p. 402. in Icon. p. 704. Libanotis Theophrasti. Gesn. h. Libanotis ferulacea alba Dodonæo. Tab. ic. & hist. Libanotis Theophrasti alba majori. *Gross weiss. hirtzmurtz*. Item: Libanotis Theophrasti alba 2. Una sufficit bat figura. Lugd. p. 748. Sefeli Æthiopici Matthioli. Item p. 765. Libanotis 3. Dodonæi. Et: Dauci alterum genus Fuchsi. Frustra tres figuras unius plantæ habet Lugdunensis: C. Bauh. una Dodonæi satis erat. Cam. h. Sefeli Æthiopicum Fuchsi. Bauh. phyt. & apud Matth. Libanotis 3. siue latifolia altera, Sefeli 1. Trago. Hujus verò haberi & alteram speciem

speciem testatur frater in Baldo, latioribus foliis; nigrioribus, magisque incisus.

Thurnihus de hac sortè intelligendus lib. 1. cap. 29. cum ait: Sardinisch aut Rort hirschiwurz: Causimon & Timoleon: Cervaria: Iudacè Z bi Zanab: Græcè *ἰραδίκη*. Quidam existimant harum herbarum unam *ἰραδίκη* Dioscoridis lib. 3. cap. 8. Plinij lib. 22. cap. 22. alteram Pabulum Cervi, & Gratiam Dei, & waldi Salbey: propter formam capillorum posset esse Z bi Zanab, quamvis forma & loci situs non ita manifestè, ut virtutes, id demonstrent. Non dubito herbam esse, de qua Plinius lib. 8. cap. 32. dicit Græcorum scēmas se purgare ante partum. Vandali vocant Zehlehnwurz, posset vocari Hirschwurz. In Syria vocatur Matz. ex hac herba fit Matzlach Turcis usitatum &c. Oleositas ejus vocatur Behalah aut *بهرال*. Descriptio Turnisij videtur demonstrare plantam de qua hoc capite tractamus. Figura autem nihil tale ostendit. Quis quæso ex ejus figuris dignoscet plantas? Quale discrimen inter ejus Elaphurin & Tordilhon, sive *نورس* ac alias similes. Planta de qua Plinius loco citato, dicitur ei Sefeli.

Turnisij
conjectura.

Locus
tempus.

Libanotum Theophrasti Dodonæi, sive Sefeli Æthiopicum Mathioli inveni Burm. in Rhetia, Julio mense florens, inter taxa. Bailex in monte Moutez semine maturo Augusto. Lugduni, Genevæ & Môtbelgardii in hortis. In monte Baldo observavit Bechius & Pona. Cervaria alba, referente Clusio, floret Junio, interdum etiam serius, semen Augusto maturat.

LIBANOTIDI THEOPHRA-
sti quorundam valdè similis, Costus
amara dicta, semine
crispo.

CAP. LXIX.

Locus.

Costus
amara.

Tela.

ACCEPIMUS olim à Domino Agerio Medico Argentinensi clarissimo, & stirpium indagatore diligentissimo, stirpem collectam in Italia monte Samano, cum inscriptione Costi amari. Erat hæc sane valde similis Libanotidi Theophrasti quorundam, à nobis jam jam traditz, quoad folia, in quibus, hoc discrimen observo, quodd minus & rariùs ferrata,

& quædam vix ferrata, nobis etiam videntur tactu crassiora: folia per caulem, quæ ferratura omni penè destituta, habent pediculum caulem amplexantem; qualem etiam jam dicta: umbella ampla: semina oblonga crispa, nõnihil amaricantia, cum acrimonia.

Lobel. in Obs. p. 704. tradit Libanotidem Theophrasti majorem, cujus descriptionem, sequenti capite adscribemus, quæ non respondet iconi suæ. Ideo perpendendum an eâ

descriptione hanc intellexerit, de quâ hîc agimus: dubium nobis movet, quodd dicat folia ampliora, verum cultura sortè in causa.



Libanotis
Theophrasti
major.

LIBANOTIS THEOPHRASTI
quorundam, folio minus rotundo.



ANNO 1595. Heil delberge in hort. D. Sprenger insignis pharmacopœi & Botanici, collegi folio amplissimo, cubitali, tripartito, & tripartitis: denud brachiis, in terna quoque plerumque foliola desinētib, sublonga, minus rotunda, quàm in præcedenti, serrata, postremum etiam interdum trifidum: infernâ parte magis candicans.

Deser. Po-
lia.

Descriptio Lobel. herbæ, quam in Obs. p. 402, in Icon. verò Plant. p.

704. titulo Libanotidis Theophrasti majoris imagine sculptam dedit, quæ plantæ huic nostræ optimè respondet. Descriptio autem ejus, nec cum nostra, nec cum ejus iconē convenit. Ea talis est. Varietatem folijs magis carnosiss, rotundioribus amplioribusque nitentib. semine cristato, Lutetia missam alunt vireta Belgica: cætera similia & re ipsa una.

A C. Bauh. phyt. appellatur Libanotis altera latifolia major.

Lib. Latifol.
major.

LIBANOTIS ALTERA QUO-
rundam, alijs dicta Cerva-
ria nigra.

CAP. LXX.

GUAR.



RADICES plures digitales, capite Mei instar capillato, in unam coeunt, quæ sensim attenuata pedes duos aut tres horum illorumq; vagatur, altius humo depacta, foris nigricans, intus alba, lentâ mucaginem, vulnerata manans, sapore resinaceo, aromatico, grato, ad Pastinacæ Germanicæ accedens saporem: substantia teneriuscula: folia cubitalia quæ cum à radice, tū caule oriuntur lōgis, appesa pediculis, aliquatenus

Deser. Ra-
dices.

Mucago.

Folia.

Petroselinæ Macedonici diviturâ & effigie, rigidiora, glabra, glauci sortè coloris, crenata, sapore remissiore, quàm radix: caules autem ferulacei, striati, duos, tres, quatuorve cubitos alti & in alas divisi, umbellas sustinent amplissimas, flosculorum albi- cantium, foliolis quinque constantium, priusquam de-

Caules.

Flosculi.

Semen. hiscant purpurascunt: semen latum ad Pastinacæ latifolia semen nonnihil accedens.

An Daucus secundus Trago: An Trago lib. 1. cap. 148. Dauci secundum genus, cui in hist. germ. (ubi die ander Berwurtzel vocat) radicem assignat foris nigram, supernè hispida, ferventem, acrem & odoratam; folia autem instar Petroselinii vulgaris dissecta, sed majora. Audivit, ut refert, qui hanc nominarent Hertzwurtz: ipsi tamen videtur Peucedani species, aut Selsi Creticum. Idem paulo post, sibi non constans, inter Daucos, vel inter Tordyla referri posse putat.

Seseli 3. germ. An eidè l. 2. c. 120. Seseli 3. sive Seselis genus alterum in Germaniæ silvis proveniens, lato instar Cimicum, aut Pastinacæ semine, *παστουριον*, latum Cyminum ipsi dictum, Dioscoridi verò Peloponnesiacum nuncupatum, quod Germanos Breitenwald Bümel/ b. e. Cyminum silvestre latum nominare posse ait, ac sic describit: Alterum [Seselis genus in silvis Germaniæ proveniens] caule & folijs evadit altius & crassius, ita quidem ut non raro caules proferat bicubitales, digitumque crassos, uti Cicuta, folijs paucis, iisque vulgare Petroselinum referentibus, sed majoribus, gustuque acrioribus, denique & nigricantioribus vestitis. Umbellas hij ferunt, exiguis candidisque flosculis emicantes, qui in semen abeunt latissimum, perque omnia Pastinacæ similitum, sed non ita scabrum, verum acius eadem. Radicem habet hoc Seseli admodum longam & teretem instar Fœniculi, hiemis patientissimum. Nasclitur in altissimis silvis humo arenosa. Hæc

Trag. taxa tur. Tragus, qui nec Seselis sui tertij, nec Dauci secundi figuram exprimit. Quò denique hoc ejus Seseli sit referendum, adhuc asserere non audemus, ideòque ejus descriptionem datà operà hic adscripsimus.

Seseli Peloponnesiacum. Fuch. natura. Fuch. ic. vocat Seseli Peloponnesiacum, Schwartz Hertzwurtz: In hist. (ubi iconem sine descriptione propria pponit: ea enim, quæ habet delineationem, est Dauci tertij Dioscoridis) Dauci tertium genus, quod ait in altis montibus provenire, quod nos non observavimus. Cornarius appellat Radicem cervinam nigram, eamque quosdam Libanotidem secundam fertilem esse putare narrat. An Cordo in Diosc. Ambrosia, quam falsò quosdam Hertzwurtz putare scribit?

Matth. natura. Matthioli suo more hujus iconem proponit absque descriptione, quæ convenit cum planta, quam hoc capite proponimus. Inscribit autem eam in comm. cum mag. fig. lat. & ital. Daucum secundum. in epit. etiam cum addit. Camerarij Daucum alterum, *δαυκον ἄλλου*. Hic ejus Daucus, quem Coriandri folijs provenire tradit, & semine Cumino simili, in hist. germ. ch. leographorum negligentia, dum Pragâ, grassante pestilentia abesset, secundum Peucedani genus, sive Cervariam representavit. An eidem Elaphoboscum in Italia inventum, plurimum tamen à legitimo dissidens?

Libanotis altera Dod. gall. Dod. gall. iconem Fuchij proponit, cui Libanotidis alterius titulum apposuit, semineq; lato, Angelicæ ferè simili tradit. Miramur autem eum hanc stirpem in fol. lat. omisisse, quali ei non fuerit nota.

Syn. Geln. Geln. h. dicitur Libanotis ferulacea nigra Dodonzi. Item: Cervaria radix nigra, & Oreoselinum nigrum. Ego Gelnherum apud Cordum in Diosc. l. 3. c. 86. pro Seseli Ethiopico, Peloponnesiacum voluisse dicere existimo. Libanotidem, inquit, secundam quidam putant Schwartz Hertzwurtz quam alij Seseli Ethiopicum faciunt. Idem in epist. ad Zvving. Seseli Peloponnesiacum jam prius in horto habebam, abundat in saxis & collibus, circa Badam Helvetiorum, ego Oreoselini potius, quam *oreolani* genus esse puto.

Lonic. natura. Lonicus hujus imaginem pictam dedit sub titulo Schwartz Hertzwurtz quam Elaphoboscum

Dioscoridis statuit, ac Pabulum cervi, Ocellum cervi Gratiam D21 & Copariam latine cognominat, diversa, meo judicio, confundens nomina.

An Ang. ep. 5. hanc intelligit, per Rosmarini species à Theophrasto traditas, quas Dioscoridis esse negat. Theophrasti enim ait esse folio Apij palustris, quæ reperiantur in monte supra Conum, qui dicitur Generosus, ubi herbarij vocant Levistico salvatico, qui omnes habet notas.

An Lob. Adv. p. 321. Icon. p. 720. est Daucus secundus Selinoides de hoc ait. Veneti pharnacopœi quam Mattheolus Daucum alterum facit, Saxifragam dicunt, illique vires consimiles frequenti experimento asserunt: nihil tamen obstat, quin sit Daucus alter Dioscoridis. Folijs namque Coriandri, aut Petroselini Macedonici veri, donatur. Semen illi in umbellis oblongum, angulosum, Fœniculi modo. Radix aroma olet, suavis gustanti, supernèque comata, Mei modo. Idem jam dicta repetit p. 323. An in Obl. p. 414. Daucus Selinoides secundus Adv. p. 321. Et p. 323. Rosmarinum, sive Libanotis prima Theophrasti, folio Apij palustris: Ital. Valdè bona vulgo & Saxifragia Venetorum? Item Dauci secundi Selinoidis varietas, persimilis, sed minor, exilior, in silvis Nervio proximis? Lobelium intelligere eandem nobiscum plantam, asserere non ausimus: descriptio seminis non quadrat. Icon quam proponit, à Clusio pro alia planta exhibetur, nempe pro Seseli Panthonico secundo. Miror Lobelium non meminisse Libanotidis alterius Dodonzi, sive Cervariæ nigre, nisi intelligat eam, per Daucum secundum Selinoidem.

Pona, ut paulò post dicemus, existimat Libanotidem minorem Lobelij, eandem esse, cum Dauci tertia specie Fuchij, quæ opinio nobis non arridet.

An Cæsalpino Levisticum alterum omninò in incultis nascens locis, squalidis, montuosis, cui folia ab radice strata in terram, dura, & lenta, breviora altero, & ut plurimum subrubra, odoratèque: cauliculum fert levem, subrubentem, cubitalem, paucis ramis: umbellas subrubentes & semina nigra: radicem fert longam, pollicis crassitudine, non sine odore: hanc nigram Libanotidem appellare possumus, quamvis Theophrastus nigre non meminit Plinius hanc significasse videtur, cum dixit, radicem habet Olusatrum, nihil à Thure d. sterentem.

Thurnisus de plant. l. 1. c. 30. vocat plantam nostrâ Weissteusch Hertzwurtz sceminam, id quod ex descriptione ejus colligimus, licet figura nullam talem demonstret stirpem. Quibusdam, inquit, Pinastellum appellatur & Meon, aliàs Cordylon aut Tordilion. Posset vocari Ayaleiha & græcè *ἰσχυρὸν*. Dioscorides hujus generis herbam vocat Tordylon, aut Cordylon: Paulus Aegineta Gordylon. Arabibus & Chaldæis Aithalibah: non malè dicitur *ἰσχυρὸν*. Quidam voluerunt esse Harstrang, alij Ocellum cervi, alij Podem porcinum. Vandalis est *ἰσχυρὸν* Iudæis Atunsaal, existimatur à quibusdam rote Hertzwurtzell.

Lugd. p. 716. Daucus secundus Matthioli. Item p. 765. Libanotis secunda Dodonzi. Daucus tertia Fuchij: eadem est planta, licet utrobique describatur: quòd verò addit, esse Libanotidem minorem Lobelij, fallitur, eum hanc plantam Lobelius Daucum secundum Selinoidem nominet.

Camer. h. nominat Seseli Peloponnesiacum Fuchij. Bauh. phyt. & pin. est Daucus (tertius apud Matth.) sive Montanus, Apij folio majore: Daucus 2. Trag. (cui & Seseli 2.) Matth. Lugd. Dauci 3. genus. Fuch. Libanotidis alterum genus, Dod. gall. Lugd. Libanotis nigra Dodonzi, Geln. h. Seseli peloponnesiæ, Fuch. ic. Geln. h. & Cam. Elaphoboscum nigrum, Lon. Saxifragia Venetorum, Adv. Daucus

An Daucus 2. Selinoides Lobelij.

Lobel. natura.

Pena opinio explorata.

An Levistici cum altero Cæsalpi?

Cervaria alba summa Turnis. Pinastellum. Meon Gordylon. Elapharium.

Per porcini.

Lugd. la. p. 765.

Seseli Peloponnesiacum Fuchij. Synon. C. B.

euselinoides 2. Ad. Lob. Sefeli pannonicum 2. Claf. pan. ic. 2. montanum, Eid. hist. ic. Libanotis nigra, communiter Cervaria nigra, Thal. Libanotis Theoph. nigra, Tab. Ger. Variat 1. folijs pallidè virentibus & splendentibus. 2. folijs laticoribus, fortè ob culturam, quam Pseudocostum Cortufus nominabat. 3. folijs minùs divifis, fupinà parte dilutius virentibus & aliquantulum splendentibus, pronà fubcinereis, quàm Cervariæ nigræ nomine, Lipsià D. Iungermanus mifit. Hæc C. Bauhinus. Matthiolus cenfuram merebatur, qui non defcripferit. Lobelij defcriptio non convenit, cum Libanotide 2. Dodonzi, cui femina potiùs Pafinacæ latifoliæ Germanicæ, quàm Fœniculi, quod Matthioli patronus annotaffe debebat.

Locum
remptum.

Libanotidem fecundam Dodonzi, five Dauci tertium genus Fuchfij inveni Bafileæ in monte prope Montez, menfe Oëtobri cum flore & femine: in monte propè Krenzach, & juxta Leurach florentem Augufto: Genevæ menfe Martio incipientem protrudere folia in monte Salevæ. Montbelgardi à la Chau juxta vineta florentem Junio, & in pratis propè Columbier Savoreux & inter Raupach & S. Germain, unde tranftuli in hortum. Frater Bauh. attulit ex horto Patavino nomine Totæ bonæ & Saxifragiæ majoris. is annotavit Cortufo dici Pseudocostum.

LIBANOTIS THEOPHRASTI minor Lobelio.

Synonyma

Defcriptio.



LIBANOTIS Theophrasti minor (ut vocatur à Lobel. Obs. p. 402. Icon. p. 705.) five Panacis species nonnullis, folijs exilioribus multò, Saxifragæ Venetæ proximis, gemino fitu Panacis alterius ritu, sed oris tantillū crenatis & lacinia-tis: caulis bicubitalis & procerior. Semen Anethi, candidum: flores in umbellis albi. Radix aromatica, grati & jucundi odoris.

Considerandum an Libanotis hæc

Lobelij minor, fit eadem cum præcedenti, quæ Cervaria nigra dicitur, estque Libanotis altera Dodonzi, & Dauci tertia species Fuchfij. Ea quidem *Pana opinio* fuit opinio Ponz in Baldo, sed nobis minimè probatur. Bauh. phyt. dicitur Libanotis 1. five Apij folio. Eid. B. pin. Libanotis 4. minor apij folio: Daucus anguloso caule, Cord. hist. Libanotis alba minor, Thal. Libanotis panacea, Tab.

Pana opinio
reprobatur.

VALDEBONÆ NOMINE MIS- sa, Libanotidis secundæ quorundam, five Cervariæ nigræ species

Defcriptio.

TOTA hæc plâta accedit ad Cervariam nigram, verùm foliorum color viret magis, nec ita glaucus in folijs etiam pauciores conjugationes, sed eadem multò majora, amara, & acris non nihil, quam



amantudinem non percipimus in Cervaria nigra: flos luteus ex umbellis minoribus, quàm in Libanotide jam nominata, qui masticatus odorem reddit aliquantulum vinosum & aromaticum.

Anno 1600. à nobis satum est semè, communicatum ab E.C. VVirtembergico reduce ex Italia, cui Vlisses Aldroandus Valdebonæ, five Dauci secundum inscriptionem offerebat. Sequenti

Dauci 2.

primùm anno provenit, & tertio anno caulem produxit, aliquot cubitorum, florebat Junio, & Julio semina maturabat.

D. Agerius siccam dedit nomine Veeltguttæ Bononiensium & Valdebonæ nigræ, quæ prædictæ similis erat, quantum ex sicca colligere potui. Eam dicebat altitudinis Angelicæ, flore luteo collectam, in radicibus Apennini montis, seminibus ad Pafinacam Germanicam, five latifoliam vel Anethum accedentem, duplicibus, fimbriâ albicante, sapore aromatico & acris.

Veeltgutta
Bononiens.

Semina

SESELI 2. CLUSI.



HÆC nostram plantam, nihilimur, sic describit Clusius: Brachiali interdum nititur radice, præsertim si planta vetusta sit (recentiores & juniores pollicarem habent) in aliquot ramos inferiore parte donata, crasso, rugoso, nigroque cortice septa, gummoso primùm lentoque sapore prædita, deinde acris & salivariæ: quæ summo capite in multa capita extuberat villosa, quemadmodum ferè omnes ferulacei generis stirpes, unde exeunt magnæ & satis amplæ foliorum

Defcriptio.
Clusii.

alæ, aliquot folijs per ambitum serratis & nonnihil incisus uni costæ inhxrentibus, sed ex adverso nascentibus constantes, colore fupinà parte dilutius virente, & aliquantulum splendente, pronà fubcinereo præditis: inter quæ sesquicubitalis nonnunquam emergit caulis, striatus, pollicaris interdum crassitudinis, geniculatus, in aliquot ramos divifus, quem ambiunt ad singulos nodos, five genicula, minores foliorum alæ; summum caulem atque extremos ramos exornant umbellæ pallescentium flosculorum: quibus succedunt semina Sileris montani semini similia. Hanc Clusij descriptionem congruere speramus huic nostræ plantæ à nobis descriptæ, ceu etiam iconem, quam in Pannon. p. 692. Se-
feli secundum [addit in hist. montanum] Pannonicum inscribit, ac inter veritas genera posse referri existimat, plurimùmque habere similitudinis, cum

Seseli 2.
montanum
Pannon.
Clusii.

Clusius e.
mendatur.

An Daucum
2. Seleni-
des Lobelii

Libanotide altera Fuchij (legendum puto Dodo-
næ) sive Dauco secundo Matthioli dicit, vocarique
à quibusdam rusticis Petero wurtzel / tamen sit alia
umbellifera stupis etiam hoc nomine & frequen-
tius donetur. Clusij porrò iconè Lobelius Obl. p.
414. & Ic. p. 720. Dauci secundi Selinoidis utulo exhi-
bet. Verùm an de Sefeli hoc montano secundo Pan-
nonico Clusij intelligat dicere non possumus: de
scriptio seminis & alia non conveniunt.

Sefelios Clusij descriptionem Bauhinus in pin.
refert ad Daucum suum 7. sive montanum apij folio
albicante, quem sibi D. Iungermanum misisse, ait.
Sefeli peloponensis lenensium nomine.

Locum
tempus.

Invenitur serè in omnibus Pannoniæ & Austriæ
inferioris montibus, aspero Solo, ventisque perfla-
to, Iulio & Augusto floret, & subinde semen pro-
fert. Simile aliquando legere meminit Clusius ad
Allobrogicarum Alpium radices.

SESELI ÆTHIOPICI MAT- thioli genus aliud, Clusio.

Locum.

Deser.

Radix cer-
vina.

Es 21. Æthiopici Matthioli nuncupati (inquit
Clus. in pannon. p. 694: & hist.) genus aliud
est, satis vulgare, in Hungaria, Austria, & Stina,
quod nusquam tamen abundantiùs invenitur, quàm
in Calenberg. Majores id habet foliorum alas, h. e.
in plura folia, nempe bina & vicena plerumque, su-
perioribus magnitudine longè cedentia divisas,
quæ supernè splendentia minùs virent, & pronà
parte cineracei prorsus sunt coloris, omnia in am-
bitu non modo, ut Sefeli Æthiopici Matthioli ferra-
ta, sed etiam laciniis dissecta: æqualem cum jam di-
cta habet caulem, nodis similiter interceptum, flo-
rum umbellas similes, semen par, radicem non dissi-
milem. Hoc Germani schwarz Hirtzwurz/h. e. ni-
gram cervi radicem appellant.

SESELI ALPINVM SIVE MON- tanum, primum Clusio, folio splenden- te, flosculis albis.

C A P. LXXI.

Deser.



partibus respondentia, sed minora: extremi rami
in magnas umbellas flosculorum quinque foliolis
canonicis constantium desinunt, odoris serè tambu-
cini: flori succedit semen gemellum, striatum, flave-
scens, aromaticum & siccido gustu: radix crassa est, &
fons nigra, quæ (ut in plerisque ferulaceis contingere
solet) semine prolato perit, nec nisi alicui aut ter-
tio à satione anno flores producere solet.

A M P L A ha-
bet folia, humi
sparta, & in multas
alas divisa, Sefeli Pe-
loponensis [an Mat-
thioli] serè similia,
supernè viridia &
splendentia, infer-
na parte minimè,
Ferulæ odore, acri,
nec admodum gra-
to sapore: caulem
deinde sesquicubi-
alem, aut amplio-
rem, crassum, stria-
tum, intus fungo-
sum, nodosum, &
multos ramos in
ambitu ex singulis
geniculis, seu nodis
ferentem, per quem
sparta sunt folia su-

Clusius, descriptionis autor, vocat in pannon. Se-
seli alpinum, sive montanum primum, in hist. Sefeli 1.
montanum Pannonicum, ipsique proximè accede-
re videtur ad Peloponensis Dioscoridi descriptum, Sefeli Pe-
loponensis quod illi ordine tertium est. Bauh. phyt. Sefeli 2. pon. Diosc.
sive montanum, Peloponensis folio nominat, quæ-
ritque an sit Ligusticum alterum Belg. Lobelij Obl.
p. 457. Icon. p. 726.

Crescit in celsis Sneberg & aliarum Austriæ Al-
pium jugis, ubi latiora sunt pascua: floret sub finem
Iulij aut Iulio: semen verò Augusto, vel etiam se-
ptembri maturefcit.

SESELI, SIVE SILER montanum vulgare.



H V M A N A M Deser.
superat altitu-
dinem Sileris mon-
tani caulis. caulem
ramosque ceu vagi-
nà laxiore ample-
ctuntur foliorum
pediculi palmares,
aut sesquipalmates:
ipsa verò folia in
alas oppositas divi-
duntur: segmenta
extrema terna serè
sunt, Cytisi Tragi
foliis similia, oblon-
ga, latiuscula, mu-
rone leviter obtu-
so, umbellæ albæ,
ample; semen ma-
gnum cum simbria
foliacea striatum,
oblongum, sapore

acri & subamaro, veluti corticis Aurantij, tandem
ad Cymini saporem accedente. radix magnà comà
infimum caulem ornat, rugosa, digitali crassitu-
dine.

Icon, quæ proponitur à Trago pro Sefeli, h. e. Si-
ler montano i. (ita enim cognominat) videtur esse
Vitisag: nos existimamus ei Sileris plantam inco-
gnitam fuisse, non enim describit.

Fuchius apertè hallucinatus esse deprehenditur,
eò quòd semen hoc, quòd à Sepplariis Sileris mon-
tani nomine venditur, Sefelios Æthiopici, vel quòd
magis vero simile ab ipso creditur, Peloponensi
Sefeli semen esse dixerit. Hujus siquidem plantæ
semen est, quæ nec Sefeli Massiliensis, nec Æthiopi-
ci, nec denique Peloponensi Dioscoridis delineā-
tioni quadrat.

Noverunt, inquit Cornarius, officinæ Sefeli, sed
corrupto ex Sili nomine, Siler appellant, & monta-
num insuper dicunt, ut sit ab aquatico differentia.
Germani, quibus nulla Sefelis est distinctio, Sefel
vocant.

Monachi in Mes. dist. 1. cen. 25. manifesto in erro-
re versantur. Nec est enim planta hæc à nobis exhi-
bita Sefeli aliquod Dioscoridis, ut ipsi somniant. Se-
seli, ajunt, sive Sefeleos, sive Siseleos, vulgo Siler
montanum, licet non bene in omnibus convenire
videatur, cum descriptionibus Dioscoridis de Sefeli,
tamen non est Cuminum silvestre, ut aliqui putant.
Sunt nonnulli, qui exponunt Cuminum Car-
menum esse Sefeleos, quo utimur, quòd quidem nobis
non placet. Attamen non est magnum inconve-
niens, si pro Sefeli, si fortè non sit ipsum Sefeli, &
pro Cuminum silvestre, pouds tamen pro Sefeli po-
nendum. Musa in suo simplicium examine dicit
quòd hoc Siler montanum convenit cum duabus Dio-
scoridis

coridis descriptionibus de Sefeli, videlicet Massiliensis & Æthiopici. Et potest stare quod Sefeli Massiliense Dioscoridis, sit Siler montanum vulgare. Erronea hæc est Monachorum opinio, etiam scribente Matthiolo, qui dicit in quamplurimis pharmacopolijs semen quoddam, Sefeli vicem explens vendi quod nulli prius Sefeli à Dioscoride descripto respondeat: quippe quoddam amaritudine tantum sit præditum & olfactu cimicum fetorem repræsentet. Lapsus Matthiolum in Ligustico ait in Theone Guilaudius, ut pro quo ineptè eundem, Siler montanum Herbariorum pinxerit, plantam solo seminis odore, qui cimicum est, execrandam. Ligusticum autem, Matthioli in Allobrogum montibus frequens nasci, ac ab incolis, *Ser montanum* dici, suo quoque ascripsit Matthiolo Dalechampi. Quare rem diligentius examinent periti. De Matthioli Ligustico supra egimus.

Ligusticum
cum Dod.

Dod. gall. sub Ligustici veri titulo etiam Ligusticum Matthioli & Lobelij pictum dedit nominisque græcè dixi, *λίσυσις*, & Galeno, *λίσυσις* vocat. Ligusticum, ac alijs etiam Panaces Dioscoridis, quo nomine cognitum ait adhuc Genuæ in officinis: vocarique à Plinio Cuuilam bubulam. Lat. in fol. inscribit nostram hanc plantam, de qua nobis sermo est, Siler montanum, traditque in Liguria haud procul Genua in asperis montis spontè nasci, tum & alibi vulgè: nominare Gallos & Flandros nomine corrupto, *Ser montanum*, officinas nonnullas Sefeleos. Non esse tamen Sefeli, nec Sefelios speciem, sed Ligusticum, quod Græcis, *λίσυσις* à *λίσυσις* siue Liguria nomen acceperit. Respondere Ligustici, quæ apud Dioscoridem, descriptioni: convenire quoque natales, nam in Liguria plurimum nasci. *Is autem*, in Hist. gall. nihil habet de Ligustico, præter Dioscoridis & Matthioli verba & Iconem, quam in lat. mutavit Sileris montani semen non respondet Dioscorideo Ligustico. Nos, uti dictum, latet an Matthiolum per suum Ligusticum intellexerit, Siler montanum. Camer. apud Matth. novam dat Iconem, nomine Ligustici veri, quæ placet pro Silere montano, seminatamen particulatim addita videntur nobis minus convenire.

Dodon.
p.

Sed & Lugd. p. 744. Ligusticum ex Matthiolo pingit, Silerque montanum Officinarum esse ait. Hoc verò multos [ex horum numero est Georg. Pictor] in expl. herb. Emili: esse Sefeli Massiliense existimare, sibi tamen cum Dodonæo magis placere pro Ligustico.

Genninis plantis Sefeleos cognitioni præse restitueris, in promptu est nosse, aliud ab istis esse Siler montanum officinarum [ita vocat in Adu. Lobelius p. 328. in Obs. p. 425. ubi dicit vocat à Matthiolo Sefeli Massiliense, quod falsum: undeque hoc in Belgij hortis latiore semine tractare tradit in Icon. p. 717.] quod retinuerunt bono quidem consilio, ut Lobel. ait, qui Neoterici tantam errandi dejerunt, atque sancienti inobtemperantes, quam Dioscoridis Massiliense Sefeli. Est quippe planta multò majoris acedimæ & effluatioris, quàm vllum Sefeli, eoque mentibus ciendis valde quàm commendatum: folia adl. re. habet, non modò fœntculo, ut Massiliense Sefeli, majora, sed vel Peucedano latiora, ac paulò minùs Ligusticum vel Coronarium Rotmarinum æquantia, molliorem etiam saccharo conditum gustu acris est quàm Æthiopicum, tantò magis quàm Massiliense, cui acrimonia præfert Dioscorides Æthiopicum.

Tom. III.

Cum nullo quidem Sefelis apud Dioscoridem genere, Sefeli vulgè Siler montanum appellatum convenire, etiam Gesn. testatur, ac propterea vel ipsum Petroselinum Veterum, vel optimum ejus antiballomenum esse dicit: Idem autè, Ligusticum, seu Libysticum verum siue veterum Coldenbergij & Emiliij vocat Siler montanum vulgè dictum plerique pharmacopolijs, quod quidem si Sil, vel Sefeli aliquid non sit, Petroselinum esse suspicatur: utpote acrimoniâ & amaritudine insignie. Idem de Lunarijs sui oblitus Sefeli quoddam genus constituit, cujus semen Pharmacopolz Germani Sileris montani nomine vendunt pastoresque Sultenses Tau-ram, *Simelekrant*, appellant.

Lonic. vocat Siler montanum, Sefeli Massiliense, *Welsch steinbrach*, [Saxifragiam italicam dixeris] & Saxifragiam majorem. Sed ignorat illi quid scribat, dicatve: figura etiam non est Sileris montani.

Ser montanum Italis vulgè appellatum semen, cum quadam gravitate odoratum, instat Comini vulgaris, unde quibusdam Platorocyminum, ilatum Cyminum vocatur, Dioscorides Sefeli Peloponense appellat, cujus Plinius quidem non meminit, sed notas, quæ huic conveniunt, Massiliensi tribuit, inquit Cæsalpius; latum enim inquit granum est sulcum.

Quod Clus. in Pannon. & Hist. Siler montanum vocat, Castor verò Sefeli italicum: Hoc fortè Tab. in Icon. Ligusticum verum Dioscoridis inscribit; in Hist. Ligusticum verum i. *Welscher liebstochel*.

Gerard. ponit Iconem à Tab. ex Matthiolo propositam, quam Leusticum vulgare, *Lommon louage*, Ligusticum, & Siler montanum cognominat: germ. *liebstochel*, gall. *Linsche*; sed nullibi legi Siler montanum ita germ. & Gall. denominari: videtur duas plantas confundere. Vocatur propriè germ. *Siler montan*, & *Sermon*; lat. It. & Hisp. *Siler montano*: Gall. *Ser montaine*.

Bauh. phyt. & apud Matth. vocant Siler montanum, Ligusticum Matthioli. Nos contra, nò audent asserere. Ligusticum Matthioli idem esse cum Silere montano, quamvis Icon accedere videatur: quia Matthiolum, uti dictum, ait Sefeli hoc officinarum cimicum fetorem repræsentare: Ligusti verò semen incolas Liguriæ passim in ciborum condimentis adhibere. Præterea Lobel. separat: vellemus patrocinatores Matth. vel exposuisse, vel errorem apud eum demonstrasse, aliorum animadversores sunt leuissimi, quæque carpentes, & interim gravissimos quosque errores in suis glossis non annotantes. Si Matthiolum, existimavit Ligusticum idem esse cū Silere montano, is sibi contradicere deprehenditur, & tanquam cæcus de colore scribere, licet suo more nota jaceret. Idem B. pin. Ligusticum i. quod Sefeli officinarum nuncupat: Siler montanum Trag. Guil. Adu. Lob. & Dod. Ligusticum Matth. Lac. Cast. Lugd. verum Dod. gall. & Tab. Sefeli Massilioticum Cord. in Diosc.

Genevæ Siler montanum inveni in monte Thuri florens mense Junio, & semen maturans Julio, plantam hominem æquantem longitudine. Frequens est montibus Austriacis, at nusquam abundantius crescere meminit Clusius, quàm in eo qui Badenibus thermis imminet. Sermontani planta in Pisanis Alpibus provenit locis viginosis propè rivulos. In Liguria haud procul Genua in asperis montibus spontè nascitur, tum & alibi: In Belgij hortis

Locus & Tempus

tis satum prouenit, sed raro, & non nisi, ubi Æstas feruida, semen perficit.

Vinct.

Sileris autem montani seminis vis exaltatoria, atque resiccans ordine est tertio, Dodonæo autore. Urinas & menses potu ducit: prodest ac intestinorum ex cruditate dolores: concoctionem promouet: status discutit: auxiliatur contra ventriculi inflationes ac tumores, serpentumque morsus. Radix eisdem præbet effectus, sed minùs efficaciter, ut pote minùs, calida, siccaque.

SILER CRETICVM QVIBVSDAM,
semine longo, crispo, incuruo.

Descriptio.

Sileris Cretici nomine datum, semen pulchrum & magnum, pediculo vnciali circiter pendet, semunciam longum, recuruum, crassum fuscum: gemellum, vnum è quinque aut sex costis asperis coagmentatum, alterum simplex, intertexto ad extremum mucronem à pediculi fine filamento: odor satis validus, nec injucundus, cum Cymino satiuo habet aliquid simile, sapore etiam aliquo modo affini.

Gener Cherlerus attulit ex Italia nomine Sileris Cretici, quod satum in horto E. C. prouenit, foliis Cicutæ, ut Camerarius in horto ait, sed latioribus & paucioribus, semine incuruo, grandi, hirsuto & fusco. Et propterea etiam C. Bauh. phyt. & pin. vocat Siler 2. foliis Cicutæ, & Siler Creticum Camerarij.

De hoc ait Bellus in epist. ad Clusium ex Grete Cydonia. Rosmarini folia Selino similia sunt, serrata, floresque in umbellis albi; quibus succedunt semina oblonga, aspera: radice nititur crassa, foris nigro cortice, eoque tenui, vestita, intus albâ, Thus maxime olente: ideo Libanotis legitima mihi videtur, quam Theoph. l. 9. c. 12. descripsit: licet radix sit nigra, quia detracto cortice leui, spectatur maximè alba. Appellatur *ourleupa*, quod vertiginem inducere credatur. Et, ni fallor, Siler Creticum à quibusdam peperam appellatur.

Ligusticum 3. siue Siler montanum angustifolium C. Bauhini.

Caule est tenui, cubitali, in alas brachiato, quæ umbellam paruum albam sustinent, *foliis* paucis, in segmenta angusta, oblonga, peucedani instar (sed longè breuiora, diuisis, quæ in alis, ferè capillacea: prope oppidum Stein Austriae D. Burserus legit.

SILAUS VETERIBVS.

C A P. LXXII.

Silaus Plin.

Silai, quantum nobis constat, solus meminit Plinius, qui l. 26. c. 8. Silaum nasci glareosis (glabriosis CH.) & perennibus riuis ait, cubitalem, Apij similitudine. Coqui ut Olus acidum (Oxylapathum, Dal. Olus atrum vet.) magnâ utilitate vesicæ.

Æquipo.

Cæterum, pro Silao sequentes depinguntur stirpes, ut latius suo quolibet loco dicetur. Aquatica Lobelij, quam Sium minus Dodonæi, quidam Silaum Plinij, esse putant. Phellandriô, aliis Cicutaria palustris, est Silaus Plinij, Cefalp. Apium palustre, à nonnullis Silaus esse perhibetur. Sefeli pratense Monspeliensium Lobelij C. Bauhinus Silaum suspicatur. Silaus confunditur cum herba Sion siue Lauer dicta, quæ & ipsa de

pl uribus prædicatur.

SILAVM QVIBVSDAM FLORE
luteolo.

Descriptio.

Silaum quibusdâ appellatur in pratis aliquib. Sobuia planta umbellifera, cubitalis & sesquicubitalis, *caule* glabro, striato, alis concauo: *flores* umbellati, albicantes: quos *semina* excipiunt, bina juncta, gibba, striata, sapore aromatico, vinoso: *folia* ampla, minutim dissecta, incisurâ ferè Sileris montani, sed segmentis longiorib. paullo, acutioribusq; qua neruulus secundum longitudi-

nem percurrit sapore acri: *radix* longa, digitali crassitudine, foris fusca, intus albâ, in capita diuiditur plerumque, penes terram comosa; sapore aromatico prædita.

An planta à nobis tradita, est Cordi in Obs. silua. Herba Cicutæ foliis & odore: radice crassâ, nigra, perenni, semine in

umbellis Caruo crassiore, quo in quibusdam Galliae & Italiae locis malè pro Ligustico vtuntur.

Hujus figuram Botanicum Francofurt. anno 1552 impressum, pictam dedit, quam Hippomarathrum, *Vildroszfenchel* inscribit. Eandem assumpsit Lonicerus, cui *haanstrang* & Peucedani titulum adscripsit.

Fœniculum siluestre Loniceri H. Lugdunensi, p. 689. (quod Fœniculum silu. nominare ait officinas auctore Ruellio & Lonicerò) & Sefeli pratense p. 752. vna eademque est planta: quamvis apud Lonicerum 1557. editum, non pro Fœniculo, sed Peucedano pingatur. Quale autem Fœniculum officinarum siluestre intelligat Ruellius, neminem diuinare posse credimus. Ita enim brevis & obscurus est ubi de eo, ut ipsi eum nondum intelligamus. Lobel. Iconib. pag. 738. Obseru. pag. 415. & Aduers. p. 428. Sefeli pratense Monspeliensium & Lutetianorum appellat. Clusius Pannon. p. 700. & hist. nominat Sefeli hoc pratense, cui alata adscribit folia, ac abundè in totius inferioris Austriae pratis nasci scribit.

Dodon. latin. in fol. Siler alterum, quod nonnullis peperam pratense aut Monspeliense nuncupari ait.

Tabern. Icon. sub Hippomarathri, Fœniculi siluestris, & Mei inscriptione pingit. In Hist. verò sub Hippomarathri primi.

C. Bauh. phyt. Sefeli 10. pratense vocat: Hippomarathrum verò illud Tabernæmontani, Fœniculum 3. siluestre: & Fœniculum erraticum Matthioli: sic hoc ab illo separans & distinguens.

Obseruavi florens Iunio Basileæ, inter Beffordiam

diam & Than Septembri : Montbelgardi inter
Lisle & Longueville in pratis. In nonnullis pratis
ac humidis locis etiam in Gallia subindè gigni-
tur. In Belgij hortis non infeliciter provenit,
autore Dodonæo. Clusius antè dixit in in-
terioris Austriæ pratis abundare.

Dubita-
sur de vi-
tabat.

Tabernamontanus quia Hippomarathrum esse credidit, ejus vires huic adscripsit, quæ an huic conveniant aliis comprobandum, & judicandum relinquimus.

*Saxifraga Anglorum filii Fœniculi latioribus, ra-
dico nigra, flore candido, semine Fœniculi,
similis Silao.*



Inscriptio

McL.

A B' eximia
dote in frā-
gendo calculo
Saxifragam scire
dixerunt Angli
plantam vdis fa-
miliarem: *foliis*
Foeniculi latiori-
bus, prætensis Se-
seli minoribus,
radice odorā, fo-
ris nigra, intus
albā, Peucedani
facie: *floribus* in
umbellis candi-
dis: *semine* Foeni-
culi: *caule* sesqui-
cubitali & cubi-
tali.

Lobelius des-
criptionis au-

thor vocat Adu.p.352. Obs.p.416. & Icon.p.784.
Saxifragiam Anglorum, facie *Seseli pratensis*
Monspeliensis, h.e.Silai quorūdam.H.Lugd.
 p.713. *Saxifragam umbelliferam Anglorum*. C.
 B.phyt.Daucum.4. siue *Seseli pratensis facie*. In
 pin.miscet tum *Polygono* suo secundo, angu-
 stissimo & acuto, vel gramineo folio, minore re-
 pente, quod nobis *Polygonum* 3. *Dodonæi*, siue
tenuifolium est. Tab. ic. *Hippomarathrum al-*
bum, *Englischer Rosfenchel*. Eid. hist. *Hippomara-*
thrum 1. *Hippomarathrum album*, *Hippomara-*
thrum anglicanum, & *Saxifragiam anglicam*,
versier Rosfenchel, & *Englischer Steinbrech*.

Копей.

Saxifraga Anglicana, si Tabernæmontano credendum, calida est in tertio gradu, & sicca in secundo. Vim habet aperiendi, attenuandi, discutendi & dissoluendi. Et his facultatibus etiā Fœniculum superat. Easdem vires inesse ait & *Silao* quorundam.

CARVIFOLIA.

Defect.

CArui foliam voco herbam, *radicibus* singu-
laribus, pluribus, valdè longis, satis tenui-
bus, intus forisque albis, sapore viroso Corian-
dri virentis, nixam: *caules* emittentibus bicubi-
tales & altiores, Petroselini similes, tenues, stri-
atos non nihil, & glaucos, & angulosos, medullâ
albâ fungosa plenos, ramosos: *folia* partim à ra-
dice statim, partim ex caulium geniculis, quæ
membraneo striato pediculo obuoluunt, oriun-
tur, Cari foliis proxima, latiora, maiora, glabra,
palmo longiora, etiam prima, diuisurâ Pastinacę
siluestris, vel Petroselini vulgaris, longioribus
tamen segmentis (per quæ nervus discurrens

Tom. III.

fulcum exarat) quæ ex intervalis cruces ramo-
sas canaliculatæ rachi annexas æmulantur, sa-
pore acrisculo & nonnihil aromatico: flores pe-
diculis inæquali longitudine, canalicularis, vm-
beliatim digesti sunt, parui illi quidem, & superi-
orâ parte ex luteolo pallescentes & ferè albi, a-
versâ rubentes: quibus decidentibus *femina*
rudimenta purpurascunt, matura verò lata,
striata, similia ferè *Psittacæ Germanicæ* semi-
nibus, glabrâ, aromatica, cum amaritudine & a-
crimonia, minora quàm *Peucedani* pallida.

C. Bauh. in phyt. vocat Siler tertium ; siue *Siler*.
 Caruifoliam lo: Bauhini: In pin. Cardj ; siue
 Caruifoliam: Cyminum equinum & sylu. Trag.
 Fœniculum erraticum alterum, Lon. Peucedanum
 Eid. It. sed hoc malè ; vt & Hippomarathrum,
 Bot. Fran & Fœniculum sylu. Loniceri,
 Lugd. Ea enim nos melius ad Silaum quorundam
 flore luteolo referimus Caruifoliam præterea
 aliam latioribus, & aliam angustioribus
 foliis tradit, quod nos etiam in culta non ani-
 maduertimus.

An *Cyminum equinum* Trago? An eidem
Danci tertia species? An etiam eidem *Cuminum*
silvestre?

Cæterum Caruifolium in Montbelgardensi comitatu florentem inueni mense Septembri inter Blössans & S. Mauritium in dumetis : itidem inter Danpierre & pontem Vauiaucourt. Translata in hortum E. C. aliquot annos durauit, florens Julio & Augusto mense, eodemque semina proferens, ac maturans.

**Locus &
Tempus:**

SION VETERIBVS.

CAP. LXXIII.


SIon aquaticum, referente Dioscoride, inuenitur in aquis, frutex pusillus, rectus & pinguis, qui *folia* habet lata, Hippofelino [Olusatro Corn. quidam *ἐν ὕδατι* alius *ἡδύμυς*] similia, sed minora & aromatici odoris: quæ quidem seu cocta, seu cruda esu calculos confringunt ac expellunt: urinas quoque mouent, ac menses & partus extrahunt. Commoda etiam sunt dysentericis in cibo sumpta. De eodem Sio agens Crateuas, herbam esse tradit fruticis specie, exigua, foliis præditam rotundis [Corn. & Marth. legunt Herbam fruticosam, exigua, habentem multa folia rotunda.] maiora quàm Menthæ, nigra [Orib. *ἀσπράς*] pinguis, & ad Erucam accedentia.

Plinius lib. 21. cap. 21. Sion larius Apio dixit, in aqua nascens, pinguius nigriusque semine, sapore Nasturtij [hæc postrema verba ad alterum Sion, quod Cardamine appellatur, pertinere notavit Cornarius.] Prodesse autem vrinis, renibus, lienibus, mulierumque mensibus, siue ipsum in cibo sumptum, siue ius decocti, siue semen è vino drachmis duabus. Calculos rumpere, atque iis quæ gignunt eos, resistere. Dysentericis prodesse infusum.

Sion in quantum saporem quodammodò aromaticum habere, in tantum etiam calfaciente vi participare, scripsit Galenus 8. simplicium. Discutere autem, & urinas ciere, & calculos in renibus confringere & menses ducere.

Cæterum, fuerunt qui Sion aquaticam Anagallidem, qui Iuncum aromaticum, i.e. odoratū, qui Daren & Lauer appellatint. Quare autem Anagallis aquatica dicta sit, indicat similitudo

Temper.
Galena.

Locus 
Tempus.

Anagallidis: non autem, ut videtur, dubitandum est, quo loco nascatur Sium. Lauer quoque cognominatur, ob natalium similitudinem, quoniam ambobus vita in aquis sit. Quale porro sit Sium, indicat etiam odoratus Iuncus, ob cuius similitudinem, eandem cum Iunco odorato appellationem ab aliquibus adeptum est. Aegyptius rex cognomento Euergetes, in Homeri lectione multum versatus, contra quam Grammatici censent, palustrem plantam Sion cum palustri Apio nasci indicauit. Sic autem cecinit quondam Homerus:

ἀμφὶ δὲ λουμέναις μαλακὰ σῖν' ἢ σάλιναι:

quod ignorantes aliqui eo tempore non sive, sed sive, quod est Viola, legi oportere contendebant: contra quod rei peritus rex Sion, non Violas cum Apis in irriguis pratis nasci in emendato Homeri carmine voluit, non leui argumento nec indigno teste, palustre Sion esse, verumque quod Dioscorides, ait, in aquis nasci & inueniri. Idem autem hoc Sion a Romanis Lauer dici, refertur in notis Dioscoridis. Meminit autem Laueris Plinius, non tamen idem Laueri in eo Sion est. Hoc enim, autore Dioscoride, odoratum est, Lauer nullo odore commendatur. Quaecunque autem Sion sit, non adeo dissimile Apio describitur. Nec est, inquit Marcellus, quod miretur aliquis incertitudinem tantam in Sio: cum nec quondam flore Græcorum fortunâ cognoscetur.

Sion esse eam herbam, quam Germani *vuasser* & *vuasser Eppich*, Sion umbelliferum, h. e. Apium aquaticum vocant, credit Cornarius. Quod autem idem Lauer appelletur, & sit hoc de quo Plinius lib. 2. c. 8. ait, Lauer quoque nascens in riuis condita & costa torminibus medetur: in siluis nascitur glareosis & perennibus riuis, cubitalis, Apij similitudine, coquitur ut olus atrum, magnâ utilitate vesicæ: maximè ambiguum quem ibet facit hoc, quod neque Sion, hoc appellari, neque in Sij huius tractatione, id Lauer dici meminerit, quum tamen alias talia prætermittere non soleat: ut ita videatur omnino alia herba esse Lauer, ab hac quam Diosc. & Plinius Sion appellauerunt. Nec satis est ad probandum quod una & eadem sit, ex eo quod inter suppositas appellationes apud Dioscoridem Lauer siue Lauer de adscriptum habeatur. Quin et si ea quæ Berula officinis quibusdam vocatur, Lauer esse credatur, sicut sunt, qui pro certo id affirmant, ita ut ex diminutiua voce Lauerula, refecta primâ syllaba, remanserit Berula: tamen neque sic Lauer idem quod Sion esse ostendit Marcell empiricus c. 36. ubi latinè Berulam dici ait, quam Græci Cardaminem vocant, de qua alibi egimus.

Diosc. not.

Dioscoridem de iisdem plantis non raro in diuersis locis pertractasse ait Guill. in Theone, ignorantemne an verò abundè diligentem non asserit: exemplum dat Sion Crateuæ, & Sisymbrium aquaticum.


Æquiuoc.

Sij autem nomenclatura sequentibus attribuitur plantis: Scilicet Sio umbellifero, & Sio maximo latifolio. Oenanthæ aquaticæ. Phelandrio: Cicutæ aquaticæ Gesneri. Anagallidi aquaticæ. Anagallidi aquaticæ alteri tragi. Samolo Valerandi. Sio Crateuæ Erucæ folio

Barbarea dicto. Menthæ verticillatæ, à Tra-

go. *

SION VMBELLIFERVM.



Sij umbelliferi radix multarum aquaticarum instar geniculatim incedit, demissis subinde fibrarum comis longiusculis, odore & sapore Sisari: cubitum longa, longo pediculo striato, glabro, intus cauo appenda, ex pluribus singularibus foliis pinnatim dispositis constant, Pastinacæ Germanicæ similibus, minus

Descript.

rugosis: quæ verò in caule sunt, minora existunt: cæterum caules fœniculacei sunt, aut Petroselinis, striati, inanes, ramosi: flores minuti, candidi, umbellati, Petroselini, subiectis ad umbellæ basin foliolis aliquot angustis: semen paruum, odoratum, acre.

Ostendisse autem suâ iam ætate Herbarios pro Sio Dioscoridis, dissimilem hanc penitus, fœniculi foliis, altiore crassiorèque caule: grandi in summo umbella, fœniculo non dissimili, sed consertiore: colore in cunctis albicante dixit Marcellus.

Tragus lib. 1. cap. 155. cum vulgari Apio hanc confundereprehenditur, Apiumque secundum [das ander Eppf.] facere, licet pro Sio odorato pingat & describat.

Apium aquaticum f ita namque vocauit hanc nostram plantam J esse eam herbam, quam Dioscorides Sion dixit, credidit Cornarius quidem, sed quod idem Lauer appelletur & sit Plinij, ambigit, ut præcedenti capite videndum.

Apium aquaticum Corn.

Fuchs. inscripsit Apium palustre, & rusticum, Græcè ἐλαιοσίλον ἢ ὀδρανσίλον, quod in paludibus & aquosis locis proveniat. In Icon. Sij primum genus Lauer vulgò dictum inscripsit.

Apium palustre Fuchs.

Matthiolum in epit. anni 1571. Sium pingit eaulè recto, expansis foliis per ambitum serratis, Smyrnio similibus, sed minoribus & odoratis, Aniso non dissimile. Eos autem errare ait, qui Plinium secuti aquaticum Sisymbrium Sium esse censent. In comm. cum mag. fig. Sium tradit folio Macerone simili. In Hist. germ. videtur describere Sion umbelliferum: Icon tamen diuersa, nempe olim siliquosi. Cam. apud Matthiolum. Sij veri titulo elegantem proponit Iconem.

Sium Matth.

An Monachi in Mef. dist. 1. cens. 5. de hac dicunt, Sion propriè est illa herba, quæ vulgari vocabulo Romæ Channæa vocatur, & ipsum est verum Lauer.

Hispanos adhortatur Amatus, ut caueant, ne herbam hanc in aquosis nascentem, quam Rabarrias appellant, Apio vulgari simillimam, palustre Apium esse credant, quia ut ait Sion est, quod non absque errore (ut bene etiam annotat Turnerus) Bachpungen cognominat: figuram autem habet ex Fuchsio.

Mixor, inquit Turnerus, Matthiolum in siliquis

quis parvis semen Sio tribuere: cum omne Sion mihi in Italia, Germania & Anglia conspectum, semen in umbella ferat, Apij modo. Verum itaque Sion ab illo propositum non existimo.

Lacuna pro Sio figuram habet Matthioli, quæ sanè multum differt summitatibus florum ab Amati Sio, cui umbellæ, & non Nasturtij aquatici siliquæ.

Sium
Gesa.

Gesn. hort. vocat Sium juxta Basileam. Is in suo Anguillara epist. 18. annotarat, Silaum Plinij omnino ejus Sium esse. Apud Cordum in Diosc. refert Sion, quod Germani *Flein vassermerck* vocant, Romæ in acetaria venire, vocarique Ranellam.

Lauer
Cratena
Dod.

Dod. gall. inscribit Lauer Crateuæ & grande Berle (h.e. Lauer magnum: assignat enim & minus Lauer, *petite Berle*, quam Oenanthem aquaticam vocamus.) Idem de frument. & in fol. novam habet figuram ejusdem tamen plantæ, Sij titulo, de quo ait, Germanorum plerique *vasser Eppich* *frosch Eppich* (Fuchf. in Icon.) *Bawen Eppich* *Bruppen Peterlin* & quidam *Bynenkraut* Trago: Belgico idiomate, *vwater Eppe* nominant, h.e. gall. *Perfill* aut *Ache d'eau* i. aquaticum Apium, aut Hydroselinon quis dixerit: Galli quidam *Berle* & *Hache de maretz*, Fuchf. Itali *Sio* & *Gorgo-lestro*: Cæalp. *Crescione* & *Herba Cannella* Hilp. *Rabaças*. Plinio ac Latinis Lauer: Dioscoridi *cin* est: quod in vetustis ejus exemplaribus, Anagallis aquatica, & Iuncus quoque dici odoratus legitur: vnde occasionem sumpsisse videntur, qui Anagallidem vulgò dictam aquaticam, verum Sium esse perperam existimarunt.

Nomina
linguar.

Lob. Adu. pag. 71. & in Icon. p. 108. vocat Sion siue Lauer (ita etiam Obs. p. 105.) Dioscoridis, Olusatris folio, siue aquatica Pastinaca. Nulli dubitandum affirmat, quin sit verum Dioscoridis Sion, etsi Dodonæus hallucinans Crateuæ Sion fecerit, in Hist. sc. gallica. Lonic. appellat Apium palustre.

Dodon.
carpitur.

Lugdunensis carpit Dodonæum, quod Sion hoc umbelliferum, perperam Sium majus Crateuæ dixit, cum non Crateuæ, sed Dioscoridis sit verum Sium. Id quod ipsum in Hist. aquatiliū agnouisse refert. H. verò Lugden. tres figuras dedit vnius plantæ. Primam pro Sio vero Matthioli: alteram pro Sio Crateuæ, majore Dodonæi, p. 1092. & tertiam p. 701. pro Apio palustri Fuchfij. Sium autem nomen sibi ascripsisse traditur *ὁ πρῶτος*, ait, h.e. à concutiendo, quia quatitur, vacillandoque perpetuò succutitur præterlabentibus vndis, atque semper alluentibus. Vnde etiam Laueris nomen Latinos deduxisse scribit, nisi quis malit ab vrinis calculisque ciendis & excutiendis dictum.

Sium mi-
nor Tab.

Tabern. Sij quatuor species agnouit, quarum hoc, Sium primum & minus nominat, ejusque Dioscoridæ & Plinium meminisse scribit, ac appellari græcè *σίον*, ἀνθαλαλὴν ἐνὺδρον & ἀρίστην. Lat. Sium & Plinio Lauer, ac etiam Angallin aquaticam & Darenium à Dioscoride: ab Herbariis Sium odoratum ad differentiam Sij alterius, vel etiam quoddam aliqui Anagallidem aquaticam ita nominare soleant. Vocari præterea Apium aquaticum, & fontanum: itemque Apium aquaticum seu fontanum minus, & Pastinacam aquaticam, ob hujus foliorum similitudinem. Aliis dici Berulam, Ranellam & Lauerulam: Auicennæ Pupillam oculi, Sumium & Chare alhayn: aliis Arabibus *Rorcarthalmi*, *Inhamelbauella* & *Hamelbaulga*: Bohemis *Pos ocunk*, Germanis, *vasserpeter-*

Tom. III.

lin vassermerck Plura nomina vide antè.

C. Bauh. phyt. vocat Apium i. siue palustre alterum, foliis oblongis serratis, & Sion Dioscoridis: itemque *ελεσθῆνον* Dioscoridis, Theop. & Plinij quorundam Is apud Matthiolum pro Sio vero ejusdem, posuit iconem Sij medij Tabernamontani. Notatis in animad. Lugdunensem quoddam Apij palustris Fuchfij nullo verbo in contextu meminerit: quodque præterea vitiosam Mattholi figuram habeat cum descriptione ex Lobelio: itemque iconem Lobelij cum descriptione Dodonæi: tres denique figuras & duas descriptiones vnius plantæ.

H Lugd.
nos.

Sij nostri umbelliferi, duplex genus assignat Cæsalpinus: dum ait, alterum scilicet caule infirmo, alterum caule crassiore: &c. Crescitionem & Herbam Canellam nuncupans.

Sium um-
belliferum
duplex

Sion umbelliferum vocant Monspelij Berlam: ibi copiosè provenit in aqua, vti Patavij, & inter Veronam & Casteifranc. Geneuæ inter pontem *Arue* & *Lanci*, & quæ itur *Chastelaine*, aliisq; locis: Montbelgardi in fossis vrbis & prope *Dampierre* ad Dubim copiosè.

Vires &
vires

Sion, vt vult Amatus, herba sic dicta, quod excutiendi vires habeat, hanc crudam ex aceto mulieres & pueri ineunte Vere comedunt Nam post aduentum autis Cuculi dictæ, non amplius herbam esui aptam, mulieres Hispanicæ distillant, imò illam inutilem, & tanquam ab aue dicta affectam prædicant. Est autem stomacho admodum grata, vrinam euocat, & vesicæ calculos expellit. De ejus viribus etiam scripsit Lobelius: sed tam ambigè, vt non solum in iis dicendis sibi parum constituisse, verum etiam id vix cognouisse videatur.

Matth.
nos.

SIVM MEDIUM.



Caulibus, floribus & seminibus *Antibus, floribus & seminibus* *priori simili-* *bus est, singulis tamen mul-* *to majoribus:* *odor etiam* *gravis, nec ita* *gratus, vt prioris,* *Petroleum* *quodammodo* *respiens, vel* *bitumen*

Tab. hist. vocat Sium 2. siue medium, *vasser peterlin* *vasser peterlin*, & Pastinacam aquaticam medium siue palustrem.

Synonj

In Iconibus ejusdem Sij medij imago, male transposita est, sub hoc titulo: Sium majus latifolium, Apium palustre, *grosse vasser Pastinach*. C. Bauh. apud Marth. ponit hanc Tabernamontani figuram pro Sio vero Matthioli, & Tabernamontani latifolio, nō animaduertens in iconibus Tabernamontani, transpositum titulum.

Gerardus capite de Nasturtio aquatico, tertio loco ponit iconem Sij medij Tabernamontani: verum confundit Nasturtium aquaticum cum Sio umbellifero.

Abundat in Germania, Gallia, Brabatia & Gel-

P 3

horto priusquam caulem ferat, longa, pedalis, juniori Pastinacæ latifoliæ germanicæ similis, corvix tenui flavescente, carne candida, fungosâ, odoris grauis, sapore subdulci.

Myrrhidi autem caule & folijs similem esse Cicutam perhibet cum Dioscoride etiam Plinius, qui licet & flore parem dixerit, sed minore tantum & exiliore, tamen alibi Myrrhin similem Cicutæ ait, folijs minoribus & caule breviori, rotundo.

De Cicutâ inquit Dioscorides: caulem producit geniculatam, ut Fœniculum [*μαράθρυ*] magnâ: folia Ferulæ [*ράθυ*] similia, sed angustiora & graueolentiora: in cacumine propagine & umbellâ: florem subalbum: semen simile Aniso, sed candidius: radicem cauam, non profundam.

Anguillara Dioscoridis textum corruptum esse existimat, & legendum pro *μαράθρυ*, cum Plinio Coriandri, & pro *μαίλα*, radice, *λαύρα*, ut habet Cræna.

Indicum
de Iconi-
bus.

Nostra Icon. ex Fuchsiâ minùs placet, folia enim nimis incisa. Gesnerus apud Cordum in hist. assumpsit figuram Tragi, non admodum laudabilem. Lobelij Iconem Cicutæ posuit Clusius pro Cicutaria vulgari.

Cicutam in solo pingui propè vrbes caule bicubitali tradit reperiri Cæsalpinus, flore graueolente, semine, candido, & crassiore Aniso. Eandem inueniri in Alpibus, brevioris & odoratioris, simili semine.

Cæterum, auerunt Cicutæ famam Athenienses, Philosophorum non contemptores modò, verùm etiam hostes, succo ejus ad mortem in publicis judicijs vtentes, ut suo damno vel Socrates testari potest, quem ad Cicutam hauriendam compulerunt. Alioquin indigna erat herba, quæ omnium Poëtarum carminibus, & sapientum commentarijs inueniretur. Sed hæc est omnium fortuna rerum, ut aliquando ex usu, gentiũ honorem, & quam possunt gratiam inuenerint. Factum id tunc in Cicutâ est, quæ neglecta modò & incognita multis jacet. Mutatæ enim leges, & pœnarum insceleribus rationes pecori herbam relinqui cœgerunt, quæ quondam malo hominis fato nascebatur.

Non erimus in hujus historia longiores. Quod enim satis est, ab herbarijs omnibus cognoscitur Fœniculi caule, folio Ferulæ, aliisque à Dioscoride descriptis notis. Aptius tamen Plinius, ut Maranthæ videtur, Coriandri folijs comparat, quàm Ferulæ angustioribus.

Appella-
tiones
varie.

In Cicutæ capite plures à principio nothæ appellationes. Sunt enim quibus *Æginos* [*Angynon* Marcell. & alijs] quibus *Echula*, quibus *Apolegusa*, quibus *Dolia*, quibus *Amaurosis*, quibus *Paralysis*, quibus *Aphron*, quibus *Creidion*, quibus *Cæten* [*Coiren*, Marcell.] quibus *Cathechomenion* [*Catheomenion* Marc.] quibus *Abioron* [*Abroton* Marcell. sed malè nostro iudicio.] quibus *Apsendes* quibus *Ageomoron*, quibus *Timoron*, quibus *Polyanodynos*, quibus *Daidanis*, quibus *Gatapyxis* dicitur. *Osthannes* *Babaty* nominat: *Ægyptij* *Apemphi*. Sed hæ appellationes quàm vetustæ sint, licet pro comperto esse dicat Marcellus, paucaque ex tam multis facilem intellectum habere profiteatur. At tamen Tragus hæc sanè vniuersa ferè nomina Cicutæ inde imposita esse autumat, quod & homines & pecora interficere possit immensa suâ frigiditate, quod & experientia & Nican- der in Alexiphar. testatur.

Nomina
Anguar.

Græcis *μαίρα*, Latinis, ut Trag. Matth. Angl.

Fuchf. Dod. Turn. Lac. Add. Lob. Cast. Lugd. Cæf. Tab. & Germ. Cicutâ planta à nobis exhibitâ, vocatur: *Gesh.h. & Thal.* Cicutâ vera: *Cordo hist. & Cam.* Cicutâ major: *H. Lugd. p. 788.* Cicutâ Marthioli: *C. Bauh. phyt. & pln.* Cicutâ i. major: *Clus. hist.* Cicutâ vulgaris: *Germ. Schir- ling, wurgerling, Wueterich, & wuest scherling,* itemque, *Zigerkrant, Matth. & kelber* *Cordo in Diosc. l. 4. c. 116.* Belg. *Dulla kerust, Scheerlineck:* Gall. *Cigue, Segue & Coque* Matth. It. Cicutâ: *Hisp. Ceguta, vel Canaheta, Angl. bomblocke* *Boleblauv:* Hung *Beurok*

Cæterum Cicutæ nomen etiam plerumque apud poëtas sumitur pro calamo pastorali ut patet ex Lucretio lib. 9.

Agrestes docuerunt canas i. stare Cicutas.
& ex Politiano.

Ecce Syracusiam tentas inflare Cicutas.

Ex his autem colligere est, Poetas Cicutam Epithetis cognominare, cauam, pastorem, leuem, argutam, Syracusiam à Theocrito pastore Syracusano: tenuem, querulam, rancam & triuialem: itemque fragilem: Quia potè herba est venenosa, ac priùs seculo inuisa, propter publicam Atheniensium pœnam, qui ad hauriendum Cicutam cogebant delinquentes, mortisque deuoto: idè mœstam, diram, suam, ac lethiferam dixit: Poëtæ. Sic enim Laur. Lippius:

Rustice lethiferam monco vitare Cicutam.

Itemque gelidam. Nam qui eâ necantur, incipiunt frigere ab extremitatibus corporis. Et hinc Festus aiebat.

quem carcere cæco.

Sorbisio gelida rapuit porrecta Cicutâ.

Detegendum hic ex Angelo Politiano erratum in codicibus Plinianis, super Cicutâ, vinòque. Quodque mendosè apud Macrobiũ [*mendo fortè exemplarium*, lubrico de Conio in Aconitum lapsu] Aconitum pro Conio. Verba itaque ex Epist. Androcidis ad Alexandrum Magnum, vitiosè posita in Plinianis codicibus reperiuntur hoc modo: Vinum potaturus rex, memento te bibere sanguinem terræ. Sicuti venenum est homini Cicutâ, ita & vinum. Leuis profeq̃ sententia nimis (que violenta, & coacta: addo etiam insipida, falsaque, vinũ esse hominĩ venenum, sicuti Cicutam. Sed enim in vetustissimo Medicæ familiæ Pliniano codice, sic inuenias: Cicutâ homini venum est, Cicutæ vinum. Nam ut hominem Cicutâ, sic Cicutæ virus meri potus extinguit. Ex eoque persuadere Alexandro nititur Androcides, ut tanquam re potentissima parcĩus vtatur vino, quod veneni venenum sit: &c.

Et hæc de Cicutæ appellationibus dicta sufficiant, si tamen priùs monuerimus, nos æstimare Vitium Apij idem esse cum Cicutâ: in eo tamen differre quod Vere oritur Vitium Apij, Cicutâ Autumno, propter quod etiam formam mutare videtur. De hac tamen separatim mox dicemus, sub Cicutariæ Apij folio denominatione.

Circa pagos & Oppida Cicutâ passim abundat, locis vmbrosis & pinguibus, propè fossas aggeresque agrorum, pratorumque sepimenta. Cum floribus Iulio; semine prægnantem Augusto ac feriùs videre est, & nonnunquam per totam Hiemem virentem folijs suprà terram expansis.

Dioscorides Cicutæ vim exitiosam & multum in Medicina vsum, sic declarat. Est & Cicutâ in

Locus.

herbaliū venenorum genere, quippe quæ vi suā refrigeratoriā enecat: merum verò remedio est: succus exprimitur contusis cacuminibus, priusquam semina comæ siccescant, qui Sole dentatur in pastillos: multo ad medendi rationem vltus est aridi: commodè miscetur collyrijs, quæ leuandi doloris gratia temperantur: ignes sacros & vlcera quæ serpunt, illitu restinguit: herbæ coma trita, & restibus circumlita, libidinum imaginationes in somno compescit: sed genitale resoluir, lac puerperarum mammis apposita extinguit: in virginitate mammas cœcet, & increlere non patitur: puerperis præstat, vt eorum testiculi alimentum non sentientes, intabescant. Porro de signis sumptæ Cicutæ & remedijs folijs agit his verbis. Cicuta pota vertigines excitat, & oculis caligines offundit, ita vt ne tantillum quidem cernatur: singultus etiam ciet, ac mentis alienationem & extremorum artuum perfrigerationem infert. Tandem vngri consulti arteriæ spiritu inrecepto strangulantur. Quare inter iuicia, vti in reliquis, Cicutam vomitu excutimus: postmodum dejectionem molhemur, vt quod ad intestina prolapsum fuerit excernamus. Tum demum ad meri portionem, seu prætentissimum auxilium, deuenimus, idque interiectis intervalis, in quibus proderit lac asinum aut bubulum potui datum, aut Absinthium cum Pipere & vino: item Castorium, Ruta, Menthaque cum vino, aut Amomi, Cardamomi, vel Stryacis drachma: aut Piper cum semine Vrtice ex vino, aut denique Lauri folia. Præterea Lascipitij succus ex oleo & passo. Sed & vinum dulce per sese largius potum egregiè auxiliatur.

Plinius.

Plinius de Cicuta consentanea tradit cum Dioscoride. Cicuta quoque, inquit, venenum est, publica Atheniensium pœt à inuisa, ad multa tamen vltus non omittendi. Semen habet noxium. Caulis autem & viridis estur à plerisque & in patinis. Radix nullius vsus. Semini & folijs refrigeratoriā vis, quæ si enecat [citò necat. Incipiunt, &c. M.] incipiunt algere ab extremitatibus corporis. Remedio est priusquam proueniat ad vitalia, vini natura excaletoria. Sed in vino pota, irremediabilis existimatur. Cicuta, inquit Galenus; quod extremè refrigerantis sit facultatis, omnes norunt. Sed nō vbi que similiter perniciosam esse tradunt auctores. Theophrastus enim scribit Thraſyam Mantinensem ad venenum conficiendum censuisse fumendam Cicutam non vadeliber, sed ex Suis. Et alibi dixerat Homeri testimonio, optimam esse Cicutam circa Susa, & in frigidissimis locis. Dioscorides maximam effracillimamque vim Creticæ tribuit, Megalicæ, Atticæ, & in Chio ac Cilicia nascenti: Plinius, natæ Susi Parthorum [Cornarius legit Finibus Parthorum. Susa enim vrbis Parthiæ:] mox Laconicæ, Creticæ, Asiaticæ: in Græcia verò Megalicæ, deinde Atticæ. Matthioli non adeo exutiola esse in Italia tradit: eamque in Hetruria, si asini depascantur, non extingui, sed profundissimo somno tantum & torpore corripit, vt non solum stupidi, sed planè mortui videantur. Id quod aliquando rusticos fefellerit, nam dum asinis, quos extinctos credebant, pellem ad vsum detraherent, accidit mirum, quod in medio serè operis asini exspectati sunt, non sine magno excoriatum terrore, atque ingenti spectantium risu. Perniciosum quoque virus tam foliorum, quam radicia Cicu-

te huius pro Pastinacæ & Carotæ radicibus, illorum pro Petroselinij, folijs imprudenter comestorum, historijs confirmant idem Math. Comment. in l. 6. Diosc. Tragus, & alij. Idem Tragus Auleres, cum primū Cicutam degustarint, insanire ac furere scribit.

Flos Cicutæ, inquit Cæsalpinus, ita grauiter olet, vt propè accedentibus, quasi murium sector videatur, & digitis obuersantibus capitis grauitas accedat: seminis esu aues obstupeſcunt vt manu capi possint, & si amplius vertigine tentantur, moriuntur.

Cæterum, exhibet Aetius, præter Dioscoridis antidota, Cicutam haurientibus, Aplij semen ex vino potandum, aut Iridis radicem, aut Sefeli Massiliense: Item Nitrum ex aqua copiosiore potum, & præsertim præcordia: quamobrem ad vehementiorem motum, ac cursum [vt ipse inquit] cogendi sunt ægrotantes. Conciliator tamen theriacam maximopere commendat, durum drachmarum pondere, ex Diamni decocto potam: aut Gentianæ radicem ex vino. Namque hoc Cicutæ verum esse antidotum putat. De Cicutæ viribus consule Langium epist. med. 69.

Antidota
Eti.

CICVTARIA APII FOLIO.



Pro plantæ ratione, extigua est radix, alba: caulis bicubitalis, serè minimi digiti crassitudine, longis internodijs distinctus, lœuis, striatus, colore viridi, subrubente, nō tamen vt Cicutæ maculosus siue guttatus: folia Cicutæ, quorum singularia propius ad Petroselinum accedunt, atrouirentia, odore nullo, vt nec

Descriptio.

sapore vilo eccellente. Umbella cum Cicuta conuenit: semen gemellum, Cicutæ par, canulatum.

Tragus scribit Cicutariam Apij folio Vitium Petroselini esse, aut certè aliqua ratione ad Cicutam pertinere. Cord. H. Cicutæ minoris titulo describit. Dalechampius apud Plinium Cicutam Apij hortensis specie dixit. Lobel. Obs. p. 423. Icon. p. 260. Cicutariam factuam. Schvvenckf. Apium cicutarium, bundt Peterlin, Stuckguder Peterlin: Batileenses, katzm Peterlin.

In Silesia abundè luxuriat in hortis oleraceis maximè cum Petroselino, cuius vitium dixit Tragus.

Locus.

Venenosam & perniciosam esse plantam, testatur Dalechampius, dicens: Esu Cicutæ, quæ Apij hortensis specie incautum fefellerat, ego quendam noui ad extremum vsque vitæ dementem factum.

Vitus.

CICV:

CICUTARIA VULGARIS.

Deser.

Radix crassa longa, multis adnatis donata, alba, potissimum internè, sapore acri & aromatico: *caules* proferit cubitales, & altiores, inane, hirtutos, nonnihil rubentes, cannulatos: *folia* Cicuta foliis proxima, latiora, odorata, sapore aromatico, & lendentia, aqersâ parte subhirsuta: *strobili* in umbella candidi, quorum singuli quinis foliis constant, supremo reliquis maiore: *semen* Chærefolii vel Antrisci quorundam, longum, striatum, tenue, spiceo colore lucens.

Chærefol.
sive Trago

Tragus vocat Chærefolium 2. & Chærefolium silvestre, iudicatque esse Cicutariam, quam Dioscorides Myrrhidem cognominat. Satius autem Chærefolio consimile facit, nisi quod caules gignat Pastinacæ respondentes. Cæterum, magnitudine totius substantiæ, omniumque partium, odore etiam & gustu, satium superare ait. & interdum in proceritatem Cicuta assurgere, radicemque quotannis novos emittere asparagos.

Myrrhis
Fuchio

Fuchius hanc Myrrhidis titulo pinxit, dixitque vocari Græcis *Μοΐσην ἢ Μόψαν*: Latinis Myrrhin, vulgaribus Herbariis Cicutariam, quod sc. caule & foliis Cicuta similima sit. Quâ similitudine quosdam deceptos, veram esse Cicutam putasse, cum tamen ab ea, viribus potissimum diuersa sit. Germ. Wilder forffel appellari: Gall. verd Persil & Asne.

Lappus
quorundamDod. gall.
taxator

Dod. gall. Fuchii figuram assumpsit, Myrrhidemque inscripsit, licet descriptio non quadret, neque nomina, quæ veræ Myrrhidis sunt. Aliam & meliorem iconem in foliat. pro Myrrhide exhibet.

Myrrhis
Fuchio 18.
Lugd.

H. Lugd. p. 751. vocat Myrrhidem Fuchii. De hac ait Matthiolus in Diosc. Gignitur in quàm plurimis Italiæ locis planta quædam Cicuta faciem representans, minor tamen minusque graueolens, Cicutaria nonnullis vocata, quam quidam legitimam Myrrhim censent.

Cicutaria
vulgaris
Clusio.
Error
quorundam
An Myrrhu
nominum

Clusius Cicutariâ vulgarem appellat: verum hoc nomine Cicuta Lobelii iconem habet. Gesn. Cicutariam, & Cicuta similem herbam, innoxiam, quam imperitos pro Cicuta accipere ait. Bauh. phyt. est Myrrhis 4 silvestris:

An Corn. Myrrhis & Wilder forffel/ferberfern Germanorum. An Cordo in Diosc. Herba minimè venenata, Cicuta nomine in pharmacopolis prostant, semine longo & gracili: Item Myrrhis umbellifera, Cicuta valde similis, nascens iuxta arbuta, Germ. Büschmören & nonnullis felberfern appellata: An Amato Myrrhis, vulgè Cicutaria, ubique obuia, apud Salmanticenses abundans.

De hac Turnerus hæc scriptis mandauit. Dotis plerisque Myrrhis putatur Cicutaria dicta vulgè. Eisdem tamen dubitare video, aut perfectè nescire quæ planta sit Cicutaria, inter quos est Amarus, qui etiam affirmet Myrrham esse Cicutariam, tamen cum professus sit Hispanica, Italica, & Gallica nomina docere, quod & facit passim, ubi nouit, hinc Germanico solo contentus est, perinde ac si diutius in Germania, quàm Hispania aut Gallia vixisset, aut locupletior esset lingua Germanica iam dictis, aut Germani Cicutariæ nomen inuenissent, reliqui nullum. Matthiolus quoque hand obscurè videtur ambigere, vtrum Cicutaria sit Myrrhis, nec ne? Inquit enim, planta est vulgè in Italia Cicutaria dicta, Tom. III.

Cicutaria
vulgarisHalluc.
mat.
Myrrh.

quæ Myrrhis putatur: & paulò post: si Myrrhis in Italia prouenit, &c. Ego hætenus nullam melius descriptioni respondentem inueni eâ quam hic propono. Ex quo videtis nondum penitus cognitam. Dux sunt, de quibus dubito, vtra sit Myrrhis. Vnam Angli nuncupant Cassheo: prouenit in pomariis inter gramina sub arboribus, Cicuta persimilis, quam nulquam copiosiorē vidi, quàm in pomariis aulæ Pombracensis Cantabrigiæ. Altera parum à prædicta differt, nisi quod in siluestribus proueniat citra sepes & in pratis, breuior præcedenti, foliis hirsutioribus, Chærephyllo similibus: vnde Mos Cheruel appello: adulta tamen Cicuta similior est, adeò ut, quantum ex figura licet iudicare, eadem sit cum Myrrhide Matthioli, Fuchio Wilder forffel dicta.

An de hac Cæsalp. ait, Cicutaria in collibus nascitur locis humidis Cicuta similima: sed breuiore caule, striato &c.

Montbelgardi passim abundat in hortorum pratis arboribus consiliis, multum se propagans radicibus, ac propterea extirpatu difficilis, gramenque multum suffocans. In omnibus verd iis, quas Clusius adiit, regionibus spontè crescit, non modò graminosis hortis & pomiferis, sed & aridioribus quibusdam pratis, florens Maio.

Chærefolium silvestre ad ducendos menses Chærefolio efficacius esse in vino decoctum ac potu ac aduersus pestē aliæque venena epoti facere traditur à Trago. Nos autem non consiliamus ulli, ut imitetur eum, qui Myrrhidem existimans, eam internè exhibeat, quia venenatam plantam suspicamus. Duas familias colligere Pastinacæ Germanicæ hiemali tempore, his fortè fortuna offenderunt foliis destitutas, ex quorum esu licet paucos, inciderunt in grandia symptomata suffocationis, torporem, ac insaniam, ita ut ebrios uerius exprimerent. Horum autem unus per integrum diem non potuit excitari: qui vomebant, facilius liberabantur. Curavi verd hos uomitu primò, dein int. os per cochlear argenteum, instar lagenulæ paratum, puluerem saxonicum &c. iniiciebam. Prima familia fuit intoxicata a non 1572. Mater quidem cum filia in iure comederat radices pro Sisaro maiore quorundam, siue Pastinacæ Germanicæ, cui radices habet similiores, quàm Cicuta, ea etiam frequentior in hortorum pratis. Symptomata apparebant, qualia Dioscorides Cicuta tribuit. Filia reiectis radicibus per vomitum, statim bene habebat. Sequenti die vocatus ad matrem ei Diaphonicon cum Mithridatio propinavi & conualuit.

Vires

Consilium
austriumComprehensio
tarbisse
plantam
esse venenatamCICUTARIÆ QVODAMMODO SIMILIS
vel Chærephyllo accedens.

Bicubitales & altiores sunt *caules*, glabri, in ramos diuisi, per quos *folia* Chærephylli, tenuis tamen dissecta, vel potius Phellandrii Dodonzi, verum hirsuta: umbellæ minimæ *strobili* albis compactæ: *semina* bina hispida, alpera, sublonga, longiora quàm in Antrisci specie altera, à cuius seminibus faciliè discerni possunt, non enim ita aspera, minora, & acutiora: *radix* alba, fibrosa, odore & sapore aromatico, non tamen vsquequaque grato, ceu & foliorum.

Deser.



Locus & tempus.

Hæc planta
nō malè expri-
mitur per figu-
ram Guariniana,
quæ apud Fuch-
siam posita est
pro Cicutaria:
quamque hic
ponimus: radix
tamen non ita
longa.

An Daucoides
minus Cordi?
An Bauh. phyt.
Caucalis 6. [7.
pin.] semine al-
pero, flosculis
subrubentibus?

Cicutariæ quo-
dammodò simi-
lis nostras a-
bundat iis locis
Genève, in

quibus Cicutia provenit: floret & semen fert
Majo & Junio. Bedfordiæ iuxta muros arcis, cau-
lescentem obieruavi Aprilis principio.

CICVTARIA LATIFOLIA HIRSVTA.



Desct.

Dum cu-
bitorum
& altior est
caulis striatus,
concauus, pilis
obtus, ad ge-
nicula singula
folio donatus
quoquoque
sesquipalmari,
trifariam pri-
mum diuiso,
cuius diuisione
deinceps
singulares ad
Myrrhidæ ac-
cedunt, sed la-
tiores, rariores
hirsutæ supra
subtusque po-
tissimum per
nervos venu-
lasque asperse,

veluti & per pediculos: umbellæ magnæ in plu-
res alias minores diuise. flosculorum candidiorum,
aliquando suæ purpureorum, aut potius ame-
thistinorum: sub quorum pedicellis foliola acuta
quaquaversum radiata: flosculos singulos se-
quuntur semina bina iuncta, bicornia, longa, quæ
relieto stylo medio facile dissiliunt, deciduntque,
odor & sapor aromaticus subacris; sed ille quàm
hic gravior & suauior: radices crassæ, oblique,
perpetuæ, aromaticæ.

An Cord. Hist. Pitynspermon à resinaceo se-
minis odore saporeque nomine efficto.

Meminit Gesnerus hanc herbam locis Helue-
tiorum montanis inuenisse & in horto plantas-
se, foliis Cicutæ, semine oblongo.

Pitynsper-
mon Gudo
dictum

An Lob. Adu p. 327. vocat Myrrhidæ alteram?
acita describit: Cicutariæ odore, siue Myrrhidis,
affinis ea admodum est foliis & ramosis umbel-
lis minoribus, delicatioribus tamen, & semine

oblongo, Dauci Cretici, exiliore, non hirsuto;
nec ita absimili sapore: & Genève & Saleuz vici-
nis montibus Medicus Penninus Anglus Lon-
dini ferendam curauit, mihi que imperiuit. An
idem vocat Obs. 423. Myrrhim alteram paruam
Aduerf. Daucoides minus Cordi? In Icon.
p. 734. Myrrhim alteram paruam. Non potest au-
tem esse Daucoides minus Cordi, Myrrhis alte-
ra Aduerf. Cordi enim Daucoidi semina sunt
Anisi minora, aspera. Myrrhidi Aduerf. arborum,
Dauci Cretici non hirsuta: figura etiam Lobelii
semina glabra demonstrat Chærephylli.

Non est
Daucoides
minus
Cordi com-
tra Lobel.

H. Lugd. præter Myrrhidem hanc alteram Myrrh.
paruam Lobelii, quam p. 761. pingit, addo
quam iam diximus: exhibet & aliam quam p. 789.
Cicutariæ albæ inscribit. Sed & tertiam iconē dat
H. Lugd. pag. iam dictâ 789. quam Cicutariam ru-
bram appellat. Ceterum Cicutariam albam Lug-
dunenlis eandem existimamus cum nostra. Ea-
dem etiam à nobis obseruata est, flore vel pur-
pureo, vel rubente, in qua præter colorem di-
scrimen haud agnoui: stirpium diligentes
indagatores perquirant diligentius an differat
ab H. Lugdunenlis siue Dalechampi rubra: &
an non tres figure vnius eiusdemque plantæ.

Camerarius h. vocat Meum Silesiacum, foliis
Cicutæ & penè caule, sed perpetuâ radice, &
nonnihil aromaticum referente gustu, multi-
plici, nodosâ, & iuxta latera se propagante, non
rectâ descendente: umbellis candidis, oblongo
semine. Hoc ait Sebizium sibi communicasse.

Meum Si-
lesiaceum
Dolan

Stirpium sanè peritus Doldius hanc plantam
siccam nobis transmisit, pro Meo Silesiaco, quod
scripsit esse Olsnicense, & Olsnichium dictum:
in Mœnia, & in Saxonie officinis pro Meo ha-
beri: à quibusdam verò pro Imperatoria, cum
radix vegeta aromaticitate non careat, quæ sub-
amara sit & acris quodammodò, cuius in peste
usus non contemnendus: semen ei esse longum,
angustum, pectinum dentium æmulum, quale
Chærefolii. Hæc ille, Diuersum tamen tradit
Olsnichiū Cord. ab hac Cicutaria L. 29. hist. c. 80.
cui semina Anetho similia, & duplicia assignat.

An Cæsalpino Silaus Plinii, Herba in rinolis
nascens? An eadem Cæsalpino Cicutaria alia Al-
pina?

Bauh. phyt. videtur malè multiplicare entia,
separando Meū 5. Cicutæ foliis: Silesiacū Cam.
cuius non amplius meminisse inter Mea in pin. &
Cicutariam 6. (5. in pin.) palustrem latifoliam
albam: Cicutariam albam, Lugd. Cicutariam pa-
lustrem fl. candido, Cam. an Meum Silesiacum
eiusd. Itemque Cicutariam 7. (6. in pin.) palu-
strem latifoliam rubram: Cicutariam rubram
Lugd. Cicutariam palustrem flore purpureo,
Cam. Considerent tamen stirpium pediculi, an
vna planta, vel plures: & an duæ postremæ, ut
iam antè monitum, solo colore floris variant,
vel diuersæ sint, ut vult Lugdunenlis. An etiam
eadem cum dictis sit, Myrrhis eius secunda in
phyt. & pin.]. vel minor: Cicutaria 2. Cæf. Myr-
rhis latius minor, Cam. Myrrhis montana. Tab.
Myrrhis altera parua, Lob. & Lugd. quam Pons
in Baldo spontè, etiam in horto, provenire ait,
ac perperam Lobelium Daucoides Cordi fuisse
concludit, ac tandem quoddam pro vero Sese-
li alios pro Ligustico genuino in Sepalsis pone-
re, quàm autem congruè, tacet.

An eadem
Myrrhis
minor?

Gesnerus cum apud illum esset vocabat Sese-
li aquaticum. Cicutariam alteram Dalecham-
pii, cuius figura non placet, Genève pro-
uenientem vidi: itemque prope Masminster
ad ri-

Sese-
li 64
viam

ad ripam fluminis, unde transfuli in hortum E.C. Morib. Tiguri obseruavi : vt etiam in valle Griesbachiana, ubi fontes acidi. In montibus Helueticis circa Solodurum, iugis præsertim summis humidioribusque satis obuia. Circa S. Vrsane florentem mense Maio conspiciebam flore albo & purpureo.

Tempus.

CICVTARIA MORAA B VLBOSA

D T

Descriptio.



Sapor.

Singulari asurgit caule hominis altitudinem excedente, crassiusculo, purpurascens, vano, cauo, propter terram hirsuto, palmatis internodiis distincto : folia ex articulis prodeunt crassis, magna, in alas diuisa, easque in minora folia subdiuidendas, Cicutæ foliis similia, delicatiora, glabra, sapore non ingrato, nam & totius a-

liquin plantæ sapor est aromaticus, non scetidus : umbellas fert paruas, stolis albis compactas : semina longa. Cicutariæ vulgaris pratorum, quibus maturis & decidentibus Autumno, perit & caulis, & radix, plantæque nouellæ ex semine nata, totâ Hieme durans, vsque ad Ver, quo tempore folia terna, vel quaterna supra terram sese expandunt, ad Chærefolium accedentia, ex virore lucida, in tres lacinias præcipuè diuisa, tres circiter uncias longa, odore & sapore aromatico, quorum pediculi ad tres uncias longi procedunt à radice singulari, breui, turbinatâ crassiusculâ, Antitoræ radici simili, vel Napis minimis, testâ cortice tenui, pullo, internè albâ, fungosâ, grati saporis, ad Staphylinum accedentis, desinente in paruas fibras longiusculas, paruas alias laterales habentes.

Radix

An Cicutaria Pannonica quam describit Clusius ?

Bulbocastanum conio-
phyllon Camer.
Cicutaria
Pann. Clusii

Hanc vocat Cam. Bulbocastanon conio-
phyllon, Cicutariam Pannonicam Clusius Pan. & hist. qui quo nomine hanc plantam donaret, diu ambiguus fuit : accuratius tandem nouis eius perpen-
sis, succurrit magis proprium (nostrâ etiam opinione) nomen dari non posse, quàm Cicutariæ. Vulgus Austriacum Peperlin appellat : Hungari Magiario salata, quod eius radice & teneris foliis in acetariis vescantur.

Cicut bulbosa C.B.

Bauh. Phyt. Cicutariam g. (S. in pin.) bulbosam : Myrrhidem Cicutariam Tab. Klappen Koffell. Dubito autem an sit Myrrhis Cicutaria Tabern. suspicorque radicem eius non factam esse ad plantam.

Locus & Tempus.

Prope Entzheim in Alsatiæ in sepibus & alibi prouenit itinere Basiliensi versus Milhusiam, mense Iunio florens & semen proferte incipiens, quo deciduo planta perit. In horto E.C. Montbelgar-
di lata, quotannis caulescit & perit, ut semine deciduo mirè se propagat. Primus qui mihi plan-

tam attulit, fuit insignis Medicus Petrus Turne-
rus, qui dederat pro Myrrhide collectam Heidel-
bergæ, obseruatamque Spire & infra Argentinam. Cicutaria Pannonica Clusii nouo Vere in hortis & herbis Viennensis agri locis prodit : nascitur & quibusdam similibus Vngariæ locis : florens Aprilis & Maio, Iunio semen plenè maturans. Bulbocastanon conio-
phyllon, quod sic ob folia Cicutam imitantia re-
dè dixerit Camerarius, biennium solummodò durat, vel ad plurimum triennium. Nam è semine quo per totam Hiemem iacuit intra terræ viscera, ineunte Vere demum pronascitur, foliis binis oblongis acuminatis, angustis, vt multæ huius generis plantæ, à quibus tamen hoc discriminis obtinet, quod alterum germen non è medio horum, sed iuxta pediculum, quo ambo nituntur, ex ipso bulbo, qui vix Orabi granum æquat, enascitur. Id si non eodem anno iustam magnitudinem assecutum fuerit, siuo altero caulem proferre quauis causa prohibe-
tum, quod vtrumque tamen rarè contingit, tercio demum anno floret ac semen perficit, & marcescente radice penitus interit, semine interim sparso multipliciter se restaurans.

Nouo Vere radices firmitores & magis succulentæ cum nouellis suis foliis in Viennensi foro ventales reperiuntur : coquantur enim & cum oleo, aceto & sale, primis mensis istuc vulgares, quæ n salubri cibo, se nescire fatetur Clusius : frequentem tamen eius usum non sine noxa esse, & capitis grauedinem, doloremque inducere, se expertum esse memoræ mandauit.

In usu
Viennensi

PHELLANDRION PLINII.

Cap. LXXV.

Phellandrium, cuius meminit Plinius L. 27. nascitur in palustribus folio Apii. Equitur semen eius propter calculos & vesicæ incommoda. Ceterum, qualis herba Phellandrium hodie siminter Auihores nondum conuenit.

Aequiuoca

Phellandrium suum habet Dodonæus, quod quibusdam Cicutaria aquatica dicitur.

Phellandria
Cicutaria
aquatica
rica

Petro Turnero Cicuta aquatica Gesneri dicebatur Phellandrium.

Apium palustre

Phellandrium esse crediderunt nonnulli Apium siluestre Dodonæi.

Phellandrium Plinii sunt qui eandem esse cum H. hoselino, i. e. Apio palustri censeant. Testis est Gesnerus in cat. pl.

Lauere.

Phellandrium alii pro Lauere accipiendum putant, vt idem lib. iam citato refert.

Seseli aquaticum

Idem rursus ait suspicari Ruellium Siler aquaticum herbariis hodie dictum esse Phellandrium.

Phellandrium Plinianum distabant Lute-
tiani, referente Lobelio, Rutas pratenses, quas Thaliætrum nigrum Cordi cognominamus.

Phellandrium Plinii est Guilandino Angelica siluestris, vt testantur Lob. & Pena.

Angelica
filu

Idem tamen Phellandrium Plinii existimant potius esse Saxifragiam hircinam maiorem.

Saxifragia hircina

Phellandrium tandem [inquit Gesn. cat.] aliis ea videtur esse, quam Filipendulam vulgus Herbariorum appellare consuevit.

maior

PHELLANDRIVM, VEL CICVTARIA A- quatica quorundam.

Quas amat, extra quas caule extat bicubitali & altiore, pollicari, sæpè etiam brachii crassitiem adæquante, striato, inani, geniculis distincto, in ramos varios diuiso. Folia dodrantalia

Descriptio

Q 2

plus mi



plus minus, diuisione Chærefolii, propemodum glabra, sapore satis grato ad Sium accedente, cum leui quadam acrimonia: umbellæ in ramis gent pro plantæ proportionē paruas, flosculorum alborum, cum exiguis in medio apicibus obscurè rubentibus: quibus delapsis succrescunt semi-

na parua, oblonga, striata, nulla hirsutiae vel asperitate donata: ex geniculis infimis demittit subinde capillares, longas, & numerosas fibras, quibus in imo radicitur.

An Ligusticum plue-
stre, Trago

An Trago Ligusticum 2. siue siluestre, in fossis, pratis, & lacubus, & paludibus proueniens, radice caua & fungosa, adeoque longa, ut fundum aquæ attingere non possit, quare aquæ prorsus supernatat: caule & foliis plus habens cum Ligustico affinitatis, quam cum Foeniculo, sed tota suâ substantia minus & odore etiam ac sapore remissius, ceterâ Leuistici simile. Ceterû, siluestre hoc Leuistici genus, Tragus erraticû Foeniculum esse existimat, quod Dioscor. Hippomarathron, Marathrida, agreste Marathrû, Thimaricolum, Myum, Siltrament, & Foeniculû erraticum cognominet: Germani Wilden fenchel seu Ross fenchel / & Meyer fenchel / agreste seu siluestre Foeniculum, equinum Foeniculum, & palustre Foeniculum vocent: Serapio Othomarathrum (tertium nempe Foeniculum, semine Coriandro simili, quod quidem Tragus alterius generis esse putat, aut si idem cum hoc sit, Serapionem seipsum non intelligere, necesse esse) & alio loco Foeniculum montanum, quod Fabar dicatur, atque aliquantulum Hippomarathro Dioscoridis respondere videatur. Quod porro Tragus capite de Ligustico huius herbæ mentionem fecerit, id in causa fuit, quodd formâ, odore, & sapore ad Leuisticum magis, quam Foeniculum accedere crediderit. Sunt autem quidam, qui Ligusticum hoc siluestre Tragi, Cordumenum, & Carui agreste dici volunt, & esse semen Peucedani. Sed nemini obscurum est, aliam esse & peculiarem plantam Peucedanum, quod Phriscus Foeniculum agreste nuncupauit. Sed credibile est bonum hunc virum Peucedanum non vidisse, sed ex Petro de Crescentis, qui nomen Foeniculi agrestis huic adscribit, didicisse.

Cordume-
num
Carui agre-
ste
Peucedanum non
est appel-
landum
cetera Phri-
scum
Phellandrium Dod.
Sii 3 species

Sium Pfeu-
sippi

Dod. in Hist. scument. & in fol. Phellandrii inscribit, ac Sii tertiam speciem constituit, & ait. Apud nostros, quod sciam, nomen non habet: officinis etiam incognitum, sicut & Sium: à Plinio Phellandrium nominatum videtur: potest autem & Sium illud esse, quod Pleusippus apud Athenæum in aqua nasci affirmat, solumque habere palustri Apio simile, de quo Homerus:

Ἄπιο δὲ λικνῶτος μαλακὸν οἷον ὁδὸν ὀλισπύ. h. e.

Huius Apio atque Sii circum mollissima prætia

Si modò hoc Pleusippi Sium non idem est cum priore loco descripto Sio, Oenanthe sc. [ut nos vocamus] aquatica.

Lob. Obl. 424. figuram Dodonzi habet [item- Cicutaria que in Icon. p. 734.] Cicutariæ palustris titulo, palustris Dodonzi opinionem de Phellandrio non approbans.

H. Lugd. p. 1093. eandem iconem quoque retinet, sed eam Phellandrium Plinii intulit: Tab. autem & Ger. Cicutariam palustrem wasser chetling: Camer. Cicutariam palustrem aliam siue Phellandrium: Io. Vviers, ut inter vites patebit, Cicutam aquaticam.

C. Bauh. phyt. Cicutariam 8. (7. in pin.) palustre tenuifoliam, quod Phellandrium Plinii constituit: itemque Ligusticum & Foeniculum siluestre Tragi: Cicutam palustrem Cord. in Diosc. Aquaticam, Geln. h. & Thal. Silaum Plinii, Carl.

Locis gaudet humidis & palustribus, & in fossis & scrobibus passim occurrit: floret Iulio ac Iulio in fossa horti Montbelgardensis & superscriptâ crassitie. Frater attulit mihi Parasio, ubi spontè prouenit, pro Cicutaria Petri Aponensis Guilandini. Phellandrium Dodonzi in perennibus cum Sio nascitur riuidis, & subinde in refectibus exit aquis, & state florens. Augusto semine maturas. Angliæ, Northmanniæ, Belgique stagnantibus fossis, leuèque fluentibus aquis plerumque obuia Lobelio.

Locus & tempus

Quod autem ad facultates, attinet, calidam & siccum erit, si Dodonæo credimus, ac Sio potentia ac temperamento simillimum. Quæ etiam de causa urinam & menses prouocare: ad vesicæ frigidos affectus vtile, & ad calculum, quem comminuere ac expellere posse ait, si naturâ suâ friabilis fuerit, scribit. Io. Vviers Tract. de Varen sub sinem: In hoc morbo, tendente in suppurationem tumore, vnguentum inducunt Dittmar-senses Chirurghi ex wasser Schirling (quod vernaculo nomine wadenduiet indignant) seu Cicutam aquaticam concinnatum: radicem inuolutam, sub cineribus assam & contusam cum melle permiscunt, quousque in vnguentum conformetur: rati dulcedine mellis foras allectos vermes huius herbæ veneno enectum iri.

Tempera-
mentum.
Dodon.

Vesica affe-
ctus
Calculi
Vernus Vae-
ren dictus

SESELI PELOPONENSE MATTHIOLI, siue Cicutaria quorundam.




Canis est geniculatus & cauus, Cicutæ, folia longè maiora, in alas diuisa, quæ rursus in segmenta pinnatim, veluti Filix, digesta, profundè serrata, latiuscula, subleuantur, odore graui & viroso Cicutæ.

Folia in figura, quam ponimus, non placent: nec faciem enim apparent plures eius partes.

Sic des-

gustu amaro, acri & aromatico, terram versus ca-
pillata.

HErba cubitali & altiore, ferulaceo, tereti, in-
tusque turgoto *caule*, ramis multis brachia-
to. *folia* Cicuta. foliis quodammodò similia,
crassiuscula, hirsuta multum & aspera in alas op-
positas subtecta, quarum segmenta singularia
semunciâ longiora, serrata: umbellalata, lutea:
semen magnum per extrema bifidum, ex rotun-
do oblongum, labiis foliaceis, simile Thapsia
Gargani montis, sed minus: *radix* sesquipalma-
ris, crassa, solida, exteriùs nigricans, intus alba,
Tom. III.



Tab. nominat Sefeli Peloponnesiacum i. *Grie-Thapsia*
 d'ischer Sefel. Cam. apud Matth. Thapsia. *Figura*
 ra autem à Camerario apposita Matthiolo est ex
 Gesnerianis facta ad plantam meam siccam, quæ
 nihil simile habet cum Matthioli Thapsia, quam
 ait Ferulæ ita similem, ut non faciliè dignosci pos-
 sit: Ad eandem figuram appictum semen, sub

numero I. Cetera semina aliarum plantarum sunt, quorum descriptiones erant apponendæ: quæ addidit de Thapsia, & Turpetho, potius tenebras leuare adferunt, quàm lucem.

Locus &
Tempus.

Thapsiam, cum esset Mus Montpelii, vocabant. Deferebatur nobis non longè ab Arclatà ex Prouincia di *Sani Martini* Leonh. Rauuolfio. Audio prouenire in montibus circa Nemausum: florere mense Maio. Hanc plantam nobis etiam communicauit Iac. Ranaudetus Thapsiæ nomine. Semen aliquando misit Iac. Vtenhouius nomine Sefeli Peloponnesiaci. Frater C. Bauh. attulit inuentam in monte Ceti.

THAPSIA I. CLVSII, LATIFOLIA, FLORE luteo, semine lato, similis Sefeli Peloponnesii Lobelii.

Descriptio



Ferulacea habet folia, viridia, villosa, seu lanugine quadam obducta, humi veluti in orbem diffusa, ingrati saporis, inter quæ cubitalis, interdum etiam bicubitalis exiliter caulis, digitalis crassitudinis, nodosus, intrinsecus cauus & fungosus, raris folijs præditus, summo fastigio magnam & latam sustinens umbellam luteorum seu flauorum florum.

quæ dum maturuit semen, quod latum & acerosum est, germénque habet longum & angustum, sphericam & orbicularem figuram quodammodo refert: radix crassa, longa, summâ parte capillata, ut pleræque ferulacei generis, crassiore libro vestita, foris subnigro, vel fusco, interiore parte candicante, lacteo succo plena, gustu amarissimo & acri, nauseam tamen mouente, aded ingrata est, medius eius neruus fungosus.

Thapsia I.
Clusii

Ceterum, Thapsia hæc prima Clusii, à Murciânis & Valentinis cumillo, à Iucci, ni Clusius descriptionis author fallitur, abundantia dicitur: reliqui Hispani *Cannaheia*, appellant, quam vocem omnibus ferulaceis plantis [quarum summa varietas per vniuersam Hispaniam] tribuunt: nam Ferula & Libanotides illis etiam Cannaheia dicuntur, quia videlicet harundinaceum caulem habent. Mirari autem subit quosdam inueniri, qui aded procliuës sunt, ut non expensis probè stirpium singulis notis, sed ex leuibus duntaxat picturæ coniecturis, statim de illa iudicium ferant, quod vix venisse iis videt author, qui huius suæ Thapsiæ iconem, ad Sefeli Peloponnesii historiam accommodare non sunt veriti, & illi quidem, qui hanc nunquam crescentem viderunt, ut taceat vtriusque plantæ facultates esse dissimiles. Tab. Hist. Lugd. Lob. & C. Bauh. in Phyt. dicitur Thapsia latifolia Clusii. Verum Lob. & Bauhinus cum Sefeli Peloponnesii confundunt. Id quod Clusius licet conqueritur, & nos præcedenti titulo insinuauimus.

Summa
quorundam
negligentia

Lob. & C.
Bauh. ut.

Gaudet collibus petrosiss, quales sunt non procul ab ostio Tagi supra Vlyssipponem, & multis alibi Lusitaniæ, Hispaniæque locis editionibus & inculis. Floret Augusto, nonnunquam maturus.

Granatenles imperiti Pharmacopœi, huius radice loco Turbith magno errore vtuntur: peritiores autem discrimen obseruare norunt.

Similis
est
quorundam

THAPSIA II. CLVSII, FLORE luteo, foliis tenuioribus, Fœniculi penè instat.

Thapsiæ hoc genus cubitali donatur caule, graciliore tamen quàm superioris, umbellâ etiam simili florum & seminis, sed minore: folia illi multò tenuiora, quàm illius, Fœniculi penè foliorum instar, nullam insignem qualitatem habentia: radix longa, digitalis crassitudinis, foris nigra, intus candida & fungosa, acris, summo capite villosa.

Bauh. pin. Thapsia 4. fœniculi folio: Thapsia Diosc. Aduers. Lob. & Lugd. Thapsia 2. vel tenuifolia, Clus. Hisp. & hist. Thapsia angustifolia Tab. tenuifolia, Gerardo.

Thapsia hæc secunda Clusii, siue tenuifolia, iisdem cum Thapsia 1. siue latifolia locis inuenitur.

Locus

THAPSIA SALMANTICENSIS, SIVE III. Clusii, magna, flore luteo, semine lato.

Et hæc longè maior superioribus, utpote caulem habens trium aut quatuor digitorum crassitudinem æquantem, instar caulis Ferulæ, & sæpissimè humanam altitudinem superantem: florem & semen primæ Thapsiæ non dissimilia: folia, antè quàm planta in caulem assurgat, multò ampliora, in orbem tamen non secus, ac illa humi diffusa: radicem etiam crassiorem.

Cicutaria
maxima
est
fœtidissima
Lobelii non
est

Sed nec parum hallucinantur, qui Thapsiam hanc 3. siue Salmanticensem, Salmanticensibus vulgò *Cannaheia* dictam, Cicutariam maximam & fœtidissimam Lobelii esse censent, inquit Clusius, descriptionis au hor. Videant autem Lectores verba Lobelii cap. de Cicutaria maxima fœtida, simili Thapsiæ 3. Clusii.

Bauh. pin. Thapsia 1. maxima latissimo folio: Thapsia 3. Clusii hisp. & hist.

Locus

Tertium hoc Thapsiæ genus, quod Clusius obseruabat in Hispanica sua peregrinatione, nascitur non solum agro Salmanticensi, sed etiam circa Pinciam, vulgò Valladolid dictam, & tota veteri Castellâ, ad Pyrenæos vsque montes.

Vetulæ Salmanticenses medicinam isthuc exercentes, huius radice vtuntur ad prouocandos menses, aliaque deiectiones moliendas. Tantâ autem vi cum supernè, tum infernè purgat, ut summentes in maximum periculum sæpenumerò coniciat.

Vfus
Deiectiones
moliuntur

THAPSIA IV. CLVSII, TVERO VOCATA, foliis glutinosis, radice nigra foris.

Eodem Salmanticensi agro & vicinis locis nascitur hæc ferulacei generis planta, folijs Libanotidis, per terram similiter expansis, lento quodam & glutinoso rore semper aspersis, saturâ viriditate splendentibus: radice crassâ, longâ, tenerâ & fragili, foris nigra, intus alba, lacteo succo

Locus
Descriptio

succo plena, caulem nullum observabat author, sed cum ferre audiret rectum, tenue, & in eo umbellam florum parvè in globum coactam. Ceterum totam plantam terribili odoris esse ait: unde verisimile esse coniecit non minus esse noxiam Thapsiam hanc quam Salmanticensibus *Tuero* nuncupatam, quam sit ipsa Thapsia, ad cuius genus ipso auctore, referenda videtur.

Bauh. phyt. vocat Cicutariam 4. latifoliam scetidissimam alteram. In pin. Thapsiam 3. foliis Libanotis simillissimam *Tuero*. Clus. hisp. Thapsia 4. Eru. d. hist.

Oderis-
simus

Cicutar.
latifol. al-
tera

THAPSIA CAROTÆ FACIE.

Defec.

Carotæ fa-
cie

Non est
Thapsia
Dioscori-
dis



Et lata & longa sunt Thapsiæ huius folia, pediculo tam primario, quam aliis minoribus segmentorum hirsuto, aspero, rubente: segmenta in alis foliorum singularia non ex aduerso nascuntur, alioqui facie tota Carotæ vulgaris folia suis referunt, hirsuta, venosa.

Quamvis autem hæc Herbariorum Thapsia vulgaris Caro-

tæ effigie, ab officinis sit verior existimata, inquit Lobelius, & superiori Thapsiæ [Ferulæ facie Thapsiæ, siue Turbith Gallico] radice non parum assimilis, tamen certum est, longius à descriptione Dioscoridis abesse: est enim folis potius Carotæ, siue Dauci agrestis, quam Ferulæ.

Eidem in Obler. & Icon. Thapsia vulgaris Carotæ effigie: Matth. & Ital. Thapsia. Gal. Turbith grise. Tab. dicitur Thapsia vulgaris, & Turpetum griseum.

C. Bauh. phyt. Thapsia 2. (4. in pin.) Carotæ folio: dubitatque [ut & Lobelius] an sit Ferula Sagapenifera? Huius autem radice pro Turbith quosdam vetescribit. Apud Matthiolum huius iconem Thapsiæ titulo pictam dedit ex Tab. dixitque Thapsiam esse Matth. Ang. Lac. Lon. Cak. Lugd. & Cæf. cui & Turbith albū Mesuei: esse item & Thapsiam maiorem, Cordi hist. Thapsiam veram & Turbith montis Gargani, Gesn. b. Thapsia vulgarem & Turpetum griseum Tab. itemque Thapsiam vulgarem Carotæ effigie, Lobelii. Sed non dissimulandum est, fratrem C. Bauhinii hic turpiter esse hallucinatum. Cum enim Matthiolo Thapsia aded Ferulæ adsimilis sit, ut non facile, nisi à rei herbariæ peritis, una ab ætera dignoscatur: præterea cum ad Dioscoridis descriptionem referat, quam in epit. & hist. germ. posuit: quæ obsecro Carotæ foliis cum Ferula similitudo: taceo de cæteris, ut figura, quæ non similis Carotæ. Idem dico de Thapsia Lacunæ, Lonicæ, Castoris, & Lugdunensis, qui omnes figuram Matthioli habent, diversam a

Thapsia
Gulf. Ca-
rotæ effigie

Turpetum
griseum

Turbith

C. Bauh. phyt.
Gargani

Tabernæmontani. Est autem illorum imago Ferulæ folio glauco. Quamvis præterea possit Cæsalpino esse, Thapsia Carotæ folio, non video: quum longè alia ei tribuat folia l. 7. c. 3. & semen crassius, & longius, quam Ferulæ semina. Tamen etiam absque ratione Cordi Thapsia 4. hist. c. 74. refertur ad Carotæ facie Thapsiæ, cum ille in Diosc. l. 4. c. 157. Thapsiā dicat foliis ferulaceis & Fœniculo similibus, Gesneri Thapsiam denique ad Thapsiam Carotæ folio referendam minime censo, quia Gesnero dicitur latissimo semine, quod huic non convenit.

Provanit nobis Thapsia Carotæ facie Montbelgardi in horto B. C.

Thapsia
Cordi
Thapsia
Gesneri

THAPSIA CÆSALPINI, SEMINE CANDIDO, crasso.

Caulis ferri non excedentem hanc cubita, candicans, em, veluti cinere asperso: folia proportionem minora, sed latioribus segmentis, & subcandida: florem luteum in umbellis: semen autem candidum, striatum, crassius & longius, in foliacea quorundam labra deunens: radix subest candida, crasso capite, in ramos diuisa, succo lacteo, valde æri, ut tractantium & manus & facies intumescant.

Cæsalpinus, descriptionis author, vocat Thapsiam Pisus in Ilia nascentem, Ferulæ semini similem, sed minorem & candidiorem. Quare eam ad Thapsiam Carotæ folio referendam cum C. Bauhino non puto: Carota namque & Ferula quantum discrepent, non nisi in re herbaria valde rudem later. Videtur autem Cæsalpinus statuere esse Thapsiam à Theophrasto & Plinio descriptam: Dioscoridem vero per Thapsiam non hanc stirpem, sed Ferulaginem, quam Ferulam seminam [nos Ferulam glauco folio] appellat, intelligere.

Defec.

CICUTARIA MAXIMA FOETIDA SIMILIS Thapsiæ tertæ Clusii

CAP. LXXVI.



Lob. Obs. Lp. 422. vocat Cicutaria maximam Brancionis, (itemque in Icon. p. 32.) ac quaerit a sit Thapsia Salmanticensium Clusio, vulgè Canahia dicta, annum potius Cicutaria maxima foetida? Sed mirari subit Lobelium, Cicutaria suam maximam foetidam Brancionis non describere. An

Cicutaria
maxima
Brancionis
Lob.

fortè non vidit plantam, sed tantum iconem. Dicta tua hæc, caule humana proceritate, crassitie

quatuor digitorum, foliis, semine, & radice Sefeli Peloponensis longè maioribus, qua clinici celebratur ad menses, vomitus & alias desectiões cūdas, ex Clusio delumpta sunt, & mutata vocabula, ut dum vocat Sefeli Peloponense, intelligit Thapsiam i. Clusio.


Thapsia
Clusio
sevilla
non est.

H. Lugd. p. 790. vocat Cicutariam maximam scetidam Lobelii. C. Bauh. phyt. Cicutariam 5. (4: pin.) siue latifoliam tertiam.

APIVM SILVESTRE DODONÆI, THYSELINUM quorundam, planta lacteo succo turgens, locis humidis proueniens.

CAP. LXXVII.

Descriptio



Dum tri-
umue
bitorum cau-
les, striati, angu-
losi, glabri,
ramosi, ina-
nes: imā parte
ex fusco ru-
bentes, ex quo-
rum geniculis
rubetibus ori-
untur pedicu-
li dodrantes
& cubitales,
caulium ritu
striati, angu-
losi, concavi-
que, folia sus-
tinētes Caro-
tæ, glabra, val-
dè incisa, atro-
virentia, la-

cteam liquorem, si rumpantur, reddentia, sapore ingrato, mixtā cum amarore acrimoniā: umbellam gerit strobilorum Petrolelini albidorum: semen rotundum, planum, Anethi simile, Dod. radices spargit complures, digiti minimi ferè crassitudine, longitudine aliās palmari alias dodrantali, candidas, eodem cum foliis sapore.

Synon.
Apium
sic.

Dodon. gall. inscribit Apium silvestre, appellatque Græcè σέλινον αἰνόν, ὃς ὡς σέλινον αἰνόν, Gall. Persil aut Ache sanuage, ger. Wilder eppich/ aut eppich. Belg. wilde eppe. Huius meminisse ait Theophrastum, ei adscribentem caulem rubrum L. 7. c. 4. Plin. verò suspicatur Thysselinum quamvis quidam eiusdem Silaum existiment.

Daucus
palust.
Gefn.

H. Lugd. p. 701. Apium silvestre Dodonæi. C. Bauh. phyt. Apium 6. siue silvestre lacteo succo turgens, quod ad Daucum referri posse existimat, Gesnero forte autore, qui Daucum palustrem de hort. vocat.

Silaus
Plinij.
Valerandi
non est
comra
Lobel.

Lobel. hanc pingit in Icon. p. 711. Thysselinum Plinii titulo, itemque in Obs. p. 409. ubi præterea Silaum Plinii Valerandi vocat. Ast Silaus Valerando Dourez & Roberto Constantino, longè alia erat planta, ni fallimur, cui flos ex luteo pallefcens, cum huic sit albus in rotundis muscularis, etiam Dodonzo teste.

Meum.

Hort. Lus. Cuminum Alni, Thysselinum Plinii. Oelsueto Erlam & Cumich. Officina Belgii, & præsertim Botanici Antuerpienses, olim perperam Meum nuncuparunt, ac

legitimi Mei loco in usu habuerunt. A nonnullis verò apud Belgas, Apium sylvestre, h. e. Wilder Eppe, dicitur: non defuerunt tamen alii, qui Hydrotelinon, siue Apium aquaticum, i. e. Water Eppe, nominarent. Hydroselinon autem, ut alibi scriptum, & Sium quandoque appellatur.

perperam
dictum.

Hydroseli-
num.
Sium.

Cordus in Diosc. l. 1. c. 1. & hist. itemque Thal. in Har. Olsenichium, Olsentef germ. nominarunt. Alii demum Phellandrium Plinii Apium palustre Dodonæi existimarunt. Sed, auctore Dodonzo, sylvestre Apium rectius dici potest.

Olseni-
chium.

Phellan-
drium Plini.

Iuxta lacus, inquit Dod. virginosis ac humidis locis, in scrobibus aquas residues habentibus, quandoque etiam Alnorum iuxta veteres truncos reperitur. Iunio ac Iulio flores ac semen proferens. Reperi ego inter Masmunster Abbatiam & S. Germain pagum è regione Rotensburg, iuxta ripam stagni inter Alnos & Salices mense Iunio, transtuli Montbelgardum in hortum Ill. E. C. vbi floret Iulio & Augusto. Locis humentionibus, sed rariis, ut plurimum tamen occurrit Thalia auf der laugen Harchinæ Saxo-notheringia.

Locus &
tempus

Est autem huius radix calida, auctore Dodonzo, & sicca tertio ordine: commanducata multam ex ore pituitam elicit, & dentium dolores sopit. Non dubium verò est, quin & eadem extenuet, incidat, & aperiat: vrinas & menses moueat: & quæ Apii genera reliqua, eadem & nec segnius, sed etiam efficacius præstet.

Temper.

Pituitam
ex ore elicit.
Dumetia
vires

APIVM CICUTÆ FOLIIS, SELINVM alterum Clusii, semine lato.

CAP. LXXVIII.

Multa habet ab vna radice prodeuntia folia, Cicutæ foliis non dissimilia: sed quæ caulem ambiunt, minora sunt: caulem cubito maiorem, sexpè vnicum, nonnunquam plures, & in his umbellas candidorum florum, quibus succedit semen latum, minus tamen quàm Ferulæ: radicem digitalis etiam crassitudinis, albam, odoratam, & vtcunque acrem.

Deser.

Clusius historix author, vocat Selinum peregrinum alterum. C. Bauh. phyt. Apium 8. siue peregrinum folio Cicutæ.

Selinum
peregrinum
& Clus.

Prouenit apricis, & à Sole illustratis locis: Iulio floret, Augusto semen profert, in Salmanticensi agro.

Locus.

Mirum in modum vrinam ciere plantæ decoctum, aut aquam in qua radix macerata, Clusio Salmanticensis referebant.

Vis
diuretica

SESELI PALVSTRE LACTESCENS, A-cris, foliis ferulaceis, flore albo, semine lato.

CAP. LXXIX.

Seselis palustris vnicam plantam reperit Camerarius, ut videre est in eius Horto, in quadam palude sylvarum vbi [Norimbergæ] vicinæ, prope piscinas amplissimas, iuxta putridos arborum truncos, foliis ferulaceis, radice longâ subfusa, & ingrato admodum gustu, ceu feruore non exiguo, fauces tentante: in hortum verò translata minus vrens euasit & saporis seruitutem deposuit, & caulem protulit amolum, tri-
cubita-

Locus.

Deser.

cubitali: flores candidos in umbellis, & semen latum, foliaceum. Planta est lactescens, ut quædam alia umbelliferæ, quales sunt Thysifolium Dodonæi, Chæresfolium, &c.

C. Bauh. phyt. meminit Seseleos palustris Cameratii, quod nono loco recenset.

OENANTHE VETERVM.

CAP. LXXX.

Oenanthe [οἰνάνθη] .lii Leucanthum [λευκάνθη] hæc non leguntur in Ald. Dioscoridis codice, nisi inter nothia: nominant: folia habet Pastinacæ (ἀστραγαλόν: flores albos, canli crassū palmi altitudine [σπυρίδιον] semem verò velut Atriplex (ἄτριπληξ) radicem magnam, multa rotunda capita habentem. Nascitur in petris. Huius semen, & caulis, & folia bibuntur in vino mulso ad secundas eiciendas. Radix cum vino ad vniuersæ stitidia, & regium morbum utilis est.

Dioscoridis hoc caput hisce expressit Plinius lib. 21. cap. 24. Oenanthe herba nascitur in petris, folio Pastinacæ, radice magna, numerosa. Caulis eius & folia cum melle ac vino nigro pota, facilitatem pariendi præstant secundasque purgant. Tussim è melle tollunt: urinam cient. Radix & vesicæ vitus medetur.

Apud Athenæum lib. 10. Aristoteles libro de ebrietate scribit, coruos & canum genus inebriari, si Oenanthem herbâ [τὴν οἰνάνθη] : sic enim legit Dalech. & non τὴν ὀνάνθη, quæ voce quidam significari putant, Dioscoridis τὴν ὀνάνθη, cuius radix vinum olet, & madefacta, potu seras mitigat, & cicurat.] depascantur.

Observandum autem est Oenanthem multarum rerum æquiuocum esse. Nunc enim herbam hinc descriptam significat, quæ tamen & ipsa de pluribus & diuersis dicitur, ut mox annotabimus. Nunc Labruscæ florem denotat. Nunc Oenanthe est Vitis domestica. Nunc Armerios flores siluestres designat. Nunc Nostrum Lilium conuallium, de quo lib. 31. H. n. g.

Nodie etiam pluribus herbis Oenanthæ nomen attribuitur. Sunt enim qui Filipendulam esse dicant. De hac & sequentibus ordine dicemus. Oenanthem siue Filipendulam Monspessulanam folio Apii, veræ Oenanthæ similiorem dixit Lobelius. Oenanthem, Staphylii folio aliquatenus accedentem, habere magnam similitudinem cum Oenanthæ Dioscoridis testatur. Tabern. Oenanthæ siue Filipendula aquatica negatur esse legitima. Considerandum an à iam dicta diuersa sit Oenanthe, siue Filipendula Ruræ folio, vel uarietas minus bene picta à Tabernomotano Oenanthem Myconi exhibet H. Lugd. quam ex Hispania missam ait. Est & Oenanthe succo Cicutæ facie Lobelio. Oenanthæ Guilandini, viz duarum vel trium vnciarum plantula, inscribitur à nobis Flos cuculi flore multiplicato. lib. 29. Oenanthem siue Filipendulam alteram montanam, diximus Pedicularem alpinam. lib. 28. Bulbocastanum pingit Matthioli in Hist. germ. ac veram esse Oenanthem existimat. Spondylium apud Gesnerum in ascript. Dioscoridis cognominatur Oenanthe. Oenanthæ generi refertur posse Pimpinellam & appellati Oenanthillam putat Fracast. de contagios. morb. lib. 3. cap. 6. Oenantharia, de quibus Paulus lib. 7. cap. 21. agit, non sic dicta sunt, quod dicitur τὴν οἰνάνθη, h. e. è La-

brusca fiant, sed quod τὴν οἰνάνθη, h. e. è vino & floribus Lilii.

Ceterum ad Oenanthem redeamus. Alia hæc est, ab illa, inquit Marcellus, quæ in vitium genere Labruscæ flos est: hæc in herbarum censu à Theophrasto inter coronarias plantas, & flores qui secundi per Ver florent, numeratur. Illa primò & per se Oenanthæ est, Vinum & florem ipso nomine indicans. Hæc, ut sit, deficientibus propriis, indicationem & nomen floris & odoris sui similitudine, ab illa faciliè impetravit. Nec idèd Oenanthæ dicta est, quia Labruscæ flos sit: sed quod candidus illi flos, racemi specie, ut in Labrusca, sit: & præter racemolum illum florem odor qualis in pubescente Vite, floreque eius sentitur. Amat hæc tepidiora loca, quondamque ad coronas in hortis etiam ferebatur, in quibus non tantum odore, sed longiore florum suorum vitâ placebat. Hanc Dioscorides ait Cerafcomen vocari: quæ voce Staphylinum, i. e. Pastinacam, à quibusdam nominari dixerat. Cui, quoniam hæc folio siuilibus est, idèd & nomine illius etiam indicabatur. Quid autem Cerafcome significet in Pastinaca querendum est. Eandem Leucanthum vocari hinc ait, manifesta à florum candore significatione. Neque enim alia eius vocis vis est. Hastenus Marcellus, qui quam plantam per suam Oenanthem intelligat, nos latet.

FILIPENDULA.

CAP. LXXXI.



Nomen huic secti radice in latum magis sparsæ, quam altè depactæ glandularum, obuiarium, aut longiorum, minusque ventriolarum, Alphodeli more, foris ex rubro nigricantium, intus alben- tium, acrimoniam quandam cum adstrictione dulcedine & leni amari- tudine sapien-

nium, per fibrarum fila pensilis connexio: folia Pimpinellæ seu Saxifragæ maioris, atro vitore splendentia, angustiora, profundius laciniata, nullis pediculis alternatim costæ adnascuntur, quæ minima hederacea foliola intercedunt: can- les cubitum vnum aut duos alti, solidi, teretes, laues, subrubentes, in alas diuisi, flores sustinent, in paniculæ modum sparsos, suauolentes, al- bos, auresque foliorum mucrone rubentes, in quorum medio magnus apicum luteorum ple- xus sese explicat: semem sequitur muscosum, squa- mosum, rotundum, Pimpinellæ.

An Molon à Plinio lib. 26. c. 7. descriptum Melius certè accedere videtur ad Oenanthem

R

Diosc. dila-
codatur

Eperis.

Vitis

Oenanthe
cuius
canis
in
briantur

Cerafcomen

Vitis
Oenanthe
herba
Labrusca
flos
Vitis do-
mestica
Filipendula
la
Oenanthe
aquaticaOenanthe
Ruræ
folioOenanthe
MyconiVitis
cuculi
flore
multiplicato
Pimpinella
alpinæBulbocastanum
Spondylium
PimpinellaOenanthe
herba
Pauli
ab
eleger
Spondylium
aquaticumA Labrus-
ca flore
diuersa
Oenanthe
Herba
corona-
ria
Theop.
Vitis
dicta
Oenanthe

Cerafcomen

Leucanthum

Inscriptio
huius radice

Dioscoridis descriptionem, quamvis non desint qui Filipendulam, Oenanthen Dioscoridis esse negent, nullum ipsi aliam, aut saltem meliorem interm ostendentes.

Oenanthe
Theophr.

Marcelli
Cordi

Tabern.
Lapsus

Vitis fl.

Gland
terrestris.

Chamaedry.
m. adri.

Quercus
terrestris.
Oenanthe
adversus
Matthiolum.

Ab hac quidem Filipendula, siue Oenanthe Dioscoridis nobis alia videtur Oenanthe Theophrasti 6. Hist. ultimo, flore commendata, ubi Vitis floram Gaza uertit, Theophrasti descriptione considerata. Quare etiam à Marcello & Tabernamontano dissentimus, qui duo, duas has Oenantes unam eandemque facere deprehendunt. Sed nec Cordi opinio nobis ardet, dicentis in Diosc. lib. 3. cap. 15. Oenanthen Gaza Vitis florem apud Theophrastum interpretatus est. Satis huic respondet herba, quæ Filipendula iã vocatur, quod glandibus similes radices à lōgis & tenuibus fibris ceu filis pēdeant. Germani proprio vocabulo *Erdeichē* / quasi terrestrem glandem, à radicum similitudine appellat. Videndum tamen est, ne cum hac Chamaedry confundamus, quæ nobis *Erdeychē* i.e. terrestris Quercus vocatur.

Filipendula hanc & ex inquit Lob. eo Camerarius, radice & flore suave quiddam halantem, præsertim quibusdam tractibus Linguagotticis & Aquitanicis, obelæ natis Commentator non respiciet, inquit Lobelius, nec doctorū (Corn. Tragi, Fuchl. Geln. Tabern. Dod. & aliorum) sententiam spreuisset, si verba Dioscoridis pressius perpendisset: & locis aridis petrosisque plurimam eruiisset. Siquidem flos candidus, semen muscosum, squamosum, caulis cubitum & squicubitum altus, itemque radix non altè infusa, sed latè sparsa & ampla è pendulis fibris multis pilularum, perbellè quadrat Dioscoridex effigie &c.

Filipendulam hanc vulgò dictam Arnoldus Villanouanus à radice similitudine, Antoræ speciem fecit: nos tamen cum Gesnero de Lunaris, toto genere differre asserimus.

Theod. Dorsth. Viscaginem & Scrophulariam turpi errore cognominat, eamque apud Laurentium Phrisium à Græcis *Seseli* vocari scribit, cum quo viribus conuenire quidem, sed formâ discrepare refert. Quod huic ū concedamus, tamen rursus meritiò hallucinari dicitur, ut qui non significet, quod *Seseli* intelligat. Ego quidem eo modo *Seseli* aliquod dixerim quo is Scrophulariam & Viscaginem appellauit.

Incertum est (inquit Cæsalp.) utrum hanc Filipendulam foliis iñstet Millefolii, aut Tanacetii, an aliam inter Apii genera à nobis descriptam Recentiores intelligant; nomine Filipendula, cui virer ad calculum frangendum & vrinam pellendam tribunt. Quicquid autem sit, huic quoque Filipendula eadem vires inesse, & efficaciores ob amaritudinem putandum est.

Synon.
& Nomi-
na ling.

Medicis vulgò, ut Trago, Corn. Theod. Dorsth. Cordo. Matth. Dod. gall. & Lat. Anguill. (qui ait vocem esse vsitatam Trotula & Galeno, vocarique in Syria Antula) Geln. hort. & de Lunar. itemque cat. plant. Lonic. Cast. Thal. Camer. Tabern. & Cæsalp. Filipendula dicitur. H. Lugd. p. 782. Filipendula; Oenanthe multorum. C. Bauh. Filipendula vulgaris. Cordo in Diosc. Fuchl. & Lac. Oenanthe. Lob. in Obl. p. 426 in Icon. Plant. p. 729. Oenanthe, Filipendula. C. Bauh. phyt. Oenanthe 9. Nic. Myrepho, *φιαρίδωλα*, Filipendula: Italis ac Hisp. Filipendola, Galli. Filipeinde. Germ. Root *Steinbrech*, id est, Saxifraga rubra: item & *Wildgarben* i.e. Millefolium siluestre: Boh. *Těžebuyš*.

Filipendulam obseruauit Birmii Rhætorum in pratis, Patui in horto publico, D. Cortusi, & aliis. Pertax in horto Cœnobii S. Dominici à l'Angel, Geneuz in multis pratis, ut pagi *Bour-digni*, florentem Maio, Iunio, & Iulio. Lugduni habebam in horto, itemque Montbelg. in horto Ill. E. C. ubi feliciter prouenit ex plantatione, & sem multiplicauit, ac Hieme folia virentia referuauit. In asperis, aridis, ac petrosis apud Germanos ac Britannos humilior exit, in hortis luxuriat ac altius atollitur, inquit Dodonæus: Iunio ac Iulio in flore est, succedente mox semine. In Anglia non procul Bristoia ad Vicentii rupes & caules deuexas, eodem tempore florens Lobelio. In montibus ab utraque parte Rheni Filipendulam nasci scribit Tabern.

Ceterum, Matthæus Syluaticus ac Simon Ianuensis puluerem radices aduersus morbum comitalem commendant: atque cibis frequenter mixtum, valde visum, & efficacem referunt, & contra tormina, intestinorumque flatus conuenire, præsertim addito Fœniculi semine quoque affirmant. Dodonæus Filipendulam, ac præcipuè eius radicem, manifestè calidam ac siccam esse, aperientem & abstergentem dixit, cum nonnulla tamen adstrictione: ac Decodum radices vrinam & calculos pellere: dysuriæ ac vrinæ st. illicidio laborantib' prodesse: & simile de Oenanthe Dioscondem scriptum reliquisse. Alii Filipendulam proximè accedere qualitatibus ad Pœoniam scripsere. Et hinc epilepticos, analepticos, atque vertiginosos, eximè quiddam prærogatiuâ magnopere iuuare Filipendula radices retulit Lobelius. Bayrustamen de morb. dist. 1. tract. 5. c. 3. ad epilepsiam succum Filipendula multum commendauit. Fuchsius etiam in lotij stillicidio & vrinæ remoratu, neque non renum doloribus, atque lapide eorundem conuenire testis est: eadem stomachi inflationes discutit, medetur & suspensio, & anhelantibus, & omnibus morbis, quos causa frigida concitauit: serinam eiusdem cibis comitialium inspergunt. Quicquid sit, huic quoque Filipendula eadem cum sequenti vires inesse, & efficaciores ob amaritudinem putauit Cæsalpinus. Puluis, inquit, radices cum vino haustus dolores stomachi sanat, & iliacam ex frigida causa ex flatu: lapidem frangit, & vrinam impellit: idem præstat extrinsecus fouendo. In clusus sacculo, & in vino & oleo seruatus: in cibis confert epilepsia & asthmati. Aqua totius plantæ distillata medetur pesti, & venenis, & calculo renum, & vesica. Plura de huius usu & facultatib' scriptis prodidit Tabernamontanus.

Vires & usus.

Morb. comitales.

Terminatio intestina.

Radic. & vesica.

Pœonia qualitas.

Succus.

Aspirationes.

Stomachus.

Morb. frigidi.

Parma.

Asthma.

Aqua.

Pestis.

OENANTHE, SIVE FILIPENDULA Montepessulana, folio Apii.

CAP. LXXXII.

Perinde ut Oenanthæ vulgari, seu Fili-Deser pendula, ita & huic gladiolus radices longis filis pendula lanis quàm altius propagantur, tunicâ nigricante contectâ, intus albâ, Pœonacæ germanicæ quodammodò sapore, gratiore tamen, dulci: huius folia plurimum ludunt, primâ germinatione lata, mox Petroselinii vulgaris seu Apii hortenensis (à cuius etiam sapore parum abluunt, nisi quod plusculum adstrictionis habeant) ex virore penè lucida, supra terram ex-
panfi



panfa, demum Peucedani effigiem induunt: caules plures surriguntur caeli, angulosi, striati, cubitum & sesquicubitum alti, multis alis concavi: flores in umbella muscosi, admodum minuti, vel ex albo purpurascens: semina differunt a praedicto Petroselinum, quo multo longiora, veluti capitulum habentia.

Videtur plantam in praesentia delineatam, Matthiolum in post. comm. cum mag. fig. Oenanthes 3. vocare, non tamen legitimam Oenanthes speciem facere.

Gesl. hort. appellat Filipendula aliam speciem foliis ferè Apii hortensis, circa Monspelium.

An Celsalino Petroselinum silvestre vulgo appellatum, & a Recenuonibus Filipendula?

An Lobelio dicitur stirps nostras in Adu. p. 326. Oenanthe minor & vetæ Oenanthæ [sive Filipendulae vulgari] similior? An eadem in Obl. p. 420. Oenanthe angustifolia, exihore folio à vulgata Oenanthe solidum diversa? An in Icon. Plant. p. 729. Oenanthe angustifolia? An hæc inquam Oenanthe angustifolia Lobelii diversa sit, vel tantum variatio, aut summitas nostræ Apii folio, arefactis prioribus foliis, inuestigandum damus posteris.

An Oenantes species Scrophularia dicta Historiz Lugd. An eadem Histor. p. 783. Oenanthe 3. Matthioli?

Tabern. vocat in Hist. Filipendulam 3. & Oenanthem selinophyllon, praecedentibus similes habentem radices, nisi quod paulo maiores & longiores sint: caules similes secundæ; folia verò similia Petroselino Macedonico, sed multo minor: flores ex umbellis.

Camer. in Hist. Matth. Germanica in tabella Oenantes alius hoc signo †, itemque in Epitome (duas enim icones in una tabella exprimit, quarum maior cum nostra Oenathe folio Apii continet) figuram nostram pictura exhibuit, ac dixit, Matthiolum in lat. herbario plures Oenantes species ponere, nullam tamen integrè describere solumque dicere, radicibus & umbellam cum Filipendula convenire. Se verò depingendam curasse, non quod sit vera Oenanthæ: sed quia nomine destituatur, maluisse sub hoc nomine ponere quam sub alio.

C. Bauh. apud Matth. & phyt. vocatur Oenanthe 1. sive Apii folia: secunda Matthioli Lugd. Angustifolia Lobelii: Filipendula Castoris, Filip. tenuifolia Tabernamontani. Item phyt. Oenanthe 2. sive Pastinacæ sylvestris folio, semine oblongo: Oenanthe species Dalechampii, Scrophularia quorundam H. Lugd. p. 785.

Tom. III.

Florentem circa Iunium Monspelii reperi inter Perous & lacum. Audio etiam in silva Agremont provenire. Eandem observavi in horto Gesneri & Ioh. Funckii florentem Septembri. In hortis quidem muratur nonnihil hæc Oenanthæ, sed non tantum ut Pastinacam foliis sub muscariis imitetur, ut exprimitur à Matth. Montbelgardi habeo in horto Ill. E. C. perennem, florentem Iunio, Iulio & Augusto. Martio mense autem observant veteres radices putrescere; & novas producere. Hanc etiam in Italia spontè nascentem, in horto D. Cortusi vidi. Provenire tandè scripsit Camerarius in collibus & locis à Sole illustratis.

Creditur iisdem esse viribus, quibus Filipendulam pollere diximus.


Locus & tempus.

Vires

OENANTHE STAPHYLINI FOLIO

aliquatenus accedens.

CAP. LXXXIII.



Folia huius Deset:

inferiora ad infima folia Oenantes Monspellulanz accedunt, nisi tenuius essent dissecta: pediculus est plusquam spithamizus, cui æquales ex aduerso sitæ alligantur alæ in folia Petroselini subdivisæ; delicatiora utrunque, & incisurâ concinniore, ad Staphylinum quodammodò accedente: reliqua folia ad caulium alas enata Peucedani foliis proxima, id quod etiam in Monspellula Oenanthæ observamus, cuius etiam cauli similis est, & huius caulis pulchra striatus: alludit quoque umbella densissimis muscariis albicantibus stipata.

An est Matthiolo in com. cum mag. fig. Lat. & Ital. Oenanthe secunda, quam ait à Cortulo missam, negatque legitimam Oenantes speciem. H. Lugd. p. 783. vocat Oenanthem Matthioli secundam.

An Tabern. in Icon. Filipendula tenuifolia; Roter Steinbrech? An in hist. Filipendula secunda? Icon eius accedit ad Matthioli iconem, mutatâ tamen, prout apud eum consuetum, illâ nonnihil, an in melius ipse indica: nobis non placent folia sub umbellis.

Plantam à nobis descriptam vocat C. Bauh. phyt. Oenanthem ternam, sive Pastinacæ sylvestris folio, semine Atriplicis, itemque Oenantes alteram speciem, qui nobis plantam ex horto Patavino attulit.

An Oenanthe secunda Matth.

OENANTE SIVE FILIPENDULA

aquatica.

CAP. LXXXIV.

Urbilli olivares ex tenuibus pendent filis plures, quos nō nisi attentâ cautione euel-

Re 2



las, abruptū-
tur quippe fa-
cile, sequenti-
bus caulem dū-
taxat fibris :
caulis cubiti &
sesquicubiti
altitudine ,
striatus , con-
cauus , ramo-
sus , genicula-
tus. Folia infe-
riora parvis
secta, reliqua
longioribus &
tenuioribus
segmentis ex-
ta. Umbellæ
parvæ , albæ :
semen oblon-
gum in duas
velut cuspides
desinit.

An est Matthioli in post. comm. cum mag. fig.
Lat lib. 3. cap. 118. & It. l. cap. 129. Oenanthe quar-
ta quam in Compend. p. 548. describit: nec sapo-
rem, nec odorem, nec colorem assignans.

Tabern.

Tabern. omisit figuram Matthioli, & tantum
descriptionem ad iconem factam ponit pro Fili-
pendula quarta.

C. Bauh. omissa Matthioli pictura, reponit Lo-
belii maiorem.

Lauer mi-
nus Dod.
gall.
Iuncus o-
doratus a-
quaticus
Lac. in fol.

Dod. gall. vocat Lauer minus, *Petite Berle*. Lat.
in Hist. trum. p. 261. & in fol. 580. Iuncum odora-
tum aquaticum, facitque sui speciem alteram.
Quantum autem ex Descriptione & icone licet
conicere, is in sativo non observavit bulbos.

An Lob. in Adu. p. 326. Filipendula Oenanthe
non adeo dissimilis? In Obseru. p. 421. pictu-
ram ex Dodonæo habet, hoc titulo: Oenanthe
aquatica. In Icon. Plant. p. 712. sub vno Oenan-
thes aquaticæ titulo duæ exhibentur figuræ: mi-
nor quæ in Obs. & alia maior postremo addita.

Oenanthe
& Camer.
Camer. no-
tat.

Camer. apud Matth. in Hist. germ. & Epit. vo-
cat Oenanthem quartam, testaturque in paludi-
bus nasci sponte sine tuberculis radicem, has ve-
rò in hortos translatam, aut in aridam deplanta-
tam, sibi demum adsciscere. Is autem Matthioli
figuram ponit nonnihil mutatam, ac aliam in ea-
dem tabella iungit, minorem sc. Dodonæi sine
tuberculis, locis aquaticis repertam.

An. Hist.
Lugd. duas
habet figu-
ras

Sed & H. Lugd. p. 783. Oenanthem 4. Matthio-
li pingit, & fortè aliam ab ea non diuersam p. 773.
Bulbocastani semina Dalechampi titulo. An
autem Historia eandem quam nos perdidit
Bulbocastani semina intelligat, adhuc asserere
non audeamus, multa licet conueniant in descri-
ptione.

Dua plan-
ta Tabern.
Filip. a-
quatica

Tabern. in Hist. dicitur Oenanthe 4. & Filipen-
dula 4. Roter Steinbrech sine icone. In Icon. Fi-
lipendula aquatica Wasser Steinbrech: Eadem
hæc in Hist. Filipendula palustris prima dicitur
Wasser Filipendelmurg & Saxifraga aquatica.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. fecit Oenan-
them quintam sine aquaticam, cognominatque
Oenanthem quartam Matthioli H. Lugd. p. 783. &
Sium, sine Lauer minus Dodonæi sine icone, p.
1093. ac etiam Siler palustre p. 724. dubitat præte-
rea, an sit Petroselinum silvestre Casalpini. Cæ-
terum, in hortis adolefcere, ex figura Matth. refert
& folia terræ proxima Chæresolio similia acqui-
rere. Nobis autem videtur Siler palustre Hist.

S. B. not.

Lugdunensis p. 724. potius esse Oenanthæ folio
Api, quæ loco palustri creuerit, ac diuersam ab
Oenanthæ 4. Matthioli, à qua etiam separauit
Camerarius, cuius nullam videmus descriptio-
nem ex Matthiolo in H. Lugdunensi, licet id as-
serat in animad. C. Bauhinus. Quod verò ait in
phyt. Bulbocastanum 3. sine radicibus multis si-
mul runctis, quæ est Bulbocastanum semina Da-
lechampi H. Lugdunensi, multum cum Oenan-
thæ aquatica conuenire, non improbamus, sed
nec certò affirmamus.

Oenanthem aquaticam, ut pingitur à Dodo-
næo, Genevæ in prato quodam copiosè indeni, Locus & tempus
ad fossas & rivulos. Repertam in pratis inter
Bolweyer & Wersthal plantam in horto Ill. E.
C. sed perit. Audio in palustribus Michelsfelden-
sibus non longè à Basilea provenire. Prouenit
in Misnia (inquit Camer.) & alius locus, circa pa-
lustris, radicibus omnino repentibus, si plante-
tur loco sicco omnino mutatur, & acquirit bul-
bulos in radice, quæ latè se spargit: si ramulus
terræ operiatur, citò radicat. Iuncus odoratus
aquaticus uterque Dodonæi æstiuis mensibus
flore: Augusto semen, in hortis quidem, ad ma-
turitatem peruenit.

Cæterum, Sium istud, authore Dodonæo, ut Vires & Temper.
odore saporeque Sium refert, sic & viribus ac
temperamento simile: calidum videlicet ac sic-
cum, & vrinæ ciens. Matthioli de viribus sen-
tentiam antè posuimus. Filipendulæ palustres
[inquit Tabern. qui hoc nomine plantam de
qua hic agimus & sequentem, quam mox tradi-
turi sumus, intelligit] sapore sunt amariuscule,
cum leui adstrictione, calidæ & siccæ naturæ, a-
perientis & abstergentis facultatis. Mouent vri-
nam & arenulas, extrinsecus & intrinsecus vsur-
patæ. Aperunt obstructions, expurgantque
meatus vrinarios.

Aperit ob-
structions.

OENANTHE, SIVE FILIPENDULA FO- lio Rutæ.

CAP. LXXXV.

Deser.

Radicem habet è multis fibris compositam
ab uno capite prodeuntibus: caules Oe-
nantes aquaticæ: folia ab imo ad summum
usque Rutæ similia, inferiora tamen breuiora
& minora, aliàs in duas aut tres partes diuisa,
superiora longiora, bina semper opposita, quo-
rum quædam non duabus aut tribus incisuris
ferrata conspiciuntur, flores in corona albos,
non aliter visus, ac si qualibet corona, flos
unicus esset. Nascitur in paludosis, locisque
inundantibus. Sapor illi amariuscule, cum ali-
qua adstrictione.

Filip. palu-
stis
Rutæ a-
quaticæ

Tabern. huius Historiæ author, vocat in Icō.
Filipendulam palustrem (secundam addit in
Hist.) & Rutam palustrem, sine aquaticam,
Wasser Filipendelmurg & Wasserrauth. Su-
spicamur nos ab Oenanthæ aquatica, hanc non
diuersam sed varietatem duntaxat, minus bene
pictam. Lectores diligentius rem considerent.

OENANTHE MYCONI CAP. LXXXVI

Perdostus bonus Myconus Medicus Bas-
celonenfis tot Oenantes generum nu-
merum

Defec.



merum quoque auxit, alia hac ex Hispania missa, cuius nec nomen nec usus ante ipsum innotuit.

Hec in montibus & petrosissimata, folia prope radicem per terram spargit, minuta, incisa, laevia, quadantenus Hederae modo, multo tamen minor, ut foliorum hic pictorum magnitudine

vix excedant, inter se coniuncta & congesta, atque ideo Coriandri foliis aut Pastinacae similia, & longis pediculis pendencia, caule enatis cubitali, ab imo rubescente, paucis geniculis cincto, tereti, levi, serè striato, & aliquantulum cano. Radices subsunt multae, ut in Asphodelo, septem aut octo, quandoque pauciores, coniunctae, crassae, foris luteae, intus candidantes, ex quarum extremis radiculæ tenuis, & longæ producuntur. In summo caule flosculi velut in umbella pendent, candidi, ex quinque foliolis constantes, in medio muscosi, quibus pereuntibus in valculis seu siliquis semen mature scit, foliorum & caulis sapor subdulcis, ut & radicem cum levi quadam adstrictione, coracis verò earum amarus.

Synon.

Ab H. Lugd. p. 785. (vbi hæc descriptio legitur) inscribitur Oenanthe Myconi. A C. Bauh. phyt. Oenanthe 6. siue Hederae foliis iunctis.

OENANTHE SVCCO VIROSO, CICY-
tae facie Lobelio.

CAP. LXXXVII.

Locus.

Defec.



partita, & quasi brachiata, nullius fibræ vinculo, aut interuentu (secus Matthioli) continuos, teneros, gustu acres & ingratos, succo lacteo pri-

Tom. III.

miim, deinde flavescente, viroso, & exulcerante prægnantes: umbella Cicutæ, cui affinem autumant, qui maleficio parem expertos se asserunt. Vires namque in acetanis nihil factum fuisse propius, quàm ut interirent, aiunt: alios, qui elitasent, vertigine tenebrosâ palantes, nutantos, attonitos, inque gyrum versantes se vidisse. Et certè tam non est Oenanthe quàm ab ea distat Ruta pratensis, aut Cicutæ. Et hæc Lobelius, qui vocat Oenanthem Cicutæ facie succo viroso crocante, (croceo in Icon. Plant. p. 730.) In Obs. 421. Oenanthem Cicutæ facie, eandem facit cum Olfenichio Cordi. An autem hæc, sit Oenanthe tertia Matthioli, ut videtur innuere Lobelius in descriptione sua, ut etiam asserit C. Bauhinus, nescimus. Olfenichium Cordi negamus, est enim Olfenichium idem cum Apio silvestri Dodonæi.

H. Lugd. p. 783. dicitur Oenanthe alia Penæ Cicutæ facie. Camer. apud Matth. germ. Oenanthæ Penæ venenatis radicibus.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. Oenanthe quarta [& non quartum] siue Chærephylli foliis, tertia Matthioli H. Lugdunensi, eidemque Oenanthe alia Penæ: Filipendula altera species Gesn. hort. Filipendula 3. & Oenanthe selinophyllos Tabernamontani. Verùm si Matthioli per suam Oenanthem tertiam, & Tabern. per suam Oenanthem selinophyllon, intelligunt eandem, quam C. Bauhinus Oenanthem, Lobelii Cicutæ facie, insignis & periculosus erit Matthioli & Tabern. error, ut qui statuunt salubrem esse plantam, quam tamen Lobelius venenatam dixit. C. Bauh. pro Oenanthæ 3. Matthioli, posuit iconem præsentem Lobeli, an bene aliorum esto iudicium.

CRITHMVM ET BATHIS VET-
ribus.

CAP. LXXXVIII.

CRithmon, seu ut alii Critamon (critamum vet. non leg.) herba est fruticosa (Oenanthe 6. siue Hederae foliis iunctis) vndique foliosa, cubitali serè altitudine, nascens in petrosis & maritimis locis, foliis referta pinguibus [amplius] & subalbicantibus, Portulacæ [vires adest] foliis similibus, latioribus (portulacæ, vet. cod. raphanifolia, crassioribus Lac. ex Plinio suspicatur Anguill. superfluum vocabulum) tamen, & longioribus, & in gustu saluginosis. Flores habet albos. Fructum veluti Libanotidis, mollem, odoratum rotundum, qui siccatu disparatur (dehiscit Sagra. rumpitur Plin.) & semen intus velut Triticum (veteres & recentes Diosc. interpretes, & raphanifolia legunt: conuertunt enim, ut Triticum, Triticum modo & figura. Plinius tamen & raphanifolia videtur legisse, reddidit enim semen seruens. Et si quis raphanifolia legat, ut serè Græca exemplaria habent, & solum semen accipiat, etiam sic ad Triticum semen similitudo aliqua fuerit, Corn.) habens. Radices autem crassitudine digitali, tres aut quatuor, odoratas, iucundas. Semen & radix & folia in vino cocta & posita auxiliari possunt vrinæ difficultati & morbo regio. Mouent etiam menses. Editur oleris modo coctum. Conditum quoque in muria seruatur.

Crethmi descriptio & pictura clarissima est apud Plinium lib. 26. cap. 8. Eadem vis (dolores vesicæ sedandi) Crethmo ab Hippocrate admo-

R 3

dum laudata [de nat. mul. item de morb. mul. ac etiā lib. 2. de dicta, ubi corruptè pro *κρηθρον*, *κρηθρον* legitur Corn.] Est autem inter eas quæ eduntur syluestrium herbarum. Hanc certè apud Callimachum apponit rustica illa necale, speciesque (eius, addit vet.) est Batis hortensis. Caulis vnus palmum altus, semen feruens, odoratum, ceu Libanotidis, rotundum, siccatum tumpitur: habet intus nucleum candidum, quem aliqui cachryn vocant. Folia pinguis albicant veluti Oliuæ, crassiora & salso gustu. Radices digiti crassitudine tres aut quatuor. Nascitur in maritimis petrosis. Estur crudum, coctumue cum olere, odorati saporis & iucundi. Seruatur etiam in muria, præcipui vsus ad stranguriam, folio vel caule, aut radice ex vino. Colorem quoque corporis gratiorem facit, verum largior inflationes. Aluum soluit decocto, vrinamque, & à renibus humorem trahit. Meminit idem Crethmi, quem Agnon i.e. siluestrem vocat, eiusdem libri capite decimo. Et rursus eiusdem libri cap. 15. dicens: Acoron vtile est interioribus seminarum morbis, & Conyza vtraque, & Crethmos. Item lib. 25. cap. 13. ait, Crethmos agrios gramias [gremias C. H. gramias Corn. τὰς ἀγρίας, glamias Festus vocat] oculorum tollit impositus, tumorem quoque polentæ addit. His itaque locis de Crethmo marino loqui videtur, de quo etiam Diosc. egit. Sed idem Batim appellat, quæ est satina Crethmus: quanquam & marinam & hortensiam Batim coniungat lib. 21. cap. 15.

Batis
Crethm
sina

Condienda
ex
Columella

Olus chordum

Baticula

Bacilla
Fenicul
marinum

Dorsth. her.

Columella lib. 12. cap. 7. de condienda Bati loquitur, & condituræ modum cap. 13. eiusdem libri docet his verbis. Sunt etiam quedam herbæ, quas appropinquante vindemia condire possis, vt Portulaca, & Olus chordum, quod quidam satina Batim vocat. Hæ herbæ diligenter purgantur, & sub umbra expanduntur. Deinde quarto die sal in fundis fidelium substernitur, & separatim vnaquæque earum componitur, acetoque insulo iterum sal superponitur. Nam his herbis muria non conuenit.

Ex his itaque colligitur, vt ait Cornarius, Crethmum esse eam quam officinæ quædam Cretham marinam, quædam Cretham, velut etiam vulgus Italicum, appellant, & quam Ligures Baticulam vocant, diminutiua à Bati voce. Sunt quoque qui affirmant, sale & aceto conditam in Gallias deferri. Imo etiam translatam istic ab olitoribus ad quotidianos vsus feri. & ab ipsis Bacillam vocari: quanquam etiam Fœniculum marinum aliqui appellent.

Dorstheno Mæcedisiel Germanicè dicitur, in quo eius apparet imperitia, siquidem herba hæc umbellifera nihil cum Carduis habet commune.

Galenus 7. simpl. de Crethmo ait. Est quodammodò salsuginosum gustantibus, vna cum modica amaritudine. Quare etiam vim habet extergendi, simulque siccandi. Verum in vtraque debilius est, quam sunt amara.

Hippocrates lib. 2. de Dieta, Crethmi succum, inter eos, qui vrinam cient recenset. Exemplaria tamen græca *κρηθρον* vocem corruptè pro *κρηθρον* habent. Idem etiam aliàs Crethmum maximè Ethiopicum probat.

Cæterum, Crithmi nomine hæc plantæ donatæ sunt. Crithmum siue Fœniculum marinum. Crithmum tertium Matthioli flore luteo. Crithmum quartum Matthioli umbelliferum. Illegitimus ille Matthioli Tragus, Pena auctore, Crithmi salicornii seu Kali congener est. De Trago Matthioli agitur H. hac g. lib. 35. Portulacæ

Tragus
Matthioli
Portulaca
marina

marinam, de qua diximus H. g. lib. 8. Crithmi Dioscoridis descriptioni melius congruere, quàm Fœniculum marinum, contendit Lobelius. Pastinaca marina, quibusdam Secacul, & Crithmum spinosum.

CRITHMVM MVLTIS, SIVE FOENICV- lum marinum.

CAP. LXXXIX.



Seculenta Desca

Sadmodum est herba, in latum diffusa, pedem circiter alta: folia latiora & breuiora, quàm Fœniculi, crassa, nec tam crebrò incisa, atro-virentia, sapore tub. salso: caulis Fœniculi striatus, porracei vitoris, umbellæ luteæ.

Trago quo- Crithmā
que referente, Diosc. qui
non desunt asserant.
qui Fœniculū
hoc marinum,

Discoridis Crithū,

seu Crithamon, quod & Batin vocat, esse putant. Inter hos est Cordus, Corn. Dorsthen. Matth. Anguill. Cast. Dod. H. Lugd. Cæsalp. Tabern. C. Bauh. & alii. Negant hoc Lob. itemque Tragus, cui videtur Batis hortensiana Plinii, genus esse Portulacæ verum, hodiè incognitum, illud nimirum, quod Olus chordum vocauit Columella.

Coniectura mera est [inquit Marantha, qui in hoc contra P. Collinutium Matthiolo assentitur:] cum nescio quis vult Empetron herbam, illam esse, quæ Fœniculus marinus vulgò appellatur, quam eandem herbam, S. Petri vulgus appellat, quasi corruptè Empetrum, in Sempetrum sit mutatum: non aduertens, nihil cæteris notis conuenire: neque enim deiciendi vim habere: sed omnium consensu Crithmum esse. Totam porro descriptionem Crithmi Dioscoridis, (dempto tamen vnico vocabulo, respondere plantæ S. Petri, eidem tamen vocabulum *πικτυρίος* ex Plinio superfluum videtur. Quin & Apollo hanc vocem Dioscoridi accevisse suspicatur. Sed & auctor H. Lugdunensis Dioscoridis veterem codicem Portulacæ foliis, non latioribus (*πικτυρίος*, sed crassioribus (*κρηθρον*) habere testatur, hancque lectionem maximè conuenire Fœniculo marino.

Lobelius contra in Aduers. negat hanc esse Crithmum, asseritque Portulacæ marinam Crithmo melius congruere quàm Fœniculum marinum, quod neuiquam Portulacæ facies sit, vt Dioscoridi placeat.

Lobelii rationem refellit Cæsalpinus, qui dicit: Baticula vulgò appellatur, & corrupto magis vocabulo *Baticino*, quæ latine Batis dicitur, herbula fruticosa in scopulis, quæ & le-

ritur

ritur in ædificiis, oleis gratia. Dioscorides cum herbulam vocat foliis Portulacæ, innuit nostram Baticulam [Crithmum multis siue Fœniculum marinum dictam] quasi parvam Batim: cum verò cubitalem altitudinem tribuit, alterum genus [Crithmum, siue Fœniculum marinum grandius cui succus lacteus] significare videtur grandius. Plinius utrumque distinguit, tradens Batim hortensem diuersam à crithmo, quam Crethmon agrion vocat, i. e. siluestre. Nec plura de hac stirpe apud autores leguntur, præterquam quòd Rondeletius Empetrum Dioscoridis esse crediderit. Et licet eandem vim & facultatem ferè cum Empetro Dioscoridis habere dicat Tabernamontanus, indeque Empetrum marinum cognominat, ad Empetri Dioscoridis differentiam, non tamen verum Empetrum constituit, ut suo loco subdixi indicabitur, sed verum Crithmum Dioscoridis [quod huic *Crithmum* & *Crithmum*, Galeno autem *Crithmum* & *Crithmum* appellatur; Latinis verò Crithmus, Crithmum, Crethnum, & Crithamum, Icum multus alius affectus.

Empetrum
Dioscoridis
di Rondeletio.

Empetrum
marinum.

Crithmum
Dioscoridis.

Synon.

Crithmum dicitur Matthiolo. Dod. gall. Dorsth. Cordo & Corn. in Diosc. Lac. Anguill. Cast. & Tabern. in Icon. ubi & Fœniculum marinum. Crethamum marinum Cordo in hist. cui & Crethmum Veterum. Crithmum marinum Dod. in fol. latino. Crithmus, Batis, Batis hortensiana Plinii, Crithmus marinus Coldébergii Geßn. de hortis: Item in Append. Crithmus vulgò Creta & Salsa marina. n. Lugd. p. 768. Crithmum Matthioli & Batis Plinii. Camer. Crithmum vulgo. C. Bauh. apud Matth. Crithmum 1. seu Fœniculum marinum & Batis hortensis Plinii. Phyt. Crithmum 1. seu Fœniculum marinum alterum. Lob. in Obs. p. 213. Icon. Plant. p. 392. Fœniculum marinum Empetrum & Calcifraga. Baucula, quasi parua Batis vulgò Castalpino, Creta marina Lonicero.

Cæterum, esse scribit Tabernamontanus, qui Petroselinum marinum, herbam D. Petri, Crethamum marinum, Sampetram, Batim marinam, Calcifragam marinam, Saxifragiam marinam, & Vnguem aquilæ vocent: Petrum verò Crescentium Rincum marinum: Arabes Ierain, Albulaic: Germ. Meerfenchel / Meerbaillen & Meer Peterlin: Belg. & Brabant. Zeemenfel Zeepeterselie: Gallos Bacilles, Saint Pierre, Fenouil marin, Cresse marin. Ital. Fenocchio marino, Herba di Sant Pietro, Crithmo, Crithmo & Crethmo: Hispan. Perexil de la mar, Hinoio marino, Fenol mari, Fungo marinho, & Vnha de agnula yerua, h. e. Vnguia aquilæ herba: Angl. Samperes & Persilber pier: Boh. stracyuho Joffe.

Nomina
linguar.

Locum &
Tempus.

Nascitur marumis saxosisque locis, in lapidum rimis, ac commissuris, plurimumque maritimis Liburniæ partibus, ac non modò in omnibus Tyrreni promontoris, scopulis ac rupibus, præsertim Argentano monte in maritimis Senensibus, & vniuerso circum Italiam littore: sed etiam in Adriatico sinu, vbi scopulosa loca: quemadmodum Matthiolo contigit videre eo tractu, per quem à Tiviano fonte Tergestum navigatur: namque inibi illa scopulosa littora Crithmo referta sunt. Romæ & in vniuersa ferè Hetruria, ac aliis quàm plurimis Italiæ locis, à marumis in hortos, ac vindaria transfertur. Vidi Patavii in hortis: Basileæ in orto Cæli florens & semina ferens nondum matura mense Notembri: Lugduni in hortis: Montpelii & Bisanti,

unde accersitum habemus Montbelgardi in orto, in quo repositum optimè conseruatur, copiosè florens, semen autem non maturans.

Qui Crithmum Veterum nobiscum statuunt, si legant quæ antè circa vires & usum ex iis in medium attulimus. Narrat Amatus Romanum quendam meracioris vini potui indulgentem cum Crethami, i. e. Fœniculi aut Petroselini marini dicti, muria conditi, largiore victu usus esset, in diabetem lapsus fuisse, sed adhibitis remediis intra duodecim dies sanatus restitutum fuisse. In Rhætorum Veltinia aceto conditum aliquando comedi, valde lapidum, non tamen me purgavit, unde non abs re Empetrum esse nego. In muria autem còditum quandoque in Belgium inferri solitum scripsit Dodonæus, quod coctum, velut Cappares cum oleo & aceto edatur. Gratum quidem admodum ciborum condimentum esse: ventriculo bene facere: iocinori, lienì, renibus, ac vesicæ prodelle: vrinam moderatè prouocare: viscera ab obstructionibus expellere: appetentiamque ciborum excitare.

Vires &
vius.

Non potest
gari.

CRITHMVM SIVE FOENICVLVM MARINVM grandius, cui succus lacteus.

Baticulæ hoc alterum genus ex Sicilia habetur grandius: foliis tenuibus incisus, odore Apii, sed sapore Baticulæ: caules ferè cubitales in Autumnis, ex lignosis ramis, in terra procumbentibus, crassis, umbellis candidis: seminibus iam dicto candidioribus, modicè oblongis, striatis, odoratis, & gustu seruentibus: è caulibus recentibus incisus, lacteo succo manans, in lachrymam subrusam concrecente: radicibus, ut prius ramosis & candicantibus.

Locus
Defect.

Baticulæ alterum hoc genus, inquit Cæsalp. descriptionis author, per Crithmum cubitali altitudine intelligere videtur Dioscorides: Plinius vocat Crethmon agrion, Crethmon Hippocratis, & speciem Batis hortensis. C. Bauh. phyt. Crithmum 1. seu Fœniculum marinum maius, odore Apii.

Synon.

Efficacius est minore (prior) in mouendo v. rina: nam tenes & vesicam miro modo purgat.

Vires &
vius.

CRITHMVM QVARTVM MATTHIOLI umbelliferum.

CAP. XC.

O Dioscori reptatæ radicem est: sunt enim ex longissimæ, & vel minimà librâ relicta re-diuvæ, satis crassæ, albæ, Eryngii & gustu & similitudine: folia in quatuor, etiam plura, paucioraue segmenta oblonga diuiduntur, semunciali latitudine, aut ampliore, longa, circumquaque serrata, sapore cum radicibus communis: caulis fœniculaceus, striatus, sarctus, nodosus, valdè ramosus: umbella latis magnæ minimis contextæ sunt flocculis, colore albido: semen gracile, sublongum, quod aiunt acre & odoratum.

Defect.

Tragus Crithmum hoc ad Triticum vadinam refert, & tertio loco sub Crithami agrestis titulo describit, vocatque Germanicè Sichel Märran & Sichel fraut / quibus etiam nominibus Cordus in Dispens. vocatur.

Crith. 4.
Matth.
Camer.
Boni.



Matth. in comm. cum mag. fig. Itemque in Epit. & Hist. germ. cum addit. Camera-ri (ubi hic, nescio cur; Crithmum montanum vocat) Crithmum quartum fecit ac terrestre cognominavit. Crithmum autem hoc quartum Matthioli, Camerarius in Horto Sichelstraut à figura dixit, videturque ipsi

apertius illa Tralliani diuretica. Sed cum Betonica Mux dicatur Brionius, hæc fortè etiam Tralliani fuerit.

Taberna. in Icon. p. 101. huius iconem exhibet sub falso Crithmi Chrysanthemum titulo: itemque sub alieno in Hist. Crithmi sc. quartum, quod spinosum & Pastinacam marinam cognominat. Quare hæc nomina plantæ de qua hic agitur, non conveniunt. Propria verò penitus omisit in iconibus, quæ in Historia, sub quinto Crithmi (cuius figuram pro quarto exhibuit) nomine dedit. Qualia sunt Crethamus arvensis Crithmus arvensis, Crithmus terrestris, & Falcaria herba. Ital. *Crithmo terrestre*. Germ. *Suschelstraut* / *Sichel Möhren* / *Acker Bacillen* & *Selbbacillen*. Qualiter, aut, à Veteribus fuerit appellatum, nemini constat.

Lobelius in Adu. p. 168. Crithmum hoc 4. Matthioli nihil similitudinis habere dicit cum Crithmo Veterum, sed idem, meo quidem iudicio, malè Eryngium appellat, licet & Dodonæus in folio Eryngii adscribat, & quartum inter spuria constituat, odore & sapore fretus, quo non Crithmum sed Eryngium referre ait.

Crithmum Montheig. in agris mense Iulio, Iunio, & Augusto, in Alsatia abundat, translatum in hortum Ill. E. C. suo reptatu ingenti redditum est valde odiosum, quamvis crassam habeat radicem. Circa Basileam intra D. Ioannis portam, & pagum hunnigen provenit in agris ad sepes. Nasitur in Bohem. copiosè, præsertim in agro Prageni, non solum inter segetes, sed in agrorum marginibus & secus vias. Copiosè provenit etiam in Flandriæ sabulosis secus Blanquebergam Brugarum, referente Lobelio.

Aperit, digerit, excalfacit, siccit, & mediocriter incidit authore Matthiolo.

PASTINACA MARINA, QVIBVSDAM
Secacul & Crithmum spinosum.

CAP. XCL

Deser.

Pastinacæ marinæ herbæ radix crassa, tenera, alba, gustui graussima, dulcis, & rugosa, ut Pastinacæ sativæ Germanicæ latifoliæ: folia crassa, duos ferè palmos longa, spinosa, crebris divi-
suris incisa, sapore aromatico cum quadâ salugii-



ne: caulis cubitalis, in multos diutius ramos, quibus insidēt umbellæ spinosæ floribus parvis albis donata.

Plantâ hoc Synon. capite à nobis pictam & descriptam. Pastinacam marinam Monspelienles dixerunt, quidam Hippophaen Dioscoridis, cuius historiz respondere videtur Dalecham-
pio, diligenter

tius tamen id disquirendum relinquit, alii Tribulum marinum.

Matth. in comm. cum mag. fig. itemque Hist. germ. & Epit. cum addit. Camera-ri (qui apposuit figuram ex Gesnerianis & mea planta, nisi fallor cum pilis, inscribit Crithmum secundum seu spinosum, à Cortulo missum.

Lobelius vexat Matthiolum, ac de hac Pastinaca marina ait. Et sciunt exercitati, secundum Crithmum Commētoris planè Pastinacæ aut Eryngii gustum odoremque præ se ferre, unde Arabum Secacul opinionem fecit, vulgus Pastinacam marinam vocat. Vtrumque litus superi inferique maris Italici hæc planta scaturit, ne non putet Senensis se munus leuidentis à Cortusiana Magnificentia accepisse, quod pueriliter solitus est iactare, & inculcare putidiuscula infantia. Hæc ille, qui immeritò Matthiolum taxat Numquid ingenuum est fieri, per quos profecerimus? Tacuisset Matthiolum si Lobeli supercilio cōtectus fuisset, qui plures Historias clam excerptit, & ex autoribus descripsit. Lob. in Obs. p. 408. l. c. Pl. p. 710. Pastinacam marinam dixit, quam antè Dodonæus Crithmum spinosum inscripsit, ac pro Crithmo 2. Pastinacæ albæ sapore & figurâ descripsit.

Duas figuras & descriptiones vnius plantæ habet H. Lugdunensis. Eius enim Tribulum marinum p. 1167. & Pastinaca marina Penz & Lobeli, ac Crithmum secundum Matthioli p. 1396. idem est.

Taberna. in Icon. vocat Crithmum spinosum & Pastinacam marinam. In Hist. pro Crithmo pingit, ac pro quarto describit, ac dicit vocari Pastinacam marinam à dulci & grato sapore Pastinacæ, ob quem etiam in cubis ulurpetur.

Anguill. epist. 4. dicitur Secacul: Apollini Secacul. Rad. 1. supra diasatyrion, Secacul legitimum, Coldenbergius in Disp. Cordi, si genuinum. Secacul non fuerit, in eius locum tamen com-
modè substitui posse arbitratur.

Monspeli obseruavi ad mare florentem Augusto mense, & Vere prorumpentem: Venetiis ad litus maris: Lugdunū habui in horto, accersitum Monspelio. Iisdem provenire locis in maris litonibus, in quibus Crithmum marinum Matthiolum prodidit.

Eodem autore ea omnia præstare potest, quæ Locis & Crithmi genus, nisi quoddam vim aliquam incusam habere

Crithmum
2. Matth.

Pastinaca
marina
Lob.

Matthiolum
dicitur
quædam
Lobeli
inducitur.

H. Lugd.

Crithmum
spinosum
Taberna.

Locis &
tempus
habere

habere videtur. In Narbonensi Prouincia radices
crucas plebecula elitat.

SESELI ÆTHIOPICVM FRVTICOSVM,
folio Periclymeni.

CAP. XCII.

Delor.



Ramis, ali-
quot cu-
bitalibus, &
altioribus fru-
ticat, rigidis,
lignosis, ni-
gricante cor-
tice intectis, in
multos ramulos
diductis, folia
per ramos sub-
longa Pericly-
meni, angusti-
ora, leuiter a-
cuminata, bre-
uiora quam
Laureola gla-
bra, sapore &
odore iuglâdis,
sed multo mi-
tiore gratiore-
q: umbelle pul-
chre, sceniculaceæ: semen delapsis flauescens
stibus gerūt oblongū, canaliculātū, magnitudine
seminum Fœniculi. An Tragiū Creticum Cordi
in Obs. Sylu.

Seseli Æ-
thiopicum
L. Matth.

Matth. in post. comm. cum mag. fig. solam dat
iconem Seseleos Æthiopici secundū inscriptione.
Nec existimariū repertam iei plantam, quæ des-
criptioni Dioscoridis melius illā conueniat. Ca-
merarium dixerim in Hist. germ. Matth. & Horto
nostram plantam exhibere pro Seseli Æthiopico
vero: in Epit. pro Seseli Æthiopico: Et sic etiam
vocat Castor, Lob. in Icon. Plant. p. 634. Ta-
bern. in Icon. & H. & Anguill. epist. 12. & Dod.
gall. qui præterea nominat Ægyptiorum *αἰόρος*,
αἰόρος, h. e. Cyonum phrycen, sine icone. Latunus,
in fol. addit figuram, cui Seseleos Æthiopici stu-
ditis titulū apposuit, interpretatūque est *αἰόρος*,
αἰόρος, canis horrorem.

Seseli Æ-
thiopicum
L. Matth.

Canis hor-
ror.

H. Lugd. p. 750. Seseli Æthiopicum verum.
C. Bauh. apud Matth. Seseli 4. in Phyt. Seseli 3.
sive Æthiopicum Herbariorum.

Locus.

De Seseli Æthiopico dissent Lobel. in Aduers.
Matthiolum increpans his verbis. E Gallopro-
uincia Massilia, circum atque prope Ceti mon-
tem, orā Narbonensis maris, non procul Mont-
pelio, nonnulli studiosi stirpem hanc deserta-
dam curarunt Luteriam, Antuerpiam, adeoque
in Italiam, ubi nondum innotuerat vel doctis.
Quin ne nunc quidem notam esset. Senensi
Commentatori, in postremis Imaginum recensis
& mutatis sententiis, magnā iniuriā factā Phal-
macopæorum plebi, Medicisque ignauis: Et
sanè multo maiore suæ dignitatis detrimento,
id contigisse magis dolendum, quàm ridendum
moderatius ingenis. Qui norint non vulgari
moderatione & certā prudentiā illum quā cum
licuit lapsibus vno loco tam multis occurrere
constitū: cum enim per opinionem tum fiducia,
tumeam emunctæ cognitionis, quam illis de
se iam dudum excitaret, leuisset illi (si libisset)
non solum picturis mendosis, sed etiam verbis
Tom. III

subdolis persuadere, picturis tamen contentus
fuit, & silentio suæ dignitati consuluit. Si quā
tamen ulus est vasculā inuersioniculā, est illa
leuis ferenda: non enim nouerat aptiores: aut
si norat, se tantopere deceptum latere, eius
dignitatis non erat. Igitur quas potuit, dono
puta emendicatas, idē nec recens animaduert-
tas, aut descriptas, in paginas congescit, per-
peram quidem binas [diuersæ penitus formæ
pro Æthiopico seseli] censitas, sed tamen earum
nam semē coram istam, quæ est Seseli
Æthiopicum verum: cuius effigiem mutuatus
fuit à Dodonæo Medico multum exercitato.
Quod Seseli, si ut pictum in Dodonæo, ita vi-
uum in agro vidisset Commentator, lubens &
volens suffecisset, in locum illius plantæ, cui
videtur postpositum: est enim illa non frutex,
sed herba, quam Recēiores Libanotidem The-
ophrasti prodiderunt, viribus & figurā aliena,
ab hoc Æthiopico, quem fruticem, adeoque
magnum, Dioscoridis correctior codex statuit
esse.

Hunc fruticem vidi apud Clariss. Virum D.
Cortusum, virentem mente Ianuario, qui etiam
misit semina, quæ Montbelgardi lata prouenire,
plantæque produxerit Hiemem perferentes, Iu-
lio ac Augusto cum floribus ac seminibus in
vigore existentes. Sed & Dodonæus hoc statu &
eodem tempore, in saxosis, & maritimis, haud
procul Massilia, tum & aliis Narbonensis Gallie
locis repenti prodidit: Lobelius præterea eni-
am ad Ceti montis celsi radices, quæ in lacum
vergit, uberi prouentu fruticare scripsit. Bel-
lonius author est semper virere, spontē nascens
quibuldam locis apud Orgon & Salonem pe-
træam.

Locus &
tempus

Idē eximiarū virū huius semen esse dixit, e-
iusque copiam se misisse Venetis & Lugdunensibus
ad Theriacam, quod scilicet, ut Dioscorides in-
nuat Massiliensi Seseli multo odoratus sit & ef-
ficacius.

Virum
magnum
nam

PERFOLIATA IN GENERE.

CAP. XCIII.

DE herba Perfoliata dicta, ut hoc capite ver-
ba sequamus, requirit ordo noster Botani-
cus. Siquidem & hanc ipsam umbelliferam non
nulli Seseli Æthiopici effecerunt: Alii tamen
an Cacalia sit ambigunt: Nonnulli tandem, ni
radix obstaret, Cotyledonem esse pronuncia-
rent. Nostro autem iudicio, tam Dioscoridi,
quàm aliis veteribus indicta est. Perfoliatam
ex eo receptiores appellant, quod caulis eius
singula folia pertransit, penetret, atque dissecet.
Quædam græcè dicitur *Σχρυννική*, quod no-
mē aliquis ante ipsū legerit, nos latet. Germa-
ni vocant *durchmax*, *Stropfloch* & *Brüchwürg*,
itemque *Viabelsfrant*, quod se multi vult sit ad
umbilici rupturam, ac etiam genitalium mem-
brorum. Quare autem Tragus concedat posse
dici *Löffelkraut*, non video. Belgæ nominant
Onerwas: Galli *Persefouille*: Ital. *Perfogliata*: An-
gli *Thorow Waxe*: Boh. *Pupfowa bylina*.

Seseli Æ-
thiopicum
L. Matth.

Nomina
ling.

Matth.
L. Matth.
per Lobel.

Perfoliatæ nomine sequentes donauimus
plantas. Perfoliata simpliciter dicta, vulgaris,
annua. Perfoliata crispa seu muscosa. Perfolia-
ta annua longioribus foliis. Perfoliata alpina
magna longifolia. Perfoliata minor foliis gra-
S

Aquimica

mineis. Et de his quidem ordine dicemus. Ad-
dit Perfoliatam rubram Gesnerus, aliis Vacca-
riam dictam, de qua H. n. l. b. 29. Itemque de Per-
foliata lutea. Perfoliata filiquosa, cuius & alter-
rum genus purpureum, tradita est H. n. g. lib. 21.
Perfoliata 3. C. Bauh. phyt. est Smyrnum perfo-
liatum.

PERFOLIATA SIMPLICITER DICTA
vulgaris annua.

Deser.



Pollicari
serè crassi-
tudine radicem
habet vnicam,
albam, paucis
fibris capilla-
tam, sapore
Rapunculi,
suavitatis cu-
bitum & ses-
quicubitum al-
tus, aut maior,
lævis, teres,
striatus, geni-
culatus, con-
cauus, in mul-
tas al. s. diuisus
odore nonni-
hil aromatico
nares cum dis-
cinditur rum-
piturue series:

filia, quæ singulis singula apposita, ex rotundo
sublonga, glauca, Dodon. dilutè virentia, læuis,
glabra, transadigit caulis vel ramus, à quo cen-
tro vndique in circumferentiam foliis excur-
runt obliqui, arcuati nervuli, sapore oleraceo, sed
feruidiore: extremi ramuli in pediculos aliquot
satiscunt: folia tria, quatuor, aut quinque acumi-
nata parua sustinentes, inter quæ emicant strobili
pusilli umbellati, suis singulis pediculis innixi,
colore luteo, vel subluteo Dod. Alchimillæ: se-
men iis succedit oblongum, altera parte acutius,
pullum; [Dod. subnigricans] narius quàm Pulegi.
Et hæc est illa perfoliata cui primò & magis pro-
priè paulò antè recitata linguarum nomina con-
ueniunt, itemque vires de quibus mox infra di-
cemus, licet & aliis quoque attribui possint.

Synon.

Matth.
reprob.

Icones

Cacalia
Lacuna
C. Bauh.

Perfoliata dicitur Brunfelsio apud quem non
sua effigie picta est. Cordo in Hist. Apollinari,
Dod. lat. in fol. Gesn. hort. Cast. Lonic. H. Lugd.
Tabern. Schvvenckf. & Matthiolo, cui hanc
in mentem redegit plantà, quam Personatam
vocant. Egtegiameherde Matth. combinatio,
qui non inuenit commodiorem locum introdu-
cenda Perfoliata, licet sit interpret Diolecoridis:
is tamen satis laudabilem figuram habet: patro-
cinator verdè deterior: sed & nostram sanè, quæ
Fuchsiana, meliorem optarim.

Fuch. inscribit Perfoliatum, & Dod. gall. Per-
foliatam maiorem & minorem Camer. hort.
Perfoliatam veram Thal. Perfoliatum vulgare
flore luteo, folio umbilicato Lob. in Obs. p. 21. &
in Icon. Plant. p. 496. Cacaliæ Lacuna.

C. Bauh. Perfoliatam i. s. idè vulgarem quæ apud
Matth. olim iactat se in Phyt. septem assignasse
Perfoliata. Sed quod annotat oportebat, Per-
foliata eius tertia, nihil aliud est, quàm Smyr-
num perfoliatum. Quartam etiam & quintam
eandem credimus, sc. Perfoliatam Alpina ma-

gnam longifolia, ita ut ipsi tantum quinque no-
bilem veræ & genuinæ supersites maneat
Perfoliata.

Malè Tragus pro Cotyledone primo Diosco-
ridis aut umbilico Veneris exhibet Perfoliatam.
Nec placet Cæsalpinum Perfoliatà ad Sefeli Æ-
thiopicum reducere.

Nonnullis locis in aruis, inter segetes spon-
te exit, nascitur & in pratis ac iuxta agrorum
margines in Italia, Germania, Thuringia, Bohe-
mia, & Vvirtembergia non infrequens, alibi in
hortis seritur. Per me in hortum semine transla-
ta, semine deciduo satis se propagat. Reperit
Perfoliatam etiam in vineis Matthioli. Iulio &
Augusto præcipuè floret: si ipsa est annua, quæ
semine perfectè intereidit.

Modicè calida, paulò verò amplius sicca hæc
est: ut pote nonnihil amariens & adstringens.
Inter eas numeratur, quibus solidandi & teru-
minandi vis est. Datur decoctum herbæ ex vino
paratum, aut folia in puluerem trita, internis af-
fectionibus, ruptis, & ex alto delapsis: ad rames
intestinarum præsertim puerorum commenda-
tur: horum etiam prominentum umbilicorum, re-
cens cum farina & vino rufa, ac cataplasmatibus
modo imposita, reprimunt. Strumas etiam hoc mo-
do adhibita resoluit, & contra tædium, vulgò
Uerberoyen efficax est. Ad fracturas etiam, her-
nias & erysipelata magni usus esse perhibet
Schvvenckf.

PERFOLIATA ANNUA LONGIORIBVS
foliis.



Annua
hinc vita Deser.
ut vulgari: ca-
les non surgit,
sed per hu-
mum sparsos e-
dit, ramosos,
cubitales, cre-
bris ceu geni-
culis intercep-
tos: folia tran-
sadigentes, quæ
vulgari longio-
ra, modicè acu-
minata, quinque,
septenarius per
longum curri-
tibus venis do-
rata, quæ ta-
men à monta-
na foliorum
longitudine

vincuntur: flores in summorum foliorum aceta-
bulis sessiles, lutei, Auriculæ leporis similes. Ra-
dix tenuis gracilis, multis adnatis diuisa.

C. Bauh. phyt. vocat Perfoliatam 7. siue mi-
norem ramis inflexis, quam referè me, Perfoli-
atam aliam minorem annuam non surteam,
vocare.

Anno 1595 mense Maio & Iunio Stutgardie
in horto E.C. à me visa & descripta.

PERFOLIATA ALPINA MAGNA, LON-
gifolia.

Maior, maioribusque foliis donata est Alpina
perfoliata, his verò oblongis, palmatis
& ampli-



& ampliori-
dus, ad Perfoli-
atæ siliquosæ so-
lia accedentibus,
quæ nec aliter
caulis traiecit, pin-
narum duntaxat
alis caulem com-
plexa: verum su-
periora folia pro-
piti ad Perfoliatæ
vulgaris accedunt,
ex oblongo non-
nihil rotunda.
flos parv^{us}, luteus,
foliis rotundis
obvallatus: semen
oblongum, stri-
tum, maius quàm
Perfoliatæ vul-
garæ: radices
crassæ, perennes.

Eandem H. Lugd. p. 1321. Perfoliatæ longifoliæ
Dalechampii titulo describit: quæ C. Bauhino
quinta est, nostra verò quarta, eo sic illas per-
peram separante.

Locus &
Tempus.

Tossanus Carolus pharmacopœus misit nobis
Perfoliatæ Bupleuri folio nomine anno 1592. Ego
eam semine colere incepti Môtbelgardi in horto
III. E.C. ubi semen maturabat Iulio & Augusto
pluribus annis durans. Hanc postea communi-
cabat Gesnerus Quingero.

PERFOLIATA MINOR FOLIIIS GRAMI- NEIS.

Descri.



Perfoliata
minor
crassiusculam
habet radicem, &
terram versus
comosam, ex
qua caules pul-
lulant plures,
palmares, pe-
dales, & cubi-
tales, teretes,
striati, per quos
folia acuta, basi
latiore caulem
complexa, un-
ciam unam,
aut alteram lon-
ga, semunciam
circiter lata,
alia verò gra-
minacea, palmo
etiam longi-
ora, culmum lata: umbellæ inæqualibus con-
stant muscatis flosculorum luteorum foliorum
rotundorum, vallo munitorum.

Cæsalp. vocat Sefeli Ethiopici genus parvum,
foliis gramineis. C. Bauh. phyt. Perfoliatam G.
siue montanam minorem folio acutissimo.

Sed
descrip-
tum
Perfol.
Bauh.
1592.

BUPLEVRON VETERIBVS

CAP. XCIV.

Meminit Bupleuri Nicander in Ther. ubi
semina aduersus serpentum venena com-
mendat. Demetrius Bupleurum arborem esse

ait: sed hoc negat Scholiastes Græcus, qui Olus
[ἀλυστον] facit, cuius mentio fiat apud Nican-
dram in inscripto Hyacintho.

Bupleuron autem in sponte nascentium nu-
mero Græcos habuisse prodidit Plin. lib. 22. cap.
22. ubi hæc præterea addit. Caule cubitali, foliis
multis longisque, capite Anethi (vel umbellæ
tantum figurâ, vel etiamnum floris colore Da-
lech.) laudatum in cibis ab Hippocrate: in Me-
dicina à Glaucone & Nicandro. Semen contra
serpentes valet. Folia ad secundas feminarum,
vel succum ex uino illinunt: & strumis folia cum
sale & uino. Radix contra serpentes datur in vi-
no, & urina cienda. Idem lib. 27. cap. 8. repetit
dari Bupleuri semen ad ictus serpentium, soteri-
que plagas decedat eâ herbâ, adiectis foliis Mo-
ri, aut Origani.

Quæ Ruellius lib. 2. cap. 127. de Bupleuro
scripsit, cum Plinii verbis coincidunt. Eadem in
Caroli Stephani prædii rustici Horto; itemque
apud Phauorinum, & Gesnerum de quadruped.
leguntur. Sed hic quidem inter Pastinacas erra-
ticas censeri vult, quibus & descriptione & sa-
cultatibus fauere scribit. Idem Bupleurum, bouis
costam reddidit, & esse Dulbub Syluatici ait, sed
quid sit Dulbub se nondum reperisse.

Plinius apud Dalechampium scriptum reli-
quit Bupleuron esse quibusdam Ammi. vulgare.
Iacob. autem Greunus, qui specialia remedia
aduersus omnia venena recenset. Bupleurin tam
incognitam nobis asserit, quâ Pulibatam. Gor-
teus tamen in carmine suo Bupleuro (itaenim vo-
cat) eadem, quæ Idææ Cupresso assignauit: ita e-
nim canit.

Quibus addita dicti

Semina Bupleuri, iuxta Idææque Cupressi:

Omnia quandoquidem certa sunt ista medela,

Infictos quæ abigunt serpentum dente dolores.

Sed nec desunt, qui præter iam dicta, censeant
Bupleurum esse Auriculam leporis umbellâ luteâ,
quæ alius, ut Lutetianis Gratia DEI dicitur.

Quin & Auricula leporis altera (seu rigidior, à
quibusdam Bupleuron existimatur.

Acanthum germanicam, Brancam vsinam
vulgò dictâ, nobis autem Spondylium, vocatî à
Nicandro & Plinio Bupleuron, & à Veteribus
Græcis Buprestin, videtur concludere Cordus.
Sed hic non leui errore Bupleuron cum Bupresti
confundere deprehenditur.

Auricula
leporis
umbellâ
lutea.
Auricula
leporis
rigidior.
Spondylium
Buprestin.
Cordus
error.
Buprestis
alius.

BUPRESTIS VETERIBVS.

CAP. XCV.

Theophrastus hanc agnouisse, vel inde mo-
ritur quis coniectatur, quod Buprestim [B-
uprestin] primis imbribus, post æquinoctium germi-
nare dixerit.

Galenus in explicatione vocum obscurarum
Hippocratis scripto testatus est, præter Buprestin
animal, Cantharidi assimile, esse Buprestin, olus ali-
quod agreste [ἀλυστον ἄγριον] cuius meminerit
Dioscorides partum in 3. libro salubrium, partum
etiam in eo, qui de olenibus [πυλίστατον] inlece-
ptus sit.

De Bupresti Plinius hæc adfert lib. 22. cap. 22.
Buprestim magnâ inconstantia Græci in laudibus
ciborum etiam habuere: iidemque remedia tan-
quam contra uenenum prodiderunt. Et ipsum
nomine indicio est, bouem certè uenenum esse (igno-

Græci
Buprestin
Buprestin
Buprestin
Buprestin
Buprestin

Plinius
erret.

ranter hęc Plinius. De Bupresti herba id non traditur, sed de Bupresti insecto, scarabæo longipedi non dissimili, à Plinio lib. 30. cap. 4. descripto, Dod.] quos dissilire degustatâ fatentur.

Plinius
confundit
Bup. est
herbam &
insectum

Gesn. de quadr. in boue & vacca, Plinii verbis iam citatis hæc subnectit. Videtur autem animal Buprestin, quod bubus venenosum est, cum herba eiusdem nominis confundere, ideoque Græcorum inconstantiam reprehendere. Cuius & ignorantie & confusionis Plinium etiam arguunt Rob. Constant. in Lex. Græco: Corihæus in defn. & Etymologici autor.

Æquiuoca

Satis itaque superque patet ex dictis Buprestin herbam eiusdem esse nominis cum animal ex Cantharidum genere.

Sinapi si-
milis

Buprastis vel Buprestis Varino est genus oleis siluestribus simile Sinapi, de hoc H. g. lib. 21.

Bupleuri

Buprestin veterum Græcorum, Cordus indigitat Bupleuron Nicandri & Plinii, non sine lapsu. Idem Buprestin veterum Græcorum ait esse herbam umbelliferam. Brancam vrsinam vulgo Germanico dictam nos Spondylium inscriptimus.

Buprestis tandem quibusdam est Auricula leporis quam duplicem agnouimus, & iam tractandam aggredimur.

AVRICVLA LEPORIS VMBELLA lutea.

CAP. XCVI.

Desca.



Auriculæ leporis appellant vulgo plantam cui radix parua, rugosa, subviridis, fibrata, sapore acris: caulis tenuis, teres, lævis, striatus, crebris geniculis donatus, intus inanis, altitudine cubiti vnius, aut duorum, ramis multis concavus, colore subrubente interdû, aliàs viridi: folia, præsertim

que in caulibus existunt, longiuscula, stricta nervis secundû longitudinē pluribus donata: inferiora autē latiora sunt [quæ tamen nostra figura Guatiniiana non exhibet:] Flores Fœniculi lutei in umbella minis patula: quibus semen succedit Petroselinæ acre.

Synon.
Elaphoboscum

Hæc est illa, quam Ruell. lib. 3. cap. 48. Elaphoboscum vocat, itemque Romanorum Cerui ocellum, officinarum Gallicarum Gratiæ Dei, & Sueffionensis agri Herbam copariam.

Ocell. cerui
Gratia Dei
Herba coparia

Quam Tragus Herbam vulnerariam [vunde fraut] inscribit, ac Panaces Chironium esse suspicatur, eadem cum nostra est. Ipsi autem [vt & Lonicer] assentiri non possum, vt qui Panacem vocat, cum Panax chironium, folia similia Amaracæ, vel vt Lacuna legit, Origano, habeat, hæc autem longè diuersa.

Cordus in Hist. Isophylli nomine describit: *Ca-* *Isophyllum*
mer. in horto & Dod. gall. Bupleuri: lat. in fol. *Cerdi*
Bupleuri angustifolii. Lob. an Adu. Bupleuri
quam non malè Bupleum Hippocratis, ex Plinii
historia, nomenclaturæ & effigaturæ quadrare
credidit. Sed quæ effigies quæso apud veteres *Bupleurum*
Bupleuri habetur? In Obs. p. 243. vocat Bupleu- *Lobel. nos.*
rum Dodonæi & Herbariorum. In Icon. Plant.
p. 456. Herbariorum Bupleuron angustifolium.
H. Lugd. p. 436. Bupleuron Dodonæi.

An Anguill. epist. 11. Bupleuron Demetrii, inter Veronam & Brixiam inuentum, pulchrius montis Baldi.

Catal. Francoford. & Helfrico dicitur Auricula leporis, *aut. tur. & a. y. y.* Basen obrlin/ Gall. *Oreille de lieure.*

Montbelgardi variis in collibus copiose pro- *Locus &*
uenit, vt iuxta collem Rosse, nec non prope Ar- *tempus.*
bouans florens Augusto, ac etiam Octobri, Basileæ circa molendinum ad Brixiam etiam Iulio, semen autem maturans Septembri & Octobri: circa montem Krenzack in Marchionatu: Geneuz in monte Thuri. Isophyllum Cordi nascitur montanis locis, solum amat argillaceum, calcario lapidi mixtum: radice nititur perenni. Reperturque variis Germaniæ, tum & Hispaniæ locis: Iulio ac Augusto florens deinde semina perficit.

Quia porro tota planta saporem habet suba- *Vires*
crem, aliquantulum amarum, & saluam prouo-
cantem, Perfoliatæ, Cordo teste, non dissimilem: ideo non abs re Dodonæus semen calidum, sic-
cumque secundo ordine esse dixit.

AVRICVLA LEPORIS ALTERA SIVE rigidior



Differentia in folio est, quod non tantum maius, sed etiam crassius, rigidius, nervosius, modicè in acumen desinens, introque flexis oris concavam carinam, aut potius leporinam surrectam auriculæ referens. Et talem habeo inter meas siccas plantas

Dalechampii *Dalech.*
descriptionem, *deser.*
quæ placet, hæc subiicere li-

bet. Folio conspicitur longo, rigido, latiusculo in medio supernè in angustum desinente, serè lanceolato, multis striis quasi distincto, nonnihil concavo & inflexo, vnde illi Auriculæ leporinæ nomen: caule procero, geniculato, in ramulos superiore parte diuiso; umbellis in summitate pusillis, sparsis, luteolis floribus, semine Anisi aut Anethi, oblongo.

Dod. lat. in fol. Bupleurum alterum latifolium in scabris

*Non est
Bupleurum
Cordi.* inscribit, atque Cordum Isophyllum vocare. Sed fallitur: nostra enim ita sententia, esse Bupleurum angustifolium.

*Elaphobosc.
non est.* Lobel. in Adu. p. 192. alteram Bupleurum cō-
generem latifoliam, Auriculam leporis dictam,
Elaphoboscum esse negat. In Obs. p. 244. &
Icon. Plant. p. 456. alterum Bupleurum latifolium.

*H. Lug.
repro.*

Hist. Lugd. duas & descriptiones & figuras habere vimus plantarum, ac planè similes, ut una ex altera facta videatur. Huius prior est p. 436. hoc titulo: Bupleurum alterum latifolium Lobelii, cuius etiam descriptionem retinuit, ac effigies Monspelienfes Auriculam leporis vocare ait: Lutetiae nunc Gratiam, nunc Elaphoboscum: Quosdam Buprestim Plinii. Alteram, quā p. 741. Panaces Chironium quorundam Dalechampii inscripsit, alios Bupleuri speciem, Monspelienfibus Auriculā leporis dictam, vocare retulit: alios Elaphoboscum, quosdam verò Buprestim Plinii. Vides inanem repetitionē duarū descriptionum & figurarum.

C. Bauh. phyt. vocat Bupleuron 2. siue folio rigido, & Bupleuron majus Gesnero.

Loc.

Multi sunt anni ex quo habeo Auriculam foliis rigidis, unde, non recordor. Gener. Cherlerus attulit collectam circa Monspelium, in eodem in locis, in quibus prior occurrit, nē procul Gramōtia silua, longè frequentiore.

AVRICULÆ LEPORIS AFFINIS, ODon-
tis lutea Valerandi & Dalechampii.

CAP. XCVII.

Descr.



DVerā, lignosā, albicante, simpliciter radice nititur, à qua statim colliculi aliquot surgunt dodrantales aut paulò maiores, Bupleuri similes, in multos ramos diducti: foliis incōdita, lanatis: strobili lutei perfoliatis, vallo foliorum oblongorum, acutorumque circumdata: semen Polygoni Tragi se-

rè simile, quod fnaull vocant.

Ceterum, magnam eam affinitatem cum Odontide purpurea Plinii, quæ est flos cuculi Tragi, ob quam à Dalechampio apud H. Lugd. 1663. nominata est Odontitis lutea, animadvertere non possum.

C. Bauh.

*Caryophyl.
lutea.*

Miror etiam C. Bauhinum hanc plantam referre ad Caryophyllos [Betonicas sc. coronarias] facereque in phyt. Caryophyllum 40. siue flosculo minuto luteo.

Ranzius hanc quoque dedit collectā in Euganeis montibus. I. H. Cherlerus ex acclivibus versibus Castellononanum Monspelio attulit, sub Tom. II

nomine Bupleuri graminei. Locis humidis gaudet.

Huius decocto si quis os colluat, dentium vulg. cruciatus sedari scripsit Dalechampius.

AVRICULÆ LEPORIS MINIMA.

CAP. XCVIII.



PEdalis aut cubitalis Descr. est piatula, quæ ex radice candida, dura, lignosaque, fibris aliquot exiguis prædita, colliculos surgit graciles, teretes, multis ramulis, ab imo ad summū brachiatos, in pinnas veluti umbellas desinentes, quæ exiguis foliolis, tenuibus, & rigidiusculis constant, & in eorum medio

semina prominent ex brevissimis pediculis, tria, vel quatuor, striata, ad Petroselinum vulgare accedentia. Alas verò singulas, singulum ab ima parte inuestit folium, longitudinis ynciæ & semis, Odontidi Valerandi & Dalechampii per simile, tribus aut quatuor per longitudinem nervis præditum, acuminatum. Flos mihi hætenus non visus. Sapor exsiccatæ evanidus & obscurus.

Basilicæ inter Byrsam & Tyluam, quā Augustus ait crescere audio mihi data à Richnero.

NARDUS INDICA VETERIBVS

CAP. XCIX.

Hæc est illa Nardus, quam Theoph. hist. lib. 9. cap. 7. cum omnibus aliis, aut plurimis odoratis ex India aduehi narrat. His sc. quibus v. Theoph. tuntur ad vnguenta.

Dioscorides duo Nardi huius genera tradit: vnum Indicum appellatum, alterum verò Syriacum: non quodd in Syria nascatur, sed quodd motis Indiz, in quo reperitur, pars una Syriam, altera Indiam spectet. Ac in eius quidem, quæ Syriaca dicitur genere præstantiorem tam censei, quæ recens sit, lævis, comosa [truncataque, Vet. cum Ruell. & Dalechampio], colore flauo, perquā n odorata, quæque præterquam quodd odore Cyperum imitetur, breuem [maximè, manu vet. maxime] habeat spicam, gustu sit amaro linguamque maximè siccante, ac in sua odoris gratia diutius permancat. Ex Indicæ verò Nardi genere esse Gægeticam dictam, à fluuio quodd Gangete nominato, qui montem, ad cuius radices ea nascitur, præterfluit. Hanc viribus esse infirmioribus quodd in locis aquosis proueniat, esseque prociorem, atque complures habere spicas ab eadem radice tum comolas, tum sibi inuicem circum-

volutas, virisq[ue] redolentes. At quæ in editiore montis parte legatur, odoratiorem esse [vet. addit & *mauritanicam*, cui lectioni adstipulatur Galenus 8. simpl. & Paul. cap. de Nardostachis pusilla]que habere spicas, iucundumque Cyperi odorem æmulari, a cæteris habere in se dotes, quas & Syriaca cognominata. Esse quendam, cui Samphariticæ nomen à loco inditum sit, admodum pusillam, attamen magnas habere spicas, inter quas medius interdum prorumpat caulis, candidior, & supra modum hircum olens. Hanc damnare in totum oportere. Vendi & madefactam: quod vitium ex eo deprehendatur, quodd candida sit spica, squallida, nullaque obsita lanugine. Adulterari inspirato Subio cum aqua aut vino palmeo quod videlicet magis compacta, ponderosiorque appareat. Vltus tempore, si quid luti radicibus adhæserit, id ipsum auferre oportere, vt & puluerem crebro secernere, ad aquam eluendis manibus dicatam accommodum. Vim habere exalciendi, exsiccandi, vrinæque ciendi. Quamobrem & aluum epotas sistere, & appositas ex vtero fluxiones, saniemque compellere. Ex frigida verd potas, nauleæ & stomachi rofionibus auxiliari: itemque his, qui à flatibus exagitantur [*ipertuiculis*. Vet. *ipertuiculis*] hepaticis, ictericis atque nephriticis. Aqua autem incoctas seu fotu seu infellu [coctas verd in aqua & pro fomento ad infellus adhibitas] vuluæ inflâmationibus adhiberi. Facere & ad superfluo humore redundantes oculorum palpebras, dum ipsi cilia adstringunt & condesunt. Quin & siccas humentibus corporibus ad summuendū graueolentiam vtiliter inspergi. Miscri etiam antidotis. Porro ad ocularia quoque med camenta vsque ad summum lauorem tritas & cum vino in pastillos conformatas vase nouo non picato recondi.

De folio Nardi plura dici par est, vt principali in vnguentis, inquit Plin. lib. 12. cap. 12. Frutex est graui & crassâ radice, sed breui ac nigrâ, fragillique, quamuis pingui situm redolente, vt Cyper (ut Cyperum M. CH.) aspero folio, paruo, densoque. Cacumina in aristas se spargunt: idēd geminâ dote, Nardi spicas ac folia celebrant. Alterum eius genus apud Gangem nascens, damnatur in totum, Ozænitidis [Gargiudis Diosc.] nomine, virus redolens. Adulteratur & Pseudo-nardo herba [item luto sicæ radici permixto, ex Diosc.] quæ vbiq[ue] nascitur, crassiore atque latiore folio, & colore languido in candidum vergente. Item sua radice permixtâ ponderis causa, & gummi, spumaque Argenti aut Subio, Cyperine cortice. Syncerum quidem leuitate deprehenditur, & colore ruffo, odorisque suauitate, & gustu maximè siccante os, sapore iucundo. Pretium spicæ in libras x. c. Folia (Malab-thri, subintelligi vult D. lech. quodd fr. de Malab-thro verbis totidem & eisdem hæc referat Artienus:] diuisere annonam: [Annonam pretium mercis vocat] ab amplitudine Hydrophazum vocatur maioribus foliis [pipul. CH.]. xxxv. Quod minore folio est Mesosphazum appellatur: emitur x. lx. Laudatissimum Microsphazum à minimis folium: pretium eius x. lxxv. Odoris gratia omnibus maior recentibus. Nardo color, qui [li M.] inueterauerit nigriori melior. In nostro Orbe proximè [primum Dal.] laudatur Syriacum, mox Gallicum, tertio loco Creticum [Ponti. D. ol.] quod aliqui agrium vocant, &c. Sunt autem ea omnia herbæ præter Indicam. Idem lib. 13. c. 1.

Nardinum siue foliatum [vnguentum] constat Omphacio, Balanino, Iunco, Costo, Nardo, Amomo, Myrrha, Balsamo. In hoc genere conueniet meminisse hircarum, quæ Nardum in hircam imitentur, species nouem à nobis esse distas: tanta materia adulterandi est. Omnia autem [vnguenta: ergo etiam & hoc,] acutiora sunt Costo Amomo, quæ maximè nares ferunt: crassiora Myrrha, suauioraque: Medicinæ autem vtiliora Crocoacerima per se Amomo. Lib. 16. cap. 32. inquit. Non ferunt Amomi Nardi delitæ, ne in Arabia quidem ex India naue peregrinari. Tentauit enim Seleucus rex. Illud maximè mirum ipsas arbores plerunque exorari, vt viuant atque transmigrent: aliquando & à solo impetrari, vt alienas alat, aduenasque nutriat: cælum nullo modo flesti. Tandem lib. 21. cap. 4. ait. Eo luxuria processit, vt non esset gratia [coronis] nisi mero folio: (Merum folium dicit aroma Indicum, non autem floris Rosæ folia. Dalech.) subtilibus mox petitis ab India, aut ultra Indos. Laudatissimum quippe habetur è Nardi folio eas [coronas] dari, aut veste serica versicolores vnguentis madidas.

Nardi spica vocatur à Galeno, quo auctore c. spica simplex exalciat excessu primo, desiccat secundo completo. Composita est ex adstringente sufficienter substantia, ac acri, calida non multa, & quadam leniter amara: ex his constans facultatibus radix, & ad iecur, & ad stomachum rationabiliter conuenit, tum pota, tum extrinsecus imposita. Vrinam dicit, morsus stomachi sanat in ventre ac intestinis consistentes fluxiones desiccat, ad hæc & eas, quæ in capite & thorace. Valentior est vocata Indica, quæ nigrior est, quam Syriaca.

Nardi sanè descriptionem & integram & euidentem proposuit Dioscorides nec ambiguum est vbi locorum mons sit, in quo nascitur. Clarè enim dixit in India ipsam esse, & alteram ipsius speciem Indicam, alteram Syriacam dici, prout altera montis pars ad Indos, altera ad Syros spectat. Declarat amplius ex eo quod alteram Indicæ Nardi speciem Gangridem appellari dicit, vt quæ ad Gangem nascatur fluitum qui montem præterlabitur. Nec verd radices auferre Dioscorides iubet veluti mutilas & ad vsum damnatas, sed hæc solæ sunt quarum vsus expetitur ad medicamenta, in his affectionibus ad quas illas commodas præscribit. Quod autem radicem vsus sit, & hæc primo abscellu caidæ sint, secundo sicæ, Aetius & Paulus ex Galeno transcripserunt.

Lapsus est hic in partem Marardus, cui n credidit id esse spicam, quod radix est. Cum [Galeno 2. de Antid. auctore] per similitudinem quam cum spica habet, hæc radix Spica nominetur, non quod reuera spica sit: neque enim propriâ appellatione vtitur Diosc. aliqui qui de ea loquuntur. Distinguit passim Demet. Constant. de cura accipit. Spicam Indicam à Nardo spica, sed qua in te differant, non monstrat. Sed nec ipsi nos discrimen nouimus. Quare considerandum vobis relinquimus, quid vbi velit, ac etiam quid per Spicam simpliciter intelligat.

Est nobis Nardus Indica, Nardus vulgè recepta, de qua tamen dubitat Anguillara, qui sibi Samphariticam Nardum incognitam ait.

NARDVS INDICA VVLGARIS

Nardi Indicæ nomen particula dicitur planitæz hodiè obtinet, quæ & Spica ob figuram dici

Herba no-
uum ipse.
Nardum
immitans

Spica
Nardi
Galeno
Temp.

Vireo

Montis
quo nascitur
Nardus
Indica Gangem

Demet. 16
2. 1. 1.

Nard.
Ind. Gal.
gare

dicti meruit. Est autem nihil aliud, quam comatum radicis caput, ex maridorum foliorum nervosis filamentis conuolutis congestum, colore rufescente, sapore amaro, acrisque & aromatico, odore Spicæ Celutæ, validiori adheret hæc con-

Deser.



radici digitalis crassitudinis, saturatius rufæ, solidæ, sed fragili: est ubi folia quoque nondum in nervos diuoluta albicantia inueniuntur, cauliculi concaui, striati, pluresque ex eadem radice capillata spicæ enata subinde conpiciuntur.

Cæterum. Nardum hanc vulgarem officinarum, Angulata non existimat esse

verum Syriacum Nardum, & adhuc multo minus Indicum: sed Gineticum, simili ratione perlatus. In Nardo vulgare officinarum, non inuenitur odor, similis odor Alari, vel Cypri, qualem requirunt in Nardo Dioscorides & Plinius: sed odor grauis & non gratus, qualem Gangitidis tribuit Dioscorides. Ergo Nardus, vulgaris officis, non erit Syriaca nec Indica, sed potius Gangitis. Huic ex posteris subscribat, qui velit.

Nardus
lignosa

Nos interim cum sanioribus, senioribus, & prudentioribus posteris credimus nos habere Nardum Indicam, licet interdum, vel ob vetulatem, vel ob viginem, maris humorem sibi ascitum, vel ob adulterium corrupta, situm contrahat, se tamen odoris, tamen saporis suauolentia illa, quam Veteres desiderant, non referat, nec colorem genuinæ repræsentet, quibus omnibus ab initio prædita erat,

Nardi
Syriacum
genus est.

Porro, non sunt diuersa Nardi genera, sed vnicum duntaxat sibi notum testatur quoque Garcias, id scilicet quod in monte quodam iuxta Gangem, fluuium prouenit, qui altera quidem parte Orientem spectat, altera Occidentem, ad quem scilicet Occidentem sita est Syria, multis regionibus ab India discretis. Neque vna præstantior est altera, Spicamue habet alia altera multo longiore. Nec est quod quis ex ingenti preio, quo antiquitus, teste Plinio lib. 12. cap. 12. emebatur, inferre studeat, nostram Nardum non esse legitimam. Huic enim obiectioni respondet Garcias, cum ait Indias nunc magis apertas & cognitatas esse, quam tempore Plinii fuerint, & ipsa aromata maiori copia ad nos adferri. Illud affirmare possum, inquit, multo plura aromata, maiori quoque quantitate, & minus adulterata adferri, viliorique emi, quam antiquitus fiebat: quod nunc Lusitanorum nauigationibus Indis nobis apertæ sint, ipsæque regiones, quæ aromata gignunt, longè cultiores nunc sint, quam Veterum tempore fuerunt. In eorum numero Nardum repono, quæ legitima & sine mangonio ad nos importatur. Inuenitur quidem interdum fordida & puluerulenta, villis ipsius plantæ in pollinem reductis. Erit tamen

Nardi
aromaticæ
hæc
aromata.Nardus
fordida.

à mercatoribus Arabibus & Persis, quos eo pulvere manus eluere intelligo. Id porro genus, quod Sepulveda Satiach & Satiach appellat, id esse puto, quod ex Saugum adferitur, celeberrimo regni Bengala portu & emporio ad fluuii Gangis ostia.

Vocatur autem Incola Cahzara: Anicennæ lib. 2. cap. 646 & omnibus huius temporis Arabibus Gambul, quod est spica, & Gambul Indi, i.e. Spica Indica. Quod autem corruptè Mathæus Siluaticus cap. 440. Simbel & Simbel & Math. in Hist. germ. & Epit. cum adhe. Cameram Strubel & Senbel protulerit, meum non est, cum in linguam Arabicam ignoratissimi malimustempore paulatim corrupta fuisse vocabula Latinis, ut Indis, Spica Nardi, & aliis Nardus Indica: Garcias rectè & rectè & rectè: Germ. Indianischer Nardus & Spise Narden: Gill. Aspic d'entre mer Ital. Spica & Spig nardo: Hulp. Azumbar aut Espige fil: Angl. Spis Narde Boh Nardus Indianisfy.

Videamus ut ne Matthioli & aliorum de Spica opinionem. Cum igitur simpliciter Nardi vocabulum. (à Nardo vrbe Syriaca Euphrati conterminata forte nuncupatum, C. Bauh.) apud authores reperitur, semper Indicam intelligendam censet Cordus. Elicet Dioscorides multas Nardi differentias proponat, loco tamen natali solum d. ferre credidit, liquidem omnes in vno monte proueniunt, utpote Syriaca in Occidentali eius parte, Syriam respiciente: Indica verò in Orientali parte ad ludram vergente. Rarus Indica in duas species diuiditur, quarum vna in monte, altera ad radicem montis prouenit, non procul à præterflente Gange, quæ Ginetica, quæ omnes hodie indistinctæ adferuntur.

Nardum Officina Nardi Spicam atq. pellano, inquit Matthiolus. Sed non desunt, qui credant Indicam Nardum in nostras terras non aduehi, ob regionis distantiam, Syriacam opinantes esse quæ nostro æuo Septentrionalitatem vtuntur: tamen si (ut inquit Dioscorides) in Syria non oriatur, verum idem Syriaca dicatur, quod ea montis parte proueniat, quæ flectitur ad Syriam. At cum inter Indos & Syrios, amplissimæ interponantur regiones, nempe Deserta Arabia, Persis, Carmania, Gedrosia, Darangia, alique nonnullæ quæ ultra quatuor millia miliariorum continent, nescimus, quomodo pacto fieri possit ut mons ille ad Gangem politus, altera parte Syriam tam facile respiciat, ut Nardus ea parte proueniens, Syriaca dici mereatur. Quis sit ut quandoque mecum disquirere licuerit, cum potius à Syriacæ regione, quæ ad Indicum fluuium est, Syrii nomen sibi asciuisse, quam à Syria, quandoquidem, si Peolomeus vera refert, mons in India visitur, quæ à Gange fluuii ad Syriacæ extenditur. Cæterum, Manardus Ferrariensis officinarum Nardum nec Indicam, nec Syriacam esse censet. In cuius sententiam non equidè pedib. eo, quippe quoniam Venetis plurib. in locis Nardi ingentis copia vidi, nullis deficientib. notis, quib. optima ex Dioscoridis sententia explorari potest. Sed illud accidere quandoque non eo inficias, ut ascito sibi maris humore, dum per Indicam & Arabicum in Alexandria deferretur, & inde Venetias, vel situm contrahat, vel subputrescat [hoc namque facile fieri possum concedo, quod Nardus sit sicillima] unde postea amissa suauolentia, grauius oleat. Quo fit ut hac in re Manardum longè hallucinatum crediderim: &c. Hallucina-

Satiach &
Satiach
SepulvedaNomina
huguar.Mathæus
Siluaticus
Syluaticus
Math.Nardi
for
de Eryman.
Nardus
simpliciter
diciturSyriaca
a
Syriacæ
regioni
dignat.Manardus
de
lappi.

tus etiam Brassauiolus, inquit præterea idem Matthioli, ut pote qui Nardi Spicam, non modò non esse radicem censet, sed nullius vltus eam existimat: cuius doctrinâ sequenti Hermolaus & Ruellius aberrarunt iudem. Rationes Senensis petat Lector ex eius Commentariis: Nos breuiatati studentes eius sententiam Turnero examinandam committimus

*Matth. & Amarus
conferunt*

Matthioli, inquit ille, eumque secutus Amatus multum laborant, ut probent spicam Nardi non esse spicam in caulis fastigio nascentem, sed radicem Nardi: contraque omnes aliter sentientes, grauitur inuehantur, contra tres potissimum viros clarissimos Hermolaum, Ruellium & Manardum, qui tamen errarunt, propter magna tamen in vniuersam Europam merita clementius debebant à nouis istis Censoribus tractari. Ego quidem [inquit Turn. part. 2.] spicam hanc vel iuxta terram, vel partim etiam intra terram nasci existimo. Non tamen propriè radicem nominandam censeo. Quod autem ex Galeno de antidotis adducunt, aut intelligendus Galenus impropriè spicam Nardi vocare radicem, aut in aliis locis negent oportet auctoritatem non tantum Galeni, sed etiam Philonis, & Diosc. quoque, qui manifestè distinguunt Inter Nardi radicem & spicam, aut planè negent spicam esse radicem. Galenus lib. 9. *κατὰ τὸν* in antidoto Philonis duos, inter alios multos, versus recitat, quibus clarè negatur Nardum esse radicem. Et drachmam dicta falsò radicis &c. Quæ verba Galenus ibi explicans inquit, Quin & Nardi ipsius drachmam vnam conficiendam censet, quam radicem falsò dictam appellat, quadoquidè spica Nardi verè nominatur. Dioscorides quoque in descriptione Nardi Gangitidis ait spicas multas ex vna radice prodire: ex quibus verbis patet Nardum non esse radicem Nardi. Ex quo sequitur spicam Nardi non propriè dici posse radicem, nisi quis Philoni, Dioscoridi & Galeno contradicat. Matthioli multos grauitur erroris insimulans de Nardo parum abest ipsomet ab errore, nisi iam eodem inuolutus est. Videtur enim existimare Nardum caule penitus carete, ideoque spicam in caulis [qui vel nullus est, vel certè nusquam reperitur] fastigio non posse oriri. Verba eius sunt, Ego enim tamen, &c. Quid autem est hoc argumenti? Nihil vidit Nardi præter spicam, Ergo præter nihil habet? Quod si hæc sit Matthioli ratio, ut ed saltem videtur tendere, tum videtur Nardus neque caulem habere, neque radicem aliam præter spicam, quod planè Dioscoridi, quem interpretandum suscepit, repugnat, qui Nardo & caulem tribuit, & radicem præter spicam. Et quanquam in Germania non est simplicium delectus, qui Venetiis, hoc tamen anno 1577. in offic. Iacobi Dieter Pharmacopœi Wilsburgensis Nardum inueni cum caule digitalis longitudinis, concauo, stramineis maioris crassitudine, quem vel hodie possum ostendere. Quod ad radicem Nardi, si eius nihil præter spicam Venetiis potuit reperire, miror ubi radiculam illam inuenerit, ex qua spica oriuntur, in figura quam in Comm. in Diosc. pingit. Censet etiam Amatus Spicam Nardi esse radicem. Apparet tamen ex eius verbis tum cap. de Meo, tum cap. de Nardo, velle enim Spicam Nardi esse radicis Nardi partem inferiorem: utrobique enim radicem Nardi, cum Mei radice confert: utrobique etiam aut capillatas radices Mei, quæ Nardo sunt persimiles, in infima

*Non est
propriè
radix*

*Radix falsè
dicta.*

*Matth. re-
darguitur*

*Nardi
caulis*

parte radices nasci. Posteriore loco ita inquit: Quod dicit Dioscorides Nardum ex vna radice plures proferre spicas, pro nobis facit, cum ex vna radice primaria, ut reliquarum matre, multæ radices veluti comosæ spicæ confertim nascentes prodeant, quemadmodum in radice Mei videre est, cuius infinitæ radices in spicas diuebantur, ut quicumque viderunt, Spicam Nardi esse iudicarent. Et paulò post, Concludendum ergò nullam aliam in Nardo inueniri radicem quam spicam. Si ita intelligit ut verba sonant, plurimum fallitur. Præterquam enim quod ego caulem immediatè ex spica prodeuntem vidi [caulis autem nunquam immediatè ex radice infima parte prodit] ostendit Dioscorides multas spicas ex radice oriri vna. Quod autem cum Matthiolo negare videtur caule, hand alia opus est confutatione, quam quæ supra, contra Matthiolum vlti sumus. *Hec igitur* Turneri est sententia de Nardo, habere radicem paruiam, in terra, ex qua spicæ oriuntur, caulemque [ut se vidisse semel ait] ex medio spicæ oriri, atro-purpurei coloris, gracilem, concauum.

*Radix
Nardi est
vna, quam
spica*

*Error
Matth.*

Tantus igitur est labyrinthus, & tanta opinio-num varietas & inconstantia iudiciorum, circa Nardum, ut tutius videatur iam in medium altaris acquiescere, quam pluribus super hanc rem differere. Illud tamen adhuc annotalle conueniat, Acoffam dixisse, quosdam apud Dioscoridem Malobatrū esse solum arboris Spicæ Nardi constituisse. Celsipino Spicam Nardi ex Algarum generi esse videri.

*Maloba-
trum
Ex Algarū
generi*

Cæterum, nasci Nardum in Mandou & Chitor prouinciis, regnis Delli, Bengala, & Decam vicinis, iuxta fluuium Gangem, quem incolæ Ganga appellant, prodidit Garcias.

Locus.

Sed & hic fabulosum omnino indicat, quod And. Lacuna in Diosc. scribit, Nardi vltum apud Indos esse periculosum, quoniam ex ea fiat veneni quoddam genus mortiferum, quod non modò haustum, sed etiam cuti in sudoribus aspersum hominem illicò iugulet, idque toxicum Pisum vocari. Nam cum multis in India annis Medicinam exercuerit, & non modò versatus sit cum omnis generis Medicis Asiaticis, sed etiam Regibus & Principibus familiaris fuerit: nunquam tamen hoc Pisu ipse videre contigit, aut eius nomen audire. Fontanonus de morb. intern. lib. 3. cap. 18. in pello ad fluxum sanguinis ex vtero præscribit Nardum: existimans sistere menses. Sed quum tutiora multa habeamus remedia, Nardo vti nolim odorato & calido, quin ipsemet lib. 2. cap. 16. de hydropo, in qua opus aperientibus, aperire perhibet. De Nardi vinibus plura qui desiderat, legat quæ antè ex Veteribus adduximus. Ex eorundem tamen sententia, hoc loco pauca quædam de Nardino *euguento*, de quo tunc dicere obliu sumus, adscribemus. Variè itaque præparabatur iam tum Dioscoridis ætate, tum cum Malabathrino folio, tum sine ipso. Plerumque verò ad Balaninum, aut Omphacinum oleum, ammiscetur spissamenti graui luncus rotundus odoratus, ad odoris autem gratiam, Costus, Amomum, Nardus, Myrrha, Balsmum. Est autem bonum, quod tenue est, non acre, & Nardi sicca, aut Amomi odorem habet. Vis ipsius attenuatoria est, acris, extensoria, & re-

*Lacuna
Lacuna in
falsitate*

Vit

Calamo,

Defluuium
capillorum.

Calamo, Costo, & Nardo. Galenus lib. 1. cap. 2. τὸν κατὰ τὸν τοῦ, ad defluuium capillorum licere aliquando vnguentum Nardinum adhibere refert in ætate frigida, & tempore hiemali. Bonum autem pharmacum ad omnia est diuinitum Fæminarum vnguentum, immò magis foliato commodum, quod Romæ spicatum appellant.

NARDVS CELTICA

CAP. C

Locu.

Nord.
Galica.

Aspergat.

Adulterio.

Nardus.

Adulterio.

Aspergat.

Vid.

Vid.

Vid.

Vid.

Vid.

Vid.

Celtica Nad^o, vt inquit Dioscorides, nascitur in Liguria Alpibus [ἀλπίων, pro quo quidam ἄλπειον] vernaculo sermone Gallica dicta, sed & in Istria prouenit. Est verò putillus, brevisque frutex, qui cū radicibus in manuales fasciculos colligitur: foliis oblongis [vet. & Orib. ἄλπειον]

subflauis, flore luteo. Caulium & radicem duntaxat vsus est, & odoris suauitas. Quare pridie aspersos aquâ fasciculos, amoto terreni, si quid inhaeserit, in humidiorē solo suppositâ prius chartâ insternere oportet, ac postridie repurgare: siquidem vtile cum aceroso & alieno minime propter humoris vim excutitur. Adulteratur autem herbâ persimili quæ unâ cum ea velletur, quamque propter virosū odorem Hirculum nominant, Facile verò est hanc ab illa interdiscere: quandoquidem herba est sine cauliculo & candidior, minusque oblonga habet folia: quin neque radicem amaram, aut aromaticam, quemadmodum legitima Nardus. Itaque abiectis foliis cauliculos radicesque seponitos ac siquidem ad vsum reponere volueris, tritos vino excipito, tandemque ex iis concinnatos pastillos fictili vale nouo ac diligenter operculato reserua. Optima verò censetur, quæ recens est, & odorata, radice, plena, minimeque fragilis. Iisdem quibus & Syriaca viribus pollet: sed & valentius urinas ciet, & stomacho est accommodatior. Iecoris inflammationibus, suffusisque selle auxiliatur: itemque ventriculi inflationibus cum Absinthii decocto pota. Eodem planè modo valet & ad lienis, vesicæ, renūque vitia itemque ex vino ad venenatorum morsus. Cæterum, additur etiam in malagmata, potiones & vnguenta calfacientia.

Memorat Plinius lib. 15. cap. 7. fieri ex Nardo Gallico oleum. Idem 24. cap. 16. ait saccharum & Nardo etiam Celtico vinum aromatizantes.

Integros, inquit Clusius, interdum cespites occupat serpendo radix, & latè summâ tellure sese inter muscum diffundendo: oblongi procumbentesque humi ramuli, tenues, plurimis ue-

Tom. III.

luti foliolis, aut siccis squamis circumlepti, subinde sulcas & nonnihil capillatas fibras agunt, summâ parte in vnicum, aut bina, ternæue extuberant capitula, aliquot longis, secundum caput angustis, deinde in latitudinem paulatim sese laxantibus foliis, satisque crassis & succulentis plena, colore, dum primum emergunt, viridi, deinde sub Autumni initium, aut Æstatis finem, flauescente, gustu amariuscule: palmariis aut dodrantalis, nonnunquam etiam maior. Inter ista emergit cauliculus, satis firmus, vt in minoribus Valerianis silvestribus geniculatus, bina ad singulos nodos inter se opposita habens exigua foliola, cui, circa summum, ex singulis alis enascuntur pedicelli, binos aut ternos sifculos coloris pallidi sustinentes, quibus succedunt semina, Valerianæ silvestri Alpina, saxauli præsertim (Valerianæ minimæ Nardi folia) proxima: paulò tamen minor. Tota plantula aromatica est & radicem Valerianæ silvestris odorem amulat.

Officinas ostendere hanc folio oblongiore, admodum angusto, & Florum S. Mariæ Magdalene nomine appellare, Spicam item Romanam ac Celticam, refert Cornarius, qui & Nardum Celticam, & Gallicam, itemque Saliuncam appellat.

Matthioli contra ebs errare credidit, qui Nardum Celticam & Saliuncam eandem plantam existimant. Sed ipsemet in errore versari deprehenditur.

Non dubitat tamen Anguillara, quin Spica Celtica, quam Plinius vocat Saliuncam, non sit ea quæ prodenit in Hungaria & Carinthia, quæque adhuc Venetias inde adfertur. Saliuncam autem Virgilii aliam plantam esse ait, quod Seruius Grammaticus exponens hunc locum dicat, sua ætate vocatam Orcitunicam, quod nomen apud Græcos significet Anemone, quemadmodum videatur intellexisse Virgilius in dicto versu. Huius autem Nardi Celtici caule, cui adhærēt radices, & flore ex Galeni sententia, vtendum præcipit, perhibetque Dioscoridem, Sennem vocare: Scribonium verò Largum Nardum siluestrem.

Clusius extra dubium hanc plantulam ad siluestrium Valerianarum classem referendam censet, quod aded illas odore, & nonnihil etiam formâ, præsertim minimam Nardifoliam refert. Cæterum, Nardum Alpinam ipse inscripsit, atque incolæ Spicâ appellare, nomine è latina voce desumpto: Pannoniæ autem Bechy seu, h. e. Viennensium herbam nominare, quia Viennâ copiosè ad eos transferatur. Arabes referente Garcia & Acosta, Cembul Rumin & Rumi cognominant, i. e. Spicam Celticam. Germ. Celtischer Nardus / langer Spick / Magdalenenkraut / Marien Magdalenen blumen. Angl. Celtick Nardus & freuch Spicknarde Celtick / Nardus. Galli Nardus Gaulois: Itali Spica Celtica & Nardo Celtico.

Cesalpinus Nardum Gallicum & Spicam Celticam vocat, testaturque eam Diosc. & Plinium tradere: Plinium autem videri alibi quoque describere, sub nomine Saliuncæ, quam Aliungiam Dioscorides vocari dicat.

C. Bin phyt. Nardus Celtica quæ Spica Celtica, vel Romana officinis, Dioscoridi κατὰ τὸν τοῦ & ἀλπίων, siue Saliuncæ dicitur: itemque lib. 6. c. 10.

De reliquo Lobelius in Adu. Lygusticâ Nardum hodie potius nuncupandam autumat, Gen-

Synon.

Flas

S. M.

Magdal.

Spica

Romana.

Saliunca.

Marth.

Non est
Saliunca
Virgilii.Series
Diosc.
Nard.
lib. 2. tit. 1.
ValerianaNard
Alp. Clus.
Viennens.
h. e. d.

Vid.

T

zianellis admodum similem folii aromaticitate, ipsoque habitu, quam Selliga Vallesii vernaculè quali Saluincam dicunt: nec dubitat quin sit ea, quam Magonis versus inquit: folius Gnaphalii montani, aut Gentianellæ minimæ: radicis propaginibus Alari odore, & modo in terrâ sparsis, scribis, amaricantibus, aromaticis, Spicam Nardi spirantibus.

Locus Copiotè provenit in Alpibus Germaniam ab Italia dispelcentibus. Montosis gaudet Genuensibus, Lygumæque Alpibus sterilibus, non procul à Sauona urb. Authore Clusio copiosè nascitur in lûmo Iudenberg Sutiacarû Alpium iugo inter muscum, saxosis locis. Mense Augusto floret sub ipsis ferè niurbus: folia deinde promit, cum illæ dissolui & diffuere incipiunt: tunc etiâ summam habet odoris gratiam, quâ caret dum folia primùm promit & adhuc viridis est.

Vires & vîus. Galeno *κατά τὴν* eadem præstat Nardus Celtica, quæ Indica, sed imbecillius, præterquam ad prouocandâ vrinam. Siquidem calidior illa est, & minùs adstringit. Consultis itaque videtur Turnero, Celticâ vtendum esse, vt quæ recens haberi possit ex Italia & Germania, quàm Indicâ exoletâ. Pannonibus frequens eius vsus est, in capitis lotioribus. Vires & vîum ex Dioscoride, ex quo Plinius sua transcripsit, vide antè.

NARDO CELTICÆ SIMILIS HIR- culus.

CAP. CI.

**Hirculus
Clusio**

Plantula est Nardo Celticæ similis, candidior tamen, & veluti ex viridi cinerea, sine *cauliculo*, minoribus brevioribusque foliis, villosa admodum secundum radicem, & nigricans, nulla odoris iucunditate. Folia præmansa nullum aromaticum saporem reddunt, sed lenta & viscida sunt, cum Nardi Celticæ folia calida sint, cum aliqua tamen adstrictione, odore saporeque tuncunda.

**Hirculus
Diosc.**

Cæterum, cum præcedenti capite de Nardo Celtica ex professo egerimus, facere non potuimus, ducti equidem autoritate Clusii, quin hoc sequenti Hirculi meminissemus, vt pote cuius iconem etiam cum illa oculis lectorum subiicerimus, & quæ ad amussim quadret cum Dioscoridis Hirculo, quem & ipse capite de Nardo Celtica describit dicens: Adulteratur [Nardus Celtica] imposita herba simili, quæ Hirculus vocatur, ab odoris gravitate. Sed facilis cognitio: namque herba candidior est, sine caule, minùs oblongis foliis, radice neque amara, neque odorata, vt Nardum est.

**Hircul. Ge-
nerû Clus.**

Inscribitur à Clusio, ex quo & Iconem & historiam desumpsimus, apud Garciam arom. lib. 1. cap. 33. Hirculus veterum: à Camerario in Hist. Math. germ. iteinque Epit. Hirculus, & sic vocatur etiam à Lob. in Aduers. p. 133. in Obs. p. 170 [vbi & Nardo Celticæ similis herba] in Icon. Plant. p. 114. Tabern. [qui impropiè Germanicè Celtischen Nard vocat:] C. Bauh. Crisalp. & Geln. in cat. pl.

NARDVS SIVE SALIVNCA NEAPO- litana.

CAP. CII.

**Saluincæ
genus**

Saliuncæ genus Neapoli missum in Apuliz smontibus nascitur, quidam Foliū odoratam

esse putant, à Malobathro diuersum. Cæterum, eos falli ex eo perpicuum est, quod & Foliū & Malobathrum Indis peculiaris sint. Pharmacopœi quidam Itali eam pro Foliō Thetiæ immitcent, quàm rectè n viderint.

**Lap-
guern-
dam
Delet.**

In tam exigua quidem planta conspicua est *radix* crassius rugolæ, vtunque flauescens, fibris capillatæ, in nodos extuberantis, è quorū lateribus hinc inde folia prodeunt, vt ex ea figura serpente radicem, & aditis illis nodis sese propagare non abs re existimem. Folia illa oblonga



sunt, angusta, Plantagini vtunque similia, infernè arcta, superè latiora. Sapore & odore planta ista Valerianam refert, vt non dubitem ob odoris suauitatem, & saporis qualitatem egregiis aduersus morbos variis facultatibus præditam esse, ac Foliū loco substitui posse.

**Folia o
substitutum**

C. Bauh.

phyt. vocat Nardum 5. siue Nardum ex Apulia.

VALERIANA MINIMA, NARDIFOLIA.

CAP. CIII.



Parua herba fragantis odoris sunt radices Nardi Celticæ, tenues, ex obliquo capite hirsuto, ex quo folia emergunt vncialia, oblonga, ad Plantaginis vel potius Nardi Celticæ folia accedentia: inter quæ erigitur *colliculus* vnicus, tenuis, palmatis circiter.

Delet.

An Clusio in Pannon. p. 511. Valeriana Alpina 2. In Hist.

An Valeriana Alpina 2. Clusio

post. Valeriana filu. Alpina saxatilis. C. Bauh. Phyt. Valeriana 5. siue montana Bellidis foliis. An Tabern. Phu minus Apulum?

NARDVS MONTANA VETERIBVS

CAP. CIV.

Nardum montanam [*valeriana montana*] quæ à quibusdam Thrylactis [*bulgaris*] & Neris [*rubra*] Gal. 3.

Gal. 9 simpl. legit *τυφίτης* appellatur, in Cilicia et Syria nasci dixit Dioscorides *foliis & caulibus* Eryngio similibus, sed minoribus [*ταῖς μὲν ἀκρωτίσιν*] non tamen asperis & aculeatis [ver. hęc non agnoscit. Sunt qui pro *ταχία, ταχία* legant.] Radices subiacent nigrę, odoratz, binę pluręque, cęu *Hastulę* regiz [*ἀσποδίου*] sed graciliores longęque minores [addere videtur Onib. & candidiores.] Verum n. que caulem, neque fructum, neque florem diu sustinet. Valet ad eadem omnia radix, ad quę & Celtica Nardus.

Nardum montanum Galenus, Paulus, & Aëtius superioribus debiliorem esse fatentur, & in Cilicia plurimam nasci, itemque Thylactin ac Pyritin: appellationum priorem etiam Dioscorides habet, pro posteriore verò Nerin vocari didicit: satis obscuris omnibus his appellationibus. Nam si quis Thylactin inde appellari putarit, quod Thylactis, i.e. facculis, ē Cilicia ac Syria in alias regiones exportata sit, ei etiam aliarum appellationum Eyma exquirenda sunt, & ostendendum cur hęc priuatim inde nomen repperit, quum haud dubiē etiam alia medicamenta simplicia facculis exportentur.

Potro, quod attinet ad Nardum montanum, pugnancia esse in vulgari lectione Dioscoridis, certum est. Vidit enim Anguillara exemplaria vetusta, inter se discrepantia, quod effecit, ut certō crediderit totum caput corruptum esse & deprauatum. In vno enim exemplari legitur *καυλός* *ἔστι καρπὸς ὅτι ἄρθος φέρει*, in altero pro *φέρει* *φύεται*. Eidem præterea Anguillara dixit Excellentiss. D. Alexander Iustinianus ex Chio insula Doctor Medicinę & Philosophię Venetiis, posse pro *φέρει*, legi *συμφέρει*, quam lectionem ipse approbavit, & multi sibi usurparunt. Matthiolo etiam inclinat animus ut in fine capitis mendum subesse, illudque ex malo vnius vocis gręcę intellectu ortum esse arbitretur. Siquidem verbum *φέρει* non pro fert, sed pro *συμφέρει*, i.e. confert, accipiendum esse dicit. Itaque non *ὅτι καυλός*, *ὅτι καρπός*, *ὅτι ἄρθος φέρει*, ut vulgati codices habent, & legerunt interpretes, sed *ὅτι καυλός*, *ὅτι καρπός*, *ἄρθος φέρει*, h.e. Neque caulis, neque fructus neque flos confert, prodęstue legendum esse iudicat. Etenim radices, utpote odoratz, vsum præcipuē commendari, non aliarum partium, quas ut odore carere, ita etiam inutiles habendas esse censet. Et certē facilis potuit esse error librarii Gręci imperiti, vel potius temerarii, casus nominum mutantis ad ineptam & incongruam huic loco verbi illius significationem. Et huic suę castigationi cūm alios, tū Fallopiū, subscribere refert.]

Contra Matthiolum verò sic insurgit Guilandin Theone. Quanta sit Matthioli in Nardo montano obsecantia, ne dicam summa Gręcarum literarum, qua de re plurimi docti & eruditi amici sui, me quidem refragante, nunquam dubitarunt, valde miror, ignorantia, quando obli- quos in rectos vertit, & verbū *φέρει* *συμφέρει* [malum] accipit, quodque deterius multo est, *φέρει* eum negadi particula pro *ἀφαιρεσιμὸς*, eo in loco exponit, alii iudicent. Quis quęso Medicorum vnquam ita locutus? Adeone omnis doctrine insignis ille Dioscoridis interpretes expertus est, ut formulam loquendi non Anazarbeo modò illi, sed etiam omnibus Medicis protritā, *χρήσις αὐτῷ ἐν ἱατρικῇ ἡ δόξα* ignoret. Sentire secum Fallopiū illum purgatissimę auris hominem, verisimile mihi non sit, qui si hęc vnquam ad eum perscripsit, loco non secus perscripsit.

Tom III

Ceterum, si quando sylvestrem Nardum aliquam ingredi compositionem Marantha videt: dubitat ipse, debeatne Asarum, an Phu accipere, vtrumque enim silvestre Nardum propter odoris affinitatem appellari Dioscorides asserit.

VALERIANA BULBOSA.

CAP. CV.



Planta hęc Deser. Valeriana bulbosa nobis dicta, à nemine quod sciam huc vq; proposita. Prima emittit folia Hyosciami albi emula, sed paullo minora: At sequentia profudē dissecata. Flores quales Valerianę maioris. Radix subest singularis, bulbosa, Nardum spirans. Quapropter Nardo montano simillima, cūm formā, cūm

odore. Aliqui inter species Nardi referunt. Incola est montium Ligurię. Valerianam bulbosam sub Nardi monte nazgenere reponi posse, Ferd. Imper. Hist. nat. lib. 32. cap. 1. concludit.

VALERIANA TUBEROSA.

CAP. CVI.



Quam exhibemus Deser. Valerianam tuberosam à nullo alio, quod nobis quidem constet, quā Imperato proposita est. Folia producit effigie simillima Valerianę minoris, sed crassiora: Flores albos instar maioris, aliquantum odoratos. Radices tuberosę odorem referunt Nardi. Nascentur in

montibus Ligurię.

CARPESIVM EX VETERVM SENTENTIA.

CAP. CVII.

Meminit Carpesii Galenus 7. simpl. med. his verbis, Carpesiū simile est vocato Phu, h.

T 2

Vires h.e. Valerianæ, non gustu tantum, sed & facultate. Sed plūs habet tenuitatis: proinde magis etiam viscerum obstructions extergit, & urinā mouet, renisque calculis degrauiatos expurgat. Non tamen eatenus tenuium est partium, ut liceat loco Cinnamomi, si non ad manum sit, usurpare, sicuti faciebat Quintus. Præstantius est Ponticum Carpesium Laërtio, non tamen vel ipsum Cinnamomi viribus vicinum est, immo non paruo deterius optima Casia. Nuncupatur vtrumque à montibus quibusdam Pamphyliæ in quibus nascitur. Ingensque eius proventus est in Syria. De eodem l. de Antid. cap. 14. hæc habet. Quinti sententiam, quam de Carpesio habui, commemorare tempestiuum. Ipsam namque non solum à Satyro, sed ab aliis etiam Quinti discipulis accepi. Impōebat igitur Quintus, ut aiunt, quoties Cinnamomum deerat, Carpesium, perinde atque viribus optimæ Casiæ non inferiorem: egoque Carpesium idcirco multum mecum attuli ex ea peregrinatione, quā Orientis prouincias adi, diligenterque repositum nunc usque plurimum seruo, quod odorem etiamnum & saporem, si non qualem prius habebat, certè nondum extenuatum retinet. Est autem Carpesium herba Phu appellato genere similis, validior tamen, atque aromaticum quiddā plus spirans. Plurimum hæc in Sida vrbe Pamphyliæ nascitur. Emiturque propterea illic vilissimo pretio. Quocirca si quis vestrum illuc accesserit Carpesii multum emat, cum id sibi longo tempore duraturū nouerit. Tenuia autem quædam Carpesii sarmenta Cinnamomi virgultis similia sunt. Eius duo genera reperiuntur. Vnum quod Laertium, alterum quod Ponticum nominatur, à monte in quo nascuntur vtraque nomē adeptæ: sed Ponticum melius est. Quod cum plurimum haberem permixtis medicamentis admiscui, in quibus Phu vocata imponi debuerat. Est enim Carpesium, ut dixi, Phu simile, validius tamen, & qualitatem quandam aromaticam, gustu, odoratuque remittens.

Cubeba Galeni Carpesium hoc Auicennam cap. 137. Cubebas facere autor est Dodonæus, qui hoc quoque à Rusco, seu Myrto agria Serapionis, quam eandem cum Cubebis esse sentit, multum differens ostendit, ex his, quæ de Carpesio Gal. l. de Antid. scripta reliquit, ac propterea Serapionem hallucinatū ait, qui tale aliquid suspicatus fuerit.

Serapis hallucinat. Cæterum, quid hoc tempore sit Carpesium Galeni, arduum admodum explicatu duxit Matthiolus. Et hinc nescitur, inquit Brassauolus, quid sit Carpesium. Siquidem Galenus 2. de comp. med. *zeta tōron* Carpesium pro Asaro coniici docet. Et Quintus pro Cinnamomo in penuria vitur. Ac tandem Galenus pro Phu vocata medicamentis imposuit.

Asaro substituitur: Pro Cinnamomo. Pro Phu. Cubeba substituitur. Sed & Garcias Matthæum sylvaticum falli testatur, ut qui ex Serapione & Arabum autoritate, Cubebas nihil aliud esse crediderit, quàm Carpesium Galeni.

Matthiolus epist. lib. 3. ad Io. Hessum Medicū ait nihil penitus argumenti sibi sese offerre, cur si quas, quas pro Carpesio miserit, legitimum Carpesium probet: Esse namque Piper Æthiopicum. Huius etiam opinionem refellit in post. comm. cum mag. figuris.

De album & rubrū. Quid sibi velit Garcias lib. 1. arom. cap. 43. ubi minus audiendos esse ducit, qui Ben album & rubrum, Carpesium esse volunt, videndum est.

Carpesium pusillos Caryophyllorum surculos Scaliger somniasset, nisi in Ponto & Pamphyliæ nasci prodidisset Galenus: quam Scaligeri opinionem amplecti videtur Cæsalpinus lib. 2. cap. 51. & 4. cap. 21.

Carpesium, vel ei cognata herba, videtur Gesnero de hort. Phu petraeum, quod Valerianam Alpinam inscribimus, de qua mox agemus.

Valerianam, quam optimam [nos Valerianā maiorem odoratā radice vocamus] appellant, Galenus ex opinione Cæsalpini Carpesiū dixit.

VALERIANA ALPINA. CAP. CVIII.



Valeriana Alpina radice lōgā, odoratā, subdulci, scopulorū rimis se infigit, altè impacta: caules profert aliquot, crassiusculos, geniculatos, sapore resinoso, acrisculo, nonnihil rubentes, infima parte lignescētes, & cortice cinereo vestitos, multis ramis brachiatis: folia inferiora hederacea, sinuata, penè rotunda, nonnunquam alis duabus aucta, pediculis longis appensa, quæ postea in festucas abeunt, ut solent Alpinæ perennes: quædam Alpines similia sunt minima, alia magna, non sinuata: superiora autè oblonga, mucronata, lacinata, & triplici aliquando diuisura, ad costam vsque incisa: *stosculi* in umbellam digesti plurimi, minuti, purpurascētes, ut Valerianæ siluestris minoris.

Clusius, ni fallor, in Pann. p. 512. itemque Hist. post. Valerianam 1. Alpinam vocat, & Valerianam siluestrem Alpinam primam latifoliam, palmari cauliculo assurgentem, radice odorata, cum aliqua adstrictione amariuscule.

An Cæsalp. lib. 4. cap. 5. Valerianarum in odorarum à tribus prima, in umbrosis montium iugis, radice gustu subdulci, non sine aliqua suauitate.

An Tabern. Hist. Valeriana 3. Herbariorum Valerianam Alpinam Montbelgardī plantatam habui in horto Ill. E. C. collectam in transitu Harcinæ sylvæ. Reperi Genevæ in monte Saleuæ & aliis locis folia producentem mense Martio, ostendentemque etiam florum rudimenta, & tandem florentem Aprilis principio.

VALERIANA ALPINA FOLIO SCROPHULARIÆ.

CAP. CIX.

Ex radice oblonga, nigricante, nodosâ prodigè canalis ynicus, cubitalis & sesquicubitalis, ex uno striâ

Defec.

uus, striatus, viridis, quem folia cingunt multum Scrophularia foliis similia, pauca, oblonga, bina semper iuncta, quorum inferna pediculis brevibus, superna nullis donantur. Verum ad radicem ad caulis exortum utrinque prodeit quasi alius caulis, ex quo tantum folia sena, septena longis pediculis prodeunt, quorum quaedam subrotunda, quaedam oblonga, quaedam leuiter sinuata: caulis in summo brachiat, ut flores sustineat Valeriana siluestri similes, sed minores, pallide rubentes.

Valer. Hanc in monte Massersfall collegit C. Bauh. qui in phyt. Valerianam 6. siue montanam alteram appellat, ac multum similitudinis cum Valeriana montana H. Lugdunensis habere ait, non tamen eandem statuit.

PHU VETERIBVS ET IN GENERE.
CAP. CX.

Nard.
fuo.
Locus
Dioscoridi
stratum

Phu [o^r] quod & ipsum aliqui Nardum syluestrem *νάρδος ἄγρια* appellant, authore Dioscoride in Ponto nascitur, foliaque profert Elaphobosco, aut Hippofelino [Oleri atro, Sarrac.] similia: caulem cubitalem, aut etiam maiorem, lauem, mollem [*νάρδος* tenerum Corn.] purpureascentem, in medio cauum, geniculis interceptum: flores ad Narcissi flores accedentes, sed & maiores (*νάρδος* minores tamen reddiderunt Sarracenus & Columba, forte legendum cum Ruell. & Fuchsio *νάρδος* similes. Quidam *νάρδος* vel *νάρδα*, & teneriores, & in albicante colore purpureos: radicem superiore quidem sui parte digiti parui crassitudinem ferme æquantem, sed ex obliquo radices patuas agnatas [capillamenta Sarrac.] lunci, aut Veratri nigri instar, inter se perplexas, sublaues, odoratas, atque adeo odore Nardum æmulantes, cum quadam tamen odoris virosa grauitate.

Nardum
Creticum
Plinius

Ponitur autem et inter Nardi genera etiam à Plinio, libro sc. 12. cap. 12. ubi inquit: Nardo color qui inueterauerit nigriori melior. In nostro orbe proximè laudatur Syriacum, mox Gallicum, tertio loco Creticum, quod aliqui agrium vocant, alii Phu, folio Olusatii, caule cubitali, geniculato, in purpura albicante, radice obliqua, villosaque & imitante animum pedes.

Phu Dioscoridis & ceterorum Græcorum, nostras Valerianas plurimum exprimere diceret Syluius, nisi florum, qui in muscario pusilli sunt, magnitudo desideraretur.

Valeriana Pro Phu officinæ Valeriana vtuntur. Sed duas habent, minorem, cui Dioscoridis descriptio non conuenit, inquit Cornarius, etiam si quædam notæ ad ipsam detorqueri possint: maiorem autem Valerianam iam ferè consensum est, verum Dioscoridis Phu esse, ut cui ex toto respondeat descriptio.

Et sanè non videtur nobis Valerianam maiorem odoratâ radice, quod Phu hortense & magnum vocant, minùs descriptioni Dioscoridis conuenire, quàm Valerianam vulgarem siluestrem. De his igitur & aliis Valerianæ speciebus deinceps nobis agendum erit.

VALERIANA MAIOR ODORATA.
radice.

Bicubitales & altiores tollit caules: fistulosos, & geniculatos, alii donatos: folia, alia integra,
Tom. III



Defec. alia Centaurii maioris modo profunde dissecta, nullo eximio odore, aut sapore: flores in umbella suauolentes, ex albo purpureascentes, quorum singuli quintis foliis constant, apicibus productioribus concoloribus: semen cum lanugine quadam papposa auolat, radix subest trans-

uersim posita, digiti crassitudine, rugosa, multis fibris donata, albicans, sapore & odore aromatico, radicum fere Asari.

Hæc est illa, quam Tragus Valerianam veram seu Nardum agrestem & o^r græcè vocauit: itemque primum maius ac nobilissimum Phu, quod haudquaquam vulgare ait, siquidem in hortis feri & plantari necesse habeat: Mulierculas verò Argentoratenses pro Calamo aromatico venditare solere, non alio iudicio quàm si Basilicon loco Vitis exhibeant: In Diosc. dici *νάρδος ἄγρια* videtur: Hieron. Braunschweig Marinellum, Geniculatam Herbam benedictam & Valerianam: Autori Luminis maioris supra vngt, Alabast. Amantham & Potentillam: Serap. cap. 62. & Razi. cap. 44. Sistrum & Spicam siluestrem.

Appellatur autem præter ea, quæ ex Trago adserpsimus nomina, & à Dioscoride & quibusdam *νάρδος ἄγρια*, i.e. siluestris aut rustica Nardus, & Nardus Cretica à Plinio, hæc ætate ab aliquibus Valentiana & Theriacaria offic. Valeriana domestica: Theoph. Paracelso Terdina: Germ. Groß Baldrian: Belgis groote Valeriane / Spiercrust / S. Joris: Gall. Valeriane: It. Valeriana Hisp. Yerna benedette: Angl. Serwal: Boh. foflyf Polon. foflyf. Cæterum per o^r simpliciter nominatum, Genus latifolium hoc Dodonæi intelligit. Valeriana autem dicta videtur eò quod facultatibus plurimis prædita sit: Phu verò à putore, grati odore mixto Nardæ suauitati, quem Phu siue Phy aduerbio admirantis & abhorrentis auersentur subdorati.

Phu igitur plerisque, siue eorum qui hodie, siue superiore sæculo scripserunt, putatur esse Valeriana maior. Nec sanè quidquam inuenire se testatur Turnerus, quod descriptioni repugnet, nisi quidd folia sint planè Smyrniio similia, nec flores Narcisso. Sed cum candidâ interpretatione tum folia Smyrniio, tum flores Narcisso possint assimilari, reliqua autem omnia satis conueniant, Valerianam maiorem sine piaculo arbitratur pro Phu posse accipi.

Dioscorides porro duas plantas, Valerianam sc. maiorem, quam optimam: & alteram, quam siluestrem cognominant, Phu vocat, sed vnicâ descriptione, inquit Casalpini, videtur duas prædictas significare: Nam folia Olusatii, priori magis conueniunt: similitudo Elaphobosci secundæ magis: radice descriptio priori quadra-

Valeriana
Sera Tra-
21

Calamus
aromat
Phu Diosc.
Amantham
Genicul.
Herba be-
nedita
Amantham
Potentilla
Sistrum
Spica silv.
Phu ma-
gnum
Alabast.
Nomen
linguar.

Valeriana
maior
Phu Diosc.

Dioſc. cor-
figitur

floris color ſecunda. Quid autem de flore in-
quit eſſe Narcifſo proximum, maiorem ac tene-
riorem puto pro Narcifſo Nardum legendum
eſſe. Nardi enim Celtice ſlos luteus traditur:
Phu autem ex candido purpureſcens, qui & ma-
ior ac tenerior eſt: ponitur autem Phu inter Nar-
di genera, tum à Dioſcoride, tum à Plinio Nar-
dum ſilueſtrem & Creticum vocantibus.

Qui Vale-
rianam
Phu eſſe di-
xerunt
qui dubi-
tarunt:
quiſque pe-
nitenti no-
garunt

A Trago igitur, Matthiolo, Dodonzo, Tur-
nero, Ceſalpino & Lobelio, vt ex eorum dictis
apparet, Valeriana maior pro vero Phu recipi-
tur. His conſentiunt Monachi in Meſ. Corn.
Sylu. Cronemb. Bacchan. & Cordus in Dioſc.
vbi quædam reprehendit in Fuchſio, nempe,
quod voluerit ſecundam ſpeciem (Valerianam
ſilu.) eſſe Phu Antiquorum, vt poſtea ſubſe-
eo dicturi ſumus. Nobis autem videtur Fuchſius
dubitare de Phu Dioſcoridis, & vtramque Vale-
rianam eſſe concedere. Sed dubitant & Camer.
in horto, & Anguillara, dicēs: Difficultas quæ eſt
in dignoſcendo vero Hippoſelino & Elapho-
boſco non ſinit me aſſerere, quæ planta ſit Phu.
Cum prioribus tamen concludunt Phu eſſe Va-
lerianam maiorem, Io. Agricola, H. Lugd. Geſn.
Tabern. Gerard. Schvvenckf. & C. Bauhinus.
Negat autem Fabius Columna, Phu Valerianam
ſilueſtrem eſſe concludens.

Synon.

Cæterum, ſtirps quæ hoc capite à nobis tradi-
tur, Phu hortenſe, à Geſn. de hort. inſcribitur,
Phu maius ab eodem de coll. ſtirp. Phu magnum
à Fuchſ. in Hiſt. & H. Lugd. p. 927. Phu verum
à Fuchſ. in Icon. & Tabern. in Hiſt. Phu à Dod.
gall. Gerardo. Brunſell. Bacch. Apollac. Rob.
Stephano. Valeriana maior à Lob. in Obſ. p. 411.
in Icon. Plant. p. 714. Turn. Schvv. & Camer. hort.
cui & Phu vulgare. Phu Ponticum & Valeriana
Pontica à Tab. in iconibus: Valeriana 1. ſiue hor-
tenſis à C. Bauh. phyt. Cætera Synonyma ex iam
dictis colligere licet.

Locus &
tempus

Valeriana maior odoratâ radice vt plurimum
in hortis colitur, vt Florentiz in horto & Ferra-
riæ florens Aprilis: Bononiæ in horto S. Salu. al
Burgo di S. Catharina: Patavii: Monſpelii, & Lug-
duni flores Maio: Baſileæ virens adhuc Octo-
bri, vt & Montbelgardi. Reperitur etiam in qui-
buſdam altis montibus in ſiluis.

Vires & v-
tus

Vim habet calefaciendi & ciendi vrinas radix a-
rida trita & potui data: ſed & decoctâ ipſius idē
efficere poteſt. Facit etiam ad lateris dolorem, &
menſes ducit, & antidotiſ miſcetur. Adulteratur
autem Ruſci radicibus ammixtis: ſed facile eſt
illas dignoſcere: ſunt enim duræ & frangi con-
tumaces, citra gratiam odoris vllam, referente
Dioſcoride. Phu herbarum radicem odoratam quo-
dammodò eſſe, teſtis eſt Gal. lib. 8. ſimpl. Nardo

Strangula-
tiones
Pectoris
dolores

viribus ſimilem, ſed tamen ad pleraque infirmio-
rem, vrinas mouere plùs, quàm aut Indicam, aut
Syriacam Nardum, perinde vt Gallicam. Phu
autem radicem dari potui tritam, vel decoctam
ad ſtrangulationes vel pectoris dolores, vellat-
erum, perhibet etiam Plinius, & menſes quoque
ciere: bibi cum vino. Folia & radices ad oris quo-
que & gingivarum cum inflammatione exulce-
rationes decoctâ & gargarifata prodeſſe ſerunt.
Excalfacit autem Phu legitimum [Valeriana
hortenſis Dodonzi:] ſed tamen non intenſe, ne-
que ipſa recens radix, ſed aſcens tantum. Re-
centem ſiquidem exiguum omnino caloris ha-
bere facile deprehenditur: aſcendentem verò ca-
lidiorē eſſe, & guſtus & odor, vterque inten-
ſior, oſtendunt. De facultatibus Phu hæc pro-

Ex Matth.

didit Matthiolus: Radix calida & ſicca ſecundo
gradu eſt: aperit, attenuat, concoquit, & prouo-
cat: hauſta ſtutus pellit, auxiliatur lateris com-
punctionibus. Præſtat quoque aduerſus ſtran-
guriā, veterem tuſſim, & aſthma, cum dulci ra-
dice, vuis paſſis & aniſo decoctâ. Miſcetur Anci-
dotis, vt Theriacæ & Mithridatio, aliique medi-
camentis præſeruatiuis à veneno, quod venena-
tis ſe beſtiis & peſti ipſi reſiſtat. Adhibetur quo-
que in potionibus internorum vulnerum. In
vino aut aqua decoctâ, & in oculis guttatim in-
ſtillatâ, oculorum claritatem adiuuat. Conſert
etiam ad eorum ruborem & dolorem, Et virens
cum radicibus contuſa capiti que adhibita do-
lorem eius ſedat.

Flatus
Compos.
Aurum le-
teris
TuſſisVALERIANA SYLVESTRIS MAGNA
aquatica.

Radix ex pluribus compoſita eſt fibris, albis,
guſtu atomaticis, reptatu ſubinde ſeſe pro-
pugnantibus: caules ad humanam altitudinem ex-
ſurgunt, recti, ſiſtuloſi, longis internodiis inter-
cepti, ſtriati, modicè hirtiſſi: quorum genicula
amplexantur baſi ſua folia Valerianæ ſæpius,
magis pinnata, ſaturatiorūque virentia, non nihil
auerſâ parte hirtiſſa: flores in umbella ſatiū ſi-
miles, quinquefolii, ex albo purpureſcentes, hir-
cum olent, tandemque in pappos faceſſunt.

Deſen-

Hanc Columna Phu nomine pingit, ac Phu
Dioſcoridis eſſe contendit.

Brunſell. quoque Valerianâ ſilueſtrē pro Phu
Dioſcoridis ſub nominibus Baldrian/ Sennens
mark/ Fatzenfraut exhibet. Quin & Fuchſius
huius quoque cōſilii fuſſe deprehenditur, dicens.
Quoniam dicitur, Græcis Phu & Nardus ſil. ſtris,
Latinis Valeriana officinis & Herbariis, Germa-
nis aut etiam Arugenwurzcl appellatur quod
ſe. cattī odore radicis eius, quo eorum oculi robo-
rantur, impenſe delectentur. Hoc alio nomine
Valeriana vulgaris, Gemein Baldrian dicitur, &
à pictura Dioſcoridis non abhorret: quod omnia
ſerē ſicilli respondeant, vt proſus nulla recla-
mare nota videatur, &c.

Contra Columnam, Ceſalpinum, Brunſellium
& Fuchſium ſe opponit Cornarius, qui Valeria-
nam minorem officinatam (in quibus ſolis error
hic remanſiſſe videtur) deſcriptioni Phu Dioſco-
ridis conuenire negat. Phu ſiquidem radices, vt
ipſe etiam Marantha obicit, ex obliquo villoſæ
ſunt, capillamentis intucem commixtis, vt planta
ipſa oſtendit, quod in hac Valeriana non cerni-
tur. Phu noſtrum, inquit Eur. Cordus, non reſ-
pondet hiſtoriæ Phu apud Dioſcoridem, imò alia
quædam magis, quæ Theriacaria in Heſſia no-
minatur. Vocatur autem hæc ab officinis, quæ
pro Phu oſtendunt, Herba cattorum & parua
Dania. An Buphtalmum & Alurum Geſnezo?

Inſcribitur à Trago Valeriana vulgaris, de qua Synon:
ait: Alteram verò Valerianam, Gerinani appel-
lant Fatzenwurzcl/ & mendwurzcl, ea nimirum
vera eſt Serpentaria herba, aut Serpyllum. Sunt
enim qui ed, quod hinc inde ſerpat ſequē con-
uertat, Serpillum maius vocitent.

Serpentari-
a
Serpyllum
maius

A Dod. gall. Valeriana ſilueſtris maior, Belg.
milde Valeriane. Gall. Grande Valeriane ſauuage.
Lat. in ſol. itemque Lobelin Adu. p. 319. Obſ. p.
411. Icon. Plant. p. 715. Valeriana ſylueſtris. Cluſ.
in Hiſt. poſt. Valeriana ſilueſtris prima. C. Bauh.
phyt. Valeriana 2. ſiue ſilueſtis maior. Ta-
bern.

Taber. in Icō. Valeriana maior, herba benedicta, Grosser Baldrian: in Hist. Phu vulgare. Gerardo Valeriana maior silvestris, great wilde Valerian. H. Lugd. p. 1044. Valeriana silu. maior Dodonæi, Phu paruum Matthioli. Gesn. de coll. stirp. Phu minus vulgare, & Phu siluestre. Fuchf. in Icon. Phu vulgare, gemein Baldrian.

Locus
& tempus.

Oris exul-
ceratio-
nes.

Targat
radix.

Valeriana aquatica maior passim prouenit in Comitatu Montbelgardensi, etiam in horto Ill. E. C. Genevæ vidi folia protrudentem mense Martio, florentem Maio & Iunio ac Iulio, Vidi etiam Lugduni, Montpelii Patavii Bononiæ Florentiæ Basileæ: Vulgaris Clusio in Pannonia, Austria, Stria, vicinisque provinciis. Lobelio in Northmaniæ & Angliæ humentibus. Nasci ait Fuchsius in humidis locis & prope aquas, hancque ad mirandam altitudinem surgere: Prouenire etiam in lucis & caduis silvis, sed hanc in tantam proceritatem non emergere. Hanc Valerianam, ruptis, conuulsis, ex alto præcipitatis vitalem censent: sed & folia huius, vt & sativæ, ad oris & gingivarum cum inflammatione exulcerationes, aphthas, decocta & gargarizata prodesse feruntur. Nec defunt, qui radices aridas, tulasque, drachmæ pondo cum vino sumptas, infra, supraque purgationem moliri affirmant. Columna huius radices pulverem ad Epilepsiam commendat, vitalem etiâ esse istibus à muscis venenatis illatis autopsia me docuit, administrante Rôdeletio: Ad visum acuendum & conservandum commendat etiam Hieronymus Brunschuueig Valerianæ vulgaris radicem, vel collo suspensam, vel in media vola compressam, insigniter corroborare congregientem cum muliere narrat Agricola. Contra febres, maximè verò tertianas, non semel, sed multoties expertus est Iohan. Schvab plurimum valere.

VALERIANA MINOR PRATENSIS, VEL aquatica.

Desce.



Valeriana silvestris minor radice tenui serpit, quæq; terrâ attingit ex geniculis demissis fibris radica-tur, sapore amaro: caulis dodrantalis, angulosus, striatus, cauus, geniculis aliquot interceptus, ubi bellam sustinet florum ex candido rubescens, vt in Valeriana silvestri maiore, minus tamen magnâ:

quorû singulorû oræ in quinque lacinias minutas reflexas divisæ, apice altiusculo tripicite: sed & umbella interdû ex foliorû cauliculi alis prodit: folia alia integra, subrotunda, parva, pediculo longo: alia, vt ea plerûque, quæ in caule conspiciuntur, bina opposita, pediculorum expertia, imâ parte laciniata, & quasi pinnata, superiore integra & oblonga, sapore nonnihil amaro & viscido.

Obseruavi hanc Lugduni florentem Aprili in pratis & in horto meo: Genevæ cum flore Maio, & semine maturo Iunio: vt & Basileæ in pratis

Locus
& tempus

VALERIANA RUBRA LATIFOLIA, & Angustifolia.

CAP. CXI.

Describe.



Digitali dicitur ra-dice nititur, lignosa ferè, sapore Valerianæ: quæ cau-les surgunt cubitum & sesquicubi-tum alti, teretes, læues, colore casti, fistu-losi: ad quorû singula genicula folia bina aduersa, ex lata basi, caulem amplexantia, in acumen desinens: laciniis quibusdam in-

binde donata, pinguis, glauca, quorum quæ mi-nora sunt, plurimû referunt Papaueris spumei vulgò dicti folia: sunt autem sapore subacri: flores in nubaris dependent perquam conferti amœni, colore purpureo, quorû singuli quin-quepartiti, oblongo, sed admodum tenui tubo-ulo, virenti pedicello agglutinantur, corniculum in super calcaris instar protendentes: semen pap-pae cristâ Valerianæ modo succedit.

A Dod. gall. pingitur pro Polemonio, quod ab aliis dicatur Chilibodiamis h.e. centû viriû: officinis, Herbatunica, ab Herbariis moder-nis Behen & Been album: A Lat. in sol. pro Va-leriana rubra.

Inscriptis hanc Lob. in Adu. p. 144. Osimat-trum Valerianthon. In Obf. p. 184. iam dicta inscriptione pingit ac etiam in Icon. Plant. p. 341. & præterea vocat Behen rubrum Belgicum, Saponariam alteram, & Scutthion Vlyssis Al-droandi, quæ utque an sic Condundum Plin. lib. 26. cap. 5.


Tabern. in Icon. & Hist. appellat Valerianam rubram, C. Bauh. phyt. dicitur, Lychnis æ. siue rubra. Sed ad Lychnides cur referenda sit non video: cum nec flores, nec valcula conueniant. H. Lugd. p. 187. vocat Polemonii speciem Dodonæi.

Sata hæc Valeriana Montbelgardi prouenit in horto E. C. vbi primo anno flores non protu- lis: altero verò floruit Iunio & Iulio, hiemem- que pertulit,

Valeriana rubra angustifolia.

Valerianæ rubræ latifoliæ similis est quod ad flores suauiter rubentes: calcaris donatos, in pappum abeuntes: caulis quoque bicubitalis: persimilis, at quæ per eum conspiciuntur folia, plurimum differunt, sunt quippe palmi ferè Sznoni longitudine, latitudine verò culmi.

Locus & tempus



VALERIANA GRÆCA QUORVNDAM
colore caeruleo & albo.
CAP. CXI.

Descript.



radice, tenui, fibrosa, albicante, euidenter amara proserpit: caules rectos surrigens, bicubitales, tenues inanes, aliquantulum angulosos & pilosos: quibus adnati pediculi, seliqui-palmates & pedales, foliis Valerianæ sylvestris, minime dentatis atro-virentibus, subhirsutis infra, pinnatim utrinque, pulchra serie stipatis, sapore sædo & lento: ex quorum alis & caulibus fastigio flores confertim multi emicant, Campanularum specie, non continui tamen, verum è quinque foliis compositi, magis coloris caerulei, vel albi gratia quam fædidi odoris, quem olfacienti afflant, commendati: è quorum medio præter tripitem stilum violaceum productiorem, stamina quoque concoloria apicibus croceis procedere solent.

Dod. gall. & lat. in fol. Gesn. hort. Phu peregrinum. Lobel. in Aduers. Obs. p. 412. Icon. Plant. p. 716. Valeriana, peregrina Belgarum &

C. Bauh. phyt. Lychnis 22. siue rubra, Valerianæ rubræ dictæ genus alterum, oblongo & angusto folio.

Valerianam rubram angustifoliam reperi florentem mense Iulio Nantuz Sabaudorum in colle extra Portam quæ nunc Geneuam ad dextram.

Herbariorum. Sed & Tabern. in Icon. cum Gerardo Valerianam græcam vocat: in H. st. autem Valerianam adulterinam. C. Bauh. phyt. Valerianam 10. siue peregrinam, caeruleo flore, rarius albo. In Rhætia spontè prouenientem inueni in siluis. In hortis Franciæ, Belgicæ, & potissimum Angliæ familiaris Lobelio. Plurima Æstatis parte floret.

Nullius est usus, nisi quoddam hororum exornet margines, ut testatur Dodonæus.

VALERIANA PEREGRINA, SEV

Indica.

CAP. CXII.



Descript. Dotalis & cubitalis est planta, cui multa sunt similia Locustæ herbæ quæ S. Claræ quibusdam dicitur, ac de qua sub finem lib. 12. radice nixa tenui, breui, candida, multis fibris capillata, sapore amaricante, non sine acrimonia aliqua aromatica: caulis serè repandus, supi-

ausue magna ex parte, partim erectus, longitudine dodrantali, laevis, concavus, teres, inanisque, subrubens, alternis aduersisque coniugationibus, sene quadam sæpius bipartitus: alarum diuicationibus incipienti præsertim apposita folia bina priora ex aduerso sita, Plantaginis latifoliz serè minora, vberiore neruorum dimisura, tenera, pingua, sapore aromatico, quorum quæ superiora, sunt minora & denticulis obiter crenata, priora quidem Valerianæ satiuæ similia: flores quasi in umbella, inodori, suauè rubentes, ex longo, tenuique corniculo, in quina folia dissecti, Ocy mastri Valerianthos, sed sine calcaribus quibus delapsis succedunt vascula oblonga, fungosa, articulis distincta, foliis quibusdam obiecta, crassa, concava, in calyces plures diuisa, in quibus vasculum latitat, velut in foliaceum corniculum bipertitum, in quo semen longiusculum.

Semen acceptum à Calabria, satum Montbelgardi in horto H. E. C. prouenit, & Iulii principio & Augusto floruit. Floret interdum etiam Maio & Iunio maturius lata, teste Clus. subinde tamè in Hiemem usque flores & semen proficere visa.

Vascula se-
minum



HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XXVIII

VERTICILLATÆ ET FLORES GALEATOS FERENTES,
hisque affines pleræque aromaticæ.

Ipsa, qua nunc dicitar, herbarum aromaticarum claritas, medicina tantum gignente eas tellure in admiratione cura Priscorum diligentiaque animum agit. Nihil enim intentati in expertumque ultis fuit, quo ipse adeo Plin. eos dicat honore: nihil deinde occultatum; quod non prodesse posteris vellent. Hinc ab ipsis pleraque nobis innuere aromata, & inter ea odoratarum aromaticarum stirpium præstantissima quæque. Et nos nobis oblata vel negligere, vel abscondere atque suppressere cupimus, & fraudere vitam etiam propriam. Ita certe recondunt, qui pauca aliquando, invidentes alii, nihil novi perquirunt, nihil discunt, nihil docent: & quod Plin. iam suo auro conquerebatur, heminem docere, vel ea qua scimus, in auctoritatem scientia est. Tantum ab excogitandis novis ac iuuantia vita mores absunt: summumque opus ingeniorum diu iam hoc fuit, ut intra unumquemque recte facta Veterum perirent. At, hercule, paucorum hodie cura, & aliqua etiam nostra, odoratarum herbarum familia accreuit, quanquam iam dudum benignè largiente natura, eiusque aeterno moderatore Deo Opt. Max. ut nobis etiam hodie aromata præ foribus, in hortis & agris nasci, indubie affirmare ausimus, tam benignâ gratiâ diligentia referente. Non equè cura eorum mira esset in his, qua satum blandiuntur; aut odore inuisant: sed culmina quoque montium insua, & solitudines abditas, omnisque terra fibras scrutari inuenire; quid quæque radix polleret; ad quos usus herbarum f. l. a pervenirent, qua salubritas ex solum odoratu resultaret, etiam quadrupedum pabulo intacta ad salutis usus verterent.

Verticillatas dicimus, quia flores caulem articulatum, veluti verticilli amplectuntur. Flores galeatos; quod galeam quodammodo representent.

MENTHA EX VETERIBVS ET IN GENERE.

CAPIT. I.



Hediosmon esse refert Marcellus qui Mintham, qui Calaminthen, qui Neperā, qui Perxo, qui Macerho, qui Perithromundo vocent: Esse Aegyptios qui Tis, & esse Romanos qui Mentham, quo solo nomine, inquit, in Græcis Mentha commendatur: nec quisquam est qui eo audito suavitatem odoris in notissima omnibus herba non amet, id enim Hediosmus Græcis est: quod ambitiosè nescio an molliter ab eis factum fuit. Qui antiqua Minthes appellatione, quæ hominis in eam conuersæ honorem haberet, parum contenti, nouo & quod vitæ tantum delicias indicaret, viginolis locis sceleriter prouenientem herbam nomine ornauerunt. Quo secuta ætas, voluptatis suæ magis quam alieni nominis ambitiosa, libentiùs & frequentius quam antiquiore illo vsa est. Theophrastus enim non alio quam Minthes nomine pluribus locis Mentham indicauit: & ante eum tota Græcia: præsertimque Arcadia in qua non procul à Pylo nobi-

lis Minthes cognomine mons fuit: Quam Plutonis pellicem & à Proserpina, ut solent pellices semper odisse vxores; in hortensem Mentham transformatam fuisse narrant Poëtarum fabulæ: æterno in æterna planta hominis monumento. Quam vocem Romani magis amantes quia in ea malè habitæ ob amorem puellæ memoria seruaretur: vnâ tantum & alterâ mutatis literis, Græcorum Minthen Mentham suam fecerant, quotidiani in sanitate vsus & præsentis in medicina contra tot mala remediū. Quam cum Calaminthe quæ Nepera est miscere non decet. Sui enim generis Calaminthe herba est à Mentastro post à nobis dicenda: quæ ab imperitis aliis Menthe appellationibus importunè adiecta est. Nec desunt qui illi voci aliam tribuant originem, inter quos Dalechampius: cui *μνδν* Græce dicitur *μνδν*, à stercoreis fæcore, per *ανθρακω*, quod minime foetida sit.

Κοκύνθη νίκη Oppianus 3. *ἀνθηκω* vocat, quod Mintham Cocyti filiam, Plutonis amicam aduentanti Proserpinæ infensam & inuitantem,

*Improbata
herba.*

Ceres in *Arabia* mutauit. Eadem ferè leguntur apud Strabonem lib. 8. de monte Minthe. Inprobam herbam vocat Oppiani interpres, quod ante coitum appositum mulierum genitalibus, conceptionem impediatur, vulnera si intus ratur, curari cohibeat, lacti mixta ante coagulum, densari non patiat, quæ Florentinus libro 12. Geoponicon tradit.

Theophrastus Hædios non inter olea recenset ruralia: miratur autem Cæsalpinus Gazam Mentastrum conuerrere non Mentham: Ac id fuit erroris causa, quod alibi Theophrastus Græcè Mintham vocat herbam, in quam degenerat Sisymbrium cum negligitur, putauit enim Gaza hoc Mentam esse do. neiticam, cum potius significetur syluestris herba esse, ut alibi dicitur. Putat autem Cæsalpinus Mentham apud Theophrastum significare ipsum Mentastrum: non quidem quod species in alteram speciem conuertatur, ut notauit Theophrastus, sed odor tantum.

Dioscorides Mentham notam plantam dicit, nec describit: genera autem duo facit Satiuam & Syluestrem quam Mentastrum Latinis dici interpretes secuti Plinius volunt.

De Mentha autem Plinius inquit lib. 19. cap. 8. Eodem tempore [quo Apium] feritur Menta plantæ: vel si nondum germinat, spongia. Minus hæc humido gaudet. Aestate viret, hieme flauescit. Non enim suauitas odoris apud Græcos mutauit, cum alioqui Mintha vocaretur: unde Veteres nostri nomen declinauerunt. Græco Mentha mensas odore percurrit in rusticis dapibus. Semel sita diutina ætate durat. Congruit pulegio, hæc quoque leuatur simili genere. Eodem lib. cap. 10. Ferro quoque non expedire tangi Mentam auctor est Sabinus Tyro in libro Cæpuricôn, quem Mæcenati dicauit.

Galenus 6. simpl. duplicem habet Mentham, Odoratam quæ Dioscoridis satia est, & alteram quam dicit non odoratam, Calaminthen vulgò dictam.

Mentha cum hortensis tum etiam syluestris, quam Hetrusci nostri Latinum nomen retinentes, vulgò *Mentastro* appellant, inquit Matthioli, adeo omnibus vulgaris notaque, ut sine vitio eius delineationem silentio prætermitti posset putauerim. Et quamuis plures, quam describat Diosc. in hortis sint Menthe species [una enim breuioribus & crispioribus constat foliis, alia rubenti caule & flore, alia verò albicante] huiusmodi ramen specierum differentia non sunt meo iudicio plurimi faciendæ. Veneris voluptatibus Mentha commendata est, et si Plinius non sine errore lib. 20. cap. 14. planè contrarium scriptis tradiderit, ut mox patebit. Græcis *ἡδύσμος* dicitur, Latinis pariter & Italis Mentha, Arabibus *Nabanabo* & *Nabanaba*: Germ. *Münz*. Hisp. *Hierna buena*, Gall. *Mentha*. Hæc ille, qui dicit non plurimi faciendas differentias Mentharum, quia non nouerat eas, ideoque non poterat distinguere, quod satis indicant eius icones, & omnia quæ scribit de Sisymbriis & Méthis. Nos cum Posterioribus plures differentias, de quibus singulis separatim dicemus, agnoscimus.

Tempestiuum est ut Menthe vires declaremus: itaque ut à Dioscoride ordiamur Mentha, inquit is, *ἡδύσμος*, ab odoris suauitate Græcis dicta, (*ἡδύς* enim idem est quod suavis *ἴσμος* verò odorem significat, quam alii Mintham vocant, cognita herbula est. Calefaciendi, adstrin-

gendi, atque exsiccandi vim habet: quamobrem iussit sanguinem potu ex aceto succo: tinea in ventre teretes enecat: Venerem stimulat. Singultus, vomitiones, choleraeque sedant terni rauli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinatur. Impolita fronti [vet. *ἡδύσμος* *ἡδύσμος*] capitis dolores mulcet: mammas si tendantur, aut Lacte turgeant compefcit: cum sale canum moribus illinitur: aurium doloribus cum aqua mulla subuenit: vuluæ ante coitum admota conceptioni resistit: linguae scabritiem conficta leuigat: lac coire densarique in cascum non patitur, si folia [aliàs *ἡδύσμος*, id est, ramuli] portionibus Lactis immergantur. In summa stomacho utilis est, & in condimentis peculiarem gratiam habet. Hæc Dioscoridis verba de Mentha satia intelligenda sunt, quam tanquam notam non describit.

Menthe ipsius odor animum excitat, inquit Plinius lib. 20. cap. 14. & sapor auariditatem in cibus, ideoque embaumatum misturæ familiaris. Ipsa acelcere aut coire densarique lac non patitur. Quare lactis portionibus additur, ne huius coagulati potu stranguentur. Datur (Data M. & CH.) in aqua aut mulso: eadem vi resistere & generationi creditur cohibendo [prohibendo] genitalia densari. Equè maribus ac foeminis sistit sanguinem, & purgationes foeminarum inhibet. Cum amylo ex aqua pota, coriacorum impetus. Syriation & vomicas vuluæ curauit. Ille & iocinerum vitia ternis obolis ex mulso datis. Item sanguinem excreantibus in sorbitionem. Hucera in capite infantium mirè sanat. Arterias humidas, siccas, adstringit. Pituitas corruptas purgat in mulso & aqua. Voci [Muscorum & *ἡδύσμος*]. Iuuat autem, quia fluxionem sistit in fauces euntem, & rauedinem efficienstem.] succus sub certamine utilis duntaxat, qui & gargarisatur vuæ tumente, adiecta Ruta & Coriandro ex lacte. Vtilis & contra tonsillas cum alumine, linguae asperæ cum melle. Ad conuulsa intus per se vitiiisque pulmonis. Singultus & vomitiones sistit cum succo granati, ut Democritus monstrat. Recentis succus narium vitia spiritu subductus [subducto. Vet.] emendat. Ipsa trita cholerae, in aceto quidem pota. Sanguinis fluxiones intus. Ileum etiam imposita cum polenta: & si mammae tendantur. Illinitur & temporibus in capitis dolore. Sumitur & contra Scolopendras, & Scorpiones marinos, & ad serpentes. Epiphoris illinitur, & omnibus in capite eruptionibus: item sedis vitiiis. Intertrigines quoque: vel si teneatur tantum, prohibet. Auribus cum mulso instillatur. Aiunt & lieni mederi eam in horto gustatam, ita ne vellatur si is qui mordeat, dicat se lieni mederi, per dies nouem. Arida quoque farinam tribus digitis apprehensam & stomachi dolorem sedare in aqua: & similiter aspersam in potionem, ventris animalia expellere. Magna societas cum hac ad recreandos defectos animo Pulegio, cum surculis suis in ampullas vitreas aceti vtriusque deiectis. His Plinius partim plures virtutes Menthe quam Dioscorides tribuit, partim Dioscoridi appertè refragatur, tradens eam Veneri officere, adducta etiam cur id faciat causa: Sicut Florentinus in Geopon. rinceptam ac incommodam rebus Veneris haberi dicit.

Dioscoridiam Hippocrates & Aristoteles aduer-

Nabanaba

aduersantur, uterque diuersam rationem secutus. Sic enim Hippocrates, Mentha calfacit, urinam ciet, & vomitus sistit. Et si quis saepe comedat, semen genitale colliquetacit ut dissoluat, attingere prohibet, & corpus debile facit. Aristoteles in Problematis sic proponit. Cur dicitur Mentham belli tempore, neque edendam neque ferendam esse? Num quia refrigerat corpus? Indicat autem id seminis corruptio. Hoc autem contrarium est fortitudini atque audaciae, sicut ipse ostendit alio problemate, cum ait, eos qui natura sunt frigida formidoliosiores esse, contra qui calida, audaces. At Hippocrates immodicum Menthae elum veneri resistere intelligit, quod caliditate sua sanguinem extenuet & semen genitale colliquet, eamque ob causam attingere prohibeat: Galeno, Dioscoride, Paulo, aliisque quamplurimis Mentham calidam siccam esse cum eo statuentibus. Aristoteles vero, Mentham corpus ex accidente refrigerare, atque debilitare, quod Semen corrumpat.

Conciliator anxius est & verè fatetur esse calidam & siccam ac Venerem excitare Mentham. Addit tamen: Mentham per se quidem calidam, per accidens autem frigidam: ac idem docet Hermolaus Barbarus corollar. 263. Demum vero Conciliator aliam problematis solutionem affert, cum inquit. Potius dicendum Mentham in bello neque edendam, neque ferendam, quod calefaciendo homines ad Venerem incitat, propter quam milites debilitantur & redduntur timidi, quam quidem responsionem admittendam censet Massaria. Quamobrem quod nequeo dissimulare, inquit, legi aliquando cum stomacho Montanum Veronensem, qui de affectibus vterinis hunc locum tractans, cum totum peruertit, scribens ad hunc modum. Hac in re Aristoteles errauit in problem. ubi volens reddere causam, docet, esse frigidam, quod falsum est. Hæc Montanus. Quæ ab Aristotele & Conciliatore adeo sunt aliena, ut certissimum sit hunc hominem neque Aristotelem neque Conciliatorem legisse, sed potius, quod alii quoque hoc tempore faciunt, hæc ex aliis transcripsisse.

Non abs re autem erit etiam huius loci facere hos Reufneri versus:

Mentham ne comedas: neque plantas tempore belli:

Sic equidem Veterum regula sancta monet.

Cur? an quod rimidas facis, imbellesque cohortes

Frigidas? sic magnus censet Aristoteles.

An quod delicias facis indulgere, gulaque

Cum condimentis hac, & odore placent?

An quod & hec metuit ferrum, si credere fas est:

An quod disidiis tunc vetat esse locum:

Quando semel longo durat fata tempore Mentha

Fertilis, & damnis ditior usque suum?

An potius Venerem quod iners remoratur amicam?

Nec reparat damnum Marris ab ense datum?

Galenus Menthae facultates, & causam cur ad Venerem incitet, exponit his verbis. Hediosmos alii vero Minthem odoratam vocant. Est enim & alia quædam Mentha insuavis odoris, quam Calaminthen vocant. Vtraque gustu acris, & facultate calida est, ex tertio ordine calfacientium. Infirmior tamen est Mentha odorata quam Calaminthe, & minus calefacit. Ut enim in vniuersum dicam hæc seu siluestris quædam est, illa seu domestica. Quamobrem ob eam quæ ex cultu accedit humiditatem, mediocriter ad Venerem excitat. Id quod omnibus accidit quæ humiditatem semicoctam & flatuosam continent. Ob

talem ipsius herbae temperaturam in abscessibus eam quidam cum polenta mixta vtuntur, id quod in Calaminthe facere nequeas, propterea quod valentius tum excalefaciat, tum desiccet quam id genus medicamenta possint. Habet vero etiam quiddam amarum in se & acerbum. Illo quidem lumbricos interficit: acerbitate vero si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis effusiones reprimit. Substantia est, si quæ alia herba, tenuium partium.

Nec omittenda sunt quæ Simeon Sethi de ea prodidit. Iuat iecur frigidum, ac ventrem corroborat ac stomachum, coctionem facit, vomitum sedat, ac singultum. Prodest etiam ad cordis morsus, & appetitionem suscitatur. Flatus discutit, & lumbricos interimit, potissimum siluestris Menthae ius. Venerem stimulat, & iecoris obstructions tollit. Verum hac vesci ad satietatem non oportet: quoniam sanguinem extenuat, & serosum facit, & ipsum in flauam bilem mutat. Dein efficit ut sanguis, qui maxime est tenuium partium, discutatur, & crassus ac melancholicus relinquatur. Quare oportet biliosos ab ea obstinere. Contrita cum sale & rabiosi canis morsui imposita, medicamentum fit salubre. Arida vero trita & post cibum sumpta ad concoctionem facit, & lienosos iuuat. Cum vino pota difficulter parienti succurrit. Ferunt etiam quod mania hippienti imposita fiat remedium: quodque eius decoctum absorptum confestim sanguinem ex faucibus eicientes sanet. Huius semen ventrem purgat, & pulmonem lædit.

Scribit Matthiolus aquam à tota planta Menthae distillatam, quatuor vnciarum pondere eporam sistere sanguinem è naribus profluentem. Succum etiam ad idem prescribunt alii, nec non ad hæmorrhoidas. Ego autem cum multa habeamus optima remedia quæ sanguinem cohibent manifesta qualitate, nolim uti hac herba acris, quæ etiam sternutationem odore & acrimonia mouere potest.

Hic porro videndum quare Galenus in Elect. de Aromat. potius posuerit Mentham siccam, quam vrentem? Respondent Monachi, quia istud electuarium est stomachicum, & non recipit nisi medicinas stomachum confortantes. At quia Mentha virens est ventosa, & stomachi conturbatiua non recipit ipsam. Cum autem siccatur, amittit ventositatem illam, & restat illi pars confortatiua, quam quærit author in presenti electuario, ideo recipit siccam. Vnde notandum, quod herba aut flos, vel simile, cum siccatur, tripliciter operatur. Aut amittit virtutem, ut sunt Borrage, Buglossa, Cymbalaria, & similia multa: aut acquirit virtutem, ut Mentha, Hyssopus, & similia: aut transit de virtute in virtutem ut Viola & similia. Item nota, quod cum in aliqua compositione petitur Mentha humida, non intelligitur virens, ut dicatur humida ad differentias siccae. Sed illa quæ in pingui, vel humida, vel aquosa humo nata est. Ut puta, illa est humida, quæ irrigatur &c. vnde cum non specificatur de virenti, ut puta pro excipiendo succo ipsius Menthae &c. vel legitur Mentha simpliciter, vel Mentha humida, semper sicca intelligitur. Et similiter Hyssopus & alia plura.

MENTHA CRISPA VERTICILLATA folio rotundiore.

Reptatrix radix huic cum reliquis speciebus communis existit, nec non caules quadrati,

qui huic cubitos binos altitudine superant, rigidi, recti, propter terram purpurascens, hirsuti,

Descriptio



multis alis cōcaui : folia odorata ex ramorum & caulium geniculis enascuntur atro-virentia, subrotunda, rugosa, crispa, per ambitum serrata, glabra, aut minimum hirsuta, flores ex foliorum alis verticillatis, Pulegii, in cauleum languētes.

An Cordo in Diosc. dicitur *ἰνδίοικος*, siue *μύρτη*, quā Germani ipso referente, *Frauß Münstz* appellant, Saxones verò *Frauß münthen* & *Pharmacopolæ Mēham* crispam. Hunc satiuam appellat, & nisi sæpe trāteratur *Silymbrio* similem fieri scribit.

An Trago *Mentha prima*, *Mentha domestica*, *Mentha rubra*, *Silymbrium*?

Dod. Gall. hanc exhibet sub titulo *Menthæ satiuæ*, [sic etiam Lat.] primæ, quam gallicè vocant *Menthe crepue*, Gerin. *deymen* & *Frauß deymen* [forte malè legitur in his vocabulis d pro B.] Belg. *Brwynheylsche*.

Fuchl. & Hist. & Icon. *Mentham satiuam* primam inscribit. Et sic etiam Lacuna, qui eius figuram assumpsit. Sed & Lonicum per *Mentham satiuam* primam die crst 3am *Münstz* / *Kort Münstz* / *Mentham rubeam*, aut *deymen*, hanc intelligere suspicor, quamvis figura displiceat.

Rob. Const. apud Amat. in Diosc. lib. enarr. 39. figuram hanc *Menthæ satiuæ* nomine inscribit, quam è Fuchio assumpsit. An Amatus verò de ea locutus fuerit, nescio.

Matthiol. lib. 3. cap. 35. an huius *Menthæ* Mentionem fecerit me latet, saltem nullam eius figuram exhibet, nec integram descriptionem, considerent lectores quæ scribimus sub *Mentha crispa* spicata, & sub *Mentastro* folio rotundiore hirsuto rugoso : descriptio Germanica non demonstrat plantam de qua hoc capite agimus, spicatam enim dicit.

De hac Lobel. in Aduers. pag. 218. ait: *Mentha* vulgata serpens, rotundifolia, Pulegii flore, verticillata, seu *Fusca*, sacra minimè dicta *Mentha* fuit, quia mentem percellat: quum potius spiritus oblectet, gratia odoris, vnde *ἰνδίοικος* vocatur. Nec de odore, qui non semper suavis est, ut Galenus etiam notauit, aut illius contrario sensu, sed potius quia *μύρτη* esset concolor, aut hirsuta, dicta videtur *μύρτη* vel *μύρτε*, ut legitur apud Theophrastum. Est enim *μύρτε* Lanugo muscidæ pubes humentibus & putrescentibus penè cunctis sub dio apertis obduci solita, qualem ternere est in succis & decoctis herbarum diutulè seruatis & passim in oletis & sterquiliniis: cui haud absimilis tenera illa hirsuties pulla, quæ in *Mentha*. In Obseru.

pag. 271. vocat *Mentham vulgatam* serpentem rotundiore folio, flore coronato. In Icon. Plant. figura eius est pag 507. sub transposito titulo nēpe *Cruciata Menthæ*. Titulus autem verus est pagina 506. qui talis est. *Mentha* vulgata siue *Fusca* sacra, & *Mentha satiuæ* prima Dodonæi.

H. Lugd. pag. 671. *Mentha satiuæ* crispa, Dodon. prima. Obscurè de *Menthis* scribit Gerardus, ita ut nesciam an per *Mentham satiuam* rubram, hanc nostram crispam intelligat. Icon eius est *Calaminthæ montanæ* vulgaris primæ Tabern. quæ est *Calamintha* vulgaris magno flore.

C. Bauh. phyt. *Mentha* 2. siue crispa verticillata. Apud Matthiolum, *Mentha* tertia siue crispa verticillata, *Mentha cruciata* Lobel. in Obs. quoad iconem puta, non autem titulum.

Schvvenckf. *Mentha* crispa: *Mentha* vulgata seu fusca sacra Adu. *Mentha* 2. (legendum puto 1.) Dodonæi: *Mentha simplex* officin. *ἰνδίοικος* Dioscoridis: *Μύρτη* Græcorum: *Silymbrium* hortense, *Garten Münstz*, *Frauß Münstz* / *Frauser Balsam*.

Hæc à Cæsalpino ita traditur. *Mentha* hortensis quæ rotundo folio constat, odoratior est: *Mentham* Romanā vocant: germinat incipiente hieme: cauliculis humi repentibus, subrubris: foliis rotundis: quo tempore usque in Ver tenella germina odoratissima, & gustui suauia expetuntur in cibis cruda ex oleo & aceto: adueniente æstate caules eriguntur, foliis grandioribus circumferratis, odore non aded grato, sapore subamato, rotundis, crispis, & subnigris: flores summis ramulis fert spicatos, purpurascens, aut candicantes: radices summa tellure serpentes, tennes, Graminis modo, viuaces admodum; vnde copiose germinationes erumpunt.

Pucherrimam & suauissimi odoris *Mentham* verticillatam à me plantatam & florentem in horto Ill. E. C. mense Augusto ex Entzemia atruli, collectam in horto nobilissimi viri D. Jo. Henrici à Reinach Entzemiæ: hanc etiam vidi Argentinæ in horto D. Friderici Meier. Sturgardiz in horto Ill. E. Wirtemb. Augusto flores, omnibus ferè hortis nota.

Authore Schvvenckfeldio, tenuium est partium. Excalefacit & exiccat in fine secundi ordinis. Attenuat, digerit, resoluit, aperit, incidit, prouocat. Flatus & lumbricos pellit, vomitum compescit. Coliacis & Ventriculi vterque doloribus à flatu prouenientibus compescit.

MENTHA VERTICILLATA, MINOR.
acuta, non crispa, odore Ocymi.

Reliquis *Menthæ* speciebus conspicuum suauissimi odoris Ocymi saporisque Mellisæ discrimen hanc facile dispescit: siquidem radice multiplex reptatus illi cum aliis cōmunis est, perinde ut & caules quadrati, ramosi, hirsuti cubitales, folia autem primùm Ocymo medio similia, nonnihil hirsuta, quæ denique acutiora euadunt, ex geniculis aduersa: ex quorum alis flores verticillati dilutiore purpurâ tincti emergunt: minores, quam in *Mentha* aruensi.

Trag. in Hist. germ. & lat. lib. 1. ca. p. 4. hanc inter siluestres *Menthas* recenset, primamque facit: Figuram autem eandem habet cum ea quam exhibuit pro *Nepetæ* agresti, de qua loquimur sub *Mentha* aruensi verticillata.

Dodonæi

Mentha horti
sensu ro-
tundo folio
Cæsalp.

Locus &
tempus

Dodon. Gall. & Lat. in fol. *Mentha sativa* quarta, *Herbe du cœur*. Germ. *Herz fraut*, quasi *Cardiaca* & *Cardiaca* *Mérha*, Germ. nonnullis *Balsam fraut*, vt *Fuchsius* tradit, vocatur.



Acinon
Cor.
partu.

Ocy-
mastrum.

Tab. nov.

Schv-
venckfeld.

Locu &
Tempus.

Vitis

Gesnero hort. *Mentha* tertia minima, rubicunda, suavi admodum odore ad *Sisymbrium* & *Ocimum* accedens. In *Catal. pl.* *Sisymbrium* horrente vulgò *Balsamica*. *Cornarius* in *Diosc.* vocat *Acinon* qui secundum *Dioscoridem* & *Paulum* mentes sistat, iuxta *Plinium* verò cieat. Hunc officinas *Ocy-*

mastrum incognita ipsis *Acini* appellatione vocare scribit: *Alios* *Ocimum* silvestre. *Germanos* *Flanc* oder *vilde* *Basilien* / hoc est, *Basilicum* paruum vel silvestre.

Camer. in *histor. German.* *Matth. lib. 3.* *Mentha* alia species, species *Menthae Cardiacae*, vt vulgò vocatur. *Herz fraut*, aut *Herz münz*. Item hort. *Mentha Cardiac*: In *Epit. Mentha* altera, It. *Mentha minore* siue *Gentile*. Non existimo *Matthiolum* sua *Mentha 2.* hanc intellexisse, piqua monstrat spicatum non verticillatum.

Hist. Lugd. pag. 673. *Mentha sativa* quarta *Dodonæi*.

Tabernæ Icon. & Hist. Calamintha Ocymoides, *Basilien Münz*. *Compilator* non bene describit, existimo ipsum nesciuisse quid scriberet. *C. Bauhin. Phyt.* *Mentha* prima siue *hortensis* verticillata.

Schvvenckfeld. *Mentha* vulgarissima, *Mentha* vulgaris serpens rotundifolia. *Mentha* hortensis verticillata *Ocymi* odore. *Cruciata* *Mentha* *Lobel.* *Mentha* *Rubea*, *Balsam Münze* / *Rote Münz Balsam* vulgò. *Nos* non possumus intelligere *Schvvenckfeldium*, *Mentha* quæ est *Ocymi* odore non est rotundifolia, nec etià cruciata *Mentha* *Lobel.* is enim dicit spicatum: nescio cur nomina germanica *Herz balsam* & *Herz münze*, & *Cardiacæ*, alteri *Menthae* tribuat, ac contrà vocet hanc *Mentham* rubeam, & *Rote münze* & *Balsam münze*, cum hæc ita vocari non soleat.

Cæsalpino *Mentha* hortensis folio oblongo, candidiorique.

Mentham verticillatam minorem *ocymi* odore habeo in horto *Ill. E. Cartuli Basileæ* ex horto patris *Ioh. Bauh. medici*, quam primò colui in hortulo meo, *Genevæ* etiam in hortis observavi: *Mentha* autem hæc floret *Iulio* & *Augusto*.

Hanc ea omnia posse, quæ *Mentha* spicata folio longiore acuto, glabro, nigriore, præstet, infra dicitur ex *Matthiolo* *Camerarii*.

MENTHA ARVENSIS VERTICILLATA hirsuta.



Menthae arvensis nomen fecerunt natales, vt quæ *Descripti* arvis frequenter in nascatur, reptando se longius propagas, *can-* libus quadratis, albâ lanugine villosis, ramosis: *folia* aduersa, *Cl. nepodii* *Matthioli*, per ambitum linter serrata, lanugi. *folia*, odore grato *Calaminthæ*, sapore acrisimo

non insuavi: flores verticillati, *Menthae* *Sisymbriæ*, minores, dilutius rubentes & in albidum propemodum pallescences: radix repens admodum.

Apud *Brunfelsium* in *Herb. Germ. ex Hieron. Brunsch.* *Menthastrum* dicitur.

Tragus lib. 1. cap. 4. vocat *Nepetam* agrestem, *Aster Nept*, *Nepetam* quartam: atque quosdam velle *Pulegium* silvestre, *wild Poley*: sed horum errorem esse manifestum. Huius eiusdè figuram reperit capite 6. hoc titulo: *Mentha aquatica* exigua, *Flain bach Münz* / quam *Pulegium* silvestre *Dioscoridis* esse statuit. Ne autem lectores decipiantur, fatemur nos non intelligere *Tragum*, nec novisse discriminè, nec scire cur duas similes figuras exhibuerit.

Dodon. gall. *Calaminthæ* alterum genus (sic & *Fuchsius*, qui hoc genere solo pro *Calamentho* officinas vt scribit.) facit, ac *gall. Poulter* [*Pulege Fuchsi*] *sennage*; *græcè* *γλήχων ἄγριος*; *Lat.* *Pulegium* silvestre & *Nepetâ*, *Germ. forn münz* / *wild Poley* / *Belg. wilde Delage* & *Veld münz* appellat.

Nepeta altera, *Latinis* particulariter *Nepeta* dicta, inquit *Lonicerus*, *Pharmacopœi* videntur, vocantque *Pulegium* silvestre.

Amatus [qui *Calamintham* tertiam facit ac *Calamentum* *pharmacopolarum* vocat] huius plantæ nomen cum *Calaminthæ* nominibus miscet.

H. Lugd. duas icones vnius plantæ proponit *hist. pl. pro diuersis plantis*, pag. sc. 906. & 907. titulis *Calaminthæ aquaticæ* *Matthioli*, & *Nepetæ 4. Tragi*.

C. Bauhin. Phyt. pag. 432. *Calamintha 6.* siue *arvensis* verticillata hirsuta, *Brunfels. in 4. pag. 210.* *Menthastrum*. Sunt qui *πυλινθιον* *Dioscoridis* esse velint. Apud *Matthiolum* *Calamintha aquatica* *Matthiolo*. *Tabern. Icon & Hist. Calamintha arvensis*.

Mentham *arvensis* verticillatam & hirsutam habeo à me plantatam in horto *Illustr. C. W. reptatu* suo odiosam, alioqui passim in agris provenit.

Locu &
Tempus

MENTHA SPICATA ROTVN-
difolia crispa.
CAP. II.

Descriptio

Facie Rotundifolię crispe spicate, qualis verticillatę, radices reptantes se propagantes: caules quadrati, hirsuti, infima parte subrubetes: folia è geniculis aduersa, crispa, rugosa, vix hirsuta, serrata, ad Verticillatam odore & sapore accedentia: at florum positus multum diuersus, licet singularium flosculorum non aliud sit vultus aut color: siquidem in spicas viciales & sextantales digesti sunt.

Plantam à nobis hic delineatam vocat Tragus lib.1. cap.9. Mentham satiuam seu crispam. Dodon. gall. Mentham satiuam secundam: Gall. *Baume crispu*: Germ. *Brausmuntz*, & *frausßbalsam*/ Belgis *fenismunte*, & quibuldā *heylyche*. lat. in fol. Mentham alteram hortensem quam alius satiuam dicit. Germ. autē *frausmuntz*, id est, ut ait, Mentham cruciatam, Bohemis *Mata*. sed Germanicę *frausß* significat crispam, non cruciatam.

Lonicero dicitur die *andere zam Muntz*/ Mentha crispa. Gesn. hort. Mentha altera nobilior, rotundioribus & rugosis seu crispis foliis: Silymbrium hortense Matthiolo.

Dodon. nor.



An Matthiolo in Dioscoridem Mentha simpliciter, Mentha Crispioribus foliis, Mentha crispa Cordi in vinguento Martiato. In histor. germ. Gerthen munge aut deyment. Mētha prima, gręcis *ndēoquss*?

Fuchf. histor.

Mentha sativa secunda, *frausßbalsam*. Iconum Mentha sativa altera. Lobelio Adu. p.218. Mentha altera, *Cruemuntz* siue *Cruciata* Mentha dicitur, flore spicato. Obs. pag.27. Mentha rotundifolia altera flore spicato, siue cruciata Mentha, Mentha secunda Dodonęi. In Icon. Plant. pag.506. titulo inuerso pro Mentha vulgaris posita icon. Que Lobel. scribit de Silymbrio folio 272. ita dubia videntur, vt nesciam an huc referenda figura: sanē quam ibi ponit posset non minus conuenire Menthe crispe spicate quam ea quam iam posuit, potest item exprimere meo iudicio Mentastrum rugosum satiuum: lectores rem perpendant.

Lobel. nor.

An Amato *ndēo quss*, Mentha vbique nota quę semper in hortis reperitur, Hortulana ab Hispanis nonnullis appellata?

Monachis in Melueu dist.6. cens.178. Mentha altera rotundioribus foliis, quam feminam cognominant.

Luminari maiori Mentha domestica quę proprie hortulana, & Mentha communis vel odo-

rifera.

H. Lugd. p.672. Mentha altera sativa.

C. Bauh. phyt. Mentha 3. siue rotundifolia crispa, spicata prima: Trago crispa: Lobelio rotundifolia altera siue spicata. Item apud Matth. in Diosc. lib.3. c.35. Secunda Mentha altera Matth. Mentha sativa 2. Lacun. Mentha minor Castori. Quam iconem & quam plantam proponat Frater pro Mentha altera me later, eius icon videtur facta ad imitationem Menthe Dodon. alterius, siue Lobelii Menthe rotundifolię alterius, melior tamen illorum: cur non annotarit se eam intelligere, si intellexit, miror: Si Mentham aliis indictam intelligit, cur icon eius ita accedit ad iam dictam?

C.B. nor.


Mentha rotundifolia crispa, flore spicato nostra opera nunc Montbelgardi in Horto Ill. E.C. abundat, florens Augusto & Septembri. Vidi etiam Basileę & Colmarie in hortis.

Locus. & tempus.

Ad dolores capiti sæpē recurrentes Wirtembergicus in adfacit lintea, triplicata aut quadruplicata, in aqua Menthe crispe, vtrique temporis ea applicans. Mentham spicatam commendat Hortius ad dysenteriam petilentialem.

Viret.

MENTASTRVM SPICATVM CVLTVM,
folio rotundiore, rugoso.



IN hortis colitur, odioso reptatu tandem hortulanis parum gratum. Caulibus pluribus quam Menthe crispe spicate, nigrioribus, hirsutis & mollioribus quam Menthe Crispe verticillatę: flores spicatum digesti, minimi, albi, odor gratus. Nostra icon est exemplis iconibus.

Descriptio

An Matth. in Diosc. Silymbrium hortense? Et in hist. Germ. *Frauserbalsam*/ Silymbrium domesticum? An Anguill. epist.7. Silymbrium primum? An Camer. apud. Matth. & Epit. Silymbrium domesticum, Balsamita, *Frauser Balsam*. Mentha crispa siue Balsamina?

Lob. obs. pag.272. Silymbria Mentha agrestis [ita quoque inscribitur in Icon. Plant. p.503.] sativa cruciata Menthe congener aut eadem. Italis etiam Balsamita seu Mentha Crispa, Silymbriū satiuū Matthioli. Figura à Lobelio posita non malè exprimit nostrum Mentastrum folio crispo: verum non parum differt à Mentha sativa cruciata, folia multo hirsutiora & molliora.

An Lacunę in Diosc. lib.2. cap.117. Silymbriū hortense, Barbaris Balsamita, aut Mentha Romana, Silymbrium primum, Gręcē *ἰπιδάριον* Lat. *Serpillum silvestre*, Arab. *Sisnabar*. Castel. *yerna buena aquatica*. Gall. *Mente aquatique*. Lacunahaber figuram Matth. an verbō intelligat hoc Mentastrum rugosum, vel Mentham crispam spica-

spicatam asserere non ausim, viderint alii.

Hist. Lugd. pag. 677. Silymbrium hortense, cuius Theophrastus mentionem fecit, quod Matthiolus & periti Herbarii eam esse putant quam officinæ Balsamicam appellant, vulgus Mentham Romanam siue Crispam. Galli *Baultme crepu*: Nos non eandem plantam facimus Silymbrium hortense & Mentham crispam: Icon autem ex Matthiolo placet, & melius quàm Lobelii, ac etiam ea quæ à nobis proponitur.

Turnero parte 2. Mentastrium, Mentha siluestris, Græcis Hediosmos agrios, nobis *Borse mint*.

C. Bauh. Phyt. pag. 429. Mentha 4. rotundifolia, crispa, spiculata Matthiol. Silymbrium hortense. Lob. Silymbria Mentha agrestis. Apud Matthiol. Mentha rotund. crispa spicata Matth. Lacun. Cast. Lugd. Silymb. hort. Gesl. Mentha hortensis 2. siue crispa Lob. Silymb. Mentha agrestis.

Icon & Tempus.

Menthastrum hortense crispæ Menthæ spicatæ simile fasciciter mihi prouenit Montbelgardi in horro Ill. C. W. florens Iulio, quod vt Mentha crispa ferpit: ac idem etiam obseruavi Tubingæ apud Fuchium: vt & Stutgardia & Argentinae in hortis.

MENTASTRUM SPICATUM MINVS.

CAP. III.

L. Ob. Obs. pag. 273. Mentastrium minus Spicatum, odoratum, mitius, minusque graue, folio Heliotropii tricoeci. H. Lugd. p. 674. Mentastrium minus spicatum folio Heliotropii tricoeci. Pro hoc Mentastro H. Lugd. ponit Iconem Lobelii positam pro Calamintha 3. Dioscoridis Mentastri folia aquatica hirsuta. Considerandum proponimus an Lobelii Mentastrium sit nostrum Mentastrium spicatum folio rotundiore rugoso, de quo ante.

C. Bauh.


C. Bauhin. in Animaduers. in hist. Lugd. pag. 33. Mentastrium minus spicatum Lobelii. Perfecit hoc loco [pag. 674.] Descriptio non ponitur: reperitur Descriptio pag. 90. sub Mentastri folia aquatica hirsuta Penz & Lob. sed sine iconem. Hæc frater. Perfecit descriptionem qualem Lob. concinnauit posuit H. Lugd. Sed iconem non bene adaptauit quæ alterius plantæ.

MENTHASTRUM SPICATUM, FOLIO crispo rotundiore, colore partim albo, partim cinereo, vel virente.

Descriptio

Perinde vt huius generi aliarum, radix Menthastrum, quo de Sermo nobis est, reptat: caules quadrati, hirsuti, subrubentes, folia aduersa, subrotunda, serrata, tomentosa colorum varietate in eadem planta mirè ludentia, modò tota candida: modò ex albo in herbidum languentia, aliàs dimidia parte alba, alterà viridi, aliàs vtròque hoc colore variè maculosa, odore minus graui quàm vulgare Menthastrum, sapore satius crispæ, acri, non ingrato: flores spicati albicant odore suauis, non vehemente.

Lobel. in Aduers. pag. 219. Menthastrum cinereum & niueum in Anglia cultum. Obs. p. 173. & Icon. Plant. p. 510. Menthastrum niueum Anglicum. Dodon. Lat. in fol. pag. 96. Menthæ siluestris species quædam foliis subinde partim virentibus, partim niueis. H. Lugd. pag. 674. Men-



& Diacymini, hinc, utpote gratiorem, nec minus efficacem, præstaret indere.

MENTHASTRUM FOLIO RVGOSO rotundiore spontaneum, flore spicato, odore graui.



Cordus sic Descriptio
Menthastrum
caules erigit cubitales, quadrangulares & hirsutos: folia ex intervallo in contrariis lateribus, alternò ordine & cruciformi posita proferentem, longitud. bellis, latitudine autem vnciam quarta aut tertia parte excedentia, rugosa, atque lanuginosa pube obdusa: ramulos

supra medium plerumque caulis è foliorum sinu producit, vere & æstate numerosis vndiq; floribus in candido rubentibus & hiantibus; Denticulatis calicibus insidentibus, & posito quâdam spicæ imaginem referentibus circumdatis: quibus exiguum nigrumque semen succedit: radice nititur multis capillamentis fibrata, laterales viticulas propagationis causa in terra spargente & perenni. Saporem habet amarum, acrem & adstringentem, odorem verò grauem & acrem, satius Mentha multò iniucundior. Hæc Cordus in Hist. (vbi Mentastrium vocat, & in Dioscor. mentham agrestem cognominat, quam G. Pferdæ mûnz exponit) cui figura ex Trago appositæ, quæ mihi non placet quia mala & præterea nò huius plantæ videtur. Nemo autem, quod sciam, Menthastrum folio rotundiore melius Cordo describit, quæ occasio vt eius descriptionem hinc assumperimus.

An Anguillara epist. 7. Silymbrium & Sesembro sponte proueniens in Italia.

Monachi in Mesuem dist. 1. cens. 25. vocant Mentalstrum verum, folia habens rotundiora.

Tab. 101.

Tabern. Icon. & Hist. Mentalstrum, Wilden Balsam/ Wilde münz & Rosmünz nominat. Verum compiler Tabern. nihil distincte de hac planta scribit. Gerard. Angl. sub Mentha aquatica Valde mint iconem Mentalstri dicti Tabern. proponit, verum de hac etiam indistincte scribit. Casp. Bauh. phyt. Mentha 7. siue sylu. rotundiore folio dicitur, & Cordi Mentalstrum.

Camer. 101.

Schuyvenck. Menta siluestris 1. *indistincte* Diosc. Mentha caballina folio rotundiore, Mentalstru Tragi. Mentha alba officin. Wilde münz/ wilder Balsam/ Rosmünz. Sapore est amaro acri & adstringente. *Ast non placet dici albam* & Mentham officin.

Locus & tempus.

Mentalstrum folio rugoso flore spicato sponte passim prouenit Montbelgardi, vt eundo ad Molendinum & Domum leproforum. Hoc etiam Mentalstrum folio rugoso rotundiore, ni fallor multum obseruari Basileæ propè Sanctum Iacobum ad flumen Mense octobri. Geneuæ passim *au plein palais*. Montpelii secundum aquas. Mentalstrum Cordi nascitur secus gelidos riuulos, solo pingui, interimque saxoso: arenoso autem nunquam.

MENTHA SPICATA, FOLIO LONGIORE acuto, glabro, nigriori.

Non secus ac alia Mentha, *radicum* longo reptatu, libinde fibris demissis se promouet, caulis bicubitalibus, subrubentibus, quadratis: ex quorum nodis per certa intervalla gemini aduersi rami exeunt, ita vt inferioris semper cum superiori cruciformis sit positus: qualis & foliorum est alternatio, tam in caulibus quam in ramis: sunt ea verò oblonga, acuta, attrourentia, minimè hirsuta, per ambitum serrata: *florum* autem pusillorum exalbidorum punctulis rubetibus guttatorum verti-

Descriptio



Variorum lapsus.

cilli longiuscula serie spicam effigiant.

Brunfels. in herb. germ. & Hieron. Braunschweig. itemque Dorst. cuius icon non placet, Balsamita & Mentha Sarracenica, Germ. Balsammünz, aut Unser frauen Münz. Sed hi plures plantas confundere videntur, præsertim Dorst. qui & Silymbrium vocat.

Tragus 101.

Plantæ sanè à nobis descriptæ videretur Tragus lib. 1. cap. 5. duas habere figuras: vnam nomine Menthae rubæ siue Silymbri: Rote münz, alteram [quod tamen lectoribus diiudicandum re-

linquimus] titulo Nepetæ aquaticæ. *Spizet Balsam: Spizmünz*: Calaminthæ alterius de qua Diosc. lib. 3. locutus sit. Puto autem figuram sub Menthae rubæ vel rote münz malè positam, ac non loqui de Mentha, cuius ibi figura: Obscure meo iudicio de Menthis scriptis Tragus.

Trag. 101.

Dodon. Gall. dicitur Mentha sativa tertia, Mentha Sarracenica, & Mentha Romana: Gall. *Menthe de nostre Dame & Menthe Romaine*. Germ. Balsam münz/ unser frauen Münz/ Spizet balsam. Belg. Roomsche munte & Balsam munte. Lat in fol. Salvia Romana, Mentha tertia aut Herba S. Mariæ.

H. Lugd. pag. 671. Mentha sativa Matthioli 1. Dod. 1.

C. Bauh. phyt. Mentha 5. siue angustifolia spicata: Brunfels. in 4. pag. 200. Mentha secunda angustissimo longissimoque folio in horto Montbelgardo visa. Apud Matthiolum, Mentha Matthioli. Mentha hortensis prima Gesn. Sativa 3. Fuchs. Dod. Menta Romana officinarum angustifolia Lob. hortensis oblongo folio Casalp. Sativa Cast. Lugd. odorata angustifolia Cam. acuta Tab. Frater proponit iconem Tabernæ: Verum an Matthiolum eam intellexerit dubito.

Monachi in Mesuem dist. 1. cens. 6. de hac fortè loquuntur cum dicunt: Multi pro Mentha Florentina, intelligunt Mentham communem, id est, Hortulanam. Item dist. 6. cens. 78. Mentha communis & vltior. Mentha hortulana quam Græci Hediosium satium cognominant longioribus foliis quæ à nonnullis masculina vocatur. Mentham melius putamus scribi cum aspiratione quamuis communiter scribatur sine ea. Item Mentha dicitur Arabicè *Nahabana* vel *Nahanna* &c.

Coldenberg. apud Cordum in Disp. supra Marc. Nicol. Mentham Sarracenicam, vocatam quoque Romanam, quam in suis de Scirpium libris imagine & scripto depinxerit Dodonæus, hoc loco intelligendam ait, quicquid Fuchsius ex suo corruptissimo Nicolao in medium proferat. Dicitur autem Fuchsio hist. cap. 4. Mentha sativa tertia, siue Romana, vel Sarracenica. Lobel. in Aduers. pag. 218. Mentha Romana officinarum siue præstantior angustifolia (ita etiam inscribitur in Icon. Plant. pag. 507. Germ. Spizmünz/ spicata, cuius disseccatas duas assignat. Quia autem folia albiora, hirsutiora habeat, & efficacior, inde Romanam & Balsaminam appellat. Obser. p. 271. Mentha Romana officinarum præstantior. Mentha prima Matthiolo. Quædam in Lobelii descriptione conueniunt, quædam non respondent, sc. albedo: hirsuties: Icon verò eius optimè placet: is fortè à glabra non distinguit hirsutam.

Matth. ponit duas figuras penè similes Menthae, quas spicatas facit, & folio longo acuto: non autem indicat qua in se differant, nec meo iudicio ritè describit: neutra enim figura responderet descriptioni primæ Menthae quam in Histor. Germ. ait folio rotundo, molli & rugoso nqnihil: Secunda icon fortè Menthae spicatae folio longo acuto, descriptio tamen non in omnibus conuenit: Sanè existimo nullam Mentham ritè cognitam fuisse Matthiolo.

Matth. 101.

Camer. apud Matth. germ. lib. 1. cap. 34. Mentha acuta Spizmünz: An eidem hort. pag. 100. Mentha odorata angustifolia? In Epit. Mentha: Græcis *ἡδύσμη*: Arabibus, *Nahabana*: Germ. Münz:

Müntz: Hisp. *Hierra buena*; & *Ortolana*: Gal-
lis *Menthe*.

De *Mentha* spicata folio acuto hæc inter alia
prodidit Turnerus parte 2. fol. 83. Dioscorides
Mentham non describit; & satius vnicum dun-
taxat facit genus. Quare cum satius *Menthe* ho-
die plura sint genera, difficile est statuere, quæ
sit Dioscoridea. Fuchsius quatuor facit *Menthe*
satius genera, eaque accuratè describit. Mat-
thiolus tria, quæ ieiunè & leuiter describit &c.

Tabern. Hist. & Ic. *Mentha acuta*, *Spitzmüntz*,
non benè describit, nec ab aliis distinguit.

Gerard. Angl. *Mentha cruciata*. Icon est Ta-
bernamentani non conueniens cum *Mentha* cri-
spa quam cruciatam vocat: verum nihil distinctè
scribit de *Menthis*, & confusè ponit figuras.

Schvvenck. *Mentha Cardiaca*, *Mentha an-
gustifolia* Lobel. *Mentha* 2. Matth. *Mentha
acuta* Tab. Bergbalsam/ *Bergmüntz*, *Spitz-
müntz*. Minus vulgata ac prior.

Gesl. *Mentha hortensis* prima communis &
maior. Lonic. *Mentha acuminata* & *Mentha
Romana*.

Locus & Tempus *Mentha* spicata folio acuto, non crispa, nigri-
or abundat Montbelgardi in hortis, nec non Pa-
rauii, Genevæ & Balileæ, ubi in hortis etiam ob-
seruauit.

Vires Gustu est acris, calidaque facultate prædita, ex
tertio quadantenus excafacientium ordine, sed
minus excafacit quam *Calamyntha*. Habet &
in se quiddam amarum, & acerbum, substantia
est tenuium partium. Adstringit quoque ac sic-
cat, Dioscoridi. Succus ex aceto porus sangui-
nem sistit: teretes ventris tineas necat: Vene-
rem stimulat. Terri rami cum acidi mali pu-
nici succo poti singultus, vomitiones, choleraq;
sedant: Folia cum farina hordacea illita, suppu-
rationes discutiunt. Mammæ item tenfas, aut
lacte turgentis compescit. Cum sale canum mor-
sibus illinitur: vuluæ ante coctum admota, con-
ceptum impedit. Lac coire non patitur in ventri-
culo, si folia lacti immergantur. In summa sto-
macho vtilis est, & in condimentis peculiarem
gratiam habet. Aqua stillatica è tota *Menthe*
placæ puerperarum mammis cum linteolis ad-
mota lactis concretionem inhibet, animum ol-
factu excitat, vlcera manantia infantium capiti-
bus mirè sanat. Matth. in Epit. Camer. Turn.
Odor *Menthe* cerebrum roborat; memoriam
conseruat & auget, lacti indita coagulari ipsum
nō sinit, hæmorrhoidas sistit. Colicis cruciatibus
confert cum gigartis mali Punici.

MENTHASTRUM SPICATUM FOLIO longiore candicante.

Descriptio *E*A *Menthe* agrestis species quam hic tradi-
mus duos cubitos alta est, aliquando proce-
rior: radicibus geniculatis reptantibus fibratis:
caules item quadrati sunt toti hirsuti: quorum
geniculis apposita folia oblonga, acuminata; per
ambitum serrata; molli lanugine canescentia,
magis tamen infernâ quam supernâ parte; odore
satis grato, minus multo vehementi quam *Men-
the* satius spicata verticillatæ, sapore item simi-
lis sed remissiore: flores ex rubore in album pal-
lescent. Icon quam proponimus à nobis empta
cum aliis non vndique placet.

An Cordo in Dioscoridem *Menthastrum*, a-
grestis *Mentha*, Pferd Müntz.

Tom. III

Schvvenck. *Mentha silu.* 2. *Mentha equina*
acutioribus foliis, *Menthastrum* Lobel. *Mentha*



strifolia aqua-
tica, hirsuta
Mentha wilde
trauß Müntz/
Spitzige Ros-
müntz, rische
müntz.

Camer. a-
pud Matthiol.
Germ. *Mentha-
strum Wildes
müntze* aut
Rosmüntze.
In Epit. *Men-
thastrum* siue
*Mentha silue-
stris*, Græcis
ῥόδανθος
Ital. *Mentha-
stra*, German.
wilde müntz.
Gall. *Menthe
chevaline*. Nul-

lam provinciam, inquit Clus. in post. histot. adire
memini, in qua non conspexi. n. *Menthastrum*, si-
ue sylu. *Mentham* sponte secundum aquas & ri-
guis locis nascentem.

Fuch. hist. cap. iii. *Mentha silvestris* *Mentha-
strum* vocatum & vulgò *Equina Mentha*. Ic.
Menthastrum. *Mentha silu.* Matthiolo quam
Hetrusci retinentes Latinum nomen vulgò *Mē-
thastro* appellant. German. *Wilde Müntz* aut
Rosmüntz.

Trag. German. & Lat. *Mentha altera silue-
stris*, (die andere wilde Müntz, verum *Bach-
müntz*) propriè dictum *Menthastrum*, *Mentha*
campetris Dioscoridis & Apuleii.

Dod. Gall. *Menthastrum*, *Menthe chevaline*,
Mentha prima silvestris, ῥόδανθος Diosc.
latine *Menthastrum* Plinio, *Menthe sauvage* Gall.
*Barzenbalsam/Rosmüntz/wilderbalsam/wilde
müntz* vide *Polemonium Absyrthi*. Lat. in
fol. pag. 96. *Mentha* 5. Dioscor. ῥόδανθος & 2.
Mentha silu. lat. *Menthastrum* Plinio auctor.
Offic. alba Mentha. Germ. wilde müntz. Italis
Mentha siluatica, Hisp. *Mentastro*. Angl. *Boorse
mint*, Bohem. *Plana Mäsa*.

Lobel. in aduers. Obs. & Icon. *Menthastrum*
Gall. *Menthe sauvage*: Anglice *Boorse & wilde
Mintre*.

Lonic. hist. lib. 5. cap. 101. die wilde müntz/roß-
müntz aut wild Balsam.

Gesl. hort. *Mentha silvestris*, *Menthastrum*
uocata. Lacunq ῥόδανθος & 2. *Menthastrum*,
Castiliensibus *Mastrantes*, Cat. *Mentastro*, Por-
tug. *Mestrantes*.

An Monachis in Mesuem dist. 6. cens. 25. *Cal-
amentum fluuiiale* siue *aquaticum*, *Menthastrum*
species.

C. Bauh. Phyt. *Mentha* 8. siue silu. longiore fo-
lio: varijs foliis longioribus & nigrioribus, mi-
nusque incanis.

Menthastrum folio longiore, candicante, flore
spicato abundat circa urbem Montbelgardi iux-
ta riuos. Existimo me etiam Genevæ vidisse: vi-
di etiam Lutetiæ in orto D. Robini hortulani
regii. *Menthastrum* Matthioli in Epit. Camerari-
i nasci scribitur plerunque vliginoso solo &
prope riuos aquarum.

X

Vires

Excalfacit auctore Matthiolo, attenuat, adstringit, incidit & aperit. Suditi vapor feminas à partu purgat: datur eius decoctum vtiliter anhelosis & ægrè spirantibus, quin etiam mulcendis torminibus qui à flatu oriuntur. Substratum vel accensum serpentes fugat. Instillatur succus vermiculosis auribus. Item tum porus tum testibus illitus, nocturnas pollutiones prohibet. Auxiliatur porus regio morbo affectis: stumosos illitus iuuat: ex aceto porus ventris animalia pelit: folia tam pota quam illita, præstant aduersus venenolorum ictus.

MENTASTRI AQUATICI GENVS
hirsutum spica latiore.

CAP IV.

Descriptio

Quadratos præmit caules, duum vel trium cubitorum altitudine, hirsutos: folia Menthae spicata: folio acuto, vel Mentastri albi, oblonga, serrata, lanugine multa subeius canescentia, minus tamen quam Mentastri vulgaris rotundiore folio, vel candidi, sapore insigniter acri feruidoque, odore ferè Sisymbrii: siue Menthae aquatica rubra, caulium scapus trifariam partitur, toridemque gerit velut spicas latiusculas (non angustas ut in Menthis & Mentastris spicatis) non multò viciâ longiores, in quibus flores subpurpurei, quinque partiti, ex calycibus hirsutis, striatis, rubentibus, in apices quinque filis: radice est reptrice.



An Lob. in Adu. & Obs. & Icon. pl. Mentastri folia aquatica, hirsuta, Calamintha tertia Dioscoridis? &c.

C. Bauh. phyt. pag. 431. Menta 12. siue palustris oblongiore folio.

H. Lugdun. bot.

H. Lugd. pag. 674. Mentastrum minus spicatum Lobelii. Item pag. 906. Pena & Lob. Mentastrifolia aquaticam hirsutam Calamintham tertiam Dioscorid. esse censent &c. Quidam silu. Sisymbrium Diosc. esse putant. Hanc videtur Tragus nomine Nepetæ quartæ agrestis depinxisse. Primo loco H. Lugd. non bene posuit iconem sub titulo Mentastri, cum ponenda fuisset secundo loco pro Mentastrifolia: quæ cum Lobelio dicatur spicatos habere flores non potest esse Nepetæ agrestis Tragi 4. cui flores verticillati.

Locus & tempus.

Reperi duobus miliaribus à Montbelgardo in Ioncercy pago ad ripam fluminis, florebat autem principio Septembris:

SISYMBRIUM ANTIQVIS ET
in genere.

CAP. V.

Sisymbrio, inquit Theophr. 4. caus. 7. nocet cultus. Id enim quasi effeminatur, & amisso sui odoris acore, transit in Mentham: quippe alimentum, neglectusque causa, sylvestris habitus prouenit: & 2. de Causs. c. 22. Sisymbrium si transit in Mentham, odorem tantum Menthae recipit, proprio amisso, quia cultura caruerit: Speciem verò non recipit, sed quasi Nepetæ redditur simile. Omnia namque in simile sibi quicquam mutantur, non in remotum penitus transeunt. Cultus autem & translatio naturam propriam retinet, atque seruat.

Sisymbrium (quod referente Diosc. lib. 21. alii Serpillum siluestre [ἑρπυλλον, ἄχρον, ἀχρίαν Ald. μέγα Orib.] vocant.) in solo inculto nascitur, Menthae hortensis similitudine, sed latioribus foliis atque odoratis (ἰσχυρότερον, ἰσχυρὸν Orib. quod quidem in coronas recipitur. Calefaciendi vires habet: ac Semen quidè cum vino [σύν οἶνῳ & ver. omittit] potum ad vrinae stillicidia calculos commodum est: & tormina ac singultus sedat. Folia verò contra capitis dolorem fronti ac temporibus imponuntur. Item ad vesparum & apium ictus. Ceterum vomitiones quoque potu cohibent. Quidam autem vetusti codices caput hoc Diosc. de Sisymbrio in libro tertio locant. Alii prorsus excludunt, & cap. de Sisymbrio altero tantum retinent cum titulo simplici ἡ σισυμβρία de Sisymbrio. De Sisymbrio autem altero Cardamine dicto egimus H. n. g. lib. 21.

Galenus prius hoc Sisymbrium in vsu medico tenuium partium, discutientem, calefacientem, ac siccantem tertio ordine vim habere, ac temperamentum tradit. Semen eius item tenuium partium & calidum esse. Vnde cum vino quosdam exhibere ipsum singultientibus & his qui tormina sentiunt.

Latissimum nasci tradit Plinius Sisymbrium in puteorum parietibus, & circa piscinas ac stagna. Quod in riguis nascitur, simile Nasturtio est (gustu Diosc.) utrumque (prius Dioscor.) efficax aduersus aculeata animalia, ut crabrones & similia. Quod in sicco ortum odoratum est, & inferitur coronis angustiore folio. Sedant utraque [prius Diosc.] capitis dolorem. Item epiphoras. Sanat & Epinyctidas, cutisque vitia in facie mulierum. Vomitiones, singultus, tormina, stomachi dissolutiones cohibet, siue in cibo sumptum, siue succo potum. Non edendum grauidis, nisi mortuo conceptu. Quippe etiam impositum eiicit. Mouet vrinam cum vino potum, siluestre & calculos. Quos vigilare opus sit, excitat infusum capiti cum aceto. Diximus lib. 21. Plinium hoc Sisymbrium cum altero Dioscoridis, Cardamine vocato, siue Nasturtio aquatico confundere.

Non cessat natura, inquit Cornar. quotidianis & in omni sui parte in peius mutationibus quam grauis & facilis negligentia iactura sit homines inonere: & quod poeta cecinit degenerare omnia & in viriura ruere ni vis humana quotannis institerit: honoremque & bonitatem suam rerum semina & genera seruare coegerit: ut contraria ratione disceremus nihil tam asperum, rude, difficileque & incultum esse quod non labore

& ope.

& opere humano meliorescat & assidua cultura ad honestiorem suavioremque usum mitescat: in quo non minus facilem sequacemque homini quam ad vitium natura se præbuit. Multa sunt ad utramque partem naturæ mutationis exempla, sed longè plura in peius degenerantis. Facile enim & lubricum ad vitium iter est: degeneratque Triticum in Lolium; Populus alba in nigram: Ocimum in Serpillum: dulcia in amara, & sativa in silvestria. Habentque omnia quæ id patiuntur mutationis suæ diuersas causas: Sisymbrium tamen ut odore in Mentham, figurâ in Nepetam degeneret, præcipuam à culturæ negligentia: nisi enim assidua cultura coëreatur, & translatione novos veluti natales quotannis accipiat, in eas quas dicimus plantas quamprimum diuersa sui parte degenerat. Testantur id rei rusticæ, & plantarum historiam tradentes, scriptores omnes. Theophrastusque præsertim &c. Quibus ostendit Cornarius prius Sisymbrium esse illud quod officinæ Balsamitam vocant & Mentham rubram, hocque Sisymbrium, etiamsi silvestre sit, in Calamintham degenerare docere Plinium, Theophrastum verò modum quo id fiat. Alterum autem Sisymbrium esse id quod Sisymbrium Cardamine dicatur, de quo egimus H. n. g. l. 21.

Tamen, inquit Matth. porro prodiderit Dioscorides Sisymbrium in solo inculto nasci, Theophrastus tamen lib. 6. cap. 7. de plantarum historia, & lib. 5. cap. 8. de earum causis, sativum etiam Sisymbrium in hortis reperiri posteritatis memoriæ commendavit. Quod sanè eam herbam esse crediderim, quæ hodie in omnibus ferè hortis provenit, quæ nostrates officinæ Balsamitam, vulgus verò Mentham Romanam, vel crispam appellat.

Sisymbrium tandem dici putat Varro à Sisymbrio, quæ fuit veteribus comediis metetricula. Coronam etiam Veneris nonnulli dixerunt, vel quodd ob odoris suavitatem quam præ se fert eo iuuentus quæ amoribus gaudet, coronata, in comestationibus suis blando odoris oblectamento suas illecebras commendaret: Vel potius quodd Sisymbrii caulis articulatum per internodia verticillato florum ambitu concinnè coronetur.

Asquiuoca Cæterum, Sisymbrium urbanum apud Theophrastum, & Acinon apud Dioscoridem vnius esse stirpis nomina Guilandino aliquando annotavit Iacob Zuingerus.

Acinon Mentha aquatica siue Sisymbrium videtur esse illam Dioscoridis C. Bauh. & aliis quibusdam quod tamen aliqui negant.

Mentha aquatica Mentastri aquatici genus, esse dicunt aduersaria Sisymbrii speciem quandam Recentiorum. Ea vocant Mentastri foliam aquaticam hirsutam Calamintham Dioscoridis.

Mentha crispa Mentham Crispam esse Sisymbrium sativum Theophrasti credidit Matthioli. Is vocat Sisymbrium hortense & Domesticum.


Mentastri hirsuta Sisymbrium cuius meminit Plinius lib. 19. cap. 8. quidam existimarunt vulgate Mentastrum.

Barbarea Plinius ut attestatur Marantha lib. 1. cap. 8. Si & Sisymbrii aquatici facultates confundit.

Serpillum Barbarea vocatur Sisymbrium hibernum & Pseudobunion ab Harchio in Euchir. Sisymbrium aut Serpillum turpiter implicasse Arabes anchor est Apollo Radic. 1. Consec. ex Aloë ligno. Sisymbrio, Ocimum substituit Tractatus quid pro quo. Idem Sisymbrio florem Syriacum i. e. Maluam.

MENTHA AQUATICA SIVE SISYMBRIUM.

CAP. VI.



H Vmidioris solis amalia ex radice reperice, crebris fibris donata caules aliquot emergunt quadrati hirsuti, aut intus concaui, aut fungosa medulla facti multis alis concaui: folia ex articulis, Menthe crispæ verticillatè paria, minimè tamen crispa, quamquam perinde villa per am-

birum serrata, inque obusum micronem desinentia, odore vehementi Pulegii, colore ex nigro rubente. flores verticillati, dilutè purpurâ rubescunt quadrifidum calathum imitati, staminibus emicantibus exalbidis apices rubellos sustentibus.

An Tragus lib. 1. cap. 4. in Hist germ. Wilde fatzenfraut. Miror, aliàs diligentem, circa figuras & descriptionem Menthatum negligentior fuisse, nullam figuram habet quæ bene hanc plantam exprimat.

An Anguillara epist. 12. Calamintha tertia quam ait aliquos fumere pro Sisymbrii prima specie, & multum commendari in Nicandri Theriaca?

An Lonic. lib. 5. cap. 101. Alterum silvestris Menthe genus?

An Monachi in Mesuem dist. 1. Cens. 5. Hanc intelligunt, cum dicunt: Sisymbrium, alterum videlicet genus Menthe quam nonnulli Balsamitam, & Mentham aquaticam appellant, & alii (ut Braslausolus scribit) Mentham florentinam nominant. Verum etiam multi pro Mentha Florentina intelligunt Mentham communem, id est, hortulanam. Alii autem, teste Dioscoride, Hoc Sisymbrium vocant Serpillum, & herbam Veneriam vel Veneream. Arabicè autem dicitur Nemem seu Nemem, vel Nemen, quo nomine etiam & Serpillum vocant Arabes. Et hoc genus Sisymbrii dicitur terrestre: quoniam in terrenis & campis nascitur quamvis etiam iuxta riuos aquarum plurimum reperiatur. Vnde & Mentha aquatica nominatur. Et dicitur etiam terrestre seu campestre ad differentiam alterius Sisymbrii quod est aquaticum: quoniam semper in aquis oritur &c.

Menthe aquaticæ (quam Matth. in post. comm. in Diosc. pro Sisymbrio silvestri pingit) figura non placet: in Hist. quidem Germ. satis commodam habet: descriptionem autem non exactam.

De hac Sisymbria Mentha egisse crediderim Turn. part. 2. fol. 139. dicentem: Duo facit Dioscorides Sisymbrii genera, vnum terrestre, alterum aquaticum. Ex eadem colligere est Sisymbrium

Pulegio simile esse, aut tum folio, tum serpendi, ctescendique modo aut certe serpendi similitudine: nec non folia debere esse Menthae satius foliis maiora. Mentastri minora. Matth. posteriore editione Silymbrium ait germ. vocari Bachmüntz, wassermüntz: quod conuenire minime potest descriptioni Silymbrii hortensis, quam tradit. Quomodo enim Mentha aquatica (Wassermüntz aut Bachmüntz) fuerit Silymbrium hortense: Quomodo etiam Silymbrii recte dici hortense possit, cum Dioscorides incultis gaudere dicat, cum horti colantur. Dubito igitur an Matthiolo verum Silymbrium notum fuerit, nec ne. Ego Silymbrium opinor Menthae Balsamita [Angl. Balm mine] speciem esse. Siue autem in siluestribus crescat, siue in hortos transferatur, medix inter Mentastrium (Bouß mine) & Mentham hortensem (syne garden) minit magnitudinis est.

Apollin. &
Dorsth. nos.

Apollinaris lib. 2. fol. 115. nomine Bachmüntz/ videtur intelligere Silymbrium, quamuis figura nullius sit momenti. Theod. Dorsth. plures plantas confundens titulo Mentastri, ponit iconem Menthae aquaticae.

Planta à nobis exhibita dicitur Brunfels. in 4.º p. 200. sine iconem Mentha rubra. Eidem in fol. pag. 80. Tom. 2. Raps. 21. Mentha: Cordo in Diosc. lib. 2. cap. 155. Silymbrium primum, [& sic etiam Thallio] & Menthae species, nigricantem habens caulem: Eidem lib. 3. cap. 42. Mentha aquatica: Lumin. maiori Balsamita. Corn. in Diosc. Silymbrii primi species prima. Fuchs. Dod. gall. & lat. itemque Camer. hort. Silymbrium. Matthiolo & H. Lugd. itemque apud Matth. Camer. Silymbrium siluestre. Geln hort. Silymbrii agreste aquaticum. Lobel. in Aduers. p. 218. in Obseru. p. 272. in Icon. Plant. p. 509. Aquatica siue Silymbria Mentha rubro folio & flore nigra Menthae, Balsamine officinarum. Cels. 1p. Mentha siluestris prima & Silymbrium terrestre Dioscoridis & Theophrasti: Tabern. Calamintha aquatica.

C. Bauh. phyt. Mentha 11. (2. apud Matth.) siue rotundifolia palustris, in Diosc. varians foliis, aliquando maioribus, aliquando minoribus, aliquando tota rubens, aliquando magis [ut pictura ostendit] minusque hirsuta.

Schvuenckf. Mentha sylu. 3. Silymbrium Diosc. Mentha aquatica & Balsamine palustris.

Nomina
linguarum


Silymbium Graecis. Lat. Silymbrium, siue Mentha aquatica Ger. Wassermüntz/ Bachmüntz/ fischmüntz/ wild farzenkraut: Trago Rossmüntz: Dod. lat. wasserpoley & Rosspolei Silesis: Schvuenckf. Belgis watter münre/ Gall. Menhe aquatique. Dod. gall. Menhe sauvage. Dod. Lat. Italis Sifembro & Mentha Romana Matth. Italicorum Balsamita Lob. Hisp. Hierua buena de agua. Boh. plany Balsam. Silymbrium Hungar. Feste mentha, h. e. nigra Mentha, Arab. Sinasbarion seu Sinasbar: Damagerani Scimbron teste Constantino Imperatore.

Locus
&
tempus.

Mentha aquatica siue Silymbrium prouenit Möbelgardii passim secundum riuos, & in hortis E. C. à me plantatum. Tubingae cum essem Fuchsius praeceptor meus vocabat Silymbrium Recentiorum, ac dicebat potius reponendum inter Mentastria, Genue & Basileae etiam annotauit. Mentha syluestris 3. Schvuenckfeldii riguum ac humentium alumna est, secus aquas labentes & piscinas multa, Iulio florens, ac Vere reuolvens.

Ceterum, Silymbrium, Menthae syluestris species, inquit Dodonaeus, calidum ac succum facultate est, non minus quam Mentha: odore vero etiam vehementius. Commendatur ad eadem, ad quae Mentha, tum & ad apum & vesparum ictus. Vnus autem eius in medicina nullus est, non deficiente Mentha, quae suauior ac naturae humanae gravior apparet. Dodonaeo consentiens Schvuenckfeldius, Haec tradit: Tenuium est partium, digerentis, excalfacientis, exsiccantis temperatura. Mouet urinas & calculos pellit cum vino pota. Vomitiones, singultus, tormina, stomachi dissolutiones cohibet. Folia in capitis dolore fronti aut temporibus illinuntur, Item contra vesparum apumque ictus. Lentiginis & cutis à Sole nigritiem & asperitatem exterit illita: Aqua huius stillatitia, auctore Camerario, multum confect contra difficultatem spirandi & pulmonum infarctus & angustias. Antigonus in congerie mirabilium narrationum Aristotelem ait scripsisse ex putrefactis Silymbriis scorpiones nasci: quod de Ocimo alii memoriam prodiderunt. Nouit quendam Bruyerinus de recibaria (lib. 3. cap. 43.) non ignobilem, qui cum Silymbrio liberaliter vesceretur, genituram per somnos effunderet.

MENTHA AQUATICA SIVE Silymbrium hirsutius.



Non solum canles quadrati, & folia, sed etiam ipsi florum calyces densa lanugine pubescunt, adeo ut canescant: folia vncialia & fescucialia, subrotunda, per ambitum obiter serrata: e quorum sinu prodeuntes pediculi flores sustinent conglomeratos, vixquam spicatos. Hanc esse illam credimus,

quam Cordus in Diosc. lib. 2. cap. 155. vocat Silymbrium, fischmüntz/ Et Menthae speciem alteram facit hirsutioribus foliis. Balsamita à pharmacopolis nominatur. Confunditurque ab imperitis cum alia Silymbrii specie. Et haec est foliis rotundioribus quam Mentastri aquatici genus à nobis descriptum, fibræ etiam & pili colorque differunt.

An Tabernæ Calamintha aquatica, Calamentum aquaticum, wassermüntz/ wassernept: Caulem pingit hirsutiorum, nec bene describitur, neque distinguit à congeneribus.

Gerard. Angl. lib. 2. cap. 117. Silymbria Mentha werte toater munt. Imitatur Tabernam, cuius figuram habet. Et vulgarius omittit cum illo Silymbrium.

C. Bauh. apud Matth. iconem Tabernæ proponit pro Silymbrio silu. sed eam etiam sub Mentha aquatica.

Ante-

Antequam verò ad Mentham cattariam deueniamus, enumerabimus breuiter omnes plantas ab Aeluro, Cato, siue Fele denominatas earumque æquiuationes. Bupthalmum itaque Dioscorides Aeluron dici meminit. Aelurum alii Valerianam vulgò dictam vocant: Alii Buglossum: Alii Nepetam: Aeluri sanguinem, Stratioten aquaticum vocarunt Magi. Germani testium Sedi genus acrimonia insignis, minimum, floribus luteis, Farzentreibel, id est, vnam Catti nominant.

Menthastrum apud Germanos nomen à fele Farzenbalsam habet, quasi Balsamum felinum.

Sic quoque Lagopus trifolia à fele nomen Germ. Farzenflee, Cati trifolium traxit.

Sic quoque felis fumariz nomen, Germ. Katzenferfel, Cati Chæthephylon fecit. Sed & Hippuris à fele Germ. Farzenschibantz vel Farzenwidel, Cati cauda, vocatur.

Catus agrorum quod Germ. Feldfarzen vel Färze à fele dicitur, & Gnaphalium Fuchsi & Linpi Plinii multis.

Catulos à fele, Germ. Färze, Arborum quarundam, Salicum præcipue, flores molli lanugine pubescentes nominamus. Nec parum felis vrinam Ribes nigra redolet.

MENTHA CATTARIA.

CAP. VII.



Nepeta ex lignosa radice caulem surrigit bicubitalem & tricubitalem, quadratum, hirsutum, propter terram subrubentem, aliqui incanum, articulatum, multis alis concanum, illisque binis semper aduersis: quo etiam ordine, (licet non pari semper numero) folia ferè adgenicula emicant, grauius

odorata, Melissæ paria, in ambitu serrata, acuminata, cana lanugine pubescentia, sapore feruido. flores verticillari nodos ambiunt, Melissæ, exalbidii, labio raris punctis guttato: apices è rictu promicant, pulli, staminulis albicantibus insidentes. Icon nostra ex Fuchsi omnino displicet.

Ex hac descriptione liquet Marantham lib. 2. cap. 12. meritò Ruellium damnasse, eò quòd herbam Gattam vulgò dictam protertia Calaminthæ specie substituerit: quia licet foliorum cum menthastrum, cui illam Dioscorides comparat, similitudo tolerari possit: id tamen quòd addit longiora esse debere, in illa planta non adest, immò depressiora sunt. Idem lib. dicto 2. cap. 13. iuste negat Calamintham 2. non esse herbam Gattæ sed illud consideratione dignum cur herbam Gattæ dicat melissophallo similem.

Brunfelsio in herb. Germ. ex Hieronymo Brunsch. dicitur Mentha non odorifera. Cordo in

Dioscor. lib. 3. c. 43. Nepeta 3. fruticosa & procera: Notatque hic malè priuatim Nepetæ dici. Monachis dist. 1. cens. 25. Calamentum siluestre Meluc, eum etiam dist. 6. cens. 186. vbi hoc Calamentum secundo loco descriptum dicitur à Dioscoride. Gesn. hort. Calminthi species quorundam: Eidem in Catal. plant. Calamintha terria. Clus. Calamintha vulgò Cattaria vocata. Lobel. in Adu. pag. 219. (vbi etiam in Icon. Plant. pag. 511. & in Obs. pag. 276.) Cattaria siue Mentha Catti. In Obs. pag. 276. Mentha cattaria. Lonic. Mentha montana. Huius pictura non placet, & multò minus descriptio, non respondens figuræ & nomini Farzen muntz. Fuchsi Calaminthæ primum genus, & propter montes, quos amare dicit; Calamintha montana. Eius figura omnino displicet, ideòque aliam pingendam curauimus. Dod. gall. Calaminthæ 3. genus. Et Nepeta officinarum: Lat. in fol. Cattaria herba. Turn. part. 1. & Thal. in Harc. Calamintha 3. siue Nepeta. Camer. hort. Nepeta Germ. & Gattaria vulgi. Tabern. Icon. & Hist. mentha felina [Non bene describit nec bene distinguit:] itaque Gerardo. C. Bauhinus Phyt. Mentha 14. siue Cattaria. Apud Matthiol. Herba Gattaria. Hist. Lugdun. pag. 908. Herba felis Matthioli. Negat hist. esse Nepetam Antiquorum, aut aliam Calaminthæ speciem esse autem hortensem & agrestem; ambas tamen similes.

Matthiol. in prior. com. Herba Gatta dicitur: Ait is hallucinari Brassauolū existimantem Calamintham secundam Dioscoridis esse: neque etiam putandum eandem esse tertiam, vt crediderit Ruellius. In post. comment. ait errare Monachos dum censent herbam Gattam esse Calamintham 2. Aquiuocate eos, qui in Lombardia Neueda vocent.

Tragus vocat Nepetam, Nepetam 1. ac vulgarem, eius autem figura non placet.

Mentha cattaria dicitur offic. Nepeta, Græcis nonnullis *κατακάρη*, German. Stein oder Farzen muntz, Farzen Nept. Belgis Catren crust. Flandris Nepta, Gall. Calament & herbe au chat, It. Gattaria, Hispan. yerua Gattaria, Angl. Catnip mynte, Boh. focurniss. Nomencl. Pannon. qui Nepethæ genus facit, vocat cattariam, Matris seu, h. e. matricis herbam.

Antiquis fortè ignoratam hanc plebecula cattariam vocat, peramœni spectaculi argumento: vixdū enim conspectam vbi olfactorit catus, amplexatus & discauiatus fuerit, lasciuiendoque illi iam accedendo, iam recedendo sese vtrisque pedibus diu & multum affricuerit, colludendo tandem miris gestationibus vniuersam auidè ligurit, sed auidius si ea ex agris in hortos fuerit transmuta: tenerior namque tunc est, odorque non perinde vehementi, aliqui agrestis similis.

Nascitur aliàs circa margines hortorum, seculis aggeres, scrobes ac vias: humidum & vliginosum solum amat. Variis in locis obseruauit, ac habeo etiam Mörbelgardi ex Alsatia accersitam.

Strenua calefaciendi & attendendi dote prædita est, sed eximia prærogatiua ad conceptus facilitandos, prolificumque vterum reddendum, auctore Lobelio. Calefacit ac admodum siccit (inquit Matthiol. in hist. Germ.) attenuat, penetrat, promouet: habetque omnes facultates, quas Calamintha, cuius loco hæc usurpari potest. Idem in Epit. cum addit. Camerarii ait. Feruido quidem gustu herba est, cum amantitudine hand obscura, exalfacit & siccit Calaminthæ modo. Valet ad omnes capitis, pectoris, ventriculi, ac

Lonic. nō?

Fuch. nō?

Nomina linguarum

Locus & Tempus.

vteri morbos, à pituita genitos, mentes elicit tam pota quàm in deflectionibus addita. Herbar vsus steriles prolificas facit, vbi causa fuerit humida frigidaque intemperies: succus naribus inditus, pituitam valenter trahit, ac visum acuit: In summa, vbi excalefacere opus sit, Cattaria plurimum præstat: valet ad omnes [dixerat in prior. comm.] capitis, pectoris, ventriculi, & vteri morbos, à pituitosis extremitatis aut flatu genitos. Idèd diuturno capitis dolore affectis, vertiginosis, stupidis, resolutis, comitialibus, asthmaticis & suspiriosis auxiliatur. Item medetur ventriculi torminibus à flatu prouenientibus. Pleraque ex iis viribus illi etiam tribuit Dodon.

MENTHA CATTARIA HISPANICA
olim mihi Sideritis altissima flore
subæruleo & albo.

Descriptio



Multis re-
ctis assur-
git caulibus, qua-
dratis, canalicu-
latis, fígosa me-
dullâ farchis, sub-
inde inanibus,
glabris, cubitos
tres altis & ma-
ioribus, multis
alis concavis, in
ramos sibi oppo-
sitos diuisis: fo-
lia Mentastri vel
Nepetæ vulga-
ris, sed longiora,
pollice latiora,
glabra, superne
atro-virentia,
inferne ma-
gis candicantia,

rugosa, in ambitu serrata. odore graui, ad genicu-
la ex aduerso nascuntur: ex pediculis duobus flo-
res verticillis crebris, spicam quodammodò æ-
mulantur, colore carneo, intusque punctis satu-
ratè rubentibus guttati: semina bina aut terna
oblonga ruffa. Sapor foliorum ingratus. Sum-
mitates purpureascent.

An Lobel. obl. p. 276. & Icon. plant. p. 50. Men-
tha Cattaria peregrina latifolia?

An H. Lugd. p. 909. Mentha cattaria peregrina
latifolia Lob.: Tabern. icon. & Hist. Mentha
felina 2. fatiua latifolia. Breut blättricht 3am
Fagenment. Mutauit figuram Lobelii, non des-
cripsit, nec benè distinguit. Gerard. hist. Angl.
lib. 2. cap. 216. Mentha cattaria altera Great Cat-
meint. C. Bauh. phyt. Mentha 16. siue cattaria
latifolia.

Mentham Hispanicam quibusdam dictam a-
liquando quum nullum scireim nomen, denomi-
naui Sideritim altissimam quæ in horto Ill. E. C.
Montbelgardi multum durat, florens Iunio &
Iulio ad Septembrem vsque.

MENTHA CATTARIA HISPANICA
angustioribus foliis.

A Præcedenti duntaxat angustioribus mino-
ribusque foliis variat, vnde an separatum

sit genus à præcedenti asserere non ausim.

Lobel. Obl. pag. 276. & Icon. pl. pag. 512. Mentha
angustifolia, & Mécha cattaria peregrina angu-
stifolia: Tabern. Icon. & Hist. Mentha felina fa-
tiua angustifolia. Schmal 3am Steppenfraut.
Non describit, nec bene distinguit. Gerard. An-
gl. Salvia Romana, Mentha Sartacenica, Mentha
Romana, Herba S. Mariæ. Mentha angustifolia.
duarum plantarum nomina confundere mihi vi-



detur & præte-
rea iconè Ta-
berne propoli-
tâ pro Mentha
felina angu-
stifolia ponit
nomine Sal-
uie Romanæ.
C. Bauh. phyt.
Mentha 17. si-
Cattaria an-
gustifolia Hist.
Lugd. p. 909.
Mentha Cat-
taria angustifolia
Lobel. Dodon. lat. in
fol. Cattaria
longiore folio
angustioreque
in Hispaniis
reperita ac spò-
tè nata.

MENTASTRVM MONTANVM
folio coloris viridis.



Caut am-
pliori assurgit
caule, quadrá-
gulo, medullâ
pleno, multis
nodis constâ-
te, ex quibus
bini semper
ex aduerso o-
riuntur rami-
li similiter
quadranguli,
circa quorum
extremas par-
tes oblongæ
spica, verticil-
latim compo-
sitis caliculis
constantes, in
quibus flores
Menthæ silue-

stris, aut illius potiùs Calaminthæ, quam vulgò
Cattariam vocant, floribus similes, exalbidis, gra-
ti odor: folia aduersis inter se pediculis caulem
& ramos ad singulos nodos ambiunt, Mentastro
ferè similia, sed magis ad Cattariæ folia acce-
dentia, colore tamen minùs albicante quàm illa,
aut Mentastri, sed potiùs viridi, Mentastri odo-
rem referentia, acri & calefaciente sapo-
re: radix dura, & lignosa ex lateribus propa-
gines spargit, vt reliquæ congeneres plantar.

Clus. Pann. & Hist. post. Menthastrum mon-
tanum 1. & Menthastrum montanum 2. C. Bauh.
phyt.

phyl. Mentha 13. siue montana verticillata.

Locus & Tempus Spontè nascentem hanc plantam inueniebat; Clus. ad Austriac. Alpiū radices Augusto florēt: deinde maximā copia in Vngariā ad radices scopolii, in quo extructa est munitissima arx. Nemethvyyvar, tum etiam alibi Iunio florentem, quo tempore similiter, in hortos translata; flores producit.

MENTHASTRVM TUBEROSA RADICE.

Cubiales habet caules, quadrangulos, erectos, frequentibus, vt superior nodis cinctos, subhirsutos: folia longiuscula rugosa, in ambitu nonnihil serrata, superioris Menthastrum foliis non dissimilia, magis tamen incana, non suavis odoris, amari & acris saporis;

singulos nodos aequali, sed appposito inter se situ ambiunt: summi rami cum extremo caule, in molles, canescentes, exilium foliorum sparsim desinunt, & inter ea verticillorum rari copiosi nascuntur caliculi, è quibus prodeunt strobili candidi, Capparidum florum amuli: his marcidis succedit semen



illi par, exile, nigrum: radix crassa, succulenta, raphano ferè aequalis, foris aliquantulum fusca, in multis hinc inde ad latera quasi paruos adnascens nappos extuberat, aliisque longiusculis fibrillis donata est, perennis, & plures singulis annis caules proferens: imò ipsi etiam nappi à matre abrupti, & terra obruti, nouas interdum plantas, procreant.

Clus. Pannon. pag. 585. Menthastrum 2. tuberosa radice ex Hispanico semine Calaminthæ tertii nomine misso. In H. post. loco citato. Menthastrum (tertium quoad iconem, secundum quoad descriptionem) tuberosa radice.

C. Bauhin. Phyt. Mentha 10. siue tuberosa radice, quam magnitudine variare scribit. Camer. hort. Menthastrum tuberosa radice maiore & minore.

Hanc Clusius sibi Viennæ semine natam fuisse pertuber, & aliis quibus id communicarit, accepto ex Hispaniis.

DE PYCNOCOMO FLORE OCYMI RADICE rotunda: Veterum sententiæ.

CAP. VIII.

Pycnocomon [πυκνόμον, addit Ald.] folia habet Erucæ (κρηκεῖρα, add. Lac. ex vet.) similia, sed aspera & crassa & aciora: caule quadrangulum: florem Ocymi flori similem: se-

men velut Matrubi [ματρυβί] pro quo Lac. ex vet. Matrubi cod. apud sic etiam Oribas. [rudicem nigram, rotundam, (intus legit Sarracenus) pallidam, (Oribas. Ald. ματρυβί) velut paruum malum, terram olemem. Nascentur in locis petrosis. Vim habet semen drachmæ pondere potum, turbulenta & gratia [multa vet.] insomnia inducendi. Discutit etiam tumores impositum cum polestra: & aculeos ac spicula infixa extrahit. Sed & folia imposita, tubercula & furunculos discutunt. At radix ipsius aluum soluit & bilem euacuat. Datur drachmarum duarum pondere in aqua mulsa, vt memorie prodidit Dioscorides.

Galeno Pycnocomi & radix & semen & folia, discutiendi & attrahendi vim habent, & ad gustum acris sunt. Folia itaque & tubercula, furunculos discutunt. Semen autem robustius est. Sed & spicula & squæ huiusmodi sunt, ad summam cutem extrahit. Radix autem ad prædicta quidem deterior est ac debilior, bilem tamen flauam purgat.

Sunt Plinio, inquit Marcellus, & Dioscoridi de Pycnocomo ferè omnia eadem: tantumque non isdem verbis cuncta Latinus scriptor ex Græco genti suæ reddidit. A foliorum conferta densitate nomen illi fecerunt græci, neque enim aliud Pycnocomon indicat quàm quod densa & conferta coma est. Herbarum autem coma folia sunt. Discrepare etiam videtur in radice colore Plinius & Dioscor. Ille lutei coloris tantum, hic nigram primum, mox & xantham, i. e. pallidam: quod idem luteo colori est, descripsit: Suspiciari multa in varietate hac licet aut deesse Plin. aut abundare. Certè quotquot græcos vidimus omnes nigrum & luteum colorem illi assignant. Eaque ob causam inclinatur animus nobis vt etiam diuersos colores illos ad diuersas referri oportere partes. Animaduertendū etiam illud in viribus & potestate radice dicere Plinium exanantem aluum: bilem (bilem extenuare male habetur apud Barbarum) & pituitam. Hunc autem & reliquos græcorum medicos, bilem tantum.

Hanc etiam inter Dioscoridem & Plinium conuenientiam sic notat Cornarius. Plin. [inquit] consonè admodum cum Dioscor. nisi quod x. ti. id est denarios duos, pro duobus drachmīs habet: non ita magno discrimine, cum in vncis denarii septē, drachmæ vero octo habeantur, &c.

CALAMINTHA VETERIBVS

& in genere.

CAP. IX.

Calamintham Menthæ congenerem aliqui, Caligni verò tantum similem, è Græcis fecerunt. Subscribitque illorum sententiæ, nomen quod coniunctum tibi habet Menthæ. Triplicem hanc Dioscorides ait, diuersisque notis ab inuicem separat, sed non facile cognoscendis, tanta trium generum similitudo est. Calamintha, inquit, quadam montana (καλαμίνθα, Vet. καταμίνθα) est, habens folia similia Ocymo, subalbida (καταμίνθα, Vet. καταμίνθα & λευκώπερα) ramulos & surculos angulosos, florem purpureum (καταμίνθα, Vet. add. κατὰ μίνθα). Altera [Vet. his vsque ad κατὰ μίνθα caret] Pulegio similis est, sed maior, vnde quidam sylvestre Pulegium nominant ipsam, quod & odore illi similis est: hanc Romani Nepetam vocant. Tertia verò similis est Menthæ sylvestri (Vet. vocem κατὰ μίνθα delent foliis oblongioribus, cau-

le & ramis, prædictis maior, sed minus efficax. Nasceitur in Campestribus & asperis ac præhumidis [*γρηγορίου* Vet. *πρυγας*] locis.

Plus not.

Licet autem Dioscorides Calaminthæ tria proponat genera, Plinius tamen lib. 10. cap. 14. vnum tantum constituit, prima duo in vnam Mentastri speciem confundens, & falso colore Pulegii, pro odore habens, velus eius verba clarè docent, ut postea inter vires intueri licebit, ubi etiam Nepetæ vires scorsim exponit.

Nicander in Theriacis duo quidem, sed aliter, Calaminthes genera cognouisse videtur, aquaticum sc. palustreque alterum: alterum verò montanum: haud sanè quia Montanam Calaminthem ille dicat.

Galenus Calamintham non in genere distinguit, sed velut siluestrem quandam Mentham, latius opponit, velut locus habet, què de Mentha ex *6. simpl.* adscripsimus. Sed postea l. 7. de Calamintha idem egit, cui duplex est, domestica, & eo efficacior montana, quam ab Andromacho minore mitatur Nepithæ voce Romana, potius quàm Calaminthen Græca, vocari in sua Theriace, cum cæterea græcè appellaret. Galeni verba de Calaminthæ facultatibus infra recitanda.

Apuleius Nepetham hanc ait Mentham Montanam à Græcis dici, à Magis Sanguinem Hammonis, ab Italis Nepetam montanam. Quæ voces scrupulum & suspensionem Marcello inueniunt an in capitis huius Dioscoridis principio desideretur aliqua huiusmodi appellationum.

Ceterum, Ruellio quidem vel Syluio dictatore, Calamintha prima videtur Calamentum vulgare, secunda Pulegium siluestre, tertia herba Cattaria. Mulsæ contra, Tertia vulgare Calamentum: Secunda, Cattaria putata. Turnero prima Clinopodium Matthioli: Secunda, Calamintha aruensis: Tertia, Nepeta siue Mètha Cattaria. Brasauolus ut videtur Matthiolo, apertè hallucinari deprehenditur, quòd pro certo existimet Calamintham secundo loco à Dioscoride descriptam, illam herbam esse, quam, eò quòd Cattaria magna eius capiantur voluptate, Cattaria quidam vulgò nominant. Error hunc Manifestè proditur, quod Cattaria sit herba foliis Verticæ, similibus, quæ quantum à Pulegii foliis dissideat, non modò cæteris noris, verum etiam odore, in quo Brasauolus nititur, si diiudicent, qui has differentias norunt rectius &c.

Acquiuoca


Ex hæcenus dictis patet tam ob Calamintharum imperfectam historiam quàm ob sententiarum circa eas varietatem, quam vnaquæque sit, difficile esse iudicare. Calaminthæ enim Nepetæ, Melissæ, Menthæ & Balsamitæ species & non nina veteres soliti sunt miscere, teste Trago. A nobis autem & aliis quidem plures Calamintha cognominantur & describuntur, ut Calamintha flore magno vulgaris. Calamintha montana flore magno, ex calice oblongo. Calamintha flore minore, odore Pulegii. Calamintha flore minore odore iucundiore. Calamintha folio & flore paruo, incana. Inter Calaminthæ species etiam numerant alii Mentham Cattariam: alii Mentastrium ruberolâ radice: alii Mentham aruensem: alii Mentham aquaticam: Monachi Mentastrium candidum: alii Mentastri-foliam aquaticam: alii Mentham spicatanam angustifoliam: alii Mentham verticillatam odore Oeymii: alii Melissam Fuchii & Dodonæi: alii Clinopodium Matthioli: alii Scordotin: alii

Mastichinam herbam Gallorum: alii, sed male, Acinum: alii Conyzam mediam Matthioli. Nò placet Pulegium dici Calamintham. Calaminthæ vice Tractatus qui pro quo substituit Verticam.

CALAMINTHA FLORE

magno vulgaris.

CAP. X.



PER caules ramosque Delatipio quadratos folia ex aduerso sita nascuntur, vnciam aut fescunciâ longa, serrata, pilosa, odore satis grato, à medio ad summum vsque ramorum ex foliorum alis pediculi duo in plures minores diffecantur, quibus flores insident è caliculis barbatis striatisque, semun-

ciales aut paulò longiores, [maiores enim sunt quàm in ea quæ Pulegium redolet] hiantes, colore purpurascens, odore iucundo præditi.

An Anguill. epist. 12. Calamentum montanum? An Cordo in Disp. supra Syr. de Calam. Calamintha sylu. & Calamintha montana? An Acerio in deser. mont. Srockornii, Calamintha montana? Dod. gall. sine pictura Calaminthæ species 1. Calamintha prima offic. Calamentum montanum, Gall. *Calament de montagne*: Germ. *Stein* vel *Bergmuntz*. Lat. in fol. Calamintha montana, de qua ait: *Καλαμίνθη* à Græcis dicitur, quasi elegans aut utilis Mentha: Latini nomen seruant.

Lobel. Obs. p. 274. Icon. Plant. pag. 513. Calamintha montana vulgaris.

Camer. hort. Calamintha vulgaris, Calamintha flore rubro circa Francofurtum ad Moenum spontè proueniens. Apud Matth. Germ. *wilder Doley*, *Nornemünge*, Calamentum vulgare, veta Nepeta. In Epit. Calamintha, Græc. *καλαμίνθη*. Arab. & officin. Calamentum, Ital. *Calamento*, Herrusciis *Niporella*, Germ. *wilder Doley*, Hisp. *Neneda*: Gall. *Poultor saunare*. Icon Camer. appositâ non displicet pro Calamintha nostra vulgari, verum non placet pro Nepetâ & pro descriptione Matthioli. An Thallio Calamintha secunda quæ aliàs etiam vbiuis ferè existens in agris montanis?

C. Bauh. phyt. Calamintha 4 siue vulg. offic. Calamintha montana vulgaris. Lobelii. Apud Matth. Calamintha 1. vulg. officin. Figura est Tabernæ Matthioli nam exprimens.

Tabern. hist. & Icon. pag. 350, Calamintha montana, vulgò *Gemey bergmuntz* / aut *Steinmuntz*. An bene fuerit nota Tabernæ planta de qua scribit hæc, figura est ex Matthiolo.

Gerard.

Gerard. Mentha sativa Rubra, Rod garden mung. Gerard non bene Calamintha Tabaconi ponit pro Mentha.

Locus & Tempus.

Calamintha flore magno prouenit circa Mordelgardū in collibus, & in horto Ill. nostri Principis, iucundē florens Augusto, & Septembri: Genevæ passim prouenit: Lugduni obseruavi florentem Octobri. Calamintha montana Dodonæi montes amat, atque in ipsis umbrosos & saxosos cliuos: Italiz, Galliz, & Hispaniz compluribus locis, ut & alibi reperitur, transfertur quoque ad hortos, in quibus feliciter adolefcit, ac seipsam facillimē serit. Viget Aestate, ac ferē toto anni tempore: à Iunio in Autumnum flores, semēque perficit.

Vires & Vitis.


Est autem Calamintha hæc (inquit Dodonæus) in montibus proueniens gustu feruens, & acris, calida ac tenui essentia, siccaque ordine quodammodo, ut Galenus ait, tertio: Tenuēs humores digerit: crassos verò extenuat, ac incidit. Promde intra corpus assumpta, cum ipsa per se, tum cum Melicrato perspicuē excafcit, sudorem cit, omneque corpus & digerit & exliccat: febrium rigores per circuitum repentē tollit: quod & pectat oleum in quo incocta, toto corpore cum hoc inuncto, adhibita frictione haud segni. Decoctum eius porum vrinas cit, menses pellit & conceptum eiicit: quod & admora facit. Rupris, conuulsi, orthopnæ (Galenus asthmaticis) torminibus ac cholera, Dioscoride auctore, auxiliatur. Ictericis prodest: utpote lecinoris, ac fellis obstructions aperiens & expurgans. Præsumpta in vino venenis resistit: pota aut imposta de mortis à serpente opitulatur: accensa aut substrata serpentes fugat. Sugillata tollit, & atris cicatricibus candorem restituit: sed ad talia recentem magis quam resiccatam (inquit Galenus) adhibere præstat. Lumbricos & ascaridas cum sale & melle pota enecat: eadem ratione & autum vermes succus infusus. Plinius succū naribus supinis instillatum sanguinis profluuium sistere ait: & radicem [que Dioscoridi inutilis] cum Myrthi semine in passo tepido gargarisatā anginis mederi. Ischiadicis imponitur: humorem siquidem ex alto euocat, & articulum totum excafcit. Paulus Aegineta etiam ad coxarum dolores ab inferioribus iniici refert: Bonum etiam Elephantiorū esurata remedium est, si [quod Diosc. ait] postea serum lactis bibant. Apuleius folia inquit frequenter commanducata elephantiacos sanare certum esse. Componitur autem ex hac Antidotos ab ipsa nomen habens, à Galeno lib 4. de sanitate tuenda descripta, quæ non modo maxime digerit, sed & virginibus quibus muliebria non succedunt, vtiliter exhibetur, vacationibus præmissis, temporis siquidem successu citra omnem violentiam aut vllam modestam menses promouet.

CALAMINTHA MONTANA FLORE magno ex calyce longo.

Descriptio

Folia aduersa, semuncialibus pediculis nixa, fescunciali longitudine, longiora enim quam in vulgari, paulo minus lata, subhirsuta, profundè in ambitu serrata: è quorum vniuscuiusque sinu pediculus exit vnus semuncialis, quinos quaternosue peculiaribus pedicellis gestans flores, parulo biaru purpurascētes, vnciali, supra fimbriatum stratum, longum calycem, longitudine prominentes: radix sanè multò longior quam in vulgari.

Hanc Calamintham, nō fallimur, sic describit Tom. III.



Lobel. Quasi elegantior aspectu odoreque delicatior esset quam Mentha, Calaminthe vocata fuit: certè hilariorē nitidiorēque habitu esse nullus inficiabitur, qui Vicentinam & Veronensem viderit, Vtinam ceterā etiam perinde & scitè expedisse Dioscor. atque Calaminthæ differentias si-

gnauit. Non obuium istud Calamentum montanum, nisi Narbonensis Seuenz vmbrosis, saxosis cliuibz, & in Romano atque Patavino agro, vnde meminit quosdam medicos Taurinenses curasse quorundam magna vi accensendum, cuius aqua stillatoria ad menstrua eienda vteretur, sperito successu: est enim gustu & olfactu suauiter acris. Etiam dum est viride plurimi sit apud Italos: arefacto non aliud ad Theriacam præstantius, virgis riget quadratis, nitidis, cubitum altis & quam Mentha gracilioribus: folia edentibus Ocyami aut Melissophylli, sed minora, speciosiora, hirsutiora: flores item Melissæ sed purpureos, semine Portulacæ minuto, odore Anaracino, Mentha suauiore.

C. Bauh. Phyt. Calamintha quinta (apud Matthioli.) magno flore: an prima Dioscor. Calamintha montana præstantior Lob. l.

Camers. hort. Calamintha montana aliis præstior. Tabern. Icon. & Hist. Calamintha 2. præstuntior, & del Bergmannz.

Gener Cherlerus attulit nescio vnde, similem Locis & autem omnino vidimus Heidelbergæ in horto Tempus. Domini Sprengeri florentem Iunio. Copiosè nascitur in montibus Euganeis propè Patavium in Vicentinis, vnde nactus est Camerarius. Facile in hortis Norimberg. sese propagat, etiam in furtulis.

CALAMINTHA FLORE MINORE, odore Pulegii.

Atque confurgit rigidis quadratis caulis, in Description frequentibus alas diuisis, hirsutis, subrubetibus, folia ex interuallis opposita, raris crenis incisa, hirsuta, odore graui Pulegii vel ferè Silymbrii, saporis acris, vegeti: flores verticillatim coaceruantur, parui, purpurascētes pediculis longiusculis hærentes.

An Cordo in Hist. libr. 5. cap. 22. Calaminthe montana serrata:

De Calamintha hæc ut existimo loquuntur Monachi in Mesuem dist. 1. cens. 25. & dist. 6. cap. 178. & 187. vbi inter alia hæc: Calamintha Campestris & montana Mesue est Nepeta, vel Nepita (vtrouque inquit nōdo scribitur apud auctores) & propriè illa, quæ vulgò dicitur Mentucia & Nepitella.

An Angnill. epist. 22. de hac dicit: Crediderim Y



potius Nepitel-
lam esse Pule-
gium Diosco-
ridis: de hac i-
dem dicit po-
stea Calamen-
tum secundum,
hodie suum ad-
huc nomen re-
tinet Nepitellæ.

Matthiol. in
Dioscor. vocat
Calamintham
alteram & Ca-
lamentum fre-
quentioris usus.
Nepitam voca-
tam & secundo
loco à Diosco-
ride traditam,
Nomen hanc
apud Hetrus-

cos retinere ait, ac Italos vulgò appellare Nipo-
tellam. Nepitam itaque Dioscoridi nil aliud vi-
quam fuisse, quam vulgarem Calamintham,
quâ officinæ vtuntur, quamque Itali vulgò vo-
cent Nepitellâ: quæ Dioscoridis testimonio à
quibusdam silvestre Pulegium vocetur: etenim
non odore tantum [vt Braſſauolus velle videatur]
Nepitam Pulegium imitari, sed & foliis &
caule.

Dod. gall. quoad descriptionem & titulum Ca-
laminthæ alterum genus, Græcè *πάχυν ἀγρίον*
vocat: lat. Pulegium silvestre, & Nepita:
Germ. formung/wild Poley: Gall. *Pontar sau-
nag*: Belg. *vilde polaye* & *welt Munte*. Lat. in
fol. Pulegium silvestre, siue Calamintha altera,

Lob. Aduers. pag. 219. Calamintha altera foliis
maculosis: odore graui Pulegii: Dioscoridis.
Nepita, antiquis Pulegium silvestre: Perperam
Matthiol. Icon. 677. Calamentum monta-
num. Obs. p. 275. Calamintha altera, Angl. Cal-
ment. Ital. *Nipitella montana*. Item Icon. Plant.
Calamintha altera odore graui Pulegii. Icon ex
Matthiolo non vndique placet, nec etiam nostra
ex Fuchſianis, non enim satis sunt verticillatæ.

Camer. hort. Calamintha secunda. *Nipitella*
in Italia. C. Bauh. phyt. & apud Matth. Cala-
mintha 3. siue Pulegii odore fortè Diosc. 2. Cala-
mintha montana Matth. lat. lib. 3. cap. 39. Cala-
mintha odore graui Lobel.

Tabern. icon. & hist. Calamintha arvensis 2.
Afermung. Tab. existimo nesciuisse quid scribe-
ret, cur separat ab aliis Calaminthis cum icon sit
ex Matth.


Gerard. lib. 2. cap. 218. Calamintha montana
præstantior. The mare excellent Calament Iconi
Tabernæ cur titulum præstantioris apposuerit
Gerardus nescio, quæ præstantior à Lobelio di-
citur & ipsa à Tabern. diuersa est.

Montbelgardi in horto E. C. mihi prouenit:
reperi variis in locis in agris vbi seges demes-
sa est, uel cum requiescunt, & alibi contigit lo-
cis apricis, ac soli expositis, quibus gaudet. Ae-
stiuis mensibus viget & floret hæc Calaminthæ
species; ac sub Autumnum colligi potest.

Facultate autem & calida quoque, ac sicca, &
hæc Calaminthes species est. Eadem quæ Cala-
mintha flore magno vulgaris præstat. Est tamen
hæc minus potens quam Mōtana. Galenus veluti
efficaciorem reliquis Montanam etiam prætulit.

CALAMINTHA FOLIO ET FLORE paruo incana.

Caulis hirsuti cubitum excedentes, ramuli op-
positi, in summitate st. li. hiantes, albidi,
grauis odoris, ex binis longiusculis pediculis bi-
nis, folia Maioranz, quædam multo minora, po-
tissimum superi-
ora, vix cren-
nata: aut rari-
us, valde hirsu-
ta inferiori
potissimum
parte, penè in-
cana.



Lobel. Ob-
seru. pag. 275.
Icon. Plant. p.
514. Calamin-
tha 2. incana.
Camer. hort.
Calamintha
Cretica exi-
gnis foliis in-
cana. Quan-
doquidem nō
describit Ca-
mer. & pauca
verba eius co-
ueniunt cum

nostra, nos non separatim in præsentia.

C. Bauh. phyt. Calamintha prima siue Ocimi
silvestris foliis non crenatis, Calamintha 2. in-
cana Lobelii. Item Calamintha 2. siue minor,
Cretica Camerario. An Calaminthæ secundæ
incana alia species Lobel. obseru. pag. 275. sine i-
cone? Lobelius non tradit duas Calaminthas in-
canas: si vnam eò loci traderet sine icon, prior
esset sine descriptione.

Tabern. icon. & Hist. Calamintha montana
vulgaris. Calaminter montaine mint. Tabern. Gerard.
nec quisquam alius iconem quam proponit, po-
suit pro Calamintha montana vulgari.
Hæc nobis obseruata in hortis insignium viro-
rum D. Doctoris Melchioris Sibitzii & Domini
Friderici Meier Argentinz cum copiosis flore
Iulio & Octobri.

Omnium Calamintharum radix inutilis, au-
thore Dioscoride: folia gustu impensè feruentia
& acris potu aut illitu demorsis à serpente opi-
tulantur. Decoctum eorum potu menses & vi-
rinas expellit: ruptis, conuulsis, orthopnæ,
rorminibus, cholericis, horribusque auxiliantur:
regium morbum expurgant: præsumpta in
vino venenis resistunt: tinea, cæteraque in-
teraneorum animalia, cum sale & melle pota, ene-
cant: nec secus cocta erudæ, si terantur. Ele-
phanticos esitata adiuvant, si postea serum la-
ctis ebibatur: folia detrita si in vellere subiiciantur,
menses extrahunt. & partus enecant: accen-
sa aut substrata, serpentes fugant: nigris cic-
atricibus candorem reddunt: in vino cocta & il-
lita, sugillata tollunt. Calamintha ischiadicis
imponitur, vt ex alio humores euocet, summam
cutem exurens: vermes necat succus auribus in-
stillatus. Et hæc Dioscorides lib. 3. prodidit. lib.
verdè 5. ait E Calamintha vinum fit, eodem quo
Thymites modo. Prodest stomachicis & cibum
aduersantibus: ac valet etiamnum ad morbum
regium propterea quod vrinæ ciet.

Quorum
rationes

Locus &
tempus

Virgo

C. 2. m.

Locus &
Tempus

Virgo

rationes deducit Galenus lib. 7. simpl. facult. quo
 autore Calamintha est essentia tenui & calida,
 sicque temperie, ex tertio quodammodo ordi-
 ne utraque qualitate, horum manifesta sunt indi-
 cia, partim gustu apparentia, partim experien-
 tia cognita: gustu liquidem acris & palam cali-
 da est, ac paulum omnino amaritudinis obrinet.
 Igitur incidendi ei quidem vis adest propter ca-
 lorem eius, tenuitatem & amaritudinem: abster-
 gendi vero propter vnicam amaritudinem. Nunc
 Plinii qui ut supra admonitum Mentastri duo
 prima genera à Dioscoride tradita in vnam spe-
 cie confundit, & post Nepete vires seorsim expo-
 nit. Mentastrium [inquit lib. 20. cap. 14.] siluestris
 Mentha est, differentiis specie foliorum quasi figu-
 ra Ocymi (Dictamni, Rondel. Nam Dictamno,
 ut Méthastro, folia tomentosa, cana, alba: Pule-
 gio vero minimè talia. At cum Dioscorides hæc
 de secundo Calaminthes genere ad verbum scri-
 pserit, & de trium Calaminthes specierum facul-
 tate in vniuersum tradiderit, quæ Plin. de Méthastri
 virib. prodit, rerum ignoratione Mentastrium
 cum primo Calaminthes genere, quod foliis est
 Ocymi, & cum secundo quod foliis ex Pulegii,
 confudisse arbitror Plinium, vocibus *αἰνιδος* & *κα-
 λυμνιδος* deceptum. Dalechamp.) Pulegii co-
 lore [odore Diosc.] propter quod quidam silue-
 stre Pulegium vocant. Iis commanducatus &
 impositis sanari elephantiasim, compertum est.
 Potum foeminas purgat à partu: sed partus necat.
 Orthopnoicis, torminibus cholericis, efficacis-
 simum: Item lumbis, podagris impositum. In
 regio morbo bibitur. Strumis illinitur. Somnia
 Veneris inhibet. Tineas pellit ex aceto potum.
 Contra porriginem ex aceto infunditur capiti in
 Sole. Nepeta quoque vires contra serpentes ha-
 bet. Fumum ex ea nidoremque fugiunt, quam
 & substernere in metu obdormituris vtile est.
 Tusa ægilopis imponitur & capitis doloribus re-
 cens cum tertia parte panis temperata aceto illi-
 nitur. Succus eius instillatus naribus supinis,
 profluvium sanguinis sistit. Item radix quæ cum
 Myrthisemine in passo tepido gargarizata angu-
 is medetur.

Dist. 1. tract. 1. cap. 4. commendat Bayrus Cala-
 ment. infusum & decoctum ad tingendos ca-
 pillos, ita ut eorum etiam radix tingatur, quod
 eius experientia relinquimus.

MELLISSOPHYLLON VETERIBVS & in genere.

CAP. XI.

Habet autore Dioscoride, folia & caules
 Ballotæ similes, maiores tamen & tenuiores
 [ita Corn. Sarr. & alii, malim tamen ego cum
 Ruellio vertere, folia similia, maiora & tenuio-
 ra] non ita hirsutos, Citrium malum olentes.
 Folia cum vino pota atque etiam imposita, pro-
 sunt contra Scorpionum ictus, necnon & pha-
 langiorum, canisque rabidi morsus. Eorundem
 decoctum foris ad eadem valet. Conuenit etiam
 foeminarum deflectionibus ad ciendos men-
 ses. Colluitur & in dentium doloribus, atque et-
 iam dysentericis infunditur. Folia quoque ad-
 dito nitro bibita, iis auxiliantur qui à fungis strā-
 gulantur, necnon torminosi: orthopnoicis ve-
 ro, in Eclegmate sumpta. Cæterum imposita cū
 sale, strumis discutunt, itemque vlcera purgant:
 sed & articulares dolores illita sedant.

Tom. III.

In Coronamenta, inquit Plinius l. 21. cap. 9. fo-
 lio venit Melissophyllon quod Apiastrum est
 hoc nomine græco indicandum, quia nostris ma-
 iori ex parte huius nomenclaturæ defuit cura. Ee
 cap. 20. iam dicti libri eiusdem vsum medicum sic
 tradit. Melissophyllo siue Melitide (Melittæna
 Diosc. & CH.) si perungantur aluearia, non fu-
 gient apes. Nullo enim magis gaudent flore.
 Copia istius (Scopis eius. CH.) examina facilli-
 mē continentur. Idem præstantissimum est con-
 tra ictus earum, vespærumque & araneorum,
 item Scorpionū. Itē contra vulvarum strangula-
 tiones, addito nitro: contra tormina, è vino.
 Folia eius strumis illinuntur, & sedis viriis, cum
 sale decocta. Succus foeminas purgat, & inflatio-
 nes (inflammationes CH.) discutit, & vlcera
 sanat. Articulares morbos sedat, canisque mor-
 sus. Prodest dysentericis veteribus, & celiacis,
 & orthopnoicis, lienibus, vlceribus thoracis. Ca-
 ligines oculorum cum melle inungi eximium ha-
 betur.

Melissophyllum Marrubio facultate simile es-
 se scribit Galenus, sed plurimum ab eo vinci:
 quamobrem nec eo vti quinquam. Superuacuum
 enim foret præsentè Marrubio, cuius tantus
 vbique terrarum prouentus, velle vti Melisso-
 phyllo. Cæterum si cui fortè ad manum Mar-
 rubium non fuerit, illo licebit vti ad eadem, mo-
 do quantum ab hoc superetur cognitum ha-
 buerit.

Sed Melissæ alias facultates easque excellen-
 tiores tribuunt Mauritanii. Scribit enim Sera-
 pio Melissophylli proprium esse animum hilare
 reddere, humenti ac frigido ventriculo auxilia-
 ri, concoctionem adiuuare, cerebri obstructions
 referare, deficientem animum reuocare, cordis
 imbecillitatem roborare, eamque præsertim quā
 somnus frequentius noctu intercipi solet: quin
 & eius tremorem reprimere, animi sollicitudines
 fugare, ac sollicitas imaginationes tollere, quæ
 tum ab atra bile, tum ab exusta pituita gignuntur.
 Quibus assentitur Auicenna, scribens Melisso-
 phyllum excalfacere siccareque ordine secundo,
 exhilarare, vitalesque facultates roborare odo-
 ris fragrantia, saporis austeritate, partiumque re-
 nuitate. Quibus facultatibus cæteris etiam vis-
 ceribus competere. Vites adiectorias habere,
 nec aded imbecilles, quin atrabilarios vapores
 à spiritibus & à sanguine, qui cordi & arteriis in-
 est, educere queat, quod in cæteris corporis par-
 tibus, ac etiam in toto corpore efficere nequit.

Plinius porro non agnouit Apiastrum & Me-
 lissophyllon vnam & eandem esse plantam. Si-
 quidem seu differentes ac diuersas plantas, pri-
 mō quidem Apiastrum ac deinde Melissophyllon
 alueariorum & apum causa ferere oportere l. 21.
 cap. 12. præcipit. Eadem aurem esse Varro aperte
 demonstrat l. 3. c. 16.

Inter nothas Dioscoridis appellationes, sunt,
 autore Marcello, qui Melissophyllon, Meliste-
 um, Melittænam, qui Meliphyllon, qui Erithram
 qui Demelen (Temelen, Sarrac. *ημελεν*.) appel-
 lent. Galli Meritemorion (Metisimorion Sar-
 rac. *αἰνιδος*.) vocant. Romani Apiastrum siue
 Citraginem. Omnibus autem his in græcis
 appellationibus mellis aut apum ratio & signi-
 ficatio coniuncta est: nisi Apiastrum ab apibus
 quibus gratissimum est, Latinis dictum sit: Ci-
 traginem autem ab odore Citri, quod si nasei
 contulas Citrium malum oleat & cordi profit.

Officinis dicitur Melissa: Arab. *Baderangie*, Nomina
Bedaringi, *Bedaren-conm*, *Turingens*, siue *Trun-* linguarum

giam, & *Marmac.* 7. Hodie Græcis *μελίτσα*, & *μελίτσα*, teste Anguill. epist. 12. Germ. *Melissen* / *Melissenkraut*, *Sonigblum* / *Imenblat* / *Bienfaugen*, *Bienenkraut*, *Mutterkraut* / *fräwenkraut* / *herzkrant* / & *Pfaffenkraut*: Belg. *Confilie de grein* / & *Melisse*. Dod. Gallis *Melisse* & *Pomme citrade*: Ital. *Melissa*, *Cedronella*, *Arancia-ra*, *Naranzata*, *Meladella*, *Melisserno* & *Allegrocuore*, Camer. *Citrona* & *Basilicaria*, Aug. Gall. *Hispan.* *Torungul.* *Hierua cidreira* Matth. Dod. *Yerva cidreira*, & *Yerva anegata*, Hadr. Angl. *Baume* / id est, *Balsamum*, Boh. *Melisse*: Hungaris *Mézganchy*.

Dalech. ser.

Fuchsius cum Dod. gall. *Melisse* duo genera facit, vnum verum, tam grato odore, ut in ædibus stratum eas gratissimo odore compleat. Et hæc est *Melissa* adulterina quorundam, & non *Calamintha montana* præstantior *Lobeli*, ut falso contendit *Dalechampi*. Alterum adulterinum *Melisse* genus, quo perperam officinas, pro vera, uti censet: est *Melissa* nostra vulgaris odore Citri, quam eum permultis *Melissophyllum* *Dioscoridis* esse credimus. Hæc locis frigidis graueolentior est, calidis autem odoratior & hinc Camer. apud Matth. *Melissam* vulgarem duplicem tradit: vnam in hortis cultam, & alteram in syluis ac montibus vel aliis neglectis sponte natam.

Dod. Lat. in fol. distinguere deprehenditur *Melissam* in vulgarem & peregrinam siue *Moluccam* quæ duum generum est, vna lenis, & altera asperior foetida, siue ut ipsi vocatur *Molucca spinosa*, quam [nisi pictur. fallat] *Matthiolum* Constantinopolitanum *Melissophyllum* appellat.

Habemus nos, quandam *Melissam* nigriorem & hirsutiorē a nemine celebratam. Exat præter hanc alia *Melissa*, multis Turcica siue *Moldauica* appellata flore purpureo & albo. Nunc *Melissa* siluestris *Tragi*, non est *Cardiaca*, ut voluit *Gesnerus*, sed potius *Melissa* adulterina quorundam. *Melissa* speciem existimat esse *Mentham cattariam* *Tragus* lib. 1. cap. 4. *Selinum* vocat *Melissophyllum* *Lonic.* in *Diosc.* lib. 3. cap. 67. *Rosmarinum* siluestrem vocat *Melissam* solitudinū *Schvvenckf.* quā ratione a. non video. *Apuleius* cap. 45. tradit quoddā vocare *Melissophyllum* *Marrubium*. *Melissophyllum* dicitur de *Marrubio foetido* siue *Ballote*. De quibus omnibus suo agetur loco. *Ocimum citratum* non est *Melissa*, inquiunt *Monachi*, licet tamen altero pro altero uti. *Idē* dist. 6. cent. 178. *Scribunt* *Melissam* à nonnullis *Mentham* *Apum* vocari.

Rosmarinū silv.

MELISSA VULGARIS ODORE Citri.

CAP. XII.

Descriptio

A Pibus gratissima *Melissa*, ex argumento nomen nata, caulibus adolefcit cubitalibus & altioribus, quadratis, lœuibus ferè & nitidis, in plures alas ex aduerso sitas diuisis, solidis duris: folia è geniculis opposita pediculis circiter vncialibus appenduntur, *Calamenthe* æmula, cum splendore attrouirentia, breui lanugine hirsuta, per ambitum serrata, odore Citri, sapore acrimoniā aliquā linguam vellicante, ex quorum alis verticillati flores emicant, albi pallidius tubentes, suprema lacinia bifida, labello lateraliūque duabus lacinias saturatiore, ex calyce hirsuto *Marrubii*. *Radix* subest lignosa, multifi-



da, teres, obliquo actu pet terram lata, fibrosa.

Vulgaris hæc *Melissa* omnium doctorum iudicio, vel *Clusio* teste, verum *Dioscoridis* & antiquorum *Melissophyllum* censetur: tamē cum nonnullis locis lætam quiddam pedoris, aut cinicum odoris ascitū habere con-

tendant multi, idcirco dubitant verane sit, an alia eius species, nostras hæc, *Melisse* nomine etiam in uisceribus nota & omni regioni in hortis frequentissima. *His resp. adetur* *Melissam* nostratē duplicem inueniri. In hortis quidem sæpe *Melissam* colit: & in siluis, montibus, ac aliis neglectis sponte quandoque nasci. Et hanc in locis præsertim frigidis graueolentiorē esse, quam quiddam odoris distinctione capri, cimices referre velint. Illam verò odoratiorem.

Tragus mihi est obscurus in hist. *Melisse* dum ait vulgò dictam non esse *Melissam* & tamen ei attribuit nomina *Dioscoridis* & vires: præterea nō intelligit quid velit, cum ait in descriptione, flos alius purpureus alius subluteus: an flore subluteo uisa fuerit, dicant qui viderunt, ego non vidi.

Matthiolum facit *Melissam* quidem satiuam & siluestrem, verum qua in re differant, non demonstrat.

Theod. Dorst. *Melisse* iconem exhibet sub titulo *Eupatorii* pag. 117. Eandem verò describit pag. 186.

Melissa hæc vulgaris odore Citri, vocatur à *Matth.* *Cordo* in *Diosc.* *Lac.* & *Lob.* in obser. pag. 277. in *Icon. Plant.* & *Aduers.* *apiastrum*, & sic quoque *Sarrac.* apud *Dioscorid.* & *Camer.* apud *Matthiolum*. A *Brunfels.* *Dod.* lat. in fol. *Anguill.* & *Cæsalp.* *Melissa*. Camer. hort. *Melissa nigras.* *Trago* *Melissa domestica.* *Dod. gal.* *Gesn.* [cui & citrargo] hort. & *Clus.* *Melissophyllum*. *Brunfels.* *Matth.* *Clus.* in *Icon.* *Castori.* & *Tabern.* *Melissophyllum vulgare.* *H.* *Lugd.* pag. 957. *Melissophyllum Matthioli.* *Fuchs.* in *Hist.* *Melissophyllum adulterinum* *C. Bauh.* in *phyt.* & apud *Matth.* *Melissa pri-* ma siue hortensis, ubi *Melissam* ab apibus, quas Græcè *μαλισ* dici scribit: & *Apiastrū*, quod apes eā delectentur, denominari refert. Plura nomina vide antè.

Melissam vulgarem odore Citrii Mali, & non *Cimicum*, *Geneuz* vidi spontaneam in sepibus pagi *Bernar* & *Thrinay.* præterea inter *Balsat* & *Wallenburg.* Colitur autē passim in hortis, ut *Basileæ.* *Lugduni.* *Monspeli.* *Parauii.* ubi virebat *Iannario.* *Ferrariæ.* *Montbelgardi* & in *Mas-* *munster.* Floret autem Iunio, Iunio, & Augusto: sub hyemem tota marcescit radice restibili, quæ prima vere noua folia, atque inde cauliculos promit.

Locat. & tempus.

Vererea

Viu

Veteres de viribus Melissæ, si eos consultum velis, lege quæ antè ex iis retulimus. Melissæ, inquit Tragus, calefacit exsiccat, discutit, sanat & conglutinat: internis enim & externis corporis partibus adhibita magni est usus. Vino albo quidem decocta, & per aliquot dies pota, pectus purgat, asthmaticis prodest, cor confortat, tristitias à Melancholia profectas tollit, morbum comitalem, & omnes prope morbos internos curat, quamobrem clysteres ex ea rectè conficiuntur. Minutim concisa perque noctem vino albo optimo macerata, ac deinde in vino distillata, imprimis commendatur, nam non tantum ad mulierum tormina, & vulvarum strangulatus seu præcipationes mire conducit, mensurâ trium, vel quatuor coclearium pota, verum etiam Cardiacæ & fungorum strangulatus auxiliatur. Oculorum ulcerationes si cum illa abluantur, sanat, oculorum claritatem adiuuat. Herba cum floribus Camomillæ lineo sacculo imposita aquæ decocta, deinde expressa, ac calida matriæ inquietæ, & suo loco motæ, imposita, præcipationem eius cohibet, inque locum suum reponit. In desensionibus mulierum ad ducendos menses perutilis est, lumborum dolores sedat. Vitidia cum sale illita cataplasmatibus instar strumas discutit. Aqua Melissæ omni scabiei, ac pustulis medetur, quemadmodum & scorpionum, & araneorum ictibus, ac canis rabiosi moribus, si cum illa colluantur. Aqua vino turbulento infusa, pristinae illud claritati restituit. Eadem carnibus aspersa, à muscarum & vermium iniuria iptas vindicat.


Fernelius lib. 6. m. m. c. 5. scribit Melissam sanguinem melancholicum & atrabilarium purificare, ac partim purgare omnem tristitiam, ac timorem à melancholia profectum depellere: somnia procreare læta, sensusque acuerere. Hinc commendatur à Rondeletio in melancholia capitis, paralyfi, morbo caduco, vertigine, aliisque cerebri frigidis affectibus, cum vino cocta, aut macerata, & bibita. A Gratarolo in confortanda memoria, & ingenio acuendo, hominemque, quocunque modo comedatur herba, industrium faciendo, animi tranquillitate præstanda, saporem capiti iucundum inducendo. Conferre etiam in lotionem pedum: in ablutione capitis. Sic etiam debilitantibus cordis subuenit, & animi deliquia præcauet, maxime si à causa frigida prouenerant, nocturne molestent, & somnum impediunt. Medetur frigido & humido ventriculo. Mulierculæ in Gallia tenetos turiones tuos, ouis, saccharo & rosaceo excipiunt, placentulasque pinxerunt parturientibus, puerperis & enixis, quibus vires impendio deiectæ fuerint, ac secundæ non probè eductæ. Orthopneæ laborantibus parari potest ex hac Electuarium, Conferua, Syrupus & Extractum cum aliquo liquore sumendum, quibus etiam ad supra dicta usus esse potest. Stilletur ad Cardiacas confectiones multus usus. E floribus fit acetum, ut Betonicæ coronariæ, confortando cordi idoneum.

MELISSA ADULTERINA QVORVNDAM amplis foliis & floribus non grati odoris.

Descriptio

Fibrosa radice, subacri, & amarâ nritur: caules quadrati, hirsuti, geniculati, multâ medullâ farcti: folia Galeopsis, oblonga, rugosa, hirsuta, è geniculis enata, opposita, in ambitu serrata. Odor parum grato: ex quorum alis, flores vtricu-

lis oblongis, laxis, hirsutis, emicant purpurei, candidi, vel carneo colore præditi, oblongi floribus Antirrhini similes, labello in tres lacinias diuiso, casside surrecta, promicantibus ex recta staminibus. Eius aliquot species nouit Clusius.



De hac loquitur Tragus lib. 1. cap. 2. dicens. Nicander in Theriacis scribit Marrubiū à pastoribus μελισσῶν vocari, quod quidam propter apes Melitrem nam interpretantur, quæ sanè verba ego de Vertica G. Binsaug dicta, intelligo, quæ dubio procul vera est Melissa, neque enim quæ vulgò dicitur, Melissa est.

Fuchsius hanc Melissophyllum siue Apiastrum verum cōstituit, ac per consequens ei verè nomina adscripsit in Hist.

Gesn. hort. dicitur Melissa vera Rurpodii, & Melissa Fuchsi, de quâ mox ait: Melissophyllum quod pro vero exhibuit Fuchsius, copiosè

in siluis nostris nascitur: & in hortos translatus aliquot annis manet. Lamium siluaticum dixit, quanquam à ceteris Lamiis nonnihil differt: à Melissa quidem vulgò dicta, toto genere distat.

Euchar. Ræss. vocat Melissam. Lobel. Obs. pag. 277. Melissophyllum Fuchsi, Cordi, & Tragi, Herbari sanam Agrippæ, & Lamium Plinii quorundam. In Icon. Plant. pag. 515. Melissam Fuchsi. H. Lugd. p. 958. Melissophyllum Fuchsi & Dod. (gall. scilicet.) Camer. hort. Melissa Fuchsi passim in Germania occurrunt. C. Bauhin. Phyt. Lamium 8. siue montanum, foliis Melissa.

Clusius huius plantæ duas icones proponit: Vni quidem titulus est Lamium Pannonicum 1: versicolore flore. Alteri Lamium Pannonicum 2: albo flore, de quibus ait. Fuchsius & Tragus hanc plantam Melissophyllum appellauerunt, cum tamen exigua odoris gratiâ prædita sit, nec apes eius floribus valde delectentur: & haud scio an

prædita sit, nec apes floribus valdè delectentur & haud scio an apta sit ad aluearia intus confricanda, alluciendarum aut retinendarum apum gratia, ut est vulgaris Melissa, quibusdam Citrago. ab odore Citrii mali, dicta, quæ omnium doctiorum iudicio verum *melisso quillan* censetur. Ego ad Lamii genera potius referendam arbitror.

Locus & tempus

Melissam Fuchsi minùs odoratam magno folio & flore vidì Monspeli, si bene recorder, Geneuz in monte *Salene* incipiebat florere Aprili, in colle *la Bassie* flore albo florebat Maio & Junio: Lugduni obseruauì *au bois du bon Alemand* florentem Maio mense. Basileæ abundantem in monte Moutetz, Montbelgardi prouenit in monte *la Chau* flore purpureo & albo, transtuli in hortum E.C. ubi floret Maio, quidam commendant ad affectiones vteri. Reperi & in alijs locis plurimis.

MELISSA TVRCICA MVLTIS dicta.

Descriptio



Odor & Sapor
Melissam arguunt, at *folia* in caulibus, ramosis, quadratis, subrubentibus cubitum altis, fescunciam longa, vix semunciam lata, per ambitum serrata ad articulos ex opposito sita: suprema autem vtriusque tenuissimis barbulis donata: flores verticillatim

geniculis circumnascuntur, cærulei vel albi, labello bifido, bifidoque cucullo brevior, binisque alis exiguis constant.

Melissophyllum Turcicum dicitur planta à nobis tradita Aduersariis quam describunt & depingunt. Lobel. in Icon. Plant. pag. 515. Melissophyllum Turcicum. Fuchsi lib. 1. compos. med. Melissa altera vulgaris, purpureis floribus, Turcica discriminis gratia nominata: Gesnero hort. Melissa vel Cedronella, id est, Citrago Turcica à quibusdam cognominata: Bizantio ut audit, allato semine, odore multò grauiore & magis ad cineres accedente, quàm vulgaris, floribus purpureis. Camer. apud Matth. hist. germ. Melissa Moldauica [ita etiam in Epit.] siue Turcica *Turckisch melissen* floribus cæruleis & albis Hort. Melissa Turcica siue Moldauica. C. Bauh. phyt. Melissa 2. siue peregrina, Turcica dicta: Melissa Moldauica Matth. icon. 4. pag. 515. in fol. lib. 3. cap. 101. Variat magnitudine & paruitate.

Hanc duabus distinctis figuris H. Lugd. pag. 960. expressit. Et quidem maiorem Melissæ Moldauicæ Matthioli, & minorem Melissæ Turcicæ alterius Dalechamp. nomine. Matthioli non describit, licet in varijs editionibus eius memi-

nerit.

Seritur in hortis, sed ex Muldauiâ primùm ad nos delata est, ubi spontè per se prouenit. Obseruauì Geneuz in horro meo florentem adhuc Nouembri, ut & Lugduni: Montbelgardi in horro E.C. flore purpureo & albo, ac eam secundo anno prouenientem ex semine deciduo, æstiuâ planta est.

Locus & Tempus

Viribus non differt à Melissa & potissimùm odoratum semen existimatur, ut refert Camerarius. Excalfacit, siccaturque ordine secundo, aperit, attenuat, & incidit, Matth.

usus Vires &

MOLVCA.



Peregrina planta Molucæ nomine donata, caulem habet rectum, sesquicubitalem vel maiorem, glabrum, subrubentem, fere quadratum, latis robustum, paucâ medullâ factum, in ramos multos satis diffusum, eosque binos oppositos: folia subrotunda, per ambitum serrata, longis pediculis ap-

pena, foliis Marrubii nigri similia, verum non ita nigra, planè glabra, neruosa, bina ex aduerso posita: in caule ramisque à medio ad summum usque ex interuallis calices magni, patuli calathoides, cutanei, neruosi, seni verticillatim digesti: strobilos comprehendunt Galeopsos ex albo purpurascens, galea hirsuta, apicibus in medios tandem seminibus succedentibus, in singulis calycibus quaternis triangulis: cæterum unicuique verticillo folia bina adherent longo interueniente pediculo inferioribus similia, ad pediculorum ipsius exortum spinulæ aliquot longiusculæ proiliunt. Radix lignosa est & fibrosa, annua herba cui folia amara [amara tota Matth.] flos fere insipidus. Huius plantæ odor mihi gratus.

Gesn. in epist. ad Occonem de hac loquitur. Molucca vel Constantinopolitana herba mihi ante biennium nata, & probè depicta est. Videtur autem ad Lamium vel Vriticam mortuam quodammodò accedere, seminis tamen [vade ego maxime cognationes stirpiuin iudicare soleo] figurâ differt, utpote triquetra.

Matth. in Diosc. cum magnis figuris vocat Melissophyllum Constantinopolitanum, è Constantinopoli allatum, foliis Melissophylli similibus: verum haudquaquâ Citreum pomum olentibus. In Hist. Germ. cum addit. Camerarij, itemque Epitome Moluccam, siue Constantinopolitanâ, Cardiacam, & Moluccam læuem, & sic etiam appellat eam Dod. lat. in fol. Lobel. autem in Aduers. pag. 231. Cardiacam Melicam, siue Molucam Syriacam, Melissophyllo congenerem Melinum & Molucam quidem appellat non ab Oceani trans Tropicum nostrum insulis Moluccis: sed nomine

nomine cum planta nullo è Sytia Venetias Martinielli Sequini opera. Obs. pag. 278. Cardiacam Meliccam, uti & pag. 279. ubi præterea Molucca minus asperam, seu etiam in Icon. Plant. p. 316.

Hist. Lugd. pag. 959. Moluccam siue Melissam Turcicam Dalechampii: Item Melissophyllum Constantinopolitanum Matthioli. Vnus plantæ duæ proponuntur icones ab Hist. Lugd.

C. Bauhin. Phyt. p. 454. Melissam tertiam siue Moluccanam odoratam: apud Matth. Melissam Constantinopolitanam. Tab. Ic. & Hist. Cardiacam Siriacam vocat.

Locus & Tempus.

Moluccam primùm vidi in horto clarissimi præceptoris mei D. D. Gefneri, postea curavi feminandam Basileæ, & Lugduni: ubique provenit copiosè, in horto meo florescens Maio, Junio, Julio, & Augusto. Genevæ ut & Montbelgardi habui florentem: & semine abundantem adhuc mense Novembri.

Herba contra venena magni sit, succus eius capitis vulneribus apprimè conferre creditur, & ad cordis affectus.

MOLUCA ASPERIOR FOETIDA.

Describe.



Longis nidentur pediculis folia circumscriptione ferè rotunda, laciniata, nervosa, foetida: flores è calycibus verticillatim caulem ex interuallis amplectentibus erumpunt: sunt autem calyces minùs paruli quàm in Moluca priore, nervosi, laciniati, quorum laciniæ in longas, rigi-

das, infestas spinas desinunt.

Camer. apud Matthioli Hist. Germ. Dodô. lat. in fol. dicitur Moluca aspera. De hort. Moluca altera, dicta foetida potius quàm odorata, non ita facilè ad maturitatem perueniens. Lobel. in Aduers. pag. 221. In Ic. Plant. pag. 217. Melica siue Molucca asperior Siriacæ. In obs. pag. 279. Maseluc Turcarum, & Molucca aspera.

Hist. Lugd. pag. 959. Molucca spinosa Dodonæi à Clusio pro Galeni Alyssio picta. Fallitur compilator, Alyssio Clusii folia sunt Marrubio similia, magis incana, inodora, hæc & alia nullo modo conveniunt cum Moluca.

C. Bauhin. Phyt. pag. 435. Melissa 4. siue Moluccana foetida, quam ait Alyssio Galeni congenerem aliquos velle.

Tabern. Icon. & Hist. Cardiacæ Syriacæ altera Ranc Syriacæ herba gesser.

Moluccam asperiorē & foetidam Genevæ habui in horto pulchrè virētem adhuc in fine Novembris, Lugduni etiam & Montbelgardi in meo etiam & lil. C. Wirt. aliquoties: nunquam autem semen maturuit.

DE ORIGANO VETERIBVS

& in genere.

CAP. XIII.

Organum pluribus plantis continetur, id quod ex eius generibus seu rectius cognominibus ostenditur. Primum Dioscoridi nuncupatur *ὀρίαν* *ὀρίαν*, quam refert nonnullos *ὀρίαν* vocare. Quæ tamen & ipsa pluribus convenit, ut ostendimus cum de Cunila propriè dicta agimus. Ex hæc etiam à Galeno Heracleotica vocatur, à Plinio autem Cunila gallinacea & Origanum Heracleoticum. Secundum genus est *ὀρίαν*. Sic & tertium *ὀρίαν*, silvestre Origanum.

Origanum verò siue Origanus quoddam montibus gaudeat appellationem apud Græcos inuenit, *ὄρος* id est, monte, & gaudio. Herodianus quoddam visum exacuat nomen duxisse testatur, ab *ὄρος* videre, & *ὄρος* clarifico, quasi aciem oculorum illustrans. Theodorus grammaticus, nomen ex aduerso ductū putat, à *ὄρος*, & quod est algeo, fieri *ὄρίαν*, quasi algens, censet, & tandem alcita litera principe, o, in Origanum esse confectum, contrario tamen sensu, quoddam minime refrigeret.

Arabice dicitur *Origanū Fandenegi, Fudenegi*, seu *Fandenigi, Fandenigi* Trago: cui & Heracleotica & Azab: Hebræis, *Karimb*: vocatur teste Arach Monstero, tamen species Hyssopi ibidem quoque tradatur. Germ. *dosten* / *wolgemuth* [quasi dicas animi bonitatem, aut lætitiā] *Costum* (Costum) & *Bergmünz* (Menchā montanā:) Gall. *Origan* & *Mariolaine basard* (Majoranā spuriam:) Ital. *Origano*: Hist. *Origan*: Angl. *Origane*. Boh. *Dobramisl*: Hung. *Sesere gyopar*.

Ceterum per Origanum simpliciter dictum, videtur & plurimum intelligendum Heracleoticum, de quo hoc loco primum agendum, quod ab Heraclea Ponti nomen desumpsit, quoddam illi potissimum nasceretur.

Præter quod autem Dioscorid. Origanum Agerato frutici maxime simile dicit, & Papaveri Rhæadi eius folia comparat, rursus particulatim hæc de eo scribit. Origanum Heracleoticum, quod nonnulli cunilam appellant, solum habet Hyssoppo non dissimile: umbellam autem non in rotæ speciem orbiculatam, sed veluti diuisam, & semen in summis virgis haudquaquam densum.

Plinius in Origanum nomine, tum Historia ambiguus admodum est, qui hanc Cunilam gallinaceam latine appellat, Græcè, Origanum Heracleoticum: Optimum autem Creticum, nam & iucundè olet: proximum Smyrnum: deinde Heracleoticum quod Onytin vocant &c.

Origano autem esse genera complura sumis differentiis discreta auctor est Theophrastus 6. Hist. cap. 1. ex quo Plinius sua transcripsit. Idem cap. 2. ait Origani genus nigrum sterile esse: candidum verò manifestè fructuosum. Lib. 7. cap. 11. Germine Origanum defigitur. Lib. 1. de Caul. c. 15. suffruticem esse, semperque virere 4. c. 3. agere germinare. Et 7. cap. 1. Origano dies plus quàm triginta dari, antequam nascatur.

Palladius cap. 13. Mense Septembri circa Aequinoxium serendum præcipit, stercoreandum ac rigandum donec conualecat: amare loca aspera & saxosa.

Præquam autem ad alia progrediamur, con-

sulendæ & considerandæ veniunt varix circa Origanum Neotericorum opiniones. Hæ enim ad oculos ponit difficultates, quas Veterum breuitas peperit & obscuritas.

Marcellus inter alios hæc scripsit: Duo statim à principio sexti de plantarum hist. voluminis Origani genera Theophrastus fecit: Nigræ quæ sterilem: & candidæ quam secundam & seminis feracem nominauit: quod manifestum multoque certius in Satureia videatur: hinc inde, & post eum Columella: Plinius deincepsque alii multa diuersis nominibus & historiis cantaque cum varietate & incertitudine Origani genera tradiderunt: vt non facile nunc sit eligere quod dicat aut quos potius auctores sequatur aliquis. Nec quicquam, si inuenisse id liceat, obtinendum magis, quam animal quadrupedemue aliquam, quæ certius salutis suæ consulere à natura docta, dum sibi in periculo necessariam Origanum querit, & inuentâ vititur, tam multas eius species & earum discrimina nobis ostenderet: quod facere à diligentioribus deprehensa Testudo est: quæ cum venenatis carnibus pasta fuerit, Origanum querit & inuentam venenis aduersantem deuorat. Difficillimum enim est cõcordem tot veterum Scriptorum Origani historiam facere. Nec nos profiteri id pollicerique audemus. Licet sane quæ ab eis tradita sunt omnia, aut saltem plura reperere hoc loco: sed nos nunquam pro bonarum artium studiis id genus laboris amauimus: simulque iniquum vitium semper est ab antiquorum Scriptorum lætione & laude deuos in admirationem sui tam mala ratione posteros agere: translatisque in sua commentaria eorum monumentis laboris sui fructu omni posthac eos priuasse. Agemus ad eam causam rem nostrâ &c.

Varia, inquit itidem Matth. ac confusa est apud Antiquos rei herbariæ authores Origani historia. Quandoquidem Theophrastus lib. 6. c. 2. de plantarum historia duo tantum constituit Origani genera, nigrum sterile & candidum fructuosum. Plinius verò lib. 20. cap. 17. post Onitidis Origani, & Tragorigani mentionem, Heracleum Origanum subiunxit, quod tria habere genera prodidit. In quibus verbis Plinius deprehenditur non sine errore Tragoriganum cum Origani generibus confudisse, quod Heraclii nomine, quod constat Origani genus esse, duas illas Tragorigani species, quæ à Dioscoride redduntur, huius ferè imitatione expresserit: licet tertium quoque addiderit ex alio fortè authore, nisi dixerimus, quod & hanc pro aliquo Origani genere sumpsit, & simul confuderit. Sed demissis aliorum placitis, & Dioscoridem quem nobis ducẽ, & authorem proposuimus, duntaxat secuti, dicimus tam Heracleoticum quàm Onitim appellatum Origanum aut in Italia non oriri, aut inibi hætenus, quod sciam, à nemine repertum fuisse. Etsi Brasauolus Ferrariensis medicus nostræ ætatis clarissimus asserere videatur, Heracleoticum illud herbæ genus esse, quod in Italia passim nascitur, quodque perperam Origanum vulgo ab omnibus vocatur. Verum huic præce eius dixerim [nunquam assentiri potui: qui potius eam plantam Origani siluestris genus esse semper existimati, quod sua sponte in campestribus, asperis cliuosisque locis & montibus proueniat, purpurascens admodum umbellâ.

Aliiter verò statuit Anguill. dicens, Origanum in Italia notissimum, sed excellentius nascitur in Apulia & Calabria, quàm in alio loco. Proue-

nit præterea in Illiria & Sclauonia, & in Græciâ, vbi vtuntur vice aromatum ob acrem saporem. In Creta, inquit Bellonius, inueniuntur tres species Origani quæ florent in principio Iunii, Onitis autem propriè prouenit inter rupes in collibus à parte sicciorè quæ meridiem respicit. Heracleoticum autè locos amat humidos quod verò siluestre vocatur, neutrum locum amat, prouenit libentiùs iuxta sepes & agros quàm locis desertis. Non longè à Berleheimo in ruderibus quibusdam reperitur Onitis & Origanum Heracleoticum. Præstantius & verius siluestre est, inquit Amat, quod nullibi quàm in Hispania hucusque mihi videre contigit: in Gallia verò & Germania ac Italia, genere quodam vtuntur, non aded tamen potenter ac bono.


Vnde meritò Cronemburgius, vbi quæ alii dixerunt recensuit, dicit: Quin parum inter Græcos, minùs inter Latinos, omnium minime inter vtrosque, circa Origanum conueniat, haud imperitiâ quispiam indideret inarticulatamq; Origani delineationem miretur.

Origani Heracleotici nomine donantur hæc Acquioca plantæ, à diuersis quidem authoribus. Origanum vulgare spontaneum, cuius tres sunt species flore differentes Trago, duæ Dodonæo. Origanum Heracleoticum Ruellii siue Maiorana maior. Origanum Heracleoticum Matthioli, & Dodonæi, vocatum Hispanicum, aliis fortè Creticum. Onites Matth. & Dodonæo, Tragoriganum Matth. Tragoriganum Dodonæi. Maiorana Anglica Dodonæi de quibus suo loco. Hysopus vulgaris. Clinopodium Dodonæi. Origanum Creticum. Geranium. Agrimonia. Acinos. Clinopodium Matthioli. Chrysogonum. Eryngium. Satureia. Thymus. Pulegium plebecula Anglicæ est Origanum. Plinius pluribus locis confundit cum Origano Conyzam.

Cæterùm in tanta nomenclationum varietate cum non facile sit certi quicquam statuere, lubet de omnibus suo loco differere & hic quidem Heracleotici Origani æquiuoca, & ad ea aliquo modo facientia, specialius pertractare, adicientes in fine, facultates, quæ Origano Heracleotico Veteres adscribere. Nec in re admodum incerta, multum operæ aut laboris temerè infundendum esse, necessarium putauit Fuchsius.

ORIGANYM VVLGARE

spontaneum.



Origani vulgaris radices tenues illæ quidem & lignosæ, oblique aguntur, frequentibus Capillamentis hibratq; sic vt ramulorum pars infima horû ope denud radiceatur: surgant autem complures caules cubitum vni aut duos cubitos alti, duri, quadrati, hirsuti: ad quos

quorum nodos aduersa oriuntur *folia*, Calamētha aruensis, hirsuta, & ex horum alis minora alia, maioranæ foliorum æmula: sapor autem tū his, tum illis acer, aromaticus, odor suavis: *flosculi* tanquam in umbella foliolis rubescentibus obuallati emicant, colore carneo aut candido, pusilli, vnum foliolum bifidum sursum reflectentes, infimum maius trifidum, ceu labellum demittentes, staminibus in medio flori concoloribus: *semen* minimum, Maioranæ stermini simile.

Huius autem Origani esse, quoad florem attinet, tria genera, attestatur Tragus: Horum aliud phœniceum, aliud ex candido rubicans: posterum verò planè candidum.

Fuchsius autem Tragoriganum, aut saltem eius speciem quandam esse ait. A Matth. Cronemb. Lacuna & Dodonæo existimatur Origanum siluestre Dioscoridis. Amatus ad nullam speciem certam reducit, sed tātum Origani quoddam genus facit. Cornarius simpliciter Origanum vocat: ceu & Monach. dist. cens. 40. vbi dubii hærent an sit recipienda opinio Braslauolæ, asserentis esse Origanum Heracleoticum. Tragum quod rursus attinet, sentit is Origanum nostrum esse Dioscoridis Hyslopum. Camer. in Epit. Matthiol. hanc plantam Pseudoriganum magis appellandum censet quàm siluestre Origanum, ut quidam credidere. Huic enim flores candidos, non purpureos ait.

Vocatur planta à nobis descripta, Fuchsi, Dod. gall. & lat. in fol. Gesn. hort. Cast. Tabern. Camer. Matth. in Hist. germ. & C. Bauh. (4. apud Matthes. phyt. vbi Cunilam bubulam Plinii facit) *Origanum siluestre*. Rurpodio *Tragoriganum*. Cordo in Dioscor. *Origanum siluestre*. Brunfels & Trago *Origanum*: Matth. Lonic. Gesn. hort. Lacunæ, Thallio & Camer. in Epit. *Origanum vulgare*: H. Lugd. pag. 887. *Origanum vulgare siluestre*. Lobel. in Aduers. pag. 211. Obs. pag. 263. Icon. Plant. pagin. 492. *Agrioriganum* siue *Onites maior*. Catalp. *Origanum italicum*, cui & Tragoriganum Dioscoridis. Origanum Onites in Lombardia proueniens Anguill. epist. 12. Camer. hort. Origanum siluestre flore albo. Et ita quidem vulgè vocatur, ait, quod passim crescit, & potius ad Heracleoticum est referendum. Nā siluestre quod secundum Nicandrum Dioscorides describit, cum umbella Anethi instar, alba tamen, Anguillara dicebat in Italia sibi non visū. Origanum siluestre, esse Cunilam Bubulam di-ctam Ruellius probare conatur.

Cæterum, Origanum vulgare mirè variat, interdum enim folio est rotundo, interdum longo & magno, interdum flores spicati, plerumque nō spicati. Monspelii passim prouenit, florens Augusto, coloris purpurei. Vulgare Genevæ abundat virens principio Ianuarii. Basileæ copiosè prouenit etiam flore albo. Montbelgardi frequēs & circa Blaumontium Castellum E.C. licet vide- re flore purpureo, rubente cum albedine, & albo, vnde transtuli album in hortum E.C. Montbel-gardum. Nascitur in inculto solo secus itinera, in collibus & apricis, non modò in calidioribus regionibus sed & in Germania, æstiuus mensibus florens: semen deinde perficiens.

Origanum Heracleoticum à Veteribus descri- ptum hanc esse plantam qui nobiscum sentiunt, vires si requirant, videant antè. Hæc quidem particulatim trademus. Exalefacit, inquit Mat- thiolus, quodd gustu subacris sentiatur, & siccat quoque similiter, sed haud strenuè. Aperit, dige- rit, incidit & resoluit, sed longè mitius quàm præ-

scripta Origani genera. Perdices, Ciconias, & Palumbos vulnere accepto, Origanum imponē- tes ad sanitatem redire, neque hominum vllā medicina habere necesse, narrat Ællanus: In- spersum piscibus, carnibus & aliis abigere mus- cas tradunt alii. Huius decocto Vngaricas mulier- culas ad filum lanæ melle pullo colore insciendam vti, auctor Nomencl. Pannonicus. Ad arcendum pediculos & pulices Origanum præscribit lac- du Fouilloux. Arnold. de morb. cur. ad dolorē capitis à pituita in gargarismo Origani semen commendat: Ego pluris facerem folia.

ORGANVM HERACLEOTICVM

Ruellii, siue Maiorana maior.

Maioranæ alii, alii Origanis accensent plā- tam quadratis, hirsutis, subrubentibus, cubitalibus, ramolis *caulis* fruticantem: cuius *folia* ex aduerso posita, binā plurāue, Maioranæ foliis maiora, Origanū vūlgāris ferè paria, cine- rea, hirsuta, venosa: extremi ramuli in *spici* du- orum versum squamatas semunciam aut vn- ciam longas abeant, è quarum imbricatis foliolis *flosculi* emicant.

Descriptio

Ad inarticulatam Heracleotici Origani, quod alii Cunilam vocant, Dioscoridis delineatio- nē magis accēdere, nullam scio (inquit Ruellius l. 3. cap. 25.) quàm quæ vulgè degeneris Maioranæ cognomento scribitur in hortis, frutice Hyslopi, fo- liis eidem vel Serpillo siluestri proximis, minori- bus tantum, umbraculis non in orbem coactis, sed diuisis, florum plenis. Tradunt olitores ne- glectum sampsiacum in eam degenerare, frutice Serpilli plerumque humi reptante, cauliculis puniceis, foliis Sampsiaci, flore purpureo, in umbella cineritia in qua semen: vnde multis Gal- liæ locis *Cendree* nominatur.

Hanc intelligit Tragus lib. 1. cap. 9. per Maior- anam siluestrem, siue alteram: foliis, caulis cacu- minibus, nec non & florum crassitudine, longi- tudine & magnitudine, Maioranæ satiuæ maiorē, eiusdem tamen ferè cum satiuæ odoris & tē- peramenti. Is nisi stultæ temeritatis argui se posse vereretur, affirmaret Maioranam siluestrem ad Caput Dioscoridis de Mæro pertinere.

Gesner. hort. vocat Amaranthum & Sampsiacū siluestrem, Maioranam maiorē. Camer. hort. A- maranthum silu. perennem. Harch. in Enchir. sil- uestem Maioranam: Item Anglorum peculia- re Origanum, quo vti posse putat in aliorum i- nopia. Lob. in Aduers. pag. 212 Hyslopum, Ma- ioranam Anglicam, Origano similem plantam: Lacuna Marum Dioscoridis & Origanum. Dod. gall. Marum quorundam inscribit, & *Mariolaine d'Angleterre* gall. vocat, Belg. *Engelsch Marz toleyne* / Maioranam Anglicam. Hanc describit pro Origani tertia specie. Non placet autem nec descriptio, nec figura, quamuis Lacuna ean- dem habeat.


C. Bauh. Phyt. Maioranam secundam siue sil- uestem perennem vocat.

Montbelgardi vbi in hortis abundat, *grosse Mariolaine* nuncupatur: ididem hiemem perfert.

ORGANVM HERACLEOTICVM MAT- thioli, aliis fortè Creticum.

Hoc nomine mihi visum & collectum Ori- ganum, cubitali *caule*, quadrato, hirsu-

Descriptio



Origanum Heracleoticum, flosculis ex albo purpureiscentibus & nonnunquam candidis. In Epit. Matth. Origanum. In Hist. Germ. Origanum Heracleoticum, Origanum verum 1. Casp. Bauh. phyt. Origanum 2. siue Heracleoticum: Origanum 1. vel 6. Tragi: Cunila Gallicaria Plinii: esse ait flosculis ex albo purpureiscentibus, & etiam candidis.

Tale habebat Fuchsius in horto quod vocabat Tragoriganum tenuifolium. Habemus & Montbelgardi in horto E.C. ubi fert hiemem nisi admodum sauietur.

ORIGANVM CRETICVM.

Descriptio



tigit, hirsuta, minora quam vulgaris Maioranae, minimeque rotunda.

Anguill. epist. 5. & 11. vocat Origanum album, nihilque aliud esse ait, quam Hyslopum Cilicium à Dioscoride descriptum.

Matth. dicitur Origanum Onites [ita & Lactanz & Cam. in Epist. & Hist. germ. qui & Origanum verum 2. vocat] è Creta allatum & à Luca Ghino missum. Trago Origanum alterum pulcherrimum peregrinum. Lobelio in Aduers. pag. 211. Origanum silvestre Syriacum,

to, vulgaris instar Origani: folia ex geniculis minora, modicè hirsuta, odore & sapore acriore: flores albi aut subpurpurei in squammaris capitulis, minime spicatis, & in umbellae fere modum sparsis.

Lob. in Aduers. p. 211. Obseru. pag. 262. & Icon. Plant. pag. 492. Origanum Heracleoticum. Camer. hort. Ori-

quod optimum ait, è Syria aut Creta allatum, hocque vti Venetos pharmacopaeos & medicos. In Obseru. pag. 263. Origanum silvestre: Hyslopum Dioscoridis Cilicium Anguillae: Ital. *Oregano bianco*. C. Bauh. phyt. Origanum 5. siue Onitis alterum.


An à Fuchsis de compos. med. lib. 1. cap. 5. Origanum Creticum appellatur?

Origanum Creticum cum longiusculis corymbis spicas æmulantibus, flore albo & rubello Gæppingæ in horto Ill. E. C. & in horto Admirab. balnei, obseruauit.

Locus & Tempus

ORIGANVM MONSPELIENSE
pulchrum Camerarii.

Similimum est Oniti à Matthiolo depicto (Origano sc. Cretico nostro), sed non idem: ab Origano vulgari, non multum differt,



nisi quod habeat multas, pulchras & oblongas quasi spicas, purpureas, caulis etiam totus purpureiscent, semina gignit rufum, putillu, vt reliqua Origani genera. Crescit in Gallia, prope Monspelium.

Synonima

Est hoc C. Bauh. phyt. Origanum 6. Nobis autem idem videtur cum eius Origano 4.

Origani vires in genere.

Origanum Heracleoticum, authore Dioscoride, vim habet calefaciendi. Vnde decoctum ipsius cum vino potum, commorsis à bestiis venenatis conuenit: cum passo verò his qui Cicutam aut Papaueris succum hauserunt, cum aceto mulso his qui gypsum aut Ephemerum biberunt. Cæterum ad conuulsa & rupta ac hydropas, editur cum sicu. At aridum potum acetabuli mensura cum aqua mulsa, nigra per alium ducit. Idem cum melle delinctum, menses mouet, & tussis curat. Ad pruritus & scabiem & morbum regium, decoctum ipsius in balneo prodest. Succus ipsius dum adhuc viridis est, & tonsillas, & columellas, & feruida oris vlcera sanat: & si cum oleo irino ipsis infundatur per nates ducit. Cum lacte verò aurium dolores mitigat. Patatur & vomitorium ex illo medicamentum, additis Cepis, & Rhoe qui obsoniis. interpergitur, omnibus in ære Cyprio, sub canis ardore, ad dies quadraginta, insolat, Herba ipsa substrata, reptilia & serpentes fugat.

Origanus Heracleotica quidem efficacior est Onitide: sed agrestis, quam quidam Panaces Heracleum, alii Conylem cognominant, valentior utraque est, inquit Galenus: Omnes verò incidendi, extenuandi, exsiccandi, calefaciendi facultatem possident: hæcque tertio excessu

excessu obtinēt. Porro ea quam Tragoriganum appellant assumpsi etiam attritionis quippiam. Idem in lib. simplic. med. ipsi attributo, ait. Origanum & ipsum omnibus notum est, & habet vires acres & excaustorias & relaxantes, & euaporantes: unde & suspiriosis & tussientibus prodest. Et serpentes fugat item biles & ventrem detrahit. Sed urinam & menstrua prouocat.

Apuleius ad tussim potenter auferendam Origanum in puluerem mollissimum terit, & melle vique ad tertias decocto miscet, & exinde figurat trochiscos & dat ad bibendum in aqua calida.

Nunc ad Plinium deuenimus, qui lib. 20. cap. 16. ait. Est alia Cunila gallinacea appellata nostris, Græcis Origanum Heracleoticum. Prodest oculis trita addito sale. Tussim quoque emendat & iocinorum vitia. Laterum dolores cum farina, oleo & aceto in forbitionem temperata. Præcipue verò Serpentiū morsus: de quo etiam plura habet eiusdem libri c. 7.

Aristoteles Origanum musto iniectum efficere vinum dulce prodit: quia partes aquosas auferat ad sese, quemadmodum Sol ab uis, quæ passæ dulciores fiant. Origanum verò acrimonia sua non tam attrahere ad se vini acrimoniam, quam eius partes coquere dilutiores.

Auicenna Origanon commendat in doloribus dærium, quod se. omnem putredinem arceat, unde prouerbiū ὀρίανος πικρὸς τὸ ἐξήσθαι φιλῷ. i. e. putre fassamentum Origanum amat. Origano adhuc in Illyria & Græcia vtuntur propter, acrem saporem in ferculis loco aromatum.

Antigonus in farragine memorabilium narrationum scribit Testudinem ubi serpentem adit, Origanum insuper edere & quodam tempore accidisse, qui hac re obseruata Origanum eo loco abstulerit, & tum testudinem eo orbatam perisse. Idem author Græcus addit palumbes percussas Origanum vulnere indere, & hoc remedio sanari. Item si Origano & Sulphure formicarū acerui obtutentur, statim illas aufugere, quod etiam tradit in Homil. D. Basilius. Decoctum Origanum cum Cariophyllis & Saccharo paratum plurimum singultui prodesse constat. Huius etiam puluis cum pauco sale nitro vulgari & melle instar eclegmatiss mistus vtiliter dentibus infricatur, & reddit cadindiores ac firmiores. Origanum inueteri, prouerbiū est apud Suidam ex Aristophane sumptū, ab acrimonia herbar, & dicebatur de eo, qui robur & maximum animū præ se ferebat. Cæterum vinum Origanites ex Origano Heracleotica parari similiter vt Thymites, testatur Dioscorides: facere & ad eadem.

De Origano Onite.

De Origano Oniti Dioscoridi dicto, quod nomē retinent etiam Galenus & Plinius, variae sunt opinioniones: tradit enim Hermolaus ornithin h. e. gallinaceum quibusdam dici: aliis Buglen Ruellius. Nicander quoque meminit Origani, cuius folium, quod Asinis pabulo gratum esset Onopetalium vocauit Origanum, quodque Onitum inde secuta ætas ab eo didicit appellare, Onitis quid sit ex Dodonæo colligere non possū, nihil enim addit præter ea quæ à Veteribus dicta sunt, addens tantum hac in regione incognitum esse genus.

Matthiolus verò depingit quidem plantam pro Origano Onite sibi missam à Luca Gui-

Tom. III.

no ex Creta allatam, vt supra ostensum, sed non describit. Nisi multum fallor hoc Origanum Onitis Matthioli nihil aliud est quam Hyssopus Anguillaris, vt videre est capite de Hyssopo.

De Onitide autem hæc dicit Anguillara cum locutus est de Origano. Onitis est species Origani quæ tantum minor est acrimonia, odore & facultatib, vt dicūt Galē. & Diosc. Nec aliud est quā Origanū quod reperitur in Lōbardia. Quod verò non sit vique aded album in causa est locus quia in locis calidis albidius est & violentioris saporis ac odoris. Hæc Anguillara.

Galenus easdem tribuit vires Onitidi quas Origano Heracleotico, nisi quod imbecilliores.

De Origano siluestri.

Ἀγροκόκκον, πικρὸν, ἡράκλειον & κοῦλην Dioscor. iisdem etiam nominibus insignita Galeno. Plinio recensetur inter Panaces, ac vocat Panaces Heracleum ac Origanum Heracleoticum siluestre. Siluestre autem cognominatum quod sine cultura & sponte sua proueniat.

Dicitur Germ. kosten wolgemut, quasi dicas animi bonitatem aut lætitiā, Braundosten / vel Bergmuntz / Wilder matoran. Flandricè Graue-Marioleine. gallicè Origan & Mariolaine bastarde.

Eius tres species facit Tragus, duas Dodonæus. Meminit verò cuiusdam Origani hispanicæ Amatus, quæ, ni fallor, Origanum heracleoticum Matthiolo, & Dodonæo. Tragoriganū siluestre esse Origanum volunt etiam nonnulli. Alii Panaces heracleum, aut Cunilam, inter quos Nicander & Diocles. Siluestris Origani non meminit Plinius, Cunilæ tamen bubulæ vocabulo comprehensum iri putamus. Nec per Cunilam aliud intellexere Columella & veteres veterinarie artis Scriptores quā siluestre Origanum.

Id autem Origanum siluestre se non nouisse scribit Anguillara, nec vllam plantam prouenientem in Italia quæ dici possit verum Origanum siluestre. Amatus dicit se nullibi quā in Hispania siluestre Origanum vidiſſe: & in Gallia & Germania quadam vti non aded potente ac bona. hanc autem speciem hispanicam videntur Dodonæus & Matthiolus existimare esse heracleoticum, vt patet ex superioribus, quandoquidem vna & eadem figura Matthioli & Dodonæi. Suum autem cum Amato vult Dodonæus ex hispania afferri: Suum ex Creta Matthiolus.

Præsertim autem folia siluestris Origani & flores cum vino bibuntur, & commotis venenatis bestiis opem ferunt. Galenus huic easdem vires tribuit quas Origano heracleotico & Onitidi, nisi quod valentiores.

DE SAMPSVCHO SIVE AMARACO

Veteribus & ingenere.

CAP. XIV.

Theophrastus amaracum vocat, non Sampsuchum, licet Theodorus modò Sampsuchum, modò Sampsuchum vertat: aliquando Amaracum inter suffrutices coronarios perpetuè vires, prouenit & semine, & auulsione: præstat seminis copia, & iucundi odoris semen est, & quidem mollioris odoris: nec non & planta eius transferri potest: radices in summo tertè hærent, mul-

Z 2

rifida, torrida que: Ætate floret, recipitur in vnguentis odoratis. Et rursus 1. de caul. plant. (vbi tamen eum aliam intelligere statuit Cæsalp. licet quænam illa sit, non determinet) ait. Amaracum recens radicem succi bonitate & carnis ad serendum habet, inter ea quorum radix crassa & carnosâ est.

Appellatio-
nes spurie.

Delectus à
locoparum.

Descriptio
Calamin-
tha folia.

Vires

Sampfuchum [sunt qui in nothis Trifolium, qui Agathides, Agethides Marcell. qui Cnecium, qui Acapnon: Pythagoras Thramben, Ægyptii Sopho, Armenii Myuron, Magi Hecigonon, siue genituram Isidis, & Ichrei asinum, Romani vero Maioranam dicant] in Cyzico laudatissimū: secundum ab hoc locum sibi vendicat, Ægyptiū. Vocatur autem à Cyzicenis & Siculis Amaracū. Herba est ramosa, per terrâ repens, foliis hirsutis, ac rotundis, tenuioris folii Calaminthæ æmulis, vehementer odorata, & exalfaciens (quidam, *apocyni*) nexilibusque coronis inseritur. Decoctum ipsius potu incipientibus hydropicis vtile, ut & iis, quos vrinæ difficultas, aut tormina excruciant. Illita ex melle arida folia, fugillara tollunt: mensesque subditi in pello trahunt. Contra scorpionis ictum ex aceto & sale illinunt. Luxatis autem cerato excepta imponuntur, itemque ædematis. Sed & ad oculorum inflammationes cum polline polentæ illinuntur. Cæterum acopis & malaginis exalfaciendi gratiâ commiscenunt, autore Dioscoride, apud quē in veteri codice, teste Goupylo, Sâpsuchi loco inuenitur caput *in apocyni* ipsiusmet dictis verbis. Amaracum autē Dioscoridi idem esse cū Sampfuchino & amaracino, licet hæc diuersis capitibus prosequatur, ut apud ipsum videre est.

Ex Plinio.
Amaracum
gens Sicu-
la.
Sampfuchū
Ægypto &
Syria.

Semen.

Oleum sam-
puchi, aut
amaraci-
num.

Plinius de Sampfuchino, siue Amaraco pluribus in locis disseruit. Ait enim lib. 21. cap. 11. Amaracum Diocles Medicus & Sicula gens appellauere, quod Ægyptus & Syria Sampfuchum. Seritur utroque genere & semine & ramo, viuacius prædictis (Origano, Thymo &c.) & odore melius. Copiosum Amaraco æquè quàm Abrotono semen. Idem cap. 22. Sampfuchum siue Amaracum in Cypro laudatissimum & odoratissimū, scorpionibus aduersatur, ex aceto & sale illitum. Menstruis quoque multum confert impositum [trahendis in pello subditum, Diosc.] Minor est eidem poro vis. Cohibet & oculorum epiphoras cum polenta. Succus decocti tormina discutit. Et vrinis & hydropicis vtile: mouet & aridum stertutamenta. Fit ex eo oleum, quod sampfuchinum vocatur, aut Amaracinum, ad exalfaciendos emolliendosque neruos: & vuluas calfacit. Et folia fugillatis cum melle, & luxatis cum cera profunt.

Amaracum à Sampfuchino videtur distinguere Galenus, siquidem de simpl. lib. 6. Amaracon exalfacere non instrenuē, non valde autem desiccare, sed in caliditate tertii esse ordinis, in siccitate vero secundi tradit. Et rursus simpl. 8. Sampfycon vocat, ac tenuium partium, & digerentis esse facultatis ait: desiccare enim & exalfacere ordine tertio. Plura ex Galeno de Amaraco trademus mox capite de Maro.

Sâpsuchus
& Amarac-
us idem.

Sampfuchū

Sed Sampfuchi & Amaraci votibus eandem rem significari, testatur præter Dioscoridem & Plinium, etiam Marcellus, cuius verba hæc sunt. Nota omnibus in quotidiano sanitatis vsu Amaracus est. Eam communi appellatione Græci Sampfuchum neutro genere vocant. Et ex hoc Columella in hortulo suo dixit:

Grataque iam veniant bilari Sampfucha Canopi: cum tamen Lucretius & Maro alteram illam vocem, magis amauerint: Plinius eandem manifestè dixit esse Sampfuchum & Amaracum: nec certè differunt nisi diuersis diuersarum gentium nominibus. Vnum idemque ergo olus, Sampfuchum & Amaracus est: non idem tamen omnibus locis nomen, neque eadem vbique bonitas & vnguenti ex eo confectio. Cæterum Amaracus Siculorum linguâ à Cynaræ Cyprii regis eiusdem nominis filio dictum, quem in hanc herbam conuersum fuisse, fabulis proditum est. Seruius autem in primum Æneidos

(vbi molles Amaracus illum

Floribus, & dulci aspirans complectitur umbra.) scribit Amaracum puerum fuisse regis vnguentarium, qui casu lapsus, dum ferret vnguenta, maiorem confusione odorem creauit: vnde & optima vnguenta, amaracina dici ceperunt: hunc postea in herbam Amaracum fuisse conuersum. Hæc clariùs ita retulit Rausius Textor. Amaracus, inquit, ut Poeta fingit, filius fuit Cynaræ regis Cypri, qui quum vnguentarium Alabastrum quod ferebat, lapsus fregisset, tanto dolore intubuit, ut Deorum commiseratione in odoriferam eiusdem nominis herbam sit commutatus. Sed relinquenda Poëtis sua figmenta, dicendaque alia, in quibus præfati illud inuile non fuerit. Magni in plantarum historia referre, quos scriptores, & quibus temporibus scribentes aliquis sequatur, & quæ diuersis locis, iisdem aut aliis nominibus appellentur, obseruasse. Nisi enim id fiat, geminari aliquando & augeri in numerum continget, quæ vnum sunt, & quod idem natura, aut paullo diuersum vbique fecit: aliud videri, eaque ratione confundi intellectum, & misceeri rerum historiam. Quod in Sampfuchino hæc fit, in qua si Galenum, Dioscoridemque & Æginetam aliquis sequatur, aliud ab Amaraco videbitur. Siquidem omnes seorsum de vtraque egerunt, aliaque in medicina alterutri vires assignauerunt. Si Theophrastum, Plinium, Poetasque Latinos, Lucretium, Maronem, & Columellam, eandem cum Sampfuchino Amaracum esse, omnes intelligent, nec esse inter hæc nisi appellationis discrimen.

Confuso
authorum
de Sampfu-
cho scriben-
tium.

Cornarius Sampfuchum & Amaracum apud Dioscoridem, eandem quidem herbam esse concedit: sed non item apud Galenum, Aëtium, ac Paulum. Diuersæ omnino herbæ sunt, inquit, Galeno & posterioribus Græcis, Sampfuchus & Amaracus: &c.

E contra verò et si Galenus & Paulus Sampfuchi & Amaraci diuersis capitibus meminerint, Matthioli tamen Sampfuchum & Amaracum idem esse sequentibus ostendit. Quamquam ex Theophrasti, Dioscoridis, & Plinii sententia idem esse constat Sampfuchum & Amaracum: cum tamen Gal. & Paulus de his diuersis capitibus seorsim scripserint, eorumque temperamenta per gradus dissidere tradiderint, non abs re credidere nonnulli aliud esse Sampfuchum, aliud verò Amaracum. Quorum opinionem auxit etiam Dioscorides, quod in vnguentorum compositionibus Sampfuchinum & Amaracinum diuersis capitibus digesserint. Quod facile plerisque ad credendum induxit, has stirpes tum facie, tum viribus differre, hac ratione fretos, quod si alterum ab altero non distaret, omnino præter rationem de his variis in locis scripsisset Dioscorides, alterum vnguentum Amaracinum, alterum

rum verò Sampfuchinum appellans. Porro
 ut huiusmodi controuersia tollatur, sciendum
 est stirpem eam, quæ Galeno & Paulo Amara-
 cum appellatur, id sanè Amaracū non esse, quod
 Theophrastus, Dioscor. & Plinius Sampfuchum
 vocauerunt, sed potius, ut ego existimo, Marum.
 Namque Mari nec Galenus, nec idē Paulus quic-
 quam prorsus in simplicium medicamentorum
 libris meminerunt. Quare non deest suspicio,
 quin librariorum culpa in Galeno Mari titulus
 in Amaracum abiit: quandoquidem in eius tū
 gradibus, tum facultatibus assignandis Galenus
 à Dioscoridis Maro non longè recesserit. Ce-
 terum, licet Dioscorides Sampfuchini & Amari-
 cini diuersis capitibus per se meminerit: non ob-
 stat propterea, quominus idem esse possint Sāp-
 fuchum & Amaracum. Siquidem duabus de cau-
 sis ut alterum ab altero distingueret, Dioscorides
 facillè impulsus fuit: quarum altera est, quod si
 diligenter animaduertantur utrorūque com-
 positiones, utique Amaracinum tum multo o-
 doratius, tum Sampfuchino pretiosius iudicabi-
 tur. Ideoque Dioscorides, eò quod nolebat vn-
 guentum hoc apprimè nobile intactum relinque-
 re, quodque ob eius claritatem id particulari de-
 scriptione dignum censebat, ut præstantia disci-
 mē faceret, utque etiam minùs probatum à pro-
 batissimo dignosceretur, homonymiam immu-
 tauit: ipsūque non quidem Sampfuchinum,
 sed Amaracinum appellare voluit: nam si id nō
 fecisset, quodnam altero præstantius esset, dis-
 cerni non potuisset. Huc accedit alia ratio, quā
 alterum Sampfuchinum, alterum verò Amaraci-
 num Dioscorides appellauerit: quod in Cyzico
 Sampfuchum Amaracum appellabatur, unde
 hoc vnguentum insigne petitur. Ex quoniam à
 Cyzicenis ex eorum more Amaracinum vocaba-
 tur, talem nomenclaturam Dioscorides haud-
 quaquam permutandam censuit. Quare ipsum
 in eadem reliquit appellatione, quā secum ex
 Cyzico attulerat. Hactenus Matthiolus cuius o-
 pinio de Amaraco Galeni & Pauli, securi etiam
 Cornarii, omninò reprobata videtur.

Diosc. il-
 lustratur.

Matth. &
 Cornarii
 opinio re-
 probata
 Maro.

Cæsalp.
 Maro.

Quandam demum ex Sicilia in Italiam allatā
 sub nomine Mari, similem Serpillo recto: sed ra-
 mulis humi procumbentibus: foliis breuioribus,
 candidioribus instar Maiorana: flores inter fo-
 liola ferentem non racemosos, sed raros, Cala-
 menti modo purpurascens: odore totius plan-
 tæ valido, ac suauis, sapore feruenti cum quadam
 amaritudine, putat Cæsalpinus Sampfuchum
 esse apud Dioscoridem. Nostrā autem senten-
 tiā Sampfuchum, quod & Amaracum vocatur,
 nihil aliud fuerit, quā Maiorana duplex, de qua
 posthac dicturi sumus.

MAIORANA, VNA TENVIOR ET LI-
 gnosior, altera maiori folio ex semine nata.


Descriptio

A Donidis hortis, quos hæc ætas pensiles aut
 in fictilibus translatis excolit, notissima,
 fragrantissimi odoris Maiorana, fruticulus pal-
 mum, aut etiam dodrantem altus, alis creberrimis
 concanuis, iisque lignosis, plarumque qua-
 dratis, subhirsutis, & tantillam rubescentibus:
 folia ex aduerso posita sunt, Origani vulgaris for-
 mæ, sed longè minora, incanā lanugine obducta,
 odore fragranti, sapore acriusculo & subamaro
 aromatico & grato: circa caulis ramorumque
 fastigium ex foliorum alis, adeoque & in ramulo-

rum extremis imbricatæ spicæ oriuntur, quatum
 hirsuta squaminatim compacta folia è sinu pro-
 munt flosculi pusillos, albicantes, hirsutos, la-
 bello quadrifido, demisso, cui folium surrectum
 imminet, bifidum, & tictu stilum albidum profe-
 rentes.

Dodonæus & Lobelius duplicem Maioranam
 hortensem assignarunt, maiorem sc. & subinde

Maiorana
 duplex spe-
 cies. —



tenuiorem, ac
 minorem, o-
 dorēque præ-
 stantiorē,
 quam Itali
 Dodonæo te-
 ste *Perjam gen-
 tilem* nomi-
 nāt: Lobelius
 autem in Adu.
 Amaracum a-
 liam tenuiore
 gentilem, &
 minutam ple-
 becule: in
 Obs. pag. 265.
 Amaracum te-
 nuiorē [&
 sic etiam in I-
 con Pl. p. 498]
 & Maioranam
 tenuifoliam,
 d. liatiorē.

Anguillara quoque epist. 12. Maioranam vulgò
 cognitam ait, cuiusque duo genera tradit: nobi-
 liorem: alteram siluestrem: ambis in Græcia &
 Italia notas. Nos autem credimus Maioranam
 siluestrem Anguillaræ ad Originum aliquod ef-
 se referendam. Maior vocatur à Lob. in Adu.
 Amaracus vulgatiore, siue Maiorana nostras (ita
 etiam in Icon. Plant. pag. 498.) non Dioscoridis
 Sampfuchus repens, sed eius species in Obs. p. 265.
 Sampfuchus siue Maiorana.

Synonyma.

Creditur autem esse Veterum Sampfuchum à
 Fuchf. Corn. Harc. Lonic. Cordo in Diosc.
 Gesn. hort. Matthiol. Amaro, Roberto Const.
 apud Amatum, Turn. Brunfels. Ruell. & aliis
 plerisque.

Sampfuchus
 Veterum.

Negat contra Marantia, qui dicit: Si Samp-
 fuchum Dioscoridis ea planta sit, quā Maiora-
 nam vulgus appellat: quis non videt falsum id
 esse, quod de ea legitur, herba est per terram re-
 pens? aut si quis serpentem plantam pro Samp-
 fucho querat, quando eam adinuenerit? E-
 iusdem etiam opinionis est Dodonæus: ob eas-
 dem rationes: iisque subscribit Matthiolus cuius
 verba antè recitauimus.

Sampfuchus
 esse Veterum
 probatur.

Apollineum quod attinet, is, Rad. i. in Conf. A-
 loes, non admittit apud Galenum Amaracum
 idem esse cum Maro, imò Matthiol. reprehē-
 dit, & contradictione Brassauolum seipsum im-
 plicare credidit, quod fusè & doctè demonstrat,
 ut ex illo ipso loco videre est. Tandem conclu-
 dens, non eundem inficias, duplicem nobis ad-
 esse Sampfuchum, primam nobilem, suauius fra-
 grantem, minutioribus foliis, tenuioribus, cre-
 brioribusque cymis: secundam rudem, nullā lege
 excultam, hirsutiorē, minùs odoratam: per
 quam rudem Maioranam diuersam à Maiorana
 plantam, nempe Origanum Heracleoticum Ru-
 ellii, videtur intelligere.

Græcis vocatur *αμάρακος*, & *μαϊόρανα*, Lat. Nomina
 Sampfuchum & Amaracus, officinis & vulgo Ma-
 iorana

linguarum

iorana. Arabicè autem *Mezenius*, vel *Mercenius* nuncupatur, vt in Pandectario, vel *Merzanziū*, vt est in i. cap. ii. tractatū libri primi. *Abumeron* Auenzoar: vel *Marcanus*, vt est in Antid. eiusdem Abumeron, Monachis. Germ. *Mas-yoran* & *Meyran*. Belgic. *Maryoleyne*. Gall. *Mariolaine* & *Marone*. Ital. *Maiorana*. Hisp. *Mayorana*, *Moradux* & *Almoradux*. Angl. *Marieron*. Boh. *Marianfa*.

Sampfuchum deduxit Mich. Neander. phyl. part. i. *and rē dūm ē, lūgē*, quod sc. blandiatur grato odore animæ, quam mirificè suauitate temperati odoris reficere dicitur.

Locus & tempus. Maioranæ sunt mihi notæ duæ species, vtræque hortenses, vna quæ semine prouenit, qualem serunt Lugduni, Genevæ, Basileæ, in Burgundia, vt Clareuallæ, & Montbelgardi, quibus omnibus in locis satam obseruauī, semine allato ex Gallia Narbonensi, vel Prouincia. Hæc quidem Maiorana folia habet latiora, & nihilominus quotannis ferè perit, ea tamen si conseruari possit, tandem in arbusculas euadit, & surculosior, robustiorque fit, folia etiam minora, ni fallor, & candidiora redduntur: conseruanda autem in calidioribus regionibus in hortis, in frigidioribus reponenda. Quæ Montbelgardi furculis plantatur, & tenuior est, Hiemem perfert. Maioranam virentem vidi Patavii mense Ianuario & Martio adhuc in horto D. Muscati: Bononiæ etiam in horto di S. Saluator al burgo di S. Catharina. Libanius de vniuers. lib. 4. credit leui occasione transire posse Maioranam in Origanum & vicissim. Sed hanc metamorphosin nobis obseruare nondum licuit, quin harum similitudine, quæ multos decepit cum illusum fuisse potius crediderim.

Vires & usus. Excalfacit autem Maiorana & resiccac, auctore Dodonæo, & in vtraque qualitate secundi est ordinis: auxiliatur cerebri & capitis frigidis morbis, quouis modo assumpta. Puluis herbarum siccarum naribus inflatus, sternutamenta ciēt, & pituitam euocat, cerebrumque corroborat: sed idem etiam præstat foliorum succus naribus infusus. Valer ad pectoris vitia: stomacho præterea utilis est, ac iocinorosos, & lienosos iuuat quouis modo assumpta: sed & ad vteri flatus, ac cæteroseiusdem frigidos morbos confert. Vrinæ & aquosos humores in potu sumpta ducit, & menses mouet: dentium dolores lenit commanfa, aut apposita: admiscetur Antidotis. Oleum eius calfacit & corroborat neruos. *Sampfuchi* loco Tractatus quid pro quo semē Saturiæ indit. Et nunc cingunt tempora folia & flores Amara-cii suaue-olentis.

MAIORANA CRETICA ODORATISSIMA, quibusdam Marum.

Descriptio. Similis est Maioranæ vulgari, nisi quod folia minora, candidiora, odoris & saporis vegetioris, pertinacis, nec nisi longo tempore exolefcentis, per ramos tenuiores, quadratos, nullo digesta ordine: capitula hirsutiora, & candidiora, quàm in vulgari.

Marum Creticum. Maioranæ huius Creticæ albæ semen habuimus ab hortulano Ducis Florentiæ, pro Maro Cretico exhibitum, quod satum Montbelgardi in horto Ill. E. C. plantam, qualem descripsimus, produxit.

Hæc est Maiorana illa, ni fallor, quam Bellon.

Obslib. i. cap. 17. spontè prodire ait in Creta circa montem Ida, quæque incolis rusticis *Ma-therina* dicitur.

Maioranam Creticam albam assumpsit Lugduni Valerandus Dourez in suam Theriacam. Vires & v. Nec dubium est, quin ea omnia præstare possit, de quibus in præcedenti diximus genere.

DE MORO VETERVM.

CAP. XV.

Marum etiam olim herbam notam fuisse, patet ex Dioscoride, qui sarmentosam esse ait, flore Origano similem. Folia tamen huius multò candidiora, & florem odoratiorem. Vim habere Sisymbrio similem, subadstringentem, & leniter calfacientem. Vnde impostam nomas sistere, & in calida vnguenta amitteri scripsit. Nasci plurimam, iuxta Magnesiā à Tralleis.

De Maro Plinius breuiter lib. 11. cap. 24. ita tradit. In Ægypto nascitur & Maron, peius quàm Lydium, maiorib. folijs ac variis. Illa breuia ac minuta & odorata. Nec dubitandum sanè Plinium & Dioscoridem de eadem herba loqui: contra quàm falso sentiat Ruellius.

Galenus ac Paulus & Aëtius in simplicium censu Marum præterierunt. In Hedichroi verò compositione Mari drachmas duas recipit Galenus: Et lib. 1. de Antid. cap. 10. quales sint herbarum Marum & Amaracus aliquo modo declarat: eaque ab inuicem distinguit.

Ex prædictis itaque cognoscimus qualis sit herba marum, nimirum peregrina, apud Lydos iuxta Magnesiā & Tralleis nascens, inde etiam in Ægypto, sed deterior. Cuius ne nomen quidem ad officinas prouenit, & hæcenus saltem doctis cognita est.

Clinopodium Dodonæi, siue Mastichina, Marum dicitur, cum quo tamen nulla in re, vel ipsius Dodonæi iudicio, conuenire videtur.

Clinopodio verius siue Mastichinæ affinis planta, Matthiolo à Cortuso missa, in omnibus descriptioni Mari respondet.

Maioranā multi legitimam esse Marum contendunt, sed nequitiam par est id asserere.

Origanum Heracleoticum Ruellii est Marum Dioscoridis Lacunæ.

Clinopodium quorundam, siue Mastichinam Gallorum, sunt qui Marum esse contendunt.

Hermolaus in Dioscor. Coroll. 473. Melissam esse constituisse deprehenditur.


MARVM CORTVSI.

CAP. XVI.

Thymi durioris siue Mastichinæ instar densè fruticat, lignosis virgulis & incanis, quas vestiunt folia crebris geniculis, Serpylli folijs paria, Thymi foliolis maiora, subtus incana, superius virentia, sapore amaro & acri, odore grato. Chamædryos verè floribus par, nec figurâ quoque abudens, multifido demisso labello, galatæ locum supplentibus tortilibus staminulis, calyce quoque Chamædryos pari, villolo, incano.

Planta à nobis præfenti loco proposita videtur Matthiolo in omnibus respondere historiæ Mari, quam sententiam improbandam nefas duci.

ducinus. Meminit autem huius primò in post. cò. cum mag. fig. hist. germ. & Epitome, flores ei adscribēs subpurpureos, odore eximio fragrātes



Camer. quoque apud Matth. Marum inscribit, ac in Hist. ait, autoris [Matthioli] Mari pulchrum genus, ex calidis regionibus, potissimum ex Syria adferri, & hoc posse esse Maioranæ genus. Et hinc figuram habet ex Matthiolo, cui adiunxit ramum plantæ, quā miseram Gesnero, quæ multum differt à Maiorana. Sed & Tab. in Icon. & Hist. Mari Matthioli

titulo plantam hanc expressit.

Helenium
Crataegus.

Marum hoc Cortusianum, Tragoriganum alterum facit Lobelius. Apollo tertiam Maioranæ speciem. Ferrariæ mihi denominavit Anguillara pro Helenio Crataegus, sed sine ratione.

Locus.

Huius descriptionem aliquando cum planta sicca misit Gesnero Mari nomine, quo etiam mihi ostendit Cortusus Patavii, fruticosam plantā in olla excultam.

Vita.

Is referebat hanc herbā summè delectari feles, vixque ab eis tutam manere, ac eā comestā circumcirca illos semen genitale effundere.

MARINVM SVPINVM.

CAP. XVII.


Lobel. in Obs. pag. 266. vocat Marum supinum non ab simile [Maro dicto Mastichina] sed cauliculis repentibus. In Icon. Plant. pag. 300. Marum. Tabern. Icon. & Hist. Marum repens. C. Bauhin. Phyt. Maioranam repentem verticillatam.

MARO PLANTA PEREGRINA

odoratissima.

CAP. XVIII.

Descriptio.



Triginta etiam annis plantæ fragmenta habemus missa Valerando Dourez ex Italia, non meminimus à quo. Lignosi sunt caules, densa lanugine obfusi, in ramos oppositos diducti, folia è geniculis bina ex aduerso sita proferentes, tota tomentosa, Maioranæ satius foliis

paria, aut etiam paulò maiora, cinerei coloris, crassiuscula, odore fragranti, sapore vegeto, ad Camphoram accedente, sed cum gratia aromatica, acri, & subamaro.

CLINOPODIVM QVIBVSDAM,

Mastichina Gallorum.

CAP. XIX.



Maioranæ instar fricat, imò interdum in bicubitalem excrescit altitudinem, multis ramis brachiatum, per quos folia ad Mari Cortusiam folia accedentia, minùs cārida, paulò maiora, inter Thymi & Serpylli media, sapore acri prædita, minùsque ut mihi videtur amaro: ad nodos & in extremis ramu-

Descriptio

lis ex mucosis verticillis emicant st. senti albi: radix subest lignosa. Odor gratus cum aliqua grauitate.

Tragoriganum Dioscoridi, & Heracleum Origanum Plinio, collatis utrinque delineationibus, in neutro satis exactè designatis, ea erit herba, quam vulgus nostrum (inquit Ruell.) Mastichinæ herbæ cognomēto sene in hortis, frutice Serpylli vel Origani, coliculis ramisque non dissimilibus, foliis Samplici, flore paruo odorato in umbellam, in qua propendent incani hircorum villi, vnde dictum Tragorigani nomen existimo, odore Sampsi cho non cedit. Studiosèque nuper in hortis nostris cæpit serri, & ut nouæ rei, noui officinis indito nomine, quoniam lentore quodā interdum madescit, Mastichinam herbam ceperunt vulgò nominare, aut quoddā iucundum Mastiches spiret odorem. Quod pinguibus locis vbertate foli latius assurgit, latiore, glutinosoque folio vestitū, tunc Sampsiuchi folium representat. Si ieiuno prodeat sita, tenuius, foliis & colibus Serpyllum potius videtur æmulari. Alterum syluestrius, quod propter sepes nascitur, folio Sampsiuchi, multò maiore, caule sesquipedali, comante supra cacumen muscario, in quo flores emicant purpurei. Vtrumque iucundo odore placet & coronis inseritur. Sed hæc loci potius, quàm naturæ discrimina sunt. Hæc Ruellius de Mastichina Gallorum, quæ si noua res est & Tragoriganum, velim eum annotasse, vbinam locorum Alterum syluestrius prouenit, cuius discrimen potius loci, quàm naturæ.

Tragoriganum Dioscoridi. Orig. Heracleum Plinio Mastichina.

Mastichina curdica.

Tragoriganum alterum.

Ruellius idem.

Dodonæus Marum esse negat, & Clinopodium decernit. Clinopodium Dodonæi vocat Gesn. hort. itémque Maron Ollingeri. In cat. pl. Tragoriganum Dioscoridis. Rob. Const. apud Amatum Galeni & Pauli Amaracum, quam linguā gallicā Masti dici, ab aliis verò Marum esse Dioscoridis credi, refert, quorum tamen opinionem non approbat.

Clinopodium Dodonæi Gesneri. Amaracum Galeni.

*Marum
Lobelio.*

Marum tamen esse contendit Lobelius. Ait enim in Adu. p. 213. Marum, est *Mastic* Gallorum & Anglorum. Regi Thraciæ, cui nomen Maroni esset, sunt qui Mari herbæ appellationem acceptam tulerint: verum tamen potuit etiam ab Amaraco per apocopen dici: utpote cum Amaraci species videatur Marum, adeoque tantoperè affine, sit ut multi hodie Maioranam legitimum esse Marum in literis miserint: iidemque auli sint Marum receptum, siue *Mastic* Gallorum decernere Clinopodium: quæ tamen herba parum Clinopodio congruit: odor, sapor, & color Marum fatentur: eoque Galli vocant *Mastic*, quia odoratior & gravior est, quam *Origanum* aut *Sampsuchum*, uti Galenus vult Marum, libro de Antidotois. Idem in Obs. p. 265. in Icon. Plant. p. 499. vocat Marum, queritque an sit Helenum odorum Theophrasti. Figura autem eius est Dodonæi.

*Contra Do-
don.*

Sarilla.

*Helenium
Theoph.*

Huius meminit Clus. in Hisp. lib. 1. cap. 64. vbi ait: Tragorigani duo genera statuit Dioscorides, quibus perlimiles duas plantas vidisse memini. Vnam, Tragoriganum 1. (*Mastichina* Gallorum intelligit) quod Castellani Sarilla vocant, incanam omnino. Eadem in Hist. post. vbi figuram ex Lobelio proponit, hæcque præterea addit. Non desunt etiam qui Clinopodium nominent: plerique tamen pro Maro habent, aliqui Helenium Theophrasti esse augurantur, &c.

Apud H. Lugd. p. 884. planta nostra pingitur & describitur pro Maro vero quod Gallos præsertim *Andes*, & Cenomanos *Mastic* appellare perhibet. Ac denud describitur, sed sine icone p. 889. pro Tragorigano primo Clusii, siue Tragorigani Dioscoridis perlimili planta prima.

Vindicatur

H. Lugd. ab

inuria C

Bauhini.

C. Bauhini censura in H. Lugdunensem, iniqua quidem, vindicanda ac ostendenda. Marum, inquit, Matthioli p. 884. Tragoriganum Dodonæi p. 888. utrobique describitur. Tragoriganum primum Clusii, describitur denud, sed sine icone p. 889. nullà nisi in floris colore differentia: hoc candidis, illud subpurpureis, vel purpureis. Item Mari huius Matthioli descriptio reperitur p. 889. sine icone sub Tragorigano altero Penæ. En vnius herbæ figuræ duæ & descriptiones quatuor. Sed eni in iustam animaduersionem in H. Lugdunensem. Ecce duplicem lapsum leueri centoris C. Bauhini. Marum Matthioli p. 884. itemque Tragoriganum alterum Penæ, est Marum Cortusi. Tragoriganum verò Dodonæi, est Tragoriganum nigrius. Sævis ita credo censorem, Leonem stimulasse.

*C. Bauh.
duplex lap-
sus.*

*Maistrana
Mastichem
redolens.
Varietas.*

C. Bauhin.

Marut ab.

*Locus &
tempus*

C. Bauh. phyt. dicitur Maiorana 5. siue *Mastichem* redolens. Et hanc *Sampsuchum* Dioscoridis & Theophrasti credidit. Ludit foliis modò longioribus, modò rotundioribus, modò angulosis hederaceis, quemadmodum Luteriæ in horto Robini hortulani Regii se obseruasse scribit. Item: Tragoriganum 9. siue angustifolium primum. Cur separat Frater?

Tabern. vocat tam in Icon. quam in Histor. Marum, Amberfraut.

Clinopodium Dodonæi Luteriæ *Mastich* nomine mihi misit frater C. Bauh. Multis annis autem durauit Montbelgardi in horto Ill. E. C. ramulis propagatum, florens Augusto & Septembri, semen nondum maturuit apud nos. Lugduni colui in horto & Geneuz: Monspelii & Luteriæ, ac etiam Bisantii magnos frutices obseruavi. Floret autore Clusio, cum Thymo & Stachade multis Hispaniæ locis: prouenit solo arido

& petroso: nunc inquilina facta multorum hortorum, cum in Gallia, tum in Anglia, & Belgio.

FABREGVE.

CAP. XX.

Fabregne Gallis dicta, autore Oliuerio de Serres, odore quodammodò accedit ad Thymum, Satureiam duriores, & Serpyllum. Sed delicatior est, quam vel Thymus, vel Satureia, ideoque non nisi culta in hortis prouenit: seritur semine: tum plantulæ nouellæ Hieme transacta, semperque Lunâ crescente transplantantur. Hoc peculiare in hac obseruatur, quod valde gaudeat aquis. Nam & euulsa radicitus & in phialam vitream aquâ plenam immissa, radices spargit & emittit in ipsa aqua, ac haud secus nutritur, quam in terra, sed eâ lege ac ordine, ut phiala interdum Soli exponatur non aprico: Ita miraculo videas hanc plantulâ in humidissimo Elemento viuere ac nutriti, & radice ten⁹ per vniuersâ aquâ, ceu per terram diffundi tantâ tenuitate, ut eas vix per vitrum sit videre.

Nobis nondum constat quam plantam intelligat Oliuarius: lectores considerent, num conuenire possit cum herba *Mastichina* (siue Clinopodio) Dodonæo olim dicta.

OCYMVM VETERIBVS ET IN
genere.

CAP. XXI.

Theophrastus sparsim de Ocimo inter cætera hæc habet. Sementes hortensium, quibus feri singula solent, tres certè notantur, vna hyberna, alia æstiuæ, tertia quæ inter eas cadit post hybernæ solstitium, siue brumam, ac Ianuario incipit: quas ita appellant, non ratione satûs, sed ortûs, vniûsque cuiusque. Tertia verò, quam æstiuam appellant, mense Martio agit, quâ Ocimum, Satureia, &c. seruntur: germine etiam defigitur: nam hoc quoque transfertur, cum ad palmum, aut plûs quoque altitudinis venerit, dimidio abscisso: radix huic, ut Betæ, vnica data est, quæ crassa esset, altèque descenderet: ceteræ verò quæ de latere prætenues orerentur, admodum prolixè adhaerent: hæc quidem omniû radicum lignosissima est, sicut etiam caulis. Particulatim verò primum inferius, deinde cum ea defloruerit parte, florere superius incipit: unde sit, ut diutius istud floreat, ut Faba: semen cortice continetur: Lactucæ lanugine obducitur. Omnia seminis germinis que largè fecunda: sed fecundissimum omnium Cominum [Corn. vult legendum *in uirg.*] est. Peculiare etiam quod de hoc dicunt: imprecari namque & maledicere serendo oportere affirmant, quò lætius, copiosiusque proueniat. Soli expositum transit in Serpyllum, quod superaccedente licetate fit, &c.

Ocimum non describit Dioscorides. Ex aliis tamen locis colligi potest foliorum eius forma. Ocymoidi namque, Mercuriali, Heliotropio, Solano hortensi (huic tamen maiora & latiora) & Erino (cui minora & parte supernâ diuisa) *folia* tribuit Ocymi. Ergo qui vel Ocymoidem, vel Mercurialem, vel Heliotropion maius, vel Solanum hortense,

*Tempus se-
rendi.
Defigitur
et trans-
fertur.*

*Florendi
tempus.*

*Maledictio
serendo.*

hum hortense, vel Erinum nouerit, facile etiam Ocymi folia, qualia esse debeant, nouerit. Sed & Acino simile dixit, ita ut etiam hinc colligi queat eius forma & qualitas. Floris tandem effigiem Pyenocomi flores, quibus illos comparat, aperte declarant.

Ex Plinio. Ocymi quoque Plinius diuersis in locis mentionem fecit. Inquit enim lib. 17. cap. 22. quod in vinea feri Caro iubet, antiqui appellabant Pabulum, umbræ patiens, quod celerrime proueniat. Idem lib. 19. cap. 17. Nilil, inquit, Ocymo fecundius. Cum maledictis & probris ferendū precipiunt, ut letius proueniat. Satum etiam paucior terrā adactā, & qui ferunt, precantur ne exeat. Et sic quidem Cornarius hunc locum legendum putat. [*ὄκμιον* scilicet, non *ὄκμιον*, ut falsū voluere nonnulli: id etiam declaratibus Theophrasti ipsius verbis: quæ quamuis in contrariū trahantur sensum: præcipue tamen id demonstrant hæc verba apud ipsum Theophrastum repetita: *πολυκαρπὸν τὸ ὄκμιον*.]

Esse refert Fuchius qui significantius per x scribendum ducant Ozimum ab *ὄζω* quod redolere denotat, quoniam herba tota suauissimum spiret odorem. Ab eodem odore quoddam Basilicā & regia domo dignum sit, Basilicum hodie nuncupari solitum Ocimum garyophyllatum. Latine autem & Græcè rectius Ocimum quā Ozimum legi volunt Monachi: deriuantes forte à Græco verò *ὄκμιον*, quod valet citò, quod celerriter proueniat: vel propterea quod citet aluum habus, cum scilicet illis datur, ut purgentur: quod genus Pabuli sunt segetes virides sectæ antequam gerant siliquas.

Ocymi duo diuersa genera. Vnde duo constat esse diuersa Ocymi genera, alterum pabuli genus, alterum in hortis nascens: de quo ait Palladius lib. 5. cap. 3. Nunc Ocimum feritur, citò nasci dicitur, si statim quum seueris, aqua calida perfundas.

Remittam de Ocymo Martialis affirmat, quoddam modò purpureos, modò albos flores, modò roseos pariat. Et si ex eo semine frequenter feratur, modò in Sisymbrium mutetur. Theophrastus 5. de caus. pl. hoc, ut dictum, aliter narrat, & causam ad Solem refert.

Sunt autem Ocymi species multæ Cornario. Nam & magnum & paruum, & medium ostendit: & quoddam etiam siluestre. Et de hoc Ocymo Dioscoridem agere, & Galenum & simpl. dicit.

Ocymi quatuor genera. Serapio quatuor Ocymi genera videtur agnouisse: Videlicet, *Scorabram* cap. 73. de temp. simpl. quod Ozimum Carmenum & Basilicum garyophyllatum Simon Ianuensis interpretatur: estque Ozimum paruum. 2. *Berengemisch* cap. 156. quod Ozimum garyophyllatum transfertur, Isaac Eben Amram autore: 3. *Berendarog* c. 157. i.e. Ozimum non garyophyllatum, sed aliud commune, cuius meminerit Dioscorides in capite de Solatro domestico, cum dixit: folia habet coloris nigri, similia foliis Berendarog, sed maiora & latiora. 4. *Hamchim* cap. 175. quod etiam Amachim, & Amachim nuncupatur, & apud Romanos Selichi, & dicitur esse Ozimum domesticum, habens lata folia, nominarique in Seni Ozimum Nabathi: habere verò ramos virides quadrangulos: colorem floris esse album: semen Ocymi.

Nomina linguarum. Ceterum, *ὄκμιον*, & per o prima syllaba *ὄκμιον* Græci appellant: nonnulli etiam *ὄζμιον*: Latini Ocimum. Differt ab Ocymo, pabuli genere, quod ad dissectionem huius per o secunda syllaba

scribendum monet Dodonæus: sed & per u etiā hoc, & maxime odoratum scriptum reperitur. Recentiores *Βασίλικον*, i. e. Latine Regium & Basilicon: itēque Herbam basilicam & Herbā regiam quoque nominant. Germ. *Basilien* & *Basilgen*. Belgæ *Basilicom*. Galli *Basilicq.* It. *Basilico*. Hispan. *Albabaca*. Angli *Basil*. Boh. *Bazalifa*. Hung. *Bosolicom*. Germani præterea alicubi *Blumlein der lieb. h.e.* Florem amoris appellant: & rursus alicubi corruptā hanc latinā appellatione, *Flormor* ac etiam *Floramor*, quo tamen nomine propriè *Amaranthum* Viennenses Austriaci vocant.

Acquidocis Ocimi demum & Ocimastrī nomine sequentes plantas exhiberi nouimus. Ocimum odoratū sine Basilicum, cuius aliquot genera recensentur. Ocimum magnum, citratum communiter appellatum, & garyophyllatum. Ocimum medium vulgariū album & nigrum, Ocimum non garyophyllatum. Ocimum minimum, Ocimum Carmenum Monachis dictum, Serapionis paruum. Ocimum Sancto-Mauritanum, latum, crispum, maximum, maculatum. Ocimum Indicum maius, album, crispum, circinatum, Ocimum Indicum Clusii. Ocimum Aegyptiū longioribus, angustioribusque foliis, Rihau dictum. Ocimum garyophyllatum Monachorū, siue Acinon Columnæ. Acinon Fuchii. Menthā verticillatā aquaticā. Melissā quibusdam dicitur Ocimum citratum & Ocimum fluuiiale. Ocimum etiam dicitur Sisymbrium. Nasturtiū aquaticum. Ocimum aquaticum quorundā Herbariorum, aliorum Herbarum Lactoris, hoc eodē libro Scrophulariam maximam radice fibrosā inscriptum. Ocimum etiam dicuntur hæc: Chamæmyrsine. Scrophularia maxima. Hieracium Sabaudum. Etula dulcis. Noli me tangere. Et Ocimastrum verrucosum.

Planè verò explodenda videtur Loniceri opinio, quod non sine errore ridendo Fagotriticum, Ocimum esse firmiter existimet, cum pabuli genus sit, ut cap. de Fagotritico fusiùs hac de re disseruimus.

OCIMUM ODORATVM SIVE Basilicum.

Cordus in dispens. supra diamoschum dulcē Mesue, vocat Ocimum quoddam citratum; non Melissam, sed speciem quandam Ocimi, siue Basilici, odore Melissæ, aut Citreinali, cuius defectu Garyophyllatum hoc Ocimum sumi posse ait.

Tragus hunc in modum de eo disseruit. Tria sunt genera Ocimi, quorum duo satia sunt, ut quæ in hortis quotannis in Maio feri oporteat: tertium siluestre nobilissimum atque pulcherrimum, folia Amaraco similia, pauld tamen maiora, odoris suauissimi, præstantissimique. Itē alibi: Ocimum quoddam odoratissimum est & garyophyllatum cognominatur, Basilica est satia, seu nobilis, & à nobis capiti Dioscoridis ascribitur, quicquid dicat Marcell. Virgilius, qui Epimætron quo de Theophrastus lib. 9. cap. 8. & Acinum, vnam & eandem plantam esse iudicat. Ac tandem concludit Basilicam nostram diuersissimam esse ab Ocimo veterum.

Catol. Stephanus de re hortensi libellum conscripsit, in quo inter cetera Ocimum partim ad Lenticulam, partim ad Viciam referre videtur.

quā rectē ipse viderit. Suspiciamus, inquit post
fufam differtationem Monachi in Mefuem, hoc
Basilicum gariophyllatum esse Ocimastrum Diof-
coridis, quod 3. lib. describit, quodque Acinos, si-
ue Aconos & filueftre Basilicum ab aliis dicitur.
Diximus autem quod est in 3. libro, quoniam in
4. aliud tradit, quod est alterius herbarū genus.

Ozimi E-
tymon.

Elle refert Fuchfius qui significantius per Z
scribendum ducant Ozium, ab *ζω*, quod re-
dolere denotat, quoniam herba tota fuauilimum
spiret odorem. Ab eodem odore quod basilicā
& regiā domo dignum fit, Basilicum hodie
nuncupari Ocimum gyryophyllatum.

Satio &
cultura.

Ocimum, inquit Cefalp. quod vulgō Basilicū
appellatur quotannis semine feritur
post æquinoctium vernum inter æstiuā: nam
Hyemē perit: gaudet Sole & aqua: herba ad-
modum odorata: gustu subacris: recipitur inter
olera cruda & cocta & in condimenta: eius tria
genera magnitudine differentia communi om-
nium consensu habentur, vnum latifolium, al-
terum tenuifolium, & tertium medium. Diofco-
rides Ocimum tanquam vulgō notum non de-
scribit, ex attributis tamen videtur intellexisse to-
lūm illud genus quod lato folio constat, vt patet
in Ocimoide, Heliotropio maiore, Mercuriali,
Solano hortensi, quorum folia Ocimo compa-
rantur. Theophrastus cum ait Ocimum transire
in Serpyllum, videtur genus Ocimi pumilum
innuere. Plinius præter satyrum filueftre quo-
que tradit, sed cum neutrum describat in-
certum est quod filueftre apud ipsam sit,
nisi Acinum intelligit, quod Ocimastrum
appellari ait. Arabes quatuor plantas osten-
dunt, quas interpretes Ocimum vocant. V-
num Ocimum garyophyllatum, quod colligitur
mense Iunio. Hoc pumilum dicerem, nisi tem-
pus collectionis seminis obstatet: propagatur e-
nim in Autumnum, vt cæterorum semina. Hæc
ille. Considerandum autem an collectio intelli-
gatur de semine, an de herba: si de herba tempus
nihil impedire videtur in locis calidis, Iunium
mensem existimamus.

C. B. not.

Gesl. hort. Ocimi, quod vulgō Basilicum nomi-
nant, id est, Regium, maioris, aliud garyophyl-
latum & aliud citratum dicit.

Inquirendum quod vult C. Bauh. in phyt. an
Vattonis Ocimum idem sit cum nostro Basilico.

OCYMVM MAGNVM.

Descriptio



DVplo tri-
maius huic fo-
lium, quā
vulgari, oblō-
gum, raris cre-
nis serratum,
pallido virore
præditum, aut
rubrum, odo-
re suauis, Ci-
tri vel Garyo-
phylli, flores
spicati, albi vel
rubri.

An est hæc,
Basilica maior
Tragi. Quod
quidem ico-
nem attinget, ea
non male qua-

drareprehenditur. Descriptio autem eius,
quam ante posuimus, videtur esse Basilici medi.
Monachis in Mefuem commentantibus est O-
cimum citratum siue Basilicum, quod paucis no-
tum esse dicunt. Fuchfio verò & Tabernamontano
dicitur Ocimum Magnum.

Dodon. gall. eandem cum Fuchfio iconem ha-
bet [sub Ocimi maioris titulo, cui flores put-
pureos, ac etiam albos concedit.] Ocimum
inquit Matthiolus, quemadmodum odoratissi-
mum, ita & omnibus notissimum est. Namque per-
rare sunt vbique ediū fenestre, perraræque eorna-
acula, ac viridaria, quæ Ocimo non redolent,
vt pote quod frequens seratur, & foueatur in si-
gulinis vasis. In Italia hoc duo Ocimi tria ha-
bentur genera. Quorum primum (magnum)
foliis assurgit Amarantho longè maioribus, latis,
longis, ac crassis, citreæ malo similibus, à quorum
effigie ipsum facile vocauerunt Arabes Ocimum
citratum, quo modo ipsum Mefues nominat. Lat-
verò in tol. hoc titulo pingit Ocimum tertium
maximum.

Ocimum
magnum De-
don. gall.

Lobel. in Adu. vocat Ocimum maximum Ca-
ryophyllatum ac Citratum: Itemque Obs. p. 268.
in Icon. Plant. p. 503. (quibus in locis figura Do-
donzi.) Rarius istud ait, & regionum calidarum
amantius, cuius folia, cunctæque planta quadru-
plè maiora, odora, Caryophylli cum Citro con-
fusa iucunditate, semine, nec vlla sui parte alio-
qui diuersa.

Cultivatio
quædam
in. and
lecta.

Cum pleræque plantæ noctu vtilius irrigen-
tur, Ocimum tamen affusa aqua interdum & sub
Solis æstu proficere plurimum solet, vnde contra
aliarum plantarum naturam magis gaudet cali-
dā irrigari, quā frigidā, cuius rei doctissim. Co-
stæus hanc assert causam: An, inquit, quia imbe-
cilla sit planta? imbecillitatem enim id prodit,
quod nisi frequenter irrigetur, tabescit. At con-
tra tepor laxando corpora, imbecillitatem po-
tius auget, quā minuat. Neque Ocimi imbe-
cillitas ob caloris esse penuriam potest, in quo
caliditatem vigere insignis odor persuadet. An
ergo potius Ocimi imbecillitas ob laxitatem est
substantiæ, cuius causa, quia profusior sit innati
humoris dissipatio, propterea celeri quoque &
affidua opus illi est alimenti penetratione, hæc
autem sit beneficio teporis. Non est hoc pro-
fecto à vero dissimile. Sic ille lib. 2. de natura
stirpium cap. 9.

Idem perhibet Ocimum æstate tota in a-
qua non secus ac in terra, virere, florere, & se-
mina quoque interdum proferre, quod sanè ad-
miratione non caret. Refertur apud Carda-
num, Ocimum primā lunā tritum, & in ol-
lam nouam inditum, sub plenilunio ab altero
capite flores emittere: quod si duplicato tem-
pore sub terra defodiatur, strigiones generare,
cum aliis dictum sit scorpiones.

Libet hic inserere lepidam historiam de hac
planta Augustini Iustiniani Genuensis lib. 6. Frä-
ciscus Marchio Iuriconsultus missus à Genuen-
sibus Orator ad Ducē Mediolanensem, cum eum
non vellet audire, nec pactis conuenientis cum Re-
publ. Genuensi stare: Captatā occasione obtu-
lit Duci manipulum herbarū Basilici. Qui admi-
rabundus, quid sibi hoc donum vellet quæsiuit.
Cui ille respondet: Eiusmodi proprietatem huic
plantæ inesse, vt leniter & saauiter contrectata
præbeat gratum odorem, nimis autem duriter
compressa & attrita, tandem produceret scorpi-
os: atque ita simile esse ingenium Genuensium.

Dux


Dux ingenuoso hoc responso admodum delectatus, & sententiam priorem mutauit, & Legatum honorifice dimisit. Scorpiones autem sub hęcilibus, in quibus Basilicum colitur, libenter stabulari, sæpius Venetiis obseruatum. Ocimum incipiens putrescere fœtet, inquit Bodinus, absolutà verò putredine bene olet.

Locus &
Tempus

Ocimum siue Basilicum magnum Montbelgardi in horto Ill.E.C. prouenit duplex, rubrum & album. Ex Italia nobis attulit siccas plantas C.Bauhin. hoc titulo: Ocimum variabile Italix: in eo apparebant maculæ purpureæ. Cum summatibus albicantibus & rubentibus vidi Montspeli in hortis, & Genevæ florens Iunio: Basileæ adh. 10 Septembri.

OCIMUM MEDIUM VULGATIVUM & nigrum.

Descriptio



Dodranta-
lis est plā-
ta, pluribus ra-
mis stipata,
quadratis, non-
nihil rubenti-
bus, subhirsu-
tis: folia Pa-
rietariæ, mino-
ra, glabra, aliās
per ambitum
incisa, aliās mi-
nimè, ortu è
geniculis ad-
uerso, odore
fragranti, sapo-
re nullo excel-
lente: flores
verticillati, in
spicam longi-
usculam dige-
sti, suauolentes,

colore albo purpurascēte, labello longius-
culo, angusto, cui ex aduerso respondet sursum
vergens in quatuor lacinias diuisum folium, pro-
minētibus è recto staminulis albidis cum stilo
purpureo: radix lignosa, nigra, fibrata.

Synonyma

Exultimamus apud Tragum Ocimum hoc de
quo agimus hoc loco, dici Basilicum secundum,
quāuis icon videatur demonstrare magnum,
de quo antè.

Matthioli vocat Ocimum secundum, siue
medium, & Ocimum à Dioscoride descriptum,
Ocimum non garyophyllum Serapionis.

Duplex Lo-
bus.

Lob. in Adu. describit duplexque tradit, hoc
modo. Quāuis antiqui exculi, tum calamo
exarati, codices, vbique Ocimum, non Ocimum
aut Ozimum habeant: tamen quia herbula hæc
eximie odora cerebrum feriret, & iternutamenta
cieret, eam primulū Ozimum vocatam i. e.
odoram fuisse, naturæ & doctis assentiri par est.
Mirum enim quantæ fragrantia sit Ozimū Tro-
glodyticum, & quantæ syluestre nascatur iamdiu
notum est. Nec ocyus ceteris quamplurimis o-
titi certum: quare id Ocimum farragini legu-
minum tribuendum fuit. Ocymi autem vel O-
zimi, cuius varietates tres notissimæ vel mulier-
culis, quas odoris & oleris gratia in figulinis va-
sculis colunt aut in puluillis arcolisue viridario-
rum: frequentissimum autem Ocimum vulgare,
siue medium dictum, quod quidem duplex odore
habetur: vnum quippe vilius & abiectius, odo-
r. n. 111.

rem quidem spirat suauem, sed Apiastrum mistum:
radicem & cauliculos pedales & folia Mercuri-
alis, Parietarix, vel Agriorigani, sed nigriora mit-
tit: flosculis è caliculis verticillatim caulem am-
bientibus: semine pusillo nigricante, quadante-
nus Thlaspi. Alterum nullatenus distat, præter-
quā odore gratiore, & cordi amabiliore, qui cor-
ticem Citri mali redolet: idcirco citratum vocat
vulgus, non à Citri folio, vt falsò scribunt
quidam. Hæc ille, qui in Obi. pag. 268. in Icon.
Plant. pag. 50. Ocimum medium vulgatius pin-
git.

Ocimum hoc, quod Olicoribus medium est,
tertium facit Cæsalpinus idque Acinum esse non
dubitat.

H. Lugd. vnius plantæ duas proponit icones. H. Lugd.
Vni titulus p. 680. Ocimum medium Fuchlii. Et
huic sunt caules hirsuti: alteri Ocimum medi-
um Matthioli.

C. Bauhin. Phyt. vocat Ocimum 4. siue vulga-
tius, & Basilicum Brunfelsii.

Ocimum medium album & rubrum habemus Locus
Montbelgardi in hortis, etiam Ill.E.C. irēmque
Basileæ: est passim in Gallia & Germania vulga-
re.

OCIMUM MINIMUM.



Palmaris
aut paullo
maior est plā-
ta, ramulis cre-
berrimis ligne-
scentibus den-
sè fruticans:
per quos folia
Serpylli aut
Maioranæ fo-
liis paria, ex
oblongo rotū-
da, viridantia,
aut rubra, sapo-
re vegetissimo
& suauissimo
Garyophyllo-
rum: st. s. s. s.
exigui, verti-
cillatim per ra-
morum leuiss-
disponuntur:
radix fibrosa.

Descriptio

Nostra icon quæ sculpra empra minùs placet,
vt & aliæ plures. Fuchsius Ocimum exiguum in-
scribit.

Cordus in Dioscor. nobis videtur hanc intel-
ligere per herbam suo tempore, vt ait, omnimò
incognitam, quam Germani fraus Basiliensis vo-
cant, quāque Acinum, si non Ocimum garyo-
phyllum fuerit, ipse adstruxerit.

Synonyma

Trago, vt existimamus, in Hist. germ. dicitur
Basilica minor & Baccharis germanica, de qua
antè: Icon tamen non placet. Eidem in H. Lat. germ.
Ocimum primum, de quo vide antè.

Autor est Robert. Stephanus Acinum multis
putari, quosdam verò Ocimastrum dicere, h. e.
Basilic farrage, herbam hanc, quæ in quibusdam
Galliæ locis Ocimum minutum appellatur. Ast
nomen sylvestris Ocimo minuto non conuenit.

Est hæc Basilicum illud aliud, siue Ozimum
leptophyllum Monachorum in Mesuem conti-
nentium, quod vulgò Basilicum minutum
appellant: quandoque multi tenent esse Basilicū

Basilicon garyophyllatum ex eo, quod Serapio titulo de Ocimo gariofilato dicit: Et fons eius sunt parua &c. sed hi errant, & est potius Ocimum eius carmenum, &c. vide titulum, de Ocimo odorato, siue Basilico.

Errorum multorum Ocimi carmenum. Acinus non est.

Ocim. garyophyllatum Serap.

Monachi caput.

Monachi hallucinantur.

Acinus Diosc.

Matth. taxatur.

Ocim. minimum. Ocim. garyophyllatum minus.

Locus.

Sunt aliqui, inquit Matthiolus, qui Acinum eam Ocimi speciem existimant, quam vulgò [nos Itali] vocamus *Basilico gentile*: sed horum opinioni refragatur Plinius lib. 21. cap. 15. & cap. 27. ex quo palam fieri potest, Acinum non esse Ocimum tenuifolium. Idem rursus Ocimum tertium, quod foliis confert minutis atque angustis, sitque ceteris odore fragrantius, Italici vulgò appellatur *Basilico gentile*. Huius [sicut & ceterorum] meminit Serapio, vocauitque garyophyllatum, quod ceteris tum minutius, tum odoratius habetur. Idem videant quæso Patres illi reuerendi, qui in Mesuem commentarios scribere, quo iure, quæue ratione in El. de gemmis se iactent Ocimum garyophyllatum hac tempestate primos adinuenisse, cum hoc Serapioni foliis exeat paruis, & caule quadrangulati: Monachis verò foliis Melisophyllo maioribus, per ambitum serratis, & caule minimè anguloso. Qua in re eos, pace sua, apertè hallucinatos putauerim. Nec equidem credendum arbitror, quod de aliq. Ocimi genere intellexerit Mesues, quàm de tertio illo genere in deliciis habito, de quo dicimus. Nam cum ceteris odoris fragrantia præstet, nulli dubium est, quin in roborandis cordis ipsius viribus ceteris sit longè aptius, atque etiam præstantius, ut quod in electuarium de gemmis additur ad cordis affectus.

Amatus credidit Basilicon minutis foliis ornatum [ita vocat] Acinum esse. Cuius opinioni refragatur Rob. Constantinus.

Sed & Gesnerus eiusdem cum Amato sententia esse deprehendit. Vocat enim in cat. pl. Ocimaltrum, Acinum, & Ocimoidem ex quorundam opinione, quam non damnat. Idem de hort. Ocimi siue Basilici paruum genus, crispum, & globosum.

Lobel. in Advers. Ocimi minimi Amara ci figura, caryophyllati titulo describit (eodemque in Obs. p. 269.) & postea capite de Acino dicit: Quin Acino florem non negasset Dioscorides, Ruellius Ocimum, siue minus Basilicum, posse esse Acinum, non obstat. Theophrasti Plinique mutila historia, dixisset: Senentis hæc accipit, & quasi sua obstrudit, exprobatque doctis, nec interea lectori quidquam commodi molitur: explorè Ocimo illo minimo. In Leon. Plant. p. 504. appellat Ocimum minimum Garyophyllatum.

Crediderunt ergo, ut patet, recentiorum plerique temerius Ocimum Acinum siue Aconum esse: sed cum non hirsutius Ocimo solùm, quin etiam glabrescat, Acinum esse nequaquam poterit. Id verò quoniam Ocimum garyophyllatum existimant esse Monachi, suam profectò non agnoscunt incertiam. Quare caryophyllati vice, minutius Ocimum, succedaneum omnibus fiat: ne nos ipsos hisce implicantes, Brasavolo, ac Matthiolo similes, maius flagitium perpetremus.

Ocimum minimum vocat Camer. hort. album & nigrum. Tibern. Ocimum caryophyllatum minus. C. Bauh. phyt. Ocimum s. siue minimum. H. Lugd. duas figuras habet p. 681 vni titulus est, Ocimum caryophyllatum. Et hæc nobis valde placet: alteri titulus, Ocimum paruum. An Cæsalpini Basilicum nanum siue pumilum?

In horto Ill. E. C. Montbelgardii habuimus

Ocimum minus, ac alibi sepiùs etià obseruauim?

Traditis ita vulgarioribus Ocimi speciebus, superest ut earundem vires & usum adscribamus. Ocimum, ut tradit Dioscorides, copiosiore cibo oculorum aciem habet, aluum modicè, flatus mouet, urinam pellit, lac euocat: ægrè tamen conficitur. Illitum cum polline polentæ, aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est [græci cod. pulmonum vocem non habent, nec etiam Cornarius in versione sua expressit, sed eam redundare ait ad inflammationes additam.] Draconis marini & scorpionis ictibus per se prodest, & cum vino Chio oculorum doloribus (quæ aliter ex græco sunt intelligenda, Draconis ictibus, per se autem in vino Chio, &c.) Succus visus caliginem abstergit: destillationes exiccat. Semen potum conuenit atrabilem gignentibus, difficili urinæ, inflatisque naribus haustum subinde mouet sternutamenta, quod idem herba efficit. Sed oculos premi necessum est, cum sternutamentum vrget. Sunt qui in cibis abdicandum censeant: quandoquidem manducatum, & in Sole positum vermiculos creat. Aphri autem adiciunt, si feriantur à Scorpione qui Ocimum ederant, nullo confictari dolore.

At non solùm ut noxium in cibis, sed & ut in medicina inutile & perniciosum, Veterum quidam grauitè repudiarunt, quod declarat Plinius his verbis. Ocimum quoque Chrylippus grauitè increpuit, inutile stoma. ho. urinæ, oculorum que claritati. Præterea insaniam facere, & lethargos, & iocinoris vitia: ideoque capras id aspernari. Homin. b. quoque fugiendum censet. Addunt quidam tritum si operiatur lapide scorpionem gignere: commanducatum & in Sole positum vetanes asferre. Aphri verò, si eo die feriat quispian à scorpione, quo ederit Ocimum, seruari non posse. Quinimò tradunt alioqui manipulo Ocimicum caneris decem marini, vel fluuiatilibus trito, conuenire ad id scorpiones ex proximo omnes: Diodotus in Empiricis, etiam pediculos facere Ocimi cibum. Secuta ætas acriter defendit id esse capras, & scorpionum terrestrium ictibus, marinorumque venenis mederi ex vino, addito aceto exiguo. Vsu quoque compertum deficientibus ex aceto odoratum salutare esse: item lethargicis & inflammatis refrigerationi. Illitum capitis doloribus cum rosaceo, aut myrteo, aut aceto. Item oculorum epiphoris impositum ex vino, stomacho quoque vtile, inflammationes & ructum ex aceto dissoluere sumptum. Aluum sistere impositum, urinam ciere. Sic & morbo regio, & hydropicis prodesse, choleras eo, & destillationes stomachi inhiberi. Ergo etiam celiacis Philistio dedit, & costum dysentericis, & colicis Plistonius. Aliqui & in teneismo, & sanguinem excreantibus in vino, duritia quoque præcordiorum. Illinitur mammis, extinguitque lactis prouentum. Auribus vtilissimum infantium, præcipuè cum adipe asinerino. Semen tritum & haustum naribus sternutamenta mouet, & destillationes capiti quoque illitum. Vulvas purgat in cibo ex aceto. Verrucas misto atramento sutorio tollit. Venerem stimulat, idem etiam equis asinisque admixtura tempore ingeritur.

Auicenna etiam in libro de viribus cordis à Dioscoride dissentire videtur: scribit enim Ocimum sanguinem turbidum & melancholicum generare: quoniam superuacua humiditas quæ in ipso

Vires & Vfus Ocimi Dioscoridi.

Diosc. lecti depranata, Ex Plinio.

in ipso est, patit inflationem in venis.

Nec aliter videtur sensisse Galenus, cum ait. Ocimum ex secundo est ordine excalfacientium, habet autem secretamentitiam humiditatem, proinde nec commodum est, quod in corpus sumatur. Ceterum foris illitum ad digetendum, & concoquendum utile est. Et 2. de alim. Ocimo plerique ut obsonio vtuntur, ex oleo & garo elicitates. Vitrosi autem est succi, quod impurum quoddam, ut falsa de eo prodiderint, affirmantes quam celeritane paucis diebus scorpiones generare, si tritum in ollam ad Solem calefactum fuerit, quod falsum est. Verè autem dixeris olus stomacho esse noxium, prauisque succi & concoctum difficile.

A parte Dioscoridis videtur itare Simeon Sethi. basilica Ocima, inquit, olfacta cor & caput. Si aqua irrigantur, humidiora fiunt, & somnum conciliant. Semen eorum cardiacis affectibus succurrit. Animi inortorem ex atrabile ortum, in hilaritatem & læticiam mutat.

Ex sua & aliorum sententia ferè ad omnia ea ad quæ Dioscorides, commendat Serapio. Hæc inter alia habens. Quando reperit Hunaim aliquos ex antiquis Phycis dicentes, quod stringit ventrem, & aliquos qui dicunt, quod laxat, videtur ex hoc quoddam habere in se duas virtutes contrarias, sicut caules. Quando ergo inuenit virtutem expulsiuam forte in corpore, adiuvat ad fluxum. Sed quando inuenit virtutem retentiuam forte, adiut ad retentionem, idè quia in eo sunt duæ virtutes, sc. virtus laxatiua, & Riptica, sed ut sicut dictum est.

Scribit Brassauolus tantam de Ocimi viribus inter Plinium & Dioscoridem esse controuersiam, ut alterum ipsorum errasse dicendum sit. Quippe ex Aphris tradit Dioscorides, quod si à scorpione feriantur qui Ocimum ederint, nullo dolore affici. Contra verò Plinius ait, si eo die feriantur quispiam à scorpione, quo edierit Ocimum, seruari non posse. Qua in re lectiois impatiens deprehenditur Brassauolus, inquit Matthiolus, Plinius refragatur eorum placitis, qui Ocimum tam acriter damnant. Precipitem ergo Brassauolum appellat Matthiolus: quia tantam de Ocimi viribus, inter Plinium & Dioscoridem controuersiam esse scribit, ut alterum ipsorum errasse dicendum sit, propter eos qui à scorpione icti sunt: quod si patienter vniuersum Plinii caput expleuisset, cognouisset utique Plinium illorum sententiam refellere, quam in capitis initio proposuerat. Quantum autem impatiens, ne dicam temerarius (Apollinis verba sunt) eò magis caligauerit Matthiolus, Brassauoli verba penficutatius expendentes facillimè diiudicabunt, &c. Vides ergo, addit, in referendis Ocimi facultatibus non parum inter se dissentire Dioscoridem, Galenum & Plinium, ita ut vix pugnantes illorum sententias conciliare possis. Quare consultum erit ut hic, quemadmodum in aliis etiam, Galeni amplectaris opinionem, qui quodammodò inter hos medius interiectus, commendat exteriorem eius usum in iis, quæ *ὀνυχοῖς & διαφόνον*, i. e. cōcoctionem & discussionem desiderant: damnat verò Internum, ob excrementitium humorem, quo grauat & lædit interanea. Et ad hunc etiam scopum respiciens plerique alias Dioscoridis & Plinii contradictiones tollere poteris.

Ocimi vulgò dicti vires Tragus ita perstringit. Duæ nobiles & odoratæ Basilicæ hortenses virio & iniquitate scriptorum indoctorum penè in cōtemptum deuenere, idque eo nomine, quodd (ut illi affirmabant) non solum inutiles, sed & vten-

tibus noxiæ sint. Quæ sententia minimè recipi debet, quippe quæ erroris plena sit: nam qui ita sentiunt, Ocimum Catonis, cum hoc nostro confundunt, atque ita decipiuntur. Nostra enim Ocima garyophyllata, siue Basilica, temperatior est calfacientis, quamobrem facultatem obtinent resoluendi ac discutiendi, viscosos lentosque pulmonis & matricis humores, quare vtiliter vtrinque adhiberi queunt. Basilici herba viridis fronti alligata, capitis dolores sedat, idem præstat aqua eius distillata: siccata non aliter atque Amiracus & Rosmarinus in cibis vsurpari potest. Eadem masto imposita quouique deferbuerit, vinum odore & sapore iucundissimo commendat, utque Apianum, seu ut vulgò vocant, Museatellinum ferat, efficit. Basilicon vino decoctum, suspiriosis medetur, pellit inueteratam tussim, humoresque crassos discutit, mane & vespere potum, vnam ciet, menses proritat, uti Pulegium. In defensionibus & foementis muliebribus Pulegii & Menthe facultates obrinet. Semen per noctem aqua rosacea maceratum in succum album seu gummi quoddam resoluitur, quod præsentaneo est remedio, inflammationibus, excoriationibus, & aphthis oris, nec non labiorum scissuris & verrucis mammarum illitum. Sed & aqua non tantum omnibus inflammationibus oculorum, capitisque, igni etiam sacro, qui tumori mammarum & paduæ, idesse solet, iuxtillo est. Semen & aqua distillata sumpta, cor confortant, & aduersus Lipopsychiam faciunt.

Ex eorum genere, quæ sanguinis è naribus profluuiū sistunt, inquit Vesalius, est succus Ocimi maioris, in quo Camphora læuigata sit, & naribus ita immixtus. Sunt qui tradant Ocimi substantiam adstringere, succum verò laxare. Non autem videtur verisimile quod asserit Hollerius cuidam Italo ex frequenti odoratu basilicæ herbarum natum scorpionem in cerebro vehementes & longos dolores ac mortem denique attulisse. Sed vermes in cerebro generati Ocimo etiam non odorato apud omnes in confesso est.

OCYMVM SANCTO-MAVRITANVM, latum, crispum, maximum.



AD cubitalem altitudinem crescit, quadratis caulis, raris pilis vestitis C. Bauh. quos aduersi rami diuidunt: folia ex longis pediculis ad articulos circinata circumscriptione, ampla crispa, fimbriata, atro-virentia, aut rubro admixto maculosa, fragrantis odoris: flores Ocimo vulgari similes, verticillati, in spiram digesti, qui aurore C. Bauhino ex candido rubescunt: semen paulò maius, nigrum, ex rotunditate oblongum, foliaceis capitulis inclusum.

Doler capiti.

In cibis. Vinum odore & sapore commendat. Tussis inueterata.

Pulegii facultas.

Aqua.

Succus. Scorpio in cerebro natus.

Descriptio

Synon.

Est hoc, illa Ocymi differentia, sub nomine Basilici Indici, vel potius Hispanici ad Camerarium, ut ipse in horto testatur, ex Italia missa, serratis & crispatis foliis, subæruleis, unde crispum Basilicum meritis cognominatur.

C. B. not.

Columna vocat Ocimum exoticum foliis purpureis maculis infectis fimbriatisq. C. Bauh. apud Matth. Ocimum latifolium maculatum, vel crispum, à nemine pictum, elegantissimum, primū. Præterea in phyt. Ocimum latifolium Cæsalpini. Nos quidem existimamus Cæsalpino hoc Ocimum Indicum incognitum adhuc fuisse.

Locus & Tempus

Primo nobis Vesuntii visum ut & Argentinx anno 1593. antequam aliquid de eo à quoquam scriptum obseruauerim. Ex India autem in Hispaniam, inde in Italiam & Germaniam semen transmissum.

OCIMVM ÆGYPTIVM LONGIORIBUS foliis, Rihau dictum.

CAP. XXIII.

Descriptio

Ocymus, inquit Prosper Alpinus, in Ægypti Alexandrix viridatis copiosissimus crescit ad altitudinem trium & plūs cubitorum, foliis nostratis longioribus, tenuioribus, colore rubro suffusis, odoremque eximium spirantibus. Suauitate enim odoris nostris omnibus præferendus meritis videtur, ob quem illi hanc plantam *Rihau* appellarunt, quod idem est, ac si dixeris, odorem, ita ut hic Ocymus præ odoris iucunditate eximiam odor per excellentiam ab iis vocetur.

Rihau.

Vlus.

Ocymi garyophyllati plantam odoris causam iuvantur: medicos verò vltus apud eos ipsa paucos habet, qui aliis multis præditi sunt. C. B. phyt. vocat Ocimum 2. siue garyophyllatum maximum.

Ocimum Indicum.

Describit etiam ac depingit Ocimum Indicum Clusius, quod Germanicè primū anno 1590. innotuerit, ac reliquorum magna sit varietas.

CLINOPODIVM VETERIBVS.

CAP. XXIV.

Ex Diosc.

Clinopodium frutex est parvus, sarmentosus altitudine duorum palmorum. Nascitur in petris. Folia Serpyllo similia: flores similes læti pedibus, ex intervallis, Marrubio [ocymu] similes. Bibitur herba & decoctum ipsius, aduersus venenatarum bestiarum morsus, conuulsa, rupta, vrinx stillicidia. Ducit etiam menses & foetus. Pensiles quoque verrucas excutit per dies aliquot potum. Alium [ultima hæc in hoc capite secundum quosdam abundant, pro quibus in Veneta interpretatione hæc leguntur. Multis experimentis confessum super hoc frutice est ramulos eius ad tertias decoctos, ex vino albo mederi correptis furore: In quo non parum dissident: Istitit idem ad tertias decoctum & potum, non febrientibus in vino, febrientibus in aqua.

Clinopodium, ut legimus apud Plin. lib. 24. c. 15. alii Cleonicium [κλεονικιον, Corn. inter suppos.] alii Zopyron, alii demum Ocimoides appellant, Serpyllo similem, surculosam, palmi altitudine plantam. Nascitur petrosis, orbiculato florum ambitu, speciem læti pedum præbens: Bibitur

ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentum ictus. Item decoctæ succus.

Clinopodio Galenus 7. simpl. exalfaciendi vim adscribit, sed nondum adurendi: esse verò ait essentia tenuium partium, ponitque ipsam in tertio ordine tum calfacientium, tum resiccantium.

Plantæ quibus Clinopodii nomenclatura appropriatur, sunt hæc. Clinopodium quorundam *Aequiuoca* Origanæ facie, Clinopodium Matthioli alterum. Ocimois Fuchli: Acinos multis. Clusii Clinopodium Austriacum; nobis pulchra Acini species. Clinopodium quintum C. Bauh. quod inscribimus Ocimo similem Acinon Columnæ. Clinopodium Dodonæi, siue Mastichine Gallorum. Tragoriganum Matthioli. Satureia. Thymbra S. Iuliani. Polygonum tertium Cordi. Heliotropium. Herba orbiculata. Guiland. in Theone lapsus asserit Matthiolum in Clinopodio, ut qui perperam Ægynetae Betonicam exhibeat.

CLINOPODIVM QVORVNDAM, Origanæ facie.

CAP. XXV.

EX radice fibrosa plures emittit caules quadratos, lanuginosos, cubito altiores, ad quorum nodos folia nascuntur opposita, Origanæ vulgaris, minus odora, sapore quodammodo Saluix remissiores: flores denso stipatu verticillatim caules ambiunt, purpurantes, interdum albi, Calaminthæ, ex oblongis, gracilibus, villosis calyculis, odore longè minus vegeto, quam Calaminthæ.

Descriptio

Lobelio in Advers. & in Icon. plantar. Acinos. In Obs. p. 269. vocat Betonicam Pauli quorundam, Germ. wild Basilic/ Belg. wilde Basilicon/ Gall. Basilique sauvage, Hisp. Alhabaca saluage, Angl. wild Basil/ quæritque an sit Clinopodium Lacunæ.

An Cordo in Diosc. Cornar. & Riffio Clinopodium, Germanicè wibeldost, quod hic Herbam orbiculatam & Pulegium montanum vocari refert?

Matthiolum passim Clinopodium vocat, ac ait in editione anni 1554. & 1559. Nascitur vbique frequens, foliis non modò Serpyllo proximis: sed etiam montanæ Calaminthæ, quam maximè repræsentat. In comm. cum mag. fig. Duæ plantæ à quibusdam rei indagatoribus pro Clinopodio ostenduntur. Prima foliis exit Serpyllo haud ab similibus, latioribus tamen, caulibus quadrangulis, tenuibus & hirsutis: floribus purpureis, caulem verticillatim ambientibus: Hæc longè magis quam altera Clinopodium refert. Credi di legitimum esse Clinopodium. Verum degustata herba mihi à sententia recedendum fuit. Idem in Epit. Cum Clinopodium adeò tenuium esse partium (scribit Galen.) ut ex tertio calfacientium siccantiumque ordine habeatur, atque operæ pretium esse, ut quæ in huius censu sunt plantæ, aut gustu acres, aut admodum amaræ percipiantur: cumque neutra qualitas in Clinopodio, cuius imaginem dedimus, reperiatur, non ausim ego ipsum legitimum facere Clinopodium: Sed potius alterum. Ex his Matthioli dictis satis apparet, quomodo sibi constet cum suis iconibus sine descriptionibus: eius contrarietates erant olim in diuersis editionibus: nunc iunctæ sunt in editione Casp. Bauhini, qui apud illum

LaBipar.

**LEONARD
FOX AND CO.**

Lib. anth. re-
proch.

*stringens vt betonica. Calefacit, siccit, dige-
rendo modicè repellit. Caput & viscera robo-
rat. Additur in cibus. Menfes sistit, & partes
imbecilles confortat.*

Description

Math. in
constans.

Error
SchöGentk!

Polycarpo.

Leuc. 208.

Orig. film
Crag.

Niff Lard
eandem re
perit figu
ram
Climp.
Vulgare
Climp.
Climp. O.
rigans fi
male.

СЛР. XXVI.

Distanni
genera
tra Theo-
ph.

Distans;
triplex
Dis/c.

re carere ipsum Dioscorides existimauit. Quod si non in eundem errorem Plinium lapsum fuisse constaret, probabilior foret vetusti codicis illa lectio: *ὄντι δ' ἀπὸ τοῦ, ὄντι δ' ἔργον ἐκφέρει*, neque flos, neque semen exportatur. Sed ne quid temerè ausi videremur, vulgatam lectionem retinere maluimus. Stante demum Matthioli, Maranthæque lectionis Dioscorideæ correctione, in utroque eadem omnia deprehenduntur.

Ad appellationes quod pertinet addendum adhuc est: *Artemidium* sc. dici dictamnium à venatrice Dea Diana, quam Græci Artemidia vocant, quoniam vulnerata ab ea in venatione caprea & ceruæ eius herbæ pastu sanarentur. Quod erat numini in primis gratum sine maleficio & naturæ iacturâ studium, & voluptatem suam amanti. Eademque de causa *Dorcadion*, quasi certualem: dorcada enim Græci hinnulum, & in ceruorum genere minores vocant: quod animal Plinius ait Dictamnium hanc ostendisse, vulneratis eo pastu statim decidentibus telis. *Cretica*, vel *Cretica dicta* est, quia propria Cretæ insulæ est & non alibi nascitur. *Ephemeron*, i. e. Diarium, h. e. vnus diei. Pro *Eldia* Humelbergii exemplaria, *Aleæ* scriptum habent, unde suspicatur aliquibus immutatis literis legendum potius esse *Idææ*, quoniam in Idæ monte Cretæ plurimū nascatur. *Exbolion* dictum est, quod extrahendis telis sit conueniens & bonum medicamentum. *Dipsaci* appellatio huc importunè translata est. Similiter & ea quæ inter Latinas refertur, *Labrum* veneris. *Vitilago* dicta est, eo quod feruens & acri gustu minimâ portione os accendit. Verum exemplaria quedam non *Vitilago*, sed *Tusfilago* scriptum habent.

Fæminino genere Dioscotides veluti herbam: Theophrastus, plurisque alii neutro tradiderunt. Quæ generis mutatio multa in plantis est, non tam quia sexu aliquo à Veteribus disctæ fuerunt, quàm quia alterutro genere eas antiquissimis appellare placuit. Interposita siquidem n. litera Dictamnus non Dictamus dicenda est. Inditantibus id Græcorum codicibus, aliorumque omnium, qui fortè Dictamni meminerunt. *Dictamnus* vocem deriuat Cornarius *ἀπὸ τοῦ δίκτυον*: alii *ἀπὸ τοῦ δίκτυον* nos verò à monte Cretæ *δίκτυον* & *δίκτυον*.

Atabibus dicitur *Mescatremfir*, *Anegen Araba*, siue *Eari*, vt refert Serapio capite de Pulegio. Germanis & Belgis *Siptam*, nec recipienda est nomenclatura Golii, qui *wilden Poley* vocat. Gallicis *Dictam* & *Diptam real* nec placet dici, *Gingembre de sardin*: Italis *Dictamo* & *Dirramo di Candia*: Hisp. *Diptamo*. Angl. *Frensch Diptammer*, i. e. vt vult Lobelius, Gallicum aut Francum, non secus ac Germani *welscher*, exoticas & rartæ inuentionis plantas vocitant. Boh. *tremdaue*. Vlticinz pro Dictamno per e primâ syllaba *Diptamnium* per p legunt, leuissimè momento errore.

Quod reliquum est, Dictamni & Pseudo-Dictamni æquiuationes & substituta, ad amussim quoad fieri potest posthac trademus.

Et quia antè ex Veteribus recensuimus; quæ fuere Dictamna & Pseudo-Dictamna à Veteribus memorata, hic primo loco statuimus Dictamnium Creticum ab omnibus penè approbatum & receptum; de quo primo loco mox agemus; quodque in Creta nascitur, esse verum & genuinum.

Dictamnium Creticum, vbi aliis locis prouenit, dicitur Pseudodictamnium; vt apparet ex antè allegatis.

Tom. III.

Dictamnium adulterinum, siue Pseudo-Dictamnium Matthioli & aliorum, quod meritis improbatum ab Anguillara & Camerario, Gnaphalium Veterum existimamus.

Pseudo-Dictamnium, quod non modò in Creta, sed aliis etiam locis nascitur, vulgò; auctore bellonio Obl. lib. i. cap. 18. *Cremid. filis* nuncupatur.

Dioscoridis Dictamnium tertium non existimamus spurium & diuersum à Theophr. tertio, vt diximus antè.

Pseudo-Dictamnium, quàm Hispani auctore Amato, vocant Pulegium cætinum, quoniam est: Eius verba posuimus capite de Dictamno Cretica, seu vera.

Dictamnium Cretica altera, cuius folia Cressonis & flores odore Narentii, inquirendum quid sit: de ea vnâ cum præcedenti.


Patam abest quin Serpyllon suum alterum Tragus Dictamno accenseret, neminem tamen secum in errorem deducere vult. Quale hoc Serpyllum sit nos latet. Dictamni Cretici alterum genus, quod flores Origani siluestris gerit, qui dixerit esse agrestem *Hylsopum*, quam deseruit Tragus, videtur ipsi nequaquam a leop. o veritatis aberrare.

Mentham verticillatam videtur Lonic. lib. 5. c. 105. Pulegium siluestre appellare, ac hoc cum Dictamno turpiter confundere.

Fraxinellam, Polygonatum, Helleborum album, & Trifolium bituminosum sunt qui Dictamnium cognominent, sed perperam.

Dictamno deficiente substituitur Pulegium, Syluius, Fuch. & Coll. Florentinum: Syluius etiam Eleitphacum, (Saluiam vocat Fuchsius.) Radicem Gentianæ Placotomus. Partem mediam Sabinæ Thad. Dünus ep. 10. Verum non placet hoc substitutum: præferrem Pulegium.

DICTAMNVS CRETICA, SEV VERA.



Superiore
Staculo de-
siderata Dicta-
mnus Cretica,
nostro demum
innotuit iussu:
Est autem cau-
libus hirsutis;
nonnihil pur-
purascensibus,
ex quorum ge-
niculis aduersi
oriuntur rami,
& ex his eodẽ
ordine alii:
foliorum licet
quoque aduer-
sus, circum,
scripto ferè
circinata, in-
terdum oblon-
gior, vnialis,

substantiâ canescente tomento vndique obducta, aliquando in hortis glabra, odoris valida, saporis acris: capitula ramulorum extremis insidentia spicam mentiuntur longiusculam, è foliis Maioranæ ferè paribus squammatum compacta: quorum è sinu promuntur flores purpurascens, tubuli patuli forma, prominentibus ex

Bb

hiatu staminulis, calyci insidentes striato.

*Error officii-
natur.*

Iamdudum à doctis deprehensum est, nos verà Dictamno carere, & diuersissimam ab ea radicem (Fraxinellam autem verborum horum Cordus intelligit) in eius locum recepisse, quam magno errore Dictamnium nominamus. Constat vera Dictamnus Pulegii foliis, nostrà verò quâ pro Dictamno utimur, Fraxini folia habet, quæ longè à Pulegii foliorum similitudine recedunt. Vera Dictamnus etiam foliis tantum medicinam facit, radices enim liguosæ sunt, propterea rarus illarum usus fuit. In nostrâ verò solæ radices medicam vim habent. Dictamni præterea folia densa lanugine utrinque vestita sunt: nostræ autem folia omnino glabra cernuntur. Quapropter in Dictamno hæc valdè erramus. Ne autem calumniæ & conuicia audire cogar, quod à communi perfrustione recedam, indicabo vbi nam vera sit Dictamnus: Georg. Agricola primus in Germaniam Dictamnium veram attulit, cum ex Italia rediret. Vidit hic viuam Dictamnium cum Scordio in fœtilib. vasculis Venetiæ ex Creta allatam. Post hunc magnam illius copiam Olingerus Norimbergam Venetiis aduexit. Nunc autem quotannis magnæ eius sarcinæ ex Creta Venetiæ, & Venetiis Francofordiam afferuntur. Et tam graphice ab omnibus descripta historia caprimus, ut nō possit melius. Verum minime caule caret, ut Theoph. scribit. Minime etiam flore, ut Dioscorides putat. Habet enim purpureum florem. Quapropter hæc in parte potius Virgilio, quàm Theophrasto & Dioscoridi crediderim, qui caulem, & flores purpureos Dictamno tribuit. Sed vena dignos pronuncio, cum multæ herbæ quibusdam temporibus & locis neque caulem neque flores habeant. Non tamen id à proprietate illis ingest. Hæc à Cordo de Dictamno profertur. Fit autem meo iudicio iniuria Theophrasto, quod apparet consideranti verba eius. Pro Dioscoride opponitur à Matthiolo pro eodem legendum esse *cordus*, i. e. confert, & per consequens deprauatum esse locum in Dioscoride, ita ut illa negatio non tam partes, quàm partium facultates auferat, atque ita restituatur locus: flores & semen non conferunt, seu nullum usum præstant; ut Dioscorides idem cum Theophrasto sentiat.

*Theoph. &
Dioscorides
notantur.*

*Theoph. ex-
cussatur.*

Dictamnium vidi (inquit Turn.) in Anglia in horto D. Richesi: alioqui in Creta duntaxat spontè prouenit. Negat ei semen & florem Dioscorides: fortè quia tum vidit, cum semine & floribus careret: palàm enim est utrumque ferre tam in Anglia, quàm in Germania, locis Cretâ longè frigidioribus. Theophrastus Dioscoride antiquior, & Virgilius semen & fructum ei tribuunt. Damocritus ei quoque florem assignauit, ut in Galeno legitur lib. 5. de comp. med. per genera cap. 10. in emplastro ex Dictamno: Plinio Dictamnium non modò flore & fructu caret; sed etiam caule, quod tamen planè falsum deprehenditur.

*Matth. sa-
natur.*

Nescit etiam Matthiolum qua autoritate scripserit Dioscorides nec florem, nec semen proferre, nisi dicamus locum eius esse corruptum, ut antè declaratum. Cur quæso in com. Ital. cum mag. fig. omisa est correctio Dioscoridis?

Dubitarunt ut refert Anguillara multi an Dictamnium quod adfertur è Candia sit Dioscoridis, quia florem & semen ferret, quod opinioni Dioscoridis resistit, verum illum descripsisse testatur ut inueniret. Quod ad Pseudo-Dictamnium atti-

net, cum de eo nihil sciat, plura non dicit. Quod de tertia specie scriptum in Dioscoride est, adulterinum, nihil commune habere ait cum Theophrasti tertia.

Brassuolo incognitum fuisse verum Dictamnium satis ostendit id quod absurdissimè scribit: Folia habere similia Elleboro.

*Brassan.
not.*

Quum alteram Cretensem Dictamnium, inquit Apollo, folio Cressonis, & ad fenestras frequentem, Aurentiorum odore depingit Amarus, amentia soporissimum significat.

*Amar. Lap.
not.*

Dodonæus, qui in Hist. gall. descriptionem Dioscoridis tantum ponit, & iconem Dictamni adulterinæ, ait Dioscoridem contra omnem veritatem, flore & semine carere scribere.

Dod. notat.

Veri Dictamni radices an sint longo in usu, ut vult Palmarius de feb. pest. cap. 18. hætenus nō obseruari: radices enim quæ passim exuberant pro Dictamno sunt Fraxinellæ, cuius non vidi exhiberi aut præscribi folia, ut ille ait: quid si confundit duas plantas?

*Palmarius
notat.*

Videtur inscui Dioscorides Theophrastum eodem ordine & iisdem ferè verbis, de primo Dictamno, Pseudo-Dictamno & altero Dictamno loquens, paucis quibusdam immutatis, quæ oppositam sententiam significant teste Cæsalpino. Fortè autem Dioscorides plantarum partes exsiccatas, ut deferri solent, descripsit: & tanquam diuersum genus tradidit, quod Hieme collectum est, antequam fructum ferat, & quod Estate & Autumno facie diuersum, ut plerisque contingit.

Diosc. not.

Dictamnus Creticus, seu Cretensis Dod. gall. Lonj. Gesner, in cat. pl. Euchar. Rollin. Collegio Coloniensi, Casp. Bauhin. Clus. in Exot. & Camerario. Dictamnium Creticum Cæsalp. Dict. Cretense Matthiolo. Dictamnus Brasfelt. Cast. & Lacunæ. Dictamnium Matth. & Lobel. atque Columnæ. Dictamnium vetum Dod. in sol. lat. & H. Lugd. Dictamnus vera Cordo in Cordo in Dioscor. & Gesn. hort. Pseudo-Dictamnium Matth. Dodon. Lacunæ. Cast. Hist. Lugd. & Camer. Pseudo-Dictamnium florib. verticillatis Lob. Hic duplex inodorus & odoratus C. Bauh. qui Pseudo-Dictamnium verticillatum vocat.

Synonyma

In Creta solummodò prouenire Dictamnium Veteres tradiderunt, ut antè ex eorum verbis apparuit, id quod etiam asseruit Bellonius. Nunc autem quoque scribitur in Italiæ hortis seminibus è Creta allatis. Quin Camerario aliquoties creuit, & florem produxit copiosum. Nisi verò pangantur plantæ, raro, etiam diligenter asseruatæ per Hiemem, durant. Sarius igitur est ut surculis propagetur, qui in alterum annum florem producant.

Locus.

Dictamnium Creticum, ut inquit Dioscorides, præstat omnia quæ sativum Pulegium, sed efficacius multò. Nam non potum modò, sed & appositum ac fustum, partus emortuos eiicit. Auiunt & in Creta capras tela, quibus itæ sunt, huius herbæ pastu excutere. Porro purgandi vim habet illius, aut cum polenta affricus. Imposita verò herba plantæ pedum reliquæque corpori impactos aculeos religit extrahitque. Est & efficax ad lienis dolorem: siquidem ipsum immittit. Legitur autem Estate & Autumno. Radix gustu exalfacit, nec non & partum accelerat. Sed & succus cum vino porus contra venenatorum morsus auxilio est. Herbæ verò tan-

*Vites
Vitis.*

Partur.

Purgat.

ta vis est, ut ichu venenato seuientes bestias & olfactu abigat, & contactu perimat. Cæterum expressus ex ea succus, vulneribus ferro illatis aut venenatis moribus instillatus præsentaneo est remedio, si præterea in potu assumatur. Pseudo-Dictamnium minus quam illud acre, eisdem præbet effectus, at ineticaciùs. Alterum Dictamni genus ad eadem, ad quæ & antè dictum est, sed minus nares ferit. Miscetur & emplastris ac theriacis compositionibus. *Et hæc Dioscorides.*

Temperat. Hipp. Dictamnū, Galeno auctore, tenuiore essentia constat, quam Pulegium, cætera illi simile. Hippocrates ad secundas remorantes, inter præstantes quas nouit medicinas, ponit Dictamnium. Eundem propinat ex vino ad molam expellendam. Quin & ad duos obolos tritum ex aqua calida ad accoletandum partum bibere iubet.

Stranguria. Plinio autore strangurias discuti Dictamno certum est. Sed & potum sagittas pellit, & alia tela extrahit illitum. Bibitur ex aquæ cyatho foliorum obolus. Proximè Pseudo-Dictamnium. Vtraque etiam supputationes discutit. Et aliquando potest ait. Sed præcipua Dictamni vis est, menses ciet, patus mortuos vel transuersos eicit. Bibitur ex aqua foliorum n obolus: aded adhuc efficax, ut ne in cubiculum quidem prægnantium inferatur. Nec potu tantum, sed & illitu, & suffitu valet: proximè Pseudo-Dictamnium. Sed menses ciet cum mero decoctum pondere denarii. Et in fine cap. 15. lib. 26: Dictamni folia præclare dantur ex aqua. Constat vel oboli vnius pondere: vel si mortui sint in vtero infantes, protinus reddi sine vexatione puerperæ. Similiter prodest Pseudo-Dictamnium, sed tardiùs.

Democrit. Hipp. Lud. Bonaciolus nimium extollit Dictamni vim Plinium secutus: quis enim crederet transfertum sætum posse expelli eius facultate, vel abortum ciere, si in cubiculum inferatur?

Historia. Thadæus Dunus mulieri, quam morituram omnes arbitrabatur ex sætu mortuo post alia medicamenta, in balneo sedenti, dedit pulueris foliorum Dictamni Cretici obolum ex aqua fontana: quibus peractis sperauit illa, ut ait, rem ex voto successuram: omnia enim ad imum ventrem vergere videbantur. Eâ nocte satis commodè habuit, sed non dormiuit. Ante diluculū mortuum sætum feliciter expulit. Et facile quidem Dictamnium sumitur, cum alia, quæ sætus mortuos expellunt, vel nimis amara, vel ferentia, vel nimis acra, vel stomacho inimica sunt, & aliquo modo nocere possint.

Facile sumitur.

GNAPHALIVM VETERIBVS.

CAP. XXVII.

Gnaphal. Diosc.

Gnapthalifoliis albis, mollibusque pro tomentum utuntur. Efficaciter autem ad dysenteriam in vino austero propinantur, inquit Dioscorides.

Inter spuria sunt qui Iren, qui Ampe-tocon, qui Anaxiton, qui Anaphalida, appellant: Aegyptii Semeon, Galli Gelasinen, Romani Centunculum, siue Centunculem herbam, & Marcellus Tomentum vocat.

Antequam, inquit ille corruptis amplioris fortunæ veneno moribus cœpissent homines molliter & lasciuè agere, non auium plumis, aut ouium lanis strato cubili dormiebant. Sed, quod Lucretius ait, & frutices inter condebant squalida membra, circum se foliis & frondibus inuoluentes, etantque illis pro culcitratum tomento, Tom. III.

quas Aestas & Autumnus herbas & frondes passim strauerant, præsertimque Gnaphalion hoc; Græcis ab eo usu sic appellatum. Græci enim γνάφαλον inter cætera tomentum vocant: sic ipse in Dictamno dixit, folia γνάφαλον, quasi tomentitia. Sed de vocè Gnaphaloide, Gnaphalio simili vide plura cap. de Dictamno.

Plinius lib. 27. cap. 16. Gnaphalion aliis Chamæzelon [Chamæxilon Lob.] vocari author est: folia tomento similia esse: dari in vino austero ad dysenteriam, ventris solutiones, mensesque mulierum sistere. Infundi autem tenefino: illisque putrescentibus vlceribus.

Chamæzelon Chamæxilon.

Gnaphalio idè sic nominatum esse, quod foliis eius mollibus ἀνὴ γνάφαλον; h. e. pro tomentis vterentur, perhibet etiam Galenus, qui ea candida & mediocriter adstringentia dixit.

Multas plantas Gnaphalia, Latinis Centunculos vel Centunculares herbas dicti; Herbarii nuncuparunt, quod molli lanugine, seu lana, vel tomento essent obuolutæ: (γνάφαλον enim est tomentum.) Et quidem primò Dictamnus, & Pseudodictamnus. Gnaphaliū marinum: Gnaphaliū pulchrum Alpinum: & id genus quod Leontopodium dicitur. Gnaphaliū Germanicum & ei affine. Pseudo Leontopodium. Gnaphaliū minimum quorundam, minus Tab. & Hort. Lusit. Filaginis species tercia Dodonæi. Stœchas citrina altera inodora. Gnaphaliū vnico cauliculo. Gnaphaliū umbellatum minimum. Gnaphaliū Americanum. Gnaphalio congener Hosteoelon Bononiensiu. Pilosella minor: Bombax: Alga: Scorba: Siliqua Syfiaca.

Gnaphalia plura.

DICTAMNVM ADVLTERINVM QVI-
bukdam, verticillatum, vel potius
Gnaphaliū Veterum.



Placet Cæsalpini descriptio quæ sic habet. Quædam ex Creta ad nos allata est pro Pseudo-Dictamno: cespes amplius, virgis numerosioribus, altioribus & candidioribus Matrubiis: foliis rotundioribus, minoribus, similibus, Dictamno Cretensi, obsitis candidiori lanugine, gustu subama-

Descriptio Cæsalp.

ro, odore exili, non inincundo: verticillos inter folia fert molles, in quibus flosculi sunt purpurascetes.

Cæterum, planta quæ nunc vulgò Græcis γνάφαλον dicitur, non potest esse Pseudo-Dictamnium, ut aliqui volunt: reclamant enim odor & sapor, ut rectè annotat Anguillara, cui lubentes assentimur.

Calceimphora.

Dodonæum aliud à Pseudo-Dictamno Matth. depinxisse & descripsisse vult H. Lugdunensis. Et

H. Lugd. ner.


B b a

quamvis icon & descriptio Dodonæi nonnihil variet à Matthiolo, non propterea aliud statuimus, sed varietatem à loco & cultura dependere dicimus. Atque Matthioli Gnaphalium, Dioscoridis Gnaphalium non esse cum Siluærio Tedeschino insigni botanica & Honorio Bello statuimus.

Locus.

Pseudo-Dictamnium vidi Patauî Februario & Martio mense in horto publico; Ferrariæ in horto Monasterii S. Dominici à l'Angeli plantas varias. In horto E.C. Montbelgardi per Hiemem reponere solebam multis annis durans florensque, sed semen non maturans: surculis facillè propagatur. Lobelius audiebat à quibusdam Italis in monte Nigro dicto, Pise & Liburniæ contermino, & aliis locis maritimis nullo satù oriri.

ZATARENDI HERBA.
CAP. XXVIII.

Descriptio
foliorum.Vires &
vires

Herba parua, quam Egyptii Zatarendi vocant, quod ex India illuc comportetur, Alpino autore foliis est crassis, rotundis, albis, succo plenis, odoratis valde.

Multi ut Origani siccatum pro obsonio comedunt. Audiuit author Alpinus multis ad tussim, spirandique difficultatem & ad prouocandam

ut nam ac menstruas purgationes in usu esse.

PVLEGIUM. CAP. XXIX.

Descriptio



Impertuno repertum quacunque terra attingit è cælium quadartorum hirsutorum dodiatum geniculis demissis fibris radicatum luxuriat, longè lateque subiectum solum opacans: filamentum ex articulis est exortus, ad Origani folia accedentium, minorum, odore cum suauitate graui, sapore

feruido: quadripartitorum florum verticilli purpurascens breuibz interuallis longè ipicataque ferre caules & ramos coronant subiecta vique foliorum coniugatione vna.

Pulegium, ut herbam vulgò notam, non describit Dioscorides. At cum Dictamno iam satis noto, folia tribuat Pulegii, sed maiora: ac rotunda sint Dictamno folia, eiusmodi quoque fuerint Pulegii. Etsi autem Pulegium vulgare florem gerat purpureum, alterius tamen meminit Plinius flore albo: illud feminam appellat, hoc marem, de quo post agemus.

Pulegium

Vulgatum hoc Pulegium, regium nominatum immeritò respuunt publici Censores, & rationis ne micam quidem addunt. Dubitauerunt etiam Recentiorum nonnulli utrum vulgare Pulegium legitimum sit Pulegium, nec ne; quod, ut dictum, ob eius vulgarem notitiam nullis foliorum florumue notis eius faciem tradat Dioscorides: Non desunt tamen rei herbariæ periti qui velint Pulegium vulgaris vsus, Dioscoridis Aliorumque Antiquorum esse Pulegium. Hocque argumentum nituntur: quod non modò experientia compertum sit, vulgare pulegium omnibus iis viribus esse præditum quas suo tribuit Dioscorides, sed quod etiam Pliniana Historia maxime respondeat. Quapropter eos aperte hallucinari vel Matthiolum crediderit, qui Pulegium communis vsus, vnam vel alteram Calaminthæ speciem esse contendunt. Quin & illud Pulegium nostrum legitimum esse ostendit, quod solum sit Cretensi Dictamno simile, cui forma Pulegio similita reddidit Theophrastus, ut etiam Dioscorides, qui tamen illa maiora fecit.

Gerardus nescio cur pro hoc Pulegio iconem proponat Pulegii Matthioli Tabernamontani, tunc ceruini, quasi et incognitum sit Pulegium vulgare.

Gerardi
error.

Græcis dicitur *Γαίαν, γάϊαν, γάϊαν, ἢ γάϊαν* & *μάϊαν*, Latinis Pulegium. Sunt tamen qui Blechona, qui Ansenicanthon, qui Galioptin vocent, Poludon & Henithon in Nothis. Aliis Pantagathon [omnibona] dicitur, aliis Dimorón, Ciceroni & Colamelle Pulegium. Martiali Pulleu: Aphri Apuleiu, Galli Aluolum (Abuolū Lonic.) Mauritanii *Alnam*, *Alnegeu*, seu *Alnegeu*: Germani *Poley* & *herzoley*: Belgæ *Paley*: Galli *Poultu* & *Pulego*: Itali *Pulegia*: Hesp. *Puleu*, & *Puleu*: Angli *Peuy royall* / *Puholl royall* podang grasses & *Orgauye*: Hung. *Chombor*, *Bözüeny menta* h.e. *Podagaria Menta*.

Nomina
linguarum

Pulegium autem dicitur à pulcibus, quod flos eius recens incensu, eos nidore suo fuget & interficiat: Blechon græcè quasi balans herba, eò quod ut tradit Apuleius, balantum animalium floris sui tempore sit paleuola. Plinius tamen & Dioscorides aliam reddunt rationem, utpote, quod gustatum à pecore, quum floret, acris & peramaro gustu, ei balantum quamprimum concitet & extorqueat. Vnde quidem Græci literas mutantes Blechon, quasi Giechon vocauerunt. Hinc igitur *μάϊαν* non è factum illi: nisi etiam, ut vulgò Lobelius, sit, quia è pulmonibus pituitam crassam farctamque extrudat.

Podagra-
ria Men-
Pulegium
pulegi de
Anm
Blechon.

Locus gaudet palustribus, & quæ hybernis mensibus rigantur, incultis tamen. Iulio & Augusto floret, & tunc quidem colligendum. Pulegium germanicæ mulieres in hortis ferunt, ac etiam in huiusmodi vasis fouent diligenti admodum cura, suis affectibus eo consulentes. Vbi latius tota coma conspiciatur, & secundo Calaminthæ generi

Locus &
Tempus

(hanc enim illi assimilauit Dioscorides) folio simile: acerrimo gustu, quadantenus amaro.

Tota planta odorata est, & gustu acris, non sine quadam amaritudine. Quo magis mirum vulgare istud Pulegium à quibuldam pro legitimo respui & secundam Calaminthes speciem haberi, cum omnibus facultatibus, iisdemque efficacissimis præditum sit, quas Dioscorides Pulegio suo tribuit. Extenyat, inquit, calfacit concoquit: potum menses, secundas, foetus eiicit, educit & ea, quæ in pulmone hærent, cum Aloë & melle potum (non μετ' αλός sed μετ' αλός hic legendum vult cum Plinio Cornarius) & conuulsis auxiliatur. Nauseas etiam & stomachi rosiones siue morbus cum posca potum mitigat. Acræ bilem per Aluim educit. Cum vino potum venenatorum moribus succurrit: defectos animo cum aceto naribus obiectum recreat. Siccatum & in puluerem tritum, crematūque gingiuas firmat. Illitum cum polenta inflammationes omnes mitigat. Podagris per se confert, vsque dū rubescat cutis. Cum cerato varos tollit. Lienosis cum sale vtiliter illinitur. Decoctum eius pruruges, si co lauentur, sedat. Inflationes, duritias, & conuersiones vuluæ in deflectionibus sedat. Eundem vsum ei cum Diosc. tribuit Plinius.

Ex Galeno amarum, valde tum calfacit, tum extenuat. Porro quod calfaciat abundè, magnum est testimonium, quod illi rubore tingit, & si quis diutius roleret: exulcerat quoque. Extenuare satis indicat, quod humida, crassa, lenta, & ex thorace & pulmone excreta facilia reddit, & menses mouet.

Simone Sethi. His assentitur Simeon Sethi, dicens: Pulegiū attenuat & calfacit vehementer: quapropter in humidis & crassis auxiliatur, & in pulmone humida glutinosaque detergit, & ut excreentur, efficit. Cum vino albo coctum & calidè potum, menses prouocat. Extrinsecus illitum ischiadicis, & aliis partibus frigore affectis auxiliatur. Io. de Monte. Expet. Pulegii puluerem sapius sumptū ieiuno ventriculo, cum aequalibus partibus aceti, mellis & aquæ, repurgare vetriculū ac oculos clarificare refert. Pulegium exilimatur apud Bapt. Cōdrōnchium, ex aceto tepido potatum, & naribus etiam appositum, loquelam amissam statim restituere.

Oculus clarificat.

Loquelam restituit.

PVLEGIVM MAS PLINII CAP. XXX.



Foliis ut illud Sisymbrii, aut Origanii, toto caule ex interuallis cum floribus verticillos alterius planè modo constātib: vires, odor prorsus eadē. In via quā Riuolo Taurinum itur ad agrorum margines obseruauit Matthioli.

Hoc est Pulegium illud masculinum flore albo, quod Apuleius Leucanthō, Albiflorum vo-

carit. Est Pulegium mas Plinii Lobelio in Icon. Blant p. 301. C. Bauhin. Phyt. Pulegium 2. siue latifolium alterum. Castori p. 381. Pulegiū. Gerardo Pulegium mas. Cur autem is proponat iconem Pulegii Cretici Tabernamontani, siue ceruini pro mare hoc, nos latet.

Gerardo ceruini.

PVLEGIVM CERVINVM AN- gustifolium. CAP. XXXI.



Frequentes proterit virgæ, teretes, tenues, subrubettes, geniculatas, pedem longas & maiores, modicè erectas: si hæc ex geniculis aduersa exeunt, Satureiæ, nonnunquam tantillū dentata, odore efficaci vulgaris Pulegii, sapore feruido & mordaci: *florū* verticillati globulis, virgæ rotundæ fastigia

ad nodos oriuntur, colore dilutè caruleo, quorū singuli quatuor foliis constant, è quibus staminula emicant floribus concoloria: *radix* adultior lignosa, multis tenerioribus, albicantibus, Gratiolæ radicem asparagis aucta, fibras summo cespice vagantes promittit.

Pingitur planta à nobis descripta à Lobelio in Adn. & 301. hoc titulo: Pulegium angustifoliū, siue ceruinum Monspelienſium odoratius. Ab H. Lugd. pag. 392. Pulegium ceruinum. C. Bauh. Phyt. Pulegium 3. siue angustifolium.

Tabern. Pulegium Creticum, Rosmarin Posley. Compiler ponit duas figuras, ut & Gerardus, quod non placet in plantis quæ, ut in descriptionibus earum habetur, magnitudine sola differunt.

Monspelii spontè prouenit, florens Autumno prope Aigremont & quā itur Perous. Basileæ florens vidit in horto Felicis Plateri mensis Iunii principio. Montbelgardi in horto Ill. E. C. Augusto: Tiguri in horto Gelsneri Iulio. Facile autem crescit, si sub Hiemem ramuli in terram curvantur & obruantur. Tamen si Narbonæ Monspelii sit ubique obuium, & nulli non cognitum, in luco Gramontio pone cænobium, & in primo aditu ad lutosas scrobes, inquit Lobelius, tamen haud temerè facile occurrit in Italia, Germania, aut aliis Galliæ regionibus.

Hoc etiam magna vulgaris Pulegii copia suppetat, pharmacopœis Regii & Monspelientes Professores accipiendum imperabant, quod viribus, sapore, & odore, multò quàm alterius, gratioribus, vehementioribus & probatioribus esse dixerint. De viribus Pulegii Cretici & Massiliotici nihil particulare scripserunt authores, verum eius vsum esse, qualem Rosmarini Tabernamontanus voluit. Sed si cōpilatori notum fuisset hoc Pulegium, non tribuisset vires plantæ valde differentis.

Locus & Tempus

Vires & sus

ACINOS VETERIBVS ET IN
genere.

CAP. XXXII.

Acinos.
*Aconos.**Vires.**Basil. silv.*
*Ocimum.**Acinos cor-*
rupte.
*Epipetron.**Plinius Ga-*
rant a Dios-
*coride.**Acinos ab*
Aconos dif-
*feret.**Acinea.**Ruell. not.**Acyne.**Matth. ta-*
*xator.**Acini Ery-*
mon.

QUod haecenus loquerim nulla Theophrasto Acinos est. Dioscorides ἀκνον & ἀκονα appellat, atque herbam esse tenuibus furculis, coronariam, & admodum similem Ocimo: hirsutiorē verò atque bene olentem: apud aliquos in hortis plantari solitam. Hanc alium & menses poram sistere. Panos (φύθλα) præterea & erysipelata (sacros ignes alii,) impositam sanare. In reiectaneis quidam silvestre Basilicum, Romanum verò Ocimastrum dicunt.

Plinius diuersis in locis Acini meminit, & modò Acinon, modò mutatis aliquibus literis Acinon, libratiōrū culpā, legit. Acinos, inquit l. 21. c. 15. Acinos quam Epipetron vocant, quæ nunquā floret. Sed his certiora, à Dioscoride accepta, tradidit cap. 27. Sed hoc illi non est cum Dioscoride idem quod Menses & vrinæ ciere dicit, cum sistere tradat Dioscorides, cui subscribit Paulus Aegineta.

Differt autem Acinos ab Acono, inquit coroll. 474. Herimolaus, quod Acinos Ocimastrum, siue Ocimi silvestris genus; Aconos spinosa brevis & lata herbā, Eryngio à quibusdam contributa, spinis latioribus. Acinos sponte nascitur Aequinoctio, hanc & Acinon & Acinean Plinius appellat, & Epipetron nunquam florentem, & Achinen, & Chenopum.

Ruellius asserit Epipetron Theophrasti, esse Epipetron Plinii, & Acinon Dioscoridis: at non demonstrat, quam plantam intelligat.

Matthiolus dum propter florem Manardi Acinon reiecit, ostendit se intelligere Acinum siue Epipetron Plinii, idem esse cum Acino Dioscoridis.

Non tantum persimilis, ait Lobelius, sed & congener Ocimo videtur ἀκνον, ac per y proferenda, quod sterilem infecundamque signat plantam, ut etiam Plinius fortè interpretatus fuit, qui hanc herbam Epipetron vocari, aut potius Epipetron (ut Theophrastus habet, qui hanc inter ἀργύρη centet) scribit. Quare cum illi florem non negasset Dioscorides, & Ruellius Ocimum, siue minus Basilicum, posse esse Acynon, ni obstarēt Theophrasti, Pliniique mutila historia, dixisset: Senensis candor consuetus hæc arripit, & quasi sua obtrudit, exprobratque doctis, nec interea lectori quidquam commodi molitur. Quare fieri potuit, ut quod Plinio in Bechio, & Dioscoridi in Dictamno contigit, idem usu venerit Theophrasto: nempe ut nullum agnosceret florem in Acyno; quem postea Plinius sequutus sit, apud quem tamen legunt nonnulli Acynon non penitus flore carere: sed in hortis non florere. Et si coronaria fuit, verisimilius est, flores habuisse. Sed quemadmodum Bechio & Petasitidi, quia præproperè florent, & citissime deflorescunt, deesse florem quidam putarunt: sic fortè isti quia obscurius & serius flores promittunt, ac sæpius interdum emersos amittit intempestiua Autumni qualibet minimā siccitia: sicuti videre est in nonnullis pusillos & serotinos flores edentibus. Aut aliud fortè sit Theophrasti Acinos, à Dioscoridis.

Acinos dicta fuit planta hæc ab a litera, quæ nota est priuatiua, & verbo ακνω, quod significat

moeco, incito, cico; unde ἀκνω & ακνωται dicitur apud Dioscoridem, ciet alium & menses: hæc autem quia contrariam habet facultatem, sc. quod menses & alium pota sistat, Dioscoridis sententiā, ideo ἀκνωται dicitur, quia ἀκνω, vel ὀκνω ακνωται, & ὀκνωται ἀκνωται.

Acini nomine plures donantur plantæ: scilicet Calaminthæ genus. Acinos multis. Acini pulchra species. Acinus Anglica. Ocimum garyophyllum siue Acinos Columnæ. Ocimum. Clinopodium l. Matth. Origanum facie. Mentha species in Græcia. Lunaria minor siue borrytes. Pes asperinus. Oleaster. Agnus.

ACINVS MANARDI MATTHIOLI
Calaminthæ folio.

CAP. XXXIII.

Recordatur huius plantæ passim Matthiolus. Manardus [inquit in prior. comm.] nil aliud Acinum esse putauit quàm quandam quæ in omnibus incultis prouenit locis, sed præcipuè & agrorum & viarum ægeribus, Ocimo hirsutior ac tenuiter olens, quæ quod Ocimum admodum æmuletur, à quibusdam silvestre Ocimum appellatur, &c.

De hoc Manardi secundum Matthiolum Acino ita disserit Apollo. Vulgaris notitiæ plantam, rusticanis Basilicum silvestre dictam, in areis camporum & viarum marginibus, odoratam, Acinum credidit Manardus, nec ab eius opinione abhorruit vulgaris Matthiolus: at latine, se à veritatis semitâ deuiasse deprehendit, quod Acinum nunquam florere Plinius testetur: idem quum huiusmodi herbam florere animaduertit, Acinum esse nequaquam voluit. Verumtamen quum in Dictamno florem negat Plinius, præter experimentum, cum verius quàm Manardum errare suspicari debuerat: quum præsertim silvestri illo Ocimo ad menses & alium sistendam non efficaciter uti assueuerit rustica plebs nostra, ut ad quæ Acinos ex Dioscoride potissimum cōmenderetur. Ast Apollo hic malè irradiat, quandoquidem eius plebi nota Acinus Manardi, & non descripta à Matthiolo, ab eo debebat describi ut alii docerentur, iisque innotesceret. Hæc verò de eodem habet Lob. l. in Adu. Senensis [Matthiol.] exploso Ocimo minimo. Calamentum inodorum viarum, ubique frequens & cōtemptrum, à Manardo iam diu adductum profert, illique nulla probatione præfert. Sed enim qui acius, menstruisque ciendis aptum Calamentum istud norit, neutiquam assentietur. Et alie sunt plantæ quæ multò aptius quadrarent, ni aduersarentur vires, nempe sistendi menstrua, & igni sacro medendi, si congruerent etiam folia, & rami floribus vidua, ex Theophrasti & Plinii historia, quod nunquam tradit Dioscorides. Hæc Lobelius. Nos autem later quid vocet Calamentum inodorum: illud præterea notandum nullum Calamentum inodorum posse esse Acinum Manardi: eius enim planta erat odorata, ut apparet ex eius verbis quæ posuimus capite de Ocimo garyophyllo Monachorum siue Acino Columnæ.

H. Lugd. transcribit præscripta Lobelii verba: H. Lugd. res. verum non docet quale sit illud Calamentum inodorum, vel Acinos Manardi & Matthioli: proponit quidem iconem, cui hunc titulum fecit, p.

Acini nota

Acinus Ma-

Ocimum

Acinus Ma-

Plinii error

Apollo ca-

Matth. cen-

Lobel. reser-

cit p. 912. Acinus Matthioli : & aliam sub hac inscriptione: Acinus, siue Clinopodium silvestre : Hanc eandem figuram etiam exhibet p. 931. pro Clinopodio priore Matthioli: diuersa admodum plantæ à Matthioli: Acino: est enim Acinus H. Lugd. p. 912. Clinopodium Matthioli Origani facie.

ACINOS MULTIS.
CAP. XXXIV.

Descriptio



Hunc ita describit Lobelius in Aduersariis p. 217. In Clinopodio, ait, siue Lectipede, propter lectipedum, quorū furculis delineat effigiatam notissimā, hodie eodem nomine, vel Pharmacopæorum vulgo apud Montpelienſes & Lugdunenſes, dicto, vix est quod ad veri Clinopodii expressionem optes. Aridos namque & glareos occupat tractus, furculis pluteulis, si quipal-

mum longioribus, radiis exiguis foliis paruis Serpyllum æquantibus, cui & similia vel Calaminthi montani, vel Ocimi minjini, nonnullis leuisculis in ambitu crenis apparentibus: cauliculi complures sarmentosi, præduri, crebris ab fino summo tenus geniculantur verticillis, & alabastrulis Lamii quaternis, sed multo minoribus, crufcula totidem exprimētibz, purpureis *sloſenſis* Calamenthæ. Calida planta, calorem non ita inagnum gustanti præbet, sed siccitatem odorem suauem spirat Serpylli quadantenus. Hanc si propius figuram intrucare, quæ melius Clinopodium exprimat, inuenies nullam. Hactenus Lobel. qui in Obs. pag. 270. vocat Clinopodium vulgare (ita etiam Ic. Plant. pag. 506.) odore Pulegio iuncundiore, wilder Burch. Jsep. Is autem taxat Tragum, quod perperam Calamintham montanam fecerit: cuius Kyberus taxandus erat; non verò Tragus.

An est Cornario in Dioscor. planta illa, quam ignotā Acini appellatione officinas Ocimastrum vocare narrat: alios Ocimū silvestre, Germanos Klein/ aut wild Basilien/ li, e. Basilicum paruum siue silvestre?

Fuchsius Ocimastrum concludit, ac Ocimoides græcè haud alia ratione dici, quā quod Ocimo, suis potissimum foliis, simile sit. Ocimastrum autem Latinos, quasi silvestre Ocimū appellare, officinis inusitatum atque incognitum. Caules autem in figura Fuchsi ac etiam nostra Guariniana nimium hirsuti videntur; vti etiam in fig. Dod. gallici.

Lonicerus acinon pingit, nec distinguit ab Ocimo siue Basilico. Rissius acinon & Aconon vocat, ac ab Acano separat. An Serpyllum maius Tragor?

Pulegium petreum vocari potest, inquit Gesnerus de hort. Germanici nominis Serinpoſey imitatione, herba aliquibus Clinopodium existimata, quæ sponte apud nos in muris & locis siccis, saxosisque & apricis collibus crescit. Hanc puto Calaminthæ montanæ nomine non rectè exhiberi à Trago (Kybero.) Eadem fortè est, de qua Car. Stephanus sic scribit: Aquatico Pulegio similis quædam planta in montibus & siccis locis crescere solet, quæ Gallis *Poultier saunage*, quibusdam Polium montanum appellatur: folio Serpylli, sed paulò latiore, flore cæruleo: apud eum collem Luteriæ vicinum frequens, qui Eritius dicitur.

Dodon. gall. hanc inscribit Acinon & gallicè *Basilic saunage*, h. e. basilicum silvestre. Lat. de Florib. & in fol. Ocimum silvestre, Acinos. Is autem & Ocimum silvestre & Clinopodium negat, esse Acinon sentiens.

Rob. Const. Apud Amatum capite de Acino, Fuchsi Ocimaſtri iconem exhibet, licet Amatus ibi de eo non scribat.

H. Lugd. pag. 912. de Clinopodio quorundam Origani facie (Acinum siue Clinopodium silvestre vocat:) & hoc Acino multorum (cuius solam delineationem ex Lobelio sine figura tradit) confusè scribit: ac sibi minime constat. Pingit enim & describit cap. de Acino Clinopodium quorundam Origani facie, statuitque esse Acinon multorum, quod falsum est. Huius autem iconem pag. 681. Ocimaſtri Fuchsi titulo dedit; quod Dodonæum Acini nomine pinxisse fateatur.

Anguill. nullam nouit plantam quæ Clinopodio respondeat, quā Ocymoides Fuchsi. Tabern. Leon. & Hist. Clinopodium 2. Stein Poſey / wubeldosi. Schvv. Clinopodium minus, & Polium montanum officinarum nonnullarum Klein Bergmānz. Cluſ. Pann. & hist. post. Acinos Fuchsi, Clinopodium vulgare. Thal. Clinopodium utrumque, maius & minus. Hoc rariuſ, illud crebrius: Gesneri Pulegium petræū, ac Dodonæi Ocimum silu. seu Acinos.

C. Bauhin. apud Matthioli. Clinopodium 1. siue Ocimum silvestre: Acinos Dioscoridis: Basilicum 3. Tragi: Pseudo-Clinopodium Matthioli & Clinopodium alterum in Epitome: Calamintha quædam Ocimi ferè foliis Cordi in Dioscor. variat foliis modò latioribus, modò angustioribus: sic tota planta modò erecta, modò repens: aliquando hirsutissima, aliquando penè læuis: quæ res facit vt Clinopodium alterum Matthioli dissimile videatur: reperitur etiam floribus albis. Nobis quidem Basilicum tertium Tragi huc referendum non videtur: quod Trago ita dicitur, potius est Mentha verticillata minor Ocimi odore. Ostendimus præterea Acinum Matthioli, non esse Acinum siue Ocimastrum Fuchsi, vt opinabatur C. Bauhinus.

An Cæſalpin. Bértonica alia, Cestron Dioscoridi dicta?

Acinon Dodonæi Bessfordiæ collectum plantatum in horto Ill. E. C. Witt. non perit. Obser. uauit Basileæ florens Octobri variis in locis, vt itinere versus Moutetz, & in ipso monte: item intra & extra vrbis muros. Lugduni cum flore Maio. Genuæ au plain palau florens adhuc Nouembri, & virens mensis Februarii principio: itera in muris domus senatoriæ cum flore mense Maio: Monspelii Aprili & Maio quātut Castelnœuf in regione domus leproforum, & in colle prope urbem: In Pannoniæ, Austriz,

Pulegium petreum Gesneri

Tragus silu. acc. satur.

Polium montanum

Acinos Dod.

Chaus Hist. Lugd.

Clinop. duplex.

Ocimi silvestre. Acinos Diosc.

C. Bauhin. not.

Locus & Tempus,

Lobel. not.

Basil. paruum siue silvestre. Ocimastrum Fuchsi.

Tragi.

Lonic. not.

vicinarumque regionum locis aridis collegit Clusius: in incultis & apricis petrosis in alto litis Schvvenckfeldius. Id etiam saepius in Germania obseruauit Turnerus.

Vires & v-
sus

Authore Schvvenckfeldio, calefacit, siccit tertio recessu. Aperit, prouocat, discutit, roborat. Tenuium est partium. Menses & partus pellit. Ex vino potum melancholicos restituit. Dodonaeus facultate aliquantulum calidam & siccam dixit, non absque tamen adstringendi vi ac potetia.

ACINI PVLCHRA SPECIES.

Descriptio



Folia non admodum vulgaris Acini foliis absumilia, bina ex aduerso posita, acuminata, crenata: flores ad articulos ex foliorum sinu bini aut terni, duplo, triploque, quam in Acino vulgari, maiores, patuli, purpureascentes. C. Bauhin. phyt. vocat Clinopodium, siue latifolium, notatque in figura Clusii crenulas esse omis-

sas. Is verò solum describit & eo quod non alibi obseruauit, Clinopodium Austriacum nuncupat.

Crescit in montibus Badensibus thermis imminetibus, & ceteris vicinis ad Danubium procurrentibus: variis praeterea aliis locis. Floret Maio, semen Iunio maturum.

OCIMVM GARYOPHYLLATVM

Monachorum siue Acinos Columnae.

CAP. XXXV.

Descriptio



verum esse. Planta autem eiusmodi est. Folia sunt Melilic, longiora tamen, nonnihil serrata: caules sesquicubitalis, aliquando altior, quadratus, pilosus, non hispidus tamen, ramosus, colo-

re vitidis, ut foliorum, quae pilosa & plana, ex peciolis longis, inter folia & alia folia spacium trium digitorum, vel circiter: fl. ei & spicae seminis, ut ceteris Ozimis: quolibet Spica habet quosdam alios veluti adnatos spicarum ramulos. Semen eius aliis minutius est, & rotundius, subrustum, nigricans. Tota planta praeter radicem habet odorem & saporem acutissimum Gariofilorum: folia linguam vellicant, ut Gariofilus. Quò senior plàta eò odoratiores & acutiores folia.

An Acinus Manardi? Hallucinantur autem Monachi se primos Ocimum garyophyllarum adinuenisse existimantes: id enim pro Acino veriore & *Prickella* assert, iconem exprimit, & describit Fab. Columna.

C. Bauh. apud Matth. meminit Acini Columnae: eam autem siccam vnà cum seminibus Neapoli ad eum misit Fer. Imperatus.

DE TRAGORIGANO VETERIBVS

& in genere.

CAP. XXXVI.


Tragoriganum Graecis pariter ac Latinis dictum, frutex est, authore Dioscoride, Origano aut Serpyllo siluestri, & foliis, & ramulis similis. Et quaedam sine reperitur in quibusdam locis speciosior, & latis foliis, multum glutinosa. Qaedam tenui sarmento, & tenuibus foliis, quae & Prasion quidam vocat. Optima est, & quae in Coe & Chio, & Smyrna, ac Creta prouenit. Calefacit, urines, urinam ciens, & ventri cominus sunt, si decoctum ipsarum bibatur, deducunt enim biliola. Profunt & splenicis potae cum aceto, & his qui Ixiam biberunt, cum vino. Quin & menses ducunt: & ad tussim ac peripneumonias cum melle dantur in eclegmate. Est & potio ipsarum lenis. Vnde nauseabundis, & stomacho male affectis, & acidum ructantibus, & in quibus anxietates, & nausea ac calor praecordiorum comitatur. Discutit insuper tumores Tragoriganus in cataplasmate imposita cum polenta.

Tragoriganon, inquit Plinius, simile est Serpyllo siluestri. Urinam ciens, tumores discutit, contra viscum [Ixiam Diosc.] potum viperarumque ictum efficacissimum, stomachoque acide ructanti, & praecordiis.

Galeno adstringit: Celso verò discutit Tragoriganus.

TRAGORIGANVM MATTH.

Descriptio



Tragoriganum, cuius plantam exhibet; frequens noster in Foroiulensi agro aithmae Matthioli, foliis Serpylli emulis, seu gustu Pulegii. Vnde non abs re statim post ipsum, Pulegi meminit auct. Dioscoride. In Hist. germ. vocat Tragedessen / Gall. Grosse Martolaine, atque abundare in collibus

bus saxosis & veteribus muris Foroiulienſibus, in
verbe Anſtia dicta, quæ ſita eſt octo milia-
ribus Italicis ab Utina: ei verd tenuer tri-
buit ramulos, foliis parvis, oblongis, ſive
longiſculis, ſtellæ modo diſpoſitis, ſaporis fe-
rè Pulegii: floribus parvis carnei coloris o-
nuſtus, à media parte caulis. Radicem parvâ, mul-
tis fibris donatam, eiſdem odoris cum foliis.
Diticile autem eſt certò affirmare de qua planta
intelligat Matthiolus, niſi nos aliquis Foroiulien-
ſis doceat, quæ planta apud eos iconi Matthioli
reſpondeat: in comm. & Epir. non demonſtrat
plantam quam intelligit, niſi ſola iconem. In
Hiſt. germ. deſcriptionem ponit, quæ non reſpò-
det nomini gallico, nec germanico: nec nobis
conſtat an ea deſcriptio facta ſit ad propoſitam
aliquam plantam. Matthioli glosſatores & pa-
troni ac imitatores nihil certi de Matthioli hoc
Tragorigano ſcribunt.

Lacuna in Dioſcor. iconem Tragorigani Mat-
thioli proponit ſine deſcriptione, quod abundare
tradit in montanis Tibuli & Subiaci. H. Lugd.
p. 888. eandem figuram ſub Tragorigano Matthi-
oli pingit. Hoc autem Lobel. non Tragoriga-
num, ſed Calaminthæ ſpeciem alteram eſſe ait,
Serpylli & Clinopodii figura.

Tragorig.
Tab.

Tab. 101.

Tabern. vocat Tragoriganum primum (Bos
deſtodenſi.) caulis pedem & ſemis longis, al-
bis, quadrangulis, in ramulos parvos ligneos di-
viſis: foliis Hyſſopo ſimilibus, paulò tamen lati-
oribus: floribus ſimilibus Pulegio petræo: odo-
re grato, ſapore acri. Tabern. quidem Matthi-
oli imaginem aſſumpſit, in qua tamen ſummita-
tes cur mutavit & magis verticillatas pinxit,
cauſam non reddit. Illud etiam non conſtat cur
Matthioli deſcriptionem ex Hiſt. germanica, vnde
figuram ſuam deſumpſiſſe deprehenditur, omi-
ſerit.

C. Bauh.
not.

C. Bauhin. apud Matthioli. pro eius Tragoriga-
no ponit figuram ex Tabern. quæ an melior de-
teriorue quàm Matthioli, iudicent quibus nota
planta: ſi Camerarius veram iconem poſuit, de-
terior multò eſt.

TRAGORIGANVM TENVIORIBVS foliis, flore candido.

Deſcriptio



Minores
ſunt huic
ſurculi & can-
didiores, te-
nuiores, lon-
gioræque folia,
aliquantulum
incanâ, acris
guſtus: odor
minùs iucun-
dus, quàm in
Tragorigano
primo Cluſii,
ſive Clinopo-
dio quorundâ,
Maſtichina
cognominato:
flores etiâ ver-
ticillati circa
ſummos ra-
mulos naſcun-
tur ex vtricu-

lis prodeuntes, maiores aliis & galeati, candidi:
Tom. III.

ſemen non obſervavit deſcriptionis auctor Cluſi-
us: radix iam dictæ ſimilis, lignoſa, dura, multi-
ſida.

Inſcribitur autem Tragoriganum alterum à
Cluſio, qui Hiſpanicum 1. & Praſion nonnullorū
vocat. A Dodon. in fol. Tragorig. Cluſii alterū.
Lob. Obſ. p. 164. Tragoriganum flore albo Clu-
ſii. In Icon. Plant. p. 494. Tragoriganum Clu-
ſii. H. Lugd. p. 590. Trag. 1. Cluſii. Tabern. H.
& Icon. Trag. ſecundum, Boeckſten. Quid
venit in mentem Compilatori, ut Tragorigani
Cluſii, cuius iconem aſſumpſit, flores dicat pur-
pureos, præter autoritatem Cluſii: cur quæſo
non adſcribit, ubinam tales videriſſent? C. Bauh.
Phyt. Trag. anguſtiſolium ſecundum.

Synonyma

Tab. 101.

Solo Valentino agro Martio florentem & ſpò-
tè naſcentem obſervabat author.

Locus &
Tempus

TRAGORIGANVM QVIRVSDAM

nigrius, folio duro, flore
purpureo.

Virgulis fruticat dodrantalibus & longiori-
bus, aduerſo plerumque ramorum frequen-
tium poſitu brachiatis, lignoſis, rubicundis, qua-
drangulis, hirsutis: folia ex aduerſo naſcuntur
per modica intervalla, oblonga, ſatureiæ foliis
quodammodò ſimilia, latiora, magisque rotunda,
interdum in hortis noſtris & Maioranz foliis nò
minora, ſtigmatis punctata, nigricantia, tactu
dura, guſtu acri & aromatico, odore ſuavi, ex
quorum ſinu alia minora folia quoque emicant:
flores verticillati, duobus ſubiectis foliis, ad ſcapi
nodos, ſatureiæ flores æmulantur ex purpura
palleſcentes, tactu hianti apiculos exſerentes ca-
lyculis hirsutis, in quinque aculeos deſinentibus:
radix lignoſa exterius rubet, intus albet, ac in ſur-
culos aliquot abit, capillaribus fibris donatos.

Deſcriptio

An eſt hæc Cam. hort. Tragoriganū Neapoli
miſſum? An Thymbra Cretica Caſalpino? An The-
oph. Helenium Anguillaræ? An Bellon Obſ. l. 1.
c. 18. Origanū ſilueſtre, neutrius naturæ (Origanū
Onitidis & Heracleoticū) particeps: nam li-
bentiùs circa ſepes creſcit, quàm apertis locis.

Dodon. huic titulum hunc fecit: Tragori-
ganum alterum. Lat. in fol. Tragoriganum, de
quo ait: In Foroiulienſi agro, Tragoriganum
naſci Matthiolus tradit: verum an illius cum no-
ſtro, foliis aſperis, ſtoſculis verticillatis idem ſit,
in tanta ipſius breuitate incertum relinquitur.
ſed icones ſolæ demonſtrant ſatis diuerſas eſſe
plantas. Geſnerus de hort. Dodonæi verba de
hoc Tragorigano recitat.

Lobel. in Adverſ. appellat Tragoriganum Cre-
tenſe apud Venetos (ita etiam in Icon. Plant. p.
493.) & Origanum hircinum, itémque Thymum
Creticum, ex recentiorum ſententiâ.

H. Lugd. p. 888. Tragoriganum Dodonæi. Ità
p. 889. Tragoriganum prius Cretenſe apud Ve-
netos: Item: Tragorigani Cluſii alterius ge-
nus alterum. Tres deſcriptiones vniùs plantæ,
vniùſque figuræ.

C. Bauhin. Phyt. ſatureiam 4. ſive Creticam
appellat, apud fratrem [me] Montbel-
gardi provenientem, & Thymbra Cretenſem
Alpini, quam eſſe nos in dubium vocamus. In
animad. in H. Lugd. Tragoriganum prius Creten-
ſe, cuius deſcriptionem ab Hiſtoria poni, figu-
ram verd omitti ait, & petendam ex iconibus
Lobelii, qui Trag. Cretenſe apud Venetos nomi-
nari tradat.

Tragori-
ganum
Dodon. &
Matthioli
diuerſum

Tragorig.
Cretenſe
Lob.

H. Lugd.
laſum.

C. Bauh.
not.

Tragorig.
2. *genus*
alterum.

Locus.

Clus. dicitur Tragorigani secundi genus alterum, siue species altera, & Tragorig. Hisp. tertium. Clus. icon ab aliis variat nonnihil.

Prouenit mihi Montbelgardi ex semine misso Sturgardia nomine Thymi Cretici aculeati, & Thymbræ veræ Candia. Lugduni in horto habui florentem Septembri; Basileæ in horto Cælii Iulio & Augusto. In Valentino agro Martio fleret & sponte nascitur. In Belgicis verò hortis etiam conspicitur & quibusdam Germaniæ, sed isthic vix Hiemem perfert.

THYMVS VETERIBVS.

CAP. XXXVII.

Thymum
duplez
Theoph.

Prima Thymo laus in antiqua plantarum Historia Græcis à Theophrasto est, quia à principio statim sexti de plantarum Historia voluminis longiore descriptione totam eius naturam fortunamque complexus est, his verbis capite secundo. Thymum candidum nigrumque reddunt: serò id admodum floret: nam circa æstiuum Solstitium incipit. Mel apes hinc capiunt, & hoc augurio apiarii constare affirmant; an probè melleatur, nec ne: etenim si aliter desloruerit, mellatio minùs probè succedet: destruitur, peritque flos, si imber incessit. Semen fecundum Thymi nullum ostendi potest, sed floribus quodam permisceatur modo: flores enim serunt, itaque oritur Thymum. Qui tamen Athenis deportare desiderant, querunt atque inueniunt. Peculiare tam præ iis ipsis, quàm præ reliquis omnibus, vel ex locis fortiri Thymum autumant: nam quo flatus è mari nequeat peruenire, illic nasci, duratque posse omninò negant. Et hæc Theophrastus, qui Thymum alibi succo acri constare testatur.

Virgilius
Thymus.

Post Theophrastum ex Latinis à Plinio & ante Plinium plerisque aliis, qui Romanorum Italique hortos & mellationem instruxerunt: Omnium maximam & æternam æterno carmine Maro illi fecit, cum in Georgicis suis cecinit

Redolentque Thymo fragantia mella:

Romana breuitate & poetica dignitate omnem plantæ huius honorem & usum in turis & apium disciplinâ complexus.

Thymus
Plin.

Quæ ad Thymi historiam, factique ex eo mellis bonitatem pertinent, Plinius à Theophrasto accepit. Hæc verò habet Dioscorides. Cæterum, Thymos ab omnibus cognoscitur, frutex parvus, sarmentosus, foliis multis & angustis circumdatus, habens in summo capitula floris purpuream referentis. Nascitur maxime in petrosis, & tenuis terræ locis.

Dioscorides
des duo
genera
agnosuit.

Et si porro Dioscorides vnus tantum Thymi meminerit, tamen capite de Epithymo duo videtur genera agnouisse: vbi ait: Epithymum esse durioris Thymi Saturejæ similis florem. Et videmus, inquit Turnerus, Thymum Venetiis & è Creta allatum alterius esse generis, à Thymo Anglicano.

Epithymus
Thymum.

Enothis Thymi appellationibus sunt Epithymis & Thymion solo declinationis genere diuersæ, antiquæ & ipsæ, inquit Marcellus. Siquidem Theophrastus genere neutro Thymon dixit: & feminino genere alii, herbam Epithymida sc. intelligentes. Egyptij accepta à Græcis voce, quoniam fortè eo coronarentur, Stephanem, i. e. Coronam appellarunt. Sic & Græci Thyr-

Stephanus
Thyrion.

lion, quoniam Bacchicas hastas, quas in orgyis eius dei thyrsos vocabant, pro hederis cramulis Thymi fortè inuoluerent. Sulpiciones tamen, seu, si malis dicere, coniecturæ hæc sunt. Quod porro est *καπελάριον*, quod capitulum significat, certam ex figura floris, capitulorumque eorum, in quibus Dioscorides florem Thymi purpurascere dixit, rationem habere potest. Sunt tandem, qui addito colore album Thymum appellant: vt Daci Mozulam.

Aequiuoca

Thymi verò nomine sequentes donantur plantæ. Thymum Creticum. Thymum vulgare. Thymum latiore & viridior folio. Serpillum. Satureia. Tragoriganum nigrius. Hyssopus. Samoluchus. Marum. Calamintha. Cæpa. Porrum.

THYMVM CRETICVM, SIVE ANTIQVORVM.

Thymo Cretico [quod legitimum Antiquorum cum multis, statuimus] plantæ frutescens, cubitali, virgule, duræ, totæ ferè albicans, subhirsuta: in quibus ad genicula veluti, modicè distantia, folia ex aduerso posita plura, alba, hirsuta, quædam paulò nostratis Thymi maiora, & aliqua etiam minora: singuli ramuli in capitulum desinunt oblongum, vix vnciale, multis foliis longiusculis & mediocriter latis, multum pilosis, squammarum compactis, constantes: Huius plantæ sapor valde acris. Descriptio hæc est plantæ sietz magnæ Creticæ datæ Patavii ab insigni pharmacopæo Io. à l'Aquila. Anno 1586. Lutetia mense Augusto obseruari quoque Thymum Creticum in horto Robini, insignis Botanici regii, capitulis, ac etiam foliis superioribus, paulò maioribus, ac in singulis denum geniculis foliis duobus longioribus, & aliis minoribus.

Descriptio

Thymi nostri Cretici meminit Bellonius lib. 1. Obser. cap. 2. Gallica genis, inquit, & magna pars Gentis subiectæ Romanæ Ecclesiæ hæcenus ignorauit Thymum, quod enim in hortis colitur, non est Thymum, nec Thymi species, sed Serpylli. Herbam Thymum, teste Dioscor. & Theophrasto, oportet habere parua capita, similia Stæchadi & vertucis in nate & pudendis proenientibus, quæ dictæ Græcis Thymea, vt testatur Celsus. Verum Thymum ita frequens in tota Græcia, vt nulla herba in montibus facilius proueniat, vbi pro loci diuersitate florem profert omninò album, vel cæruleum aut purpureum, vel mixtum. Vti autem Thymus nomen dedit, vertucarum generi, ita etiam pisci, qui dicitur Thymus, aut Thymalis & in Lombardia Themero aut Themolo. Idem cap. 18. in Thymo prouenire scribit in Creta Epithymum. Hanc etiam intelligit cap. 76. per Thymum Græcum. Et lib. 1. de Conif. vbi Galliam atque Septentrionalem regionem Thymo præfatus cætere scribit.

Thymum
Julian.

Matthiolus non videtur distinguere Thymum Creticum album à Thymo Monspelienfi. Thymum in Italia, inquit, notissimum: [An Creticum Thymum in Italia sit notissimum dubitamus.] Præstat autem quod ex Apulia fertur: quàm laudatissimum est, quod è Creta insula, aliisque nonnullis Græciæ locis aduehitur. Theoph. & Diosc. Lat. Thymus & Thymum dicitur: Mauritanis, *Hasse*: Germ. *Römischer Quendel* & *welscher Quendel*: Gallis *Thym*, seu *Mariolaine d'Angleterre*: Hisp. *Tomillo salsero*: Bohem. *Thym*: Polon. *Oziścielina*.

Anguillara epist. 12. Thymum notissimum in Græcia

da & graecolentia, quæ verba de odore sunt Dodonæi, quæ dixit de suo Thymo durior, in Hist. Lat. in fol. vbi figura hoc titulo: Thymum durius.

Thym. Gal.
gatum pu-
sillum Lob.

Lobelius in Adu. vocat Thymū vulgatum pusillum, folio & flore Serpylli rigidior, passim Epithymi cincinnis & capillamentis delicatissimis obuolutum, Norbonæ in maritimis collibus natum. Vide caput præcedens. Figuram quam ponit in Obs. Belg. p. 508. & Icon. Plant. p. 425. hoc titulo: Thymum durius Plinii, non placet.

Thym. Gal.
gata Clus.

Thymum vulgare, quod nonnulli durius cognominant, quoque teste etiam Plinio, lapidei campi in Norbonensi Prouincia referti sunt: & mediterraneis, quemadmodum & Salmanticensi agro, & alius Hispaniæ locis sponte crescere gracili & salebroso solo, testatur quoque Clusius. Et id quidem nunc purpureo, quale in Narbonensi Gallia, & Aquitania, nunc albicante flore.

Locus &
tempus

Thymon hoc Monspelii passim sponte copiosissime in montibus & locis saxosis provenit, acrius multo eo quod in Germania in hortis feritur. Floret copiose mense Martio & tota Æstate ac Autumno. Batileæ in hortis Hiemem difficulter tolerat, nisi recondatur: Lugduni verò facile. Monthebgardi ex semine ex Gallia Narbonensi allato facile provenit.

THYMVS REPENS PISANVS. CAP. XXXIX.

Locus.
Deteripio
surguli



Thymi repentem hanc speciem in horto Pisano lectam exhibuit Nic. Agerius Medicus Argentinensis. Sarculis fruticat pusculis, lignosis, pedalis, cubitalibus ad terram repandis. Quos ex vnciali intervallo breuissimis ramulis glomeratim adaggesta foliola viridia, rigida, angusta,

albidis, sed breuib. per ambitum pilis hirta, stipant: flosculi rubelli, vt idem perhibet: sicæ sapor aliquant. aromaticus.

DE EPITHYMO VETERIBVS

& in genere.
CAP. XL.

Epithym.
Thymi du-
rioris flos
Duple.

Quum grauium authorum grauis controuersia de verò veterum Epithymo inueniendo, constituendoque sese offerat, placuit ac necessarium debuit singulorum audiri opinio. Nec enim cuius datur tantas componere lites. Epithymum itaque & ex autoritate Dioscoridis, Thymi durioris, & Thymbæ similis, flos est. Habet capitula tenuia, leuia, caudas velut capillos habentia. Epithymi semen vt Alypi. Eadem Oribasius lib. ii. habet.

Plinio lib. 26. cap. 8. Epithymon est flos & Thy-

mo, Satureiæ simili. Differentia autem, quod hic herbaceus est, & altior Thymi albus. Quidam Hippophaeon vocant: Quidam aliter Epithymum tradunt, sine radice nasci, tenui similitudine pallioli, rubens: sicari in umbra.

Flos Thymi
Plinio est
Epith.
Hippophaeon

Mesues Epithymum Thymo, Thymbæ, cuiusdam speciei Origani, supercrescere Cassutæ modo voluit: duplexque id ait, Creticum, idemque præstantius, præcipue capitulis florulentis, sub-rufum, acre etiam, odoratu absolutum, graue. Alterum Syriacum, minus rufum, ignobilius, vt etiam pallidum & subcitrinum. Hæc ita apud Serapionem leguntur: Ex Epithymo melius est graue, cuius color est propinquus rubedini, acuti odoris, & illud quod defertur ab Insula Cretensi, & a domo sancta.

Epithym.
in Thymo.

Duplex.
Creticum.

Paulus Epithymbrum, vt arbitratur Ruellius, vocat, quod Epithymi modo supra Thymbam increseat.

Syriacum.

Epithymi
delectus.

Sic parum hætenus inter auctores conuenit. Alii Thymi florem esse dicunt, & capitulis leuibus, quasi crines dependentem, quibus & Dioscorides & Plinius astipulantur. Florem tamen putauerit appellari Ruellius, quod crinium, vel cincinorum modo capitula Thymi comat, quadam florum imagine. Alii in Thymo sine radice succrescens nasci produnt, quadam capillamentorum specie.

Epithymum
Ruellio.

Videtur autem Manardo (quem sequitur Tagaultius) Epithymum Mesue ad secundum Plinii referendum, sicuti & id quod in usu nunc est, & vel ex Apulia, vel ex Orientalibus locis affertur.

Epithymum Arabum velut Cassutam Thymi esse, vt etiam Hyssopi, Satureiæ, & Sampluchi sapè se vidisse testatur Syluius. Epithymum autem Græcorum & quid reuera sit nondum planè compertum haberi. Quanquam hoc ab illo diuersum existimet. E contra verò Epithymum Græcorum & Arabum vnum & idem esse contendit Fuchsius.

Epith. Ara-
bum est
Cassuta
Thymi Syl-
uii.
Arabum d
Græcorum
Epithym.
diuersum.

Vnum etiā & idem statuunt esse Monachi Epithymum: tum apud Dioscorum apud Mesu. & Plinium ac alios auctores: sed, cum, vt ipsimet fatentur, quātō magis legerent de Epithymo apud auctores, tantō magis mens eorum vexaretur, & confusionem maximam inuenirent: Phantasticatur, machinatur, fabricantque suo modo vaniloquia.

In ea opinione, inquit Matthiolus, versantur Brasauolus & complures alii, vt credant, Dioscoridis, aliorumque Græcorum Epithymum, magno discrimine ab eo diuersum esse, de quo scripserunt Mauriani, præsertimque ab illo, cuius meminit Mesues. Quippe qui asserant, nil aliud Arabicum Epithymum esse, quàm capillaris Cassutæ genus quoddam, quod Thymo circumuoluitur. Græcum verò idem esse volunt, cum proprio flore durioris Thymi Satureiæ similis.

Matth. de
Epith.

Suam autem sententiam hoc argumento comprobare videntur, quod si vulgaris vsus Epithymum, Arabicum scilicet illud esset, de quo disserit Dioscorides, is non dixisset, Epithymum florem esse durioris Thymi, sed alterius plantæ Thymo adnascentis, eique sese conuoluentis. Id quod etiam Plinii auctoritate confirmant, vt qui eorum opinioni, ex eo maximè ad stipulari videatur, quod duo Epithymi genera prodiderit, quorum alterum illi ad Græcos, alterum ad Arabes referunt, & ita suam tuentur sententiam. Horum certè iudicio ego quoque facillè subscriberem, nisi quædam sese nobis offerrent, quæ apertè reclamare videntur, atque etiam ostendere, Plinium

Matth.
opinionem
probat.

Plinium

nium ipsum Dioscoridis codicem, unde illa mutatus est, deprauatū habuisse, vel aliū auctore in hoc minus graue secutū fuisse, vel alio modo deceptum, ut in aliis pluribus euenisse adnotaui-
mus. Palam enim faciunt, quantum equidem reor, nostri vltus, & Dioscoridis Epithymum, vnum & idem esse medicamentum, quæ de eo Aëtius, & Actuarius, Dioscoridem & Galenū secuti, concordēs posteritatis memoriæ prodiderūt. Quorum sanè verba liquidò ostendunt, quod nō secus Epithymum in Thymo prosit, atque Epithymbrum in Thymbra, & Epistobe in Stœbe nascitur. Hoc idem præter Aëtium & Actuariū longè antè testatus est Paulus. Ex quibus non dubitauerim asserere, vnum tantū esse Epithymū, non autem plura. Quandoquidem si Paulus, Aëtius, & Actuarius pro certo nō habuissent, legitimum Epithymum esse illum Thymi florem, de quo scribit Dioscorides, putassentque duo eius genera reperiri, nullū dubium est, quin & ipsi explicassent duplex in Thymo nasci Epithymum. &c. Eorum autem qui contrarium tuentur fundamenta quod attinet, ita illa reicit idem Matthiolus. Quod autem Dioscorides Epithymum florem Thymi dixerit, haud ineptè dictū putauerim: nam cum is sciret Epithymum Thymo innasci, nullā radice propriā, sed Thymi adminiculo fultum, floresque per se albos ferre, qui cum in Thymo sunt, huius plantæ proprii videntur: idè non absurdum fore duxit scribere, Epithymum esse florem durioris Thymi. Præterea Plinius cum & deprauatum Dioscoridis codicem habuerit, nec eius mentem rectè perceperit, nō affirmatè sed dubiè duo Epithymi fecit genera, & aliorum potiùs opinionem, quàm suam retulit: Nisi omninò concludendū, quod satis perspicuum est, tam confusè & inconstanter de Epithymo & Thymo tractasse Plinium, ut nihil certi in hac re ex eius verbis elici possit.

Cornarius in Diosc. de hisce difficultatibus nihil omninò asserit.

Amatus de Epithymo hæc prodidit. Est igitur Epithymon, siue Epithymus, crinis tanquam paliolum Thymum ambiens, vel potiùs flores Thymi. Nascuntur autem potissimū capilli isti, rāquam inuolucrum super Thymo, qui easdem floribus Thymi vires habent, & ea de causa auctores nonnunquam per Epithymum flores Thymi intelligunt, nonnunquam verò crines supererectos in eo cum suis floribus. Nascitur Epithymus iste Salmantica (ut ceteros sileam locos) ad ripas fluminis Thormidis, & si rectè memini prope Sacellum S. Mariæ dicatum. Est & alius Epithymus rubens, qui capillorum modo absque radicibus crescit, & aliis obuoluitur, circumligaturque plantis, præcipuè Lino, & ea de causa Podagra lini appellatur, quam Plinius Cuscutam aliquando nominare non dubitauit, quāque etiam inter Epithymi genera commemorat.

Contrarium statuens Anguillara, Dubitandū non ducit, Epithymum plantam esse separatam à Thymo & Cuscuta, consistentibus etiam Dioscoridis verbis. Malus autem, inquit, quorundam intellectus, quibus incognitæ erant plantæ Epithymi & Alipi, efficit, ut Dioscoridis res duæ diuersæ in eodem subiecto intelligantur. Dioscoridis verbis patet eum voluisse vocare plantam Epithymū, licet sit Thymus, qui similis est Thymbræ. Dicendum igitur, reperiri duos Thymos, quorum vnus cognomento Epithymus, & alter simpliciter vocaretur Thymus &c.

De duello Brassauoli & Matthioli, si liceat, & mihi integrum fuerit [Apollinis verba sunt] impune loqui. Matthiolo honoris manubias offerendas iudicamus, vulgatumque Epithymum id esse, de quo Dioscorides scripserit, nec scire quid dicat Brassauolus, si quæcunque capite de Thymo, in eum, ut etiam Matthiolum reiecta sunt, diligenter examinentur, duplici tantum existente Thymo, eoque Saturciæ simili, è quo Epithymon lib. 4. idem cum Thymo lib. 3. descripto, quod et si è durioris Thymi genere sit, cui Epithymum insurgat, non idè diuersa in specie appellanda: propterea si quæ aduersus eum obtorqueri possunt, animo agitentur, iure cadit Brassauolus, tamersi Matthiolum nihil ferè aduersus eum opponat, &c.

Porro Tragus pro Epithymo, si deficiat, vtiliter sumi refert Cuscutam nascentem in vrtica. Gesnerus verò Cuscutam nascentem in Hysso nostro vulgari. Fallopius Cuscutam in Thymbra nascentem subornat, ut infra dicemus de viribus. Apud Euch. Ræss. confunditur Epithymon cum Trifolio acetoso, ut cuius icon pro illo malè ostenditur.

Potum igitur cum melle Epithymum, purgat deorsum pituitam, & bilem atram, priuatim conueniens in melancholicis, & inflatis, acetabuli mensura ad pondus drachmarum quatuor, cum melle & sale, & modico aceto, auctor est Dioscorides. Thymi facultatem habere Epithymum testantur, Galen. 6. simpl. Oribas. lib. 15. Paul. 7. Act. lib. 1. sed ad omnia efficacius: exsiccare & exalfacere in tertio gradu. Aluum purgat ex aqua multa etiam Epithymon, inquit Plinius: stomacho minùs vtilis, uomitiones minùs mouet (stomacho inutilis, vomitiones mouet Corn.) sed tormina & inflationes discutit. Sumitur & eclegmate ad pectoris vitia cum melle, & aliquādo Iride. Mesues Epithymum calidum & siccū secundo dixit gradu, duplici substantiā compositum, terrea paucā parum adstringente, & ignea acri, melancholiam præter cetera, tanquam prærogatiuā quadam, facile & citra molestiam purgante, ob id affectus melancholicos, potissimum capitis melancholiam, epilepsiam, delipientiam, rumorem, vertiginem, cephalalgiam melancholicam, syncopen quoque cardiacam, cordis tremorem, & affectus alios cordis melancholicos, Obstructionem lienis, & morbos inde ortos sanat, & melancholiam hypochondriacam, obstructions renum, cancerum, lepram, vlcera nigra, quartanam, vltu multo sanat: nam tenuat, resoluit, obstructions aperit, viscera roborat. In calidis & siccis naturis non vtendum: quia calorè immodicè auget, ac inde sitim excitat. Imbecillius & tardius purgat, nisi largius sumatur, aut cum Myrobolanis Indis, aut paucis Elleboro nigro, aut multa, cum paucis sale aut vuarum passiarum decocto, cum sale præsertim gemmeo, vel Indo, vel Naphthico, aut sero lactis caprini, vel Pipere aliquo, Zingibere, vel alio acri: sic enim citò & facile purgat. Sumendum autem omninò est, vel cum oleo Amygdalarum dulcium, vel decocto vuarum passiarum purgatarum, ut lentendā aluum magis subducatur, & ne substantia nitrosa partes lædat, quas permeat. Parum diu coqui sustinet. Datur decocto à drachmis quinque, ad drachmas viginti: puluere à drachmis tribus ad drachmas septem: cauendo Aestatem. Epithymum [inquit Aët. tetrab. 1. seriv. 3. cap. 19.] atram bilem infernè purgat. Dantur ex ipso con-

Matthioli
argumentum
est contra
Brassauo-
lum lenia.
Substituta.

Vires &
vltus, ex
Diosc.

Galen.

Plinius.

Calidis &
siccis non
conuenit.
Cum quibus
sumendum
& promptius
purgat.

Decocti
dosia.

rufis ac tribrato scrupuli 12. cum passo & aceto mulso ac modico sale.

Ceterum, Mesuem dosim nimium auxisse asserunt Manardus & Tagaultius. Syluius autem cum Mesue, ob imbecillitatem à drachinis quatuordecim ad drachmas viginti dandum cernit. Tagaultius contrarium asserit, dicens nequidem esse, præter vnum Mesuem, qui ad septem vsque drachmas progredi audeat. Proinde consulti, ut quinque tantum, vel sex ad summum drachmas, idque paucissimis concedamus. Porro verò ipsius Epithymi infusi seu macerati offerri potest, Tagaultii quidem opinione, ab uncia vna, vsque ad uncias duas. Galenus idem pondus exhibet in sero lactis, vel mulsa m. m. lib. 14. Oribasius in suo compendio vix drachmas tres transcendit. Auicenna portionem Epithymi quatuor esse aureos præcipit.

Fallopia de
Epithymo
opinio.

Fallopia putabat Epithymum Dioscoridis, & Galeni differre ab Epithymo Pauli, Aetii & Arabum: sed postea reperit Epithymum Græcorum & Arabum idem esse; Cuscutam sc. supra Thymum nascentem, quæ si supra Thymum nascatur, vocat Epithymum: si verò supra Origanum, aut Tragoriganum, Epioriganon. De Cuscuta autem Mesuem agere perhibet, eiusque tria genera esse, sc. Epioriganon, Epithymum & Epithymum Pauli, siue Epithymum officinarum, quam in usu esse perhibet loco Epithymi, eademque habere vires, licet aliquantò debiliores: supra alias verò plantas, præter iam dictas, vitam non habere vim purgandi. Propriū enim esse plantarum orientum supra alias, ut exsugant alimentum à plantis, in quibus proueniunt unde sicut illa planta attrahit succum à terra, quo alitur: ita planta supra ipsam producta trahere succum ex se pro sui nutritione, & sic illam absorbere, eiusque puriori & tenuiori succo nutrir: & hinc esse, quod Cuscuta orta supra plantam habentem vim purgatoriam, non solum & ipsa purget, sed & magis etiam ipsa plantā, quia succo subtiliori nutritur. Epithymum tandem fugiendam ait illam, quæ Thymum adnexa & implicata folia atque flores non habeat, quia nihil aliud sit, quam capillamenta, quæ aliquando non soluant ventrem, quæque Sepiasii acceperint ex plantis, quæ non habent vim purgandi: sicut Epithymum validè, & calefacit: & ideo fugiatur ipsum in siccis habitibus: quod etiam vult Fallopia esse dictum de aliis Cuscutis, ortis supra plantas purgandi facultatem habentes.

CASSUTA SIVE CVSCUTA.

CAP. XLI.

Descriptio CVM Epithymum, Cuscutam nobis in memoriam reuocet, hic locus postulat, ut deinceps de ea differamus. Alienæ quadræ affectu nunquam non parasitatur Cassutha, ingrata hospes; quippe quæ herbas frutesque, quos semel arripuit, longissimis stamineis clauiculis rubentibus tam arcto nexu complectitur, ut eorum genium defraudet, subductoque alimento eos penitus enecet, nullis postquam in altum conscendit nixa radicibus, quibus tamen primum erumpens haudquaquam destituitur: flores per capreolorum mæandros nullo ordine subuascuntur glomerati; quorum singulares stoculi

rubefcentes, albicantesque, quatuor foliolis radiatis constant, fibrillis purpurantibus medium obsidentibus; sapore insigniter acris capitulis succedentibus insunt semina rotunda, Papauerinis magnitudine paria.

De hac nihil veteres Græci, quod adhuc inuenimus (inquit Ruellius) memoria prodiderunt.



nerum (inquit Ruellius) memoria prodiderunt. Plinius in calyce decimi-sexti voluminis, cuiusdam consimilis herbæ meminit, quæ ut viscum in aliena stirpe viuisset: hæc in Siria vocatur Cassutha. Hæc, ut testatur reliquerunt auctores, si calida insidet herbæ arboris, calidam sortietur facultatem: & si decubuerit frigida, vim si-

bi frigidam vendicabit: sic suæ parentis ingenium referens, nec à conditione maternæ degenerans,

Tragus Androsacen facit, ac duplex eius genus constituit, candidum sc. ac rufum, præsertimque omni reliquo in medicina vtilis adnatum. Illud præterea negari non posse contendit, eam in hortis nequaquam vtilem, sed damnosam esse, ac propterea a quibusdam Podagram, & Anginam Lini appellatam fuisse, & rectè quidem, cum vitis herbarum accenseri possit. Adhuc Orobancham Dioscoridis meo iudicio non ineptè negat, sed non sine periculoso lapsu illam in Dioscoride Androsacen appellari dicit, Antoniū Musam & Euritium Cordum securus. Cum porro cum Epithymo similitudinem aliquam habeat, Epithymum hanc nostram herbam appellandam censet, ac sororem Epithymi esse iudicat, ac etiam pro Epithymo vtiliter usurpandam censet.

Anguillara Epithymum esse negat, ac Androsacen, si apud Dioscoridem Androsacen legatur, esse comprobatur, non absque temeritate.

Dodonæus Cassutham in fol. lat. duplicem tradit, his verbis. Reperitur, inquit, Iunio, & Iulio & Augusto mensibus, in Rubo, Vepribus, Lupulo & Lino, maior, crassior, & candidior: in Thymo verò, Thymbra, & aliis humilioribus, ac durioribus, ut Eryngio, Genista, & aliis, tenuior ac rethor. Maiorem, crassioremque Officinæ passim Cuscutam appellant: nonnulli quod Linum amplectatur, podagram Lini: doctiores Cassutham aut Cassutham, Gesnerus de hort. Linodesmon: Arabes Kessuth, aut Chassuth: Illyrii nonnulli Poplith; Germani filzfraut; Todtern/ dotternfraut; Seiden Todtern/ Seidenfraut; & flachscyden: Brabant & Belgæ Schorste/ wranghe/ & Veldcruyt: Galli Goute de Lin & Angure de Lin. Ital. Cuscuta: Angli doderi: Boh. fofotice: Hung. Góreny siu Minorem ac tenuiorem, quæ duriori Thymo, Thymbræque se implicat, Dioscorides Androsacen nominat, Officinæ nomen seruant. Alii inter quos

*Epithym-
bra.
Epithym.*

quos Actuarius solius Thymi Epithymum: quod
verò Thymbra Epithymum: simpliciter quod
Stæbe innascitur Episteben nominare, sin-
gularem cuique generi appellationem tribuen-
tes. *Hæc inter alia Dodonæus*, qui præterea ne-
gat Cassutham, quod quibusdam visum est,
eamdem esse cum Cadyra, quam Theophras-
tus Syriacam herbulam tradit arboribus, ve-
ribus, & aliis quibusdam innascentem.

Fuchsius eos errare refert, qui Dioscoridis
Androsacen esse putant: Plinium eius meminisse
placet ipsi; ac propterea Cassythas apud Plinium
etiã Hermolao adinonere, legendū iudicat, & nō
Cadytas. Et sic iã memoriã Plinii Cassythã herbã
nomine Syriaco venisse in Latinum, quod multis
postea seculis usurpantes tam Pœni, quàm Ara-
bes, suis scriptis protriuerint. Quod autem Plini-
us sine spiritu protulerit, id librariorum culpa
factum esse suspicatur, quin inuertentes mutasse
Cassythã in Cassytas.

Sunt, inquit Matthioli, qui putent admira-
bile hoc plantæ genus Plinio Cassytam appellari.
Ex cuius equidem verbis, quoddam reperiuntur Plini-
ani codices, in quibus Cadytas, non Cassytas
legitur, quodque hæc arboribus tantum, & spi-
nis se circumuolat, nostra verò Cassutha duntaxat
herbas & frutices, non arbores complectatur,
& irretiat, non aulim affirmare vulgarem
Cuscutam esse Plinii Cassytam: præsertim cum
in Syria tantum nasci scribat ipse Plinius. Hæc
Matthioli, cuius vltima verba hæc, veritati cō-
trariane: Plinius non dicit tantum in Syria
prouenire, sed herbam Syriæ esse, & non tantum
arboribus, sed & ipsis etiam spinis sese circum-
uoluerit.

*Matth. re-
futat.*

*Epithymia
Serena
Corda*

Cordus in Dioscor. ait Epithymum, quo nos
hodie utimur, verum Epithymum esse, id tamen
infirmis argumentis negare Musam Brassiulolã:
verum enim Epithymum in pharmacopoliis ha-
beri, & nihil aliud esse, quàm Cuscutã in Thymo
nascentem: adnasci etiam Thymbra Cuscutam,
quæ Epithymum appellerur: Cuscutam alia-
rum herbarum accidens esse: Bene legi apud Plini-
um Epithymum sine radicibus nasci: nam pro-
prias radices minimè in terram agere, &c. *Nobis*
tamen Cuscuta non omni radice caret.

Cord. m.

*Locus &
Tempus.*

Cassutham copiosam obseruauit Montpelii su-
pra Thymum, eam autem vocant Epithymum:
itemque supra Aspalathum secundum, pluresque
plantas alias: Basileæ copiosè extra portam la-
pideam in superiore parte ad dextram mense Iu-
lio & Augusto: Montbelgardi copiosè in horto
III. E. C. supra Vrticam, in horto Nosodochii su-
pra Lupulum in suo adhuc vigore Octobri: in
agris versus patibulum Septembri. Cuscutam
supra Ebulum luxuriantem obseruauit Ioannes
Schvab in pago Strillenfrid ad flumini in fini-
bus Austriæ. Non in terra, inquit Fuchsius, sed
in herbis arboribusque passim nascitur Cassythã,
quas tam spisso sæpius irretit contextu, ut tento-
rii modo herborum cespitem à Sole vindicet.
Nonnunquam cacuminibus impendens stirpes
humiliter deturbat, propriamque parentem suis la-
queis strangulat, aut continuò materni alimenti
suctu producit ad tabem. Ætate Iulio potissi-
mum & Augusto mensibus, maximus illius in
Germania prouentus esse solet: hoc enim tem-
pore tanta eius est luxuria, ut mole suã stirpes o-
neratæ ferè procumbere videantur. Et hæc Fu-
chsius, qui radicem temerè nimium è medio tol-
lit. Planta hæc, inquit Tragus, viridis adhuc

*Fuchs. re-
futat.*

radicem habet prælongam, quam non multi,
quod sciam, obseruauerunt. Solet autem è terra
prodire Androsaces Iunio mense, ac in fine eius-
dem rotundos proferre acinos, semine perexi-
guo, Argemonæ, seu erratici papaueris simili, ex
quo ubi in terram deciderit, quotannis sponte
sua repullulascit, refertos. In Belgio planta lubè-
ter prouenit in Rubo, Lupulo & Lino, ac in aliis
etiam herbis, maximè locis calidis, ut in Thy-
mo, Thymbra, Tithymalo, Chamædri & Eryngio,
sed valde parua & tenuis est: ac locis siccis, in
Genistâ parua, & Absynthio.

Serapio Cuscutam tradit calidam esse in pri-
mo gradu & siccam in secundo: abstergit, aperit
obstructiones hepatis, renum, folliculi fellis,
humores expurgat crassos & biliosos, robor ad-
dit vtriculo & iecinori. Vtriculo tamen vsus
eius nimis aduersatur propter adstrictionem
immodicam: corrigitur tamen Aniso & semine
Apii: purgat bilem, idque efficacius quàm Ab-
sinthium: propinatur decoctionis scilicet cum
sacchari boni drachnis decem. Sunt in ea sen-
tentia quidam, ut pro plantarum, quibus innas-
citur, temperamento, iam calidam, iam frigidã
esse putent. Tragus magno experimento aquam
destillatam Cuscute laudat ad sudores ciendos, &
sanguinem purgandum, & obstructions hepatis
& lienis, & luem Veneream. Cæterum iis,
qui Cassytham parentis suæ facultatem aliquam
sibi quoque adsciscere autumant, subscribit etiam
Dodonæus, sic ut quæ Genistam superat, vrinas
potentiùs moueat, & ad alui deiectiones ma-
gis efficax sit: humidior quæ Lino implicatur
adstringendi facultatem admixtam habeat, quæ
Rubio infidet, quæ & propter hanc potentiam
adiunctam, aliis ad iocinoris, lienisque affec-
tus merito præfertur: cum enim expurgandi, ad-
stringendique facultates simul habeat, visceribus
istis imprimis vtilissima est: talia enim iocinoris
lienisque oportere esse medicameta, Gal. I. 12. m.
m. abundè docet. Lobum tamen etiam plantæ cui in-
nascitur, vires quadantenus referre concedat: è
Lino tamen Practicis & officinis præferri scri-
bit, quod citra calorem minùs adstringat, magis
emolliat, leniat, extergeat, & ad educationem &
decussationem præparet: in Vrtica verò natam vrini-
s potentius eliciendis & obstructionibus solu-
endis efficacior. Manipulus huius herbæ
vino decoctus & potus obstructions spatii &
lienis soluit, morbum regium sanat. In fomen-
tis, desensionibus & balneis sudatoriis ad quasuis
melancholicas affectiones, regiumque morbum
inueteratum præstantissima habetur Cuscuta.

*Vires & vi-
sus
Obstru-
tiones*

Correptio.

*Tempera-
mento
variat.*

Ex Vrtica

In decuss.

SERPYLLVM VETERIBVS ET

in genere.

CAP. XLII.

Ambagibus cunctis relectis, Serpylli pluribus
in locis meminit Theophrastus, in genere
tamen ait. Ex herbis viret perpetuò Serpyllum
(*serpyll*) videturque ex superioribus oriri. Sunt
enim qui omnino fructu carere assenserunt. Sæ-
pè enim exsiccatum, tritumque seruisse se inqui-
unt, sed nunquam germen etupisse: nam huius
quoque periculum se fecisse affirmant: attramen
& florem & semen fert. Neque desunt qui vel
hæc experti fuerunt, & natura ipsa siluestrium
planè attestari videtur: Serpylli etenim siluestre
etiam genus est, quod deferentes ex montibus
serunt, ut apud Sycionem fieri solet, atque etiam

*Serpyll.
Theoph.*

Satur

Athenis ex monte Hymetto : apud alios verò, vt in Thracia, montes & plana omnia Serpyllo sca-
tent : apud nonnullos etiam Thymo figura, fo-
lio, rectis virgulis, flore, odore, viribus & facul-
tatibus simile [*Serpilla* enim legitur in græco tex-
tu, pro quo Gaza perperam transtulit, Thymum
penitus redolet.] Constat ergo quod sui ortus
primordium ex semine capit : in summo terræ
adhæret, radice multifidâ, torridaque, & ligno-
sa : Ramulorum proprium quoddam est incre-
mentum. Quippe cum possit in quantamlibet
longitudinem produci, arcepro pedamento ali-
quo, aut si propè sepes plantetur, aut ex altiore
loco demissum, auctu facillimum. Species autem
urbani (sc. Serpylli) tenere non est (facile sc.
fieri nequit, vt quis eius species recenscat) Syl-
uestris verò [sc. Serpylli.] aiunt esse [sc. certas
species & dictu faciles.] Hoc enim in montibus
(sc. prouenit) Thymbræ odore simile, acrimo-
niæque. Illud verò odoratum & mollius [sc. o-
dore non acri.] Serendi verò oportunitatem ipsius
tempus, vt plurimum est Autumnus, in quo pro-
perant inter prima conserere. Cæterum, Vere
nonnulli quoque ferunt : & cum cætera umbram,
aqua, fumumque ament vniuersè, hoc squalorem
patitur, atque in totum aquæ pauca indigum
est : sed fimo præcipuè gaudet, & iumentorum
potissimum : Transferendum quoque id sæpius
centent vt melius reddatur. Serpyllo, inquit Plin-
nius, lib. 19. cap. 8. sub finem : [cætera quæ alibi de
Serpyllo tradit parum distincta : nec bene dixit
Serpyllum suis innasce administrari :] montes ple-
rique [plana que Theoph.] scærent, sicut in Thra-
cia, vbi aquæ (vbi quidè Theoph.) deferunt ex iis
auullos ramos, feruntq; Item Sicione ex suis mō-
tib; & Athenis ex Hymetto, &c. letissimū nascitur
in puteorum parietibus, & circa piscinas ac sta-
gna, Lib. 20. cap. 22. Serpyllum à serpendo pu-
tant dictum. Quod siluestri euenit, in petris
maximè. Satiuum non serpit, sed ad palmi al-
titudinem increfcit. Pinguius voluntarium &
candidioribus foliis, &c.

*Serpyllum
duplex
Dioscoridis.*

Dioscorides Serpyllum vnum agnouit hor-
tense, odore Sampsuchum referens, & corona-
rium. Nomen item habere à serpendo, & quod
prout quæque ipsius pars terram contingit, ra-
dices agat. Habere folia & ramos Origano [*an-
gustifolia* : legendum arbitror *serpyllifolia* Clus.] similes,
sed candidiores. Verum ad sepes demissum, au-
ctius assurgere. Alterum siluestre statuit,
quod & Zygis appellatur, non serpens, sed ere-
ctum : ramos emittens tenues, sarmentotos, foliis
plenos, similibus Rutæ, angustis tamen, & oblon-
gioribus ac durioribus : flores gustu acres : odo-
re iucundum : radicem inutilem.

Et hæc ex Dioscoridis autoritate, apud quem
Serpyllum quidam agrestem Zygida, alii verò Po-
lium, Egyptii Meruopnon [Meronopū alii] Ro-
mani Cicer erraticum appellant. Herpillon au-
tem Græcorum, & inde Serpyllum Latinorum,
dictum quidem est à serpendo, rum quia per ter-
ram, quæ illam contingens radicatur, serpit : cum
quia iuxta sepes plantarum, aut ex altiore loco
deorsum demissum, adiecto illi pedamento, in
longum protrahitur & serpit, autore Theophra-
sto, Dioscoride, & Plinio. Zygis appellatum
est siluestre genus, idque vt videtur à trutina, quæ
Græcis Zygon dicitur, eò quod in rectum, instar
trutinæ, ramulos suos erigat : Seu quia ramulis
eius ad vincendum & ligandum, iugandumque

præcipuè vites, quod Græci ζυγιν aliquando di-
cunt, antiquiores vterentur. Cicer erraticum
ac rusticum appellatum est à foliorum similitu-
dine, conuenitque syluestri generi hæc appella-
tio, quod stat, & Ciceris modo ramulos suos eri-
git, inquit, Humelbergius apud Apuleium,
qui floribus esse ait Serpyllum agreste omnibus
in virgis constitutis, in summitate purpureis, re-
mordentibus linguam, odore iucundo : nasci
præterea in petris, vehementiorem autem esse
quàm rubeam, seminalem siue hortualem appel-
latam. Cætera eadem tradit quæ Dioscorides.

*Serpyllum
Nicander.*

Nicander in Ther. commendat Serpyllum ad
arcendos serpentes : *serpilla* appellans, quod
continuè in anteriorem partem progreditur, eo-
rum modo, quæ aut in armentis & gregibus, aut
in corporibus nostris pascendo progrediuntur &
serpunt : & *serpilla*, quod vitam amet, ideoque ip-
sum seipsum noua continuè sobole, & propaga-
tione radiceat, & *serpilla*, id est, radices agentibus
foliis, quod Dioscorides ait : quæ parte ter-
ram contigerit, seipsum radicat. Vocatur itaque
Serpyllum pascens, quod vitæ cupidum, madidâ
depascitur herbam : Aut quod radices agens hir-
sutis semper foliis, seipsum in altum suspendens,
pascat. *Serpilla* etiam dici perhibet Scholiastes
Græcus, eò quod vt plurimum radices ipsius ser-
pant, ac propterea etiam *serpilla* vocari, quod sub-
inde vterius pascat.

*Serpyllum
pascens.*

Hermol. transcribit multa de Serpyllo ex
Theophrasto eo non citato : deinde ait, satium
non serpere Plinio, sed ad palmi altitudinem in-
crefcere ; voluntarium i. e. siluestre serpere in pe-
tris maximè : Dioscoridi contra serpere satium,
non autem siluestre.

Herm. m.

Marcellus nihil scribit, quod multam lucem
adferat Serpyllo à Veteribus tradito : Tam suauis,
inquit, quem ex se mittit, odoris halitu delectat
omnes Serpyllum ; tamque vno hoc bono vbi que
sefe commendat, & amabile facit, vt in delitiis
vitæ homines id sibi semper fecerint, & adhuc
faciant coronis in conuiuiorum læticia, & si li-
gnosum sit, adicientes rusticis pulmentariis, li-
cèt multo calore serueat in ore : nouerunt id quæ
vrbes & agros incolunt gentes omnes, pauci ta-
men siluestre à satiuo discernere didicerunt. &c.

*Marcell.
satium.*

Serpylli æquinoca tradituri, dicimus Serpyl-
lum vulgare esse Serpyllum antiquorum : inue-
nitur autem flore maiore, & minore, colore pur-
purascente, & aliud albo. Serpyllum maius Ser-
pyllum Citrii odore. Serpyllum angusto folio
odore Nucis Iuglandis, vel nullo. Serpyllum
angusto, lanuginosoque folio. Serpyllum longi-
folium hispidum. Serpyllum Thymi folio Nar-
bonense. Serpyllum siluestre Zygis Clusio, Thy-
mo vulgari rigidiori simile. Tragus auctor est
Thymum Germanos Serpyllum Italicum vo-
care.

*In conui-
uiorum co-
ronis.*

Acquinoca

*Serpyll.
vulgare.*

Serpylli præterea nomine apud Authores se-
quentes donantur Plantæ. Thymus latiore &
viridiore folio. Acinos multis. Serpyllum al-
terum Tragi. Tragoriganum Matthioli. Origa-
num. Silymbrium. Valeriana siluestris maior.
Artemisia. Veronica scæmina Dodonzi.

Serpyllum Tralliani quale sit considerandum.

SERPYPILLVM VVLGARE.

TAm græco, quàm Latino nomini originem
dederunt serpentes *ramuli*, duri, lignosi, qua-
drati,

Descriptio druti, subrubentes, modicè hirsuti, qui vbi terram attingunt, nouas subinde radices agunt : primæ autem lignosæ sunt, satis crassæ & frequentes, fuscæ, plurimis fibris capillatæ : ad ramulorum nodos singulos falsa plura, Thymi vulgaris latiora, subrotunda, nervosa, sapore acri & aromatico : flores in capitulis Thymi interdum candidi, plerumque tamen purpurascens.

Varietas Eius duplex habetur genus : *Primo* flos est media parte minor, apice in medio interdum bifido : colore ut plurimum purpurascens : folia, ut sequentis, odore non nihil ad Melissam accedente. *Secundo* flos maior duplò, in medio quinque apices, color remissior & minus purpurascens : in foliis non differt à precedenti, nisi odore, qui nobis suauior videtur. Serpyllum interdum degenerat in capitula



tomentacea, candicante, quæ florum loco sunt. Est nobis præterea genus aliquod, foliis & caulibus præcedentibus si mile, sed hirsutum valde.

Nomina **linguarum** Nota vulgo est herba, & Græcis quidem *ἑρπύλλιον* dicitur : Latinis autem Serpyllus & Serpyllum : Germ. Quendel / fümel / fums del / fyenlein / hünersöl / hünersflee / wild Dorley / vnser fräwen betstro / hünerserb : Belgis Quendel / wilden thymus / & vnser vrouwen bedstroo : Gallis Serpolet & Pillalet, Dod. It. Serpyllio, seu Serpollo : Hisp. Serpoll & Serpillo, Dod. Serpollio seu Serpam, Camer. apud Matth. Angl. wild tyme : Boh. Materii & außfa : Sclatun. Babaduffa : Hung. Bafut seu h.e. Cuculi herba. Arab. Hamen, Serapioni autem Arillas.

De Serpylli descriptione Porro tam Dioscorides, quam Plinius, duo faciunt Serpylli genera : in descriptione tamè non conueniunt, quorum alter Serpyllum syluestre negat serpere, alter affirmat : difficile hinc est dicere, cui sit adhaerendum. Auctoritas Dioscoridis ad se trahit Turnesium : sed experientia nonnullâ adducitur, ut in Plinii sententiam penè faciliat. Quemadmodum enim nullum iniquâ ut ait vidit Serpyllum, etsi ex siluestribus translatum, serpere, & ex cacuminibus, caulibusque radicari denud, ita nullum unquam, rectum surgere obseruauit, præsertim adultum, sed semper in terram caducum : fatetur tamen Serpyllum etiam siluestre, cum capitula floresque producit, coliculus tollere, sex circiter vnciarum : & hinc fieri posse, ut Dioscorides Serpyllum syluestre non perpendens, pronunciarit Serpyllum siluestre non repere, hortense autem serpere, & exgeniculis denud radicari, quod obseruationi Turnesi repugnat, nisi de siluestri intelligatur in hortis translato.

Tragus in Hist. germ. Serpyllum penè Dicta-
Tom. III.

munum Dioscoridis existimarat : nolebat tamen suâ opinione quemquam decipere, ac idè in lat. tanquam erroneam omisit.

Serpyllum hortense in Hetruria haud negligitur : sed in hortis seritur, & magnâ admodum diligentia colitur, quod etiam inibi (ut Dioscor. inquit) in coronamenta additur. Siluestre duorum est generum vnum flore candido, odore citrei Mali : alterum verò flore purpureo, gustu perquam acri, Satureiz simili : vtrumque copiosissimè nascitur apud Goritienfes Saluatico monte, quo multi (inquit Matthiol.) hætenus lætius nusquam videre contigit, nec item odorati. Serpyllum Theophrasti hortense nil aliud esse censeo, quàm siluestre in hortis satum.

Dodon. in fol. lat. Serpyllum vulgare pingit & describit, ac dicit : Officinæ Serpyllum : pleræque verò etiam Pulegium montanum nuncupant. Et passim quidem Serpyllum Veterum existimatur : non tamen tam Serpyllis, quàm Saxifrangæ Dioscoridis respondens. Si etenim diligenter, & ad Serpylli vtriusque & ad Saxifrangæ descriptionem expendatur, exiguum Serpyllis, plurimum verò Saxifrangæ simile esse comperietur.

Varietatem in flore Serpylli perhibet Lob. in Adu. cum ait : Serpyllum hodie quoddam satium quod habitius & grandius : quoddam verò siluestre, incultis marginibus, sterilibus, & collibus gaudens : facies vtrique Thymi nostratis vulgaris : flosculi purpurantes, nonnunquam & albescentes. In Obs. pag. 230. in Icon. Plant. p. 423. huius figuram habet inscriptione Serpylli & Saxifrangæ Dodonzi. Clus. Serpyllum vulgare repens vocat.

Tabern. Icon. & Hist. Serpyllum minus flore albo : Item Serpyllum minus flore purpureo. Frustra duas figuras ponit, herbæ solo colore floribus variantis.

Camer. hort. Serpyllum maius flore purpureo, & aliud candido. Thal. Serpyll. passim, sed rariis floribus candidis. Hort. Lustr. Serpyll. vulgare : item album : ac Serpyll. minus.

C. Bauhin. Phyt. Serpyll. 2. siue vulgare maius : Camer. Serpyll. maius flore purp. & candido : Tabern. Serpyll. album, qui & alteram habet figuram, Serpylli albi 2. nomine. Item Serpyll. 3. siue vulgare minus : Brunfels. Serpyllum : Lobel. Serpyll. & Saxifraga Dodonzi : Apud Matth. Serpyll. satium 1. Serpyll. vulgare minus 2. *Duo hæc Matthioli Serpylla cur frater separet, & duas figuras ex Tabern. se. priorem eius & postremam assumat, credimus excusationem adferre cum vix possit : nec Matthiolus duo hæc Serpylla ab inuicem seiunxit.*

Nulli porro sunt, authore Clusio, nudi colles, gramineique campi, aut sicciora prata, vtriusque margines herbosi qui vulgare Serpyllum in Pannonia non alant : in omnibus Europæ prouinciis occurrit, passim locis siccis, restante Gesnero, asperis & apricis luxurians : & pro diuersitate locorum ac cæli odorem mutat. Serebatur olim in hortis, idque surculo, non semine. Serpyllum hortense in Aprilis initio florens conspexit Marantha : sed Iunio & Iulio mensibus florere scribit Fuchsius. Ego Serpyllum obseruavi Montpelii, Parauii, & Basileæ florens mensibus Iulio & Augusto. Genevæ florens passim mense Maio & Iunio. Montbelgardi in horro Ill. E. C. vnum flore minore, & alterum maiore.

Serpylli Vires & facultates ex Dioscoride & Plinio Poëmate hoc describit Macer :

Serpyll. hort. Matthiol. Syluestre duorum generum.

Pulegium montanum.

Saxifraga Diosc.

Serpyll. du. plen.

Saxifraga Dod.

Tab. ser.

C. Bauhin. ser.

Locus

Vires & vfus

*Serpillum veteres dixerunt quoddam quasi serpentem
Terra vicinum, hinc feruida siccaque vis est,
Acti cum vino c. cum contundis Olio,
Cui Rosa dat nomen, hoc vnguine per lue frontem
Agros, capitis s. l. hoc sedare dolorem:
Nidus combustus serpentes effugat omnes,
Et quoduis animal infundens ore venenum,
Hoc idem misere cibus inessoribus est mos,
Vt si forte sapor fessis depresseris illos,
Vermibus à nocuis tunc requiescere possint.
Pestiferas morsus bibulam inuat, appositumque
Prænotat urinas, compevit tormina ventris:
Splen inuat admixto si sapor sumatur aceto:
Si mel prædictis iungatur, sputa cruenta
Lactantes, mirè potus s. l. ille inuare.
Haustum cum vino iecoris sedare dolorem
Dicitur, hicque solet producere menstrua potus.*

Oculor.
caligo.

Serpillum autore Galeno, usque adeo exalcat, ut & menses, & urinas moueat, gustu multum acre. Serpyllum cum melle & aqua coctum, ad caliginem oculorum, si eo lauentur, commendat Arnoldus Villanouanus. Anton. Roiet è Serpillo cum Saccharo parat Electuarium pro pauperibus à peste præseruandis, quos antè ientiaculum nucis Castaneæ quantitate accipere iubet. Serpillum refrigerare putatur corpora æstu Solis feruida, nõ secus atque Allia, Cæpe, cæteraque acria vesca. Rationis quædam vestigia videre est in diuini Maronis Bucolicis.

Testylis & rapido fessis inessoribus æstu

Allia, Serpillumque herbas contundis Oleres.

Facultate Serpillum vulgare calidum & siccum esse perhibet Dodonæus, tertio penè ordine, tenuium partium & incidens: menses euocare; urinam ciere, calculos expellere; & in balneis ac fomentis adhibitur, sudorem euocare.

SERPILLVM CITRII ODORE.



Serpyllum hoc ab aliis non obseruatum ait Clusius, qui sic describit: Admodum, ut opinor, simile est vulgari, in omnibus Europæ provinciis occurrenti: crassiora tamen & magis atra habet folia, quæ trita, Citrii mali, vel Melissophylli odorem referunt, & capitella paullo maiora, magisque

purpurascencia, similibus tamen flosculis prædicta: crassiores ramulos, quadrangulos, palmares, per terram fusos, ad singula internodia fibras agentes: radicem verò lignosam, multifidam, fibrosamque, numerosos proferentem cauliculos, summâ tellure in orbem sese spargentes.

Locus
& tempus

Clus. in Pann. p. 626. & Hist. post. vocat Serpyllum Pannonicum 1. & Serpyll. Citrii odore. H. Lusit. Serpyllum citratum. C. Bauh. phyt. Serpil-

lum 4. siue foliis Citrii odore, & Serpyll. citratum Tabernamontani.

In Pannonia mixtum cum vulgari prodest, cum eo etiam florens Iunio. Ego prope Dornach Serpillum Citrii odore mense Augusto obseruavi.

SERPILLVM ANGUSTO, LANUGINOSOQUE folio.



Latè serpit, & magnos cespites nonnunquam occupat. Nam licet duram & lignosam habeat radicem, ut præcedentia genera: tenues tamen, quos in circuitu spargit, cauliculi, lubinde fibras agunt, quæ temporis successu, in radices non minus duras, & lignosas euadunt, quam sic primariæ, atque alios deinde

fundunt in ambitu cauliculos foliis non minus quam proximè præcedentis, oblongis, & iis quidem angustioribus præditos: incanâ, molliorque lanugine pubescentibus: longa in summis cauliculis capitella à Serpilli longo glabròque folio capitellis non differunt, & similibus flosculis plena sunt: semina in villosis rufescentibus verticulis parua, rotunda, fusci coloris. Tota stirps pineum quodammodo siue resinaceum odorem trita refert, & calido gustu est.

Clusius descriptionis auctor in Pannon. p. 627. itemque in Hist. post. Serpyllum Pannonicum tertium inscribit, ac Serpillum angusto lanuginosoque folio cognominat. Idem etiam ibidem aliud describit Serpyllum: Angusto scilicet folio, odore nucis iuglandis, vel nullo: nec non etiam Serpyllum longifolium hispidum, cuius figura etiam exstat in tabella huius Serpylli angustifolii. C. Bauh. phyt. Serpyllum 7. siue angustifolium hirsutum: illud verò quod odore est iuglandis 6. angustifolium glabrum.

In Pannonia, Austria, & vicinis provinciis cum vulgari nasci ait, & florere Iunio. In hac porro tabella exhibemus ramum Serpilli longifolii hispidi, quod hic subiicimus.

Synonyma

Locus
& Tempus

Serpillum Thymi folio Narbonense.

In Ericetis Egidii pagi vulgò S. Gilles agri Montpellierensis, Thymi angustifolii facie rarior Serpilli species lignosis & durioribus surculis repit, cuius radix & flores similes nostrati. Huius ramulos nobis communicauit Franciscus Peninus.

Pingitur à Lob. in Obs. p. 230. in Icon. Plant. p. 423. sub hac inscriptione: Narbonense Serpillum foliis & facie perpusilli angustifolii Thymi nostrati. C. Bauh. phyt. vocat Serpyllum 1. siue Thymi folio. An Camer. hort. Serpyllum minus

Descriptio

nus

nus folio Thymi, sed virentiore, angustior

Tab. m. Tabern. dicitur in Icon. & Hist. Serpyllum Creticum. Illi vel eius Succenturiato placuit in hac planta fingere, quæ libuit: Figura ex Lobeliana mutuata & mutata: falsus titulus appositus, descriptio facta ad malè consideratam figuram.

SERPILLUM SILVESTRE ZYGIS

Clusio, Thymo vulgatiore rigidiori simile.

Serpyllum silvestre Zygis appellatum, quale Dioscorides describit, observabam, ni fallor,

Descriptio



(inquit Clus.) in Castella veteri, iisdem locis cum Thymo duriore, siue nigro, cui perquam simile est figurâ, ramis, altitudine, & radice: folia verò paulò latiora habet quàm Thymum, minus odorata, sed gravius nonnihil olentia, ut pote quorum odor ferè sit inter Abrotonum & Stæchadè medijs: in virgis item ramulos,

qui floribus verticillatim nascentibus vestiuntur, coloris ex albo purpurascens: quâ florum dispositione & odore, à Thymo discerni penè duntaxat potest. Minor est præterea eius acrimonia quàm Thymi, quippe quæ aliquid adstrictionis adnatum habeat.

Synonyma

Clusius author huius historiæ in Hisp. vocat *serpyllum dymu* & *serpyllum*. Dioscoridis, id est, ut in H. post. (vbi figura) ait, Serpyllum silvestre Zygis Dioscoridis: Est autem hæc Clusii imago apud Lobelium pro Narbonensi Serpyllo: cogitandum igitur, an eandem plantam uterque intelligat [ac cum his etiam Dodonæus, qui in fol. lat. eandem pingit Serpylli alterius titulo.] Vel si non eadem omnes tres pingunt, quis melius adaptarit iconè suæ descriptioni: quum verò Clusii descriptioni respondeat, nos etiam ei apposuimus.

CUNILA VETERIBVS.

Cap. XLIII.

Cunila generis Plinio

Meminis Cunilæ Plinius lib. 20. cap. 16. eiusque præter sativam plura statuit in Medicina genera. Est enim quæ Bubula appellatur, Est quæ Cunila gallinacea appellata, Græcis Origanum Heracleoticum dicta. Est quæ à Græcis mascula, à nostris Cunilago vocatur; è contrario est quæ Mollis vocatur: est quæ Libanotis: & præter sativam est etiam montana. Commendantur à Plinio Cunilæ species contra serpentes, tussim, iecinorum vitia, & laterum dolores, ut & ac moudas vrinas, ac ducenda mulierum lochia. Masculæ verò dictæ vires vehementissimi-

Tom. III.

ma in omnibus generibus.

Cunilam bubulam Origanum silvestre Græcorum esse, Ruellius convincere nititur lib. 3. c. 25. placetque hæc opinio, etiam Dalechampio. Gelsnerus Bubulam appellatam conficit, quod inter boum, remedia fortè olim in vfu fuerit, quàm apud Scriptores in Hippiatrica solùm mētio eius inueniatur.

Cunilæ nomine sequentes plantæ passim apud autores occurrunt. Satureia hortensis. Satureia silvestris. Origanum Heracleoticum Matthioli. Origanum vulgare. Clinopodium Matthioli primum. Ligusticum. Conyza. Origanum silvestre. Encensaria. Serpyll. siva. Siler montanum. Acinos. Conyza. Conyza maior Matthioli. Conyze medice minor species. Conyza media Matthioli.

Cunilabubula est Origan. silv. Bubula unde dicta

Aequiuoca

THYMBRA VETERIBVS.

CAP. XLIV.

Thymbra Dioscorides notam ait, prouentientem in tenui terra & asperis locis, similem Thymo, minorem tamen & teneriorem, ferentem spicam flore plenam, viridem. Possit eadem, quæ Thymum, si similiter sanatur. Et in sanitate ad vsum idoneam esse. Nasci & sativam Thymbra, per omnia minorem sylvestri, sed vtiliorem in cibo, eo quod non ita intentam habeat acrimoniam.

Thymbra Diosc.

Thymbra silvestris quidem, inquit Paulus, eadem quæ Thymus potest: sativa verò per omnia debilior est, sed ad esum melior. Si mola ex crassa genitura, ingus adhaerescens, generatur, Satureiam [Satureia] ex aceto ex aqua tenuiter trita, potui exhibendam præcipit Hippocrates.

Thymb. siva silvestra

Cæterum, habuisse se antiquissimum & probatissimæ fidei Dioscorideum codicem refert Marcellus, in quo plures Thymbre à principio appellationes, præter Cunilam & Satureiam, hæc leguntur: Clinopodion, Probation, Ageratum, Origanus agrestis: & post barbaras, nulliusque intellectus plerasque alias, à Romanis Cunilam rusticam appellati.

Thymbra appellatio. nec notata

Marcelli sententiæ quæ Thymbra, Cunilam, & Satureiam vnam eandemque herbam facit, contrarius esse deprehenditur Cornarius, vbi in hæc verba prorumpit: Plinius eandem herbam Thymbra, Cunilam & Satureiam facit. Columella verò, inter Thymbra, & Cunilam, quam Satureiam vocant, distinguit. Quod verò inter Thymbra & Satureiam sit differentia, in carmine docet:

Cunila rusticam

Marcelli opinio reprobatur.

Satureia quid Cornario.

Et Satureia Thymi referens Thymbraque saporem. Mihi itaque mangonio parata fuisse videtur Satureia, & ex Thymo ac Thymbra composita, ut non simpliciter Thymbra, Satureia dici possit. Galenus in simpl. tractatu Thymbra præterit, nisi excidisse putandum est.

Cornatio subscribit inter alios etiam Dodonæus, dicens: Græcis *thymbræ* est, nec aliud Latini nomen verè habet. Nam quod Satureiam interpretes dici velint, Columellæ Latino scriptori repugnat, qui inter Thymbra & Satureiam manifestum discrimen ostendit. A vulgo autem in officinis Thymbra nullum nomen accepit.

Confundi tandem tres diuerlas plantas vna appellatione, testatur Marcellus. Vtinam, inquit, agrestem Origanum, Thymbra, & Thymum non simul miscerent Herbarii.

D d i

De Thymbra in Lex. Rob. Constant. hæc scribit : *Thymbra* Dioscoridi, dicitur *Thymbra* Hippocrati, & *Thymbra* Theoph. histor. 7. i. Plinio Thymbra, Cunila, & Satureia: Columella tamen inter Thymbram & Satureiam distinguit. Actius etiam *Thymbra* dixit in plurali.

Cæterum Virgilius 4. Georg. Thymbræ graue odorem esse perhibet:

Serpilla, & graue spirantis copia Thymbra.

Phaenonius verò Thymbron, olus esse acre & amarum statuit.

Thymbræ demum species prima Dioscoridis Anguillare, videtur nobis Thymbra Græca.

Thymbra vera Dodonæo, est nobis Satureia durior.


Thymbram hortensem multi faciunt Satureiam satiuam, de qua mox agemus.

Thymbræ
nomen
donatæ
plantæ.

SATVREIA SATIVA.

CAP. XLV.

Descriptio



Lignosa nititur radiculâ & simplici, ex qua virgulta surgunt, pedem aut cubitum alta, teretia, rubescētia, subhirsuta, geniculis certis distincta, ad quorum singula folia nascuntur Hyslopi vulgaris, non nihil hirsuta, & crebris foraminulis, non tamen peruiis, erosa, odore Thymi vulgaris, mitiore, sa-

pore æquè acri: ex eorundem alis *stipulæ* exeunt in quatuor laciniolas diuisi, ex albo purpurascētes: semen paruum, Chelidonio conferendum æstimat Tragus, tamen illo magis sit incanum, & colore sub nigricans.

Post Serpyllum, inquit Tragus, atque Thymū, sequitur Satureia, seu hortensis Hyslopus, & iure quidem, quod enim ad formam & temperamentum attinet, consimiles penè apparent commemoratæ plantæ. Est autem hæc inter illas statuenda differentia, quod Satureia, maior & magis fruticosa, & quæ instar arbusculæ multis ramulis brachiatis, quotannis increseit.

Multi, vt Fusch. Trag. Corn. Lacuna, & alii Satureiam satiuam, Thymbram esse concludunt, quibus ad stipulari videntur Matthiolus & Dodonæus. Et hinc quoque Cordus in dispens. supra diaphysop. & diacurcuma Nicolai in defectu Thymbræ, siue Satureiæ siluestris, sumit satiuam Thymbram, h. e. Satureiam hanc nostram.

Hist. Lugdunensis contra neutram Dioscoridis Thymbram, nostratrem Satureiam dici voluit: cuius fuit etiam opinionis Bellonius.

Cæterum, Latinis Satureia appellatur, Trago sc. Corn. Matthiol. in prior. comm. Lacunæ, Turn. Dodon. Camer hort. & Tabernamonta-

Descriptio

no: Satureia sativa Fusch. Satureia siue Thymbra sativa Cordus in Hist. Satureia hortensis Lob. in Adu. p. 182. in Obs. p. 232. in Icon. Plant. p. 426. Satureia vulgaris hortensis Matthioli H. Lugd. p. 898 Satureia altera Matth. in comm. cum mag. fig. in Epit. cum add. Camerarii; in Hist. German. eiusdem Satureia prima. Gerardo Satureia hortensis altera: C. Bauh. phyt. Satureia 1. siue hortensis; apud Matth. Satureia altera: Brunfels. Hyslop. agrestis. Dodonæo inter nomina Cunila Columella. Gesn. hort. Thymbræ hortensem vocat; in Car. pl. Thymbram herbam: Cæsalp. Satureiam herbulam.

Siguitur alia est Thymbra Dioscoridis, & alia Satureia hæc sativa seu hortensis, meritò hanc appellabimus Arabicè *Sabater*, seu *Shatar*, & cū Rhaze *Caroban*: Germ. *Saturon* / *Saturey* / *Sa-dauey* / *Sergentfrant* / *Fanell*: *Zwibelhyslop* / *Garten hyslop* / *Joseple* & *Hünersfull*: Belg. *Leülen* / nomine vt apparet à Cunila detorto, item *Saturey*: Gall. *Sariette*, *Sarriette*, *Sadrée*, *Sauvée*: It. *Sauoreggia*, *Cornicella* & *Pauerella*. Hysp. *Cast. Axedrea*; Cat. *Sagorida*; Port. *Saturagen*, *Segurelha*, Brab. *Timbria*, & *Saturegia*: Angl. *Sauery* / & *Sommer Sauorie*: Boh. *Satureget* Polon. *Egibr*: Hung. *Boro fu*.

Satureia autem à saturando fortè dicta, quod eduliis frequenter indatur & incoquatur, id quod germanicum illud nomen *Hünersfull* innuere videtur, quod ad gallinaceum genus faciendum non raro adhiberi consuevit. Prouinciales quidam, vt nobis relatum, vocant *Pebre d'an*, vel *Pebre d'aze*.

In hortis vbique ferè feritur, quotannisq; moritur. Planta enim est æstiuæ, quæ per Hiemem durare non potest. Non solum autem in hortis feritur, sed spontè per se nascitur in apricis collibus, & in torrentium alueis, si fides Matthiolo haud neganda. Eodem quo prouenit anno floret, semen facit, ac deinde perit.

Porro Satureia calida & sicca tertio ordine, sed minùs quam Thymbra (Satureia durior) quàm mitior est, atque idcirco etiam vt Dioscorides ait, in cibis commodioris vsus: Attenuat autem & flatu insigniter discutit, proinde vnà cum Phasiolis (Fabis cum Selino incisa & infixa edulium gratum Belgis frequens habetur, Lob.) & aliis leguminibus statuosè vtiliter coquitur ac editur imo ventri calens in fomento apposita, vteri ex flatu strangulatus mox sedat, authore etiam Dodonæo. Thymo suis in qualitatibus similis est, inquit Matthiolus, proinde excalfacit, aperit, ineidit, & digerit. Satureiam planè eandem cum Serpyllo vires obtinere ait Tragus (sed illo odore suauiore ac remissione, gustu autem & naturâ calidiorem esse, proindeque condimentum pauperum: nam omnibus eduliis tam carniū, quàm piscinā concoqui: inducere enim appetentiam ciborum, stomacho conferre, veneremque stimulare. Alia, si quæ sint, Satureiæ iuuamenta, in historia Serpylli & Thymi declarata esse. Vnum hoc addere libet, consuetudinem nimirum esse pauperibus, in nostra Germania, vt hac herba Brassicas, quas vulgò vocant capitatas, condiant, qui sit, vt illæ iucundissimum odorem, ac saporem gratissimum inde accipiant.

Nomina
linguarum

Locus

Tempus

Vires &
Vfus.

SATVREIA DVRIOR.

CAP. XLVI.

Satureia durior folia habet minora, C. Bauhino, aliquando latiora; multoque duriora, dilu-

dilutiùs virentia, quàm sativa, numerosa in ramulis brevioribus, multis statim à radice

lignosa, perenni, pullulantibus: ex foliorum alis spicem vtrinque emittant breves, Hylsopi quodammodo similes, strobilorum candidorum.

Hanc Bellon. Obs. lib. 1. cap. 62. commemorat, ac vocat, Tragariganum circa Hierosolimam in montibus repertum.

Anguill. speciem Thymbra facit, &

quidem silvestris, quæ in Tuscana vocatur *Temo*, *Tumbi*, ac etiam *Thimo*, quod sc. folia habeat similia Thymo, sed maiora.

Dodon. Columellæ authoritati innixus, inter Thymbra & Satureiam discrimen statuit: idcirco Thymbra præsentem plantam inscripsit, Thymbraque Græcorum asserit, vulgo ac officinis incognitam. Satureiam autem non esse, etiam ex Plinio concludit.

Lobel. in Aduers. itemque Icon. Plant. p. 426. dicitur Satureia siue Thymbra altera: in Obs. p. 212. pingitur sub falso Satureiæ hortensis titulo. Dicit totam guttu esse Piperis, coque vulgo Piperellam appellari. Camer. in Epit. Matthioli. itemque Hist. eiusdem germ. Saxifragiam secundam inscribit.

Non dubitandum quin H. Lugd. vnus plantæ plures proponat figuras: & primæ quidem p. 897. hæc esse inscriptionem, Satureia durior: alteri verd hanc, pag. 898. Thymbra effigies Dodonæi: fortè & tertiam habet p. 898. sub hoc titulo, Thymbra Dodonæi, quæ figura inepta videtur, nec dum eam apud Dodonæum reperi: prior adhuc icon & secunda describitur: tertiæ nulla fit mentio. Indagandum denique quantum ab hac differat Hylsopus Fuchii nomine posita p. 934. Et an eandem cum Hylsopo Bellonii.

Tabern. in Icon. & Hist. Thymbra 1. Römisch Saturei. Item Satureia Romana 2. Pro hac Satureia Romana 2. ponit Compiler iconem, quæ Linatiam Beluidere potius exprimit, quàm ullam Satureiæ speciem. Quam itaque plantam intelligat nos fugit, & forsan ipsemet ignorat quid scribat.

In Germania ac Belgio temerè fuerit alibi, quàm in hortis querere. Ferrur in montosis & saxosis Narbonensibus & Pedemontanis, asperis quibusdam & incultis vberim prouenire. Nos variis in hortis eam obseruauimus florentem Vere ac etiam Autumno. Montbelgardi in orto Ill. C. Hiemem interdum perfert, nec quotannis perit: nimio tamen frigore existente reponendam curauimus.

Facultatem autem Thymbra [Satureiæ durior] Dodonæus calidam & siccam tertio excessu assignat: attenuare, incidere, meatus expurgare: breuiter, omnia quæ Thymum posse & præstare.

Ex opinione Cameratii apud Matthiolum, vrinâ cit, calculos in renibus frangit & eiicit, visumque, si edatur, acuit Saxifraga secunda, cuius titulo Satureiam hanc duriorē exhibet.

THYMBRA GRÆCA. CAP. XLVII.

M Vultis ea ramis statim à radice fruticat, Thymi instar, quadrangulis, subasperâ lanugine obductis, purpurascētibz, quibus innascuntur alternatim semper ex aduerso ramuli, folijs eadem serie digestis onusti, Thymi genuini folijs pæne similibz, subhirsutis, odoratis, medii quodammodo inter Camilam & Thymum odoris, acriusculique saporis: summos ramos verticillatim ambiunt aliquot capitula multis foliolis constantia, inter quæ caliculi, è quibus emergunt suauiter purpurascētes *strobili*, Thymi strobilis similes in quatuor lacinias diuisi quarum infima latior est & repanda, suprema etiam lata, sed breuior, reliquæ duæ minores, prodeuntibus è medio quinque staminulis candicantibus, quorum apices tutei coloris, & medio stilo bifido: è semine hæc planta nata patillo, nigro, Thymi semini non ablimilis: radix dura, lignosa, quam in Belgio perennem futuram, vix sibi persuadere potest Clusius, licet rami procumbentes fibras egerint.

Clusius legitimam Thymbra statuit, quam etiamnum hodie Cretenses *Thymbræ* & *Thymbræ* appellant, Arabes, si Rauuulfo credimus, *Sathar* *Sathar* A. dicunt. Insule Sio incolis *spasbia* dicitur, vt *rabum*. vult Anguillara. Cretensibus *reia* vt scribit Bellonius.

Primum Clusio conspecta fuit & exactè nota anno reparatæ salutis humanæ 1595. vt quæ illi illo ipso anno in Belgio nata fuit, semine à Bello è Creta vsq; misso. Octobri autem & Nouëbri duntaxat flores protulit: eamque ob causam nullum semen præbere potuit.

Clusius easdem illi facultates tribuit, quas Thymbra Diolæ & Paulus.

SATUREIA FOLIIS TENVIBVS, SIVE renuifolia S. Iuliani quorundam. CAP. LXVIII.

Satureia, siue Thymbra vera S. Iuliani, siue Satureia vocata, in Icon. Plant. p. 425. vt referunt Aduersarie, in Tyrreni maris asperis & salebrosiss S. Iuliani Hetrusci, magno prouentu oritur, aspectu perquam elegans herbula, quam nullus non fatetur Satureiam veram, quàmque Pisani etiam



Synonyma



Thymbra
Græcorum
differt à
Satureia.

Piperella.
Saxifraga
2.

H. Lugd.
plures
nom.

As 4.

Tabern
re-
proh.

Locus &
Tempus.

Vires
vltus

Descript.

Locus &
Tempus.

Descript.

vernaculo sermone *Tymbra di S. Iuliano* dicunt, *virgultis* exilibus, palmum altis, sarmentosis, lignosis: *folius* ab imo crebribus, Thymi Cretici, sed angustioribus, longiusculis, spicam teretem summo gerentibus, *flosculo* copioso intertam: gustu acri & odore, vniuersa ex obsoleta purpura albicat, Thymo maiore minori ferme par.

Tabern. dicitur *Thymbra vera*; Gerar. *Satureia S. Iuliani*; H. Lugd. p. 897. *Thymbra genuina* Penz, C. Bauh. phyt. *Satureia* sive *spicata*. Is apud *Matthiolum* duplicem esse ait, in Italia foliorum latitudine solum differentem: Nos *Thymbra* S. Iuliani eandem existimamus cum *Clinopodio Cæsalpini* montis S. Iuliani, quod ait à quibusdam vocari *Hysopum montanum*.

SAXIFRAGA VETERIBVS ac in genere.

CAP. XLIX.

Contraria opinio de Saxifraga capite. **C**Apud Saxifragæ in impressione Basiliensi i-
ceique in eorum. in Diosc. Cornarianis est inter reiecta, ut etiam cum Marcello plurimi sentiunt alii: Hermolaus tamen retinet, videtur etiam approbare Matthiolus, qui variis impressionibus de hac verba faciens, ac sibi minime, ut ferè nusquam, constans, varia de ea scriptis mandauit. Textus autem Diosc. sic habet.

Saxiphages Pauli. Saxifragæ (sunt qui *σαξίφαγος*, alii *σαξίφαγος*, alii *σαξίφαγος*, Romani *σαξίφαγος* dicunt) turculosus frutex (*θαύρος πορφυρέος*) est, in petris & asperis nascens, *Eperhymus similis* (ita Ruell. locum ab Hermolao vacuum relictum reddit:) Coctus in vino, mox potus, febrientibus opitulatur (hæc Marcell. non adscribit:) strangurie prodest, singultum sedat, calculos vesicæ frangit, & vrinum citat.

Saxifragam autem vrinam mouere, & calculos conterere perhibet etiam Ægineta, qui Saxiphagen (Saxiphagen Andern. appellat.

Cestron. Quod porro genus Saxiphagi habendum fuerit Galeni s. de san. tuenda, cap. 5. quod calculo laborantibus commendat, & Cestron vocari, ac in Galliis nasci tradit, indagandum proponit Iul. Alexandrinus, hæc immerito. Sunt enim plures Saxifragæ, de quibus paulò post fusè enarrandum.

Saxifraga tur dila. Cæterum peregrina Græcis & aliena vox Saxifraga est, indicantque id quæ ad compositionem eius coaluerunt, simul nomen & verbum, Romanæ voces: & quæ non aliter, quàm in Ossifraga aliquotque aliis Romanorum huiuscemodi vocibus, herbam significent, quæ saxa frangat. Nec disputandum modò, dictane sic fuerit, quia in petris nascens suo ortu eas dirumpat: an quia hominis calculos in vesica frangat. Illud potius monendum, legi in hoc capite voces græcas latinæque eiusdem propè soni, sed diuerse Etymologiæ. Saxiphagon enim, quasi quod carnes exeat, dixeris.

Saxifragæ æquiuoca. Saxifragæ autem nomine sequentes donantur Plantæ. Saxifraga vera Diosc. folio Thymi Matth. Saxifr. Matth. foliis Cunilæ. Saxifragia tenuifol. umbellif. Matthiol. Saxifrag. alba multis rotundifolia. Satureia durior. Serpillum. Saxifr. Antiquorum quibusdam. Polygonum 6. Dodonæi. Daucus glauco folio. Pimpinellæ germanicæ & Italicæ. Viscaga. Viscaga

gaminor. Sefeli Massiliense. Saxifraga Pannonica multifido folio. Libanotis alter. Dodonæi. Crithmum. Talictum radice lutea. Sannicula alpina. Polemonium petrum. Saxifr. alba petra. Tridactylites flore albo. Milium Solis. Filipendula. Halicacabus. Adiantum rubrum. Saxifr. aurea. Erysimum alterum Matthioli. Betonica. Polium. Herniaria. Saxifragia Cæsalpini. Saxifr. Bauarica. Anthemion Plinii. Garyophyllus coronarius. Adiantum. Trichomanes. Ruta muraria. Asplenon. Tragopogon. Tormentilla. Coralloides. Melilot. vulgaris. Trifol. pratense luteum. Cali geniculatum. Ononis. Perchepier Anglorum.

Saxifragæ cuiusdam miraculose meminit Adamus à Bodenstein in Onom. Paracellico, quæ humilis sit & rubra, floribus Centauræ similis, ac si vitro vino repleto per noctem indatur, vitrum dirumpi, eandemque lapides in homine comminuere. Hæc qualisnam sit tunc dicemus, ubi eam videbimus, aut similem talia miracula præstantem.

DE HYSSOPO VETERVM SENTENTIÆ.

CAP. L.

Hysopus ex Diosc. herba nota, duplex est: altera montana, altera hortensis. Optima est quæ in Cilicia nascitur. Hysopum siue Hysopum siue Hysopus, Hermolao etiam referente, præfertur Hippocrati Cilicium quidem, sed è Tauro monte: dem Pamphylum & Smyrnum. Cæterum, quale sit folium Hysopo declarat Diosc. cap. de Origano Heracleonico cui folium adscribit simile Hysopo. Sed & Origanum Onitis appellatum, albidius folis est, & magis simile Hysopo. Comam habere corymboidem apparet ex Chrysocomes capite, ubi sic legitur. *χρυσόκομος ἡ δὲ δὴ ἐν τῇ σιβαρίδι ἔχει κομὴν κόρυμβοειδὴν ὁμοίαν τῇ κομῇ τοῦ ὀρίανου* &c. Baccas habere ex Plinii verbis infra de virib. positis, colligere licebit.

Porro Hysopum alii Lauer, alii Cassialam vocant, Ægyptii Pefalem.

Hysopi demum nomenclatura diuersis attribuitur plantis. Sunt pñdum quidam, qui inter Hysopum Græcorum, & Hysopum Arabum seu officinarum, quem Symphytum petrum Dioscoridis esse comprehendunt, distinguere conantur, non sine occasione. Hysopum verò Græcorum quodnam sit non ostendunt, relinquentes rem summè dubiam, inter tot Hysopi species, de quibus posthac agemus.

HYSSOPVS VVLGARIS SPICATVS angustifolius, flore caruleo, rubro, & purpureo.

CAP. LI.

Ex radice lignosa: dura, crassitudine digitali, *virge* surgunt plures, quadratæ, subhirsutæ, geniculatæ, dodrantem longæ, ramosæ, ad quatuor nodos folia oriuntur verticillatim posita, foliis lauendulæ similia, sed duplò breuiora, sapore acriusculo, odore non ingrato: si res in spicam longam digesti sunt ad ramorum articulos, in vnam partem ferè spectantes, quorum supremum foliolum bifidum sursum reflectitur, bifidum labellum

bellum binis alis superioris parte donatum demittitur, colore cæruleo sæpius, albo aut rubro rarius: semen minutum in vasculis oblongis. Odore nonnunquam grato Moschi differens reperitur.

De iconibus
eiusdem.

Cæterum an pro tribus hisce Hyssopi varietatibus, tribus opus sit iconibus, ut quidam crediderunt, iudicent lectores. Lobel. in Icon. Pl. tres habet. 1. est p. 433. hoc titulo: Hyssopus Arabum, Mesue & officinarum: secunda est p. 434. Hyssop. Arab. flore rubro: tertia p. 435. Hyssopus albis floribus. Sed & Gerard. tres dat imagines: Duas verò Tabernamontanus & toridem Hist. Lugd.

Hyssopi
differentia
C. Bauh.

C. Bauhin. cæteris oculatior in inveniendis & observandis plantarum differentiis, ita de iis differuit. Hyssopus, siue vulgaris cærulea communiter ex vna parte floret, aliquando ex utraque, ut expressit Lobelius. Est & odore tantum differens, moscham redolens. Hæc etiam spica brevis, & rotunda aliquando variat. Hyssopus 1. siue cærulea folio dissecto, aliàs à vulgari non discrepans, quare tantum ramum (cum vulgari ut & nos) apud Matthiolum exprimi curavi. Hyssopus 3. albo, vel rubro flore, flores habet sæpius vno tantum ordine digestos, aliquando utrinque.

Præter Hyssopum vulgare, aliam quoque agnovit Geln. hort. moschatam sc. quæ pro Cilissa à Dodonæo describitur, & cum iconibus stirpium primi toni Fuchsi Antuerpiæ excusis cum nominibus & descriptionibus Hispanicis sub libri finem depingitur.

Facile existimamus Euch. Rætslin. intelligere Hyssopum vulgare, quamvis descriptio non correfpondeat. Apollinaris etiam lib. 2. fol. 118. vires sub his nominibus *Jfen Ephem*, adscribit, huiusque figuram habet, itemque aliam fol. 100. pro *Eppich*, i. e. Hedera, sed malè.

Fuchsius malam exhibet iconem: quin & Porta phyt. lib. 2. cap. 31. ineptam vulgaris Hyssopi figuram habet.

Cæterum, non immeritò controuertitur ab autoribus An Hyssopus Græcorum, cum hac Arabum idem sit, nec ne. Et quidem pro Dioscoridis Hyssopo recipitur à Fuchsi, Cordo, Matthiolo, & Amato. Negatiuam verò tuerentur sententiam Monachi, Anguillara, Turnerus, H. Lugdunensis, Lobelius, Hort. Lust. Gerardus, Syluius, Clusius, Bellonius in Obseru. & C. Bauhin. & alii: quorum argumenta refutando nobis minimè satisfaciunt Fuchsius, Cordus, Matthiolum & Amatus: Vnde nos vulgarem nostram Hyssopum Dioscoridis & Plinii esse asserere nondum audemus. Illud interea negare haud possumus Hyssopum nostram vulgarem non infelici cum successu eius loco in medicamenta venire.

Origanum
Dioscoridis
Traga.

Cæterum quod nos Hyssopum dicimus, Tragus Origanum Dioscoridis esse sentit, quam verò doctè, ipse iudicato.

Symphytum
petræum
Casalp.

Quia autem Casalpinus non audet asserere Hyssopum vulgi floribus cæruleis esse Hyssopum antiquorum ob saporem. Ideò magis ipsi videtur cum Symphyto petræo Dioscoridis conuenire, quod Plinius Alum vocari testatur. Illud solum ambiguitatem facit, quod capitula Thymi tribuuntur: non enim cum Thymo Cretico, sed potius cum Italico similitudinem gerit cacuminibus.

Nomina
linguar.

Hyssopum hanc passim officinæ & vulgò appellant: Serap. cap. 260. *Halcusa Cysæ*: Hebræi 3. Reg. 4. *Leuit. 14. Esf*, & *Osafion* vocant: Thal-

mudistæ *Schomafok*: Germ. *ysop* / *hysop* / *hloster* *hysop* / & *firchen ysop*, ob vltim. ut nonnulli crediderunt, quem in Ecclesijs ac monasterijs præbuit, ut populus cum ipsa respergeretur. Vnde & illud esse aiunt Psalm. 50. *Asperges me Domine Hyssopo*, &c. supra quem textum D. Augustinus de Hyssopo quædam monet. Verum hyssopus quæritur, si Zefriël in fulm. credimus, nō est hyssopus de quo Salomo loquitur. Non desunt, inquit, qui plantam illam, quæ in Hebræo dicitur *Esf*, seu *Esfob*, quod Rosmarinum interpretatur, seu Libanotis, hyssopum transtulerint, vocabulorum vicinitate decepti. Sed, nostrum non est præsentis componere lites. Theologis disceptandum hac de re fuerit. Institutum nostri ratio requirit, ut nomina linguarum eâ fidelitate, quâ fieri poterit, recensamus. Belgæ *Jsep* aut *ysope* dicunt. Galli *hyssope* & *uisope* Lob. Itali & hispani *hysopo*, & *isopo* Dod. Angli *hysope*. Boh. *hysopo*. Nomencl. Pann. *Jfop*.

hyssopum angustifolium spicatum vulgare, flore cæruleo, albo, & purpureo copiosè colui Montbelgardi in hortis: floret in Germania ac Belgio, Iulio ac Augusto mensibus. Genex vidit in hortis Nouembri, interdum hieme folia retinentem. Tiguri & Tubingæ apud D. Gesnerum & Fuchsi observauit hyssopum moschatam, quam illi montanam quoque vocabant: nobis creuit postea in orto Ill. E. C. Collibus asperis Romanæ & Veronensi tractui, præsertim secus Athesim, quæ Imperatoriam, à Venetorum ditione discriminat, è regione montis Baldi, spontè fruticare hanc refert Lobelius, cum nulpiam aliquin nisi in hortis inuenisse dicat.

Locus &
Tempus.

Vires quod attinet, Dioscorides suo hyssopo vim tribuit attenuandi ac calefaciendi. Decoctum cum ficibus & aqua, mellèque ac Ruta, & potum, peripneumonicis, anhelosis, tussi diuturnæ, destillationi, & erectæ cervicis spirationi auxiliari, itemque lumbicos occidere, scripsit. Et si cum melle delingatur, idem facere. Decoctum eius crassa per aluum ducere, cum aceto mulso potum. Edi & cum ficibus viridibus tritis, ad aluum subducendam. Sed vehementius purgare ammixto Nasturtio aut Iride, aut Irione. Inducere item bonum colorem. Eandem ad splenem & hydropem, in cataplasmate imponi, cum sicu & Nitro: cum vino verò ad inflammationes. Discutere etiam sugillata, cum aqua feruentè impositam. In anginis commodissimè gargarisori, cū sicuum decocto: dentium quoque dolorem mitigare cum aceto coctam, sic colluatur. Soluere & aurium inflationes eiusdem decocti vaporem. Galenus hyssopum tenuium partium esse dicit, & tertio ordine calefacere ac siccare. Hippocrates 2. de dietâ *ysopum* *ysopum* esse statuit. De hyssopi viribus Plinius sparsim hæc annorauit. Anginè medetur hyssopum cum vino decoctum & gargarizatum. Faciles præstet vomitiones tritum cum melle, vtilius presumpto Nasturtio, aut Irione. Manipulus huius decoctus ad tertias cum sale, pituitas trahit illitus, vel contritus cum oxymelite & sale, pellitque ventris animalia. Ad lienem prodest cum fico decoctum. Comitiales sanant bæcæ ternè contrite, & in aqua potè diebus sedecim. Hyssopus, inquit Mesues, (qui pleraque ex Dioscoride & Galeno transcribit) calidus & siccus est ordi ne secundo, vel potius tertio. Pituitam etiam crassam purgat, sed minùs quàm Thymus confert præsertim partibus respirationi dicatis, & cerebri affectibus: &

Vires in
genere.

viscerum tumoribus, lumbricos necat & prodest aurium tinnitui.

Notandum verò apud veteres auctores, non leui sed ob communis vocum facili errore pro *Cardamo* supponi *Cardamomum*: & pro Cardamo Cardamomum ut apud Diosc. scitè annotat Cornarius.

Ex herba Hyssopi Tragus fomenta, epithemata, & balnea rectè confici testatur: clysteribus item in passione colica vtiliter adhiberi. Aquam in qua Hyssopus decocta fuerit, omnes ploras, scabies: & mentagras sanare, si ex illa colluantur. Hyssopum nostrum flore spicato iis omnibus pollere viribus, quas Hyssoppo reddidit Dioscorides, experientiam comprobare asserit *Matthiæ*: aduersari serpentium moribus, cum sale & Cumino admotum: ex oleo illitum pediculos necare, & capitis pruriginem tollere: comitiales iuuare quouis modo sumptum. *Dodonæus* præter alia Obstructiones aperit, crassa incidit: lenta attenuat, & ut facilius expuantur, præstat. Cum carnibus bubulis decocta, non insuauiter ex iure editur, ori ac ventriculo grata: vrinas verò etiam mouet, & ad vrinæ stillicidium vtilis est. Eius Syrupum ad calculum valde commendat *Mizaldus*. *Enchar. Roeslin* Aquæ varias tribuit vires inter alias contrarias, nostro iudicio, dum scribit aperire venas & postea utilem mulieribus laborantibus copiosioribus menstruis.

Præter aquam verò Hyssopi hodie quoque vimur succo, syrupo, conferua, vino, & oleo, ad iam dictos vsus, de quibus plura in medium adducere non statuimus.

Fuch. notat.

*Prepara-
tiones Ga-
ria.*

HYSSOPVS SPICA BREVI, LATA.

Descriptio



HYSSOPPUM alià præter vulgarem non inmerito quidam reperiri ferunt apud *Dodonæum*, caulesculis breuioribus, & plurimà parte humum versus reclinatis: foliis paullo nigrioribus ac crassioribus: strobilis verò in cacumine in breuis spicæ modum digestis, colore quoque pulchrè cæruleis, & vulgaris

formâ similibus. Verùm hæc species rarissima.

HYSSOPVS PARVA ANGVSTIFOLIA.


Locus.

ALuit aliquando Belgica hoc genus humilius & tenerius, hispanico semine natum, alioqui formâ non multum differens à vulgari, cæruleis floribus, quod *ysopillo* vocabant, quia nimirum semen, ex quo natum, tali nomine inscriptum fuisset. An verò Hyssopus hic Hispanicus minor Clusii istic etiam nunc alatur me latet. Hyssopum hanc tenui folio attulit ex Anglia

*Hyssop. His-
panicus mi-
nor Clus.*



HYSSOPVM GORITIENSE FLORIBVS verticillatis ambientibus.



Doct. Thomas Platerus, folio angustiori, quam in vulgari, odoris grati.

Lob. in Ic. Plant. p. 434. vocat Hyssopum paruum, angustis foliis. In Belg. Hyssopum vulgari omnino similem, sed multo minorem angustifolium.

An est Gerardo Histor. Angl. Hyssopus 4. tenuifolia, tamen leas sed hyssope.

HYSSOPUS ex agro Goritien-
ritien ramum pedalem dedit D. Agerius, rectum, firmissimum, folia producere glabra, per geniculos bina, vnciam circiter longa, culmum lata, Satureiæ duriori similia, alia inter illa multa, sed minora, odoris grati & suauis, sapore nonnihil acris, cum leuissimâ amaritudine: spicam


vnciis duabus longiorem, angustam, siue tenuem, tenuiorem multo quam in vulgari, multis paruis constantem verticillis, & secundum vnumquodque verticillum foliola duo floribus longiora: flores non vergentes in vnam partem ut in vulgari, sed ambientes, paruos, multis apicibus donatos, quos cæruleos fuisse coniicio.

An Matth. Hyssopus montanus Goritienfis agri?

HYSSOPVM MONTANVM MACEDONICVM Valerandi Dourez.

DODRANTALIS est ramus, lignosus, quadratus asperiuscula incana lanugine hirtus: breuibus furculis adnatis filis: folia ex intervallis verticillatim disposita, Satureiæ vulgaris foliis nonnihil similia, breuiora, rigida, nigricantia, aspera, angusta, acuminata, lanugine candida ciliari per margines ornata, sapore acris, aromatico, ad Satureiæ saporem accedente: flores eodem modo ex foliorum sinu, per tamotum summities,

Descriptio



tates, vertigillatim digesti, Saturatæ vulgaris floribus similes; hiantes, stamina rectupromunt, calycibus oblongis purpurascensibus multifidis, subhirsutis: à triginta annis hanc ad seruo, vna cum alijs plantis Valerandi Dourez, nomine hyssopi montani Macedonici.

An Abs, Abes, aut Gulen Arabi Anguillaræ?

HYSSOPVM MONTANVM
Cilicium quibusdam.

Synonyma



IN Fuchsi Epitome Hispanica nominatur *la yerba de la montaña*. Hyssopum montanum Cilicium, El Verdadero hyssopo, que lleua tiene la flor colorada. In Hist. Lugd. pag. 93. hyssopus montana Fuchsi. In Phyt. Calp. Bauhini, hyssopus s. siue montana Lugdunensis.

HYSSOPVS FOLIO ORIGANI DAL.

Descriptio



Hyssop s. montana Desf. Hist. Lugd.

Tom. III.

Dalechampio u. Lugdunensis. Et hinc reuocet communem illam Maioranam (Originum nimirum heracleoticum Ruellii) quam Pena & Lobelius pro hyssopo genuina Græcorum assumpsit.

Cæterum, an Hyssopus hæc 6. siue folijs Pulegii, sit hyssopus Dioscoridis non immerito hæret C. Bauhin phytopinace.

Hyssop. fol. Pulegii C. Bauh.

STOECHAS ARABICA VVLGO DICTA.
CAP. LI.

Vtilis iuxta ac pulcher est frutex, radice lignosa, crassiuscula, virgulas emittente lignosas, cubitales & bicubitales in ramos aliquot diuisas, folia per geniculos laeuendula bina, & ex alijs alia minora plura, incana, odore & sapore aromatico: linguli rami quadranguli, plerumque folia- ti, uti obseruaui in f. n. s. f. d. g. n. t. u. r. , crassiusculas, vnales, aut longiores, pilosis squamulis imbricatis, in quibus si f. c. l. purpurei: præterea ex cacumine emittant foliola aliquot purpurouiolacea, visui grata, qualia tere in homino Matthioli. Icones nostræ sunt ex Fuchsijs & Clusianis respondent.

Diosc.



Icones

Hanc asserimus esse illam herbam, quam Dioscorides Stachadem appellat, tenuibus surculis, comâ Thymi, sed folio longiore, gustu acro, & aliquantulum subamaro. Plinius odoratam herbam ait, comâ hyssopi, amarâ gustu. Serapio Dioscoridis verba recitat, ut & Galeni, quæ infra de viribus adscribemus. Mesues Arabicam extollit, herbam folijs tenuibus, oblongis, stipite gracili, cinericeo, cubitali, flore spicarum Siliginis æmulo, breuiore, sine semine: calidam recessu &c.

Stoechas Diosc.

Comâ Hyssopi



Ruellii verò opinionem quâ Arabicam Stachadem distinguit à Græcorum Stachade, quam citrinam facit, recipiendam non existimamus.

Ec

Curauit, inquit Cordus, Arabicum Stœchada, nostro orbi peregrinam plantam mihi adferri, aliarumque ex Narbonensi Gallia, semen terræ mandauit aliquoties: & è semine prodiit planta ramulis, foliis, odore, sapore, & ramulorum, foliorumque posita spicæ Lauendulacæ per omnia similis. Porro Mefue vehementer errat, quod scribit Arabicam Stœchada semen non habere, cum illi satis manifestum & perspicuum sit.

Stœchadem etiam exoticam facit Syluius: ex Creta enim habitioem & melius nutritam, ob id meliorem peti scribit: multam tamen nobis domesticam ex insulis Stœchadibus esse non negat. Prouenire etiam multam in Arabia, quam inde Arabicâ cognominant, & quæ à Mefue præfertur, flore præsertim, pòit foliis: spicæ ex purpureo cærulea, odorata.

Stœchas
Massiliensis
sit.

Cæterum, Massiliensis pelagi Stœchadem plarumque Arabicæ vicem explere testatus est Matthioli. Stœchadem, inquit, officinarum vulgus Sticados appellat. Nascitur hæc non modo in Gallia (ut Dioscorides scribit) ex aduerso Massiliæ in insulis, quas Stœchadas vocant: sed & in Arabia, unde cum aliis mercimoniis, quæ ex Alexandria aduehantur, Venetias comportatur. Quapropter tam à Medicis, quam à Sepalsariis, indito ab Arabia cognomento, hodie Arabica nuncupatur: etsi Massiliensis pelagi Stœchas plarumque Arabicæ vicem expleat. Prouenit præterea in nonnullis Italici locis, verum ea cæteris in Italia præstat, quæ ex Gargano Apulici monte aduehitur: quanquam omnium probatissima est peregrina, quæ ex Arabia defertur, hanc deinde sequitur, quæ in Stœchadibus insulis nascitur, à quibus primum nomen adinuenit.

Stœchas
montis
Gargani
præstat.

Synon.

Lobelius in Obs. p. 234. Icon. Plant. p. 419. sub Stœchadis, siue Stichadis titulo, pingit Clusii Stœchada breuioribus ligulis, vel ut ipse ait in in Obs. summis cauliculis ut plurimum foliis stipatis. In Obs. dicta pag. in Ic. Plant. p. 430. Stœchadem nobis cauliculis summis. Illam vocat H. Lugd. p. 918. Stœchadem Matthioli; Hanc, Stœchad. capitulis foliatis, quam Clusius longioribus ligulis appellat.

Tabern. &
Gerard.
notantur.

Compiler non apposuit Stœchadis Arabicæ, ut vocat, figuram. Gerardus verò pro Stœchade ponit iconem à Tabernamontano pro Spica hortulana exhibitam, flore albo. Ipsemet autem quasi duas confundat plantas, titulum facit, Stœchas, siue spica hortulana.

C. Bauh. phyt. Stœchadis primæ, siue purpureæ titulo, dubio procul intelligit Stœch. cauliculis foliatis: secundam siquidem, Stœch. cauliculis non foliatis appellat.

Nomina
linguarum

Stîxas & Stîxas Græcis, Lat. Stœchas, Stœchas, Sticas, Stichas, & vulgo officinarum Stœchados & Stichados. Arab. *Astochados*, *Astubrados*, siue *Astuchades*. Germanic. *Stichasfraut* & *Stôchasfraut*. Gall. *Stachados*. Ital. *Stechado*, seu *Steca*. Hisp. *Tomani*, *Cantuello*, *Cantueño*, *Tomillo*. Angl. french *Lauender*.

Stœchas verò nomen accepit à Stœchadibus ex aduerso Massiliæ (ut ex Matth. dictum) sitis Gallici insulis, in quibus prouenit. Sunt tamen qui existiment Stœchadem rectius Stachim quasi spicam dici.

Admar. hal.
lucimatur.

Quam congruè Amatus herbam fruticosam dicat, in vniuersa Hispania admodum frequentem, Lusitanique Rosmarinum appellent, non video.

Locus &
Tempus

Herbarios in multis Germanici hortis Stœcha-

dem seminare, & magna cum diligentia colere prodidit Fuchsius. In plurimis Hispaniæ, Lusitanici, & Gallici Narbonensis locis, Aprili, Maio, nonnunquam etiam Autumno florere scripsit Clusius. Galenus Stœchada multam vbique terrarum nasci dixit, sed plurimam in Creta, & insulis Stœchadib⁹ in Iberico mari sitis. *Stœchades verò insula* non è regione Massiliæ, ut perperam scripsit, annotante Lobelio, Dioscorides [bidui enim itinere & litore inde absunt:] Sed è regione Olbiæ sitæ sunt, vulgò *Hyeræ*, oppidulo olim tam lauto, quam nobili, à quo etiam hodie insulæ Stœchades nomen retinent. Non solum verò Stœchades insulas, sed etiam colles Narbonæ, asperosque tractus Gallo-provinciæ tanto prouentu Stœchade scaturere legimus, ut etiam cibariis calfaciendis satis suppetant. In quibusdam Italici montibus quoque prouenire affirmavit antea Matthioli, & Camerarius in monte S. Iuliani, prope Pisam. Nobis Stœchas Arabica in horto Ill. E. C. sata sæpè prouenit, sed non tantum non floruit, sed nec Hiemem etiam reposita pertulit.

Diosc. falli-
tur.

Stœchadis decoctum, auctore Dioscoride, quæ admodum Hysopi, ad pectoris vitia efficac est. Antidotis commodè miscetur: [quæ sequuntur, defunt in exemplari græco Basiliensi.] Liberat ab obstructione, attenuat, extergit, & corroborat viscera omnia, & totum animantis habitum. Menses ciet potu, inquit Plinius, pectoris dolores leuat. Antidotis quoque miscetur. Ischiadicos dolores & spinæ leuat Stœchadis farina ex aqua mulsa pota. De Stœchadis viribus Galenus hæc prodidit. Stœchadis gustu quidem qualitas amara est, & mediocriter subadstringens. Cæterum, temperies composita, nempe ex terrena essentia frigida, exigua, unde sanè adstringit: & extenuat altera terrena copiosiore, à qua amara est, & mediocriter subadstringens: ob utrorumque verò conuenientiam & coitum, obstructione liberare, extenuare, extergere, roborareque tum viscera omnia, tum totum corpus ea potest.

Vires &
Vitus.

Temper. et
Galeno.

Mefues plures & insigniores vires eidem assignat. Tenuat, inquit, terget, purgat, resoluit, aperit hepatis & lienis, & aliorum viscerum obstructionem, putredinem prohibet, omnes internas partium intemperies, præsertim cum materia, corrigit: cerebrum, nervos, cor, & alia viscera, partemque omnes internas vi parum adstringente roborat. Purgat autem bilem atram, & pituitam etiam ex cerebro, nervis & sensuum instrumentis, easque partes roborat: omnibus frigidis affectibus est salubris, foru, balneo, potu. Oleum quoque Stœchadis cerebrum & nervos calfaciendo, ceu vitam illis restituit. Syrupus, vel aliâ formâ Stœchas sumpta, quartanis & reliquis diuturnis febribus præsertim pituitosis succurrit. Calidis, siccis, biliosis, præsertim quibus multa bilis flaua in ventriculo redundat est noxia, quia turbat ventriculum, & sitim, vomitum, ardoremque molestum excitat: ac quoniam imbecillius purgat, ipsi additur pars sexta salis communis & salis gemmæ: additur & Myrobolanus nigra, aut Capula, ut valentior eius fiat vacuatio: item Scilla, præcipuè in capitis affectibus. Eadem sero lactis macerata, vel incocta sit potentior: cum vino autem, passis purgatis, succo pomorum dulcium cocta innocentior. Oleum vetus Stœchade & pauca spica imbutum, est magnarum virium. Pars Stœchadis potior flos, paucam decoctionem sustinet, longiorem verò eius folia floribus igno-

Vires ex
Mefues

Oleum?

Delebas
partium.

ignobiliora. Potatur Stœchadis decoctum ab vnciis quinque ab vncias septem: pulvis autem à drachmis tribus ad drachmas quinque.

STOECHAS VIRIDIS.



Stœchas viridis Dalechampii à Bauhino missa, tota lucunda viriditate nitet, foliis per intervalla in caules multis duobus longis, aliquot aliis multò brevioribus, capitulo in caulis summitate longo, rotundo, cum duobus in summo foliolis, ex quo lutei flores exeunt.

C. Bauh. phyt. vocat Stœchadem viridem à

J. B. Lugduno missam, facitque Elichryson vndecimum.

STOECHAS SERRATO ET CRISPO folio.



Stœchadis genus hoc valde rarum Clusio observatum, eiusdè cum Stœchade Arabica altitudinis, lignosis, fragilibus, tenuibus, quadrangulis ramis: Folijs etiam olongis, angustis, omnino serratis & crispis, parte supernâ virentibus, infernâ candidis, calidi & amari gustus: eius extremi quoque

ramuli desinunt in dodrantes virgulas, nudas, quadrangulas, incanas, quæ spicam sustinent Stœchade longiorem & rariorem, ad Lauendulæ minoris spicam prope accedentem, è multis similiter veluti membranaceis squamis congestam, cû eminentibus in summo quibusdam laniusculis foliolis è purpura cæruleis, vti in Arabica: flores ex singularum squamularum sinu copiosi, purpurei, vti in præfata: semen etiam simile, quemadmodum & radix.

Stœchas serrato folio, ab Hist. Lugd. p. 1200. Sucudi Auicennæ Myconi titulo pingitur & describitur. Tabern. Hist. & Icon. dicitur Stœchas serrata. Lob. in Obs. p. 235. in Icon. Plant. pag. 430. itémque Gerardo Anglo Stœchas folio sex Tom. III.

rato, Angl. Toothed Stœchadonj. C. Bauhini phyt. Stœchas, siue serratifolia.

Stœchadem crispo folio non nisi in summa Hispaniæ Calpe nascentem, & suis floribus ornatum Februario mense inueniebat Clusius, primum ipsi conspectum Scintz in Regiæ arcis hortulo, quatuor supra Vlyssiponem leucis, floribus & semine plenum: Sucudum H. Logdunensis quoque in Hispaniæ incultis aridis, montosisq; locis nasci, & in hortis etiam coli refert.

Facultates eadem hinc insunt quæ Stœchadi Arabicæ.

CAPVT AQVILÆ, HYSSOPI FOLIO, summitate Stœchadis.


CAP. LII.

Herbæ Capitis aquilæ nomine ab Amaro descriptæ. Caulis est subtilis, quadratus, dodrantis altitudinis, in quo folia stricta, oblonga, hyssopi modo sunt, quibus à latere alia duo folia à caule orta hærent, si non nitate verò caulis, flores Stœchadis modo piores sunt, in quorum infima parte alij flores nascuntur, cum albedine rubricantes per medietatem diuisi, vti vnusquisque florum, serpentis caput referre videatur, vel potius Achilles [fortè legendum aquilæ] vnde nomen trax ille videtur.

Hæc autem adstrictoria herba est, & vt sapore percipitur, frigida temperaturâ.

TRAGIVM ALTERVM DIOSCORIDIS quibusdam folijs Trichomanis.

CAP. LIII.



Radice est lœguscula, gracili. Ex qua surculi emergunt lignosi, vix minimum digiti longi: quibus folia adhærēt lœguscula, pulchra serie disposita, aduersa, haud secus ac in Trichomane digesta, iis tamen longiora, vti in Asplenio, quibus & colore lunilia: nam supernè pulchrè virent, infernè verò ei-

nereo tomento obsita, minora præsertim & ab imo primum pullulantia. Inter hos surculos alij prodeunt coliculi, nudi, purpureos flores, spicatos sustinentes.

Rauwolfius descriptionis auctor vocat Tragium alterum Dioscoridis, incolæ verò Halepi Secudes, quo nomine & Arabibus, præsertim Auicennæ cognitum fuisse suspicatur, ac idè parte 4. Icon. n. 123. Tragii Dioscoridis, Secudes & Secudi Auicennæ titulo pinxit: itémque H. Lugdun. in append. pag. 29. licet aliam plantam, Stœchadem sc. serrato & crispo folio, Secudes Arabum esse cum quibusdam aliis potius existimet;

Ec 2

Sed & C. Bauhin. Phyt. Tragium alterum Dioscoridis constituit. Hoc tamen negat Fab. Columna, qui in Tragio hirci odorem requirit, quæ plantam hanc exoticam habere non referunt. Considerandum igitur quantum differat à Succide H. Lugdunensis, de quo antè sub Stœchade ferrato folio. *Asquiuca* Tragii & quæ veteres de eo scripserunt, legenda erunt lib. 29.

Locus.

Ceterum, in agris circa Alepum & montibus vicinis, copiose observatum Tragium hoc alterum Dioscoridis Ruvvolutio, vdis præsertim locis, ut ad fontium rivulos ex alto scaturientium.

Est & aliud Tragium secundum Dioscoridis quod Anguillata Epit. 14. & Lobelius Tragium alterum scolopendri folio nuncupantur: Vid. loc. Anguill.

PSEUDO NARDUS, QUÆ VULGO

SPICA.

CAP. LIV.

Etymon.

Descriptio



ODORIS Nardi affinitas Pseudo-Nardo nomen imposuit, non item facies, Stœchadi similior: *virgis* autem cubitalibus, & sesquicubitalibus, quadratis, duris, iisque multis ex lignosa radice ortis fruticat: *folia* infima quidem incondita, superiora ex aduerso bina per intervalla longiuscula, incana, culmum, aut etiam secunciam lata, duarum, triumve unciarum longitudine, nervo medium percurrente, odore vehementi grato, sapore amaricante: summis ramulis *spicam* gestat longam, verticillatis calyculis cæruleis constantem, è quibus *strobili* emicant cærulei seu violacei.

Ol. spica.

Spic. Nard.

Lauand.

mas.

Nardus

germ. Tra-

go. Libano-

rus. Diosc.

Stachas.

Genera duo

A Cordo in Hist. Lauendulæ maioris titulo describitur, ex qua sc. oleum Spicæ. Illi autem apposita figura ex Trago, & annotatum Lauandulam maiorem, vulgus Spicæ Nardi nominare, Dodonæum verò Lauandulam marem.

Trago hæc spica, est Nardus Germanica, quæ reponit sub libanotide prima Dioscoridis. Gesner. hort. vocat Nardum vulgarem, Stœchadique veterum cognatam ait, ex Cordi sententia. In car. tamen Nardum & Spicam appellat, & Pseudo Nardum statuit.

Plin. Stachas græcè & latinè nominatur, inquit Fuchsius, quod sc. non sit vera & genuina Nardus, cuius Dioscorides & alii Veteres meminerunt. Duum ceruitur generum, mas & femina. Mas vulgò Spica cognominatur: femina verò, Lauendula nuncupatur. Mas procerior est, & maiorem spirat odorem, nec minùs quàm Nardus placet. Frutex est folio crassiore, carnoso, angusto, colore languido, in candidum vergen-

te, piloso, frequentibus spicis in aristas sparsis: strobulis in spica ferè cæruleis. Hoc nos Pseudo-Nardum marem diximus: Officinæ & vulgus herbariorum Spicam, à spicatis floribus nominant. Spicanardi / itemque lavender: Galli *Narde* & *Aspic*, *Aspicum* Gesner. Itali vulgari lingua *Spiga* nuncupant. Hisp. *Nardo al Isieglo*, *al-brizema*, & *Lauandula*. Angli *frensché Spick* *Narde*: Boh. *Spisanarde domaci*: Nomenclat. Pannonicus Lauendulam maiorem Spikanard vocat. Et haud abs re nomen Spicæ latinæ & tritum ad Stœchadem alludit, idem enim signat Stœchas græcè, quod Spica latinè; nempe propter similitudinem totius, primum faciei, deinde saporis & loci.

Ceterum, Spica à Lauendulæ specie non est diuersa, sed hoc tantum discriminis interest; spicæ, ut dictum, fragrantia odoris maior, & grauior: folia maiora & latiora Stœchadis, & spicæ longiores & inflexæ; Lauendulæ aromatici & gratæ plusculum, folia breuiora & tenuiora, spicæque breuiora, & recta.

Porro, Pseudonardum hunc marem vocat Syon. Matthiol. Nardum Italicam: Lobel. in Aduers. Spicam, in Obs. p. 235. [itemque Icon. Plant. p. 431.] Spicam recentiorum, & Nardum Italicam, Stœchadem Arabicam Mesues, & Spicam Siliginis Mutoni: Dodon. Lauendulam: Clus. Lauendulam spicam; item Lauendulam longiorem habentem spicam inflexam, longioraque folia, flore cæruleo, siue purpureo. Hist. Lugd. p. 910. Lauendulam marem: C. Bauh. phyt. Lauendulam siue latifoliam, flore cæruleo.

Compiler Tab. in Hist. & Icon. cur Spicam Tabern. re. albam inscribat, scire haud possum. Ille minùs *Prob.* diligenter descripsit & depinxit Pseudo-Nardi species.

Gerard. proponit iconem Tabern. titulo Lauendulæ hortensis minimæ, *The Schmallest las* uander, an bene iudicent Lectores.

Lauendula in genere existimatur esse Casia, odorata illa herba, cuius Virgilius subinde meminit. Sed horum opinionem tanquam erroneam damnamus. De Casia egimus Hist. n. g. libr. 4.

Qui tandem Lauendulam hanc, Cneorum album esse contendunt, omninò hallucinantur. Nequaquam enim crassa est, ut Cneoron, radice, nec altè descendente, ramulis non lentis, & non Autumno, sed Æstate florens: proinde Cneori species aliqua esse non potest.

Vestiuntur in Hispania & Narbonensi Gallia plerique montes & campi deserti Lauendula mare. In reliqua Gallia, apud Germanos & alibi in hortis seritur, Junio, ac Iulio flores exerens. Monspelii inter saxa spontè proueniens floret etiam Autumno. In viribus plantata feliciter etiam prouenit.

Pseudo-Nardus quæ Spica flore albo.

Hæc quia solo floris colore albo à præcedenti differt, superfluum esse duximus propriâ imagine eam exprimere, contra quàm statuit Tabernamontanus, qui Spicæ hortulanæ flore albo titulo inscriptam dedit. Tandem penitus iconem Gerardus Stœchadis, siue Spicæ hortulanæ, inscriptione pictam exhibuit, licet Stœchadi non conueniat. Deprehenditur itaque Gerardus

*Inter spicæ
& Lauendulam
describitur.*

*Gerard.
mas.*

Casia.

*Hallucinatur
qui
Cneorum
velant.*

*Locus &
Tempus*

*Gerard. in
p. 110.*

con-

confundere Stœchadem cum Spica Tab. alba.

Vocatur hæc à Lob. in Adu. Spica alia flore Viricis albo: à Dodon. Lauendula flore albo: à C. Bauh. Lauendula latifolia flore albo: à Clus. Lauenda longiore folio & spica, flore albo, in Hispania spontè proueniens.

PSEUDO-NARDVS, QVÆ LAVENDULA vulgò.

Describe.



Lauendula
la spica.

Tota quidè facie, vti dictum, Spicæ vulgò dictæ, seu Pseudo Nardo mari proxima est fœminina, siue Lauendula vocata, minor utunque, nec foliis aded albidis, minoribus, nec odore aded vehementi prædictis, spicati flosculi nō dissimiles, sed spica breuiori & erectiori.

Pseudo-Nardum hanc amplitudine & o-

dore minorem, fœminam appellat Fuchsius: Officinæ & herbarii recentiores Lauandulam, vel Lauendulam: eò quòd balneis & hominum lacrimis expetatur, elotique omnia, si permisceatur, odoris commendat suauitate. Germani ad hoc nomen alludentes, lauendel & lafänder nuncupant: Belgæ & Angli lavender: Galli Lauandei Itali Lauanda.

Hanc Cordus in Dioscor. vulgarem Lauendulam appellat, & ex maiore illa in hanc degenerasse scribit. In Hist. Lauendulæ minoris titulo describit. Ei autem figuram ex Trago adaptavit Gesnerus, qui Lauandulam vulgò dici & Stœchadi Veterum cognatam esse contendit. Tragus quidem Cassiam germanicam vocat, & sub Libanotide prima Dioscoridis reponit.

Lobel. in Obleru. pag. 236. & Icon. Plant. p. 431. Spicam Lauendulam vocat. Clus. inscribit Lauandam vulgarem breuiore folio & spicâ: Tabern. Ic. & Hist. Lauandam primam: Gerard. Lauandam flore cæruleo: Hist. Lugd. pag. 419. Lauandulam fœminam: C. Bauhin. Lauandâ 2. sinè angustifoliam: Dodon. Lauandulam alteram: alii Lauandam & Lauandulam minorem, itémque fœminam.

Gaudet apricis & petiosis, vbi perpetuâ comâ ekitu Veris canescit, & Iunio & Iulio mense spicatus, floribusque prægnans sit. In Hispania quidem & Gallia Narbonensi spontè prouenit. In Germania verò & Belgio non tarò in hortis, locis à Sole illustratis, feritur: sed etiam in vinearum collibus læta fronde nascitur.

Pseudo-Nardus qua Lauendula flore alba.

Lauendulæ albae Lobel. in Ic. Plant. p. 432. itémq; Compiler Tab. tam in Ic. H. ponit iconem particularem, quasi differat à præcedenti: si cognouerit differentiam aliam, præter colorem, cur

non de ea ad. nonuit? Iam si color solasti facit differentiam, vt nos equidem existimamus, quid opus erat ico de illa, quam Gerard. quoque hoc titulo expressam dedit: Lauendula flore albo, turbe flores lavender spica.

LAVENDULA MULTIFIDO FOLIO.



CVbitali interdū altitudine allurgit, Descrip: quadrangulis & huius ramulis, quos multifida, tenuiterque incisa ambiunt folia, lanuginosa, cinereique coloris, acris gustus, & iucundioris: si res in summis vitigulis quadrangulis, nudis & lanuginosis, spicemittit, vt in Lauendula, cōgesti, cæruleo colore præditi,

odorati: spica autem aliquantulum contorta est, & in quatuor veluti versus aut ordines digesta, alia interdum ex alia nascens: radicē habet duram lignosam, & multis ramulis donatam, quam viuacem esse facile sibi persuaserit, descriptionis author Clusius.

Lobel. in Obli. p. 236. Icon. Plant. p. 432. & H. Lugd. p. 920. inscribunt Lauendulam multifidam folio Clusi: C. Bauh. phyt. Lauendulam 3. siue folio dissecto: Gerard. Stœchadem multifidam: Tabern. Lauendulam secundam.

Synonyma

Nascitur circa Malacam Bœtiæ urbem, vbi illam primū inueniebat Clus. coile quodā illi vrbis vicino, Februario mense florere: deinde circa Murciam mense Martio, nec vquam alibi. Excalfacit & siccit ordine tertio completo, inquit Matthioli: aperit, attenuat, resoluat & concoquit. Confert omnibus frigidis cerebri affectibus: ventriculum roborat, & iecur ab infarctu ibeat. Lienosos iuuat, vterum calefacit, & mentis ciet. Flores ex vino decocti, & illiti vrinam pellunt, & status dissoluant. Eorundem decoctum ictericis, auxiliatur, à iocinoris infarctu affectis, additis Marrubio, & Fœniculi radicibus. Stillatitia florum aqua pota, amissam reddit loquelam: præstat eadem ad animi deliquia cum pota, tum naribus, & arteriis admodum. Oleum, quod à floribus distillat, illinitur vbi ex-

Locus & tempus

Oleum & flos.

Locus & Tempus.

Est Dodonæo Lauandula, potentiâ ac viribus calida siccâque, & ordine quidem tertio: tenuium item patrum, est ex multis æcreis spiritibusque partibus constans: frigidis ea de causa capitis morbis quouis modo adhibita confert, & præsertim iis, qui non ex copioso humore, sed ex sola potissimum qualitate originem ducunt. Proinde & stillatitius eius liquor odoratus, & temporibus ac fronti illitus, catalepsi, leuion hemiplexiâ, ac subinde comitiali morbo, ac non rarò syncope laborantes resicit. Sed vbi humorum copia adest, præsertim sanguini commixtorum, non satis tutus huius usus est: caput enim implet & morbum incendit: Dodon.

VERONICA VVLGATIOFOLIO ROTUNDIORE.

CAP. LV.

Descriptio



Ethæc rep-
taticibus
accēdenda ve-
nit, quæ subin-
de demissis fi-
bris se propa-
gat: viticula
tenues, teretes,
longæ, hirsutæ
geniculatæ, fo-
lius, binis ad-
uersis, ad sin-
gulos articulos
quatis donan-
tur, hirsutis, in
ambitu ferra-
tis, Pruni fo-
liis similibus,
sapore amaro,
& acri: flores
spicatum oriū-
tur Chamæ-

drios vulgaris, seu adulterinæ more, è quatuor
foliolis ex diluta purpura cæruleis striatis com-
positi, staminibus concoloribus medium occu-
pantibus, quibus decussis semen relinquitur Cha-
mædrios vulgaris, loculamentis paruis conclusū,
veluti Bursæ pultoris. Est & alia Veronica mihi
huius generis, foliis duabus vnciis longioribus, &
vnciā latioribus, caulibus cubitalibus: Et alia
multo minor, foliis ad Veronicam fœminam
serpillifoliam magnitudine accedentibus.

Teucrium
Trag.

Veteribus Græcis & Latinis cognita fuerit
nec ne hæc herba, nondum liquidò constat. Tra-
gum autem hanc per Teucrion intelligere existi-
mo, licet figura aliquantū Veronicam rectam
angustifoliam referre videatur.

Andræacus quoque Veronicā Herbariis & Offi-
cinis dictam verum Teucrium esse contendit lib-
de peste.

Veronica
maritima.

Fuchsi. per Veron. marem [in marem & fœmi-
nam enim communiter distinguunt] Veronicam
nostrā folio rotundiore exprimere existimo, quā-
vis figura non multū abhincilis, à figura Tragi,
possit quodammodò angustifoliæ rectæ conue-
nire, quæ occasio, vt Fuchianam figuram iam
sculptam ponamus pro recta angustifolia & no-
uam curauerimus scripendam pro ea quæ rotun-
diore folio, de qua hoc capite agimus.

Synon.

Matthiolus Veron. marem humi repere per-
hibet. In eius autem figura (quam etiam malè
assumpsit Lobelius) non placent semina, nec
flores: in Epist. vocat Veronicam Germanorum.

Dodon. Gall. Veronicam marem. Tabern. in
Icon. & Histor. Veronicam. Lobelius in Adu.
Veronicam marem & maiorem. Anguill. Ve-
ron. marem: Gesn. hort. Veron. marem Fuchsi i
Cæsalpin. Auriculam muris tertiam: Corn. in
Dioscor. Betonicam alteram ex Dioscoride ex-
emptam, & inter suppositia relata, à Galeno
ad calculosos, & Paulo ad renales compositio-
nes probatam, Veronicam Herbariorum vulgi
vocat.

H. Lugd. pag. 1319. sine necessitate vnius herbæ
duas habet figuras: 1. Veronicæ maris Fuchsi ti-

tulo: alteram Veronicæ maris Matthioli, sub
vna descriptione.

C. Bauh. phyt. Veronica 3. siue mas erecta (ma-
ior Clusi apud Matth.) Matthiolo mas, quæ du-
plex maior & minor. Item, Veronica 3. siue mas
supina Teucrium Tragi.

Nascitur incultis & siluestribus locis, apricis, **Locus**
sabulosis, ac arenosis, non rarò iuxta tumulos, ac
aggeres, agrorum sepimenta, quandoque & færo-
lis reperitur. Iunio ac Iulio quidem floret, vi-
get, & semine abundat, reliquis anni mensibus **Tempus**
etiam viret. In Pannonia, Sciria, Austria, & Mo-
raua in cædis siluis maxima in copia etiam in-
fra Onatum vulgarem supinam Veronicam ob-
seruauit Clusius. Nos Patavii virentem in orto
mense Martio vidimus: Lugduni vero *au b. u. de*
la bonne Alemande: Genevæ virentem in syluis
montis Saleux, principio Februarii, & florentem
Iunio: Montbelgardi in proximis syluis.

VERONICA SPICATA RECTA MAIOR,
& minor.

Veronica spicata recta maior.



Veronica spicata recta minor.



Oblivam
radicem a-
git fibratam,
caulem rectum
tollens, inter-
dum quatuor
vnciarum tan-
tū, aut peda-
lem, vel cubi-
tale, & inter-
dum altiore
multo, simplici
plurimum: ad
cuius nodos fo-
lia nascuntur,
angustiora, a-
cutiora, quàm
Veronicæ vul-
garis, leniter
crenata, hirsu-
ta, ad radicem
latiuscula: cau-
lis in spicam lō-
gam desinit,
plerumque vi-
su simplicem,
interdum flori-
bus Veronicæ
vulgatæ cæru-
leis densissime
stipatum, paul-
latim florescē-
tibus, primū
inferioribus,
denique sum-
mis, quibus ex-
cidenubus sta-
minula reman-
ent longa: se-
men autem pla-
nis, bifidis cap-
sulis contine-
tur.

Descriptio

Quia autem
existimamus, ve-
postea quoq; dicemus, Veronicam spicatam rec-
tam maiorem à minore tantū variare magni-
tudine,

tudine, eas simul relinquimus, pro maiore tamen iconem Fuchianam proponimus, ut quæ iam sculpta erat, & ei satis accedat. Figura quoque Clusii maioris angustifoliae non male exprimit nostram maiorem. Minorem quidem curauimus pingendam de nostris plantis siccis, licet, ut dictum est, eandem puremus cum maiori.

Maiorem C. Bauhin. vocat Veronicam 2. siue spicatum angustifoliam: minorem, Veron 3. siue spicatum minorem.

Veronicæ porro rectæ vulgaris duas species inter se discretas inueniri asseruit quoque Clusius. Nam alteram maiorem esse, latioraque habere folia, & longiorem florum spicam animaduertit: alteram minorem, graciliorem caulem, angustiora folia, breuioremque spicam. Sed considerandum an easdem Clusius nobiscum intelligat.

Si compiler Tabern. per Veronicam rectam primam: itemque Veron. rectam minorem, easdem nobiscum intelligit plantas, non multum placet pictura rectæ minoris, in qua minus feliciter assequitur iconem Lobelii.

An est Cæsalpino lib. 8. cap. 17. Auricula muris quarta, hirsutior tertia: Veronicæ vulgarior? Vtramque etiam obseruauimus Geneuæ, & in Sabaudia florentem Iulio. Circa montem Saleuc non longè à Geneua Februario, sed siccam. Môtbelgardi prouenit in agris prope Audincourt. Insignis Medicus Petrus Turn. aliquando detulit collectam inter Heidelbergam & Spiram: is assererebat prouenire in Angliæ Bristoia. In Pannonia & Austria infra Onalum, nullæ sunt cædæ siluæ, nulli aridiores colliculi & aggeres, qui non alant vulgarem supinam Veronicam, teste Clusio, maximâ copiam.


Recentiores huius usum vnicè commendant. Tragus, qui Teucrium vocat, totâ suâ substantia amarum ait eademque cum Betonica & Chamædri facultates obtinere. Si quid verò de præstantia eius dicendum sit, hoc vnum affirmat, Teucrium vino maceratum ac distillatum mirabili & efficacissimâ vi aduersus aëris pestilentem intemperiem ac quasuis pestilentes febres polleat, adeo quidem, ut ea in re multas alias plantas longo post se intervallo relinquat. Ad eadem commendat herbam in vino decoctam. Teucrium, inquit præterea, vitii lienis opitulatur, lienè ipsū potenter absumit, per aliquot ex ordine dies potum. Aqua Teucrii stillacitiam per aliquot dies binis vnciis pota, vertigini auxiliatur, lentam incidit pituitam, sanguinem purgat, stomachum exaltat, meatus iecoris aperit, pulmonis & lienis vitia emendat, venas purgat, thoracis crassos humores discutit, nec non matricem & vesicam, sudorem & venenum expellit, regiumque similiter morbum, & calculum renum, & si quæ sunt alia corporis totius pestilentes affectiones. Pecoribus tussientibus pastores herbam in puluerem redactam, cum sale exhibent. Folia cum aceto, vel tusa, vel cocta, per aliquot dies imposita, induratum lienem discutunt & absumunt. Vncia Vitrioli in puluerem redacta ac in aqua Teucrii liquata, collutione putrida vlcera, lichenas, serpigines, papulasque, & alias quasuis scabies purgat, sanatque. Idem succus herbæ præstat, vel per se, vel cum alumine. Et ut paucis omnia dicat, Teucrium non solum hominibus, sed & iumentis, ad internas & externas affectiones, vtilissimum prædicat.

Fuchius ex amaritudine quadam & vehemēti adstrictione, quam in gustu præ se fert, cali-

dam & siccam esse coniicit. Mirificè ad cruenta ac vetera vulnera & vlcera sananda conferre. Scabiei denique & omnibus cutis vitiijs mederi. Latum est quondam huius herbæ adiumento Rege Galliæ elephantis morbo correptum, à quodam venatore sanatum esse, cum is certum à lupulo vulneratum eius herbæ comestione, & assiduâ in illa volutatione, curasse se ipsum animaduertiret. Quisquis igitur, inquit, usum Veronicæ verum tenuit, is certè ad gravissimas affectiones corrigendas non duntaxat vtilissimum, sed necessarium deprehendit, &c. Is autem præsertim ad pulmonum quæcunque vitia, pestem, discutientes tumores, & expurganda quæ in vesica, renibus & vtero sunt summè prædicat: atque ad aperiendas omnes obstructions.

Veronicæ extracto contra pestem multum tribuebat Io. Crato trium Imperatorum Archiater. Veronica autem optima quæ ad radices Quercuum crescit: colligitur Iulio.

VERONICA MAIOR LATIFOLIA FOLIIIS SPLENDENTIBUS & NON SPLENDENTIBUS.



Cubitales proferunt caules, interdum etiam ampliores, non valde ramosos: ceterum quam rarissimis alis, sed multis nodis, præditos: folia contrariis inter se petiolis, ad singulos nodos nascētia, duas aut tres vncias longa, vnam lata, crassa, ex atro viridia splendētiaque, raris &

vix conspicuis crenis serrata, gustus admodum adstringentis & exsiccantis, deinde acris: summo caule spicatim crescunt multi conferti siccant, Veronicæ rectè dictæ floribus formâ similes, sed colore paullo dilutiores, ab infima parte spicarum explicare se incipientes, quemadmodum Teucrii flores, & alii plerique qui spicæ in modum congesti nascuntur: semen in planis vasculis continet, exile, fuscum: radix crassa est, multisque fibris donata, singulis annis nouos ex lateribus caules producat.

Est & alia huius species, cubitalem altitudinem non excedens, mutilque in summo caule ramis prædita, cuius folia superioribus non minus ampla & crassa sunt, sed neque splendēt, neque adeo atra sunt.

Conspicitur & tertia species, secundæ non valde dissimilis, cuius folia euidentioribus crenis serrata sunt, ramulique oblongiore florum spicâ præditi, in reliquis conueniunt: vtrique sapor idem, qui in priore, auctore Clusio.

Inuenitur genus hoc cum suis speciebus, in multis Pannoniæ siluosis montibus, gaudetque

Vlcera
cruenta.
Cutsi vicia
Elephantia.
sc

Entra 88.

Deser.

Compil.
Tab. not.

An Arab.
vicia muris
& Cæsalp.
Locus &
Tempus

Vires
vius

Vlcera
scabiosa
scabior.

umbra: sed & Stiriacarum & Austriacarum Al-
pium radices hanc alunt. Floret Iulio, ali-
quando etiam Iunio, in hortis præsertim: semen
Augusto & Septembri maturum est.

VERONICA MAIOR ANGVSTIFOLIA,
caulibus viridibus.

Descriptio



Fibrosa radix
flacribus se
propagat, no-
uos singulis an-
nis: stolones
promens, cubi-
to non mino-
res, rectos, viri-
des, veluti no-
dis aut genicu-
lis distinctos:
folia in singulis
nodis bina, ex
adverso nascentia,
oblonga, e-
ius Lysimachie,
quæ cæruleum
fert florem, pe-
nè similia, sed
crassiora, & in
ambitu mi-
nus serrata, gu-

stu adstringente, & ingrato, postea acriusculo:
summi rami in *spicas* desinunt cæruleorum flos-
culorum, quatuor foliolis constantium, in quo-
rum umbilico duo staminula cum exiguo stilo:
semen in bifidis vasculis, planis quidem, sed ali-
quantulum tomentibus & pulvinatis, exile ad-
modum & rufum.

Habet etiam hoc genus alteram speciem, cui
media sunt inter utrumque genus folia, h.e. illo
paullo latiora, illo (præcedenti) tamen angu-
stiora, caules minus ramosi, dilutiorque florum
spica: sapor quidem adstringit & exticeat, sed
non adeo vehementer, ut in prima specie, autore
Clusio.

Cæterum, Veronica hæc secunda Clusii, siue
maior angustifolia, multum conuenit cum no-
stra Veronica spicata recta.

Locus &
Tempus

Iisdem locis quibus latifolia prouenit, & cum
eadem eodem tempore floret, & semen perficit.

VERONICA SPICATA RECTA,
profundè serrata, quam Lysimachiam
cæruleam quidam vocant.

Descriptio

Cæterna, aut plura *folia* ad nodos habet, Parmia-
cæ Fuchianæ foliis similia, vncias duas aut tres
longa, culmum lata, valdè serrata, glabra: spica
longa *stribus* dense congestis constat, cæruleis,
quibus deciduis remanent longa staminula. Flo-
res dicit Lobelius nitidos, Teucrii, Germandree,
aut Lanendulæ longiores, plura exigua succedere
marsipiola, in quibus *semen* minutum: exigua &
& fibrosa *radice* niti.

Inscritbit autem in Adu. Obs. p. 186. & Ic. Plant.
p. 344. Lysimachiam cæruleam nortensem, Ver-
onicam rectam quorundam: Dod. Gall. Lysima-
chium cæruleum: Lat. in fol. Pseudo-Lysima-
chium cæruleum: nonnulli Lanendulam silue-

Lysimachia
cærulea
hortensis.



stem vocant
sed malè: ut
Gesnerus: etiã
perperam Ana-
gallidis aqua-
ticam. spe-
ciem dicendã
existimauit.

Clusius & H. *Synon.*
Lugd. Lysima-
chiam cæruleo
flore quoque
vocant, C.B.
phyt. Lysima-
chiam 14. siue
spicatam cæru-
leam. An Ca-
mer. hort. Ve-
ronicam Spi-
catam cæru-
leam? An Ta-
bern. Icon. &

Hist. Veronicam rectam secundam?

Rarior hæc in hortis; Londini Iunio & Iulio
floruit in horto Morgani: Belgicis autem siluis
dicitur crescere spontè. In hortis verò apud
Belgas facillè luxuriat soli expolis locis, non
omnino aridis: umbrosis non proficit, aut agrè:
tota Ætate flores gignit Dodonæo autore. In
Pannonia, & vicinis Austria atque Stiria regio-
nibus, vel secundum riuos, vel in montanis pra-
tis spontè nasci narrat Clusius.

Vfus nul-
lus.

Rarior omnino & paucior huius vsus. Nam
facultates eius explorare nondum cuiquam curæ
fuit.

VERONICA SAXATILIS.

CAP. LVI.



Folius vestiti-
fleur *caliculi*
lignosi palma-
res, crebris, bi-
nis, ex aduer-
so sitis, Scrypylli
foliis paullo
longioribus,
obiter subindè
crenatis, gla-
bris, per extre-
mum rotundis;
summos cau-
les ornant flo-
res mascululi,
cærulei, cha-
mædrios spuriæ
vulgaris flori-
bus similes: ra-
dix lignosa, sa-
tis long.: tota
planta valdè a-
mara est.

Descriptio

An Veronica minor alpina Scrypylli folio Po-
næ? C. Bauh. phyt. dicitur Veronica siue frutes-
cens.

Reperi plantam in Valle Telina Rhætiae, & in
mesen in iuris: Genevæ in Monte Thuri. Pro-
uenit in Sneberg & alpestribus Stiriae iugis, ubi
Iunio floret: at, teste Clusio, etiam in hortis Ma-
io, semen Iunio ad maturitatem perducit. In al-
rioribus

Locus:

tionibus vero summitatibus Baldi Orientem versus floret Iulio mense: semen Augusto maturitate perficitur. Ceterum, perennis naturę planta est: licet frigore depereant comę.

Tota planta, & semen gustu adstringente deprehenditur, nullā percepta acedine, aut mordacitate: unde in fluxibus, & in quibus adstringere sine caliditate opus est, aptum esse medicamentum iudicavit olim Pona.

VERONICA FOEMINA QVIBVSDAM,
aliis Betonica Pauli, Serpillifolia.

CAP. LXII.

Descrip.



Radice tenui infirmā per terram serpit: quā terram attingit, propagatis fibris se radicās: coliculi attolluntur aliquot semipalmares, tenues, geniculati: ad singulos articulos folia binz opposita, Serpilli, oblonga, subrotunda, nonnihil interdum ctenata: strobili ex foliorum supremorum alis tenues &

brevi pediculo pulchelli, inodori, quatuor foliolis constantes quorum tria cærulea, aut albican- tia, striata, quartum reliquis minus, albidum, nullis striis pictum: stamina in medio alba, apicibus cæruleis: succedunt utrīcula Veronicę similia.

Perenn. foemina Dod. gall.

Euphrasia dicitur Brunfelsio, sed falsò: Tragopodium agreste. Dodon. gall. Veronicā foeminā vocat, gall. Veronique femelle, germ. Erenpreis weiblun / Belg. Erenprys wyffen. Lat. in fol. Veronicę pratensis, Veron. tertia. Lobel. in Adv. Obs. p. 250. Ic. Pl. pag. 472. Veronica minor Serpillifolia. Gesn. hort. Betonica Aeginetæ secundum Turnorum. Thallio dicitur Veronica foemina. Hort. Lusitan. Alina palustris. C. Bauh. phyt. Veronica 6. siue pratensis Serpillifolia, glabra & hirsuta: Mysotidis species apud Dioscoridem quibusdam, Alyssum Dioscoridis Columnæ: Alii Alyssum Columnæ alia est planta de qua sub Alina: neminem præterea novimus qui Veronicam serpillifoliam hirsutam aut dixerit, aut pinxerit, ut frater voluit.

C. Bauh. ver.

H. Lugd. ver.

Descriptio Veronicę foeminę Dodonęi apud H. Lugdunensem est duarum plantarum simul confusarum: nempe huius de qua agimus, & E. latines quæ quibuldam etiam Veronicę foemina dicitur.

Locus tempus

Veronica foemina Dodonęi in pratis, ac humentibus exit: Iunio & Iulio floret, ac viget, reliquis anni mensibus etiam vivet. In silvis sub Quercubus, locis arenosis, montibusque ad collibus & agrorum limitibus nasci auctor est Tragus. In horto Sionis & silvis plerique non procul Stone, flore albo, mixto cæruleo: semine Tom. III.


Bursa pastoris observata à Turnero Montbelgati in horto Ill. C. W. & aliis locis abundat. Basileæ non longè à Castello Hermes floret Maso: Lugduni Martio: Genevæ in segetibus Aptili.

Eadem pollicetur quæ Veronica mas, sed inefficaciùs: radix nonnihil calida & deficiat: ad Serpilli gustum inspidiosam accedit Lobelios: licet à Dodonzo ignava & nullius usus habeatur.

Facultas: sibi Veronice.

CHAMÆDRIS SPURIA ANGVSTIFOLIA:

CAP. LVIII.



Multas ab una radice tenui, sed longā, repente, lignosa, fibrosā, virgulas per terrā diffusas, interdum nonnihil humo delatas proferit, teretes, & hirsutas, itemque lignosas, tenues, longitudine palmari & dodrantali in quibus bina per intervalla folia opponuntur, oblonga, inartibita serrata: virgulae in ramulos aliquot circa extremum divisa, flores sustinent inspicam digestos, non simul se expandentes, cum inferiores existant, cæruleos, singulos quatuor foliolis constantes: staminibus concoloribus & hilo tenuissimos, quorum pedicellis brevibus & tenuibus appositum est foliolum tenuissimum oblongum viride.

Descript.

Hanc autem non esse Teucrium, nec legitimā Chamædrin, notius est quā refelli opus habeat. Nihilominus tamen ante notam Chamædryn, vel etiam Teucrium, huc Chamædris in officinis nomen accesserat, ac pro Chamædris in medicamentorum compositionibus admittēbatur: nostro quidem iudicio non sine errore.

Teucrium non est, nec Chamædris legitima.

Brunfels. Rhaph. 10. Tomi tertiū male huius herbe figuram sine descriptione, Chamæpityos titulo pingit. Nec multò melius in Herb. germ. Chamædryn & Querculam minorem appellat.

Brunfels. falso vocat Chamæpityon.

Fuchsius inscribit Chamædryn vulgatam marem, sed hanc ab aliis Chamædryos speciebus suā descriptione non distinguit. Tragus in eius descriptione obscurus est. Marth. in comm. cum mag. fig. solam imaginem proponit Teucrii secundi titulo. Sed & Cast. Dur. ineptam dat iconem Chamædryos alterius inscriptione. Dorst. quoque pro Chamædry Pseudo-Chamædryn hanc exhibet.

Dod. gall. Verbenacæ annumerat, eamque Hierobotanes foeminæ, Veruaine basse femelle, titulo ostendit. Lat. verb. in fol. proprio capite pro Chamædry silvestri describit, & depingit.

Ceterum, Dodonęus lat. vnicam dat figuram & descriptionem nempe angustifolię, cum gall. duas proposuisset figuras ex Fuchsio (maris sc. de qua hic agimus, & quam is scemellam cognominat: & foeminę, de qua postea dicemus, & quam

is marem inscribit.) & duas descriptiones, quæ placebant: cur autem Lat. alteram reiiciat, nobis haud constat.

Facile crediderim Chamædryn angusto folio, & sequentem lato, intelligere Geln. hort. per Chamædryn falsam, inspidam flosculis cæruleis, suæ spontis vbiq; Schaffraut; & alteram eius speciem in siluis & montibus nascentem: de collo. stirp. Chamædryi affinem, flore cæruleo duorum generum: Clusium per Teucryi priini genus Chamædryos nomine à vulgo nuncupatum in Pannon. In Histor. per Teucryi quarti tertiam speciem. Lobel. in Obs. 239. per Teucryum pratense alterum, Herbam sacram, & Verbenacam supinam feminā Dodonæi. Ic. Plant. per Veronicam supinam facie Teucryi pratensis. Cur autem supinam dicat, rationem non adfert: in Aduers. non separat à sequenti. Teucryum 2. Tabern. Auricula muris 5. Cæsalpino: Chamædrys 9. siue spuria maior 3. C. Bauh. phyt. Eidein apud Matth. Teucryum alterum, Chamædrys altera Tragi.

Locus & Tempus

Nascitur pluribus locis in pratis iuxta flumina, riuulos, scrobes, ac fontes, subinde & in memorosis: Et Iunio, Iulio ac Augusto cum floribus viget.

CHAMÆDRYS SPURIA LATIFOLIA.

Descriptio



PRO Chamædry vera receperat iam olim vulgus plantam numerosis fibris radicatam & reptantem subinde sese propagantem, & quibus exeunt cauliculi, spithamam aut etiam cubitum alti, lanuginosi, ex nodis subinde fibras radices vicem subplecturas producentes: unde etiam aduersa folia

oriuntur, Chamædryos vere foliis similia, latiora quam Chamædryos adulterinae maris, vtrisque molliora, tristius virentia, hirsuta, similiter tantè serrata, sapore amaricante prædita, qualia, sed proportionem minora, per ramos, qui oppositi sunt, nascuntur, & quidem tam hæc quam illa, sine pediculo, caules ramosque amplectuntur: flores in thyrsum digesti per aduersos ramos hilari cæruleo nitent, & quatuor foliolis compositi, non ita frequentes vt in adulterina mare: in quorum medio apices violacei: singulorum autem florum pediculo ligula appositæ est.

Locus.

Chamædryn vulgarem feminam lato folio obseruavi Ferrariæ in Monasterio S. Dominici à l'Angeli, Basileæ etiam & Montbelgardii frequentem in hortis, spontè quonque nascentem.

Vires.

Caloris & siccitatis cum amaritudine participem esse, ac Tussi, incipienti hydropi, indurato lieni, stranguaria, viscerum obstructionibus, Ca-

cochymia & virginum fædis coloribus conficere tradunt Tragus, Lobelius & Dodonæus.

CHAMÆDRYS FALSA MAXIMA, AN Teucryum siue maius Pannonicum, Clusio.



Congener Chamædryi vulgari, verum multis numeris eâ maior: folia longa, acuminata, serrata, per hirsutos caules bina: rami itidem ex aduerso positi longam sustinent florum spicam, Chamædryos vulgatè similem, maiorem, succedentibus compressis, bifidis, capsulis. Florentem reperi Genue mensè Iunio in colle la

Basile: Clusius verd in collum omnium & montium Pannoniæ petrosis herbosis locis.

Chamædrys falsa supina atro-virentis folio.

Lobelius è Teucryi familia esse existimauit, docereque id flores cæruleos spicatum prodeuntes, & foliola; sed angustiora, longiora, minusque serrata; Polio montano paria, atro-virentia, in cauliculis dodrantalib. humi fassis, ideoque Teucryum paruum supinum appellauit. Oritur in Frisia iuxta Deuenteriam & Ouerissel.

CHAMÆDRYOS FALSA SPECIES. Teucryum 2 aut 5. Clusii.



HVmi procumbunt huius rami dodrantem longi, per quos ex opposito bina sepe folia Chamædryos foliis similia, serrata, in obusum mucronem desinentia: flores magnam ramulorum partem occupant, spicati, Chamædryos adulterinae cæruleæ floribus similes: bifide succedunt compressæ capsulae, semen compres-

hendentes rufum: radix subest fibrosa. Hanc etiam describit Clusius, eius tres faciès species: ratione scilicet caloris vel cærulei saturatissimi.

ratissimi, vel dilutioris & quasi cineracei, vel ex carneo candicantis.

Synonyma Clus. in Pannon. vocat Teuctrium Pannonicum minus, Teuctr. 2. In Hist. post. Teuctr. 5. Tabern. Teuctrium Pannonicum Dngersich Baschengel. C. Bauh. phyt. Chamædryn n. siue spuriam minorem latifoliam secundam.

Locus. Nasceitur omnibus ferè siccioribus agris incultis, herbosisque aggeribus & colliculis, secundum vias publicas inferioris Austris præsertim Viennensi agro, & apud Neapolim vicinam urbem loci natura munitissimam. Floret Maio.

CHAMÆDRYS SPURIA MINOR angustifolia.

Descriptio



Chamædrin hanc siue spuriam minorem angustifoliam, prædictæ valde similem, sed ramosiorè, altiore, foliis duplò, triplòve angustioribus in agris Rauracis siccioribus incultis, ut circa balneum Brugglingen copiosè observare est, auctore C. Bauhino. Talem mihi dedit Thomas Platerus Basileæ collectam: eadem flore albo reperti in hortis quibusdam circa Montbelgardum.

dem flore albo reperti in hortis quibusdam circa Montbelgardum.

CHAMÆDRYS SPURIA TENVISSIME lacinata.

Descriptio



Sanè quàm elegans hæc est Chamædryos species. Cauda erigit pedales, altiores, teretes (præterquam crassiores, qui ab ima parte quadrangali videntur) firmos, ramosos, lanugine quâdam modicâ obsitos: folia secundum genicula singulis utrinque plura hærent, tenuissimè ac profundis segmentis lacinata. Ramulorum extrema vasa ex longiusculis pediculis gerunt singularia, cordata, Chamædryos vulgaris, foliaceo caliculo comprehensa, in quibus semen exiguum coloris spadicei,

Tom. III.

compressum. Radix crassiuscula multis nigris fibris donata.

In Goritienli agro D. Agerius legit, nobisque pro figura & descriptione elegantes aliquot plantas exhibuit.

CHAMÆDRYS VETERIBVS

& in genere.

CAP. LIX.

Chamædryos falsè vulgatiorebus speciebus traditis, reliquum est, ut ad genuinam ex Galeno, Theophrasto, Plinio, & Dioscoride tradendam nos accingamus, iuniorumque in eorū sententiis explicandis opinionem intelligamus.

Chamædryn igitur sunt qui Chamæropa, qui Lynodryn, qui Trixaginem dicunt. Sunt etiam qui & hanc propterea, quod aliquam cum Teuctrio similitudinem habet, Teuctrion pariter appellent: Nasceitur in asperis & petrosis locis. Est autem frutex palmi altitudine: folia habens parua, figurâ & hirsutâ quernis similia, gustu amara: florem subpurpureum, & ipsum etiam exiguum.

Colligere oportet suo semine prægnantem herbam. Vim habet viridis decocta cum aqua, & pota auxiliandi convulsos, ruffientes, liene indurato laborantes, difficultatēque vtriusque oppresses, ac hydropicos in principio. Ducendi etiam menses & fetus. Lienem quoque liquandi cum aceto pota, & imposita. Trita verò & in catapotia efformata ad eadem efficax est. Potest & vlcerà vetera repurgare cum melle. Tollit etiam caligines oculorum cum oleo trita ac illita. Natura autem ei est calefaciendi, ut Dioscoridis scripta testantur. Chamædrys [inquit Plin. lib. 24. cap. 15.] herba est quæ Latine Trissago dicitur. Aliqui eam Chamæduopem, alii Teuctrion appellauere. Folia habet magnitudine Menthae, colore & diuisurâ Quercus. Alii Serratam, & ab ea serratam inuentam esse dixere, flore penè purpureo, Carpitur prægnans succo in petrosis, aduersus serpentium venena, potu illiusque efficacissima. Item stomacho, tussi vetusta, pituitæ in gula coherentis, ruptis, convulsis, lateris doloribus: lienem consumit, vrinam & menses citat. In plerisque is cum Dioscor. consentit.

Theophrastus tamen lib. 9. c. 11. Hist. aliam vim foliis, & aliam semini assignat, similibus verbis. Chamædryos quidem folia adrupta & vulnera in oleo trita valent, & ad vlcerà: fructus autem purgat bilem. Oculis quoque prodest. Folium verò ad albugines tritum in oleo confert. Habet folia, &c. Sed partes quidē omnes herbe eiusdem minimè ad idem viles fore haud quicquam absurdum fortasse. Radicis verò eiusdem partem vnam superna: alteram inferiora purgare profectò mirabilis.

Ex Galeni autoritate Chamædrys vincentem habet qualitatem amaram: est & quodammodò acris. Quocirca meritò lienes colliquat, & vrinæ ac menses prouocat, crassitudinem humorum incidit, & viscerum obstructions purgat. Ponatque eam quispiam in tertio ordine excalescentium & desiccantium: plus tamen calfacit, quàm desiccet.

Chamædryn porro nihil aliud quàm humilem & terrestrem Quercum exponit Marcellus, ac ab eiusdem coacta breuitate aliud Chamæropis nomen illi ab aliquibus factum esse narrat. Sic enim ex veterum Græcorum & Latinorum fide legendum existimat, etsi Dioscorides Chamædropa

FF 2

vocari tradat. Plinii quoque codices omnes ante Barbari castigationem Chamæropem vocari Trixaginem dicebant.

Aequiuoca. Ad Chamædryos æquiuocationes quod attinet : Sciendum est Chamædryos eius, quæ verior existimatur, & procul dubio non multis officinis in Germania nota est, nec etiam vifa, quatuor esse differentias Clusio, sicuti etiam Lobelio. Eodem nomine præterea sequentes donantur plantæ. Chamædrys arborea. Teucrium. Chamædrys spinosa. Chamædrys montis Sumani. Chamædrys laxatilis Baldi. Clinopodium spinosum Ponce. Chamædrys alpina flore fragarise albo. Chamædrys vulgaris officinarum quarundam. Chamædrys maxima. Chamædrys spuria minor angust folia. Chamædrys spuria tenuissimè latifolia. Botrys altera siue verticillata. Scordium. Veronica. Radix Lapathi acuti. Chamædrys vulgaris spuria latifolia, folio rotundiore.

CHAMÆDRYS VVLGO VERA

exultimata.

CAP. LX.

Descriptio.



Reptatium classis accensenda, radicular lignosæ oblique agit, fibrisque tenuissimis subinde rursum radicator: virgulis donata dodrantalibus, rubentibus, lanuginosis: quibus folia ex interuallis adnascuntur, bina ferè, opposita, Quernorū diuisurā, longitudine vnciali & maiore, latitu-

dine semunciali, rigida, nervosa, hirsuta, sapore subamaro, subdulci, & aromatico, flores in folia spicatum quodammodò exeunt purpurascens, labello scutellato, alis duabus acutiusculis ad angustam ceruicem appositis, supra quas surrecta ceu spicula: pro galea verò, quæ destituuntur, purpurantia stamina surriguntur.

Matthioli. Matthiolus, qui non describit, picturam habet quæ non in omnibus placet, nec in comm. post. cum mag. figuris meliorem exhibet: Præstat autem Camerarii in Hist. germ. itemque Epit. Trissaginis & Chamædryos titulo.

Dod. Dod. lat. in fol. Chamædryn repentem vocat, ac in minorem, vt Clus. quoque, & maiorem distinguit, duasque figuras pingit, quamuis in descriptione vnius tantum plantæ meminerit: In icone autem, quæ maior inscribitur, nihil repentis apparet, ac propterea displicet.

Lonic. Lonic. lib. 5. cap. 14. huius Chamædryos signam absque descriptione dedit, his nominibus, quæ inter se confundit: Chamædrys vulgaris mas, Bathengel Nānlin/Erdr weyrauch.

Synonyma

Chamædrys porro dicitur planta, de qua hic

aginus, Fab. Columnæ, Gesn. hort. Turn. Cast. Dur. (cuius icon non placet) Marth. Anguill. & Cornario. Chamædrys vera (ita etiam Cord. in Diosc.) itemque Chamædrys siue nobilis Trago. Cham. vera mas Fuchsi. Chamædrys vulgò Quercula, Cæsalpino. Cham. mas maior & minor Hort. Lusit. Chamædrys siue maior repens, Tragi C. Bauhino in phyt. Item Chamædrys siue minor repens: vera mas Fuchsi, maior Lob. Ic. Chamæpyris Brunfelsii. Quam ob rem queso separet frater Tragi Chamædryn, à vera mare Fuchsi; similes cum sint icones: Brunfelsii Chamæpyryn diuersam admodum esse, nempe Pseudo-Chamædryn, asserimus, in quo etiam lapsus est Cordus.

Græcis hæc planta χαμῆδρυσ, ἢ χαμῆδρυσ (Marcell. tamen χαμῆδρυσ legendum censet): ἢ χαμῆδρυσ, quibusdam etiam Τριξάγρῳ: Lat. Trixago, aut Trissago dicitur, iuxta nostri seculi Medicos: Chamædrys in Hetruria. Senensibus præsertim; vulgò Quercinola (aliis Querciula) Quercula minor & humilis Quercus: Plinio lib. 24. cap. 15. ob incisuras quas retinet, Serrata, & alijs Serratula: Insulribus & Manlio Calamandrina: nonnullis Febrifuga & Herba februm; Apuleio Drys, Drysites, Barbaris & Arabibus (vntibus gentitio pro nominatio) Camedreos, Camedryos, Damederios, Chamedrius & Kemadrius: Laurent. Phrysiō Kamel & Trizaoga appellatur. Germanicè Erdeiche / Gamandelein / Germanderlin / Bathengel / Flein Bathengel / & Bathonien: Chesnettes, peris Chesne, & Germandree: Italis Quercinola: Hispan. Camedreos: Angl. Germander, & in Agro Cantabrigiensi Englische Triacle, h.e. Theriaca Anglorum. Boh. Ozanka meussy.

Chamædryn & Chamædrypa Guiland. in Theon. vnam eandemque credidit, ac propterea Galenum & Paulum, de hac planta in diuersis locis sub diuersis nominibus pertractasse sentit. Vbiuis locorum præsertim apricorum adolefcere autoritas est præcipuorum Scriptorum, Vidimus nos copiosè Lugduni videntem mense Martio, & Aprili a la Roche; Genevæ passim; Montbelgardi prope la Crete, & ad vites: Patavii in horto quodam videntem Ianuario: Monspelii florentem Aprili prope Castelneuf; Basileæ in monte prope Moutets, & alibi mensibus Iunio, Iulio, & Augusto.

Chamædryn repentem tenuium esse partium, ac incidendi facultatem habere dixit Dodonæus, calidam & siccam propemodum ordine tertio; veluti de Teucrio Galenum scribere testatur, quamobrem & lienosis conferre: recentem cum oxycrato, vt Diosc. aut aridæ decoctum, potenter lienem absumere. Imponi verò lientis cum aceto & ficibus: serpentum verò moribus cum aceto solo: Posse autem omnia, quæ & assurgens, siue fruticans (Chamædrys fallax, siue spuria) proinde & citra errorem pro Chamædry accipi & vsurpari posse. Pestilentis, humbricis, Sanguini concreto, Podagræ, Hemorrhoidum doloribus, Capitis morbis frigidis, Ictero, Auribus vermiculosis, suppressis Urinis & Febris tertianis feliciter adhiberi scribit Matthiolus.



CHA-

C. B. 100.

Nomina ling.

cap. 100

CHAMÆDRIS SPINOSA.
CAP. LXI.

Descriptio



Hanc, quā C. Bauh. in phyt. itēq; apud Matthioli. Chamædryn 4. siue spinosam ex horto Bembii nuncupat, anno 1594. Basileæ inter eius siccas plantas, obseruauit: nusquam verò alibi: scō quam damus ex sicca planta depicta.

VERONICA PETRÆA SEMPER VIRENS
Ponx, ad Chamædryn vulgarem
falsam accedens.
CAP. LXII.

Descriptio

Ex scissuris simplicis & omnino nudi saxi Baldi, hæc nascitur, quinque, sex, vel pluribus etiam caulibus rotundis, non ramosis, altitudinis sesquipalmaris, e quibus foliola bina exeunt (licet aliqua magna reperiantur) æquali ordine disposita, uti Chamædryn, tamen non sic profundè



incisa, admodū crassa, splendida, supernè virentia, & lanugine quadam donata, infernè verò albicantia: fert in summitate multos flores ad instar spicæ, quaternis, quinis, & septenis foliis, cæruleo colore, aliquantulum albicantibus: quibus cadentibus relinquitur calyx, in quo semen continetur, ut in aliis Veronicis fit. Habet radices par-

uas fibrosas ac nigricantes, quæ ita saxi illis horridis paucissima commixta terra includuntur, & adhærescunt, ut difficilimè etiam ligonibus euelli possint. Acerbi & amari saporis planta esse gustu percipitur.

Synonyma

Veronicam hanc petræam Ponx, siue ut Casp. Bauh. in phyt. vocat, Chamædryn 6. siue saxatile Baldi, Clusius Hist. post. Teucris 6. (3 in Pannon.) pumili titulo delincauit.

Ex scissuris simplicis & omnino nudi saxi Baldi nascitur, florens initio Iulii, testibus Pona &

Clusio, & circa finem maturans semen, semperque virens.

CHAMÆDRIS MONTIS SUMANI.
CAP. LXIII.

Descriptio



Sane quā Schegins apectu plantula videtur: caulis est palmaribus, dodrantalibus, firmiculis, teretibus, albicantibus, quibusdam breuissimis pilis obsitis: quibus folia hærent aduersa, quædam rotunda, alia oblonga, medio ambitu serrata, sedima supremis multis numeris minora, lan-

nugine item prædita: supremis fastigiis flores in spicam fastigiantur, qui hinc videntur, ut etiam pictori videbatur, quod tamen asserere non audemus: cuius porro coloris ex sicca certò definire nolumus, candicant tamen. Hos vascula excipiunt quadripartita, in pyramidem exacuta, perangustis quibusdam foliolis pilosis, densè obsepta: semen quod intus est, minimum est, & penè araneolum, sed quod longius, quàm crassius, rufum: Folia sicca amareant, cum modica adstriptione. Hæc planta magnam habet similitudinem cum Veronica petræa semper virente Ponx.

D. Agerii liberalitate ad nos peruenit nomine prædicto, lecta in monte Sumano, Viterbiensi.

CHAMÆDRIS VULGARI FALSÆ ALIQUATENUS AFFINIS ALPINA, & CLINOPODIUM
Alpinum Ponx.
CAP. LXIV.

Descriptio



Ex aduerso sita sunt per caules folia, Chamædryos paria, acuminata, rugosa, hirsuta, per ambitum serrata: ex quorum alis per caulium partem superiorem bina ex aduerso quoque oriuntur vascula Pedicularis Alpinae in binas carinas, singulas totidem diuisas loculis, sese aperientia, semine plena paruo, nigro: caules dodrantales, & pal-

mares, firmi, multi, è radice lignosa, nigricante, multis capitibus diuisa.

Locus

Hæc planta collecta est in Alpibus Allobrogicis, cum Genevæ degerem, quam tunc ex sicca sic delineavi.

Io. Pona industrius Botanicus transmisit anno 1690. plantam minorem, pluribus capitibus è radice repente fibrosa exeuntibus donatam, quam eandem cum nostro ramulo esse statimus. Ei autem in monte Baldi Clinopodii Alpini titulum attribuit.

CHAMÆDRYS ALPINA FLORE

Fragariæ albo.

Descriptio



DVra lignosa virgulta palmaria aut dordantalia crassiuscula per tertiam spargit, colore rubente prædita: per quæ folia nullo nascuntur ordine Chamædryos verioris foliis similia, minora, duriora, rugosiora, serrata, inferne incana, superne atro-virentia, gustu adstringente: præ-

diculis tenuibus, palmaribus, hirsutis insident singulis flores, singuli, candidi, Fragariæ, duplò maiores, foliis tenis aut pluribus constantes, quorum medium occupant circa staminum numerosi, quibus delapsis succedit plumarum Pulsatillæ capitulum, semine oblongo, ruffo: totius autem floris basin fulciunt folia hirsuta, oblonga, angusta: radix longè lateque serpit, crassa, lignosa, ex ruffo nigricans.

Synon.

Vocat eam Lobel. in Adu. Chamædryn montanam frutescentem duriorum. Dod. lat. in fol. Chamædryos aliam speciem. Clus. in Pannon. Chamædryn 3. [C. Bauh. in phyt.] siue Alpinam, Cist. flore: in Hist. post Cham. 3. siue montanam. Camer. hort. Cham. Alpinam, Leucadem quorundam, & Heluætorum *bergwurz*, h. e. Herbam cerui.

Locus & Tempus

Genevæ in monte Thuyri floret mense Iunio & Iulio, itemque in Rhætiæ monte Brailio, & montibus Ingadinæ. Frequens est, auctore Clusio, in summis Austriacarum & Sciriacarum Alpium iugis: floret Iunio.

Vires & Virtus

Chamædryn montanam ad ventris profusiones, mensium abundantiam, sanguinis effluxiones, & vomitiones immodicas Alpini commendant, sed ad dysenterias præcipuè, huiusque frondes damas avidissime carpere narrat in locis huius plantæ feracibus degere consuetas.

TEVCRIVM VETERIBVS.

CAP. LXVI.

Ex Disce.

Teucrium, aliis ob similitudinem Chamædryos dicta herba est, inquit Dioscorides, vir-

gæ speciem præferens, similis Chamædryi, tenuia folia, & Ciceri simile folium habens. Nascitur plurima in Cilicia, iuxta Gentiadem & Cissadem appellatam. Vim habet viridis cum posca pota: aut arida feruefacta pota, lienem fortiter liquandi. Imponitur etiam cum ficibus & aceto in splenicis. Verum in his qui à venenatis bestiis commorfi sunt cum aceto solo, absque ficibus.

Teucrium à Teucro Aiæcis fratre inuentum, sic tradit lib. 25. cap. 9. Plinius. Inuenit & Teucer Teucrion, quam quidam Hermion (vt Marthiol. Hemionitin Corn. Hemionium Dalech.) spargentem luncos tenues, folia curua, asperis locis nascentem, austero sapore, nunquam florentem: neque semen gignit. Medetur lienibus, constatque sic inuentam. Quam exta super eam proiecta essent, adhæsisse lien, eumque exinanisse. Ob id à quibusdam Splenion vocatur. Narrant sues qui radicem eius edant, sine splene inueniri.

Plinius

Teucrium, inquit Galenus, vim secandi & tenuium partium habet. Vnde & lienibus medetur. Et posuerit quis ipsam in tertio ordine siccantium, in secundo calefacientium.

Teucrii autem nomine apud Autores sequentes donantur plantæ: Teucrium multis. Teucr. Boticum. Chamædrys. Chamæd. vulgò vera. Teucrium foliis Scorodoniz. Chamæd. falsa maxima. Cham. falsa angustifolia. Cham. vulg. femina. Cham. vulg. mas. Chamædryi aliquatenus affinis. Chamædrys falsa supino folio atro-virente. Veron. petraea semper vitens Ponz. Veron. saxatilis. Veronica. Veronica femina Dodonæi. Hemionion. Asplenium silu. Hemionitis. Scolopendria. Lingua ceruina. Faba grossa. Teuthrium. Pimpinella. Alceuetto Oeconis. Teucrium Creticum.

TEVCRIVM MVLTIS.

CAP. LXVII.




Cognatum Chamædryi Teucrium, aliud tamen fruticat, rectis, lignosis, quadratis, hirsutis virgulis: in quibus ex brevibus intervallicis cernere est aduerso posita folia bina, vtrinque hirsuta, superius atro-virentia, inferius nannihil canescentia: & inferiora quidem formâ & magnitudine

Descriptio

Chamædryos spectantur, serrata, ex oblongo rotunda (iucundi, inquit Clusius, si terantur, odoris) quæ verò virgularum fastigia ornant, ad Hormini folia quodammodò accedunt, nequaquam per ambitum incisa, & circa basim latiora

flora in acumen desinunt :



florae porro ex foliorum superiorum alis emicant plures iuncti, pediculis satis longis hæretes, calyce hirsuto canescente, Chamædryos florum formâ, labello quidem longiori dimisso, sed cucullo vidui, cuius loco stamina luteola exeunt, quo colore flos quoque ipse est præditus, Clusio ex albo pallecente : sapor herbæ est acrisculus cum amarore non ingrato.

Fuchf. natur.

Fuchsius Teucrit huius nullam proponit notam, præter Dioscorideas quasi non vidisset plantam.

Matthioli opinio reprobata.

Matthiolo Teucritum hoc non notum fuisse existimo, ut qui id Triflagini aded simile dicat, ut sæpe ex tempore visum oculos decipiat. Non est sanè tanta similitudo, quantam sibi imaginatus est Matthiolus. Discrimen inter Teucritum & Triflaginem ille tandem deprehendit haud exiguum qui non raro utramque videntem deciperet, ac inter se conferet.

Lob. hallucinatione.

Sed & Lobelio incognitum fuisse coniectamur, ex eo quidem, quod in montibus observari dicat, nec tamen locum particularem adscribat.

Synonymia

Teucritum dicitur Gesn. hort. Matthiol. in priorib. com. H. germ. & Epit. cum addit. Camerarii, Fuchf. Lob. Dod. gall. Teucritum primum Matthiol. in comm. cum mag. fig. & Tabernamontano. Teucritum vulgare Camer. hort. & Clus. cui etiam fruticans, sine primum in Hist. Hisp. & post. Teucritum alterum Matthioli H. Lugd. p. 1165.

C. Bauh. Phyt. Teucritum 1. siue alterum Matthioli fol. lat. lib. 3. c. 95. p. 544. Item Teucritum 4. siue Boeticum Camerarii: Apud Matthiol. Teucrit. 1. Matthiolo (verum in penultima editione figura posita sub 2.) Cordo Teucritum.

Locus & Tempus.

Licet Dodon. hoc ut Lob. in petrosis & asperis nasci, montesque, ac loca arida & aprica amare dicat, tamen ego non nisi in hortis observavi, ut Basileæ in Zvvingeti, virens adhuc Octobri: Lugduni in meo perferens Hiemem: Patavii virens Decembri: item mense Martio in orto Trivesani: Bononiæ in orto S. Salvatoris: albugo di S. Catharina: Genevæ superueniente frigore corruptum: satum in orto Montbelg. prouenit.

TEUCRIVM BOETICVM ET

Creticum Clusii.

CAP. LXVIII.

Descriptio

Ignescit Teucriti Boetici ramus, candidissimus tortis, lanuginosus, quadratus: ad cuius genicula aduerso sinu nascuntur folia, Teucriti vulgarioris (de quorum tamen sinu alia minora

prodeunt) supernè attrouirentia, infernè admodum alba & nervosa, & lanugine densiore ob-



sita: flores per rami summa ex foliorum alis candidi labrum longum demittunt, pro galea, quam nullam habent, stamina longa cæxerunt: calyces candidi, striati in quinque mucronatas lacinias diuiduntur.

Teucritum Boeticum Tab. tam Icon. quam Hist. Græcis & Bengel germanicè nominat, quod, ut ait, in Græcia prouenire soleat. Sed in qua parte quæso Græciæ cõ-

Tabern. res prob.

pilator Tabern. hoc Teucritum obseruauit? Boetica regio mihi ex Strabone Hispaniæ pars est.

H. Lugd. pag. 1166. Teucritum Boeticum Clusii Synon. appellat: C. Bauhin. phyt. Teucritum 2. siue peregrinum sinuoso folio. Hoc variare refert floris colore candido, & purpurascens exeruleo.

Locus

Ex semine, dato à D. Zvvingero, in orto Montbelgardensi ill. C. prouenit. Montibus autem circa Calpen, ad Herculeum fructum, & Boeticæ maritimis, in sepibus & inter alios frutices inueniebat Clusius: tum etiam Gadibus, eà parte quâ Continenti recens coniuncta tum erat insula à ponte admirabili, vulgò Puente de Cuac. dicto, sed humiliorem, quam commemoratis locis. Florebat Februario.

Eidem Clusio mittebatur Teucriti semen à Tempus. Creta Chamædryos maioris appellatione: unde ei natum Teucritum vulgari fruticanti non valde absumile.

TEUCRIVM SCORODONIAE FOLIO.

CAP. LXIX.

Planta hæc ex Italia Cameratio missa Teucriti veri nomine, foliis fuit penè Scorodonie vulgò dictæ, sed minoribus. Florem eius non obseruauit. Cauliculos verò per Hiemem cum summis foliis durare scripsit. Non autem ipsi videtur congruere Dioscoridis descriptioni.

Teucritum verum.

C. Bauhin. Phyt. est Teucritum 2. siue alterum Scorodonie folio.

Diosc. descriptionem non cognouit.

SCUTELLARIA TEUCRIT FACIE.

CAP. LXX.

Cinbitalis est planta, caule quadrato, hirsuto in ramos oppositos brachiato: per quem ex aduerso posita folia bina, quorum superiora ad Teucritum accedunt, quæ verò in imo sunt ex oblongo rotunda, maiora, omnia per ambitum serrata, hirsuta, ex pediculis longiusculis: Ramorum extrema ex toto ferè spicati flores occupant magni, Galeopsis, colore aliàs rubro, aliàs albo præditi, subhirsuti, in vnam ferè partem vergentes, ex breui villosa calyce: foliis subiectis

Descriptio



SCORDIVM. CAP. LXXI.

parvis, latiusculis, subrotundis, acuminatis, lanuginosis, & obscure rubentibus.

Gener Cher-
lerus attulit le-
ctam in horto
Patauino Scu-
tellariz Cortusi
nomine, mense
Majo floren-
tem.

minerit Scordii, Plinius tamen lib. 25. cap. 6. duplex assignat his verbis. Ipsi Mithridati Crateuas adscripsit vnam Mithridation vocatam. Alteram [Mithridatium] Lencius Scordotim siue Scordion, ipsius manu adscriptam magnitudine cubitali, quadrangulo caule, ramosam, Quercus similitudine, foliis lanuginosis. Est & alterius generis, latioribus foliis, Mentastro similis, plurimosque vtraque ad vsus per se, & inter alia, in antidotis

Anguill. cp. 12. sequutus Plinium Scordium duplex quoque commemorat. Commune, inquit, hodie per totam Italiam optimè notum. Secundum reperitur, iuxta ripas Pescare fluidi in Abruzzo, cum foliis latis, similibus Melissæ, aut Calamenti primæ speciei: idem videtur etiam in Candia, & per Græciam & aliis locis: non est dissimile à primo, odore & qualitate.

Scordium, quod in Creta Italia, & Gallia nascitur, eandem cum Germanico figuram habere perhibet Cordus, ac in Norico solo luxuriare, cui assentitur Tragus: unde nemini obscurum post hac esse debet, Scordium æque in Germania nasci, atque Cretensisibus in Creta, aut Gallis & Italia, in Galia Italiae.

Scordium, quod penè perierat superiori seculo, primò in Academiæ Pharmacopœisq; Mospeliacis innotuit opè Episcopi Guilielmi Pelisserii, qui, dum cum Rondeletio in herbis & amœnis maritinis Mospeliaci, anuni causa spatia retur, inibique Allium subodoraret, illic herbam vixdum acceptam, & eminus conspectam Scordium esse vnâ deprehenderunt, indeiq; variis plantis in Galliam & Italiam missis, verum esse Scordium monuerunt, id annotante Lobelio, qui Scordio tribuit folia aspera, quæ diligens inspectio haud concedit.

Σαῖδον apud Græcos vocatur etiam σκῆδον, πινεῖς, δύσμορον, καλαμῖθι ἀγρία, χαμαιδρον, μελιδάκτις, αἶμα πόδους, & ἀρά.

Scordion autem Græcis ab Alliis dicta est herba hæc, quodd nimirum eius folia affricta, Allii (quod Græcis Scordion vocatur) odorem referant. Ab eodem mali & ingrati odoris sensu iisdem etiam *Sisyrinchium* appellata fuit. Vt verò palustris Trixago dicta sit, tum similitudo fecit, tum natalium locus. Trixagini enim [quæ Græcis Chamædrys dicitur] similis est, & in humentibus ac palustribus nascitur. Voluit Tragus allusione quadam ad latinam (Trixaginis palustris) appellationem n. lachen / & wasserfnobland / q. c. Allium palustre & aquaticum appellare : Fuchsius verò wasser Battenig oder Barthengel : Gallicè *Gerymandre d'eau*, quibus tamen & Scordion, & Chamæraz quoque dicitur : Ital. *Chalamandrina palustre* : Pulp. *Camedreus de arrys* : Angl. water: *Nierisch* : & Garleke mander, Lobelio auctore, qui ab omni memoria celebre fecisse Scordium, Allii retinere odorem, & alexiteriacum nomen, restatur.

Plantam, de qua præsens extat caput, è Recentioribus simpliciter Scordium plurimi dixerunt, ut Manardus, Corn. Carol. Steph. Cordus, Tragus, Lobel. Dodon. Anguill. Fuchs. Cæsalp. Camer. Tabern. Histor. Lugdun. pag. 910. quæ non tamen Marchioli cognominatur: Gesn. hort. Scordium verum: Casp. Bauh. phyt. Scordium 1. quod variare magnitudine affirmat, & inde maius, medium, & minus à Tabern. pinxi memorat. Fabr. Hild. Obs. Chir. 99.

Descriptio



geniculis *folia* exeunt aduersa, Chamædryos, sublonga, rugosa, serrata, tactu mollia, hirsuta, albicantia, odore Allii, sed remissiore & gratiore, sapore amaro: ex eorum alis ramuli etiam pronascuntur: *flores* indidem quoque undique per caulem, quaterni, Chamædryos floribus persimiles, colore rubentes, scutellatum labellum dimittentes, quatuor *anfis* superiore parte donatum galeæ loco, quæ hinc, ut Chamædryi, nulla, *staminula* prolixiunt purpurascencia; emicant autem flores ex folliculo in quinque mucrones partito, lanuginoso, pediculo breui, rubescente: delapsis floribus *semen* in vasculis reperitur minutum.

Nostra Fuciana icon non placet, nec etiam Matthioli in prior. comm. ideo in post. cum mag. fig. itemque Hist. germ. melius depingendū curauit.

Nunc Scordium folia habere similia Chamædryi, sed maiora, & non ita incisa per ambitum, Allium quodammodo odore referentia, in cauliculis quadrangulis, in quibus flos sit rubicundus, attestatus quoque est Dioscorides.

Licet autem Dioscorides, viuis tantum me-

*Sordium
duplex Ag
gnath.*

Scardinius
ab Episcopo
Monsperis
recessit.

Lebenslauf

**Nomina
ling.**

Synon:
Scordium.

Idem.

Scordium
Diase.

Scordii speciem primam, & Scordium verum: quod non vbiq; & copiose reperiri posse putat.

Aequiuoca. Scordii tandem nomine aliz quoque donatae sunt plantae. Scorodotis siue Scordium folio Saluiz. Scorodotis tomentosa Cretica: Stachys Fuchsiana. Gallitrichum. Alliaria. Allium vrsinum. Personata.

Substituta. Quidam (vt ab Aequiuocis ad Substituta fiat progressio) malè Allium silvestre pro Scordio usurparunt, cuius diuersa genera H.n.g.lib.19. de Alliis prosequuti sumus. Gesnerus scribit luā armensem, vt vocat, siue Botrym alteram sibi videri substitui posse, paullo minus efficacem. Fabr.Hildan. Obs. Chir. cent. 2. Obs. 93. Scordio vero subministrat Scordii 2. duplum: Obs. verò 94. Alliarium Veterum quorundam imitatione Scordio vero etiam substitui posse censet.

Locus. His ita absolutis reliquum est, vt natales perlustremus. Scordium nasci in montanis & palustribus locis nouit etiam Dioscorides: in Ponticis pinguibus humidisque Plinius. Nec inter se pugnat Dioscorides & Plinius, dum hic in campis humidis, pinguibisque, ille autem in montanis nasci scribit. Vterque enim verum dixit: in campestribus siquidem & montanis, non tamen omnibus, prouenit, sed [quod Dioscorides etiam adducit] humenibus tantum. Scordium olim à Mercatoribus è longissimis regionibus sumptibus magnis afferebatur, vnde quidam, quod vltimatum hoc nouissent, excellentissimi Doctores appellari voluerunt, licet nunquam eo in loco subolfecerint, aut collegerint. Et hos quidè, dum extera cōtemplantur, in fossam reprehensionis illapsos; Thaletis ancilla iure eam eos pari dixerit, quòd se patria, & iuxta pedes posita ignorent, & in longè distitis regionibus quærant. Annon in Germania nasci compertum est Scordium excellentius, nostrisque Germanis vilius, eiusdem specificæ formæ, cuius illud est Barbarū & extraneum. Scordium, inquit Cordus, in multis Germaniæ locis nascitur. Ego Scordium in comitatu Montbelgardeni obseruavi inter vrbe & pagum Souhauc ad fossas quasdam: inter Dalle & Audincourt locis paludosis florens mēse Augusto: in paludibus prope S. Mauritium, ad viam lapideam illiē stratam. Monspelii vidi in vicino prato florens Maio & Septembri. Circa Lugdunum abundè: Geneuz copiosè multis in locis au prè l'eueque, in pratis propè Arue florens Iulio. Fuchsio & Dodonæo Iunio & Iulio mensibus floret; sds tamen non nisi diem vnum durare videtur, sic continuò vnus aliū sequitur.

Plantatio. Plantatum autem Scordium non difficulter in hortis nascitur, & possunt de vno duntaxat ramo, siue surculo complures prouenire, modò solo humido & vmbroso committantur: semine quoque si seratur, celerrimè germinat. Trāslatum in hortos facili negotio perit.

Vires & Vitis. Viribus & vsu more nostro se monem hūc de Scordio absoluamus. Diosc. itaque auctore vim habet herba calefacientem, cientem vrinas, viridis [χαρπύ] trita, itēque arida cum vino decocta contra serpentum morsus & lethalia medicamentabibitur. Item ad stomachi roisionem (pro σπυγίς, legit Lacuna σπυγίς & σπυγίς σπυγίς) & dysenteriam, & vrinæ difficultatem, duarum drachmarum pondere cum aqua mulsā. Purgat & crassa purulenta è thorace. Facit ad tussim veterem, rupta, conuulsa, si arida cum Nasturtio, & melle, ac resina mixta, in eclegmate delingenda exhibeatur. Præcordia diu inflammata cerato excepta lenit. Facit & ad podagram cum acris a-

Tom. III.

ceto oblita, aut cum aqua imposita. Eadem apposita mentes mouet. Glutinat & vulnera, & vlcera vetera repurgat, & ad cicatricem perducit cum melle. Arida verò excrecentem carnem reprimat. Bibitur etiam succus ex ipsa expressus ad relatas affectiones. Efficacissimum autem est Scordium Ponticum [legit Lac. πυκνόν.] ac Creticum.

Ex Galeni sententia, ex variis tum saporibus, tum facultatibus constat, nam & amari quid obtinet, & acerbis, & actis. Maximè autem Scorodo, h.e. Allio, adsimilis eius est atrinonia: vnde sanè nomenclaturam sortitum est: Expurgat igitur simulque exalfacit viscera: tum mentes virinamque producat. Præterea conuulsa, ruptaque, & laterum dolores ab obstructione, & frigore natos sanat epotum: denique viride quidem illitum magna vulnera conglutinat: sed sordida purgat, & contumacia ad cicatricem perducit illitum aridum. Et hæc de simpli. med. facult. habet. Libro autem 11. de Antid. cap. 12. ait: Scordii quoque pulcherrimum Creta mittit. Quanquam in aliis regionibus etiam minimè contemnendū Scordium reperias. Literarum quippe monumētis traditū est, à quibusdam celebribus viris, cum in prælio interemptorum cadauera multos dies insepulta iacuisent, quæcunque supra Scordion forte fortunā ceciderant, multo minùs aliis computruisse, ea præsertim ex parte, quæ herbam attrigerant. Ob quam rem sanè persualum est omnibus, tam reptilium venenis, quàm noxiis medicaminibus, quæ corpus putrescere faciunt, Scordium aduersari. Plinius passim hæc de eo tradit: Contra venena omnia, magicæque artes Scordotis, ex vino priuatim ad angues pota & illita, siue succo, siue folio, siue decocto, &c. quæ habet Dioscorides.

Aegineta Galeni verbis conformia recitat. Matthiolus vermes necare scribit.

Scordium [inquit Camer. in Hotto] quamuis in locis humidioribus & palustribus frequentius inueniatur probatur tamen magis quod ex montanis locis irriguis defertur: quale est Pannonicum, quod odore caput ferit, & cæteris est acris. Commendatur quoque Creticum lanuginosum.

SCORDOTIS, SIVE SCORDIVM

folio Saluiz.

CAP. LXXII.



Radice nititur flexuosa, lignosa, & fibrata cirris, quæ auctore Cordo, inutilis & singulis annis perit, ex qua caules plures eriguntur, cubitales & tritricubitales, quadrati, hirsuti, purpurascētes vel nigricantes, maiores, medulla albā farcti: ad quorum

G 8



genicula folia
exerunt ex in-
teruallis gema-
na opposita,
Saluiz vel Be-
tonicæ, nisi a-
cutiora essent,
ad Vrticam
quodammodò
accedentia, ru-
gosa, atro-ui-
rentia, scabra,
squallidaque,
pilosa, per am-
bitum serrata,
sapore amaro:
summus caulis
in furculos a-
liquot diuidi-
tur, in quibus
spicatum dige-
runtur flores

in vnam partem vergentes, Chamædryos, sed
colore herbaceo, vel candido, pallido, ad Saluiz
flores accedentes, ex quorum rictu loco galeæ,
stamina emicant purpurascencia: semina calyculis
continentur fusca, Ocimi granis similia, ama-
ricantia; rotunda & fusca, tradente Lobelio;
plerumque ternis in singulis Florum calyculis,
Chamædryos seminum quantitate, Cordo. Hu-
ius odor nobis aromaticus, ac Allium aliquate-
tenus olens.

Hæc Scorodotis est illa stirps, quam Ruell. l. 3.
cap. 31. Polemonion & Polemoniam, à certamine
regum inuentionis appellari refert; ab aliis ve-
rò Philetarion & Philetariam; à Cappadoci-
bus autem à multitudine villicatum, Chiliody-
namin. Non defuisse porro dicit, qui eam esse
crediderint, quam omnes gallicè cum suis her-
bariis pro ambrosia demonstrant, licet perpe-
ram: rura Boscaluiam, i.e. nemorensem Sal-
uiam appellare.

Ambrosiam habent officinæ & Herbarii, om-
nino à Dioscoride diuersam; quam Germani
wild Saluiz, i.e. Saluiam siluestrem appellant,
inquit Cordus in Diosc. qui in Hist. Scorodoniz
siluestris titulo eam describit. Ei Gesnerus ad-
didit figuram, quam Scorodoniam inscribit, ac
Scordium montanum Odi esse concludit.

Hanc, quam Germanos ait wild Saluiz i.e.
Saluiam siluestrem nuncupare, Scorodoniz sil-
uestris titulo describit Cordus; Scorodoniam
verò vocat Gesn. Errorem autem autem non par-
uum comittit Tragus, Scordium hoc Nepitum
existimans. Quare vires etiam ab ipso apposi-
tæ, merito suspectæ esse debent.

Apollin. nomine wild Salbey & Alpenfraut/
vires huius perstringit, sed figuram malè exhibet.
Lonic. stirpium petitis duplicem exhibet fi-
guram lib. 5. Et primam quidem cap. 100. Alteram
114. his nominibus wild Salbey, Alpenfraut &
Bulchfraut, qui adscribit flores ceruleos, ac
Sphacelum Theophrasti esse posse concedit. At
postremo hoc loco ineptam habet figuram, quæ
fortè confundit Gallitrichum siluestre cum Scor-
dio nostro, folio Saluiz.

Gesnerus autem Ambrosiam hanc officina-
rum, Stachyn esse pronuntians, quod pace eius
dixerim, à vero non parum declinat. Nimis
securè Lobel. in Adu. p. 10. Obs. p. 262. Icon. Plant.
p. 497. Scordium alterum Plinii pronuntiat,
officinarum Saluiam hanc agrestem, & Saluiam

bosci, Belgarum wilde Sauie, Angl. wood sage.
Sed & Camer. hort. Scordium secundum Plinium
facit, eadem quæ Lobelius temeritate.

Thalies, qui Scorodoniam & Scordium mon-
tanum Cordi vocat, notat apud Cordum pro hac
stirpe falso poni iconem Vrticæ Heracleæ Tragi,
sicuti & in adiecto ibi scholio errorem admissum
esse ait, in nomine Odi, quod & aliàs aliquoties
in Cordi de stirpium historia libris factum dicit.
Nam pro Odo, vult semper Cordum esse legen-
dum: Scholia autem illa subiuncta, quæ præfixa
stellula notantur, Emilii esse, ab ipso subscripta
in autographo, qui quoties Cordi nomen scri-
beret, veluti priores tres literas abbreviaturus,
cordis humani effigiem pinxerit. Quod cum i-
gnoraret ille qui autographum in exemplum
prælo typographico committendum describeret,
accidisse ut perperâ Odû legerit, transcripseritq.

Honor. Bellus Scorodoniam hanc ut notham &
spuriam reiecit, ut quæ Allii non spiraret odorem,
nec viribus à Plinio attributis respondeat: quæ
duo argumenta non mihi satisfaciunt. Scorodo-
tis siquidem nostra, non solum nobis, sed etiam
aliis, ut Hild. Cordo, Lobel, & Camerario, Allii
olet: ac viribus præferendâ Scordio putatur Gesn.

H. Lugd. p. 380. Saluiam agrestem, & Sphace-
um Dodon. vocat. Tab. lc. & H. Saluiam siluestre.
Compilatores autem nesciuisse quid scriberet,
satis indicant subiectæ vires, quas dicit minores,
quàm in Saluia hortensi.

C.B. phyt. Saluiam 7. siue siluestre, vocat quæ ali-
quândo foliis Meissæ instar amplis reperiri narrat.
Mihi autè nunquâ visa Scorodonis folio Melissæ:
huic enim sunt subrotunda nō Saluiz modo longa.

Nasci refert Cordus editis incultis inter ar-
busta, & syluis (Germaniæ & Angliæ frequens
Lob.) lucidioribus: solum amare aliquatenus a-
renosum, vel alioquin asperum, non tamè omni-
nò siccum: prouenire iuxta sepes & agrorū mar-
gines addit Dodonæus. Ego Monspelii obseruavi
florens Octobri in montibus circa Esperoni Lug-
duni au bois de la bonne Alemende proueniens Mar-
tio: Genevæ in horto vires Januario.

Gesneri iudicio ad remedia Scordio præfere-
nda fuerit Scorodoniam folio Saluiz. Fabr. Hildanus
hanc miris laudibus in vlcerebus gangrenosis
celebrauit, & duplicatâ dosi Scordio subicitur.

SCORODOTIS TOMENTOSA CRETICA.

CAP. LXXII.



A Fratre Cas-
paro ad nos
missa planta hæc
pro Scorodoniam
Creticam, quæ pul-
chre exprimitur
supremâ parte O-
tymastri Valeriani
Clusii, cuius figu-
ram exhibemus.

Pona in Baldo
vocat Scorodoniam
legitimam Plinii
Bellii, qui, ne præ-
ter ratione, negat
Stachym vel Gal-
litrichum esse.

C.B. phyt. Sta-
chidem 4. siue
Creticam.

Viros & facultates huic eadem quæ Scordio,
teste Plinio, de quibus antè.

VINO.

VINOSA HERBA, SIVE VINACEA RUTA, Gallis rusticis pueris Minone dicta.

CAP. LXXIV.

Ambrosia inuenitur apud nos (inquit Ruell. lib. 3. cap. 61.) copiosa inter exiles & madidas segetes, quâ messorum se coronant, ut insolata diu capita iucundo & vinoso simul odore recreent, & ut frondosa comâ sese vindicent ab æstu. Pueris rusticis optimè cognita, qui vertices racemosos lanugine molli per initia vestitos, Minones vocent: Vinosa herba rusticis dicitur. Audio à quibusdam vinaceam Rutam, quod folio Rutam, & odore vinum imiteretur, nominari. Dodrantali verò surgit frutice ramoso, foliis rutaceis, circa unum caulem minoribus. Cauliculi seminibus racematim collectis grauidi, nunquam florem pariunt, sicut in vertice racemoso, & odore vinoso, radice tenui nec sesquipalmo longiore. Superior [Scordium alterum] longâ radice nititur, hæc breui: illa floret, hæc minime: illa ramis riget, hæc invalida sese, ut fertur, adminiculis quibuscunque inuoluit: hæc vinum, illa herbaceum virus olet.

A Scordio
altero quod
differat.

CHAMÆPITYS VULGARIS ODORATA
flore luteo.

CAP. LXXV.

Chamæpitys plantula est palmaris, nonnunquam vix vnam, aut duas uncias alta, radiculâ latis longâ, simplici & dura: coliculus teres, hirsutus propter terram rubescens, ceterâ ex herbido in luteum vergens, quemadmodum & folia, quæ ex breuibus interuallis ad nodos gemina, opposita nascuntur, hirsuta, auiculæ digitatos pedes, siue tridentem, imitata, sapore & odore picis aut resinæ: ex quorum alis flores emergunt luteoli, labello latiore biâdo, superiore parte pûctulis rubris guttato: galeæ verò vice flamma promunt dilucè purpurascens: succedunt capitula in quatuor toculos turgentia, totidem semina triquetra continentia: duas ponimus hæc Fuchianas figuras, quæ vnius plantæ, sed neutra placet.

Chamæpitys vulgaris ineptam iconem exhibet Ryffius in Dioscor. lib. 3. cap. 105. Polii titulo. Matthiol. in prior. comm. ponit solam figuram,

sine vlla descriptione, quali plantam non viderit, nisi pictam, nec valdè affabrè. Sed & Fuchl. contentus malâ figurâ suâ, quam ex eo proponimus, nihil addit in Histor. præter Diosc. verba, quasi ei planta ipsa nûquâ visa. Lonic. lib. 5. c. 13. Chamæpityos alterius inscriptione imaginem habet Fu-



Tom. III.



chianâ non meliorè. Cap. 187. vocat Feld Cypress: ta n-dem c14. verâ Chamædryn formam, vbi descriptio est Botryos alterius, & figura appositâ pro Chamæpityi prima, quæ nō conuenit: sic solet stirpium ignarus omnia confundere.

Ceterum, Chamæpitys, Chamæpityos, quam referent Dioscor. in Ponto Holo-cyron vocant, Athenis Ioniâ,

in Eubœa Siderizin, herba est per terram serpens subincurua. Folia habet similia Semperuiuo paruo, sed multò tenuiora, & pinguiora & hirsuta, circum ramos frequentia, odorem Pini habentia: flores tenues, melinos aut albos: radicem velut Cichorium. Est & altera Chamæpitys, ramos habens cubitales, in anchoræ speciem incuruatos, tenui sarmento: comam autem prædictæ similem: florem album, semen nigrum: redolens ipsa Pinum. Et tertia quædam est quæ mas appellatur, herba exigua, foliola habens tenuia, alba, hirsuta: caulem asperum, album: flores melinos: semen iuxta alas: redolet & hæc Pinum.

Chamæpitys latinè Abiga (aliis Aiuga) appellatur, si Plinio credimus, diciturque propter abortus: ab aliis Thus terræ, cubitalibus ramis, flore Pinus & odore. Altera breuior, & incurua similis. Tertia eodem odore, & idè nomine quoque, paruo cauliculo, crassitudine digitali, foliis scabris, exilibus, albis, in petris nascens.

Plinio Abi-
ga dicitur.

Tragus pauld meliorem nostrâ habet figuram pro Chamæpity tertia, die tritè feld Cypress quâ exiguam ait, Seplasarilque luam appellant, asserentes ad proprium genus referendum, quod & ipse dat, ac propterea Chamæpityn vocat, lib. 1. cap. 25. Eius autem appellationes præcedenti capite 24. has enumerat. Dioscorides, ait, Chamæpytin, Cupressinam, Bryoniam siluestrem, Pityforsin, Crizelon, & Olocyron, Ioniâ, Sideritin, Docheiam, Sanguinem Palladis, Aingam, seu Abigam appellat: Apuleius cap. 25. Orozelô, Holocryton, Bryon agtion, Hæma Athenas, Abigam, Rapam, Cypressum nigram, Spiculum, Mammalem, Nemenepa. Anthyllida alii putant. Anguillara epist. 5. Peristereon Crateuz, luam, i.e. Chamæpityn vulgarem esse credit. Gatinaria cap. de paralyti, luam vocat, atque dici à Sim. Ianuensi speciem Chamæpityos, & vocari à Mesue Ziniâ, ita exponentibus Nicolao & Antonio Guainerio.

Appellatio-
nes herbarum

Anthylli:

Ziniâ

Præter Chamæpityn hanc, vulgè luam vocatam, Celsalpinus alteram quoque tradit, maiore appellatam, peregrinam apud Pisanos, ramosam: foliis & floribus rarioribus: in ceteris similè prædictæ: Huic descriptionem Chamæpityos 1. Dioscoridis conuenire ait, at flore candido non

alium esse visam. Tertiam verò siue marem optimè lux vulgari quadrare. At incertum esse quæ ostendi possit pro secunda.

Synonyma Chamæpitys prima dicitur Matthiolo, Dod. & Cordo in Hist. Chamæpitys vera in Diosc. Aiuga siue Chamæpitys mas Dioscoridis Lobel. in Adu. Obsp. 207. & Ic. Plant. p. 382. Chamæpitys tertia Trago. Vulgaris Aiuga, siue Chamæpitys flore luteo, Clusio. Chamæpitys maior Tabern. Chamæpitys 3. siue foliis in tres partes fissis, C.B. phyt. Chamæpitys 1. apud Matth. Aiuga Castori. Fuchsius pingit Chamæpityn 1. & 3. omittitque secundam.

Nomina linguarum *Xanthoxylum* Græcè, Chamæpitys Latine: item Iua, Iua arctica & moscata, Aiuga, Abiga, & Ibiga, quod nomen Hermolao teste ferè seruant Illyrici. Hinc abiectis duabus literis i. & gi lba: & ab Aiuga abiectioe literarum a & g. Iua manauit in vulgi nomenclationem. Chamæpitys autem dicta est, quasi humilis & brevis humique depressa Picea: nam eius folia Piceam (Pinum ali) olent, inquit Fuchsius. Mauritanis dicitur Humefichicos, seu Chamelichius: Germ. Erdpin, Erdpfel / Schlagfraulein, & quibusdam Zengler te lieber: Trago feld Cypressen: Belg. Delt Cypress/hee langhet hee lieuer. Gall. *Tue muscate*, & *Arbétique*. It. *Camopitis* & *Iua*. Hisp. *Pinilba*, *Iua arctica*: Boh. *ywa*.

Locus & Tempus Chamæpityn vulgarem odoratam flore luteo obseruavi Monspelii florentem Martio, & in pòte Maio; Lugduni copiose Septembri & Octobri, Geneuz Nouembri, Aprili, Maio & Iunio, variis in locis, vt circa pontem *Arue*, & iuxta Rhodanum versus *la Basse*: Basileæ quæ itur Dornacum, & prope Haltingen Augusto. Totâ Austria, adeoque Pannonia, frequentissimam collegit Clusius in agris & gramineis campis.

Vires & Vius. Folia primæ Chamæpityos, teste Dioscoride, & septem diebus in vino pota, regio morbo medentur: & quadraginta diebus ex hydromelite, Ischiadicis sanant: dantur peculiariter vrinæ difficultatibus, iocinoris & renum vitiis: torminosis profunt: & apud Heracleam Ponticam, perinde atque antidoto contra Aconitum vtuntur, bibentes decoctum: ad antè dicta illinitur, cum polenta iure decocti subacta: trita in farinam & cum sicibus in pilulis sumpta aluum ex cepta melle cum æris squamma & resina purgat: apposita ex melle, vuluæ vitia extrahit: mamma-rû durities discutit: vulnera glutinat: vlcera quæ serpunt, cum melle illita cohibet: Secunda & tertia vim habent prædictæ similem, non tamen ita efficacem. *Galenus*, saporem habet amarum validiorem quàm acrem, effectu verò expurgat abstergitque viscera plusquam calfacit: proinde auriginosis, & omnino quibus faciliè iecur obstruitur, bonum est remedium, quin & menses ducit, tum pota, tum apposita cum melle: sed & vrinæ mouendæ medicamen est: sunt autem etiam qui eam exhibent decoctam in melicrato iis qui coxendicis doloribus torquentur: herba porro ipsa viridis vulnera magna conglutinat, & vlcera putrescentia sanat: præterea vberum durities discutit: est enim in siccando ordinis tertii, in calefaciendo verò secundi. Quibus addit *Matthiæus*, omnibus frigidis cerebri, neruorum & artuum morbis conducere, cuiusmodi sunt apoplexia, epilepsia, arthritidis, si herba puluis cum oximelite bibatur.

CHAMÆPITYS SIVE IVA MOSCHATA

Monspelienisium.

CAP. LXXVI.



Descriptio Compleures ab radice crassiuscula longa fundit caules lignosos, palmares aut dodrantaes, hirsutos: per quos folia crebra villosa albicantia, duas tresue uncias circiter longa, vix semunciam lata, quæ cauli hærent angustiora, vnâ aut altera circa medium apophysi Coronopi instar, donata, aliquando circum circa

integra, sibi que similia, vnico neruo per longum decurrente: flores satis magni, purpurascetes, hirsuti, patulo rictu hiant: semen nigrum, crispum, sublongum, vermiculi instar aliquantulum incurvum, in capitulis rotundis lanuginosis. Tota planta odorata est & non nihil amara.

Synon. An est Dioscorid. lib. 3. & Plin. lib. 26. cap. 8. Anthyllis altera? Lum. maiori in pil. arthet. Arctica? Castori & Clusio dicitur *Abiga* in *Arta*: lat. Anthyllis altera: Lusit. *Herna crina*: Monspellianis yua moschata, Gesn. hort. Chamæpityos alia species Monspelio allata. C. Bauh. phyt. Chamæpitys 1. siue Monspelica foliis serratis, 3. apud Matth. vbi Chamæpityn alteram & maiorem Cæsalpini esse statuit. An verò Cæsalpinus per maiorem & 2. hanc nostram Monspelicam intelligat, ambiguum admodum est: folia siquidem Monspelica non tripartita habet, aut similia Chamæpity vulgari: flores etiam non luteos.

Locus & Tempus Iuam porro moschatam Monspelii vago hoc nomine vocatam (pluribus enim plantis id competit) prouenire in montibus prope Castelnou locis valde petrosis, florentem mense Septembri obseruavi. In Oliuetis & aridis aruorum marginibus Norbonæ ac Galloprovinciæ fruticat, inquit Lobel. nec alibi temerè nota. Moschata hæc vulgo vocata, contrariè fragrantie significatu (ironicè nempe) est enim odora, sed olfactu minimè grata, nec Pinum redolente, verè & odoratæ Chamæpitydi cognata, vnde proximus illi locus datus est. Nasci leto solo ad Tagum flumen in Lusitania, Granatensi etiam regno, & Gallia Narbonensi dixit Clusius: florere autem Estate & Autumno, Granatensi tamen agro maturids.

Anthyllis altera si sit hæc, bibitur, teste Plinio, in duritia vuluarum, & in torminibus, in comitiali similiter morbo, cum melle & aceto, quatuor drachmis. Lusitani & Granatenses Clusio referebant, eius decoctum ad repurgandum sanguinem impurum propinari.

CHA-

CHAMÆPITYS ORIENTALIS.
CAP. LXXVII.

Descriptio
Pluscus foliis palmatis, crassis, quadratis, tomento multo candido obsitis fruticat: foliis ad nodos confertis, vncialibus




circiter, luteo-molchate Möspeliensium, lanuginosis, crassiss, per extrema denticulatis, gustu amaris: ex quorum alis ab imis ramis ad fastigium usque vascula erumpunt hirsuta in quatuor catinas dehiscencia.

Preteriere triginta anni, ex quo hanc plantam pro Chamæpity Orientali habeo, unde non recordor.

CHAMÆPITYS FOLIO NON
laciniato.
CAP. LXXVIII.

Descriptio



Radice fibrosa Sôchi, aut Dentis leonis minore: ramulos profert palmum altos, humi stratos, & foliis septos. Semperuiui minoris, aut potius Vermicularis, minus carnosus, sed incanis & hirsutus: in quibus sterculi ex melino albi di: suauis odorem, interdum viginosum, vti vinea, muscul-

tie quernus, aut cedrinus. Minus nota & paucis locis obuia, magis tamen odora, collibus aridis & aruis editionibus Nicæ Sabaudæ, & Genue Ligusticæ, circum urbem Penem in Italia fruticat, vt quidam affirmant. Quin etiam eandem vireta nonnulla Belgii sedulo colunt, inquit Lobelius in Aduers. vbi sicuti etiam in Icon. Plant. p. 383. Chamæpity primam Dioscoridis odoratorem inscribit: Pinum redolentem in Obs. pag. 208. itémque alteram Matthioli, & tertiam Dod. luteolis floribus. Figura autem à Lobelio proposita pingitur sine pilis, quæ apud Dodon. ex Fuchio cum pilis.

Chamæpitys 1. dicitur Fuchio: Germanicè

ye lenger ye lieber weible/ quam etiam in Icon. pingit, sed si nota fuit, cur solam recitat descriptionem Dioscoridis; nihil addens de suo, nec locum vbi viderit: cur etiam nomen adscribit Germanicum quod Amarè dulci potius competit, vt rectè notat Ryfius.

Dodon. gall. pro Chamæpity tertia: que muscæ assumptæ figuram Fuchii: Lat. in preb. fol. autem eam habet quam Lobel. de ea ita scribens, vt existimem ab eo nunquam fuisse gustatam, nec etiam visam.

Ryfius in Dioscor. lib. 3. cap. vltimo, vt stirpium ignarus ponit figuram Fuchsianæ similem, quam non describit, nec vbi viderit annot.

Chamæpitys 1. Loniceri lib. 5. cap. 187. signa est qualis à Fuchio proposita, sed descriptio longè diuersa, nempe eius quam Botrym alteram vocamus.

Matthiol. in Diosco. Chamæpity alteram & postremam vocat, non ad eam omnib. notam, quam sæpius se vidisse refert: mediam autem hæcenus sibi quidem aspicere non licuisse. Eadem repetit in comm. cum mag. fig. Lat. & Ital. vocans Chamæpity tertiã: Et hanc in Hist. germ. ornauit. Figuram autem quam in prior. comm. ponit Matthiolus, est sine pilis, quam in postremis non nihil immutat: dicit mediam quæ secunda, sibi non visam, & tamen ponit figuram sine quidem descriptione. Postremam quæ tertia, quam ait sibi sæpius visam, nobis inuider, nec describit, nec depingit, nec locum vbi reperiri possit, assignat.

Si eius figura secundo loco posita, est tertia, cur in post. comm. non indicat suum vel typographi errorem in præcedentibus.

De Chamæpity folio non laciniato hæc Casp. Bauhin. in phyt. Chamæpitys 1. siue foliis non incisis: Auga siue Chamæpitys altera Matthiol. icon. 4. p. 612. (in Ital. 3. & Dod. 1. Fuch. & Lobel. addit apud Matthiol.) Alii foliis hirsutis, alii glabris pingunt: (quare nostra vtrumque exprimit, inquit aut Matthiol.) nondum vidi: non desunt qui existimant Echium scorpioides hæc exprimi: alii Chamæpitydem verniculatam: nisi sit Anthylloides Thalii, quid sit ignoro. hæc frater, in cuius figura, quam Matthiolo apposuit, nihil hirsuti obseruo, & ob id nullam demonstrat differenciam. In Anthylloides Thalii descriptione, quæ est in Hærcinia, nihil quoque inuenio, quod cõtineat cum Chamæpity Lobelii 1. quinimò suspicor, Anthylloidem Thalii; longè diuersam plantam, nempe Spergulam.

BOTRYS VETERIBYS.

CAP. LXXIX.

Botrys à Dioscoride herba esse dicitur tota lutea, fruticosa, diffusa, multas habens alas: semina circa totos ramulos nasci: folia Cichorio similia esse: & tota multum odorata. Quare etiam vestibus interponi. Nasci maximè circa fossas, & torrentes. Vim habere cum vino potam, erectæ ceruicis spirationis leniendi. Et hanc Ambrosiam Cappadocæ vocare: quosdam verò Artemisiam.

Botrys à Plinio lib. 27. cap. 8. ita describitur vt ex Dioscoridè transcripisse videatur: Galenus Botryn præterit. Paulus verò ex Dioscoridè eam commemorat.

Ceterum, officinis ignota est Botrys, sed plerique Botanici agnoscunt, ipsamque ad Græcæ Gg;

Lob. not.

Fuch. hab. vinctur.

Dodon. vi. preb.

Ryfius tra- natur.

Loniceri not.

Cham. altera Matthiol.

Matth. tra- natur.

C. Bauhin. not.

Ex Plinio.

vocis imitationem Botrym herbam appellant. Gale etiam vel Gagel : Amomum : Artemisiam & Ambrosiam Botryn vocari testes sunt Ruellius, Fuchsius, Plinius & Dioscorides.

BOTRYS PLERISQVE BOTANICIS.

CAP. LXXX.

Descriptio **R**adix ex albo subrubra est, lignosa : caulis dodrante altior, hirsutus, multis alis concavus : folia Senecionis, latiora, quercinorum æmulâ diuisurâ, colore viridi, in luteam languente, odoris grati & vegeti, subhirsuta : flosculi vndique numerosissimi, ex foliorum alis, in ramulorû summitatibus & lateribus, primulûm erumpentes, Vitiûm botros æmulantes, qui expansi ex minutissimis fibris ochreis compositi conspiciuntur.

Synon. cñ nominibus linguarum

Græci *Σίτρον* appellant. Latini (vt Trag. Cord. Fuchf. Dod. Gesn. hort. Lonic. Lobel. in Adu. Obs. p. 115. Ic. Plant. p. 228. Matth. Anguill. & alii,) eadem appellatione vtuntur : C. Bauh. phyt. (qui Plinium Botrym cum Artemisia confundere perhibet) Botrym sive ambrosioidem vocat. Hort. Lusit. Chamædrin feminam & Chamæpitym ; Dodonæi. Germani Traubenfraut / h. e. Herbam botri, Frottenfraut / i. e. Bufonum herbam, Turcischē Beyfuw / h. e. Artemisiam Turcicam, Gernand / & Mottenfamen : Belgæ Punene / & druynenfruyt : Galli Pymen, & Piment, quidam alii Millegrais ; nonnulli etiam de la Passen. cñt. Botry, & l'isne, vt Cremonenses : Hisp. Bien granada : Angli Ofe of Hierusalem.

Locus

Botrys Montbelgardi lata in horto Ill. E. C. facile prouenit, & quotannis semine deciduo se propagat. Circa Genenam spontaneam offendi, item Monspelii prope Gangen aliquot miliaribus ab vbe. In Oliuetis Nemausensibus, cæterisque tepidioribus & apricis aruis agri Narbonensis, & Nitiobrigum sponte fruticat. In Flandria, Anglia, & Germania, quod Fuchsius equidem sciat, non nisi lata crescit. Augusto & Septembri ad maturitatem peruenire consuevit.

Vires & vsus

Quæ veteres de Botryos viribus & vsu memoriarum prodiderunt, antea ascripsimus. Existimat autem Tragus herbam in puluerem redactam elegmari admisceri, & ita ad orthopnoeam vsurpari posse. Matth. Botryos herba in puluerem redacta, melleque in electuarii formam excepta, præstat contra pulmonum vomicas, quo remedio multos ego curavi, qui pus serebant. Non parui momenti est remedium contra vteri dolores, si super candentem laterem Botrys calefiat, asperso vino generoso, aut Cretico, atque ita calida hypogastrio inducatur: Multi tandem aduersus blattas commendant, ideoque in hortis magnâ curâ seminant, reponendâ inter vestes suspirantur eiusdem herbæ vapore vtiliter semina ad menses ciendos & emortuos sætus eiciendos.

BOTRYS VERTICILLATA.

CAP. LXXXI.

Toto vultu hilarior est Botry sativa, sed staturâ contractiore, palmari, ramis qua-



Descriptio dratis, hirsutis: in quibus folia Botryos, sed lanuginosa, saturatiusque virentia ex geniculis ramorum orta, odore suauis, sapore amaro: flores, indidem verticillatim emicant purpurascences, labelium productius unitati, intortis eiusdem coloris staminum cinctis comitati, ex calycibus interna parte

turgidulis, supernâ angustioribus, in quorum singulis semina latent quaternis nigricantia: radix lignosa, gracilis, paucis fibris donata.

Clusian Pannon. & Hist. post. vocat Chamæpityn tertiam multifidis foliis & rubescence flore, multis Pannoniæ locis incolam: Item tertiam (sc. Chamæpityn) Fuchsius & Dodonæo, quorum nomine apud eos eam nondum inuenio. Chamædrin feminam vocat Lonicerus: Chamædrin alteram Matthioli: Chamædrin feminam & Chamædrios speciem Camerar. hort. Chamædrin feminam Dodonæi Historia Lugd. Chamædrin minimam Lobel. in obseru. & icon. plant. Chamædrin laciniatis foliis: Chamæpityn alteram Aduers. tertiam Dodonæi, in quo Lobelius titubat: est enim ipsi Chamæpitys secunda.

Libel. par.

C. Bauh. in Phyt. & apud Matth. Botrys sive Chamædryoides. Ambrosia Platero: Heraclea Cordo: Chamæcyparissus agrestis Trago: Sideritis Turnero: Rytio verò plures plantas simul confundenti Chamæpitys semina & Polium montanum dicitur.

Botrys altera passim Montbelgardi prouenit inter segetes: in horto Ill. E. C. faciam habui, virentem Nouembri; Genevæ in aruis obseruavi: & in horto adhuc virentem Ianuario: Monspelii circa montem Esperon. Floret mense Octobri in agris Basileæ. Nasci tradit Cordus in vineis & earum muris, caluisque apricis, & editis locis, nonnunquam etiam in aruis: ac solum amare pingue, calcario lapidi mixtum, cui & nos subscribimus.

Locus & Tempus

Quia verò saporem habet amarum, odorem etiam acrem & grauem, veluti si quis vinum & Lupulum commisceat, teste Cordo: idem non abs re ordine secundo calidam & siccam eam quis statuerit. Facultatibus hanc cognationem habere cum Chamædryi auctor est Matthioli. Cum aded amara non sit, inquit, vt Chamædrys, ea quidem minùs calida, siccaque fuerit, itaque ad omnia munia imbecillior, non tamen multò.

ÆGIPYRVS, VEL ÆGYPTIRVS

Veteribus.

CAP. LXXXII.

Agypti nominis authorem Theophrastum agnoscimus, lib. 2. Hist. c. 9. Plant. dicentem:

ἡ δὲ ἰσχυρὴ ἐν τῇ πόλει, ὅπου αἰγίπυρος ἔσται. i.e. nostra quidem interpretatione, Aiunt verò caprificare Polium quando Aegipyrus multus fuerit. Gaza sic reddit: Quin & Polium culices reddit, cum copiose fruticat. Scaliger contra Theod. apud Theophrastum αἰγίπυρος Polii fructum esse contendit.

Hanc plantam Anguill. epist. 8. existimat eam esse, quam Ononidem & Restam bouis vocamus.

Polium. αἰγίπυρος Theophrasti, Scaligero est fructus Polii, quæ opinio præ cæteris, quæ sequuntur, nobis arridet. Anguillare verò, Rob. Constantino & Dodonzo est Ononis. Gesnerus propter florem purpureum Glauci Dioscoridis conuenire credidit: ac malè αἰγίπυρος pro αἰγίπυρος apud Hesychium legi docet, Grammaticis plantarum imperitis diuerſas confundentibus.

POLIVM ANTIQVIS.

CAP. LXXXIII.

Theophr. Theophrast. Polio tribuit folia carnosâ: quia pulpa continent, perpetuè virentia: valere contra vermiculos noxios vestimentis interpositum; culices gignere, cum copiose fruticat: ad omnem rem terram, & magnificandam, & famam, effodi noctu tabernaculo instructo Hesiodo & Musæo auctoribus.

Diosc. duo Polii genera. Dioscorides duo Polii genera tradit: Montanum (ἡ ἐν τῇ πόλει) quod Teuthion (τὸ τεύθειον) dicitur, & cuius est vsus: tenuis frutex est, candidus, dodrantalis, semine reſertus, capitulo in cacumine quandam corymborum speciem præ se ferente, paruo, similis cano hominis capillo, grauitè olente, non sine quadam suauitate. Alterum magis fruticolum, non ita validi odoris, & viribus inefficacius: Decoctum horum potum comorſis à bestiis venenatis auxiliari potest. Hydropicis item & morbo regio. Splenicis autem cum aceto. Inducit & capitis dolorem, & stomacho incommodum est. Ducit quoque aluum & menses. Quin & substratum & luthum venenatas bestias fugat. Idem impositum vulnera glutinat.

Plinius. De Polio Plinius lib. 21. cap. 7. ita scribit. Ut Saliuncam vestibis interponi gratissimum, Si apud Græcos Polion herbam, inclytam Musæi & Hesiodi laudib', ad omnia vtilem prædicantiū, superque cætera ad famam etiam, ac dignitates, prorsusque miram, si modò vt tradunt, folia eius (hæc Plinius Polium cum Trifolio confundit) manè candida, meridie purpurea, Sole occidente ærulea aspiuntur. Duo genera eius, campestre maius, siluestre quod minus est, &c. quæ Dioscor. habet.

Galenus. Galenus Polium amarum esse dixit gustantibus, & modicè acre. Quare obstructione liberare viscera omnia vrinamque & menses ciere, ac cætera pluraque præstare quæ antè ex Diosc.

Nicander. Meminit Polii & Nicander in Ther. quod commendat ad accendos serpentes à grabato.

POLIVM MONSPESSVLANVM.

CAP. LXXXVI.

Folia ex certis interuallis multa eodem loci ex opposito nascuntur, angusta, oblonga, denti-

culata, candida, tomentosa, saporis acris, & amari, per ramos dodrantales aut palmares, firmos, rotundos, incanos, ex radice lignosa, paucis fibris donata: capitula glomerata, alba, tomentosa, calyculis constant oblongis, è quibus flores emicant hiantes, candidi. Huius virgulis intertexti solèr

Descriptio

Epithymo similis flamina.

Odor totius plantæ gratus etiam post triginta annos, nec incluse tamen. Culca minus incana & latiora quædam emittit folia.

An Polium secundum albo flore Clusio? An Ruellio lib. 3. c. 60. Polium montanum, Narbonensis Prouinciz?

De Polio eiusque speciebus Matthiolus hæc

inter alia memoriz mandauit. Sepaliari illi qui pro Polio herbam quandam vsurpant, quæ numerosos profert cauliculos, tenues, rectos, rotundos, semine vndique reſertos, errant. Vtrumque Polii genus, quod nulla reclamante nota legitimo respondeat, in pluribus Italiz locis prouenit. Primum vulgus herbariorum luam muschatam appellat, à quo secundum eligit non longè distat, quamuis non aded sit odoratum. Secundi generis Polium, cuius etiam picturam adieci, viret Venetiis in horto Maphæi. Et hanc in prior. comm. habet, quibus in post. cum mag. fig. sequentia addit. Polium montanum planta est candicans, foliis oblongis, per ambitum serratis caules habet copiosos, rectos, rotundos, lignososque albicantes, & qui in cacumine capitula edunt, florida, candicantia, Thymi figura. Tota planta odorata est, odore tamen acuto & subgravi. Est & alterum, quod Herbariorum quidam luam moschatam vocant. Id ego inter Polii genera recensendum volui, quod capitulis, foliis, caulibus, odore, facultatèque Polium referat &c. In Hist. germanicè setiam cum addit. Camer.] vocatur Berg polium, Polium montanum, Teuthion: Item, Feld polium, Polium campestre, wild Rosmarin. In Epit. cum addit. Camer. Polium: Item, Polium alterum, Herbariis nonnullis lua muschaca. Marienfraut / wild laundel. In comm. cum addit. Casp. Bauhin. Polium 1. Polium 2.

lua muscata.

Polium montanum


C. Bauh. apud Matthiol. Polium maritimum erectum, Matthiol. Polium 1. in maior. fig. in minoribus enim transpositæ sunt figure, & pro altero positum in littore Mediterranei maris, M. spessuli etiam cum Epipolio obseruatum. In phyt. Polium 3. siue maritimum erectum Monspelien. Matthiol. & Clusii primum. Clusius autem in Hisp. asserit Polium suum habere cauliculos humi sparsos: In Hist. autem post. imaginem exhibet, quæ non representat Polium Monspelienſe, quod fruticat, nec humi spargit ramos.

Pol. maritimum erectum C. B.

Epipolium

C. Bauhin. not.

Gesn. hort. Polium 1. siue montanum Dioscori.



dis vocat, & recentiorum quorundam Polium maius. In append. Polium Italicum.

Dod. gall. Polium, Pol. montanum Teuthrion (sic etiam vocat Tabern.) An Lat. in fol. quoad descriptionem Polium 1.

Locus & Tempus.

Lobelio in Ad. *Πόλιον ἰππεύς*, Polium maritimum montanum: Angl. poleye dicitur.

Polium 1. Monspelii apud mare prouenit copiosè, odoratius multò montano altero, quod depingitur apud Cordum, florens mense Maio & Augusto, acre valdè & amarum. Cultum multum degenerat, inidus candidum euadit, foliaque redduntur latiora, vt Geneuz in horto obseruati ex semine satum, virens Ianuario. In Belgio spontè non prouenit, sed in hortis magno labore cultum, Iulio verò floret. Locis maritimis & deucis collibus & arenosis litoribus obseruatum à Lobelio, cuiusmodi ad Ceti montis insulam & Magalonam Narbonensis Galiz.

Polis ramulosos pargatur.

De illo porro rei herbariæ studiosi obiter admonendi sunt, omnis generis Polii ramulos in terram vmbroso loco depactos, sine difficultate radices agere, modò ipsa terra bene subacta, & repurgata sit, vt in aliquot eius generibus Clusius periculum fecit.

POLIUM VENETVM.

CAP. LXXXV.

Descriptio



Polium è Lio Venetorum per fratrem C. Bauh. allatum, quod si conferatur cum eo, quod Monspelii prouenit, diuersum videtur. Tota namque planta minus candida, folia latiora, paulò, & plus crenata; coma etiam magis diuisa.

Polium Venetum (Monspelienis) multò minus Lobel. crescere meminit in insula Lio Venetæ ditionis & clientelæ, nec ita incanum: vocaturque Polium montanum purpureum.

Polium supinum (ita vocat apud Matthiolum) in litore Adriatici maris apud Venetos legit C. Bauhinus. Is in phyt. appellat Polium 1. siue maritimum supinum Venetum; Dodon. gall. Polium 1. Lobel. Polium montanum purpureum.

POLIUM CYPRIVM CANDIDVM.

CAP. LXXXVI.

Descriptio

Ignosum Polii Cyprii nomine raturum Lpalmo longiorem Fatruliæ rater, quod Monspellulano candidius totum, magis-

que tomentosum, odoris iucundi & fragrantis, sapore præditum est amaricante: folia perpusilla, per quorum margines crenæ vix tantillum apparent.

An Lobel. Aduers. Polium Creticum, Veneto magnitudine par: lanugine & habitu maritimo Monspeliano simile? An Polium minus Cordo, in Hist.

POLIUM CANDIDVM TENELLVM,

tomentosum, flore purpureo albo

CAP. LXXXVII.



Priorius tenellum est, exilibus ramis humi fulis, dodratalibus, multa lanugine candida tectis, qui subinde ad nodos radices agunt: folia illi sunt medix, inter primum & secundum (Polium Apenninum nostrum existimo, & Monspelienis) genus magnitudinis, breuiora tamen, denticulata,

Descriptio

valdeque tomentosa, quæ aded causa est vt in tenellis foliis nulla dentium vestigia conspiciantur, nisi à diligenter obseruantibus; capitella superioribus paulò minora, totaque tomentosa, in quibus flos purpureus.

Inter iam descriptum, describendumque nunc Polium, sola teneritas stirpis, & floris varietas discrimen facit, quod albis floribus est præditum. Vtrumque enim genus nihil ferè nisi tomentum sunt, & odoris suauitate reliqua genera superant. Vtrumque suis floribus onustum Martio reperiēbat descriptionis auctor Clusius; nec differentiam animaduertisset, nisi floris color, diligentius conferendi singulas plantas, ausam præbuisset.

Varietas flore albo.

Prius inscribit in Hist. post. Polium montanum quintum purpureo flore: In Hist. Polium 4. flore purpureo. Alterum in Hist. post. Polium 6. albo flore: In Hist. Polium 5. albo flore. Lob. in Icon. Plant. p. 487. itemque Obs. p. 257. Folium montanum purpureum: Polium repens supinum, *ἰππεύς* Clusii, & quintum flosculis albis. Dodon. lat. in fol. Polium repens, & Polium tertium, *ἰππεύς*. C. Bauh. phyt. Polium 5. siue maritimum supinum secundum. H. Lugd. p. 929. Polium 4. Clusii.

Synon.

Incolæ Murciani regni Chamapityn esse putabant, apud quos vulgare nomen erat *camarilla*. Murciano regno duntaxat inter Lorca & Velez el rubio in accliuatibus tumulorū arenoso solo obseruabat auctor, florens Martio. Icon quā proponimus desumpta est ex Clusio, quam nec pictor nec sculptor bene aduimbravit.

Locus & Tempus.

Polis

Polii appellationes notæ, Aquinoca & Substituta.

Polii appellationes notæ.

Ceterum, quod superius adnotadū erat, sunt qui Polium Teuthrion, qui Pheuxastidiō, qui Achamenida, qui Ebeniten, qui Melosinon, qui Belio, qui Leonthocaton vocent: Mauritanī Cahade, Iahade, seu Giade. Est autem Polio nomen à canitie canilue capillamentis, & tomento hirsuto, quæ non modò capitula corymbacea, vt ait Dioscorides, sed etiam vniuersam plantam incanam reddunt, perinde ac Gnaphalium.

Aquinoca

Præter autem hactenus recensita Polia (nam & æquiuocationes annotasse conueniat) Polii nomine sequentes donantur plantæ. Serpillū. Satureia. Pulegium ceruinum. Acinos. Impia Plinii. Stæchas citrina. Tripolium. Vinum album. Periclymenum. Guacaton herba. Chamæpitys.

Substituta

Polio in extractione vermium & prouocatione vtriq; & menstruorum, pondus æquale de Ligni Granati viridis, & duas tertias ponderis corticum lignorum Cassiæ lignæ supponit Tractatus qui pro quo. Fuchsius in Antiballom. pro Polio semen Erucae recipit: Alii Chamæpityos specie in Seplassis pro Polio vtuntur teste Fuchsio, qui id improbat, etiamsi odore atque sapore concurrant.

BETONICA VULGARIS PURPUREA.

CAP. LXXXVIII.

Descriptio



Betonica caulibus surgit numerosis, cubitalibus & altioribus, quadratis, ex longo intervallo nodosis: folia alia ad caulium genicula gemina, aduersa, alia humi sparsa, incondita, pediculis palmaribus circiter donata, per ambitum laciniata, rugosa, aspera, hirsuta, sapore aromatico prædita: flores spi-

cati verticillatim genicula circūstâr purpurascētes, galeâ reflexâ subrotundâ, labello trifido demisso, è medio rictu stamina flori concoloria exseruntur: semen, Trago, oblongum, angulosum, in spicis quibusdam Marrubii instar occultatum: radix pollicem crassa crebris longisque fibris capillata.

Cestrum Duple.

Cestron, inquit Dioscorides, quod Psychotrophon vocatur, quoniam in locis frigidissimis reperitur, & quod Romani Betonicam vocant, herba est caulem habens tenuem, cubiti altitudine, aut etiam maiorem, quadrangularem: folia longa, mollia, quernis [spui] similia, per ambitum hirsuta, odorata, ad radicem maiora. In summis caulibus semen est Thymbæ modo spicarum.

De Betonica Plinius ait. Verones in Hispania Tom. III.

inuenerunt eam, quæ Betonica dicitur in Gallia, in Italia autem Serratula, à Græcis Cestron aut Psychotrophon, ante cunctas laudatissimam. Exit anguloso caule cubitorum duorum à radice, spargens folia ferè Lapathi, serrata, semine (stamine, Ruell.) purpureo.

Serratula

Lapathi folio.

Galenus lib. 5. de sanitz tuenda, Betonicâ herbam à Celtis *oxyphagos* vocatam refert: Dioscorides autem omnino aliam Saxiphagon describit. Galenum tamen loco citato distinguere vult Cornarius inter Cestrum & Betonicam: & Cestrum quod apud Gallos nascitur, Saxifragam vocare, testemque adducit Actium, calculosis Betonicam adiucentem & Cestron, Saxiphragon dictum: sicut etiam Paulus duplicem facit Betonicam.

Saxiphragum Cestrum Gal.

Cestrum gallicum est Sani. fraga Corn.

Muli verò ancipites fuerunt in visuali hac Betonica, non esse eam existimantes quæ à Dioscoride describitur propterea quod folia non videantur illic in remane odorem, quem tamen inesse debere vult Dioscorides. Atque ex his multi suspicati sunt veram Betonicam esse plantam illam quæ quibusdam locis Mentha Romana, Neapoli Mentha francesca vulgò appellati solet: capiti solum ex odoris fragrantia. Sed huiusmodi odorem querunt, multas alias notas se amississe non considerant, ac præsertim flores, & radices, quæ nullo modo Dioscoridis descriptioni conueniant.

Betonica hanc vulgarem duorum generum obseruauit Clusius. Nulli inquit, in Pannonia, Austria, vicinisque prouinciis montes herbosi, nullæ siluæ, nullæ præta sunt, in quibus non abundantissimè proueniat Betonica vitata flore rubro, huc purpureo: quæ duorum generum est. Vna enim breuiorem florum spicam habet, & maturius floret. Altera autem longiore, molliore, & magis tuscâ est florum spica, illaque etiam ferius flores suos explicat: solet præterea hæc postrema in maiorem altitudinem excrecere, quam prior, licet eodem modo vtrique spontè nascatur, vel eodem puluino excolatur.

Betonica purpurea duple.

Betonica Græcis, vt Dioscor. & Galeno, *αίγειον* vocatur, à floris spicata & mucronata acutis, veruculum, seu, vt apud Plinium in vulgatis exemplaribus legitur, viriculum præferente, sic enim ille Cestrum interpretatur. Dicitur etiā *ψυχότροπον*, quoniam, vt dictum, frigidis in locis reperitur: itemque *βήρυξ*. Latinis Cestron Betonica, *Veronica* (Plinio auctore) ab inuentoribus Veronibus Hispania populis, & Serratula: Recentior tamen ætas aliam comprobat Serratulam, de qua suo dicemus loco. Antonio Mulsæ, referente Trago, Britannica, Prionites, Pyrenes, Adianthos, Thyariza, Seropodion, Pandiona, Hierobotane, Serrata, & Rusmarina. Arabibus, Herb. antiquo lo. Cubæ, nastaren vel Castaron, aut Chastara: Serapioni denique cap. 32. Rastata, Auetrhoi Alchison & veragnes. Manlio Lingua bubula; & Lingua equi appellatur. Germanis Berbonien & Berhomen / Berhoniens fraut & Berhonenfraut: itemque Betoniess.

Nemina Cestron.

Serratula.

Gallis *Berouine* & *Ber-sne*. Italis *Betonica* seu *Betonica*. Hisp. *Betonia*. Anglis *Betony* / & *Betonye*. Sclauonis *Serpar*. Anguill. *Suckwey* fegere seele. Hort. Lusit. *Sof* seu *h.c.* Hirci *Natba* Nomencl. Pannonico. *boh.* *Suckwey*.

Eam verò quæ purpurea est flore (conspicitur enim & albo, de qua mox) Germani propriè *Braun betonien* cognominant. Latine verò apud plerisque, vt & in officinis solum betoniq;

simplex nomē retinuit. Trag. & Hort. Lusit. purpuream: Lonic. flore purpureo: Anguill. veram & legitimam: Cord. & Geln. hort. Veronicam.

Locus & Tempus

Nascitur in pratis, siluis montosis, frigidis & opacis locis, & plurimum Maio & Iunio mensibus floribus abundat. Montbelgardi in multis locis prouenit: abundat inter Bessort & Raupach. Monspelii in sylua Aigremont. Basileæ adhuc florens Octobri in monte Mouters, & prope Krentzach: itemque in colle extra portam S. Albani ad Birsam mense Iulio. Parauini in horto viret Decembri. Lugduni & Genue Ianuario. Nasci in pratis, frutetosis & herbosis locis, solo ferè qualicunque retulit Cordus. Betonicam multas durare annis, si non accedat sæmina menstrua ex Constant. lib. 12. cap. 10. & Iosepho lib. 7. belli Iudaici, scribit Coler. æcon. lib. 5. cap. 44. De Betonicæ cultura consule Aug. gall. agric. di. 6.

BETONICA FLORE ALBO.

Descriptio

Hic, authore Clusio, multa sunt folia rugosa, subhirsuta, in ambitu serrata, Betonicæ vulgaris foliorum prorsus æmula, non aded tamen fusca viriditate nitentia, sed dilutiora: quadrangulata caules, geniculati, subhirti ex illorum medio exeunt, & in pedalem altitudinem excrescunt, subinde extremâ parte in alas sese diuidentes: folia in singulis geniculis caulem æquali situ ambiunt, humi fulis minora, nullo pediculo



fulta, odorata, quæ admodum & illa, gustus amaricanti: summi caules & rami in densam caliculorum spicam desinunt, è quibus stas emergit vulgari formâ similis, sed coloris omnino albi: semen deinde in vasculis, Betonicæ vulgaris semini par, fuscum: radix non dissimilis, viuax, singulis annis augefcens, &

plures caules producents.

Huius meminit quoque diligentissimus, peritissimusque Cordus lib. 2. Hist. pl. cap. 159. his verbis: Veronica alba genere à rubea non differt, habet tamen suam propriam & ab illa solo colore florum diuersam speciem. Et hanc à vulgari solo colore florum differentiam obseruauit, etiam Tragus qui Dioscoridem miratur, quod cum diligentissimè Betonicæ historiam persecutus sit, non tamen florum colorem indicarit, fortasse ided quod in flore Betonicam non uiderit, vel potius quod illam ex verbis, quibus Betonicæ semen, ueluti Saturiæ spicatum inesse tradit, animaduerti facile posse arbitratus sit. Sed ut ut hæc quidem se habeant, satis erit, si eas quas iam descripsimus, veras Betonicas esse, nullatenus dubitemus.

Dicitur hæc Betonica candida Brunsch. & Trago. Alba Tabern. 10. Agric. Hort. Lusit. Synon. & Schvencckf. Flore albo Clus. & Camer. hort. itemque Lonicero. Veronica alba Cordo. Ger. weiß Berbonien.

Nascitur Cordo iisdem natalibus cum rubra, inuentu tamen rarior est. E silua quadam Mediomatricum ad Tragum allata. Et hinc non passim obuiam arbitratus est, nec multis in Germania visam. Crescere tradit Clusius in ascensu montis Neuberg, Escheri iugi, & aliis quibusdam edicioribus locis: sed omnium abundantissimè supra Zeehof; magno ultra Garmingam miliari germanico, quâ iter est in Herrenalben, & Dürrenstein. Florere istic Iulio, in hortos translatam maturius aliquantò, ac egregiè augefcere. Ego reperi florentem Augusto inter l'ise & Longenlepagum Ill. principis Vvrt. itemque Belfordiæ & Raupe.

Locus.

Folia Betonicæ, præceptore Dioscoride, collecta siccare oportet, maiorem ad usum. Radices cum aqua mulsa [hydromelite] potæ pituitosam vomitionem prouocant, folia dantur ruptis, conuulsis, vuluæ affectionibus, & eiusdem strangulationibus drachmæ vnius pondere, cum hydromelite. Ternæ in vini sextariis duobus contra Serpentium morsus ebibuntur. Herba ipsa illita venenatis moribus prodest, aduersus etiam venena drachmâ in vino pota conuenit. Hanc si quis præsumpserit, lethale haustum venenum nihil nocebit. Vtinam cit, aluum subducit, medetur comitialibus & furiosis cum aqua pota. Iocinoris & lienis vitilis drachmæ pondere cum aceto mulso pota succurrit. Concoctionem adiuuat si quis à cœna eam fabæ magnitudine cum melle decocto deuorauerit. Eodem modo & iccida ructantibus propinatur: stomachicisq; eam manducare, & succum deuorare proderit, si postea dilutum vinum sorbeat. Datur sanguinem excreantibus trium obolorum pondere; cum diluti vini egelidi [lactei reporis, Cohn.] cyathovno: ischiadicis, renum & vesicæ doloribus ex aqua: hydropicis autem binis drachmis, febrientibus cum hydromelite, & non febrientibus cum mulso. Regio morbo laborantes recitat, menses ducit drachmæ pondere cum vino pota. Aluum purgant drachmæ quatuor cum hydromelitis cyathis decem potæ: cum melle tabidis, purulentis, auxiliatur, folia cum inatuerint trita fictili vase reconduntur. Easdem vires eidem assignat Plinius. Galenus vim habere incidendi scripsit, ut gustus indicat, ac præterea plerasque ex prædictis viribus ei tribuit.

Viris Betonicæ in genere.

Ex Plinio.

Scripsit & de iis proprium libellum Antonius Musa clarissimus Augusti Cæsaris Medicus, in quo hæc de ea memoriæ prodidit. Herba Betonica nascitur in pratis, & montibus mundis & opacis, circa frutices. Animas hominum & corpora custodit, & nocturnas ambulationes à maleficiis & periculis. Loca sacra & busta à visis memendis tuetur, & defendit: denique res omnino sancta est. Cestron vocatur & Psychotrophon, liquidem frigidis reperitur in locis, radicibus tenuibus, thyrso pariter tenui, cubiti altitudinem excedente, quadrangulo, folia profert Quercus, odorata: semen in lumenitate thyrsi spicat Thymbre modò. Pollet vniuersa planta doribus ferè innumeris, quandoquidem rufa, capitisque vulneribus illita, ea mita celeritate

Ossa fracta
Oculorum
dolores.

Aurium
dolores.

Caligo
oculorum.

Dentium
dolores.

Viscerum
morbo.

Renum
vicia.

Intestinum
tormina.

tate conglutinat. Præstat id tamen efficacius, si tertio quoque die iterum atque iterum imponatur. Aiunt præterea tam Valentis esse facultatis, ut ossa quoque fracta extrahat. Radicem ex aqua decoctum ad tertias, fori, oculorum doloribus medetur, quod item præstant contrita folia, & fronti superimposita. Succus à foliis per se tritis expressus, aut prius aqua maceratis, aurium dolores mulcet, si addito rosaceo in aures egelidus instilletur. Idem drachmæ pondere haustus in aquæ calidæ cyathis quatuor sanguinem illum per inferna trahit, cuius redūdantia caliginem oculis offudit, quo fit ut etiam visum acuunt comesa folia. Eadem cum salis momento contusa, naribusque immissa sanguinem inde fluentem sistit. Betonica decoctum ex vetere vino, aut ex aceto dentium dolores finit, si eo os sæpius colluatur. Herba ipsa ex tepente aqua pota suspiriosis & anhelosis maxime proficit, folia melle excepta tabidos iuuant, præsertim qui purulenta extruunt. Eadem tribus diebus continuis deuorata drach. quatuor pondere, aut ex frigide aquæ cyathis quatuor ebibita, ventriculi dolores mulcet, iocinoris verò, si ex calida hauriatur. Ex vino decocta lienis vitiis medetur. Sanat & renum vicia ex mulso bibita duarum drach. pondere: ex vino autem vetere triū drach. pondere, additis Piperis granis septē & viginti: ad lateris lumborumque dolores vtilissimè bibitur. In duobus aquæ calidæ cyathis sumpta, alui & intestinorum tormina remouet, si tamen à crudis non fiant succis, foliorum quatuor drachmis in aquæ nultæ cyathis octo epotis, commode citatur aluus, sananturque iis ex vino sumptis coli inflammatione vexati. Betonica in eclegmate ex melle sumpta nouem diebus rursim sedat. Pota in aquæ calidæ cyathis quatuor duarum drachmarum pondere, additâ Plantaginis drachma, febres quotidianas expellit, quod tamē in accessionibus tantum fieri debet. Idem præstat etiam in tertianis, si cum pari Pulegio assumatur. Sanat ipso quoque ordine, etiam quartanas in quatuor aquæ calidæ cyathis hausta, quatuor drachmarum pondere: additâ mellis vicia calculi franguntur. Betonica ex repente aqua feliciter bibitur hydropicis: Pariendi celeritatem adfert, vterique cruciatus à frigore conceptos mulcet, si ex calida aqua, aut mulso duarum drach. pondere propinetur. Contrita folia & illita præcisos glutinant nervos, & resolutos iuant. Eadem triū drachmarum pondere ex caprillo lacte sumpta tribus diebus, sanguinem ore seiectum colubent: pari vini veteris mēlura, medentur ruptis, & ab alto deuolutis. Præsumpta ebrietatem atcet. Ex vino frequenter hausta ictericos sanat: suillo adipi admista carbunculos curat. Pota ex aceto mulso vnius drachmæ pondere viatoribus longo itinere defatigatis vires mirificè reficit: fastidia abstergit, & stomachicos recreat. Aduersatur venenis, & serpentium, & venenosorum, rabidorumque quorumcūque animalium moribus, non modo intus sumpta, sed etiam extra emplastri modo imposita. Cuniculosa sinuosaque sanat vlcera cum sale indita. Ex vino hausta menses ciet. Potu dolores podagricos lenit, præsertim radicem decoctum potum, idemque præstant contrita folia imposita. Hæc Antonius Musa.

Betonice quantum ad duas porciones satis est, in aqua decoquendum, & decocti tepentis duas Tom. III.

heminas ad colluendum vterum præscribit Hippocrates. Radicem Fontanus ad choleram commendat. Post purgationem Betonica in aqua Rosarum, vel vino decocta reparat omnes spiritus (ut habetur apud Arnoldum lib. i. cap. 17. de cur. morb.) inque cōseruatione visus, & augendo acie oculorum iam obtenebratam multum iuvat. Aquam Betonicæ expellere febres legitur apud Io. de Monte Exper.

Ceterum in hac herba id obseruandum, radicem facultates longè dispares à foliorum & florum viribus, utpote quæ multum stomacho, orique ingrata, nauseam, rugitum, vomitumque ciant, folia contra odora, aromatica, & grato sapore, nonnihil roborante, cibo & medicamento naturæ amica. Et hanc non temerè eam tantopere laudauit rustica & urbana plebs omnis: nunquam non in extollenda boni alicuius multiplici potestate & vtu *Veronica vtilius* dicere solita. Idque à tam multis & tam sæpè factitatum fuit, ut experit iampridem non secus quàm in prouerbio aliorum bonorum formula & exemplar quoddam Italicæ genti herba hæc esse: Quotiescunque enim aliquem laudibus familiariter extollere volunt, vulgari prouerbio. *Tu hai più virtù che non ha la Betonica*.

obseruatio

Præuerbia

BETONICAE FOLIO ALOPECVROS quorundam.

Cap. LXXXIX.



Et radice nigra, rubro-
sa, fibrata: cau-
libus multis, cu-
bitalibus, rotun-
dis, imâ parte
vestitis, corticis
quibusdam ex-
stantibus veluti
lactiis, partim
ē nigro rufis, dē-
sius congestis, in
cuspidem desi-
nentibus: foliis
Betonice, rotū-
dioribus, breui-
oribus, latiori-
bus, venosis,
quæ medius ner-
uis protendi-
tur, nigris, ad
extremam oræ

Descriptio

marginem valdè crenatis, magnis intervallis per caulem prædeuntibus, geminis ex aduerso positis: in caulium vertice ex geminorum foliorum tanquam alâ caput exoritur, oblongum, metæ figura, innumeris villis hispidū, densissimè stipatis, candicantib. eleganti protus huius congeriei figura, emicanti omni ex parte illa pilorum casaric, ordo, & densitas, vtcunque vulpinæ caudæ speciem æmulatur, vnde nomen impositum est, Alopecurus montana ab Herbariis, à fructus sc. villosi quadam similitudine cum eius animalis cauda.

Nascitur in altorum montium opacis conuallibus, arborum frequentia vimbrosis, & illapsu aquarum vdis.

Quæ facultate prædita sit & ad quas ægritudi-
Hb.


Locus

nes valeat, nobis cum H. Lugdunensis auctore, qui p. 1358. Alopecuri genus inscribit, compertum nondum est.

SALVIA LATIFOLIA.

CAP. XC.

Descriptio.



Salubris medicinq̃ nomē meritō indepta est Salvia: cuius species vna maior & est & dicitur, viuaci & lignosa radice perennis 1 ex qua furculi attolluntur complures lignosi, quadrati, hirsuti, incani, aut viridantes: folia Menthae foliorum formā acuminata, retortidā facie panicosa, colore vel incano, vel viridati, spadiceo, odore eximio aromatico, sapore cum aromatica amaritudine, acriusculo & calido:

flores in spicam digesti, ex foliorum quorundam alis caerulei, aut ex albo purpurascens, Lamii, cucullo hirsuto, labello bifido, ex calycibus oblongis, hirsutis, striatis.

Hanc sic descripsit Dioscorides. Salvia frutex est oblongus, ramosus, virgas quadrangulares, & subalbicantes habens: Folia Malo Coroneæ similia, longiora tamen, & asperiora ac crassiora, latenter velut detritæ vestes hirta, subalbida, vehementer odorata, graui odore. Semen in summis caulibus Hormini siluestris modo habet. Et sic etiā delineatur à Serapione, qui tamen legisse videtur, & ita, addit enim strictiora, pro asperiora & crassiora.

Salvia gen.
nora duo
Theophr.

Et licet Dioscorides solum hanc Saluiam agnouisse deprehendatur, Theophrastus tamen duo eius genera prodidit. Differunt autem (inquit lib. 6. cap. 2. Hist.) Spacelos & Eleliphacos, quod altera satia, altera sterilis est: habetque Sphaceli folium maiorem leuiorem [minorem asperitatem, alius:] breuius illo est, & minus squalens. Eleliphacos grauiore odore sentitur. Hæc sic legit Gaza: Sphacelus & Salvia inter se distant, quasi alterum vrbani, alterum genus siluestre dixeris. Sphacelo folium leuius, contractius, minusque squalens: Saluiæ scabrius. Verum vtra lectio magis conueniat, ipse iudicet.

Plinius lap.
fur.

Illud obiter monemus, nos plures Saluias tradere, sed in præsentia duntaxat de maiori agere. Plinius vocis eandem, lentem significantis affinitate deceptus Eleliphacum Lentis siluestris genus facit. Est Eleliphacos, inquit, dicta Græcis, ab aliis phacos. Est ea satia Lente leuior, & folio minore & sicciore, & odoratiore. Est & alterum genus eius siluestris, odore graui, hæc mirior. Folia habet Coroneæ Mali effugie, sed minora &

candida. Et mox post hæc verba, quasi alia esset Veterum, alia sui temporis Herbariorum Eleliphacos, subdiçit hæc verba. Nostri qui nunc sunt Herbarii, Eleliphacum græcè, latinè Saluiam vocant, Menthae similem, canam, odoratam.

Ceterum, Matthiolus præter vulgaris notitiæ Saluiam hortensem, habet & ipse Saluiam siluestem, foliis domesticæ similibus. Quam autem siluestem appellat, ea ipsi non est, quæ in Hispaniæ campestribus & asperis locis ac in Massiliensi agro nascitur, quam loquidem hæc non siluestris Salvia est, sed ea ipsa quam domesticam vocant. Porro genera Saluiæ, quæ à Theophrasto redduntur, in Italia quoque in hortis quam plurimis inueniri asserit: in eaque est sententia, vt existimet Sphacelum maiorem esse, Saluiam verò seminam. Et quia Græci Eleliphacum Saluiam vocarunt, inde factum esse perhibet, vt Plinius vocabulorum cognatione deceptus, crediderit Eleliphacum Lentis speciem esse.

Dioscoridis textum esse corruptum, testatur Anguill. ac folia non esse Malo Coroneo similia, sed Menthae: legendum enim cum Cratæa eul. p. 1358. & ita, fide inq; facere Plinium. Dioscoridis allegatum locum quoque reprehendit Lobelius.

Hist. Lugdunensis attestatur nota esse vulgò duo Saluiæ genera (licet Dioscorides vnā tantum describit) Saluiā sc., maiorem, Gallicè grande Sauge, & Saluiam minorem siue nobilem, Sauge fran. he, & Sauge menue vocatam. Addit Theophrasto totidem esse genera.

Clusius, qui Saluiæ multa genera obseruauit, latifoliam inueniri scripsit folio viridi, còque crispo, vel non crispo, purpurascens. & versicolore: itemque in Austria floribus candidis, cuius semen istinc in Belgium amicis misit: è quo natæ plantæ.

De Saluiæ generibus Camer. in Hort. hæc annotauit. Salvia latifolia & altera eiusdem formæ cum auriculis: item tenuifolia auriculata, & eiusdem generis Hispanica à frigore munienda, sicuti quæ flore albo, cuius meminit Anguillara, hæc non simo pingui, sed luto veteri cum terra debet stercoreari. Lixiui etiam cinere muniunt olitores & sic lætiorem prouenire testantur.

Saluiam hanc nostam latifoliam, inscribit Matthiol. passim in suis comm. itemque Hist. germ. Saluiam maiorem. Et ita quoque Dodon. gall. (qui 2. facit, & quorundam agrestem cognominat) & Lat. [qui tamen primo loco eam describit] H. Lugd. p. 879. Lobel. in Obs. p. 299. (& sic quoque in Adu. & Icon. Plantar. addens tamen scabriorem Dioscoridis.) Tabern. & C. Bauh. in phyt. Saluiam latifoliam Tragus, itemque Brunfels. in 4. pag. 280. sine iconè: figura enim adposita, est Eupatorii cannabini. Cæsalp. Saluiam domesticam floribus caeruleis, vel candidis, dis.

Apollinaris lib. 2. Saluiæ species non 1. parat, easdem omnibus vires adscribens. Ego tamen maiorem infirmiorē minore existimo. Matthiol. in Epit. cum addit. Camer. Saluiam inscribit, & Saluiæ genus vrbani Theophrasti pronunciat.

Cuius porro ex imperita multitudinē nota est non solum facie, sed etiam certissimi remedii herba Græcis Ελαιοφάκος vocata: Latinis & officinis Salvia: Arabibus Aeliphacos, & Elipha: Mesue Brui: Germanis Salbey: Belgis Sae

nie: Gallis *Sauge*: Italis & His. [his & *Salua*] *Salua*: Angl. *Sage*: Boh. *Salmsteg*: Polon. *Szalwea*: Hung. *Salya*: & Borany iron, h. e. agninum Absinthium. Hæc autem cum retorrida semper & exueta videatur, factum est ut Græcis Elelisphacon siue Elelisphatos, quasi in tabem redacta, vel in syderationem flaccescens dicta sit, *ἐλελίζων* & *ἐσφάτω*: vocibus in vnam coalescentibus appellationem. Est autem *ἐλελίζων*, intorquere, contrahere, & *ἐσφάτω*, seu potius *ἐσφάτω* malum in plantis, quum per ætatem, & ardentissimum canis æstus, vi Solis altius penetrante, humoræque, quo nutriuntur, deficiente, languent & arescunt: Latini Syderationem nominant. Potuit tamen æquè scite dici (inquit Lobel.) à medendis Sphacelo penè demortuis partibus, quibus calorem natium roburque insitam reuocaret, quâ pollet familiari facultate nostræ vitæ primordiis beneficiâ, vnde *Salua* dicta, quod saluos homines & incolumes efficiat. Aut quod præsertim ad fecunditatem salutaris sit. Hanc namque sæpè vlrupantes steriles, grauidæ redduntur. Quare Agrippa Sacram herbam vocauit, vt author est Aetius.

Salua.

Herba sa-
lva.

Nuba te.

Broom.

Cuslari.

Tussilago.

Lecm.

Inter nothas verò appellationes & hæc nomina occurrunt. *Elaphoboscon*, *Phagnon*, *Phædon*, *Ciosinis*, *Ciosnite*, & *Beceon*, quod nomen apud Apulgium quoque legimus. Græcè autem sonant hæ voces *ἐλαφόβοσκον*, *φάγνον*, aut *φάγον*, *βίον*, *βίον*, & *βέκον*. Et Galenus in confectionibus dolorem sedantibus, quæ tabescentibus & sanguinem reicientibus sunt commodæ, *βίον* incunat, & *βίον* simpliciter, quam herbam Cornarius *Saluam* conuertit, & *βίον* pro *βίον* substituendum censet, vt sit *βίον* vna aliqua appellatio *ἐλελίζων*, quam nos *Salua* n. dicimus. Et Plin. altera Bechii speciem *Salmiam* appellari testatur. Omnibus his appellationibus Apuleius cap. 101. Cission addit. Sed & *Corsaluim* quibusdam dici refert Dod. gall. Tragus verò monet Latinos *Tussilaginem* *Saluam* appellare. Apuleius, inquit, c. 101. vocat suam *Tussilaginem* & Bechion *Saluam*: vbi igitur in Apuleio scribitur *Tussilago* aut Bechion, intelligenda *Salua*.

Porro, *Salua* hæc latifolia, siue maior dicitur *Germ. grosse* aut, breuiter *Salbey*: *Edel Salbey*: Belg. *Groete* siue *groote Sauie*. Gallicè *Sauge grande*. It. *Salua maggiore*. Angl. *Great Sage*.

Hæc subinde locis asperis & ruderatis in Germania reperiri refert Dodonæus. Camerarius restatur eam in Galconia, Gallia Narbonensi & Pedemontio in viciis luxuriare: in hortos verò translatam pulchriorem euadere. Monspelii & Lugduni floret Maio: seriùs in Germania, Iunio sc. ac Iulio, vel etiam Augusto. Martio verò, vt & alix *Saluiz*, commodè transfertur ac plantatur.

Salua nigra vel rubra.

Ex genere *Saluiz* maioris est, foliis magnis, sed plerisque ex atro rubentibus, potissimum antequam caulescat, vel florescat, alioqui florida folio parum differt à maiore vulgari.

Est Dod. gall. *Saluiz* maioris tertia species, dicta rubra gall. *Sauge rouge*. Lat. in fol. *Saluiz* maioris species alia, foliorum pediculis ac nervis, cum & recens enatis foliolis rubentibus. C. Bauh. Phyt. *Salua* 2. siue *nigra*. An Clus. *Salua* folio purpurascens.

Nusquam hanc vidi nisi in Castello Beuuge, vnde transtuli in hortum Ill. E. C. florentem Iunio.

Salua albis foliis.

Ex genere *Saluiz* maioris & hæc est, quæ folia Descriptis quædam tota, quædam verò media ex parte candore nigro prædita habet. Hæc vocat Dodon. *Synonyma* gall. *Saluiz* maioris alteram speciem, *Saluam* albam dictam, gall. *Sauge blanche*. Lat. in fol. *Saluiz* maiori speciem nonnullis foliis vel totis, vel partim albidis: C. Bauhin. Phyt. *Salu.* maioris speciem foliis albidis. An Clus. *Saluam* latifoliam versicoloream: quam in Austria flore albo obseruauit.

Saluam huiusmodi Lutetiâ misit Robinus hortulanus regius: itenque Cargillus Londinorum cum hac inscriptione, *Salua versicolor* ex albo viridi & rubro.

Salua serrata crispa.



Idem Cargillus Scotus Medicinæ Doctor huius *Saluiz* misit duo folia, ad tractum lauiâ, renuia, breuiâ, serrata, nonnihil hirsutæ albicantia, *Saluiz* siuorem habentia, collecta Londini in Lobelii horto. Horum inscriptio erat hæc: *Salua serrata & crispa folio latiore*. Ceterum an Clusio *Salua latifolia folio crispo*.

Salua minor auriculata



Minorem *Saluam*, quæ minorâ capiat incrementa dixerunt: frutescit ea tamen, contractior interim maiore, quadratis stolonibus & hirsutâ canitie lanuginosis: folia aduersa Maiori magnitudine cedunt, odore vehementiore, saporeque vegetiore vincunt, magis candicantia,

quibus ad imum pinnulæ duæ appositæ, aliquando vna, est vbi nulla: spicatos cæruleos flores ex Maiore promptum est discere.

H. Lugd. pag. 880. hanc pingit Sphaetli veri Theophrasti titulo. Sed & Matth. [qui *Saluam* Hh 3

Synon.

minorem inscribit, vt & Tabern. itemque Dod. gall. qui primam cognominat, & Lat. qui secundam] ac Lobel. Sphacelum esse asserunt. Hic in Aduers. Saluiam minorem pinnatam vocat. Clus. Saluiam angustifoliam. C. Bauh. phyt. Saluiam 4. (2. apud Matth.) siue minorem, & Saluiam nobilem Brunfelsii in 4. p. 180. Hanc autem aliquando pinnatam esse, & aliquando non, vna figura expressit Tabernamontanus. Foliis vero nonnunquam eam reperiri Lauendulae concoloribus, sed latioribus & grauioris odoris; rarius etiam luteolis variare, & flore albo esse inouit C. Bauhinus.

linguarum nomina.

Germanicè dicitur Spitz Salbey / Creutz Salbey / Klein: Edel: & Crecht Salbey: Belg. Cruys Saue, & Orfene Saue: Gall. Sauge fraîche, Sauge menue: Ital. Salvia minore: Angl. little Sage.

Locus

Hæc Salvia est lignosior maiore, nec ita facile multiplicatur. Qualis pingitur à Fuchsio & Matthiolo Monspelii prouenit. Genuæ cum auriculis, quæ in in eo affinitatem habet cum gallifera Cretica. In Gallia & Italia quibusdam locis ita abundat potissimum in terra aspera, vt eâ calefiant elibani, Matthiolo authore. In campestribus Hispania in Massiliensi agro spontanea occurrit, cum tamen in Germania non nisi culta in hortis habeatur.

Vires.

Nos minorem hanc Saluiam cum Trago maiori præferimus, à Lobelio dissentientes quidem, qui nullum in sapore discrimen esse ait, cum tamen eo sit magis amaro & aromatico ac acriori. De viribus in genere plura infra dicemus.

SALVIA TENVIFOLIA.

Descriptio



SALVIA M. Foliis minus spissis, angustioribus; itemque paruis auriculis donata, mihi verò Bisantii in horto Clariss. D. à Belle fontaine à S. Mauritio demonstratam, sic describit Clusius. Multos statim à radice profert ramulos, lignosos, ex fusco subrubentes, quos alternis bina semper ex aduerso ambiunt folia, longè angustiora, quàm in vlllo Salviae genere, in ambitu nonnihil interdum crenata, seu crispata: e quorum sinu alii pusilli ramuli prodeunt: medius caulis in spicam purpureorum florum desinit, nullis intermixtis foliolis: radix dura, lignosa, in ramos diuarcata. Quo tempore floruerit, & an semen retulerit, nihil Clusio à Jac. Plateau, qui eius iconem viuis coloribus depictam ad ipsum misit, significarum fuit. Ramis aliorum Salviae generum instar, illam pangi posse, putat Clusius. Clusius porro, qui nascentem non conspexit, Saluiam Creticam angustifoliam appellauit. C. Bauh. phyt. Saluiam 6. siue tenuiore folio, Cameraarii Hispanicam & Tabern. Indicam.

Syn. m.

SALVIA GALLIFERA CRETICA.

Descriptio

TOTA denso villo obstita canescit, internodi potissimum parte, tam caules lignosi quadrati, quàm folia partim auriculata, partim mutila, crassa, in mucronem obtusum desinentia: obseruauimus in iuvene planta ternas & quaternas pinas: ad iuncturas pediculo sefcunciali gallæ insident rotundæ, pilulis Querneis, in folio nasci solitis.

Dodon. Lat. in fol. videtur non galliferam, sed tuberosam cognominare, itemque Matthiolum. Anguillara epist. 12. non tuberculum, sed fructum appellandum censet. Clusius eam Salviae Creticae non pomiferæ titulo donauit. Lobel. in Adu. Salviae cocciferæ siue baccatæ Cretensis: le. Plant. p. 554. & H. Lugd. p. 381. vbi figura quæ non placet, Salviae bacciferæ Cretensis. Tabern. Salviae cum gallis. C. Bauh. phyt. Salviae 5. [3. apud Matth.] siue bacciferæ, à lo. Bauhino communicatæ. Creuit enim mihi Montbelgardii in horto Ill. E. C. Wirtembergicæ.

Vires & usus a genere.

Foliorum & ramorum Salviae decoctum, inquit Dioscorides, potu vrinam ducit, menses & fortis extrahit, pastinacæ marinæ ictibus auxiliatur, capillos denigrat. Vulneribus herba vtilis est, sanguinemque compescit, tetra vlcera purgat. Pudendorum pruritus foliorum & ramorum decoctum, cum vino, si eo abluantur, sedat. Nescio quid humani Plinio acciderit, qui Elelispachon Lentis syluestris genus fecit: Et rursus, alterum eius genus tale, quale omnino Diosc. describit. Verba eius supra adscripsimus. Est syluestris & Elelispachos dicta, &c. Alterius generis folia cum ramis decoquuntur. Menses ciet & vrinas, & pastinacæ marinæ ictus sanat. Torporem autem obducit percusso loco. Bibitur cum Absinthio ad dysenteriam. Cum vino eadem commorantes menses trahit, abundantes sistit decocto eius potu. Per se imposita herba, vulnere sanguinem cohibet. Sanat & serpentium morsus. Et si in vino decoquatur, pruritus testium sedat. Et mox, quasi alia sit Veterum, & alia sui temporis Herbariorum Elelispachos, subdit: Nostri qui nunc sunt herbarii Saluiam menthae simili appolitam partus emortuos extrahunt: item vermes aurium, vlcerumque: Ad muliebrem profluuium compescendum, & procurandum conceptum eius usum commendat Arius: Hollerius ad sanguinis sputum, quod minimè probamus, alii ad Lac augendum eâ vruntur.

Cæterum, virota & pestilens ea maximè censetur esse, quæ foliorum pinas, veluti carbuncularas præ se fert, estque toto habitu, nedum foliis, retorrida, emaciata, & languidula. Post hanc summè periculosam & noxiam, adhuc etiã viridem & bene habituatam, esse conicit Ioh. Schvvab Feldkirchenensis Rhætus, quæ cœmeteria incolit, quod non raro in iis, non tam frequentes quàm prægrandes & virosos bufones offendit, vt loco cadauerum corruptioni dicato & generationi bufonum, serpentum, omnisque generis vermium, insectorumque obnoxio. Est siquidem vt Philosophorum norunt filii, corruptio, unius, alterius generatio.

In cuius etiam venit probationem notus ille duorum amantiũ lugubris casus qui ambo cum in horto essent labiis leuiter afflicta Salvia subito occubuerunt, vnde lo. Boccatio occasio hunc scribendi verbum.

Cur

Cur moriatur homo cui Salvia crescit in horto?
Idem Feldkirch. Rhemus Adagii haud inelegan-
tis. nobis author fuit: Illorū Salviā non teme-
re esse utendum, h.c. Viro incognito nec antē
bene experto.

SALVIA ABSINTHIUM REDOLENS.

CAP. XCI.

Descript.



Flore est fa-
tis magno
verticillato,
purpurascens &
obseruandū an
ab albo diffe-
rat, vel solo co-
lore ludat: folia
Salviae minoris
pari, nunc pin-
nato, nunc mu-
tilo, Absinthii
obolente, quem
tamen odorem
siccata vix re-
seruant folia.

C. Bauhin.
phyt. vocat Sal-
uiam 3. siue o-
dore Absinthii,
flore rubente,

cum vulgari minore conuenientem. An Ca-
mer. hort. Saluiam latifoliam alteram cum auri-
culis: Item Saluiam flore albo?

Locus.

Sturgardię in horto Ill. E. C. itēque Mont-
belgardi vtramque flore rubente & albo obserua-
uimus: Adhuc Argentinae Iulio & Augusto in
horto Frid. Meieri.

VERBASCUM SYLVESTRE MONSPELI-
ense, flore luteo hianse.

CAP. XCII.

Descriptio



Hæc foliis
rotundi-
oribus, candi-
dioribus, den-
sioribusq; mi-
nus tamen la-
nugine canis,
sed Salvia æ-
mula concre-
tione: alioqui
lignosa, libra-
tæque radice,
caule & facie
non ita dissim-
ilis: iisdem gau-
det Syrię nata-
litiis, qui-
bus Verbas-
cum Lych-
nites Syriacū:
fiores descri-
ptori Lobelio

videre non contigit, quia ut refert, iam marci-
diant.

Synonyma


Is in Obs. p. 302. Verbasum sylvestre Saluifo-
lium exoticum intitulat: itēque in Icon. Plant.

H. Lugd. p. 1302. Verbasum silu. exoticum Lob.
C. Bauh. phyt. Verbalcum 4. siue exoticum sub-
rotundo folio Saluia.

VERBASCUM SYLVESTRE MONSPELI-
ense, flore luteo hianse.

CAP. XCIII.

Descript.



Aco silue-
stri Matthioli
diuersum est
Monspelientse,
quippe cuius
folia duplō aut
triplo angu-
stiora, lanugi-
nosa, & inca-
na, potissimum
parte inferio-
re, superius
enim colorem
Salviae refe-
runt: caules
quadrati, vil-
losi, in ramos
ducti, in qui-
bus ex inter-
uallis breui-
bus, longā

serie verticillati calices, pinnatis cristis insignes,
fiores proferunt luteos, gileatos, Verbasci silue-
stris Matthioli, quibus bina subiecta folia ca-
lyces omnes vndique fere complexa, latiuscula.

An Matthiol. in Hist. germ. plantam nostram
intelligit per Verbasum siluestre minus, cuius
in descriptione obiter meminit?

Lobel. in Aduers. appellat Verbasum silu. Sal-
uitemuifolium Narbonensium: In Obs. pag. 301.
Phlomon Lychnitidem inscribit. Sed huius in-
scriptionis effigies reducenda ad præcedentem
titulum, Verbasum siluestre foliis Salviae tenui-
foliæ: & contra huius inscriptionis imago, ad
sequentem titulum, Phlomi Lychnitidis: trans-
positæ enim sunt figuræ: In Ic. Plant. Verbasum
hoc, vero titulo expressit p. 358. Verbas. silu. fo-
liis Salviae tenuifoliæ, Narbonense, Hispanicum,
Illyricum aut Syriacum. Dixerat enim in Obs.
plantam esse non modò Narbonensem, sed His-
paniæ, Syriæ & Illyriæ indigenam: quæ hæræ-
que etiā in Adu. an Phlomos Lychnitidis Diosco-
ridis: ac paullo post Saluiam siluestre plebi di-
ci, Dioscoridisque Phlomon Lychnitin videri.

Sic licet non ignarus clarius, alias stirpes pro
Phlomidæ Lychnitide à variis rei herbariæ scri-
ptoribus proponi: nullam tamen ad Dioscoridis
descriptionem propius accedere indicauit, quā
quæ à nobis proponitur, & ab illo Phlomidis
Lychnitidis titulo pulchrè pingitur, &
à quibusdam Syriacæ appellatur: à Monspe-
lianis Verbasum siluestre: Castellanis Candilera:
Granatensibus Menibera, eadem propè ratione,
quia s. eius folia, non modò sicca, sed etiam re-
centia oleo imposita, ellychnii vicem supplere
possint, si accendantur, quod etiam Dioscoridis
Lychnitidi & Thryallidi tribuit.

Non benè tres figuras eiusdem plantæ, quasi
diuersarum proponit Hist. Lugdunensis: Verbas-
cum silu. Dodonæi, p. 1301. Phlomidem Lychni-

Synonyma
Lob. lap. 100.

H. Lugd.
reprob.

tidem Penz p. 1303. Item Phlomidem Lychniti-
dem Clusij.

C. Bauh. phyt. vocat Verbascum 2. siue angu-
sta Saluiz foliis, dubitatque an sit Verbasc. silu.
foliis Saluiz Dioscoridis? Anagarthi aliquibus
dici refert.

Locus &
Tempus.

Ad miliare quâ itur Monspelio Frontignan
inter saxa vidi florentem Vere. Frater C. Bauh.
annotauit florere Maio & Iunio, ac dici Verbas-
cum Saluifolium, & Saluiam spicaram in His-
pania. Sara à Gethero Tiguri prouenit, & in va-
se Hyeme domi vitat: sed injuria quadam po-
stea ante florem perit. Exit collibus, sicciori-
busque & petrosis locis, per vniuersam Hispa-
niam & Lusitaniam: obseruauerat & antea Clu-
sius in Narbonensi Gallia. Semen subrufum Ver-
basco syluestri Matthioli ferè simile in vasculis
Iulio profert.

Aequiuoca
Saluiz a-
grestis.

Saluiz agrestis nomine donantur sequentes
plantæ: Scorodotis. Gallitrichum satiuum. Gal-
lica syluestre. Menha Sarracen. Stachys. Sta-
chys Fuchii. Stachys Matthioli. Cistus femi-
na. Tullitago. Ruta muraria. Saluia syluestris
Tragi adulterina Lobelio quid?

HORMINVM EX VETERVM sententia, & in genere.

C A P. XCIV.

Theoph.
Geminale.

FRUGUM generi adnumeravit aliquot locis, de
de plant. histor. Theophrastus Horminum,
quod Gaza Geminale vertit.

Dioscorides Horminum in genus satiuum & sil-
uestre parit. *Satiuum*, inquit, herba est Mar-
rubio similis: caule quadrangulo, semicubitali;
circa quem eminentiæ siliquis similes prodeunt,
ad radicem nutantes; in quibus semen diuersum
includitur: nam in syluestri rotundum, fuscumque;
inuenitur: in altero oblongum & nigrum, cuius
& vsus est ad venerem stimulantem cum vino
poti. Purgandi autem cum melle oculorum al-
bugines, eorumque vlcerâ, argemata Græcis vo-
cata. Ex aqua emplastri modo impositi tumores
discutiendi, & furculos extrahendi. Quin &
& herbæ ipsius eodem modo impositæ eadem
præstandi. *Syluestre* autem edicaciores habet vi-
res: eamque ob causam vnguentis miscetur, mu-
steoque præsertim, Gleucino vocato.

Vfus.

Plinius Hormini methinir & Horminii: per
Horminium, Cæsalpino auctore, intelligens As-
paragum syluestrem: vtrumque nomen inditum
quia venerem stimulant. De Hormino, inquit
lib. 22. cap. ultimo, semine vt diximus Cymino si-
mile est, & in reliquis Porro [malè. Scribendum
erat Marrubio] dodrantali altitudine. Duorum
genetum, alteri semen nigrius, & oblongum. Hoc
ad venerem stimulantem, & ad oculorum ar-
gema, & albugines: alteri candidius semen, &
rotundius. Vtroque tuso extrahuntur aculei ex
corpore, per se illito ex aqua. Folia ex aceto
imposita, panos per se, vel cum melle discutiunt:
item furunculos prius quàm capita faciant, om-
nesque acrimonias. Libro 18. cap. 10. Theophra-
stum sequutus inter fruges numerat post Erysimū
& Sesamum. Quinquam ambigat inter fruges
& medicamenta. Eiusdem naturæ (cum Erysi-
mo) & Horminum, à Græcis dictum, Cumino
simile: scribitur cum Sesama & Irione inter æstiu-
a: nullum animal vescitur virentibus.

Galenus quoque inter fruges numerat lib. 2.
lib. 1. Hormino, inquit, videntur, torrentes, vt fa-
rina fiat. Annisceat ipsis etiam melle. Habet au-
tem in se alimentum, naturam mediam habens,
inter Erysimum & Cuminum, tenuium est par-
tium, attrahendi detergendique potentia n habes.

Plinius Hormino tota Porri tradidit, Græ-
corum nominum vicinitate deceptum, testatur
Matthioli. Qui & aliud Hormini genus esse
falso credidit, à Theoph. Galeno, & Plinio inter
fruges annumeratum. Hormini, inquit, de quo
hic nobis sermo, meminisse Galenum in libris
simpl. med. non reperio, quamuis eius mentio-
nem fecerit Paulus, qui tamen illa tantum re-
fert, quæ à Dioscoride mutatur est. Hæc ille. Ec-
verum quidem est, teste Cornario, Plinium er-
rasse, & pro *argemato* legendè, & Porro pro Pra-
sio, i. e. Marrubio, conuerterentem. Sed maior est
error eius & aliorum, qui tamen de diuersis pro-
dunt, alterum Horminum cereale facientes: &
alte un herbaturum genus: quoniam Theophrastus,
Plinius, Galenus, & omnes veteres, vnum Hor-
minum noverint, de vno omnes prodiderint,
quod tamen tum syluestre, tum satiuum sit: & hoc
etiam inter alimenta retulerint. Et hinc, Dios-
corides, inquit Marantha, Horminum satiuum
& syluestre depingit: in nulla re, quantum ad
formam at inet, libi inuicem dissentire per hoc
nobis significans: sed in semine solum differen-
tiam ponit: liquidem in syluestri rotundum, fus-
cumque; in altero nigrum & oblongum inueni-
ri tradit. Iam quis non admiretur eos, qui duas
plantas, floribus, foliis, magnitudine, caulibusque
inter se multum distantes, pro duabus Hormini
speciebus depingunt, cum Diosc. nullam, nisi in se-
minibus, ponat discrepantiam.

Cæterum, quod Matthioli Hormini Gale-
num in simplicium Pharmacorum numero me-
minisse cum Cornario & aliis quibusdam negat,
id cum doctioribus, vt Guil. And. no, Phorbion
esse iam olim Gethero notante, didicisse poterat.
Si dubitat Paulum adeat, vtroque sub nomine
eadem verba referentem.

Lappas a-
liis quorū
dam.

Quia porro non desunt, qui Gallitrichum
Horminum Dioscoridis esse contendunt, forte
non abs re fuerit, de vtriusque sic differentem
Turnerum audire. Diu, inquit, in ea hæsi opinio-
ne in qua etiam est Ruellius cum aliis multis,
Horminum esse Gallitrichum, & barbaris Sclarea
dictum. Sed accuratius perpensa Dioscoridis
descriptio Hormini, deprehendi cum Sclarea
non conuenire, inuper etiam comperi eiusdem
esse sententiæ Matthiolum. Itaque aliud hormi-
num exhibet (hoc nos duplex agnoscimus; i. co-
mâ purpureo-violaceâ; & alterum comâ rubrâ,
de quibus mox agemus) sed, pace eius sic dictum,
nimis ierune descriptum. Sed præstat vtramque
plantam ad descriptionem Dioscoridis expende-
re. Sclarea in multis videtur à descriptione
discrepare, atque etiam in vno etiam hormi-
num Matthioli: folia Sclarea multum differunt
magnitudine, nonnihil etiam formâ, à foliis
Marrubij. Caulis habet duos cubitos altum; at
hormini caulis cubitum semis altus est: quæ in
caule Sclarea apparent, sursum spectant, in hor-
mino deorsum. Quare Sclarea nostra hormini
descriptioni non responderet. Dioscorides in
suo Hormino vnius tantum caulis meminit: at
horminum Matthioli, vt minimum septem habet
caules: quare cum Diosc. rō oleat tales insignes
notas prætermittere, verissimile est, si tot caules
haberet

Horminum
est Gallitri-
chum.

haberet Horminum; non fuisse silentio præteritum &c.

Hormini
Aequiuoca

Gallitricha tandem quibus Hormini nomen adscribitur hæc sunt: gallitrichum sativum. Gallitrichum. exoticum. Gallitrich. silu. vulgo. Gallitrich. silu. flore maiore albo. Gallitrich. glabrum folio Saluæ. Gallitrich. silu. versicolore folio. Gall. silu. comâ virecente. Gallitrich. folio rotundiore. Gallitrich. tenuifol. Gallitrich. fl. minore. Gallitrich. fl. minimor. Gallitrichis affine Maru. Gallitricho affine Horminum. Galiopsis species lutea. Asparagus silu. Corruca.

Quæ sint illa Hormina campestris, quæ Tragus Betonicas siluestres dicit, inquirant lectores. Hormino deficiente, ut & hoc obiter moneamus, substituitur auctore Fuchsio de compoli med. in antiballom. semen Lini.

HORMINVM COMA PURPVREO-violacea.

Descriptio



Multâ habet Horminum cum Salvia similitudinem: caules subrubentes, multis alis cœcaui, quadrati, copiosâ lanugine hirsuti, pedales & maiores: ad quorû genicula folia Saluæ bina aduersa, non ita retorrída & squallida, sed assatim hirsuta, odore nullo eccellente, sapore amaricâ-

tè: at verò foliorum, quæ in extremis sunt ramulis, densior est phalanx, quorum summa purpuro-violacea faciem ad huius plantæ cognitionem viam monstrant: flores ex foliorum alis Saluæ minores, partim purpurei & albicantes, ex caliculis verticillatis, Marrubio similibus, foliaceis, hirsutis & striatis, sursum vergentibus, dum flores gestant, deorsum nutantibus, semine onustis: radix lignosa & fibrosa. Herba est annua.

Matthiol.
corpore.

Matthiol. apud Dioscor. ex sola effigie Pisis ad ipsam missa à Luca Ghino, iudicat suum Horminum, verum sativum representare, omittens nouæ plantæ descriptionem, eique folia valdè rotunda appingens. Eandem Matthioli figuram proposuit & Dod. in H. gall. foliis rotundis: In postremis nouam assumpsit iconem, foliis non ita rotundis. Considerandum igitur fuerit an huius duæ species. Olim ipse in horto publico Patavii Horminû foliis rotundis obseruauit, quale deinceps videre non memini: à me culta & ab eo tempore obseruata, non solum minùs multò rotundis erat foliis, sed etiam ramis longioribus. Icon Tabernamont. & alia Camerarii, multum quoque differunt. Placet præ cæteris, quæ apud Dod. & Lobelium.

Nomina &
Synonyma

Græci ὀρνίς, Latini, ut Matthiol. Anguill. Tom. III.

Lob. in Adu. itémque Obs. pag. 300. & Icon. Plant. p. 555. Dod. Tab. & Camer. in Epit. Matthiol. Horminum vocant: Horm. Matthioli H. Lugdunen. pag. 964. Horm. sativum Camer. hort. Horm. sativum & hortense Camer. apud Matth. in Hist. germ. & Dod. gall. Satiuum i. Schövenckf. i. line sativum C. Bauh. phyt. Domesticum & sativum idem apud Matth. Geminalem nonnulli. Hormini pulchram speciem, & Orminum sine aspiratione nonnullorum, itémque Pformium Galeni, Gesneri hortus. Germani Garten scharlach & Römischer scharlach/ itémque welsch tag vnnd nacht: Itali Hormini. Dictum autem & Horminum, ut nōquā impetu agi instinctuque ferri & cieri in venerem, quod apud tūcā sūmā mēsuā, ut loquitur Dioscorides, ad Venerem stimulet.

Locus

Copiosè crescere dixit Camerarius in agro Senensi, sed copiosius in Apulia, Illyria, & in Lesena insula, atque vniuersa Græcia. Nusquam nisi in hortis cultu herbariorum à me visum verum Horminum, Genæ, Lugduni & Basileæ, ubi in horto publico mense Februario virebat, cuius folia cum nascerentur, mense Martio, erant rotunda. Monhelgardi floruit Iunio & Iulio.

HORMINVM COMA RVBRA.



Similis est Hormino comâ purpuro-violacea, caulis suis quadrangulis, tripartitis, hirsutis: foliis prioribus ex longis pediculis, Saluæ accedentibus: itémque pet caules verticillis: At floribus differt minoribus, summitatibusque caulium tubris, ac odore nullo insigni.

Descriptio

Visa mihi primùm hæc planta in horto culti-

Locus &
Tempus

tiss. D. Friderici Meier Argentinz, florens Iulio:

GALLITRICHVM SATIVVM: CAP. XCV.

Sativum Gallitrichum ad cubitum alterum sexerescit, & altius, caule quadrato, minimifere digiti crassitudine, rigido, hirsuto, medullâ albâ pleno, in oppositos ramos ex intervallis coniugatim fisso: quâ etiam serie & rami in alios minores deinceps abeunt: flores spicati ex multis compositi verticillis, Saluæ floribus persimiles, cucullati, colore cæruleo in album vergente, ex striatis pyxidulis, tactu glutinosi, quaternis semina cludentibus lubrico leuore perpolita; alterâ facie gibbosa; alterâ angulosa, coloris rufescentis: folia ex aduerso bina sita, rugosa, Aethiopidis, minùs villosa: radix lignosa. Odor totius plantæ vehemens, sapor amarus.

Descriptio

Varia de
Gallitricho
opiniones.



Syn. in.

Quodnam
huius plantæ in
Diosc. propriū
sit nomē, haud
dum conueni-
tur inter au-
ctores. Tragus,
persuadet sibi
Gallitrichum
hoc nostrum,
eam esse her-
bam quā Dios-
corides Sideri-
tidem Hera-
cleam, seu Her-
culeam appel-
lat. Trago &
Dodonæo gall.
inscribitur
Gallitrichū: vt
& Gerardo, &
Camer. hort.

Gallitricum siue Sclarea H. Lugd. p. 966. quæ cum
cunctis aliis excurrit, qui semē huius nigru esse cō-
tendunt. Gallicentrum officinarum & Herbario-
rum vocatur à Cornario: Gallitrichon Tagault. l.
2. cap. 19. de Purg. Gallitrichum hortulanum à
Constant. Plateat. & multis ex Neotericis scrip-
toribus: Horminum satium officinis & herba-
riis, notum à Corn. horm. satium 2. & Salvia
Turcica transmarina Ruellii à Sch. venckf.
Horm. 3. siue Sclarea dictum à C. Bauh. phyt.
Hormini Oldingeri, Sclarea vulgò dictæ, species
satia à Gesn. hort. Horm. silu. Sclarea vulgò nun-
cupata à Clus. Pann. sine icone: ab eodem in Hist.
post. horm. silu. cum icone. Orminum à Lon-
nic. qui duas figuras habet: Orm. satium à
Fuchl. qui de comp. med. lib. 2. Taderi Auicennæ
vocat: Orminon hortense, *gallitrichon*, Garten
Scharlach à Gesn. in cat. pl. Orminum sat. malè
Gallitrichum appellatum à Cordo in Diosc. Sla-
rea à Matth. (qui et si sciat Dioscoridis hormi-
num non esse, tamen horm. maius & odoratum
cognominat) Anguill. Camer. in Epit. Alois. su-
pra exam. Brass. Turn. & Tabern. in Ic. & Hist.
Sclarea Matthioli à C. Bauh. apud eundem: Scla-
rea à Lob. in Adu. ac Obs. p. 300. & Ic. Plant. p.
556. Oruala a Do 1. lat. de flor. & in fol. (cui &
Orualia dicitur) ac Gesn. in cat. pl. Oruala, aut
Tota bona olitorum, & Sclarea Italorum à Ruel-
lio: Sideritis heraclea odorata hortensis, à Fra-
cast. de morb. contag. itemque herba S. Iohannis
Alektorolophos à Gesn. in cat. pl. Bezomo à qui-
busdam, referente Trago: à Germ. Scharlach/
gemein Scharlach/Garte Scharlach & Schar-
lag: à Belg. Scharleye: ab Ital. Sciraria: à Gallis
Oruale & Tarte bonne: Ebrodunensib. du l'Oruo: ab
Angl. clarye: ab Vngaris Zent Janos siue, h. e. S.
Iohannis herba, vocatur.

Nomina
linguarum

S. Iohannis
herba.

Locus &
Tempus.

Vires &
Vfus.

Vinum.

Seritur in hortis & viridariis: translatum re-
cens, aut satum primo anno caulem non fert, &
secundo à satione, maturato semine, interit: Iu-
nio ac Iulio florens: Basileæ & Genevæ adhuc
Novembri, & virens Ianuario: ceu etiam Patavii
Lugduni & Monspeli, obseruauit.

Cæterum, calidæ & siccæ est temperaturæ, au-
thore Trago, & resoluendi, extenuandi, expellen-
diq. vim obtinet. Vinum Gallitricho imposito,
si efferbuerit, & decoctum fuerit, apprimè sto-
machi frigiditati conuenit, nam phlegmata inci-
dit, & consumit: idem potum frigidis & infecū.

dis ac albis mensibus laborantibus mulieribus
subuenit. Sunt qui Gallitrichon capiti, ob odo-
rem quem habet grauissimum, noxiū esse dicti-
tent, id quod facie concesserim, sed ita demum
cū quis intemperantiū hoc vini genere vīus
fuerit. Sed certè sulphurata illa vina longè
magis nocent, quàm omnia alia ex quibuscun-
que herbis confecta. Id licet experientia testetur,
nemo tamen non vinis sulphureis detestando
suffitu infectis vitur, neque quisquam, quæ est
humani iudicii prauitas, his deliciis carere vult.
Gallitrichum in puluerem redactum, & naribus
inditum, sternutamenta prouocat, catarrhum tollit
& cerebrum purgat. In aqua decoctum in defec-
tionibus mulierum vtile ad trahendos menses,
secundinas & alia id genus non aliter atque Di-
ctamnū. Folia ex aceto imposita, panos per se,
vel cum melle discutere dixit Matthioli: item
furunculos antequam acuminentur. Dodonæus
calidam & siccam ordine tertio statuit, ac men-
ses modo quouis sumptam mouere, ac secundas
eicere: Oruala ac Hormini quauis specie, calo-
re & viribus potentiorē esse: Sch. venckf. me-
deri epilepsiæ & suffocationi matricis. Crato
inter alia sua *herba* commendabat, in suffoca-
tionibus vteri & similibus affectibus vnguen-
tum ex Sclarea, cum butyro coctum, cui adii-
citur aliquid gummi exotici Takamæ, quod
umbilico imponendum. Nunc testibus Ant.
Mizaldo, Ambros. Paræo, Fab. nildano, & aliis,
semen Gallitrichi satium vtile traditur, ad exci-
tiendam oculorum caliginem, & educenda cor-
puscula ea, quæ in illos inciderunt, vt sunt are-
næ, festuæ, segmenta, & similes sordes: in ocu-
lum siquidem immisum granum vnum (tria
imponit Paræus) & multâ reuolutione circa bul-
bum eius circumductum, tandem humore præ-
gnans, & sordibus onustum, non sine fructu,
modò non adhæreat vehementer membranis,
elabitur, id quod experientiâ multoties com-
probatum est, & non omni penitus ratione de-
stituitur. Similis enim in oculo lubricitas id mu-
cilaginosum reddit, & extranea illa ei adhærere
facit.

Fertur si semen in puluere sumatur, cum aliquo
potu aut cibo, ad recuperandam memoriam mi-
rabiliter conducere, teste Gratarolo. Semen, in-
quit Lobelius, *capit*, capitulæ grauitatem in-
ducit, odore, quem etiam vniuersa spirat planta,
non tamen ingrato: eoque magni vsus quibudā
Septentrionalium ad Zyti, Bieræque confectio-
nem. Lupuli namque vel penuriâ, vel vegetio-
ris potionis faciendæ causa, cortinis feruentibus
addunt; sitque temetum, quo non multis deple-
tis poculis remulenti fiunt, hilaritate propemo-
dum insanā: in nonnullis tamen, miseratione
quàm risu magis digna. Venerem stimulat.

GALLITRICVM EXOTICVM FLORE
magno albo.

CAP. XCVI.

EXotica planta Bisermas, nostram Scla-
ream satiam totâ facie egregiè refert, *Delcriptio*
caulibus quadratis, pilosis, nonnihil tactu as-
peris, in fréquentes alas aduerso situ coniuga-
tim positas diuisis: folia Sclarea nostratis, infi-
ma priora parua, oblonga, sequuntur deinde am-
pla, rugosa & hirsuta, odore suauis Ocymi, poli-
tu Scla-

ru Sclaree, qualis etiam est situs



florum in spicis longiusculis per interualla verticillatorum, quibus bina sepe subiecta similiter folia acuminata & cœcaua, coitu labrum efficiunt: cæterum flores ex lœgis, striatis, lanuginosis calycibus emicant suauolentes, Sclaree, sed colore lacteo, labello punctulis paucis introrsum guttato, prominentibus sub galea staminibus incuruis, vno coccineo re-

liquis duobus argenteis, ochreos sustentibus: semen simile Gallitrico satiuo, sed paulò maius, vna parte gibbosum, altera ferè triangulare, coloris varii, ex nigricantibus & rubentibus maculis oblongis.

Bisermas

Bisermas Hormino nostro vulgari, vel Sclaree dictæ congener facit Camerarius hort. Horminumque Syriacum vocandum censuit, eò quod ex Syria per D. Bernh. Paludanum primò delatū sit. Et hinc C. Bauhin. apud Matth. & in phyt. Horminum Syriacum quoque denominauit, & a. Horminum fecit.

Camer. autem nomine Bisermas semen communicauit, quod satum Montbelgardi in horto M. E. C. feliciter prouenit, & Iulio, Augusto & Septembri floruit. Idem aliquando mihi inueni plantā Stutgardie in horto D. Gerardi Vicecancellarii demonstrauit, & Aman Syriacum cognominauit. Aman etiam nomine, sed Aegypti nominati, semen dedit Zvingerus. Ab Agorio habui Hormini Cretici titulo.

Aman Syriacum.
Aman Aegypti.
Horm. Creticum.

GALLITRICHUM SILVESTRE VULGO,
sive silu. Sclarea, flore purpureo,
cæruleoque magno.

CAP. XCVII.

Descriptio

Hanc plantam videre est interdum cubitos duos adæquantem, caule quadrato & hirsuto, inani, in alas diuiso: folia quàm Hormino satiuo veriori maiora, squallida & veluti siderata, quædam nonnihil linuata & serrata potissimum prima, quæ breuiora, ex longioribus pediculis, alia ad Saluæ magis accedentia, odore graui, sapore aliquantulum aromatico: flores in longa spica gestat cæruleos & purpureos, magnos, Saluæ florum formâ: semen nigrum: radix lignosa, odorata. Flores Scarleam redolere ait Lobelius: Icon est ex Clusianis.

Synon.

Gallitrichum vulgò vocat Cæsalp. ac Alektorolophon Plinii credit, multòsque Veronicam rectam putare scribit. Gallitrichum silu. Corn. & Lonic.

Centum gallinæ aut Galli centrum appellat Tom. III.

Ruell. taxatque idem officinas; quodd perperam Gallitricum appellant, aliqui verò etiam



Gallitrichi varietas.



Tabernamont. & quam posuerat Tab. pro Sclarea siluestri, dat Gerard. pro Colo Ionia. hort. Lugd. proponit quidem duas icones, pag. 965. non tamen diuersarum plantarum ait, Horminū silu. Matthiol. & Horm. silu. Fuchsi. Ad normini siluestris classem, Gallitrichum hoc silu. nostrū, cum nonnullis aliis stirpibus, de quibus post hoc scribendum erit, Clusius quoque referendum censet.

Lobel. in Aduers. p. 240. Obs. p. 300. Icon. Plant. p. 556. & hist. Belg. p. 617. pro suo Hormino silu. ponit figuram Clusii folio non laciniato, licet in Adu. dicat foliis aliquantulum laciniatis oris, Blatteriarum similitudine. An Dodonæo Gallitrichum flore minore?

C. Bauhin. phyt. Horminum 6. sive siluestre alterum caule purpurascens.

Et hi sunt, quod mihi quidem constat, qui Gallitrichum, Horminum siluestre pronuntiant. Sed horum sententiam minùs probat Matth. in prior. com. qui tamen & ipse in post. com. hanc suam censuram omittit, ac Horminum syluestre vocat, fo-

Li 2

Saluam transmarinam, vel Romanam: sed Alektorolopho dici penitus non mereri testatur: asserit enim esse Orminum siluestre.

Sed & Cord. in Dioscor. quoque credidit recentiores inexcusabili errore Callitrichon vocasse, ac idem Orminum siluestre malè Gallitricum appellatum nominauit. Orminū silu. Lonic. Orminon silu. Gesner. in cat. Pl. Orminum alterum silu. Fuchsi. Horm. silu. Camer. in Epit. & Hist. germ. Matthiol. flore cæruleo in Horto: Hormin. silu. Matthioli & Lobelii Schvve. Horminum silu. maius flore cæruleo & rubicundo Thal. in Harc. Horm. silu. à Patauinis pro Betonica usurpatum Anguill. Horm. silu. & Oculum Christi, Gerard. qui ponit iconē

Exter. v. centurionum.

Betonica.

Oculus Christi, Gerard. not.

Icon. Loh.

Horm. silu. alterum. C. Bauhin. not.

Icon.
Marb.

Error quo-
rundam

Sideritis
Heraclea
Salarea
filu.

Nomina
ling.

Tota hinc

Locus

Tempus.

Vires & V.
sus.

lio Sclareae ferè simili: caule sesquipedali, aspe-
ro, quadrangulo, leuiter hirsuto, striatoque: flo-
re Saluiz, colore purpurascens: siliquis pluribus,
in humum reflexis, semine rotundo, fusco colore,
Gallitricho pallim vocato, haud longè ab simili
pregnantibus. Icon autem eius proponit Galli-
trichum siluestre folio non laciniato flore ma-
iore. Longè denique aberrare vult eos, qui pro
siluestri Saluia, agrestem Sclaream vsurpant. Scla-
ream statuit esse Sideritim Heracleam praten-
sem Fracastorius. Et hoc quidem contra Ruel-
lium negantem & volentem esse Horminum.
Sclaream siluestrem dixit quoque Marcell. Fici-
nus, Cæsalp. & Tabern. qui & Matri-Saluam co-
gnominant: Sclaream silu. flore caeruleo Thal.
Sclaream alteram siluestrem flore caeruleo Gesn.
hort. Saluiam denique agrestem cum Brunfels.
aut siluestrem cum Trago [qui etiam Callitricon
agreste, & Ambrosiam quorundam appellat,] qui
inscripserit, habeo neminem.

Græcè dicitur *ἡλιότρον* & *ἡλίανθος* multis: Germanicè
Wilde Scharlach Fuchf. Gesn. Wilde Salbey i.
e. Saluia siluestris, Brunfels. & Trago: Türkisch
aut Römisch Salbey, i. e. Turcia aut Romana
Siluia Schwenckf. Gall. *Toute bonne sauvage*, i. e.
Tota bona siluestris: Ital. *Schiaria*, ni fallitur An-
guillara, saluatica, & *Hormino saluatico*: Angl.
Wilde Clarie.

Secus itinera in agrorum limitibus, in collibus
iuxta cultos agros litis, & capestribus provenit,
vel Trago teste. Fuchsius passim omnia prata
exornare scribit, Iunio mense floribus & semine
pregnans.

Iners, & nullius facultatis esse videtur Dodo-
næo. Matthiolus tamen omnia ea præstare credi-
dit, quæ de domestico scripta perhibentur.

Gallitrichum siluestre flore maiore albo.

Descriptio

Hæc Gallitricho siluestri, flore purpureo,
caeruleo, magno, similis quidem est, sed
floris colore variat, qui prorsus niveus est,
folia etiam incana, non virentia, in reliquis con-
veniunt.

Synonyma

Gesn. hort. dicitur Sclarea altera siluestris
albo flore. Tabern. Icon. & Hist. Sclarea sylu. flo-
re albo. Huius iconem proponit Gerard. pro Hor-
mino siluestri. Thal. Horminum siluestre maius,
flore nonnunquam candido, sed rarius. Camer.
hort. Horminum silu. flore albo. Clus. Pannon.
p. 580. Horminum silu. quartum nunc flore: In
Hist. post. Hormini silu. quarti species altera. C.
Bauh. phyt. Horm. 6. siue siluestre alterum, caule
purpurascens, flore albo, foliisque incanis.

Locus &
Tempus

Et sic Camer. frequens in Sueniæ quibusdam
pratis, absque ullo ferè flore per Æstatem, sed
Hieme caeruleo, Lupuli odore, obseruauit. Clu-
sius inuenit Maio mense in siccioribus pratis,
Sopronio Pannoniæ vicinis, unicam plantam,
quam erutam Viennam deferrebat, in D. Aichol-
zii hortum, ubi aliquot annis permansit, & de-
ciduo semine multiplicata est, atque aliis com-
munis facta. Ego reperi in pratis itinere l'Isle in-
ter Longeville & Bauans: in Tigurina ditone
prope Bârensee florens Maio: Nos Montbel-
gardi non longè à molendino obseruauimus.

GALLITRICHYM GLABRUM, FOLIO
Saluiz, flore purpureo **CAP. XCVIII.**

Siluestri Gallitricho vulgari est persimile: fo-
lia ex opposito ad caulium nodos nascuntur,



rainora mul-
tò & angustio-
ra quàm vulga-
ti Gallitrichi
sylvestris, ali-
quatenus ad
Saluiz acce-
dentia, nisi
q uod in ambi-
tu serrata, &
veluti circum-
rofa, sine pili s,
quamuis parte
inferiori sint
albidiora paul-
lò, quàm in su-
periori: *florum*
crebri verticil-
li spicam effor-
mant, purpuro
violacei, mino-
res quàm iam

dicti sylvestris Gallitrichi: subiectis unicuique
verticillo, binis breuib, latiusculis foliis, non-
nihil etiam caeruleis.

Icon ex planta sicca pictori delineanda fuit. **Icon**
Non placet autem ab eo hinc adiuncta radix, &
caulis racemosus ex imagine Clusii huc non per-
tinente.

Lobel. in Aduers. Verbascom nigrum Salui-
folium purpureo flore: vt & in Obleru. vbi illis
addit. Matthioli. Clus. in Pannon. p. 581. vocat
Horm. silu. quintum Saluiz folio, refertque p.
584. rhizotomas mulierculas Austriacas, wild
salbey, h. e. Agrestem Saluiam appellare, vulgo-
que venalem proponere. In Hist. post. Hormini
silu. quinti speciem priorem.

Vbiq; circa Viennam Austriæ nascitur, tota-
que Pannonia, secundum vias, in agrorum, vine-
torumque marginibus, integrè Æstate florens, &
subinde semen proferens.

Locus &
Tempus

GALLITRICHYM SYLV. COMA VIRESCENS.

CAP. XCIX.



Quam Gal-
litrichum
silv. flore ma-
gno maiori al-
titudine excres-
cit, caule qua-
drangulo vt re-
liquæ species, &
foliis ad singula
genicula ex ad-
uerso nascenti-
bus: sed eius ex-
tima pars non
purpurascit, ve-
runt virescens
est: flores camer-
si formæ similes,
dilutioris sunt
coloris: folia in-
feriora maiores
habent incisur-
as, vt nonnihil
laciniata

Descriptio

Synonyma lacinjata videantur, reliquæ notæ conveniunt.

Clus. descriptionis author in Pannon. p. 180. appellavit Hormini silu. quartæ alteram speciem, & norminum silu. 4. dilutiore flore: In h. post. normini silu. 4. speciem tertiam.

Ita Clus. C. Bauhin. phyt. norm. 7. siue sylvestre 3. caule virenti: norm. silu. 4. Clusii, sine icone. Ego in hist. post. Clusii iconem sub titulo normini silu. quartæ specie prima exhibitam huius esse speciei puto, & per Typographum transpositam.

Locus. Passim in silvis cædis, montanis pratis, viorumque marginibus spontè nascitur cum prima [Gallitricho silu. flore magno] non modò in Pannoniis & Austria: sed in Bohemia, Moravia, tota Germania, & aliis plerisque provinciis, florens Maio, interdum etiam Iunio.

Tempus.

GALLITRICHVM FOLIO ROTVNDIO- re flore magno violaceo.

CAP. C.

Descript.



Hormini flore violaceo nondum descripti nomine, dedit nobis Argentor. D. Ageri^{us} pulchrum Gallitrici genus. Huic erant folia quædam brevissimo pediculo appensa, vngue inferiore minora, alia longioribus periculis dependentia, maiora, maxima verò vncias fere duas lata, & tres pe-

næ longa, ovalem formam non malè representantia, quædam etiam rotundiora, in circuitu serrata, Betonica modo, glabra: caules quadranguli: flores magni, violacei, hiantes: calyces deorsum nutantes, verticillati.

In montium Tyrolensium pratis altis expandere folia indicabat D. Agerius.

GALLITRICHVM FLORE MINORE purpurascente & rubro.

CAP. CI.

Descriptio

Viuaci radice multos perdurat annos, sylvestri Gallitricho affinis planta, odorata, facie non ita dissimili, caule, foliis, crescendique modo: at flores ita parvi, ut vix extra calycem promineant, purpurascetes, nonnihil hiantes, cum in vulgari flores magni sint, galeæque magnæ prominentes apices multos condant: calices deorsum nonnihil reflectuntur, breviores quàm normini verioris. Idem Gallitrichum floribus purpureis minoribus: foliis profundè satis laciniatis, diuisis, nonnihil hirsutis.

An Dod. H. flor. & lat. in fol. Orula secunda. An Lobelio in Aduers. Verbascum purpureum Erucæ folium?

Basileæ in horto D. Felicis Plateri florebat

mensè Iunio. *Locus & Tempus.* Nobis Montbelgardi viuaci radice multis perdurat annis, florete incipiens Maio, semen maturas Iunio & Iulio. In Italia vix aliud obseruauit D. Agerius.



GALLITRICHVM FLORE MINI- mo albo.

CAP. CII.



Plura humi spargit folia, longo pediculo donata, crassa satis & rigidiuscula, Betonicae æmula, sed ad pediculum nullo sinu prædita, obtusa, crenata, pilis albis per venas obita, inodora. Caules modò singulares, alia plures, quadrangulares, hirsuti ex longo intervallo in ramulos op-

Deser.

positos diuisi: ad quorum exortum folia quoque bina opposita longo pediculo enascuntur internis planè similia. Flores verticillati digesti per intervalla summitates occupant, odorati, exigui, & vix ex calycibus prominentes, albi. Quorum verticilla singula sustinent foliola parua, in acutissimum apicem terminantia & radix oblonga, exiguis fibris donata, nullo gustu notabili prædita.

An norminum minus Supinum Creticum Clusii?

Ex semine à genero Cherlero ex Italia allato in horto Ill. E. C. satum Vere, floruit Iunio, & deciduo semine se propagauit. Perit ubi caules protulit.

GALLITRICHIS AFFINE MARV, SI NON genus aliquod, Selarea Hispanica Tab.

CAP. CIII.

A Nno 1595. Iulii principio demonstrauit D. Höchsteter Pfortæhemiz in hort. D. Soceri

herbari nomine Maru celebrem, foliis spissis, sine manifesto sapore. Incipiebat autem tunc floridam comam depromere. Clusius, cuius iconi, quā proponimus, folia optimè respondent, sic describit. Hormini silu. quarti quinta species, Hispanico semine Viennæ Austriæ nata, illi [Gallitricho flore paruo rubro] non valdè dissimilis: etenim caules habet non minùs altos, quadrangulos, nodis cinctos, villis quibusdam obritos, & folia in singulis nodis fere similia, paulò tamen duriora, laxiora, angustiora, angulosa quodammodò, mucrone magis obtuso, & laxioribus dentibus prædita, præsertim quæ secundum radicem nascuntur: è cauliculis, in extremo caule, summisque ramis verticillatim nascentibus, & veluti in spicam desinentibus, emergunt flores reliquis speciebus longè minores, Lauendulæ florum fere æmuli, nec colore ab illis valdè differentes: quibus deciditibus succedit semen nigrum: radicem habet superioribus similem: & tota planta simili cum reliquis odore prædita.

Synonyma Vocat Clusius in Pannon. p. 580. Horminum silv. 4. Lauendulæ flore: p. 582. Hormini 2. speciem tertiam: p. 584. Horminum semine ex Hispaniis Baccharis nomine misso natum. In Hist. post. Hormini silu. 4. quintam speciem.

Sclarea Hispanica Tabern. Tabernomontani Sclarea Hispanica, Sclarea Romanæ similis, paucioribus ramis, caulibus quadrangulis, foliis magis glabris, & magis acutis, firmioribus, floribus Lauendulæ quodammodò similibus; Maru nostro foliorum firmitate respondet, licet icon nonnihil diuersa videatur.

C. Bauh. phyt. vocat norminum 3. siue silu. quartum Lauendulæ flore: Clusii Hormini 2. speciem tertiam (i. Pannon. sc.) sine iconē. Sed cur C. Bauh. dicat esse sine iconē, me later: est enim p. 582. vt iam annotatum.

C. Bauh.

Nascitur spontè in Anglia satis frequens ad regis arcis Grenvicii hippodromum Septembris initio cum florens, tum semine onusta. Hispanico semine Clusio Viennæ Austriæ nata, florebat Iunio.

GALLITRICHIO AFFINIS PLANTA, Horminum silu. latifolium Clusio. CAP. CIV.

Descriptio



desinentia, rugosa, & ad pediculi vncialis, vel ses-

EX radice pollicari, plurimis fibris longiusculis donata, ex qua plura capita, caules edic prociduos, quadratos, copiosa medulla albâ fæctos, insigniter hirtutos: cuiusmodi etiam sunt folia, quæ ex caulium geniculis bina ex aduerso oriuntur Marrubii, subrotunda, in mucronem exiguum mox

quiuncialis commixturam falcata: inferiorum ceterum foliorum pediculi multò etiam longiores: Ad foliorum verò exortum auriculæ quædam velut fœturæ adnascuntur, modò v-nica, modò duæ: flores in caulis fastigio sæpè rubente & in paucis breuibufque alis similiter rubentibus verticillatim sine villo foliorum interiectu, breuibufque intervallis dispositi spicam deformant, perquam numerosi, Lamii parui, cæruleo-purpurei, galericula exigua apicem albam occultente, labello in binas lacinas diuiso, è calyculis oblongis, subrubentibus, hirsutis, striatis prominuli, pediculis atropurpureis hirtis: deciditibus stoculis in calycibus sunt semina quatuor oblonga subrotunda. Sapor plantæ nullus notabilis.

Clus. in Pannon. p. 577. & p. 578. Horminum silu. 1. siue latifolium alterum vocat: in Hist. post. Horm. silu. tertium: Horm. Sclarea foliis minùs incanis & odore minùs graui, floribus purpureis, Lauendulæ vix maioribus. C. Bauh. phyt. Horminum 5. siue silu. latifolium. Schvvenck. Horm. silu. 2. murale Sclarea, vider matver & Charlesch.

Synonyma

An Camer. hort. Horm. silu. fermè abique villo p. Æstatem: flore sed in hieme paruo cæruleo, Lupuli odore, simile secundo, quod Clus. in Pannon, depinxit.

Prouenit mihi Montbelgardi in horto Ill. E. C. florens Iunio Iulio & Augusto: hiemem pertulit, & semine se propagauit: multis etiam annis durauit. Inuenitur, inquit Clusius, passim Viennensi agro iuxta vias, in montanis pratis circa Mariæ cellam, & S. Crucis Abbatiam, supra Badesches thermas, & plerisque Alpestribus Austriæ atque Stiria locis:

GALIOPSIS SPECIES LVTEA, VISCIDA, odorata, nemorensis. CAP. CV.



INsigniter fibrosa radice nritur, multos inde caules surrigens bicubitales, & altiores, quadratos, hirtutos, fangosa medullâ fæctos, in alas brachiatos: folia è geniculis exeunt opposita, longis pediculis hirtutis appensa, Ari modo alata, sed Lamiorum instar rugosa & hirsuta, essi multò maiora, in ambitu serrata, nonnulla interdum per margines aspersa saturâ rubedine: flores in longis spicis verticillatim ramos ambiunt: foris hirtuti, intus glabri, labello tripartito, mediâ laciniâ fimbriatâ & crispâ, colore foris ex albo luteo, intus obsoletis notis maculoso: superius verò folium, seu galea, foris guttarum, intus luteum: è rictu medio prodeunt stamina alba: insident autem flores calycibus oblongis striatis, viscidis: in quibus succrescit postea semen: tota planta tactu viscida est, odorata, sapore nullo insigni.

Varia

Synonyma Varias hæc adepta est appellationes. Nos quidem, quia apud Dodonæum de Florib. à Dalechamptio propria manu legimus annotatum, esse galiopium luteam, viscidam cognominavimus, & maxime ut amphibologiam vitaremus: alia siquidē est præter hanc galiopsis lutea nūcupata. Propter viscositatem verò quidam Pulicariam nominant. Dod. de Flor. & H. lat. in fol. Orulam tertiam, Horminum luteum, & Horm. Tridentinum à plerisque appellatum. Lobel. in Adu. Colum lous folio Vitiæ, aut Hormini, Galioplin recentiorum. In Ic. Plant. pag. 557. & Obs. p. 301. Colum lous, Horminum silu. pingue quorundam. Clus. in Pannon. p. 57. Horminū silu. 3. In hist. post. secundum. Cæsalpin. Melinum vulgò, aliis Meligo. Gesn. lib. 3. epist. ad Zwving. Orminum luteum, Herbam pinguem flore luteo, Italorum quorundam Cerinthem, & Germanorum Flöstrant h. c. Pulicariam, quod foliis per cubicula sparsis, cum pingua & viscosa sint, pulices adhæreant, & facili simul euerantur.

Tab. 8. Gerard. 100. An huc sit referenda Salvia alpina Tabern. me latet: descriptioni ieiunæ, in qua ei tribuit flores purpureos paucā fides tribuenda. Gerard. ponit pro Colo lous iconem Sclæræ silu. Tab. quæ non respondet Colo lous.

C. Bauh. phyt. Horminum 4. siue luteum glutinosum, Scaphis Plinii quibusdam. Item Salvia 3. siue Salvia alpina Tabern. ex Lonicero: Hormini species. In animad. in H. Lugd. Galiopsis lutea Dalechamptii p. 1246. dicitur esse Lamium luteum: ego verò suspicor esse Colum lous, inquit C. Bauhin. Hist. Lugd. Colus lous Lobelii: Galiopsis lutea Dalechamptii: Phlomis Lychnotis altera Syriaca Lobelii.

Locus & tempus Monspelii circa montem Esperon reperi florentem mense Octobri: in Rhæcia non longè à balneo Fidris Iunio: propè wallenstat Iulio: in montibus prope Basileam Octobri: Genevæ germina protrudentem principio Aprilis in colle La bazie. Per vniuersam Pannoniam ad radices montium obuiam dicit Clusius: in hortis apud Belgas feri Dodonæus. Scaturigines, vdsque siluarum margines Galliz, Germaniz & Italiz amare Lobelius.

Vires Facultates eius nondum à quoquam exploratæ sunt, præterquam quod Gesnerus eam calefacere, emollire ac discutere crediderit.

ÆTHIOPIS VETERIBVS ET IN GENERE. CAP. CVI.

Descrip. **A**ethiopis, auctore Dioscoride, folia habet Verbasco similia, sed valde hirsuta, & densa, in orbem circa radicis imum: caulem quadrangulum, crassum & scabrum, similem Apiastro aut Arctio, multis alis concavum: Semen Erui magnitudine geminum in vno conceptaculo: radices ab eodem cespite multas, longas, crassas, gustu glutinosas. Quæ siccate nigrae ac duræ sunt, cornibus similes. Plurima nascitur in Messenia ac Ida. Radix cocta ac pota ischiadicis, pleuriticis, sanguinis sputo, arteriæ asperitati auxiliatur, sumitur etiam cum melle in eclegmate.

Pinus Eadem prorsus Plinius habet, ut ex Dioscoride transcripsisse videatur. Galenus in simpliciū censu Aethiopidem præterit. Quæ Paulus de ipsa retulit, ex Dioscoride transcripsit. Quin &

Ruellius recenset; quæ Diosc. & Plinius scripserunt.

Aethiopidi porro herbe nomen dedere magice vanitates, teste Plinio, quod sc. amnes ac stagna sicari huius coniectu, tactu clausa omnia aperiri, somnariit Asclepiades. Somnariit, inquā, nam si vera sunt, ut Plinii verbis utar, nonne factius fuisset Aemilianum Scipionem Carthaginis portas herbā patefacere, quā machinis claustra per tot annos quaterere? Siccentur hodie Aethiopide [Meroide] Pontinæ paludes, tantum agri suburbanæ reddatur Italiz. Verisimilius itaque erit Latinos Græcum Aethiopidis nomen serualle, ab Aethiopia sc. regione, in qua nasci gloriabatur: Vel quod fuliginosa & veluti cinere aspersa sit: *αἴνη* enim fuligo est, siue fauilla adusta.

Ceterum, Aethiopidem quamvis ignotam dixerit Cornarius, non desunt tamen, ut Matth. Anguill. Dodon. Lobel. Amat. Cæsalp. Castor, Schvvenckf. C. Bauhin. & alii, qui eam agnouisse videntur.

Hesperim, Violam albam, Persicam hermodai, si radicem haberet nigram, & instar cornu durum, facile dixerit Aethiopida Tragus.

Eorum opinionis esse non vult Anguillara, qui in insula Candiz oallitrichum satium Aethiopidem vocant.

ÆTHIOPIS MVLTIS. CAP. CVII.



Descriptio **F**olia per terram primò spargit palmo latiora, haud multò longiora, tenera lanugine ceu carptā suprā infraque vbertim obducta, alioqui Sclæræ satiaz non multum dissimilia, sinuosa, quædam etiam laciniata: inter hæc caulem profert foliis contumilibus, sepe minoribus, stipatum, quadratum, pariter villosum, multis alis concavum: in quibus ad nodos, flores verticillati, duorum foliorum acuminatorum complexu Hormini modo obualati, candore niueo, vno folio cuculli instar surrecto, compresso, apices luteos, stilumque argenteum è sinu proferente, labro Cotulæ instar concavo, ex calyce oblongo quinquepartito, quem circumquaque tam densa obregit lanugo, ut vix conspici possit: odore est fetido, Lamii vel Galeopsis: radix fibrosa: semina in singulis vasculis quatuor Hormini seminibus similia, fusca, lubrica, triangula.

Matthiol. (qui Roberto Constant. teste olim scripserat incognitam, in post. verò comm. eius ostendit effigiem) Amato, Anguill. Dodon. Gesn. Cast. Lob. in Adu. Obs. pag. 304. & Ic.

Plant. p. 466. Lac. Lonic. Camer. in hort. & apud Matth. Tabern. & Hist. Lugd. p. 1306. Æthiopis: Schvvenckf. *Albus* Dioscoridis: C. Bauh. Æthiopis 1. siue foliis sinuosis. Æthiopidis verò eius secundæ, siue foliis in profundas lacinias diuisis, qui meminerit, non habeo vllum. Æthiopidem Monspensulan Cotoniariam vocant: Germ.

Cotonaria. Mohrenkraut: Itali *Etiopæ* & *Etiopide*.

Locus &
Tempus

Copiosè provenit in Græcia & Illyria, unde ad nos primum delata. Nobis Montbelgardi in horto Ill. E. C. ex semine Surgardie in horto Ducis collecto nata fuit: semen maturabat Iulio & Augusto. Primo anno caulem non ferebat, secundo autem semine deciduo se propagabat, & peribat. Patavii observavi virentem in horto publico mense Februario.

MARRUBIUM IN GENERE.

CAP. CVIII.

Marrubium duplex
Diosc. &
Theoph.

Marrubium Dioscorides duplex assignat: Album quod *αλευρον* dicitur, & Nigrum, quod *βαλλον* & *αλευρον* nominatur.

Sed & Theophrastus duo quoque genera tradit. Aliud, inquit, folium herbidum (*πυκνόν*) habet magis serratum, incisuraeque profundiores, valde manifestas, quo vnguentarii uti ad nonnulla consueverunt: Alterum verò rotundius, & squallens (*ἀχμῶδες*) vehementer, ut *τὸ σπαραγιόν*, incisuraeque habens obscuriores, minusque serratum.

Ceterum, Ruellius primum Theophrasti Marrubium folio herbaceo, officinas Prasion viride nominare testatur, comâ herbaceâ serratori, crenisque profundioribus, reliquâ parte candido simile, eiusdemque naturæ. Alterum verò folio rotundiore, candidum interpretatur, quamvis non desint, qui hoc Balloten, illud candidum appellant.

Prasion
Linistroph.
Philopada.
Philocha.
res.

Marrubium inter primas herbas plerique commendauere, quod Græci *αλευρον* vocant, alii Linistrophon, nonnulli Philopada, aut Philochares, notius quàm ut indicandum sit. Huius folia semenque contrita prosunt contra serpentes, &c. inquit Plinius, qui & ipse duo genera Marrubii, ex Castoris sententiâ proponit nigrum, & quod magis probat, candidum, quanquam eius sententiæ parum memor, nigrum Marrubium postea in Porrum nigrum commutauit.

Plin.
mutatur.

Prasium, inquit Amatus, Marrubium est Prasium verò Porrum, cuius inaduertentia Plinius sæpè in errorem labitur. Plinium itaque consummatæ lectionis & eruditionis authorem, perpetim (ut eius verbis utatur Constantinus) aut ut Varronis, indefinenter vellicat Lusitanus, cæsum quidem & punctim petens, nequaquam tamen feriens, ut malus gladiator veteranum militem.

Aequiuoca

Nunc & hoc obiter indicandum recentiores Medicos quatuor Marrubii genera constituere Primum Marrubium album, siue Prasion. Ad quod reuocamus Marrubium candidum folio subrotundo: Item, Marrubium Hispanicum odore Stæchados Lobelii, Ocymastrum Valentinum Clusii. Et tertium Marrubium album angustiore folio. Secundum Marrubium nigrum siue Ballote quod duplex habetur: alterum foliis maioribus, alterum minoribus. Tertium aquaticum, quod, ni fallor, quidam pro Sideritide exhibent. Postremum campestre, vel agreste quod à nobis Stachys Fuchsi intitulatur.

Marrubii præterea nomine sequentes etiam donantur plantæ. Cardiacæ. Herba Venti. Meliphyllon. Vrtica. Melissa. Tragoriganum. Eupatorium. An Galeopsis angustifol. fertida. An Galeopsis minor folio caulem ambiente?

MARRUBIUM ALBUM.

CAP. CIX.

Descriptio



Caulibus cubitalibus, quadratis, canâ lanugine pubescentibus, tubulo peruis: ad quorum nodos folia nascuntur binæ ex aduerso sitæ, perquam rugosæ, subrotundæ, in ambitu serratæ, ex viridi albicantia, hirsutæ, sapore acti & amaro: ex quorum alis fasciculi numerosi verticillati: oriuntur, b. fidam cristam surrigentes, labello utriusque alati demisso, in calyculis albis lanuginosis. Semen subrotundum asperiusculum: radix fibrosa, nigricans. Tota herba Dod. suavis & grati est odoris, & nonnihil moschum redolet, præsertim hybernis mensibus.

Marrubii, seu Prasii Dioscoridei delineatio ad amissum huic nostro respondet. Frutex est, inquit, ab una radice multorum ramorum, subhirsutus, albicans, quadrangularibus virgis: folium pollicis æquale, subrotundum, hirsutum, ragosum, gustu amarum: semen per intervalla in caulibus est: flores velut verticula, asperi.

Est Marr.
Dioscoridis

Quodnam autem sit Marrubium hoc apud Theophrastum, authores non conueniunt. Ruellius & eum secutus Cæsalp. volunt eum hoc pro secundo genere describere. Dalechampius contra id eum intelligere credidit per prius: per alterum verò Dioscoridis Balloten, hoc ab illo discrepantem, quod plusculum ad virorem fuscum porraceum vergat, unde Marrubium nigrum vocetur, & odorem grauem, fetoremque vibret.

Cornarius primum Theophrasti Marrubium narrat officinas quidem viride Prasion vocare: attamen Prasii huius, genus alterum esse ait, & non id quod Ballote, nigrumque Prasion dicitur. Et certe D. Agerius huius Marrubii varietates communicauit. Dedit namque Marrubium in Marca Anconitana collectum, Germanico candidum, foliisque minoribus & ramosioribus. Et aliud maius, odoris suavis, Romanorum agrum inhabitans.

Est secundum
Marrubium
Thes.

Est prius.

Prasion
Græc.

Græci, ut Diosc. Theoph. & Galenus *αλευρον* appellât. Latini, ut Matthiol. Lobel. in Aduers. Cæsalp. & Dodon. Marrubium; Marrub. album Matthiol. in Epit. & Hist. german. cum add. Camer. Lobel. in Obs. pag. 278. & Ic. Plant. p. 517. H. Lugd. p. 961. & Gerardus: Marrub. candidum alterum & vulgare Tragus. Vulgare Clusii in Pannon. legitimum vulgare in H. post. Tertium & album vulgare C. Bauhin. Marrub. notius

Prasium
unde dicitur

hōrius quān vī indicandum : itēque candidū
Castori magis probatum Plinius. Marrub. siue
Prasium album Tabern. candidum Schvvenckf.
Mart. fœminam Brunfels. Prasium Anguill. &
officinæ. Videtur autem, inquit, Pena, prasi-
nus viror, aut certè virosus odor appellationem
dedisse Marrubio, tam nigro illi fœtido, quod
Ballote dicitur, quān albo huic & odoro. Inter
nothas voces & apud Apuleium eius & hæc no-
mina extant, Εὐμαυρίον, φυλλάραρον, περιέριον,
αμυγδαλοειδές, κισσώειον, αϊλόφαρον, Labeo, Labeo-
nia, Asterion, Asterope, Asteriope, Atyrbesia, Vl-
ceraria, Marua Iantufa Serap. Tauri sanguis,
Hori genitura, Melittæna & Meliphyllon. Di-
citur quibusdam Hebraicè, vel potius Chaldaicè
Tamcha: Maurit. Farasio siue Frasiu: Germ.
weisser Andorn/Marobel/Gortee vergiß/helffe-
fraut/lungenfraut/& wilder taurant Sileis
Schvv. Belg Malroue/Malrueuc/& whitte
Andorè: Gall. Marrubin & Marochemin. It. Maro-
bi: Hisp. Maruio & Marolbo: Angl. borehounde:
boh. Zablecniif: Hung. Feyer pözercze.

Locus &
Tempus

Multis locis frequens spontè crescit, vt Mon-
speliū passim, vt etiam Bur nū in Rhætia: itē-
que circa Colmariam, Horburgum E.C. castellum,
& Entzihemiam, aliisque Alsatiz locis: propè
Bessfordiam paucas plantas vidi, ac etiam inter
Ferrariam & Bononiam. In Silesia oriri propter
ædificiorum ruinas & rudera perhibet Schvven-
ckfeld. dicitque in arvis pagorum vulgò notum.
At in Austria & Pannonia rarum est, & certis
duntaxat locis, isque paucis spontè nascitur, au-
thore Clusio. Colligitur Aestate, Iulio potissi-
mum mense, cum semine prægnans est.

Vires &
vires

Huius folia arida, inquit Dioscor. cum semine
decocta in aqua, aut viridium succus expressus
datur cum melle Asthmaticis, tussientibus & ta-
bidis. Crassa è thoracè, cum Iride sicca, ducunt.
Datur mulieribus quæ non purgantur, vt men-
strua & secundas pellant: item difficilè patienti-
bus, & iis qui à serpentibus morfi sunt, & qui le-
thale quid biberunt. Vesicæ tamen & renibus no-
cent. Folia cum melle illita sordida vicera pur-
gant, pterygia, nomasque cohibent: dolores late-
rum mitigant. Ad eadem pollet ex foliis contri-
tis succus, & Sole coctus: Cum vino & melle il-
litus oculorum claritatem exacuit. Morbum
regium per nares expurgat. Aurium doloribus
per se, aut cum rosaceo instillatus prodest. Mar-
rubium plerique inter primas herbas commen-
dauere, inquit Plinius, eadem tradens quæ Dios-
corides: ac prætera alium soluere, vrinam ciere:
strumis, gangranis, & laterum doloribus confer-
re. Ad eadem commendat etiam Galenus ad-
dens in caliditate esse quidem secundi ordinis
iam completi, in siccitate tertii medii, aut com-
pleti. Marrubii decoctum, inquit Matthiolus,
datur commodè iocinorosis, & aqua intercute
laborantibus: eo quoque foliorum puluere ne-
cantur interaneorum vermes. Recentia folia cū
veteri axungia tita & illita canum morsus per-
sanant, & mammarum tumores persoluunt. Li-
chenas purgant, sanantque ex aceto illita. Ad
viscerum obstructions commendat præterea ex
Marrubio parata decocta, vina, eclegmata, syru-
pos, & alia eiusmodi.

MARRUBIVM CANDIDVM FOLIO subrotundo. CAP. CX.

Descriptio

Caulis, quos ex radice vulgari Marrubio si-
mili cōplures profert, cubitales & bicubita
Tom. III.



culo, non tamen ingrato: flores ad genicula ver-
ticillatim caulem amplexantur Marrubi. vulga-
ris, ex oblongis, incanis, mollicillis calycibus.

Clus. in Pannon. & hist. post. vocat Marrubium
alterum Pannonicum, quæritque an sit Marua
Iantufa Serapionis? Eius autem delineatio non
malè conuenit cum Marrubio iam descripto, ni-
si quoddam esse odore iucundo. Lob. in Ic. Plant.
p. 518. Marrubii candidi alterius hispanici tiru-
lo, eandem habet iconem quam Clusius: itēque
in Obs. pag. 279. Tab. inscripsit Marrubium cā-
didum hispanicum: Gerard. candidum. C. Bauh.
phyt. 4. siue album latifolium peregrinum.

Synonyma

Adeò vulgare est toto Viennensi agro, vt vi-
netorum agrorumque margines, sicclique & grā-
minei campi eo abundant, imò in ipsius vrbis
(quæ ab aquis sunt liberæ) fossis nascatur: flo-
ret Iulio. habemus nos Montbe'g. in hort. III.
E.C.W.

Nullò tamen apud Viennenses, quod Clusius
sciat, in vñ est.

MARRUBIO ALBUM ANGVSTIORE folio. CAP. CXI.



Candidius
Marrubio
caulibus ra-
mi que qua-
dratis tenuio-
ribus: folia ex
geniculis ad-
uerso situ oriū-
tū impensè
candida, oblō-
ga, serrata, ner-
uosa, sed ner-
uis plerisque
recta secun-
dum longitu-
dinem decur-
rentibus: flo-
res in ramis,
subiectis binis
paruis foliis,
K k

Descriptio

verticillatim positi, interdum & in spicæ formam digesti, parui, candidi, bifido foliolo surrecto, labello demisso è candicantibus striatis calyculis.

Synonyma

Lobel. porro in Aduers. & Icon. Plant. p. 519. vocat Marrubium Creticum angustiore folio : H. Lugd. p. 952. Marrub. Creticum Penæ: [Existimauit autem compilator hoc à Marrubio candido Hispanico non differre : sed errat: diuersum est & utrumque mihi notum:] Camer. hort. Marrub. Creticum aliud, à Lobelio & antiquis depictum: Tabern. & Gerardus Marrubium Creticum: C. Bauh. phyt. Marrub. 5. siue album angustifolium peregrinum : Apud Matth. Syderitidem 2. Matthioli & Castoris.

Locus

Ex semine per fratrem C. Bauhinum Marrubii albi veri nomine Lutetiâ misso prouenit mihi Montbelgardi in orto Ill. E. C. vibi Hiemem perfert.

Hoc Creticum Marrub. qui cum Schvvenck. opinantur, id cæteris præstantius credunt.

MARRVBIVM NIGRVN SIVE

Ballote.

CAP. CXII.

Descriptio



rubri, verticillati ex calycibus oblongis striatis: radix Vrticæ fibrosa.

Balloten, inquit Dioscorides, quod nomine alio Marrubium nigrum vocant, caules edit quadrangulos nigros, subhirsutos, complures ex vna radice: folia hispida, vel ut alii, densa per intervalla in caule disposita, quàm Marrubii maiora, subrotunda, graueolentia, Apiastro proxima: unde aliqui Apiastrum eam vocauerunt: candidi flores vniuersi verticillato ambitu caulem coronant. Plinius similiter depingit.

Synonyma

βαλλότην autem dicitur Græcis & μέλας ἀράστη, & in quibusdam exemplaribus μέλας ἀράστη: Latinis Ballote, Marrubium nigrum, Marr. magnum, Marr. spinosum, Marr. fœtidum, Marr. nigrum fœtidum, Marrubiastrum, & Prassium fœtidum: Itemque inter nothas appellationes Nophthan, Notianoscemin, Nosprasion, Nothera, Nochelis, Nostelis, Nophrys, Gnothuris, Gnotera: Aegyptiis Asphos, aut Esce: Prophetis sanguis Ixionis: Romanis Apnium aut Medata, aut Viceratia, aut Marrubium, aut Cantherinum. Marrubium quidem à foliorum similitudine, ni-

grum à colore, qui ad colorem fuscum magis vergit, quàm in Marrubio, Prassium fœtidum ab odore graui & fœtore. Germ. Schwarz Andorn/ Sünded Andorn/ & Andorn weible: Gall. Marrequin puant Marrubin noir: Ital. Marrubio bastardo: Hisp. Marrubio negro & bastardo: Angl. Sunding & black horehound. Sefete pōzeretse.

Gerardus pro Marrubio aquatico ponit iconem Tabernamontani Marrubiastri, & pro Marrubio nigro iconem Lamii albi eiusdem.

Marrubium nigrum alterum haberi foliis maioribus & alterum minoribus obseruauit C. Bauhinus.

Montspeli florens intruebar Aprilis & Maiomentibus: Basileæ Octobri. Frequens in agrorum marginibus Genèuz, Lugduni, Montbelgardi, & alibi, passim etiam secus vias, parietes & sepes vmbrosis locis florens Aestate.

Huius folia, inquit Dioscorides, cum sale trita canis moribus medentur. Feruenti cinere flaccescunt, ut condylomata reprimant: sordida vlcera cum melle purgant. Plinius eadem iisdem ferè verbis retulit. Vis eius efficax aduersus canis morsus ex sale foliis tritis impositis: item ad condylomata, coctis cinere, in folio oleris. Purgat & sordida vulcera cum melle. Galenus Ballotes ne meminit quidem in simplicium medicamentorum censu.

Locus & Tempus

MARRVBIVM AQVATICVM QVORVMDAM.

CAP. CXIII.



Acubitali, aut sesquicubitali, caule rigido, quadrato, subhirsuto, in ramos oppositos diuiso: folia bina semper ex aduerso sita, Betonicæ foliis paria, profundè serrata, interdum laciniata, in singula segmenta: exporrecto nervo obliquo, in acumen desinècia, inferius nonnihil hirsuta, superius glabra, breuiusculo

Descriptio

pediculo hærentia, sapore amaricante: ad quorum exortum verticillati globuli sunt strobilorum candidorum, punctis rubentibus asperforum: ex calyculis asperiusculis & veluti spinosis vix tantillum prominentium: radix fibrosa, albicans, modicè adstringens.

Quidam, ut Matthiolus, Sideritim primam facit, quàm alii, ut Dodon. & C. Bauh. rectius Marrubium palustre vocant: aquaticum Thalius & Schvvenckf. Marrub. 4. aquaticum & palustre Tragus, qui Sentum Avicennæ statuit. Marrub. aquat. vulgi Lob. in Aduers. & Obs. p. 283. & Ic. Plant. p. 524. (vbi malè Sideritim secundam vocat) & Hort. Lusit. Sideritim Matthioli, Lanceam Christi Gesneri, & Aegyptiacam herbam quorundam, Camer. hort.

Germ. wasser Andörn / weyher Andörn: Gall. Marrubin aquarique: Angl. water horehound: Hung. Vizi pözereze.

Locus & Tempus.

Marrubium aquaticum Tragi floret Basileæ ad ripam fluminis Birse intra urbem Iunio & Octobri. Montbelgardi spontè Augusto locis humidis. In Silesia viget & floret, referente Schwenckfeldio, æstiuus mensibus ad riuulorum margines & secus fossas, ac scrobium extremitates aquas habentes: rigari etenim postulat: in aridis autem non prouenit.

Cæterum, refrigerandi, atque vnâ validè adstringendi facultatem habere videtur: & nonnullis succus eius colore tingere nigro creditur, quod indagandum proponimus.

ALYSSVM IN GENERE, VETERIBVS, & Neoticis.

CAP. CXIV.

Alyssum Dufc.

Varia est apud auctores Alyssi historia. Et quidem ex Dioscoridis sententia *ἀλυσσός* est frutex paruus (*εὐφράσιον*). Ruell. addit vnicaulis: subaspera folia habens, rotunda, circa quæ fructus, duplicis scuti figurâ, in quo semen est aliquantulum latum. Nasceitur in montanis & asperis locis. Eius decoctum singultus, qui sine febre sunt, potu soluit: idem efficit, si quis eam, aut teneat, aut naribus odorandam admoueat: ac cum melle trita lentigines & maculas Solares [vitia cutis in facie] emendat. Contusa in edulio rabiei canis mederi putatur. Sed & in domo suspensa salutaris esse creditur, tum hominibus, tum aliis animalibus, ne fascino lædantur. Quin & purpureo linteo, seu puniceo panniculo alligata, pecorum morbos abigit.

Alyssum Plin.

Ab hoc, ut quidam opinantur, Alyssum Plinii discrepat: is namque videtur Rubiam minorem Alyssum facere.

A Dioscorideo alienum quoque est Aetii Alyssum quod Heracleam Sideritidem esse statuere videtur. Aegineta libri 5. capite 23. cum Aetio de Alyssis conformia scripsit. Ab illis verò omnibus circa Alyssi historiam dissentit Galenus. Ex cuius verbis palam est, Alyssum ab eo ex Asclepiade descriptum, potiùs primam, quàm ultimam Sideritim referre.

Sive porro frutex sit ille Dioscoridis exiguus, hætenus non satis cognitus: Sive alicuius plantæ (quæ eam habeat proprietatem, qualem ex Asclepiade voluit esse Prassii (speciem Galenus: Sideritidis, Heracleam sc. Paulus, ait naccius de venen. & Antid.) cognomen Alysson, sic tamen dicitur à proprietate sanandi morsus canis rabidi. Et hæc Etymologia potiùs Alyssis conuenit, quàm Melanthio, quod Arabes à græca voce *ἄλυσσος*, sic dictum testantur.

Aequiuoca

Cum igitur varia admodum sit de Alyssis auctorum sententia, cumque eius historia tam varia, incertaque habeatur, difficile quidem fuerit asserere, quænam planta Alyssum legitimum, aut Dioscoridis, aut Plinii, aut Aetii, aut Galeni, vocari possit & debeat. Magnus enim numerus plantarum occurrit, quæ pro Alyssis à rei herbariarum studiosis passim & certatim ostenduntur, inculanturque. Quas licet Matthioli, quod fortassis earum nullam legitimum Alyssum referre crediderit, potiùs suppressendas, quàm declarandas existimauit. Nos tamen contra eas hinc nominandas, & suo quoque loco pingendas, suscitauimus.

Matthiol. varior.

usque pertractandas esse, consulem duximus: Illud nobis saltem indicasset scidius, quodnam Alyssum illud foret à Galeno ex Asclepiade representatum: quodnam & illud, cuius meminit Aetius: siquidem ambo hæc in Italia prouenire non amplius inficiatur. Cur bonus ille vir aliis diiudicandum relinquit, quid Ruellius per Cannabin rusticam, quam ipse Dioscoridis Alyssum esse putat, aut saltem ad ipsum propius accedere ait, intellexerit, & tamen carpit? Cur non Cistam galli pronunciauit?

Cæterum Alyssi nomine sequentes apud Aethores donantur plantæ. Althea fol. serrato hirsutior. Veronica. Veron. pratensis terpillifol. Alysson filiqua lata; &c. Alyssum Anguillare. Thlaspi minus. Thlaspi maritimum. Clinopodium quorundam Origani facie. Alysson Galeni. Moluca asperior: Moluca. Cardiaea. Ladan. segetum fil. albos: Lad. seget. fil. purpureo. Syderitis glabra. Syder. Alysson Columnæ. Sideritidi affinis. Sclarea. Be-tonica. Consolida media. Costus annuus Ledi folio. Cynoglossa copiaria fortè Plinii: Cynoglossa pulchra species. Apacine. Rubia minor. Alysson Plinii, &c. Gallium secundum Tragi. Rubiis affinis Asperula Dodonæi. Rubia cærulea elatior. Rubia parua fil. cæruleo. Geranium Robertianum. Liliun Martagon: Lilialis. Cyanus: Alysson Cytisi facie. Periclymenum. Numularia.

STACHYS VETERIBVS ET IN GENERE.

CAP. CXV.

Stachys Dioscoridi frutex est Marrubio similis, Sed longior (quæ vox in Cratæa deest, Anguill.) folia ferens plura, sed rara [illa Cratæa legit: *εὐφράσιον* Anguill.] hirsuta, dura, odorata, incana: virgas ab vna radice plures; Marrubio candidiores. Nasceitur in montibus & asperis. Vim habet exsiccatoriam & acrem. Vnde [quæ vox in aliquibus omittitur:] foliorum decoctum potum inenses & secundas ducit.

Plinius l. 24. cap. 15. de Stachyde Laconicè loquutus est. Ea quoque, inquit, quæ Stachys vocatur, Porri similitudinem habet, longioribus foliis, pluribusque & odoris inuendi, colorisque in luteum inclinati: pellit menses. Sed & hic vocum vicinitate deceptus Plinius, quæ pro *εὐφράσιον* agnuit. Non enim Porri similitudinem habet Stachys, sed Marrubii, ut Dioscorides dixit *εὐφράσιον*.

Quin & Galenus quoque Marrubio similem fruticem Stachyn esse dixit, gustu acrem & amarum, qui tertii ordinis sit calefacientium; vtmèrit non solum menses moueat, & secundas eiciat, sed etiam abortus procreet.

Stachydis nomine donata sunt sequentes plantæ quatum quidem nobis constat. Stachys Fuchsii. Stach. Cordi. Stach. candidior & minor Matthioli. Stach. Lusitan. Pseudonardus quæ Spica vulgò. Sideritis spinosa. Scorodotis tomentosa Cretica. Scorod. folio Saluæ. Stachas. Galioptis lutea glutinosa. Galiopt. fœtida angustifolia.

STACHYS FUCHSII.

CAP. CXVI.

Rediuuam Stachydis radicem numerosæ libæ vbertim circumquaque productæ co-



*Stachys
Corda*

Stachys

*H. Lugd.
carpitur.*

Synonyma

ronant: caules
autem promit
plures (sæpe v-
nicum) cubi-
tum altos, aut
paucos proce-
riores, quadra-
tos, lanugine
incanâ villos-
os, fungosa
medullâ rari-
tos: ex quo-
rum geniculis
folia ex oppo-
sito sita pro-
deunt, Mar-
rubii foliis
longiora, la-
nuginosa, mol-
licella, per
ambitum ser-
rata, sapore ci-

tra omnem morsum siccante: flores ex foliorum
alis verticillatim ex longa veluti spica caules
summos ambiunt, foris hirsuti, intus glabri, pur-
purascentes, ad Lamii flores quàm proximè ac-
cedentes, labello trifido subinde guttato, galeâ
item saturatiore, dilutioreque purpurâ versicolo-
re, ex calyculis oblongis villosis: semen rotun-
dum & nigricans: odor totius plantæ grauis.

Cord. in Diosc. Stachydem spicatam herb. m
esse ait, & Marrubio similem, candidiorem tamè,
& ob eam causam Germ. weissen Andorn, h. e.
Marrubium album, & Stein Andorn Marru-
bium petraeum, appellat.

A Trago pro Marrubio tertio describitur, ap-
pellaturque Marrub. agreste siue campestre feld
Andorn, si: que genus Gallitrichi sylvestris, ac i-
deo germ. feld scharlach nominatur. Hoc ipsum
tam lucue olens Marrubium, Stachyn Dioscori-
dis esse existimat. Is autem odorem totius plantæ
gratissimum ait, qualem nos non obseruauimus.

Stachydem appellat Fuchf. quod verticillato
florum ambitu & orbiculis spicarum caules cin-
gentibus coronetur: germ. riechenden Andorn/
gall. Sange sanuage. Is autem more suo Dioscori-
dis verba pro descriptione repetit, nihil addens
præter florum purpureorum verticillatum am-
bitum: odorem & folia dura non obseruauit.

Sphacelum esse statuit Guilandinus, sed per-
peram, reclamant enim folia Gesn. in cat. pl. Sta-
chyn Marrubio similem rura Tygurenſia rusti-
cam, vel montanam, vel mollem Saluiam: Her-
barios Nauiculam, alios Coronatam herbam ap-
pellare, ex Ruellio, ni fallor, perhibet.

Lobel. in Obs. p. 285. (itemque Icon. Plant. p.
330.) Stachydem Dioscoridis inscribit ac Scor-
dotin Plinii constituit: alibi Marrubium agreste
Tragi, & Pseudostachyn Matthioli vocat.

H. Lugd. p. 963. duas habet icones: vni titulus
Pseudostachys Matthioli: alteri Stachys Fuchfii:
descriptiones etiam duas habet, quasi diuersæ es-
sent plantæ. Vna est Fuchfii ex Dioscoride petita,
altera Lobelii.

Stachys dicitur Castori, itemque Lonic. & Ta-
bern. qui trium plantarum, quas pigrit, nomina
confundit in Hist. Stachydis, Pseudostachydis &
Saluiæ montanæ, quæ quænam ei sit, iam non
occurrit. Stachys maior germ. Camer. hort.
Floribus purpurascens C. Bauh. phyt. Sta-

chys Fuchfii Dod. lat. in fol. Marrubii tertia spe-
cies Dod. gall. Marrub. montanum alterum, ge-
neris secundi Thelio. Marrub. campestre Hort.
Lutic.

Honor. Bellus ait Lobelium pro Scorodoti
Plinii secunda, stachim Dioscoridis describere:
sed eam stirpem notham, spuriamque esse: nam
neque Allii odorem spirare, neque viribus à Pl-
nio attributis respondere. Ego Stachydem vulga-
rem non esse Scorodotim Plinii Bello quidem
cedo: sed hoc ipsi non do, nec etiam Lobelio
quod Stachys sit Dioscoridis: haud enim respon-
det odor, qui, Plinio teste, iucundus: nec color
consentit, qui in luteum inclinans, esse dicitur:
sapor etiam contrariatur, hic enim Galeno teste,
marus & acris esse debet: neque calefacit tandem,
vt docet Dioscorides.

Asperis locis, montibus ac collibus prouenit:
floreſcit Iunio & Iulio mensibus: Basileæ etiam Iu-
nio, extra portam lapideam Iulio & Augusto: in-
ter Basileam & Leutach versus Mouetiz Octo-
bri.

*Sideritis
non est Lab.
repreh.*

*Locus &
Tempus*

CARDIACA.

CAP. CXVII.

Hanc sub Lupi pedis nomine sic describit
Ruellius. Lupi pes, quam Græci Lycopoda
nominant, herba est Marrubio sylvestri similis,
folio Lupini pedis effigie, dissecto, grauis odoris,
caule anguloso & geniculato, fungosa intus me-
dulla, radice frequenti capillamento fibratâ: Galli
nunc Param lupinam, nunc Herbam pectoralem:
nunc Manum S. Mariz nominant.

Hæc itaque herba Lycopous Ruellii est, quam
multi in Germania Cardiacam vocant: nimirum
quod Cardia (sic etiam stomachum siue os ven-
triculi veteres appellabant) imposita medeatur.
Quod verò Ruellius ait græcè Lycopodem dici,
nusquam reperitur, vt author est Gesnerus quadr.
de lupo, apud Græcos, neque apud Plinium: quare
conſectam ab eo ad imitationem gallicæ vocis,
græcam esse coniecit, & pro Galeni Lycopertio
admisit: huius enim & nomen à lupo, & odoris
insignem grauitatem, leniter tamen aromaticam
& ni fallitur, etiam colorem conuenire dixit, præ-
sertim maturo iam semine prægnanti herbæ.
Hæc Gesnerus qui in cat. pl. Cardiacam opinatur
dictam, quod folia trita præsentaneo remedio
dissoluto stomacho imponantur.

Kajd. flor. Nicolai dicitur Fuchfio: Sideri-
tis prima Heraclea Dodonæo: Euricius Cordus
Marrubii, vel Melissophylli speciem esse putat,
quia non aliter, quàm Melissophyllon apibus gra-
tissima sit, scribitque se propterea ipsam ad alue-
aria plantasse, neque credi posse quanto examine,
ac quàm sonoro murmure circum hanc floren-
tem densæ apes susurrarent.

Marrubium & quidem primum Cardiacam
vocat C. Bauh. phyt. dubitatque an sit primum
Theophrasti. Quidam Alyſſon Galeni & Actii
esse volunt. Sunt etiam qui Marrubium mas
Brunfelsii faciunt, vt C. Bauh. & Schvvenckf. qui
Palmâ Christi à Parisiensibus appellari testatur.
Brunfels. quidè Tom. 2. ante rhapsodiam 25. p. 758.
iconem habet sine nomine: & aliam quoque sine
titulo pag. sequenti 759. & sequitur Rhapsodia vi-
gesima quinta: prior autem icon est Cardiacæ,
secunda Marrubii. Vbi verò Cardiacam Marru-
bium

*Descriptio
Lycopous*

*Para-lupi-
na
Herba pe-
ctoralis
Manus
S. Mariz*

bium mas vocatit, vt annotarunt C. Bauhin. & Schvvenckf. non mihi constat.

Lycopis.

Lycoplyn tandem Cardiacam vocat Anguill. epist. 12. Aliam demum esse Cardiacam a Ballore perhibet Fuchsius.

*Nomina
linguarum*

Quo igitur nomine herba hæc à Veteribus sit appellata, adhuc sub iudice lis est. Herbarii nostræ ætatis vulgò Cardiacam appellare cōsueverunt hand dubiè quòd cordis palpitationi, quam multi perperam *Cardiacam* appellant, mirificè conferre videatur: germ. *herzgespær* / *herzgespan* / & *herzfraut*: Schvvenckf. nonnullis *Wolfstos* pe vocari ait, i.e. Patam lupinam. Belg. *herzeghespan*: Galli *Agrispaulme*, testibus Fuchf. Dod. & Lob. Quà autem ratione Agria palma dicatur, haud scit glossator Fuchf. in impress. Lugdunensi, nisi fortè à rudi foliorum fissura tanquam in digitos à qua, sed perfectiore, Ricinus vulgò etiam Palma Christi nuncupatur. Angli *Mortworme*: Boh. *sedecunf*: Hung. *zu fuu*.

*Patam Lupi-
na.
Agria Pal-
ma.*

Locus

Passim ruderibus, lapidosis, ac aliis incultis & asperis gaudet: iuxta sepes & veteres muros subinde inuenitur: in hortis nimis facilè calefcit. A Iunio in multum vsque Autumnum viget, & floribus (præsertim Iulio) abundat, seménque perficit. Caules Hieme intercidunt: radix vi- uax est, Dodon. Prouenit etiam in pagorum areis, iuxta semitas, & propè vrbium mœnia, vt etiam Basileæ vidi florentem Octobri.

*Vires & v-
su*

Fuchsius ex amaritudine insigni sumpto argu- mento, calidam statuit in secundo ordine & sic- cam in tertio: rectè à recentioribus scriptum, contra cordis palpitationem, conuulsionem, & resolutionem conducere: posse enim cum amara sit herba, suâ caliditate & siccitate crassos humores, qui in venis & aliis partibus, neruosis potissimum, sunt, incidere, extenuare, & discutere: hac etiam ratione morbo comitiali conferre, vrinas mouere, & menstrua educere, aliâque facultates, quas Galenus lib. 4. de simpl. med. facult. cap. 17. amaris tribuit, obtinere. Hic sub- scribit Matthiolus, addens eam in puluerem cō- tritam, & cochlearis mensura ex vino haustam, difficilè parientibus mirum in modum opitulari: obstructions aperire, quas causa frigida indu- xerit: pectus à pituita detergere, & lumbricos necare. Cum expurgandi, adstringendi quòque facultatem habet, inquit Dodonæus. Ad cordis affectus à nonnullis commendatur, & tantum va- lere existimatur, vt ab effectu nomen inuenisse putetur. Ferrur & conuulsis ac quoque resolutis inederi, obstructions viscerum aperire: ventris tinea ac lumbricos interimere, & puluerem her- bæ cum vino exhibitum, non modò vrinam & & menses euocare, sed & difficulter parientibus prodesse. Ad cruenta eadem quoque laudatur. Medetur & quibusdā boum morbis, ac à rusticis ea de causa subindè expetitur.

*Partum
promouet.*

GALIOPSIS VETERIBVS.

CAP. CXVIII.

*Diosc. le-
uiss. illu-
strata.*

Galiopsis, quam authore Dioscoride, aliqui Galeobdolon vocant, frutex (*δάκτυλος*) est to- tus cum caule & foliis, similis Vrticæ: sed folia læuiora sunt, & dum teruntur valdè grauem o- dorem reddunt: flores tenues (*λίαν*) purpura- scentes [*ποικιλοχρῶν*]. Nascitur ad sepes & cir- ca vias, ac domorum areas vbique. Vim habent folia, succus, caulis, & semen, dissipandi duritias,

carcinomata, strumas, parotidas, panos. Verùm cum aceto bis in die imponere oportet, & cata- phlasma repidum facere. Sed & decoctum ipsius vtiliter in fomentum affunditur. Facit etiam ad nomas, gangrenas & putredines, cum sale impo- sita. Dioscoridis verba habet Plinius. Paulus vires eius ex Dioscoride quoque habuit. Gale- nus verò Galiopsios mentionem non fecit.

Galeopsis inter nothas, aliis Galephos, Aegy- ptiis Aethiopsis, Romanis verò Vrtica Labeo di- citur.

*Notha Ge-
ces.*

Græcis *Γαλιόψις* vel *Γαλιόψις*, & *Γαλιόψις*. *Galeopsis*. Dicitur autem galiopsis, si cum i scribatur, à flo- rum effigie galeata, quòd eius flores galex aspe- ctum referant. At quoniam inusitatum fuit græcis præsertim veteribus, Latina nomina cum græcis componere, *Γαλιόψις* potius per *n* scriben- dum erit, vt & multa exemplaria habent, & Plinius ita legendū testatur, qui galiopsia nominat, à florum figura mustelæ faciem & rectum qua- dantenus exprimente. Id quod etiam videtur innuere & *Γαλιόψις* nomen i.e. mustelæ fœtidæ: quo quænam sit herba indicatur, nulla videlicet descriptioni aptiore, quàm galiopsis, siue vrtica fœtida mortua, Corn. Cordo, Trago, Fuchf. Mat- thiol. H. Lugd. Clusio & Schvvenckf. auctoribus.

*Galeopsis
est Vrtica
fœtida.*

Hanc tamen opinionem tanquam falsam re- probauit Marantha. Odor, inquit, qui in galiopsis descriptione proponitur, nisi nonnul- lis consideratis intelligatur: eius cognitionem impedit. Ex hinc colligitur error (quod eorum pace dixerim) volentium galiopsin esse, quam vulgò Vrticam fœtidam appellant, inter alias no- tas eius herbæ graueolentiam in medium affe- rentes: non enim animaduertunt graueolen- tiam galiopsidis foliis Diosc. assignasse, si te- rantur: non autem integris: at in Vrtica fœtida, etiam si non confricentur, grauissimum longius emittunt odorem. Huic subscribit Clusius, cui nullus recentiorum satisfacit in icone galiopsis historix addita: nam vel Lamii genus aliquod, vel Scrophulariam vulgarem eos sustinere per- hibet, cum ad illarum nullam Dioscoridis de- scriptio aptari possit.

*Afuletrum
opini de
Galeopsi re-
probata.*

Nos Galeopsis nomine sequentes denomina- uimus plantas, quarum quænam sit legitima, iu- diciū penes lectorem relinquimus: Galeopsis siue Vrtica iners flore purpurascente maior folio maculato & non maculato. Galeopsis siue vr- tica iners floribus albis. Galeopsis siue Vrtica luteo flore. Galeopsis siue Vrtica iners folio & flore minore. Galeopsis siue Vrtica iners mi- nor folio caulem ambiente. Galeopsis siue Vr- tica iners magna fœtidissima. Galeopsis siue Vrtica fatua incana reptilis. Galeopsis siue Vr- tica fatua maxima flore magno rubro. Galeop- si fœtidissima affinis. Galeops. fl. paruo atrop- purpleo. Galeops. angustifolia fœtida. Galeops. lutea viscida Dal. Scrophularia maior. Scroph. maxima. Scroph. 3. Dod. Palegium.

Acquiuea

GALEOPSIS SIVE VRTICA INERS

flore purpurascente maiore, folio non maculato.

CAP. CXIX.

Radice nititur hæc Galeopsis fibrosâ nume- rosa, repente, perenni, ex qua caules plures surriguntur, lōgi, quadrati, concaui, purpurei, mo- dicè hirsuti, geniculis inferiùs crebrioribus, me- dio caule internodiis longioribus: ad radicem

Descriptio

Kk 3

folia subrotunda, ad Marrubium foetidum accedentia, ex satis longis pediculis, superiora ad singulos geniculos purpureis semuncialibus latiusculis appenta, Vrticæ similia, pilis hirsuta, sed inertibus, rugosa, atroviuentia, atroque purpurea, ferrata, foetida: ad quorum alas flores timbratis loculis rubentibus insident, seni vel deni verticillatim caulem coronantes, purpurei, pilosi, inodori, rictum ostentantes, foliolo concavo, ceu galea, sursum reflexo, bifido, labello punctis carneis & sanguineis notato, deorsum reflexo: ex medio hiatus stamina profert quaterna recurua alba, capitulis atrocubentibus, nec non stilum album tenuem bifidum: semen in caulibus per interualla copiosum & nigrum.

Synon. &
Nomina.
Vinguarum



Hung. Got chalan

Vrtica non mordax, & Galeopsis vulgaris purpurea, Lamium Plinii, itemque Archangelica vulgi dicitur Lobel. in Aduers. Vrtica labeo & Lamium Nomenclatori Pannonico: Vrtica mortua & alba Corn. Vrtica foetida Apollinaris: Vrtica foetida floribus purpureis Matth. Schvveckfeld: appellauit. Lamium purpureum vulgarius, γαλιόψιν Dioscoridis, & Vrticam labeonem, foetidi & grauis odoris: Fuchf. Lamium 3. fl. purpureis: Tabern. Lamium 3. purpureum: Item, Galeopsis 1. (in Hist. 2. in Icon.) Lamii similis, exceptis foliis paullo rotundioribus, & albis maculis aspersis: Ego duas plantas nondum facio. C. Bauh. phyt. Lamium 2. siue purpureum folio oblongo, non solum à priore ratione formæ foliorum differens, sed etiam odore: hoc enim non foetet. Lamium purpureum à nobis semper fuit obseruatum foetidum. Gerard. Lamium rubrum Item Lamium Pannonicum siue Galeopsis. A Gerardo non bene pro Lamio Pannonico Clusii ponitur icon Tabern. Galeopsis primæ.

C. Bauh.

Lamium
rubrum
Gerardus
et.

Camer. in Epit. Match. itemque n. Germ. hanc figuram exprimit titulo Galeopsis. Cur verb Lamium Euch. Ræfl. germ. Unser frauen schulin vocet, rationem non habet.

An Thal. Galeopsis rubra? An Anguill. Lamium Plinii, Bononiensibus Milzatella, quasi *piccola Milza*. Milzadella Cæsalp. vulgò dicitur, quia lienosis egregie opitulatur.

Locus &
Tempus.

Galeopsis purpuream in Italia inter Vicentiam & Villanouam vidi florentem Martio, Geneuz Nouembri, Basilæ Octobri, Monspelii toto anno florere. Montbelgardi frequens est etiam in horto

Vulgò Vrtica iners & mortua appellatur, quod folius non mordentibus sit, inuisissima. Sunt qui Albam Vrticam nominent, & Archangelicam: Ger. binsang, stindend Vlesfel/ Todnessel & taub nessel: Belgæ Dooſe netelen: Galli *Ortie morte*: Itali *Ortica morta*: nisp. *Hortica mauerta*: Angli *Deadnetel*

Ill. E. C. spontè, florens Aprili: Amat ædificiorum areas, plateas & hortorum sepes.

Foetidi est & grauis odoris. Eius calor & siccitatem sapor arguit, inquit Schvvenckf. qui ex Dioscoride eius folia durities, strumas, & carni-nomata discutere, itemque ad putrescentia vlcera, gangrenam, & nomas vtiliter cum sale illini perhibet.

Vires &
Vfus.

Galeopsis folio maculato.

Est alia planta Vrticæ foetidæ non absumilis, quæ à lacteis, maculis singula folia in longum procurrentibus, Vrtica lactea, à Senensibus vulgò cognominatur, quam rectius fortè quis Galeopsis dixerit, si à γαλιόψιν dictam esse statuat, quod ex Dioscoridis ordine coniectura quidam colligi possent: hanc legitimam esse Galeopsis, quasi assermate non dubitarem, inquit Matthioli, nisi Plinius eam Lamium appellari prodidisset, laudibusque exultasset album, quod medio in folio habet. Quibus sanè Plinii placitis decernere cogimur, prunam, quam Vrticam foetidam diximus, esse Galeopsis: alteram (hanc) verò Plinii Lamium. Sed si sustinere velimus hanc secundam esse veram Galeopsis, dicere nobis liceat, Plinium non cognouisse Galeopsis: neque id fortasse temerè diceretur, quod in multis aliis Plinius euidenter errasse deprehendatur. Hæc ille. Ego facile crediderim eandem esse hanc cum præcedenti Galeopsis purpurea, & in foliis foliorum maculis consistere differentiam

Vrtica la-
tea

Camer. in horto vocat Lamium Plinii, & Milzatellam Italarum, in foliis albas maculas proferentem, in locis humidis & opacis circa fossas. And. Spieg. Lamium verum Plinii. Schvvenckf. Lamium pictum. C. Bauh. phyt. Lamium 3. maculatum, & Milzatellam Cæsalpini, de qua vide plura cap. præced.

vfus

Solenander tradit eius vsum esse crebrum in Hærrtria, exhibendo puluerem foliorum in ouo sorbili in lienis obstructionibus: atque asserit solum puluerem istum in vino feliciter se in iisdem affectibus exhibuisse.

Galeopsis siue Vrtica iners floribus albis.

Tragus huius meminisse videtur Vrticæ quintæ neque pungentis, neque vrentis, floribus albis titulo. Fuchf. vocat Lamium 1. siue floribus albis, Lamium Plinii propriè. Camer. hort. Lamium Tragi flore candido. Lobel. in Adu. & Obs. p. 280. itemque Icon. Plant. Lamium siue Archangelicæ flore albo: perperam Galeopsis Herbariorum Matth. Lacunæ. Tabern. Lamium 1. album. Iconè Tabernam. Lamii albi male pro Marrubionigro ponit. C. Bauh. phyt. Lamium 2. siue folio oblongo flore albo. Schvvenckf. Lamium candidum.

Tab. nat.

H. Lugd. p. 1246. Lamium Fuchfii vocat, Lamium Plinii putatum, vrticam inertem & mortuam floribus albidis, seu pallentibus, vulgò Archangelicam, ab eximii viribus: Lamium fortasse à florum figura, veluti cucullo laruatam Lamiam quandam representante: Italarum Milzatellam, & Herbam de la Milza, ab insigni eius aduersus splenis obstructionem & duritiem efficaciâ, qui splen illis Milza vocatur: Galeopsis Matthioli Lobelii. Falsò autem ita vocat: reiecit enim Lob. eorum opinionem, qui Galeopsis Matthioli statuunt.

Turnerò

Turnero dicitur Lamium, siue vrtica iners aut mortua alba. Cordo in Diof. Galeopsis flore candido. Thal. Galeopsis Matthioli, seu vrtica vulgaris mortua, flore verticillato candido passim, grandiore nonnunquam folio locis pinguioribus. Dod. lat. in fol. vrtica iners siue Lamium primū. An Casalp. Leucas montana flosculis candicantibus, nullam albam maculam habens in folio.

In Italia vidi florentem Martio inter Brenzelam, & Vicentiam; Lugduni mense Aprili, & in Sabaudia circa Mirabel; itemque Montbelgardi in hortu Ill. E. C. frequentem spontaneam. Humida & opaca occupat loca folias & areas, lilio flores ostendens, Schvvenckf.

Vites & vras
Calidum siccumque est Lamium, id quod ex facultatibus eius & amaro constat gustu. Ex vino potum iecmoris adimit obstructions. Flores Lamii candidi menstrua muliebria alba absumere [sistere Dodon.] foeminarum experimento celebrantur, paraturque à nonnullis in eum usum ex floribus istis cum saccharo (ut vocant) conferva, quam singulis aliquot diebus sumendam præcipiunt. Herba tusa auctore Schvvenckf. cum sale plagis & contusioni utilis, nec non vlceribus putridis & vulneribus, vlcera spertigino-
Menstrua alba.
sa, vulgò den murm, imposita sanat. Recen-
**Contra-
sc.**
tiores Vrtica hac mortua vtuntur (id quod lege-
**Hæmorrh-
gia.**
re est apud H. Lugd.) sistendo ruentis è naribus sanguinis impetu: imò ceruicis, vel scapulis alligando: nam inde sperant in aduersum trahi cru-
oris manantis imperam.

GALEOPSIS SIVE VRTICA INERS flore luteo.

CAP. CXX.

Descriptio



Synonyma
Galeopsis
Trago.

A Superiore Galeopsi alba differre non videtur, nisi proceriore caule, minoriflore, hisutior folio: flore pereleganti luteo toto, labello saturationibus punctis & striis croceis notato: alias modò viticoloribus, alias labelli modo picturatis.

Tragus hanc Galeopsios nomine pingit, ac Vrticam sextā

facit floribus croceis. Fuchf. Lamii genus alterū. Dod. gall. Lamium luteum. Hi tres vñ iconē & descriptione, Galeopsim purpuream, albā & luteam complexi sunt, colore tantū ab invicem distinguentes, ignoranter quidē, quicquid dicant: picturā autē hanc potissimū exprimere videntur.

Cord. vocat Galeopsin flore luteo. Dod. lat. in fol. Vrticam inertem tertiam, siue Lamium luteo flore. Tabern. Lamium 2. luteum, Casp. Bauh. phyt. Lamium 2. siue folio oblongo luteo flore. Schvvenckf. Lamium luteum, & Archā-

gelicam luteam, geele wald Vlessel / geeler hā-
nenfopff.

Nascitur ad riuos, ad piscinas, in montibus opacioribus, & alijs locis humidioribus. Florentiā vidi in hortu. In siluis opacis floret Maio mē-
Locus
se potissimū, & tota ferē Aestate. Apud Qua-
Tempus
dos, Marcomannos & in Pannonia superiore notior est.

Non dissimilibus quoque viribus illo, sed multo efficacioribus esse perhibetur ad vulnera, vl-
Vires
cera, tumores.

Galeopsis, siue Vrtica iners folio & flore minore. Hæc quamproximè accedit ad Galeopsin flore purpurascēte maiorem.

Iuxta sepes, parietes, vias, in rudibus, secus agrorum margines, ac in ipsis quoque aruis
Locus & tempus
obseruavi Genue, alijsque in locis florentem magnā ex parte tota Aestate. In hortorum areis parum excultis non rarò occurrit, & valde molestā est, ut Montbelgardi, florens ibi Februario, Martio, Aprili, ac etiam Septembri.

De Galeopsi viribus in genere, & de nonnullis alijs Galeopsi speciebus, ceterisque plantis illi affinis.

Vrticas inertes omnes eandē cum vrentibus vim habere, plus tamen posse in externis vlceribus, & tumoribus dissipandis credidit Tragus: quapropter illis in balneis ad vaporaciones & emolliendum vterum vti consuluit, præsertim sili-
Descrip:
uestri, quam Heracleam dixit, nos Galeopsim magnam foetidissimam. Experientia promde certa de olentibus Vrticis, quæ in vetustis areis & sepibus proueniunt: illæ enim si vrentes adhuc contūdantur, earūque succus cum foliis cataplasmati instat, phagedæne, quam Gerden wurm vocant, imponatur, breuē eam enecabunt. Amb. Parzus Galeopsi cuiuscunque generis succum ad hæmorrhoidas commendat. Plura lege antè in specie, & de Galeopsi veterū.

De ceteris Galeopsi speciebus, Lamio, Cannabi siue stri, ceterisque affinis plantis, consulat lector huius Tomi Appendicem: Nos enim ibi de his: nec hic præterquam Locusta herba superest Locus; cuius historiam ad huius Libri calcem tradicam vti superiori promissimus.

LOCUSTA HERBA.

CAP. CXXI.

Locusta herba prior.

Descriptio



Herba Locusta dicta, parum interdum palmū superat, alias dodrantalis & maior, etiam cubitalis, radice donata tenui, ad imum fibrosa, gustu subdulci & ferè insipido: folia tenera & delicata, longitudine semunciali, vnciali, aut sextantali, colore herba-

eo latitudine trientem vncie parum excedentia subrotunda, nullo pediculo appenda, interdum serrata, superiora sapore ferè eodem cum radice, à qua vnica caules plures, angulosi, tenues, brachiati, binaque ramulorum conjugatione semper diuili: inter foliola summorum ramulorum *stosuli* simul aliquot pulchelli, albidii, aut diluta purpura languentes, oblongi, in quinque lacinias dissecti, apices amplectuntur tenuissimos, obtutum ferè fugientes *semen* obseruare non licuit.

Icones.

Iam, antequam ad alia deueniamus, figurarum nostrarum reddenda ratio. Est autem prior ex ipsa herba virente, cui appingi curauimus Oleris albi ramum Agerii. Altera ex Icone Plantiniana Phu minimi alterius p. 717. foliis nempe serratis, qualis inter nostras herbas siccas Locusta reperitur.

Locusta altera foliis serratis

Sacrum
litterarum
Locusta
herba.
Hermolao.



Ceterum, meminit Locustæ herbæ Hermol. Coroll. 256. dum inquit: In sacris certè literis sunt quibus Locustæ mandit solitæ, non animal insectum, sed herbam hoc nomine significant. In qua sententia magnus auctor Chrysostomus & prior eo Athanasius fuisse creduntur, quasi pro animali acceptæ, vefcendo non essent. Cùm tamen in Africa vt Dioscorides commemorat, ad Leptin cibo

etiam frequenti commendatur, & hodie quoque vulgò eas comedant Egyptii. Plinius etiam gentem quandam & Æthiopum quoque partem Locustis tantum viuere fumo & sale duratis in annua alimenta prodidit post Diodorum Strabonemque, vt ob id Acridophagi [Acridas enim Locustas Græci vocant:] nomen habeant. Locustam igitur, siue Pedem locustæ pro herba sumptam interpretantur, quam vulgò Rapunculum, siue Napunculum vocamus [H.n.g.lib.23.] folio angusto, desinente in mucronem, cauliculis vertice torulos habentibus, vt in Asparago & Salictario lupo cernitur. Itemque multi lateris. Ex quibus minores alii, alterno semper inguine profiliunt. Radicula vel diuitum, lautorumque mensis petita: Rapistri quidem sapore: non tamen ad ructus illiberali, ac fatuus omnino gustus, sed cum aceto, & sale non iniucundus: semen ei tam exiguum, vt discerni ferè aliter non possit, quam grana fabuli. Alii Pedem locustæ pro Blito aut valdè simili herba capiunt in Arabicis scriptori-

Acridophagi.
Pes
locusta.
Rapunculus.
Napunculus.

Blitum.

Acris

bus. Sunt etiam qui vocabulo Acridis non herbam vnā aliquam, sed summam omnes, quibus visitari homo sanctus in solitudine, intelligi velint. Dioscoridis certè paniculas Auenæ dependentes Locustas appellauit.

Gefnerus de hort. vocat Locustam herbam foliis ferè Oleæ: Oliui etiam sapore quodammodò, inspidam alioqui. Lobel. in Icon. Plant. p. 717. Phu minimi alterum inscribit, vt etiam in Obs. p. 412. vbi ait vocari Gallo-Belgis *Salade de Chanane*, Delt troppen verò Belgis: quasi dicas Lactucam campestris, quia folia primo pullulatu habet Lactucis aut Seriolis adhuc tenellis similia.

Phu minimi alterius Lobelii imaginem & descriptionem assumpsit H. Lugd. p. 3127. Cuius tamen & aliam figuram & delineationem ante p. 554. Polypremi titulo dedit addens vulgò appellari *de la Blanchette* & *Poule grasse*.

Tabern. tam in Icon. quàm Hist. duplicem exhibet picturam, Lactucæ scilicet agnitiæ primæ & secundæ titulo.

C. Bauh. phyt. dicitur Valeriana n. siue campestris inodora maior, quæ Bupleuron, Hippocratis apud Plinium lib. 22. cap. 22. ipsi videtur; Itemque Phu minimi alterum Lobelii Obs. p. 412. & Icon. Plant. p. 717. Eidem vocatur Valeriana n. siue campestris inodora laciniata, & Herba S. Clare Monspelienis, ac etiam Phu minimi Aduersar. p. 319. & Lob. Icon. Plant. p. 716. Dod. lat. 10 fol. huius meminit nomine Albi oleris.

Locusta herba Montbelgardi in horto Ill. E. C. ex semine Sturgardii missa, nomine Sonnens wirbell, nata mense Ianuario & Febuario, frequens prouenit. Huius verò semina quiddam mense Septembri terræ committere solent, quod hybernis mensibus in acetariorum usum venire queat. Locusta herba, Pinguicula aliis dicta, aliis Lactuca agnita: Germ. *hasenortlin* / *Rebens freßig*: Genue *Rampun*: Burgundis *oreille de Lievre*, frequens est in agris, vineis, & hortis, teste Tabernam.

Quam porò Hermolaus in Corollario, si bene memini, ait Gesn. in epist. ad Cos. Holz locustam appellat, aliqui eas esse Locustis nugantur, quibus in deserto Io. Baptista pastus sit. Refrigerans est hæc herba, & nonnihil humectans, facultate ac temperamento Lactucæ haud dissimilis; cuius loco hybernis & primis Veris mensibus infertur, ac cum aceto, sale & oleo iucundè editur, veluti alia acetaria: inter quæ haud postremum locum obtinet. Ambæ Lactucæ agnitiæ, Tabernomontano id referente, grati sūt saporis, aluum emolliunt, præsertim si cum iure carnis bouinæ aut veruecinæ coquantur, atque calidè coctarum ius absorbeat. Frequens earum usus in cibis potissimum per totam Hiemem niue liquefcente & Vere, usque ad mensem Aprilem donec caules ferat. Salubriter exhibuit gratum hunc & sanum cibum febricitantibus, qui ab esu carniū abhorrent, Spinachiorum modo concisum & in iuseulis cum omphacio decoctum. Agniti deum huius pastu multum delectantur, & iuantur, impinguanturque.

Locusta
Olea foliis
Gesn.
Phu
minimum
alterum
Lobelii.

Icones
deser. d. n. s.
H. Lugd.

Lactuca
agnitiæ
duplex
Tabern.

C. Bauh.
Album
olei Dod.

Locus
Tempus.

Vires
Vitis.

Temper.

Emolli
aluum.

Febricitant
cuius cibis.

Agniti
pastus.



HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XXIX.

GORONARIAE SEMEN IN VASCVLIS ET CALYCVLIS
GERENTES, ET QVÆ FLORVM FOLIORYMQVE, AC TO-
tius aded Plantæ, forma nonnihil accedunt:

Coronarum vel per se tantum immensa contemplatio, si quis asimet varietatem, numerum, flores, odores, coloresque & succos, ac vires earum, quas varietatis studiosissima natura, salubris, aut v. lupratis gratia gignit. Est sane, ut Plinius ait, inenarrabilis florum maximè subtilitas, quando nulli potest facilius esse loqui, quam verum natura pingere, lasciuienti præferim, & in magno gaudio fertilitatis, tam varie ludenti. Quippe reliqua, vsu alimentique gratia gignit: idèque seculis, annosque tribuit iis. Flores verdè odoresque in diem gignit: magna (ut palàm est) admonitione hominum, qua spectatissimè fioreant celerrimè marcescere. Sed ne picturæ quidem sufficiente imagini colorum reddenda; misuratum varietati, siue alterni atque multiplices inter se nechtantur, siue priuatis Generum funiculis in orbem, in obliquum, in ambitum quædam corona per coronas currunt. Coronarias porro omnes hoc uno libro complecti nec volumus, nec possumus: nam nec ipsa natura unico horto, unica tribu, complecti potest, alias in fruticum, alias in herbarum, & harum rursus in nonnihil diuersis familiis collocauit. Dicemus autem potissimum vascula ferentes post florem; & his sauci specie accedentes, ut Linifolias, Alsinifolias, & c.

DE BETONICA CORONARIA SIVE CARIOPHILLO
flore in genere: & specialius de vulgari satua flore pleno.

CAPVT I.



Duo fasti-
gia summa

IX in omni genere stirpium vlla existit quæ tantâ colorum varietate flores suos commendet, atque Betonica coronaria, cuius duo fastigia summa: Alia enim syluestris, alia satua: Hæc rursus nunc simplici foliorum in floribus ordine contenta est [minor Dod.] nunc duplici prædita [maior Dod. qui & Armenios flores in Gariophyllorum numerum recipit:] de quâ præsens instituitur sermo.

Ex Gariophyllis itaque plenis [etiamque simplicibus plerique foliis sunt & singulis geniculis, binis, angustis: alii penè teneris, at brevioribus magisque exiguis (portaceis Ruell.) duris, per extremum acuminatis, cæsis quasi, siue glauco, colore: caulis lœuibus, teretibus, cubitalibus, rard altiorib. geniculatis, nodosis: in quorû fastigijs lœgiusculis spectantur calyces teretes, orbiculo superiore denticulati Ruell. quib. dehiscētibus paulatim diuersis apparent florû genera, candida sc. ex cædido purpurea, coccinea, nigricantia, vermiculata, diuersoque colore variegata, idque non vnâ, sed variâ ratione. Inuenias liquidè in quib.

Tom. 411.



candidus, & coccæus, color ita misceatur, ut in alio candida, in alio rubra foliola numero superiora euadant. Quid? quod nonnullos videas ita candidos, ut minutissimis rubris punctulis sint redimiti, contra qui rubent lacteis notis aspersi videantur. Postremò ex vno & eodem caule non rard duo flo-

rum genera, quod ad colorem attinet, hoc est, partim candidi, rubrique maculis notati, partim et

candidi, rubrisque maculis notati, partim vero coccinei, proflunt, & quod mirū magis videri possit, sæpe vno pediculo diuersi coloris flores suffultos, deprehendas, quod ipsum non semel se obseruasse testatur Tragus, in florum medio stamini emicant gemini apices candidi: semen in vasculis oblongis, paruum ac nigrum Dodon. latum Cæpæ simile Trago: radices fibrosæ: simplices, geniculatæ Ruellio.

Nomina
linguarum

Quam Betonicam coronariam magis propriè appellandam censemus, Cariophylleum florem ab odore Cariophyllorū Recentiores nominant, licet sint alij odoratiores māgonio, alij minus, & alij etiā inodori: Dicūt Germ. Negelin, Negelblumen, & Grassblumen: Belgæ/Gineffel blumē & Grosse bloemē: Galli Oeillers, & Oeuillers: Itali Garofoli, & Garofni: Hispani, Clavel: Angli, Geliflowers & Gelouera. Bohem. Baraffilts, Hung. Zecf. siu.

Betoni coronaria indi-
ca Veter.

Ioh. Ruell. (& post eum Eur. Cord. itēque Matth.) Cariophylleum florem incognitum Veteribus existimauit; cuius optimum iudicium videtur. Mirum creditu, ait; ut tam celebris flos tamque iucundus fuerit à Veteribus silentio prætermittitur, quā amplitudine, pulchritudine, varietate, Rosā non inferior videri possit, imò cum eā de principatu certet, quando nec colore superatur purpureo, candido, vermiculato: nec odore, nisi quod à lo. pinquo plūs olet recens Rosa. Jam nihil Rosa fugacius, longissima namque decerpit mora dies: illi in quadriduum & amplius vita vigorque durat, aliquibus potissimum Damascenis. Tanta magnitudo olitorum curā, ut orbem utraque manus, complecti serè nequeat, Non desuere qui Baccatē id genus esse floris existiment, sed sylvestris, toto herbe habitu apertissime reclamante, Alij Calham Veteribus fuisse putant. Sed tūm Virgilius lateolo colore nobis tinctam cecuerit, nec Plinius à Virgilio dissentiat, non video quā possit ita statui. Vetoniam hanc coronariam, Galli à specie floris, ut arbitror, Ocellum: ab odore Cariophylleum nominant: vulgus verò Ocellum Damascenum appellari existimat, quod fortassè è locis quorum gentilitiū nomen refert, ad nos venerit. Sunt qui Oenanthem quasi Vitifloram putant dictam Theophrasto. Sed cūm flos Oenanthæ racematim cohaereat, huic autem in pulcherrimas Rosas, nec usquam vnā videantur in racemosam speciem colligi, sed vertices surculorum coronare, certè alilem hanc Betonicam Theophrastæ non nouit.

Turnerus contra Fuchsum (qui Vetoniam siue Betonicam inter potha Dioscoridis, esse voluit) negat Cariophylleum florem esse Betonicam, (quā de re tamen dubitet Lobelius) asserens Cantabricam Plinij. Sed nec Tragus vllum ex Cariophylleæ generibus ad Betonicam pertinere testatur, ac propterea genus hoc Cariophylleam alilem & Narcissum Germanicum vocauit.

Ocell. Bar-
baricum.
Barbaricum

Quam Recentiores Caryophyllos, & nonnulli etiam Ocellum Barbaricum & Barbaricam nuncupant, Gesner. hort. Betonicam & Vetoniam, alilem aut coronariam cognominat [Matthiol. Vetonium Coronarium dicere maluit Dod.] ad differentiam sc. alterius Betonicæ, quæ Græcis *αἰσιν* & *λυσίτροπος* dicitur: atque hinc etiam, Tunica flores dictos, vel etiam Tunicam

herbam cum plenisque hanc esse existimat: licet Bernardus Gordonius herbam Tunicam Dioscoridis Polemonium esse tradat. Cæterum, Iphyum apud Athen. lib. 15. quidam esse voluerunt annotante Dalechampio. Alij Iphyum Theophrasti 6. Hist. 2. & 7. Hist. 12. sed malè, Bulbosam enim esse plantam vel ex Theophrasto liquet. Aliqui tandem inter Saxifragias numerarunt, & præsertim sylvestre genus, teste Casp. Bauh. de quo infra dicemus.

Betonica coronaria satua flore pleno, dicitur Synon. Cariophylleæ Trago: Matthiolo & Camerario Cariophylli domestici: Lonicero, flos Caryophyllorum: Casalp. Cariophilus quem alios Violam Damascenam vocare ait. Dod. Latin foli. appellat Caryophylleum florem maiorem. Lobel. Obs. pag. 141. Icon. Plant. pag. 441. & Taberna Icon. & Hist. Caryophyllum multiplicem. Gesn. hort. Betonicam alilem Fuch. Vetoniam alilem: Dodon. gall. Betonicam coronariam: Lacinia Cantabricum Turneri. Casp. Bauh. Phyt. Cariophyllum 2. siue alilem vulgatum. Schvv. Caryophyllum satuum, item alibi Cariophyllos domesticos plenos. Cur Gerardus Cariophylli sylvestris multiplicis titulo, iconem Tabernæ montani Betonicæ satuæ proponit?

Betonica coronaria satua flore pleno Basilea colitur diligenter in hortis & sæpe flores magni venduntur: floret Maio, Iunio & Iulio, & plerumque toto anno colore albo, rubro, nigricante, rubro minus obscuro, caruleo, mixto ex albo & rubro: Monspelij, rubro, purpureo, rubello, vel incarnato, ut vocant, April. Maio, Iunio & Iulio: Lugduni frequens flore variegato mense Septembri: Genevæ copiosè florens Nouembri: Montbelgardi in horto illustr. Excell. Celsit. variorum colorum etiam ex semine flore pleno, multæ species serunt hiemem non repositæ: quibuldam tamen infesti sunt mures, teneras summitates, si non reponantur, rodentes, quod mihi sæpe euenit. Pulcherrimi sunt illi Caryophylli maiores foliis latis, partim rubri, partim albi, & punctis rubris notati, quos Germani vocant Junefer blumen. Vbiuis in Silesia in fenestris, pensilibus vasis, necnon in hortorum torulis spectantur ut nihil vulgatius. Florent diutissime tota quidem ætate, & autumnō, etiam interdum sanente loci tepore, hieme tamen rigida Schvvenckfeldio referente. Habentur in hortis inquit Dodonæus: sed speciosissimi serè in fistilibus vasis.

Seruntur frequentius auulis exiguis cum foliis surculis, seminibus raris: Nam è semine nati flores, ad agrestem naturam redeunt: minusque odorati, ut simplices, etiam si prius multiplices, redduntur. Adiguntur subinde surculis plantarum filis Caryophylli, quod illorum odorem flores alliciant, & iucundam eorum suauitatem naribus abundantius representent. Viua est planta, & multus durat annis, si hybernis mensibus à furore iniuriā tuta, in cellis vinariis, aut aliis similibus locis tepidis asseruetur.

Annotat Camerarius singulare huius esse floribus, ut Isaminis & Rosis, quod interdum primo tabescente flore, similem alium in eodē pediculo producant: Infusione quoque propagatū vidisse se aliquando ad tantā crassitiē in longius plantis caulem

tis caulē siue stipitem peruenisse ut brachii mediocri aquaret crassitudinem. Florem variegatum efformari, si semina plantarum diuersorum colorum in calami scriptorio includantur, terræque committantur.

BETONICA CORONARIA RARA
flore phœniceo pleno.

Descriptio



Perelegans hæc & rarior Betonice coronarie species, ea descendit reliquos, longos, subgraciles. Folia glauca cæsiue, canaliculata, firmiuscula, subangusta. In flore elegantia & varietas præcipua est. Hic antequam emerget, cornicula terna præmittit pallidè rubentia: succedit floris mediocri inter huius generis Betonice magnitudinis, color

puniceus est, peregrinus quasi, dilucior, unde vulgè lutei dicuntur, cum tamen floris Anagallidis phœnicei colorem non malè exprimant, ac etiam ad coccineum colorem accedant. Folia floris eleganter secta, veluti cristata videntur, raris subindè maculis aspersis. Etiam paulo flore tria prædicta cornicula eminent semonciali longitudine plus minus, Odor gratus ut in cæteris.

Caryophyll. multiplex minor.
Betonice hanc Coronariam Caryophyllum pleno flore Silesiacum miniatum vocat. Clusius. Schvvenck. Caryophyllū multiplicem miniatū, Caryophyllum domesticum plenum Ararum pomi colore, Pomerantose farbe Tiegelin.

Locus & tempus.
Duo genera habemus Montbelgardi in horto E. C. vnum flore simplici alterum pleno: vidi etiam Statgardiz in horto Principis: floret autem Iunio & Iulio.

Ylus

Præ cæteris ob colorem elegantem ad corollas in Silesia expetitur, verum odore minis fragrat.

BETONICA CORONARIA SIVE
Caryophyllum maior flore vario.

Descriptio. **B**etonice huic folia lata, flores magni, valde pleni & odorati, colore vario, multis lineis & punctis rubris, quædam folia semirubra, & quædam ferè totaliter, interdum in eadem planta flores omnino rubri, cæteræ partes floris albicantes.

Synonyma. Lob. Icon. Plant. pag. 442. dicitur hortorum Caryophyllum multiplex maior & minor rubro striatus, versicolor, peramœnus. Casp. Bauh. phyt. Caryophyll. 3. siue multiplex variegatus.

Icon.

Figura nostra facta ex ipsa planta virente, cui appinximus folium vnum iuxta suam latitudinem & longitudinem. Flores ex Plantino huic Tom. III.



Basileæ excellunt ubi vocant Zunder blumen.

BETONICA CORONARIA FLORE
plena maxima, punctis rubris
variegata.



appictos nolumus: Lobelij enim icon fortè melior est pro maximo Tabernæmontani, licet tamen pro vario non malè conuenire possit, quamvis in eo aberratum.

Montbelgardi in horto Ill. Cels. Wirt. abundanter ij flores ex Burgundia edeclati habuimus etiam ex semine Stutgardiano minores.

Caryophyll. Clusii
descriptum apud Tabernam non descriptum vidi Argentorapud Dom. Fredericum Meierum, maximum, volam manum penè implentem, albicantem, & stigmatibus rubris aspersum, plenum, sed paucioribus foliis quam vulgaris maior varius.

Descriptio

A Tabernæ. Synonyma
& Hist. pingitur

hoc titulo. Caryophyllum multiplex maximus, Groß gefüllte Tieglein blume/oder Grass blume. C. Bauh. phyt. dicitur Caryophyllus i. siue altissimus maximus. Lobel. maior. Tabern. maximus Lob. Obs. Belg. pag. 528. Groote dehele rooddringende vnde witachtighe pespicker Ginoessien. Caryophyllum maior rubens, & albicans, flore pleno punctulis rubentibus fornicatis aspersis. Gerard. Caryophyllum maximus multiplex, The great double Carnation. Dod. lat. in fol. Caryophylli floris multiplicis solam iconem sine descriptione habet.

Elegantia amœnitatisque pariter ac magnitudinis spectatas nobiliores Gallie Narbonensis ciuitates alere obseruant Gener H. Cherlerus, Nemausus præsertim, ubi dum ibi sub regio militaret stipendio Professor, non paucæ eidem à studiosis auditoribus oblata iustam Rose rubre magnitudinem æquantes. Florent Iunio Iulioque, uis aut tardius etiam pro cultorum industria.

Locus

Tempus

BETONICA CORONARIA, SIVE Caryophyllos flore simplici satiuus.

Descriptio

Tota facie satiuus siue domesticz densifloraz simili foret, si folia angustiora, & flores è quinis 'vt plurimum' foliolis simplices responderent, qui nunc rubri, nunc albi, nunc ex rubro fulci, nunc rosei siue rubelli, nunc ex rubro & albo variegati, striis vel punctis distincti conspiciuntur, odore etiam suavi, & odoratos Indicos Caryophyllos nonnunquam referentes.

Synon.

Dod. de flor. & Lat. in fol. Caryophyllei florem simplicem vocat, & sex vt plurimum foliolis constare dixit. Autopsia tamen nostra aliter rem habere testatur: Inscritbitur autem in Icon. Plant. pagina 440. Caryophyllus sylu. maior vulgarior.


Tab. icon. & Hist. Caryophyllus hortulanus, Betonica coronaria, Klein Same Negelin. Cas. Bauh. Phyt. Caryophyllus 5. simplex flore maiore. Gerard. Caryophyllus syluestrius simplex suauiter rubens.

Locus

Schvvenck. Caryophylli domestici maiores simplices rubri, albi, minati, purpurei variegati, Einfache oder holt Negelin/ rot weiß, leibfarbe/ Pomeranz farbene, wingspitzegre. Ex semine facile nascitur & hiemis frigora perferunt in Silesia.

Betonica coronaria flore simplici satiuus eodem tempore floret cum domestica plena, ex cuius etiam semine vt plurimum pronascitur.

BETONICA CORONARIA SYLV. flore simplici laciniato rubro.



L Obel. Icon. Plant. pag. 443. Caryophyllum syluestrem flore simplici laciniato rubro inscribere videtur, licet icon non in omnibus titulo respondeat. Casp. Bauh. Phyt. Caryophyllum 7. sine simplicem minorem.

BETONICA CORONARIA ARBOREA Cretica.

Descriptio

Dvis stipitibus & nodosis fruticat, crassiusculis & ramosis: folia glauca, sesquiuicium creiter longa, angusta, rigida, in acutum & pungentem mucronem desinentia, in stolonum & surculorum extremis duntaxat confertim posita conspiciuntur, vt muscaria totidè videre videaris, nam in reliqua ramorum parte, caduca, vestigiis relictis nodosam illam aspredinè efficiunt calyculi antequam in flores explicentur, exigui Echini instar spinulis hærent, ipsæq; ad eum mittero pungit: cæterum manentibus iisdem spinulis calix productior redditus florem exhibet simplicem circumscriptæ rotunditatis, è quinque foliis constatum



quem noster pictor non bene expressit in nostra iconè, per extremam oram incisâ, colore dilutè purpureo præditis, striatis, paulò ultra mediū lineola guttata saturatius rubente pictis, ex quarū omniū concursu circulus describitur, infra quē lanugo quædā apparet: mediū occupant stamina florum concoloria.

Quartus iam Locus est anans quod tempus

Semen Stuttgardiam à Iosepho Casabona hortulano ductis Florentiz, nomine Caryophylli arborer Candiz missum accepi. Floret mense Iunio & Augusto, hieme in hypogæum reponendus: multis anni mihi durauit.

BETONICA CORONARIA SIVE Caryophyllea repens, tubra & alba.



D Odranta: Descriptio
les huic sunt cauliculi teretes, geniculati: folia in singulis geniculis bina inter se opposita, oblonga, angusta, dura, mucronata, colore quasi cæcio, flor è calyculo rubente emergens, singulis cauliculis vnicus plerumque insidet, (interdum binus) quinque foliis constans, lentè simbriatis, coloris in

dilutè purpura rubentis, circa umbilicum hirsutus, & saturatiore purpurâ nitens, atque odoris ex vnus medio umbilico duo breuia staminula prominent: semen in calyculis paleaceum, sulcū: radix longa, tenues fibras spargens, ex cuius capite plures cauliculi latè in ambitu, & confertim sese diffundunt, fibrasque subinde agunt.


Clusius descriptionis author, tam in Pannoh. quam in Hist. post. caryophylleum syluestrem primum inscribit, narratque esse qui Vetoniam appellare malint. Non desunt tamen qui ad Plinii cantabricum referendam putent. Germ. Wilda negelin, Steinnegelin vocant. Ungari Zef sib.

Geln. hort. & Lob. in Obs. Syluestrium vetoniarum species floribus albis. Ruell. Betonica voluntariū: Betonica posterior. Tab. icon. & Hist. caryophyllus virgineus, Jung frowen negelin. Dod. lat. in fol. Armerius flos textus nonnihil odoratior, colore vt plurimum eleganter tubens: An Caper. caryophylli sylv. odorati & inodori sanguinei

sanguinei coloris flore pleno. Arido & inculto solo, quandoque iuxta marginēs arborum in ple-
risque Germ. Bohem. Silesiæ & Moraviæ locis fre-
quens reperitur. In multam æstatē floret & viget,
autore Dodonæo. Genevæ habui, & etiam nunc
Montbelgardi habeo florentem Maio & Junio.

BETONICA CORONARIA SIVE
Caryophyllea Corolla purpurea
insignis.

Descriptio




Non autem
Nallurgie
& hæc Caryo-
phylli species,
Rami supra
terram sparsi
ut in Betonica
coronaria re-
pente, denso
f. liorum stipa-
tu muniti, mi-
nus cæliorum:
qui ima parte
duriusculi &
ferè lignosi,
caules in duos
aut ad sum-
mum tres alios
ramulos divisi,
quorum qui-
libet singula-
rem sustinet

floribus elegantissimum, quinquepartitum, in am-
bitu pulchrè dissectum, & in medio amœna co-
rolla saturatius purpurascens decoratum. Cuius
odor suavisissimus gratissimusque.

Locus & tempus

An Lob. Obs. pag. 241. Armerii floris varietas?
Eleganter provenit Sturgardiz & Montbel-
gardi in hortis Ill. Ducis Wirtembergici ex semi-
ne. Præcox est, & reliquos antevertit: floret cum
coronaria repente antè dicta Maio. Iunio medio
penitus defloruerat.

BETONICA CORONARIA SIVE
Caryophyllea ex rubello albicans &
crispante flore cum corolla.



Tom. III.

Betonica hæc
coronaria
observata Stut-
gardiz in horto
Ill. a. c. florens
Maio, similis
est nostræ re-
penti foliis: ea
tamen paulò ci-
tius floret: flos
autem simplex,
quinquefolius,
ex rubello albi-
cans, corollæ
striis purpuras-
centibus &
simili nonni-
hil crispæ.

BETONICA CORONARIA MINIMA
micis aureis aspersa.



cem minorem alterum. Nec plura de hac Betoni-
ca legere memini.

Lob. in Ob-
serv. Belg.
pag. 510. sub
hoc titulo pin-
gitur: Alder
cleynste recht
op Gaende
Zeer aerdighe
gheplechte wile
de Ginofflen/
Caryophyllus
alter minimus
flore simplici
micis aureis
asperso: Et hæc
inscriptio
habetur etiam
in Icon. Plant.
p. 444. C. Bauh.
phyt. nominat
Caryophyllum
8. siue simpli-

BETONICA CORONARIA SIVE
Caryophyllus minor folio vindi,
nigricante, repens, flore
argenteis punctis
notato.

CAP. II.



Foliorum hu-
ius Caryo-
phylli raritas
descriptionem
promerita est:
ea enim tam
sunt Hyslopi
foliis toto vul-
tu similia, co-
lore, figurâ, nō
item odore &
sapore, ut le-
genti impo-
nant: ceterum
coliculi palmar-
es, Caryo-
phyllorum sil-
vestrium in-
stargeniculati,
nonnihil aspe-
ri, subhirsuti,
flores sustinent

Caryophylli silvestris, quinquepartitos, supinâ
parte hirsutos, suavè rubentes, argenteis punctis
guttatos, quorū singula folia lambdoeides lineæ
coccinea saturatior pingit, oræ autem crenatæ
sunt: porro autem pronâ parte color est ex lu-
teo viscens, levi rubore perfusus marginibus:
reptatrix est planta.

An Lob. Icon. Plant. pag. 444. Caryophyllus
minimus pilcellus lupinus, maculis aureis argen-
teisve aspersus?

Clus. Hist. post. Caryophyllei silv. 7. inscrip-

L 13

ptione pingit & supini cognomento describit.

Locus & Tempus. Nobis Mörbelgardi floret Maio & Iunio: Clusius verò crescere audiuit in monte illo non procul à Niclasburg Moraviae diffuso & umbrosis locis delectari.

BETONICA CORONARIA MINIMA
rubello flore pleno, repens.
CAP. III.

Descriptio

Betonicam coronariam minimam repentem *Beaulibus* in aliquot ramulos diuisis, in eorumque extremitate singularibus floribus, parvis, plenis, rubellis, foliis breuibus, latiusculis, florentem vidi Iunio Heidelbergæ apud Dom. Sprengerum, Spitz apud Do. Tengenadel, & Argenturæ apud Dom. Frid. Meier.



An Tabern. Icon. & Histor. Caryophyllus 15. montanus multiflorus, geniculatus sicut neglein.

An Gerardo Caryophyllus montanus purpureus wild Purple jagged Pinfe?

BETONICA CORONARIA FOLIO
aruginoso latiori, flore rubro laciniato, repens.
CAP. IV.

Hvic cauliculi paulò maiores crassioresque [Betonicà coronà parua folio viridi, flore magno.] Pedali plerumque altitudine assurgunt, geniculati, singula genicula ambientibus binis foliis, primo genere (Beton. coron. repente, flore rubente & albo) longioribus & latioribus, arugini quodammodò coloris: ex summis alis binis, ternis, singulatim autem nascentes flores, priori nominatae nò multum ab similes, quinque foliis per oras laciniatis, atque circa umbilicū carnē lanugine pubescentibus, constantes, rubri coloris, nullis corniculis inflexis præditi, odorati, qui è caliculis primùm emergentes, candidi futuri videntur: floribus succedunt cornicula fatiscassa, semen nigrum, planum, ut ceteri Caryophyllei, continentia: radix oblonga, fibrosa, à capite plures furculos in orbem diffundit, qui plerumque fibras agentes, adeò se propagant, ut breui totas areas occupent.

Semen.
Radix

Synon.

Locus

Tempus

Clusius descriptionis autor vocat Caryophylleum tertium: C. Bauh. Phyt. Caryophyllum 26. siue siluestrem Pannonicum, laciniatum, rubrum. Vnde autem primùm illatus, ignorat: sed in omnibus Austriacis, Vngaricis, Bohemicis, etiam Germanicis plerisque hortis soli refert, & Maio

mente cum reliquis florere:

Temperaturà medià præditos esse Caryophylleos flores voluit Tragus. Sunt qui ex iis Conferuas, ut vocant, conficiant, quemadmodum & Rosæ, Buglossæ, & Violæ saccharo conditi consueuerunt. Eiusmodi confectio imbecillitati cordis præsertim in ardentibus febribus apprimè conducit: alij aceto imponunt flores Caryophyllez rubros, quod iucundo odore commendant: hoc acetum dolorib. capitis olfactu & illitu temporibus, opitulatur. Flores Caryophyllez campestris, qui naturà ceteris calidiores existunt, destillantur. Ea aqua singulari experimento ad pellendum, calculum mensurà duum aur trium cochlearium bibitur. Calidà, siccàque pollere facultate hosce flores perhibet etiam Matthioli. Es sanè indicio esse potest odoris fragrantia & saporis amarulenta quædam. Qui purpureo colore nitent, præstant ad omnes cordis affectus, ad vertiginem, apoplexiā, paralytim, & conuulsionem, ex Betonicæ, aut Amaraci decocto poti. Asseruantur saccharo; non solum ad prædicta omnia utiles, sed etiam aduersus venena, venene solumque animalium ictus. Dantur contra pestilentie contagia: Id quod valentius operatur succus, ex vniuersa planta expressus. Haustus enim quatuor vnciarum pondere, ubi morbus inuaserit, liberat. Præstant syluestres quoque ad ea omnia, ad quæ satius siue altius præstare diximus, verum longè remissius operantur. Fuchsius siluestris succum calculo atterendo, ac educendo, necnon comitiali morbo laborantibus à recentioribus utilem credi, scriptum reliquit. Præstant (inquit Schvvenckf.) purpureo nitentes colore, Caryophyllus aromaticos redolentes: roborant ventriculum, cerebrum, cor, & iecur, vnde commendantur ad omnes prædictorum viscerum affectus, antidotisque inferuntur. Succus haud inferior est, qui ex granis tinctoriis Kermes dictis colligitur. In cordis affectibus, palpitatione, lypothymia, in capitis malis, vertigine, apoplexia, paralyti & conuulsione, cephalalgia, &c. ventriculi imbecillitate, cardialgia, &c. præstantissimū remedium. Commodissimè etiam in febrib. malignis propinatur. Acetum florum Oxvrrhodinis vtiliter permiscetur. Aqua ad eosdem vsus vitreis organis elicitor. Iulepis cordialibus & episthematibus hepaticis & cephalicis non sine fructu miscetur. Radix inodora, insipida, cum floribus in compositis sit præferenda, non videt Schvvenckfeldius. Plura qui volent de Caryophyllorum florum viribus & vsu, legat Tabernamontanum, qui ex iis, & vinum, & syrupum, atque oleum fieri commemorat. Gesnerus pro Been albo & rubro flores Caryophyllorum eiusdem coloris, id est, albos & rubros saccharo conditos substituit.


Vires & Vius.

BETONICA CORONARIA TENVISSIME
dissecta, siue Caryophyllea superba
elatio, vulgaris.

CAP. V.

Caulis huic sunt multi, cubitales & bicubitales, ramosi, geniculati, foliis inferioribus pluribus, latiusculis, dodrantalibus, virescentibus, superioribus ceterarum Betonicarum coronarium similibus, binis, geniculos amplectentibus, saporis amari: flores sparsi ex pediculis longioribus

Descriptio



ribus, quinque
foliis, nunc
albis, nunc
purpurascen-
tibus constan-
tes, longissimè
& tenuissimè
dissectis, umbi-
lico virecente,
hirsuto, odore
suavissimo: as-
culi succedunt
duas penè un-
cias longà, te-
nuia, superi-
ore parte in qua-
tuor partes
crenata, extra
calicem emi-
nentia, qui tu-
nica constat &
aliquot breui-
bus foliolis

iuxta principium semine abundant nigro, com-
presso.

Synon. Trag. in Hist. germ. vocat Mistwilt & hochmüt,
i.e. Superbam: in lat. Caryophylleam siluestrem
alteram, flore odorato; ex candido leuiter pur-
pureo: Anguill. epist. 12. Diosanthion Theophrasti:
Gein. hort. Vetonicam tertiam: Fuch. Betoni-
cam silv. alteram.

Clus. in Pann. p. 321. inscribit Caryophylleum
6. cognominatque siluestrem 2. tenuissimè laci-
niato & albo flore: In Hist. post. Caryophyll. silu.
sextum: Caryophylleorū florum sextum genus,
Austriacis mulieribus ob odoris fragrantiam in
deliciis habitum.

Tabern. dicitur Caryophyllus silu. plumarius
albus, Weissfeder aut Pflaum Negelein, wild-
er mütsillen: Gerard. white wilde, ragged
Pinke.

Lobel. in Adu. Superba Recentiorum, phœni-
cea purpurā insignis, Centaureo minori conco-
lor: in Obs. p. 241. Superba Fuchii & Recentio-
rum, Italorum Fior d'amor & Balsamin: in Ic. Plāt.
p. 451. Superba Austriaca Clusii.

Schvænck. Caryophyll. silu. 2. colore varians,
candido aliquando, interdum purpurascens.

Dod. gall. Betonica altalis minor, tertia Veto-
nicæ species, Vetonica altalis, aut coronaria. Lat.
in fol. Caryophylleus minor alter, Vetonica alti-
lis siue coronaria minor, aut altera nonnullorū,
Belgis à sterculorum foliis simbratis & pluma-
rum similitudine dissectis Plumfens flein Gi-
nosflen, h.e. Caryophylleus minor appellatus.

C. Bauh. phyt. Caryophyllus 20. siue altalis flo-
re tenuissimè dissecto: Superba Tragi: Vetonica
altalis minor Dod. gallici: Superba alba, medio
corolla purpuro-violacea obsolete cincta: Item,
Caryophyllus 22. siue siluestris alter flore laci-
niato odoratissimo, Caryophyll. 6. Clusii, flore nunc
candido, nunc purpurascens: Superba Austri-
ca Clusii.

Locus & tempus. Betonica coronaria, siue Caryophylleus super-
bus elatior vulgaris, tenuissimè dissectus Basileæ
flore Junio & Julio: Genevæ colitur in hortis:
in Sabaudia silvis copiosè reperitur, item in
Sundscania circa arcem Mölspurg diversorum
colorum, Montbelgardi in horto Ill. & c. flore
in fine Iulii & Augusto: semen maturat Septem-
bris. Clusio auctore spontè nascitur in humi-

dioribus Viennensis agri pratis, atque etiam ad
carduarum siluam, pratis vicinarum: declives
marginis, plenisque Austriæ locis: serius reliquis
flore, nempe Iulio & toto Augusto, interdum
etiam serius. Apud Belgas hortensis est.

BETONICA CORONARIA, SIVE

Caryophylleus flos, folio tenuissimè
dissecto, flore pleno purpurascens.

C A P. VI.



Descriptio
Duple x est
hæc Su-
perba plena:
vna enim in-
tensius purpu-
rascit, & spe-
ciosior videtur,
altera paulò
minor, minus
purpurascit, &
plures albas
ferè partes ha-
bet: folia utri-
que angustio-
ra, & non ita
glauca, ut aliis
Caryophyllis
plenis. Noster
pictor folia
paulò latiora
pinxit.

Inscripsit hæc Synon.

Lobelius in Icon. Plāt. p. 442. in Obs. Belg. p. 529.
Caryophyllum purpureum flore multiplici pro-
fundè laciniato. C. Bauh. phyt. Caryophyllum
4. siue multiplicem profundè laciniatum.

Superba plenæ duplicem differentiam ob-
seruari primò in Plumberg apud nobilem Joh.
Christophorum à Phir: post Stutgardiz in horto
Ill. & c. florentem Nouembri: Montbelgardi flo-
ruit Iulio.

Locus & tempus.

BETONICA CORONARIA, SIVE

Caryophylleus, flore tenuiter laciniato, maiore
albo & dilutius rubente.

C A P. VII.



Descriptio
Firmioribus
& longio-
ribus est cau-
culis [Betonica
coronaria mi-
nus ramosa,
&c.] maiore
etiam flore, li-
cet non minus
profundè per
oras laciniato,
nec odorato,
aut lactei can-
doris omnino,
aut dilutius ru-
bentis & quo-
dammodò car-
nei coloris,
breuib. villis
purpureis um-
bilici circum-
ferentiam in

plumarius purpureo cæruleus, brun balaw wild
feder Nägelein. An Gerard. Caryoph. plum.al-
bus, Purple jagged Pinks:

BETONICA CORONARIA LATIFOLIA
petra, flore punctulis albis notato.

CAP. XII.

Descriptio



Lignosa ra-
dix caules
emittit cubitū
vnum aut al-
terum altos, le-
ues, teretes, ge-
niculatos, ina-
hes: ad quorū
singula genicu-
la folia liliacea,
atro-virentia
flores in cauliū
& alarum ex-
tremis, suaeo-
lentes, multi si-
mul in umbel-
lae formam iun-
cti, ex oblon-
gis rubentibus
calycibus,
quinque foliis
constantes,

coccinei, crenati, circulum ē punctis albis, satu-
risque purpureis, citra imam foliorum partem
efficientes.

Synon.

Lobel. Icon Plant. p. 447. Armeria altera, mul-
tis in latum orbiculum congestis floribus orna-
ta, punctulis in gyrum asperis, foliis quā supe-
rior lationibus. Gesn. hort. Vetonica, vel Beto-
nica silv. alia in petrosis collibus, & asperis, sabu-
lofis, apricisque locis nascens: Scarlata quibus-
dam dicta: tanquam à coccineo floris colore.
Idem in append. Violam Marianam vocat.

Altera Ar-
meria
species

Dodon. Hist. flor. & lat. in fol. Altera Armerio-
rum species quam Germani Stein Niegale vo-
cant, aliqui Scarlatam à rubeo floris colore cōc-
cum referente.

Plur. Can-
dus.

Camer. hort. est inter Armerios flores ille, qui
elegantiori strobilum stipaturā umbellam consistit,
colore rubro & albo variegato, Carthusianer
blümlein/ i.e. Flos Carthusianorum. Clus. forte
huius meminit, sed obscurius nomine Armerii
floris, cuius verba paullo pōst ponemus.

Caryoph.
Armer.

Tabern. in Ic. & Hist. dicitur Caryophyllus
Carthusianorum i. Scharlach blümen. C. Bauh.
phyt. Caryophyllus 15. siue barbatus latifolius, &
Lychnis Monachorum Gesneri de hortis: Ge-
rardo Armeria suave rubens, Narrow leaved
sweete williams. Schvvenckf. Caryophyll. Ar-
merius, folio latiore & breuiore Saponariae. An
H. Lugd. p. 810. Viola barbata latifolia.

Locus &
tempus

Betonica coron. petraeam latifoliam obser-
uam florentem Iunio, Iulio, & Augusto diuersis
Germaniae in hortis: dum ex semine prouenit,
primo anno caulem non fert.

Vit.

Vsum huius introduximus Montbelgardi,
ad panni scilanei maculas tollendas, si,
cuiuscunque generis is fuerit, huius
herba fricetur. deinde limpida
aqua abluatur.

BETONICA CORONARIA LATIFOLIA
angustiore caliculo, foliis fastigiatis cincto,
suave rubente flore Lobelii, &
Armerius simplex flos Pan-
nonicus Clusii.

CAP. XIII.

L Obelio Ic. Plant. p. 448. dicitur Armeria alte-
ra suave rubenti flore, sed angustiore caly-
culo, foliis fastigiatis cincto: Casp. Bauh. phyt. Ca-
ryophyllus 16. siue barbatus hortensis angustifolius.
Dod. lat. in fol. Armerius flos alter, quoad
iconem: descriptio enim est Betonice latifolae
petrae, flore punctis notato. Clus. Caryophyl-
leis florib. congener Armerius simplex, & Arme-
rii genus simplici foliorum serie praeditis flori-
bus: cuius quinque tradit differentias.

Synon.

BETONICA CORONARIA LATIFOLIA
petra pleno flore rubro, vel ad purpureum
accedente & albo.

CAP. XIV.



Hic folia Descriptio
inferiora
lata, ut in pe-
tra simplici
dicta, minus ta-
men: flores ru-
bri, vel ad pur-
pureum acce-
dentes, vel
quod rarius, al-
bi, pleni.

Clus. in Pann. Armeria
p. 327. Itemque pleni du-
H. st. post. dicitur plex diffe-
rentia.
Armerius
pleno flore, du-
plici, tripliciue
foliorum tex-
tura constans.

Lobel. in Ic. Synon:
Plant. Armeria
rubram multa-

plicem vocat: Tabern. in Icon. & Hist. Caryo-
phyllum Carthusianorum 3. Gerard. Armeriam
rubram latifolia, broad leaved sweete williams:
C. Bauh. phyt. Caryophyllum 11. siue siluestrem
pleno flore.

BETONICA CORONARIA MINVS
latifolia, flore profundè dissecto.

CAP. XV.

Eradice alba fibrosa plura prodeunt capita fo-
liorum vnciam ferè latorum, palmum longo-
rum, atro-virentium, similium quodammodo
Plantagini angustifoliae, in quibus duo nervi exi-
guituxta costam secundum longitudinem exten-
duntur. caules sesquicubitales, recti, glabri: in
plures ramos diuisi, per quorum genicula gema-
na folia alterno posito discrepantia angusta, sur-
recta. Summitates ramulorum flores stipant sua-
uiter olentes, accedentes quadantenus ad Su-
mm

Descriptio



perthæ dictæ
florem, minùs
tamen profun-
dè atque tenui-
ter lecti, sed
profundiùs mul-
tò quàm in Be-
tonica alia lati-
folia, purpurei
potissimù circa
foliorum media
& umbilicum,
extremitatibus
atque segmen-
tis ad albedinè
tendentibus, in
quibusdam etià
saturatius can-
dicantibus, in
quibus apiculi
eminent gemi-
ni, candicantes,

exigui: sapor radicis & foliorum amarus.

Extat huius imago apud Tabern. in Icon. & Hist. Caryophyllei Carthusianorum secundi in-
titulatione, sed sine ulla descriptione. In eius
etiam effigie desunt folia lata, per capita disposi-
ta, quæ etiam præter nostram mentem à pictore
nostro omissa: maluisse quoque flores paulò
profundiùs in nostra icône fuisse pictos. Gerar-
do dicitur Armeria rubra.

Floret Iunio & Iulio in horto Montbelgarden-
si, egregio naturæ coronaræ specimine, ob flo-
rum copiam & elegantiam. Vnde nacti sumus
non recordamur.

BETONICA CORONARIA LATIFOLIA, flore picturato Vesuntina.

CAP. XVI.

Locus &
Tempus.



Vesuntio.
Montbel-
gardu culmus
propter insi-
gnem venusta-
tem quæ pol-
lèt. Nam & ibi
elegantiz gra-
tia in hortis co-
luntur, florènt-
que Iunio &
Iulio mēfibz,
& Montbelgar-
di Augusto, in
horto Ill. E. C.
Virt. D. Car-
gillus Scotus
misit nobis Lō-
dino cum hac
inscriptione:
Armerius flo.
versicolor, al-
bus, ruber, carneus, guttatus in eodem ramulo.

BETONICA CORONARIA SYLV.

siue Caryophyllus flore albe-
scente, striato.

CAP. XVII.

Descriptio

Betonica coronaræ sylv. similis foliis & multis
simul floribz, pulcherrimis, albicantibz, striatq;

purpurascētibz. Reperta in sylvis à D. Tengnā-
gel asseffore Spirensi, qui eam in hortum translu-
cit, ibidēmq; floruit Iunio, cubiti altitudinem
excedens.

Locus &
tempus

BETONICA CORONARIA, SIVE Caryophyllus filu. vulgarissimus.

CAP. XVIII.

Hic caules plures, & diuersis capitibus, recti,
rotundi, strigosi, nunc palmares, nunc pe-
dales, ac etiam cubitales, non ramosi, nisi interdū
in summitate: folia graminea, viridia, ad genicu-
la bina, propter terram numerosiora: radix lon-
ga & satis crassa, colore foris fusco, intus albo, sa-
pore subamaro: flores modò singulares, modò
plures simul, suæ rubentes, odore nullo excel-
lente, per obtusum marginem crenati, quinque
foliis constantes, ex vasculo oblongo, tereti, a-
tro-rubente, cui ad basin foliola acuta calyci æ-
qualia, sæpè breuiora, apposita.

Descriptio

Hæc est illa Caryophyllea siluestris, siue tertia
Tragi, flosculis, radiculis, calycibus, Caryophyl-
lex satiaz, sed longè minutissimis: flosculis qui-
dem senis, interdum octonis, rubore nigrescente
quali, nonnunquam & dilucidiorē tinctis, isque
exilioribus magis, quò caules proceniores exute-
runt.

Synon:
Caryophyl-
lea sylv.
Tragi.

A Fuchsis Betonica siluestris inscribitur, ac ad
Betonicam alteram dioscondeam cum satia re-
fertur.

Matthiolus in prior. comm. vocauit caryo-
phyllum florem siluestrem, plantam spontè na-
scentem, traditque in post. comm. alteram flori-
bus rutilis, & alteram candidis. In Histor. germ.
& Epit. floribz. dilutè rubris, aut valdè rubris, inter
Caryophyllos omnium minimis, pendè inodoris.

Camer. apud Matthiol. nouam posuit iconem,
quæ an sit caryophylli, de quo hîc agimus, dubi-
tamus.

Caryophyl-
lea sylv.
Matth.

Icon Cam.

Dodon. gall. appellat Vetonicam secundam
veram, & Herbam tunicā quorundam, floribus ve-
plurimum rubris, interdum punctis notatis, duobz
tribus, nonnunquam nonem aut decem si-
mul foliis angustis. Lat. in fol. Armerium florem
primum, & Armeriorum florum speciem pri-
mam, foliis aliquantulum, quàm maioris Caryo-
phyllei latioribus, colore herbaceo virentibus:
flosculis parvulis, pluribus simul in quandam
veluti umbellam congestis, semper ferè cocci co-
lore rubro splendentibus, punctis interim can-
didis, circa medium variegatis: rarissimè candi-
dis. Ornate ait hunc flosculum Belgicorum hor-
torum areas: apud Italos & alibi locis incultis,
& aridis exire: Gesnerum circa Gryphij lacus ri-
mas in Heluetia à se repertum scribere: proue-
nire & alicubi in Belgio locis desertis, iuxtaque
aruorum & pratorum margines ac scrobes, sed
multò quàm in hortis minorem & tenuiorem:
maturè & Aprilis sæpè mense, aut Maio florere,
Caryophylleos flores antecedentem: plumi-
ma inde æstatis parte vigere: Caterùm, hunc
florem nihilò magis, quàm Caryophylleum sa-
tium, cum Vetonica altera, aut Polemonio
conuenire.

Vetonica 2.
Gera. &
Herba tuni-
ca Dod.
gall.
Armerius
flos 1.

Lobelius in Adv. remittit ad iconem Dodo-
næi, quæ olim erat Fuchsiāna: in Obs. p. 241. &
Ic. Plant. pag. 446. Armeriz siue minoris Caryo-
phyllei siluestris, minùs odoris [in Obs. hæc duo
nomina non leguntur.] solus latioribus titulo
proponit

Vetonicam
alterā esse
negatur:
itemque
Polemonium
Lobel. notat.

proponit eandem figuram, quam Dodonzus in postremis, quæ flore pleno, ac indistinctè de Caryophylleis floribus scribit.

Caryophyllus montanus primus Tabern. in Icon. & Hist. an ab eius Caryophyllo 13. siue montano albo secundo colore tantum differat, & an iidem cum nostra Betonica vulg. silvestri, asserere non audeamus, quia non describit. Eisdem icones & Gerardus assumpsit, & Armeriam alban, white Johns, lib. 2. cap. 174. & Caryophyllum montanum album, white mountaine Pinke cap. 178. inscripsit, an autem has intelligat, me latet.

Nomina
Inguarum

Schvvenckf. Caryophyllum silv. primum vocat, & Caryophylleam silvestrem Thali: Germani Sonder Negelin / Stein Negle / feld Negelin / wild Negelin blumen / wild gras blumen, bey den blumen / & bluta tropffle: Belgæ Cuyderels / quasi dicas fasciculum florum enim fasciculum propriâ lingua nominat. Gallo-Belgæ Cuyderels: Galli Armoires & Armoires: Itali Garofani & Garofali saluaticchi.

Locus
&
tempus.

Basilea floret adhuc Octobri quâ itur Montets & inter portam Stein & Eschen extra urbem, & quâ itur Krenzack Iunio, Iulio, Augusto, & Septembri: Genevæ in pratis Maio. Gignitur etiam in sylvis cædis, deinde & arenosis aridis & incultis campis, teste Trago. In pratis, montibus, nitidisque locis nascitur in Ætate magna copia, Fuchsius referente. Vbiuis spontè provenire ait Schvvenckf. in petris, montosis & silvosis marginibus.

Vires & V.
fus.

Sanguis calidior censetur. Succus cum aqua Ononidis, & florum Lili conuallii calculum attingit & comitialibus prodest. Plura lege anti.

BETONICA CORONARIA squammola silvestris.

CAP. XIX.

Descriptio



Rectos complures emittit caules, læves, geniculatos, dodrantales, interdum cubito longiores, ad quorum singulas iuncturas binæ gramineæ folia, angusta: summo cauli, extremisque ramulis calyx insidet squammas habens albas, florem promens parvum pallidè rubetem, quo marcescente

alius quoque flos, subinde plures suis singulis calyculis obvoluti subnascuntur, tanto numero, ut tandem prægnanti calyci, qui reliquos iuniores cum suis flosculis complectitur, aliis sobolis multitudine rumpatur.

Synonyma:


Inscribitur hæc à Lobel. in Ic. Plant. p. 449. & Obs. Belg. p. 534. Armeria prolifera, funderfene: Tom. III.

C. Bauh. phyt. Caryophyllus 18. siue silvestris proliferus. Tabern. in Icon. & Hist. Caryophyllus silv. minimus, Klein wild Negelin. Gerardus inepto Viscaria titulo huius iconem dedit, cum qua Viscaria nihil commune habet. Thal. Lychnis 4. dicitur.

VIOLA BARBATA ANGUSTIFOLIA

Dalechampii.

CAP. XX.



Canisbus Descriptio:

Cest spontanea non multum palmum excedentibus, culta cubitalibus & altioribus, teretibus, tenuibus, hirsutis, geniculatis, ramosis, sæpè vnicaulis: folia ex articulis binæ aduersa, basibus coeuntibus. caule amplectuntur, culmum laeta, palmum circiter longa, pilosula, obcurè viridula, sapore

quodammodo viscoso: calyculi in extremis ramulis modò singulares, modò plures, nullâ serè umbellæ formâ, tenues, vniculi longitudine, striati, foliolis acuminatis, æqualibus, aut etiam altioribus obvallati, è quibus flosculi emicant Armeriæ hortensis, sed longè minores, quinque foliolis non ut illis rotundatis, sed mucronatis, & per extrema modicè crenatis, colore foris ex viridi rutilo, intus suavè rubente, punctulis argenteis guttato, qui faciliè conuoluntur, ac quibus superueniunt vascula longa, ymen, ubi maturum, compressum, latum, & nigrum continentia: radix lignosa, tenuis.

Lobel. in Ic. Plant. pag. 443. inscripsit Armeriam silvestrem alteram. H. Lugd. pag. 810. Violam barbatam angustifoliam. Figura autem Plantiniana nobis arridet, displicetque Dalechampii, ac etiam nostra ex Fuchsiânis emptus, utpote quæ minus bene exprimant flores.

Floret Maio & Iunio circa Montbelgardum: in horto Ill. & c. Iulio & Augusto: in monte Rotsberg prope Malmunster etiam adhuc Octobri.

Locus
&
Tempus.

APHYLLANTES MONSPELIENSIBVS.

CAP. XXI.

Mltos iunceos enodes caules bipalmares c. mittit, quorum singulis flos satis magnus insidet vnicus in summo, quatuor denticulatis cæruleis foliis constans, ex calyce oblongo erumpens, gustu dulci: radix fibris multis longis contorta, lignosis, duris, albis constat: circa quam folia multa graminea, celeriter marcescentia.

M m. 2

Synon.



Locus & Tempus

num ex Monspelio, locis saxosis flores Aprilis: In cacumine montis Ceti in fine Maij & Iunio.

GARYOPHYLLEVS FLOS APHYLLO-
caulos, vel junceus, minor & maior.

CAP. XXII.

Descriptio



quot capita diuisa, ex reliquijs veterum solorum quasi capillata: caulis primò aliquot vnciarum, deinde palmaris, tenuis, capitulo Scabiosæ ouinæ accedenti, vaginâ longiuscula: exterior facies capituli constat foliolis mēbraneis, exterius virētib., interius, argenteo colore lucentib.: totū capitulū scaturit membranis foliolis lucentibus: inter ea exoriantur flores, quos subsequuntur semina aliquantū longa, cum membraneo vmbilico, vt in Scabiosis.

Descriptio Maioris. **Caules** Maior eadem vel valdè similis Iunco caules dodrantes & cubitales emittit, rectos, enodes, quorum vnusquisque cacumini (quod vncialis & longior vagina membranea obuoluit) stus insidet item glomeratus, Schönophrasii ferè similitudine, ex albo purpureus, foliacearum squamarum vallo circumdatus: radix longa, lignosa, teres, crassiuscula, in multa capita diui-

Lob. in Adv. Aphyllanthis Herbariorum Monspeliesum titulo depingit, & describit. Sed in Icon. Plant. p. 454. Aphyllanthus Monspeliesus vocat: Taber. Ic. & Hist. Caryophylleum caruleum. Cesp. Bauh. Phyt. Caryophyllum 13. sine caruleum Monspeliesum. Monspelij prope Castellum in monte, & quā itur Frōignia-

ditur, vnde terram proximè magnā seges foliorum emergit, gramineorum, ylaucorum, latitudine paulo subinde variantium. *Det. m. a.*

Cur radicem tenuem huic assignet Dodonæus non video, nec prior, nec posterior talem sortita est. Is etiam in Hist. gall. vocat Gramen marinum, ac etiam Pseudo-Moly, licet non Moly speciem, sed potius Graminis faciat in Histor. lat. in fol.



Lob. in Adv. hunc in modū presentē stirpem commemorat: Caryophyllus marinus omnium minimus, quē Belgæ Moly marinū indigitarūt, alij Holostium, propter folia graminea, rigidiuscula, colore glauco, similia Caryophyllis, &c. Hac arearum margines ornant Belgæ & Angli, apud quos

in maritimis frequens oritur: calidis & mediterranei maris litonibus, non perinde occurrit. Sed conuallibus Calcaris seu enæ montis, passimque alibi in Gallia Lugdunensi, locisque à mari distitis, protus eadem repentur, nisi plures funderet caulicūlos pedales: folia item quadruplò maiora, & reliqua grandiora. Hæc Lobelius, qui in Obl. pag. 242. itemque Ic. Plant. p. 452. Caryophyllum marinum inscripsit priorem: posteriorem verò Caryophylleum montanum alterum. Et hanc perperam Cantabricam Plinij cognominari ait, creditque potius esse Staticeen eiusdem. Testatur autem hanc Louanij florē albo variatē in hosto D. Io. Limoges, aliàs Nonnij.

Priorem H. Lug. pag. 994. Pseudo-Moly Dodonæi: posteriorem pag. 1190. Staticeem.

Staticeen hanc H. Lugdunensis vocat Clus. in Pannon. p. 716. Caryophylleum, vulgò Gramen maius cognominatum, folijs Graminis montani spicati. In Hist. post. vtriusque meminit. Ad Armerium florem, inquit, procul dubio referendū sunt duæ hæc plantæ, quæ à rei herbariæ studiosis Belgis Graminis marini maioris & minoris nomine vocantur, tumeti plerisque alijs procul à mari distitis locis etiam spontè præbuciant, &c.

Caryophylleum aphyllacaulon minorem vocat Tabern. in Icon. & Hist. Gramen marinum minus, germ. Klein meergras: Belg. Seegrass, Zeginoflen: Gerard. Caryophyll. marinum minimum Lobelij: C. Bauh. phyt. Caryophyll. sine montanum minorem, vel marinum: Schvvenckf. Caryophyll. silu. 7. Klein grass Nægelin. Maiorem. Tabern. Gramen marinum maius, groß Meergras: Gerard. Caryophyllum mediterraneum. C. Bauh. phyt. Caryoph. 37. sine montanum maiorem, radice longissimā: Schvvenckf. Caryophyll. silu. 6. groß Meer Nægelin.

Caryophylleum aphyllacaulon minorem delatū ex Anglia dono accepti à Turnero anno 1571. *Locus tempus.*

Moly marinum. Heliosium.

Armeria silu.

Armeria silu.

Synon. m. a. n. o. r. i. s.

Locus tempus.

anno vero 1595. à Do. Vursilio collecta in horto
Reginæ Angliæ. Sed ex Angliâ quoque transmi-
sit Cargillus Garyophylli graminis maritimi nomi-
ne: Tabern. collegit in superioris Germaniæ co-
mitatu Fagendenbôgen locis humidis, arenosis,
graminis, ibique copiose: Schivvenckt. in ag-
gribus secus itinera frequentem, Augusto cum
tore. Maiorem nos collegimus Lûgduni & cir-
ca Lutetiam anni 1596. Augusto cum suis capitulis.
Scabice Dalechampiûs in aridis & petrosis, qui-
etiam ex lapidum saxorumque rimis integram
evellere volens, saxum diffregit. Gratien pol-
yanthemum reperit in pluribus per Germaniam,
Bohemiâ & Silesiâ locis in agris, ac non raro
juxta Rhenum ac Mosam, atque vno quidem lo-
co minus ac altius, alto vero minus ac humiliter,
auctor est Dodonæus: exire & in palustribus
nonnullis, haud procul à mari in Z-landia. Quæ
de loco Clusius & Lobel. scripterunt legenda
antea.

Virus &
Vfus.

Example
Name: _____
Date: _____
Page: _____

Valeriana
Flora.

Osterum, licet Dodonæus vsum in medi-
cina nullum habere testetur, sed flosculos in coro-
nis solam gratiam aliquam obunere dicat, Dale-
champius tamen saporem totius Statices plantæ
adstringentem perhibet, ac facultatem habere ad
miraculum usque desiccandi, & erumpentium
humorum impetum cohibendi, siue trita admo-
ueatur, siue succus eius bibatur. Dysenteris suc-
currere, mensum abundantiam, sanguinis è na-
ribus profusum sistere, sanguinem excreanti-
bus opitulari. Denique vulnerariam esse, & mali-
gna vlcera ad cicatricem perducere.

BETONICA CORONARIA, QVÆ
Caryophyllus pumilio Tauricus
Clusio.

Слр. XXIII.

Description



Impeto, in quinque latinis diuiso, quæ non ineptum cum Germanicæ Helueticæ flore compares.

Synon.

Onl: in Pannib. Act. Caryophyllum s. cognominatque pumilionem Tauricum: in Hist. post. inferibit Caryophyll. silv. octiduum. Tabern. in Leon. & Hist. Caryoph. montanum tertium, Steud. Negelin. C. Bauh. Caryoph. 29. siue alpinum calyce oblongo, hirsuto. Gerard. Caryoph. mont. clusii.

Tom. III.

Provenit in Tauro Caripithi monte solote. Locus.
nui & arenâ splendens referto : floret sub finem Tempus.
Iulii & Augusti.

BETONICA CORONARIA SIVE
Caryophyllus gramineus pulillus.

С А Р. XXIV.

Multorum capitum est radix, mediocriter
crassa: folia conferta rigida, dimidio Hyssopi
foliis minora, acutiora, viridantia: caules crebri,
palmares, graciles, geniculati, foliis binis ad no-
dos donati, indivisi al. quando, interdum in
pauculos breves surculos divisi, calyces sin-
gulares, vel geminos gerunt seminales, vel
penē viciales, & quibus steremineant.


An Caryoph. silv. humilis fl. maiore gemino
C. Bauh. ? An Caryoph. silv. Tauricus Clusi. ?

Geneæ collegit Gener Cherlerus, & inde attulit.

BETONICA CORONARIA SIVE

Tunica minima.

С л р. XXV.



Betonica ff. Descriptio
Bue Tunica
minimæ radix
pro plantula
modo crassius-
cula, multorum
capitum, coar-
cti numeri, pa-
lmares & al-
tiores, ramosi,
ad quorū lin-
gula genicula
sunt foliola bi-
na ex aduerso
posita, peran-
gula, vnciam
circa longa:
extremis ra-
mulis flosculi
maiusculi, lin-
gulares super-
nascuntur, ex

albo purpurascens, & quinque foliis compo-
siti, in quibus stria purpurea, calyce ambiente ex
squamis oblongis lucis viridatibus striatis. Fi-
gura hæc Fuchiana non bene exprimit nostram
Beronicam, & potissimum radicem.

H. Lugd. pag. 171. dicitur *Tunica minima*, & *Holosteum* quorundam, radice candida, flore gustu austero: C. Bauh. phyt. Caryoph. 19. siue silv. C. Bauh. flore minimo, aliquando maior, aliquando erecta, ^{171.} aliquando repens, ramosa, *Saxifraga Lobelii*, & *Tunica minima Lugdunensis*. Sed ferri possent non possunt existimanti Lobeli *Saxifragiam* eandem esse cum *Tunica minima Lugdunensi*.

Tunicam minimam inueni inter Lugdunum
& Moluellam Sabaudiz : Geneuz florentem
Majo in muris, è regione domus Senatoriz, &
passim au Plain palati mente Iunio. In sabuletis,
aridis locis, & murorum subgrundis Galliz &
Italiz nasci perhibetur.

Aldroandum ad hæmorrhoidas fluentes hac
vix relict Agrius Med. Argentinensis.

Locus, &
tempus.

Vfus ad hunc
m. phol-
das.

Ma 3

BETONICA SIVE TVNICÆ MINIMÆ
similis planta.

CAP. XXVI.

Descriptio. **D**odrantalē est plantula, aliquando pedalis, gracilis, plurimā ramulorum diuisurā stipata, haud secus ferē ac Alfine angustifolia, à quā tamen pluribus notis manifestē differt, quemadmodum à Betonica minima quoque.



Foliola rara & ad singulos ramulorū geniculos bina, angustissima, longiora, quā in Alfine dicta. Extremis ramulorum flosculi appensi subpurpurei, pulchelli;

Betonica supra dicta aliquatenus similes, calyce folioso, qui & valcula sequentia flosculos sustinet, quæ nullis stribus prædita sunt ut Alfine tenuifolia. Semina continent exigua, valde nigricantia. Radix exigua tenuisque alba, sed dura ac ligrosa, in aliquot diuisuras secta. Annua est.

Locus & Tempus.

Florebat & semen gerebat mense Augusto in agris montis Rofsberg prope Masmunster: Montbelgardi Iulio supra muros. Frater reperit in monte prope tres pontes dictos Gab in Gallia Narbonensi florentem Verē.

SAXIFRAGA ANTIQVORVM QVIBVS.
dam & de Gyplophyto, siue Symphyto pet-
rizo, maiore & minore Thalij.

CAP. XXVII.

Descriptio



Digiti parui magnitudine siue crassitudine obseruauimus radicem lignosam, palmo longiorem, in numerosa capita diuisam, vnde stolones pululāt innumeri, palmares & longiores; geniculati, folia ad iuncturas binis, ex aduerso positis, Hysopii similibus, minorib. amicti: flos vniuscuiusque flo-

lonis cacumini insidet vnicus; multis in medio staminibus, ex calyce albedo, semunciali, stribus viridanubus virgato, inferius angustiori.

Matth. in Diosc. Saxifragum tertium maius vocat, à forma & ab effectu: In post. verò comm. cum mag. fig. Saxifragiam magnam inscribit.

Saxifraga
tertium v. o.
i. u. Matth.

Lob. in Adv. Saxifragiam, siue Saxifragam Antiquorum sine tergiuersatione intitulat, monēque Saxifragæ vocem apud authores esse multiuocam, nec vnius cuiuspiam stirpis indicem, sed omnes vulgò Saxifragas vocatas esse ob insignes vires, efficaciamque quā prædita sint. In Obs. p. 233. Itēque Ic. Plāt. p. 428. pro Saxifraga magna Matthioli & Itatorum, nouam habet iconem, Idem etiam meminit Saxifragæ Aduers. p. 183, exhibetque eorundem effigiem in Ic. Pl. Saxifragæ antiquorū inscriptione. Ceterum obcurus nobis videtur Lobelius, ut qui in Adv. non distinguat suam Saxifragiam antiquorum, à Saxifraga Itatorum, secus quā in Ic. Plant. & Obs. vbi, quasi diuersæ essent, duas icones & descriptiones proponit: nec annotat an eedem vel diuersæ sint, aut saltem variant, ita vtdubius hætere videatur: prior quidem descriptio Lobelij non malè conuenit Saxifragæ Matthioli, si radix non adscriberetur parua: verū accidit forsitan illi ut cum delinearet vnica habere ad manum plantam iuuenem aliquā aut variantem.

Saxifr. an-
tiquorū Lob.

Camerarij apud Matth. Saxifragæ magnæ noua icon (cui in H. st. germ. flores paruos pallide luteos, vascula verò rotunda paruo semine plena assignat) non in omnibus consentit cum Saxifragia Matthioli magna, quinimò multa habet similia cum Betonica coronaria siue Tunica minima, licet color floris pallide luteus non respondeat: Matthiol. etiam florem album asserit, & Camer. in Epitome, ita ut in floris colore etiam sibi contradicat. C. Bauh. Caryophyllo suo in phyt. 36. siue Saxifrago appinxit iconi Matthioli flosculos sex foliolis constantes. H. Lugd. p. 113. inscripsit Saxifragiam magnam Matthioli: Castor Saxifragiam quintam.

Huius magnam copiam Italia, Gallia, Delphinatū, Angliæ, quam plurimūque aliorum tractuum arida, cretacea, montosa, saxosa, sterilia & sabulosa fundere prodidit Lobelius. Nobis verò attulit Genet Cherlerus ex Gallia Narbonensi.

Miris laudibus hanc plantam Matthiolo commendauit Calzolarius ad calculos renum educendos in potu.

Thalij Gyplophyton, seu Symphytum petraeum, maius & minus quod attinet, vtrumque sibi ignotum fatetur Frater C. Bauhin. quod & nos, id, quousque melius innotescat, ad Antiquorum Saxifragam referri posse existimantes.

SAXIFRAGIA BAVARICA.

CAP. XXVIII.

IN admirabili montis Baldi corona, Pona teste, Ilex rimis cautis prodit Saxifraga Bavarica, primū ibi locorum à D. Ioach. Iungermano obseruata: scuticæ subtili radice, albaque, frequentibus caulibus, teretibus, nodosis, coloris diuini: foliis oblongis, crassis, atque æquali ordine, sed ad opposita latera alternato situ bina distincta, in quorum summitate frequentes flores lactei coloris asserunt, quinque foliis compositos: quorum in medio

Descriptio

ordine, sed ad opposita latera alternato situ bina distincta, in quorum summitate frequentes flores laetei coloris afferunt, quinque foliis compositos: quorum in medio quidam staminula pallida conspiciuntur. Huius semen planum est, coloris nigri splendescens. Planta perennis est, profusque sabacei saporis. Plantulam iconem minorem misit diligentill. Botan. Io. Pona Veronâ anno 1609. Iunii principio floret, eiusque semen eodem mente ad maturitatem peruenit.

DE LYCHNIDE CORONARIA AC
sylvestri, ex Veteribus & in genere.

CAP. XXIX.

Dioscor.

Pres.
Diversa le-
bia.

Natha ap-
lat.

Lychnidis coronariae [Λυχνίς κορωνάρια] florem esse similem Leucoto ait Dioscorides sed purpureum [ιουρίσους] & qui in corollas ne-
stat: cuiusque semen cum vino potum istis à scorpione auxiliatur: vel ut legit Marcellus, cuiusque semen & flores cum vino bibantur: & per se utrumque contra Scorpionum idus.

Sunt qui hanc inter nothas Dioscoridis Athanaton, i.e. immortalem, quod longissimè à prima æstate ad extremum Autumnum floreat: qui Acylonium, qui Bullarion, qui Gruis pedem, qui Corymbum, qui Taurium, qui Sceptum, & qui Maloion appellant. Magi Apocathemenes sanguinem, Egypti Semeon, Romani Genicularem siue Bellariam dicunt, & Bellaryon, quæ vox licet incertam modò habeat in Græcis significationem, antiquam tamen fuisse in Lexico suo Hesichius indicat, Bullarin Trifoliam herbam esse dicens, nec ultra quicquam de ea testatus est. Ceterum, quo argumento natus in mari sæpe visum piscem, Lucernam veteres Romani appellauerunt, igneà per os exerta lingua tranquillis noctibus relucens: eodem, inquit Marcellus, in humidis nascentem magnitudine Violæ, sed figurâ Rosæ, florem Lychnida, ut fertur, Veteres Græci dixerunt. Noctibus enim hic etiam fulgere creditur, & ut nomen ex re illi factum indicat, ignis fulgore quodam videntium oculos in se convertere. Non aliter quàm & Felium oculi flammæ modo in tenebris fulgent, & putres in tenebris caudices eodem tempore ignium speciem quandam videntibus afferunt. Quorum etsi diuersa materia sit, communis tamen omnibus causa, humoris copia est, nisi fortè in foliis, quod ab Aegyptiis observatum fuerat, non in humore, sed in Lunæ luminibus lucis eius causa sit: ad quorum quotidiana incrementa augentur, dilatenturque in eius animalis oculo papulæ: & cum toto orbe mortalibus fulget id Sidus, tunc etiam copioso lucis fulgore intra domesticos parietes animalis eius nobis oculus splendeat. Verum tamen alterius quæstionis est, horum causas & rationes inuenisse.

Apud Theophrastum in Gaza Iuernulam vertit, inter flores æstiuos & coronarios. Sic Plinius Lychnim flammeum (ex eo quod diximus argumento,) & Rosam Græcam (à gente) vocat, notum si in humidis prouenientem, nec unquam excedentem quinque folia, Violæ magnitudine, odore nullo. Ex quo demitteretur aliquis, quod coronarius flos sit factus, & coronarii nominis honore ab agresti distinctus, & deficiente odore ob solam floris speciem in coronis amarus, inque tam magno nominum & appellationum ambitu

ingentibus sit habitus.

Lychnis sylvestris à Dioscoride non describitur, sed omni ex parte satiuæ similis traditur. Nec Plinius aliter decreuisse creditur, & ante cum Nicander in Theriacis. Quod denique per omnia similem satiuæ, Lychnidem sylvestri Dioscorides dixerit, eundemque usum ac vim attribuerit, inde factum putat Cornarius, quod Galenus 7. simpl. huius non meminerit seorsim, de ea quoque intelligendum relinquens, quod de coronaria dixit, nempe semen calidum & siccum esse ordine secundo, aut etiam tertio, modò non obliuiscamur sylvestria omnia esse satiuæ fortiora.

Iam non parum eos errasse constat, Dictatore Maranthâ, qui diuersas plantas pro coronaria Lychnide ostendunt, floribus vel subpurpureis, vel ex purpureo rubris, vel rufis constantes: cum sciamus à Dioscoride purpureum colorem ei tribui: qui cum in floribus sit perfectus quæri debet, ac propterea Senensis opinio in hac planta ad veritatem magis accedit: quàm ob rem si Lychnidis florem (si veram adinuenire optemus,) non purpurascens, non ex purpureo ad alium quemuis colorem vergentem, sed verè purpureum quærere oportet.

Constat igitur Lychnidis nomine antiquo herbas alios alias ostendere. Et hinc Lychnis coronaria vulgò dicta, sitne Dioscoridi descripta, controuertitur. Est & Lychnis coronaria altera flore pleno. Sunt qui Pseudo-Melanthium sylvestrem Lychnidem faciunt, atque horum placitis subscribendum haud censet Matth. Ocimoides rubrum, Lobel. Camer. Clus. Schvvenckf. H. Lugd. & alii multi Lychnidem silv. purpuream vocant. Est & altera Lychnis agrestis multiflora, nobis Ocimoides purpureum pleno flore. Ocimoides nostrum flore albo vocat Lychnidē sylvestrem Dodon. & Lob. qui tamen alibi Ocimoidis nomine describit. Lychnis alba sylvestris multiflora à nobis appellatur Ocimoides flore albo pleno. Exstat & Lychnis agrestis abortiuæ multiplici viridi flore Lob. in Ic. Plant. p. 253. Ocimoides album non speciosum vocauit Lychnidem sylvestrem albam noctifloram Schvvenckf. Lychnis Neapolitana prolifera Frider. Meieri flore purpureo. E Lychnidis generibus dicitur esse Chalcedonica siue Constantinopolitana miniata, nobis Flos Constantinopolitanus. Inter Lychnides reposuit Saponariam C. Bauhinus. Muscipulam siue Viscariam Lychnidem sylvestrem quartam [Lobelio, Tabern. & H. Lugdunensi teste,] vocabat Clusius: ut & Muscipulam alteram: atque etiam Muscipulæ maioris species aliquot. Habet idem & Lychnidem silv. (1. in Hist. p. 2. in Hist. post. foliis angustis platis ex singulis geniculis. Habetur & Lychnis quidam plumaria Tabern. dicta. Lychnis sylvestris viscosa alba latifolia, an Polemonium petraum? Lychnis silv. latifolia alba est cognominata Viscaria Auriculæ facie Cretica. Lychnis silv. lanugine canescens flore maiusculo rubescente. Lychnis, vel Ocimoides repens montanum Casp. Bauhini, inscribitur à nobis Saponaria minor quorundam. Lychnidem silv. Creticam nominamus Ocymoides flore minore rubello Candiz. Lychnis repens folio viridi flore albo, viscosa alba angustifolia maior Casp. Bauh. Lychnis repens folio & flore albo minore, viscosa alba angustifolia minor Casp. Bauh. An Lychnis minor, Lychnis silv. hirta minima,

Lychn. silv.
Diosc.

Error quorundam.

Asquileua

Flos Cretæ
Constantinopolitanus
Saponaria.

Lobel. H. Lugd. & Hort. Lusit. lanuginosa palmaris C. Bauh. Ocymoides siue Lychnis semper virens, appellatur à nobis Been albo officinarum similis planta semper virens. Been album officinarum dici Lychnidem siluestrem patebit hoc libro. Lychnidibus sylvestrib. affinem dixit Lobelius Lychnidem Anglicanā marinam. Lychnidis elegans genus describit Fab. Columna, quod Ocymoidem Lychnitiam cum Clusio appellare placuit. An stirps illa quam aliqui Lychnidem putauerunt siluestrem, est Centaurium minus adulterinum? Quam Lychnidem quidam vocant, nonnulli Perfoliatam rubeam, aliqui Lychnidem Monachorum, nos cum Dodonæo Vaccariam nominamus. Silvestris Lychnidis appellationem quoque asscutæ sunt sequentes plantæ. Flos cuculi: Betonica coronaria Germanis feld Negelin dicta: Alfine corniculata Clusio dicta: Valeriana rubra latifolia: Cyanus: Campanula Lychnida Myconi: Lutea Plinij: Leontopetalum: Corneola Ruellij, nobis Flos tinctorius dicta: Filius ante patrem: Hippoglossum Ruta capraria: & Candelaria Gallorum de qua Ruellius l. 3. c. 57. & Gesnerus in cat. pl.

Cornarius postquam apud Æginetam lib. 3. c. 24. de sanguinis eruptione è naribus cohibenda, legisset: *ἡ τὴν ἀπομύκνιν λυχνίδα ἐν τοῖς τῷ μυκτῆρι* (quod Andernacus interpretatur, vel funiculum lūcernarum in nates conjicito) nullamque Lychnidis speciem sanguinis sistendi vim habere crederet, de corrupta lectione hæsitauit, & aliquamdiu *λυχνίδα* legendum esse suspicatus est. Est autem Lychnitidis vox æquiuoca, nunc enim denotat Cyanum alpinum, nunc Digitalem purpuream, nunc Verbascum vulgare, & nunc Verbasco Montpelienſe. Sed & Matthioli Lychniten Verbasci speciem constituit, de qua nullus apertè tradit, quod sanguinis eruptionem sistat, nisi quis ex eo quod Paulus lib. 7. de Verbasci generibus tradit, quod acerba sint, id colligat, &c. Tandem in eam sententiam adductus est, ut Lysimachiam legendum esse crediderit.

LYCHNIS CORONARIA VVLGO. CAP. XXX.

Descriptio



denſo villo canescentia: flores ex calycibus oblongis, canaliculatis, villosis, emicant, parum odorati, coloris rubri, albi, & ex carneo candidoque mixti, ex foliis quinque latiusculis constantes,

EX radice multum fibrosa, caules exunt recti, cubitales & sesquicubitales, teretes, incanā lanugine pubescentes, in alas aliquot diuisi: ad quorū singula genicula folia oriuntur bina ex aduerso posita, Saluiz paria, aut paulo maiora, oblonga, obtusa, crassiuscula, mollia, supra infraque

Rosulam exprimentes: singulis autem foliis ad exortum appositi apices, bini, acuti, rigiditè repertur & flore multiplici rubro, de qua post seorsim verba facienda.



Matthiol. in Diosc. commemorat duplicē Lychnidē coronariam: vnā hortensem flore purpureo, & alterā eiusdem generis frequentissimam apud Ananienſes siluestrem, satius per omnia similem, quam merito Lychnidem siluestre appellari posse putat.

Camerarius Lychnis flore in eius Epit. & c. c. c. c.

Hist. germ. nouam dat figuram, additque in Hist. flore esse albo, rubro, & rubello, nonnihil odorato. In Horto tamen, ubi ambigit siue Dioscoridi descripta Lychnis, flore variare dixit solum albo & rubro. Velim autem Patrocinatorem indicasse, vbinam siluestrem satius odoratiorem viderit.

Lonicerus inter Verbasca reponit, sextumque facit, depingit & leuiter describit. Cord. in Dioscor. Verbascum coronarium appellat, flore purpureo, & candido, vocarique refert græcè Lychnitida & Thryallada: Huic subscribere videtur Dodonæus. Lychnis coronaria, inquit, à Gaza Lucernula [*λυχνίδα*] conuertitur. Videtur eadem & *λυχνίς*, *ἡ λυχνίς* per γ, esse Verbasci species, quæ & *θυρῶν*.

Contradus Gesner. hunc Iouis florem, græcè *ἰουὶς* nuncupari existimat. Sed Theophrastus inter Lychnida, & Iouis florem, lib. 6. d. fin. diuisionem facit: ætliua sunt, *αἰτ.* *λυχνίς*, *ἰουὶς* d. d. &c. & similiter Plinius, lib. 21. c. 11. hæc Theophrasti verba referens.

An Corymbe Columellæ Ruellio de qua hæc Columella:

Nunc veniat quamvis oculis inimica Corymbe.

C. Bauh. phyt. Lychnidem 3. satiuam facit, & coronariā Dioscoridis, Theophrasti & Plinij Lychnidem censet, licet non desint, quibus *αἰτ.* *ἰουὶς* Iouis flos, apud Theophrastum 6. Hist. 1. & 6. dicatur: sed ubi quæso minuta folia, quæ Theophrastus requirit? Alij Ocymoides faciunt.

Tragus attestatur in ea Gesnerum esse sententia, ut putet ad Iouis florem Plinij referendam esse Rosam Marianam floribus rubeis & candidis: aliis verò quibusdam *λυχνίς* & *θυρῶν* dici, sed quàm rectè se nescire.

Schvvenckf. triplicem Lychnidem coronariā adscribit, rubram sc. quàm propriè *λυχνίδα* vocant Dioscoridis, & *αἰτ.* *ἰουὶς*, ac Lucernulā appellat: alteram albo flore, Rosam marianam 2. & Lychnidem albam maculis rubris aspersam Eingesprengte Veilrosen & Lychnidem 3. subpurpureo flore, bleich rote Veilrosen. Et ob hæc flores colorum varietatem, duas exhibuit figuras Tabernamontanus, Lychnidis coronariæ albæ & rubræ, sed frustra, vna enim suffecisset ipsi, ceti prob. & nobis, verum quum paratæ fuerint, datâ opera apposui.

apposuit: fatemur etiam nostras melius pin-
gi potuisse. Sed & Lobelius absque necessita-
te effigies duplicavit, vnam inscribens in Ic.
Plant. pag. 334. Lychnidem coronariam, Obl.
pag. 181. alteram pag. 335. Lychnidem candidam
& rubram. Cassor Dur. eiusdem plantæ duas
ponit figuras: vnam pag. 255. Lychnidis ti-
tulo: alteram pag. 256. Lychnidis uluistris in-
scriptione.

Nomina
linguarum

Rosa dumi-
norum.
Rosa ma-
riana
Rosa
Flos cal-
Rosa as-
uait.
Oculus Chri-
sti.
Oculus Dei.

Locus &
Tempus.

Vires &
Vius.

Græcè *αυχνίς* & *αυχ-δε σπορπιάνη* dicitur: La-
tinè similiter *Lychnis*, *Lychnis coronaria* & lati-
na: Germ. *Margen Röslein* / *Margen Röslein*,
framen Röslein, hoc est, Dominarum Rosula,
Samer Rosen, Damoff Rosen / Lampel Rosen /
Marien Rosen / d est Rosa mariana. *himel Rös-
lein* Rosula czli: *himel blümen*, Flos czli: *Veil Ros-
sen* / Summer Rosen, *Ætatis Rosa*: Belg. *Christus
oogsen* / *Oculus Christi*: Galli *œillets*, & *œillets de
Dieu*, *Oculus Dei*, *Pantienlib. Passerofes*: It. & Hisp.
Lychnide coronaria: Angl. *Rose campii*: Boh.
Svate Marie. Propter flores rosæ purpure ru-
tilos ac nitore flammantes, oculorumque aciem
perstringentes Pyropi aut lapidis *Lychnidis* mo-
do, nomen adeptæ.

Seritur in hortis & si cilibus, Iunio, Iulio, ac
Augusto æstivis mensibus florens, & Basileæ etiā
Nouembri: apud Ananienfes, ut Matthioli re-
fert, siluestris, sponteque exit.

Bilem per alium trahere, vulneraque recentia
glutinare dixit Schvvenckf. Radicum porro suc-
cum attractum naribus sternutamenta ciete, ce-
rebrumque efficaciter purgare: Mirum verò in
modum ruralibus, urbanisque virginibus ad
coronas faciendas expeti tradit Matthiolus.

LYCHNIS CORONARIA FLORE pleno:

Descriptio

Synon.



Caulis, foliis
& florum
calycibus à
vulgaris coro-
naria mirime
differt: at flos
rubens denso
foliorum stipa-
tu multiplex
spem seminis
omnem præri-
pit.

Est hæc illa
quam Lobel. in
Icon. Plant.
Lychnidem al-
teram rubram
cognominat:
Camer. in Hor-
to, & Matth.
Hist. germ. *Ly-
chnidem flore*
pleno Belgii &

Angliæ: Dod. lat. in fol. *Lychnidem coronariam*
floris foliolis multiplicatis: Casp. Bauhinus
phyt. *Lychnidem 4* siue coron. latiuam multipli-
cem: H. Lugd. pag. 815. ex Lobelio. *Lychnidem*
omnium pulcherrimam: floribus adeo confertis
& multiplicibus ut semine orba relinquantur, ex-
hibita nimirum formæ vi, & pabulo in florum
commodum absumpto.

Et obis Montbelgardii in horto:
Tom. III.

PSEUDO-MELANTHIUM.

CAP. XXXI.



Simplici & Descriptio
*Salba radi-
culâ* nititur:
caulis cubitalis
& sesquicubita-
lis, steres, lanu-
ginosus, inca-
nus, ramosus,
inanis, genicu-
latus: *folia* cul-
mum plus mi-
nus lata: longi-
tudine palmar-
i & sesqui-
palmar, pilosæ,
bina ex geni-
culis opposita:
Flores oblon-
go, canulato,
villosa calyci:
in quinque se-
gmenta angu-

sta flore altiora diuiso insident, *Lychnidis coro-
nariæ*, purpurei, quinque foliolis constantes, api-
cibus obsolete purpureæ: quibus oblongum
succedit petiolum, semine nigro, amaro refer-
tum.

Germani *Kaden* / *Katten* / *Fornrosen* / *Forn nes
gelbloemen*. Galli *Nielle vulgaire* & *Nielle des
bleds*, & *lurea* appellant: Itali *Githone*, *Githone* &
Githone: unde plerique similitudine vocis indu-
cti, verum ac legitimum *Gith* siue *Melanthium*,
in officinis *Nigella* nuncupatum, esse credide-
runt: sed hoc à veritate recessisse notius est, quam
ut reselli debeat. A verò siquidem *Melanthio*
non solum foliis, & semine, sed & aliis proprie-
tatibus differt. Et hoc iam olim probè animad-
uerunt *Hermolans* & *Ruellius*, qui asserue-
rent omnino hallucinari eos, qui putent hanc
stirpem, legitimum *Melanthium* esse, quæ inter
segetes in arvis passim nascitur, in quo *Brassano-
lus* & cum eo *Brunfelsius* manifestè cæcitate-
runt.

Non desunt inter quos est *Taberna*, etiam,
qui velint hanc plantam siluestrem *Lychnidem*
coronariam esse, quibus, qui utramque notuerint,
subscribere nequeunt.

Sed longè minus id fuerit *Lolium* [Trago,
Cordo Corn, *Lecuna*, & *Matthioli* testibus:] ut
aperissime hallucinatus credidit *Fuchs*.

Hippocrates *Gith* siue *Melanthium* à semine *Synon*,
nempe nigredine appellasse videtur, verum non
simpliciter, sed cum adiectione aliqua, ad diffe-
rentiam legitimi *Melanthii*: sc. *μαλάνθιον* in τῷ
πυρῶν, hoc est, *Melanthium* ex *Tritico*. *Oscantius* *Melanthi*.
Horatius *Gith* quod in segete nascitur ipsum no-
minavit: & eandem ob causam ab huius ætatis
doctis [ut *Ruell.* *Matth.* *Dod.* *Gall.* *Lobel.* in
Adv. Obl. pag. 23. *Ic. Plant.* pag. 38. *Lonic.* *Cass.*
H. Lugd. pag. 43. & *Thal.*] *Pseudo-Melanthium*
dicitur: *Nigellastrum* *Dod.* lat. *Nigella vulg*
dicta Corn. & *Lacuna*. *Trago*, qui pro sexto
Marianæ Rosæ genere describit, *Githago* [sic etiā
Ruell.] & *Lolium* mulcorum Germanorum [ut
Fuch.] sed perperam. *Nigella* *Brunfelsio*, ve-
rùm non sine errore. *Lychnis* *arvensis* *Tabern.*

Nomina
linguarum

Fuch. errat

Triticum.
Hipp. Gith
segetis Obl.
Horatius
Pseudo-Mel
anthium.
Nigellastrum
Marianæ
Rosæ.
Githago
Lolium parv.
peram
Nigella
Lychnis.

*Antemones
foliosum.*

Lychnis alia inter Triticum Calsp. Lychnis segetū Schvvenckf. Lychnis (6. in phyt. 5. apud Matth.) segetū Mutoni. Ruellius à Gallis Niente & florem Mancalum (sic & Gesn. in cat. florem vocat) appellari refert, & Theophrasti ἀνθεμόν φυλάκτης (Anthemion foliosum appellat Gesn. nulla mentione facta Theophrasti) esse indicat. Sed Anthemion Theophrasti, Anthemis est apud Dioscoridem, teste Dodonæo, & ἀνθεμόν φυλάκτης Anthemidis species, cum Nigellastro parum conueniens.

*Locus &
tempus.*

Pseudo-Melanthium obseruatur passim in agris inter segetes: Maio ac Iunio mense cum flore viget. Monspeij etiam Aprilis: vidi etiam Basileæ florentem Octobri, virēque Genex mensis Februarij principio.

Ceterū n, autore Dodonæo, Nigellastri semen, caldum & siccum secundo est ordine satis intento: in pseudo cum melle subdium menses euocat: ut Hippoc. in lib. dem. m. testatur. Octavius Horatianus, semen frictum & tritum ad auriginem bibendum exhibet. Lolij facultates huic etiam herbe, Germanis Ratten nominata, Recentiores tribuere refert Fuchsius: Et hinc mirificè eam in sanandis inperginitibus, alitque scabiei generibus commendare: Item vulnerib. glutinandis, ac fistulis curandis, compescendoque sanguine, eius esse vsum tradere.

OCIMOIDES VETERIBVS ET

in genere.

CAP. XXXV.

Descriptio

Quo siluestre ad satium discrimine Mentastrium, Apiastrumque Latini veteres dixerunt: eadē naturæ & satium analogia Ocimoides ab iisdē Ocimastrū dictū fuit: venimile est. Ocimoides siquidem, seu, ut alij, Phileterium [ἀνθεμόν φυλάκτης]. In alio hæc est inscriptio: ἐπεὶ ἔχει τὴν ἀνθεμόν φυλάκτης. Ista habet Ocymo [ὀκίμο] similia: ramis palmi altitudin. [ἀνθεμόν φυλάκτης, dodrantes, Sarrac.] hirsutos: siliquis [λεβέδες] similes Hyoscyamo, semine refertas nigro, simili Melanthio. Vinum hanc habet semen in vino potum, ut viperarum, ceterarumque serpentium moribus medeatur. Dicitur & ischiadicis cum Myrrha (vet. caret) & Piperi [Marcell. & Corn. & Aldin. in nothis, addunt, & vino. Ruellius, cum melle & vino. Sed illud, & vino, quid opus fuit ex præcedenti periodo repetere, cum satis per se subintelligatur.] Ceterū, radice nititur tenui [ἀνθεμόν φυλάκτης, vet. albā, λευκή] & superuacua, inquit Dioscorides.

Notha appellaciones.

Sunt porro qui & hanc Echion appellent inter nothas: alij Scorpiuron, alij Sparganon [Sparganion leg. Marcell.] alij Althæam, alij Amaranthida, alij Probatæon [Probatæam Marcell.] alij Elaphion, alij Antimimon, alij Porphyrida, alij Augion, alij Nemesion, alij Hecnopolon, alij Thyrsitio, alij Thermitin (Thermitin scribit Marcell.) alij Misopathion, & Romani Ocimastrum. In magno autem honore veteribus fuisse Ocimastrum ex tam multis eius appellationibus colligi potest, quarum plures ex alienius partis ad alias herbas similitudine illi à gentibus per tempora accreuerunt.

*An Ocymū
silvestre
Plinius.*

Plinius tantū silvestre Ocimum contentus dixisse paucis medicinam & historiam eius abtoluit. Sed quum parū consentiant ea quæ Plinius de Ocimo silvestri tradit, cum his quæ Dioscori-

des de Ocimoide habet, ambiguum est an de eadem herba Plin. lib. 20. c. 12. loquatur. Syluestri Ocymo, inquit, vis efficacior ad eadem omnia: peculiaris ad vitia, quæ vomitionibus crebris contrahuntur, vomitisque vuluæ, contraque bestiarum morsus, radix in vino efficacissima. Hæc ille. Dioscoridi ac æquè Galeno 8. simpl. Ocimoidis radix inutilis est: semen autem tenuium, & desiccantis citra mordacitatem facultatis est.

*Ocymoides
Galeno.*

Ocimoidis & Ocymoidis, siue Ocimastrū & Ocymastrū nomen plures obtinuerunt plantæ. Et quidem Cornarius, & Gesn. in cat. pl. silde Basileæ germ. Match. verò *Basileo saluatic*, Ital. *Rafite sauvage* gallicè, & Brunfelsius in Lex. Basileon siluestre vocant, non sine hallucinatione. Existimamus hos ignorasse quid vocarint Basileon siluestre.

Idem nomen cōtinuere præterea sequentes plantæ. Acinos Dodonæi. Ocimum medium, Botrys altera. Ocimastrum Valentinum. Scrophularia maxima. Scroph. vulgaris maior. Ocimoides album multis. Ocimoid. album flore pleno. Ocimoides purpureum multis. Ocimoides, purpureum polyanthes. Ocimoides non speciosum. Saponaria minor quibusdam. Flos Constantinopolitanus. Ocimoides minus Creicum: Reseda minima. Ocimoides lychnitis reptante radice. Caryophyllus angustifolius. Valeriana rubra quorundam latifol. Ocimastrum verrucarium. Cacubalum quibusdam. Clinopodium. Ennos: & Chamæleon niger.

OCIMOIDES ALBUM MVLTIS.

CAP. XXXVI.



Perenni nititur radice cubitorū duorum aut trium longitudine, interdū brachiali sæpe crassitudine, multifida, alba, acti, & subamarā, quæ antequā ē terra emergat in numerosa capita pollicaris crassitudinis, aut minora, dodrāctalia, aut palmaria diuiditur: caules emittit crebros, cubicales & sesquicubitales,

vel etiam maiores, hirsutos, geniculatos, ramosos: ad quorum singulas iuncturas folia bina aduersa, oblonga, acuminata, pilosa, ex sinu ramulos emittentia: flores summis hærent ramulis, Ocimoidis rubri similes, sed colore niveo radiati, & calyce hirsuto, canaliculato, turgidulo: semen vasculo turbato, Nicotianæ æmulo, in crenatum denticulatumve orificium dehiscente, sed inuolucro exteriori striato, continetur copiosum, Hyoscyami par, rotundum, compressum nonnihil, coloris cinerei,

germani hanc Glidweid: Glidfrant Margen Synon: Kößelin

Roslin, wild Margen Roselin / tauben Kropff / wider stoß, Spley spitzel, & Lydwich appellat: Belgæ Juncifens: c. h. *Ocellis junagis*. Lat. unum & grecum quoddam accepit nomen apud Veteres, inter auctores non convenit, aliis aliter eam appellatibus. Aliis enim Ocimoides sine Ocimastrum esse videtur, ut Matthiolo. H. Lugd. pag. 682. inscribit Ocimoides manus Matthioli: Ocimastrum & Ocimoides Ruellius (qui & albam laccam) Tabern. Icon. & H. fl. Lob. in Adv. pag. 144. (ubi & laccam albam Montpichensium, & Herbam tunicam Gordonii) & Obs. pag. 184. Ocimoidem maiorem flore candido Celsipius: Ocimoides album duplex Gert. hort. maiorem scilicet apicibus in medio adscit, & sœminam, quam sine apicibus ait veluti odorem spirantem tanquam Hesperidem Theophrasti. Id de coll. stirp. Ocimoides album duplex: ut unum in medio apicem exiens minus odoratum: alterum (sine apicibus puta) odoratum, eodem die marcescens.

Ocimoides
sive Ocimastrum.

laccæ alba

Herba tunica

Ocimoides duplex
Gert. hort.
Mat.

Ocimoides non est.

Saponaria.

Lychnis fil.

Dodon. hal.
luc. nec no
alia.

Sapon. hirsuta.

an Melandrium?

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Lychnis fil.

Ocimoides album flore pleno.

Hirsuta per ramos ex aduerso sita folia possidet, adeoque totâ facie cum eo quod simplice est flore convenit, solo excepto flore, qui tam multiplici foliorum stipatu luxuriat, ut Rosam albam imitetur.

Descriptio.

Synonyma:

Clus. vocavit Lychnidem silv flore albo, pleno, odorato, in cultis. Lob. in Adv. p. 142. Lychnidem silv. multifloram albo flore Ag. & Osble Rose Champion. C. Bauh. Lychnidem g. siue silvestrem albam multifloram, vel Saponariam hirsutam.

Locus

Ocimoides album longo cultu aliquando florum solum multiplicare, & polyflorum reddi, perhibet Dodonæus.

OCIMOIDES PURPUREVM MULTIS.

Ocimoides rubrum ex radice minimi digiti crassitudine, & ba. sapore tubacri & subamaro, fibris multis donata, caule. emittit aliquot cubitales & b. cubitales, geniculatos, hirsutos, concaves, non ita subinde rubentes: ad quos singula genicula, folia linea oriuntur opposita, foliis Plantaginis aliquatenus similia, oblonga, lata, acuta, tactu mollia, hirsuta: flores simul aliquot in caulium terminatate feruntur folia singul iunctos, sed non simul se expandentes, è quinque foliolis suane rubentibus bipartitis, cordatisque compositis, stamina quinque alba flore altiora ambientes, calyce striato, lanuginoso, partim rubente, partim viridente, pediculo bigui, villosi, in quo senium conceptaculum oblongum.

Descriptio

Gesl. de hort. vocat Ocimoides purpureum, vel roseum duplexque ait, maiorem, & sœminam sine apicibus. De coll. stirp. Ocimoides rubrum duplex, purpureum dilutum, albo cognatius odoratumque Alpino, etiam die se claudens: Item, Ocimoides purpureum: unum in medio apicem exiens, minus odoratum: alterum non odoratum, eodem die marcescens. Thelus Ocimoides rubrum: Matth. Ocimastrum purpureum: Camer. spud Matth. in Hist. germ. Ocimastr. flore simplici rubro: Tabern. Ocimastrum rubrum.

Ocimoides purpureum
vel roseum.

De hac, ceu & alia ante dicta, Lobel. in Adv. pag. 142. ait: Lychnides silvestres affines passim secus satorum sepes exerunt, radice non ita magna, gracilibus ac paucioribus, tum cauliculis, tum foliis, & mollioribus, nec perinde tomentosis, sed ex pallido herbaceis: Alteri flores rubelli dilutione Roseæ, alteri vero nuce candore reident.

Lychnis fil.

Dodon. dicitur Lychnis silv. flore rubenti: Lobel. in Obs. pag. 181. Ic. Plant. p. 335. Lych. silv. rubello flore: an Hesperis Theophrasti? Camer. hort. Lych. silv. rubra: Schvrenckf. Lych. silv. purpurea: C. Bauh. phyt. Lych. 8. siue aquatica purpurea simplex: Clus. Lych. silv. flore rubro & dilutius rubente & subviridente. Lonic. vocat Lychnidem flore rubeo, negatque meritò esse Polemonium & Been rubrum. Tragus Rosam marianam flore rubeo, traditque de hac eadem, quæ de 3. siue alba: Fuch. quondam Iouis florem caulem.

Synonyma

Geneux in monte Thuri vidi florentem mense Maio: Basileæ & Montbelgardi multis in locis provenit. In Austria, Stiria, Pannonia & Silesia

Polemonium non est.
Rosa mariana.
Iouis flus
caul.
Locus & Tempus.

herbulis & humidis montium tractibus, autore Schvvenckfeldio, plurima Aestatis parte in Autumnum floret.

OCIMOIDES NON SPECIOSVM.

CAP. XXXVII.

Descriptio.



Ocimoidis Genus haud speciosum, Ocimoidi albo simile, planta est annua, pedalis vel cubitalis, ubi lux spontis est, in viridatis culturâ maior adolefcit radice satis crassâ, albâ, breui: *foliis* Ocimoidis albi, atro-virentibus, lanuginosis, ex nodis aduerso situ positis, oblongis: *floribus* mino-

re quàm in Ocimoide iam dicto, parte supinâ albo, ac etiâ dilutè rubente: pronâ ex languido luteo pallescente, quinque foliolis bifidis constante, quæ mane expansa, vesperi circumflectuntur, vt in Polemonio Petro Gœrneri: calyces longi, villosi, canaliculati, æquales, viscidum cum tota plantæ summitate, qui succrescente semine cinereo, minuto, Papaveris, turgescunt, à pericarpio glabro distenti.

Synon.

Camel. hort. vocant Lychnidem sylu. viscidam vel noctifloram, annuam, noctu tantum flosculum odoratissimum explicantem, coloris albi & nonnihil puniceantis: Item, Ocimoides noctiflorum Autumno & ingruente Hyeme in odorem: Calsp. Bauhinus phyt. Lychnid. 12. sine Lychnidis speciem, flore noctu tantum in Aestate odore: Schvvencksf. Lych. sylu. albam noctifloram, wild Nachr. Mârgen rosulin.

Locus & Tempus.

Prouenit in agris circa Boll & admirabilem fontem floret Augusto & Septembri, & adhuc Octobri.

SAPONARIA MINOR QVIBVSDAM.
CAP. XXXVIII.

Descriptio.

Radices habet crassas, longas, multifidas, fibratas, in multa capita diuisas, molles. exteriùs nigras, intus albas: *caules* per terram supini procumbunt, hirsuti, rubentes, geniculati, ramosi, quorum nodis adnascuntur ex aduerso polita folia bina, Polygoni aliquatenus figurâ, hirsuta: *flores* purpurascens, Saponariæ minores, ex calyce oblongo, hirsuto, rubente, quinque & foliis & apicibus in medio constantes.

Mathiol. in post. comm. figuram Cneori Theophrasti titulo pingit, quæ videtur exprimere Saponariam hanc minorem quorundam. Lobel. in Adu. vocat Ocimoides repens polygonifolium: Gœsn. Ocimoides paruum.



Behisparæ H. Lugdunensis seminum effugies multiplicare. Primam enim proponit p. 23. titulo Saponariæ minus Dalechampi. Alteram habet p. 1365. Cneori alius Theophrasti Matthioli inscriptione. Tertiam dat p. 1429. Ocimoidis repentis Polygonifolio, inscriptione. Et hinc ait C. Bauh. in anim.

in H. flor. Lugdunensium, Saponariam minorem Dalechampi pag. 823. & Ocimoides repens Polygonifolio p. 1429. vtrobinque describi, & figuram posteriorem meliorem esse. Eandem p. 1365. pro Cneori alio Theophrasti Matthioli, sine vlla descriptione, & vitiosâ figurâ extare. *sed censura* hæc de Cneoro, merito aduersus Matthiolum effundenda erat, ex quo desumpsit compilator H. Lugdunensis. Is enim quamvis Romæ se accepisse dicat, nullis descriptionibus nectis, non tamen descripsit, nec addidit sine candidum an nigrum. Verum hoc non foret patrocinari Matthiolo, Cneorum Theophrasti (sit apud Mich.) nobis non videtur aliud quàm Lychnis aut Ocymoides repens: Nolumus Matthioli figuram amouere, meliorem exhibituri eam in Appen. no legerimus. In phyt. vocat Lychnidem 33. sine Ocimoides repens montanum. An eidem Ocimoides minus H. thariorum, Vireolarum Plantis: An Cam. hort. Ocimoides repens, itemq; angustifolium flore rubello: An Calsp. Ocymoides paruum? Delectatur locis ad merid. è suis, arenosis, & collibus iuxta Rhodanum & Arne Genens. Aliquando Curia Rhecor. reperti florētem Maio, Iunio & Iulio. Sub finem Aprilis prope S. Hippolitum Burgundia.

Lychnis vireolarum
na C. Bauh.
in Vireolarum Plantis

Locus & Tempus

FLOS CONSTANTINOPOLITANVS MINUTUS ALBUS & varius. CAP. XXXIX.

Descriptio.



Numerosis fibris radiceatur, gustu subacri: *caules* tollens, cubiti & sesquicubiti circiter altos, teretes, hirtos, inanes, crebris geniculis interceptos: ad quorū singula bina folia coniugata, alternante coniugiorum sicut, adnascuntur pediculo nullo, sed latiore basi caulem ample.

Sentia.

dentia, Lychnidis sylvestris æmula, verum nigriora, rigidiora, magisque aspera lanugine obsita, priora cum Caryophyllis laevis foliis magnam similitudinem habentia, gustu acri: flores in ramulorum extremis umbellam deformant, odore suaviquanquam obscuro, sed colore perquam amœno, miniato, aut cinnabazis factus, aut carneo, quorum singuli è quinque foliis constant, oblongis, bifurcis, utrinque eis medium alatis, & ad exertum binis appendicibus incumbenibus auctis, sic ut integrum & explicatum solum papilionem occultato corpore exprimere posse videatur: inter hæc, flamina purpurascens apiculis violaceos insistent: emicat autem flos ex calyce oblongo, hirsuto, viridante: in quo postea est semen pullum exiguum. Figura nostra Fuchsiana minus placet.

Flos Constant. Dod.

Flos Constantinopolitanus inscribitur à Dodonæo, qui Gesnero auctore, duplicem facit, bicubitalem sc. floribus, in latis umbellis, multis simule congestis: & cubitalem aut paulo altiore, rariore, ac primo anno flores proferentem, de quibus ait: Nostri vulgò Constantinopolitanum appellant florem: Germani verò Hierosolymitanum: Aldroandus Creticum cognominat: alius Lychnidem coronariam. Sunt qui velint Lanariam nuncupatam Latine radicem esse, quæ Græcis *ῥαδις*, Arabibus *Condif* dicitur, quæ ad purgandas lanæ, qui eas eluunt, olim utebantur: quos veritatem minus assecutos esse evidentiùs est, quàm ut refelli debeat. Gesnerus hort. Ocimoides peregrinum dixit flores quos ab Hierosolymis denominant, croceo colore splendens longe pulcherrimos, odore carentes, Soleque nõ marcescentes. Idem in append. vocavit Ocimoides croceum, aliquot annis durans, licet primo anno floreat.

Flos Hierosolymitanus.
Flos Creticus.
Lychn. coronaria.
Struthion.

Ocimoides peregrinum.
Ocimoides croceum.
Gesnero.

Lychn. Chalcedon.

Tabern. in Ic. & Hist. dicitur Lychnis Chalcedonica, Zinobert Rößlin: Lobel. in Adv. pag. 143. Obs. p. 83. & Ic. Plant. p. 340. Lychnis Chalcedonica siue Constantinopolitana miniata: Camer. hort. Lychn. Constantinop. vel Cretica. Clus. Lychnis Byzantina miniato albo, & versicolore. Schvvenckf. Lychnis peregrina miniata, *ῥαδις* Theoph. *ῥαδις* Hegelin. h. e. Caryophyll. Turcicus, Jerusalem blümlin, Flocculus Hierosolymitanus, Spornblümen, & Ungerisch Rößlin/Rosula Hungarica.

Lychn. Constantinop.
Vel Cretica.
Lychn. Byzantina.

Locus & tempus.

Peregrinus est flos: seritur in hortis: Iunio & Iulio altero à satione anno floret, deinde pluribus sequentibus aliis. Radice æternim constat vivaci: diuque durat: Hiemis & frigoris patiens. Eadem florem hunc allatum narrat Gesnerus.

Vitæ in coctis.

Ceterum, Flos Constantinopolitanus præter eam, quam in hortis & coctis gratiam assecutus est, nullum, quod sciamus, medicum usum habet: facultas eius ea de causa incomperta est. Radicem tamen, quæ gustu aliquantulum acris est, forsitan hæc inopre quis calidam in primo gradu fiatorem.

STRUTHIVM, RADICVLA, SEV
Lanaria herba veteribus, & Condif.

CAP. XL.

De Dioscor.

Dioscorides quamvis Struthiũ non descripsit, tanquam vulgò notum, ut quo fullores ad purgandas lanæ utantur, foliorum tamen similitudinem indicavit in Papavere spumæo, id est, Herculano, ut Theophrastus vocat, & in Tom. III.

Phyteumate. Eius radicem verò acrem esse ait Vires vrinamque ciere: auxiliari iocinorosis, tussis & orthopneæ, sumptam cum melle cochlearis mensurâ, & aluum quoque subducere: Eandem cum Panace & Capparis radice calculos strangere, & cum vrina expellere, lienemque in scirrhũ induratum liquare. Subditam verò menses trahere, & partus efficaciter enecare. Cum polenta autem & aceto illitam, lepram emendare. Discutere & panos cum farina hordeacea & vino decoctam. Misceri præterea collyriis exaeruentis oculorum aciei dicatis, itemque malagmatis. Sternutamenta etiam facere, atque per os purgare tritam eam melle ac naribus insusam.

Hæc inter nothas Dioscoridis appellationes Appellat: à quibdam Cadre, ab aliis à purgando Catharsis nothæ vocatur. Sunt qui & Struthocamelon, qui Chamariton, i. e. humi sparlam appellant. Magi denique Chalyrricon, Egyptii Aeno, Aphri Sirin, Romani Radiculam, siue Herbam lanariam vocant, à radice tanquam præcipue partis usu.

Vnde autem Græci Struthion nominaverint, non satis nunc patet: nisi fortè à foliorum positura, quæ avium alas quadantenus imitantur, nomen illi fecerint: *ῥαδις* enim & *ῥαδις*, ea gens passerem, & minores alias appellat aves. Quod si in cibos radix huius transiret, crederet Marcellus ob caliditatem quam in quarto ordine habet auctore Galeno, venerè stimulare. & ob id Struthion dictam. Græci siquidem *ῥαδις* passerem dicunt, & ab eius avis salacitate, *ῥαδις* de quasi passores, ad Venerem procliviores homines: & ex eâ ratione id facientem herbam Struthion etiam dicere potuissent. Sed nihil horum pro comperito est.

Hanc Dioscorides ait in nares coniectam sternutamenta excitare: in quem usum Celsus lib. 3. cap. 21. eam quoque recipit.

Struthii radice [inquit Gal.] maximè vimur, Galen: quæ gustu quidem ævis est, temperamento verò calida & sicca ex quarto ordine. Vim habet extendendi & irritandi: propterea etiam sternutamenta movet, similiter ut alia, quæ sapore acris, & temperamento calida existunt.

Hipp. de nat. & morb. mul. radicem Struthii Hippocr: [ῥαδις] læviter tritam & contusam ad pugillum vnum, mellèque subactam, & in pessario subditam, menses & puerperia purgare, aquasque educere, auctor est: Produci autem in Andri [Andri alibi] insula præcipue litonibus.

De hac Plinius lib. 19. cap. 3. At quæ vocatur Plinius: Radicula, lavandis demum lanis succum habet, mirum quantum cõferens candori molliæque. Nascitur sativa ubique, sed spontè præcipue in Asia Syriaque, saxosis & asperis locis. Trans Euphratem tamen laudatissima, caule terribili, tenui, & ipso cõbis indigenarum expetito, & tingenti quicquid sit, cum quo decoquatur, folio Olor: Scenthion Græci vocant, floret æstate, grata aspectu: verum sine odore, spinosa, & caule lanuginoso. Semen ei nullum (Plinio repugnat hic Columellæ versu).

Plinio com-
tradi-
tut.

— à Syriaque venit quæ semper radix.)

De eius verò usu pleraque ex prædictis habet lib. 25. cap. 3. & lib. 24. cap. 11. Male autem in Struthio ramulos appellat, quod radices debuisset dicere: cum excepta radice Struthion nihil sit, re. Quæ annotante Marcello, vnde etiam, seu ex potiore radicem usu, Romanis Radicula dicebatur.

Sed an Struthiõ in Italia nascatur asserere noluit

Matthiolus, quippe quod ipsum non viderit, nec qui illud cognosceret, animaduertit.

Struthion[is] quae Marantha[est] planta, quae alio nomine Radicula & Lanaria appellatur: sed & Struthion etiam est Mali Cotonei genus quoddam.

Marantha. Garopius in Vertumno Herbam lanariam duplici ratione nomen Struthij accepisse credidit: scilicet ut moneamur tam puram coniugij castitatem esse debere, quam sit lana radice fullo[n]ia emendata: rursus quod eadem Radicula libidine etiam exaret. Vulgo pro Struthio ab Herbariis sumuntur Plantae sequentes. Saponaria vulg. Flos Constantinopolitanus. Ocimoides purpureum Valeriana rubra quorundam latifolia. Brien albu[m]. Praxicella. Cruciatu[m]. Lutea herba. Imperatoria. Asterantia. Elleborus.

SAPONARIA VULGARIS.

CAP. XLI.

Descriptio

Tenues Saponariae radicle vario implexu vagantur: caules plures teret[es] recti surguntur, ciliolati & aliores, subrubentes, hirsuti, crebris geniculis articulati: filia ex nodis bina aduerso posita nascuntur, Genitanae cruciatu[m], colore minus h[ab]ent, nigula, ciliis communiter ternis, secundum longitudinem decurrentibus, sapore nitroso: flores tum in scapis summis, tum ex foliorum supremis scapi alis exoriantur in umbellam digesti floris Constantinopolitani, albicantes aut ex albo tanullum purpurascens, odorati, quinque



Struthium
qui faciant

foliis constantes, staminibus candidis medium occupantibus, ex calyce tenui, vnciam longo, hirsuto: Semen copiosum, paruum, penè rotundum, compressum, spadicum.

Inter alios, qui vulgarem Saponariam Struthium faciunt, occurrunt Gennetes, Botan. h[ab]it. Eger. Gesn. in cat. pl. Fuchsi. Tragus

& Ruellius.

Car. Steph. in colle huius Clymeni & Saponalis siue Saponariae meminit, plures plantas confundens ex male intellectis verbis Ruellij.

Tragus quidem Saponariae nomine depingit & describit, adque Violam agrestem [Ocimoides] fortè purpuream referendam esse censet, & tamen Struthium Dioscoridis [cuius nothas appellationes adscribit] facit, & Códex Serapionis cap. 32. utemque Cod. si officinarum.

Fuchsin Hist. Struthium inscribit [in Icon. Struthium] lauium] ac de eius appellatione eadem legit, quae ex Marcello antè precedentem capite adduximus: Saponariam autem & Herbam fullo-

num recentiores vocare, ex Ruellio docet: sed nec huius, nec illius mentionem facit.

Quam Gesn. de Hort. Saponariam vulgò dici refert, eam in cat. pl. Struthium vocat: sed malè, vel ipso de coll. stirp. monente, subscribentibusque Corn. Matthiol. Dodon. Lobel. Lacunà, Camer. H. Lugd. & C. Bauhino.

Licet autem Saponaria h[ab]eat ab extergendi potestate, quae saponis ritu pannos eluit, purgareque, Struthium, seu & alia quaedam, vocari possit, à verbo *σπυλίζω*, quod Graecis, lanas purgare & candidas facere significat, tamen nostram Saponariam antiquorum Struthium, Arabum Condi. si, siue Latinorum Radiculam aut Herbam Lanariam (h[ab]ere enim nomina eandem designant plantam) non esse, tum ex Theoph. & Plinio liquet, tū ex iis quae sequuntur, ostenditur. Struthium Graecorum, siue Radicula Latinorum in Syria vbiuis colitur, ideòque Columella Syriacam radicem, ac eius semen Syrium vocat, Gaza Lanariam herbam: Gignitur & ibidem in asperis & saxosis locis, radice magna longa & tereti addit Serap. ex Diosc. quae in nostris exempl. desiderantur. Jem. stu. ac, & feruida, sternutationes irritante: folio Olea, spinoso: caule lanuginoso, tenui, ferulaceo, indigenarum cibis expento, & quicquid tingente, cum quo deconquitur: flore alpestrato, inodoro, aestivali. Ab hoc igitur Struthio multis notis, ac praesertim facultatibus Saponaria nostra differt, teste Lacuna.

Ceterum nonnulli Herbam Tunicam appellant: non est tamen Veronicae coronariae, multò minus Polemonij aliqua species, quas pro Tunicis herbis haberi, de Caryophylleis scripsimus. Videntur etiam posset Alisma, siue Damalonium, si caulis ei crebri, non simplex, sed subinde in alas quoddam diuisus, & radices essent quàm Veratri nigri crassiores: folia siquidem habet Alismatis descriptioni conuenientia, & globosam florum in summo caulium longiorum. Sed Alismatis tenuis est caulis & simplex, & radices similiter tenues: quae differentiam Saponariae huius & Alismatis ostendunt, inquit Dodonaeus, qui Saponariam cum Lobelin Obseru. pag. 170. in Icon. Plant. p. 314. inscripsit: Lacuna & Camer. Saponariam vulgarem: Celsalp. Saponariam vulgò: Lob. in Adu. Saponariam vulgi, foliis plantagineis aut Gentianae, flore Ocimoidis: Schvv. Saponaria, Herbam fullo[n]iam & Lychnidem fullo[n]iam: Germ. Sciffkraut/meschkraut/Speichelwurz Silesij Hundstegelin/Madenkraut/ & alibi Spatzentwurz/ autore Trago.

H. Lugd. frustra vnus huius plantae duas dedit icones: primae titulus est p. 822. Saponaria maior, alteri p. 823. Struthium Fuchsi.

C. Bauh. phyt. vocat Lychnidem 10. siue Saponariam lauem, floris colore ludentem, communiter dilute purpureo, aliquando ex roseo rubente, nonnunquam candido: item caule leviter hirsuto, foliis verò lauib[us] (qualè Tragum & Fuchsum exprimere refert) nonnunquam etiam caule & foliis lauib[us], qualem Lob. & Dodonaeum pingere testatur. In hac & abortum se obseruasse ait, ut pro floribus sint copiosiores ramuli foliacei paucis floribus intermixtis. Idem & Vrceolarum Plinij esse negat merito. Anguill. epist. 14. est Ocimoides Ghini.

Apud Belgas in hortis colitur: alibi, seu in Germania iuxta fluuios, torrentes, & stagna locis apricis & arenosis spontè nascitur, florens Iunio, Iulio, Augusto, Septembri & Octobri: Genua in colle

Saponaria
p[er]fecta dicitur
Struthium.

Herba
anica.

Alisma.

H. Lugd.
duas Saponarias
figura.
Lychnis lan-
nis.

Locus &
tempus

Car. Steph.
repreh.

Struthium
Fuchsi.

Gesn. sibi
contrarium

in colle *la Bassie* viret Aprilis. In hortis diu durat & vix est pertinacis. Reptatu in hortis odiosa est.

Vires & V.
sua.

Potro, Saponariam, calidam quidem & siccam esse temperie attestatur Dodonæus : facultate autem abstergerendi non exigua præditam. Pressu (inquit Schvvenckf.) nitrosum extergentemque remittit succum, unde vi pollet abstergentia, aded ut etiam pituitam de capite eliciat, ac sternutamenta moueat tantâ violentia, ut partum mortuum excutiat : Rustica gens puluere ascarides puerorum expellit : abstergit scabiem & omnes cutis scditatus. An autem hæc experientia habeat Schvvenckf. ipse nos docebit. In coronas ob floris tum suauissimum odorem, tum summam pulchritudinem, venit. Maculas vestras vestium tolli, si cum Saponaria herba lauentur, extra controuersiam verum est.

LANARIA SIVE STRVTHIVM Dioscoridis Imperato.

CAP. XLII.

Descriptio

Lanaria Dioscoridia nomine ex Italia ad Fratrem missa planta cubitalis, caule & ramis subinde angulosis: ad genicula folia nascuntur bina ex aduerso sita, vncialia aut scuncialia, angusta, Garyophylli holostii folijs similia: de quorum sinu rami exeunt itidem geniculati, folijs eodem sita amicti, quorum extrema nescio quid *flosculorum* gerunt: inferiora folia ad Luteæ vulgò dictæ folia accedunt, longitudine ferè palinari, semunciam lata. De eadem planta aliquot annis pòst ita proditum ab Imperato inuenimus, lib. 28. Hist. nat. cap. primo: Lanaria paganis dicta prouenit in Calabria, & in regione Basilicata vicina Regni Neapolitani prouinciis. Dicta autem est Lanaria, quòd huius radice ramisque commodè vtantur ad mundandas lanas. Ortus huius plantæ similis ferè Saponariæ vulgaris, aut Lychnidis, sed ramis tenuioribus minutioribusque: quorum extremis flosculi hærent parui albi. Ipsi alioqui rami subtilissimi articulati ferè in ramulos subdivisi. Semina minimis inuolueris continentur nigra, magnitudine grani Mili, saporis amariusculi.

Exortus
sua Saponaria

STRVTHIVM SPINOSVM, SIVE Conditi Bellunenlis.

CAP. XLIII.

Descriptio

Bellunenlis radicem esse scribit plantæ solis spinosæ Carduorum modo, crassitie pollicis, intus subflauam, nigram foris, odore & gustu acrem: eius decocto lanas, laneosque pannos sordidos abstergi. Damascenos Seplasiarios eius decoctum immiscere confectioibus paratis de melle ac sapâ, idque candoris tantum conciliare, ut ex amylo & saccharo punissimo constare videantur: quin etiam sic durare, ut tenaciores sint, & vix morse diuellantur. Constat eius radice in globos coactâ, Syros vestium, linteorum, & induriorum sordes ac inquinamenta eluere, saponis aut lixiui modo.

POLYCNEMON VETERIBVS.

CAP. XLIV.

Hippocr.

Hippocratis n. m. *πολύκνημον* (vel ut Fœl. in *con. πολυκνήμον*) nominat, ac totu & lusu

vtro malè habenti adhibet, lib. πειρὰ ἀφροῦ.

Dioscorides fruticem ait sarmentolum, folia habentem Origano similia, caulem verò multis geniculis præditum [iuspiciatur Corn. hic interponendum ex Plinio, τὸν δὲ καυλὸν πολυκνήμονα, *οὐκ ἔστι δὲ ὡς πρὸς γὰρ ἔχειται*] velut Pulegium. Non tamen umbellam habet, sed paruos in cacumine corymbos, cum æri quadam odoris iucunditate. Sen recens, seu aridum (*χλωρὸν ἢ ξηρὸν*, vet. *ξερὸν*) ex aqua impositum efficaciter vulnera glutinat: sed quinta die solui debet. Ad stranguriam iudem & rupta ex vino bibitur. Cætera quæ huic capiti accreuerunt, ut adulterina cum Marcello reuicimus.

Non habet Polycnemum certam in Latinis historiam: Plinius lib. 26. cap. 24. Cunilæ bubulæ, quæ inter Origana numeratur, similem tantum dixit: cætera ex Dioscoride iisdem verbis ab eo reddita sunt.

Galeno Polycnemum siccat, & calefacit secundo ordine: ut propterea etiam vulnera glutinet.

Nicander in Theriac. contra venenata eam laudauit: *ἀλλοτὶ ἐμὴς ἡγούμενα πολυκνήμονα*, &c. quo loco transmutatione literarum, ut solent Poetæ, vsus est. Polycnemum dicens.

Meminit eiusdem Apollonius in comm. de herbis, nec dissimilem Origano fecit.

Hanc inter spurias appellationes Clinopodiò, Iouis eolum, Echeonymon, à Romanis Putealogan, & à quibusdam Polygonaton dici audimus. Non quia verè Polygonato similis sit, sed quoniam geniculato per totum caule est. Quam credit Marcellus etiam fuisse causam ut Polycnemum Græci eam vocarint, quasi frequentibus furis: *κνήμας* enim furas illi vocant, quæ in furculis herbæ huius internalla sunt, quibus folia inter se distant.

Plinius lib. 20. cap. 16. de Cunila bubula obliuiose ea scripsit, quæ de Polycnemo lib. 26. cap. 24. produxit: ita ut cum historia Cunilæ bubulæ Polycnemi descriptionem confuderit.

Cæterum Polycnemonis appellatione sequentes donantur plantæ. Tricnemum. Consolida media. Prunella. Polygonum tertium Dodonæi. Polycnemum Dalechampii. Mentha aruensis. Clinopodium. Polycnemum Origano simile. Alfine minor Thalii.

POLYCNEMVN DAL. FOLII lucis, valculis longis.

CAP. XLV.

Ignitur radice breui, fibratâ, nigricante, caulibus palmum altis, furculosis, crebros geniculatis, folijs Tragorigani, h. r. is, odoratis, acris, eximium ac suauem quandam odorem spirantibus, flore non umbellæ specie, sed in summis caulibus oblongo, ac ex valculo longo, & herbaceo emergente. Polycnemum hoc Dalechampii H. Lugd. pag. 932. sibi ignotum faretur C. Bauhinus. Ex aridis & æstiuis Corsicæ montibus ad Dalechampium allata fertur.

FLOS CVCVLI, ODONTIS QVIBVS DAM. CAP. XLVI.

Subinde reptante, fibratâque radice se propagat Flos cuculi dictus, caules tollens cubitales

Diosc. lectio illustratur.

Plinius

Galenus

Nicander

Apollon.

Apollonius
nec spuria

Polycnemum

Plin. reprob.

Aequiuoca

Descriptio

Descriptio

& altiores, inanet, hirsutos, geniculatos, striatos: in quibus *f. lia* ad genicula, bina, stricta, oblonga, acutiuscula Caryophylli superbi dicta, rubete, carneove colore, rarius albo, fimbriat, apicib. cinereis, ex calyce oblongo, purpurante, striato, & quasi cannulato. Huius ex flore pleno suae rubente petita varietas.

Flos cuculi vulgò appellatur teste Clusio Pannon. pag. 33. itémque Hist. post. (vbi Odontitidis Plinij simpliciter flor., titulo eam donavit.) & Lonicerò: Trago cuculi flos pratensis, qui respectu floris Anemones speciem faciendam censet: Gesn. hort. Odontis Plinij Kreichio: Eadem in cat. pl. Odontides Fœni genus: Ruellio Odontides fruticosa, à Plinio inter Fœni genera, Fœnaria rustica: Camer. hort. Odontis quorundam. Sed huc non omnes Odontitis Plinii notas respondere in Hart. prohibet Thalius, qui *ἑρμύλλης* alterum, sine *ἑρμύλλης* speciem alteram vocat: Calp. Bauh. phyt. dicitur Caryophyllus 29. sine pratensis, flore simplici, communiter rubello, rarius candido: Schvvenckf. Caryoph. silu. tertius: Dod. de Flor. Caryophylleorum, vel Armeriorum species quarta: Hist. lat. in fol. Vetoniez 4. species, & Vetonica siluetris: Lobel. in Adu. Armoraria silu. pratensis, & Armoraria silu. nonnullorum practicoi, Tunix Arabum: Icon. Plant. p. 451. Armoraria pratensis silu. Flos cuculi Lob. in Append. Tent. 536.

Nescimus quâ occasione Tabern. huius plantæ duas figuras dedit, vnam nimirum pro flore cuculi, alteram pro Caryophyllo pratensi, quam in Hist. 18. fecit.

Nomina
ling.

Germani vocant Gauckblum/ fuchtblumen/ Peckblumen/ & Pecktegelin: Belgæ Eraye bloemfens, i. e. Cornicis florem & Loockcoernes bloemfens: Galli *fleur du coqun*, h. e. Florem cuculi.

Prata communiter ornat Maio, Iunio, Iulio & Augusto. Ad venena commendatur.

FLOS CVCVLI FLORE MULTIPLICATO
purpureo, & altero albo.

Descriptio



Armer. a.
quat. Poly-
thes.
Odontitis
Plinij flore
pleno.
Locus &
Tempus

terum Armerium aquatile flore albo.

Clusio est in Hist. post. Odontitis Plinij pleno flore: Venetis *Margarita* nomine habuerunt Camerarius & C. Bauh. Floret adhuc Augusto: facile verò perit, nisi surculis propagetur.

ODONTIDI SIVE FLORI CVCVLI

affinis *Lychnis sylvestris* 1. Clusij in Pannon. 4. in Hist. post.
CAP. XLVII.

Caulis tollit cubitalem, rectum, cauum, longior inter nodos distinctum, tactu circa



Descriptio
cavum glutinosum: ex singulis geniculis bina folia ex aduerso sita. Floris cuculi, oblonga, acuminata, crassiora, saturatiusque virentia: ad eadem genicula à medio serè caule ad lumen fastigium, pediculi à foliorum sinu exorti longiores flores crebros sustinent, pulchrè purpurascens quinque foliis

constantes, Saponariae floribus accedentes, ex calice oblongo: semen rufum sequitur in vasis ex principio angusto paulatim dilatatis: radix crassiuscula, nigra, multas fibras spargit, & singulis annis nouos, còlique numerosiores caules profert.

Clusio in Pannon. p. 328. vocat *Lychnidem silu.* Synon: primam [4. in Hist. post. Tabern. *Lychnidem silu. purpuream* in Icon. [7. in Hist.] C. Bauh. phyt. *Lychnidem* 29. sine viscosam rubram angustifoliam. Schvvenckf. *Caryophyllum silu.* 4. viscosum. Thalius *ἑρμύλλης* rubrum, propter florum colorem & *Helperidem*, quorundam aliorum verò *Vilcaginem*.

In omnibus serè Pannonia & Austria inferioris montanis syluis, editisque & herbidis locis inuenitur, atque etiam syluis Francofurti vicinis: floret Maio, semen Iunio maturefcit, Clusio: apricis & aridis delectari dicit cautib. Schvveckf. Vbiuis in Hircania locis aridis frequentem perhibet Thalius. Mihi verò ostensa Argentina flore conspicua Maio.

Locus &
Tempus.

LYCHNIS SILV. FOLII ANGVSTIS
& pluribus ex geniculis singulis,
Clusio 1. in Hispan. & in post.

CAP. XLVIII.

Ceniculatos habet caules, tenues, in plures. Glas dimissos, pedales, aut maiores: folia in singulis bina, ternave, interdum plura, angustiora quàm iam dicta, viridis candido perfusi & quasi castij coloris: flores in summis ramulis nascentes, quinque foliis bifido mucrone praeditis constantes, internâ parte candidos, externâ aliquantulum purpurascens, & anteaquàm omninò tatescant, se se contrahentes & circumuoluentes: calices admodum duros, breues, subrotundus: semen paruum, rotundum, Papaveris rhizadis, cinesacel

Descriptio

Synon.



p. 182. itemque H. Lugd. p. 817. ac Tabern. in Ic. & Hist. Lychnis silvestris Clusii primis. Casp. Bauh. phyt. Lychnis 18. siue silv. pluribus foliis simul iunctis. Suspicio me hanc habere collectam Aigentini in horto D. Georgii Obrecht. foliis latiusculis ob culturam.

LYCHNIS SILV. LANUGINE CANESCENS, flore manifestulo rubescente, Clusio 3.
CAP. XLIX

Descriptio



Multos habet ex una radice caules, rotundos, longiusculos, ceteris infirmiores, in terra procumbentes, geniculatos; folia in singulis geniculis bina, longa, mollia, & lanugine quadam cancellentia, inter quæ flores alternatim secundum ramulorum longitudinem nascuntur Odonatidi affini Lychnidi silv. formæ similes,

maiores & dilutiore colore rubescentes, vel, ut ita dicat Clusius, incarnatos: semen illi in valculis par, subrusum: radicem crassam & fibrosam, quæ tamen plerumque alterum annum non superat.

Pingitur à Clusio in Hisp. & H. post. Lychnidis silvestris 5. titulo, itemque à Tabern. in Ic. & Hist. vbi Lychnidem 12. silv. Græve wilde Nasrien Kößlin/cognominat. C. Bauh. phyt. vocat Lychnidem 15. siue silv. lanuginosam incarnato flore: H. Lugd. pag. 818. Lychn. silv. Clusii, hirtam Lobelii: Lob. in Ic. Plant. p. 337. & Obs. p. 181. Lychnidem silvestrem hirtam.


Clusius author est hanc subamaro esse sapore & in marginibus quorundam Castellæ agrorum inueniri.

Tom. III.

MUSCIPULA VISCARIA, SIVE

Lychnidis species.

CAP. L.



Descriptio.

Clusiæ à radice fruticat ramis multis, caulem ipsum cubitalem altitudine æquantibus, geniculatis, solidis, rotundis, per quos ad genicula nascuntur folia aduersa duobus plura, oblonga, acuminata, quibus latiora & obtusiora sunt in fima, ad Bellidis accedentia, viridia, glabra: flores tum

extremis ramulorum, tum è foliorum sinu prodeunt rubelli ex calyce simili Polemonio petreo, oblongo, striato, qui delapsis floribus à pericarpio & valculo in ventrem turgente distenditur, semine subnigro: radix lignola, alba, multifida: Sunt nobis plantæ alia patæ huius generis dormiente minores.


Muscipula siue Viscaria, Lobelio in Obs. pag. 242. (vbi Lychnid. silv. 4. Clusii. & Silenen Theophrasti Aldroandi quæque vocat.) & Ic. Plant. p. 453. Spontè nascitur in aruis, inquit Clusius, & inter segetes pingui solo, plerique Castellæ veteris locis: in hortis culta, floret eodem quo lata est anno à Maio mense usque in Autumnum: Spontè etiam seritur, & ante Hiemem prodit.

Hanc Lychnidem silv. 4. Clusii pingit H. Lugd. p. 818. & Tabern. in Ic. & Hist. vbi & Lychnid. silvestrem appellat. C. Bauh. phyt. dicitur Lychnis 25. siue viscolo caule, & Muscaria Adu. An Viscago vulgò vocata Czialpino?

Muscipula siue Viscaria Lobelio.

Synon.

MUSCIPULA MAIOR CALYCE turgido ventriolo.



Descriptio

Viscaria maior cubitalem emittit caulem rectum, statim à radice ramosum, crassiusculum, hirsutum stratum, fragilem: folia Ocyroidis non speciosi, hirsuta, mollia: ex ramorum diuiscationibus, foliorum sinu, extremisque flores ex pediculo satis longo appendi, quinque folus bifidis purpurascens, bus, orto Sole

O o

Synon.

Locus

flavescentibus constans, apicibus in medio albis, ex calyce oblongo, hirsuto, pulchrè striato, quem in immensum distendunt seminū vascula è lata sessilique basi ventriosa in mucronem desinentia, semen continentia pulchrum, nonnihil ad papaverinum accedens, sed maius, compressum, striatum, cinereum: *radix* robusta est, recta, ex lateribus fibras producens: Tota planta ad tactum viscida: foliorum sapor glutinosus.

Synon.

Hæc est illa, quam Clus. in Hisp. Lychnidem silu. 3. in Hist. post. 1. inscripsit. Lobel. verò in Obs. p. 183. & Icon. Plant. p. 339. Lychnidem silu. 3. Clusij.

H. Lugd. &
Tabern. no-
tantur.

H. Lugd. p. 318. hanc itidem pingit, titulo Lychnidis silu. 3. Clusij: cauliculis [calyculis legendum. Compiler Hug. Lugdunensis errorem apud Lobelium à typographo commissum ignoravit: ut & Tabernam. qui itidem etiam inscripsit:] striatis, ponitque eius descriptionem p. 319. & aliam p. 316. Melius C. Bauh. phyt. dixit Lychnidem 26. siue silu. lausoliam calyculis duris striatis.

Locus &
Tempus.

Muscipula siue Viscaria maior floruit mense Maio Genevæ ex semine eodè anno sata in horto meo: annua est herba: Montbelgardi lapidis prouenit ex semine deciduo. In aruis & inter segetes pingui solo, plerisque Castellæ veteris locis collegit Clusius: & in hortis Belgij florentem, eodem quo sata anno, à mense Maio in Autumnum vsque.

MVSCIPVLÆ MAIORI CALYCE
ventrioso, similis.

CAP. LII.

Descriptio



Multum similitudinis habet hæc herba cum præcedenti: *radix* alba, crassiuscula, fibris paucis donata: *caules* crassiusculi, rigidi, pedales, purpurascētes, geniculati: ad genicula *folia* bina, caulem amplectentia, superiora vnciâ longa, angusta, hirsuta, candidantia: caulium supremæ partes diuiduntur potissimum in ter-

nos breues ramulos, in quorum extremis *calyces* turgent, magnos, breviores multò quàm in præcedenti: in his vascula breviora, tunicis diuisa, *semina* Papaueris modo, parua, cinerea, continentia. Et sic quidem siccam descripsimus.

C. Bauh. phyt. ut iam annotatum, dicitur Lychnis 19. siue silu. angustifolia caliculis duris striatis.

H. Lugd. p. 317. & 319. Lychnis silu. altera Clusij, Papauer spumeum quorundam: *Figura* Lychnidis silu. alterius Clusij posita apud H. Lugd. p. 317. titulo non correspondet, inquit C. Bauhin. est enim *figura* Lychnidis silu. alterius incanæ

cauliculis striatis Lobelij, quare non huic *figura* descriptio Clusiana addenda: Clusij enim descriptio, quæ hoc loco habetur, est eius *figura*, quæ Muscipulæ, siue Armeriæ alterius nomine p. 809. ponitur & describitur. Quare hæc *figura* p. 317. referenda est in pag. 319. ubi ex Lobelio, Lychnis silu. altera incana describitur. Dicitur pag. 319. videri Lychnidem quartam Clusij. Nego quia Clusius suæ tribuit *folia* intenso vultu ferè nigricantia: ex Lobelio verò vniuersam plantam albicare tradit.

Montpelij lectus vias obseruauit gener Chelidonium præsertim quæ Castelnouanum pergitur: siccam etiam plantam dono nobis dedit D. Iacobus Zvingerus.

Locus &
Tempus.

MVSCIPVLA MVSCOSO FLORE, SIVE
Ocyroides Belliforme.

CAP. LIII.



Ocyroides Descriptio belliforme à *foliis* primùm pullulantibus Bellidis *folia* vel Globulariæ referentibus, satis densis, sitosis, obscurè virentibus, sapore nullo insigni: licet reliqua per caules *folia* oblongiora, angustioraque conspiciantur, & ad genicula multò breuiora & tenuiora enascentia: *caules* sæpè excedunt cubitos duos, teretes, hirsuti, in-

nes: à caulis medio ferè ad summum *flores* aliquo modo racemosi ex longiusculis pediculis, spicam longam mentiantur, pluribus ad genicula ortis mulcariis, singulares autem parui, ex luteo herbacei, calyculo striato insidentes, quos vascula excipiunt turgidula *semine* cinereo, papauerino ferè simili, insipido, plenæ: *radix* longa, mediocriter crassa, alba: & glutinosa est herba potissimum circa superiora. Totam amaram scribit Clusius: ego tamen in culta Basileæ non obseruo amaritudinem.

Est Muscipula seu Viscaria altera flore muscoso, Lob. in Aduers. Muscipula altera flore muscolo, Papauer spumeum quorundam, & Sclamoides magnum Salmanticum Clusij, in Icon. Plant. p. 453. & Obs. p. 242.

Cæsalp. vocauit Viscaginem quandam, racematam tanquam in spica, flores exiles, & subpalidos ferentem. H. Lugd. pag. 684. Muscipulam alteram flore muscolo Penz. Tabern. Odontidem siue Lychnidis silu. genus: Item, Sclamoides Salmanticum magnum. C. Bauh. phyt. Lychnidem 26. siue Viscosam alteram flore muscolo, multum cum Papauere spumeo Dioscoridis conuenientem, si spumeum ob viscum inhaerens sit appellatum. Frater postremo hæc verba ex Cæsalpino desumpsit:

Synon.

Viscaginem
quandam

descriptis: an autem conueniant huic potissimum, vel Viscagini priori Celsalpini potius, aliis iudicandum relinquo.

Ocimoides minus siue album, non est Sclamoides magnum Clusii, vt videtur H. Lugdunensi p. 683. Ocimoides enim minus florem habet album instar Been albi, oblongum: Clusii verò Ocimoides magnum flosculos racematum coaceruatos exiguos ex pallido herbaceos: & hoc Clusii Ocimum sequenti p. 684. Muscipulae alterius flore muscolo nomine positum est, rectius tamen fecisset, si figuram Clusii, quae melior est, Compilator assumpsisset, teste C. Bauhino.

Locus & Tempus.

Burmii in Rhætia inueni florentem Iunio: Tiguri Gesnerus in horto alebat, vti ego Genevæ, vbi nonnihil culturâ formam mutabat. Eandem postea Basileæ observavi florentem & semine abundantem Iulio in horto D. Zvingeri, vbi à pluribus annis ea se conseruat radice perenni.

LYCHNIS PLUMARIA. CAP. LIV.

Lychnidem plumariam, Psilum Mârgen Röslein/ siue Lychnidem 4. Tabernomontano ita dictam à globulis albicantibus, rotundis, striatis, in quibus flos lanæ, vel plumæ similis, plantam caule firmo, recto, binis foliis ex nodo-

sis geniculis, incognitam fibi esse fatetur C. Bauh. phyt. vbi Lychnidem 24. facit. Mihi verò suspecta est, ieiuna hæc descriptio, sorte per Compilatores Hist. Tabern. facta ad figuram: mirum quod non annotetur locus, tempus, & sapor: vereor etiam ne figura minus sit artificiosa: quædam habet similia cū Muscipula



C. Bauh. ignota.


An Muscipula muscosiflora?

muscolo flore, siue Ocimoide Belliformi: perquirant lectores.

POLEMONIUM PETRÆVM Gesneri. CAP. LV.

Descriptio. Radix longa, crassiuscula, lignosa, alba, subactis, ex pluribus radiculis in vnam coeuntibus, composita, à qua folia infima nullo ordine nascuntur numerosa, vnciam circiter lata, tres, quatuorve vncias longa, pediculo satis prolixo, atro-virentia, hirsuta, sapore subacri & subamaro, pediculis rubentibus, hirsutis: caules cubito & sesquicubito nonnisi quam longiores, tenues, rubentes, hirsuti, lento succo oblitati, geniculati, binis foliis oppositis, hirsutis, oblongis, acutisque ad singulos articulos: flores à calyce, qualis

Tom. III.



in flore cuculi conspicitur, rubente, striato, oblongo emicant, albi, ex quinque foliis bifidis inque spicam reflexis compositi: ex quorum medietate exeruntur stamina ternis, toto calyce longiora, rubentia: semina in vasculis bullatis, leuibus, officio patulo in tres loculos distinctis, minutum, pullum, ferè orbiculatum, crispum. Figura nostra ex Fuch. non placet.

Figura nostra ex Fuch. non placet.

An Trago Floris cuculi genus siluestre flore albo? An Tabern. Icon. & Hist. Lychnis silv. wild frawen Röslein/wild Mârgen Röslein / Lych. silv. 6. flore albo, ac etiam rubello? Hic si eandem nobiscum intelligit, non placet ieiuna descriptio. An Celsalp. Viscago flore candido?

Genevæ & Tiguri in montis abundat, sicuti & Basileæ: floret mense Aprilis & Maio. Plantatur in horto E. G. semen maturat Augusto & Septembri: prouenit etiam à la chau florens Maio & Iunio: abundat in rupibus iuxta Morimontium. Gesnerus, qui Tiguri in horto colebat, me præsentente Polemonium petræum, vel laxatile denominabat, & Ceruicalem Val. Cordi: Dalech. Sarragam, Ocimoides minus, & Perdicium alterum Plinii cap. 17. l. 12. Cæterum, auctore Clusio nona (falsè legitur octaua) non modò in cædis silvis, sed etiam ad restibulum agrorum margines, nascitur per vniuersam Austriam infra Onatum Morauiam, Bohemiam, Pannoniam, vitraque Murâ & Drauam, abundè etiam in silvis Francofurti vicinis. Meminit idem & in Belgica videre Lutzelburgensi Ducatu: Schuerbeck. in Silesia petrosus & alpeis, florens Iunio in Gussinshausen dorf.

Locus & tempus.

Polemonium petræum, Ceruicalem Val. Cordi, Sarragam, Ocimoides minus, Perdicium alterum Plinii.

VISCAGO AVRICULÆ FACIE RETICA, & variæ aliæ Clusii Lychnides. CAP. LVI.

Radices agit fibrosas, Primularum Vitis in- Descriptio
star, à quarum capite folia promittis satis ampla, Auriculæ vrsi vulgò appellatæ flauo flore solius non valde dissimilia, candidiora tamen & lanugine pubescentia, etiam illis crassiora, densiora, & succo abundantia: altero detumescione anno caulem producit duorum aut trium cubitorum altitudine, firmum, rotundum, succo quodam lento & glutinoso oblitum, quo multæ & alia minuta insecta insidentia detinentur magno numero: in summis ramis plurimos profert flores, veluti in umbellam congestos, etiam ad centesimum interdum numerum, satis tamen exiguos pro plantæ magnitudine, quinque foliis

Qo 2



bifidis constan-
tes, coloris ex
viridi flavesce-
tis. Huius se-
men ad se misit
meminit Clu-
sius ex Italia, à
Iosepho de Ca-
sa bona, quum
ex Greta redux
esset, Mulcipula
Auricula vrsi fa-
cie cognomine.
Iconem verò,
quam hac ta-
bella expressam
damus, ad ipsū
mittebat Iaco-
bus Plateau, quā
Clus. Lychnidē
filu. latifoliam
inscripsit.

Sunt verò illi & alia varia Lychnides quas de-
scribit, verbi gratia:

Lychnis filu. Clusio è semine nata, folio lanu-
ginoso 1. flore albo, viviradix, Mulcipula Ita-
lorum.

Lychnis filu. Clusio è semine nata folio lanu-
ginoso 2. flore foris ex fulgine purpurascēte,
incus albo, viviradix.

Lychnis filu. Clusio è semine nata, folio lanu-
ginoso 3. flore carneo, annua.

LYCHNIS PARVA.

CAP. LVII.

Descriptio

Hoc nomine ad me misit Frater Lychnidis
plantam annuam, dodrante paulò maio-
rem, vncialem, rectam, radice singulari, lignosa,
fibrata, satis tenui: folia infima propter terram,
vngue non multò longiora: at superiora longio-
ra & latiora paulò existunt, Polemonij petraei
foliis similia, minora, magis hirsuta, ad caulis hir-
suti & teretis genicula nascuntur: à caule medio,
summo tenus tenuia foliola & strobili concen-
dunt oblongi, tunica striata, rubente, longis pilis
obscure innoluti, eo ferè modo quo Polemonij
petraei flores: vascula tandem oblonga, turgi-
dula, superius crenata alternatim per caulem ex
breui pediculo, tunica tam dicta obuestita.

Synon.


Inscripsit hanc Lob. in Obl. p. 183. Icon. Plant.
p. 339. Lychnidem filu. hirtam minimam: H. Lu-
gdun. p. 819. Lychnidem filu. minimam 6. Clusij:
Tabern. in Ic. & H. fil. Lychn. filu. minimam, Fleischer
nild. Rame himmels Noßlein; Lychnidem 14.
C. Bauh. phyt. Lychn. 16. siue filu. lanuginosam pal-
marem.

LYCHNIS MINIMA RIGIDA Cherleri.

CAP. LVIII.

Descriptio

Rigidula est planta, duum triumve vnciarum
altitudine, rard palmum attingit, coliculis
dntis, rigidis, ramosis; folia ad nodos bina ex ad-
uerso posita, semunciat breviora, perangusta, pi-
losa, è quorum alis nascuntur calices semunciales,
bimuli, perquam graciles, æquabiles à hirtu &



asperis: è quo-
rum apice flo-
sculus proslit,
quem præ exi-
guitate vix vi-
sus capie, pur-
pureus: radix
dura lignosa:
collecta per Ge-
nerum Cherle-
rum prope Ne-
maulum iuxta
molendinum.

OCYMOIDES FLORE RVBRO, minus, Creticum.

CAP. LIX.



EX semine Descriptio

ECretico,
Ocyroidis mi-
nons flore ru-
bro Candia
nomine à Ca-
sabona misso,
nata, est plan-
ta, caulis pe-
dalis, hirsu-
tis, tenuibus,
pluseulis extra-
dice tenui pul-
lularibus: ad
quorum arti-
culos conspi-
cuntur bina
folia oblonga,
mucrone ob-
tuso, ex quorū
alis ramuli duo
aduersi germi-

nant, fastigio flores rubros sustinentes longos, tu-
nica longā striata obuolutos, quemadmodum
Lychnis filu. 4. & 6. à Clusio depingitur: subse-
cutus est calix longus.

Hanc esse Lychnidem sylvestrem 7. Clusij as-
serere non dubitamus. Caspar. Bauhinus in
phyt. Lychnidis decima nonz speciem facit,
sed foliis brevioribus, floribus minoribus, in
ramulorum summitatibus sitis, ac nomine Ocy-
moidis minoris flore rubro Candia à me accepisse
ait. Anno enim 1594. ex semine à Casabona
accepto mihi prouenit. Ego autem non possum
hanc ad Lychnidem 19. Fratr. siue incanam Lo-
belij, quæ ab illa non parum differt, referre. Ac-
cepi Stutgardia semen, quod sacum, Aprili
prouenit, & floruit Iunio, semen
maturauit Iulio: ad pedis
autem altitudinem
peruenit.

Locus &
Tempus

OCYMOIDES LYCHNITIS
reptante radice.

CAP. LX.



Elegans hoc Lychnidis filu. genus depingit Fab. Columna dicto Ocyroides Lychnidis reptante radice titulo, sicque describit. Media est planta hæc inter Ocyroidem & Lychnidem coronariam: Ocyroidi verò, quia folius sit parvis ab radice statim binis singulis geniculis hærentibus: at Lychnidi quia incana, pilosa,

atque carnosæ folia habeat, non minus quam Lychnidis folia ad ellychnia formanda apta, similis videtur. Spontè ac frequens oritur in monte D. M. Virginis appellato, locis humentibus petrosis.

Descriptio

Radix tenui admodum firmatur, parum sub terra descendente, atque eucum reptante, ex qua plures fruticant viticuli rotundi, incani, hirsuti, bina foliola singulis geniculis hærentia habentes, quæ in imo minora sunt, deinde maiora in medio viticulo, quod contrà euenit in plantis, ab radice statim foliatis, ante caulis eruptionem, ut in Theophrasto legitur, hirsuta, carnosæ, incana, Lychnidi similia, sed magnitudine & formâ Ocyroidi, Polemoniz Belgis dictæ. Cuius etiam, sicuti & aliarum congenerum ritu flores edit Aptili atque Maio mense candidos, quinque foliolis constructos, stamina intus quinque lutea habentes, atque singula folia in summo quo latiora sunt, diuiduntur uti folliculi Thlaspi: lunio semina in oblongis pericarpis mollibus, cartilagineisque perficit, fulua, angulosa, hirsutaque. Pericarpium verò non vesica uti in superiore Ocyroidi (Ocimum silv. intelligere puto) obductum sunt, sed tantum basin quinque foliolis constructum, ut in planta, Galliarum morsus appellata. Huius radix vixit admodum est, ideoque multum fruticat, atque perennat, terramque ipsius comæ operit.

Vires & Virtus

Sapor plantæ dulcis est, quare non ineptè Herbariorum, seu nellarumque vulgus ad eliciendum lac copiosum vitur, atque plantam sicuti cætera olera iusculis admixtis intus ouis disruptis decoquant, non sine Piperis, atque Amaraci modico, vel, ut alii solent, in placentam efformant, cuius esu magnam lactis copiam prouenire experimèto se habere asserunt, atque hodie vtuntur. Ex his igitur, calidam atque humidam, nec aded terrenz substantiæ participem esse censi potest. Hanc Herbarii Neapolitani, Herba lactaria vulgò appellant, à lactis eliciendi facultate ipsius nota.


Tom. III.

CENTAURIUM MINUS FLORE
purpureo & albo.

CAP. LXI.

Obliquè radicem agit gracilem, lignosam, exsuccam, insipidam: caulis vnus [flores nonnunquam] angulosus dodrantalis circiter, læuis: folia per terram alia sparguntur, alia in caule, pinnæ ex aduerso sitæ, Hyperici foliis maiora: flores in extremo caule, ramulisque plures simul iuncti, ex oblongo viridante calyce suauiter rubentes,

Descriptio



quinque foliis constantes, apicibus totidem luteis, quibus delapsis succedunt longa capitula, strigosa, puluisculo farinaceo plena: sicut autem tum folia, tum flores, insigni amaro prædita.

Centaurium Dioscoridis paruum (& te- illustratur. nue addit Lacuna ex vet. κενταύριον τὸ μικρόν καὶ λευκόν] quod aliqui, auctore Dioscoride, Limnæum (λεμναίον Corn. λεβάνθη) quo modo habetur apud Plin. quod circa

id est, locos irriguos nascatur:] vocant, quod humecta amet loca, herba est Hyperico aut Origano similis, caulem habens palmum excedentem (dodrantem altiore: Syrrac.) angulosum: flores ad Lychnidis florum similitudinem accedentes, è puniceo sc. colore ad purpuram inclinantes: folia minuta, prælonga [κνίφωρον, vet. tamen κνίφωρον] velut Ruta. Semen simile est Tritico: radix porua, læuis, & superuacua. Plinius eadem serè transcribit.

Quamuis, inquit Theophrastus, Centaurii folia, caulesque amara sunt, vilia tamen planè sentiuntur. Huic cultus minimè adhiberi potest. Hoc enim imminutis viribus hebetatur, atque effeminatur, & aquosum redditur. Quærit loca algentia. In Elia agro fecundum: quod montuosis æditur, infœcundum: quod planis, florantius gaudet: quod concauis ne floret quidè, nisi improbè. Cæterum, quantum colligere licet, Theophrastus distinguit inter κενταύριον & κενταύριον. Κενταύριον enim ei est Centaurium maius, ut lib. 9. Hist. cap. 9. & 14. Item cap. 1. vbi legendum cenſeo pro κενταύριον, κενταύριον, facili errore, cum Plinius ita legisse videatur, ac id Centaurium maiori competat. Κενταύριον etiam Hippocrati est Centaurium maius, ut videre est in principio lib. de aff. internis. Centaurium verò minus à Theophrasto simpliciter κενταύριον vocatur, ut patet ex lib. 3. cap. 1. lib. 4. cap. 6. lib. 7. cap. 9. Hist. Item de caus. lib. 6. cap. 4.

Græci autem in versione sua Centauridem & Centaurium sub nomine Fellis terræ confundit, ut lib. 7. cap. 9. Hist. Item lib. 3. cap. 1. & lib. 6. cap. 4.

Gaza ed. sat. 17.

Oo 3

Caus. quo loco Centaurion vertit Fel terræ. Lib. autem 9. cap. 14. Hist. idem rursus *κένταυρίδα* etiam Fel terræ reddit: libro autem 6. cap. 6. item 9. c. 9. Hist. *κένταυρίδα* Febris fugam interpretatus est.

Varia nomina. *Herculis sanguis. Amaranthus. Stirpexila.*
Centaurium minorē à Græcis Elleboriten vocari refert Apuleius, à Prophetis Hæna heracleō quasi Sanguinem Herculis, Ægyptiis Amaranthum, quod non facili marcescat, Dacis Surloziam, Italis, eod quod febres fugat, & procul à corpore pellit, Febris fugam, aliis Muluradicem Earum autem notharum appellationum difficilis, Marcello teste, est cōiectura: nihil enim inter eas tam propriū & simile est, ut misceri & communicari cum diuersarum plantarum nominib. non possit.

Nomina ling. & Syon.
Græci *κένταυρον* appellant: item *κένταυρον* & *ἀμναιον*, quod videlicet circa palustria nascatur: Latini communiter Centaurium minus, paruum Lob. & alij tenue cognominant: Plinius, ut ostendimus, à loci occasione Libadion (si integra est lectio) ac propter summam amaritudinē, Fel terræ dici affirmat. Arabibus *Kanturion*, *Chanturion*, & *Kasarian sege sege*, seu *sages* dicitur, ac Limuscum eo teste, quod i. d. Cē aurea libelli descripsit. Germ. *Tausend guldenfraut*/Erdgall/fel terræ fieberfraut/Febris fugam, biberfraut/Belg. Santorie, & Kleynt Santorie: Gall. *Petite Centaure*, sine *Centaure poullet*, & *Repeyret*: It. *Centaurea minore*: Hetruscis *Biondella*: Hispan. *Cintoria* & *Fel de rieta*: Angl. *Centory*: Boh. *Centluc mensoy*: Polon. *Centurzia*: Hung. *Kü Centaurea*, & *zori. fia*.

Taberna reprob.
Tabern. in Hist. hunc titulum fecit Cētaurium minus flore luteo perfoliatum, geel tausentgulden: Item, Centaurium minus album, weiß tausent gulden. Sed quæ cognitio stirpium Tabern. vel eius cōpilotoris? ponit duas figuras Cētaurij minoris sub falso titulo, nulla addita descriptione, ac facit Luteum Centaurium similius purpureo quàm album, quod sanè nulla in re differt à purpureo quàm colore albo: luteum autem perfoliatum plurimum discrepat.

Varietas

C. Bauh. apud Matth. & in phyt. vocat Centaurium minus flore è puniceo colore in purpura rubente, perth bérque aliquando esse albo & ferrugineo: in humidis bicubitalis altitudinis: in aridis vix duos tréve transversos digitos adquare.

Centaurij minoris vires & descriptionem cum Gratiolæ descriptione & facultatib. à Theophrasto & Plinio permixtas fuisse censet Dodonæus.

Centaurium minus nullis ferè non cognitum, quod passim in officinis habetur, verum & legitimum esse, omnibus, ut arbitratur etiam Matthiolus, exploratus est, quàm ut hic multis ostendi debeat. Quippe quod nullis in vniuersum notis Centaurij minoris historię refragetur. Quo fit, ut non parum aberrauerint inter Mauritianos Melues, Auicenna, & Serapio, utpote qui Cētaurij minoris vires cū maiori turpiter confuderint. Inter alios dubitat Anguill. epist. 11: Difficile est, inquit, affirmare, Centauream minorem, quæ ostenditur esse eam, de qua locutus est Dioscorides. Verba enim eius cūm dicit plantam similem Origano aut Hyperico, ostendunt esse simile tū foliis, tū ramis, quod non appareat in nostra.

Fecus & tempus.

Loca amat herbosa, aratro non proscissa, aliquantulum, sed tamen non omnino, rigua. Est non modò in Italia provinciis, verum & in Germania, ac Belgio abundè frequens in collibus riguis. Iulio & Augusto vna cum florib. ac siliquis legitur. Basileæ prope Leutach in monte, & cir-

ca Dornacum in syluis Augusto florens obseruati: in siluis circa Geneuam pulchrè vires locis humidis mensis Februarij principio. Abbo flore multis locis reperitur, potissimum circa Augustam.

Magni, multique vsus herba Centaurium minus. Herba ipsa vires contusa & imposita, vulnera glutinat, vetera vlcera purgat, & ad cicatricem perducit. Decocta eadem & pota [legendum enim *potum*, & non *κένταυρίδα* deuorata, ut legit Sarrac.] bilem, humorēque crassos per aluum ducit. Decoctū ipsius ischiadicis conuenientissimè infunditur, trahit enim sanguinem dolorēque leuat. Succus ad oculorum medicamēta perquam utilis est: quippe qui quæ pupillis caliginem offundunt, vna cum melle dicitur. Vulux subditus mentes & partus extrahit: peculiariter verd neruorū vitiiis epotus prodest. Galenus ob ingentes, miræque eius facultates, de ipsius viribus integrum librum conscripsit, Papizque dicauit, eiusque lib. 7. quoque simpl. meminit, sic inquit: Centaurij minoris radix planè inefficax est: sed caulis eius extremus & potissimum folia, quæ illi inhaerent, & flores vtilissima sunt. Vincit in eis qualitas amara, paululum habens & adstrictionis, atque ob eiusmodi temperamentum admodum exsiccatorium est medicamen, expers mordacitatis, &c.

Manipulus, inquit Tragus, herbæ vna cūm floribus, dimidiā mensura vini albi vel aquæ ad dimidias decoctus ac potus, bilem crassosque humores per aluum exigit: quæ de causa, vtilissima est siue decoctio iis qui morbo regio, continuūque febribus laborant: eadē potio vesperti ac mane per al quot dies sumpta icterici heni, quæ obstructions soluit, omnia corporis vitia expellit, tinea ventris enecat, menses, scilicetque emortuos euocat: eodem modo usurpata tormina, colicam passionem, aliasque ventris affectiones pertranat, maxime eas cum quibus nulla est coniuncta alui adstrictio: aquæ ex herba & floribus facilius vsus, sed non perinde efficax: quare delicatiorum ac puerorum esto remedium, qui lumbricis infestantur, quos si commodè pellere velint, singulis vicibus mensurā trium vel quatuor cochlearium haurient illam: quidam herbam in puluerem redactam è vino ad omnia ea quæ diximus bibunt, nonnulli pilulas faciunt ex ea, quæ quidem ischiadicis, neruorum vitiiis & podagricis adhiberi possunt: quin & clysteribus haud inuiciter adiicitur. Auctor est Matthiolus in Hetruria Biondellam nuncupari, quoniam abstergendis dealbandisque mulierum capillis ex lixiuio plurimum præstet. Detrahit hoc bilem & pituitam, quæ sanè facultate Cētaurium maius planè carere deprehenditur. Datur eius decoctum vtiliter tertianariis, quod bilem per inferna deijciat, quo factum est, ut quidam hanc Febris fugam vocauerint. Idem, ac pariter succus, icterici ac lientis obstructions & durities tollit. Alui tinea pellit, ex melle drachmæ pondere potus, tum vmbilico illitus. Herbæ comæque decoctum, lentiginēs, varos, alphas, & ceteras cutis infectiones exterit, infectis particulis adhibetum. Infunditur succus vermiculosis auribus, quinetiam illinitur contra papulas, & manantia capitis vlcera. Camerarius exhibet in apoplexia, paralyfi, epilepsia, similibusque morbis, quod ad intestina validdè reuellt. Ceterum, quod Dioscorides & post eum Galenus scribit, Centaurium minus bilem & crassam per aluum ducere, ischiadicis infundi deco-

Vires & Vius.

Tragus

decoctum : nos inquit Dodonæus, tametsi frequenter ac feliciter hoc vñ, per alium tamen expurgationem vñam facere, observare non potuimus. Quamobrem nullam huic Centaurio minori cominuentæ aut expurgandæ alui vim ac potentiam adesse existimamus : quas quidem virtutes Gratiolæ, cuiusdam Italici *flanca cavallo* dictæ, & Centaurio minori amaritudine non cedit, inesse non imus inficias.

PERFOLIATVM CENTAVRIVM
luteum.

CAP. LXII.

Descriptio



Inutili fibrosa, multifidaque alba radice nititur : caulem tollens modò simplicem, modò ramosum, teretem, glabrum, dodrante longiorem ; vel sesquipalmū, qui solum ad singula genicula gemellū mucronatum traiecit, haud secus atque calidatum regionum Periclymenon : ceteroqui circa

radicem, proximeque terram folia sternuntur multa in orbem, Centaurii minoris rubri (Clus. Saponariæ vulgari non dissimilia, minora tamen & candicantia) summis autem caulibus, ramulisque è foliorum sinu erant florēs insident maiores quàm Centaurii iam dicti, Hyperici pares, intenso auri fulgore nitentes, quos magna excipiunt valvula semen minutissimum [Clusio nigrū] copiosissimumque claudens. Montpelii flores abundant succo luteo.

Synonyma

Gen. hort. Perfoliatam Achilleam appellat : Idem de coll. Perfoliatam hanc aliquos ineptè Centaurium maius vocare refert. Lobel. in Adv. Centaurii lutei titulo pingit. In Obs. pag. 219. & Icon. Plant. pag. 401. inscribit Centaurium floribus luteis siue citreis pallidis Mesuei. Clus. in Hisp. Centaurium luteum : In Hist. post. Centaurium parvum flavo flore. *Suspiciamus* iconem Clusii & Lobelii ad siccam plantā paratam, & ab eis foliorum formam negligentius observatam.

H. Lugd. consp.

Centaurium luteum prius, H. Lugd. p. 1290. & Centaurium luteum alterum p. 1291. (quod ab illo discrepans fecit, quòd nullos surculos edat, ut illud, quibus flores insideant, sed in summo caulis fastigio florem singularem mittat, Chrysanthemo similem) non sunt duo, sed vnum. Et postremum quidem nihil aliud est, quàm primò proveniens, quod cū vnum habet florem, vnumque caulem, ad latera plures producit. Eisdem locis reperitur, eodemque est gustu.

C. Bauh. ev.

C. Bauh. phyt. dicitur Centaurium 3. siue luteū perfoliatum ramosum : Item, Centaurium 4. siue

luteum perfoliatum non ramosum. Eidem apud Matth. Centaurium 3. siue luteum perfoliatum ramosum, floribus aliquando pallidè, aliquando intensè luteis & planè aureis, vel citreis : seminibus minutis nigris : Duplex, alterum angustioribus foliis & non perfoliatis, alterum latioribus multò, & caulem ambientibus. Centaurium 4. siue luteum non perfoliatum. Diximus nos antè esse Centaurium luteum vnicū non duplex, & quidem cū primum oritur ramosum non esse, sed successu temporis tale fieri. Propter errorem verò, ut puto, pictoris, qui figuram à Clusio & Lobelio exhibitam pinxit, nolim facere genus particulare Centaurium luteum non perfoliatum, quum etiam Lobel. dicat idem cum suo, quod in Adv. tradit.

Tabern. vel eius compilator in Hist. non describit Centaurium luteum ; sed titulum solum ei imponit, qui non competit, scilicet : Perfoliati lutei montani quorundam.

Camer. apud Matth. vocat Centaurium minus luteo flore perfoliatum : Casalp. Achilleon, in incultis nascentem, Centauream maiorem vulgi, & Centauream florū colore citrino pascari Mesuei.

Genevæ & Montpelii observant flores menses Maio. Tiguri in collibus reperitur, non frequenter tamen : Quatt plurimis tum Galliarum tum Angliæ locis : Montpelii, Basileæ in pratis humidioribus Michelsfeldensibus Autumnō florēt : sic in agro etiam Bononiensi & Montpelienli, in pratis vdis versus Larre & Lupum montem : provenit læto solo in collibus iuxta Tagum, ac aliis etiam Hispaniæ locis : ubi observavit Clusius.

Eisdem pollet facultatibus quibus Centaurium flore puniceo.

Tabern. & Bauh.

Locus & tempus.

Vires & Vires.

CENTAVRIVM MINVS ADVLTERINVM
quibusdam Lychnidis viscidæ genus.

CAP. LXIII.

Tenuis est huic caulis, proceritate cubiti vnius, aut sesquicubiti, rotundus, lœvis, geniculatus nonnihil rubescens, præsertim propter terram, superius cæsius, paulòque sub geniculis, visco tenaci obductus, in ramos diuisus : ad singulos nodos folia immediate cauli adnascuntur, bina opposita, plurimum surrecta, Been albi officinarum, sapore serè oleraceo, magis nitrolo, colore glauco : in ramulorum summitatibus, veluti umbellæ florum ad Centaurium minus accedentium, suave rubentium, quinquepartitorum, cæ oblongis sed tenuibus, striatis, rubentibus calycibus, in quibus succedunt vasa longa ex tenuiore principio sensim crassescuntia, semen minutum continentia, cineracei coloris : radix singularis paucis fibris donata. Spontanea in quibusdam locis dodrantem assequitur, & paucos fert flores.

Descriptio

C. Bauh. phyt. dicitur Lychnis 17. siue viscosa altera purpurea latifolia, atque eandem esse cum Lychnide filu. 2. Clusii in Hist. pag. 337. & Muscipula siue Armoraria altera Lob. in Obs. p. 244. in Ic. Plant. pag. 454. Idem in Animad. in Hist. Lugdunensem dicit Muscipulam primam Penz H. Lugd. pag. 684. sine iconē, putare Historiam esse idem cum suo Ocimoide minore siue albo pag. 683. sed falsum hoc esse. Penz namque Muscipulam primam, eam esse, quam Historia p. 309,

Synon.

Muscipula siue Armeria alterius nomine pinxit, & pag. 817. Lychnidis silu. alterius Clusij titulo, appositâ figurâ non conuenienti, descripsit.

Ceterum, H. Lugdunensis sub titulo Lychnidis silu. alterius Clusij malè posuit iconem plantæ, Muscipulæ minori calyce vërmoso similis, quæ non respondet descriptioni. Eademque Histor. eiusdem plantæ tres diuersas habet descriptiones, S. Muscipulæ siue Armeriæ alterius p. 809. Altera descriptio est Alsines purpureæ pag. 1235. Tertia Lychnidis silu. alterius Clusij p. 817. Sed & duas icones habet Muscipulæ alterius & Alsines purpureæ: tertia alterius est plantæ.

Gesn. hort. vocauit Caryophyllatam siluestrem & Lychnidem quorundam: Tabern. Ic. & Hist. Viscariam litiuam, & Muscartiam; Jam leunfraut. Authore fratre Casp. Bauhino. Cortuso dicebatur Centaurea 2. & Euaginata Anguillaræ Centauri minus exaltimanti. Monthelegardi se propagat semine deciduo, ubi Augusto mēse florebat; Monspeliæ etiam obseruati: Spontè nasci ait Clusius in aruis & inter segetes pingui solo plerisque Castellæ veteris locis: in hortis culta floret eodem anno quo sata, à Maio vsque in Autumnum: spontè sentitur & ante Hiemem prodit.

POLEMONIUM VETERIBVS.
CAP. LXIV.

Dioc. illustratur.

Polemonion [*πολεμόνιον* enim genere neutro Græci, quamvis non desint quibus genus femininum Polemonia placeat] quod alij Philetætion [*φειλεταίον*: Philetætiā legunt nonnulli.] Cappadoces Chylidynamin [*χυλιδύναμις* à multiplici potestate dicunt. Ald. tamen *χυλιδύναμις*. Marcell. vt fusiùs dicitur, *χυλιδύναμις*.] appellant, ramulos habet tenues, vtiq; pinnatos: folia paulo quàm Ruta maiora [i. quentia ascutia suspicatur Dodonæus, quoniam neque in Cratæuæ fragmentis habentur:] at longiora ad Polygoni, aut Calaminthæ folia accedentia. In summo verò velut corymbi sunt, in quibus semen est nigrum.

Dioc. lectio suspecta.

Radix cubitalis [*καυκάσια*: Vet. *καυκάσια*, & sic quoque Lacuna.] albicans, Struthio seu Radiculæ similis. Nascitur in montosis & asperis. Radix ex vino bibitur contra venenatas bestias ac dysenteriam: & ex aqua aduersus vtriusque difficultatem & ischiadem. Datur autem ex aceto drachmæ pondere lienis. Eadem contra scorpionis ictum amuleti instar adalligatur. Tradunt porro, qui radicem eam gestauerint à scorpionibus minime ferri, aut si ab ijs icti fuerint, nihil mali passuros. Dentium quoque dolores mitigat commanducata, inquit Dioscorides.

Vires.

Polymoniā, inquit Plinius, alij Philetætiā & certamine Regum inuentionis appellant [certarunt enim ob id olim reges, tradente Marcello vt aliquarum insignium virium plantarum, & accedentis ab illis humano generi beneficii] Authores dicerentur: Cappadoces autem Chylidynamin [i. e. mille vires habentem, quidam pro Chylidynamin Chelydoniam legunt, Marcellus:] radice crassa [cubitali Dioscorides:] in reliquis eadem tradit quæ ille.

Galen.

Galenus Polem. tenuium partiū est, & siccantem facultatem habet: Vnde quidam ad ischiadas, & dysenteriam, & induratum splenem, radicem bibendam dant cum vino.

Pro Polemonio, autem siue Polemonia di-

uerse plantæ proponuntur: scilicet Been album officinarū. Polemon. Siciliæ hirsuta, &c. Beton. coron. satia. Beton. coron. silu. Saponaria. Ocimoides. Vaccaria. Valeriana rubra angustifolia. Valer. rub. lat. fol. Scordium alterum. Montastrum. Fraxinella. Polem. petrum.

BEEN ALBUM OFFICINARVM.
CAP. LXV.



Lignola r. Descriptio
Lix crassa & alba caules emittit cubitū & sesquicubitū altos, tenues, teretes, lenes, geniculatōs, in alas circa summum diuisos: ad singulos articulos *scilicet* bina opposita nascuntur. Lychnidis formā, sed penitus glabra, cū dulcedine quadā, acia aff. cum & obscure amara: flores ex laxis vtricolū in-

star habentibus calyce b. quinque partito, rubro, herbidoque & albo vërscoloribus, glabris, parū prominent, vel albi, vel ex albo purpurascētes, ex quinque foliis bifidis compositi, staminibus purporascētibz medium occupantibus: calyces postea pericarpia continent Lychnidis semine pleni.

Been album officinarum, Fuch. lib. de comp. med. itemque Dod. gall. & lat. in fol. Polemoniam esse putant, sed ab ijs planè distent Matthioli, quod hoc ramulis, non sit vtriusque pinnatis: ac quod corymbos nullos proferat, sed calycem Ocimoidis modo: quod denique non solum in montibus & asperis proueniat, sed vbique, præsertim in pratis. Licet autē officinæ vulgò Been album nuncupent, non est tamen id, de quo Mauritanii ser plere. Struthion nonnulli conieciarunt, verum plurimum discrepat. Nonnullis præcis vt Gordonio Tunica herba dicitur. Appellatur verò & à nonnullis, vt Lobel. in Adu. p. 143. Obs. p. 184. & Ic. Plant. p. 340: Papauer spinosum, cum quo similitudinis habet nihil. Clusius, qui eandem iconem cum Lobelio habet, Melandryum Plinij quorundam inscribit: Dodon. in fol. lat. Been album siue Polemonium. Ceterum, eorum figura minus placet, nec etiam nostra, quaterna folia exprimens in flore: semper enim quina & bifida oblectusimus. Tabern. Herbam articularem: Casp. Bauhinus Lychnidem 21. siue siluestrem Been album siue Polemonium dictum: Schvvenkf. Lychnidem silu. candidam 2. & M. non a prædictis.

Polemonium non est com. tra Fuch. & Dodon.

Struthion non est Tunica herba

Duorum verò generum esse observabat etiam Clusius: Vnum enim in montanis nascens, altius adolebit, crassiores habet caules, qui cum laxis folliculis florem amplectentibus ex vindi purpurascunt: Alterius autem quod in omnibus etiam Germaniæ praus obuium est, diluiores & quasi albicantes

Genera

albicantes sunt. Sic & Gesn. in app. hort. Polemonium pratense [ita enim vocat, & Been albu] duplex assignat, aliud apicibus florum albis, aliud purpureis. Sed C. Bauh. alteri florem candidum, alteri rubrum, & alteri virentem adscribit.

Locus &
Tempus

Obleruam, Montpelu, Lugduni & Geneuz in siluis, aruis, & praeietis, florens menſe Maio: Baſileæ in pratis Iulio & Auguſto. In Aſtriaz, Bohemiz & Sileſiz herbosis aciebus collibus multa exit.

Vires
Vires

Eſt porro Been albi vulgò dicti [ſi Polemonium non ſit] facultates incompetetas Dodonæus crediderit. Tragus tamen commendat ad fomenta & balnea ſudatoria, quibus induratis nervos & articulos emollire conſuevimus, vtiliter parari dixit. Succus ophthalmiam calidam tollit, docente hoc Schvvenckfeldio, & dolores oculorū mulcet: Semen pituitam purgat, & comitialibus datur. Suppoſitū egriſ neſcientibus criſin moliri vulgus credit. Quercetanus in phar. reſt. in ſuo extracto Bezoardico cur præſcribit Been album & rubrum, radices officinarum, quæ nihil habent Bezoardici, vt notunt vel mediocriter docti: Eſtne reſtituere aſſumere reiecta ab illis?

BEEN ALBO OFFICINARVM SIMILIS planta ſemper virens:

CAP. LXVI.

Deſcriptio

Hic multi ab eadem radice prodeunt rami palmares, craſſiſculi, lignoſique quidem, ſed fragiles, in quibus naſcuntur bina ſemper aduerſa inter ſe folia, Bellidis folio non maiora, ab imo paulatim in latum expanſa, ſed ſummo mucronata, viridia admodum & ſplendentia: è ſummis aliquot ramis alii enaſcuntur dodrantaes, aut pedales interdum ramuli, geniculati, graciles, binis inter ſe oppoſitis anguſtioribus foliis ad ſingula genicula donati, & ſummo in alas contrario ſitu vtrinque naſcentes diuſi, quibus inſident membranaceis pinguibus caliculis incluſi flores, quinque biſidis foliis conſtantes, coloris quodammodo carnei, è quorum medio terna gracilia, incuruaque prodeunt ſtamina: radix candicat, pauciſque fibris prædita eſt, perennis tamen: Floret Iunio novum hoc & elegans genus Melandryi Plinii quorundam [Been albi officinarum:] quod Cluſio, ſemine ex Italia miſſo Ocimoidis arborei ſemper virentis appellatione, natum ſuit, quodque Lychnidis ſilv. ſemper virentis titulo tradita deſcriptione delineavit.

Caper. hort. vocat Ocimoides arboreum vel fruticoſum potiùs, foliis Myrti, ſplendidis, flore rubro. Caſp. Bauh. phyt. dicitur Lychnis 13. ſive fruteſcens myrtifolia.

LYCHNIS MARINA ANGLICANA.

CAP. LXVII.

Deſcriptio

Been albo officinarum apprimè ſimilis eſt planta, vt haud à quoquam ita facile diſcerni queat. Nam, vt in illa, bina quoque geniculis hærent folia, multò tamen minora, craſſiſcula, glabra, glauca, per oras ceu pilis breuiſſimis albis ſerrata: cauliculi teretes, dodrantaes, & longi.

Tom. III.

giores glabri, humi ſpatti: flores ex turgidis folliculis prodeunt ſpecioſi, ſtriatis, & Auellana magnitudinem ſerè adæquantibus, pauciores, foliis conſtantes quinque biſidis, nucis, quàm illo lationibus, & ita geminatis, vt ſlos plenus illius reſpectu videatur: in medio ſtamina totidem ſine apiculis, & plura quoque cum capitulis geminis, ex uſco luteolis, ſpor nullus inſignis. Ad hunc modum in horto Montb. ſatam atque cultam deſcripſimus.



Huius r. Synonyma:

mulum Lobeliana figura æſtimationis, ob eam quàm ſuprà diximus, rationem. Noſtræ enim Lychnidis Anglicanæ, hoc nomine exhibitæ figuram non damus, quippe quæ ex Lobeliana iam erat parata, licet minùs ſeliciter picta videretur.

Lychnidem mannam Anglicam pingit Tabern. in Ic.


& Hiſt. vocatque germ. Engliſch Margen Roſlin: Lobel. in Adv. & Ic. Plant. p. 337. H. Lugd. p. 1361. C. Bauh. phyt. vocat Lychnidem 17. ſive marinam repentem.

In agerib. maritimis Veſtis inſula Angliæ, totòque illo littore frequentem, nò niſi inter ſilices & Braſſicas marinas, quæ ſermè vndæ alluunt, enaſci author eſt Lobel. Floret menſe Iunio, Iulio, Septembri. Lychnid. Anglicanæ marinæ nomine miſſum ſemen per Robinum hortulanum Regis Galliar, ſatam Martio, ſtote protulit Iulio, aliquot annis duravit in horto a. c. Montb. Exiſtimo tandem periſſe ſuffocatam umbrâ maiorū plantarū.

Locus
Tempus

VACCARIA.

CAP. LXVIII.



Vaccaria Deſcriptio

Vaccaria ſurgit ſingulari, cubitali & alioſiore, læui, terete, concauo, qui circa ſaltugium in oppoſitos diuicatur ramos, atque hi in alios, ſitu ſemper contrario: folia ad caulis genicula, bina ex aduerſo naſcuntur, ex glauco pallentia, oblonga, acuminata, aliſ ſuiſita caulem.

Pp

amplexientia, ut ab eo transfadigi videantur: singulorum extremis flos infidet dilute rubescens, quinque constans foliolis, paulum è calyce prominens, qui canaliculatus, glaber, strias habet virides, ceteroqui pallet: pericarpium eodem obvoluitur, turbinatum, senine plenum nigro, rotundo, Sinapios magnitudine: radix lignosa, candida, recta, fibras à lateri spargit.

Thamecne.
non Cordi.

Thamecne.
non Cordi.

A Cordo in H. flor. Thamecnemi stulo describitur. Gesnero autem, qui figuram addidit, videtur ad Polemonij vel Perfoliatæ species pertinere, ac græcæ linguæ peritum fortè Thameocnenum potius dicere, siue à *thame*, siue à *thameocne*, quod est creber. Idem de coll. stirp. Castabricam quorundam nominat, sed non est. De hort. Lychnidem silu. quorundam, herbam in arvis nascentem, Perfoliatam rubeam nonnullorum, & Lychnidem Monachorum [Carthusianorum] *farthūs* ser blümle. Anguill. epist. plantam hanc pro Glasto primo vero describit. Sed hallucinantur (teste Dodonæo lat. in fol. qui Vaccariam nominat, & Ocimoides suspicatur,) qui Gastum, siue Itandem esse, aut eius aliquam speciem iudicant: ad tincturam, siquidem inutilis est. Lob. in Ic. Plant. p. 353. in Obs. pag. 190. Itatidis silu. Vaccariæ dictæ titulo hanc pingit, ac in Adu. eandem cum Myagro Matthioli esse contendit, sed falsò, vti capite de Myagro dicemus.

Lob. lappæ.

C. Bauh. phyt. Lychnidem 23. siue segetum rubram foliis Perfoliatæ, variate scribit foliis nunc latioribus, nunc angustioribus: totamque plantam modò maiorem esse, modò minorem & hinc tres apud H. Lugdunensem extare icones. Harum prima est p. 500. Itatidis siluestris Lobelij: Vaccariæ pallidæ titulo. Altera pag. 515. Vaccariæ rubra maioris inscriptione, ibidemque tertia vaccaria rubra minor.

Vaccariam plantam vocat Herbarij, quod eam libenter vacca depascatur, rubram & pallidam à floris colore. Quidam Códurdum Plin. esse volunt. Cæsalpino verò Rapum sylvestre dicta est, & genus Polemonia læuis, i. e. Been albi officinarum. Gignitur Montbelgardi, Genevæ & Monspeli, ac etiam florens Iunio & Iulio, quo etiam mense semine maturo observatur.

Loens &
Tempus.

LYCHNIS REPENS FOLIO VIRIDI,
flore albo Clusij.
CAP. LXXV.

Descriptio



Singulis annis ex eadè radice noui prodeunt cauliculi, per terram sparsi, & subinde circa internodia radices agentes, deinde sursum denud sese erigentes palmarum altitudine, graciles, geniculati, bina folia in singulis geniculis ex aduerso opposita ferentes, longiuscula, angusta, obtuso mucrone

viridia, prominulo dorso: flores in summis caulis & lateralibus ramulis elegantes, candidi, quinque laciniatis foliolis constantes, inodori: quibus succedunt obtusa *vascula*, exigua, nigricante, planòque semine [quà notà quandam affinitatem cum Armeriis floribus habere videtur,] referta: fibrosam habet radicem, quam faciliè pangere licet. Vbi adoleuit lento quodam & glutinoso humore, superiore parte, illita videtur.

Clusio descriptionis auctori est in Pannon. p. 330. & seq. Lychnis 3. siue albo flore 2. In hist. post. Lychnis silu. 20. Casp. Bauh. phyt. Lychnis 31. siue silu. viscosa alba angustifolia maior [minor verò ac Lychnis 32. C. Bauh. phyt. quæ Clusio folio & flore est minore.] Lob. in Ic. Plant. p. 445. Caryophyllus minimus humilis alter exoticus flore candido amœno.

Synon.

Prouenit ad Striacarum Alpium & Snealsben supra cœnobium Neuberg radices: abundantius tamen in Etchero sæpius commemorato.

Locut

AVRICULA MVRIS, SIVE
Myosotis Veteribus.

CAP. LXXVI.

QVÀ Dioscorides Muris auriculā [*μυρὶς ἀυρίδα*, alii verò Myosotida [*μυρὶς ὀτίδα*] vocant, caules promit ab vna radice plures, aliquatenus infernè rubentes, & concauos: folia verò oblonga & angusta [*φύλλα δὲ ὀρθὰ καὶ στενὰ*. Matth. tamen legit *αὐτὰ ἐστὶν ὀρθὰ*, h. e. tenuia & parua, non absque errore fortè] dorso spinam elatam & eminulam habentia, nigricantia, per interualla assidue geminata, & in mucronem desinentia. Prodeunt verò ex alis tenues cauliculi, in quibus *flosculi* cærulei, parui, vt Anagallidis. Radix digitali est crassitudine, multis fibrata capillamentis. Est denique herba similis Scolopendrio, sed læuior ac minor (vet. hanc partem non legit: alij continnè legunt, Sarr.) Huius radix imposita ægilopas sanat. Sunt & qui Alfinen [Helxinen quidam legunt] Myosotida vocitent.

Descriptio

Myosota, siue Myosotis, inquit Plin. læuis herba, caulibus pluribus ab vna radice, aliquatenus rubentibus, concauis ab imo: foliis angustis, oblongis, dorso acuto, nigris, per interualla assidue geminatis: & tenuibus cauliculis ex alis prodeuntibus. flore cæruleo: radix digitali crassitudine multis capillamentis fibrata. Vis eis septica & exulceratrix, ideòque ægilopas sanat.

Galenus secundo ordine siccatè, nullam autem manifestam caliditatem habere dicit.

Galenus

Auriculæ muris nomine donantur etiam sequentes plantæ: Anagallis. Auric. muris Matthioli. Aur. muris 2. Veronica. Veron. Spicata. Aur. muris quibusdam. Auricula muris pulch. fl. albo. Polemonium petrum. Botonaria Anguill. Pilosella maior, Pulmon. Galorum. Pilosella maior Fuchsi. Pilos. altera Tragi. Pilos. minor Fuchsi. Stoech. citrina germanica, maiorana. Pyrola. Pulmonaria Italicorum. Aur. muris Camerarij leguminosa. Asperula Dodonæi. maritima. Alfine-folia Lædrensis. Bursa pastoria minima.

Asquimoca

Alfine etiam vulgaris non solum Recentioribus, sed etiam Antiquis Auricula muris vocitata fuit: nec desunt, quicquid historiam huius capit apud Dioscoridem cum Marcello præfigunt Alij verò

verò

verò vt Cornarius & Sarracenus cen suppositiua remouent, & lib. 4. reponunt.

AVRICULA MVRIS MATTHIOLI.

CAP. LXXVII.

Auricula muris locus ex Matth.

Passim mense Maio floribus ornata visitur, nimirum in pratis, in campis, in hortis, & secus vias, & vbiq; serè locorum: vocatur germ. wald Mangolt nist blattken blumen. Auriculæ muris Matthioli meminit Dod. gall. sed lat. in fol. eam præterit.

Compiler H. H.

Compiler H. Lugdunensis satis demonstrat se parum in stirpibus versatum. Ex sola siquidem icone [quanti scilicet credimus] Auriculæ muris Matthioli indicat omnia, quæ Dioscorides & Plinius scripserunt, aptissime competere plantæ ei, quam ex Matthiolo pingit p. 117. Inconsideratè tandem eadem pagina eandem Matthioli effigiem repetit pro Dodonæi Auricula muris secunda, quam tamen Dodon. in Hist. gall. posuerat pro prima: descriptio etiam ex Dodonæo non conuenit.

Auricula muris Matthioli quæ sit se ignorare fatetur C. Bauh. nisi sit, quam E. hium scorpioides aruente vocat, & Lobel. in lc. p. 461. Alsine Myosotin appellat.

AVRICULA MVRIS QVORVNDAM
flore paruo, vasculo tenui longo.

CAP. LXXVIII.

Descriptio.



Capillaribus fibris radicata: cauliculi palmares aut dodrantales, partim erecti, partim sepini, tenues, teretes, hirsuti, inanes, ad quorum singula genicula bina folia opposita, muscutorum aures acutius, hirsutæque ad vnguem exprimunt, sapore nullo: strobili exigui, colore albo, quos excipiunt loculi longi, lucidi, in quibus semen copiosum.

Synon.

Dodon. gall. Auricula muris quibusdam. Auricula muris 2. *Auricula de muris vulgare.* Eadem in H. Lat. in fol. Alsine spuria tertia.

Dodonæus in Hist. gall. [inquit Lugd. p. 118.] alteram pinxit Auriculam, quæ plerique Auricula muris videtur: Hanc penit quidam Herbarii veram Elatinem esse suspicantur, satis congruente historiâ. Tertiam adiecit, sed non depinxit Dodonæus. Et hæc est Ocimoides minus alba à nobis p. 63. descriptum. itæ H. Lugdunensis, quæ pro Auriculæ Dodonæi alterius icone ponit effigiem eius primæ, quæ ex Matthiolo. Neminem verò noui qui ex Auricula muris prima à Tom. III.

N. L. p. d. m. n. a. u. r.

Dodonæo iconè exhibita Elatinem faceret. Si tertia Dodonæi Auricula est Ocimoides minus album, multum discrepat Dioscoridis descriptio. Auricula muris altera Dodonæi non est figura illa apud H. Lugdunensem p. 117. eo titulo posita [inquit C. Bauh.] sed longe alia sit quam in Hist. sua gallica nomine Auriculæ muris quorundam pictam dedit, & in suis Iconibus p. 59. Myosotidis nomine exhibet, cuiusque figuram in post. edit. latina omisit.

Nos ad hoc caput reserimus Auriculam muris 1. & 2. magnæ flore, Alsine hispida dictam Frater C. Bauh. phyt. Item, Auriculam muris 2. siue Alsine alteram hispida viscosam, cum Auricula 3. siue Alsine hispida minore. Quid autem frater sibi velit per Auriculam suam 1. siue flore magno, non intelligo: Dodonæus enim ait hanc strobilos ferre, & non florem magnum.

An Thalo Alsine hispida passim, locis præsertim humidioribus?

Generæ passim in hortis Auricula muris quibusdam flore paruo albo, siliqua tenui longa, viret mense Ianuario, floretque etiam in agris Februarii principio. Montbelgardi & Basileæ viret in hortis tota Hyeme, & passim floret Martio ac etiam Iunio & Iulio: spontè ad fontem mirabilem Augusto, Septembri & Octobri.

An Alsine hispida. Thalo. Locus. Tempus.

ALSINE CORNICVLATA
Clusii.

CAP. LXXIX.



Palmaris. Descriptio
hæc est herbula, unico caule, qui in aliquot ramos diuiditur, constans, eoque geniculato, tenero, subhirsuto, v. Alsine vulgaris: folia Alsinæ foliorum æmula, paullo longiora, subhirsuta etiam, inter se opposita, & ex intervallis gemina: alarum caulis insident pusilli flores,

condicantes, quibus succedunt membranaceæ & transparentia cornicula gallinaceorum calcarum formæ, quæ lento quodam comperfa humore à tangentibus deprehenduntur: semen in illis exiguum, maturitate nigrum: radia inutiles & annuæ. Tota insipida est, auctore Clusio.


Lobel. in Icon. Plant. pag. 462. Alsine corniculatam Clusii scribit, eamque in Obs. pag. 245. Nigellæstri genus facere videtur. C. Bauh. phyt. Lychnidem 7. siue segetum minorem vocat. Ego nec Lychnidem, nec Pseudo-Melanthio subiungendam dico, quod eis non similis, vt satis constat ex figura & descriptione.

Synon.

Inter segetes frequens Salmanticensis agro tempus.

Locus & tempus.

vbi Maio mense flores pr oducit, & semen matu-
rum præbet.



AVRICVLA MVRIS PVLCHRO

flore albo.

CAP. LXXX.

Descriptio



Radice tenui vario reptatu vagante, fibrarumq; è geniculis demissatum ope rursus terram apprehendete constat: caules autem teretes, hirsuti, geniculati, in ramulorum fastigio flores habet amœnos, lacteos, quinque; foliis in medio aliquotq; vnicâ diuisurâ incisis & striatis cõpositos, quos foris ad

basim totidem hirsuta viridantia foliola sustinet, in medio verò stamina & stilus colore luteo: folia ad genicula bina ferè, opposita, interdum plura, hirsuta, semenciâ longiora, ex latiore basi sine pediculo, sensim in acumen desinentia.

Synon.

Placet figura Tabernamontani nomine Holostij Caryophylli, weiß Niegelin grass.

Locus

Non est autem vulgaris hæc planta: Genevæ tamen abundat & Montbelgardi: itémque ad Rhenum in montium cespitibus & colliculis.

Vires & Vius.

Siccæ est natura, in caliditate temperata. Affectionibus cordis medentur flores, maximèque caduco morbo succurrunt. Nonnulli conseruam parant, alij è floribus aquam distillant, quam infantibus epilepsia correptis propinant. Extrinsicus ad paralyin & resolutionem neruorum extollitur.

AVRICVLA MVRIS PVLCHRO FLORE folio tenuissimo.

CAP. LXXXI.

Descriptio




Folia habet pergenicula tenuia, lari- cea: ramulos multos, dodrantes, ligneos à radice crassa dura & perenni emit- tit: flores magni sunt & albi, non differentes ab Auricula muris flore pulchro: calices latis magni. Prouenit in montib. circa Geneuam, vt Thuri.

Locus

AVRICVLA MVRIS ALPINA GLABRA, siue Lychnis glabra minima, aut Caryophylli minima species flore albo.

CAP. LXXXII.



Dviusculis, & pro plâ- tulæ modo etiâ crassiusculis radicibus nititur, albis, nõ admodum fibrosis, sapore nullo manifesto, calyculi plusculi palmares, tenues, laxes, inferius rubetes: folia oblonga, glabra, acuminate: flores surrecti, candidi, foliolis quinque per extremum denticulatis, in medio apiculis: calyculus in Lychnidum sylue-

Descriptio


strum morè formatus, striatus, superius nonnihil fimbriatus. Vascula succedètia, vbi desinunt, denticellis sectas habent oras, in quib. semina tenuia. Herba perennis est.

C. Bauh. phyt. Alline 21. siue pratensis glabra: An porro ab alio descripta sit, nondum mihi constat.

Alsiue pratensis glabra C. Bauh.

Inueni eam in rupib. ad meridiem sitis in monte Rofsberg prope Malmünster vbi florebat Iunio & semina maturabat Octobri.

Locus & tempus



CARYOPHYLLVS HOLOSTEVS

tomentosus.

CAP. LXXXIII.



Totus candido molli densoque ramis est oblitus, vt vix aliud quàm tomentum esse videatur: calyculi geniculati dodrantes & singulis nodis bina proferunt folia ex aduerso sita, Caryophylli holostij siue Auriculæ muris specioso flore paria, nec formâ dissimili, & solum excipias cū mollitie tomentum, ex quo-


Descriptio

rum sinu subinde ramuli propagantur: caulis superior in ramulos plusculos abit, quorum vnicuique flos innascitur candidus, Auriculæ muris specioso

specioso flore : horum calyceet tomentosi quoque, internè verò membranei argenteo sc. ceu Margaritarum splendore lucent : secundum ramulorum diuisionem sunt etiam breuissima folia argenteo colore micantia.

Locus.

Elegantissimam hanc plantulam Romæ primùm in horto Coruini Belgæ, Pharmacopœi Romani : postmodum etiam Florentiæ in horto Magni Ducis obseruauit & legit G. Cherlerus.



CARYOPHYLLVS ARVENSIS

umbelliferus.

CAP. LXXXIV.

Descrip.



Tabern.


Holostium Caryophyllarū aruense vocat, germ. weiß ader Nigelin gras/ & à nullo descriptum ait, sicque delineat. Secundum genus [Holostiu] assimilatur Holostio Caryophyllo [Auriculae munis flore] durā radice, eiusque fibris : folia verò sunt crassiora, latiora & duriora, nec ita acuminata : cauliculi te-

nues, parui & rotundi, spithamei, tribus aut quatuor geniculis distincti, à quibus enascuntur opposita bina folia, inferioribus, quæ à radice protuberant, æqualia. Summitatibus insident sex aut septem ac etiam plures & pauciores longis pediculis surrecti flores, albi, illius floribus similes : hos decedentes sequuntur capitula parua longa, paruum semen includentia, terram versus spectantia.

C. Bauh. in phyt. dicitur Caryophyllus ; aruensis umbellatus folio glabro : caule aliquando virente : flore communiter albo, aliquando subpurpurascente.

Locus.

Basilæ in agris aliquando reperitur, extra portam Blasianam, quæ ad Viam flumen itur : item copiose intra Vormaciam & Niewhaas.



GRAMEN FUCHSII SIVE

Leucanthemon.

CAP. LXXXV.

Descriptio

Tenui & infirmâ radiculâ summo cespite geniculatâ reptat, demissis tamen altius fibris : cauliculi inanes, quadrati, dodrantes & cubitales geniculis distincti, ad quorum vnumquodque bina folia, graminea, acuta & rigida : ex quorum alis pediculi exeunt, tenues, hirsuti, quibus insident strobili amœni, candidi, è quinque foliis profundè fissis & striatis compositi, in quorum medio apices crocei : dehiscens autem calycis

Tom. III.



quina folia virentia floribus tota sunt, capitulum succedit rotundum semen continens.

Quibusdam etiam Sepasianus Euphrasiam dici, auctores sunt Tragus & Dodonæus : hic autem Gramen Leucanthemon inscribit : ille Gramen nodosum cognominat : alius etiam Euphrasiam candidam & No-

ricam, Vascosis verò Teuffels blumen/ i.e. florem Diabolici, dici ait.

Gesl. de hort. Gramen à Fuchso exhibitum appellat : Lobel. in Adv. Holostium Diocoridis floribus albis, & dicitur Aginetæ in Obs. p. 26. Holostium Ruellii (& sic etiam in Sc. Plant. p. 46.) h. r. h. anorum & Lutetianorum, Chamaecissus Otobasi Italorum, & Gramen alterum floridum Matth. Tabern. Gramen floridum, blumen gras, Gramen virginicum, Euphrasiam virginicam, Jungfrauen gras, Enchmirt Anglorum, Oegentrost gras Flandræ & Brabantæ. C. Bauh. phyt. Caryophyllum ; siue aruense glabrum flore maiore, & Gramen floridum.

Genevæ florebat Maio : Lugduni Martio & Aprili au bois de la bonne stemande : inter Sardon & S. Jean le vieux itinere Lugdunensi mense Aprili : abundat alibi in sepibus.

Refrigerandi vi pollet & siccandi. Quare inflammationibus oculorum adhibetur recens cotulum, & emplastri loco impositum. Idem succus præstat, si lintea in eo madefiant & applicentur. Aliud dictas oculorum inflammationes aquam è floribus distillant.

GRAMINI FUCHSII LEUCANTHEMO

affinis & similis herba.


CAP. LXXXVI.

Synon.

Locus & tempus.

Vires & Vtus.

Descriptio



Stilis hoc floret, tenuioribus, quadratis vorticulis i. strobili ex longis pediculis, laticis, è bis quinque foliis, priore illo minoribus, apiculis cutilanibus : capitula minora oblonga : folia breuiora, repanda, bina : radix similiter fibrosa, terpens. Multum habet hæc planta cum Alfine nostra longi-

Pp 3

Synon.

folia, quæ quamvis humilior, latiora ei folia.

Lob. Ic. Plant. p. 46. Dinerſitas Holſtij Ruelij. Tabern. Gramen floudu n minus, ſlein blus men graß. C. Bauh. phyt. Caryophyllus 33. ſiue aruerſis glaber flore minore.

Locus & Tempus.

Obſeruauimus Geneuæ in daretis: Tiguri florentem maio menſe, eeu etiam prope Malmunſter in monte Roſenberg. Montbelgardi ſpontè in horto Ill. E. C.

ALSINE VETERIBVS ET in genere.

CAP. LXXXVII.

Alſinen quidam Myos otadicunt, inquit Dioſcorides, ex eo quòd folia Auriculis muris ſimilia habeat. Alſine verò dicta eſt, quòd opaca [lucos, quos Græci *δῖον* vocat] nemoroſaque loca amat. Herba eſt Helxine ſimilis, at humilior [*παραμυρία*] longioribulque foliis [*εξυμμετρούμενα* : Otib. *εξυμμετρούμενα*.] & non hirsuta: & cùm teritur (*διατερεῖται* πῖ, Vet. caret:) odorem Cucumeris reddit. Vim porò refrigerandi adſtringendique (*παλιν*, Vet. caret,) obinet: quam ob rem oculorum inflammationibus commodè cum polenta illitur, aur umq; dolori ſuccus infunditur: deniq; ad eadem omnia, ad quæ Helxine valet. Et hoc Dioſcoridis caput, rectius noſtro iudicio lib. 4. poſt Helxinem, quàm lib. 3. ante Auriculam muris collocatur, verùtque Alſine, quam Myolota inſcribitur.

Varia Dioſcor. lectio.

Virus

Nota ap-
pallationes.

Sunt autem qui & Myoton, qui Anthyllon, qui Myortocon, qui Myotofleron vocent: Aphri *Labathalabar*: alij à murum auribus, quibus ſimilia folia habet, muris auriculam dicunt. Eadem quæ Dioſc. habet & Plinius lib. 26. c. 4.

Alſine (inquit Galeus lib. 6. ſimpl.) aut myolota ſimilem facultatem Helxine obtinet, nempe refrigerantem & humectantem: eſt enim eſſentiæ aqueæ, frigida: quare & citra adſtrictionem refrigerat. Quocirca ad ſeruantes phlegmonas & mediocritia eryſipelata competit.

Æquiuoca.

Quamvis porò Dioſcorides, Plinius & Galeus vnus tantum Alſines mentionem fecerint, tamen recentiores multò plura eius adinuenerunt genera, vt eſt Alſine maior repens perennis. Alſine maxima Hiſtor. Lugdunenſis. Alſine vulgaris, ſiue xorus gallinæ. Alſine Plantaginis folio. Alſine marina Dodonæi. Alſine pelagica & littoralis Cluſio. Alſine minima. Alſine tenuifolia noſtra. Alſines ſpecies aliquot Thalijs. Alſine muſcoſa quorundam. Alſine longifolia in vlgineis proneniens locis. Alſine foetida. Alſines foetida quodammodò ſimilis laciota. Alſine ſerrato folio glabro. Alſine ſerrato folio hirsutiore. Alſine oblongo folio ſerrato, flore caruleo. Alſine folio profundè ſectò, flore purpureo ſiue violaceo. Alſines genus Fuchſio, folio Hedera hirsuto. Auricula muris Alpina glabra. Alſine nodosa, ſemine globoſo. Alſine corniculata Cluſij. Alſine Breuca eiſdem. Auricula muris quorundam calyce oblongo. Auricula muris quorundam flore pulchro albo. Auricula muris pulchro flore, folio tenuiſſimo. Polemonium petratum. Alſine folia myagri capitulis. Tridactylis muraria flore albo. Saxifragia alba petræa. Androlacos alterum matthioli. Buſſa poſterior minima.

Anagallis. Anagallis lutea. Pilosella maior. Echio scorpoides minus. Alſine vilcaria. Centaurium minus adulterinum. Erinos Columæ. Herba trientalis. Asperula. Panetaria. Cacubalum quorundam. Periclymenon. Melampyrum luteum Dalech. Galioſis minor folio cauloni ambiente. Helxine ciſſampelos. ſiue Conuoluulus, qui etiam Helxine dictus eſt.

ALSINE MAIOR REPENS PERENNIS.

CAP. LXXXIX.

Descriptio



Alſine de Aqua hîc agimus, ex radice perenni repente fibroſa caules proſert plures qui latè ſe diſſundunt, cubitos aliquot longi, teretes, ſcrobentes, lanuginofi, & ramoſi: ad quorũ ſingulos nodos ſilia ex aduerſo ſita nalcuntur quorum maiora Papanerianæ ſolia aliquant, ſorma

eâdem, ſecundum neruos & per ora hirsuta. nota verò vt Alſines vulgaris, pediculo alio nullo, alas mediocriter longo, piloſo, ſapore ſauo: flores ſpecioſi, Graminis leucanthami, quinque ſiliolis conſtant: ſingulis ad ſinum vſque ſiſſis, candidis, ſtratis, ſtaminulis niueis, medum occupantibus cum capitulo viridi è cuius ſummo quinque reflexa ſibra emicant, teridèmq; toti ſtori ſuſtendendo ſubſeuntur ſolia viridantia, villoſa, quæ vâſcula ſubſequentia obueſcunt, hyperici vâſculis ſimilia, turbinata, in quibus grana continentur Papanerianis paria, ruſſa, circa clauam racematim coherentia.

Brunſell. Mortem gallinæ maiorem, Groß roſ gelfrant vocat. Caſp. Bauh. phyt. Alſinem 20. ſiue altiffimam. Dodon. gall. Alſinem: Lat. ſol. Alſinem maiorem, plenique Hippiam maiorem appellatam: incognitam tamen multis, ac etiam (quod admiratur) diligentibus de ſilpium materia ſcriptonibus.

Lobelium, qui Dodonæi gall. figuram aſſumpf. ſit tam in Ic. P. p. 460. quàm in Hiſtor. Belg. pag. 445. pro Alſine maxima, Alder meſſit. Vinct ſuſpicatur in Aduerſ. non ceget ſic Alſinem maiorem, vt etiam vocat Camer. in horto, & apud math. germ. vbi figuram addit: itèmq; hort. Luſit. & H. Lugd. p. 222. vbi ramulos huius repentes depat, ſed contra quoduidiam obſervationem. Thalius Alſinem mediam vocat.

Tabern. Alſinem maiorem appellat in Icon. & ſecundam facit in H. flor. ibidèmq; primæ (i. e. vulgaris) non nind ſimilem ait, exceptis ſolijs, quæ maiora perhibet. Sed ſatis apparet Alſines ſpecies Tabern. montano, vel eius Compulſatori, non notas fuiſſe, vt qui non diſtinguat maiorem hanc à vulgari niſi foliorum magnitudine. Et qui præterea

Synon.

Alſine ma-
ior
Hippia ma-
ior.Alſine max,
Lobel.H. Lugdun.
ſatur.

Tabern. ſatur.

terea tam in Ic. quàm Hist. eiusdem plantæ aliam ponat figuram Alſines palustris titulo, nullâ annotatâ differentiâ.

Locus & tempus An morſus Gallinæ genus ſecundum Tragot Inter vepres, in dumetis, ſub rubia, locis opacis & aliſiſ, itemque prope fontes & defluentes aquas exit. Floret Aſtate & Autumno, hocque tempore ſemen maturat.

ALSINE MAXIMA H. LVGDVNENSIS.

CAP. XC.

Descriptio

Radix eſt ſuperne craſſiſcula, paulatim gracileſcente, innumeris fibris capillatâ: caulibus multis, pedaliſ, foliis Alſines primæ [vulgaris] per intervalla ſæpè quaternis, interdum ſingulis, interdum binis, ramulis multis, brevibus, copioſum ſtorem producentibus, antequam hiet oblongo, & acuminato capitulo incluſum, cùm apertus eſt, candidum, exiguum, radiatum, ſex foliolis conſtanti, ac totidem filis tenuiſſimis. In opacis gignitur (inquit H. Lugd. p. 1233.) aliorum Herbariorum Alſine maior, ſive maxima. Sed miror cur dicatur maxima inter Alſines, cùm Hiſtoria ei caules attribuat pedales & folia Alſines vulgaris.

C. Bauh. vocat Alſinem 16. ſive oblongo folio.

H. Lugd. notatur. Alſ. oblongo folio C. B.

ALSINE VULGARIS SIVE

Morſus gallinæ.

CAP. XCI.

Descriptio

Non multum diſſimilis majori eſt; aliſiſ locis petinde gaudens, radiculis capillaribus: humi ſtratis, tenellis, hirsutis, ſubrubentibus, geniculatis viticulis: folia Anagallidis, minora quàm in maiore, ſubhirsuta, ex geniculis ſimuliter adverſa, guſtu ſæcuro: ſiſtulis candidi, ſtelligati, minores: ſemen in pericarpis non diſſimile.

Quamquam autem hæc, quæ vulgò Morſus gallinæ dicitur, Anagallidis quadantenus, maximè quod ad folia attinet, affinis eſſe videatur, non tamen ad illam reſerri poteſt, ſed ad propriam ac peculiare genus pertinet. Quare minùs probanda eorum ſententia, qui cum Hier.



Synonymi Anagallis negatur.

Tragi q. no imp. barur.

Branch. hanc herbam, mediam vocandam contendunt. Tragus quoque Anagallidem negat, & Telephium Dioſcoridis, Plinii & Serapionis eſſe iudicat, cuius iudicio quoque quominus acquieſcamus, utrarumque deſcriptio necnon temperamentum & vires nos urgent.

Errant & ij qui cum officiis quibuſdam; Anicula muris, & qui Pilofella nomine vocant, diuerſas ſiquidem plantas confundunt.

Agricola turpiter commiſcet Anagallidem Dioſcoridis cum Morſu gallinæ. Sed & Apollinaris retinendo nomina & vires eundem errorem committit.

Lebelio in Aduerſ. Alſine! Hippia. Alſine minor Recentiorum ſeu Hippia minor. In Obſeru. & Icon. plant. Alſine. In Hiſt. Belg. Alſine; Hippia maior. Et ruruſ Alſine minor Recentiorum; & Hippia minor. Obſcurus eſt Lobelius.

Alſine dicitur Turn. Geſn. hort. (cui & Morſus gallinæ vulgò ſœmina) Anguill. Lonic. Matth. in Hiſt. germ. & Tabernamontano. Alſine vulgariffima Hort. Luſit. (an eidè Alſine media:) Alſine Matthioli H. Lugd. p. 1232. Alſine media, ſive 12. C. Bauh. in phyt. Alſine media à Fuſchio exhibitâ Camer. hort. Alſines primum genus & Alſine maior Fuſchio, qui malè apud Dioſcoridem cap. de Alſine per Helxinen intelligit Ciſſampelum: Hippia minor Cordo in hiſt. Morſus gallinæ officiis, Lonicero, & Trago. Dod. lat. in fol. Alſine minor.

Germani vocant Vogel fräut/ Auium herbâ: Hünterbiß/ Morſum gallinæ, Hünterdarm/ Intellinum gallinæ: Hünterſerb. Genß fräut, Anleum herbam, & Meier. Belg. Muer & Vogels fräyt. Gall. Mouron & Morgelaine, q. e. Morgelina. Itali Centocchi, Centone, Gallinella, Pauertina, & Pauertina, Papparina, Pizzagallina, Budello di Galline, & Centouice. Ruellius ab Italis Paſſerianam etiam dici reſert. Angl. Chetivweede. Bohem: fûrimor: & furriſtewce. Hung. Tif hur. Sclavus Muſch.


Nomina linguarum

Lucus, & humentia etiam amat, ſed tamen in hortis inter olera, ac in vineis enaſcitur. Viret etiam Hieme: Vere floret; ac ſemen petſicit.

Morſus gallinæ, ut inquit Tragus, refrigerantem & humectantem, quemadmodum Portulaca obrinet facultatem. Aqua diſtillata eadem habet vires, ſed & hoc illi experientia tribuit, quod is qui diuturnis morbis & magnitudine ægitudinum conſumpti ſunt, viribusque deſiciunt, & macreſcunt, viliſſima ſit, vel per ſe, vel in vino pota. Eadem infantibus in ſummis caloribus & ægitudinibus exhiberi debet, nam non ſolum internas inflammationes reſtinguit, ſed & impedit, qui accidere poſſint morbi, ut ſunt Spasmi. Herba ipſa, ſuccus & aqua diſtillata non ſecus atque Portulacæ & Sempervivi minoris, vulneribus calidis & vlceribus viliſſima ſunt, impoſita, illita, & ſi ex illis colluantur. Ex ſucco vnguenta refrigerantia conſci poſſunt, inflammationibus iecoris, aliorumque vulnerum, commodiſſima, non minùs quàm Populeon. Anicula caueis incluſæ, cùm eſcam ſaſtidunt, huius herbæ recreantur. Pauertina pulvis, Solenandro præceptore, fluentibus hæmorrhoidibus inſperſus, vel illitus fluxum & dolores compeſcit: Alii cum theriaca dant ꝓ. ad Epilepſiam: ad tormina puerorum All. dicta, propinant alii Aquam Alſines per aliquot dies.

Locus & Tempus.

Vires & Vires



ALSINE PLANTAGINIS FOLIO.

CAP. XCII.

Alſinæ vulgari perſimilis: radix fibris ſtaminibus capillata: ramuli conformes, pilofi,

Descriptio



An Alsine
hirsutior &
nigrior?

Tab. reproh.

Dodonæo?

Tabernamontânnum nesciuisse quid scriberet, cum exhibuit figuram titulo Alsinæ, mihi persuasit, eam nonnihil aliter pinxit, quam Dodonæus suam. Figura autem illa, quam pinxit pro Alsinæ tertia media, Steinvogelstrauß / (quam vulgari parvæ Alsinæ omnino similem, sed in eo tantum differentem ait, quod in saxosis proveniat locis) nonnihil atcedit ad nostram Alsinem Plantagini similem: melius tamen convenit cum Alsinæ vulgari. Quæ obsecro scientia botanica ponere figuras plantarum diversas non aliter quam loci ratione differentium?

An Camer. Hort. Alsinæ hirsuta, mediæ similis, sed nigrior, hirsutior ac durior spontanea? An Horto Lusit. Alsinæ hirsuta mediæ seu vulgari similis, sed hirsutior? An Thalia Alsinæ minoris alia species, foliola edens rotunda, sed diversæ inuicem magnitudinis, ita ut maiora foliola per totos coliculos, minimis subinde intercurrentur?

Locus.

Alsinem Plantaginis folio observavi in l'isle in Burgundia in vineis, & in Rolsberg prope Malmünster.

ALSINE MARINA DODONÆI.

CAP. XCIII.

Descrip.

Alsine marina siue quarta Dodonæi lat. in fol. secundam eius (vulgarem) referret, nisi caules crassiores essent, & breviores, crebriusque geniculati: folia item similiter crassiora: capitula non in rotunditate oblonga, sed latiuscula: in quibus semina tria, quaternave. Alsinem autem maritimam natales appellandam requirunt. Siquidem frustra alibi fuerit, quam in maritimis expetere. Et hæc ex Dodonæo, qui an exhibuerit figuram suæ Alsinæ marinæ dubitamus. Siquidem imago, quæ pro Alsinæ marina ab illo ostenditur, à Lobelio pro Alsinæ maiore, ac passim nascente recipitur: Suspicio ego eam convenire posse cum Alsinæ nostra Plantaginis folio: exprimendam tamen curam eius portionem in præcedenti tabella.

Tabern. Alsinem marinam, Meer Vogelstrauß / vocat, de primo genere [Alsinæ vulgari] planè si-

quemadmodum & folia longiusculis pediculis ex nodis appella, subrotunda, hirsuta, nigriora, in eo tamen differentia notabilis, quod per longum nervi plantaginei decurrant: flosculi parvi, albi, Alsinæ iam dictæ.

An Gesn. hort. Alsinæ hirsutior & nigrior? An Alsinæ siue Hippia maior Lobelii? An Alsinæ marina

milem ait, & in eo solum differentem, quod prope mare proveniat: Sed si Alsinæ marina solo situ differt, cur figuram apponit vix differentem ab Alsinæ vulgari ac paulò aliter pictam, quam in Dodonæo, vel Lobelio, qui eandem habent imaginem sub diversis titulis, ut antè quoque monuimus.

ALSINE MINIMA. CAP. XCIV.



Nisi totius Descriptio plantæ parvitas obstat, media Alsinæ esset, ita totâ facie effigiatâque ad similes est, verum per omnia minor, tennellis ramulis & hirsutis donata, magnâque ex parte simplicibus: foliis minimis, Alsinæ mediæ minoribus nigricantibus, paulum hirsutis, pediculis brevissimis


nixis, & flore similiter albo: semen in pericarpis, minutissimum, rufum.

Fuchsio dicitur Alsinæ minor & Alsinæ tertiâ Synon. genus. Dod. gall. Alsinæ minor. Lat. in fol. Alsinæ minima, & sic etiam Lob. in adv. Obs. p. 246. Ic. Plantæ pag. 461. Camer. hort. Alsinæ minima à Fuchsio exhibitâ. H. Lugd. p. 123. Alsinæ minor siue minima Dodonæi. C. Bauh. phyt. Alsinæ 17. siue minor multicaulis folio oblongo.

An Trago Mortus gallinæ quarta species? An An Mortus Hort. Lut. Alsinæ minor? An Thalia Alsinæ minoris tertia species minimis prædita foliolis, subrotundiusculis, ac in mucronem excrecentibus? Locus & Monspelij spontè in cœnobii mense Aprilis tempus florere animadverti. Genevæ viret tota Hyeme.

ALSINE TENUIFOLIA.

CAP. XCV.



Radices habet numerosas, albicantes, lignosas, multifidas: ex quibus surgunt cauliculi palmares descepsipalmares, teretes, ramosi, ad quorum nodos folia bina nascuntur: tunice minimæ, longa & tenuia: flosculi fastigii hærent ramulorum, pediculisque longiusculis ex foliorum

sim


fibi ortis, Alſines tertix Fuchſii, minores, candidi, ſtellaſci. Sapor huic plantæ nullus conſpicuus. Monſpelii in agris florens Aprilis occurrir.

Locus

ALSINE MVSCOSA QVIBVSDAM.

CAP. XCVI.

Deſcriptio.



Tenella admodum & infirma eſt plantula, veluti muſco tertix ſuperficiem operiens, palmaribus & bipalmaribus cellulis, interdum duas, aut tres vncias longis, prætennibus, ramosis, quorum nodis folia adnascuntur vncialia, & ſeſcuncialia, aliquando vix ſemuncialia, ſili inſtar tenuia, lætè virentia, flores minimi, ex quatuor ſoliolis conſtantes, albi,

Spergulæ facie & formâ, quorum media apiculi albiſſimi nodulo viridanti inſidentes occupant: ſtoſculi ſequuntur caliculi exigui, ſpadiceo, aut atro-rubente ſemine, Portulacæ ſecè, ſarſci: radix gracilis, inutilis, articulatiſſima fibrata. In hac plantula tantillùm amaricantis ſaporis percipimus.

Synon.

Apud H. Lugd. pag. 125. Alſines muſcoſæ titulo pingitur. C. Bauh. in phyt. Alſinem 24. facit, & tenuiſoliam muſcoſam cognominat.

Locus & tempus.

Montium ſummis aditibus umbroſis vdiſque ſerè gaudet. Vidi verò in monte Saleve non longè à Geneua.

ALSINE LONGIFOLIA VLIGINOSIS

proueniens locis

CAP. XCVII.

Deſcriptio.



In viginosis montis Roſenberg inuenta eſt nobis, florens Oſobri, radiculis tenuibus, ſerpentibus: caules pedales quadrati, infirmi, ad quorum genicula, folia bina Gratiolæ ſoliolis paria, minora, nec per ambitum ſerrata, in acumen deſinentia, glabra, neruo vnico medium decurrente, circa

medium latiorâ, quàm in Graminis Hoſtii Ruellii varietate, cui tamen flores ſatis ſimiles, aut Alſines vulgaris, extremis hærent ramulis, ſtellaſci albi. Viſcidus & ſæuus herbæ ſapor. Ceterùm, ſoliola florem ambientia, quinque ſunt viridia, alba autem decem, & præterea apices.

Apud Tabern. in Ic. & hiſt. inſcribitur Alſine fontana, Brunnenvogelſtrauß. A C. Bauh. phyt. fit Alſine 14. ſine aquatica. An à Lob. in Icon. Plant. pingitur pro Anagallide aquatica quarta? An Hort. Luſ. Alſine fontana?

Synon.

ALSINE FOETIDA, FABIO

Columnæ Dioſcorideæ.

CAP. XCVIII.



Ex radiculis fibroſis & frequentibus, caules complures enaſcuntur, cubito longiores, humi reptantes, teretes, crebris nodis intercepti, laues, inanes, fragiles vt Portulacæ: ex geniculis prodeunt folia, non illa quidem vt pluriſimum vtrinque, ſed altero duntaxat latere (licet ſic etiam vbi coniugati aduerſa, vbi

Deſcriptio

etiam trigemina emicent) plura ſimul innata, quorum vnum productiori pediculo appendum coniugii expers multis numeris reliqua, quæ & aduerſa & contrario ſitu poſita, indidem oriuntur, magnitudine ſuperat, Hippiz maximæ paria, pinguiora, atrouicentia, attritu putidum quid redolentia: ex oppoſito foliorum coniugii expertum, ceteroqui ex alis, ſemper tamen ad genicula ſtoſculi muſcoſi plures ex albedo in herbaceum colorem languent, ex duobus aut tribus ſoliolis, ſubacta bracteolarum tenuitate nitentibus, & oris plerumque extroſum reflexis: quibus delapſis ſuccedunt ſemina cannabinis minora.

Noſtro autem iudicio hæc minùs, quàm noſtra vulgaris, cum Alſinè Dioſcoridis conuenit. Et hoc vel odor ſæuidus comprobatur, qui non eſt Cucumeris, vt voluerunt Columna & Caſalpinus.

Quam potè Fab. Columna nomine Alſines facie plantæ nouæ expreſſit, eius ab Antonio Cortuſo ſemen Cynocrambes Dioſcoridis inſcriptione ſe accepiffe apud Matthiolum reſert C. Bauhinus, quæ oſenſio vt Cynocramben tertiam ſive Dioſcoridis fecerit. In Phytop. verò Alſinem 13. ſtatuit, & Parietariæ ſolis cognominat. Sed & Pona in Baldo Cynocramben legitimam eſſe voluit. Ceterùm, minùs nobis probatur opinio Cortuſi, Hononii Belli, & C. Bauhini exſtillantium Cynocramben: quænam enim ſimilitudo cum Mercuriali? vbinam reperitur mas & ſemina?

Locus & tempus.


Loca videtur amare eadem, quæ Helxine, atque ex insula Capreis, ubi frequens sponte oritur, habuit adiectam Columna: Oðobri mense ex t. Verè flores, atque Aestate perficitur. Cassalpinus semen terre Hieme & Vere tantum, prodidit. Casp. Bauhin. Montpessuli, locis vimbrosis sponte ortum legit. Mihi verò Montbelgarda prouenit in horto Ill. E. C. ex semine fratri C. Bauhino Neapoli à D. Imperato misso nomine Plantæ nouæ Alsines facie.

Vires & Vitis.

Gallu insipido a quo sunt folia, in semine verò aliquid inest tenuium partium, quo extergi lingua largè manò percipitur, non autem calorem imprimat. Ex quibus colligitur, extergere, adstringere, atque humectare posse, sicut Helxine.

ALSINES FOETIDÆ QVODAMMODO
similis laciniata.
CAP. XCIX.

Descriptio



Palmaris est, & ex frequentissimis cauliculis, geniculatis, alicubi purpurascens, folia, quib. breues pediculi, exent quodammodo serrata, coniugata, è quorum combinatione & cauliculi alij, & minora foliola alia subnascuntur. Indidem & flosculi verticillatim oriuntur, parui, muscoli, ex herbido pallidi. Quib. succedunt semina patua, ex rotundo oblonga, canabinis minora, sed supernè pulchrè cristata. Radix albida, crassiuscula, flexuosa & longiuscula. De odore nihil pronuntiamus, quia siccam accepimus. Sapor herbidus. Monspelio attulit D. du Vernoy.

PARONYCHIA ANGVILLARÆ QVIBDAM.
Et Paronychia, siue Alsine-
folia incana.

CAP. C.

Descriptio
Radix.
Folia.

Flores

Simplici nititur radice, duriusculâ & crassiusculâ: ramuli per terram sparguntur, quinque vel sex circiter pollicum longitudine, varîe diuisi: folia Alsine tertiz serè similia, nigriora, minus mollia, & paulò maiora, primò rotunda, pediculis breuibus nixa: flores quoque non multum dissimiles, sed numero & positu dissimili, multi simul, umbellæ simulachrum faciunt, gustu est viscido. Vti autem nunc descripsi, ita obseruavi Monspehij. Similè attulit mihi ex Italia C. Bauh. Et quoque similis quâ gener Cherlerus Monspehij collectam communicauit, ac cuius hic iconem damus ex sicca paratam. Hæc humi spargit numerosos caliculos palmates, subrubentes, crebrè geniculatos, subinde in ramos diuisos: quorum acti-

culos folia verticillatim coronant, Alsinecomino-
ris, per extremum rotunda, glabra, incana, bina & etiam quaterna, huiusmodi quàm præcedentis, fo-

Paronychia, Alsine-
folia incana.

liolis membranis lucentib. subiectis: flosculi albi copiosissimi, extremis caulium, ramulorumque acervatum congesti hærent, pusilli: radix simplex, brevis.

Anguill. epist. 22. vocat Gramè secundum Plinij, & Paronychiam, ei affligens folia Peppo paulò latiora, flores umbellæ modo, coloris albi, & radices capillares. Qui Paronychiam alterâ (sic appel-

Gramen 1.
Plin & Pa-
ronychia
anguil.

lat in post. comm. lat. & ital.) legitimâ Dioscoridis Paronychiam faciunt, eorum sententiam nec probare, nec improbare voluit Matthioli.

Maximè incana Anthyllidis Alsine-foliz Narbonensium Lobelij in Icon. Plant. p. 463. pictura, quæ Matthioli figura satis similis, placet. Caspar. Bauhinus in phyt. dicitur Anthyllis 3. siue maritima Alsine-folia. An Dalechampsio Loti pratensis genus?

Monspelij, quâ itur in Aigremont, prope siluam inueni florentem Septembri & April mensibus, Maio verò Cherlerus. Supra petras prouenire, & copiosam esse in horto Patamno testatur Anguillara.

Locus & Tempus.

TRIFOLIUM PARVVM QVODDAM,
siue Lotus pratensis purpureus Dalecham-
pij, serè Paronychia altera
Matthioli.

CAP. CI.

Lotus purpurea pratensis radicem gignit gracilem, candicantem, parum capillatam: cauliculus multos, serè pedales, surculosos: folia Loti nunc terna, nunc quaterna, ex qua: stans in ramulorum vertice copiosos, purpureos.

Descriptio
Radix.
Cauliculus
Folia
Flores

In phyt. vocauit C. Bauhinus Trifolium septimum siue pratense minus flosculis purpureis.

In pratis & humidis locis nascitur, ut apud H. Lugdunensem p. 10. descriptionis author Dalechampsius perhibet.

Locus:

Considerent stirpium periti an cum Paronychia 2. Matthioli comparari possit.

ALSINE SERRATO FOLIO GLABRO.

CAP. CII.

Alsine serrato folio, pumila est planta à radice alba, fibrosa, caules aliquot surculos, rubres nonnihil

Descriptio
Folia
Caules
Flores



nonnihil hirsutos, articulatos, ad quorum singula genicula oriuntur folia parua, bina semper aduersa, nervis rubentibus interlecta, longiora quam latiora, serrata ut Chamædryos vulgaris, glabra, brevissimis pediculis appensa: ex alis pediculi semunciales foliolis quatuor glabris circumseptum sustinent *sustinent* ex quatuor

foliolis cæruleis, rariùs albis; infernè continuus, staminula pauca & stylum tenue circumstantibus: floribus decidentibus succedunt loculi bipartiti, in quibus semen rotundum.

Synon.

Trag. tertiam Mortus gallinæ speciem vocat: Dodon. gall. Elatiorem alteram: Lat. in fol. Alsinem spuriam alteram: Fuchf. Alsinem alterum genus & Alsinem mediam: Camerarius hort. Alsinem flore cæruleo, interdum spontè prouenientem lacteo aut dilutè purpurascens flore: Tabern. Lobel. in Ic. Plant. pag. 464. & Hort. Lusit. Alsinem foliis Trillaginis, hünedarm mit Germanderle blettern. C. Bauhinus phyt. Alsinem Chamædryfoliam. H. Lugd. pag. 1239. Alsinem alteram Dodonæi, & pag. 1232. Alsinem mediam siue minorem Dodonæi. *Cur bis Hist.* eandem plantam proponit. An Cæsalp. Antirrhinum?

St. Lugd. *not.*

Locus & Tempus. Passim in hortis florens Martio prouenit, & adhuc Iunio & Iulio & aliquando tota Hieme & Vere.

Eiusdè cum vulgari facultatis esse dixit Fuchf.

ALSINE SERRATO FOLIO HIRSV-
tiori, floribus & loculis cauliculis
adherentibus.

CAP. CIII.

Descriptio



Tom. III.

Radice nititur tenui, fibrosa: caules fert multos dorsales maiores ac minores, rectos, parum ramulos, in principio rubentes, hirsutos: folia longiuscula, minus profundè serrata, nonnihil hirsuta, per longitudinem caulium alternatim crebra foliola Thymi, quæ loculos bipartitos am-

biunt, immediatè hærentes, non ex longis pediculis, ut in Alsinè serrato folio glabro: flores paruos, quadripartitos, purpurascens, striatos, plerumque oculos: sapor plantæ amaricans.

An Tabern. Alsinè foliis Veronicæ, floribus cæruleis, hünedarm mit Ehrenpreiß blettern? Fab. Columnæ Alyssum Dioscoridis appellatur. An C. Bauh. phyt. Alsinè prima?

Obseruavi in Malmünster & S. Hippolito Burgundorum florens Aprilis in agris & circa hortos. Sed & Columna Aprilis mense florere incipere testatur: Maio perfici fructum. In editis locis & Sole illustratis, saxosis, non cultis, parietibusque, Neapoli orti, & etiam vallibus, pratensibusque, sed non ita frequentem.

Ad cruenta & vetera vlcera, & vulnera sananda misce confert. Scabiei & omnibus cutis vitii medetur. Tumores discutit potissimum in cernice: contratussim; & vitia pectoris pulmonisque datur stillatitia aqua potanda: locinoris & lienis obstructions aperit: vterum; renes, & vesicam expurgat. Ad febres, contagiososque morbos, trium drachmarum pulvis epotus cum Theriacæ drachma ex vino commendatur, si statim operatur ut fudeat æger. Dioscoridis Alyssum facie refert; ut & viribus, si modò ut illud rabiem etiam sanaret.

Locus & Tempus

Vires & V. *sus.*

ALSINE OBLONGO FOLIO SERRATO,
flore cæruleo.

CAP. CIII.



Angulosos caules emittit, palmares & lesqui-palmares, hirsutos, satis validos, ramosos: per quos alternatim folia oriuntur, semunciam, aut vnciam longæ, latitudine semunciali, per ambitum serrata, hirsuta, gustu glutinoso: flores parui, cærulei, quibus subiecta folia maiuscula, pilosa: succedunt cap-

Descriptio

sulæ; paruum semen continentes: radix lignosa, alba, multifida.

C. Bauh. phyt. vocat Alsinem 3. siue foliis profundè incisiss.

Florentem vidi prope Monspelium mense Aprilis: Frater Maio & Iunio.

Locus & Tempus

ALSINE FOLIO PROFVNDE SECTO,
flore purpureo siue violaceo.

CAP. CV.

Liquando duarum aut trium vnciarum Aest plantula hæc, rarè palmaris: coliculis

Descriptio

Q. 9 2



supinis ferè & pilosis, in quibus folia opposita in aliquot profundas lacinias celsa, alia integra, potissimum inferiora, pinguicula: ex quorum sinu orti pecioli *stomata* gestant purpureos, qui bifidas post se relinquunt capsellas, alias inter folia sedent flores: Radix parua, fibrata.

Tragus, ni fallor Hensdelkraut inscripsit, Thal. Dactylobotanon appellauit: H. Lugd. p. 1214. Elatinen triphyllon: Lobel. in Ic. Plant. Alinen parua rectam folio Alines: Hort. Lus. Alinen rectam Ruthæ folium huncerranten. C. Bauh. phyt. Alinen 4. siue tri-dactylen caruleam.

Locus & tempus.

Florentem in segetibus inueni mense Martio circa Genenam: in agris versu Chastellaine videtur nonnihil variare, foliis non diuisis, sed ex rotunditate oblongis.

Vires & Vfus.

Vim habere refrigerantem & humidam auctor est Tragus, postèque citra noxam vtrinque corpori aduersus inflammationes usurpari, quemadmodum & Anagallides. Esse autem facultatibus Portulacæ similem.

ALSINES GENVS FUCHSIO, FOLIO Hederacæ hirsuto.

CAP. CVI

Descriptio.



Alsines genus istud radicem habet superius singularem & glabrâ, rubentem, sine vllis adnatis, inferius verò quâ plurimis fibris tenuissimis albicantibus capsellatam, sapore terrestri: ramulos per terram spargit dodrantes & longiores, infirmos, argulosos, lanuginosos, nonnûquâ in alios ramulos subdivisos, nervulo me-

dio separabili factos: in quibus folia alternatim sita semuncialibus pedicellis hirsutulis appensa, prima germinatione rotunda, mox in Hederacæ subij modum angulata, sed crebrius incisa, in tres,

quinque, septemve portiunculas, carnosâ, supernâ parte atrouirentia, infernâ dilutiora, admixta interdum obscurâ purpura, vtrinque hirsuta: ad vniuscuiusque folij exortum pedicellus sulci, aut purpurascens, vnciales ferè, in auerfam partem intorti, sustinent quatuor foliola cordata, glabella, margine lanuginoso, quæ complectuntur *stomata* caruleum quaternâ diuisurâ intectum, infernè continuum, striatum, staminulis binis tantillum caruleis donatum, qui facillimè excidit: succedunt didymæ capsellæ per transversum suturâ commissæ, in quibus semina bina, terna, quaterna, aliquando vnicum, oblonga, gibba foris, intus concava, nauculæ instar, in cuius medio tuberculum prominet, malum cymbulæ emulans.

Flascul

Est Alsines 4. genus Fuchsio. Alsine hederacea Tabern. & Hort. Lusitano. Alsine 7. siue Hederulæ folio, varians foliorum magnitudine & paruitate, flore purpurascens, aut dilutè purpurascens, interdum lacteo Casp. Bauhin. phyt. qui & Centumculum quorundam vocat. Ego colorum varietatem hanc non huic tribuo, sed illi cui folia serrata glabra, id quod fecit Camerarius in Horto (ubi Alinen flore purpurascens, & Alinen tertiam Fuchsii statuit. Sed legendum quartam, vti Fuchs. in Icon.) ex quo hæc varietas desumpta videtur. Lobel. in Adu. Obs. pag. 247. & Icon. Plant. p. 463. Morfus gallinæ folio Hederulæ. Dodon. gall. Elatine: Lat. in fol. Alsine spuria prior, siue Morfus gallinæ. Anguill. epist. 12. Lappago Plinij.

Synon.

Genevæ florentem collegi spontaneam mense Ianuario, Febuario & Martio, ceu & Montebelgardi in Horto meo.

Locus & Tempus.

ANDROSACE MATTHIOLI altera.

CAP. CVII

Non est fabulosa, ut putarunt Aduersarios, cuius radix singularis, tenuis, fibrata, caules emittit septem, plures aut pauciores, viginti interdum, ut ego obseruavi, palmares aut dodrantes, nudos, enodes, teretes, hirsutos, quorum fastigium in sex septemve abijt pediculos vnciales & longiores, umbellam mentientes, ad quorum coitum & exortum radiata foliorum septem corona, oblongorum, pilosorum, paucis subinde crebris incisurum, ceterum singuli pediculi calycem gestant masculinum, in quinque lacinias acutas, foliorum instar habentes, diuisum, quorum vmbilicum, cum globulo flor. obsidet albus pannus, quo marcescente globulus in Pisi molem grandescens semen continet copiosum, triangulum, oblongum, rufum: folia frequentia per terram in orbem sparguntur, vncias duas circiter longa, semunciam lata, hirsuta, Plantaginis instar nervosa, & per ambitum subinde crenata.

Descriptio

Auctoribus Aduers. Lobel. & Penz., itemque compilatori Hist. Lugdun. qui pagina 1361. Androsaces alterum Matthioli [& sic Camerarius in Horto vocat, ac in Historia Matthioli, german. eiusdemque Epitom. optimam & pulchrè plantam experimentem figuram habet] inscribit, non fuisse notam Matthioli Andro-

Lab. & c. palat. H. Lugd. n. r. am.

Andro-

Androsacem alteram (Mans barnsch vocat germ. Taborn.) satis apparet, dum Alines (speciem esse contendunt, cum tamen planta sui generis sit, & ab Alines speciebus longè distincta.

Androsaces alterius Matthiolum duntaxat iconem, & eam quidem non admodum scitè expressam, nullà insuper historià traditè edidisse perhibet Clusius, qui cur Matthiolus ex Syria matutinis eam accersuerit, non videt, quandoquidem Austria in qua vixit, abundè subministrasset, si diligens Austriacarum stirpium scrutator fuisset: etenim copiosè nascitur inter legetes circa Bidentis thermas sæpius memoratas, atque aded locis Viennensi vrbi vicinis. Numlum porò vulgare nomen illius intellexit Clusius.

Locus. & Tempus. Locus dictis floret Aprili, semen verò Maio & Iunio maturat. Basileæ provenit in horto patris fata per Fratrem C. Bathinum: deinde Montbelgardi in horto Ill. E. C. ex semine à Cortuso & fratre misso: semine maturo Augusto perit planta.

ANAGALLIS PHOENICEA ET carulea.

CAP. CVIII.

Descriptio **A**lbam multumque fibrosam radicem habet: ex qua ramali palmares, sæpè lupini, quadrati oriuntur: quibus folia ad nodulos adnascuntur Alines medix, ex aduerso posita, sapore feruido: eundemque ex alis flores, longis, tenuissimis pediculis insidentes, ex quinque foliis radiatis colore phœniceo præditis compositi, apiculis staminum purpureorum luteis: capitulum succedit Alines, semine minuto repletum. Feminam dicunt, huic cætera similem, flore tamen caruleo.

Anagallis phœnicea, mai.

Anagallis
duo genera
Mans. & Plinso.



nam: fructum rotundum.

Sed & Plinius Anagallidis duo genera fecit, matrem flore phœniceo, feminam caruleo, non aliores palmo fructus tenero, foliis pusillis, rotundis, in terra iacentibus.

Tom. III.

Anagallis caruleo, semina.



Porò Herbarius neoteris nota est utraque Anagallis, quam Græcè similiter *anagallida* vocant, germ. Gauchbeyl / Gochbeyl / Zochbeyl / Grundcheyl / & Colmar's traunt; Belg. Guychbeyl / Gall. Mouron. Ital. Anagallida. Hisp. Muruges. Angl. Pimpernell. Hung. Tiltará.

Tam, inquit Lobelius, græcè Hyacinthus dicebatur, unde à colore hyacintheo Anagallis nuncupari potuit. Porò dixit antiquitas Anagallidem, quia superbula floribus venustas eas possunt ornare, colore oculis grato & amico. Plinius tradit Anagallidem quibuldam Corchoron [quæ vox etiam inter supposititias habetur] vocari. An autem accipiendum sit de Corchoro Theophrasti ut videlicet Corchorus sit Anagallis, ambigit Cornarius, cui cōtrariatus Trag.

Malè quidam Anagallidem & Auriculam muris confundunt, naturà diuersas herbas. In horum censu sunt P. de & Mor. cap. 43. & Santes Arduinus de venen. lib. 6. cap. 1. itemque Hier. Brunsch. qui in editione anni 1595. posuit incertam Anagallidis figuram, quam & pro Veronica primò, & post pro Numularia exhibuit.

Auricula
muris
m.

Indoctissime tandem nonnulli, ut Toxites, Euchar. Santes, Hortus cap. 31. & Iac. Manlius, ac etiam officinæ nonnullæ, Anagallidem hūnerbiß / hoc est, Morsum gallinæ, Alsinem, Pauatinam Morgelinam, Hippiam & Centonem quoque vocant. Et hoc in errore Car. Steph. in vineto, versari deprehenditur, cum ait, Anagallidem Græcis dici, sed vulgè Morsum gallinæ: quia eius semen (quod Cortandro simile aut non prius decidat, quàm à gallinis & auribus demorsum sit, & earum rostro concussum.

Indoctè ap-
pellatur
Morsum gal-
linæ.

Car. Steph.
error.

Sed & Dorsthenius se parum peritum Herbariorum ostendit, ut qui & ipse pro Anagallide pingat Alsinem, & cum eius viribus etiam confundat: licet ipsemet hunc errorem sub Auricula muris annotarit.

Dorst. auric.
mur.

Quin & Senensis suo more planè hallucinatos queritarum [queritatur & Hermol. & Ruell. Trag. Fuch. Bruffel. Torn. & Lacuna] qui herbā vocitatā Pauatinam Barbaris Insubribus, Hetruscè verò Centone, Anagallidem tradunt: atqui si sciret utrumque harum Pimpernell plebi pharmacopœorum & muliercularum in Angliā dictari, ne illi multò grauius sibi ferendum putaret. Quasi verò non vulgi sit peruertere nomenclaturas, veteres delere, nouas suo, non nostro [arunt aduersaria] arbitrio, cudere, & commutare: si seipsum intueatur, iamiam & vulgi decipulā captum dicet. Nam Morsum gallinæ, qui est Alsinem, An-

Q9 3

gallidem hanc vulgi more hallucinatus fecit.

Varia le-
plus notan-
tur.

Non minus culpandi sunt ij, qui Anagallidē Cichoream esse dixerunt. Sed & eorū dāatur opinio, qui Anagallidē Matoranā esse statuerūt. Nec defuerunt qui Portulacam siluestrem affirmarēt, non sine hēlitatione. Anagallidem pro Matrisylua interpretans Razes, decipitur. Pandest. Moreti nescio quā datā occasione Anagallidos, semen Myricæ transfulerit. Plurimū etiam ij hallucinantur, qui Moronem vulgō dictū, florem candidum ferentem, huic Anagallidi conubio retulerunt.

Anagall.
phænicea
nomina

Cæterū, Anagallidis phæniceæ, & cæruleæ (quæ neuquam effigie diuerſæ sunt, sed duntaxat colore, atque ut quidem Dioscorides ex aliorum historis infrā recensebit, effectū) plures appellationes annotantur. Quæ phæniceæ est floris, mas habetur, & à Serapione Xantala nuncupatur, ab aliis Aeritis, Ægius ab aliis; ab aliquibus Saurius, quod nomen cum feculitate, quam habet extrahendi spicula, conuenit, ut testatur Marantha. Prophetæ siue Magi Oculi sanguinē vocant, aut Chelidonium; Romani, ut Marcellus Maciam, Thufci Matatipon, Galli Sapanam, Daci Cerceraphron, Corn. seu ut Trag. habet, Cerceraphron. Eadem Phæniceon & Corallion dicitur. Æginetæ, ut opinatur Hadr. Iunius, quodd Corallium flos puniceo, vel purpureo robore mentiatur. Cæterū n Germani Gauchheil Manlein / aut Gauchheyl mit rotten blumen nomināt: Belgæ Guychheyl Rooden: Angli Pimpernell the male. Galli Mon-
ton range.

Altera, cæruleæ floris, fœmina vocatur, & à Serapione Cardabella nuncupatur, & Anagallidis cōmunis nomine spurio dicta reperitur; ab aliis etiam Corchori, Halicacabi, & Zeliauri voce nothā donatur: Prophetis siue Magis Nycterstis dicitur: Ægyptiis Mecii Trago, siue ut vult Corn. Micii: Romanis Aneciaton, siue Meccraton: Aphris Asiritsæ, siue Asiritsi: German. Gauchheyl weiblin & Gauchheil mit blauen blumen: Belgis Blau guychelheyl: Angli Pimpernell the femel.

Mixtum autem, quod Plinius commemorat: fœminam Anagallidem pecora vitare, at si deceptā similitudine (flore enim tantū distat) degustauere, statim eam in remedio querere, quæ Asyla vocatur, à Romanis Fetus oculus.

Locum

Porro, Fuchf. & Lobel. in Obs. p. 247. & Ic. Pl. p. 465. duas habent figuras: verū sufficiebat vna: ponimus tamen & nos duas, quodd iam sculptæ erant, & plures alij, vtramque pinxerint.

Anagallides, autore Plinio, nascuntur in hortis & aquis. In aruis etiam, iuxta semitas, ac vineis non rarō prodeunt: tota Æstate, potissimū tamen Augusto mense, florem faciunt.

Locus

Dioscorides vtramque mitigandi vim habere, inflammationes arcere, adactos corpori aculeos extrahere, & nomas cohibere tradit: succum itē caput gargarisati purgare: naribus infusum dolorem dentium lenire, si in aduersam nares ini-ciatur; argema cum melle [Attico addunt quidam] emendare; retusæ oculorum aciei auxiliari: contra viperarum morsus, iocinoris, ac renum vitia si ex vino bibatur, prodesse: addit dici eam, quæ cæruleum florem profert, prociduam sedem reprimere, quæ verō Phæniceum, impositione [illitu alius] euocare. Plinius ad eadem etiā commendat. Galenus omnia clariū & methodiōs tradit. Anagallis vtræque, inquit, & quæ cæruleum flo-

rem habet, & quæ puniceum, multū ex terforiatū vim habet, insuperque quidd subcalidum, & attractorium, ut etiam spicula infixa attrahat. At succus ipsarū ex naribus purgat caput, ob eandem causam. Et in summa siccantem citra mordacitatem vim habent: vnde etiam vulnera glutinant, & vlcibus putrescentibus opem ferunt.

Anagallis, ut ait Tragus, vino decocta, medetur ictibus serpentum, & viperarum, si bibatur, aut si ex decocto vulnera colluantur & herba imponatur. Propter hanc ipsam causam, aduersus pestem Anagallis vtræque mirificè conducit, ita usurpata, ut posteaquam ex illa mediocrem haustū acceperis, in lectum te componas, probè contentum, & sudes, tum enim omne venenum per sudores expelletur. Quædam mulier Lutetia aqua è phænicea Anagallide distillata multos suffusione laborantes curauit. Potest autem distillari, teste Hollerio, cum melle.

Trag.

ANAGALLIS LUTEA, NUMVLARIAE similis.

C A P. C I X.

Non, ut Numularia, serpit terræ appressa, sed Anagallidis phæniceæ & cæruleæ modo, infirmis tunc etiam ramis, erigitur, per quos folia acutiora quā Numulariæ, Anagallidum iam dictarum bina aduersa; quibus & flos assimilatur, sed colore tinctus luteo.

Descriptio

[Anagallidem] luteam vocat Lobel. in Adv. & Obs. p. 248. ac Ic. Plant. p. 466. itēque Camer. apud Matth. in Hist. germ. & Tabern. qui huius & alteram figuram habet titulo Hirundinariæ siue Numulariæ maioris. H. Lugd. pag. 1237. Anagallidem luteam Lobelij, à qua haud diuersam existimo, Alūnen luteā, quā Hist. p. 1235. antè pinxit. Anagallidē luteo flore Camer. hort. & Clus. in Pannon. p. 491. Idem in Hist. post. Anagall. flauo flore: Schvvenkf. Anagallidem luteam montanam: C. Bauh. Anagall. 3. siue luteo flore nemorensē: Thal. Anagall. luteam foliis Numulariæ: Gesn. de coll. stirp. Numulariæ genus minus acutius, erectum in siluis Idem de hort. Numulariæ speciem altā, siluaticā, aut mare-

Reperi in siluis le Chesnois. vnde habeo à me plantatam in horto E. C. Virentem vidi mense Februario in silua inter Mompelgardum & Dell. Floret Iunio, Iulio, & Augusto.

Locus & Tempus.

NUMMVLARIA SIVE CENTIMORBIA.

C A P. C X.

Longis, sed tenuibus viriculis, angulosis proserpit, quorum geniculis ex breuioribus interuallis, folia bina opposita nascuntur, Anagallidis, rotundiora, & nonnihil crispā, gustu vehementer citra mortum siccante, adstringentēque: ex quorum alis flores plerumque bini, rariū terni, Anagallidis luteæ, eodem quoque colore præditi, sed sapore adstringente, quique foliis constantes, quæ totidem calyculi viridantia folia minora sustinent: capitulum & semen Anagallidis luteæ.

Descriptio

Huic herbæ nomen aliud imponere haud licet.



cuit, quam, quo vulgò hodie à plerisque appellari solet, Nummularia, & Contimorbia, vel Centummorbia. Haud dubiè autem Cétummorbia à Chirurgis qui illà quotidie vuntur, à miracula sua aduersus multos morbos, plurimæque vicera, medendi facultate & efficacia, dicta existimatur. Nummulariam verò



maiusculum, rubrum, Anagallidis phœniceæ similem; floris infimum cingentibus foliolis videntibus acuminatis. Monspelli iuxta montem Calcatris collegit Genes Cherierus.

An Anagallis purpurascens flore Oldi. si?

à foliorum forma, quæ nummi similitudinem refert, nuncupatam credimus: Germani Pfennigkraut dicunt, Belgæ Penningkrûyt. Quia potro serpentes vulnerati, hæc sibi mederi feruntur; Serpentariæ nomen quoque accepit, indeque Germani Egelfraut (Belgæ Egelfruyt) & Flein Slaterkraut vocant. Sic & Ruell. lib. 2. c. 12. Colubrorum herbam vocat. A nonnullis Hirundinaria, quod passim terræ Hirundinis instar affixa sit, dicitur.

Æquiuoca.

Nummularia nomine sequentes, sed malè, donantur plantæ, Gramen Parnassi: Lunaria crassula dicta: Elatine: Helenium Ægyptium. Echios Plinii altera dicitur Gesn. de coll. fl. Anguillaræ verò Erestedandum Theophrasti, quod Gaza Russiam vertit, & quod in Italia sub Dinariz vel Dinerariæ nomine notum ait. Fuchsio Herba agnos necans, l'herbe qui tue les brebis.

Locus & Tempus

Iuxta serotes & fluenta, aliaque rigua loca provenit, subinde & in humidis reperitur siluis. A Maio mense in multam Æstatem floret.

Temper.

Secundè aut tertii ordinis exsiccantium esse herbam sapor eius gustu admodum adstringens ostendit: est verò & simul modicè refrigerans. Ex hinc flores & folia trita & imposita, vulnera & quævis vlcera glutinare valent: eadem cum vino sumpta dysenterias, ventris imbecillitates, fluxusque ac humiditates sanant. Conducunt & ad sanguinis reiectiones, profluvia muliebria, & ad omnia interaneorum vulnera & vlcera, potissimum pulmonis. Vinum in quo herbe folia decocti, vlceribus summè confert, si hoc lauentur & abstergantur. Folia cataplasmatibus ritu illis vlceribus putredinosa iuuat, auctore Leonh. Fuchsio. Sed & faciens quoque foliorum, cum & herba ipsa, illis recentia vulnera glutinat. Præcipuam autem vim eius esse dixit Matthiæus, ad purgandum enterocelam, cum illa; tum in puluerem hausta.

Vires & Vius

NUMMULARIA RUBRA

Descriptio

Longiusculis tenellis ramulis coniugatis ex breuibus intervallis adnascuntur foliola, Chamaelyces folis paria, latiora ferè quàm longiora, mollia, glabra & quorum sinu pediculi prodeunt tenues, longi, singulares, florem gerentes

ELATINE VETERIBVS ET IN GENERE CAP. CXI.

QUæ Græcis ἐλάτιν Latinis Elatine, Arabibus Athin dicitur, describitur à Diosc. folia habere Helxines, at minora [Quibastamè μακρότερον, maiora, pro μακρότερον legat. rotundioraque, & pilosa [vel ut alii, densa:] tenues & dodrantales ramulos, quinis lenitve à radice statim foliolis [vel ut alii; tenues & dodrantales ramulos à radice prodeuntes, foliorum plenos:] gustu acerbis. Nasci in segetibus & cultis. Folia cum polenta imposita, inflammatis, fluxionèque infestatis oculis auxiliari. Coctam verò herbam sorbitionis usu dysenteriam sistere. Eadem Plinius lib. 27. cap. 9. habet. Elatinen modicè tum refrigerate tum adstringere prodidit Galenus 6. simplicium. Quænam verò hodie genuina Elatine sit, inter Herbarios controuersia est.

Quam enim Fuchs. & Matthiæus Vetoniam seminam faciunt, eam Lobelius Elatinen Dioscoridis esse asserit. Ego verò hanc Elatinen maiorem voco, folio subrotundo, flore cucullato.


Quæ Elatine semina, siue cucullata altera, folio anguloso à nobis inscribitur, ea à Castorena fol. an. elatium Græcorum, siue Athin Arabum asseritur.

Elatines nomen quoque obtinere sequentes plantæ: Nummularia. Helxine semine triangulari. Hedera terrestris. Alfine folio Hederulæ. Auricula muris quorundam, &c. Auricularia. Echium scorpioides minus. Cynoglossa minor. Pilosella. Sanguisorba minor. Rapistrum. Elaterium. Vicia. Alfine serrato folio glabro: Alfine serrato folio similis Elatine chamaedryfolia: Alfine oblongo folio serrato, flore caeruleo. Et Alfine folio profunde secto, flore purpureo siue violaceo.

ELATINE DUPLEX, MAS ET FOEMINA flore cucullato.

CAP. CXII.

MAS ex radice parua, alba, lignosa, ætrea. Descriptio
per terram expandit foliolas, vel nihil, vel

Elatine mas, folio subrotundo.*Elatine femina folio anguloso.*

Descrip.

Synon.

nia, minoribus quam iam dicta Elatines, & magis acuminatis: si res confimiles, sed minores.

Elatine prior siue mas folio subrotundo, flore cucullato; dicitur Anguill. epist. 13. itemque Fuchsi, qui sinuatam prout & male ad Veronicam relexit & Maith passim in Diosc. lib. 3. itemque H. & germ. & Epit. Veronica femina: Gesn. hort. Veronica femina Fuchsi.

Sed recentiorum quidam, iidemque periti, & admodum in re botanica exercitati, melius verant ac legatim antiquorum Elatinen viribus & figura contententibus esse credunt. Ex horum numero est, Lob. qui Veronicam feminam Fuchsi & Maitholi, in Obl. pag. 249. & I. Plant. p. 470. Elatines Dioscoridis inscribit, & T. bern. qui Elatinen appellant. Sic etiam in phyt. C. Bauh. Elatinen i. siue folio subrotundo nominat, & Dioscoridis Elatinen quoque constituit.

Male tribus distinctis capitibus H. Lugd. Elatines mas eandem iconem sub diuersis etiam nominibus proposuit. Veronicam enim feminam Maitholi p. 1090. (ubi eam in descriptione

nihil, vel minimum humo se tollepentes, tenues, villosos, & subinde nonnihil rubentes: folia quam Veronicam minus acuta, rotunda serè mollia, lanuginosa, sapore amaritate: ex quorum vniuersi iusque ala pediculis rubescens, villosus, semuncialis & longior, enatus florè sustinet foliolis viridibus hirsutis consitu, Linariae quodammodo similem, calcari, libelloque ex herbido flauescente, superiore aduersa lacinia bifida pulla, sub qua latent apiculi, partim nigri: semen in vasculis rotundum conclusum.

Femina magis sessilis tota, humo non atollitur, viriculas longissimas spargens, filis Helixines C. Campdi faguta mucronis alai for-

cum Veronica femina, vel pratensi, siue Serpilli folia Dodonzi confudit) inscripsit: & p. 1103. (ubi & Heliotropium minus Dodonzi in Epit. sicut) Verbasculum quorundam.

Elatines feminæ, siue cucullatæ alterius, folio anguloso, Matthiolus lib. 4. in post. comm. Lat. & Ital. cum magn. fig. solam imaginem sine descriptione Elatines titulo dedit: In hist. germ. Elatinen veram per Cortulū Paduā missam ait, & ad plantam, delineationem concinnat: In Epit. cum addit. Camerarij, Dioscoridis descriptionem assumpsit. Vides hominem vanā delectari varietate.

Ceterum, Elatine femina, dicitur Cast. Duranti Elatine: Tabern. Elat. secunda: Lob. n. Icon. Plant. p. 470. Elatine altera: Elatine 2. siue folio acuminato C. Bauh. in phyt. Elatine Maitholi folio acuminato Thelio: Camer. hort. Elatine Maitholi longè glabrior in horto & laudis vires (pontaneā auer. si: Horto Lut. Elatine Dioscoridis altera Tabern. montani.

Marem primò inter Stutgardiam & Tubingam in agro quodam obseruauit: Monspelij dein frequenter: Basileæ etiam abundantem in segetibus circa Leirach: item in agris circa Gonteldingen, florere tem mense Augusto, ibidemq; Octobri. Montbelgardi in planitie, quæ est inter Arbonant & Audincourt ac Vites crescere incipiebat Iulij principio, florere Augusto. Plurimè autè in segetibus Narbonæ Gallo-prouincæ, Delphinatus, Germaniæ & Italiæ quibusdam locis, rariùs in Belgio, & Angliæ comparere, testatur Lobel. Feminam vidi mense Octobri in agris cum præcedenti Montbelgardi spontè proueniensem & Iulio florere incipientem.

Maith. haud considerans suam Veronicam feminam non diuersam genere à sua Elatine, scribit illam virib. & facultate à Veronica mare minimè differre, sed ad omnia imbecilliorē esse. Veronicam autem mare, à qua femina hæc plurimū formā discrepat, ait calidam & siccam, gustu adstringentem & amaram, &c. Elatine verò (femina sc.) Dioscoridis vires adscribit.

Vires & Vir.

ANAGALLIS SERPILLIFOLIA aquaica.

CAP. CXIII.



Herbula facie Glauca exigua Lobelij, sed longè diuersa, quæ pro natalib. habet vuidum & paludosum solū. fibris radica-tur numerosis gracilibus, quas & ex coliculis geniculis subinde consuevit demittere longiusculas, sed fili inftar tenues & capillares: coliculi lupini per terram repunt palmares, aut

Descriptio

tes, aut etiam dodrantes, interdum paullo longiores, striati, crebris geniculis intercepti, quorum singulis bina ex aduerso posita adnascuntur folia, Serpylli similia foliis, magnitudine quoque pari, nonnunquam tamen maiora, acutiora, & penè vncialia, pediculo sublongo ex angusta ceruice sensim dilatata, perque extremum rotunda, glabra, viridia, nonnunquam rubentia, nervo secundum longitudinem unico donata: ex quorum alis cauli adnascuntur proximè totidem *flosculi*, cærulei, sublongi, in medio apices quaternos, flori penè concolores, continentes, singulique vasculum seminis Milii magnitudine relinquentes, in quo copiosum minutum rufi coloris, *semen*: sapor in hac planta nullus manifestus, nisi herbaceus, cum leui acrimonia.

Trago est Sit odorati genus: An Tabetz-montano, Alfine fluvialis foliis Serpylli, repens supra terram, flusvogelfraut? An Alfine aquatica altera C. Bauhino?

Locus & Tempus

Florentem mensis Augusti principio observauimus anno 1584. in paludosis prope Lutram urbem Principis Maurbacensis. Eadem mihi inuenta sub finem Augusti prope stagnum post Raupen versus Rotenbourg siue Rougemont inter Malmunster & Bessort.

GLAUX EXIGUA MARITIMA.

CAP. CXIV.

Descriptio

PUillis & gracilibus est *coliculis*, subinde repantibus, & sili inftar tenuium fibrarum, & geniculis propagatione radicatis: *folia* per articulos, Herniariz, bina contrario situ, ex quorum vniuscuiusque sinu *semen* perpusillum, nudum, fuscum.

Synonyma.

In Adv. vocatur Glauz exigua Dod. effig. 38. in Obs. pag. 217. Glauz exigua marina: & sic & in Ic. Plant. pag. 414. ubi quæritur an sit Glauz Dioscoridis. Camer. hort. Glauz, parvula herbula, ex falso lacu prope Isebiu: Doldio epist. ad me exarata, Glauz, parvula herbula, subfalsa, foliis vtrinque Alfine, flore luteo: C. Bauhinus phyt. Glauz maritima, Hamburgo missa, ibidemque proueniens: Dod. gall. γλαυξ ἡ γλαυξ ἡ γλαυξ: Latine Glauz & Gl-x: Gill. Herbe au lait: Germ. Melchfraut: Belg. Melchfruyt.

Locus & Tempus.

Zelandia & Angliæ plerisque mari conterminis salis lacustribus conuallibus reperitur, Lobelio: Sic & Dodonæus locis nasci maritimis & depressis, aquaticisque ad mare dixit, prope toto litore Zelandico: florere Iunio & Iulio. Nobis siccam communicauit Frater C. Bauhinus.

Vires & V. sui.

Vsurpata in cibis, & iusculis lactis copiam auget: quare nutritibus lactis penuriâ laborantibus vtilissimam esse Dodonæus perhibuit.

ANTHYLLIS DVPLEX VETERIBVS, & in genere.

CAP. CXV.

Anthyllis duplex Dioscor.

ANthyllidem duam esse generum author est Dioscorides: ait enim quandam foliis esse mollibus, alioqui Lenticulæ (φακὸς) simillimis, & ramulis palmi altitudine, rectis: radice tenui & parua. Nasci in sabulosis [saluginosis legit Corn. & mox patebit.] apricis, subfalsam gustanti. Al-Tom. III.

teram esse foliis ramusculisque Chamaepithyi similem, hirsutior tamen, breuiorem & asperior: flore purpureo, & odoris admodum grauis, radice Cichorii. Hanc drachmis quatuor bibitam, vrina difficultate laborantibus & nephriticis plurimum prodesse. Tritas verò [ambarum radices] veteri inflammationes emollire, cum rosaceo & lacte subditas, ac vulneribus quæque mederi. Quæ autem Chamaepityos similitudinem refert, præter alia etiam comitiales sanat cum aceto mulso pota.

Appellatio: meo nomen.

Inter nothas Dioscoridis appellationes, sunt qui Anthyllon, qui Anthemida, qui Eranthemō, qui Leucanthemon, qui Soranthes, qui campestrum Florem vocent: Romani quoque, vt legitur apud nonnullos Salastrium vocant. Sed & Galenq Anthyllis duplex est. Ambæ, inquit, moderatè siccant, vt etiam vlcera glutinent. Verùm altera quæ Chamaepityi similis est, magis tenuium partium est, quàm altera, vt etiam comitialibus conueniat. Maiorem quoque extergendi vim habet quàm altera.

Quænam hodie sint Anthyllides inter autōres non conuenit. Ryfius in Diosc. Anthyllidis primum genus incognitum ait. Ruellius hoc posleritatem Salsolam vocare credidit, itemque Bacchanellus. Sallaginem vulgò appellari scripsit Harchius. Alterum genus, Antonius Musa Cali potius suspicatur: sed Anthyllidem aliorum nō Kali, nec eius speciem aliquam esse author est Dodonæus: Ryfius contra Iuam moschatam constituit. Ruellius Salsolæ nomine appellandam censuit. Qui porro Kali speciem faciunt, rugosus vel ad Kali maius, vel ad Kali minus, vel tandem ad Kali Arabum, de quibus lib. 30. dicendū, referre coguntur.

Æquiuocū.

Anthyllidis autem nomine sequentes donantur plantæ. Vermicularis marina arborescens: Cnethum marinum. Chamaepitys. Camphorata. Linaris. Vulneraria. Lotus siliquosa. Trifolium candidum. Medica marina. Paronychia. Tripolium. Aster atticus. Tanacerum. Matricaria. Chamamelum. Auricula muris. Alfine. Plures Anthyllides lectores reperient apud Apollinem Rad. quas ipsimet ad sua capita reducent si poterunt.

Castor Durantes duas Anthyllides describit, & vnā pingit, quam autem intelligas, aliis discernendum relinquimus.

Anthyllis constans primum veluti Tritici graminis, cacumine sibi insertis, salis locis, non procul à lacu saliscululo Statfuti nascens Cordi in Obs. siliu quid? Quid & altera eiusdem ibidem Anthyllis humi sparsa, minori Aizoo similis, falsa? Quid & Anthyllis latiusculis oblongisque foliis, falso gustu [quod Cordus Telephium falsum opinatur] ibidem? Quid tandem Anthyllis altera. Cordi in Diosc. lib. 3. cap. 15. Germ. Salzfrucht/ à manifesto sapore, dicta? Notat Cordus Aristotelem atque Plinium, atque eos minis rectè sensisse, quod scribant omnes sapores plantis inesse, præter salum. Securidaca quædam gracili solo nascens Cæsalpini lib. 6. cap. 33. quam quidam Anthyllidem primam putarunt, quid? Anthyllis lentifolia, Peplios effigie maritima Lobelii quid?

ANTHYLLIDIS SPECIES QVIBVS DAM

CAP. CXVI.

Dodrantes aut altior est planta, propaginibus frequentibus brachiata, ad ramorum

Descriptio

Rr



*Anthyllis
Valentia
Clusii.*

Synon.

Peplum.

Locus &
Tempus.

Descrip.

atque prop-
ginum exortu
nodos, foliis
minimis acer-
uatione conge-
stis circa no-
dos vestita,
multo Serpylli
foliis minorib.
per extremum
lationibus &
subrotundis:
sarcuti lignosi
sunt, firmi, te-
retes, repandi,
humique spen-
si, variéque
quaquaersu
brachiatæ: radix
singularis.

Anthyllidē
hanc Valenti-

nam Clusij Placā *dyodonis* vocabat, eamq; ad pri-
mum genus Dioscoridi descriptum referebat. Et
si autem inter Anthyllides procul dubio recen-
sendam admiserit etiam Clusius, primam tamen
esse negavit, utpote quæ rectis ramulis assurgat,
hæc autem repentes habeat, totaque facie Cha-
mælicen propemodum referat.

Lobel. in Icon. Plant. huius plantæ duas ima-
gines dedit, quarum melior ex Clusio (qualem &
nos habemus) mutuata extat p. 422. Anthyllidis
Valentia Clusij & Placæ titulo. Peiorem dedit
p. 768. pro Anthyllide marina Narbonensium al-
tera solummodo folio-acida, interponitur in Ad-
uers. Chamælicæ loc.

Dodon. de pingu. & in sel. lat. pro Peplio siue
Peplide, cuius descriptione non proponit, Anthyl-
lidem hanc pingit. Sic Tabernamontanus pro
Chamælyce quam in Hist. describit, Anthyllidem
hanc p. 422. demonstrat. Casp. Bauh. in phyt. Anthyl-
lidem i. siue maritimam, Chamælyce similē
vocat. Is apud Matthiæol. pro Chamælyce figura,
quam a Matthiæolo omisit, & à se appositam ef-
se ait, Anthyllidem Valentiam ex Tabern. pro-
ponit, quæ in re aperte hallucinari deprehenditur.

Gener. Cherlerus observavit in montis Ceti
Ritoralibus, eique confinis arenosis: Clusius
nusquam alibi contexit, quàm ad fossas vrbis
Valentia in Hispaniis. Florebat Aprilis mensis
initio.

PARONYCHIA HISPANICA CLUSII, siue Anthyllis nivea. CAP. CXVII.

A Spectu pulcherrima est planta, sparsis per
terram dodrantalibus, aut vix palmarib. in
adolescens herba caulibus iunctis, e quorum
nodis alternatim prodeunt propagines vnciales,
glomeratis squamulis argenteis confertissimis
odustæ, præque glomerulorum densitate vix con-
spiciunt, emicantibus ex scandularum commissura
hinc inde raris foliis viridantibus, Herniariz pa-
ribus: radix subest lignosa, alba, crassiuscula, lon-
ga, multifida.

Clusio nihil aliud est quàm Polygoni maris
genus peculiare: Lobelius verò in Adv. vocat
Polygonum montanum minimum, mucum &
seneum.

Polygonum 4. siue minus candicans (inquit C.
Bauh. in Phyt.) est Paronychia Hispanica Clu-
sij, siue Polygonum montanum niveum minimum



Narbonensis oppidum observavit & collegit
Ioh. Hent. Cherlerus Maio. Clusius nusquam
abundantiùs, quàm in collib. petrosis & succis Sal-
mæticæ vicinis, trans flum. e Thormum: item circa
Valentia & Murcia observare meminit, ac etiam
lapidoso illo cap. supra Arelaten, non procul à
Dni Martini diuersorio, quæ Massilia uer est, sed
multo minorem, & vnciam vix excedentem. Flo-
ret Maio & Iunio & semer profert.

ANTHYLLIS LENTIFOLIA PEPLIOS effigie maritima. CAP. CXVIII.



In Angliæ insulis
Australibus, in-
quit. Lob. ea præ-
sertim quæ Port-
landia vocatur,
litore Northma-
niæ obuerso, plu-
rima quam hic,
hic damus, pusilla
prouenit in sabu-
letis & arenosis
vadis depressis, &
apricis: geniculis
& ramulis palmu
trésve vncias lon-
gis, angulosis,
pallentib. & foliis
Lenticulæ, Alie
minorem, vel Pe-
plin referentib. Flo-
sculi simis insunt
ex buceo herba-

cei, dentatim stellati, Sedi minoris. Iunio & Iulio:
semen Tythymali in perexiguis Chamælyce tri-
quetris thecis alit: prolixiore, exili, geniculata ra-
dice, sabulo altè in fossa, Soldanellæ modo: tota sal-
sa, gustanti amarecat & parum quiddam calfa-
cientis indicat.

In Ic. Plant. p. 468. vocatur Anthyllis prior len-
tifolia Peplios effigie. In phyt. c. Bauh. Anthyl-
lis 2. siue marina lentifolia.

DE POLYGONO SIVE CENTINODIA. CAP. CXIX.

Ad multas stirpes, vocabuli vim si spectes, Descriptio
extendi posset Polygoni nomenclatura,
ex fre-

Locus &
tempus.

Locus



ex geniculis solummodò exeunt, Olea foliorum figura, tenera, gustu viscido: *stipuli* secundum caulem ad nodos pusilli, colore ex albo purpurascens: quibus *semina* succedant nigricantia, triquetra, Lappathi similia.

Synon.

L. *on alia.*

lam, qui à copia seminis Polycarpon, qui Carcinethron, qui Teuthaliden, qui Myrtopetalon, h. e. solum myrteum, qui Cnropodion, qui Pedalion, qui Stempchin, qui Munis vnguem, qui Proserpinacem vocent: Magi Heros sanguinem Aegyptii Thephin, Aphri Cuculum dicunt: Graeci quidem à seminis copia, vel, vti dictum, geniculorum, quos habet, frequentia, cognosci eam voluerunt. Vtrumque enim Polygoni vox significare potest. Siquidem genti illi *γόνι*, genituram & semen sonat: *γόνι* verò genū, & diminutivū formā, geniculus est. Et huc pertinet, quæ in notis adiecta illi appellatio Polygonaton fuit, ab eadem geniculorum frequentia, & densitate facta. Nobis tamen, ceu & Marcello, in alteram partem magis inclinatur animus, credimusque à copia seminis quondam sic appellatam fuisse. Plinius, qui lib. 27. cap. 17. Sanguinariam interpretatur, aliquot quoque ex his, quæ inter spurias recensentur Dioscoridis appellationes, numeravit, addens vocari etiam Halmada, ut Marcellus

Tom. III.

ex frequentium geniculorum, aut, ut alii volunt, seminum multitudine deducta: quam in primis tamen meruit passim obitum in vus Polygonum gramen, ex radice dura, lignosa, contra, multis fibris capillata, viticulas suas emittens cubitales, ramolas, teretes, striatas, frequentissimis geniculis interceptas: folia

Dioscoridi lib. 4. *πολύγωνον* dicitur, hoc est, ut Marcell. reddit, Sanguinalis mascula. Sunt qui in notis Dioscoridis, Polygonaton, qui Cynochalen, qui Heraclian, id est, herculeam, qui Asphaltion, i. e. Trifolium bituminosum, qui Chiliophyllon, h. e. Millefolium, qui Clema, hoc est, Viticula-

quidem ex Apuleio Stopinacem, legens Proserpinacem.

Cu doni Tract. 3. cap. 1. Polygonum idem est, quod Virga p. Eidem Tract. 7. Virga pastoris frigida in tercio, sicca & temperata: Ex quibus male fultis, maleque inter se coherentibus, haud absurdè quispiam nostro iudicio collegit, ignorasse Guidonem quid esset tum Polygonum, tum Virga pastoris.

Bru. feli. Tom. 3. p. 18. in Coroll. Corrigiola & Virga pastoris. Vgoni Lingua passerina: Arnoldo de villa houa, Polygonia, Virga pastoris, & Lingua passerina.

Cord. in Dioscor. lib. 4. cap. 4. Polygonum mas, Latine Sanguinalis mascula, & Proserpinaca, pharmacopœis Lingua passerina. Ruell. Polygonon Graecis: Latinis Sanguinaria, herba Sanguinalis & seminalis, quam Aëtius Helibocanon h. e. Solis herbam vocat.

Matth. in Diosc. lib. 4. cap. 4. Polygonum mas Italis vulgò *corregiola* & *centinodia*, Proserpinaca Apuleio: Arab. Basialrahagi: Gallis *corregiole*. Idem in Dioscor. lib. 3. cap. 11. Virgam pastoris Serapioni & Auicennæ dictam, Polygonum esse asseuerat, Matthæumque Syluaticum cum Dipsaco confudisse. Eidem cap. 11. in post. comm. Ital. Virga pastoris est Centinodia vulgaris & Polygonum Dioscor. In Historiæ verò germ. libro 4. cap. 4. maius appellat Polygonum, Boemiceque *trasfawec*.

Monachi id M. l. Dist. 8. cent. 257. Pandecta. rium erroris merito insimulant, quod Dipsacum & 351. cū Virga pastoris seu Polygoni confuderit.

Polygonum etiam statuunt & Polygonum mas & Polygonum maius. Apollo, Cæsalpinus, Pachius, Car. Stephanus, & Tabernamontanus. Camer. [quo nulus pulchriorem dedit figuram in Hist. germ. Matth. & Epist.] in horto vulgare Polygonum appellat. Anguillaræ epist. 17. dicitur Polygonum mas, Centinodia, Lingua passerina, & Carzola. Dod. gall. figuram dat, additis nominib. Polygoni & Polycarpi. Gall. *Renouée* & *corrigiole*: Belg. *weg gras werkeus gras* & *duysent fnoop mannefen* [Quibus addit in sol. Lat. ubi Polygoni maius nomine pingit] *fruepel gras*: It. *P. lino*: Angl. *fnorgrasse*. Lob. & Penz Adu. p. 179. Polygonum mas. Nec non Obs. pag. 229. quo loco figura est exhibitæ, quæ in Ic. Plant. p. 419. sub Polygoni maius vulgaris, Sanguinariæ, Centinodia titulo habetur. Gerard. Polygonum mas vulgare. Thalin Harc. Turner. & H. Lugd. p. 113. Polygonum mas: C Bauh. phyt. Polyg. siue latifolium, mas Diosc. & Plinii. Fernelius m. m. l. 6. c. 1. & c. 12. receptum Polygoni nomen retinuit, ut & Fab. Columna p. 30. Bauder. l. 1. sect. 2. Cast. Dur. pag. 368. [qui tamen & Polygonum maius vocat] Geln. de coll. stirp. cui de Hort. & in cat. pl. Polygonum mas herba quoque dicitur. Hort. Lus. Polygonum alterum vulgariū, *gemein wegdritt* / *denn gras*.

Sed alias præter Polygonum mas, siue Centinodiam, habemus stirpes, quibus ob nonnullam convenientiam Polygoni nomen imposuimus, ut, Polygonum angustifolium duplex: Polygonum maritimum: Polygonum tertium Dodonæi, siue tenuifolium: Polygonum masculum fruticosum: Polygonum pusillo vermiculato Serpilli folio: Polygonum Polonicum cocciferum: Polygonum paruum flore albo verticillato, & Polygonum Hernariæ foliis & facie, peramplā radice.

Rr 2

Locus &
Tempus

Centinodiz autem natales quod attinet, ubique locorum nobis obseruata Basileæ, Monspelij & Lugduni. Octobri in Muteto monte florens. Dodonæo prouenit locis incultis, vias ac semitas latè subindè occupat; non rarè & iuxta riuulos serpit: omni ferè anni tempore virescit, Hieme excepta, ac semina facit.

Vires &
usus.

Quibuscunque porrò ab auctoribus insigniatur nominibus Polygonum, haud tamen vulgaribus ab iisdem virium encomiis celebratū innotuit; ut cuius succus epotus Dioscoridi spissat ac refrigerat: prodest cruentæ excretioni, cholerae, alui fluxionibus, & vrinae stillicidio: nam vrinam apertè ciet. Cum vino potum, contra serpentium morsus auxiliatur: datur in febribus per horam ante significationes: sceminarum profluvia impositu sistit. Idem succus aurium doloribus, iisdemque purulentis instillatur: facit eximie ad genitalium vlcerum cum vino adiecto melle decoctus: stomachi feruori, sanguinis reiectionibus, vlceribus quæ serpunt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, & recentibus vulneribus folia illinuntur. Polygonum, auctore Galeno de simpl. lib. 8. vti adstrictionem quandam obtinet, ita sanè vincit in eo aquæ frigidum, ut videlicet secundi sit ordinis medicaminum refrigerantium, aut etiam quodammodò in initio tertij. Proinde sanè quibus stomachus feruet æstu, foris frigidum illitum prodest: velut etiam erysipelata, & calidas phlegmonas inuat. Porro tale cum sit, & fluxiones repercutit, & hac ratione videtur esse excitatorium. Quare cum herpetum, tum vlcerum, aliorumque bonum est remedium: efficacissimum autem inflammatione & fluxione laborantium partium. Est & ciuentorum vulnerum gluinatorium. Sed & aurium vlceribus prodest.

Plin diluci-
datur.

Succus Polygoni (inquit Plin.) infusus naribus supprimit sanguinem, & potus cum vino, cuiuslibet partis profluvium excretionisque cruentas inhibet. Quocunque hæc (Polygoni genera) modo se habeant, vis earum est spissare ac refrigerare. Semina alium solvunt, largius sumpta vrinam ciet, rheumatismos cohibent [succus alium sistit largius sumptus, vrinam ciet, rheumatismos cohibet, &c. non prodest, Diose.] qui si non fuerint, non profunt. Stomachi feruori folia imponuntur, vesicæ dolori illinuntur, & ignib. sacris. Succus & auribus purulentis instillatur, & oculorum dolori per se. Dabatur & in febribus ante accessiones duobus cyathis in tertianis, quartanisve præcipuè: item cholericis, dysentericis, & in solutione stomachi.

Scribit Tragus calculos renum potenter pellere [frangere ut & Herniarum, H. Lugd.] Aquam distillatam seu succum herbæ auribus purulentis instillari, putrescentibus & gangranosis gingivis prodesse. Sed quandoquidem Galenus dubitat an vrinam moueat, maior inde exsurgit occasio dubitandi, an calculos frangat & pellat. Polygonum vulgare in fluxu sanguinis, ut Brassicula quoque annotauit propria experientia, efficacissimum Camerarius quoque expertus in Nobilissimo quodam viro, alijs remedijs frustra adhibitis contra vomitum sanguineum cum pauco vino styptico hunc succum maximè profecisse. Illud scire gauderem quâ facultate Polygonum lumbricos interimere queat, id quod Matthiolus, scriptis prodidit. Aqua (inquit) vtilis est aduersus lumbricos tam iuuenum, quam senum. Certum idem iactat experimentum, aduersus vomitum, profluvium alui & dysenteriam, quod multis pro-


fuisse affirmat. Accipit duos manipulos Polygoni, coquit in libra vna & semis aceti, linteum duplicatum madefacit in decocto, imponit supra ventriculi regionem, & vmbilicum, ac supra posteriorem partem. Polygonum ab effectibus præstantia Sanguinarum nomen obtinuisse perhibet Fernelius, quod eo siue integro, siue cuncto stillanti parti inducto, sanguis coeat, & in grumos concreseat, ut non amplius effluat. De Polygono eiusque aqua plura si voles, Tabernamontanum leges.

Dioscoridem contra Galenum defendit Marantha, in eo quod Polygonum vrinae stillicidio prodesse is affirmat, quod vrinam apertè ciet: concludens tandem à quibusdā, cum Galeno, Dioscoridem non rectè in crimen vocari, quod præ se nimis, angustæque, & nullâ adhibita distinctione simplicium facultates docuerit. Sed ad Polygoni historiam reuertamur. Cat. Stephanus valde nocuam herbam omnibus, si ea vescantur, allegit. Ait enim totum earum ventrem inflari, eaque humorem subilem & valde foetidum excre-

Ombus no-
cua.POLYGONVM ANGVSTIFOLIVM
duplex.

CAP. CXX.

Descrip.



Polygonum vulgari per quâ simile duplex hoc Polygonum radice habet teneram albam, ramulos admodum multos longè latè que supra terrâ reptantes fundentem, folia quoque Centinodiz similia, sed minora, acutioraque, eademque nunc breuiora & latiora, nunc longiora & angustiora.

Polygoni angustifolij duplicem varietatem Tabernamontani vna tabella expressimus, alterius ramulum duntaxat separatim pingentes.

Tabern. Polygonum 2. & 3. inscripsit: Caspar. Bauhinus phyt. Polygonum 2. siue oblongo angusto folio, Item Polygonum 3. siue breui angustoque folio. Gerard. Polygonum minus mae, Small common knot grass.

Icon

POLYGONVM MARINVM.

CAP. CXXI.

Polygonum marinum prolixas habet radices, lignosas, crassiusculas, contortas, nigras viscosasque, crassiores quàm Polygoni vulgari-
tis, fre-

Descriptio



ris, frequentioribus, brevioribusque internodiis interceptis, non tantum foliis veltut maioribus candidioribus, verum etiam squamis tenuibus pellucidis albicantibus: flores pulchri, numero & magnitudine vulgaris flor. vincunt: semen nigrum, triquetrum, Oxalidis semini simile.

Synonyma

Lobel. in Adu. dicitur Polygonum marinum maximum itemque in Icon. Plant. p. 419. Camer. in Epit. & Hist. germ. Math. Polygonum marinum H. Lugd. pag. 1386. Polygonum marinum prius Dalechampii, gustu in maritimis salso, aliquo adstringente: Herbariorum quorundam Polygonum quartum. Et Aizoon marinum nonnullorum. Dod. lat. in fol. Polygonum propellitorum marina, veluti Adriatici maris, speciosius & amplioribus foliis. C. Bauh. phyt. Polygonum 5. siue maritimum latifolium. Maranthæ Polygonus marina.

Locus & tempus

Florens apud mare vidi mense Septembri: Frater Iunio in litore maris ad montem Ceti. Abundare dixit Camerarius iuxta Adriaticum mare, ac etiam circa Narbonam.

POLYGONVM TERTIVM DODONÆI
siue tenuifolium.

CAP. CXXII.

Descriptio

Tota planta cineraceo colore prædita, ex radice lignosa, fractuque contumaci, albicante, cauliculis complures emittens, partim supinos, partim erectos, palmates, sili instar tenues, hirsutos, propter terram aliquando paulum rubentes, crebris nodis geniculatos: ad quorum singulos folia plura apposita tenuissima, quorum longissimum vnicui non æquat, strobili numerosissimi, tum ex foliorum alis, tum in extremis coliculis, stellati, muscoli, quibus semina pusilla succedunt, dura, umbilicata, striata, medullam albam continentia: sapor plantæ est subamarus, & nonnihil tandem acris.

Io. Mothardo insigni Medico Hallensi in Indice plurimarum suarum plantarum dicitur Canaria seu Polygonum Tragi. Dod. gall. Polygonum tertium species, Polygonum 3. à Plinio descriptum. Et sortè. Lat. in fol. Polygonum quoddam montanum minimum, sine icon. Tabern. Ic. & Hist. Polygonum minus Polycarpum, sicut fructus megritæ Polygonum 3. flore albo: Item, Polygonum minus alterum, Klein megritæ. Sed cur Tabern. vel eius conpilator Polygonum minus alterum separam à Polyg. minore Polycarpo, cuius videtur tantum varietas.

Gerardus appellat Polygonum polycarpum Tom. III.

Tabernamontani, Polygonum 3. selinoides, ac ineptè pro Anthyllide Valentina Clusii pingit Gerard. nr.

C. Bauh. phyt. Polygonum minus siue gramineo folio repens, Anglica laxifraga Aduers. Item Polygonum 2. siue gramineo folio maius erectum.

Passim in segetibus, Genue, Lugduni, & Mōt-Loeus Belg. occurrit: item Basileæ in agris, quæitur Bin- tempus. ze florens Iulio & adhuc Octobri. In hort. Ill. etc. usque aded vnicui plantæ se propagavit, ut vix extirpari potuerit, Hiemem etiam ferens.

Eadem vires & usus, intus & extra usurpata possidet, quas Polygonum vulgare. Quoslibet ardores extinguit, fluxus ventris sistit, dysenterias & vteri profluvia, ac etiam hæmorrhagiam narium. Lapides pellit, calculum & urinam citat, Tabern.

POLYGONVM MASCVLVM
fruticosum.

CAP. CXXIII.

Radix tenui, multifida, lignosa, fibrolaque, lupetvacanea: cauliculis tenuibus, brachiatis, lignosis: foliis multis, Hyperici minoris, sed multo tenerioribus, aut Serpilli tenuifolii. Flores eius non obseruavit author Thalius. Reperit aliquando non longè à Stolberga secus vias. Non est autem Polygonum alterum serpillifolium Anglorum. C. Bauh. phyt. vocat Polygonum 4. siue fruticans angustifolium.


Descriptio

POLYGONVM PVSILLO VERMICVLATO
Serpilli foliolo.

CAP. CXXIV.

Rara & in- dicta hæc- nus planta nobis industria Iacobi Reinaudeti Massiliensis pharmacopœi primum innotuit, inquit Lobelius: Ramulis & cauliculis surculosis, prolixis, gracilibus, Serpilli, humi spatis luxurians, & geniculis folia pusilla, teretia, succulenta, Aizoi, vel Illecebræ, Thymo paruo nostrati æqualia & similia.

Descriptio



Radix prælonga, lignosa, sapore amaricante, caudiculo.


Lobel. in Aduers. ac etiam Ic. Plant. pag. 422. inscribit Polygonum alterum pusillo vermiculato Serpilli folio. Hist. Lugd. pag. 1124. Polygonum alterum Serpilli folio Penz. Casp. Bauh. phyt. Polyg 5. siue minus foliolis Serpilli. Similem se accepisse ait, Herniarix ex Candia nominæ, à Laurentio Rosenau industrio pharmaco-

Synonyma

pro, radice tamen non lignosâ, sed tenui, inu-
tili, foliis non teretibus, sed Serpilli minori-
bus.

Locus

In collibus maritimis Gallo-prouinciæ, non se-
cus ac Herniaria multa luxuriat.




POLYGONVM POLONICVM

cocciferum.

CAP. CXXV.

Descriptio



Tenuissimis
prodit fa-
lis & mucro-
natis, cauliculis
nodosis exalbi-
dis, & flosculis in
summitate can-
didis inter squa-
mas virecentes:
ad radices ipsi
coccu adnasci-
tur, elegantissi-
mo rubore ad
Chermesina
tingenda com-
mendatum, in-
quit Camer. in
Epitome Mat-
thioli, qui stirpē
hāc in eiusdem
Hist. germanica
Polygono Tra-

go fnael dicto [Polygono tertio Dodonæi, siue
tenuifolio] valde similem ait, & à Polonis, apud
quos in arenosis locis reperitur, Kolmaczek vo-
cari scribit. Hæc C. Bauh. phyt. Polygonum 7. si-
ue Polonicum cocciferum nominauit.

POLYGONVM PARVVM FLORE
albo verticillato.

CAP. CXXVI.


Descriptio



Palmaribus
aut sesqui-
palmarib. con-
stat *serpens*,
gracilib. rigi-
dulis, genicu-
latis, & in alios
minores diui-
sis. Ex quorum
geniculis vn-
ciam serè à se
inuicem distā-
tibus bina e-
mergunt folio-
la, Herniariz
serè, sed Cha-
melyces instar
rotunda, mi-
nora. Inter
quæ flosculi e-
xigui, cādicā-
tes, verticilla-

tim in tenuissimas apiculas fastigiatur: radícula exi-
gua fibrata. Sicæ sapor nullus manifestus, nec
eius vilus in medicina, quod letum, vtilis.

In scrobibus, fossis, & agrorum marginibus
luxuriat: vidi autem Bizantijs.



POLYGONVM HERNIARIÆ FOLIIS

& facie, peramplâ radice.


CAP. CXXVII.

Descriptio

Nec hæc despectui futura erit discendi cupi-
dis: Est enim perquam parū nota, perpul-
la quidem herbula & humi accumbens, cespiti se-
mimera, ramulis creberrimè geniculatis: foliis
& seminulis albidis, prorsum Herniariz: tota
incana quàm exiguo, muscolo flore. Radice am-
pliore quàm pro plantæ modo, durâ, surcu-
losâ, implexâ, & in se reticulatim convolu-
ta, auulsi difficilis, gustu præficcus, calidius-
cula.

Lob. in Adn. & Icon. Plant. Tom. 2. p. 85. voca-
uit Polygonum Herniariz foliis & facie, peram-
pla radice Astragaliti. H. Lugd. p. 1124. iurgit &
idem facit Polygonum hoc Herniariz foliis cum
Paronychia Hispanica Clusij, an bene, conside-
randum.

In fulissima Cretæ Salonenfis Galloprovinciæ
planitie, media via inter Arelaten & Solonam
ad diuertorium D. Martini à Lobelio reper-
tum.



HERNIARIA.

Synon:

CAP. CXXVIII.

Herniaria glabra.



Latè subie-
ctum solū
opacat, luxurie
lata complu-
rium ramulorū,
quos ex pusilla
radicula fun-
dit, hinc inde
sparsos, tere-
tes, creberr-
mis geniculis
interceptos:
ad quorū sin-
gula, aduersa
foliola serpilli,
minora, ex vi-
ridi lutea, gu-
stu ac theodæq;
locis erumpūt
mirum in mo-
dum numerosi
flosculi, ex api-
culis luteolis

Locus:

Descriptio

compositi.

Camerarius hort. prior dicitur Herniaria:
H. Lugd. pag. 1126. Herniaria siue Herba Turca,
quibusdam Luthentribon ab effectu, vi & Her-
niosa vocata: Herniaria Gallorum Gesnero
hort. & apud Cordum in Histor. ubi figuram ad-
didit, & Herba capen nomen. Idem in ep. ad lo.
Carun. Britannum Med. Veterum Elleboren-
esse indicat, ac Theophrastum melius herbulam,
quàm Dioscondem *βερνιάρια* paruum appellasse
concludit.

Lobel.

Herniaria biflora.*Taberna-
sacra.*

Lobel. in Adv. & Obs. pag. 230. ac Ic. Plant. pag. 421. Herba Turca siue Herniaria. Anguill. ep. 14. Epipactis, Turcarum Herba viperarum, dale viper. & Asphela Gracorum. Mitor quid Tabernaculum, vel eius succenturiatum mouerit, vt Herniariam gallico idiomate Boutonnet, quod non herbam, sed herbæ locum denotat,

cognominari.

*Empetron
Trago
Lonic.*

Tragus, qui, si non fallor, Herniariam glabram pingit, Empetron inscribit, quod ~~quædam~~ quosdam, & Galenum Prasoides appellare contendit. Sed & Lonic. græcè Empetron, Latine verò Calcisfragam, gallicè Persopetram Rumpipetram, & quibusdam Cristam marinam vocati ait. Ast turpiter duas plantas confundit. Quis obsecro Herniariam, cuius picturam dedit, Cristam marinam vocauit: conuenit hoc vocabulum Fœniculo marino, quod vulgò Crithmum dicitur.

*Millegrana
Cordo Po-
lygonum
minus*

Cordus in Hist. Millegranæ vocabulo describit: Matth. hist. germ. polygoni minoris.

Est Polygoni genus dicta herniaria vulgò herbiorum Clusio: polygonum minus Matthioli ponæ in Baldo: Cal. Bauhin. phyt. polygonum 5. siue minus, & Millegrana maior.

Holerius lib. 1. de morb. intern. cap. 59. ad herniam hanc herbam commendat, sine nomine tamen proprio describit, appellans tantum Herbulam in sabulis nascentem. Et hinc ab aliis Herba Holeri, *Holeriana*, *Fallopia*, & *heriola* dicta quæque est. Germani vocant *harnfraut* / *Sternfraut*, *Flain wegritt*, & *raüfensföner*: Galli *l'herbe au Turc*. Itali *centograna* & *Millegrana*.

*Locus &
Tempus*

Est mihi Montbelgardi in horto Ill. z. c. non longè à Bessfordia prope pagum Danieutin circa solo arenoso collecta Herniaria: item prope pagum S. Susannæ di. & uni Montbelgardi. Obseruati præterea Tiguri in Gesneri, Basileæ in Plateari, & Patau in Cortuli horto, semine turgentem mense Nouembri: Geneuz, Lugduni & Mospelii copiosè locis siccis mense Aprili, Maio, Augusto & Septembri: C. Bauh. Basileæ inter segetes vidit: Camer. circa Norimbergam frequentè Augusto in locis sabulosis: In aruis, oliuetisque Narbonensibus ad rus Boutonet altero à Mospelio lapide Lobelius. Semel in hortis facta quotannis periens restibili semper fecunditate reddit, authore Gesnero.

*Vires &
Vius*

Epipacti siue Millegranæ insignes tribuit facultates tres Anguillara. Succus, ait, potus, aut herba esitata, vel etiam emplastri modo plagæ imposita, morsus à vipera auxiliatur. Secundò emplastrum ex ea herniam mirè restituit. Postremò iecori prodest & ietero: aqua enim distillata

ac pota curat intra octo dies. Camerarius aquam distillatam optimam prædicat in calculo. Polygoni Herniariæ appellati decoctum feliciter calculosis propinari refertur apud Clusium. Ipsum verò exsiccatum & in puluerem tritū, boum, & equorum vulneribus atque vlcibus inspersum, vermet in eis natos abigere & enecare: præter facultatem verò quæ calculosis prodest aduersus heretas etiam vtilem esse. De eorum vñ ad descensum intestini ex Hollerio dictum antè.

POLYGO NI, VEL LINIFOLIA PER terram sparsa, flore Scorpioides.

CAP. CXXVII.



EX radice quæ Descriptio
tenuis, singularis, interdū multifida, alba, folia emergunt Lini, vel Linaria, caules anteuertentia, at illi vbi prodierint, per terram sparguntur palmares aut etiam dodrantales, ramosi, foliis nullo ordine positis vestiti, Polygoni, minores, casti coloris, sapore nullo euidenti: in extremis ramulorum acuatim congesti

stipuli numerosissimi, Polygoni floribus similes, minores, extrinsecus purpurascens, intus albi, caudam Helietropii, vel Scorpioidis aquatici circumflexu imitantes: semina parua, albis, videntibusque striis variata.

Calp. Bauh. qui aliquando sine nomine nobis Synonymi, in phyt. Polygonum 7. siue minus, & Millegranam minorem vocant: Lobel. cuius icon in Ic. Plant. pag. 421. minus placet Millegranam minorem.

Anno 1590. medio Septembri plantam rep. Loc. n. spontaneam copiosè prouenientem in loco culto.

CAMPHORATA MONSPELIENSIVM.

CAP. CXXVIII.

Camphorata radicem habet pollicaris ferè Descriptio
crassitudinis multorum capitum, caules emittentem lignosos, crassiusculos, cubitales, aut breuiiores, ramosos, subhirsutos, albicantes, per quos visuntur nodi alternatim positi, è quorum singulis confertissima prodeunt foliola, trientem vncie non excedentia, tenuia, pilosa, mediocriter rigida, odore aromatico, sapore aliquantulum acri.

Lobel. in Adv. non admodum feliciter depingit, & satis adumbrare credidit Chamæpucen, siue humilem Piccam Plinii, Camphoratam Mospeliacam, vt vocat in Obs. pag. 221. in Ic.

H. Lugd.
duas figuras.



Locus

Selaginis, siue Camphoratæ inscriptione.

In squalidis & arenosis locis gignitur in via Frontignana, & Montbelgardi in horto Illustr. E. C.

HYPERICVM VETERIBVS.

CAP. CXXIX.

Descriptio

Comunes Hyperico, tribusque aliis deinceps numerandis & describendis plantis, Ascyron, Androsæmon, & Cori, notæ & partes aliquæ, congeneres & in aliquibus scriptoribus cognominæ sibi inuicem plantas eas omnes fecerunt, priuatimque huic, aut illi debitas appellationes aded miscuerunt, ut non secus, quàm Romæ quondam in adoptionibus, quibusdam factum est, ut seruato antiqui & proprii generis nomine, adoptione quæsitum alterum illud adiceretur: sic seruata Hyperici appellatione, Hypericon Ascyron, & Hypericon Androsæmon aliquando congeneres illi hæc plantæ à quibusdam vocatæ vocatæ fuerint. Nec aliter posteriores Latini de his tradiderunt. Græci tamen omnes, priuatimque Dioscorides seorsum de singulis docuere, certiore disciplinâ vti, quàm, si vno capite, simulque de cunctis tradidissent. Quod enim generum rerum & species dispescit exiguum semper est: quod verò coniungit multum, docetque in his Professores omnes natura exemplo vti, nec miscere simul quæ discreta ea voluit esse. Quæ aut communia quatuor his plantis, quæritidem propria singulis sint, faciliè ratiocinati & colligere erit ex earum historiis mox seorsim tradendis.

Hypericum igitur alij Androsæmon, alij Corion, alij, quoddam semen eius odore pinæ resinæ sit, Chamæpytin vocant: *Frutex* est furculaceus, dodrantalis, rubescens, folia habens Rutæ [πυρρα] similis [ὄσπλησσα]: *Florem* verò luteam [μυλινον] Violæ albæ similem [vet. quidam totâ hæc periodo caret, ut & Oribas. vsque ad αλωνία] qui quidem inter digitos contritus sanguineum succum remittit: quæ ex causa etiam Androsæmon appellatum est. *Caliculis* [καλαρία] pro qua vet. αλωνιον] subhirsutos: *fructum* in rotundo oblongos, Hordei magnitudine, in quibus *semen* nigrum & resinosi odoris. Gignitur locis cultis & asperis. Urinam cit, subditumque menses trahit: ex

Vires.

vino autem bibitum, à tertianis, quartanisque liberat. Medetur & semen ischiadicis, quadraginta diebus haustum. Sed & solis cum semine impositis ambusta sanantur. Et hanc legitimam Dioscoridis lectionem esse credimus.

Eadem præstat Hypericum, quam alij Chamæpytin, alij Corion, appellant, oleraceo frutice, tenui, cubitali, rubente: folio Rutæ, odore acrisæmine in siliqua nigro, maturescente cum Hordeo. Natura semini spissandi. Aluum sistit, urinam cit. Ad calculos vesicæ cum vino bibitur. Et hæc Plinius lib. 26. c. 8. non omnino cõsonè cum Dioscoride tradit, etiamsi de eadem herba agat, inquit Cornarius.

Galeno hypericum calefacit, & siccit, tenuium partium essentiam habens, ut menses & urinas prouocet. Ad hæc autem totum sit dum capere oportet, non semen solum. Idem fructus viridis cum foliis impositus, ad cicatricem perducit vlcera, tum alia, tum ambusta. Si verò siccatum contusum insperleris, humida & putredinosa vlcera sanabis. Quidam etiam ischiadicis ipsum bibendum exhibent.

Hippocrates de morbis mul. in potu vterino, & colutione ad vlcera sætuda *σμεν* præscribit.

Cordus in Dioscoridem facit primam hyperici speciem priuatim hypericum dictam, sibi incognitam esse, pharmacopolaque eius loco Ascyro vti, quod altera est hyperici species.

hyperici nomen sequentes plantæ obtinere. hypericum vulgare, siue Perforata caule rotundo foliis glabris.

Hypericum Ascyron dictum, caule quadrangulo.

Hypericum Androsæmon dictum.

Hypericum pulchrum Tragi, siue montis Balon.

Hypericum elegantissimum non ramosum, folio lato.

Hypericum Syriacum & Alexandrinum.

Hypericum Ascyrum Creticum.

Hypericum minimum superum.

Hypericum tomentosum.

Symphytum petraeum, Onobrichis, & Ruta siluestris hyperici nomina etiam insigniuntur.

ASCYRON VETERIBVS ET IN GENERE.

CAP. CXXX.

Ascyron siue Alcyroides, aliis Androsæmon, etiam hyperici genus est, magnitudine distans: siquidem ramos habet maiores [vet. διαφύων αλωνιον, πυρρα] ac fruticosus est: foliis interim tenuibus, puniceo colore rubentibus: flores luteos profert, & fructum hyperico similem ac resinosi odoris: cuius attritu digiti veluti cruentantur: qua de causa Androsæmon [quasi humanum sanguinem dixeris] vocauere. Est & huius fructus ad ischiadicos efficacis potus in hydromelitis heminis duab. Nam biliosa recrementa, plurima aluo detrahit. Sed dari frequentius oportet, donec sanitati restituti fuerint. Illinitur & ambustis efficaciter.

Ascyron & Alcyroides similia sunt inter se, & hyperico. Sed maiores habet ramos quod Alcyroides vocatur, ferulaceos, omnino rubentes, capitulis parvis luteis. Semen in caliculis pusillum, nigrum, resinosum. Comæ tritæ velut cruentant. Qua de causa quidam hanc Androsæmon vocauere. Vtus seminis ad ischiadicor. poti duab. drachmis in

drachmis in hydromelitis sextario. Aluum soluit, bilem detrahit. Illinitur & ambustus.

Galenus

Galenus Ascyri ut eiusdem cum Hyperico speciei, non meminit suo loco, sed de Androsæmo agens, ut mox sequenti capite adducemus. Paulus Hypericum duplex esse ait, alterum quod Androsæmum & Ascyron appellatur: alterum de quo capite præcedente egimus. Lonicerus in Diosc. Ascyron tertiam Ruta agrestis speciem esse ait. Harchius in Ench. Hypericum; Ascyron, & Androsæmum eiusdem generis statuit.

Ascyri & Equiuoca.

Ascyri nomenclaturam communem habent sequentes plantæ. Hypericon vulgare, siue Perforata caule rotundo, foliis glabris:

Hypericum Ascyron dictum, caule quadrangulo.

Hypericum Androsæmum dictum.

Hypericum pulchrum Tragi, siue montis Balon.

Hypericum Ascyron Creticum.

Hypericum Ascyron supinum in *Androsæmo lanuginosum*. Asraçtylis auctore Dioscoride.

ANDROSÆMVM VETERIBVS & in genere.

CAP. CXXXI.

Descriptio

Androsæmon, quod alii Dionysiada, alii Actiam Ascyron appellant, ab Hyperico & Ascyro differt auctore Dioscoride: frutex verò est ramulis gracilibus, surculosus, virgultus puniceo colore rubentibus, foliis triplid, quadruplòve (vet. delet) maioribus, quàm sint Ruta folia, quæque trita vinoso succo manant. habet autem alas in cacumine complures, vtrinque expansas pinnatasque: circa quas flosculi pusilli lutei, & in calyculis semen Papaveris nigri, veluti punctis notulisve distinctum. huius coma contrita resinolum odorem reddit. Sed & semini tritum drachmis duabus potum, excrementa biliosa trahit: prodest verò maxime ischiadicis; verùm à purgatione aquam insuper sorbere oportet. Ceterum illita herba medetur ambustis, & sanguinem cohibet. Plinii verba declarant Dioscoridem, & præsertim vsum medicum diligenter & exactè exponunt.

Galenus.

Androsæmon, auctore Galeno, fruticosa planta est, duplex naturâ: Altera quæ Ascyron & Ascyroides nominatur, & hyperici species est: Altera quæ à quibusdam Dionysias appellatur. Est autem semen ipsorum purgandi vi præditum. At foliorum facultas siccet, & moderatè extergat, ut etiam ambusta sanare credatur. Coris verò in vino austero, vinum efficit, ut magna vulnera glutinet.

Ab his non multùm euariât Paulus. Quin & Pandectarium Moreti haud dissona habet, vocans Androsæmum alterum Alkita seu Alkaydes, & alterum Dionysia.

Monachi

Monachorum in Mesuem scribentium [pace tamen eorum id dixerimus] ineptias detegit Matthiolus: quippe qui asserant nullam ferè esse differentiam inter Rutam siluestrem, & Androsæmum, siue hypericum, ut quæ in alterius locum substitui possint.

Ryffius in Diosc. ait officinas & gallicum vulgus Androsæmum cum hypericone confundere. Sed ipsemet Ryffius non demonstrat verum discrimen, nec figurâ, nec descriptione. Androsæmum enim hirsutum, Ascyron & Hypericum vulgare non hirsuta sunt: Ascyro præterea cau-

Tom: III.

lis quadratus, Androsæmo verò rotundus.

Plures hodie occurrunt herbæ quæ Androsæma vel cognominantur, vel appellantur, ut Hypericum Androsæmon hirsutum caule rotundo: Hypericum: Hypericum Ascyron. Hypericum tomentosum. Hypericum elegantissimum non ramosum, folio lato. Ciciliana. Alcæa Veneta. Atractylis.

Equiuoca?

CORIS VETERIBVS ET IN GENERE:

CAP. CXXXII.

Coris, quod aliqui etiam Hypericum appellant, frutex est foliis Ericæ, sed minore, pinguiore, & rubente, dodrantalis, origatus, acris & odoratus. Huius semen potum vrinæ mensisque ciet. Est & auxilio ex vino potum à phalangio demorsis, ischiadicis & opisthotonicis: itemque rigotibus addito Pipere. Sed & eo vtiliter opisthotonici cum oleo perunguntur. [Sequentia habet Ald. cod. in nothis: eadè Gampylus in utroque vetusto codice reperit in capitis calce.] Radix in vino decocta, potaque resolutis egregiè opitulari creditur: sed laborantem inter potandum bene circumquaque operiri decet: siquidem corpore toto sudorem ciet, quæ ex re agilitas pristina recuperatur.

Descriptio

Pires

Plinius de hyperico agens lib. 26. cap. 8. hæc de Cori habet. Est aliud, inquit Plinius Hypericon, quod alii, ita etiam Paulus Corin appellant, folio Tamaricis (Ericæ Diosc.) & sub ea nascitur, sed pinguioribus foliis, & minus rubentibus (& minoribus ac rubentibus, vet.) odoratum, palino altius [non alius Diosc.] leniter suauis, aculeatum (acutum Dioscor.) Vis semini calidior, & ideò inflationem facit enterocelis: sed stomacho non inuile, præcipuum ad stranguriam, si exulceratâ non sit vesica. Medetur & pleuriticis ex vino potum. Idem cap. 11. Semen hyperici, quod Coris [Caros, vet.] hydriopicos sanat. Hactenus Plinius, ex cuius confusione [quod Tamaricis folio dixit, pro Ericæ folio] factum est, ut quidam Erycam & Myricam confundant, vtramque Tamaricen appellant.

Plinius?

*Plinius com-
fusur.*

Galenus Corin sub hyperico comprehensam omisit.

*Galenus &
Paulus.
Acquiuoca?*

Pro Coride autem variæ exhibentur plantæ: nempe Coris Cretica Belli. Coris hypericoides quorundam. hyper. minimum supinum. hyp. Ascyron Creticum. Coris Monspell. Coris lutea. Kali paruum. Erica baccifera Matthioli Chamæpitys

HYPERICVM VVLGARE SIVE PERFORATA caule rotundo, foliis glabris.

CAP. CXXXIII.

Ex radice lignosa, multatam diuisa, buxæ cortice intecta, virgula surgunt complures, rigidæ, lignosæ, rotundæ, subrubentes, in ramos diuisæ, cubicum vnum, aut etiam duos altæ: folia Maioranæ, glabra, vel Centaurii minoris Lobelio, nervis per longum excurrentibus donata, innumeris foraminulis soli obiecta pertusa esse videntur, sapore sicco & adstringente cum aliquo amaro: flores in extremis ramulis copiosi, lutei, ex quinque radiatis foliis compositi, apicibus multis concoloribus: semen paruum ex nigro rufum, pingue, in capitulis oblongis, granum Hordei imitantibus, sapore resinoso, Lobelio amaro & ingrato: atque tam flores, quàm capitula semine grauida sanguineum succum reddunt.

Descriptio

§ f

Nomina
linguarum
Millefora.

Vt Cræcis *ἑρπύριον*, sic quoque Hypericum Latinis & *Perforata* dicitur vel Millefora, quod folia obuersa Soli, innumeris ferè poris, ac quasi traiectis, aciem tum nostram, tum Solis transmittat radios: itémq; *Fuga demonum*, quod plurimi in ea sunt opinione, vt allerant, eam dzmōnes fugare, non aliter atque veneno alexiterium verulæ mulierculæ fascinatæ, vericulos subscriptas patriâ linguâ recitare consueverunt.

Doffi barham/ vnd weisse heidt/

Thur dem Teuffel vil leidt: Hoc est, Origanum, Hypericum, & Erica, multum dzmōnibus aduerlantur. Ex quibus sanè vericulis factis apparet, quid maiores nostri cum adhuc gentiles essent, de his plantis senserint, & ad quos illas vsus adhibuerint. Sed relictis superstitionibus, ad linguarum nomina redeamus. Arabs *Scrapio Resfricon*: Auic. *Albarib & Vnam demonis*, Auerrh. *heusericon, Nelsfricon, Mellifigon & Cordul* nominat: Hebræi *Alarif*: German. S. *Johans fraut*, hoc est, Herbam sancti Ioannis, *Barthaw/ iwaldthoff/ & Unser frauen beströ*: Belgæ S. *Jans Cruyt*: Galli *Millepertuis*: It. *Hyperico*, & *herba rossa*: Hisp. *Corazoncillo*: Angli S. *Johans worte*: Boh. *Zivoúecz ezervuecy*: Hung. *Chengo verág*, hoc est, Sonantem florem.

Fls sonans.

Locus

Tempus.

Vires & vius.
Apoplexia.
Febri tertiana & quartana.
Semen.

Oleum.

Vb. que vulgatissima & vltimissima Medico & Chirurgo Hypericū dicta, margines latorum, areas desertas, & ruinosas sectans, etiamque latiora loca. Monspelij obseruauit florens Maio: Basileæ inter portam Stein & Eschen luhio & Augusto: in Marchionatu circa Bingen Octobri: Geneuz virens adhuc Decembri.

Quidam referente Trago, Hyperici aquam distillatam contra apoplexiam & morbum comitalem bibendam exhibent. Hypericum decoctum & potum febri tertianæ & quartanæ medetur, excreationes sanguinis finit, vulnerib. & erosionibus internis auxiliatur. Semen in pericarpis ad vulneraria balsama nulli secundum, multo Chirurgo petiissimorum Monspelienium experimento, vbi etiam oleum vernaculè *de Trefelan* vocatum, quotannis paratur longè optimum, ad hunc modum: Accipiunt summitatum Hyperici & olei communis singulorum libras duas. Myrrhæ & Gummi Elemi an. Vnc. duas: Terebinthinæ Vnc. quatuor: Aloes Vnc. vnam: Thuris & Mastiches an. Vnc. semis. Infundantur, bulliantque in diplomate ex arte. Ad icterum etiam & calculum utilitas conspicua.

HYPERICVM ASCYRON DICTVM, caule quadrangulo.

C A P. CXXXIII.

Descriptio

Ascyron dictum ex radice reptante, fibrata, rubente, caules emittit Hyperico vulgari pares, quadratos, rubescentes, ramosos: folia ortu & magnitudine foliis respondent iam dicti Hyperici, utcumq; tamen latiora, & nervosiora, nullis poris pertusa (Lobelio verò pūctim poros pernios habet) odore illò Hyperici resinoso, quo & flores lutei, eius floribus pares & consimiles, præditi sunt, sanguineum succum digitorum attritu reddentes, quibus similia quoque succedunt semine pusillo prægnantia vascula: figura Fuchsiæ, quam hic ponimus, displicet. Hanc autem caulem habere quadratum, foliaque paucis for-

minibus pertusa obseruauit Turnerus, quod in Hyperico non animaduertit.



Ascyron d. exueus: Græcè, *Ascyron* Lobel. in Obs. p. 216. It. Plac. p. 399. & Turnero latine nominatur: *Ascyron* Fuchsio, Matth. in Epit. & Hist. germ. cum addit. Camerarij, *Lonicero* (quorum figura non respondet) & Horto Lusitano: *Hypericum* 2. & *Ascyron* notissimum Lob. in Adu. Hy-

Nomina & Syuon.

pericum in dumetis nascens Trago: Cordo in Diosc. *ἡ ἑρπύριον* & *ἡ ὑπερίκος* caule quadrangulo.

An Geln. in cat. *Ascyroides*, S. *Johans kraut mit grossen blestern*, h. e. Herba S. Ioannis h. liis magnis?

Officinis ignotum. Germ. *Barthew*, i. e. durum Fœnum appellatur. Gallicè *Fuchsi Trucheran* dicitur: veteribus autem Gallis *launette* dicta est. Græci à contrario, huic herbæ nomen imposuisse videntur: *ἡ ὑπερίκος* enim illis asperitatem significat. Pulchrè igitur ad græcam appellationem germanica alludere videtur. Anglicè vocari potest, *great S. Johans grasse*, vel *wurt*.


Ascyron notissimum annuum, & rigorum, rivulorumque pratensium amans valde. In vltuario Sionis sæpè Turn. obseruauit. Ego Monspelij, Basileæ & Geneuz: Montbelgardi frequens eundo ad Vites maximum loco humido inter frutices. Floret Iulio & Augusto.

Ascyron haud disparis cum Hyperico sed infrequentioris vsus est, autore Lobelio.

Locus & tempus.

Vfus:

HYPERICVM ANDROSÆMVM DICTVM CAP. CXXXIV.



DVos cubi-
tos altitu-
dine superat
Androsæmi di-
di tantis, rigi-
dus, teres, lanu-
ginosus, cuius-
modi sunt & fo-
lia, aded vlti-
mior parte
canescant, As-
cyri foliis pro-
xima, quippe
nervola, sed lo-
giora, & Hyper-
ici instar fora-
minulenta, po-
sita sunt autem
ex aduerso, ad
caulis articu-
los, ex quorum
alis ramuli
enascuntur.

Descriptio

nascentur: caulis circa fastigium in crebros surculos facessit, in quibus flores Hyperici vulgaris consimilibus succedentibus valculis. semen continentibus resinolum: radix recta non agitur, sed in latus, frequentibus fibris donata.

Fructus

Figura apposita ex Fuchsiis non multum placet. Nec arridet Androsami Matthioli in Epit. & Hist. germ. cum addit. Camerarii, quia angulosa picta. Imago quoque apud Lonicerum pro Androsamo vulgari expressa non conuenit, est enim Hyperici parui.

Lobel. in Obs. p. 217. & in Icon. Plant. p. 399. Androsamon. Fuchsi. in Hist. *Androsamon*, quod germ. *Fünkrath* vocat, & gall. *Mille-perenis large*, vel *Truchoran large* depingit & describit: verum nec figura nec descriptione, titule eam exprimit. Idem in Epit. Hisp. vocat Androsamon & specie de *Terna de Sant Juan*. Gein. de coll. Androsamon caule rotundo, & Androsamon Fuchsi: & sic quoque Horto Lusit. dicitur. Anguill. epist. 13. Androsamon.

Locus & Tempus

Montbelgardi abundat in vicinis collibus, florens Iulio & Augusto: licet etiam in monte Rolsberg prope Masmünster observari, itemque Basilea circa Dornacum, & in monte Leurach, Geneuz, & Montpelu.

HYPERICVM PVLCHRVVM TRAGI.

CAP. CXXXV.

Descriptio.



Quod Hyperici pulchri nomine pingit Tragus radice nititur lignosa, rubescente: caulibus dodrantalibus, & maioribus, teretibus, glabris imâ parte rubentibus, ramosis, non tamen perpétui: folia ex geniculis gemina aduerso situ posita, solidiora, rotundiora & minora quam in vulgari, non minus crebris

tamen foraminulis pertusa, glabra, aequali parte nonnihil interdum purpurascens, valde concinna, & caulem concursu suo veluti completentia: flores lutei consimiles, sed pauci, brevibus haerent pediculis, binis, plerumque aduersis, & foliorum sinu ortis.

Hypericum montis Baloni.

Hoc genus Hyperici reperi in cacumine montis Balon Augusto.

HYPERICVM ELEGANTISSIMVM NON ramosum folio lato.

CAP. CXXXVI.

Descriptio

Ex radice lignosa, multifida, fibrata, tortuosaque caules duo, tresve pullulant cubitales & altiores. Tom. III.



res, teretes, glabri: per quos ex intervallis, inferius quidem brevibus, paullo vicia maioribus, superius longis, palmatis & amplioribus, bina semper folia ex aduerso posita adnascuntur, ita ut inferius coniugatio cum proximo superiore decussata erit cum deformat: folia infima quidem Hyperici vul-

garis foliis paria, superiora vero, sensim crescente semper cum loco, magnitudine, duplo maiora, oblonga, acuminata, nullis foraminulis (ut Hyperici vulgaris) pertusa, membranacea, glabra, & nervo medio in mucronem excurrente productis, sinuatis in arcum venulis: per margines punctula apparent rubra: flores umbellæ simulachrum efficiunt, summum caulis fastigium occupantes, cum in ramos Hyperici modo non findatur: alioqui Hyperici floribus similes, quibus nondum explicatis punctula rubra aspersa comparent.

In horto Tossani ex montibus Genevensibus allatum floret Iunio. Virens inveni in monte Rolsberg: prope Masmünster mense Octobri: Montbelgardi in colle versus Audincourt & in monte la Chau. Basilea in silvis observavit Frater.

Locus & Tempus.

HYPERICVM SYRIACVM ET Alexandrinum.

CAP. CXXXVII.



Quadruplo Descriptio minora quam nostri Europæi, quæ luminum cubitalibus virgulis confertim tanquam in verticillis exeunt, profert folia: flores luteos nostrati persimiles.

Lobelius in Synonymis

Obs. pag. 216. & Ic. Plant. pag. 398. dicitur Hypericum Syriacum & Alexandrinum. Tabern. Hypericum Alexandrinum.

C. Bauh. phyt. Hypericum 6. siue folio brevior.

SS 2

speciosi, maiores, lutei, stellati, quinque foliis constant, quibus totidem viridantia subiecta, apicibus numerosis luteis: capitula per maturitatem nigra, semen continent pusillum fulcum, gustu, ut & folia, resinoso.

Cæciliana.
Androsæmon
Bellonius Sicilianam, vel Cæcilianam Italiis vulgò dictam, Androsæmon interpretatur, spondiatum in Ponto ubi visum scribens. Androsæmon Veterum Fuchsius quoque videtur itemque Fab. Columnæ. Sed & C. Bauh. in phyt. Androsæmon statuit, & maximum frutescens cognominat, ac Centetiam Theophrasti suspicatur.

interia
Theophr.
Androsæmon
non est
Clymenon
italic
Clymenum
Plinii
Lobel. cum Dodonæo Androsæmon negat, & in Aduers. itemque Obs. pag. 357. & Icon. Plant. pag. 632. Clymenon Italorum inscribit. Anguill. epist. 5. non per S sed per C Cæcilianam scribit, & Clymenum Plinii, non verò Dioscoridis, interpretatur. Et huius sententiæ est quoque Camerarius hort. qui Androsæmon maius vocat. Quæ Dioscoridi est Androsæmon, & Pharmocopæis Anglicanis Agnus castus, Turneri sententiæ est *Toussain*, hoc est, Tota sana, quod omnia sanat, dicta: differens ab Hyperico & Ascyro, quod ramos multos habeat, &c.

Agnus c.
fus
Tota sana.
Gefnero Anguillaræ opinio non placet, nec fortè etiam Fuchsius, quamvis de hort. Androsæmon quoque nominet. Galli vocant: *Toute saine*.

Locus &
tempus.
Primum vidi Esslingz in horto Volmarii, baccas habentem mense Septembri. In Anglia abundare dixit Turnerus: in Illa insula Camerarius. Montbelgardii in horto Illust. r. c. semen maturat Iunio, Iulio, Augusto & Septembri, ac baccas etiam Decembri: Hiemem perfert.

TRAGIVM PRIMVM ET SECVNDVM
Veteribus & in genere.

CAP. CXLII.

Descriptio
TRagium [*τραγιον*] in Creta tantum nasci dixit Dioscorides, Lentisco simile, foliis, semine ac ramis, singulis tamen minoribus. Liqueorem verò proferre gummi similem.

Vires &
vires.
Folia, semen, & lachrymam impositione ex vino spicula omniaque corpori impacta euocare, Pota eadem drachmæ vnius pondere stranguræ mederi, calculos vesicæ comminere, & menses trahere. Dicit & siluestres capras sagittis ictas huius herbæ pabulo spicula excutere. Alterum [*τραγιον αλ*] folia Scollupendrii habere, & radicem tenuem, candidam, siluestri Raphani similem. Hanc seu crudam, seu coctam comestam, dysentericis esse auxilio. Cæterum folia per Autumnum hircini vitis odorem emittere, unde & verbam Tragii nomen obtinuisse. Protenire (hec ex Ald. codicis nothis huc transferre visum est, Sarrac.) in montibus & præcipitiis.

Tragii al
terius ap
pellatomes
ouha
Galenus
Tragium alterum in nothis Dioscoridis aliqui Tragon, alii Tragoceratò vocant, alii Scorpiò alii Garganon. Latini Cornulacæ seu Bituensæ: Daci Saliam: Egyptii Sophæ: Aphi Achiosim.

Galenus 8. simpl. Tragium hoc Lentisco iudem simile facit. Tragii, inquit, folia, fructus, lachrymaque, trahentis digerentisque sunt facultatis. Est verò & tenuium partium, & facultate in principio tertii iam quouo modo ordinis calida: stipites & hærentia corporibus extrahit, lapides frangit, menses mouet, drachmæ pondere

Tom. III.

potum. Porro in Creta sola nascitur, Lentisco adsimile. Cæterum alterum Tragium hoc minus multis in locis prouenit.

Plinius parum sibi constat, dum lib. 13. cap. 21. *Plinius h*
gaur
Tragium, quod alias Tragonin vocat, fruticem esse scribit solius Cretæ insulæ Terebintho similem. & semine, quod contra sagittarum ictus efficacissimum tradunt. Libro verò 27. cap. 13. eundem ipsum Iuniperò similem facit, (quod reprehendit Gesnerus tum quia Iuniperus multum absimilis Lentisco, cui Dioscorides Tragium comparat, tum quia Tragium nihil nisi herba est ut docent Hesychius & Varinus, & semine, & folio, & ramis. Trachinia, ait [Trachynia Dal. Gesnerus autem legit Tragonia] herba qualis sit, non traditur. Credo & falsum esse promissum Democriti. Portentosum enim est, adalligatam triduo absumere lienes, &c.

Cæterum, hinc fortè aliquis Tragion dictum coniciat, quod hircis & capris siluestribus medeatur.

Tragii autem nomine sequentes donantur plantæ, Ruta hypericoides. Poterion. Tragacantha. Selseli Ethiopicum. Fraxinella. Dip-tamum album. Saxif. hircina. Sanguisorba. Lunar. botrytis. Succudus. Parmica quortundam. Atriplex foetida.

Acquisitio

RVTA HYPERICOIDES QVIBVSDAM
Sicilianæ affinis siue Tragium.

CAP. CXLIII.



Descriptio
Hoc nominem plantam donauit Sprengerus Seplarianus, caule tereti, læui, ramoso, foliis ad articulos aduersis, duplò Hyperici maioribus, glabris, neutiquam pertusis, foetidis, sapore [ut nobis videtur] acidulo floribus magnis, Sicilianæ proximis, luteis, densa circhorum luteorum, tenuissimorum, longorumque in-tortis apiculis

segete, medium occupante, capitulo sequente & cuius summo emicant stamina longa.

Androsæmon minus Camerario: Androsæmon secundum C. Bauhino phyt. Sicilianæ congener Fabricio Columnæ: An Tragium Græcum Anguillaræ?

Basileæ in horto Io. Heitzman copiosè Iunio mense florentem obseruavi, perferreque Hiemem etiam non repositam. Reposita in horto Ill. Princ. Stutgardie, & Durlaci in horto Ill. Princ. Georgii Friderici Marchionis Badensis florebat Augusto. Camerario autore licet hybernus frigus difficulter ferat, copiosè tamen se ex semine propagat.

Locus
tempus

Descrip.



Monspelijs Phyteuma vocant plantam, cui radix singularis, nullis, aut perpauca fibris donata, satis crassa, lignosa, alba: caules emittit plures pedales, in ramos multos fissos, parum reectos, partim reclinatos: per quos folia oblonga, per extremum obtusa, subinde

fissa, mollia, quamquam inferiora nullam agnoscant diuisionem, quatuor vnciarum circiter longitudine: flores per ramos crebri, albi, è meris staminibus compositi, quibus radiata folia viridantia subiecta: *siliqua* turgidulæ, semine longæ, striatæ, superiore parte perforatæ, *semen* claudunt capiosum, nigrum.

Releda cognata.

Gelnero hort. *Reledæ* [de qua nos libro sequenti] cognata videtur hæc planta, quam Monspelijs Phyteuma nominant. C. Bauh. phyt. *Reledæ* affinem quoque dixit, & *Reledam* tertiam, variantem folijs, vt & *Reledam*, cuius nomine apud H. Lugd. pag. 1198. duas icones haberi notat. Lobel. in Obs. p. 415. Icon. Plant. p. 718. Phyteuma Montpelienfium intulit: in Adu. Phyteumatis Norbonensium nomine donauit, non tamen verum affirmavit.

Locus & Tempus.

Monspelijs provenit mense Aprili, Maio & Septembri, Genevæ in hortis florens habebam Maio, semine maturo Iunio & Iulio mense.

ONOBRYCHIS LUTEA DALECHAMPII.
CAP. CXLV.

Locus Descriptio



In niuosis luteæ montis cacuminibus prostrata, radice crassâ, lignosâ, breui, radicante: cauliculis perquam multis, pedibus: folio limbo angustiore, longiore, inæquali posito è cauliculis prodeunte: flore luteo, copioso, paruo, in summis cauliculis nitecente. Herba rara & vix alibi visa, Onobrychis 4. H. Lugd. pag. 491. lutea Dalechampi.

Synon.

POLYGANON MVLTIS.

CAP. CXLVI.


Descrip.



Perenni radice semipalmum aut palmum, interdum vnciam longâ, lignosâ, albâ, vel nonnihil viridi, purpurante, gustu subamaro, nonnihil aromatico: caules proferit multos, alios surrectos, alios repandos, tenues, palmares, & spichamæos, in viridi nonnihil rubescentes, folio-

los, spicam sustinentes *st. sculorum* minorum, non vna vice sese pandentium, colore dilute cæruleo; labello exiguo, & in fibras tenuissimas digitato: galea è duobus foliis alternatim subeuntib. & incumbentibus; latera claudunt alæ geminæ passæ, latiusculæ in obtusum mucronem desinentes virescente lineolâ per longum signatæ: in rectu latent apices minuti croci: basin floris excipiunt tria foliola tenuissima, oblonga, vnum galeæ incumbens: duo labello subsum, quæ nonnunquam diducta, cruscule imitantur: *folia* humi sparsa, & in caulibus numerosa, illa subrotunda, hæc oblonga & acuta, carnosa, gustu vehementer amaro.

Icon 11.



Quidam Polygalon cam esse volunt, inquit Cornarius, quâ nostri Creugblum vocant: Sed quum hæc trium generum sit, iuxta triplicem florē, Polygalon esse voluit eam quæ albi florē habet. Reliqua duo genera, & purpureum florē habens, & cæruleum ad Glauca referunt: ego nihil pronuncio.

Tragus in trepidè huius speciem flore albo Polygalon Dioscoridis esse pronunciat. Flores, ait, Polygalon diuersi sunt coloris. Nam alij sunt niui, alij Bersilici, alij cærulei, conspicuntur. Omnium verò generibus idem solium, idem caulis, eademque denique radix, nuncium lignosa. Ego illam Polygalon

galon Dioscoridis esse coniicio, maximè eamque candidos fert flores, nam quæ purpureo & cæruleo emicat, eam ad Glaucem refero, quam Plinius ab abundantia lactis, quam facere ait, Eugala-ton nominat. Sed salteur Tragus, de aliis Plinius loquitur.

Ab opinione Cornarii & Tragi aliena est Dodonzi lat. in fol. dicentis: Nomen accepit apud Germanos *Ramsel* & *Creugblum*. i.e. *Ambarualis* flos: appellari autem sic contingit, quod festis *Ambarualium* diebus præcipuè vigeant, ac rustici virgines, ex his, plerisque locis, tunc coronas sibi nectant. *Ambarualis* autem festa sunt, quæ Romana Ecclesia dies appellat Rogationum: Germanis *Creugtagen*: tunc enim arua à sacerdotibus & populo lustrantur. Hieronimus Tragus *Polygalon* esse existimat: nec fuimus quandoque solum in Hist. gall. ab hac sententia alieni: sed cum apud Dioscoridem & Plinium breuissima huus extet descriptio, quid affirmandum? præsertim cum ad lactis abundantiam facere hanc non constet.

Polygala recentiorum Lobel. in Aduers. vocat *Polygalam recentiorum* floribus purpureis, pallidis & interdum albidis. In Obs. pag. 228. *Polygalam recentiorum* coloris purpurei, sanguineius, diluti punicei. 2. Albi. 3. Violacei. 4. Albi rubore confusi: *Onobrychis* veram Dioscoridis. In Ic. Plant. p. 416. *Polygala recentiorum*: p. 417. *Polygala rubris* floribus.

Onobrychis. H. Lugdunensis, meo iudicio, duas habet figuras & descriptiones vnius plantæ: p. 491. *Onobrychis* tertia purpurea Dalechampii.

Camer. hort. intitulat *Polygalon Tragi*: Thal. & Pona in Baldo *Polygalam Tragi*: Clus. *Polygalam* plerorumque recentiorum: Lonic. *Polygalam* Græcorum & Latinorum: Gesn. in duab. epist. ad Bened. Aret. *Amarellam*: C. Baub. *Polygalam* 2. siue vulgarem floribus cæruleis, purpureis dilutionibus seu albis, rariis niveis.

An Glau Anest Cordo in Diosc. Glauz: An Cæalp. Co-do in Cæalp. fr. ut suspicatur planta, quam lib. 5. cap. 14. sic describit: Quod in fruticulis in collibus saxosis nascitur, arido solo & inculto ramulos tres aut quatuor ab radice spargens, simplices, doctante longiores, humi procumbentes: in quibus pauca folia, ceu Lini, breuia, colore aliquando viridi, aliquando ex rubro nigrescente: supra folia pendunt flores ex vno tantum latere usque ad cæmina, spectantes ad terram, purpurei, vel pallescentes, ex rotundis foliis regnibus: fructum compressum & rotundum, qui in summo scissus est: semine in utroque latere oblongo, gustu subamaro: Non abhorret ab hac Osyris Diosc. sed quoniam apud Plinium coloris mutatio non solum tribuitur, sed fructui, idcirco aliam ostendo *Otyridem*.


Multis in locis à me reperta est, ut passim Montbergardi etiam in horto Ill. E. C. quod transtuli minorem albam collectam inter Malmunster, & S. Germain. Geneuz in pratis Maio florens; virens circa montem *Salene* Februarii principio: Basileæ propè *Leurach* Augusti itemque in monte Mutensi. Monspelii, Tubingæ & in Italia flore purpureo & albo. Flore luteo siccam plantam demonstravit Fuchs. Flore minuto, dilute cæruleo inueni florentem mense Aprili satis copiose ad pontem Dubis. In siccioribus Austriz & Pannoniz pratis tribus florum coloribus discretam, ferè passim obuam perhibet Clusius. In

collibus herbosis, ut refert Dodonæus, qui nec aratro præscinduntur, nec pedibus atteruntur, in pluribus Germaniz ac Belgii regionibus lato ac mediocri solo spontè gignitur. Maio mense præcipuè cum flore reperitur.

Polygalon Tragi à sapore à Gesnero *Amarella* Vitis vocata cærulea præsertim, præamara est. Si verò manipulus eius per noctem in vino maceretur, idque bibatur, bilem per aluum mirè deiecit, nullo periculo quidem: experientia Gesneri.

POLYGALA VULGARIS MAIOR duplex.

CAP. EXLVII.



EX eadem in- Descriptio
terdum ra-
dix prodeunt
quinque aut sex
virgulae durius-
culæ, pedales,
graciles: lentæ
& obsequiosæ,
filiis nullo or-
dine dispositis
oblitæ, angustæ,
floris Tinctori,
aut. vulgaris
Hyssopi angu-
stifolia & mino-
ris, quod ab
Hispanis *Ys-*
pillo vocatur, fo-
liorum æmulis:
flores conferti
& spicatum nas-
centes, summas
virgulas occu-
pant.

Fumiterræ floribus non multum ab similes, longiores tamen, & dilutionis purpurei coloris elegantissimi, siue dilutione rubore pulcherrimo nitentes: his succedunt penduli loculi plani, Bursa pastoris valvæ ferè similes, quos membranaceæ quædam veluti alæ integunt, semina bina plerumque continentes, nigricantia, hirsuta, longiuscula, quæ aperiuntibus sese ad latera mutantate burstis, decidunt: radix crassiuscula, brevis, durat lignosa, vivax, aliquot fibris donata est: tota planta amaricat.

Clus. descriptionis author vocat in Pannon. *Polygala* p. 314. & 315. *Polygalam* vulgarem maiorem purpurei coloris, variantem albo & cæruleo: In post. Hist. *Polygalam* vulg. maiorem 1. Item, *Polyg.* vulg. maiorem secundam: variantem etiam quibuldam umbrosis & humidioribus locis, floris colore aut cæruleo, aut albo, non secus ac minor vulgaris, & perinde assurgentem ut modò descripta, sed minùs venustam. Pona autem pro secunda iconem à Lobelio pro *Polygala* albis floribus demonstratam.

Pro suo more frustra Compil. Tabern. tres figuras exhibet solo colore differentes, nec ullam trium laudabilem: *Polygala* 1. maior alba, *Groß weiß Creugblumen*: *Polygala* 2. maior cærulea, *Groß blau Creugblumen*: *Polyg.* 3. maior purpurea *Groß Purpuror Creugblum*.

C. Baub. phyt. *Polygala* 1. siue maior, flore varians.

Compil. Tabern. n. 111

Locus

Frequens est admodum in Leytenberg supra Manderstorf, circa Medelng, totaque illa montium serie, quæ à Calenberg Danubio supra Viennam imminenti ad Austriacæ usque Alpes excurrit. Nusquam non occurrit similiter per Pannoniam, etiam interamnem, ultra Dravum flumen. Floret Maio & Junio. Aliquoties illam ob florum venustatem Clusius in hortum transtulit, & cicutatè voluit, sed operam luserit.

Tempus

POLYGALA VULGARIS COLORIS

obsoleti, foliis angustissimis.

CAP. CXLVIII.

Descriptio



que flosculi coloris obsoleti, & post hos vascula

PAucis aliquot ad surgit coliculis, aliquando etiam singularib. pediculis, alioribus, magna parte nudis: circa ima ferè foliolis vestitis quàm in reliquis Polygalæ speciebus angustioribus, acuminatis, prope terram tamen existentibus latiusculis & brevioribus. Ramorum extremis quo-

membranea, binis foliis lucentibus obducta, lineisque virentibus notata hærent, sed rariore stipatu, eaque serie, ut alterum post alterum ritè positum esse videatur. Tota spica palmum ferè adæquat: *radicula* simplex, dumiscula, alba, nullis penè fibris prædita. Facies plantulæ, hoc est, partium figura & color, facillè eam à reliquis Polygalæ speciebus distinguit.

In Gallia Narbonensis locis saxosis, collibus præsertim sterilibus propter Monspelium Æstate primùm prorumpentem observavit Gener Cherlerus, qui inde attulit: sat alioqui frequens loco suo natalitio, qui tamen rariùs occurrit: Fit enim ut unico quodam loco frequens obueniat, multà postmodum ab ea distantia nuspiam amplius appareat.

Locus & tempus

POLYGALA VULGARIS LVTEA.

CAP. CXLIX.

Polygala 3. siue lutea C. Bâuhin. in phyt. foliis est circa *radicem* rotundioribus, *flore* luteo, per reliqua similis vulgari, quæ prope Aquapendentem intra Florentiam & Romam provenit. Gener Cherlerus attulit nobis collectam prope littus Maris Adriatici, in qua nullum discrimen apparebat, præter colorem florisluteum: in vulgaribus enim folia etiam cum primùm exoriantur, rotundiora observantur. Cur Polygalam Anguillaræ negemus, colligere est ex capite de Polygala quorundam. Pona in Baldo vocat Polygalam Tragi floribus luteis à Iacobo Zvingero inuentam.

Locus

Anguill. Polygala negatur.

FINIS LIBRI VIGESIMI NONI.





HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM LIBER XXX.

CORONARIÆ ETIAM PLERÆQUE, VT PAPAVERA, ANEMONES,
GERANIA, RANUNCULI, VERBASCA ET AFFINES: ADHÆC SCROPHULARIÆ: SI-
deritides: Anthurina: Melampyra: Vitis: Cannabis: Lini & Linariz species variz.

VIDES quam à lasciuia Natura in Coronariarum societatem vel floris, vel solidum, vel faciei tantum
similitudine ascuerit eas, quas nihil minus, quam Coronarias dicat, & quas utique Cato in hortos, se-
vere non praecepit. Deinceps dicendis plerasque etiam Coronarias aut certe non multum alienas uno agmine
comprehendemus, ne librorum magnitudo, vel multitudo in immensum propemodum excreseat. Nam & compendio
interdum studendum, ubi multitudine obruimur, ut naturam sancere luxuriantem arte quadam coërceamus.

PAPAVER STATIVVM ET SILVESTRE VETERIBVS.

CAPVT I.

Papaver an-
tiquum.



Dea in tem-
pli manu
Papaver in-
notas.

NON se videt quondam rusti-
ca plebs, quantum lato totis
agris Papauere segetibus suis,
& futuræ annonæ officeret: Sed
religionis fortunæque Ceteris
rustici numinis ignara, quæ ce-
resle à Poëtis suis vocari aliquod Papauer audie-
rat, gestaræque manu Deam Papauer in templis
quotidie videret, facile credidit propitium sibi
rusticum fore numen, si, quod coli & ornari Dea
posset, copiosum sibi in aruis cresceret. Eamque
ob causam nullâ fruge magis quam Papaueris
confitos agros & hortos suos habuit Antiquitas.
Nec prius desit in tam multos vitæ vsus malam
frugem serere, semineque eius in cunctis se-
cundæ mensæ dulciariis uti, quin rusticæ rei
perita frugis eius maleficium cognouerit, &
poëtam nostrum ex meliore turis disciplina in-
clamantem omnibus audierit.

Vrunt lethæos perfusa Papauera somno.

Hisque non ad cibum, sed ad leuandum som-
no pro amissa filiâ dolorem Deam usam fuisse: &
in luctus fortunæ suæ memoriam mortalibus sem-
per ea subinde ostendere. Poëtam verò non in hoc
tandem, sed totius naturæ peritissimum hominem,
lethargici somni vim illis & potestatem assigna-
se. Neque enim lethæos obliuiosos simpliciter,
aut ab inferis repetitos potestate Papaueris fa-
Tom. III.

Etos somnos vocasse eum credimus: sed quod in
plerisque aliis idem fecerat concinnâ breuitate,
quæ fiat à liquore Papaueris, malam quietem si-
gnificasse. Nos primum de Papaueris generibus,
eorumque viribus & facultatibus dicturi sumus,
quàm de liquore verba fecerimus. Dioscorides
itaque quatuor Papaueris genera proposuit.
Mihon puer, Papauer erraticum, à flore protinus
deciduo, flore puniceo, interdum albo: de hoc
postquam puer, Papauer sativum, quod semine
candido est, & Dulacris vocatur: huius alterum
genus siluestre nigro semine quod *astir* nomi-
natur: quibusdâ potius, quoniam eius scapo lacteus
succus emanat: huius & tertium maius siluestre
& ad medicinas valentius. De his in præsentia
agimus, idcircoque eius verba adiungimus.

Papauer [*μῆλον*] quoddam sativum [*ῥαιον*] est
hortense [*αντιον*] cuius semen in sanorum vsum
ad panes adhibetur: eo etiam ex melle pro sesa-
ma vritur: Thylacitin [*θυλακίτις*] quasi follicu-
losum vocant. Capitulum id habet oblongum, &
semen candidum. Alterum & siluestre papaueris
genus, sessili caliculo, & semine nigro [oblongo
ver.] Nonnullis & ipsum Rheas [*ῥεας*] ex eo di-
citur, quod ab eoliquor emanet: Quod lithitis
quasi dolare nominatur. Est & tertium agrestius,
ac medicatius, hisque longius [Dodon. legit, mi-
nus] oblongo capitulo: omnibus in commune
vis est refrigerandi: proinde, si folia cum capitibus
ipsi in aqua decocta fuerint, somnum totum con-

Diosc. 4. Pa-
paueris 35
noto.

Sativum 36

Tertium ad
grosium, sed
medicatus

ciliant : bibitur & decoctum contra vigilias. Calyces verd triti & cum polenta cataplasmati admisti, inflammationibus ac erysipelatis profunt. Verum ex ipsis dum adhuc virent rufi singi trochiscos oportet, eosque siccatos ad vsum recondi. Ex iisdem quoque calycibus per se in aqua decoctis ad dimidias, iterumque deinde cum melle ad iustam spissitudinem percoctis, eclegma conficitur, quod in tussi, arteriz fluxionibus, colicisque affectibus doloris leuamentum prestat. Efficacius tamen redditur, additis Hypocistidis succo & Acacia. Papaueris autem nigri semen tritum cu vino vix potui datur contra fluxionē alui floremque muliebrem. At in peruigiliis fronti temporibusque ex aqua imponitur. *Additur & 3. μῆλον καρατῖτις αἰ 3. ὀβάλον.* Papauer corniculatum, à calyculo in corniculorum modum inflexo, aut marium. 4. *μῆλον ἀφρόνης,* Papauer spumeum, quia tota herba est spumosa, quibusdam *ἡράκλειον* Heracleum. De his suo loco.

Theophr.

Theophrastus Papaueris sativi i. hist. 1. & 18. & 19. & lib. 9. cap. 8. meminit: Siluestris verd genera 9. hist. 13. plura notauit: quoddam enim Corniculatum, quoddam Nigrum, aliud Erraticum flore ruffo, aliud Heraculeum nuncupatum folio Scythii. De satiuo autem loquens inquit: succus inest lacteus: è capite lactisuccatio fieri solet, quod huic soli est peculiare.

Plinius.

Plinius lib. 19. c. 8. tum nigrum, tum candidum inter satiuia numerat: Papaueris satiuia tria genera inquit, *Candidum* cuius semen tostum [Cocetum id bellarium vocat Festus & Tertullianus contra Valent.] in secunda mensa cum melle apud antiquos dabatur, (ebedatur, M.) Hoc & panis rustici crustæ inspergitur (inspergunt, Dalech.) affuso ovo inhaerens, ubi inferiorem crustam [que feruorem artingit] Apium Githque cereali sapore coniunt. *Alcerum* genus est Papauer nigrum, cuius scapo inciso lacteus succus excipitur. *Tertium* genus Rhœam vocant Græci, id nostri erraticum, &c. Plinius hæc non satis distinxit, ut capite de Papauere erratico annotauimus. Idē rursus lib. 20. cap. 18. satiuia, albi, & nigri meminit, ac e. 19. inter satiuia & siluestria medium genus constituit, Rhœas siue erraticum: Syluestrium vnum genus ceratrin vocant, inquit, nigrum, quidam Glucium, alii *παράλιον* vocant, interdum è siluestribus Heracleum vocatur, ab aliis Aphron. Tertium genus est Tithymalon, Mecona vocant, alij Paralion.

Quæ Galenus de Papauere scripsit, legantur postea inter vires. Fuisse Papauera in honore apud Romanos semper, sunt indicio, 1. Tarquinius superbus, qui legatis à filio missis decurriendo Papauera in horto altissima, sanguinariū illud responsum [nempe principum virorum Gabianorum capita præcidenda esse, quod vnius eius tyrannis stabiliretur] hac facti ambage reddidit, Plinio lib. 19. c. 8. teste. 2. Pausanias qui commemorat in Corinthiacis extare Veneris simulachrum altera manu tenens Papauerum capita. 3. Poëti à quibus celebrata fuisse comperimus. Papauer enim illis dictum scimus. Cereale, Lethæum, Vescom, Soporiferum, Fecundum, Gravidum, Plenum sapore, Agreste, Frigens, Medicatum, Luteum, Candidum, Purpureum, Capitolum, & Grauiserum, ut ex variis colligi potest auctoribus.

Herba app. Batianet.

Mecona potius satiuum, sunt qui Chamæscen, qui Papauer rhœada, qui Oxygonon dicunt: sed Egypti Nanti, & Romani satiuum Papauer vo-

cant. *Μῆλον* autem à *μηλον* non ministrando; quod vescientes suis munis fungi non possint, dictum legitur.

Papaueris hodie genus multiplex. Est enim *Papauer multiplex* satiuū, quod ipsū aut album, flore vel simplici, vel pleno amplissimo: item semine luteo, cum vngue rubro: & capitulis apertis semine cinereo: Aut purpureum flore vel simplici, vel pleno maximo. Ambo rursus, album sc. & purpureum flore fimbriato: Aut rubrum: Aut nigrum: Aut denique flore multiplicato diuersorum colorum. *De his mox dicturi sumus.*

Est & siluestre Rhœas nominatum, maius, flore pleno, & albo, itemque minus, Argemone exigua Tragi. Papauer erraticum alterum Matth. de quibus postea. Papaueris erratici speciem existimat Tragus Anemonem tenuifoliam: Est & Papauer corniculatum luteum, & phœniceum alterum, ac tertium violaceum. Papaueris etiam nominē insigniuntur. Glucium Diosc. Hypocœum Clusii. Melanth. flore maiore. Ficus infernalis Papauer spumeum. Cyanus Columnæ. Papau. spumēum Cæsalp. Mucipula altera. Beenalbum officinarum. Saponaria. Lychnis fily. Gratiola. Tithymalus minimus angustifolius. Peplum. Centaurium maius. Malus panica. Piper album. Melanth. flore minore. Nymphaea lutea. Sunt tandem qui Legumen esse velint Papauer, sed in eo errant, cum Papauer non habeat grana in siliquis.

Siluestre

Equiuoca

PAPAVER SATIIVM.

Papauer quod in hortis seritur, digitali crassitudine circiter radicem habet, amaro lacte, si-

Descriptio

Papauer album




cui & tota planta, turgentem. *Caulis* surgit cubitum vnum aut duos alius, in alas diuisus, leuis plurimum, nonnunquam modicè hirsutus: cui *folia* adnascuntur Lactuca, oblonga, laciniata, crispa, colore glauco: *flores* alias simplices, alias multiplices, fimbriati & nō fimbriati, colore albo, rubro, carneo, variegato: quibus *radix* succedūt, globosa, ven-

triosa magis, magisve oblonga, aliis pugno paria, aliis iuglandi, stellato operculo interfecta, septis membranis *semen* nunc atrum, nunc fuscum, nunc album, discusum continet: odorem spirat virens planta virosum & *capitulum* at hæc in genere, species enim ex synonymis facillè est elicere.

Fuchsius Papaueris satiuia duplex genus, album videlicet, cui florem & semen candidum adscribit. Et nigrum quod semine nigro constare ait, v-

Fuchso g. duplex.

nā pi-

Papaver fimbriatum flore purpureo & albo.

nâ picturâ complectitur. Castor album & nigrum pingit. Acoſta Ital. de Aromat. memorat opium fieri ex lacrymis maximorum capitum incisorum Papaveris albi in India, rarissimè ex nigro: Meconium vero ex succo totius plantæ: Hier. Brunſch. meminit Papaveris nigri, quod *Remisehen Magſos*, & communis semine cinereo, quod *veiff-grav Magſos* appellat.

Trago ſipil

Tragus. Papaveris sativi septem genera, herbâ quidem, caule, radice & succo admodum similia, at flore & semine totis differentia prodidit. I. Vulgarissimum flore supernè candido, infernè verò purpureis maculis notato, semine incano, capitibus apertis. II. Flore planè candido, capite oblongiori, & ut in sequentibus quinque, clauſo, semine itidem candido. III. Flore similiter candido, infernè rubris maculis infecto, semine flavo. IIII. Flore proſus rubeo, semine prægnans fulco. V. Flore roseo, purpureis infernè punctis maculato, semine præditum nigro. VI. Floribus candidis, hisque per ambitum supernè incis, semine albo. VII. & vltimum floribus robeis, ac his quoque per orbem supernè dissectis, semine fulco.

Lobelii cō

Lobel. in Aduers. tritz admodum cognitionis omne Papaveris genus esse ait, sed difficultis ab Amenon. cur tanta similitudine Rheas coniungi scribit, ut planè eadem iudicio multitudinis cōstitueretur. Dignotionis, *Papaveris vero sativi has differentias assignat.* I. Papaver album. II. Papaver fimbriatum [aut cristatum, addit in append.] album, capitis corollâ radiolis argutioribus & dentatim crenato ambitu donatâ: III. Papaver nigrum sativum flore Maluæ hortensis, aut Pæoniz, l. a. guineo saturo, semine nigro. IV. Sativum nigrum cristatum: in append. Papaver fimbriatum aut cristatum nigrum. V. & VI. Papaver parvum album & rubrum, officinis etiam notum, nec vlla in re à superiore albo & rubro vulgari discrepans, nisi foraminulis in superna capitis parte parulis. VII. & VIII. Papaver spontaneum hortense & sylvestre semine interdum nigro, aliàs albo, floribus dilutè rubentibus, obsoleto aspectu, capitulis triplè minoribus, quandoque huius osculis, quandoque oclulis.

Dodon. tria

Dodonæus de Purgant. Sativa Papavera tria agnouit, album, & nigrum, ac vtrumque in agnum, & minus tertium. Duorum autem priorum quandoque florum folia pluribus iucilaris dissecta scribit. In hys. l. 1. in fol. his plura addere videtur: ac quatuor facere, quæ Veterum speciebus etiam accommodare conatur.

Tom. III.

Papavera sativa hæc numerat Gesner. hort. Papaver minus nigro semine, nigrum, vel commune in hortis abundans, de quo alicubi agri obſeruntur, quodque alicubi sylvestre nascitur. Papaver album sativum flore & semine candidis. Huius & altera species, florum folijs dissectis. Papaver rubrum, capitibus Dodonæo rotundioribus, &c. Huius species folijs crenatis, &c. *ſem in append.* hort. Papaver Memphyticum floribus magnis multifidis, album & purpureum, & mediij coloris: quod idem cum eo putat Gesnerus, quod aliqui recentiores Papaver Ophj vocant, semine coloris albi, ad roseum vergentis. Papaver nigrum dissectis floribus, albis, roseis & rubris. Papaver flore multiplici. *In cat. plant.* Papaver sativum, *μικρον κισσινον*, *Garten Magſos*, du Pavor blanc. Papaver nigrum [unde Meconium expressione, & Opium vulnere fiunt] *μικρον η μελανα*, *ſchwarzzer Magſamen*, du Pavor noir.

Tabern. frustra novem figuras ponit: has enarrans species. Papaver sativum siue hortense. Papaver flore niueo. Papaver polyanthes. 1. Papaver polyanthes. 2. Papaver Polyanthes 3. Papaver polyanthes 4. Papaver album polyanthes minus: Papaver multiflorum niueum: Et Papaver multiflorum purpureum.

Tabern. frustra 9. figuras exhibet.

Hort. Luf. hæc sunt Papaveris sativi differentia, Papaver sativum album. Papaver spontaneum: Papaver nigrum sativum flore Pæoniz simplicis: Papaver fimbriatum rubrum: Papaver multiflorum niueum: Papaver fimbriatum carnei coloris flore: Papaver multiflorum rubrum: Papaver Polianthes purpureum.

H. Luf. 8. sunt differentia.

Casp. Bauh. in phyt. hæc recenset: Papaver I. siue hortense semine albo, sativum, Dioscoridis, album Plinij: II. siue hortense nigro semine, sylvestre Dioscoridis, nigrum Plinij: III. siue vulgare, capitulis foraminibus hiansibus, semine incano, *εχιδνις* & *φάρμακος* *εχιδνις* Dioscoridis: IV. siue flore rubro, semine fulco: V. siue cristatum album floribus & semine. VI. siue cristatum, floribus rubris, semine nigro. VII. siue polyanthes nigrum.

C. Bauh. 16. idem.

Camer. in horto Papaveris sativi varias differentias comprobat, inter has autem potissimum papaver flore pleno elegantissimi coloris, albi, rubri, purpurei, & ex his mixti.

Camer.

Casp. papaveris sativi species tres constituit præcipuas. Sativum scilicet, cui capitulum est longum & semen candidum: sylvestre, quod caput habet depressum & semen nigrum: & sylvestris, quod albo constat semine, multò illis longius, productiorèque capitulo, ut habet Dioscorides. Cætera vero sylvestria, inquit idem Casp. pinus, nominavit Dioscorides, non quodd spontè, & per se nascantur [seruntur enim omnia] sed quodd asperiora, hirtioraque proveniant, tum caule, tum capitibus, tum etiam folijs: quodd præterea nigrum, asperumque proferant semen: quodd denique serantur in campestribus segetum & leguminum modo. Rem autem se ita habere testari videtur Plinius lib. 19. cap. 8.

Casp.

Græcis *μικρον*: Lat. Papaver: nonnullis *εχιδνις*: Nomina Germ. *Magſamen* & *Olmag*. Belg. *huel* & *Manſcop*: Gallis *Pavor*: Italis *Papavero domestico*: Hisp. *Dormideras* & *cascall*: Anglis *Poppy* aut *Cheshoult*: Boh. *Mak*.

Vere seruntur papavera in hortis, ac etiam non raro in ipsis arvis: frequentissimum tamen illud, quod caule, folijsque, floribus item & capi-

Locus & Tempus.

Tt 2

tulo minus est, cuiusque flos è cæruleo ac purpureo obsoletum & dilutum quendam colorem refert, quod crebriò non satum pluribus quoque reperitur locis, præsertim tamen in hortis. Album viret ex semine deciduo, mense Ianuario in horto meo Genevæ, vbi hyemem pertulit, floruitque Iunio. Papaver flore albo densissimo & amplissimo folio, suffulto, spectatu pulcherrimū, ut sambucus roseus, floruit in horto Illustr. E. C. mensis Maij principio, & Iunio. Diversorum colorum densò & suffulto flore primū vidi in horto Canonici D. du Tarte florens Iunio Stæ. Hippolitæ. Monbelgardi in horto Principis flore suffulto subcæruleo: item rubro, phæniceo & cinereo, vnguibus albis ornato, calycibus oblongis: semine albo punctis rubentibus asperso. Nigrum siue vulgare, Monspelij, Genevæ, & Lugduni floret Maio. Genevæ Papaveris floribus dissectis aliquot species observavimus, quarum meminit Dodonæus: Hyemem pertulerunt plantæ ex semine deciduo, vna flore albo in inferiore parte, in superiore incarnatò: alia flore purpureo infra, supra rubro: florēt mense Iunio. Papavere candido passim abundat Hetruria. Virisque verò nigris scæret vniuersa Insulæ tellus: sed præcipuè apud gentes quæ Tridentinas incolunt valles, vbi Papavera hæc copiosè feruntur in campis, & inter legumina, præsertim inter Fabas.

Vires & Vfus.

Seminis papaveris albi vires & vsum in cibis ex Dioscoride antè diximus: Opij & Meconij vires postea perstringemus: Quæ verò Plinius & Galenus de papaveris viribus prodiderunt, legenda postea ex ijs cap. de Opio. Addemus hic tantū: Plutarchum memoriæ proditum esse narrare spiritum à papavere defluentem non cautè observatum ab ijs qui succum colligunt, subverttere homines. Omnia verò papaveris genera frigida & sicca esse ad quartum gradum, ut author est Dodonæus: atque ex Eliano, animalia apibus nocua, viridi papavere locum antè alveos sternendo, depelli.

Spiritus à Papavere defluens cautè observandus.

OPIVM ET MECONIVM.

C A P. II.

Papaveris liquoris vires & vsum.

Papaveris liquor refrigerat magis [quàm papaveris nigri semen] incrassat exsiccatque. Sumptus Erui magnitudine, dolores sedat, somnum conciliat, & convectionem adiuvat: tussi cæliacorumque affectibus auxiliatur. Verum si copiosior hauriatur, accessito lethargo etiam mortifer est. Est & ad capitis dolores efficax, si cum rosaceo irrigetur: vti & ad aurium dolores, si cum Amigdalino, Myrrha, & Croco instilletur. Oculorum inflammationibus cum oui luteo tosto & Croco proficit: erysipelatis ac vulneribus, cum aceto: podagris, cum lacte muliebri & Croco: denique sedi pto balano subditus somnum facit. In eo liquoris genere præstantissimus censetur qui densus & gravis est [Lacuna legit ex vet. cod. *ὁ σικκώτερος ὁ βαρύτερος*] odoratu soporifero, gustu amarus, quique faciliè aquà diluitur, levis, candidus, neque asper, neque grumosus, quique inter colandum non vti cæra coit densaturus, sed Soli expositus diffunditur, & ad lucernam accensus, minimè atrà obscuratue lucet flammæ: qui denique, postquàm extinctus fuerit, suam odoris vim etiamnum conseruat. Ipsum

porrò admixto Glaucio, aut Gummi, aut silvestris Lactucæ succo adulterant. Verumtamen qui Glaucio fucatus est, dum diluitur colorem Croci reddit, qui verò agrestis Lactucæ succo, exili & evahido est odore, asperiorque spectatur: qui denique Gummi viciatus est, inualidus est, inodorus, atque pellucidus [Addit Lacuna ex vet. cod. *ἢ ἀσκή*]. Nec desunt qui eò dementiæ deaenerint, vti & adipem illi admiscerent. Porrò ad oculorum medicamenta fictili nouo torretur, dum mollior, fuluioque appareat. At Erasistratus, Diagoram testatur illius vsum damnassem in agrium doloribus & oculorum lippitudinibus, quoniam & visus aciem hebetaret & Torporifer esset. Addidit Andreas protinus excæcatum iri qui eo illineretur, nisi adulteraretur. Mæsi demus præterea duntaxat vsum olfactandi probavit ad conciliandum somnum, alioqui seu noxium damnat. Quæ quidem omnia commentitiæ esse experimento deprehenditur, siquidem effectus vitium huiusce medicamenti fidem facit. Quare non abs re fuerit liquoris illius excipendi rationem subtexere. Nonnulli capita foliaque ipsius tendunt & prælo exprimunt, mox terentes in mortario, pastillos effingunt: id Meconium vocatur, multum Opio ignavium.

Porro Opij faciendi ratio hæc est: Cum ros exaruerit, stellulam [quæ in summo capite Papaveris visitur] cultello intra scarificare oportet, vti ne penitus intro adigatur, & à capitis lateribus per directam summam cutem incidere, & erumpentem lachrymam digito in conchulam abstergere, ac non ita multò post eò redire: tum enim rursus & alia densata reperitur, atque etiam postero die. Tandem in pila teri & in pastillos coacta reponi debet. Verumtamen interea dum inciditur, retrocedendum est, vti ne liquor vestium affricu deradatur.

Papaverum & Opij vires Galenus pluribus locis exposuit, libro sexto, simplicium medicamentorum, sic inquitens. Papaver alterum Rhœas nuncupatur, quodd scilicet celeriter flos eius defluat. Alterum domesticum, quandoquidem colitur. Quin & alteræ duæ sunt præter has species silvestris Papaveris: alterum velut incidentem calycem sustinens: alterum longiorem quàm illud calycem obtinens, totum autem procerius, ac squalidius. Ab hoc succus defluit, atque hinc est, quodd hanc speciem quidam Rhœa nominant. Porrò omnium facultas refrigeratoria est. Cæterum sativi semen, quod & Thulacite cognominant, medioeriter somnum conciliat, visu candidum: proinde panem ipsum inspergunt, ac melle maceratum edunt. At eius quod primo loco recensuimus, cuius florem celeriter decidere posuimus, validius semen refrigerat, ita vti nequaquam eo quis innoxie solo vti possit, siue sativo siue domestico melli admiscens. Admodum verò si ita sumptum sit, somnum conciliat. Cæterum, pusillum eius inspergunt ijs, quæ ex melle conficiuntur, bellarijs, ac placeatis, panibusque. Porrò tertio loco dicti semen atrum, etiam medicamentosum est: admodum refrigerans. At quod quarto loco positum est, omnium medicatissimum, tum in semine, tum in calyculis, tum in folijs, tum in succo. Validè enim frigiditatis vehementiam retundunt. Est enim ex quarto & ultimo refrigerantium ordine. Porrò quo pacto maximè ex methodo missionem facere oporteat, non est præsentis tractationis proprium. Et lib. 2. de compositione medicamentorum secundum locos, de dolore capitis agens citra manifestas causas

festas causas oborto, ita de Opio differit. Raro, inquit, cogimur Pharmacis ex Opio uti, cum videlicet præ doloris vehementia homo de vita periclitatur. Quanquam & tunc solidæ partes ex eius uso offendantur, aded ut post hæc correctione opus habeant. Sic & ex Opio collyria multis detrimenta fuerunt, aded ut debilem oculum reddiderint, & visus hebetudinem, ambliopiam Græcis appellatam, induxerint: velut etiam auditus gravitatem inducunt quæcunque ad vehementem aurium dolorem ex Papaveris succo sunt composita: at verò ob capitis dolorem vehementem nemo unquam animi deliquit comprehensus mortuus est, neque se ipsum occidit.

Castile.

Ex quibus sanè omnibus admoniti debent esse Medici, ne temerè, aut inconsultè ad usum Opii se conferant. Sed ratio quæ id corrigendum, administrandumque sit, ex ipso Galeno colligi potest lib. 8. de compositione pharmacorum secundum locos, ubi scripsit Calefacientia misceri, quæ refrigerantium stupefactionem deducere possunt, Castoreum, Piper &c.

Atrius de viribus tractat lib. 1. serm. 1. verum cum omnia iam sint dicta ex Galeno de simplic. ea hinc non repetimus,

Plinius.

Plinius lib. 20. cap. 18. hæc de Papavere & Opio memoriz prodidit: Papaveris sativi diximus genera: & spontè nascentis alia promissimus. Sed sativi albi calix ipse teritur, & è vino bibitur somnificans. Semen Elephantias medetur. E nigro Papavere [è nigro potius, quàm albo Papavere, Opium fieri nusquam Dioscorides scribit. Valentius à nigro verisimile est, imbecillius ex albo.]

Plin. duplici.

sapor [saporis vocabulo πικρὸν Græcorum Plin. voluit exprimere, duplici errore: altero, quod liquoris esset sit, id est, manans spontè lachryma, non autem χυλὸν, id est, succus herbæ trita expressus: altero quod ad id papaveris albi, non nigri scapus inciditur] gignitur scapo inciso, ut Diagoras soadet, cum turgescit [grædescit & ad florè properat] ut Iollas, cum desforescit horà diei sereni, hoc est, (circa meridiem) cum ros in eo exaruerit. Incidi iubent sub capite & calyce (sub capite ante florè, sub calice post florè) Nec in alio genere ipsū inciditur caput. Succus & hic, & herbæ cuiuscunque, lana excipitur: aut si exiguus est, ungue pollicis, ut Lactucis, Constantinus legit, aut conchis, in dictione ὀστρά. Ego nihil muto. Glaucio enim & silvestribus Lactucis succum detrahi solitum Dioscorides prodit, quo verum Opium adulteraretur, & postero die magis quod inaruit. Papaveris verò latus densatur, & in pastillos tritus in umbra siccatur, non vi soporifera modò, verum si copiosior hauriatur, etiam mortifera per somnum: Opion vocant. Sic scimus interemptum Licinij Cecinnæ prætorij viri patrem in Hispania Bauili, cum valetudo impatibilis odium vitæ fecisset: item plerosque alios. Qua de causa magna concertatio extitit. Diagoras & Erasistratus in totum damnavere, ut mortiferum, infundi vetantes. præterea quoniam visui noceret. Addidit Andreas, ided non protinus exacerari eo, quoniam adulteraretur Alexandria. Sed postea usus eius non improbatum est medicamento nobili, quod Discodion vocant. Semine quoque eius trito in pastillos è lacte vuntur ad somnum: item ad capitis dolores cum rosaceo. Cum hoc & aurium dolori instillatur. Podagris illinitur cum lacte mulierum. Sic & foliis ipsis vsuntur. Item ad sacros ignes & vulnera

Semen.

Tom. III.

ex acero. Ego tamen damnaverim collyriis addis multoque magis quas vocant lepyretas, quæque pepticas & coeliacas. Nigrum tamen coeliacis in vino datur. Satiū omne magis rotundat capita. At silvestri longum & pusillum & ad omnes effectus valens. Decoquitur & bibitur contra vigilias, eademque aqua fouent ora. Optimum in siccis, & ubi raro pluit. Cum capita ipsa & folia decoquuntur, succus Meconium vocatur, multum Opio ignavior. Experimentum Opii est primum odore: sincerum enim perpeti non est, mox in lucernis, ut puta luceat flamma, aut extinctum demum oleat: quæ in fucato non eveniunt. Accenditur quoque difficiliter, & crebro extinguitur. Est sinceri experimentum & in aqua, quia nebula innatat: fictum in pustulas coit. Sed maxime mirum, æstivo solo deprehendi. Sincerum enim ludat, & se diluit, donec succo recenti simile fiat. Moesicles optimè servari putat Hioscyami semine adiecto: talij in F. b. Idem, ubi lib. 20. c. 29. locutus fuit de Papavere teratite, addidit sequentia. Alterum è silvestribus genus Heraclion vocatur, ab alijs Aphron, foliis (si procul intuearis) speciem passerum præsentantibus, radice in summa terre cure, semine spumeo. Ex hoc lina splendorem trahunt. Æstare. Tunditur in pila comitalib. morbis, acetabuli mensura in vino albo vomitiones enim facit, &c.

Affernatis.

Heraclion.

Ex Trago.

Prodest Papaver, Trago referente, & iis qui vertigine laborant, experientia hoc testatè, quietem inducit, somnumque conciliat, tam inuenibus quàm senibus, quo uque modo assumere libeat, Quin & infanibus, quado inquieti & insomniis laboraverint, in lacte vel pulve concoctum exhiberi potest hoc semen. Omne Papaveris genus, tam sylvestre quàm sativum, & non solum herba eius expressusque succus, sed & Aqua distillata Phreneticis, & his qui insomniis laborant, utilissima sunt, emplastrum modo fronti vel temporibus imposita. Si Errhinon in succo herbæ Papaveris intinctum naribus indas, somnum quamprimum induces. Aqua in quâ capita papaverum decocta fuerint, easdè facultates obtinet, sacris etiam ignibus imposita, opitulatur. Aurium dolori cum oleo Amygdalino vtiliter instillatur. Aqua ex herbæ floribus & capitibus papaverum distillata ad eadem omnia efficax est. Oleum Papaveris circumcirca tempora linitum allicit somnum, ut Clem. Clementinus perhibet.

Aqua distillata.

Oleum.

Gentes, quæ Tridentinas incolunt valles, teste Matthiolo, papaveris semine vescuntur, misto placentulis quas ex pasta foliosa multiplici involucro conficiunt. Comedunt illi quidem hæc placentas ad saturitatem usque: nec ob id tamen unquam (quod mirum alicui forte videbitur) diuturniore somno capiuntur, neque veteriosi fiunt, Quin nec illi etiam, qui Stiriam, superiorèque Austriam incolunt in veterum incurrunz: et si oleum è nigri papaveris semine expressum in cibis continud assumant, Olivæ olei vice. Ea denudè experientia fecit, ut intrepidè quandoque ausus sim papaveris seminis cremorem, Hordei decocto expressum in ardentissimis febribus ad sitim extinguendam, somnumque conciliandum etiam longius exhibere. Hinc præterea factum est, ut cum metum excusserim, & deposuerim, quæ mihi olim præceptorum meorum graves admonitiones incoherant & ingesserant. Hæc Matth. addit in hist. Germ. Sciendum, inquit, Germanicū papaver, non ita refrigerare ut Veteres de suo scripserunt, id in causa proculdubio regionis &

Placentula semine mista.

Papaver germanicum non ita refrigerans.

T t 3

æris proprietas. Deinde in commentariis suis de Opio hæc dicit. Quamuis Opium quarto excessu frigidum statuatur: tamen si ex sapore, & affectu rerum temperamenta & qualitates cognoscuntur, Opium nostri vsus [quantum equidem deprehendere potui] non modò gustui amarum percipitur, sed etiam acre, aded ut paululum in ore detentum linguam & palatum exulceret. Unde haud dubiè colligi posse putauerim, calidissimas illi inesse qualitates. Cuius rei fidem augere potest, quæ ex eo prodit odoris grauitas. Veruntamen ne impudens, atque arrogantis nomen subeam, quod in hoc omnium ferè medicorum sententiam destruere velim, eorum iudicio rem hanc æstimandam relinquam qui ante nos Opium qualitates, tum facultates diligentissimè expenderunt. Sed fortè ea acris, amaraque facultas in Opium faciliè inuehitur ex Glaucii adulteratione, quod illi sæpius admiscunt, ut Dioscorides annotauit. Illudque argumento esse potest, quod aqua colliquatum croceum colorem reddat. Adde quod Opium quod hodie ad nos conuehitur non est illud verum & legitimū è lachryma, quæ ex inciso Papaueris capite exeat, concretum: sed potius hoc è foliorum & capitum contritorum succo confectum est: idque Meconium vocatum erit, Opio longè deterius. *Hæc Matth.* Sic etiam Amarus, Quod ex Apulia hodie Venetias afferunt, inquit, reuera Meconium potius, quàm Opium appellari meretur.

Hispanicum Opium nonnulli aliis præstare existimant: inquit Cornarius, Acrius aliquando Asianum, aliquoties etiam Achaicum probat. Alii Thebaicum præferunt. Scribonius Opium laudat quod ex lacte ipso siluatici Papaueris capitum sit, & non ex succo foliorum eius, ut pigmentarii institores eius rei compendii causâ faciant. Illud enim cum magno labore exiguum conficitur, hoc sine molestia & abundanter teritur. Quod ipsum etiam Plinius l. 20. cap. 28. dixit his verbis. Quum capita ipsa & folia decoquantur, succus Meconium vocatur, multum Opio ignauior, &c. Nam eadem Diosc. etiam lib. 4. tradit. Galenus tamen & authores qui ab ipso in his libris citantur, indifferenter modò *μυκάνιον*, modò *ὀπιον* dicere videntur, & nos *μυκάνιον* succum Papaueris, *ὀπιον* itidem, ut Græci, Opium reddidimus. Officinæ nostræ vno ore Thebaicum prædicant, emuntque Antuerpiæ & Francofurti, sed ubi paratum sit, prorsus ignorant. Dicitur verò indifferenter Opium, succus, lac, & lachryma: si quis autem vulgare nostrum ratione atque experimento [quæ firma sint artis nostræ, ac veritatis præsidia] agnoscere laborat, merè adulteratum reperiet. Addendum hic quæ obseruauit Bellonius Obser. 3. cap. 15. Opium nunc sit in Turchia, maxime in Achara, Carachara, Spartada, Emetelinda, & aliis vrbibus vicinis Paphlagoniæ, Cappadociæ, & Ciliciæ. Conferunt agros Papauere albo ut nos Tritico. Serendo obseruant ut vnusquisque rusticus tantum serat, quantum putat se habiturum homines qui colligant, ubi Papauer capita produxit, leuiter dissecant, unde effluunt aliquæ lactis guttæ, quas concrefcere sinunt: nullus autem est Turca qui non cõemat, etiam pauper, & secum circumferat, tum tempore pacis, tum belli. Mercator quidam Indus ex Natolia, ceterò nobis affirmauit nullum elabi annum quin efferrentur ex Paphlagonia, Cappadocia, Galatia, & Cilicia onera quinquaginta Camelarum, ut transferrentur in Persiam, Indiam, & Eu-

ropam, & in alias regiones longinquas, ac etiam in vniuersum dominium Magni Turcæ. Quod vix credidistimus nisi particulatim recensuissent quid possit eff. rii ex vno quoque pagorum vicinorum Caracharæ, & aliis vrbibus Paphlagoniæ, Cappadociæ, Armeniæ minoris, & Gallogæciæ. Dicebat præterea maior in vno esse adhuc apud Persas, quàm Turcas. Semel experiri volumus quâ doli exhiberi posset vnâ vice sine nocumẽto, inuenimus quendam conuetum quotidie comedere, qui nobis præsentibus comedit pondus drachmæ dimidiæ, sequenti die dedimus ei comedere vnâ vice drachmam vnâ, nec vllum ei detrimentum euenit, nisi quod quâsi ebrius videretur. Turcæ commendant, qui sibi persuadent se magis strenuos & minus timidos periculorum belli reddi, ita ut Turcæ exercitum colligente ita consumatur, ut regio vacua eo remaneat. Solent interdum se mutuo conuiciari dicentes, *Opium comediisti*, sicuti nos dicimus ebrius es. Americus Christianus apud què diu viximus, nobis præsentibus sæpius vetecebat.

Nos Opium experiri sumus, verum nullum symptoma animaduertimus, nisi quod exalfaceret pectus, & nonnihil caput turbaret, & insomnia pareret. Credimus quod si in Europa, ut Gallia, Germania, & Italia ea diligentia adhibeatur in colligendo, quam adhibent, posset etiam fieri sicuti in Asia. Natoliæ clima est æquè frigidum atque Galliarum. Eadè a. ratione fit, quâ authores scripsere. Ac si habemus in Europa, fortè permixtū: Mercatores eorum multiplicat priusquam ad promocias distribuatur. Quum animaduertimus quibus notis sit dignoscendū hic subiciemus. Opium valdè amarum est; gustu calidum, ita ut os inflammer. Coloris est lurci, inclinantis in colorem pilorum Leonis, simul coaceruatum, massa veluti ex multis paruis granis diuersi coloris. Odor grauis est & vehemens: licet tribuatur ei vis refrigerandi, nihilominus os accendit. Opium in ipsa Natolia compingitur in massas non excedentes pondus vnciarum quatuor, aut ad summum semilibræ: Verum mercatores ut plus lucrarentur, multiplicat dimidium addentes, ita ut massæ quæ Venetias efferuntur ponderent ferè libram vnâ. Hæc Belonius.

Antidota Opium recipientia & narcotica sunt hæc, Theriaca, Diacodium Galeni quod Quercetanus in pharmac. non improbat, Diacodium compositum Aduarij: Diacodium Montagnanæ, quod ludat: pilulæ Cynoglossæ Nicol. præpositi apud Quercetanus: Requies Nicolai, apud eundem: Philonium Tharsense Galeni, Philonium Romanum Nicolai, Philonium versicum, Philonium Mesuzi Quercetani qui descriptionem ponit, & Laudana siue Nepenthes.

Luminare maius descriptioni emplastri contra rupturam adiungit Opium, quum multi sequuntur, & cæcus cæcum ducit. Opij autem Alexipharmacum dicebat Rondeletius esse vinum. Adreas Baccius verò Balneum aquæ temperatæ. Opium autem in colica non conuenire ostendit Petrus de Abano.

OPIVM OFFICINARVM.

CAP. III.

Papauerum lachryma quam scarificata capita plorant, ut ad nos adfertur atque in officinis afferuatur, placentis constat mutuo incumbenti-
bus

bus, non penitus viciam crassius, interiectis folijs, forte Papaverinis: substantiâ illi compacta sed ductilis, ponderosa, colore fusco vel è fusco rubente. Commansum dentibus adhærescit, saporemque amarum repræsentat. Odore est viroso *καρπικον*, & candelæ admodum in lucentulam flammam exardet.

De Opij qualitatibus contrarias acutissimo-
rum nostri seculi virorum sententias, huc referre
non est animus: eum & integri super hac materia
scripti fuerint libri, & ex autè dictis satis super-
que ea elucescere videatur.

*Addeamus tantum nos non posse animadu-
Opio opinis. tere quomodo præparatio Opii vel Meconij apud Quercetanus melior sit Veterum præparationibus, nisi quatenus minori quantitate exhiberi possit miseris ægris, qui pauca deglutire possunt: præparatione suâ an tollat fectorem considerandum, Veteres vt & ille mixtione aromatum minuunt, sed non tollunt: suâ præparatione non præstant vt minus nocens sit venenum: tantum hoc agit, vt facilius sumi possit: si exhibeat eâ quantitate suum præparatum Opium vel Meconium quo Turcæ suum non præparatum assument, profectò peribit is qui eius Opium vel Meconium præparatum assumer: eius igitur præparatio non facit vt nocentissimum venenum, vt ait, æstimatum, non maneat tale, vel transformeretur in vtilissimum & saluberrimum remedium, idem fecerunt veteres quod ille. Digestiones itaque Meconij minuire aut tollere malignitatem aut separare nunquam concesserimus, corrigi quidem accessione aliorum medicamentorum non negamus: præterea etiam inrendi illius vires facilius existimamus, nec terrestres partes quæ separantur, minuunt venenatam aut soporiferam qualitatem. Per Hyacinthos, Corallia, terram sigillatam, Puluerem Bezoardicum, & Unicornu, non censemus minui Opii malignam qualitatem: Probamus tamen in magnis doloribus cum fluore aliquo magno, non item in colico dolore à causa frigida à flatibus & obstructione alui.*

PAPAVER ERRATICVM VETERIBVS.

CAP. IV.

Description

Papaner extaticum Rhœas nominatum est Græcis [inquit Diosc.] ed quodd florem breui abieci. Nascur in arvis Vere, quando etiam colligitur: *Folia* similia sunt Origano, aut Erucæ, aut Cichorio, aut Thymo, fissa, sed longiora & aspera: *caulem* habet iuncum, rectum, alperum, cubitalem: *florem* Puniceum, quandoque etiam album, similem siluestri Anemone: [Tragus legit Argemone,] caput est oblongum, minus tamen quàm Anemones: *semen* fulvum: *radix* oblonga, subalbida, parvi digiti et assitudinem habens, amara. Huius capita quinque aut sex, cum vini cyathis tribus cocta vt ad duos deueniant, bibenda præbe ijs quibus somnum inducere voles. At semen acetabuli mensura cum aquâ malsa potum, aluum leuiter mollit. Ad idem præstandum mellitis placentalis, & dulciarijs libis admiscetur. Cæterùm, folia cum caputrum calycibus imposita, inflammationibus prosunt, Sed & decocto [*αῖμα* Bas. cod. *αῖμα* vet. cod. Lat.] ipsorum si quis persundatur, somnum inducit.

Sciendum autem est in hoc Dioscoridis con-
Tom. III.

textu impronidè comparari huius Rheadis Pa-
paveris folia Origani & Thymi folijs, non posset
dissimilior esse horum proportio. Habet enim
Rheas Erucæ siue Cichorij modo incisa folia, à
qua similitudine longissimè recedunt folia Thy-
mi & Origani. Abundant igitur, & ab aliquo ma-
lè adiecta sunt vocabula ista.

Plin. pro Rhœada Rhœam dixit, sic enim l. 19. c. 8. Tertium [Papaveris genus] Rhœam vocant id nostri erraticum. Spontè quidem sed in arvis cum Hordeo maximè nascitur, Erucæ simile, cubitali altitudine, flore ruffo, & protinus deciduo. Vnde & nomen à Græcis accepit. Idem lib. 10. c. 18. & 19. Inter sativa & sylvestria medium genus, quoniam in arvis spontè nasceretur, sed Rhœam vocavimus & erraticum. Quidam id decerptum cum toto protinus calyce mandunt. Alium exnaniunt capita quinque decocta in tribus vini heminis: pota somnium faciunt. Hoc & Dioscorides habet, sed cum vini cyathis tribus, falsè ut opinatur Cornar. voce *κνίδιον* pro *κνήδων* supposita, ex utriusque scripturæ decurtatione.

Galeno quoque Rhoeas hoc genus Papaveris appellatum est, qui semen ipsius vehementius frugesacere dicit, ut quis ipso solo uti non possit citra lesionem, sed melle admixto: quo modo acceptum somnum inducit. Quare modicum ex ipso placentis ex melle, & libis, & panibus inspergunt: Sic Plinij verba dicentis mandi Papaver erraticum solum contrariantur Galeno qui eo solo nequaquam uti posse prodidit.

Theoph. lib. 9. Histor. Rhœtada Cichorio syl-
vestri assimilem dicit, vnde etiam edatur. Nasci
verò in arvis, maximè inter Hordeum. Habere
florem rubrum: calycem vel caput, vnguis digiti
magnitudine. Colligante Hordei messem, sed
adhuc viridiorē. Purgare aluum deorsum.

Vehementer tandem errant, qui hoc Papaver,
cornutum Papauer, & Memichen, i.e. Glaucium
esse putant. Est enim qualibet illarum ab alijs di-
uerfa & proprii generis herba, teste Cordo in
Dioscoridem.

PAPAVER ERRATICVM RVBRVM
campestre.



Toto vultu Description;

Papaver
exprimit, in eā-
dem familiam
accensendum
ac eo argumēto
Fluidum nūc-
upatum, quod
flos postquam ē
bivalui vīridan-
ti hirsutōque in-
volucto per-
quā caduco se
explicuit, & ipse
quoque, puni-
ceo colore insi-
gnis, vnguibus
arcorubencibus,
quadrifolijs, nō
ita multō post
decidit, relicto
capitulo Papa-

neraceo, stellato umbilico, quod stamina circum-

stant purpurascens, apicibus ochre colore, semine continens minutum sulcum aut nigrum: pedem verò & sesquipedem longus est caulis, hirsutus, qui folia appolita Bursæ pastoris modo incisa, nec multò latiora, succum fundentia lacteum, Papaueraceum, patilq; odorem virosi: radix exigua est. Dodonæus Papauer erraticum duplex agnouit, & sic descripsit: Erratico Papaueri cauliculi & folia nigriora hirsutiora, quæ folia virinque altis incisuris, instar Cichorii, aut Erucæ diuisa: flores è fastigijs cauliculorum pulchro ac rubente phæniceo emicant colore, staminibus nigricantibus capitulum medium ambientibus: quod adustum minus est, sed tamen oblongioris formæ quàm tertij sativi: semen exiguum nigricat. Huic & alia minor species, folijs minoribus, oblongis, non Erucæ per margines diuisurâ, sed tantummodò serratis, reliquis priori similis.

Dioscoridi est *caulis paræ*: Lat. Papauer rhæas, siue erraticum: Gazz. Papauer ilaidum. Wistung. & officinis Papauer rubrum, siue rubrum, itemque Lolium: Germanis Clapper Rosen, kern Rosen, feldmag'samen, hirschal, volder Mahnfeld, Mah. Kleischen, Schmalblumen, Roter Mag'sodt, Roter kernblumen, & Kindsmagen: Belg. rooden buel, volder buel, Colloblumen: Gallis Pauer sauvage, Coquelicot, Confans & Poete Tabern. Burgundis Rose au ladre: Ital. Papauero siluatico & Rosolaccio: Hisp. Amapela Rosella, & Papoula: Angl. wild red poppy, Boh. Makovly.

Papauer Rhæas obseruavi Monspelij florens mense Martio & Aprili: Lugduni Maio: Genesivirens mensis Februarii principio, florens Iunio: Basilæ Maio, Iunio & Iulio: Montbelgardi frequens in agris, florens Augusto. Vnâ cum Tritico, inquit Dodonæus, Zea, Secali, Hordeo, Avena reliquisque frugibus in agris erraticum gignitur Papauer: non rarò quoque inter olera, ac secus margines hortorum. Bellè colorati flores Maio & Iunio pulchritudinis venustatq; quandam gratiam arvis conciliant.

Vires Papaueris erratici ex veteribus antè posuimus. Triadunt Recentiores sacro igni mederi. Mulierum menstrui profluvia compescere: sanguinem è naribus fluentem iecori impositum sistere. Lingua decocto eius lotâ, ardorem faucium sanare. Pudendorum tumores per id detumescere. Temporibus illiis phreneticis somnum conciliare: calidos oculorum dolores lintheo impositum mitigare: ac Pleuritidi: Febri ardenti, & dysenteris confetto.

ARGEMONE VETERIBVS ET IN GENERE.

CAP. V.

Argemone in totum Papaueri siluestri similis est, inquit Diosc. Folium autem Anemoniæ simile habet fissum: florem puniceum: caput simile Papaueri Rhæadi, sed oblongius & latum circa supernas partes: radicem rotundam. Succum autem remittit croci coloris, acrem. Purgant argemæ & nubeculas, & inflammationes mitigant folia imposita.

Galenus Argemonem vnâ nouit, cuius herbar vis est, ut ait, extensoria ac discussoria. Nec in veteribus Græcis & Latinis codicibus reperiri alteram Argemonem plerique asserunt. Itaque & altera Argemone, vbi quædam de priore leguntur, inter suppositicia semouenda fuerit.

Plinius l. 25 cap. 9. de Argemonia sic habet, ex veteris codicis fide. Folia, inquit habet qualia Anemone, diuisa Apij modo, caput in cauliculo Papaueris siluestris: autem radicem Succum Croci

colore acrem & acutum. Nascentur & in arvis apud nos. Tria eius genera faciunt, & id demum probant, cuius radix thus redolent.

Argemonem & Argemida dictam putat Hermodolus à Diosc. vbi de Anemone loquitur. Pandect. verò varias plantas Argemoniæ nomine commiscet. Cornario, Trigo, Rob. Stephano, Theoph. Galio in Onom. Regino, Matthiolo, Frischlino & alijs, Argemone est quam cum multis Papauer erraticum appellauimus.

Argemones nomine donantur etiam: Pap. Equinoca, corn. rubrum & violaceum. Glaucium. Chamaemelum Eranthemum. Alcea solifraga. Pantonilla. Argemone r. d. thus olente. Agrimonia. Targetes Indicus & Lunaria.

ARGEMONE CAPITVLO BREVIORE hispido.



Papaueracei generis haud absurdè quis existimauerit Argemonem Recentioribus proditâ, folio Adonidis aut Papaueris corniculati violacei, tenuiter dissecto, piloso: caulibus ex radice simplice gracilibus multis, pedibus & maioribus, tenuibus, hirsutis racemosis: flores sâr punicei, valdè caduci, paulò

Adonidis florib. maiores, formâ Papaueracea, capitula turbinata, nucleo Auellane paria, rigidulis spinulis vndiquaque, denticulatâ stellâ operculata, semine facta copioso, minutissimo, rotundo, nigro. Capitula in icone nostra minùs benè expressa. Monspelij & Heidelbergæ obseruavi.

ARGEMONE CAPITVLO LONGIORE spinoso.



Foliorum diuisio minuta Nigelæ citrinæ, pilis sterpis obsitorum cum per caules, tû per ramos, speros hirsutosque nascentiû. flores admodum caduci, purpurei, decuplò minores quàm Papaueris Rhæadi: capitula verò post se reliquant breuibz confectis spinulis minutissimis hispida, oblonga, canulata, stellato operculo te-

sta. Radix longiuscula, simplex. Circa Môipel, & Nemausû collegit Cherlerus.

Dysenyma
rum nomi-
nibus lin-
guarum.

Lotus &
Tempus.

Vires &
Vfus.

Malus.

GLAUCIUM VETERIBVS ET NEOTERICIS in genere.

CAP. VI.

Diosc.
Gari illa.
Stracur.Plinii
Lapsus.

Glaucium Dioscoridi succus est herbe ad Hierapolim Syriae nascentis: cui folia cornu-
n Papaveris similia sunt, sed pinguiora (λεπρό-
τρε) & humilia (χαλαρή) siue in terram sparsa,
grauicollentia [βαρύστα] seu tetro odore, ac gustu
amara [πικρία]. Marcello simpliciter amara
queque crocei coloris succum copiosum [χρυσό-
πολὺν κροκότρε] habent. Incolae sua in ollam (fi-
ctile) coniecta, sem frigida libanis calefaciunt
vsquedum flaccescant (in furnis non aded calen-
tibus vsque dum calore inarescant) deinde con-
tulis succum exprimunt. Est porro eius vsus ad
oculorum affectus circa principia: quippe quod
refrigerandi vim habeat: vel ut Corn. legit, vsus
huius est ad medicamenta ocularia, ut qui in
principio refrigeret.

Galenus Glaucium cum iniucunditate qua-
dam adstringere ait, & aded manifestè refrigera-
re ut solum sapè ignes sacros, non ita vehemen-
taret. Ille verò temperamentum ipsius compo-
situm ex aquosa & terrea essentia: quæ ambæ
frigida sunt, non tamen summe, sed ita ut fonta-
na aqua.

Sunt Plinio & Dioscoridi in Glaucii medicina &
& historia eadè serè omnia, ut ex hæcenus dictis
colligere licet. Sed quod hic solū pinguius dixit,
ille sordidius magno discrimine pronuntiauit. Di-
uersitatis autem ea potuit esse causa quod quod
nunc legitur λεπρότρε certa pinguedinis signifi-
catione: tunc σπυρρότρε i. sordidiora legeretur,
facillimo & lubrico in vnius literæ figura, & sen-
su ad contrariam & adulteratam significatio-
nem lapsu.

Plinii
error alius

Potro quod Plinius dixit, lactis quoque vber-
tas, &c. Dioscorides de Glauce prodidit. Quare
Glaucium cum Glauce confundit.

Glauci nomine sequentes insigniuntur Plan-
tae. Papauer spinosum. Papauer erraticum, Pa-
pauer corniculatum luteum. Papauer corni-
culatum flore Phœniceo. Papauer corniculatum
violaceum. Papauer erraticum Germanis forn-
rosen dictum. Chelidonium maius, sed malè.
Mala aurea, perperam etiam. Citysus. Sidethz
Turcicum: itidem malè ut monet Matthiolus.
Si Lobel. quandoque optaret tutum & utile
απορροισμῶν in initis fluxionum, malit è Soncho, si-
ue Cicorbis, aut Chondrillis succum elicere, &
impermixtum admoovere, ad ea quæ Dioscorides
Glaucio sanat, non minori, sed, ut inquit, certiori
commodo.

Sonchus.
Cicorbis.
Chondrilla

PAPAVER SPINOSVM.

CAP. VII.

Deser.

Ex omnibus Papaveris generibus, nullum
est cui aptius spinosum compares: quàm
corniculatum: siquidem folia, consimiliter la-
ciniata sunt, succo luteo prægnantia: pal-
mum aut sesquipalmum longa, utrinque gla-
bra, mollia, & laciniarum mucrones in fla-
uentes spinas exeunt acutas, parte supina folii
virorem intercipiunt, ut in Carduo Mariano,
macula lactea, postica parte neutiquam consi-
picienda, ubi tamè nerui acutis spinulis horrent,
sicut & costa, quæ supinâ parte innocens, cau-

Tom. III



lem verius ho-
nihil rubescit,
inde ad mu-
cronem vsquo
albet: & caulis
vnicus minaci-
bus spinis ar-
matus, dodran-
talis, eundem
illum succum
luteum viro-
sum è vulnere
reddes, capitu-
la sustinet ali-
quot Papau-
racea, sentico-
sa, in tria corollu-
cula aculeata
desinècia, quæ
de hiscentia flo-
res ostentant
Papaveris cor-
niculati luteos,

concoloribus fibris de mote medium occu-
pantibus, quos vascula excipiunt vndique aculeis
armata, oblonga, canaliculata, semine repleta, su-
pra vulgarem sortem magno, nigro, rotundo.

Cæterum, Papaveris huius spinosi plantam
in Italiam fuisse delatam nomine Figo del inferno,
hoc est, Fici infernalis, auctor est Ferd. Impera-
tus. Gerard. Anglus vocat Carduum Chrysan-
themum Peruanum, The Golden thistle of Peru.

Papauer
spinosum.
Ficus
infernalis

Ex semine Nonbergâ à D. Ioachimo Camera-
rio seniore missa, excreuit mihi in horto Ill. E.C.
qui Montbelgardi colitur, planta eâ formâ quam
icone & descriptione delineatam exhibemus,
florens Augusto: semine deciduo sequenti anno
provenit.

Locus
TempusDE PAPAVERE CORNICVLATO EX
Veteribus & Recentioribus in genere.

CAP. VIII.

Corniculatū Papauer [Μήλον κροκότρε] quod
Galii Paralium (παράλιον) alii marimum θαλάσ-
σιον] quasi in maritimis nascentis, & alii agreste vo-
cant, Aphri Simacha, Romani Fabiolum marinū,
folia habet alba, hirsuta (hirta Sarrac.) Verbasco
(φάρμακον) similia, serrata in ambitu, silvestris Pa-
paveris modo, & caulem non dissimilem, florem
pallidum (ex luteo pallecentem, Sarrac.) Fru-
ctum [siliquam Sarrac.] longum (ita legunt Cor-
dus, Corn. & Sarrac. μικρόν breuem Marcell. &
Basil. codex) in corniculi modum inflexum, ceu
Fœnugræci (τήληκος. Ald τήλιδος) vnde & nomen
habet: semen exile, nigrum, simile Papaveris se-
mini: radicem per summa cespitem nascentem,
nigram, crassam. Gignitur in maritimis & asperis.
Radici ea vis inest, ut decocta in aqua ad dimi-
dias coxendicum & iecinoris vitia potu sanat,
iusque profit qui crassa & araneola quædam cum
lotio reddunt. Semen acetabuli mensura ex aqua
multa potum, leniter aluum purgat. Illita ex oleo
folia, floresque, crustas emarginant: argemas &
nubeculas iumentorum inunctione depurgant.
Cæterum non desunt qui ex hoc Papaveris ge-
nere scitari Glaucium fieri putarunt, ob simi-
litudinem foliorum, inquit Dioscorides.

Pap. cornic.
Diosc.
Paralium

Galenus Papauer corniculatum est à fructu

V u

Vires

breuem curritatem habente, quemadmodum Fœnum græcum, vt bouis cotnu similis sit. Appellatur ab aliquibus Paralium: quoniam plerunque prope mare nascitur. Vim habet secandi & extergendi. Quare radix herbæ in aqua ad dimidias hepaticis affectionibus prodest. Folia & flores sordida valde & maligna vlcera repurgat, Sed vbi vlcera pura facta sunt, ab ipsorum vsu desistere oportet, in tantum enim extergent, vt etiam de ipsa pura carne quid absumat. Ob hanc certè vim non solum sordes, sed etiam crustas ab vlceribus auferunt.

Affectus
hepatici.
Cautio.

Theophr.

Porro, vnus satis Theophrastus est, vt cornicularis Papaueris historiam & tot nominum eius in Græcis ratione intelligamus. Huius, inquit, folium nigro Verbasco simile, minus tamen nigrum est. Caulis altitudo cubitalis. Radix brevis & in summa terra hærens. Fructus inflexus, siliquis, quas Græci Ceratia vocant, similis. Carpitur per messem. Aluum purgat. Pecoris albugines folium exterit. Nascitur ad mare petrosiis locis. Ex his dubitauerit merito, quæ sitque aliquis, Ceratiene hoc Papauer à cornuum figura simplicitate, vt Diosc. & Galenus voluerunt. An, vt in Theophrasto auditur, à Ceratis quas Latini Siliquas dixerunt, quæ & ipsæ inflexæ sunt, & cornuum figurâ per longitudinem incuruantur. Multi faciendâ Dioscoridis auctoritas, aliorumque omnium, qui eum secuti, corniculis fructum eius comparauerunt. Non spernendus etiam Theophrastus grauis auctor, in cuius sententiâ nos inclinamus animas, etsi nullum in re discernimus. Nec si cornibus, aut Ceratiis comparauerit Papaueris huius fructum aliquis, diuersam rem ostenderit. Ambo enim cornua sc. & Ceratia in longitudinem producta inflectuntur: nec siliquæ illæ aliunde quàm à cornibus Ceratiis à Græcis dictæ sunt. Ex eodem Theophrasto nouerit aliquis etiam, agrosse Papauer hoc rectè dici, communi tantum agrostibus aliis appellatione. In eorum enim censu est. Nec minus quàm ad mare nascitur Paralium: id enim ea vox significat. Et hanc naturæ nataliumque eius notam secuti Latini Fabulum marinum vocauerunt, quoniam ad mare nasceretur, fabaceisquæ siliquis in longitudine similia vascula sua ferret. Habere hoc Dioscorides ait folia *λευκά* i.e. candida. Hermolani verò quasi *λευκὰ* legeret, tenuia dixit. Nescio ego [inquit Marcell.] an ex suorum codicum lectione sic verterit: an potius à Plinio in ea re monitus candorem ad tenuitatem transfulerit. Ego communem omnium quotquot vidi, Græcorum codicum fidem secutus, candido colore folia eius esse dixi &c.

Dubium
de nomine
Papau.
Ceratiis.

Ceratia

Papauer
agrosse

Paralium

Fabulum
marinum.
Hermol.
notatur.Papau.
corniculat.
triple.

Ceterum nos triplex Papauer corniculatum, luteum sc. phœniceum, & violaceum agnoscimus. De his autem nunc dicturi sumus.

PAPAVER CORNICULATVM LYTEVM.

Deser.

Digiti crassitudine est radix, longa, nigricans, luteo succo, sicut & tota planta, eoque visoso prægnans, & amaro: folia crassa & hirsuta, spithamam longa, digitos verò quatuor lata, Verbasco Monspeliensis foliis similia, per ambitum serrata, & profundius incisa & sinuata, ac veluti crispata, glauca, & pinguis. Humi autem procumbunt, & Hiemis iniuriam contumaciter perferunt, quæque ad radicem oriuntur crassos pediculos habent, potissimum primo anno cum caule destituitur, quem sequentiestate



primum fert robustum, solidum, glabrum, geniculatū & in multos ramos diuisum, foliis è geniculis prodeuntibus prædictis minoribus, & parcius incisis, quò summitati propiora sunt, aliqua hederaceorum similitudine: cuiusque autem sinu bina plerumque erumpunt germina, vnum indiuiduum, flores

fructumque ferēs, alterum iuxta alterius folii sinu rursus in bina prædicto modo diuiditur: eaque diuisio vsque ad summam ramulorum ab hac herba seruat: minora igitur & indiuidua germina seu pediculi singulos ferunt flores, colore luteos, Papaueris satini floribus equales, quatuor latis tenuissimisque foliis constantes: in quorum medio eiusdem coloris numerosa stamina capitulum constituunt, ex quo deinde incurua, gracilis, corniculatæ siliquæ, tangenti aspersæ, digitali longitudine erumpit, Fœnogræci siliquæ æqualis, non tamen ad eundem acumen desinens, & in summitate nigricans, capitulum alarum sagittæ quandam similitudinem præ se ferens habet, sed obtusa acumine siliqua utrinque lineâ profundam ceu incisam per longitudinem habet, quæ commissuræ eius sunt, quibus matura aperitur: semina intus continentur Papaueri similia, colore admodum nigro.

Est hæc *μικρὸν κωνία* Græcorum, *ραγέδω* Aetii Synon. & Orbasii: Papauer cornutum Cordi in Diosc. & Hist. Dodon. gall. Lonit. H. Lugd. Tabern. & Camerarii: Papauer corniculatum Matth. Cast. Lobel. in Adv. & Obs. p. 141. & Leon. Plant. p. 270. Cæsalp. & Lacunæ: Papauer corniculatum luteum Fuch. Turn. & C. Bauh. in: Papauer cornutum & corniculatum flore luteo Gesn. hort. & Monachorum, quibus & Papauer corniculatum flore croceo dicitur. Papauer vulgare corniculatum flauo flore vocat Clusius: Tragus Papauer siluestre corniculatum: Papauer luteum Catullus: Plinius Papaueris syluestris genus, Ceratiis vocatum: Quidam Papauer siluestre, h.e. *μικρὸν ἄγριον*: Alii Papauer marinum, i.e. *θαλάσσιον*, & Plinio teste, Glaucium & Patation: nonnulli porro Fabulum marinum: alii Sisimacum Trago: olim Officinæ Memitham: Serapio verò Alnucharam appellabat. Ger. gehornter Magsamen/wilder gehornter Magsamen & geel: Magsen: Belg. geelen hnel: Itali Papauero cornuto: Galli Papau cornu: Hesp. Dormidera marina: Angli Horne Poppie: Bohemi Mafungfo Kmaty.

Nomina
linguarum

Nisi verò monuisset Dioscorides quosdam deceptos foliorum similitudine ex isto Papauete fieri Glaucium putasse, putassem & ego [inquit Lob.] à Papauerum hoc genere esse Glaucium, quod Plinius congener Rheudi seu erratice fecit, eorum fortè persuasus lectione, quos Dioscorides hallucinatos dixerat. Nec absurdè Verbasco nigro

Error
querendus.

nigro comparantur folia à Theoph. & Plinio, namradulta nigriora redduntur, quz initio candida sunt, ut Diosc. testatur.

Locus & tempus

Primà, quà feritur, Ætate, neque caulem, neque florem, neque fructum producit, sed tantum folia: quotannis regerminat: apud nos [Norimbergæ] feritur in hortis: in calidioribus verò regionibus spontè in asperis maritimis exit: ac in multos annos durat, inquit Cordus. Observavi ego Montpelii spontè propenire prope Castelleus & Nemausum, ibidemque florere mensibus Aprili, Maio & Iunio. In hortis si feratur in Autumno, provenit Vere, floretque Iunio & Iulio, siliquas verò maturat Augusto. Idem etiam in variis Germaniæ & Italiæ locis itidem observavi.

Vires & usus.

Par fuit vires ex Dioscoride, Plinio, Galeno & Theophrasto antè in genere recensuisse: siquidem & sequens Papaver cornutum à quibusdam pro veterum genuino Papavere obtrudatur. Calidum autem & siccum esse usque ad tertium gradum, ex sapore & facultatibus fortè non ineptè colligitur. Siliquas huius nullo modo esculentas esse Scaligerum habemus auctoritatem.

Temper.

PAPAVER CORNICVLATVM PHOENICEUM, folio hirsuto.

Deser.

Alterum corniculati Papaveris genus caules ramulos priori pares habet, repandos in humum, teneros: folia minora, altioribus lacinis incisa, hirsuta: flores multò minores quoque, colore punicante, vnguibus intentius rubenibus: corniculatæ siliquæ, longæ præpilatæ semen claudunt nigrum: radix crassiuscula, oblonga.

Synon.



Tragus huius meminit nomine Papaveris corniculati flore rubeo. Clusius describit & depingit Papaveris corniculati (alterius in Hist. post.) rubro flore inscriptione, atque hanc plantam minimè croceo succo turgere, ut quidam falsò crediderint. Lobelius qui eandem cum

Clusio figuram habet, inscribit in Adu. itemque Obs. p. 141. & Ic. Plant. p. 271. Papaver cornutum flore phœniceo. Papaveris corniculati rubri titulo Dodon. de purg.

Glaucium

Gesn. hort. vocat Glaucium Papaveri corniculato similem, radice succo luteo prægnanti: In Append. Glaucium Basileense Theod. Zvyngeri.

Papaver

C. Bauh. phyt. Papaver. 12. siue corniculatum phœniceum hirsutum, varians colore floris, interdum intensè rubeo, interdum languido, nonnunquam pallido.

Matth. Papaver corniculatum alterum foliis Tom. III.

minis asperis, atque minoribus, flore rubeo.


Montbelgardi in horto Ill. E. C. ex semine misso, terræque mandato, floruit & siliquas produxit Augusto & Septembri, eodem quo satum anno, semine deciduo quotannis se propagans. In Moravia & Bohemia copiosum etiam observavit Matthiolus: in agro verò Salmanticensi & in Belgica Clusius. Qui etiam Papaver corniculatum Phœniceum folio glabro describit: pallescente scilicet flore, & quod Lobelio Papaver corniculatum phœniceum alterum: Cesp. Bauhino verò Papaver 13. siue corniculatum phœniceum glabrum dicitur: quodque à priori siue hirsuto non nisi senio differt, ætate enim flos languidior pallidiorque evadit, ac ramis & caulibus grabrum redditur.

Locus & tempus.

PAPAVER CORNICVLATVM VIOLACEUM.

Clusius sic describit: Papaveri corniculato Cæruleo, siue violaceo flore, folia sunt multò minora, teneriora, valde minutim dissecta non candicantia, sed viridia: cauliculi tenelli, sub-

Deser. Pap. corniculatum cæruleo siue violaceo flore. Clus.



hirsuti: flos superiore non minor, quatuor etiam foliis constans, coloris ex purpureo cærulei extatura, & nigra Violæ panè æmuli, fugax admodum, & qui laevissimâ aurâ excutitur: huic succedunt corniculata digitali duntaxat longitudine prædita, plerumque etiam breviora, exilia, duriuscula, ri-

gidioraque hirsutiâ prædita, in quibus continentur semen valde exile, coloris ex cinereo nigricantis: radix tenuis est, & inutilis, nec supra annum spatium perdurat.

Lobel. in Aduers. dicitur Narbonensis Anemone maior corniculata: sed perperam, ut in Obs. p. 141. fatetur, ideoque Papaver corniculatum violaceum cum Dodonæo inscribit. Florem etiam in Adu. minus benè expressum ait.

Castellani, auctore Clusio, *Rosetum* nonnullis verò *Amapolas* Moradas, i. e. Papaver flore purpureo, à succi Mororum colore, dicitur. Idem testis est Montpelianus quondam inter Anemones genera retulisse.

Gesn. hort. est Papaver cornutum purpureo flore: Item Papaver corniculatum minus flore violaceo Monachorum, à Dodonæo exhibitum. An eadem, Glaucium floribus purpureis?

C. Bauh. phyt. Papaver 14. siue corniculatum violaceum, floribus cæruleis & nigra Violæ æmulis.

Rosetum

Anemone

An glaucium Gesn.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. ab aurora ad vespere usque floruit, siliquasque Augusto &

Vu 2

Septembri mense produxit. Inuenitur, inquit Clusius, multis Hispaniæ locis, sed non nisi inter segetes: Maio mense floret: Apud Belgas satum, multo ferulis. Meminit etiam olim Clusius colligere agro Narbonensi in agris auena consitis.

PAPAVER SPUMEVM IN GENERE.

CAP. IX.

Pap. Hera-
clium

Heraclium vocari Papauer Theophrastus in Histor. testatus est. Ignoratur autem ab Hecatenone sic vocatum fuerit, an ex tam multis, quæ toto Orbe aliquando fuerunt vrbes, Heraclia aliqua, ad quam frequens, aut speciosum Papauer hoc nasceretur, nomen illi fecerit. Plures alii à candore & raritate spumæ, quas habet notas, spumeum nominauerunt.

Theoph.

Theophrasti historia de eo hæc est. Aliud verò Papauer Heraclium [*μήκων ἠρακλέου*] vocatur, folium habens Strutho [*Lanariz Marcell.*] quo lineæ dealbantur [quo splendorem linteis tribuunt, Cæsalp.] simile: radicem candidam (*λευκὴν*) omittit Cæsalp. in superficie terræ: fructum item candidum. Purgare per superna radix eius nata est: non desunt qui ad comitalem morbum eā in aqua mella [vino mullo, Cæsalp.] vtuntur.

Vires

Diosc. illu-
stratur

Dioscoridi Papauer spumeum [*μήκων ἀφρώδης*] caule est dodrantali, foliis admodum paruis, Struthio [*σπρῦθιον*], Lanariz Marcell. Radiculæ Sarrac. vet. inserit *πρωῶν*.) similibus: fructum (*καρπὸν*). Semen Sarrac.) inter ea habens album [atque spumeum: ita vetus legit, *ἀφρώδης*.] Sed & herbula tota candida est atque spumea [his vet. caret] radice alba in summa terra nascente. Legitur Æstate fructus [semen Cæsalp.] cū integrè adoleuerit, aridumq; deciderit. Acetabuli mensura sumptum in aqua mella [*σὺν μέλι κράτῳ*] vomitione purgat, priuatimque huiusmodi purgatio comitialibus prodest.

Galen.

Papauer Herculeum, inquit Galenus, vocatur & Aphrodes, h.e. spumofum: ed quodd totum candidum est & spumofum: exile autem semen habet pituitam expurgans.

Plin.

Plinius, vbi libro 20. cap. 19. de Papauere Ceratite loquutus fuit, sequentia de spumeo hoc tradit. Alterum ait, è siluestribus genus Heraclion vocatur, ab aliis Aphron, foliis [si procul inuencaris] speciem passerum præsentantibus, radice in summa terræ cute, semine spumeo. Ex hoc Lina splendorem trahunt Æstate. Tunditur in pila comitialibus morbis, acetabuli mensura in vino albo, vomitiones enim facit. Medicamento quod Diacodion & Arteriace vocatur vtilissimum. Fit autem (ex) huius Papaueris aut cuiuscunque silu. capitibus centum, &c. Reliqua lege inter vires Opii.

Plin. ex-
ter triplex

Cordus in Diosc. ait ignotam esse omnibus herbam, nec Plinium ipsum cognouisse, vt qui duplicem errorem commiserit: Primum quodd Struthon verterit passerem: Alterum verò quodd dixerit Papauere lina candorem trahere. Arteriaceque porro mox sequentis lectionem corruptam esse apud Plinium, Cornarius primum, quodd sciam obseruauit: eumque locum ita legendum esse monuit, vt vox copulatiua (&) omitteretur, sicque restitueretur. Medicamento quod Diacodion & arteriace vocatur.

Æquiuoca

Gesnerus in suis annotationibus Been album siluestre Papauer spumeum esse suspicatur. In-

telligit autem per Been Polemonium primum Dodonæ, h.e. Been album officinarum. Plures Papaueris spumei æquiuocationes legantur in huius libri capite primo.

ANEMONE IN GENERE.

CAP. X.

Anemones genera duo fecit Dioscorides, vnum siluestre alterum satium: Huius rursus plures agnouit species. Anemone [*ἀνέμων*] iduum est genus, inquit, siluestris quidem vna, satia altera. Et in satia quidem genere est quæ phœniceos flores habeat, altera quæ candidantes, aut lacteos, aut purpureos. Harum folia Coriandro similia, sed proximè terram scissa tenius, Cauliculi lanuginosi tenues, in quibus flores Papaueris, & in medio capitula nigra aut cærulea: radix longa Oliuæ magnitudine, aut maior, veluti geniculis distincta. At siluestri hæc & sequentia vsque ad vires vet. non legit.] amplitudo prorsus maior, quàm satia, foliisque e& lationibus ac ductioribus: capite oblongiore, flore phœniceo, tenuibus ac pluribus radiculis. Est & quædam solis nigris, quæ quidem acrior est. Vis vtriusq; acris: qua de causa ipsius radicis succus naribus infusus valet ad purgandum caput. Commanducata verò radix, pituitam trahit. Decocta autem in passo & imposita, medetur oculorum inflammationibus: sed & cicatrices eorundem ac hebetudines emendat, sordidaque vlcera expurgat. Caterum, folia & caules, si cum pitana decoquantur, & in cibo sumantur lactis fecunditatem præstant: subdita autem in pello menstrua ciunt. Illa quoque lepras eximunt. Sunt [vetus quidam putat hæc ad finem vsque illegitimè ascripta, & expositionem quandam esse] qui nescientes ab Anemone siluestri distinguere Argemonem dictam, & Papauer rhœas, propter florum in puniceo colore conuenientiam, Eupatorium errore ducti Argemoniam appellant. Veruntamen tum Argemone, tum & Rhœas minùs saturato puniceo colore videntur, & vtraque seriùs floret. Quin etiam Argemone croceum, gustuque admodum acrem liquorè reddit: Rhœas verò candidiorè & acrem. Insuper vtrique intermedia sunt capitula syluestris Papaueris similia: nisi quod Argemones quidem capitulum supernè, lauiusculum est, Rhœadis autem aliquantò angustius. At Anemones genera neque capitula, calicesue, sed velut Asparagi cacumen. Denique & in artis cultus illa plerumque nascuntur.

Anemones
genera
Diosc.

Satia

Siluestris

Vires
PurgatAppella-
tur
tha

Anemonè sūt qui agreste Papauer appellant. non minùs tamen spurio nomine, quàm qui nigrum Papauer, qui à colore Phœnicida, qui à vento Anemion, qui Maconion, i.e. Papauerculum, qui Tragocerota, qui Gosparimen, qui Barbilen vocant. Osthane Berilion, Pythagoras Attractylida, Magi agrestem Cnicum, Aphri Cusfit, Romani Orcitunicam dicunt.

A *ἀνέμων* Dioscoridi fuit dicta *ἀνὰ τοὺς ἀνέμους* à vento, quodd flos nunquā se aperiat nisi vento flante, autore Plinio lib. 21. cap. 21. Duo, inquit, is, eius genera. Syluestris prima, Altera in culis nascens, vtraque fabulosis. Huiusque plures species: Aut enim phœniceum florè habet, quæ & copiosissima est, aut purpureum, aut lacteum, &c. Profunt Anemonæ capitis doloribus, & inflam-

matio-

mationibus, vuluis mulierum, lacti quoque. Et menstrua cient cum pituita sumptæ, ac vellere appositæ. Radix commanducata pituitam trahit, dentes sanat: decocta oculorum epiphoras & cicatrices: phoeniceæ radix contrita expurgandis vlcibus adhibetur. Magi multum quiddam his tribuere, quamprimum aspiciantur eo anno tolli iubentes, dicique colligi eas tertianis & quartanis remedio.

Galenus

Galenus testatur omnes Anemonas acrem, extensoriam, attrahentem, ac aperientem vim habere, indeque radicem commanducatam pituitam prouocare, & succum ex naribus purgare, & cicatrices in oculis attenuare. Sordida etiam vlcera Anemonas purgare, & lepras remouere, appositæque menses prouocare, & lac attrahere.

Adonidis
flos Ouidio

Ouidius Adonidis florem describens Anemonem videtur adumbrare lib. 10. Metamorph. vbi hæc.

Sic facit cruorem
Nectare odorato sparsit, qui cæcis ab illo
Innumis sicut sulco perlucida calo
Surgere bulla solet: nec plena longior hora
Facta mora est, cum flus de sanguine concolor
erit &c.

Poëtar. fa-
bula

Bion Smyrneus Poëta vetus in Adonidis epitaphio, Anemonem ait natam ex lachrymis Veneris Adonidem descentis.

Nicander

Coronariam autem plantam apud veteres fuisse ex Athenzi Dipnosoph. Hist. lib. 13. apparet. Nicander enim lib. 11. Georg. flores coronarios apud eum recensens, Anemonidis meminit, his verbis.

Et Anemonides fulgentes ipsæ, antea quam con-
trebentur.

Et Cratinus in Effeminatis, apud eundem,

Chamamelis omnigenis ornatur mihi caput,
Liliis, Rosis, Leiris, Cosmofandalis, Violis, Si-
symbris,

Anemonarum vernis calicibus, Serpillo, Cræco,
Hyacintho.

Quin & Theocritus in bucolicis de lachrymis Veneris Adonidem lugentis produisse finxit, eique Epitaphium hoc dicauit:

Quorūque cruoris agit guttas hic casus Adonis
Ter Venus effundit lachrymas, quæ singula flo-
res

Cessante demittunt: lachryma pariunt Anemo-
nem:

Sed cruor ille Rosam creat.

Anemones
nomen
agrosticum

Nicander contra Anemonem ex Adonidis cruore natam prodit.

Vagum itaque commune multis & plantis & floribus Anemones fuit quondam nomen ac bisariam ab Antiquioribus diuidebatur totum hoc genus, in coronarias sc. & medicas Anemonas. Dictæque nonnullis Anemone Laminia: aliis Oithona: aliis sed perperam, Papauer rubrum: aliis Orcitunica: aliis Phænon: aliis Fremium, aliis Anemolia: aliis Adraçylis: aliis Anemochorta.

Nomina
lingual.

Germani vocant Anemone Roselin & Winde Roslin: Belgæ Anemone Reffens Ruellio teste, Galli Coquelourdes, Cocles, & Passe fleurs appellant. Scit autem etiam Clusius postrema duo nomina Papaueri erratico nonnullis Galliarum locis tribui. Idem Coquelourdes vocem Putatillæ, quæ siluestris Anemones genus est conuenire suspicatus. Non desunt tamen, qui simili appellatione Pseudonarcissum pallido flore donent. Italis Anemone dicitur, Hisp. Hierua viente: Boh. Magpolsky: Hung. Anemone siluestris Beferchen/Tom. III

Seyer veragu/ Bisclini fin.

Omnia porro Anemonidum genera, singulares caules, interdum duos, aut tres vel etiam plures, prout magnæ & amplæ vel vetustæ sunt radices, proferre solent, & nullis ramis prædizos: non candidè igitur agunt, qui eas multifido & ramofo caule expressas proponunt. Non tamen inficias ibit Clusius, quin interdum naturæ luxuriantis lula cōtingere possit, vt vnus ramulus, interdum & alter, inter superna illa folia summū caulem amplectentia enascatur, vt aliquoties obseruauit. Flos tandem Anemones, vt est pulcherrimus, sic leui ventorum impetu, aut Solis calore languet & decedit, eiusque semen pariter facillè in pappos abit.

Omnia porro Neotericorum specificis differentis, Anemones nobis cognitæ tempestiuum est vt oratione prosequamur.

ANEMONE TRAGI HORTENSIS.

CAP. XI.

EX radice recta, laui, & digitum minimum crassa, caulem habet teretem, & instar Been albi [vt vulgò vocant:] geniculatum, foliis herbaceis coloris, iisque plurimum dissectis, instar Chamomillæ vulgaris seu Cotulæ, ad fastigium vsque, quod flore rutilo, & quasi aureo, formâ Argemonem planè referente, vestitum.

In horto quodam fortè fortuna repertam vidit Tragus, qui Anemonem inscribit, & Anemones genus esse existimat, quod à Dioscoride describitur. Turnero tamen non videtur Anemone Diolcoridis, sed Papaueris erratici species.

Tabern. est Argemone tertia: C. Bauh. phyt. Synon. Adonis i. siue hortensis, & [vt etiam H. Lugd. p. 844.] Anemone hortensis Tragi: Apud Matth. Anemonē alteram vocat & Anemonem s. Matthioli in edit. secunda, in aliis verbò editionibus Anemonem hortensem Tragi.

ANEMONE LATIFOLIA FLORE FLAVO,

L. Clusii.

CAP. XII.



Satis amplis Delt. Siliis circinnatæ serè rotunditatis, per ambitum serratis, duris & firmis, longoque pediculo sulcis, supernè intensius virētibz, infernè verò plerumque purpureo-cenubus, vt Cyclaminis flore odorato folia propemodum, seruidissimi gustus: uerberosa, & oblongiuscula, Tormentillæ

vulgaris æmula, fibris aliquot dependentibus, foris nigra, intus alba, solida, ingrati admodum saporis, quæque nauseam mouens quodammodo strangulet; deinde linguam aliquantulum vellicet.

Synon.

H. Lugd. p. 846. dicitur Anemone latifolia prima Clusii: Et sic in Obs. p. 147. & Ic. Plant. p. 279. In Lobelii vero Obs. figura est transposita. Gerardo & Tabern. in Icon. Anemone latifolia Clusii: Eisdem Hist. Anemone 8. latifolia siue Lusitanica, Portugalsch Anemone Rösslin: Angl. Brande Leased winde flower. C. Bauh. phyt. Anemone 16. siue latifolia folus serratis.

Locus & Tempus

Lapidosis quibuldam Lusitanie colibus iuxta Tagum, atque etiam inter vepres eruebat Decembri anno 1564. Clusius, & insequente Ianuario, qualis in Hisp. expressa est, & nos depinximus, nullum enim florem tum temporis ipsi obseruare licuit. Sed multos deinde post annos semine è Lusitania delato, similem apud Hollandos natam monebat Ioannes Moutonus, siccumque cum caule & foliis florem è Batavia acceptum communicabat Clusio, qualem in Hist. post. exprimi curauit.

Is autem plurimas id genus alias proponit & describit, quas, breuitati studentes, hic tantum notabimus, ampliorem delineatione ex eiusdem Clusii Historiis petendam relinquentes.

Anemone latifolia duplo flore flauo,
2. Clusii.

Tempus.



Hæc Clusio iterius aliis Anemones generibus & germinabat & florebat, semen verò Iunio maturabat.

Anemone Italica latiusculis spinosis foliis, 3.
Clusii.

Clusius in Hisp. describit pro Anemone latifolia altera, foliis inferiore parte nonnihil purpurascens, flore diluto rubore purpureo. In Hist. post. pro Anemone hortensi latifolia 3. simplici flore, eamque Herbariorum vulgus apud Belgas Anemonem stellatam siue stelligeram nunc cognominare scribit, miraturque nonnullos pro Geranio primo reponere non veritos.

Synon.

Dodon. de Florib. in Epilogo, & Hist. in fol. lat. vocat Anemonem primam: Camer. ad Hist. Matth. germ. & Epit. Anemonem secundam:



C. Bauh. phyt. Anem. 10. siue Ranunculi rotundo folio purpurascens. Lobel. in Icon. Plant. p. 279. inscribit rad.

Anemonem tuberosam. Bulbocastani radice: Et sic etiam in Obs. p. 247. ubi florem dilutè purpurè rubere, nonnuncquam candicere, ait: quæritque an sit Anemone lutea Gallorum. Sed

Error typograph.

typographico errore mutata figura, quæ proin occasio suspicandi Luteam Galeni. Non video hanc ferre luteum florem, ne ullus, quod sciam, affirmavit. Ad Aduersariorum paginam 14. hanc cur referat Lobel. in Obs. nondum percipio. Si quidem huius Anemones nulla sit mentio in Aduers. Negligentia ergo accusandus quod eo loci non descripserit. Præterea in Aduers. de germanica in Obs. de exotica scribit.

Lob. notatur.

Tabern. dicitur in Iconib. Anemone stellata purpurea, & alba, Stern winde Rösslin: In Hist. Anemone tertia. Item Ic. Anemone papaueracea, Non winde Rösslin: Hist. Anemone 12. flore purpureo, sex folis magnitudinis Papaueris filu. conspicuo. *Dua figura planè similes sub diuersis titulis: descriptio præterea 12. non respondet iconi: quam verò intelligat, diuinare haud possumus.*

Tabern. notatur.

Gerardo Anemone 5. Bulbocastani radice, Ches sinus winde flower: Item, Anemone 10. papaueracea, Poppe winde flower. Eisdem cum Tabern. icones ponit sed descriptiones alias.

H. Lugd. Anemones 1. Dodonzi p. 845. Flos cum superiorib. foliis infra p. 1036. rursus pingitur Ranunculi purpurei nomine. Sed eadem repetitur p. 1275. sub Geranio 1. quorundam Dalachampii: ac sic unius planta tres icones.

H. Lugd. tres figura

Obseruavi florentem Aprili & Maio in hortis Patauinis, Veronenfibus, & Bononiz, ubi etiam in montibus copiosè habetur. Eam quibuldam Germaniz locis secundum Rhenum, inter Moguntiam & Andernacum inter vepres in aprico florentem Martio conspiciebat Clusius.

Locus & Tempus

Anemone latifolia, ex purpura dilutiore
albicante flore, 4. Clusii.

Clusius in Hisp. Anemonem latifoliam alteram inscripsit, eique præcedentis effigiem apposuit: In H. post. iconem illam priuauit, vocauitque Anemonem hort. latifol. 4. simplici flore: eam autem paulò seriùs priore florere tradit.

Synon.

Anemone latifolia flore ad carneum colorem tendente, albicantibus unguibus, 5. Clusii.

Clus. in Pannon. ni fallimur, est Anemone latifolia Bizantina carneo flore: In Hist. post. Anem.

Anem. hort. latifol. 5. simplici flore : C. Bauh. phyt. Anemone 14. Eum autem folia ante hyemē profectē tradit idem Clusius.

Anemone latifolia purpurei serē coloris
Vnguibus albicantibus. Byzantina,
6. Clusii.



A Nemones latifoliz simplici carneo flore genus hoc, Anemonem sc. hortentem latifol. 6. simplici flore, habuit generosa Domina de Heusenstain Byzantio allatam, quæ Aprili & Maio anni 1584. ipsi, referente Clusio, primum flores protulit : foliorum formā, colore, radice, à superiore parūm differens.

Anemone colore saturatius ex purpureo rubens, oris
coccineis, vnguibus albis, magnis, Byzantina, 7. Clusii.

Hoc Anem. genus etiam habuit Clus. Constantinopoli emptum Anno 1587, quod inde Francofurtum ad Moenum delatum florem tulit cum reliquis Anemonibus generibus sub Maii initium. Eius autem duas varietates à se observatas tradit & describit.

Anemone latifol. flore coloris purpurei saturi, vnguibus magnis, albis, infima parte purpureis : 8. Clusio.

Anem. latifol. purpurea

Inter latifolias, quæ purpureum florem habent mittebat ad Clusium N. V. Ioh. Boissot genus quoddam, ipsi semine natum, cuius flos ipso referente elegans esset, sed Clusio biennio duntaxat post florem dedit. Florebat cum alijs Anemonum generibus extremo Aprili & Maio.

Anemone latifol. flore ex purpura violacea, ad umbilicum albicante orbe, 9. Clusii.

Florebat Anemone hæc hortensis latifol. 9. simplici flore, Clusio auctore cum alijs Aprili.

Anemone latifol. violacea, maculis albis notata : 10. Clusii.

Defect.

Decimum hoc Anemonibus latifoliz genus à Clusio observatum, licet tota quodammodo facie nouo simile esset, & floris folia coloris essent etiam violacei : internā tamen parte notis quibusdam erant discreta, nam albis maculis erant insignita. Et certē initid Anemonem hanc hort. latifol. 10. simplici flore, vitium aliquod contraxisse existimabat Clusius, cuius causā maculæ illæ in flore apparent. Sed quum radicem in-

corruptam offendisset, & sequente anno flores similibus maculis notati conspicerentur, diuersum genus esse rectē censuit.

Anemone latifol. flore violaceo, vnguibus magnis, candidis Byzantina : 11. Clusii.

Flores violaceos paulō saturationis coloris, 11. Defect. habebat genus, non cedens elegantia ei, cuius vngues maiores magisque candidi erant, propius quodammodo ad octauū generis flores accedentes. Illud Constantinopoli allatum Clusioque ab Illustris Viri Davidis Vngnad vxore communicatum. Anemonem hort. latifoliam 11. simplici flore appellauit.

Anemone latifol. violacea, vnguibus argenteis
12. Clusii.

A Nemonidi huic, inquit Clusius, hortensi latifoliz 12. simplici flore, non valde dissimilis erat ea, quæ semine nata Porreto, primum florem tulit anno 1600. Hæc florebat Maii initio.

Anem. hort. latifol. 12. simpl. flore

Anemone latifol. flore ampliore, duodenis
foliis, violaceo-purpureis, vnguibus
albis : 13. Clusii.

A nemone hort. latifol. 13. simplici flore, Clusius Porreto semine natam esse dicit ac florere Maio. C. Bauh. phyt. est Anemone 11. siue Synon. violacea rotundo folio. An porro sit Anemone latifol. flore simplici violaceo magno Camerarii hort. dubitamus, licet Frater id asserat.

Anemone latifol. flore veluti carneo, vnguibus
albis : 14. Clusii.

Iam dictis Anemonibus, adiicit Clusius eas latifolias, quæ flores quidem purpureo colore præditos habent, sed multo dilutiore & veluti carneo. Omnes autem, radices & foliorū formā, non sunt dissimiles superioribus, præsertim tertia : caules etiam habent teretes, & breui lanugine obstiti, atque ex viridi purpurascetes, vt illius, ad quorum fastigium nascuntur vntialis longitudinis folia, quorum vnum, vt plurimum, paucis laciniis sectum, inter quæ exilit triuncialis pediculus, ex viridi etiam purpurascens : sustinēs florem octo plerumque foliis constantem, quorum externa pars nonnihil purpurascit, interna coloris est serē carnei, eiusque vel saturationis, vel dilutionis, vnguibus item vel amplioribus, vel minoribus, omnium tamen albis, & capitellū medium obtinentibus nigrum & villosum, quod ambiunt multa albicantia stamina apicibus cæruleis prædita. Flores autem sunt vel maiores, vel minores pro terræ ratione & vbertate.

Defect. latifol. Gen. lues carnearum

Florent omnes eodem tempore, quo superiores, aut interdum paulō serius, pro loci, in quo repositæ, situ. Quædam florem habent nonnihil odoratum, alia minimè. Hæc Clusius, quibus particulariter Anemonem hortensem latifol. 14. flore simplici delineauit.

Anemone latifol. colore Orengeus dicta :
15. Clusii.

A nemonem hort. latifol. 15. simplici flore habuit [inquit Clusius] munere Io. Boissot. Aliud eius genus etiam mittebat, iam descripto

per omnia minus, cum foliis, tum caulibus, & & flore, cuius color licet ferè idem, mihi tamen paulld dilutior videtur, in vtroque tamen nulla odoris gratia. Floret vtrumque genus cum superioribus: & pro foliis, in quo repositæ, vbertate, ampliores, vel minores flores proferunt. Non dubium est, quin plantæ earum semine natæ, etiam interdum variant, & flores proferant, vel saturatioris, vel dilutionis coloris.

Tempus

Anemone latifol. flore coccineo: itemque unguibus: 16. Clusii.

Descript.



Similem quidem habet cum *Anemone latifolia* pleno flore [de qua postea] radicem, sed eius folia quæ etiam multa ex illa oriuntur, non erant aded ampla & crassa vt illius, neque aded dilutè virebant: caulis, dodrantalis vel etiam pedalis, satis gracilis, viridis floris color idem qui plenæ latifoliz flore, h.e. elegantissimo

coccineo internâ parte nitens, similes etiam vngues pallecente orbe illos ambiente, externâ autem quâdam lanugine pubescens: medium florem occupabat capitellum villosum cinctum staminibus purpureiscentibus, quorum apices nigricant.

Anemone latifol. coccinea sine unguibus Byzantina: 17. Clusii.

Locus.

Tempus



Agenus hoc 17. simplici flore latioreque folio habuit Constantinopoli allatum generosa D. de Hensenstein, quod anno 1587. mense Aprili in eius horto floribus onustum conspiciebat Clusius, cuius fragmentum sequente Iulio accipiebat, & amicis in Belgio communicabat. Id autem, inquit, similibus superior

iori erat, foliis paulld tamen rudioribus, &c.

Anemone latifol. ex coccineo phæniceo coloris, unguibus parvis, subpallidis: 18. Clusii.

Anno 1600. observabam, inquit Clusius, apud N. V. A. vander Duyn elegantem hanc

Anemone hort. latifol. 18. simplici flore.

Florebatur duntaxat Maio, quia is annus valdè serotinus fuit, propter præcedentem asperitatem Hiemem qualis totis 35. annis non fuerat conspecta.

Tempus

Clus. in Pantheon. p. 394. vocat *Anemone latifolia* Byzantinam coccineo flore: C. Bauh. phyt. *Anemone* 13.

Synon.



ANEMONE LATIFOL. FLORE PLENO
variegato.
CAP. XII



Nihil in hac *Anemone* flore speciosius, qui Rosæ magnæ par, densissima foliorum sectura, præonia ferè modo luxuriat, foliis oblongis, acutis, rubentibus striatis: exterioribus verdè quadrupld, quintupldue latioribus, rubro, viridique confusis, variegatis.

Descript.

Clus. in stirp. Hispanicarum

Synon.

appendice *Anemones latifoliz flore multiplici* titulo pingit & describit p. 523. Lobel. in Obs. p. 146. Ic. Pl. p. 278. dicitur *Anemone maxima polyanthos Chalcedonica*. Figura, vt Clusio, duplex: vna radice, altera floribus. Malè apud H. Lugd. p. 847. in *Anemones latifoliz flore multiplici* Clusii figura, flos adaptatur radici.

Tabern. in Icon. est *Anemone Chalcedonica maior*: In Hist. *Anemone* 7. *Chalcedonica*: Camer. hort. *Anem. latifol. flore pleno rubro elegantissimo*: C. Bauh. phyt. *Anemone* 13. siue *rotundifol. maxima*: Gerardo, *Anem. max. Chalcedonica polyanthos*, The great Double Winde flower of Bithynia. Germanis *Anemone Rößlin Von Constantinopel*. Constantinopoli allata fuit. Aprili vel paulld etiam seriùs florem expandit. Flos in Germania rarissimè ad frugem pervenit, frequentissimè enim, antequam se explicet, vitium contrahit. Certè licet multo annis aluerit Clusius, ultra ternos aut quaternos eius flores explicat.

explicatos videre non meminit: Cassellis autem in horto Ill. Pano. Hist. Lindgrani, maximum & ante rursus in protulerat. Nobis Venetiis attulit Cherlerus, ac Argentine ostendit Meierus.

ANEMONE LATIFOL. PLENO FLORE
coccineo, siue Pauone maior 1. & 2. Clusii.

CAP. XIII.

Anem. latif.
Defen.



Nomine Ranunculi Constantino-politani gener Cherlerus secum ex Italia Patavio ab Ill. Pinello, nobili Gendensi acceptum, attulit pulcherrimum rarissimumque Anemones genus. Ramus erat dodrantalis, unico folio circa medium donatus, quod sine pediculo caulem amplectebatur, circumscriptio- ne ferè circinata

diuisurâ profundâ & crebrâ superiorum quorundam foliorum Ranunculi auricomi: super quod ramus nudus paullatim attenuatur, summo fastigio florem gestans Anemones multiplex flori patem, secundâ foliorum ferturâ luxuriantem, ut nullus planè compareat umbilicus, saturatâ purpura tinctum: extrema cuius folia vniâ longiora, semunciâ latiora, obtusa, venosa, interiorum alia dimidium, alia ne quadrantem quidem eius magnitudinis attingunt. Est hic flor, ni fallor, idem cum Clusii Anemone hortensi latifolia 2. pleno flore, ut & cum eiusdem Anemone hortensi latif. Pauone maiore 1. atque etiam cum eiusdem Anemone hortensi latif. Pauone maiore 2.

Locus &
Tempus

In Belgicis hortis inquit Clusius, Aprili vel paullò etiam seriùs florem expandunt. Barum etiam radices, perinde ac latifoliarum simplici flore, præsertim quæ crassæ & globosæ sunt, temporis diurnitate plerumque cariosæ fiunt, & vitio deinde ad extremos nodos serpente, tandem penitus corrumpuntur, nisi alternis ad minimum annis, in fragmenta diuulsæ, telluriq; commissæ pangantur.

ANEMONE GERANIFOLIA.

CAP. XIV.

Defen.

Multa habet folia nouo Vere, quum prodire incipium, purpurascencia, deinde ex viridi pallentia, multifida, Coriandri referentia, vel Limoniæ potius Anemoneidis foliis similia, trigemina plerûq; simul pediculis cõnexa, hirsuta, & in terram, ut Dioscorides rectè ait, inclinantis: inter quæ caulis exiit nudus quidem, sed quem terna foliola, trifariam profundius incisa, media parte amplectuntur, quæ aliquamdiu florem



occultat, donec Solis calore ex his sese explicas & emergens, expandatur in quatuordecim aut quindecim foliola mucronata, minora quàm in latifoliarum generibus, coloris vel cerulei vel albi, vel utroque mixti h. e. ex terna parte subcerulei, internâ albi, staminulis albis, quorum apices pallidi, medium florè occupantibus:

decusso flore, apparet capitellum penè Ranunculi, conflatum ex seminibus eius semini etiam similibus: non tomentosum ut in latifolia Anemonide: radix digitalis plerumque longitudinis & crassitudinis, in aliquot ramos diuisa, & tuberculis obliterata, fibras quædam hinc illac spargens, foris nigra, intus alba, quæ similiter fragmentis leni & pangi potest.

A Clusio nominatur in Hisp. Anemone tenuifolia 3. In Hist. post. Anem. hort. tenuifolia 1. simplici flore: A Dod. in fol. lat. Anemone 2. A Lobel. in Obs. p. 148. In Ic. Plant. p. 280. Anemone tuberosa geranifolia: A Tabern. Anemone Rupertiana. C. Bauh. phyt. Anem. 6. siue Geranii Rupertiani folio: Schvvenckf. Anem. Rupertiana flore nunc albo, modò ceruleo, flein blaue lechte windt roßlin. Gerardo Anemone Geranii folia, Storckes winde flower: H. Lugd. p. 845. Anem. 1. Dodonzi, tenuifolia 3. Clusii, siue Geranifolia Lobelii.

Locus &
tempus.

Hanc primùm ex Italia habuerunt Belgici hortis, in quibus Vere florot: semen Maio maturat, refcit, aut paulò seriùs. Radicis fragmentis scriitur ac pangitur.

ANEMONE ITALICA TENUIFOLIA
purpurea, foliis floris orbiculatis
CAP. XV.

Defen.

Anemone Italica tenuifolia radice nitebatur subrotunda, capillarium fibrarum non experte: foliis Coriandri foliis similibus, multè diuulsis, haud secus ferè quàm Apii hortensis, sed crebriùs incisis, pediculis dodrantalibus appensis statim à radice orientibus, infirmo & tenui principio pediculi, crassiori in adulationibus: inter folia surrigebatur caulis tenuis, cubitalis, nonnihil hirsutus, citra cuius fastigium, aliquot digitis sub flore erant folia sine pediculis caulem ambientia, minutim dissecta. Cauli in se habebat flos vnus, magnus, purpureus, quinque foliis constans, latis, rotundis, in acumen desinentibus, externis multum hirsutis: umbilicum floris occupabant apices multi.

An Anemone prima Matthioli? Camer. hort. de hac ait: Anemone tenuifolia flore purpureo frequens in Italia circa Romam & Neapolim atque in Hetruria. Hæc tantum potest re-

gio vt



plurimum cerebrum expurgare.

Anemone tenuifolia Species varia.

Eleganter pingit & graphicè describit Clusius tum in Hispan. tum in post. hist. plurimas Anemones tenuifoliae species, quas breuitati studentes, vt in latifoliis factū, hic tantū notabimus, pleniorē earum historiam ex ipsius Clusii scriptis petendam relinquentes, additis tamen præcipuarum nonnullarum iconibus. Considerandę igitur veniunt præter iam descriptas Anemones.



gio, vt flores quarto anno pro purpureis, albos proferat. Apud Matth. in Epit. & Hist. germ. vocat Anemonem 4 foliis frequenter laciniatis, floribus purpureis, &c.

Montbelgardi in horto, ni fallor, Maio florebat, sed tunc eam depingere neglexi.

Camerarius auctor est, acrem esse plantam, eiusque succum naribus insulum

rem [foliis constantem coloris interiore parte coccinei elegantissimi, vnguibus albis, exteriore quidem etiam coccineis, sed tenui lanugine pubescentibus & splendentibus umbilicum occupante villosa nigricante capite, multis staminibus cincto, quorum apices ex nigro purpurascebant.

IV. Anemone tenuifolia flore magno coccineo vnguibus albis orbiculatis: 5. Clusii: cuius

icon in hac pagina tertio loco posita est.

V. Anemone tenuifolia flore amplo [foliis florū in cuspidem ferè desinentibus] sanguineo, vnguibus albis magnis: 6. Clusii: cuius hic traditur icon.



VI. Anemone tenuifolia flore minore coccineo vnguibus exalbidis, purpureis venis distinctis: 7. Clusii.

VII. Anemone tenuifolia coloris sanguinei coccineo permixti, vnguibus eiusdem ferè coloris: 8. Clusii.

VIII. Anemone tenuifolia flore pluribus foliis constante carnei quasi coloris, 9. Clusii.



IX. Anemone tenuifolia duplex: Vna ex albidō virescens, vnguibus albis: Altera prorsus ferè alba, vnguibus & venis ex albo paullulū virefcentibus, 10. & 11. Clusii.

Clusius in Pann. p. 395. priorem tradit sub Anemonidis tenuifoliae carneo flore nomine, siue Byzantinæ secundæ.

Et hæc est quam Anemonidis hort. tenuifoliae 11. simplici flore titulo describit.

C. Bauh. phyt. vocat Anemonem 4. siue angustifoliam



X. Anemone tenuifolia candida, exceptis vnguibus, externâ parte non nihil virefcenibus, 12. Clusii

XI. Anemone tenuifol. prorsus niuea præter vngues, in quibus aliquid carnei coloris, 13. Clusii.



XII. Anemone tenuifolia exalbida, venis carnei coloris: 14. Clusii.

XIII. Anemone tenuifolia præcedenti candidior, 15. Clusii.

XIV. Anemone sanguinea, vnguibus venis albicanibus distinctis, foliis floris orbiculato mucrone, 16. Clusii.

XV. Anemone tenuifolia Kermelina, 17. Clusii.

XVI. Anemone tenuifolia coloris coecinei valdè diluti, vnguibus amplis & albis, 18. Clusii.

XVII. Anemone tenuifol. cochinillea, vnguibus magnis albis, foliis florum extrema parte orbiculatis, 19. Clusii.

XVIII. Anemone tenuifol. sanguinea albicanibus vnguibus, 20. Clusii.

Et illæ sunt Clusio Anemonidis tenuifoliz florem simplici foliorum serie gerentis species: qui non dubitavit quin plures aliæ aliis fortè innotuerint: confidens etiam quotidie deinceps plures exorituræ, vel foliorum numero, vel aliis notis flores discretos habituras.

Tom. III

stifoliam tertiam.

An est Tabern. in Hist. Anemone 11. siue rapacea propter radicem, flore ex purpureo albicante.



XIX. Anemone tenuifolia, flore polyphyllo coecineo.

ANEMONE FOLIO ACONITI, RADICE

Rapunculi, flore ex purpureo albicante: Et Altera folio Coriandri, radice Oliuæ flore purpureo.

Tabern.

CAP. XVI

Radice prior est longa, Rapunculi, crassitudine mediocris digiti, fibris donata pluribus, odoris acris: foliis profundè dissectis, instar Aconiti: caule spithameo, & longiori, crassiusculo, tomentoso, canaliculato, recto, intus cauius flore ex purpureo albicante.

Deser. Anem. rapacea

Alterâ radicem habet Oliuæ, totundam, odoris acris & vehementis: folia Coriandri, profundius tamen & magis incisa: caulem pilosum, tenuem, canaliculatum: florem sex folis constantem, purpureum, papaueraceum: capitulum in medio foliorum nigrum.

Anem. papaueracea

Ambæ [i. sc. siue rapacea, & 12. siue papaueracea] abundant Vvaſcouiz montibus planis, soli expositis.

Loem.

An aliquis meminerit Anemones radice, Rapunculi nondum occurrit. Quæ verò sit Anemone papaueracea Mon Windt Rôſſin foliis & flore magnitudine Papaveris nobis non satis constat. Icon sanè quæ pro hac proponitur à Tabern. non respondet descriptioni. Videtur autem nobis hæc diuersa, ab eius Anemone, quam nominamus Italicam latiusculis foliis spinosis.

ANEMONE FOLIO MULTIPLICATO,

hirsuto, flore quadrifolio, rubro, albo caeruleo.

CAP. XVII.

Habemus [inquit Anguillæp. 12.] Anemone Athenæ in montibus altis, foliis multifidis, & lanuginosis, cuius flos quatuor duntaxat foliis constat, Papaveris modo, aut ruber, aut albus, aut caeruleus. Reperitur in Italia, in siluis altorum montium supra Castellum in Marſis dictum Piſcina, & montibus Sclauoniz, siue Illyriæ, & Moreæ.

Anem. Athenæ Anguillæp.

Clusio dicitur Anemone Anguillæp. C. Bauh. phyt. Anemone 1. siue lanuginoso folio

Xx 2

flore albo, rubro, cæruleo. Sed quæ sint hæc Anemones prænominati non explicant. Nec quis è genere Pulsatillæ eas esse contenderit. Habent enim Pulsatillæ plura quàm quatuor in flore folia.

ANEMONE ANGVILLARÆ LVTEA,
quadrifolia, foliis multifidis.

*Anem. lutea
Galen.
Anguill.*

Refert idem Anguillara epist. II. in Apulia Anemonidis genus illud reperiri, quod Galen. lib. de comp. med. sec. loc. floris colore luteo esse scribit, atque illic notissimum esse, & à cæteris figura non differre, sed colore. An autem Anguillara de Pulsatilla lutea scribat considerandum. Dubium in eo consistit, quod non sit quadrifolia. Clusius dubitat an non sit latifolia Anemones genus illud, quod secundo loco descripsit. Sed quomodo possit ea esse Anemone Anguillaræ, quæ quatuor tantum floris foliis constat, cum latifolia Clusii magno sit floris foliorum numero. C. Bauh. phyt. vocat Anemonem 12. siue luteam. Nec plura.

ANEMONE LVTEA RAVWOLFFII.

CAP. XVIII.

Locus

Sakaick

*Sakaick
affar.*

Commemoratur hæc cum aliis à Ravvolfio Itinerarii sui part. I. cap. 9. Circa Halepum occurrunt aliquæ Anemones species, plurimum colorum, rubri, purpurei, lutei, &c. quas omnes communi nomine *Sakaick* appellant, cognomine addentes *Sakaick achmar, Sakaick alfar, Sakaick aserach*, i. e. Anemone rubra, lutea, purpurea. Luteam verò pingit parte 4. numero 15. titulo pulchre Anemones rosæ, floribus luteis, Anemones luteæ *Sakaick affar* Arabibus dictæ.

H. Lugd. append. p. 26. Anemones genera Arab. *Sakaick*. C. Bauh. phyt. Anemone 17. siue varia peregrina, radice fibrosa.

ANEMONÆ MATTHIOLINÆ.

CAP. XIX.

*Anemoni-
des legiti-
ma Diosc.*

*Matth.
redarg.*

*Anem.
genera.
Matth. in
comm. post.*

Legitimam utriusque generis Anemonem se legisse gloriatur Matthiolus in Diosc. in anni 1559. editione, idque in Ananiensi agro, quæ ut arbitratur, Dioscoridis descriptioni nihil prorsus recedant. Postea verò Venetiis in horto Medici Maphæi à Maphæo conspexisse. Sed si collegit, cur non descripsit? cur præterea falsas exhibuit figuras, ad descriptionem factas, maleque intellectas. Appingit enim vascula, & calyces Papaveris, quorum non recordatur Dioscorides. Cur non monet suas icones non responderè visis plantis, si nolit? Si veras proposuit imagines in priorib. comm. cur in postremis eas mutavit, nec falsas fuisse priores admonuit?

Anemones [inquit in comm. It. cum mag. fig. impressis anno 1568. & Lat. impressis anno 1583.] quinque genera observavi: Horum primum folio progenit Copiandro simili, sed frequentibus incisuris, caulibus lanuginosis, tenuibus, striatis, in quibus tenuiora per intervalla sunt folia, flo-

ribus silvestris Papaveris magnitudine, senis circum distinctis foliis, purpureis, capitulo umbilico tenui emergente, nigro colore, nigrisque capillamentis stipato, perinde ac in Papavere. Radix illi Oleæ magnitudine, subrotunda fibrataque & sapore acri. Secundum foliis assurgit minoribus, & frequentius laciniatis, cynoctoni Aconiti modo, caulibus alteri similibus, sed aliquantò crassioribus inanibus, & in rectum spectantibus, quibus flores insunt, dilutioris purpuræ nitescences, capitulo circūquaque comato: perinde. ac alterum. Radicem habet brevem, Ranunculi ferè figura, fibris adnatis multis, acri etiam gustu. Tertium foliis crescit Ranunculo primo æmulis, caulibus tenuibus, sesquipalmatis: rotundis, in quorum cacumine flores exeunt albi, quinque tantum folioli distincti, Rosarum magnitudine, & nonnunquam tenui quadam purpurâ respersti, inferiore præsertim sede. Radicem habet fibratam ac tenuem: Nascuntur in collibus. Habentur quoque Anemonis, genera alia duo, foliis laciniatis, & floribus in altero purpureis, in altero aureis. Omnia genera Maio mense florent. Non desunt, qui credant Anemonem, & silvestre Papaver idem esse: sin minus, Tempus

saltem eiusdem esse generis. Sed ii, meâ quidem sententiâ, falluntur, & prorsus aberrant à Dioscoridis proposito. Quandoquidem si hoc idem sensisset Dioscorides, alterum ab altero diuersis capitibus non distinctisset, neque, ut legitur in eius capitulis, calce, differre Anemonem à silvestri Papavere tradidisset. Verum ut non diu nec multum in Matthioli erroribus retegendis laboremus, rem Camerario committimus, qui apud Matth. in eius

Hist. germ. dicit se coniectari haud posse, quænam sint Anemones à Matthiolo in suo herbario pictæ, quandoquidem de iis nullus scribat, nisi de tertia. Ipse etiam se ramosam vidisse negat, & alias descriptionibus Matthioli respondentes effigies habere affirmat quas tradit.

Tabern. in Icon. Anemones ramosæ purpureæ; Et, Anemones ramosæ luteæ titulo, ambas Matthioli fictas imagines habet, & cum imitatus cudit descriptiones. In Hist. Anemonem 13. & 14. inscripsit.

Matthiolus autem in commentar. priorib. duo proposuisse Anemones genera, quæ nec in Germania, neque Anglia, nec etiam in Italia proveniunt, testis est Turnerus, qui nunquam illa videre meminit.

A partibus verò Anemonarum Matthioli stat Frater C. Bauh. Matthiolus, inquit, quæ que proposuit Anemones, cuius figuras mutare non vobis.

H. Lugd. p. 842. & sequentibus Anemones Matthioli quinque proponit, nec quales sint, indicat. Anemones autem secundæ Matthiolinæ titulo pingit Ranunculum flore globoso, ut fufus hoc titulo dicemus,

ANEMONE RANUNCULI FACIE LVTEA

CAP. XX.

Foliis provenit Ranunculi ferè, sed tenerioribus, floribus aureis, radice parvæ fabæ magnitudine, inquit Camerarius, qui in Epit. & Hist. Matth. germ. Anemonem quintam inscribit. Sed in Epitomes eadem tabella pinguntur icones duarum plantarum: in utraque autem est radix maior

*Silv. Papaver.
Lap. minorum
Anemones.
Silv. Papaver non est.
De Matthioli iconibus iudicium
Camer.*

Icon. Tabern.

H. Lugd. p. 842.

Deser.



maior Fabæ^r:
Quæ porro sub
numero 1. pro-
ponitur, est
quæ hoc capite
describitur.
Quæ verò nu-
mero 2. nota-
tur, ea accede-
re videtur ad
Ranunculum,
cui flos in me-
dio folio. In H.
germ. nudam
proponit ico-
nem sine de-
scriptione.



capita inter-
dum diuisa, su-
perius ex cellu-
lis marcescen-
tibus foliorum
comata, sapo-
re nonnihil a-
marcescente, &
tandem acri-
monia linguâ
vellicante.

Desist.

Iones

Duas figu-
ras proponi-
mus, nō quod
sint diuersarū
specierum sed
quod si quid
in vna requi-
ratur, ex altera
fortè supplea-
tur: nisi factas

emissimus, meliorem dedissemus.

Tragus Herbam ventu intitulat, incognitam
que ait & quasi peregrinam: Mulerculas verò
Argentinenles herbarias fūden schell vocare,
vel fūschell, q. e. si interpretens, Campanula vel
Nola culinæ, siue culinaria: Campanula vacca,
aut vaccaria. Videtur autem ipsi Ranunculi ge-
nus Sardonium, de quo Dioscorides lib. 2 scrip-
sit, quamuis non delint qui Oreoselinon esse
contendant.

Herba
Sardonia
Trago

Cordus in Hist. pro Decima Ranunculi specie
describit, ac leptophyllon & comatum cogni-
minari posse concedit.

Ranunculi
species
Cordo

Gesnerus hic figuram ex Trago posuit. Idem
de hort. vocat Pulsatillam vulgi Italorum, Cau-
dam vulpinam Amati, Ranunculi Dioscoridis
secundam speciem, Herbam Sardoam, & Helue-
tiorum Birgvis. Item Anemone Aretii, flori-
bus caruleis, maioribus tamen, pallidioribus, &
et nonnullorum das wilden mans frasis.

Pulsatilla
Italor
Cauda
Vulpis

Turnero pingitur the common Anemone ti-
tulo.

Dod. gall. inscripsit Herbam Sardoam & A-
pium risus, delineauitque pro Ranunculi auri-
comi (Ranunculi dulcis folio rotundo) specie
altera, floribus purpureis. Hanc incognitam
scribit, ac postea inter nomenclaturas ita appel-
landam censet: Herbam sc. Sardoam, Apium sil-
uestre, Apium rusticum, Apiastrum, & Apium
risus, ut quo nomine in aliquibus officinis co-
gnita sit, ut in aliis Pulsatillæ Gallicæ Passifloræ,
Belgicæ Cneusense: Sed aliter sentit Dodon.
in fol. lat. ubi Pulsatillam vocat. A nonnullis, in-
quit, Apium risus dicitur. Non est tamen Herba
Sardoa, quæ propriè Apium risus videtur ap-
pellanda. Non est etiam Ranunculi, neque
etiam Anemones species: utrisque tamen & præ-
sertim facultatibus accedit. Colore est plurimum
Violæ nigæ purpureo, quandoque candido, al-
liis luteo, rariis rubente. Belgæ in hortis habent:
apud Germanos satis frequens locis asperis &
lapidosis, & subinde in ipsis rupibus, & quidem
flore purpurei ex caruleo coloris, qui pro loco-
rum ratione aut inueniuntur, aut remissior. In silvis
siquidem de umbrosis dilutior colore quasi in-
albidat, flos in apricis coloratior est: Albidi floris
Auerntæ & Narbonensis Galliarum montes sup-
peditant: lutei Taurinenses Allobrogum: rubri
floris ex Alepo Syriæ urbe habetur.

Herba Sar-
doa & A-
pium risus
Dod gall.Nec Apium
risus
nec Ra-
nunculus
etiam A-
nemone est

medium obsidet ex oblongo rotundum capitulum
fibris apicibusque luteis cinctum: postquam
autem delapsus est flos, caulis supra solum
supra dictum, quintuplò, aut aliis excolescit,
proque flore incedit comosum capitulum sta-
minum hofericeorum mollitie, argentei splen-
doris: appenso vnicuique stamini semine ob-
longo, tereti: delapsis porro caducis seminibus
vnâ cum staminibus appensis caput relinquitur
rotundum: radix crassa, longa, nigra, in plura

Tom. III.

Xx 3

Pulsatilla
vulg.
Lob.

Lobel. in Obs. p. 149. & in Ic. Plant. p. 281. vocatur Pulsatilla vulgaris. Qui Ritus Apium Diolcoridis autumant, ritum potius quam responsum merentur.

Pulsat.
Matth.
Fuch.
error.

A Matthiolo in Epit. & Hist. & germ. cum addit. Camerarii, ac etiam passim in comm. in Diosc. Pulsatilla titulo pingitur, dicente: Fuchsius in libello imaginum Anemones purpureæ (sylvestris) loco, pingit herbam quæ plensque Pulsatilla cognominatur, etsi nullam habeat cum Anemone cognationem. Scribit Ruellius Anemone in Gallia nasci, eamque esse, quam Herbarum venti vocant Herbari: sed me latet quid Ruellius per Herbarum venti intelligere voluerit. Bohemi vocant Fonicflec, Saxones propter semen Bocksbart. i.e. Barbam hirci.

Pulsatilla
vulg.
duo genera
Clus.

Pulsatilla vulgaris Clusius duo genera passim in Austria & vicinarum regionum locis editionibus & vento perflatis inveniuntur: vnum præcipue crassius folio, amplius flore, quod ab Ungaris lo kevvkevvrchin, i.e. equi kevvkevvrchin, siue equina Pulsatilla: alterum, non adeo præcox, folio tenuius inciso, floreque minore, & purpurei coloris, adeo saturi, ut niger videatur, Ungaris Lean kevvkevvrchin, h. e. virginis kevvkevvrchin, siue virginea Pulsatilla, appellata. Is verò titulo Pulsatilla vulgaris dilutius flore iconem habet à Lobelio propositam pro Pulsatilla vulgaris: Et titulo Pulsatilla vulgaris saturius flore, quæ Lobelio dicitur Pulsatilla flore clauso caeruleo.

Synon.

H. Lugd. p. 849. vocat Pulsatillam Matthioli. Tabern. in Ic. & Hist. nominatur Pulsatilla 1. flore purpureo & caeruleo; item Cauda vulpis: Gerardus Pulsatillam vulgarē vocat Purple passe flower: Schvvenckf. Pulsatillam purpureo flore, Thallus Anemones speciem Pulsatillam vocat: C. Bauh. phyt. Pulsatillam 1. siue vulgarem, foliis florum nonnunquam reflexis, colore ut plurimum Violæ nigre purpureo, & etiam obsoleto.

Locus & Tempus

Montepelii Martio. mense floret in montibus ceu & Lugduni, ubi copiose provenit. Frater C. B. circa Helvetiorum Badenles thermas, purpuream collegit. Szpius in hortum transtulit, sed frustra. Copiose tandem circa Bonam in Germania nascitur, & circa Oxoniam in Anglia, ut Turnero Falconerus retulit.

Vires & vias.

Ab Empiricis id compertum habet Brunfelsius, quod vulneraria sit herba. Quod folia non sine acore quodam secantur, ita ut oculos, quemadmodum Allium aut Capz feriant. Quod illa per Alembicum distillata, aquam vulneribus mūdicandis curandisque præstent utilissimam, quæ & putridam carnem erodat. Folia, caules, & flores [inquit Matth.] cum acerrimo sint gustu, exarscunt & siccant ordine quarto: incidunt: attenuant, attrahunt, digerunt, expurgant, & exulcerant. Radix verò cum subdulcis sit, non longe aberit à temperatis. Sunt qui eam maximè præferant, contra pestilentie contagia & pota venena, & virulentorum animalium ictus, si cum vino bibatur, drachmarum duarum pondere, quare in Antidotis additur. Aqua è foliis distillata, vulnera sanat, & pota sudorem provocat. Trago Herba venticalida est & sicca, debetque magis externis, quàm internis corporis partibus adhiberi. Commendatur ad calculos, gangrænam, putrida vulnera, vngues scabidos, papulas, maculas, verrucas, & maculas. Radix siccata sternutamenta ciet: cruda verò mansuetudinem elicit.

Sudorem
provo-
cat.

PVLSATILLA FLORE CLAUSO CAERULEO. Descri.

IN Pulsatilla flore caeruleo perpetuo clauso conspicuam differentiam videnti copiam fecit Lobelio Goldenbergii hortus. Ceteroquin cum superiori re ipsa una, nisi folio esset superuiventi.

Lobel. Obs. p. 150. dicitur Pulsatilla varietas. Ic. Plant. p. 281. Pulsatilla flore clauso. Dod. in fol. lat. Pulsatilla altera icon. H. Lugd. p. 850. Pulsatilla altera Dodonzi. Clus. in Hist. post. [ubi icon eadem quæ Lobelio, sed diversa descriptio, quam antè tradimus] Pulsatilla saturius flore. Tabern. Pulsatilla 3. siue caerulea minor. C. Bauh. phyt. Pulsatilla 4. siue foliis florum reflexis.

Synon.

PVLSATILLA RVBRA.


Differt à vulgari non solum floris colore, sed etiam formâ foliorum, quæ tenuius diuisa: florum item foliis, quæ in priori acuta, in hac obtusa.

Hæc sine dubio est illa Pulsatilla rubra Obs. p. 149. Icon. Plant. p. 281. quam ex Alepo Syriæ vrbe se habuisse Pena & Lobelius referunt, quanque Clusio videre nunquam contigit.

Inferibitur hæc apud H. Lugd. p. 850. Pulsatilla rubra Lobelii. Tabern. in Icon. & Hist. item: quæ Gerardum, Pulsatilla 2. rubra. C. Bauh. phyt. Pulsatilla 2. siue flore rubro: apud Matth. Pulsatilla rubra.

Synon.

PVLSATILLA ALBA.



Pulsatilla alba, foliis est multo amplioribus, quàm reliquarum vlla, nec ita etiam minutim concisis, & ad Myrrhoidis fil. foliorum diuisuram quodammodo accedentibus, & nonnihil hirsutis: caulem qui cubito longior nonnunquam, medium cingit consimilia quoque folia: ceterum, flos qui summo cauli hæret vnicus;

lacteum est candore, quem villosum capitulum cristatumque aliarum more consequitur: radice iudem crassa.

An hæc est Bened. Aretio in descr. montis Stockhornii apud Gesn. de hort. altera illa species Bigmürthen flore albo, quam Ranunculum aliquem montanum aut Anemones speciem esse haud negauerit?

Gesnerus de hort. nominat Anemonem flore albo, quam græcè *oprymorra* dicendam præcipit. Item, Pulsatillam Italorum, Anemonem albo. In descr. montis Fracti, in lib. de Lunar. Anemonem alpinam,

Ranunc.
montan.

Anem. fl.
albo

Puls.
italorum.
Anem.

alpinam, radice nigra &c.

Pulsatilla alba
Lob.

Fortè Lobeli Pulsatilla albidapallens in Advers. non eadem est cum nostra, quam in Obs. p. 149. Icon. Plant. p. 181. Pulsatillam albam inscribit.

Pulsatilla alba
Tabern.

Tabern. in Ic. & Hist. habet Pulsatillam albam siue 3. quam Lean fœrcherin Hungaricè, h. e. Virginis Pulsatillam vocat. Habet & in Hist. Pulsatillam 4. flore albo prouenientem in montibus Lotharingiam separatibus ab Alsacia, potissimum inter Espinal & Fontenoi inter rupes, unde quoddam difficultè euellatur, Pulsatillam petream, vocandam existimat.

Synon.

Gerardo dicitur Pulsatilla flore albo white Passflower: Schwenck. Puls. niuea alpina. Puls. petrea, Schneblumen Schnehenlin / & wild Mauefraut. C. Bauh. phyt. Pulsatilla 3. siue flore albo. Clus. in Pann. p. 381. Anemone silu. 2. montana Pulsatillæ folio.

Locus & Tempus.

Geneuz mense Iulio in monte Thuri copiosè floret. Crescit in celsioribus Etcher & Durrenstein Stiriz iugis, inter scopulos tenui & leui terra rector: plerumque verò in ipsis scopulorum fissuris & commissuris ad aliè radices agit, ut summâ difficultate, & viæ vnquam, nisi avulsis ferreo instrumento scopulorum fragmentis integras Clusio erueret licuerit. Floret autem Iulio, interdum etiam duntaxat Augusto, pro ætate maturius aut ferius incipiens natura, solutis videlicet niubus: nam è primis floribus est. Semen plerumque maturitatem acquirit sub extremum Augustum. Difficultè cicurari posse tradit idem Clusius.

PULSATILLA LVTEA.

Descript.

Pulsatilla lutea palmatis erat planta, radice crassa, foliis caruleis modo diuisis, sed legementis lationibus, valdè hirsutis: caulis singularis, vnicum summo fastigio sustinens florem colore luteo præditum, foris hirsutum, intus glabrum, obsidente medium apicum magno numero.

Camerarius ait florem luteum subrubentem, & subsequi semen papposum barbatumque: figura autem quam proponit facta est ad plantam meam siccam Gesnero missam.

Synon.

An Anemone siluestris tertia Clusii? An Gesn. hort. huius meminit. Anemones & Pulsatillæ flore luteo nomine? Pulsatillam luteam vocat Camer. in Matthioli. G. Ste. Bignonius, h. e. Radicem contra morsus venenatos luteam: in eiusdem verò Hist. G. Ste. Fischenschel. Campanulam, siue Nolam culinariam luteam. Commemorat Pulsatillam luteam Lobel. in Adv. & Pulsatillam lutei floris Dodon. in fol. lat. Qui an nostram intelligant, ambigimus. Siquidem eam à vulgari colore tantum distinguunt. Pulsatillam luteam sibi à Pedemontio sicca missam ait Tabern. indeque Pulsatillam Pedemontiam cognominat.

Dalechampi apud H. Lugd. tria Pulsatillæ genera luteo flore conspicua produxit. nam autem inscripsit p. 350. Pulsatillam 1. Alpinam Dalechampi, radice crassa, nigra, exesa, foliis Apii modo dissectis, inter hæc tria genera latissimis, hispida.

C. Bauh. phyt. vocat Pulsatillam 5. siue luteo flore: Pulsatillam autem Camerarii: Pulsatillam verò 6. siue luteam Apii folio, primam Dalechampi. Sed cur Dalechampi Pulsatillam lu-

team 1. separet à lutea Camerarii non video.

Reperi florentem Iulio in Rhœtici monte Brauni, Gener Cherlerus sub finem Iunii in monte Gotthardi.

Locus & Tempus.

PULSATILLA LVTEA APII HORTENSIS

folio 2. & 3. Dalech.

Pulsatilla 2. alpina Dalechampi siue lutea 2. genus apud H. Lugd. p. 351. radice est tenuiore, brevior, minus atra, foliis hortensi Apio simili-
Pulsatilla 2: alpina Dalech. descr.

libus, paulò lationibus, hirsutis, radicem ambientibus, multis in caule dodrantali, lanuginoso, mediâ sui parte villoso glomo pubescente e quo prodit floris aurei pediculis.

Pulsatilla 3. alpina Dalechampi, siue lutea tertium genus, radice est, quam in superioribus gradioribus, foliis Pastinacæ siluestris, apicibus in medio flore coaceruatis luteis, quos in seminis conceptaculum tandem formatos spissa lanugo vestit. hæc tria genera, inquit, in monte Murz, Allobrogum oppidulo vicino, reperiuntur.

C. Bauh. phyt. vocat Pulsatillam 7. siue luteam Apii hortensis folio, Puls. 2. Alp. Dalechampi: Tertiam verò Puls. 3. siue luteam Pastinacæ silu. folio. Pulsatillæ luteæ secundum genus vidi apud Fratrem. Quod sit tertium nos latet. Icon nobis quidem inepta & falsa videtur: nec putamus reperiri Pulsatillam ramotam, nisi fortè monstrosum, qualem hæcenus non vidimus.

ANEMONE MAGNA ALBA PLVRIMA

parte anni florens.

Radix minimi digiti est crassitie, plurimis fibris donata, multum se multiplicans, Hellebori nigri vulgaris modo, sapore subamaro: caulis dodrantalis, tenuis, rigidus, densâ lanugine canescens, subinde circa summitatem rubescens, concavus: floris, in singulorum caulium summate priusquam dehiscat, hirsutus, postea magnus, nonnihil odoratus, quinis, senis, septenis siue foliis constans, cuspidate orbiculatâ internâ parte penitis albis & glabris, externâ verò hirsutis, unguibus purpurascens: in medio, staminum croceorum corona

Descript.

ambit capitulum tuberosum, serè herbidum, quod maturo semine, paruo, plano, in lanuginem albam resoluitur: folia Ranunculi serè, triplici diuisura profunda ad pediculi usque extremitatem, inferius hirsuta & albicantia, supernè glabra, saturo virore tincta: atque horum quidem alia incerto numero radix statim emitte, pediculis palmaribus &



bipalmaribus: interna verò in caule pediculis vincta:

An Pulsatilla lutea
Lob.

C. Bauh.

hibus ; & sesquiuncialibus caulem amplectun-
tur.

Folia Clusio ingrati initio saporis, postea acris:
Flos vnicus, rarissimè bini: Radix ingrati & acris
saporis

An Cocles, Caelourdes ou Coquetourdes blanches
Ruellio ?

Ranunculi
2 species
Cordo.

A Cordo in hist. describitur pro Ranunculi 2.
specie. A Matthiolo verò exhibetur in post.
comm. It. & Lat. cum mag. fig. & hist. germ. Anemones
tertiz nomine, licet pictor, etiam Clusio
teste, iconem negligentius expresseit. Pingitur à
Dod. in sol. lat. pro Anemone Pannonica. A Lobel
in Obs. p. 48. in Ic. Plant. p. 280. pro Anem. 3.
Matthioli flore albo. A Gerardo pro Anemone
Matthioli. A Clusio in Pannon. p. 381. pro Anemone
filu. Ranunculi folio prima: In hist. post. pro
Anemone filu. prima. Ab hist. Lugd. p. 343. pro
Anemone 3. Matthioli.

Camer. hort. dicitur Anemone filu. flore can-
dido. Thallio Anemone fl. candido, amplo, folio-
so, palmati, folus hispidis, latè expansis, variè que
dissectis. Schvvenckf. Anemone maior alba,
Theophrasti, weisse wind Rösslin: Angl.
white wind flower.

Tabern. in Ic. & hist. Anemone maior alba,
vnguibus interdum veluti purpurascens. Gross-
weiß Anemone Rösslin. Item, in hist. Anemone
15. Anem. filu. alba. Et, Anemone 16. solo
flore purpureo à precedenti varians: Anem. filu.
purpurea.

Hort. Lus. Anemone filuestris flore grandi,
foliis Ranunculi, durioribus tamen, locis monta-
nis inter Ericas proueniens. Item, Anem. 3. Mat-
thioli, filuestris, Ranunculi folio, prima Clusio.
Considerandum quæ sit illa Anemone grandi
flore Horti Lusitæ, an solo flore à Matthiolina
differat.

C. Bauh. phyt. Anemone 13. siue alba, radice
fibrosa, Matth. Ic. 356. Anemone 3. Apud Matth.
præterea, Anem. alpina Gesneri in monte Fracto,
Aconito cognata. Diximus nos Anemonem Ges-
neri non posse esse eandem cum Matth. Anem.
3. Gesneri enim Anemone lanuginem habet in-
star Vitis filuestris caustica, lanugo autem Anemones
3. Matthioli plurimum differt: melius in
phyt. p. 317. ponitur pro Pulsatilla 3. flore albo.
Planta tandem, quam Gesn. hort. Aconito co-
gnatam affirmat, videtur nobis Ranunculus mō-
tanus, albus, hirsutus.

Primo Verè, & Æstate, ac etiam Autumno flo-
ret, multumque radice se propagat, culta quidem
in horto Ill. E. C. spontanea verò ad Rhenum in
Brisgouia inter Bûrcken & Offenbûrg, ut etiam
circa Heidelbergam, & in Bohemiæ collibus, ac
copiosè quoq; ad loca montana quatuor milia-
ribus à Norimbergæ, vicinisque Francofurto ad
Mœnum pratis. Quin & Broccenbergi cacumini
familiaris, Sed & vicinis vrbi Viennæ pratis, &
plenisque Austriæ, Pannoniæ superioris & inferi-
oris, tum interamnis ultra Dræum flumen, mō-
tanis locis nascitur.

ANEMONE TRIFOLIA FLORE ALBO

CAP. XXII.

Properat huc & alia quædam, tametsi foliis
differens. Neque hæc enim Coriandro, aut
Ranunculo folia gerit similia? sed instar Trifolii



in propages quasdam extuberat, non absque
capillamentis fibrosis subnatis.

Dodon. qui in sol. lat. pro 7. Anemone dicto
modo descripsit, Anem. trifoliz titulo pinxit. II.
Lugd. p. 347. Anemonem trifoliam Dodonæi in-
scripsit. Gerard. Anemonem trifoliam, Three
leafed wind flower. Tabern. in Ic. Anem. tri-
foliam Hec wind Rösslin: In hist. Anem. 9. trifo-
liam. C. Bauh. phyt. Anem. 19. siue trifoliam.
Lobel. in Obs. p. 150. Icon. Plant. p. 281. Alaba-
stritem siue Dentariam albam D. Brancionis.

Cæterum, Lobel. tam ignotas vires perhibet,
quàm raram plantam ait, minusque obuiam, nec
nisi in vireto D. Brancionis ipsi visam.

RANUNCVLVS PHRAGMITES, ALBVS
& purpureus vernus.

CAP. XXIII.



Ranunculus Deser:
Phragmi-
tes vernus ra-
dicem habet
crassiusculam,
longam, obli-
què proserpen-
tem, foris pur-
puream, aut fu-
scam, intus al-
bam, sapore
cum leui ad-
strictione acré,
nescio quid
empyreumatis
ecu spinarum
pisium crema-
torum respi-
entem, à qua
fibræ capillares
demittuntur: sur-
rigitur: collica-

lus tenuis, mollisque, purpurascens, sesqui palma-
ris & maior, citra cuius fastigium vno & eodem
loco enascuntur folia terna Ranunculi ex seman-
cialibus rubellis pediculis, hirsuta, nunc virentia,
nunc

Gesn.

Locus &
Tempus

Deser:

nunc purpurascens: colicula summo flos insidet vnicus lacteus, aliàs cum vnguibus colore carneo, rarius totus purpureus, foliis constans senis, nunc oblongis, nunc brevibus & subrotundis, in medio stamina plurima crocea.

Ruellio Ranunculus 4. flore lacteo quem rursus gallica *Senicion*, quasi *Saniculam* vocant Brunfels. *Sanicula* altera species agrestis. Cordo in Hist. l. 2. cap. i. (vbi Gesnerus figuram Tragi addit, ac insuper monet huius Ranunculi flores esse vel albos, vel roseos, vel luteos) sub Ranunculi quarta specie, cognata tertie describitur. Vocatur autem eodem lib. cap. 184. Ranunculus *Chelidonium*. A Fuchio pingitur in Hist. pro Ranunc. 4. specie, sed non describitur. In lib. 1c. pro Ranunculi 4. Dioscoridis specie lactea: quin & Dodon. gall. sub titulo Ranunculi 4. generis eam pingit ex Fuch.

Synon.

Trago dicitur Ranunc. siue candidus cum rubore, weisß Aprillen blumen: Gesn. hort. Ranunc. phragmites fl. lacteo, & Mergen blumen. Ranunc. phrag. fl. albo, vel roseo, Anemonis adnumerandus: In cat. s. l. (vbi verba Ruellii allegat) Ran. 4. de coll. stirp. Ranunculi genus 4. Fuchii, quod vulgò vocat Martini flores; albos & purpureos. Loban Advers. Ranunc. nemorosus fl. albus: in Obi. p. 384. & 1c. Plant. Nemorosus Ranunculus. Hort. Lusit. Ranunc. nemorosus albus, weisß walde henlein: nê, Ranunc. nemorosus purpureus, lieft rot walde henlein. C. Bauh. phyt. Ranunc. 1. siue nemorosus albus, flore communiter candido, aut ex purpura rubente, sed modò dilutione, modò intensiori colore, vel carneo, imò & roseo, & duplis floribus. Est & qui in dorso, frequentibus punctulis protuberantibus exasperatur. Est maior, media, & maior species. Hinc Thalus in sua Hareynia Ranunc. tertij quinque genera enarrat.

Tabern. icon. ranunc.

Tabern. in Icon. cur tres figuras, Ranunculi nemorosi albi, purpurei, & ex rubro purpurei 2. nomine, ponit, quum colore tantum differre videantur. Ranunc. octauus [inquit in Hist.] est Dioscoridis 4. tus lacteus, quem Germani quidam *Augen würg* vocant. Nonus & decimus sunt etiam species Ranunculi quarti Dioscoridis, quia florum duntaxat colore differunt.

W. Lugd. reproh.

Turpiter H. Lugd. duas historias & duas icones eiusdem plantæ diuersis libris & capitibus ponit: p. 347. Anemonem 5. Dodonæi, Ranunculum nemorosum 4. Fuchii: p. 1030. Ranunculum lacteum Fuchii, Ranunc. album nemorosum Dodonæi.

Schvvenckf. vocat Ranunc. præcoccem candidum, Ranunc. præcoccem purpureum, Turb. Ranunc. album siluis & umbrosis gaudentem, ac Aprilis florentem. Dodon. lat. Anemoni 5. Sunt, inquit qui, Ranunculum phragmitem vocitant. Flores eius aut lutei, aut candidi, aut purpurei.

Locus

De Ranunculo phragmite albo & purpureo vetno, hæc Clusius scribit: Vulgares sunt in Pannonia & Austria siluis illæ stirpes, quæ toti Germaniæ, & multis aliis Prouinciis communes, à nonnullis Siluarum Ranunculi nuncupantur, Anemones tenuifoliz exuleo flore præne foliis, & inter siluestres Anemonides procul dubio numerandæ: imò à quibusdam siluestribus Anemone, Theophrasto *λενωρία* dicta, æstimatæ. Solent autem illæ nouo Vere florem proferre, eumque aut lactei prorsus candoris, aut purpurascens, Tom III.

Ranunc. siluarum Anem. silu. L. emonia Theoph.

aut cui in candore leniter aspersa sit dilutior purpura, siue carnea [liceat mihi hoc vocabulo uti] color. Est etiam quæ flauum habeat: &c.



Ille autem Ranunculum siluarum inscribit: variæque alias Ranunculi nemorosi tradit & describit species verbi gratia *Ranunculi nemorosi* genus 1. *Anemone nemorosa* peregrina 1. ipsi dictum. *Ranunculi nemorosi* genus alterum, *Anemone nemorosa* peregrina 2. ipsi dictum. *Ranunculus nemorosus* flore pleno albo & purpura

rascente cuius hinc iconem damus.

Reperitur Lugduni flore lacteo mense Martio *au bois de la bonne Alemande*: Genæ albis & carneis, vt & Montbelgard, in siluis & dumetis florens adhuc etiam Aprilis. Primo Vere in Silesia siluis frigidiusculis montosis vberum cum flore luxuriat, Schvvenckf.

Locus & Tempus

RANUNCVLVS PHRAGMITES LVTEVS nemorosus.

Vt et nunc phragmitæ Ranunculi radix præcedenti vulgari albo & purpureo forma, colore, sapore, fibrisque per similes, colicula item & foliorum numero conuenit, sed folia virentiora, longiora, breuioribusque pediculis, ita vt iis quasi destituta, concursu suo quasi cotylam purpurantem efficiant, in cuius medio præter duo folia oblonga minimeque dissecta, crenataue, coliculi scapus nonnihil pilosus, florem sustinet nonnunquam singularem, aliàs geminum, Ranunculi, aureum, quinque foliis, latiusculis & obtusis constantem: in cuius medio staminula crocata plurima.

Tabern. flos minor est quàm albi: herba tota sapore acris & vrente.

Huius Ranunculi Thalius genera duo scit. Alterum cuius flores deprehendere nunquam potuit: alterum verò cuius flores sint citrini & species duæ.

Clus. in Pann. p. 185. vocat Anemones silue. Synon. stris genus totum luteum, plerumque aliis minus & præcocius: In hist. post. Ranunculum siluarum flauum, foliis ab albo & purpureo nonnihil differentem, plerumque humiliorem & præcociorem. Lobel. in Icon. Plant. p. 674. Nemorosum Ranunculum luteum. C. Bauh. phyt. Ranunc. 2. siue nemorosum luteum, flore communiter vnico, aliquando duobus, aut tribus. Tabern. in Icon. Ranunc. nemor. luteum. Gees. Wald Hânlein: in hist. Ranunculum 7. Dioscoridis tertium, & Batrachium Diosc. tertium, Ranunc. phragmitem luteum, *Ranunculo saluatico giallo* Italarum, *Jelowe Wood* & *Crowfoot* An- Yy

glorum Gele bosch Hanehoet Belgar. Schvv. Ranunculi præcoccem luteum, gelbe wald Weilichen. Dod. gall. Ranunculi 4. genus, Grenosillerre de bois, Ranunc. paruum: Idem de purg. p. 302. & in fol. lat. Anemonem sextam, foliis tantummodò, floreque minorem, eoque luteo. Fuch. in hist. Ranunculi quartam speciem luteam: in Icon. Ranunculi apud Diosc. speciem tertiam. Tragus [qui portionem huius alteri adhzrentem pingit] Ranunculum tertium. Cord. in hist. Ranunculi tertiam speciem. Gesn. hort. [cui Anemonibus adnumerandus cum albo videtur] Ranunc. phragmitem flore luteo.

Ran.
phrag. lat.
Locus &
tempus.

Genevæ florentem Martio reperi. Basileæ in Mendenstein observavit C. Bauhinus. Montbelgardi in silva Chesnoi occurrit.

RANUNCVLVS CVM FLORE IN MEDIO folio, radice tuberosa.

CAP. XXV.

Deser.



Rara est elegantia huius Ranunculi quippe qui nullum producit caulem, sed ex radice tuberosa si adultior, sit, Anemones modo inæqualibus articulata, alias Staphylodendri nucem magnitudine duntaxat adæquante exterius nigra, acri admodum gustanti Dod. feruente Camer. fibris nō-

nullis capillata: [Cæsalpino radices sunt candidæ, breues, multæ, æcruatæ, similes minori Chelidonio] vel, ut ait Camer. pluribus tuberculis aut granis composita, pediculos aliquot promit, palmares, vel etiam dodrantes, teretes, cauos, nudos, præterquam quod extremum in umbilicum inferitur folii, quod pediculo singulare infidet, rotundum ferè, sed ad pediculi usque commisionem multifidum, in radios stellatos subdivisos sectum, glabrum, splendidum, saturo virore tinctum: Camer. folia explicat rotunda, in rotæ modum: C. Bauh. folium rotundum circumscriptione vnicum quidem, sed in plures partes Geranii Columbini, aut Napelli figura, in profundiores minusque profundas lacinias diuisum: è cuius medio sessilis, sine pediculo flos vnicus emicat, Ranunculi, luteo auri fulgore, vel ad virorem declinante, Vel, ut ait Camer. si minor fuerit, flauior est, sin maior, aut longiusculus, obscurioris est flauedinis, senis longiusculus foliis constans, medium obsidentibus numerosis fibris apicibusque luteis: horum delapsum excipiunt corniculatæ siliquæ Aconiti, vel Hellebori nigri, quatuor, aut quinque erectæ: C. Bauh. semen inclusum siliquis, rotundum, compressum, flauescens, Milu instar Cæsalp.

Dodon. in Hist. purg. & in fol. lat. pinxit Aconiti lutei minoris titulo, descripsitque pro Aconito Lycoctono luteo minore, hæc de eo subdens verba: In Belgii hortis non rarò ipso Ianuario floret, præsertim vbi clementior Hyems est. Et hinc Aconitum hyemale, siue hybernium dici cepit. Aconiti autem speciem esse, & formâ foliorum, siliquarumque, tum & ipsa perniciosa herbæ facultas ostendit. Ad Theophrasti autem Aconitum multum accedit, quod ab ipso lib. 9. c. 16. describitur: &c.

Lobel. in Aduers. vocauit Ranunculum bulbosum vni folium batrachoidem, Elleboraceam herbulam. Sed in Obl. p. 386. [vbi Aconitum hyemale Belgarum, Ranunculum monophyllum, & Anemonem Bononiensem vocat, & p. 385. etiam inscripsit] hunc titulum corrigendum præcipit, legendumque voluit esse Bulbosam vni foliam, batrachoidem elleboraceam plantulam. In Icon. Plant. p. 676. Aconiti hyemalis Belgarum, Aconiti batrachoidis elleboracei titulo, habentur duæ effigies, sc. Observationum quæ erat retinenda, & aduersationum, quæ ut imperfecta erat repudianda.

Cæsalp. Elleborinæ nomine describit, ac Elleborinam Theophrasti esse, & Epipactim Dioscoridis & Plinii, statuit. Ponæ in Baldo dicitur Aconitum Lycoctonum batrachoides Lobelii. C. Bauh. phyt. Aconitum, siue vni folium luteum bulbosum: apud Matthiolum suspicatur esse Aconitum Theophrasti.

Si planta, de qua hic nobis sermo est, Compilatori H. Lugdunensis fuisset nota, eius aut non tres figuras dedisset, aut saltem diuersorum librorum capitibus, titulisque non seiuuisset, ponendo p. 1505. Bulbum paruum vni folium Penæ: p. 1742. Aconitum lycoctonum luteum minus Dodonæ: Item, Aconitum aliud Dalechampii.

Euganeis in montibus inter montem Gemulam & Vidam Februatio mense florentem reperi: Bononiæ in agris & montibus Apenninis semine maturo, Aprili. Montbelgardi ferens Hiemem in horto Ill. E. C. floret Februatio.

Radicem cum magna prudentia exhibitam purgare perhibet Camerarius: sin verd non ritè, aut nimia quantitate vsurpetur, esse valde nocuam.

RANUNCVLVS FOLIO RVTACEO. CAP. XXVI.

Aliquot, inquit Clusius, à radice (singulari, crassiuscula, producit folia multifida, Rutæ foliis non valdè dissimilia, molliora tamen & magis viridia: flores autem habet amplos, ante ipsa folia emergentes, forinsecus dum initio emergunt, ad suauem rubentem colorem tendentes, internè candidos, duodenis aut pluribus foliis constantes, umbilicum occupante capitulo viridi, ut in reliquis Ranunculis, cincto multis albicantibus staminibus quæ flauos apices habent, sine odore: hos sustinet cauliculus teres & initio purpurascens, deinde ex viridi pallescens, quem ambit vnicum plerumque folium [rarè plura] exiguum duabus aut tribus lacinias diuisum, latè basi cauliculum amplectens: floribus deciduis succrescit illud capitulum, & in semina crassiuscula euadit, Thoræ Valdensium, siue Ranunculi grumosa radice tertii, semini pæne similia.

Clus. ve.

Aconitum
luteum
minus
Dod.
Acon. lyco-
ctonum
luteum
minus

Ranunculi
bulbosus
vni fol. Ad-
uers.
Acon. hye-
male Belg.
Ranunc.
monophyl-
lus
Anem. Bo-
noniensis.

Elleborinæ
Cæsalp.
Acon. lyco-
ctonum

Compilatori
H. Lugdunensis

Locus &
Tempus

Vires

Locus

Clus. verò dicitur Ranunculus præcox. Rutæ folio: C. Bauh. phyc. Ranunc. 4. folio rutæco: Pontæ in Baldo Ranunc. alpinus Coriandri folio, flore sex foliis composito, albis, subpurpureo-tenibus, ac venulis sanguineo colore percurrentibus.

Nascitur in inferioribus Sneberg iugis, & vicinis montibus, inquit Clusius: nos verò Aprili florentem Heidelbergæ apud Sprengerum observauimus.

RANUNCULI EX ANTIQVORVM ET
Recentiorum sententia in genere.

CAP. XXV.

Diosc. 4.
Ranunculi
species

Dioscorides Ranunculi plures proponit species, sed vim vnam, acrem, & valde exculcerantem. Habet, inquit, una ex ipsis, folia similia Coriandri, sed lauiora, subalbida, & pingua: florem luteum, quandoque purpureum (prospici) caulem non crassum, sed cubitum altum: radicem paruum albam, amaram, quæ propagines Veratri modo habet. Nascitur iuxta fluuenta. Est & altera species lanuginosior & longior caule, quæ plures habet foliorum incisuras, & plurima in Sardonia nascitur, acerrima, quam sanè & siluestre Apium vocant. Tertia species valde parua, & grauis odoris est, flos eius similis auro. Est quarta huic similis, flore lactei coloris.

Eadem etiam quatuor Ranunculi species facit Plinius: totidemque Galenus.

Veterum, præsertim verò Galeni, Ranunculos nostris accommodat Cordus: quod etiam facere annititur Cæsalpinus: Ranunculos appellans plantas, aut in aquis, aut prope aquas nascentes.

Marantha
Ranuncu-
lo 10.

Eiusdem
que lapsus

Nomina
linguarum

Marantha decem Ranunculi genera obseruauit, floribus, radice, foliis, acrimoniaque Ranunculo- rum naturam præ se ferentia, licet aliud ab alio differat, quod acrius sit. Artificiose Maranthæ distinctione, si Diis placeat, ab acrimonia Ranunculo- rum desumpta.

Ranunculos posterioris obseruationis in duo prima diducit genera Dodonæus, ita ut vnus sit hortensis: reliqui autem siluestres. Horum autem nonnulli vulgares, alii verò externi.

Nos Ranunculo- rum differentiam petimus tum à radice, ita ut alius dicatur Ranunc. tuberosa, racemosa & grumosa radice. Alium à caule & foliis cognominamus rectum, repentem, læuem & hirsutum: Item, tenuifolium, latifolium, rotundifolium. Diuersitas & in flore est. Est enim Ranunc. flore simplici & plene: rursus luteo, albo, & phæiceo. Ludunt & natales. Et hinc obseruatur hortensis, arvensis, palustris, siluaticus, siue montanus & alpinus. Alius vulgaris, Exoticus alius, Asiaticus, Constantinopolitanus, Lusitanicus, &c. Tempore quoque variant, Hiemalis, Vernus, & Autumnalis.

Ranunculus in genere Græcis dicitur Βάτραχος, οἰλίον ἄγριον, οἰλίον ὑδατίον, Βάτραχος, χαλδο- φῶν, σάκτις, κατὰ σάκτιν, χαλδοφῶν, καλὸν, ροδῶν, ὀφείδιστον, σαρδῶν εἶδος, & Epigram. λυκίσκος. Latinis etiam Batrachium, Batrachis, Clonum, Hephæstium, Rhufelinum, Lycopus, ac etiam ut antiqua Apulei exemplaria legunt, Herba scelerata, Clorophis, Phœotium, Rhofelinum, Apiastellum, Dentaria, Tom III.

Mileum, siue Nileum, & Auricomum: Plinio Herba strumea: ab herbariis appellatur Herba vulneraria, Herba caustica, Apium raninum, Vulcania, Herba Vulcani, Herba ranina: Arnoldo Villanouano, Ranunculus lupinus: Vulgo Herbariorum Pes corui & Pes galli, sed perperam: Ab aliis, eodem tamen lapsu, Pes coruinus, & Pes gallinaceus: A nonnullis Apium siluestre, Apium rusticum, & Apium aquaticum. Hermolaus hæc nomina subdit: Apiastrum, Strumen; Polyanthemus: Horatio Sardea herba: Apuleio Gelotophye: Cotiannon, Corion, Synechion, Carcadana, Nemecon, Apium risus. Ab Arabibus præsertim Serapione lib. de simpl. cap. 198. nominatur Borachion, quod dubio procul nomen à græca Βάτραχίῳ voce derivatum est. Ab Hali Abbate Verdelhe, Verdelhe, Quemgeum & Quegenum & passim Kebikenzi, Lelelach, Madafin, Maserus, Nodassar, Reicheg, Mischeh, & Kimisl. Germanis Hanensfuß / hunsersfuß froßschfrauß / froßschpfeffer / Rappensfuß Schmalzblum / Brennender hanensfuß / Gleyßblum / Butterblum / Blatterfraut, Brenfraut / Eubentraut / Spiegelblum, & alicubi in Sueuia Glizer psanlein. Belg. Hanenuoet / & Boterbloem. Gallis Bassinet, Bacinet, & Grenville. It. Ranuncolo, Ranunculo, Pie coruino, & Apio risi. Hispanis Terua belida & Hiuuabelida. Anglis Eræfoot. Bohem. Drypstyunk. Hung. Besz fia. Egypt. Synechon & Carcadana. Et hæc sunt nomina Ranunculi in genere Linguarum nominatarum.

Ceterum amiserabili maledicto inter gentes quondam infamis Ranunculus ille fuit, qui in Sardinia nasci dicebatur, idemque Sardonia à Poëtis & aliis vocabatur. Ea siquidem in cibo potuque sumpta mentis alienationem & cum laborum contractione eiusmodi conuulsiones facit, utriusque speciem præbeant. A quo deinde affectu tristi & amaro nimis Sardoniæ risus inter homines dictorio iactabatur. Huius Cicero meminit dicens: Sed heus tu τίς γὰρ ταύτης ἰδὲαιμ; Et Poëta cecinit:

Immo ego Sardoniis videar tibi amarior her-
bis.

Hoc porro versu, & saporem, quem radix habet, ac infelix & lamentabile mortis genus vnâ amaritudinis notâ descripsit.

Apulegium sceleratam herbam Ranunculum appellasse credit Marcellus, quoniam nimis malo euentu: constat risum ab eo fieri, comestumque noxium esse. Dalechampsio autem magis aridet sic dictam esse, quia validi sceleratique mendicantes sibi crura ac lacertos dilaniant, quod possint impudentius stipem extorquere, atque hæc impostura pecuniolam aucupari.

Nostris herbariis, inquit Plinius, Strumeam vocant, quoniam strumis & panis medeatur: vel ideo forsitan quod strumosa conspiciatur radice. Sunt qui Apium agreste seu Apiastrum, quoddam folio Apium amuletur vident. Alii quoddam prope aquas nascatur, Apium aquaticum cognominant. Marcellus ex antiquorum codicum fide Chelidonium i.e. Harundinariam herbam appellandam censet, quod illi similis sit, & Dioscorides in Harundinaria dicat eam Ranunculo similia folia habere: esse autem similitudinem naturam, ut similitudinem suam inuicem communicent. Dicitur Ranunculus, quod limitibus humidis, opacisque marginibus, ranatum more lateat: Aut quoddam aquis, ubi ranæ degunt, potissimum gaudeat: Aut quia inter eius frutices ranæ frequenter

Sardonia
herba

Herba scelerata

Strumen

Apium agreste

Apium aquaticum
Chelidonium

Grenouille quenter inveniuntur. Eadem de causa *Grenouille* lotte à Gallis nominatur: *Bassinet* verò à floribus, quòd vasis æneis constrictarum, in quibus barbas emolliunt, similes videantur colore ac figura. Vulgus Herbariorum Apium risus vocat, ab effectione quam inducit.

Vires in genere

Vim habent Ranunculi solia & caules teneri impositi exulcerandi, & crustam cum dolore inducendi. Vnde & scabros vngues & Scabiem remouent, & stigmata & puncta delent, fornicarias item ac pensiles verrucas & alopecias ad breue tempus imposita tollant. Foliorum verò decocto tepido perniones perfunduntur. At radix arida trita naribus admota, sternutamenta monet: & adalligata dentium dolores leuat: frangit tamen ipsos auctore Dioscoride. Ranunculis omnibus [ita Plinius vertit] vis caustica, si cruda solia imponuntur, pustulasque, vt ignis, faciunt. Idem ad lepras his vruntur, & ad tollenda stigmata, causticisque omnibus miscant. Alopecis imponunt, celeriter remouentes. Radix in dolore manducata diutius, rumpit dentes. Eadem sicca concisa, sternutamentum facit. Nostri Herbarii Strumea vocant: quoniam medetur strumis & panis, parte in fumo suspensa, creduntque eà rursus lata, rebellare quæ curauit vitia.

Lepra Alopecia

Struma Fabula

Temper.

Quatuor habet speciatim Ranunculus differentias, inquit Galenus. Sed omnes vehementer acrem facultatem possident, aded vt cum dolore exulcerent &c. Omnium tum radicem, tum vniuersam plantam vehementer calidam & siccam esse testatur quoque Fuchsius. Primi tamen generis siluestris lutei [Ranunculi rotundifolii] non perinde ac reliquorum acris admodum esse facultatis.

RANUNCVLVS RECTVS, NON REPENS flore simplici luteo.

Descript.



AD duos cubitos interdum videas recto lutei caule hunc assurgere ex radice fibrosa albaque: solia ex longis pediculis reptantantis Ranunculi solis similia accedunt interdum ad Aconitum luteum, vt me pene fefellerint, interdum purpureas habent maculas, parum hirsuta sunt, acris: flos

luteus, eumque subsequens echinatum seminum capitulum.

Synon.

Lobel. in Aduers. pratenfis Ranunculi varietas: in Obs. p. 379. figuram ex Dodoneo habet, surrectis cauliculis pratenfis Ranunculi titulo.

Ranunc. 13 Tabern. & Ran. silu.

Tabern. in Hist. vocat Ranunculum 1. gemein. Ranensuß: Item, Ranunc. 1. siluestris: in Icon. Ranunc. siluestris. Vna figura, duæ descriptiones.

Gerardus pro Ranunculo surrectis cauliculis ponit iconem, quod non placet, à Tabern. pro Ranunculo dulci exhibitam: Pro Ranunculo verò batrachoides, Ranunculum siluestris Tabernamontani. Sekvvenckf. est Ranunculus vulgaris pratenfis causticus: 2. Matthioli: 1. Tabern. Ranunc. siluestris pratenfis surrectis cauliculis.

Gerard. natur.

Ran. vulg. pratenfis causticus Schv.

C. Bauh. phyt. Ranunc. 6. siue pratenfis erectus lauis: Item, Ranunc. 7. siue pratenfis erectus maculato folio, Calthæ alterum genus Tragi, Chrysanthemum Fuchsi.

C. B. not.

An Anguillæ Ranunculus Sardonicus?

Genevæ spontè provenit & Montbelgardi in pratis: Basileæ in sylvis: In valle Griesbachiana copiosè provenit solis nigris maculis notatis: In Kirchen Ducatus Virt. foliis magnis ad Aconitum accedentibus. In Silesiæ pratis plura quàm notissimus, vt cuius flores sæpe integra præter operiunt.

Locus

Hoc Ranunculo se aliquoties vsum pro vesicatorio asserbat D. Rentzius Med. Fontis admirabilis.

Vsus

RANUNCVLVS RECTVS NON REPENS pleno flore.

Descriptio

Ranunculo recto præcedenti cetera similis, ratorubente rigido caule ramoso præditus: solia iam dicto proxima, maiora, crebrius incisa, acutiora: flos parvus auricomus, non, vt illius, simplex, sed quod fortassis culturæ mangonio debetur, denso foliorum stipatu multiplex.

Dodon. gall. vocat Polyanthemum multiplex, Bassinet double, simplici planè simile. Brunfels. tom. 1. Rhaph. 23. Cruris galli speciem domesticam & hortulanam soliat & repletis floribus: Camer. hort. Ranunc. tertium flore pleno erectum, Bauarorum Flein Buch bergu, Misnensiu gelb tausenschohn. C. Bauh. phyt. Ranunc. 8. siue hortensis erectus multiplex, Per corui flore pleno Brunfels. tom. 1. Rhaph. 23. Coronopus eidem in 4. p. 132.

Polyanth. multiplex Dod. Cras galli species domestica

An est Trago Ranunc. 1. multiplex, gesülte Ranensuß. An Geln. Ran. sardous flore multiplici? An Cordo quod figuram attinet, quæ eadem cum nostra, Ranunc. multiplex? An Lobel. in Aduers. Polyanthemos multiflorus siue holeraceus?

C. Bauh. in Pinace, Ranunc. luteus vel 3. flore multiplici Tragi, Ranunc. multiplex Fuchster. idus Turn. quartus Lohic. Ranunculi 7. species coronaria Cordi Hist. Ranunc. silu. 2. Dod. Lugd. Ran. polyanthemos Lob. polyanth. 3. erectus Camer. at 2. epit. Ran. erectus hortensis flore pleno luteo Eyst. Maior & minor habetur: & ille dicitur Ran. multi florus Tabern. Ran. max. multiplex Gerardo. Flores Bellidum plenarum orbiculos imitantur, sæpius geminatis combinantur, ac quandoque sobolem aliam ex se mittunt.

Syn. C. B.

RANUNCVLVS TENUIFOLIVS MON- tanus luteus.

CAP. XXVI.

Peculiaris hæc Ranunculi species est. Radix ex capitulo denso tenuium fibratum longa-

Descriptio



tum nigrican-
tium agmine
constat. Ex
qua ipsa statim
folia singularia
longis pedicu-
lis oriuntur,
Gerani grut-
nalis, siue
quarū Fuchsi,
tripartita, sed
minuēdis dis-
secta parte sin-
gula in mino-
res diuisuras.
Cauliculi plu-
res, sesquipal-
mares, graciles
quibus adhz-
rent folia sine
pediculis, sed
in angustiores

quām priora multō partes diuisa & verē digita-
ta. In quorū summo flores singulares, lutei, splen-
dētes, quinq; aefoli: Quorū media numerosi ap-
pices concolores, sed obsoletiores occupant: in-
ter quā crassus quidam globulus futurorum se-
minum, vt in reliquis Ranunculis, rudimentum.

An aliquis eius meminerit, nondum mihi
constat. Obseruatus Geneuē in montis Iurē prę-
alta parte Thuici.

Locus

**RANUNCVLVS MAGNVS VALDE HIR-
sutus, flore luteo.**

Deser.



EX radice o-
blonga ex
qua veluti ca-
pillamenta sur-
sum seruntur
ad modum
Daui alterius
Fuchsi, caules
prodeunt cubi-
tales, striati, ca-
ui, hirsutis as-
peris, & ex resso
flauescentes,
qui in ramos
brachiantur: fo-
lia quinque se-
nitue palmari-
bus & sesqui-
palmaribus pe-
diculis [caulis
formā & colo-
re] ē radice pro-

deuntibus, quā densa sunt, lata, in ternas pro-
fundas lacinias diuisa, quā denuō incisa sunt, per
ambitum serrata, colore ex viridi nigricante, vel
potius rufescente, quē propter lanuginem & hir-
sutem splendent: in caule folia parua & quidem
breuioribus pediculis habentur: in summis cau-
libus flores parui, aliorum Ranunculorum more
quinque foliis donati, pallidē lutei: semen in capi-
tula congestum succedit.

Synon.

C. Bauh. phyt. vocat Ranunculum 15. siue mon-
tanum latifolium hirsutum alterum. An Thallio
Ranunculus Cordi textus, seu Fammula.

Tom. III

Prouenit in monte Basileensi Apollineo, Mu-
teto dicto, locis vmbrosis, vbi vt plurimum repe-
ritur Iunio florens: eundem etiam in Roßberg
monte prope Tubingam collegit descriptionis
author C. Bauhinus.

Locus & tempus

**RANUNCVLVS RECTVS FOLIIS PAL-
lidioribus hirsutis.**

Radicibus figitur multus, fibrosis, albis, nequa-
quam reptantibus: vnde caules pullulant,
compures pedales vel cubitales, caui, molles
hirsuti, in varios ramulos diuisi, quorum extre-
ma flores sustinent paruos, luteos, quinque foliis;
raro pluribus constantes, apicibus medium occu-
pantibus, crebris luteis: quibus succedunt capi-
tula aspera, vt in plerisque Ranunc. folia multō
minora quām in Reptante, vel Recto, hirsuta,
longis nix pediculis quoque, in tria primaria
legmenta diuisa, quorum vnumquodque deinceps
in profundas lacinias subsecatur, quorū

Deser.



color subpalli-
dus minutique
virens quām
in reliquis Ra-
nunculi specie-
bus: At verō,
priora nec pro-
fundē, nec in
tot lacinias di-
uisa sunt, vt
supremi, figurā
etiam sunt ro-
tundiore. In
gustu nullam
percepimus a-
crimoniam ma-
nifestam.

An Ranun-
cul. 19. Casp.
Bauh.

Circa Mör-
belgardum &
Bessfordiam, lo-

Locus & Tempus

cis potissimum humidioribus & lutosiss abūdat:
floretque Maio, Iunio & Iulio.

**RANUNCVLVS TUBEROSVS MAIOR
CAP. XXVII.**



Quodū in-
ter vulgares
Ranunc. hunc
quoque est re-
perire, ita quo-
que folia iis ha-
bet similia, simi-
literque subse-
cta, pilosa, ma-
culis albescen-
tibus notata:
flore aureo, cau-
leque hirsuto,
vulgari Ranū-
culo respon-
det. radix subest
alba, bulbosa,
Fabr. vulgaris
mediocri mag-
nitudine, quā
Y 3

Deser.

facile separari potest, multis fibris circumdata. Et talem reperi in Italia: Geneuz observavi in Ranunculo simili hirsuto bulbū dependentem, ut Matthiolus pingit.

Minoris

Iam descripto accedit Ranunculus parvus, si non idem, à me sæpius observatus, verticillato tubere non admodum altè a cō donatus [qui non facile separatur à caule & foliorum pediculis] fibras dens crassas demittente ex inferiore bulbi parte, quique caulem erigit subhirsutum, floribus vulgaris Ranunculi recti simplicibus, quos excipit similiter capitulum, Fragis, vel Pentaphyllo simile: cui succedunt semina tria compressa, duplici pelliculā vnaqueque involuta: falsa non admodum magna, in tria segmenta potissimum dissecta, hirsuta, Hic Ranunculus interdum valdè parvus cum caule singulari, vix dodrantali, interdum maiore, ramolo.

Icon.
Cruis galli.
Coronopus
filu.

Figura ex Fuchsiāis apposita non in omnibus satis facit. Brunfelsii figura, Tom. 1. thap. 23. Cruis galli, des Fleinen hanensfuß / & Coronopi siquellris titulo donata, respondet Ranunculo tuberoso minori hic descripto.

Ran. minor
Ranunculi
9. sps
Ran. 1. eni-
guis idem.
que scelo-
ratis.

Fuchl. in Hist. (vbi describere neglexit) & Icon. dicitur Ranunculus minor. Cordo Hist. Ranunculi 9. species, cognomento rotund, germ. Drüschmurg. Cum Batrachio picto à Matthiolo, & à nobis priore loco descripto convenit descriptio Tragi Ranunculi primi exigui eiusdemque steratissimi folio nigricante, leviterque hirsuto, parte sui aversa ranam viridè referente.

Batrachi
Apulei
Ran tub.
rosus

Dod. gall. vocat Batrachion Apuleii, Belgarum Sint Aurbienis racp. In Hist. purg. & lat. in fol. inscribit Ranunculum tuberosum: ait autem Diocoridem huius non meminisse: Apuleium verò ab aliis separasse, seorsumque de isto egisse & peculiariter Batrachion appellasse: & hinc Apuleii Batrachion dici, vulgoque Rapum D. Antonii nominari. Figura Dod. gallicè eadem quæ Fuchlii: Latini alia est, qualis apud Lobelium.

Rapum D.
Antonii.

Bulbosum Ranunculum Lobelii in Icon. Plant. p. 667. fuisse malè in Aduers. ab hirsuto muricato semine denominatum, monet in Obi p. 380.

Ranunc. bulbosus, siue quintus Matth. in Diosc. & Hist. germ. respondet Ranunculo priori descripto.

H. Lugd. duas habet figuras: Ranunculum 5. Matthioli. p. 1029 Ranunc. tuberosum p. 1014.

Lonic. dicitur Ranunc. 5. Officinarum Pes columbinus, Taubenfuß, quod nomen non placet. Camer. hort. Ranunc. radice bulbosa vel tuberosa potius, flore simplici. Thal. Ranunc. bulbosus Apuleii à Dod. ascriptus. Cels. p. Ranunc. aliud genus, tum foliis tum caulibus lanuginosum, radicem ferens Verticilli modo rotundam, priuatim Pes coruinus vocatum. Tabern. in Ic. Ran. minor: in Hist. Ran. 4. minor, Ran. rotundus, Ranunculus Vulcani, & D. Antonii, Flammula minor, rotunda Vulcani, Brenfraut/Rus benhanensua. Gerard. Ran. bulbosus, Roond rooted. Croomfoote.

Ran. bulb.
radice etc.
Varietas

C. Bauh. phyt. Ranunc. 11: siue bulbosus radice verticilli modo rotunda. In siluestribus flore est simplici, in hortos translatus non modò flores multiplicat, sed ex vno & alterum promit. Reperitur etiam locis arenosis & laxosis ita parvus, ut vix trium vnciarum sit. Item, Ranunc. 13. siue minimus laxaulis hirsutus, cauliculo triū vnciarum, hirsuto.

In montibus Bononiensibus observavi florere Aprili, nec non inter Veronam & Castelfranc: Geneuz cum tubere ex tenui folio pendente videntem mensis Februarii principio. Minor Ranunculus, cui fibræ à tubere dependent abundat Montebelgardi loco valdè secco ad Meridiem sito in Vitrum monte, talis etiam in monte arcus Bessfordianæ.

Tempus

Scribit Tragus Batrachium exiguum adurere & exulcerare efficacissimè, non lecus atque ea, quæ cotrosiva vocant, nec nisi externis corporis partibus adhiberi debere, pustulas excitare, quare erodendis & exulcerandis duris tumoribus mirificè conducere, verrucas formicantes & peniles, & id genus vitia, citra incisionem, seu adustionem, succum illitu tollere. Radix, ut ait Matthiolus, tuberosa per dens nucis Juglandis magnitudine, acris & exulcerans, per Hiemem arecentibus iam foliis, à quibusdam, vbi exulcerare partem aliquam volunt, usurpatur. Herbam Batrachion tussā cū sua radice mixto aceto impones, authore Apuleio, his qui habent cicatrices nigras: exedit enim eas & similem corpori reliquo reddit colorem. Camerarius de Ranunculi bulbosi siquæ pleno & simplici facultatibus hæc subdit: Radix bulbi instar rotunda, si recens sit, caulitica est, ac admodum vitit: exiccata verò post vnum mensem dulcis efficitur: vititur hac radice tussā, & emplastri modo imposita tempore pestis ad rumpendos abscessus. Nebulones mendici quidam, quò facilius nobis imponant, eā sanguine Draconis macerata suras aut femora illigunt.

Vires &
vires.

Radix recens
caulitica
sicca dulcis

RANUNCVLVS MAXIMO TVBERE, flore magno pleno.



Iucundi spectaculi oblectamento, omnium Ranuncolorum primas, ameno florum incremento: qui colore aureo non tantum denso foliorum stipatu luxuriant, sed & è medio flore alius assurgit minor, hirsutis suis foliis quinque non minus quam inferior obvallatus, numerosaque folio-

Descri

rum congestione multiplex, pediculo inferiorem transadigente: folia rugosiora quam pratensis, siue surrecti, siue repentis, maiora, rotundiora, inque minis acutos angulos diuisa: radix subest tuberosa verticillata, Cyclamini magnitudine.

Et hic vocatur à Lob. in Adu. Ranunculus polyanthemus Anglorum: in Ic. Pl. p. 666. Ran. magnus Anglicus polyanthos. A Dod. de purg. Ran. tuberosus flores multiplicans: in fol. lat. Ran. tub. flore

flore multiplici. A Camer. hort. Ran. radice bulbosa, vel tuberosa potius flore pleno. A C. Bauh. phyt. Ran. 11. siue radice tuberosa pleno fl. habetur & simpliciter: in Pin. Ran. hort. flore pleno quintus, siue Ran. rad. tuberosa fl. pleno & proliero, Ran. 3. Camerarii in Epitome. Solum florem appictum habet. A Tabern. in H. st. Ran. 24. omnino similis quarto minori tuberoso, radice & foliis, nisi quod maior est, & flores pleni: Ran. tuberosus aut bulbosus multiflorus, Germ. gesüßter Rüßwurtz / & gesüßter fleiner hancers süca: Item, Ranunc. 25. prædicto similis: sed flos duplex, aut triplex.

Locus

Montbelgardis colui Ranunculum amplissimum flore pleno, radice valde tuberosa, plurimum se multiplicantem. In Belgii hortis reperitur, ex primum ex Anglia delatus, & tandem in Germaniam.

RANUNCULVS FLORE GLOBOSO,
quibuldam Trollius flos.

CAP. XXVIII

Descriptio



Ranunc. flore globoso dictus, radice nigram, fibrosam, que Helleb. emulam habet, ita ferè Aconiti, in quinque; legmenta diuisa, idque ad ipsum usque pediculum dorante longiorem, nisi quod folia in caule, nullo pediculo cauli adnascuntur, cõ. similiter tamè diuisa: caulis sesquicubito

latis, inanis, ramulos, flores sustinet vulgari Ranunculoz forte maiores, his tamen concoloribus, sed minus micantes, densis, aut videntis foliis constantes, interò modicè reflexis, ut sessilem globum imitentur: [qui minus bene nostram figuram exprimitur] fibræ luteæ, medium occupant.

Ranunculus globoso flore duorum generum Clusio

Ranunculi huius Clusius duo in Austriacarum Stiriacarumque Alpium pratis obseruabat genera: Maius vnum, amphiore flore, & quasi aureo: Alterum, humilius, flore paulò minore, & colore, ut plurimum, ex viridi pallescente: aliàs, foliorum formam, capitulis, semine nigro, & radice inter se conueniebant hi duo Ranunculi glomerato flore, ut in post. H. st. author vocat, vel ut in Pannon. p. 372. Trollius flos.

Synonyma

Matthiolus Aconitis adnumerat hunc Ranunculum, licet ad Aconiti genera non pertineat. Lacuna in Diosc. Aconiti tertii inscriptione solum iconem ponit: nam in annot. ubi Aconiti tertii meminit, hoc non intelligit. Thallio dicitur Aconitum 3. Matth. flore Ranunculi luteo magno.

Tabern. duas figuras

Tabern. in Icon. Ran. alp. luteus: in Hist. Ran. n. montanus luteus. Item, p. Ic. & H. st. [ubi quintum] Aconitum Matthioli tertium. Hæc duæ

figuræ non sunt diuersarum duarum plantarum sed vnius, quod Compil. nō animaduertit.

Petrus apud H. Lugd. triplex imago ponitur, H. Lugd. p. 1029. Ranunculus 6. Matthioli: p. 1033. Ranunc. flore globoso: p. 1739. Aconitum lycoctonum 3. Matthioli. Priori & posteriori loco non detrahitur.

Gesl. hort. Trollius flos, Anemone montana Synon. luteo & in globum collecto flore, & Ran. montanus. Dodon. Ran. externus quintus, Ran. fl. globoso, & sic etiā Eyst. Lob. in Obl. p. 385. Ic. pl. p. 675. Ran. mont. Alp. glomeratus. Gerarde Ran. globosus. Schvv. Ran. Alp. lute. globosus. C. Bauh. phyt. Ran. 44. siue montanus globoso flore luteo, & [secundum Tabern. qui Ranunculum 12. Alp. album nominat] lbo: Eidem in Pin. Ran. mont. 9. siue Aconiti folio, fl. globoso, Ranunc. mont. alter folio aluore quasi Napelli, Catalpini.

Proferunt hunc alti montes Harcinæ, & Helueticorum Alpes: itemque Silesiæ vallis Gigantum ad Oupæ cataractam, florentem Iulio: Geneuenses, ut mons Thuri, copiosum etiam Iunio: Non diu durat in hortis, nisi loco umbrato & frigidiusculo plantetur.

Locus & tempus

Notandum Matthiolum tribuere suo Aconito flore Ranunculi, vñs & vñes lycoctoni quas nostris inesse Ranunculo globoso flore vix credimus. Potest tamen in animalibus fieri periculum. Schvv. quidem ceteris Ranunculis hunc minus acrem ait, ac propterea minus calefacere & siccare.

Matth. m. catas

ACONITVM 3. MATTHIOLI EFFIGIE
alictus Ranunculi vel Anemones.

CAP. XXIX.

Cuius plantæ icon à Matthiolo in Epit. anni 1571. pro Aconito quinto floribus purpureis sit proposita, hæcenus præsentire non licuit, quia nullam addidit descriptionem: folia quidem referunt Ranunculi genus aliquod, sed caules ita picti, ut singulares & non ramosi videantur, flores autem quinquefolii. An potius ad Anemonem aliquam sit referendum, fatemur nos ignorare. Camer. in Epit. sic describit: Aconito quinto flores insunt crocei, folia vitigineis aut ficulneis accedunt magnitudine ac figurâ seu diuisione, maculis verò albis & lucentibus venis deformatur, radix nigra. Eius autem inuenitur copia in monte Baldo.

Aconit. fl. purpureis Matth. quid

RANUNCVLVS REPENS, FLORE LUTEO simplici.

CAP. XXVI.

Fibrosâ radice reptante, quæ non bene exprimitur figura apposita ex Fuchsiâ, albidâque nititur, ex qua caules oriuntur aliquot fistulosi, purpureo & viridi, instar Serpentinæ, versicolore, non nihil hirsuti, brachia, supini, humi sparsi, quam attingentes fibræ productis denud radices agunt: folia atroviuentia, subinde maculis nonnullis albis notata, hirsuta, Apii dimensurâ quodammodò sapore herbaceo: flores aurei, quinque foliolis splendentibus compositi: fibræ & apices crocei, capitulum echinatum.

Descriptio pua

A Trago pro Ranunculo pratensi primo, siue

Ran. dulcis seu pratensis Trago



dulci & de-
scribitur, sed
malè pro Ran.
silvestri pingi-
tur, transposi-
tis figuris.
huius enim
imago poste-
riori loco p.
98. pro silu.
Ranunculo
posita, debe-
bat priori p.
97. poni pro
Ranunculo
dulci seu pra-
tensi: & econ-
trà quæ p. 97.
pro dulci ex-
stat, ponen-
da erat p. 98.
pro silvestri.

An Fuchsio Chrysanthemum, germ. *Wasserschönwurz*.

Polyanthemum
simplex Dod.
gall.

Dodon. gall. vocat Polyanthemum simplex à Plinio lib. 27. cap. 12. descriptum, minus calidum & sicum Ranunculo, ut quod. teste Trago, cibis admiscetur. Breuiter & ambiguum describit, nec figuram in omni. & respondens, Fuchsio siluestri, assumptis. La autem, quam in purg. mist. & lat. in fol. Ranunculi hortensis primum uolo exhibuit, nobis satisficit. Ranunculi porro speciem esse, non modo florum, verum & ipsa totius herbarum facie, & facultate ostendi posse credidit.

Synon.
nonnulla

Lobel. in Ad. vocat Ranunculi differentiam & uarietatem vulgarem, ut quæ pratensis à Batrachio nunc dicitur, quos si Florem butyril vocant, ut quæ tenera floribusque onusta multum pulchra vacat, quum ad mulctum veniat, & uenit lac d. m. 10. Obi. p. 379. l. c. Pl. p. 664. Ran. pratensis eumque hortensem reptante caule. Gesn. hort. Ranunculi genus per terram magis repens, & acuminata carens, Coronopodem querendum, & Ranunculi speciem finalem luteam flore simplici: Idem de coll. stirp. Ranunculum plumbur habentem, & interea serpentem, floribus maioribus, iuxta semitas. Cæsalp. Ranunculi genus humi repens non mordens. Turn. Ran. tertium, vulgari simile per omnia, sed dulcem, Monguntinensibus Schmalzwort Süss hanensfuß nuncupatum. Hort. Lut. Ran. vinealem repentem weingarten hanensfuß: Item, Ran. dulcem pratensem, Süssen wiesen hanensfuß. Tabern. in Icon. Ranunc. dulcem, Batrachium saluiferum: Item, Ran. holeraceum maiorem, grossen süßen hanensfuß/Butterblum: Et, Ran. vinealem, Batrachium vineale, weingarten hanensfuß: In Hist. de his ait: Ranunculum dulcem quidam docti imprudenter miscunt cum Coronopo Dioscoridis: dicitur græce Βατραχίου γλαυκόν, Batrachium dulce, aut saluiferum, Ran. dulcis pratensis, vulgè herbatus holeraceus, quibusdam saluiferus. Süss hanensfuß: dimitit cauliculos repentes, Fragariæ modo Ran. dulcis 3. siue holeraceus maior, aut pratensis maior, germ. groß Schmalzwort/groß Butterblum: folia habet priori dulci similia, maiora, minus laciniata, caulem maiorem, ac etiam flores maiores. Ran. dulcis 6. doctis *Phlox* v. *Actinopodium*, Lat. dictus Pes milui-

nus, Batrachium vineale, Ran. repens dulcis & vinealis priori (dulci) foliis similis foret, nisi crassiora & obscurius viridia essent, caules item crassiusculi & fusci: repit & se renouat. Descriptio Ranunc. 1. dulcis Tabern. conuenit cum nostro Ranunculo, non item icon, quæ non respondet descriptioni, ut in qua nulli caules respiciet. An 3. dulcis sit repens non indicat Tabern. nec icon demonstrat. Ranunculi 6. icon facta videtur ad iconem Lobelii.

Icones
Tabern.
quæ

Gerardus pro Ranunculo pratensi etiamque hortensi, Common Crowfoote proponit iconem Ran. repentis dulcis sexti Tabern. Item, pro Ran. auricommo, golde harre Crowfoote eiusdem Ran. dulcem tertium.

Ranunculum dulcem Schvvenckf. Tabernomontani secutus, triplicem constituit: Ran. dulcem pratensem, oleraceum: Ran. dul. prat. maiorem: & Ran. dul. prat. maculosum, serpentem.

An Ranunculus secundus Matthioli?

Historia certè Lugd. præter Ranunculum secundum Matthioli, quem p. 1028. exhibet, pro repente alium Ranunculum, sc. hortensem priorem Dodonæi p. 1031. demonstrat. Et hunc nostrum pulchrè exprimere dicimus, quamvis alterius sit opinionis Dalechamp. qui cum ad quartum Matthioli accedere suspicatur.

Ran. hort.
prior Dod.
H. Lugd.

An Brunfels. Coronopus & Crus galli silu.?

An est Anguill. epist. 11. Ranun. tertia species?

Thalio est Ranunc. polyanthemus 1. Dodonæi, Ranunc. pratensis 1. Anglorum, Ranunculi 8. species Cordi: Item, Ran. auricomus, seu 3. Ran. species Dod. gallici, Ran. dulcis siue pratensis Tragi. Ego Ran. octauum Cordi huc non refero, sed ad Ran. surrectum acrem, licet Thalio assentiat C. Bauh. in phyt. ubi ei est Ranunc. 9. siue pratensis repens hirsutus simplici flore.

Basileæ in pratis florentem adhuc Octobri obseruavi, & Genæ Nouembri & Marti principio, Aprili Monspelii, ac passim Montbelgardi. Locis umbrosis, & nonnihil humentibus, non prorsus aridis, secus vias & in locis hortorum incultis spontè exiit: in pratis quoque, & non rarè iuxta agrorum margines occurrit. Nec enim quod in hortis tantummodò gignatur, Dodonæo hortensis dicitur, sed quia ferè præ cæteris hortis sit familiarior, atque in his creberrimè gramini permixtus reperiatur. Maio ac deinde serius multò vigent flores.

Locus &
Tempus

Ranunculum maiorem siue pratensem dulcem minimè acrem pethibet Tragus, ac propterea citra periculum & noxam vtrinque corpori adhiberi posse ait: folia quidem quacunque in corporis parte ortos tumores imposita discutere ac resoluerè. Refert Lobelius, herbam teneram, floribusque onustam, nec non semen, minus viete gustu, nec insuauis odore lactis copiam impertire credi: pasci enim hanc præ cæteris armentis, ceteris gratiores, & pratis pinguioribus usque; cuius copiosissimam. Tabern. scribit Ranunculum 1. dulcem Aprilis & Maio collectum in pulvis oleraceis esse valdè gratum, sicuti & dulcem tertium Maio collectum, ac cum insuper cum sexto bobus & vaccis gratum & salubre pabulum præbere, iisque lac augere.

Vires &
usus.

RANUNCVLVS REPENS FLORE pleno.

ET huic quoque fistulosi caules, maculosi, sub-
E hirsuti, humi fusi, qui vbi terram attigerunt demissis fibris eam denudè subeunt: folia Repen-


Descri

ume

SCROPHULARIA VVLGARIS
& maior.

CAP. XXXI.

Descriptio.



Fœtidi odor tota est. Radix oblique agitur, alba, crassiuscula, & tuberculis inæqualibus strumosa: caulis firmus, rectus, quadratus, canis, purpureus, ad binos cubitos excrefcit, in alas diuisus: folia Galeopsis, maiora, acuta, serrata, ex caulibus geniculis aduersa, atrovirentia: flores

ex hirsutis pediculis, caulicibus quinque-foliis insident, Anturhini minimi, hiantis oris instar habentes, suprema lacinia intus atro-purpurea, extrâ nonnihil virecente, lateralibus duabus cum infima extorsum reflexa magis ex viridi pallescentibus, prominulo è rictu stilo virente, alid reconditis tortuosis staminibus cum apicibus ochreis.

Nomina
linguarum.

Passim Scrophulariam vocant, cognomento maiorem, ad differentiam minoris, quæ Fabarola & Chelidonium minus quoque nuncupatur. Appellant verò & Millemorbiâ, Picariam, Ferrariam & Castrangulam: Germani Braunnwurz / Saumnwurz / Scutwurz / Feigwargenfraut / Feigwurz / Feigwargenfraut / & groß Feigwargenfraut: Belgæ groot speculuyre / siculuyre & helmerust: Galli Scapulaire: Ital. Scrof. laria: Angli water betonye / broune murr: Hong Scrofulariam appellant Corofguif flu: Fœtete, bozza, h. e. nigrum Ebulum.

Radix in empta sculpta figura minus placet: tubera enim inæqualia strumosa non satis exprimit.

Fuchf. Cordus.
Dod. gal.
Gefn. op.
mo de Scrophularia
reprobata.

Fuchf. Cordus, & Dod. gall. itémque Gefn. in cat. pl. Scrophulariam h. e. a nobis traditam pro Galeopside demonstrant, & describunt. Quorum sententiam reprobant Matth. & Dod. lat. in sol. In Scrophularia vulgati grauem odorem, quo Galeopsis præditam esse volunt, frustra desiderantes: Vnde odoratus sensum eos [præsertim verò Matthiolum] perdidisse faciliè quis crediderit.

Galeopsis esse non posse dicimus, inquit Marantha, quod præter alia, tota planta fœtidi & grauis sit odoris, licet omnino nullam contritionis violentiam sit perpessa: Galeoplos autem folia non nisi tæta odorem grauem reddant.

Cæcutiunt & illi, qui cum Trago Ocymastrum faciunt. Nec minus aberrant qui cum Rob. Constant. Clymenum Plinij esse contendunt. Quidam herbam Chryssipeam Plinij esse putant, quæ cum Ficis strumis medetur. Sed in tanta verborum Plinij breuitate, quod concludam

Tom. III.

non occurrit. Tigurenles vocant Schwarze Nachtschar, i. e. Solanum nigrum, improprie tamen: nec desunt qui wurmfrant / hoc est, Vermium herbam, aut Vermiculariæ vocitent, sed quam ob causam, nondum patet: Gefn. in cat. pl. cur Agripalmam cognominari, haud video. Genetæ vocant L'herbe du siége, à parte cui remedio est. Summo enim emolumento radice vtuntur, in hæmorrhoidibus abigendis.

Cæterum, Matth. passim in comm. suis, Hist. Synon. germ. & Epit. etiam cum add. Camerarij, Lac. & Dod. lat. in sol. vocant Scrophulariam: Brunfels. Cast. Dur. Gefn. quadr. Lon. Turn. Lobelin. Adn. Obs. p. 289. Icon. Plant. p. 533. Thal. Camer. & Tabern. Scrophulariam maiorem: H. Lugd. pag. Scroph. maiorem Matthioli: C. Bauh. phyt. Scrophulariam i. [2. apud Matth.] siue nodosam fœtidam. Gefn. hort. Scrofulariam maiorem: Item, Clymenum nodos ceu scrophulas in radice habens, & Clymenum marem: Cæsalp. Scrofulariam maiorem recentiorum Medicorum. Galeopsis Fuchf. Cord. & Dodon. gall. itémque Gefner. in cat. pl. Galeopsis minorem Fuchf. in Icon.

Scrophulariam vulgatam maiorem obseruari Basileæ O. Bri ad fluvium B. rle extra & intra urbem: item florentem extra portam Basileæ minoris Riemerthor, mense Iunio: Genetæ passim: Lugduni quoque, & in Italia inter Veronam & Castelfranc. Secus agrorum margines, in scrobibus siccis non raro provenit: ac in sylvis. Iulio ac Augusto cum flore viget: semen inde maturefcit.

Cæterum, quamvis satis sit, Scrophulariam non esse Galeopsis: ea tamen viribus pollet non contemnendis, namque eius radix strumas, & hæmorrhoidas sanat. In quem usum radix effoditur autumnali tempore, & repurgata vinditur cum reconti butiro, opercularoque fictili in vliginoso loco reponitur, vbi dimittitur per quindecim dies. Deinde lento igne butyrum illud liquefit, & percolatum asservatur, quo prædicti morbi itémque scabies, vtilissimè illinuntur, referente Matthiolo, Solenandro cons. med. 20 sectio. 4. & Dodonæo. Scrophularia radicem habet tuberosam (inquit Porta phyt. lib. 5. cap. 23. vbi figura) vlcerebus strumosis cavernosis, carcinomati, aut depascentibus sideratis, satis opportunam: tuberculis itém ab humore frigido glaciatis emolliendo opitulanti. Facultate autem calida & sicca est, & propterea desiccet, extenuat, discutit, abstergit: est enim gustu amara, & subtilium partium. Et hinc ad duos glandularum tumores quos Græci xanthas; Latini strumas, & vulgò Scrofulas appellant, & hæmorrhoidum cum dolore tumores prodesse fertur: Nonnulli vel collo appensam, vel aliàs gestatam ad sanitatem conferre temerè prædicant. Sicca radicis pulvis impositus hæmorrhoidas siccat: Idem drachmæ pondere potus, lumbricos ventris pellit. Aqua è radicibus distillata, faciei ruborem illita tollit.

Locis
tempus.

Vires
&
vius.

Superfluit.

SCROPHULARIA MAXIMA
radice fibrosâ.

CAP. XXXII.

Quadratis caulibus ad cubitos aliquot alius excrefcit: per quod folia Scrophulariæ



vulgaris, vel
Betonica, serrata,
nigricans, foetida: flores
& vascula ad
maioris vulga-
ris Scrophulariae
accedunt: ve-
rum radix non,
ut illi, strumosa,
sed ex innume-
ris fibris con-
texta.

Hoc est Ocymastrum illud
maius Tragi,
quod Ocymastro minore
[Scrophularia
vulgari] caule
& foliis viridioribus esse per-
hibet, & ad pro-

cerit tem lapè viri assurgere.

Eandem plantam cum Trago fortè intelligit
Corneus per Ocimum in aquosis nascentem,
quod Herbarios pro Erno Dioscoridis, & Erineo
herba Plini agnoscere ait, & Germanos pro
trasser Basiliens. Hoc non describit, & fortè no-
men germanicum fingit.

An Ocimum aquaticum Gesnero?

Lobel. in Obs. Scrophulariam maximam sub
sequentibus nominibus pingit pag. 298. Betonica
aquatica Septentrionalium an Clymenum Dios-
coridis? Galeopsis siue Scrophularia altera Do-
donæi verrucula editionis [gallica, intelligo.]
Clymenon Turneri [eius verba præ. cap. ad-
scriptis] S. famoides nunc fortè Solimano. Ter-
pentaria D. I. Dilis à Terebinthinæ dote simili.
Ocymastrum alterum Tragi. Belg. Beed Scëym
& cruyt / S. Antuenis cruyt. In Icon. Plant.
pag. 533. intulavit Betonicam aquaticam Sep-
tentrionalium: Dodonæus Lat. Betonicam a-
quatilem. Camer. apud Matth. vocat Scrophu-
lariam femininam, & vulgo germ. weissen Nach-
schatten/hoc est, Solanum album.

C. Bauh. phyt. Scrophulariam 2. siue palustrem
non scetidam. Item. Scrophulariam 3. siue aqua-
ticam folio Betonicæ: Ocymastrum maius Tra-
go: Betonica aquatica Septentrionalium Lobelio. A-
pud Matth. Scrophulariam palustrem radicibus
fibrosis, caule & foliis protus viridibus, in palu-
stribus Basileensibus minimè scetidam. Se-
cundam & tertiam Fratri Scrophulariam non-
dum separauerim.

Varus in locis progenit Montbelgardi. Mont-
peli floret mense Maio & Iunio ad fossas aqua-
rum. Iuxta aquas profluentes emicat, inquit
Dod. ac secus scrobium ripas: in aridis vix repe-
ritur. Iulio ac Augusto cum flore vigeat, semen in-
de maturefcit.

Facultate calida & sicca est: folia absterforia
vi prædita, ad prurum, & foetida ulcera pluri-
mum prodesse feruntur: & cum melle sue-
cus horum decoctus. Curant autem
ulcera & contusa, si manè & serò
continuis diebus in foco cale-
facta & contrita folia impo-
nantur.



Scrophula- *Scroph sine*
ria altera *tuberculis*
siue scrophu-
lis siue tuber-
culis, cuius
floresculos &
folia Scrophu-
larie vulgaris
maioris ele-
gantiora esse
ait author Ca-
merarius, in
ceteris ferme
conuenire,
nescit an ab
aliis descrip-
ta, nisi sit Ga-
leopsis An-
guillare. Se-
mine quotan-
nis sua sponte
propagatur.

Huius ico- *Icon: Scroph po-*
nem quadragesimo *regima.*
tertio loco, Scrophularia
peregrinæ titulo pictam dedit. In hac autem
imagine flosculi è suo conceptaculo euulsi, par-
te anteriore & posteriore, & vnus eidem adhuc
inherens, denique semen cum suo vasculo di-
stinctè notari possunt. Sculptor noster malè ca-
pitulorum apices ademit, & ea nimis rotunda re-
presentant.

C. Bauhinus, cui à Doldio ex horto Camerarii
transmissa, vocauit in phyt. Scrophulariam
quartam, siue flore rubro. An est Clusio Scro-
phularia Cretica 2. cuius delineationem infra ea-
dem inscriptione dabimus?

SCROPHULARIA LVTEA MAGNA

amplis foliis.

CAP. XXXIII.



Caulis *Descriptio*
profert
plures bicu-
bitales circi-
ter, quadra-
tos, nonnihil
pilosos: folia
superiora a-
cuminata, ner-
uosa, profun-
dè per ambi-
tum serrata,
infima qui-
dem quatuor
vncias longa,
totidem lata,
pediculo qua-
ternis vncias
longiore:
quæ his su-
periora sunt,
per caulem veluti ad genicula opposito situ
nascentur

C. Bauh.

Locus &
Tempus

Vires &
Vilus.

nascuntur, alia trium, alia duarum unciarum & semuncialibus tandem pediculis hærent, decrefcente pariter foliorum magnitudine: ex vniuscuiusque serè folij sinu pediculus emergit palmaris circiter, cuius circa fastigium foliola bina exigua conspiciuntur, supra quæ extremo pediculi cacumine flores hærent complures, lutei, Pisi minimi magnitudine, concavi, hiantes, apicibus itidem intus luteis, quos extrinsecus amplectuntur foliola quædam lutea: subsequuntur *seminum* conceptacula turbinata, capitulis hyperici similis. Nullum mihi manifestum odorem halat planta. Sapor autem tam florum, quam foliorum nonnihil dulcis mihi videtur.

Lamium Pannonicum a. siue exoticum Clusio.

Locus & tempus

Montbelgardi in horto Ill. E. C. pluribus annis durat se quotannis semine renouans, Aprili & Maio florens. Clusius florentem obseruauit primum Viennæ Austriæ in hortulo suo ad patientiæ natâ, nescit quo semine. Eam subsequens Hiems auferebat quidem, sed deciduo semine prognatæ sunt insequente anno aliquot plântæ, quæ demum altero Vere flores protulere. Floret Maio, semen Iunio maturum est: deinde tota planta radicitus perit: nonnunquam tamen ex radice etiam repullulat.

SCROPHULARIA INDICA CAPITVLIS maximis, & de Creticis Syluij Scrophularijs.

CAP. XXXIV.

Semen. In dno. Calyx



Scrophulariæ Indicæ nomine accepi semen quoddam, cuius calyces sunt ex breuibus inæqualis longitudinis pediculis quinque simul iunctis, formæ serè & magnitudinis Ciceris arietini rotundi, qui bipartiti in acumē desinunt, quos folia ambiunt breuia: semē in capitulis, siue calicibus, minutū, nigrum. Hanc Caspar. Bauh. in

phyt. vocat Scrophulariam 6. siue Indicam capitulis aliquot iunctis, sed quadruplò quàm in his maioribus.

Scrophulariæ autem Creticæ genera duo tradit & describit Clusius: 1. quidem quod Francofurti natum ex semine Cretæ accepto, Rutz siluestris appellatione: ac 2. quod folio vrticæ esse dicit; ac de quo meritò queri & dubitari possit, utrū sit Scrophularia peregrina Camerarij necne.

SCROPHULARIA TERTIA DODONÆO tenuifolia, Ruta canina quibusdam vocata.

CAP. XXXV.

Descriptio

Scrophulariæ tertiz nomine exhibita à Dodonæo planta, radicem habet longam, simplicem,

mediocriter crassam: caules cubitales striatos, teretes, serè nigricantes, medullâ fungosâ plenos; ramosos; per quos folia oblonga, arguta, profundè laciniata, grauiter odorata: flores eo ordine dispositi quo in Scrophularia maiore vulgari, copiosiores, parui, nigri, quos vascula excipiunt Scrophularia minora, acuminata, in duas earinas dehiscentia.



Scrophulariæ suæ tertiz speciem Dod. gall. pro Galeopseos specie sumi posse admittit. Lobel. in Aduert. huius mentionē facit nomine Rutz caninæ [sic in Obseru. pag. 588. & Ic. Plânt. Tom. 1. pag. 45. quoque inscribitur.] & suspicatur Hypocourum esse. Clus. in Histot. post. vocat Scrophulariam, siue Rutam caninam primam.

Ad Sideritidem reducitur à Calalpino & Cameratio. Gesnerus tradit in pede montis circa Glaronam locis saxosis nasci, Montpelij Rutam caninam vocatam.


An Cordo Herba folijs Pyrethri? An Herba Mora Italarum H. Lugdunens.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. per multos annos floruit adhuc Octobri, radice perenni. Eam autem primum obseruauit Esslingæ in horto cultiss. Ioan. Volmarij, qui Scamoides nominabat: dein Montpelij & Lugduni, itémque Brisaci ad Rhenum:

Locus & tempus.

CHAMÆROPS.

CAP. XXXVI.



Chamærops Plinij hæc videtur esse Historiz Lugdunensi pagina 1339. quæ in siluosis gignitur, radice crassâ & multiplici, caulibus multis & cubitalibus, foliis Myrti circa caulem geminis: flore copioso; & foliorum sinibus nascente, semine in oblongis vasculis.

Chamærops Plin. Descriptio

Eodem verò effectus Z 2 2

H. Lugd.
not.

lateris doloribus habet Chamærops, inquit lib. 26. cap. 7. Plinius, myrtes circa caulem gemmis folijs, capitulis Græculæ rosæ ex vino pota. Quis ille fuerit apud H. Lugdunensem, qui Chamæropem Plini ita ieiunè delinearit, nec natalè adscripserit, authoritati suæ non consuluit. Merito cum Casp. Baubino, quænam hæc sit, aliquis petierit.

DE SIDERITIDE IN GENERE, ET particulatim de Heraclea.

CAP. XXXVII.

Sideritidis
Erymou.

Sideritis Gr. Latinis quoque Sideritis dicitur ἀπὸ τοῦ σιδήρου, à ferro, quasi Ferruminatrix, quod vulnerib. ferro factis perutilis sit, vel quoniam glutinandis vulnerib. apta, præcipuè in belio habeat vim, quod sæpè ab eo metallo in græcis scriptoribus indicatur. Sed cum permultæ sint plantæ, diversi etiam generis, exque insignes, quæ ferro luctatis partibus, vel vulneribus quouis modo acceptis, opem polliceantur, ac ob id Sideritides nuncupentur, hæc immerito hic et commemorandæ veniunt. Sed enim studiosis bene consultum fore speramus, si ex, quæ à veteribus, & maximè à Dioscoride, descriptæ sunt, illis primò innotescant.

Sideritidis
tria genera
Diosc. lectis
illustratur.

Dioscorides itaque tria facit Sideritidis genera, quorum primum est Sideritis, quam aliqui Heracleam vocant (hanc solum describit Byzant. cod. Sarrac.) herba folia habens parua multa & tenuia, similia Marrubio [ἔμφια πρᾶσιον. Vet. ἐλαττωμένον πρὸς τὰ τῶ σπινός.] sed oblongiora [ἰμυνοειδῆ.] ad Saluæ [ἰαλισφάκην] aut Quercus [ἄγρος] folia accedentia, minora quidem & aspera. Caules verò edit quadratos, pedales [δοδρανταles, Sarrac. σπθαμνίος græc. cod. πηχύς vet.] & maiores, non iniucundi gustûs [ὡς ἀνδρὶς. ἰαλισφάκην Dal. ὁδὸς vet.] & quodammodò leuiter subastringentis, in quibus ex intervallo verticilli spectantur rotundi, ut in Marrubio, & in illis semen nigrum. In locis sub quibus petra latent, nascitur. Folia imposita vim habent glutinandi vulnera, & ab inflammatione vindicandi. Sideritis altera ramos habet binum cubitorum, exiles: folia longis herentia pediculis, ceu Filicis, in extrema sui parte incisuris diuisa, utrinque numerosa: è superioribus autem alarum cauis nouoserumpentes furculos longos, tenues, capitulis in cacumine globosis & alpeis, in quibus semen continetur, ceu Betæ, verum aliquantò rotundius atque durius. Huius etiam foliorum vis vulneribus utilis est. Traditur & tertia Sideritis, quam etiam Crateas Heracleam vocat. In maceris vinetisque nascitur, folijs ab una radice multis, Coriandro similibus, circa cauliculos dodrantales, leues, teneros, cum rubore candicantes: floribus puniceis, paruis, gustu amaris & lentis. Huius etiam impositæ ea vis est, ut cruenta recentiaque vulnera glutinet.

Panax He-
raclea.
Millefolium.

Panax Heracleam, alij Sideritim, & apud nos Millefolium vocant, cubitali scapo, ramosam, minutionibus quàm Fœniculi folijs vestitam ab imo. Alij fatentur quidem illam vulneribus utilem, sed veram Achilleam esse scapo exeruleo, pedali, sine ramis, ex omni parte singulis folijs rotundis eleganter vestitam. Alij quadrato caule, capitibus Marrubii, folio Quercus. Hanc etiam præciosæ nervos glutinare serunt. Alij Sideritim

in maceris nascentem, cum teritur, fo li odoris: Etiam num aliam similem huic, sed candidioribus folijs & pinguioribus, tenerioribus cauliculis, in vineis nascentem. Aliam verò bitem cubitorum, ramulis exilibus, triangulis, folio Filicis, pediculo longo, Betæ semine: omnes vulneribus præcipuas. Nostri eam quæ est lausit n. folio, Scopas regias vocant. Medetur anginis lud n.

Achilleas seu Sideritides sex statuit & describit Plinius, ac satis quidem indistinctè, ita tamen ut agnosci & intelligi possit (inquit Dalech.) primam Achilleon eius, Dioscoridis Achilleam esse: secundam; Achilleon veram, scapo cartuleo, &c. esse Myriophyllum Dioscoridis. Tertiam quadrato caule, &c. esse Sideritin Heracleam Dioscoridis primam. Quartam in maceris nascentem, &c. esse Heracleam Crateas; apud Dioscoridem. Quintam superiori similem, sed folijs candidioribus, &c. esse tertiam Sideritin Dioscoridis. Sextam, Dioscoridis Sideritin secundam.

Galenus vnus duntaxat Sideritidis meminit. Sideritis (inquit & simpl.) habet quidem etiam abstergendi facultatem quandam, sed plurima eius pars humida est, & mediocriter frigida: pauca verò inest adstrictio, quare phlegmonem sedat & glutinat.

Clauius vno eodemque capite veterum codicum lectione & fide per Marcellum moniti, tres ab alijs seorsum tractatas Sideritides, nec satis certè à veteribus etiam historià descriptas. Quominus miretur aliquis nostra ætate incertas earum notas: & inter similes herbas & eiusdem potestatis vagos Medicorum vsus, miscentibus earum genera Herbarijs, & inuicem commutantibus. Factum hoc iam pridem est, quodque Plinii ætate incertum erat, ignorari sæculo nostro nullus mirabitur. Nos quidem ingenuè fateamur in tanta veterum & iuniorum diuersitate nihil habere, quod pro comperto tradere valeamus.

Sideritis nomine sequentes insigniuntur plantæ. Sideritis hirsuta vulgaris. Sider. Clus. capitato flore. Sider. Montpellier. Sider. hisp. hirsuta Clusio. Sideritis flosculis vix ex valculis prominentibus fuscis. Sideritis quarta Clusii ramulis procumbentibus. Sideritis folio rotundiore. Sideritis glabra arvensis. Sideritis Valerandi Dourez breui spica. Sideritis ligulosa. Sideritis glabra angustifolia spectiosis verticillis. Sideritis cruciata. Sideritidis genus spinosis verticillis. Sideritis spinosa. Sider. foliolis Oleæ. Ladanum segetum flore albo. Ladanum segetum flore rubro. Cannabidis siluestris quorundam. Cardiaca. Marrubium Tragi palustre. Marrubium Pannonicum. Marrub. album angustum. Herba venti. Melissophyllum Fuchii. Galeopsis angustifolia scrida. Galeopsis, latifolia scrida. Gallitrichum silvestre. Gallitrichum lativum. Gallitricho affine Maru. Galeopsis lutea. Ternionaria. Coris lutea Montpellierana. Euphrasia 2. Dod. purpurea. Botrys altera. Chamæpitys. Senecio hirsutus scridus. Parietaria. Millefolium stratiotes. Achillea. Fumaria minor. Geranium sanguineum. Geranium Robertianum. Scrophularia tertia Dodonæi. Sanicula vulgaris. Sanguisorba minor. Barbarea. Filix floribus insignis. Tanacetum album. Verbena supina. Pulmonaria gallica. Virga aurea. Erice. Eruum.

SIDERITIS

SIDERITIS VULGARIS HIRSVTA.

CAP. XXXVIII.

Descrip.



EX lignosa radice caules emittit pedales & bipedales, quadratos, hirsutos, ex albedo vigore flavescentes: ad quorum genicula folia exeunt aduersa, rugosa, hirsuta, vnciali, aut sextantali longitudine, semunciam cuneata lata, in ambitu crenata, sapore exsiccante & adstringente cum calore aliquo: flores

verticillati genicula amplectuntur, galericulati, ex albedo lutei, labro sanguineis punctis guttato, ex calyculis hirsutis, in quinque mucronata segmenta abeuntibus: relinquunt post se singuli flores quaterna semina.

Ex Clusio.

Clusius de sua dicit, folia grauer odorata, gustus amariantis & acrisculi: flores galeatos aliquantulum, candidos, odoratos, hiatum, siue ritum sanguineis notis conspersum habentes: semen in pentagonis vasculis inaequale, nigrum.

Lob. descr.

Lob. sic describit. Virgultis pedibus, iam surrectis iam depressis, quadratis, durisculis, ternis, aut quaternis, verticillis crebribus donatis, pungentibus, floribus albicantibus ex diluta purpura. Iuxta quos & subter, folia sunt longiora, angustiora, incana, & ut totus caulis, scabra, & crispata, ambitu laciniato, ut Chamædryas, aliquando laciniola diuisura obscurius apparet in quibusdam foliis, quæ causa fuit, ut Dioscorides iam quernæ frondi, iam Saluæ & Marrubio contulit. Radix lignosa Marrubij, minus fibrosa.

Synon. linguarum.

Sideritum appellat Ruellius: Sider. Heracleam Euch. Roess. & Lobelius: Sider. heracleam Dioscor. Tabern. Sideritidem primam Fuchsi. Sideritum i. Dioscoridis Turn. Sideritum Fuchsi Cord. in Hist. & Camer. Hort. Sideritum i. Dodonæi [gall.] & Fuchsi Hort. Lusit. & Thalia. Sideritum i. Fuchsi Gesn. hort. Sideritum i. Marrubij folio in cat. pl. Sider. i. florib. albis de coll. stirp. Sideritum vulgare Camer. in Hist. germ. & Epit. Matthioli. Sideritidem quartam Lonici. Sideritum Pannonicam spicata flore Clus. in Pannon. Hist. Sid. i. vulgare in Hist. post. Sid. i. siue vulgare hirsutam C. Bauh. phyt. Aliqui veram Achilleam cognominant. Sed & Alysson Galeni vocat Presburger. Recentiores Herbarij & officina nonnullæ ludicam herbam, & Tetrabit aut Tetrabit barbas nomine inscribunt: Germani wundkraut, i.e. herbam vulnerariam, & gnedkraut, h.e. Artuum, & Zeisskraut. Galli espece de Tetrabit, Fuchsi. & Lob. Hung. Tetrabit suu, h.e. Nobilem herbam. Magna officinarum pars, ac nonnulli recentiorum pro Chamæpity veterum ostendunt, eaque non sine errore, ut bene docet Tom. III.

Fuchsius Sideritidem i. inscribens, pro Chamæpity vtuntur. Fuchsius in eo aduersatur Matthioli, à cuius è contrà stat partib. in adu. Lob. Vocabulo, inquit, quod ferro sauciat partib. opem promitteret, nobilitare ut primi mortales complures plantas, Sideritidesq; vocarunt, potius vitium consimiles effectiones sequuti, quàm vulnium affinitates, genericæve differentias. Quare Sideritidem hanc Herachiam, siue Ferruminatricem Herculeam, docti Barbari illam multo experimento compertam & vocatam Tetrabit, siue ludicam esse sapienter: non modò propter vires efficacissimas, & plarè Hercules, sed etiam quia quàm proximè delineationem Dioscoridis, si quæ alia, repræsentat. Quo magis docti peritis & candidis plantarum arbitris, Commentatorem Senensem eo securitatis ignauæ progressum, ut cum quænam esset, vel Italicis ludæis ludicæ herba, se nescire quæreretur, quàm scire, ut sepe omnia, Ruellius, & ex eo Fuchsius expressisset, tamen in vtrumque inscitæ calumniam impegit, & sensu studio planè deprauato plausum è tritio captarit. Huicque herbæ de sua classe pulsa, sibi missas, ut semper iactat, nec tamen nisi mutilè descriptas, alias suffecerit, sc. Marrubium aquaticum vulgi. Hæc Lobel. in Aduers. vbi plantam minus felici picturâ expressit. Eandem imaginem in Ic. Plant. p. 52, pro Sideritide siue Ferruminatrice, & Sideritide Herculea Diosc. Cordo, Clusio & Herbarijs dedit: Itémque ibidem aliam pro Tetrabit Herbariorum pinxit. Is autem in Obs. p. 282, pro Tetrabit Aduersariorum, siue Heracleæ Sideritide Dioscoridis Cordi & Clusij, aut pro Sideritidis vulgaris figura, ponit iconem Clusij Sideritidis Hispanicæ, quasi putaret eandem cum vulgari Fuchsiانا. Libro etiam Iconum, plantæ, quam exhibuerat pro vulgari hac Sideritide, titulum iam scriptum adaptauit, ibidemque iconem Clusij à vulgari non separauit. Et hæc occasio ut Lobelij descriptionem nostræ subiecerimus: Clusij autem Sideritis Hispanicæ capite proprio.

Lob. Lat.

Sed & H. Lugd. primam Dioscoridis Sideritidem Tetrabit esse pronunciat. Ait autem inter cetera, Matthioli Ruelium & Fuchsi erroris insinuat, quod primam Sideritidem dixerint herbam esse, quæ hodie nostris herbarijs & officinis barbaro nomine Tetrabit, aliis herba ludicæ nominatur. At periti & exercitati Herbarij, tum Ruelio, Fuchsi &que ætate superiores, tum inferiores multis rationibus induci Tetrabit siue ludicam herbam, primam, siue Heracleam Sideritidem esse censuerunt: &c. Eadem verò historia huius plantæ duas proponit figuras p. 119. Vnam quidem habet hoc titulo: Tetrabit. Herba ludicæ, Sideritis prima Fuchsi: alteri titulum fecit, Tetrabit, Sideritis Heraclea Dioscoridis. Et hanc Clusius & Lobelius quoque pictam dederunt, quæ meo iudicio eiusdem plantæ cum Sideritide prima Fuchsi: nec meminit historia duarum discrepantium Herbariorum Dioscoridis Tetrabit.

Matth. 100. 101.

Camerarius in Epit. & Hist. germ. Matth. ait se apposuisse Sideritidem vulgarem, propter vires celebrem, tamen glabram & serratis folijs p. xii, quæ non respondere videtur vulgari, sed potius nostræ Sideritidis cruciatæ, de qua paulò post.

Camer. 100. 101.

Monspelij florentem obseruavi mensè Iunio, Loc. & ac etiam Genæ & Basileæ quæ iur Moutets, & Tempus, inter portam ciueram & lapideam, circa castel-

lum Hermes : Item extra portam Riemerthor. Iunio & O. Johri. Montbelgardi copiose prouenit. Clusius passim in Gallia, Germania, Pannonia, & Austria siccioribus agrorum & siluarum exluarum marginibus obuiam perhibet. Collib. apicis & meridiano Soli obiectis, in promontoriis præcipue circa Ilfeldam, Vvernigerodam: versus Northulam obseruauit Thalius. Lobelius in maritimis, & montosis Italia, Insucriis, & ad Apenninos montes, Venetiis ad Lio, inque Gallia Narbonensi & Lugdunensi reptantem, strigosaque vel lappulosa arida perpetuo amantem, inque Autumnum perdurantem : Iulio & Iunio florentem.

Vires &
Vitis

Iam diu valde magno emolumento cognita prædictis quibusdam Iudæis & Maranis cursoribus, qui hæc enterocelas & alba menstrua curant. Vehementer exsiccant, nonnihil odora adstructione insigniti, nec ingrato sapore, ad vulnera nata & prorsum tanto Herois nomine digna. Hanc in usum desiccata adseruant thizotomæ mulierculæ : Nam præterquam quod aduersus capitis dolorem, quem Sini siues pæer appellant [vnde herbarum nomen, inquit Clus.] ipsum decocto illius lauare utile censent, ab aliquo indocto empirico edoctæ : eandem etiam decocto pedes & alios artus defatigatos, aut alioqui rigentes, vtiliter foueri prædicant. Quidam ad erum Erysipelata [Belgæ de roose/Germ. die Rôte appellant] curanda, recens collectæ & adhuc virentis decocto, non sine felici successu vsi sunt, crura fouendo, aut decocti sumo leniendo.

SIDERITIS SECUNDA CLVSIO, capitato flore.

Descriptio

Hvmilior priore, neque pedalem excedit altitudinem, in raris diuisa ramulos, foliis priori similibus, mollioribus tamen: flores amplexiflori albi, pallescente labro, & paucis rubris punctis asperso, verticillatim in vtriusque caulem supremosque ramulos ambientes, breuiorem quam in iam dicta, & quasi mutilatam spicam faciunt, vt in Prunella vulgo dicta, auctore Clusio qui Sideritim secundam Pannonicam capitato flore in Hist. Pann. vocat, & Sideritim 2. in post.

Locus.

Nusquam non occurrit in agris, & inter segetes in multis Pannoniæ & Austriæ locis : circa tribusvindel autem frequentissima. Floret Iulio.

SIDERITIS MONSPESSVLANA.


CAP. XXXIX.

Descriptio.

Sideritidis Monspeffulanæ radix subest crassiuscula lignosa, raris fibris donata : caules à radice mox plures, subinde ramosi, dodrantes, valde hirsuti, albicantes : folia breuiora, rotundiora, magisque hirsuta, quam Sideritidis vulgaris, serrata, amara : flores verticillati, forma quidem & magnitudine similes, sed coloris ex luteo albescentis, odore est graui. Amaricante exsiccanteque gustu præditi sunt flosculi, inquit Lobelius, ac nonnihil aromatici suauisque halant, quod Chamædryn aut Betonicam referat.

Synonyma

Lobel. dicitur in Adv. Sideritis Monspelica Scordioidea, siue Scordii folio. In Obl. pag. 283.



uit Monspelienfium Schola.

SIDERITIS CLVSIO HISPANICA hirsuta.

CAP. XL.

Longiore est folio quam Marrubium, satis ad Descriptionem Saluæ folium accedente, minore tamen, querni ferè folii diuisurâ, scabro, villis quibusdam prædito, nec iniucundi gustûs, nec odoris: caules fundit quadrangulos, palmum vt plurimum excedentes, interdum procumbentes, dueros, hirtos, candicantes, quorum summities per intervalla verticillati orbes coronant, vt in vulgari Sideritide, orbes vasculis constant, in quibus flos priori par, ex candido nonnunquam purpurascens, quo euanescente, semen in vasculis nigricans reperitur : radix dura, lignosa, viuax, auctore descriptore Clusio.

Lobelius in Obs. & in Icon. pl. assumpta Icone Sideritis Hispanicæ Clusii, eandem fecit cum vulgari, vt iam antè annotauimus. Dodonæus etiam proponit iconem Sideritidis Hispanicæ Clusii, quam à vulgari non distinguit. An verò Sideritis vulgaris sit, de qua scribit, iudicent lectores.

C. Bauh. phyt. ait Sideritim suam 3. siue hirsutam alteram esse Sideritim heracleam Clusii hisp. & Tetrahit herbariorum Lobelii, differreque à vulgari, quòd illa altior : hæc caules habeat procumbentes, magisque hirsutæ candicet. Ego autem ferè dicerem Sideritim hispanicam Clusii eandem esse cum Monspelienfem, nisi Lobelius & Casp. Bauh. eam ab illa separarent. Posteriores hanc rem diligentius perquirent.

An Sideritis 1. Schvvenckfeld.

Nusquam ferè non occurrit hæc arido & petroso solo per hispaniam, Galliam, Germaniam, floretque Æstate, & quibusdam etiam locis in Autumnum vsque florens spectatur, vt refert Clus. in hisp. Idem in hist. post. ait frequentem occurrere aridis & petrosis Castellæ veteris locis, Æstate florentem, quibusdam etiam locis in Autumnum vsque floribus onustam conspici.

SIDERITIS

& Icon. Plantæ pag. 325. Sideritis Monspelica Scordioidea floribus luteis, Tragoriganum Præloides Francis si Pennini. H. Lugd. pag. 1122. Sideritis Monspelienfis Penn. C. Bauh. phyt. Sideritis 3. siue hirsuta Monspelica.

Florentem Locus & mente Aprilis Tempus. & Maio vidi prope patibulum Monspeffuli vbi abundare annota.

Locus & tempus.

SIDERITIS FLOSCVLIS VIX EX VAS-
culis prominentibus sulcis.

CAP. XLII.

Descriptio



C Vbitalis est
lū: minū
planta, caule
quadrato, hirsu-
to, foliis donato
ad articulos
ut in Sideride
vulgarī, aduersis
nequaquam per
marginem fer-
ratis (in planta
quā habemus)
vinculis & sel-
cuncialibus, hirsu-
tis: rami in
quos diuiditur
oppositum ha-
bent situm: per
quos longā se-
rie flores verti-
cillati, pulchri, in-
tra ipsos calyces

propemodum occultat, fusco colore inhaerent, in
sicca, calycibus admodum hirsutis, in quinque a-
cutas in spinulam delinectas testiores diuisis:
porro vnicuique verticillo bina subiunguntur ad-
uersa folia, multo infrioribus innotata, magis to-
mentosa, neuis secundum longitudinem dona-
ta, equabili marginum circumscriptione ad Ser-
pulum accedentia.

Iconem nostram ex sicca pictor minū scilicet
delineauit.

Locus Clus. in Pannon. p. 600. dicitur Sider. Pann. 3.
In Hist. post. Siderit. 6. Pannon. C. Bauh. phyt.
Sid. 4. siue hirsuta Pannon. Rh. zotomis Viē. cū lib.
mulerulis fuscis per frant.

Ex plantis Agenj habui Sideritidē Pannonicā
hanc antē sō vilam. Frequentissima autem est in
Pannoniz Austriaeque inferioris aruis & inter se-
getes, macro & sterili solo. Floret Iunio & Iulio,
semen subinde maturum etiam Iulio.

Tempus

Vires Huius vires adscriptae sunt ex Clusio capite de
Sideritide vulgarī.

SIDERITIS QVARTA CLVSII,
ramulis procumbentibus.

CAP. XLIII.

Descriptio

A Liqueot habet ramos procumbentes, qua-
drangulos, tenues, villis quibusdā obsitos,
quos per intervalla contrario semper situ bina
cingūt folia, vulgari, serē similia, pauld tamen mi-
nora, à medio ad extremū serrata, nonnihil etiam
villosa: summos ramos verticillatim ambiunt
vascula in quibus flores prioribus formā similes,
quācum ex delineatione colligere potuit author
Clus. propterea nihil de colore pronunciat, ne-
que de semine, quod superiorum semini par esse
verisimile est: radix non videtur viuax, sed eo
anno, quo planta flores protulit, perire.

SIDERITIS FOLIO ROTVNDIORE.

CAP. XLIV.

Descriptio

M Edinm caulem habet surrectum, quadran-
gulum: deinde, statim à radice, multos in
latera spargit ramos, humi fufos, quadrangulares,
quibusdā villis pubescentes, geniculatos, quos

bina semper inter se opposita, ad singulos nodos,
amplectantur folia, praecedentis folii penē si ni-
lia, minū tamen serrata, inter quae, ab imo ad sū-
mum vsque, verticillorum ritu nascuntur in
vasculis flores, superioribus etiam forma similes,
(quorum color, ni fallitur author Clusius, nam in
aquis Belgicis illam olim obseruasse putat) albus:
nec huius radix viuax esse videtur: Iconē ad Clus.
mittebat Lac. Plateau, eleganter expressam.

An Thalis Sideritis Cordi?

SIDERITIS GLABRA ARVENSIS.

CAP. XLV.



Sideritum vul-
gare refert, **Descriptio**
tum caule qua-
drato, cū foliorū
cōsimili positū,
erratis, verū
tum ille, cū hūc
glabra sunt & a-
tro virore splen-
dentia, folia et ā
latiora: florum
verticilli spicam
effigiantes patu-
lo nōtu, subiecta
habent singuli
bina: flores ipsi
maiores viden-
tur, candoris ni-
uei, subinde pi-
lofi, veluti & ca-
lyx: radix sim-
plex, gracilis.

Hac est illa stirps, quam Tabern. in Hist. Alyf-
sum maius: C. Bauh. phyt. Sider. 6. siue arvensem
glabram, flore pallido. Non est autem Sideritis
altera Matth. ut alicui facile concesserit C. Bauh. **Locus** &
Montbelgardi obseruavi in aruis inter Ar- **Tempus**
bouans pagum & Audincourt, & eundo ad vi-
tes, florentem Iunio & Iulio ac Augusto: Basilea
etiam frequentem:

SIDERITIS VALERANDI DOVREZ
breui spica.

CAP. XLVI.



Minimum **Descriptio**
digitum
crassitudine
semē aequat
radix, lignosa,
non sine adna-
tis fibris, Lo-
belio flexuosa,
pulla, amarica-
te gustu, pra-
sicca, nec in-
grata: quae ex se
innumeras
promit virgas
lignescences,
dodiantales,
oppositis ra-
mis pauld su-
pra radicē bra-
chiatas, hirsu-
tas, per quas
folia ad jun-

eturas bina oblonga, angusta, per extremum nonnihil serrata, minora quàm Sideritidis Euchsianæ: desinunt autem singuli ramuli in spicas B-tonicæ, vel Philandis spicarum æmulas, vnciam aut sesquianciam ferè longas, pulchris calycibus in quibus aculeos desinentibus, maioribus quàm vel Euchsianæ, vel Maripellulanz Sideritidis, insensuque hirsutis denè stipatis, adiacentibus foliis latis aut ferè spinosis: florum color quis fuerit, non dixerim certò, præsertim cum iam olim à Valerando Dourez reposita planta quam habeo, propemodum exoleuerit.

Sideritis montana
Lobel.

Sideritum montanum (ita namque vocat Lobel. in Aduers. itemque Icon. Plant. pag. 525. pessimam exhibens effigiem) satis bellè quadrare arbitror Heracleæ Sideritidi, ni folia angustiora multò essent, & vique efficaciora carerent. H. Lug. pag. 122. inscribit Sideritum montanum Pennæ: Cesp. Baub. phyt. Sideritum 9. siue montanum.

SIDERITIS GENVS SPINOSIS verucillis.

CAP. XXVI.

Descriptio



Sideridi affinem plantam vocamus, cui caulis est quadratus, hirsutus, & ad singulos nodos verticillatim circumnascuntur flores, Sideritidis vulgaris floribus similes, candidi, hiantes, non ita exerti, calycibus laxis, duris, in quinque lacinias rigidas spinosas, supremam omnium longè maximam, diuisis: vnicuique autem

rem verticillo, ab imo ramo ad summum vsque fastigium, duo sunt subiecta ex aduerso orta folia, modicè hirsutie obsita, serrata vt Teucrii, sed nonnihil oblongiora, angustiora. Hanc Cherlerus collegit prope Romam.

SIDERITIS SPINOSA.

CAP. XXVII.

Descriptio

Mortelgardii in horto Ill. E.C. nobis prouenit ex semine, si bene recorder, Cretico, plantæ, cui nomen dedimus Sideritidis spinosæ, propter quandam cum vulgari Sideritide similitudinem. Est autem hæc vulgaris foliis vncè longioribus, in acumen desinentibus, hirsutis, candicantibus, sibiue oppositis: caulibus aliquot dodrantalibus, ramis itidem contrario naturæ vinculo ornatis, in spinas desinentibus non

admodum rigidas, etiam hirsutis: plantæ nouellæ radix pedalis, simplex, exiguis fibris conspicua.

An Gaidarothymo Belli in epistola ad Clusium? An Clut. Stachys spinosa?

PRVNELLA FLORE MINORE, vulgaris.

CAP. XXVIII.



EX repticiu Descriptio
Ecentuæ & hæc, quæ subinde à cauli anguloso, subhirsutorum, purpurascens, demissis fibris radicans: folia ferè bina, ad articulos opposita, nonnihil subtentia, hirsuta, Organi vulgaris, sapore nonnihil viscido, subdulci, subamaro: flores verticillati, duobus semper hirsutis

rubentibus subiectis foliis, spicam deformant; quorum singuli colore ex caruleo purpurascens, Lamii floribus non absimiles, ex calyce hirsuto purpurascens procedunt cucullati.

Ex Solidaginum genere Brunellam esse autem Solidago
stor est Brunellius, vnam ex primis herbis verno tempore germinantium, foliis Ozimo similibus, coloris herbacei, cum quodam acumine: flore quadantenus Stæchadis Arabicæ, coloris violacei. Hæc ille qui suâ figurâ non laudabili & descriptione denotat Prunellam, de qua hic agimus, verum dum vernam scit plantam, cum ea confundere videtur Consolidam mediam.

Hallucinatur Matthioli indicio, qui Symphytum petraum putant hæc esse plantam, quam is cum officinis Consolidam & Solidaginem nunc rem vocat, & Prunellam, germanico nomine (vt ait in Hist. germ.) ex latino deriuato, vel à morbo linguæ, dicto Breüne aut à florū colore Bräuno. Camer. apud Matthiolum refert herbam hæc describi in lib. de Dynamidiis, falsè Galenq̃ adscripto: Quin & Herb. ant. 10. Cubæ de Prunella citat Hippocratem & Dioscoridem, neuter tamen indicat quomodo nominarint.

C. Baub. phyt. vocat Brunellam i. siue maiorem
folio non dissecto, flore communiter purpureo, vel caruleo punicante: aliquando ex diluto albo: caule glabro aliis, aliis ac rectius hirsuto: foliis etiam aliquando integris, aliquando leuiter crenatis. Clusius Prunellam vulgarem foliis subrotundis. Træg. Prunellam 6. flore minore, Prunellam vulgarem. Lobel. in Adv. Prunellam & Consolidam minorem: In Obs. p. 251. Brunellam, Symphytum petraum: In Icon. Plant. p. 474. Symphytum petraum & Consolidam minorem Matth. Cast. Durant. Consolidam minorem. Quidam Polycnemum Dioscoridis: Valer. Dourez Petistere Præpositi: Guiland. Britannicam.

Varia Prunella
C. Baub.

Ceterum

Nomina
linguar.

Ceterum vulgus Medicorum & Herbariorum, Prunellam aut Brunellam: Germ. Brunnellin/ & Gotscheil ab efficacia insigni: nobilis enim est vulneraria: Belg. Bruynelle: Galli, Herbe au Charpentier: Itali Contolida minore, Morellam, & Herbam Moram: Boh. Czernobletsef: Hung. Tenz fid.

Vires

Prunellam flore minore purpureo Argentina & Basilea, quâ itur Moutets, florentem obseruauit Octobri ad flumini Birtz intra urbem, & circa montem prope Krentzsch, & in monte Leurach, itemque Montbelgardi passim in pratis Iunio, Iulio & Augusto; Lugj. & Mompelij Maio: Geneuz (spatium virentem Februarii) principio.

Locus &
Tempus.

Brunellam more reliquum Solidaginum, omnibus ferè cognitam aut Brunfelsidque ob eximiam eius virtutem: esse in eo nodis faucium & linguæ atque gutturis accommodatissimam, ardorem eorum extinguendo, quem Germani die Breune vocant, si ex illius decocto, aut aqua distillata colluantur & gargarizentur: Aquam (succum aliq.) ius acet. & oleo rosato mixtam, vehementes capitis dolores sedare, si ex ea tempora inungantur: Huic mixturæ autem posse & aquam rosatam addi. Aphthas & oris vlcera sanare, fauciumque vitia succum eiusdem, addit Fuchsius, qui herbam calidam & siccam esse, ex gustu concludit: Laudatur Prunella ad vulnera sclopetorum in potione & lotionibus: succus cum vino sumptus ad morsus venenatorum. Sal eius vt fiat, docet Querc. in pharm. rest.

Prunella flore magni, folio non laciniato.

Descriptio



Habet caulem quadrangulū mollior hirsutus, geniculatum: folia in singulis geniculis bina, ex aduerso sita, nonnihil villosa, vulgaris Prunellæ folius formæ respondentia, gustu amaricante: capitula in summis caulibus crassiora, quàm in vulgaribus: flores illius floribus forma

quidem similes, sed longè maiores, nec ingrati odoris, ventre laxiore, g. dea que scutatis plerumque purpurascens, tamen inueniuntur aliquando diluiores, & quasi exalbidi; interdum etiam subcinerei coloris: semina in singulis vasculis, v. plurimum quaternis: radicem nigram: multis crassiusculis & candicantibus fibris præditam, nouisque propaginibus sese, annis singulis, augentem.

Icones

Quamuis Fuchsiana nostra figura videatur differre à Clusij Prunellæ siue non vulgari, eiusdem tamen plantæ existimamus, ac propterea eius descriptioni hic adiunximus. Nec etiam à Clusiana icone separamus Prunellam tertiam Tabernamontani, quamuis eius compilator sub more nihil distinctè senbat.

Locus

Eadem quoque est Prunella 6. Tragi, siue v. Tom. III.

ra, pulcherrimo, magno & purpureo flore, foliis Monthastrum imitantibus.

Tempus

Eam primùm in Vngaria & Austria, deinde etiam multis aliis Europæ prouinciis nascentem inueniebat Clusius, editioribus & gramineis locis, minus tamen vberem & luxuriantem, quàm quæ in Austria crescit. Floret Iunio, Iulio & Augusto, & subinde semen profert. Circa Montbelgardum copiosè luxuriat.

Prunella flore magno albo, folio laciniato.

Tota planta vix quatuor digitos excedit; foliis superioribus admodum dissectis, hirsutis, flore magno albo, alioquin vulgari similis.

Descriptio

C. Bauh. phyt. Prunella 5. siue minima alba, An Prunella 7. siue candida altera Tragi: Montbelgardi prope Arbouans & in planitie prouenit quâ itur Adinecourt, in agris ad Dubim: Geneuz circa Rhodanum versus la Bassie.

Locus

Prunella laciniata, flore magno purpureo.

Descriptio



Caulis est palmari, hirsuto, cuius singulas iuncturas ornant bina ex aduerso posita folia, inferiora quidè vnciali pediculo nixa; superiora proportionem minori, tandem etiâ nullo, vnciam & fescutiâ ferè longa, subhirsuta, in aduersas laciniâs dissecta: flores inter spicæ vncialis squamata folia

subrubentia, emicant magni, tres vnciæ quadrantes æquantes, hiato patulo stamina emittentes, purpurascens.

Observata Prunella hæc, folio etiam non laciniato, flore maiori purpureo, Montbelgardi iuxta hortum Ill. E. C. florens Iulio & Augusto: item à la Chau vbi Vites, & inter pontem Vauiaucourt à Dampierre.

Varietas
Locus &
tempus.

Prunella flore albo paruo, folio laciniato.

Descriptio



Offeret nobis à D. Thoma Platero, Medico insigni, elegantiq. Et folia erant multa à radice fibrosa, ex longis pediculis, quædam palmaria, oblonga; vnciâ digiti angustiora, pilosa; vltra medium caulis pedatis duo, magnis laciniis dissecta, cornu ceruinum representantia, iteq. A 22

alia duo iuxta florum caput vnciam & semis
longum, larum vnam, paucioribus laciniis prædi-
ta: flores inter squamas conspiciuntur hiantes,
albi, & nonnunquam rubelli, mediocriter emi-
nentes.

Synon.

Lobelin. Obl. p. 251. in Ic. Plant. p. 475. effigiem
nostrâ pinxit pro Symphyto petræo: Dod. lat.
in fol. pro Bunellæ altera icon. Quamvis autem
nostra descriptio non in omnibus conveniat
cum figura hac nostra ex Lobelio desumpta,
eandem tamen plantam putamus, quam eum
pingendam curavimus, non erat nobis ad ma-
num Plateriana.

Compilator Tabern. Prunellæ suæ albæ secundæ ineptam descriptionem subnectit in Historia. Casp. Bauh. phyt. dicitur Prunella 3. siue minor folio laciniato, aliquando non solum superior, sed & inferiori. Clusio dicitur Prunella 2. non vulgaris.

Gaudere autem herbosis & gramineis locis, itemque altis, quæ à fluminibus conuoluuntur, mundantur, fixos, testis est idem Clusius. Floret maturius Prunellâ flore magno, nempe Maio, tametsi etiam Iunio. Obseruauimus autem Montis-pellii & Geneuæ.

PRYNELLA ANGVSTIFOLIA

CAP. L.

Description



Nostrę vul-
garis noti-
ta Prunellę si-
milis caulis do-
drantalis, an-
gulosus, nonni-
hil rubescit, pi-
lis hirsutus, si-
cuti & folia ex
geniculis ad-
uerso situ nata,
sextantalia aut
etiam quadran-
talia, culmo la-
tiora, ex quo-
rum alis alia
suboriuntur vt
longitudine, ita
& latitudine
multũ illis
cedentia: flores
in spicam diges-
ti rubescunt.

forma & magnitudine Prunellæ vulgaris. Talis est quæ à Genero nostro Cherlero nobis delata ex Gallia Narbonensi : quæ verò à D. Thoma Platero communicata, angustifolia etiam, minor fuit, quatuor & quinque unciarum, satis aspera & rigida, sapore nullo insigni : radice fibrosâ, crassiuscula, nonnihil amarescens : floribus majusculis.

C. Bauh. in phyt. vocat Brunellam 2. siue minorem folio rigido integro 3 floribus obscure purpurescentibus. Huic figuram Prunellæ albae 2. apud Tabern. satis continere diceret, si folia essent media parte angustiora, & etiam longiora.

PRVNELLA ITALICA.

•CAP. - LI.

Description

Plantula hæc palmaris, caule rotundo, striato, leuiter hirsuto, foliis paucis profunde in

aliquot lacinias diuifis cincto, quorum inferiora minora, & in ternas lacinias diuifa funt, flores habet in summo, tanquam ex fpica [quam foliola etiam laciniata cingunt] prodeuntes galericulatos, ex purpura nigricantes, rariùs enim infra fpicam flores profert: radix exilis, nigricans.

Casp. Bauh. descriptionis author vocat in phyt.
Brunellam & siue Italicam, testaturque Vlysses
Adroandum Bononiensem Botanicum Euphra-
siae speciem facere.

Romæ in monte Testaceo & etiam in via Ro-
mana reperiri scribit author.

Brusella &
salicis

Locus

CONSOLIDA MEDIA, QVIBVSÐAM

Bugula.

CAP. LII.



Quadrato, inani, hirsuto, & aliquantulum cyaneos affurgit caule: foliis Anagallidis aquaticæ maioris, nonnihil serratis, binis oppositis, per intervalla nascentibus, colore vel violaceo, vel purpurascēte, vel virente, sapore primo occurfu subdole, mox amarescente & adstringente, inferioribus ex satis longis pediculis, ad Bellidem accedentibus: clematibus longē se spargentibus: flores ex foliorum alis calyci insident sessili, brevis, hirsuto, cyaneo, quinquepartito, carulei variati, labello Orchidis alicuius similes, in quatuor segmenta, duo lateralibus productiora, inferiora totidem, minus alta, sed

magis lata, abeuntes, nullâ galeâ, alisue vt Orchides & Lamia: apicibus & stylo cyaneis: sapore melleo, si caudicellam, qua calyci haeret, iuxeris: radix tenuis, fibriola, maiore adstrictione, quam folia, gultum mouet.

Duas has Fuchianas icones exhibemus non quòd eundem plantae esse ignoremus, sed quòd huius herbae frequentem demonstrant varia-

tem & naturæ lufum.

*Consolida
media
Bauh.*

Prunellam vocat Tragus, eîusque, aliquot recenset & describit species. C. Bauh. phyt. vocat consolidam mediam 1. [5. & apud Matth.] siue cæruleam pratensem, Consol. mediam Brunfels. fol. p. 95. Tom. 1. Rhaps. 14. & in 4. p. 153. cæruleam vel priorem Tragi sine iconē, Chamæcillon spicatam Plinij, eîusdemque Anonymi aliorum: flore communiter cæruleo, aliquando albo; cinereo: foliis vel solùm leuiter incisis, vel linguatis, latoribus, angustioribus: Item Consolidam mediam tertiam siue purpuream pratensem; Brunellam purpuream vel 4. Tragi, Consol. med. purp. Fuchsi. Consolidam mediam i. e. Symphytum, inquit, in Adu. Lobel. Chirurghi vocarunt, seu Solidaginem & Bugulam. Is verò in Obseru. & Ic. Plant. Prunellam & Herbam sacram Cordi vocat.

*Bugula
Dod.*

Dod. gall. & lat. in fol. pingit & describit sub Bugula. Inter appellatas, ait, Solidagines siue Consolidas à recentioribus numeratur: Consolidam media à quibusdam horum dicitur, officinis nostratibus Bugula. Ruellius Buglum nominari à Gallis refert. Sunt qui existiment Symphyti illud genus esse, quod à Dioscoride *μαζίν* cognominatur. Verùm hi non parum falluntur. Symphytum liquidum petrarum ramulos tenues habet Origani similes: capitula verò veluti Thymi, & totum lignosum & odoratum est, at talis quidem non est Bugula, quæ nec lignosa, nec odorata, & caules promit differentes ab Origani, & capitula nequaquam habet Thymi æmula. Hæc Dodonæus, qui eius duntaxat Bugulæ meminit, quæ floribus est cæruleis.

Haud statuendum censet etiam Matthiolum Symphytum petrarum eam esse herbam, cuius folia auersâ parte purpura sunt, quæ ab Herbariis vulgò Consolidam media nuncupatur, ab aliquibus verò Laurentina, & à Senensibus Morandula. Cæterum, rectius fortè Prunellam à Germanis dici posse putat à foliorum colore, indicatam Græcis & Mauritanis. Is olim in prior. comm. contentus fuit solâ figurâ minùs exactâ, sed in post. edit. breuem addidit delineationem, in qua non meminit saporis, nec clematum, quæ nostræ duæ figuræ vnius plantæ expriment, quarum vna sufficeret, si non plantæ huius lufum aliquem naturæ ob oculos ponerent.

*Consol. med.
moles.*

Camerarius etiam ad suam Hist. germ. & Epit. Matthioli longè diuersam posuit iconem sine clematibus: Quin & Tabern. huius Consolidæ mediæ duas effigies dedit, quarum prima flore cæruleo, sine clematibus non placet: secunda, quam priori similem ait, sed foliis maioribus, hirsutioribus, minùs serratis, Verbasco maiori similibus, an bona sit, te iudicem expectamus.

Quam cum aliis, etiam Fuchf. Cast. Durantes & Thalius Consolidam mediam dicunt, Lonic. Prunellam & Symphytum medium vocat, Anguill. epist. 13. Arcticam Pandectarum, H. Lugd. p. 1309. Chamæcissum quorundam, Cæsalp. Chamæcissi alterum genus, Gesn. in cat. pl. Verbena cam sopinam, Herbam sacram, & *ies Cordi*: German. Guntzel / gulden Guntzell / Belg. Senis groen / Ingroen / Galli *Consolide*, quidam *Bugle moyenne*: Quercetanus in Sclopet. *Consyre moyenne*, & cum nonnullis *Sophie*: Itali, vt antè diximus, *Morandula*, *Consolida Mezzana*, & Herba, *Lorenza* & *Laurentina*: Boh. Sualuyf prostruduy.

Tom. III.

Saxosis, non rarò quoque humidiorib. pratis apticis & apertis vineis, quàm opacis locis gignitur: translata ad hortos luxuriat: compluribus regionibus familiaris, Aprili, sed copiosè Maio ac posterius florens. Patanij virentem memini in quodam horto Ianuario: Basileæ in vineis propè Moutets ad montē flore purpureo Octobri: Montbelgardi flore albo in horto Illust. E. C.

Locus & tempus.

Aquam Prunellæ scribit Tragus (sic enim Bugulam vocat, vñ cum ea quæ aliis vulgò Brunella dicitur): internis corporis affectionibus mederi, doloresque ex calida intemperie profectos sedare: eadem omnia tam inueterata quàm recetia vulnera mundari & sanari comodè posse, maxime tum quando ardor siue inflammatio aliqua illis accesserit. Eandem hodie ardori gulæ & exulcerationi oris, fauciumque vitij, quam Germani die breune appellant, duntaxat adhiberi remedio sanè præstantissimo, si gargaretur, adiecto paulillo mellis rosati: flores, vel folia, vino, vel melle decocta (pro ratione ægritudinis) oris & faucium commemoratis vitij subuenire. Hæc ille tam de Prunella vulgò dicta, quàm de Bugula, de qua sermo, coniunctim. Fuchsius verò priusquam Bugulæ has vires attribuit: Vult era glutinat, sanguinis grumos ex casu, vel cõuulsionib. coactos à corpore disicere & dissoluit, præsens remedium est aphthis & vlcetibus in ore serpentinibus, decoctum huius tumoribus illitum, eos dissipat! vsus etiam eius ad intertrigines, & ad vlcera pudendorum & intestinorum exulcerationes prodest. At *Matthiolum*, tametsi nec hanc, nec Prunellam recentioribus dictam, veteribus siue Græcis, siue Mauritanis cognitam fuisse existimet, eas tamen refert mirum in modum existimari viles disruptis, fractisque internis, & externis corporis partibus: idcirco vuliter dari potandas ab alto deuolutis, ac etiam iis, qui interna intestinave vulnera acceperint: namque illa, mirificè sanare tradidit nonnulli, qui rerum experimenta profitentur, Consolidam mediam vocatam potu sanguinis grumos in ventriculo, vel in alia corporis parte concretos disicere & dissoluere: illita verò folia, vel eorum succum efficax medicamentum esse prædicant vlcetibus in ore manantibus exedentibusque, ac etiam testium, pudendorumque virilium & muliebrium. Addit *Camerarius* contra icterum prodesse, & infarctus iecoris & lienis expedire, vrinas mouere, succum ad aphthas & putrescentia oris vlcera vsurpari: quibus subscribit *Lobellus*, nisi quoddam regio morbo & ictero nigro mederi docet, vesicâ felleâ, hepate & liene ab obstructione liberis. Camerario tamen adstipulatur *Dodonæus* ad iocinoris languores scribens mederi, nam præterquam quoddam obstructiones aperiat, viscera etiam ipsa roborare. Calidi verò temperamenti admodum exigui particeps est: resiccat manifestè cum nonnulla adstrictione. Quare commendatur ad disrupta, fracta, conuulsa, cæcæque: idcirco & potionibus vulnerariis additur, in quibus tanta eius facultas commendatur, vt sanguinem concretum dissoluere ac discutere valeat. *Ruellius* tandem in Gallia vulgò dici refert, eum vulnerario Medico, aut Chirurghi operâ non egere, qui Bugulam & Saniculam habuerit: nec enim sumptam tantummodò vulneribus mederi, sed & ipsis foris impositam.

Vires & vltus.

*Herba
sacra.
Nomina
linguarum.*

Aaa 2

Consolida media Geneuensis.

Descriptio:



Locus & Tempus.

hant Martio, vbi etiam quidam florebant & April. alba quidam rarior, circa Nofodochium in prato dictum la coul.

Consolida media carulea Alpina.

Descriptio



angusti sunt, trium transversorum digitorum longi, per ambitum incisi, leuiter hirsuti, sursum spectantes,] cingunt: flores galericulati, carulei (in caulis summitate flores tanquam in spica carulei, in phyt.) è quorum medio filamenta quoddam prodeunt, in cacumine quasi spica congesti sunt, inquit descriptionis author Casp. Bauhinus, qui Consolidam mediam [secundam in phyt. sextam apud Matth.] siue caruleam alpinam vocat. Ceterum, figura à Camerario apud Matthiolum in Hist. germ. & Epit. exhibitæ, similia quoddam habet cum Consolida hac à Fratre C. Bauhino hinc proposita: nos damus effigiem à Fratre pictam, & iuxta eam, quæ ab eo nobis communicata. Videtur autem fratris Consolida in eo à Geneuensi differre, quodd minus hirsuta, & folia per caules longiora, & magis, ordinatiusque serrata.

In monte Italiz Baldo prouenit.

A Vulgari antè scripta nobis hæc diuersa videtur, caules siquidem habet ab vna radice plures, hirsutiores: folia etiam minora, oblongiora, & superiora profundius crenata: flores modò purpureos, modò rubellos, modò albos: an clemata habeat non obseruauimus.

An Prunella quoddam Trago?

Geneux vire-

CAP. LIII.

CAP. LIII.

Descriptio



P Almaris plantula est, tenuibus, subhirsutis virgulis lugeis: folia denticulata, ciliolata, sed triplo maiora, crispata & aucta parte hirsuta, bina ex aduerso posita, sapore pingui & subamaro: ex quorum alis strobili emicant pulchelli, lactei, purpurantibus striis picti, aspersa nonnulla da-

uedine, labello in tres bifidas lacinas diuiso, superiore folio sursum reflexo, tripurato: radix tenuis, lignosa.

Cum Euphrasia hac eandem statuò, quam Synonyma Tragus Euphrasiz titulo pingit, quamque Euphrasiam alteram, nobilem, & Argentinensium cognominat, licet ille diuersam à vulgari faciat, semperque omnium præstantissimam iudicet.

Lobelius huius effigiem exhibet sub inscriptione in Obs. pag. 261. Euphrasiz Aduers. pag. 210. In Ic. Plant. pag. 496. pro Euphrasia, siue Euphrasie oculari. Brunfels. Euphrasia alba: Schev. Euphrasia cardida: Casp. Bauh. phyt. Euphrasia siue officinarum: H. Lugd. pag. 167. Euphrasia Matthioli.

Ceterum, Euphrasiz nomen græcam sapit originem, inquit Dal. champius: videtur namque *εὐφράσιον* appellata fuisse, quia oculos iuuat & delectat, quam vocem imperiti linguæ græcæ deprauantes, in Euphrasiam verterunt, eamque sic corruptam officinarum & plurimi alii retulerunt. Alii quoque Euphrasiam & Euphrasiam. Easi autem græco & eleganti donata fuisse videatur Dalechampio hæc herbula nomine, nihil tamen de ea, quod sciam, apud veteres Græcos & Latinos, nempe Dioscoridem, Galenum, & Plinium, addere etiam apud recentiores, Actium Paulum, & Aetnarium scriptum reperitur: sed à ducentis tantum vel paulo plus annis posteritati Euphrasiz nomine innotuit, ad oculorum caligines & morbos pituitosos pernagatæ commendationis. Unde Germanis Augentrost, hoc est, Oculorum solamen, siue solatium, ab effectu, dicta fuit, nonnullis hæc quoque ratione motis, Ocularis, Ocularia Ophthalmica [*ὀφθαλμική*] Oculorum lumen, *ὀφθαλμοδυνία*, & Anguill. teste Luminella Germ. Augendienst / weisse leuchte / taglichte, & weisse genleuchte. Belgæ Ooghen trost: Galli Euphrase, & Euphrase: It. & Hisp. Euphrasia, & Euphrasia: Angli Eyebright: Boh. Ambrozka: Hung. Euphrasia. Non est igitur quod posteriores *εὐφροσύνη*, Euphrosynen nominent. Aliud siquidem est *εὐφροσύνη* ipsum videlicet Buglossum. Eur. Cordus putat esse Adhil Arabum, de qua tamen Neotenci

varias

varias habent sententias, aliis Euphrasiam Cassi-
laginem esse putantibus, aliis Herbam Verulam
interpretantib. Vide Nicol. & Manliū de confect.

Locus. Nascentur locis herbosis, non omnino aridis,
sed nonnihil humentibus & pinguibus, sed in-
cultis, ut pratis, secus agrorum margines & vias,
nec raro in ipsis quoque viis passim, ut vel hac
ratione facile agnosci queat. Floret autem Estate
& Autumno: colligitur Augusto ac Septem-
bri potissimum, totaque refectata deinde reponi-
tur.

Vires & Vitis Euphrasie inflammationibus, & caligini ocu-
lorum adhibentur, tuxa ac imposita, aut succo
eius oculis indito: præstat tamen aqua ex illis di-
stillata aduersus affectiones prædictas vii. Ego
certè, inquit Tragus, Argentinensem Euphra-
siam morbo arquato volissimam comperi, vino
decoctam, ac calidam ægto propinatam. Memo-
riam etiam, teste Fuchio, oculorum neque aciem
redacta in puluerem, & in vino albo pota, miri-
ficè roborat, amissa neque reparat. Dar ad prædi-
ctos affectus commodissimè scribit Dodonæus
in puluerem tritam: addique non raro Fœniculi
semen pari pondere & nonnihil Macis, & saccha-
ri tantum, quantum est omnium simul pondus:
huius mixturæ cochlear aut per se, vel cū exiguo
vino exhiberi manè corpore jejuno, & quidem
per continuos non modò dies, sed & menses
quandoque posse & solam, & quouis modo as-
sumptam, videndi potentiam conseruare, adan-
gere, debilem ac depravatam restituere. Euphrasiam
per se solam masticando, & in ore tenendo, ac
postea deglutiendo expertus est Arnoldus mira-
bile iuramentum. Idem auctor est fieri & ex Eu-
phrasia vinum vindemix tempore, cuius vsu senum
etiam oculi rejuuenschere feruntur, auferrique
omne oculorum impedimentum, vitisque defe-
ctionem, præsertim pituita, crudisque humo-
ribus redundantibus. Dum autem effruescit mu-
stam, Euphrasia inijcienda. Calida autem & sicca
est herba, sed tamen magis sicca quàm calida.

EUPHRASIA PARVA PURPUREA.

Descriptio. Tota palmarem non assequitur altitudinem,
coliculo aliàs singulari, tereti, hirsuto, aliàs à
radice statim duobus minoribus spicâ vnciali aut
longiore summo ornante, flosculis stipata pur-
purascentibus, alternante cum foliis imbricatis
sitis, cuiusmodi & alia foliola circa imum caulem
conspiciuntur, sed supernis latiora summo tenus,
ferratim secta, pro radicibus sunt multifidæ, du-
riusculæ, pili instar tenues fibræ: secundam Do-
donæus fecit, inquit Lobelius in Obs. pag. 22. qui
postea p. 261. eam pro Euphrasia 2. Dodonæi (sic
etiam in Icon. Plant. pag. 496. inscripsit) siue Cra-
tægono altero quorundam pinxit.

Describitur bis apud H. Lugd. binisque iconi-
bus exprimitur, priori p. 111. pro Sideritide præ-
tensi rubra: posteriori p. 167. pro Euphrasia secun-
da Dodonæi, quæ icon melior.

C. Bauh. phyt. vocat Euphrasiam 2. siue præten-
sem rubram: Thal. Ericoides rubrum, vulgò Tri-
ticum leporinum.

Montbelgardi abundat in agris florens Iulio,
Augusto, & Septembri. Huius varietatem flore
niueo, totamque candidiorem reperi Septembri
inter Villarsuxel & Grammont in Burgundia.

De temperamento, aut facultatibus aliis nihil
attulit Dodonæus.

CORIS MONSPESSVLANA LVTEA.

CAP. LIV.



Simplex & Descrip.

Simplex est
radix caulis
singularis cu-
bitalis, ligno-
sus, teres, ramis
aduersis diui-
sus, duris, li-
gnosis: folia
inferiora qui-
dem Hyssopi
foliis similia,
vtrunque an-
gustiora; acu-
minata, caduca;
superiora verò
tenuia, Ericæ
arborescentis
æmula: ramuli
longas gestant
spicas hiantium
flosculorum

luteorum, cum multis apicibus, flosculis singulis
subiectum foliolum, sapor acris cum amaro:
Folia & caules interdum omnino rubent.

An Cæsalpino Cista altera ad Euphrasiam
reducenda: An Lobel. in Adu. Sideritis odora
pusilla: Thallio dicitur Ericoides luteū pro Cori
ostentum: H. Lugd. pag. 111. Sideritis præten-
sis lutea: Camer. hort. Euphrasia flore luteo, à
Lobelio descripta; item apud Thal. Euphrasia lu-
tea Dodonæi: C. Bauh. phyt. Euphrasia siue
prætenensis lutea.

Monspessuli mense Augusto floret in monte
prope Castelneuf loco sicco & saxoso, tota rubel-
la: Basileæ lutea in monte Marchionatus prope
Leurach Augusto: Frater etiam in pratis proue-
nire ait.

Locus & Tempus.

SYMPHYTUM PETRÆVM veteribus.

CAP. LV.

Symphytum petræum nascitur in petris: ramu. **Disce. l. 1. id**
Slos habet Origano similes, tenues, capitula **varie illud**
veluti Thymus [καπρία δὲ καὶ ὁμοία ὀρεῖται, καπρία, **strata.**
καπρία καὶ ἀλὰ δὲ ὁρὶ θυμὸς: & ita legit Orib. l. 1. c. 7.
vulg. Sed Sarr. ex Ald. addit post καπρία vocē, εὐλα-
cod. ut lectio sit, ramulos Origano similes, tenuia
folia, capitula verò, &c. Matth. cōtra legēdū suspi-
catur, καπρία δὲ καὶ εὐλα ὁρὶ θυμὸς, hoc est, capita &
folia Thymi: Anguill. tandem legendum vult,
εὐλα καὶ καπρία: nos communem sequimur, quam
etiam Ruell. & Marcell. approbant.] Totum verò
lignosum, odoratū & gustu dulce est, saluamque
ciens [πύλας περικλητικόν. Sic & Plin. & Apuleius.
Et hac certè ratione ἀδύον esse crediderit Sarrac.
attamen pro iis vocibus apud Orib. legitur κα-
πρία, quæ lectio Matthiolo in prior. comm. pro-
batur, in post. tamen lectionem Dioscoridis, non
Oribasi retinet:] radice nititur longâ, tubifolia
[καπρία: εὐλα, Orib. καπρία: Plin. ruellam descri-
bit, Apuleius fuluam:] digitali ferè crassitudine.
Decoctum in aqua multa & potum, quæ pulmonibus
hærent,

hærent excrementa repurgant: sanguinem reicientibus ac nephriticis cum aqua exhibetur. Bibitur & ad dysenteriam, rubentemque fluorem muliebrem in vino decoctum, vti ad conuulsa, ruptaque cum aceto mulso. Quin & commandacatum situm sedat: faucibus asperis subuenit, illitum recentia vulnera glutinat, & enterocelas cohibet. Quin & carnes, dum coquuntur, conglutinat additum.

*Symphytum
petraeum cō-
tineat Gal-
enus*

Symphytum petraeum ex contrariis constare viribus lib. 8. simpl. dicit Galenus: habet siquidem siccandi vim quampiam, quā collectum in thorace pulmoneque pus expurgare potest: habetque etiam quandam contrahendi vim, quā electionibus sanguinis auxiliatur: & tertia insuper inest humiditas quædam non immodicè calida, per quam gustantibus dulce apparet, & odoratu incundum. Morsum sitim extinguit, & arteria asperitates sanat.

Hermol. coroll. 618. proponit descriptionem Symphyti petraei ex Plinio, quasi propria esset: addens Venetos Cotoneam appellare ex Plinio: rosæ radicis, alibi albae, alibi nigrae. Hic notandum Hermolaum in prima edic. Ital. & in Coloniensi legere, rosæ, vbi Plinius noster habet raræ.

Cornarius, qui & ipse raræ legit, in comm. med. in Galeni librum 1. caput 5. τὴν κατὰ τόπον, ab ipso scriptis per Cydoniam herbari Alum & Symphytum petraeum intelligit, eò quod Plinius Cotoneam appellare Venetos Alum prodidisset.

Cæterum, Symphyti, Solidaginis & Consolidæ nomina plurimæ habent plantæ. Symphyt. petraeum Matth. Coris cærulea Monspeßulana. Coris lutea Monspeßulana. Gypsophyton. Saxifragia maior Matth. Symph. petraeum Cordi. Trachelium minus. Trachel. album. Hyslop. vulgare. Polium vulgare montanum. Sannicula. Prunella. Consol. media. Virga aurea. Centaurium. Flos Solis. Bellis maior. Symphytum magnum: Radice tuberosa. Pumilum repens. Pulmon. Italica. Coralloides. Helenium. Nicotiana. Tragus verus. Glycyrrhiza.

CORIS MONSPESSVLANA, purpurea.

CAP. LVI.

Descriptio **M**onspeßulanae Coris appellatur concinna planta, quæ ex radice crassa, lignosa, nigricante, quamplurimas per terram sparsas emittit virgulas, vt vix vtrique manu coactas omnes possis interdum complecti, palmares aut bipalmates, tenues, rubentes: per quas folia densissima, Thymi folijs quodammodò similia, sed longiora, æquabili vique latitudine, & Thymi folijs minùs nigra, summæ virgulæ spicas sustinent vncias circiter duas longas, Thymi vulgaris vel Serpylli, crassiores, confertissimis floribus stipatas, immortali purpurâ cæruleoque arideubus, hiantibus, è quatuor folijs compositis, bifidis omnibus: quibus succedunt calyces parui, in aculeos exeuntes, semen continentes paruum, nigrum: nullum ego in vlla parte plantæ, siue odorem, siue saporem manifestum sentio.

Coridis huius Monspeßulienis figuram de meis



plantis siccis Gelnero communicatam, apposuit Camerarius in Epit. capiti Symphyti petraei Matthioli, itemque apud Matth. in Hist. germ. vbi Symphytū petraeum, Consolidam petraeam, & Alū Plinii cognominat, germ. Steingünfel. Mompelliani referente Clusio Corim hanc quorundam, Gallorū

sc. & Hispanorum [sic namque is inscribit] eam esse existimabant quam Græci *ῥαδὴν τῆς πέτρας* appellant, cuius sanè descriptioni multis nouis reponderere credit.

Lobelius [qui in Obs. pag. 220. itemque Ic. Plant. p. 402. figuram Clusii habet, ac aliam ex Aduersariis] Corim suam Mompeliacam, nisi apertè quadraret, Eticam minimam putasset, aut mediz cuiusdam inter Hypericum & Augam naturæ. Iam non aliò quàm ad Corim referri arbitrat, posseque nos adducere ad Symphyti persuasionem, verùm morosis non omnia penitus quadrare videri. An autem Coris Dioscoridis sit, vt voluit Lobelius, affirmare nondum ausim, nec etiam Symphytum petraeum asseruerim.

Coridem Mompeliacam, vt Tabern. quoque inscribit, vocat germ. *Erdiffer von Mompelien*. C. Bauh. phyt. Corim 3. siue cæruleam maritimam cum Symphyto petraeo Matthioli, exceptâ radice lignosiore, optimè conuenientem. Apud Matthiolum Frater longè alterius est opinionis: ait enim Symphytum Matthioli minimè cum Coride cærulea maritima confundendum esse, siquidem Coris amara sit: flores purpureo cærulei rariùs purpurei. Coridis quin potius à Dioscoride & Plinio propositæ notas plures habere credit.

Florentem copiosè, vidi Monspelij apud littus *Locus & maris, Vere, itémque Venetiis*: C. Bauh. ad mon. Temporis Ceti radices, Maio. Floret Maio, inquit Clusius, nonnunquam etiam Martio mense, siccis quibusdam circa Salmanticam & Mompelium locis maritimis, itém Valentiniæ & Galliz Narbonensis, vbi tota maior, crassior & succulentior nascitur, vt ferè solent omnes maritimæ stirpes, si cum eis, quæ macro & arido solo proueniunt, comparentur.

GRATIOLA.

CAP. LVII.

Vertim luxuriant huius radices, pennæ anse. Descriptio rinz crassitudine, obliquè reptantes, albæ, crebris geniculis nodosæ, à quibus plurimæ demittuntur fibræ, albæ: caules plures dodrantales surgunt, teretes, propter terrâ rubentes, superius ex albedo



lex albido vire-
f. ctes, creter-
rimis genu-
lis distincti, id
quorum sin-
gula folia bina
Saponariae mi-
nora, nonnihil
in ambitu cre-
nata, nascun-
tur, & ex eorū
alis, modò sur-
culi folus Hyss-
opi minimè
crenatis dona-
t, modò flores
singulares,
stiaui, oblon-
gi, colore quā
pediculo se-
mūciali & lō-
giori commit-
tuntur subflauo, per reliqua albo. excepto folio,
ex quatuor quæ habet, supremo sursum reflexo,
quod interna parte lanuginem luteam ostendat,
insidet autem totus flos calyculo quinque parti-
to, cui bina foliola Hyssopi apposita: porro autē
pericarpium ex rotundo oblongum est, semen
continens minutum: Tota planta insigniter a-
mara est, & inodora, quadam cum obscura adstri-
ctione.

Matth. re-
prob.

Matthiolus, si Ruellium intellexisset, facilè ex
eius Gratia Dei descriptione collegisset, cum de
planta à nostra aliena, Elaphobosco scil. scribere.
Crediderunt nonnulli [inquit Commentator]
herbam hanc quæ vulgò ab aliquibus Gratiola
vocatur, ab aliis Grata Dei, quibusdam etiam, vt
à Foro iulienlibus, *Stancia cauallo*, quodd equi eius
pabulo mirè defarigetur, esse Hyssopum illud
montanum, de quo Melues in suis scriptis men-
tionem fecit. Sed ij omnium ferè iudicio, eu-
identius hallucinari sunt, quàm pluribus demon-
strare sit opus. Qui verò [cum Quercet. & Cor-
d.] Melues Eupatorium esse contendunt, omni-
nò cæcitiunt. Sed & Ruellij sententiam explō-
dendam putaperim, si per Gratiā Dei, eam plan-
tam intelligit, de qua differimus. Hæc Matth. qui
passim gratiolam vocat: Nos dicimus Ruellium
Elaphoboscum per suam Gratiā Dei intellige-
re. Et hæc occasio est, cur Amatus in Diosc. in Ita-
lia longè aliam herbam, quàm in Gallia pro graua
Dei indicari dicat.

Lymnefium
Corda.

Cordus plantam nostram Lymnesij siue Cen-
tauridis titulo describit in Hist. vbi pulchra figura
à Gesnero addita. Dodonæo videtur species Cen-
taurij minoris. Anguill. epist. 14. proponit discuti-
endum, an gratiola. Semen vomituum hodie
in Syria dictum, sit Papauer spumeum: oilbe-
nech Auicennæ eius nuncupans semen.

Gratiola

Label. in Aduers. & Obs. p. 238. itemque Ic.
Plant. pag. 415. Gesn. hort. Gerard. & Tabern. vo-
cant gratiolam, germ. wild Aurin/begde hyssope:

Gratiola
citrinoides
varietas
C. Baub.

C. Bauh. phyt. gratiolam centauroidem, varian-
tem flore purpurascēte, albo, rariis luteo: foliis
aliquando integris, frequentius tamen crenatis.
An frater hanc floris varietatem, itē, nque folio-
rum ipsemet obseruauit, suo tempore monebit.
Matth. sanè florem in purpura albicantem perhi-
bet, Dod. verò album.

Locus &
Tempus.

Ego flore subcaeruleo copiosam inueni Gene-
ræ secus viā, & in prato inter Bourdigni & Thuiri

florētem Iulio: abundantem in prato matuilleni,
& Boluilleni. Nascitur Ebroduni in locis humi-
dis, præcipuè in pratis palustribus, Iunio, Iulio &
Augusto florens. Prohienit quoque spontè vlg-
nolis & palustribus locis Germaniæ, nec non Ita-
liæ: Belgis hortensis est, eodēque tempore cum
flore reperitur.

Vires
Vius

Excalfacit, siccit, incidit, attenuat, aperit, dei-
cit, abstergit, aluum vehementer purgat, tam re-
cens, quàm sicca sumpta, bilem pituitamque ir-
ruit: vulneribus celeriter medetur, ea glutinando,
tuta & imposita, authore Matthiolo. Est autē,
vt amarissima, ita etiam temperie excalfactoria &
resiccans, eximiam simul expurgandi, cum per
superiorem, tum per inferiorem ventrem poten-
tiam obtinens, teste Dodonæo: Educit verò non
modò lentam pituitam, verum & crassam flauam
bilem. Prodest aduersus diutinos coxendicis do-
lores, & aduersus inueteratas febres, siue tertia-
nas, siue erroneas: iecur & lienem expurgat, ab
obstructionibus liberat, ventris lumbricos pellit;
putredinibus aduerfatur: Dosis maceratæ aut de-
coctæ est à drachma vna, vel una & semis, ad duas
vel amplius paulò.

Bouius ad quartanæ febris curationem mirè
extollit eius decoctum. Gesnerus Gratiolæ suc-
ci vsum in *induratis* elaterio futurum arbitratus est.
Herbæ verò trita scrupulum vnum & scrup. i. &
semis cum Rob acinorum Sambuci post horas
quinque, copiosè suprà infraque, mirè phlegma
& aquas detrahete retulit, sed non sine molestia:
Et hinc in pilulis cum Zingibere, tale gemmæ, &
Cinamomo, vt ciuīs agat, & minùs offerat
ventriculum, Gratiolam propinandam suadet.
Rulandus ad ischuriam pro potu exhibet deco-
ctum eius. Cordus affirmat eam purgare egre-
giè bilem & pituitam, nihil interanea lædentem:
quoniam horribili isto acingrato odore, quo cæ-
tera purgantia medicamēta prædita sunt, careat.
Recitat Bouius in Flagello, historiam de pane,
quo multorum alui commotio, quia fornax repur-
gatus & mundatus Gratiolæ fasciculo fuerat, & in
eo combustus. Medicis quidam haud vulgaris,
non contemnendo consilio, loco pulueris Gra-
tiolæ, eiusdēque decocti, salem extrahendum
consulit, eoque prædictis in morbis vtendum.

GRATIOLA ALPINA.

C A P. LVII.

Vix fescunciam excedit coliculus, qui singu- Descrip-
laris, supernâ parte vbi aliquot flosculi, bifi-
dus, per quem folia, duo aut tria oblōga, inferiora
latiuscula, vnciam circiter longa, sapore nullo e-
uidente, multis tenuibus fibris radicaatur. Floren- Locus &
tem inuenimus mense Iulio in monte Braulio Tempus,
Rhætorum.

TERTIÖNARIA ALIIS LYSIMACHIA galericulata.

C A P. LVIII.

EX Lysimachiarum classe, vt voluerant qui- Descriptio
dam, earum magnitudinem vix vnquam asse-
quitur, contractionibus *caulibus* breuionibusque,
quadratis, rigidulis, articulatis, in crebras alas di-
uisis: folia ad genicula ortum habent, gemina
aduersa, Betonicæ æmula, minora, perin-
de rugosa, rariis per ambitum serrata, sapo-
re insigniter amaro: ex quorum alis flores forè



Tertiana.
ex nomen
S. de adp.
1.4

coningi surre-
cto tubulo emi-
cant, ex viola-
ceo in pallidum
languentes, la-
bello punctulis
saturacionibus
pictis, galea ala-
ta fibras argen-
teas occultan-
te, ex calyculo
breui, gibbulo:
radix tenuis, ser-
pit, adeoque &
caulis ex geni-
culis demissis
fibris denudè ra-
dicari solitus.

Turnerus in-
signis Medicus
nobis coram
assumavit, Hei-
delbergæ (vnde

attulit à se ibi collectam) in officinis ob eius vi-
sum ad tertianas viurpatam, Tertionariam co-
gnom nati.

Nos eandem plinè credimus cum *Lyfimachia galericulata* Lobelii in *Icon. Plant.* p. 344. &
Obs. p. 186. de qua ait. Riuiolorum & fl. innum. ri-
pas & depressos agrorum margines Londinen-
sis & Antuerpiani agri sequitur hæc: plures e-
mittit quadratos sesquipedales & bicubitales
geniculos pediculos: in quibus folia *Lyfimachie*
propter similia, *Scordii* æmulatione atro-
virentia, ex geniculis gemina, è quibus instar ga-
lericuli flores cæruleo-purpurascentes: radice variè
diuicicata repit, vt nullidum hætenus descripta
aut depicta, sic vltu neglecta, aut incognita. Hæc
ille, qui *Lyfimachiam* suam galericulatam cæru-
leo-purpuream ad *Aduersariorum* paginam 144.
refert, licet ibi nihil penitus legatur, quod ei con-
ueniat. Huius demum *Lobelia* galericulata
Lyfimachie bini flores ex foliorum contrario
sui in cauliculis quadrangulis salientium, sinu-
bus prodeuntes, semper in anteriorem partem
propendent ad eod. æqualiter, & contigui, vt ex
eodem sinu orti videantur, quod pictor in eius
icone teste Clusio, in vnico duntaxat nodo &
geniculo obseruauit, plantam delineando.

Label not.

*Lyfim. ca-
ruleogaler.
C. Bauh.
Terzolla.
Locus &
sculpur.*

C. Bauh. phyt. vocauit *Lyfimachiam* 15. siue cæ-
ruleam. Reform. Worm. *Tertianariam*, *Terzolla-*
lam, siue *Terzollam*, *fieberfraut*.

Tertionariam obseruauimus prope Montbel-
gardum eundo *Souchaux* loco humido proue-
nientem cum *Scordio*, & florentem Iunio men-
se. Ea enim aquosis & palustribus plurimum
gaudet. Nec minus feliciter in hortum Mont-
belg. translata floruit Iunio Iulioque, vbi con-
dem septatu suo Hortulano valde odiosa facta,
difficiter extirpata fuit. C. Bauh. collegit non
longè à *Basilea Michelfeldensib.* humidis locis.
Clusius nasci ait copiosè in *Vngaria*, *Austria*, *Sti-*
ria, *Moravia*, *Bohemia*que, secundum riuos è
montibus defluentes.

CRISTA GALLI MAS ET FOEMINA.

C A P. LIX.


Descriptio.

CRista galli Herbaris dicta, duplex mihi ob-
seruata, mas radice est exili, caule pedali &
sesquipedali & recto, tenui, quadrato, inani, in

Crista galli mas



Crista Galli feminas.



ramos aliquot
diuiso, quos
aduerso sita
posita bina
semper ambiut
folia sine pedi-
culo, ad exor-
tum laticula,
sensim in mu-
cronem desi-
nentiâ, aliud
crenata, galli
cristam æmu-
lantiâ, circum
plantæ summi-
tatem magis
quàm in for-
mina albican-
tia, sapore nul-
lo insigni: in
summo ramo-
rum aut caulis,
ex foliorum a-
lis flores vnde cæ
folliculo com-
presso hirsuto-
que & lacinia-
to, è quo pro-
minent, galli-
nam glorientē
incubantem-
que exprimit:
quorum supe-
rius solum ca-
put gallinaceū
deformaculeū,
rostrum cæruleo,
in quo occul-
tantur apices
hirsui qua-
tuor, duab. la-
ciniis excauati:
inferius verò
intensius cro-
ceū in tres laci-
nias abijt stig-
matis nigris
guttatas: v-

triculi foliacei modicè protuberantes, hirsuti,
valcula continent membrana, lucida, in qui-
bus semen rotundum, compressum, sinuatum,
cum membraneo margine, colore fusco, sapore
nullo effatu digno.

Fœmina humilior est, caule minùs robusto, fo-
liis angustioribus. floribus multò minoribus,
summitatibus minùs albescentibus, verticulis gla-
bris.

Figura nostra *Fuchsinia* minùs acurata, ma-
rem potissimum exhibet: altera verò ad plantam
virentem delineata fœminam demonstrat.

C. Bauhino excepto haud dum aliquem scio,
qui *Crista galli* aut sexum, aut varietatem saltem
obseruauit. *Pedicularis* 4. siue *pratensis* lutea (in-
quit in phyt.) variat magnitudine & latitudine
foliorum: item caulium numero: altera enim est
pluribus caulibus donata & angustioribus foliis,
quæ rarior. Floribus est luteis, rariùs candidis: lo-
men nigrum aut subluteum.

Vtramque *Cristam*, marem & fœminam expri-
mere videtur *Lobelius* in *Obs.* p. 285. itémque *Le-
Plant.*

Plant. p. 529. per Cristam galli Herbariorum, de qua in Aduers. quærit, num sit Aleatorolophus Plinii? annum potius Alliaris recentiorum?

Pedicularia Tabern. in Icon. & Hist. Pedicularis lutea picturâ maris Gallinaceæ cristæ proponit. Tragus pro Pedicularia campestri secunda describit, eamque modò pecori nociuam, modò innocuam ait, non sine hallucinatione. Schvvenkf. Fistulariam luteam vocat.

Alectorolophus Ruellio (& post eum Anguill. & Tabern.) Crista gallinacea propius ad Plinianam Aleatorolophi picturam accedere videtur. Haud quoque dubitat Clusius quin Aleatorolophi genus sit ea planta, cui Cristæ gallinaceæ nomen indiderunt recentiores. Aleatorolophus, inquit Dodonæus, similior, quàm Mimulo, Crista galli nostra videtur.

Nomina lingear. Germani *Reelrodel* aut *leuskeant* nominant: Belgæ *Râelen* & *geele Râelen*, & plerique *hennecamkens*: Itali referente Anguill. *Crista di gallo* & *Centro galli*.

An porro Ruell. lib. 3. cap. 55. dicitur Cannabis rustica Herbariorum? An Cristarum genera duo in montium pratis Cæsalp.?

Locus & tempus. Exit passim in aruis, & non rarò in pratis etiam siccoribus, utrobique inanis & vitiosa; plurima ætatis parte floret, Dod. & Clusio testibus. Nos in valle Griesbachiana, ubi fontes acidi, utramq; observauimus.

Vires & Vitis. Quâ autem Crista galli facultate aut potentiâ prædita sit, nulli adhuc curæ fuit, cognoscere, cum inutiles vel Dod. dictatore habeantur. Demetrius tamen Pedicularis grammatriscibrata, tribus carnis adiectis partibus accipitri dat per quadraginta dies, ut nunquam destillatione laborer, neque gestatus, neque inclusus.

CRISTÆ GALLI AFFINIS PLANTA Romana, siue Crista galli maior Italica.

CAP. LX.

Descriptio



Geniculis per caulem ramosque hirsutos bina adnascuntur ex aduerso sita folia, Sideritidis aut Cristæ galli, longitudine fescunciali, latitudine semunciali, hirsuta in acumen desinentia, serrata, longis nervis distincta, à quibus in diuisurarum lacunas venulæ excurrunt: ex vniuscuiusque folij sinu flor exit vnus luteus, paulo recto stamina

proferens hirsutis apiculis donata, è calyce longo, vinctali serè, striato, hirsuto, per extremam oram laciniato.

Locus & Tempus. Circa Romam secus vias copiosam obseruauit L. H. Cherlerus Maio florentem, cuius ramum secum attulit.

Tom. III.

ANTIRRHINUM ALBUM SERRATO folio.

CAP. LXI.

Hæc planta, quam Antirrhinum album serrato folio vocare libuit, donec vel melius nomen occurrat, vel apud aliquem autorem eius mentionem inueniatur, vnico, recto, ad cubitum,



interdum duos alto caule assurgit, in quo folia serè ordine quo Lini disposita cernuntur, satis dura & aspera, pulchrè serrata, longa satis & angusta: flores albi serè similes sunt maiori Antirrhino, satis magni proportionè plantæ: calycibus vitoli narium æmulis succedentibus.

Montepelii in prato quodam, in quo species duæ Narcissi

nascentur, prouenit, Vere florens.

PEDICULARIS, QVIBUSDAM CRISTA galli, flore rubro, & albo.

CAP. LXII.



Habet hæc planta in florum forma aliquid cum Crista galli vulgò dicta simile: emicant enim ut in illa ex vesiculis laxis glabris, verùm non ita compressis, canalicularis, tantillū cum multo virore rubescentibus: colore sunt rubro, aut carneo, aut albo, folio superiore rostrato, apices luteos quatuor binâ cavitatē,

ut in Crista galli vulgari flaua insculptos, stilūque purpurascentem sinu suo occultante: inferiorem in tres lacinias circinatas profundè inciso: folia cum Filipendula nonnihil habent simile, at longè minora, minutiūque incisa, colore viridi, vel spadiceo, in caulibus angulosis, concavis, palmaribus, dodrantalibus & cubitalibus: radix, nonnihil amaricat, alba, rugosa, forma radices

Bbb

Petroselinum vulgè dicti, minimi digiti crassitudine vix attingens, in crassiusculas fibras diuisa. Ex summa porro radice folia exoriuntur lata, crassa, in mucronem desinentia, per ambitum serrata, ex quorum sinu reliqua folia cum caule emergunt. Sic & primogenitæ plantæ folia prima Dryopteris æmula formâ & laciniis, vt etiam aliquos fallere possit. Cæterum, *semen* fuscum, rotundum, in vasculis magnis falcatis, in rostra desinentibus.

*Pedicularis
Lob. Ped.
Alektorolophi.*

Lobel. in Icon. Plant. pag. 748. Pedicularem inscribit, in Obs. verò pag. 431. Pedicularem Alektorolophon, eam in Aduers. Pliniano Alektorolopho minùs quadrare, repetit: & inter Filipendulas, aut Millefolium reddendam censuit.

Quod porro Pediculare vocari ait, quodd facultatibus sit virosis, præis infesta, & pediculis hectis, à Dodonæo dissentit, qui hanc pediculos generare tradit. Fistulariam (inquit in Histor. frum. & Lat. in fol.) Germanorum plerique *braun Rodel*, alii *Leus kraut*, *Braun leus kraut*, Græcè *phipros*, Latine Pedicularem ab effectu nominat, quodd pecori ac iumentis, quæ in pratis ubi hanc prouenit, pascuntur, pediculorum copiam gignat: Belgæ *Roode Ratelen* appellant: Et hæc Dod. qui in Hist. gall. Alektorolophon inscripsit, ac gallicè *l'herbe aux pouls* appellauit.

*Pedicularis
campestris
Trago.*

Tragus Pediculariæ campestris titulo pinxit, ac prioris cognomento delineauit: H. Lugd. pag. 1074. Cristæ galli alterius, seu Phthirii. Gesn. in descr. mont. Fraet. lib. de Lunar. Pediculariam Tragi vocauit. Clusius in Hist. post. Alektorolophon 3. & tertii genus alterum inscribit, ac Fistulariam à caulis cavitare vocari opinatur. Casp. Bauhin. Pedicularia 1. siue præensis purpurea.

*Locus &
Tempus.*

Generæ flore albo sed crebrius purpureo obseruauit, pedalem, altiore & ramosam, florentem Maio iuxta *Arue*. Prouenit quoque in Michelsfelden, inter Montbelgardum & Basileam aliquibus in locis, in valle Griesbach & aliis pluribus locis aquosis circa Montbelgardum, semine maturo Iunio. Nascitur, inquit Dodonæus, in vlginosis pratis: herba non solum parum utilis, sed & noxia, ac pratorum ipsorum vitium: Maio ac Iunio mensibus cum flore ac valvulis reperitur.

*Vires
Vfus.*

Creditur, eodem Dod. referente, ad fistulas & sinuosa vlcera utilis esse, nec non menses & aliunde profluentem sanguinem, in vino austero decocta potaque sistere. Quis autem Medicus propter virosam facultatem intus sumendâ præsentibus suauioribus medicamentis suaderet.

PEDICVLARIS MAIOR DA- lechampi.

Descriptio

Plantam siccam ab ipso Dalechampio habemus, quam sic descripsit. Filipendulæ Alpinae affinis est: *radice* foris nigra, Napi modo gracilesciente, rugosa, nonnihil surculosa: *caule* ferme cubitali, virgato, vnico: *foliis* Filicis in longo pediculo, ordine collocatis, per ambitum crenatis, exeunte per caulem alternatim vnoquoque foliorum pediculo: *flore* pallido, spicatum in summo caule congesto: *semine* copioso, in latis corticosis vasculis concluso, Alyssi modo.

*Pedicularis
maior alpina.*

Inscribitur apud H. Lugd. pag. 1138. Pedicularis maior Alpina: apud C. Bauh. in phyt. Pedicularis 2. siue Alpina maior folio Filicis. An Alektorolophi alterum genus Clusio.



PEDICVLARIS BVLBOSA.



An est Clusio in Pannon. pag. 707. & Hist. post. Alektorolophi primi alterum genus? de hoc mox capit. de Pedicularibulbosa.

Locus.

In vertice montis Aurei Gergobiz Aruernorū propinqui gignitur Dalechampio perhibente. Nemauso misit Cherlerus C. Bauhino.

Descriptio

Complures *caules*, pedales, concauos, in quorum cacumine *flores* multi aceruatim cōgesti, cucullati, Pedicularis, maiores: *folia* palmariibus nixa pediculis, pinnata, Filipendulæ diuisurâ, statim ex radice prodeunt, qualia per caules, pauca, præterquam in summitate ubi *florum* spica incipit,

quo loco satis sunt frequentia: *radices* capillariibus fibris intertextæ, multæ, principio angusto, sensim extuberantes, multam Filipendulæ radicibus cedentes: vestigia veterum caulium demonstrant non esse annuam stirpem.

Lobel. lc. plant. pag. 730. Oenanthe siue Filipendula altera montana.

H. autem Lugd. huius plantæ duas & descriptiones & figuras dedisse credimus. Et earum quidem primam p. 784. pro Oenante siue Filipendula altera montana Penæ: Alteram p. 786. pro Oenante alia Myconi, quam Filipendulæ genus esse iudicat ex foliorum & radicum similitudine, eodemque sapore.

Clusio Alektorolophus Alpinus maior siue 1. An Gesnero Herba foliis Aspleno similis?

In altissimorum montium verticibus vt Norbonæ ad Veganium: in Dei paradyso vocato Calcar contermino eruta à Lobelio. Iulio florentem in Gothardo euulsit gener Cherlerus. Clusius vtrumque genus in summis Alpibus Durrenstein, Etlicher, aliisque celsis & herbosis iugis nasci obseruauit: posterius etiam in inferioribus vlginosisque pratis. Meminit & in Flandriæ pratis humidioribus, etiam Gentilly pago vicinis, non procul Lutetiâ Parisiorum.

*Locus &
Tempus.*

PEDICVLARIS

PEDICULARIS ALPINA FLORE
luteo, radice nigra.

Descriptio



Hæret radi-
ce crassâ,
nigrâ, multitudine,
folia ex radice
profert longo
pediculo nixa,
quæ foliolis
multis constant,
toto ambitu mi-
nutissime inci-
sis, ex aduerso
sitis, ut in Fili-
pendula, quæ
causa nominis
fuit: *caulis* pe-
de altior flores
luteos spicatim
ferè congestos
in vertice susti-
net, quibus di-
latis vascula
succedunt ob-

longa, Anthirini oculis similia, minuto semine
plena.

Apud Hist. Lugdunensem pag. 1158. Filipen-
dulæ Alpina titulo habetur. C. Bauh. phyt. Oe-
nanthe 11. siue Filipendulæ similem alpinam lu-
team cognominat.

Locus

Eam gignit summa Alpium iuga, pascuis pra-
tis, & vberissimo forni prouentu greges innume-
ros atque armenta saginantia, indeque rusticos
distantia.

MELAMPYRUM VETERIBVS ET
in genere.

CAP. LIII.

DE Melampyro veteres obiter duntaxat &
obscurè nimis egerunt. In genere Frumē-
torum (inquit Theophr. lib. 8. cap. 5.) Siculum
satis purum, & præcipuè Agrigentinum siue Lo-
lio exit. Siculo autem, quod priuatim Melam-
pyrum vocant, proprium datur, quod innocuum
sit, nec sicut Lolium graue & capitis dolores fa-
ciens: Idem c. 8. Lolium ex Tritico & Hordeo
corruptis nascitur: Vel si id minus, nasci quidem
inter Triticum solitum esse, nulli dubio est: ut et-
iam Ponticum illud, Triticum atrum [*μαλάντρο-
ν*] cognominatum.

Sed & Galenus simile quid de Melampyro
memoriæ prodidit, ita ut à Theophrasto sua mu-
tuasse deprehendatur. Sic namque Alim. 2. ait:
Ex Tritici mutatione nascitur Melampyron, ut ex
melino nigrum fiat, & tamen tale, multò minùs
malignitatis quàm folium habeat. Item Alim.
2. cap. vlt. Melampyron dictam, sit ex mutatio-
ne Frumenti, sed prauitate quàm plurimùm à
Lolio relinquatur.

Acquisitio

A Melampyro hoc Theophrasti & Galeni di-
uersum dicimus Melampyrum quorūdam, quod
Dioscorides Myagrum appellauit. Sed fortè illo
loco cum Paulo legendum Melampycon. Me-
lampyron etiam de quo hîc agimus, Stelephoros
Plinij quibusdam esse videtur lib. 21. cap. 16. A-
liis eiusdem Alopecuros lib. 21. cap. 17. sed malè,
Tom. III.

referente etiam Casp. Bauhino. Hic autem eius
Aëram lib. 18. cap. 17. esse credit, quamuis hoc no-
men Lolio melius fortè tribuatur. Melampyrum
multis hodie videtur esse Triticum vaccinum, de
quo iam iam sermo instituendus.

MELAMPYRUM MULTIS, SIVE
Triticum vaccinum.



Lignosa est Descriptio
& exigua
radiculâ, ali-
quot consimili-
bus fibris do-
natâ: ex qua
surgit *caulis* lin-
gularis, quadra-
tus, hirsutus,
purpurascens,
multis alis con-
cauus: *folia* ex
intervallis, ex
aduerso posita,
Linariæ alia, a-
lia lata & pro-
fundè laciniata,
aspera, atro-vi-
rentia, at quæ
in supremo
thyso tûr, cre-
briora exstant,

brevia, latiora, digitata, hilari purpurâ tincta:
ex quorum alis galeati *flores* exunt subhirsuti,
callide purpurâ, labello luteo rubore confuso,
ceruice penitus luteâ, reliquo rubulo purpura-
scente: quibus succedunt in capsella oblonga
turgida, tegmine membraneo in aristas desinen-
te breuiusculas obuolutâ, *semina* duo aut tria tri-
ticea minora, nigriora.

Triticum vaccinum siue bouinum flore pur-
pureo, candido interdum, sed rarissimè, conspi-
ciendum se præbere legitur apud Tragum, qui
narrat semina purpureo colore tincta, Tritico,
vel Speltæ admixta (quod apud Mediomartices,
frequenter solet) panem reddere purpureum. a-
gricolæ verò *kurvenzen* à semine Triticum re-
ferente, vocare: quomodo verò in Dioscoride
appellatur, sibi non constare.

Gesl. decoll. stirp. Triticum vaccinum à Tra-
go descriptum inutile perhibet Medicinæ, vocat-
que Vitium Tritici, germ. Brand: non de unt ta-
men qui *Bräurfleischblumen* & *Mohren wurzen*
appellent: Belg. *Peertz bloemen*: Galli *Blé noir*,
Blé de vache, *Blé de bœuf* & *ronge herbe*, Arabi-
tib. h. e. Herba rubra, à comæ colore.

Triticum vaccinum vocat Dodon. gall. lib. 2.
cap. 14. eius figuram quoque habenti lib. 4. cap.
16. Melampyri titulo, & lat. de frum. & in fol. &
Hist. Lugd. p. 419. itemque Cordus. Melampy-
rum Lob. in Adu. Obs. p. 23. & Ic. Plant. p. 37.
ac etiam Tabern. Melampyrum 2. siue purpu-
rascens comâ, Melampyron Galeni & Theophr.

ac etiam Aeram Plinii, Casp. Bauh. in phyt. Me-
lampyram Belgarum & *καλίσκος* Plinii Lobel. in
Aduers. dicens: Melampyrum Dodonæi cogno-
minauit Camer. hort. & Thalius, qui varias pal-
sim eius obstruari species prodidit. Quas eo non
nominato ex eo sic recenset C. Bauh. Variat varietas
floris colore, flos enim infertè candidus, super-
Thal.

Bbb 2

nè luteus: sic ex albo viridique mixtis: item floribus luteis, in summo albicantibus: sic infernè puniceus, supernè luteus, foliis minoribus, & eadē flos infernè superneque puniceus, medio candicans, foliisque laciniatis.

Clus. in Pannon. p. 603. appellauit Parietariam siluestrem purpurantē comā: In Hist. post. Parietariam silv. tertiam. Quo autem nomine veteri donari debeat, se ignorare fateatur. Trifolium maius dicitur Brunfels. tom. 1. Rhapf. 14. pag. 47. Et tom. 2. Rhapf. 16. pag. 59. *Braunfelschium*, quam vocem Casp. Bauh. Trifolium purpureum reddidit, quam rectè tu videris. Schvvenckf. Melampyrum purpureum, & Parietaria silv. comā dilutè rubescente, Germ. *Vuachel vneuzen*.

Locus & Tempus. Genes, & Montbelgardi, ac in Alsatia inter segetes prouenit, læto potissimum, pingui, ac resistibili agro, cum frugibus florens & ad maturitatem perueniens in omnibus ferè provinciis: negligi mauius quàm in hortis coli. Si tamen alicubi expectatur ob floris elegantiam, Autumno seti necesse fuerit: annua est planta, quæ maturo semine perire solet.

Vires & Vitas. Nullum quod sciamus in medicina vsum obtinuit, sed plerumque negligi solet. Scribit Clusius eam in Occidentali Frisia seu Flandria parte [ubi copiosissimam ait] panem vitare & acriorem reddere: quinimò eos, qui eo vescuntur, plerumque capitis grauedine tentari solere, non secus ac si Lolio victitassent. Ego semine huius læpius quidem panem tinctum obseruari, sed nullum prauum saporem ei adferre ceprehendi, nec insalubriorem à rusticis idèd haberi animaduerti, nec eam vllò modo separare student. Quin & Tabern. qui admodum, sapidum panem ait, se sine vllò nocumento sæpè comedisse testatur. Gratus pastus bobus & vaccis saginandis, ut non incongruè forsan Pabulum bonum aut vaccinum quis nuncupare posset.

MELAMPYRO AFFINIS. PARIETARIA caerulea quorundam.

Descriptio



pediculum laciniatorum, mollique lanugine pubescentium, coloris purpurei, nunc dilutioris, modò saturatioris elegantissimi & violacei: inter quæ bini semper inter se oppositi flores nas-

Quæran-
gulo as-
furgit canē, pe-
dali, nodoso,
villis quibusdā
birto: in quo
alternatim ad
nodos bina sæ-
per ex aduerso
nascuntur lon-
ga folia, secun-
dum pediculū
lata, & sensim
in mucronem
desinentia, ali-
quantulum vil-
losa: summus
caulis & rami
desinunt in fo-
iorum comam
superioribus
minorum, ad

cuntur, longiores, concavi, aliquantulum hian-
tes, superiore labro nonnihil reflexo & villoso,
inferiore latiusculo & deorsum propendente, co-
loris ibitidè lutei, deinde omninò aurei, omnes
tamen, licet alternis contrario situ nascentes
antrorsum expositi & spectantes, quod pictor
in hac Clusii icone delineanda tunc non obserua-
uit: *radix* candicans, quam subsequens Hiems
corrupt.

Clus. in Pannon. vocat Parietariam siluestrem primam caeruleā comā: In Hist. post. Parietariam siluestrem (quorundam, addit ad descr.) primam.

Camer. hort. Parietariam siluestrem vulgò vo-
cari, quod miratur Clusius, refert, elegantissimam
herbam hanc, foliorum comā caeruleā, vel dilutè
rubescente, vel penitus candidā: flosculis quā
parte suo conceptaculo tenentur, sanguineis,
priore verò flauis.

C. Bauh. phyt. nominat Melampyrum 2. siue
caeruleā comā, Parietariam Lipsienfium Tragi.
An verò sit Parietaria tertia Tragi, quā à Lip-
sienfibus Medicis veram Parietariam existimari
tradit, dubitamus.

Schvvenckf. Melampyrum purpuro-viola-
ceum, Triticum vaccinū 2. *Blaugeel tag vnd nacht*,
& *Ringelscheis* vulgò corruptè, cum potius dicen-
dum *Rinder vuer*.

Aggrius obrulit in Austriae pratis collectam
nomine Parietariae silv. comā caeruleā. In Silesia
siluis & aggeribus montosis Iunio & Iulio fre-
quens. Crescit etiam in Hungaria, Austria, Mo-
rauiæ, Bohemiæ, ac quoque Germaniæ sepibus &
silvarum marginibus, vmbrosisque locis. Ob
insignem elegantiam & colorum varietatē hor-
tis inferendam censet Camerarius, sed locis fruti-
cosis, & circa sepes. Non vult enim in arvis coli.
Semen maturè colligendum, antequam exiliat è
vasculis & statim reddendum telluri, ut spontè
excidat. Nudum enim si contrahatur forscundi-
tatem perdere existimatur.

Quidam vulnera sanare & liuores discutere Vires &
arbitrantur. Sapore est subdulci, & nonnihil acri, Vitis
simulque astrictionis alicuius particeps.

MELAMPYRVM CRISTATVM FLORE albo & purpureo.



Tortuosā Descriptio
nititur ra-
dice, parum altè
demissā, ligno-
sa, aliàs simplici
aliàs apophysi-
bus adnatis
multifida: cau-
lis singularis,
pedalis & pro-
cerior, aliàs re-
res, aliàs angu-
losus, potissi-
mum parte su-
periore, in ra-
mos plurimum
aduersos, in-
quali interdum
orto, diuisa fo-
lia plerumque
opposita læ-
pè incondita, oblonga, angusta, acu-

minata, Melampyri vulgaris: flores hiantes, eiusdem floribus respondent, coloris vel albi cum rictu luteo, vel purpurei, quos complectitur duo folia latiuscula, figurâ Lunæ falcata, arcu minutis denticellis concinnè crenato cristatâque.

An Melampyrum 4. siue luteum angustifolium Casp. Bauhini in phyt.

pyr. luteū Illud, cui flos albus cum rictu luteo, Julio men-

se florens inueni inter Scherndorff & fluuium C. B. Loc. & Fals. versus Forndorff. Alterum eodem mens Tempus florens inter Balneum admirabile & Nurtin-

MELAMPYRVM SYLVATICVM

flore luteo, siue Saturea lutea siluestris.

Descript.

Melampyri vulgationis segetum radices habet, strigosius plerumque, coliculis dodiatibus, & cubitalibus, quadratis, subhirsutis, iu frequentes ramos coniugatum diuisis: folia geniculis adnectuntur bina opposita, atro-purpureo colore maculosa, interdum columm lata, interdum duplò latiora, vncias duas plùs minùs longa (ingrati & aliquantùm acris saporis, Clus.) quorum quæ suprema floribus apposita sunt, vulgationis Melampyri segetum modo laciniata existunt: cæterùm tubuli formâ flores hiantes alterius Melampyri, toti lutei sunt, conspectiores, bini & in vnam ferè partem vergentes: quib. compressa succedunt rastro adunco pericarpia, semina tria, alterius non dissimilia, oblonga, comprehendentia. In hac planta obseruauit interdum colorem cæruleum, vel dilutè rubentem.

In Cratægoni Lobelij figura, quæ extat in Obl. p. 22. in Icon. verd Plant. pag. 36. flores requiruntur.

Clus. in Pannon. dicitur Parietaria silu. flore luteo: In Hist. post. Parietaria silu. (quorundam, addit. in marg.) secunda, Cratægonum:

C. Bauh. phyt. Melampyrum 3. siue luteum latifolium, Cratægonum Dioscoridis. Schvvenckf. Melampyron luteum, Triticum vaccinum 3. flore nonnunquam candido, sapore acri ac vehementi: vvidtag vnde Nacht.

H. Lugdun. huius plantæ, ni multùm fallimur, duas descriptiones habet & duas figuras: Cratægoni scil. 420. & Satureæ luteæ Dalechampij p. 899. Et Hylsopi nemorensis & luteæ p. 936. descriptionem tertiam sine figura: quod etiam animaduertit Frater: qui tamen etiam perperam apud Matthiolum duas figuras solo colore differentes tradit. Nec placet apud Tabern. in Icon. itémque Hist. Milij siluatici, siue Allinæ siluaricæ (huius sc. plantæ) duas poni figuras, colore tantùm distinctas.

Crescit in sepibus, & siluarum marginibus, vmbrosisque locis Vngariæ, Austriæ, Moraviæ, Bohemiæ, atque etiam Germaniæ: floret Maio & Iunio, annua planta, Clusio. In siluosis collibus & dumetis, vmbrosis, Norbonæ, Angliæ, & Sabaudiæ, Pedemontisque passim multâ ætate fruticantem obseruauit Lobelius. Abundat circa Montbelgardum in siluis: Genæ in colle la Bastie floret Iunio, & Tiguri, ac Basileæ in segetibus.

Milium vaccinum censuit calidum vsque ad 4. gradū Tabern. Quæ si hoc temperamento pollet, existimarim haud temerè eam vsurpandam.

Tom. III.

Semen in folliculo exiguo Milio non dispari, cuius odor & sapor acre nonnihil restantur, vti & folia siccata. Ac tamen ortum in loco lacunoso & hiantes, tamen semen in pollinem pulchrè ductum, esse Veneris inceptiuum, & seminis genitalis quasi fermentum quoddam & cotem non abs re retur Lobelius.

PERISTEREON, VERBENA, EI Hierobotane, siue Herba sacra ex veteribus & in genere.

CAP. LXIV.

Quamuis *ἑρπύριον*, h. e. Verbenaca recta, & Descript. *ἑρπύριον*, h. e. Herba sacra, seu Verbena supina, passim ab auctoribus, figurâ, viribus, & nomenclaturâ discernatur, tamen quia Plinius diuersum videtur innuere, & breuitatis studio vtramque vnâ inuoluere, visum nobis fuit ambas vno capite comprehendere. Verbenaca recta (*ἑρπύριον*) in aquosis nascitur: nomen autem grecum ex eo doxisse videtur, quod libenter circa eam [*ἑρπύριον* & *ἑρπύριον* pro quib. vet. *ἑρπύριον* & *ἑρπύριον*] columbæ commoentur. Herba est palmi altitudine, aut etiam maior, foliis incisis, subalbidis, è caule prodeuntibus: singulari plerumque ramo [*μονὴ ἑρπύριος τὸ πᾶν*. Vet. *μονὴ ἑρπύριος*.] & radice vnica reperitur. Folia cum Rosaceo, aut adipe suillo recenti subdita, vulgè dolorè adimere creduntur. Ipsa quoque herba imposita cum aceto etylipelata reptimur, putridaque vlcerâ cohibet: vulnera etiamnum glutinat, veterâque cum melle ad cicatricem perducit, auctore Dioscoride.

Sunt autem qui Peristereona rectum, qui Peristerion, qui Trigonion, qui Bunion, qui Sacram herbam, qui Philtradorem vocet: Egyptij Pempsempse: Magi Iunonis lacrymam, siue Mustulæ sanguinem, aut Mercurij itidem sanguinem: Romani Cristam gallinaceam, Feriam, Trixalim, Exuperam, & Herbam sagminalem.

Sed & Herba sacra [*ἑρπύριον*] quam etiam nonnulli Peristereona vocant, ramulos emittit cubitales, aut etiam maiores & angulosos, circa quos folia sunt ex interuallis, quernis similia, sed angustiora, minorâque [*καὶ ἑρπύριον* vet. caret] diuisuris incisa per ambitum, & colore aliquatenus glauco: radicem longiusculam & gracilem, flores purpureos ac tenues. Huius folia cum radice ex vino, illitave, aduersus serpentes [*πρὸς ἑρπύριον*. Lac. Dio. sc. Dio. di. uersa.] legit ex antiq. exempl. *πρὸς ἑρπύριον καὶ ἑρπύριον*. Pollent: eadem illa [*ἑρπύριον*] contra morbum regium drachmæ vnus pondere ex vini veteris & calidi hemina vna quaternis diebus ieiuno ventriculo bibuntur. Sed & œdemata diuturna, inflammationesque imposita mitigant, sordidaque vlcera purgant. Tota verd herba in vino decocta, constillarum crustas abrupit, & oris nomas gargarizatu cohibet. Aiunt si aquâ spargatur trichinium, quâ maduerit, lætiores, hilarioresque cōuiuas fieri. Datur & potandum tertianâ laborantibus, tertium à tertia geniculum vnâ cum foliis circumdantibus, vti & quartanâ, quartum. Cæterùm [vet. caret sequentib.] Sacram herbam idè vocant, quod in expiationibus sit ad amuleta perutilis.

Potèd capitū huic, de Hierobotane [*ἑρπύριον* Capiti] Goupili vterque codex hūc titulum, *ἑρπύριον* habet: Antiquus, verd manu scriptus codex *ἑρπύριον* legit. Sunt etiam qui Peristè-

Bbb j

reona supinum nominent inter nothas appellationes: sunt qui & Erigenion, qui Chamæleucon, qui Sideritum, qui Curitum, qui Persephonion, qui Iouis Colum, qui Dichtomon, qui Callesim, qui Ciparission, & qui Demetriada appellant: Ægyptii Pemphthemphtham, Pythagoras Erysisceptrum, Romani Cinnamulem herbam dicunt.

*Sagmina-
lin.*

Sagminalis appellationis [quæ vox inter supposititia Dioscoridis habetur] ratio, ex Plinio manifestè declaratur, ubi lib. 22. cap. 2. ita legitur. Sagmina in remediis publicis fuere, & in sacris, legationibusque Verbenæ. Certo utroque nomine idem significatur, hoc est, gramen ex arce cum sua terra euulsam: ac semper & legati cum ad hostes clarigatumque mitterentur, id est, res raptas clarè repetitum, vnus utique Verbenarius vocabatur. Nulla tamen (pergit idem lib. 25. c. 9.) Romanæ nobilitatis plus habet, quàm Hierobotane. Aliqui Peristereon, nostri Verbenacam vocant. Hæc est, quam legatos ferre ad hostes indicauimus. Hæc Iouis mensa vertitur, domus purgantur, lustranturque. Genera eius duo sunt: foliosa, quam feminam putant: mas, rarioribus foliis. Ramuli utriusque plures, tenues, cubitales, angulosi. Folia minora, quàm Quercus, angustioraque, diuisuris maioribus, flos glaucus, radix longa, tenuis. Nascitur vbiq; in planis aquosis. Quidam non distinguunt, sed vnum omninò genus faciunt, quoniam eosdem effectus habeat. Vtraque sortiuntur Galli, & præcinent responsa. Sed Magi utique circa hanc insanunt. Hæc perunctos impetrare quæ velint, febres abigere, amicitias conciliare, nullique non morbo mederi, Colligi circa canis ortum debere, ita vt ne Luna aut Sol conspiciat, fauis antè & melle terræ ad piamentum datis. Circumscriptâ ferro effodi sinistra manu, & in sublime tolli. Siccare in umbra, separatim folia, caulem, radicem. Aiuntque, si aquâ spargatur triclinium, quâ maduerit, letiores conuictus fieri. Aduersus serpentes conteritur ex vino. Idem & hæc sparsim habet. Verbenaca cum Plantagine, in collo suspensa, comprimere dicitur strumas. Insanabilis Podagræ non est credendus morbus: quippe quoniam & spontè desit, & in pluribus curâ. Medetur Verbenaca cum axungia trita, & illita: aut si pedes macerentur in eius decocto. Iumentorum febribus in vino medetur: sed in tertianis à terriogiculo incisa, quartanis à quarto. Fasciculo manûs plenè decocta in aqua ad dimidias, hydropicos sanat. Morbo regio dysentericæ & calculis confert. Tandem radix eius ex aqua pota, ad omnia in partu & ex partu mala præstantissima est.

Galenus. Peristereona non modò ædemata antiqua & tumores sistere, & mitigare, sed & consilium crustas abrumpere & exsiccare, nimirum calfaciente vi, quâ etiam capitis dolores chronicos discutere ait, ex frigidityte & crassis humoribus ortos, tradidit Galen. 2. de comp. med. sec. loca, his verbis: Omnium verò maximè discutit & perfectè corroborat Verbenaca recta [ῥιζὴν ῥιζὴν] maximè viridis, imò & arida cum radicibus & simul cum Serpillo oleo incocta. Idem de simpl. Peristereon nominatus est, quod columbæ in ipsa versentur. Vim habet in tantum resiccantem, vt vulnera glutinet.

Verbenacæ, quæ & ultimâ detractâ syllabâ nunc communiter Verbena dicitur, inquit Humelbergius, historiam satis succinctè tradit A-

puleius. Quare copiosius de illa dicendum, præsertim quia nulla in toto herbarum censu Romanæ nobilitatis plus habet, vtpote quæ vna auctoribus Romani imperii, conditoribusque immensum quiddam dedit. Sunt autem duo ipsius genera, diuersis tamen notis, ceu fosiùs iudicatum antè est, discretâ. Græci, vt Dioscorides, quem sequutus Apuleius, à plantæ habitu illam in rectam & supinam diuidentes, de iisdem diuersis capitibus agunt, qui mos & circa alias herbas non infrequens est Apuleio. Capite enim tertio sub Hieras botanæ & Verbenacæ nomine de supina cognominata agit: de recta verò dicta cap. 65. sub Peristerei titulo. Plinius porò cum Latinis in marem & sceminam distinxit. Ceterum quod nominis rationem concernit, Verbenaca dicta est, quod sola & per se verbenas faceret. Præterea quæ illi adiecta sunt specierum discrimina, supina & recta, hanc rationem habent. Hæc quod recto caule rigearilla quod humilioribus, & deiectis in terram ramulis quasi iaceat. Adduntur autem ambabus per tempora & ex aliis causis alie ab aliis gentibus appellationes. Hiera botanæ, id est, Sacra herba, enim vocatur autore Dioscoride, quod in lustrationibus suspensa, alligatæ, felicem habeat usum: Vel autore Plinio, quod ad Iouis mensam vertendam, præparandamque ad sacrificium adhiberetur. Peristereona hyption, hoc est, Columbina supina quoque nuncupatur: ὑπὸς enim Græcè idem est, quod supinus Latine: ὑπὸς ὑπὸς verò Columba, à qua tum apud Latinos, tum apud Græcos nomen adepta est, eò quod, vt Apuleius ait, columbis esca sit admodum iucunda & familiaris: seu vt Dioscorides dicit, quod columbæ inter eam versentur. Plinius id nec ad cibum, nec ad conuersionem refert, sed simpliciter columbis familiarem esse ait, ideoque nomen id indeptâ. Dioscoride verò dicta quasi Iouis Columbus. ἰουὶς enim idem est quod Iouis: & ἰουὶς colus dicitur. Vocata est etiam Panchromon, quasi tota speciosa & nitida: πᾶν enim Gr. omne & totum significat: χρῶμα verò eiusdem color est & nior. Colletis dicitur quasi conglutinatrix ab effectu, quia vulnerum sit conglutinatio, à verbo κολλῶ, q. e. conglutino. Aristereon appellata est quasi glutinata vulnera firmans ac solidans, à verbo στερεῶ, quod est, firmo ac solido, & à dictione ἄρ, quæ quamuis per se nihil significet, in compositione tamen aliis dictionibus addita, illis augmentum addit, & valde significat. Cyparissos dicta est, quod folia illi sunt per ambitum secta, quemadmodum in Cyparisso. Demetrian, hoc est, Cerealem nonnulli appellant: Δημήτριον, id est, Demeter, enim Ceres est, à qua & nomen inuenit, quod vt Ceres inuento frumento & traditis legibus homines feros cicurauit, & mitiores ciuilioresque reddidit: ita, ceu Magorum vanitas perhibet, & Plinius refert, hæc perunctos amicitias conciliare, nullique non morbo mederi, & si aqua eius spargatur in triclinium, latiores conuiuas fieri creditum esse. Siue quod in agro iuxta fruges quas Ceres inuenit, ac etiam quarum Dea habita est, lubens etiam ac frequens nascitur. Æsclepij nomen ab Æsculapio vetustissimo medicinæ inventore, ac plurimorum valetudini hominum viliū autore, adinuenit, propter multiplicem usum & virtutem. Sic & Alceæ, id est, Medicæ, & contra morborum iniurias validam & efficacem auxiliatricem

hiatricem dixerunt, *ἄλκιμος* enim vis est & efficacia, auxilium & remedium: unde & hæc herba præ aliis nomen hoc sibi asciuit. Erysiſceptron appellata est à calathis & virgis. Nam Græci *ἑρυσίσκετρον* calathum vocant & sportam: *ἐρύσις* verò sceptrum & virgam. Sicque dicta est, ed quod caulis & virgæ ipsius virides lentore suo in calathos, sportas, tegetes, & id genus alia, texti & in nexus circumagi possint, quemadmodum & Cyperus & Aspalathus [quib. Erysiſceptri nomē etiam commune & peculiare est] & Tilix & vtilia alia texēdis calathis, & corbibus, flicellisque sunt idonea. Quæ ratio etiam fecit ut Licinia dicta sit Latinis, à verbo Licio, quod est implere, vel à nomine Licium, quod est filum, quo textrices stamen in tela implicant. Nisi Lucinia legere, quis mauerit, ed quod oculorum luci & visui proſit, à Lucina quæ Iuno est. Heras dacryon, i. e. Iunonis lachrymam sunt qui nuncupent. *Ἡρα*, i. e. Hera enim Iuno dicitur; *δάκρυον* verò lacryma: sicque fortassis dici potuit, quod oculos & visum iuuet, illorumque illachrymationibus destillationibusque proſit. Iuno enim à iuuando dicta est, & quia oculis lucique præest, Lucina vocata est. Lustrago dicitur, quod lustrationibus adhiberetur. Nam, quod Plinius testatur, hac domus purgabantur, lustrabanturque. Lustrare autem expiare, purgare & purificare est, sic dictum à luendo, i. e. soluendo & liberando. Et inde lustratio, i. e. expiatio, purgatio, solutio; & liberatio purificationisque. Militaris vocata est, quod hæc coronari faciales ad hostes legati mitterentur ad bellum indicendum, pacem componendam, clarigatumque repetendum. Sive quod herbæ Achilleæ, quæ Militaris etiam appellatur foliorum formâ sit aliquo modo similis. Verripedium dicta est, quod virgis eius domus & paupercula verterentur, purgarenturque. Verrere enim trahere est & mundare, quod sordes trahendo mudentur: Pedum verò pastoralis baculus est & virga. Crista gallinacea nuncupata est, quod folia illa sint serrata & incisuris diuisa, ceu cristatus galli apex. Trygonion, i. e. Turturina, quasi Columbina, à torture, quæ græcè *τρυγών* dicitur, è genere columbino, dicta est, & eadem ratione quâ Peristereos & Columbina, utpote quod turtures sicut & columbæ libenter inter eam versentur, aut ipsâ vescantur. Chamelygos dicta est à caulis & virgarum ramulorumque in terram deiectione, & eorundem ad ligandum aptitudine, de qua in Erysiſceptri nomine iam dictum est: *χαμῆος* siquidem humile & humi depressum; *λύγος* verò vimen significat. Dicta etiam est Sideritis, hoc est, Ferraria, à foliorum forma & similitudine quadam cum Sideritide herba, cui peculiare & proprium hoc nomen est. Sive à ferro, quod Græcis *σίδηρος* est, quod glutinandis vulneribus ferro factis in bello vsum præberet, unde etiam teutonice *Isenkrant*, h. e. Ferraria nuncupata videtur. Ad eundem modum & Curitis, quasi Hastatis, ab hasta, quæ Sabi norum linguâ curis vocatur, appellari potuit. Humelbergius tamen nomen hoc inuenisse narrat ab eo, quod quemadmodum olim hasta, quam sceptrum Græci dixerunt, regij fastigij insigne diadematis loco fuit: sic etiam herba hæc, quæ muleum laudis ac plurimum Romanæ nobilitatis habuit, & quâ semper legati ad hostes missi coronabantur & ornabantur. Nominata est & Phersephonion ab infernali numine Proserpina, quæ græcè Phersephone dicitur. Nominis autem causa est, quod cōtra ipsius veneficiorū maleficia

Tom. III.

vim habeat & amuletum sit. Credebatur enim antiquitus Phersephone pueris & aliis veneficiis suis nocere. Herbam sagminalem dixerunt, quod intersagina primum hæc honorem haberet. Et hæc de nomenclaturis Hieras botanes, h. e. Herbæ sacræ, siue Verbenæ supinæ.

Peristereon oithion, i. e. Columbina recta, etiâ Trigonion, quasi Turturina nuncupatur, quorum nominum, ut & Hieras botanes, Heras dacryos, Cristæ gallinacæ, Columbina & Ferraria, ratio reddita est iam antè. Alij etiam Herculaniæ, Ægyptij Thio; herges, Hamagales alijs, i. e. sanguinem mustelæ, alijs Hama hermu, h. e. sanguinem Mercurij, Punico Zimicum, alijs Azirgozol vocarunt: nonnulli Bunion, si non potius legendum sit Bomion, à dictione *βῆμος*, quæ aram significat, cuius nominis ratio fuisse potuit, quod herba hac Iouis mensa & ara ad sacrificiū verbebat. Philtradores appellata quoque est, quoniam lustrationibus adhibebatur feliciter, & philtis amolendis erat accommoda. Exupera matricalis etiâ dicitur. Exupera quidem, quod omnes alias dignitate antecellat. Nulla enim quæ Romanæ nobilitatis plus habeat quàm ista: Matricalis autem quod muliebrium locorum & matricis indolentiam faciat apposita: siue ad discrimen Heracleæ Sideritidis, quæ Exupera etiam dicitur, sed cum adiuncto matricalis, ut Apuleius tradit c. 72. cui & hæc nonnihil folio assimilatur: quæ ratio & causa etiam fuit, ut Herculinea sit dicta. Plura nomina inter Dioscoridis nothas appellationes antè adscripsimus. Sunt tandem qui Petonomon à volucrum pastu nominent. Item Ferrariam, non Feriam, ut malè inter nothas Dioscoridis legitur, teste Hermolao.

Verbenæ tandem, siue Verbenæ, Peristereonis, Hierobotanes, siue Herbæ sacræ nomine sequentes plantæ donatæ sunt. Verbena vulgaris. Verbenæ supina. Verben. odiflora. Verb. Peruana. Euphrasia purpurea Dod. Verbesina flore minus specioso. Chamædryos falsæ species, Erysimum Tragi. Senerio. Scabiosa. Consolida media. Gallitrichum. Marrubium palustre Tragi.

VERBENA VULGARIS.
CAP. LXV.



Vulgaris Descriptio
Verbena pluribus ab una radice minimo digito tenuiore, fibrosâ & subamarâ caulibus cubito longioribus assurgit, quadratis, tuberculatis & subinde purpurascens: folia ferè opposita, oblonga, incisurâ quodammodo foliorum. Quercus, infini duabus incisurâ

ris profundioribus: sunt item varietates.

hirsuta, sed colore saturatione superius quam inferius virelunt : *flosculi* in thytulis exigui, quinquepartiti ex pallido purpureascentes.

Varia nomina. *Nepisipia* & *isp. sacra* vocatur græcè, Verbenaca, Verbena, Columbaris seu Columbina, Herba sagminalis & Ferraria, quorum nominum rationem, præcedenti capite ex Humelbergio adscripsimus. Verbenaca supina Dioscoridis, & *Cinnamalis* fœmina Plinii, Romanorumq; Cinnale : Blattaria Plinii, Columbaris, Lucinia, Lustrago, Militaria, Petonomos, Panchramos & Vermenaca Herimolai. Tragus vocat Verbenam, & Verbenam 1. siue rectam : Brunfels. Verbenam masculam, Corn. Verbenam officinarum : Verbenam vulgarem Catalp. Verbenam 1. siue communem, flore cæruleo & albo C. Bauhin. phyt. Verbenam communem, Clus. Verbenam communem siue factam 1. proceriorem rectam Lob. in Aduers. Verbenam Gesner. hort. Idem de coll. stirp. Verbenam albam in locis vmbrosis : Item Verbenam ratiorem, pulchriorem & maioribus floribus è Prouincia Verbenacam Matth. Lac. & Cast. Verbenacam rectam, & Verb. marem Tab. Verbenacam rectam Dodon. gall. & lat. in fol. Verbenacam rectam Dodon. Hist. Lugd. p. 1336. Verbenacam rectam, siue Peristereon Dioscoridis & Verbenacam marem Plinii Corn. Verbenacam supinam, siue fœminam Fuchsius : Hierobotanem siue Herbam sacram Dioscoridis, eiusdemque Peristereon supinum quorundam, & Verbenacam fœminam Plinii Catalp. Herbam sacram Anguill. & Turn.

Nom. ling. Germ. *Eisenkraut*, *Eisenhart*, & *Eiserich*, h. e. Ferrariam, a ferri duritia appellant : itemque *taubenkraut* h. e. Columbinam, pro qua voce malè Apollinaris *taubentropff* legit, quæ Fumanæ propriè debetur : Belgæ *Isercruyt*, & *Iserhart* : Galli *Veruaine* : It. *Verminacula*, *Berbena* & *Berbenaca* : Hisp. *Verbena*, *Vrechaom* : *vverbena*.

Communem Verbenam vbique secus pagorum viarumque margines & vrbium areas, ac non raro in ipsis etiam rudibus nascentem, florentemque mensibus nunc æstiuis, nunc autumnalibus, ac quandoque Nouembri, viretque incipientem vidi mensis Februarii principio. Locis incultis, inquit Dodonæus, sed tamen decliuibus ac humidioribus, in vtraque Germania, Gallia, alibique iuxta sepes, semitas, & scrobes frequenter reperitur : Iulio ac Augusto floret. Sunt alii qui ad hydropem puluerem foliorum exhibeant felicissimo successu, Casalpini. Cæterum, validè desiccantem facultatem habet, adest & adstringendi ac refrigerandi mediocris vis : Commendant Recentiorum plerique teste Dodonæo eius decoctum vel succum ad pestem : puluerem verò ad hydropem.

VERBENACA SUPINA.

CAP. LXVI.

Descript. **H**ic quaterni aut quini sunt *cauliculi*, anguloli siue quadranguli, ut in vulgari Verbenaca, tenuiores tamen (& complures Dodon.) supini & in terram procumbentes : folia quoque ex viridi cæsia, vulgari similia, sed magis incisa & multifida, Dodon. profundiori-



bus incisuris diuisa : *flos* in summis virgis vulgari similis, ex cæruleo purpureus, minor tamen : Dodon. *flosculi* in summis alis parvulus, eodemque modo ac ordine digestus : *semen* Idem : *radix* tenuis (oblonga, Dodon.) & vulgari similis, auctore Clusio, cui *isp. sacra*, i. e. Sacra herba

& *isp. sacra*, i. e. Verbenaca supina dicitur.

Clusii iconem & descriptionem habet Hist. Syon. Lugd. p. 1337. hoc titulo : Verbenaca supina & tenuifolia Clusii : Lobel. in Obseru. pag. 190. in Icon. Plant. p. 335. inscripsit Sacram Verbenam Hispanicam minorem : C. Bauh. phyt. Verbenam 2. siue tenuifoliam Hispanicam. Dod. lat. in fol. Verbenacam 2. & supinam.

Agro Salmanticensi frequens, florens Iulio & Locis. Augusto : Belgis ac reliquis Germanis hortensis **Tempus.** est : & quidem Hispano lata semine.

Eiusdem est cum vulgari temperamenti, quare Vires ad eadem utilis, & aliquantò efficacior.

VERBENACA NODIFLORA.

CAP. LXVII.



Descriptio
Verbena. *ce* nodifloræ nomine ad fratrem meum C. Bauh. ex Italia missa planta, quam supra terram spargi existimamus, *foliis* est Agerati, ex aduerso sitis, vncialibus & breuioribus, paulò quadrante vnciae latioribus : *flosculi* perpusilli, acervatim congesti è glomere e-

micant ramo extremo hærenti.

VERBENA PERUVANA PERPETVO virens.

CAP. LXVIII.

Scripsit Nicolao Monardo nobilis quidam vir Locuz. Sex Peru, secundum flumina è montibus eorum regno.

regnorum delabentia plurimam Verb. crescere, illi quæ in Hispania nascitur similem, perpetuò virentem, quæ Indi in multis morbis curandis vtantur, præsertim ad omnis generis venena, & in his, qui in cibis toxicum, aut simile aliquid hauserint. Sed & nobilis quædam matrona ex Peru rediens eidem Manardo asseruit, sed multis annis ægram fuisse, cumque plurimorum Medicorum operâ vfa fuisset, Indum tandem quendam accessisse, qui in plantarum scientia celebris habebatur, quique inter Indos Medicum agebat; Verbenæ succum depuratum illi propinasse, seq; ab eius vfu post paucos dies lumbricum eiecit [colubrum ipsa nuncupabat] hirsutum, pede longiorem, crassum, caudâ bifidâ, deinde omninò conualuisse: Ipsam porro Nobili cuidam viro in Peru, qui continuè ægrotabat, singulis dieb. manè eundem succum saccharo permistum vt sumeret, persuasisse [ita enim ipsa hauserat ab amaritudine] illum deinde plurimos lumbricos iecisse, longos, tenues, atque inter cæteros, vnum albi cinguli instar, longissimum, & tum demum integram valetudinem recepisse. Id postea consilium plurimis aliis, qui malè affecti erant, & quos lumbricos habere suspicie erat, se dedisse, ac omnes sumpro Verbenæ succo, multas ventris tineas eiecit, & sanatos fuisse. Illud porro remedium adeò certum affirmabat, vt vnum è suis famulis ostenderet, qui ob morbi gravitatem philtrum aut medicata pocula hausisse diceretur, quique epoto Verbenæ succo, vomitu multa variis coloribus distincta ex ventriculo reiecit, quæ medicata pharmaca esse asserbant, deinde conualuisse, &c. de quib. prolixius Hist. Lugd. Clusio etiam duo miri Verbenæ effectus exempla refert, quæ hic breuitati studètes præmittimus.

Synon.

C. Bauh. phyt. vocat Verbenam 3. siue Peruanam, Hispanicæ similem.

VRTICA ROMANA SIVE MAS cum globulis.

CAP. LXIX.

Descrip.



PRimæ inter Vrticas commendationis est, quam Romanam à semine prærogatiua indicant, quod in vtriculis gloceratim con iunctis mordacibus reclusum coniungitur, quod & compressâ laterum formâ & lubricâ superficie semen Lini gemulatur, flosculi præcedentibus fibrosis luteolo puluisculo plenis, pediculo

vinciali aut longiore appensis: radix non alia quàm Vrticæ vulgaris: caulis verò rigidioribus, pungentibus spinulis, pro vrida vulgaris lanugine, donatur, perinde vt & folia, quæ quam in illa altius multò incisa sunt: tota planta hominis altitudinem interdum multum superat.

Synon.

Hæc est illa Dioscoridis Vrtica, aliis Cnide dicta. Tom. II.

ita, & quidem agrestior (aleutica; dixit veto) asperior, latior, nigriorque foliis, semine Lini, at minore.

Plin. Vrticam siluestrem feminam facit, & mitiorem esse refert. Tragus vocat Vrticam Romanam quartam, peregrinam, & elegantissimam: Fuchl. Vrt. græcam siue romanam, & asperam Diosc. Bayrus. Dod. gal. & Lob. in Adu. (vbi & romanam officinarum, semine Lini.) Vrticam siluestre. Idè in Obf. & Ic. Plan. Pl. Vrt. Romanâ & Vrt. siluestre semine Lini: & sic etiam inscribit Taber. Matth. Vrticam primam: H. Lugd. p. 1243. Vrticâ 1. Matthioli: Doulat. in fol. Vrticam virentem priorem: Vrticarum virentium maiorum primam: Vrt. marem nonnullorum: Vrt. silu. asperiorum Diosc. & Vrt. silu. feminam mitiorem Plin. C. Bauh. phyt. Vrt. 4. siue pilulas rotundas ferentem.

Atque, auctore Athenæo lib. 3. Deipn. dicta est bono omine per antiphrasin, neque enim tactu suaui & mollis, sed aspera & iniucunda: Vel, quod iniucundo sit tactu, puriginem ciens. *Vrtica* autem quod lanugine noxiâ vellicet, pungat, & suo morfu sensum lacellat, a verbo *κρίνω*, quod pungere & vellicare significat. Vrtica ab virendo, quod pruritur, postulatque igni similes excitet: vnde, & Macer ait:

— Nec immerito nomen sumpsisse videtur;

Tacta quod exurit digitos Vrtica tenentis.

Præter iam dicta virentium Vrticarum genera Nomina rica nomina, sunt & hæ linguarum appellationes: germanica N. ff. Belg. N. s. Gall. Ortie: Italica, Ortica: Hispan. Hierba. Angl. Nettle. Boh. Kopriva: Ægyptia Scelopsis, vel Selepsion: Arab. Humure wath, Dacica Dym.

Particulariter verò Vrticam præsentem Germ. vocant *Vrtich*, *Nesselen*, Italicam Vrticam, & Romanam *Nessel* Vrticam Romanam: Belgæ etiam *Rom, ch Nesselen*: Galli *Ortie* Græcæ: quod rarior sit, neque ubique occurrat, at semine aliunde mulo, subinde spectaculi causâ, in hortis seratur, vnde & hortensem cognominavit Tragus.

In densis siluis nò raro apud Belgas reperitur. *Locus & Aetate* virens, & semen Iunio & Augusto maturans, Dod. Ego Vrticam globulis celebrem Monspelij passim in sepib. obseruavi, florentem & semina ferentem mensib. Aprili, Maio & Iunio. Basileæ in pratis, Genevæ & Montbelgardi in horto meo proueniebat, sed Hiemem non perferebat.

VRTICA VULGARIS MAIOR.



VRtica maior, vridâ lanugine, quâ caules quadrati cubitales, foliaque acuminata serrataque atro-virentia aut subflauescencia obsita sunt, notissima, rubentibus non nihil radicibus nititur: flores racematim in ligulis ex foliorum alis profertens, lanuginis incanæ instar: *sem* perquam minutum.

Descrip.

Ccc

Tragus duas habet figuras, non tamen duas, sed vnam hanc Vrticam denotantes, Vrticarum vrentium vulgarium inscriptione: prior florentem & vigentem, posterior verò iam declinantem deflorescentemque demonstrat: non est itaque verum, quod quidam ineptiunt, cum duas figuras solo foliorum, nunc spadiceorum, nunc nigriorum, colore variantes exhibuisse. Ipsemet enim duas has Vrticas, quas magnas & vrentes appellat, vnius generis esse scripsit.

Eius frustra duas figuras expressit Tragus vtpote solo colore differentes: quod non monuit Frater, nec fortè animaduertit. An etiam hæc sit Diosc. altera illa *αἰσώφης*, quam Cniphem vocant, C. Bauh. not. Romani verò Vrticam mollem, minuto semine [fructu, Ald.] non æquè aspera, vt vult frater, aliis diiudicandum relinquimus. Fuchsius refert eam se nunquam videre potuisse: nostram autem Vrticæ maioris titulo pingit, ac passim in Germaniæ dumetis ac sepibus gigni scribit. Lobel. in Adu. Obs. pag. 281. & Ic. Plant. pag. 521. appellandam duxit Vrticam siluestrem alperiolem, siue Vrticam communem, siue maiorem, aut Vrticam fœminam. Pro Vrtica pingitur ab Apollinari: pro Vrt. maiore à Brunfels. & Dod. gall. ad differentiam minoris: pro Vrtica vrente altera à Dod. lat. in fol. qui vulgò fœminam cognominari refert. Germanis dicitur *Gemein Nessel*, *gemein brennend Nessel*, *groß Nessel*, *groß brennend Nessel*, & *heyter Nessel*: Belg. *Groote Neten*: Gall. *Ortie commune*: Angl. *Nettle*.

Locus & tempus. Exit locus incultis: frequentior autem est iuxta sepes, dumos, veteresque parietes spontè: nascitur quandoque etiam neglectim in hortis, odiosa nimis suo reptatu, & viuida radice. Viget præsertim Æstate: semen Iulio & Augusto maturum legi potest.

VRTICA MINOR annua.

Descript.



Tota est hæc minor: neque enim pari altitudine vnamquam exsurgit, neque folia Vrticæ maioris molem assequuntur: vrentior tamen est, folio attrouirente & rotundato ferè: flores racemosi, albi: radix non dissimilis, nisi quod minor.

Falsò maioris Vrticæ titulo donatur à Trago, id quod ex sequentibus

eius verbis colligere quilibet potest. Tertia vulgaris Vrtica, inquit, quam *heyter Nessel*, hoc est, causticam, siue ardentiolem Vrticam, Germani dicunt, admodum exiguae quantitatis est, rarò enim ad altitudinem trium palmorum assurgit, caulis eius rotundus, radix breuior, folia angustiora, semen verò maius. Vrtica

est alsiola, hyemis impatiens: quare singulis annis, ex semine deciduo repullulascit, hortorum omnium singularis pestis. Hæc ille. Tù verò ex his colliges, tertiam hanc suam vulgarem Vrticam, minorem inscribi debere, præsertim quòd rarò ad altitudinem trium palmorum assurgat, prior verò colore foliorum ludens ad trium cubitorum altitudinem excreseat.

Fusch. Cord. Tabern. Dod. gall. & Lob. in *Synony.* Adv. (vbi tamen & Caniam Plinij acriorem vocat) itemque Brunfels. Vrticam minorem appellat. Lobel. in Obs. pag. 521. Vrticam minorem acriorem: H. Lugd. pag. 1244. Vrticam 3. Matthioli: C. Bauh. phyt. Vrt. 3. siue vrentem minorem. Dod. lat. in fol. Vrticam vrentem minimam, & Vrt. vrentem tertiam: Tragus Vrticam maiorem inscribit, sed falsò, vt ex descriptione constat. Germani *Heyter Nessel*: Belgæ *Heyte Neten*: vtrique à mordaci eius contactu appellant. Illi etiam *Haber Nessel*, quod nimirum in Avena nasci multum amet. Galli *Ortie greffe*. Sime autem hæc, quam Plinius Caniam nominat, vel potius prior, studiosi obseruent: Est in siluestri, inquit, quæ Cania, acrior, caule quoque mordaci, hmbriatis foliis.

Vrtica hæc minor annua quanquam à maioris natalibus haud abhorreat, tamen & in hortos, & humidiora arua descendit: eodem tempore quo illa & viget & floret, & etiam alibi, vt Geneuæ, citius.

Quælibet vrentium Vrticarum innatam malitiam infinitis commodis & vtilitatibus pensat. Vtriusque (Vrticæ asperioris, & mitioris) enim folia impoſita cum sale canis morsus sanant, inquit Dioscorides, gægrænas, carcinomata, ac sordida vlcera, & cacoethe: item luxata, tubercula, parotidas, panos, abscessus. Eadem lienosis cum cerato imponuntur. Faciunt & ad sanguinis è naribus eruptiones folia cum succo trita indita. Menses cient trita cum Myrrha subdita. Vterum prolapsum restituunt folia recentia admota. Semen ex passo potum ad venetum concitat, & vterum aperit. Idem cum melle delinctum Orthopnoæ, pleuritidi & peripneumonix prodest. Educit & quæ in thorace hærent. Admiscetur quoque erodentibus medicamentis: ac folia cum conchis cocta aluum emolliunt, vrinæ mouent, inflationes discutiunt, verum cum ptisana cocta, quæ in thorace hærent, educit. Decoctum foliorum cum modica Myrrha menses mouet. Succus gargarizatus vuluam inflamatam reprimat [male exprimit verit Ruellius].

Plinius Vrticæ vires & vsum medicum exponit planè ex Dioscoridis sententia, sed fusius, vt Dioscoridi intelligendo non parum lucis adferat. Vrtica, inquit, quid esse inuisius potest? At illa præter oleum, quod in Ægypto ex ea fit, vel plurimis scatet remediis, &c.

Galenus euidentius & vires & effectus Vrticæ tradit, tanquam de vno genere loquens. Vrticæ herbæ & semen & folia [nam hæc potissimum sunt vsui] admodum digerentis sunt facultatis, aded vt & phymata, & parotidas sanent. Sed & quiddam flatuosum obtinent, quo & venerem extimulent, maxime si cum passo semen bibatur. Porro quod non vehementer excalfaciatur, sed multum tenuium sit partium, testimonio est crassorum viscosorumque humorum ex pectore, pulmonequeeductio, tum quod partes quas contrigerit, pruriant. Porro flatuosum eius, cuius esse particeps dicta est, dum concoquitur, nascitur.

nascitur. Non enim actu flatuosa est, sed facultate. Ventrem autem subducit modicè, ipsâ duntaxat abstentione, ac veluti citillatione, non purgatione. Et gangrenosa & canerosa, & in totum quæ exsiccat, citra mordacitatem postulant, ea convenienter sanat nimirum cum subrilium sit partium, & temperaturæ sicca, non tamen tantum habens caliditatis, ut mordicer. De Vrtica apud Macrum extat poëna:

*Græcus Acalaphos, nos Vrticam vocitamus,
Fervida non modicè ut illi dicitur esse,
Vnde nec summissio nomen fuisse videtur,
Talla quod exurat digitos Vrtica tenentis.*

*Iuniorum
dogmata.*

His ita traditis ex veterum sententia, reliquum est, ut & Iuniorum nostri sæculi Medicorum de Vrentium Vrticarum facultate & usu dogmata annotemus. Omnes tres, inquit Tragus temperatissimi suâ sicca sunt, quamobrem resoluunt, discutunt, & incidunt duros tumores ac pustulas, & si quæ alia à pituita derivantur, sique tam in internis, quam externis corporis partibus effluunt. Minor verò, quam Germani *Venter Nessel* vocant, viribus duabus reliquis inferior est extrinsecus adhibita, nisi recens adhuc illa fuerit. Omnium itaque folia vino decocta & pota, alvum emolliunt, discutunt flatus, cohibent tormina, maxime ea, quæ non à constipatione ani orta sunt, urinam ciant, purgant lumbos, Venerem stimulant. Tuta, & cum sale, ritu emplastri, imposita, vulneribus & canis rabidi moribus medentur, experientia id attestante: Parturitione lordidis, putridis, gangrenosis ac malignis ulceribus auxiliantur. Quin & talia cataplasmata incidunt collectiones omnes, & duritias, abscessus, frigidolique tumores, siue ij sint in articulis, siue in liene, aut secundum aures. Semen in ijs morbis, quibus folia ex vino decocta conuectiunt, efficacius est, si sapâ decoquatur, aut ex illo cum melle eclegma fiat. Sed aqua destillata in memoratis ægritudinibus usu commodior est, & aliquantò mitior: purgat enim & abstergit omnia vulnera tam interna, quam externa, si bibatur, vel si ex illa abluantur. Radix magnæ pungentis vino & melle decocta, haud vulgare medicamentum est contra frigidas tussis, & orthopneas: purgat namque fistulas spirituales, pulmonis, & quæ in thorace sunt educit, pectorisque vitia emendat, discutit plenitudo, & vix affectiones curat, aliolque morbos, qui ex viscoso humore suboriuntur, mentura trinum, vel quatuor ligularum pota ac gargarizata.

*Temper.
Ded.*

Temperamento autem Vrticam siccam quidem Dodonæus quoque statuit, calentem verò exiguum, & vix primo ordinis vim tenuium partium simul obrinentem. Neque enim ex eo vires, aut mordicare nouit, quod impensè calida sit, sed huius causam esse admittit lanuginem eius rigentem ac duriusculam, aculeorum instar pungentem, cutimque vellicantem: siquidem flaccida facta ac decocta Vrtica, haudquaquam vult, lanuginis nempe remisso rigore.

Vrtica frigida.

Sed & Langius libro secundo epistola 33. virtutem Vrticæ ad remem superficie tenuis manere testatus est: intus verò rapidum frigoris latere, ut ea contusa arteriis metacarpi ac temporum applicata, febris feruorem extinguat in corde.

Cæterum, Vrticis bene contulis, emplastri vice ventri ut potius, neque citò inde dimotis, se matricem & retrahere, & reducatam usque continere, quidam certo experimento jactant, ut vi-

Tomus III.

dere est libro 6. cap. 9. de conceptu apud Iacobum Rueff Bayrus de morb. distinct. 1. tract. 5. cap. 3. Vrticam cum vino potatam epilepsia conferre scripsit. Quin & apoplectico loquelâ destituto, ut quamprimum sermo redeat, Vrticæ semine linguam fricandam præcepit Empir. Wirtembergicus Bouius ad arthritidis dolores mitigandos, & humorem peccantem per euaporationem resoluerendum reprobare narcotica, laudatque potissimum forum cum decoctione Vrticarum viridum, aut siccarum, vel etiam radicum. Corpus hominis Vrticis perficere, melancholiam non parum iuuare scribit Cardanus. Nunc si velis manus simul atque faciem teneram, albamque efficere: cape, auctore Fallopio, Vrticæ folia & radices, decoque in aqua, itaque manus faciemque ablue, tum pulchram reddes, albam, tenellamque. Vrticæ radicibus derato cortice virente vtuntur Chymici ad purificandam aquam vitæ, imponuntque eas in cucurbitam cum secundò distillant.

Ille tandem, qui semen Vrticæ comederit, oris, linguae & gutturis excoriationem patietur (referente Petro de Abano de remed. venen. cap. 50.) itemque arsuram & ardorem in mictu: Horum autem malorum curam esse ait, oleum Amygdalarum dulcium epotum, Bezoar, & graua Citoniorum trita & pota cum aqua calida.

Notimus iuueni cuidam ab adultera & lasciuia meretrice semen Vrticæ propinatum, quo tardior aliàs ad actum venereum excitaretur. Vnde Iuuenalis: Iritamentum Veneris languentis, & acres Vrticæ.

Præter prædictos illos usus, autor est Alpinius, mulieres Aegyptias nihil habere quo valentius veterum calefaciant, mudent, atque ab obstructionibus liberent, quam vrticam, ex qua ad mouendos menses seminis decocti atque suffiri usus est apud ipsas frequentissimus: maximeque addita myrrha.

Cæterum, æstum & pustulas ab Vrtica excitatas restinguit & sanat oleum Rosarum, itemque Olivæ. Se. I & Nicotianæ succus, aut spissamenta, aut folium viride ex fricatione madeas confectum lesionis dolorem amouet & prorsus tollit, si quis loco ex Vrticæ contactu adusto, horum vnum applicauerit.

*Vrtica
morbus
medelæ*

CANNABIS MAS ET FOEMINA.

C A P. LXX.

Dum generum Cannabis passim observatur culta, mas videlicet & scemina, siue secunda & sterilis: surgit vtraque homine altior (licet scemina vari altitudine cedat) caule quadrato, cauo, cortice in fila ductili recto, singulari, interdum superius diuiso: folia in quatuor, quinque aut plura segmenta ad pediculum usque subdividuntur, serrata, arrovirentia, aspera, odore caput tentanti: flores vni mutcoli luteoli in pulvisculum leui concursu abeunt, nullo post se relicto semine: altera species nullo præeunte flore semen copiosum fert, nudum, secundum caules, ramolque, oleaginosum.

Icon nostra, quæ ex Fuchianis est, sceminam demonstrat.

Cannabim sativam, matrem Dioscorides folia Fraxini [τῆς μάλιας, pro qua voce malè interpretatus est Marcellus τῆς μάλιας, Mali:] gerere

*Cannabim
sativam
Dioscor.*

scripsit, sed fœdi odoris, caules proceros, inanes,

Cannabis femina.



semen rotundum. Galenus similem Vrticæ facit non solum figurâ, sed & facultate. Plinius inter Cannabin hanc satiuam & siluestrem minus ingeniosè distinguit, & vires viriusque miscere videtur.

Quoniam porro in syluestris Cannabis mentionem incidimus, meritò quoque eam ex Dioscoride considera-

quit, virgis fort Althææ virgis similes, sed nigriores, asperiores, & n. ineres, cubiti altitudine: folia sativæ similia, asperiora tamen & nigriora: flores subrubicundos. Lychiudi similes: semen & radicem Althææ similia. Radix cocta & imposita vim habet inflammationes mitigandi, & tumores discutendi, & tophos in articulis dissolvendi. Sed & ex hac cortex est idoneus ad funes texendos. Et hanc Dioscoridis Cannabin siluestrem nobis adhuc ignoram ingenue fatemur. Illud nobis liquidò constat quosdam Vrticæ inerti affinem plantam fecisse: alios verò Clinopodij alterius Matthioli genus album constituisse nec nec de esse, qui Alceam vulgarem maiorem credant: reperiri tandem nonnullos, qui Alceam Vertaphylli folio esse sibi persuadeant. Et hæc de Cannabe silvestri hic nobis dicta sunt.

Siluestrem Cannabin, Hidrastinam & Terminalem cognominatam, nos non habemus [inquit Tragus nisi per illam subintellexerit] vnam sativæ speciem Dioscorides, aut certe, quod puto, caput illud redundet. Nam syluestrem Cannabem primò contra consuetudinem suam ponit loco, deinde satiuam. Sed & Pliniū tria Cannabis genera describentē, quarū primam & optimam Mesiam, Milesiam alteram, tertiam Roseam nūcupat, de sativa dūtaxat Cannabe loqui, vel hinc liquet, quòd silvestris nusquam mentionem faciat. In libro quidem 20. cap. 20. rem paucissimis attingit verbis. Sed de nostra vulgari intelligi ea verba commodè possunt.

Sed relicta Cannabe silvestri, ad sativæ historiam redeamus. Duorum itaque nascitur generum ex vno eodemque semine, Mas & femina, quæ utraque pingitur apud H. Lugd. p. 49. Marrem inscripsit Lobel. in Obs. p. 184. in Ic. Plant. pag. 326. Cannabem 2. siue maiorem, semen ferentem, masculam, & Cannabem Dioscoridis: Dod. lat. fol. Cannabem fecundam, flore non conspicuo: C. Bauh. phyt. Cannabem 3. siue satiuam: Fœminam Lobel. modò citatis locis, Cannabem erraticam paludosam siluestrem, sed falso titulo: Tragus Cannabem satiuam inscri-

psit, ac primâ siue fœmellam, tenuem, & semine destitutam vocavit: Dod. in fol. lat. Cannabem sterilem, flores imputiles & vanescentes proferentem: Cas. Bauh. phyt. Cannabem 2. siue erraticam: Miror autem Fratrem non meminisse Cannabis fœminæ, quâ sub falso titulo Lobelius exhibuit. Vtramque etiam vnâ iconē Cannabis inscriptione cur comprehendat Tabern. rationem non video: is sæpius solo colore differētes iconibus separat. Sed & Camer. apud Matthiolum iconem novam ex mare & femina compositam, Cannabis titulo dedit. Cord. Corn. & Brunfels non distinguunt.

Κανναβίς καναβίον, αἰσέριον. & σκαπορέσπον, à texendis ex ea funibus, Græcis dicitur: Hebræis seu Thalmudistis græcam vocem imitantibus, teste Elia in Nomencl. *Kannafis* vocatur: Arabibus *Canab* & *Sphedenegi* appellatur: Medici tamen differentiam cōstituūt inter Scēhedenegis quod est semen Cannabis, & inter Scēdenegi, qui est *Amantes lapis*, qui sanguinē silit, & inter Scēheteregi, qui est *Fumus terræ*, vide Auc. lib. 1. cap. 174. & 683. Latini *Cannabē* dicunt: officinæ nomen retinent: Sunt autem Græcis *καταβίς*, fonticuli, sparcæq; scaturigines, quibus locus cum iubens spontē & fata luxuriat, videtur id nominis Lobelio indepta: Germanis *Banff* Belg. *kemp*: Gallis *Chanvre* & *Cheneue*: Ital. *Canape*: Hispan. *Cannamo*: Angl. *Bunp* & *Beup*.

Porrò ambæ Cannabes, ex vno, vt diximus, semine procreantur, sed quâ ratione hoc intra terrâ perficiatur, vt altera ex illis fructifera, altera verò sterilis sit, nemo est qui scire possit, ideoque cum alia multa, tū etiâ hoc ipsū naturæ esse miraculum necesse est vt dicamus. Vtraque autem quotannis Vere passim in agris & hortis plantari consuevit, nec vnquâ sua sponte siluestrem observare nobis contigit, & pluribus alis luxuriantem, qualem Dodonæus commemorat.

Solum, vt Columella scribit, pingue, stercoreatumque & riguum, vel planum atque humidum & altè subactum deposcit. In quadratum pedē feruntur grana sex eius seminis Arcturo exoriente, quod est ultimo mense Febuario circa sextum aut quintum Calendas Martias. Nec tamen vsque in Æquinoctium vernum, si pluuius cæli status, improbè feretur. Fœmina prior maturefcit, meliorque ac præstantior est ad pannos conficiendos: mas verò apta ad sui generis conservationē. Fœmina matura Iulio vellitur. Maris semen sine Augusti, vel Septembri mense, maturum legitur.

Cannabis plantam in vita admodum vtilem pronunciauit Dioscorides, ad robustissimos funes texendos: Semen verò si copiosius edatur, extinguere genituram: succum è viridi semine expressū ad aurium dolores commodè instillari. Cannabis autem semen olim in cibo homini fuisse, docet Galenus 1. Alim. his verbis. Non quemadmodū plāta ipsa Cannabis Virici quodammodò est similis, ita semen semini facultate est simile, sed plurimū ab eo dissidet, vt quod concoctu sit difficile, stomachoque ac capiti noceat, prauique sit succi. Sunt tamen qui eo quoque friso cū alijs tragematibus vescuntur. Tragemata autem voco ea quæ post cœnam voluptatis inter bibendum excitandæ gratia manduntur. Multum autem calfacit, ideoque sumptum paulè

Mirum naturæ.

Locus.

Vires & usus.

paulò largius caput ferit, vaporem sursum ad ipsum mittens calidum simul ac medicamento-
sum. Semen (addit 7. simpl.) status extinguit, adeoque dissipat, ut si plusculum edatur, genit-
uram exsiccat. Sunt qui ex eo viridi succum
exprimentes, ad aurium dolores, ab obstructio-
ne, ut opinor natos, vtantur.

*Simeon
Sethi.*

Non est silentio prætereundum, quod de se-
mine Cannabis Simeon Sethi prodidit. Come-
stum, inquit, idem nocumentum quod Corian-
drum asserit: immodicè enim si estur, ut illud de-
lirium facit: folia verò arida in potu sumpta fa-
rinæ modo, ebrietatem, quandam hospitalem &
innoxiam faciunt, quæ ab hauriente non senti-
tur. Apud Arabas pinfitur, subigiturque pro vi-
no, & inebriat. Deliccat verò semen genitale, ut
Caphura.

*In cibo
venit.*

In Francia Orientali, referente Trago, aliisque
nonnullis regionibus semen Cannabis quotidie
inter cæteros cibos decoquitur, non aliter quam
Hordeum, sed reuera qui continuò huiusmodi
semine in cibo usus fuerit, is non parum læde-
tur, namque semen Cannabis stomachum frigi-
dum & debilem reddit, & genituram extin-
git. Idem semen lacte decoctum & calidum po-
tum, aridam calidamque tu-ssim emendat & ex-
pellit.

*Matth.
Gallina
feracioris.*

Cannabis semen in gallinis contrarium, ac in
nobis, efficere, tradit Matthiolus, siquidem gal-
linas ouorum feraciores reddit, experientiæque
se se comperisse ait, gallinas, quæ Hieme sequite,
quo tempore oua rarius pariunt, Cannabis semi-
ne pascantur, oua frequentius multò ponere.
Cannabis recentis decoctum expressa validè her-
bæ, terrestrium lumbricorum cavernulis insper-
sum, statim eos euocare idem affirmat, quod pi-
scatoribus acceptum referendū est, qui hac arte
vermiculos capiunt suis hamis asfigendos, ut re-
ctè scripserit succum ejus vermiculos ex aurib.
ejicere. Ex his etiam colligi potest, ejus vires ad
interaneorum vermes haud imbecilles fore. E-
quorum etiam sedi hærentes tænias, succus aut
decoctum ejicit. Sunt etiam qui foliorum pulve-
rem dysentericis propinent. Quod Plinius de
radice dixit ambustis sæpius admoenda, & a-
moenda, commodius præstabitur, si recens in
mortario tundatur, cum recente butyro &
subinde applicetur.

Rustici Belgæ apud H. Lugdunensè, seminis
contrusi medullam liquore aliquo expressam i-
stero laborantibus initio ipsius mali exhibent,
& sæpe non sine successu, si quando ex sola ob-
structione & citra febrem exoritur. Aperit enim
fellis meatum, & bilis per corpus digestionem
promouet. Empirici quidam asserunt sanguinè
ex quacunque parte corporis fluentem sisti, si
qui exit sanguis cum foliis Cannabis minutim
concisis, frigatur, & ægro pro cibo detur.

Cunctis populis denique Lobelio teste, pe-
nuriæ Lanæ, Lini, Xilique refarcit, ad vestium
stragula, velorum, papyrum, quamlibet denique
suppellestem. Mas robustior rudentibus & ca-
pistris torquendis nata habetur, mulierculis ada-
gio iocantibus dicentibusque esse feminam po-
torem mari. Hujus autem semen est non parum
ad multa proficuum: ex eodem oleum pressum
tumoribus & scirrhis opitulatur, lucernis alit
lychnia & lucem. Lac etiam vel pulvis ejusdem
macerati, aut jusculis decocti, fluxiones sistit diu-
turnas, dolores, repentinósque flatuum vortices,
& humorum fluctuationem compescit: somnum

Tom. III.

conciliat. Usus tamè nimius molesto sopore per-
fundit, tritum capiti, vel pedib. imis admotum,
haud abs re isteri humores, vaporesque tenues
à centro auertere & euocare putatur. Radices
podagricis tophis proficue. Odorem grauem &
nonnihil virosum eructat, & vel capitis in eo
decubitu remulentos facit. Succus verò folio-
rum certa pernicies insectis interaneis, & vul-
nerum putridorum alumnis: non quâ facultate
idem foliorum Perficæ, aut Iuglandium putami-
nis succamentum efficit: sed vapidò, tetroque
siti, odore & exsiccandi vi. quâ alimentum præ-
ripit illis & populatur excrementis dissipatis:
multum alimonie suggerit gallinis, cortalibus-
que: sed Hyeme sæcundiores, postea steriles, &
quasi pinguedinis mole obrutas reddit. Auicu-
lis etiam cibus est, ac tantum saginæ adfert, ut
aut enecet, aut cantillandi agimat alacritatem
& facultatem, ut carduelibus, linottiis. Lacunis
aut scrobibus aquæ plenis merguntur vtriusq;
sexus fæces & manipuli, ubi macerantur, eluun-
turque multum & diu: deinde siccantur in So-
le, ut tundantur, ac demum cortices staminei
tundendo velluntur, ut Lino sit ad filum & te-
las. Sed lacustris aqua, cui intabuerit, tantopere
viru nocet, ut epota præsentissimo sit sitientibus
exitio, cuique antidotis præstantissimis, tempe-
stivè etiam datis, occurrere non possit.

Noxæ.

BANGVE CANNABI SIMILE.

CAP. LXXI.

BAngue planta est Cannabi haud absimilis,
nisi quod hujus semen canabino minus est,
nec ita cædicans ut illud: deinde hujus stolones
lignosi, nullo ferè cortice vestiti, contra quam
cannabini, auctore Garcîa, qui ab Acoſta in qui-
busdam discrepat: Banguè simile ferè est, ait hic,
Cannabi: caulem habet quinque palmorum al-
titudine, quadrangulum, colore dilutius viren-
te, fractu contumacem, nec adeò concavum, ut
cannabinus caulis, cujus cortex non minus
quàm illius in fila diduci potest: folia cannabina
supernè virentia, infernè incanâ lanugine pu-
bescentia, gustu terrestri & insipido. Nos à Tho-
ma Platero semen accepimus nomine Banguè,
quod ad Strammonie primæ semen aliquate-
nus accedit, rufum, ac ferè spadiceum, compres-
sum, acuminatum.

Descript.
Garcia
Semen.

Nonnulli in ea opinione fuerunt, ut Banguè
Indorum, auctore Garcîa, ab Opio differre non
putarent. Acoſta ramen dici refert Arabibus A-
xis, Turcis Asarath, Persis, Decan, plurimarum
aliarum regionum incolis Banguè, quod pluri-
mam affinitatem habere videtur Clusio cum
Turcarum Constantinopoli degentium Maslac,
quo ad varios affectus vtuntur, nonnulli
etiam vescuntur excitandæ veneris gratiâ.
Dubitat tandem Fragosus, an herba hæc ab In-
do allata, illa sit, cujus meminit Theoph. lib. 9.
cap. 10. pl. Hist. sed quàm apè, nescit ipse Clu-
sius. H. Lugd. pag. 1914. Banguè inscribit: C.
Bauh. phyt. Cannabem 3. siue Cannabi similem
exoticam. Huc autem reducitur propter folio-
rum cum Cannabi, & corticis in fila ductilis si-
militudinem, aliàs enim auctores contrarias fa-
cultates huic tribuunt, videlicet, quod genitale
semen multum juuet.

Nomina.

Indi, inquit Acoſta, semine & foliis vescuntur.
cùm ut validiores in re venerea fiant, tum ad

Vires, &
Virus.

Ccc 3

excitandam cibi appetentiam. Fit ex hoc Banguæ compositio vulgaris admodum vsûs, in ijs regionibus, ad varios effectus: etenim magnates & milites præfecti, ut laborum obliti securius & liberius dormiant, seminis & foliorum in puluerem redactorum, quantum videtur, sumunt, illique addunt Arecam, siue Auellanam Indicam viridem, & Opij nonnihil pro arbitrio: omnia saccharo excepta deuorant: si verò in somno varias rerum species sibi obuersari cupiunt, addunt selectissimam Camphoram, Caryophyllos, Nucem molchatam & Macis: si verò hilares esse volunt & faceri, & præsertim in venerem procliniore, Ambaro & Muscho additis saccharo excipunt, & electuarium faciunt. Multi autem affirmant, hujus semen & folia ad libidinem citandam miræ esse efficacis: unde colligere licet, nihil affinitatis habere cum Cannabi, licet illi admodum si milis sit: quanta quidem auctore Dioscoride, Cannabis calida & sicca est, & genitum extinguit.

TOCCON HERBA BRASILIANA, COR. I.E. CANNABINO.

CAP. LXXII.

Descri-
ptio.

Brasilianorum herbæ Toccon cortex, Cannabis modo detrahatur, cannabino fortior, filo, cui spinam subjungant ad pilicandum, parando accommodus. Ex eodem arcum fures si int, qui licet tennes sunt, equis tamen ad sua pondera vehenda, fortitudine sufficiunt, Leri auctore, cap. 12 & 14.

CARBASVS VETERIBVS.

CAP. LXXIII.

Anequam de Lino verba faciamus, Laconicam de Carbola tractationem instituere placuit. Et Hispania citior habet (inquit Plin. lib. 19. cap. 1.) splendorem Lini præcipuum, tot rentis in quo potitur natura, qui alluit Tarracoenem. Et tenuitas mira [magna M.] bi primum Carbaliis repetitis.

Lini ge-
nus.

Carbalem autem esse Lini genus miræ tenuitatis palam si ex jam relatis Lini verbis. Quia & Dalechamptio Carbalius est Lini genus quo texebatur vestis magni pretij, antiqua in delicijs habita. Et confirmatur hoc auctoritate plurimorum scriptorum. Carbaliina enim vela primus in Amphitheatrum duxit: traditur Lentulus Spinter in Apollinaribus ludis, mox Cæsar Dictator, teste Plinio. Verres, ut Cicero perhibet, Astarte summâ tabernacula carbaleis tuta velis in litore collocari iussit, ut totos dies cum impudicis mulieribus perspolaret Virg. 11. Æneid.

--- cum croceam chlamydemq; sinusque eropantes.

Carbaleos fuluo in nodum collegerat auro.

Item 8. Æneid.

--- cum tennes glaucæ velabat amillu,

Carbalius, & crines umbrosa tegbat arundo.

Lucanus lib. 3.

Fluxa coloratis astringunt Carbasa gemmæ.

Propertius.

Exhibuit viuos Carbasi alba focos.

Ex quibus locis, atque etiam ex Quinto Curtio lib. 8. de Indis loquente, intelligi potest, hoc quoque virile esse vestimentum. Sed & muliebri esse satis constat ex Val. Maximo, loquente de Emilia virgine Vestali lib. 1. cap. 1. quâ adorante,

cum Carbalius, quam optimam habebat, foculo imposuisset, subito ignis emicuit.

Nunc & Lino candidissimum ex Ægypto, Xylon. Cottonem nonnulli & Carbalius per conjecturam vocant, &c. Vide Xylon, siue Gossypium.

Carbalius quidam id genus linei panni esse putant, quod Telam Baptistæ, & Telam Holandicam, & Telam Cameracensem vocant. Hæc postrema aduchitur ex Hispania.

Carbalius est pallium, quo quis amicitur opulentie causa, ut ex Serico, aut tenni Lino. Vide Andr. Tiracquellum comm. de leg. connubialibus leg. 1. gl. 1. part. 3.

Carbalius tandem de velo, instrumento nautico, habetur, ut ex locis hic annexendis colligitur. Virg. 3. Æneid.

Vela vocant, tumidoque inflatur Carbalius Austro, Item 4. Æneid.

--- vocat iam Carbalius auras:

Puppibus quæ læta nauta imposuere coronas.

Ouid. 11. Metam.

itaque malo.

Carbalius deducis.

Item 13. Metam. Mota se, undò flum sonans Carbalius.

Epist. Præbere ventis Carbalius.

Fill. 3. Torio sub luce & carbalius Lino.

Silius 4. Silu. Aurâ ventilantur Carbalius,

Martial. lib. 1. epig. 19.

Festinant trepidi subfringere Carbalius, nauta.

Carbalius Carbali penultimâ correptâ est feminini generis secundum Priscianum: masculini secundum Phacum. Probus verò & Caper dicunt esse masculini & feminini in singulari: in plurali verò neutrius. Græcè dicitur, ἀπυρρον καὶ ἀπυρρον, ὡς, τὸ, velum.

LINVM.

CAP. LXXIV.



Vulgò no-
tum Li-
pus

num tenui, radiculâ, nititur, caule, tereti, plurimum simpliciter, inani, cubitum, aut sesquicubitum alto, alia circa summum disto: folia, acuminata, culmum lato, vinctas duas plus minus longa, alternatim caulibus apposita: flores, caerulei, quinque partiti, striati, quos capitula, excipiunt rotunda, in quibus semen fuscum, lubricum, latum.

Alex. Græci vocant, Lino Latini & officinæ: Synonyma cum eorum nominibus linguarum. Lino germanicum Tragus: Lino sativum vulgare caeruleum Lobel. in Adu. & Ic. Plant. p. 42. In Obs. pag. 225. Lino Aduersariorum: C. Bauh. phyt. Lino i. siue sativum. In Dioscor. Annon, Pænis, & Zephæos cognominatur. Quemadmodum

Quemadmodum autem lingua latinâ & græca Tela lineæ, & ipsa Lini herba communi nomine *linum* & Linum dicitur, ita apud nos Germanos Linum siue in agro, siue domi ad texturam, & telam apparatus commune nomen retinet *flachs*. Tamen non defunt, qui Linum nondum euulsum, Linum agreste, & Linocalanum; contra verò telam ex Lino textam, Linum domesticum seu vrbani vocitent. Belgæ nominant *Vlachs*, Galli *Lin*, It. *Lino*, Hisp. *Lino*, Angli *flax*, Bohemi *Leu*, & vt Hungari. Arabes seminis tantum meminere, vocantes illud *Bazabichitem*, seu vt Serap. placet, *Bazarabichen*: Hebræi *Pistah*, Chaldæi *Chisna*: Exod. 9. Onkeli: Græci *λινον* & *λινωπύριον*: Germani *flachs* *Lin* *amiet*.

A Lino varia ducuntur adagia, v.g. *Linum lino connectit*, cuius duplicem apud Græcos interpretes sensum inueniri perhibet Erasmi. Roterodamus: Horum alter est: infirmis infirma copulas, friuola friuolis. Alter eadem non iisdem rationibus facis, aut dicis. *Vltra lannum* dixit Lucianus in Iouē redarguto, pro eo, quod est extra decretum fatale. Est & tertium prouerbiū *Candidum Linum luci causa ducit*, quod in eum quadrat, qui doris causa ducit vel deformem, vel anum. Est & quartum: *Qui canem alit externum præter Linum nihil habet*, i.e. præter funiculum ei nihil sit reliqui. Qui beneficium collocat in ingratum, perdit operam. Nam canis alienus relicto fune, quo alligatur, pristinum dominum repetit.

Theophrasto visum fuit, Linum degener factum, in Lolium abire. Noltrates coloni sibi visum pernegant, aut auditum.

Pinguissimum, vt Columella ait, locum & modicè humidum poscit. Aliqui, inquit Palladius macro solo spissum ferunt, atque ita assequuntur, vt Linum subtile nascatur. Plinius scribit seri fabulosis, maximè vno sulco, nec magis festinare aliud, vtrèque agrum, & deteriorem ipsum facere, quod & Virgilius in Georg. attestatur:

*Vitis Lini campum seges, vitis Aneia,
Vitis lethæo perfusa Papauera somno.*

Seritur linum Vere: Maio & Iunio mensibus floret. Linum (inquit Crescent.) desiderata ærem temperatum, & terram solutam & pinguem, & quanto pinguior fuerit, tanto ipsius stappa erit grossior, quanto verò mactior, tanto eius stappa subtilior erit. Sed ex eo parum & breue in tali terra nascetur. Huius autem seminatione terram satis macrari & lædi creditur, ideoque auxilio letaminis eget, si tale semen recipere assuescit. Eius terra ante Hiemem debet arari, vt glebæ propter gelū sequentis Hyemis in puluerem reducantur: deinde post Hiemem, cum primum poterit, secundâ vice arabitur, deinde aspergatur & iterum aretur quinque vel sex vicibus, in tantum vt in puluerem redigatur, ita tamen quod primâ vice profundius aretur, secundâ minùs profundè, & sic semper profundatio vsque ad vicem vltimam minuatur: deinde à medio Aprilis vsque ad finem eius satio ipsius est optima, satioque in summo terræ sit minùs vno palmo, tertâ super semen aratro reuolutâ.

Tres còrbes huius seminis, vel parum plus sufficiunt iugero, cui multum proderit si talis ager expetetur postquam fuerit seminatus, quod si tempus fuerit magnæ siccitatis, ei valdè proderit, si poterit irrigari. Potest etiam seri ante Hyemem in locis calidis, in quibus Linum natum frigore non læditur, & tunc melius prouenit in

terra mediocriter cretosa, quàm nimis soluta, nec est necesse quod sit pinguis, & quod vltra duas vices aretur, dummodò terra puluerisetur, & cum fuerit seminatum, melius est quod cum expexe solummodò de quibusdam spinis facto semen operiatur, melius etiam est quod homo vnus cum fune trahat expexam, quam boues, propter nocumentum, & hoc est cuilibet homini facile.

Hæc verba bis mundanda est cum maximè suffocetur, ideoque extirpandum est noxium antequam circa Linum inuoluatur, licet per ipsum ambulando lædatur cum magnum est, & ideo mundatur, & debet ante se manibus aperire, & ire per eum optime eleuatis pannis. Sed cum primâ vice mundatur, quia tunc paruum est, & conculcatum releuatur, non læditur ambulando per eum.

Colligitur autem cum maturo colore flauescit, & eodem die ne rore tangatur, sub lecto ponatur in fascibus, deinde malleolis ligneis excutuntur semina, & ipsum Linum ad maturandum in aqua ponitur, in qua quatuor vel quinque diebus, si putrida sit, sterile sufficiat, si autem aqua non sit corrupta; vsque ad septem dies stare in eadem oportet, vt putrescat caro herbalis, & cortex ex quo fit stappa.

Erit autem signum temperatæ maturationis, quando maceratur in aqua, cum tactu mollescit, aded quod omnem rigiditatem amiserit, cognoscitur etiam si ex eo aliquid extrahatur de aqua & siccatur probetur, si caro herbalis à stappa facile separatur. Veruntamen si minùs, quam expedit, maceretur, erit stappa fortior & albiore, sed non perfectè separabitur caro herbalis, & erit durior ad filandum.

Deinde optimè lauatur & in aqua excutitur, concutitur malleolis ligneis, vt eius caro rumpatur, & deinde ad Solem calidum ponitur, & cum fuerit calefactum in pannis calidis in domo simul ponitur, & cum per aliquas horas sic steterit, gramolatur, hoc enim modo mundatur optimè, nec stappa rumpitur gramando, quod fieret si statim gramarentur cum eleuantur de Sole. Quod si tempus fuerit humidum cum multis pannis madefactis ad ignem præparatur gramen, deinde spatulis eius mundificatio completur, deinde perlinatur, & filatur.

Lini semen, inquit Dioscorides, eandem vim habet, quam Fœnum græcum, discutiens ac molliens omnem internam & externam inflammationem, cum melle & oleo & modica aqua coctum: aut cocto melle exceptum. Tollit maculas solares crudum, & varos cum nitro & Ficibus impositum. Cum lixiuio verò parotidas, iuxta aures abscessus, & duntias discutit. Herpetas, & duntias discutit. Herpetas, atque vlcera, cum vino coctum expurgat. Scabros quoque vngues remouet, cum pari Nasturtio & melle. Educit etiam ea quæ in thorace hærent, cum melle eclogmatis vice acceptum, & rufles mitigat. Stimulat item ad venerem, si mixtum melli & Piperi placenta modo largius sumatur. Sed & decoctum ipsius infunditur ad intestinorum & vteri rosiones, & excrementa educenda. Commodum est etiam ad infellus, quemadmodum Fœnum græcum, ad vteri inflammationes.

Velorum ex Lino in nauibus vsus in mari, velut admirans Plinius, decimi noni libri principio ait: Atque vt à confectis ordianur vtili-

tatibus, quæque non solum terras omnes, verum etiam maria replevere, feritur, ac dici neque inter fruges, neque inter hortensia potest Linum. Sed in qua non occurrit vitæ parte? quodve miraculum maius, herbam esse quæ admoveat Agyptum Italiæ? herbam esse quæ Gades Hercules columnas septimo die Ostiam afferat, & citeriorem Hispaniam quanto, Prouinciâ Narbonensem tertio, Africam altero. Audax vita, scelus plena, aliquid feri ut ventos procellasque recipiat: & parum esse fluctibus solis vehi. Denique tam paruo semine nasci, quod orbem terrarum ultra citroque portet, tam gracili auenâ, tam non altè à terra tolli: neque id viribus suis necti, sed passum, tulumque, & in molliem lanæ coactum, iniuria naturæ, ac summa audacia, & quod peruenire nulla execratio sufficit, contra inuentorem dictum suo loco à nobis. Cui non satis fuit hominem in terrâ mori, nisi perierit & insepultus. At nos priore libro imbres & status cauendos, frugum causâ fructusque præmonebamus, ecce feritur hominis manu, meretur eiusdem hominis ingenio, quod ventos in mari optet. Præterea ut sciamus fauisse pœnas, nihil gignitur facilius: ut sentiamus nolente id fieri naturâ, vrit agrum, deterioremq; ipsum facit. Hæc Plinius.

*Utilitates
Lini.*

At quanta censenda est velorum ex Lino utilitas, si ad reliquum Lini usum per omnem vitam conferatur? Hoc loti detergemur, hoc sordidi defricamur. Ex hoc factâ veste totum corpus extrinsecus ad cutem integente omnes interdiu vestimur: noctu stragulis inde factis incubamus ac integimur. Rusticana gens vtriusque sexûs pallia, & tunicas ex ipso gestat: & mundus muliebris magna ex parte ex hoc constat. Sed omnes has necessarias vitæ utilitates facile superat Linum chartarum dono. Hæc ex ipso penitus detricto & nullius amplius usus: reliculo sunt, tot hodie ubique officinis, ut multa hominum millia ex præparandi chartas opera, in papyraceis, ut vocant, molendinis, se nutriant. His chartis & literarum notis, omnes bonæ artes, leges, tota Philosophia, & vitæ pietate ac recte degendæ rationes excipiuntur, habentur, conseruantur. His chartis hanc materiam medicam, & totius ferè naturæ plantas descriptas commendamus orbi. Harum utilitatem vix a nimo quis concipere possit, nedum pro dignitate explicare, quantumuis longâ institutâ oratione.

Galenus.

Verum Galenus r. de Alim. Quidam, inquit, vtuntur semine Lini tosto, velut obsonio cum Garo. Vtuntur etiam melle ammixto. Aliqui etiam panibus inspergunt. Sed stomacho incommodum est, & ægrè concoquitur, & modicum alimentum corpori præbet. Ad ventris autem egestionem neque laudari, neque vituperari meretur. Exiguum tamen quid habet de ciendi vrinam facultate, id quod magis manifestum sit, ubi tostum editur. Tunc autem sistit quodammodo magis aluum. Idem 7. simpl. Semen Lini, si editur, flatuosum est, etiam si tostum fuerit. Ita superflua humiditate refertum est. Calidum est, ordine primo: verum inter humiditatem & siccitatem medium obtinet. Pinus lib. 20. cap. 22. seminis Lini usum medicum longius describit, & multa Dioscoridis declarat.

*Linum
calidum
& hu-
midum*

Linum, apud Tragam, communi Medicorum consensu calidum & humidum esse traditur. Semen autem tulum ac in puluerem redactum adiecto modico mellis, & Piperis, ita ut eclegma ex

his fiat, & per diem quantitate Nucis moschatæ sumptum, tussim mitigat & venerem stimulat. Qui internis inflammationibus infestantur, his semen Lini aqua decoctum, admixto melle, in potu exhiberi potest, & foris emplastri instar imponi, quæ medicina plurimum prodest, & quousque finit dolores. Ad emolliendas vulgæ & interaneorum propter lentam humiditatem obstructions, in colica etiam passione prodest, corpus oleo Lini inungere, aut semen decoctum calidum foris imponere, aut ex iure seminis decocti & oleo clysteres iniicere, prout unicuique visum fuerit. Semen Lini, necnon oleum eius illitum & impositum ambustis conducit. Quotopere porro flatuosum & recrementitiâ humiditate plenum semen Lini sit, paucis ab hinc annis Middelburgi in Zelandiis animaduerti potuit, cum propter frumenti aliarumque frugum inopiam, plerique ex ciuibus pane & cibis ex hoc coctis vescerentur. Distenta enim his valde citò hypochondria fuerunt, & facies aliæque partes tumidæ factæ, quorum non pauci sic affecti, etiam mortui sunt. Neque enim aliunde hæc symptomata, quam ex recrementitiâ seminis humiditate, quæ flatulentiam parit.

Oleum quod ex semine eius exprimitur, multiplicem usum habet, nec enim à pictoribus, aut statuariis, aliisve artificibus expetitur solum, vel ad lucernas tantum vrile est, sed etiam medico vsui seruit. Nam & duritias omnes mollit: nervorum tensiones contractionesque laxat, dolores illitum sopit. Sunt etiam qui bibendum exhibeant lateris aut coli dolore laborantibus, verum recens sit oportet, rancidum enim factum & nauseam excitat, & plus, quam par est, calefacit.

LINVM SILVESTRE, SATIVVM planè referens.

Linum silvestre, sativum planè refert formâ, nisi quod caules habet & folliculos crassiores, & maiores, & in summo surculis multis brachiatis. Et maxima inter hæc duo Lini genera in eo consistit differentia, quod folliculi silvestris Lini calore Solis non aperiuntur, perinde ut alterius, nam quamprimum exsiccati Sole fuerint, excutere semen ut aliarum frugum oportet, auctore Trago, qui Linum 2. & silvestre vocat: C. Bauh. phyt. Linum 2. siue alterum folliculis crassioribus.

Apud Mediomatrices hoc sylvestri Lino ad- Locus &
Tempus. uentante Æstate integri agri conseruntur, & inuenitur etiam quandoque inter segetes Auenæ.

LINVM SILVESTRE ANGVSTIFOLIVM, flore quasi cinereo, capitulis magnis.

CAP. LXXV.

Miram in Lino silvestri conspici varietatem satis ex Clusii Hispanicarum, Pannonicæ Lini silu. rumque stirpium historia patet: Cum verò Lini silu. Lini silu. Linum silvestre dicit, Linariam non intelligit, quæ aliquibus etiam hoc nomine appellatur, sed plantam floribus Lini similibus, eodemque modo fugacibus, nonnunquam etiam Lini folia habentem.

Linum igitur silvestre angustifolium flore Descrip. cinereo, Lino silvestri angustifolio albo cum purpureis lineis omnino simile est cauliculorum & foliorum

foliorum gracilitate, tenuitate, *foliorumque* formâ & *radice*: in florum duntaxat colore est differentia, qui niuci non sunt, sed cærulei in candidum languescentes, & quasi cineracei: capitula etiam floribus succedentia longè ampliora, nec minora quàm in satiuo.

Locus.

Lini silvestris quinti, angustifolij secundi varietas hæc in Austriacis Alpibus præsertim verò Sneberg inuenitur: Floret verò isthic sub finem Iunii, semen extremo Iulio & Augusto maturum.

Tempus.

LINUM SILV. ANGUSTIFOLIUM.

Descript.



Flores.

D Vram lignosamque possidet radicem, satis crassam, ex qua germinant multi, simul caules tenues, qui ad cubitalem altitudinē ascendunt, foliis stipati cōtortissimis, tenuissimis, longitudine ferè Lini satiuicæ calycibus longiusculis flores extremis ramulorum brevium nascuntur, magni, albi, vel quasi

cinerei, fortuitis cæruleis stris sublucentib., tam caduci ut vix attingi possint, quin delabantur, vascula minora quàm Lini satiuicæ, quadripartita, semine Lem., minore. Figura Fuchiana non satisfacta.

Icones.

Lin. silv. cit.
tenuifol.

Camer. hort. dicitur Linum silv. tenuifolium, flore albo, cæruleo intensè, & dilutè purpureo. Et aliud pusillum candicantibus floribus spontè ubique occurrens, circa vineta Franconiz. Gerardus Linum silv. tenuifol. 1. & 2.

An Linum silv. angustif.
Clus.

An Clus. Hispan. Linum silv. 2. siue angustifolium?

Lin. fol. capit. cit.

An Trago Linariz species quarta? Caspar. Bauhinus phyt. Linaria 14. siue foliis capillaceis, tenuifolia H. Lugdunensis. Item, Linum 7. siue silv. angustifolium, flore minore primum.

Locus & Tempus.

Variis circa Viennam Austriæ locis spontè nascitur, præsertim in gramineis accliuatibus, & iuxta vias. Floret Maio & Iunio, interdum etiam tota Æstate: semen verò maturum est Iulio.

LINUM FRUTESCENS FLORE omninò candido.

CAP. LXXVI.

Descript.

Fruticosum atque dodrantalibus pedalibusque ferè ramulis semper virentibus præditum est, quos numerosa folia exornant, medix inter Thymi & Psyllij magnitudinis, subalbida, flores deinde superiori paulò maiores, quinque foliis vi illi constantes, omninò niuci, sum-
Tom. III.

mis ramulis insident, quibus succedunt capitula semine plena: radix dura & lignosa est.

Clusio descriptionis auctori dicitur in Hispan. Linum 3. siue silv. fruticans: In Hist. post. Linum silv. 7. fruticosum.

Exit desertis quibusdam Hispaniæ locis, Sole illustratis: floret Iunio & Iulio, atque subinde semen profert. In Belgio satum, tertio duntaxat à satu anno seriùs floruit, nec semen tulit.

Locus & Tempus.

LINUM SILV. ANGUSTIFOL. ALBUM: lineis in umbilico purpureis.

CAP. LXXVII.



Descript.

D Odrantales, nonnunquam etià pedales, habet cauliculos, graciles, firmos, rectos: folia latiusculi Lini, angustiora, dura, mucronata, virentia, amaricantia: flores in summis cauliculis multos, magnos, quinque foliis albis præditos, circa umbilicū quinque purpureis lineis distinctos, totidem staminibus, &

quinque separatis apicibus ex medio umbilico prodeuntibus, odoratos: semen in rotundis vasculis planum, nigricans, splendens, satiuo Lino simile: radicem candicantem, duram, aliquot fibris donatam, perennem, & singulis annis novos cauliculos proferentem, auctore Clusio, qui in Pannon. p. 303. & 304. Linum silv. 4. siue angustifolium flore albo cognominat: In Hist. post. Linum silv. 5. angustifolium secundum: flore ex diluta purpura candicante, & quasi carneo.

Synodi

Linum silv. florens observauit Monspeßuli mense Aprili & Septembri: Basilæ prope Krenzach Octobri: prope Leutach in monte Augusto: Linum silv. 6. angustifolium Clus. in Hist. post. primum observatum in anteriore Madritianæ silvæ parte, quæ secundo ab vrbe Luretia lapide distat, inter gramina, loco aperto, & nullis arboribus obfeto, florens Iulio, maturum semen profert Augusto: deinde agro Viennensi aridioribus gramineis locis.

LINUM SILVESTRE LATI-folium hirsutum flore cæruleo.

CAP. LXXVIII.

Ramus nobis datus Argentinæ anno millesimo quinquagesimo-nonagesimo quinto, ex plantis Agerij, cubitalis, satis crassus, firmus, hirsutus, in quo folia, semunciam circiter lata, paulò longiora, acuminata, pilosa
D d d

Descript.

venosa: flores extremis ramulorum, in quos superiore parte caulis diuiditur, hærent simul multi, Alceæ floribus pares, coloris cærulei, aut ex cæruleo pallescentis, quorum imum obuoluit foliaceus calix hirsutus: supremæ partes Heliotropii modo flectuntur. Anno 1600. nobis dati alii rami singulares, cubitum excedentes, sub inscriptione Lini siluestris latifolii floribus rubentibus, foliis & caule viscosis ex Sumano monte prope Bassanum oppidum & circa Bononiam. Huic Lino *caules & folia* hirsutiora, vnciâ longiora, acutiora, flores magni quidem, sed minores, purpurascens, saturatoribus lineis insculpti: in foliis sapor nullus manifestus.

Synon. Clusio Pannon. pag. 298. Linum silv. latifolium flore cæruleo: item pag. 299. ad figuram Linum silv. 1. In Hist. post. Linum silv. 1. latifolium: Lobel. Obs. pag. 226. Linum latifolium, foliis hirsutis, Tithymali Heliotropii paribus: Num autem hæc eadem sit planta cum Latifolio Clusii siluestri Lino Ascyri folio, affirmare dubitat. Icon. Plant. pag. 414. Linum silv. latifolium. C. Bauh. phyt. Linum 4. siue silv. latifol. flore cæruleo magno.

Locus. Frequens est multis Pannoniæ superioris & Austriæ inferioris locis editioribus & siccioribus, gramineis tamen. Floret Iunio & Iulio: semen maturum Augusto. Rantzius, qui Lini latifolii alpini purpurei titulo portionem nobis communicauit, in Baldo prouenire retulit.

Linum silv. latifolium lanuginosum, flore candido, purpureis lineis striato.

Descriptio Pedales, graciles, lanuginosos, ternos, aut quaternos ab vna radice promittuntur caules, in quibus Lini latiuscula folia trinervia, ad Ascyri formam ferè accedentia, nec multum à prioris foliis discrepantia, lanuginosa: extremi cauliculis in binos, aut ternos ramulos diuisi, & Heliotropii maioris quodammodò instar circumflexi, pleni sunt floribus, qui ab imo aperiri incipiunt, Lini florum diuisurâ, sed maioribus, superiori æqualibus, candidis, quos multæ purpureæ venæ interfecundant: semen & capitula Lini similia radix perennis est, crassiuscula, longa, candicans raris fibris sepra.

Synon. Clusio, descriptionis auctori, est in Hisp. Linum silv. 1. siue latifolium: In Pannon. pag. 295. Linum silv. 1. Hispanicum. Hist. post. Linum silv. latifol. secundum, sine icone.

Locus & Tempus. Apud Colibriam Lusitanæ urbem hanc stirpem duntaxat obseruare meminit Clusius, ad desertum quoddam & solitarium templum mense Nouembri repullulantem, è cuius cauliculis semen collectum in Belgicam attulit, quo terræ commisso, vnica planta nata est, cubitalem excedens altitudinem, & latioribus natali solo foliis, quæ singulis annis sub Æstatis finem quidem floruit, sed nullum semen præbuit.

LINVM LATIFOLIUM luteum.

CAP. LXXIX.

Descriptio. Linum latifolium luteum caulibus adolefcit angulosis, firmis, cubitum altis, pluribus ex vna radice ortis, & superius in ramos breues diuisis, quos folia vestiunt alternata, glabra, vnciâ

longiora, semunciam lata, in obtusum mucronem desinentia, sapore amaro prædita: flores numerosi extremis ramulis innascuntur, magni, è quinque foliis compositi, lutei coloris, quinque itaminibus, totidemque villis luteis, medium obsidentibus: semen, teste Clusio, in capitulis com-



pressioribus, reliquis paulo minus, nigricans quidem, sed non splendens, quemadmodum illorum: radix satis crassa, contorta, albicans, aliquot fibris donata, singulis annis repullulans, nouosq; caules producens.

Clusio Pannon. Synon. non. pag. 300. vocat Linum silv. latifolium flore luteo: pag. 301. Li-

num silv. 2. In Histor. post. Linum silv. 3. latifolium.

Tabern. Icon. & Hist. (vbi primum) Linum silv. Pannonicum: Cæs. Bauh. phyt. Linum, siue silv. latifolium flore luteo magno.

Gerardus ineptè pro Lino satiuo posuit iconem Lini silv. Pannonici Tabern. Gerardus latus.

Exit abundè in monte Badënsibus Austriæ thermis imminenti, locis gramineis secundum sepes, & plerisque aliis in montium illa serie ad Danubium vsque excurrente, locis: ad siluulam item Lachn. pago vicinam: Floret Iunio & Iulio: semen maturat Augusto.

LINVM LVTEVM NARBONENSE.

CAP. LXXX.



Descriptio. Ab vna radice surgunt caules, cubitales, qui superius in ramos diuiduntur, per quos folia mollicella, latiuscula, breuiora quam Lini satiuui, insipida: flores extremis hærent ramulis, Lini, sed coloris lutei, amaricantes, quibus succedunt capitula minora quam Lini satiuui, satis amara, semen continentia.

Monspeli

Montpelij iam descriptum Linum à nobis obseruatum, floreps Septembri. Verum ibidem in maritimis Autumno aliud longè maius obseruauimus, ad duos cubitos excrefcens & vltra, ramis crassioribus, firmioribus: folijs longioribus & latoribus, salsi saporis: floribus luteis, facillè deciditibus: capitulis amaris, sine fallugine.

Simile nobis prouenit Montbelgardi in horto Ill. E. C. excedens duos cubitos. Qui stirpiem diligentes indagatores haberi volunt, Montpelij obseruent, an sit differentia aliqua, vel varietas tantum ratione loci.

*Lin. gl.
M. sil. &
Dodon.*

*Linum
maritimum.*

Matthiolo in post. comm. vti existimo, est Linum siluestre. Sed & Dod. lat. in fol. Linum appellat siluestre, quod non satum, sed spontè exeat, & Maritimum Linum, quod maritimis gaudeat, in stamina diduci & istud posse credidit. Lobelio in Adu. dicitur Linum marinum luteum, quibus in Obs. pag. 225 & Icon. Plant. pag. 312. vox Narbonense additur. Cesp. Bauh. phyt. Linum 3. siue maritimum luteum. Cesp. hort. Linum silu. Matthioli latifolium flore luteo, in agro Bononiensi vbique proueniens. Haud procul à mari (inquit Dod.) in pratis ac herbosis locis, in nonnullis regionibus gignitur, veluti in Narbonensi Gallia.

LINUM PYMILVM FOLIS SEMPER
binis, albo flore, vel luteo
pallente.

CAP. LXXXI.

Descriptio



EXili, rotundo, dodrantalique, aut paulò maiore allurgit cauliculo, quem aduerso situ, ut in Hyperico, bina semper amplectuntur foliola, Lini satius folijs ferè paria: supremus cauliculus in aliquot ramulos diuiditur, qui in oblongis pediculis exiguos flosculos, quinque fo-

liolis albis constantes, proferunt, luteis intus staminulis: flosculis succedunt parua capitula, Lini vasculis non absimilia, minora tamen, in quibus semen: radix tenuis, aliquot exhibus fibris donatur, sed an perennis & rediuiua ignoratur à descriptore Clus. qui in Pann. p. 305 & 306. Linum silu. 3. siue Chamælinum Pannon. vocauit, & in Hist. post. Linum silu. 8. Chamælinum, & silu. 8. angustifolium, Lobel. in Icon. Plât. pagina 413. nomine Chamælini eandem cum Clusio habet iconem, quæ occasio, ut non separemus, quamuis in Obseru. pag. 227. ei alium colorem adscribat.

C. Bauh. phyt. Linum 9. siue silu. minimum flore & candido & luteo vidit.

Locus & Tempus. Prouenit in herbosis collibus & montanis Austriae atque Pannoniae: floret verò Iunio & Tom. III.

Iulio. Similem aliquando ad Clusium Machliniam, è Tornacensi vrbe Ioannes Moutonus misit.

ALSINE VERNA GLABRA. FLOSCVLIS
albis, vel potius Linum minimum.

CAP. LXXXII.



EX radícula tenui, sed rigida, exiguis, sed multis filis capitata, coliculus mittit nonnihil reptantes, mox humo ad palmum, aut alius sese attollentes, fastigio sursum ramoso, nuntante, teretes, tenues, geniculatos, propter terram rubescentes: foliola infima Alines mino-

Descript.
Radix.
Cauliculi.

Folia.

Flosculi.

ris sunt rotundata superiora, quæ in caulibus bina opposita ad articulos nascuntur. paulò longiora, sapore subamato & subacri: flosculi candidi, è quinque foliolis compositi, apertibus intus luteis: vascula succedunt Lini, parua, canaliculata, in quibus semen lucidum & lubricum, Lini, compressum & oblongum.

An Linocarpus Thalic? Cesp. Linum silu. exiguum in hortorum areolis sæpè prorumpens. H. Lugd. pag. 1234 Alsine verna: C. Bauh. phyt. Alsine 20. siue pratensis glabra, & Belvedere quorundam.

Alsine verna Dalechampii circa Geneuam in Locis & segetibus floret mense Martio: Montbelgardi in Tempus. prato sicco ubi olim fuerunt hortus serarum, ante pontem & passim Maio, Iunio, Iulio & Augusto.

PASSERINA LOBELII.

CAP. LXXXIII.



Folius est per caulem dodrantalem confertis, Lini similibus, viridantibus, acuminatis, vncialibus, circa superiora rarioribus: floribus in summis ramulis brevibus, acervatim congestis, luteis, quos excipiunt vascula exigua, turbinate, Lini, dimidiata, aut triplè minora, foliolis quibus-

Descriptio

Ddd 2

dam acutis vndique obuoluta, *semine* plena lubrico, lucido, fusco, multò Lini seminibus minore: radix satis longa, tortuosa, alba, lignosa.

Synon.

Lobel. in Icon. Plant. pag. 411. vocat Passerinam Linariæ folio, & sic etiam in Obseu. pagina 224. vbi & Chrysocomen alteram Muto. ni.

G. Bauh. phyt. Lithospermum 7. & Passerinam alteram Monspeliacam, non semper vno caule exfurgentem.


Locus.

Basilæ anno 1594. vidi plantam siccam apud C. Bauhinum, quæ et missa fuerat per D. Paschalem. Gener. lo. Henr. Cherlerus attulit Monspelio. Meminit Dom. Schvartz Passerinæ cuiusdam arborescentis Candix cuius semen ei missum per Casabonam. Nos nondum vidimus.

PASSERINA TRAGI.

CAP. LXXXIV.

Descript.



Lingux passerinæ nomen fecerunt foliola acuminata: auiculæ iam dictæ linguam imitantia, alternatim, rarius aduersa, cauli dodrantali & altiori recto, tereti, sæpè simplici, interdum ramoso, sine pediculis adnata, sapore viscido prædita, ex quorum alis *flosculi* plures pusilli oriuntur, calathisci formâ, ex herbaceo

fluascentes, oris in quatuor lacinias diuisis: *semina* parua, turbinata, nigra, Lithospermi seminibus multò minorâ.

Passerina Trago.

Tragus Passerinæ nomine depingit & describit, ac tertium Lithospermi, vel Milij Solis genus facit. in teque germanicè *vulden Aserhirs* vocat, & Dyospyron Theophrasti esse somniat.

Lobel. in Adv. Passerinam Herbariorum appellauit: Camer. hort. Passerinam Tragi: H. Lugd. pag. 1152. Passerinam, Linariæ folio Lobelij. Tabern. Icon. & Hist. linguam passerinam *Sparzen zung*: Dodon. gall. Lithospermum minimum Tragi, *Gremil sauage fort petit*: Casp. Bauh. Lithospermum 6. siue minimum Passerina dictum.

Locus & Tempus.

Prouenit Montbelgardi in agris, Augusto semine maturo: item inter Taillecourt & Audincourt, versusque Marthai castellum. Inter segetes Basilienses obseruauit Casp. Bauhinus: In agris Franconiæ inter Herbipolim & Francfurtum copiosè Camerarius: Inter oppidum *Alzeim*, & montem tonitru post messem in agris frumentariis Tragus.

LINARIA LVTEA VULGARIS.

CAP. LXXXV.



Priusquam Descrip. flores producat Linaria, aded Tithymalum cyparissiam mentitur, ut nisi lac deesset Tithymali, difficile futurum esset iudicium: tanta est foliorum similitudo: at flores in thyrtum digesti, ut vel primo intuitu ab errore prohibeant, qui huic posticâ parte corniculum Consolidæ regie proferentes,

anticâ parte Anthirini rictum imitantur, colore luteo præditi, apiculis concoloribus: repetitur interdum flore albo: *semen* in capitulis rotundis latum: *radix* lignosa, dura, alba: varias hinc inde fibras emittit, ac suo reptatu in hortis odiosa sapor plantæ amaricat.

Linariæ herbæ plura sunt genera, quæ singula seorsim recensenda. Vulgatissimam autem hanc Linariam à vulgari exigua Esula, cui plurimum propinqua, vel lequens discernit vericulus:

Esula lactescent, sine lacte Linaria crescit.

Existimatur a multis esse Olyris: sed Olyris ab *Olyris* hac differens est stirps, ex qua videlicet *aspyrata*, *h. e.* scopas hac ætate, in Italia componunt: ut & olim Galeni seculo: quam vulgò Itali *Belvedere* nuncupant.

Tragus Olyridis & Linariæ titulo eam donauit, & primo loco pro vulgari Linaria descripsit. *Olyris qui* Videtur autem ei hæc planta rectius Cynocephalia dici posse, quæ in Ægypto (ut prodidit Apion Grammaticus) Olyrites cognominatur, & aduersus veneficia à Magis vsurpatur.

Sed & Lobelius, qui in Ic. Plant. pag. 406. Olyridem, Linariam & Vrinariam (ut & in Obs. pag. 222. vbi etiam Chrysocomè Gesneri Dalech. vocat) inscribit, in Adv. Plinii Antirrhinum facit. Dodonæo etiam gall. & lat. Antirrhini species videtur, licet in Hist. gall. eam Olyridis: & in lat. Linariæ primæ titulo pingat. Fuchsi quoque constans est opinio Linariam esse Olyridem. Hunc tandem Adrian. Spieg. Ifag. lib. 1. cap. 23. sequitur: itemque Eut. Cordus, cui Herba vrnalis est hæc ipsa Linaria, contra vulgares Herbarios, qui has quasi duas distinguunt.

Cusio dicitur Linaria vulgò nota, & omnibus ferè prouinciis familiaris: Cameratio hort. Linaria vulgaris. Hist. Lugd. pagina 1151. Linaria vulgaris flore subluteo: Casp. Bauhino phyt. Linar. 1. siue vulgaris lutea flore maiore: varians floris colore, luteo-pallido, magis luteo, aliquando albo.

Ponit

Compil. no- Ponit Compiler Tabern. tam in Icu. quàm
taur. Hist. figuras duas, Olyridis maioris vnam, alteram minoris, nullo appposito discrimine, quàm magnitudinis.

Gerard. la- Gerard. ambas assumpsit, sed præter rationem
ph. exhibet pro Linaria Valentiz, eam quam Tabern. pro Olyride minore ostendit.

Dorff. re- Dorst. Olyrim, Linariam, quam Esulam adul-
prob. terinam vocat, & Herbam vripalem confundit, & commiscet. Non probamus autem cum p. 149. ponere duas icones pro Herba vripali & Olyride: & postea p. 173. eisdem locare pro Linaria & Olyride, ubi etiam non bene germani è, *vild vvolffs milch*, hoc est, Esulam filu & *Scheiffkraut*, hoc est, Cacariam vocat, siquidem non purgat.

Nomina Linariam Germani appellant *lynkraut*, *flachs-*
linguar. *kraut*, *vvald*, & *vild flachs*, h. e. Linum siluestre, vel etiam Pseudo-Linum: *harnkraut*, i. e. Vripalem, quæ vox magis propriè aliis plantis debetur *Unser frauen flachs*, vel *harr*, i. e. vt Pannoniæ mulierculas rhizotomas interpretemur, Diuæ Virginis Linum, vel capillū. *Nabelkraut* Herbam vmbilicæ, aut vmbilicalem. Multi *Gal Ritter sporen*, h. e. Consolidâ regalem luteam *kruten flachs*, h. e. Linum bufonum. Belgæ *vult vults*. Galli *Linare* & *Lin suauge*. Angli *code star*. Boh. *len mirky bozy* Hung. *Vad len* & *Vad frau*, Itali & Hispani Linaria.

Linariam autem dixerunt recentiores à foliis quæ Lini faciem referre videntur.

Locus & Nasctur passim in Germania ac Belgio locus
Tempus. agrorum margines, & aliis locis. Floret Iulio ac Augusto, ac etiam seriùs, vt Septembri & Octobri.

Vires & v- Vulgaris Linaria, alui turbatrix est, inquit Tra-
fus. gas. temperamenti humidi & calidi. Extrinsecus maiorem habet vsum, in iis quæ refrigerationem potius, quàm calefactionem requirunt. Aqua enim in linteolis imposita id præstat. Aquæ quantū vitrum exiguum capit, admixta drachma corticis ebulli in puluerem redacti, sumpta porio, vrinam potenter cit, quare hydropicis tantūmid medicamenti exhibendum erit. Eadem aqua distillata ac pota, aluum laxat, morbum discutit regium, aduersus quem herba ipsa vino decocta ac pota inprimis facit, sicut & iecur obstructionibus liberat. Aqua distillata aut succus oculis inditus, inflammationes eorum & ruborem tollit. Linaria, aqua eius, & succus, quæuis vlcera mundant, cuiusmodi sunt cancer, & fistulæ, linteolis imposita, & si cum aqua loci affecti colluantur. Succus idem maculas & vitia faciei emendat, quare superbis mulierculis, quæ puram & immaculatam faciem affectant, conuenit. Fuchsius vehementer errare eos scribit, qui Linariam frigidâ & humidam esse asserunt. Et certè vel hoc vno argumento erroneam illorum sententiam confutare omnium maximè licebit. Cum etenim Linariæ vrinam mouendi facultatem inesse scribant vulgares etiam herbarij, colligitur illam non esse frigidam & humidam: quādo Galeno lib. 5. simpl. c. 12. attestante, omnia quæ vrinam ducunt ex acrimia atque aded calidiorū & siccorum sint genere. Est igitur Linaria calida quidem & aliquantulum sicca temperie, & aperiendi potentia prædita, teste Dodonæo. Quod verò multi regio morbo laborantibus eam prodesse dicant, id ab Olyride huc translatum esse perhibet.

Linaria vulg. lutea, flore minore.

Alterum hoc Linariæ genus, iam descripto per Descript.
omnia simile est, nisi quod flores habet multò & Synon.
minores, subluteos, autore Trago. Et hinc C. Bauh. in phyt. nominat eam Lineariam 2. siue vulgarem luteam flore minore.

Hæc in agro VVormatiensi è regione oppidi Alzen inuenitur.

LINARIA LVTEA PARVA SERPENS.

C A P. LXXXVI.


Palmatibus exit virgulis, frequentibus, humi sparsis, quæ vellunt folia vulgaris-foliis similia: extremos ramulos occupant multi flores flui, vulgari minores, veluti in spicam congesti, quibus succedunt capitula minora quàm in vulgari, exiguo semine nigro plena: radix tenuis est & candida, vulgaris modo serpens.

Clusius, cuius descriptionem assumpsimus, in Synon. Hisp. nuncupat Linariam pumilam: In Hist. post. Linariam Hispanicam quantam. Hanc, quia valde amara est, & plerumque cum Chamæpiti nascens reperitur, adedque pumila est, Salmanticenses Chamæpityos genus esse censebant. Lobel. p. 223. vocat Linariam pumilam Clusij minorem, sed non ab similem: In Léon. Plant. p. 410. Olyridem flauam siluestrem: C. Bauh. phyt. Linariam 3. siue luteam pumilam lupinam.

Salmanticensi agro, aridis locis hoc genus pumilum inuentum ab auctore, vbi tota terè æta- te florebat.

LINARIA LVTEA PARVA ANNUA.

C A P. LXXXVII.



Magnitudine varia mihi crevit, aliàs seiquipal-
mari, aliàs plusquam do-
drantali, ex rad-
icibus paruis,
albicantibus,
pluribus: sunt
autem caules,
qui tenues &
numerosi exi-
stunt, & folia
quæ teneriora,
angustiora,
crassioraque
quàm in vul-
gari Linaria,
colore glauco,
terna, vel qua-
terna, aut qui-

na, ex certis intervallis, aliàs verò incondita, sub-
amato sapore: *stipuli* in ramulorum fastigiis, Li-
nariæ forma, crocei, sed quadroplo minores, odo-
re nullo, quos excipiunt globuli oblongi *semen*
continentes paruum, orbiculatum, compressum:
radix tenuis est & annua.

Clusius vocat Linariam Pannoniæ & vicina-
rum regionum secundam, & Morauicam pri-
mam.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. provenit ex se-

Ddd 3

mine Heidelbergæ in horto Sprengeri, vbi deciduo quotannis se propagat, collecto. Lutetia extra portam Honorii in arborum marginibus & colliculis collegit Gener Cherlerus Iulio: Clusius verò in variis Moravia collium accliuatibus: Floret quasi tota Estate, etiam in Autumnum vsque.

LINARIA PANNONICA FLORE LVTEO
minore quàm in vulgari.

CAP. LXXXVIII.

Descript.

Synon.

Locus.



EX plâtis ab Agetiomis ex Pannonia mihi delata pulchra hæc species floribus aureis, minorib. quàm in vulgari: foliis quinque ab illa differentibus, laticioribus & brevioribus.

Clusio, qui describit, est in Pannon. & Hist. post. Linaria Pannonica 1. (sic etiam Tabern. in Icon. & Hist. inscribit) siue maior. Gerardus inceptè Tabern.


iconem Linariæ Pannonicæ 1. quæ lutea est, pro Linaria purpurea altera pingit. C. Bauh. phyt. vocat Linariam 7. siue pallidam minore flore.

Crescit in montium decliuibus secundum publicas vias, & gramine nudis locis, supra Posoniũ ad Danubium, Gumpoltkirchen, Leytenberg, atque etiam in Moravia. Floret Iunio & Iulio, ac interdum etiam Augusto, & subinde semen profert.

LINARIA MAXIMA FOLIIS LAVRI
Dalmatica.

CAP. LXXXIX.

Descript.



Folia maxima hæc profert, & ad foliorum formam accedentia, vncias duas, aut etiam tres longa, vnciam quædam ferè lata, in summitate cauliũ semper breviora & angustiora, omnia autem in utrumque definentia: caules nulos, cubitales ac bicubitales, ramosos: flores luteos: magnitudine Anthirini maioris.

C. Bauh. phyt. Linaria 19. siue Americana. An Camer. hort. Linaria altera flore maiore & magis luteo?

Montbelgardi in horto Ill. E.C. & meo ex se- Lotus mine mihi prouenit.

LINARIA TRIFOLIA.

CAP. XC.



Nihil mi- Descript.
nusquam Linariæ folia habet, quæ per ramos pedales & longiores, crassiusculos, succulentos reteres, inferiore parte rubescens superius viridæces, ex certis intervallis pulchrè disposita, ex eodem loco terna caulem amplexantia, potissimum parte inferiore, circa fastigium enim sparsim nullo ordine

digeruntur: accedunt ea verò nonnihil ad Fabæ inuersæ folia, quibus minis crassa, succulenta, minime tamen per ambitum incisa, circa exortum latiuscula, in obtusum definentia, pari ferè latitudine cum longitudine, sinuatis nervis, ad modum ferè Plantaginis, posticâ parte minime apparentibus, donata, acetabuli instar concava, caulemque aquam exceptam continentia, sapore amaricante: Verùm flores serie longâ dispositi, Linariæ vulgaris similes sunt, lutei, tinctori tamen labello & rictu lanuginoso, corniculo purpurascente extra folia visidantia, quæ floribus basin ambiunt, porrecto: floribus succedunt capitula rotunda, in quibus semen, quod nobis videre non contigit: radix subest singularis, crassiuscula, caules plures emittens.

Clus. in Hist. inscripsit Linariam Valentinam: In Hist. post. Linariam Hispanicam 1. Lobel. in Obs. p. 213. & Icon. Plant. p. 408. Linariam Valentinam Clusii.

Casp. Bauhini in phyt. Linariam 4. siue luteam C. Bauh. nov. folio Centaurii, & Linariam 5. siue luteam latifoliam peregrinam, Linariæ latifoliæ Valentini Clusii nomine à Doldio missam: duas non facio distinctas, sed vnâ, culturâ tamen variantem.

Circa Valentiam Hispaniæ in pratis & locis Lotus umbrosis Martio florentem obseruauit Clusius. Montbelgardi verò in horto Ill. E.C. VV. prouenit, florens Iulio & Augusto, semen verò maturans Septembri.

Linariæ nomen huic idem indidit, non à foliorum similitudine, quæ non conueniant, sed quia eius flores vulgari formâ similes, & eiusdem ferè temperamenti sunt, nam commundata manifestam acrimoniam, cum quadam amaritudine coniunctam exerit ipsa planta.

LINARIA

LINARIA ODORATA
Monspelulana.

CAP. XCI.

Descript.



Rectis & rigidis stat caulis, bicubitalibus, iuxta terram rubescentibus, quos Linariae vulgaris folia angustiora, denso stipatu ornant, sapore amaranthaceo: summum caulis fastigium in surculos aliquot abiecit, qui flores sustinent eodem quo in Linaria vulgaris dispositos ordine, calcari longè breuiori,

& parum apparente, quàm in te differunt à planta Linariae aliquatenus simili, sicuti & in eo quod flores sunt maiores, odore gratissimo, superiore folio pallido, purpurascens stris variegato, inferiore in tres lacinias albidas diuiso, rictu lanuginoso, amethystino croceoque colore picto: semina parua in vasculis subrotundis, herbae Linariae iam dictae similibus, sed maioribus, sapore, ut mihi videtur, adstringente: radix viuax in latus serpit, colore candida. Flores in figura hic exhibita minùs bene expressi sunt.

Caryophyllata.

Camer. in horto vocat Linariam flore albicante, & ob odorem, quem spirat, Caryophyllatam, atque radicibus admodum se propagare, & diu durare in hortis.

Lin. odorata H. Lugd.

H. Lugd. pagina 1151. Linariam odoratam vocat flore ex caeruleo albicante, suauissimè olentem.

Clus. no. 1111.

Clus. in Hisp. & Hist. post. Linariae odoratae nomen pingit, & describit tantùm flores: cetera sunt alterius plantae, nempe Linariae folio Bellidis: miror eum in Hist. post. non emendasse errorem illum, & veram Linariae odoratae figuram posuisse.

Locus & Tempus.

Ex semine à Zvingero misso Linariae albae nomine prouenit Montbelgardi in horto Ill. E. C. insigniter repens: reposita Hiemem perfert, florèscitque Iulio, Augusto, & Septembri: minùs verò odorata est, quàm Monspelij proueniens.

LINARIA ALBA, VEL ALBICANS
INODORA.

CAP. XCII.

Descript.

OSyridis albae, ut Lobel. in Icon. Plant. p. 408. inscribit, descriptionem nullam adscribimus: quia eam nondum apud quemquam reperimus, nec ipsi etiam plantam, quantum recordamur, obseruauimus. C. Bauh. phyt. vocat Linariam 6. siue albo flore. An Camer. in hort. Linaria flore albicante, inodoro, sed eleganti, & penè æqualis magnitudinis, &c. vide antè.

LINARIAE ALIQUATENVS SIMILIS,
folio Bellidis.

CAP. XCIII.



EX vasculo-
rū & superio-
riorū foliorū ar-
gumento in Li-
nariae classẽ
refero: radix
subest crassius-
cula, lignosa,
alba, contorta,
simplex, inter-
dum multifida:
ex qua germi-
nant multa per
terram sparsa
folia, serè Belli-
dis maioris aut
Agerati, profun-
dè in ambitu
terrata, glabra,
amara, reliqua
per ramos te-
nuia, angustissi-
ma, longiuscula: caules ex radice statim plures
oriuntur, cubitales, teretes, multum ramosi: quos
serè totos vnâ cum ramis ornant longa serie flo-
sculis ex foliorum sinu prodeuntes, exigui admo-
dum & quodammodò hiantes, partim caerulei,
partim albi, nullo calcari donati: vascula dela-
pso floribus succedunt, multa, parua, subrotun-
da, & veluti bipartita, quibus semen clauditur co-
piosum, minimum, subruffum, amarum.

ma, longiuscula: caules ex radice statim plures oriuntur, cubitales, teretes, multum ramosi: quos serè totos vnâ cum ramis ornant longa serie flo- sculis ex foliorum sinu prodeuntes, exigui admo- dum & quodammodò hiantes, partim caerulei, partim albi, nullo calcari donati: vascula dela- pso floribus succedunt, multa, parua, subrotun- da, & veluti bipartita, quibus semen clauditur co- piosum, minimum, subruffum, amarum.

Compiler Tabern. non contentus assu-
mere figuram Osyridis odoratae purpureae, vol. no. 1111.
riechend purpur harnkraut, compositam ex
duabus plantis, confundit cum tertia. Gerardus
quoque imitatus Tabern. habet figuram falsam
ex duabus compositam, confundens cum duabus
plantis etiam tertiam.

Descriptio Clusij Linariae odoratae conueniret Clus. 1111.
plantae à nobis descriptae, si non diceret florem
habere hamulum incuruum: sed & flores in cal-
caribus non conueniunt, nec etiam titulus odo-
ris. Quare existimo vnâ descriptione & vno titu-
lo duas plantas esse ab ipso traditas. Miror au-
tem, eum in Hist. post. meliorem iconem non ex-
hibuisse.

Vnius nostrae plantae H. Lugd. duas habet figu-
ras, quarum vna extat pag. 1151. Linariae caeruleae
Dalechampij titulo, cui folia adscribit proximè
radicem Bursae pastoris, caulem verò vestitum fo-
liis Linariae similibus, angustioribus, florem ex
caeruleo albicantem. Alteram ibidem inscripsit
Linariam odoratam Dodonaei, cui folia Bellidis.
Haec autem figura ex duabus diuersis composita
est: folia enim inferiora Bellidis forma rectè pin-
guntur, superiora verò non item, quae oblonga
esse debent, angusta, lino similia, ut in descri-
ptione nostra habetur: flores etiam in viuâ plan-
ta corniculis destituuntur: quare ex planta viuâ
Monspelij collecta nouam figuram damus. Et hic
error à Clusio prius commissus à me obseruatus,
quod indicare debebat Frater in Animadu. suis in
H. Lugdunensem: Is eius in phyt. non meminit:
nec etiam ostendit Linariam caeruleam Dalecham-
pij esse summitatem Linariae odoratae Dodonaei:
& vicissim, Linariam odoratam Dodonaei esse in-

feriorem partem *Linariæ cæruleæ Dalechampi*, sed male duas diuerſas plantas conſtituit. *Linariam* odoratam Cluſii, ſiue Dodonæi vocat *Linariam* 8. ſiue purpuream Bellidis folio : *Linariam* cæruleam Dalechampi, *Linariam* 13. ſiue cæruleam anguſtifoliam. Frater igitur qui ſecurus eſt meam opinionem, non animaduertit in H. Lugd. vnius plantæ duas dari icones.

Zeit. m. præ.

Lobel. in Icon. Plant. p. 407. inſcribit *Linariam* purpuream odoratam. Miſet autem cum hanc figuram incommodam aſſumpſiſſe : præterea purpuream odoratam cognominare, ac in Obſ. p. 222. ad Aduerſaria referre, cum ibi non fiat vlla mentio *Linariæ* odoratæ : & Cluſius loco proximè citato addat, in calidis regionibus aliquantulum duntaxat eſſe odoratam, in Germania verò & Belgicis hortis inodoram, & *Linariæ* purpureæ ſtorem nonnihil æmulari : *Sefamoides* maius *Salmanticenſes* nuncupare, quamuis deſcriptioni non conueniat.

Locus & Tempus.

Montpeſſuli florentem & ſemina matura ferentem reperi menſe Octobri in montibus circa Elperon & Gangen. Eadem menſe Iulio mihi occurrit in agris inter Valentiam & Lugdunum. Gigni in aridis, ſquallentibus & apricis : florere Maio deſiciente in H. Lugd. perhibetur.

Reſertur apud eandem H. Lugd. vlcera ſordida purgare, lumbricos interficere, obſtructiones expedire.

LINARIA PURPUREA MAGNA.

CAP. XCIV.

Deſcript.



Sesquicubitalis eſt lōga, nigra, contorta, lignoſa radice caulem emittit, cumque teretem, glabrū, firmū in ramos prælongos diuiſū, foliis ornatum longioribus, latoribusque quàm *Linaria* lutea, ſapore nullo euidente: ſtrobili longâ ſerie per ramos naſcuntur, antrorſum hiantes, poſticâ parte calcar promittentes, colore purpureo præditi, minores multò quàm *Linariæ* luteæ: ſemen in vaſculis paruis bifidis continetur.

Linaria altera Dod.

Dodon. in Hiſt. lat. *Linariæ* alterius nomine deſcribit, dicens in lib. de Florib. flores habere in cæruleo purpureos : in ſol. verò lat. purpureos: viderique ſibi ſpeciem *Antirrhini* : ſed nullibi depingit. Lobel. in Adv. *Linaria* purpurea, vt fruticoſior ſic elegantior multò & rarior. Eidem in Obſ. p. 223. & Icon. Plant. p. 407. *Linariæ* purpureæ varietas.

C. Bauh. phyt. vocat *Linariam* 9. ſiue purpuream maiorem, *Oſyridem* alteram Dodonæi, & *Linariæ* purpureæ varietatem Lobelii, variantem

floſculis purpureis, purpureo-violaceis, albis & cæruleis : foliis item latoribus & anguſtioribus: Item, *Linariam* 13. ſiue cæruleam anguſtifoliam, & cæruleam Dalechampi. An verò Dalechampi ſeparanda ſit à Lobeliana conſiderandum. An Camer. hort. eſt *Linaria* flore cæruleo?

Genevæ florebat in horto meo Iunio, Montbelgardi Iulio : Stutgardie in horto Ill. C. *Linaria* violacea magna Iunio.

Tempus.

LINARIA PURPUREA PARVA.

CAP. XCV.



Subest radix ſtoruoſa cū fibris longiuſculis: caules cōplures, palmares & maiores, in terram reclinati, ramiſi, foliis amicti veluti ex geniculis, modò ſingularibus, modò ternis aut quaternis, vix quadrantem vnciæ æquantibus anguſtis : extremis ramis flores multi congeſti herent *Linariæ* vulgaris, minores, longis calcari-

Deſcript.

bus præditi, cæruleo-purpurei, folio ſuperiore bifido, apicibus in riçtu luceis, concolori etiam labelli portiunculâ penitior: ſuccedunt vaſcula penè rotunda, calyce ex quinque foliolis excepta, quæ continent ſemina longiuſcula compreſſa, qualia ſunt *Alyſſi* Dodonæi.

Cluſ. in Pannon. pag. 307. & 309. vocat *Linariam* Pannonicam 2. ſiue Alpinam pumilam : In Hiſt. poſt. *Linariam* 3. *Stiriacam*. Tabern. *Linariam* Pannonicam. 2. *Vngeriſch Lankraut*. Gerard. *Oſyridem* albam vobis tunc flaxe. An verò iconem Tabern. legitimè albam faciat, conſiderent lectores. Imago apud H. Lugd. pag. 151. *Linariæ* minoris Dalechampi, quod folia inferiora attinet, non in omnibus placet : C. Bauhin. phyt. eſt *Linaria* 10. ſiue pumila ex violaceo purpureſcens. An Geſn. hort. *Linaria* Alpina minor? An Camer. hort. *Linaria* flore cæruleo, in aruis reperta, ſemè *Antirrhino* minimo ſimilis, & vt exiſtimat, tantùm annua?

Genevæ circa fluuium *Arne* floret menſe Maio : in monte Thuri loco arenoſo & decliui ad meridiem ſito, menſe Iunio. Reperi eandem in Narbonenſi Gallia apud tres pontes inter Nemaufum & Avinionum. Cluſius inter ſaxa & præcipitia montium Auriæ collegit, ac in horto coluit.

Locus & Tempus.

LINARIA PARVA PURPUREA, foliis ſine ordine diſpoſitis.

CAP. XCVI.

Tennes & humi diſfuſos habet cauliculos, valdè frequentibus, anguſtioribus, ſine ordine

Deſcript.

dine dispositis, crassiusculis, & coloris caeli *foliis* obfatis, in plures alas nonnunquam diuisos, quarum fastigium occupant multi, spicæ instar confertim nascentes, *strobili*, colore superiori ferè similes, sed multò minores: quibus succedunt parua *capitula* *semine* plene, de cuius forma & colore nihil asserit Clusius; quandoquidem fibrentem, & capitulorum rudimenta duntaxat præbentem in Moravia collibus inueniebat: *radix* multis fibris constat, & perennis apparet.

Clusius, cuius descriptionem damus, intitulat *Linariam* 4. & *Morauicam* secundam. Lobelius Ada. & Icon. Plant. p. 416. Oxyridem purpureo-cæruleam repentem. C. Bauh. phyt. *Linariam* 11. seu purpureo-violaceam repentem.

Meminit idem Clusius *Linariæ* tenellæ ex purpura nigricantis, v. & *Linariæ* parue carnosis foliis, floribus cæruleis ad cinereum tendentibus.

Linariam Hispanicam quartam Clusii, siue *Linariæ* Hispanicæ quantum genus Clusio primū videre contigit anno 1590. in cultiss. horto Illust. Principis Cattorum Vilhelmi: semine peregrè misso natum Cassellis, Augusto mense suo flore onustum, & maturum semen in vasculis continens: Semine inde accepto auctori data sequenti anno, totâ Æstate & Autumno floruit, & maturum semen tulit.

LINARIA CÆRVLEA, CALCARIBVS longis.

CAP. XCVII.

Descriptio.



herbacei coloris, angustis, longisque foliolis basin suffulgentibus. *vascula* minora, quam *Linii* vulgaris.

Gener Cherlerus attulit collectam in Italia in viis prope Viterbam.

LINARIA ODORATA MONSPES- sulana minor cærulea.

CAP. XCVIII.

Descriptio.

*D*odrantalibus & breuioribus ex *radicula* fibrosa mox ortis *caulibus*, tenuibus, rigidis, quos *folia* vestiunt rara, alternatim ex longis interuallis, sili instar tenuia, semuciâ longiora, *flores* in cæcurne serie quadâ sibi inuicē succedūt. *Li-*
Tom. III.

nariz odorata maioris, cærulei, calcari longo præditi. Icon est in præcedenti tabula.

LINARIÆ SIMILIS.

CAP. XCIX.



*R*adix nixa Descriptio.
lignosa, satis crassa, modò simplex, modò in capita plura diuisa: *caules* statim è radice plures emittit, palmares, aut etiam cubito longiores, ramosos, & non ramosos; angulosos: per quos *folia* *Linii*, glauca, longa, angusta: ex quorum sinu in ramulorū summitate *strobili* emergunt parui, quos sequitur *vascula* parua.

Huic similis admodum est, si non eadem, Anonymos *Linii* folio Clusii, quem sic describit: Pedales habet *ramulos*, duos, ex viridi pallescentes, & in his multa *folia* temerè sparsa, nulloque ordine disposita, dura, angusta, longiuscula, *Li-*



ni foliorum æmula, eiusdē cum ramulis coloris, qualis in Ruta montana elucet, h. e. ex viridi pallescente, gustu nonnihil acido primum, deinde amicante: extremi *cauliculi* in multos ramulos siue pediculos diuiduntur, qui *strobilos* albicantes sustinent, quinque foliolis stellatim decussatis, constantēs, cum aliquot interioribus staminulis, qui tandem in singularia *semina* efformantur, pentagona, duro corio siue putamine medullam albam continentia: *radix* candicans, multirida, perennis & viuax, annuatim nouos ramulos, siue virgulas producens: nonnunquam etiam serpens, *Linariæ* repentis instar.

H. Lugd. p. 1150. figuram proponit plantæ, quæ intitulat Anthyllidem montanam, quæ multa habet communia cum nostra planta.

Caspar. Bauhinus phyt. Anonymon *linifolium* Clusii; *Linariam* 15. siue montanam *strobilis* albicantibus cognominauit, & eandem cum Anthyllide montana Historiæ Lugdunensis fecit, qua de re nihil certi pronunciamus, sicut neque

E e e

an eadem sint cum nostra Linariæ simili.

An Tabern. in Icon. & Hist. dicitur Linaria adulterina, falsch linfraut? An Gerardo Linofyris nuperorum Dusch tode flare.

Locus &
Tempus.

Linariæ similem variis in locis obseruari, utpote Geneuz, Basileæ, in monte prope Birsbeck, & Montbelgardi. Anonymos Lini folio Clusii copiose nascitur editionibus herbosisque locis agri Viennensis: tum etiam herbosis collibus Polonio vicinis, in accliuitate Hamburgensis montis, quâ Altenburgum spectat, aliisque præterea plurimis Austria & Pannoniæ montibus, etiam interamnibus ultra Drauum. Floret Maio. Meminit & Clusius Madritianâ siluâ, secundo ab vrbe Lutetiana miliari colligere, sed longè exiliorem.

LINARIA BELVIDERE DICTA.

CAP. C.

Multum fibrosam radicem habet, & perquam surculosa planta, rigidula, sed fragilis: folia quam vel Lino, vel Linariæ vulgaræ longiora, frequentiora, incondita, sapore subamaro: flosculi secundum caulem & alas herbaei, obrutum præ paruitate propemodum fugientes, vel etiam purpurei, quibus succedunt exigui loculi, in quibus semen.


Descriptio.

Linaria Belvedere dicta.



Iconis.

Belvedere altera icon.



Tres figuræ, quas ponimus, sunt ex iis, quæ paratæ erant, quasque emimus.

Dodon. de Floribus huius Linariæ meminit, cum ait Campanulam hortensem maiorem [Campanulam ceruleâ Rapunculo similem, vel angustifoliam] plerique Belvedere nuncupant: sed Italia Belvedere, Græcorum est Osyris, cum qua Campanula nihil omnino habet similitudinis. In fol. lat. pingit & describit Osyridis titulo, eamque à Linaria, quam multi Osyridem faciunt,

distinguit, ut ex qua videlicet *osyris*, hoc est, scopæ hac ætate in Italia componantur, cen & olim Galeni seculo. Apud Italos *Belvedere*: in Græcia modò *osyris* dicitur, voce corruptâ, teste Anguillara: nam olim *osyris*: Latinis quoque Osyris nominabatur.

Hanc, quam Dodonæus Osyrim esse existimat, Gesl. hort. *Belvedere* Ital. & *Beluidere* Italicorum vocat: item Scopariam aliquorum, ac aliorum Herbarum studioforum.

Lobel. in Adv. cap. de Osyride, ostendit descriptioni Osyridis minus convenire Scopariam, *Beluidere* Italicorum [ita in Adv. proprio capite, inque Obs. p. 223 inscribit] in Icon. Plant. p. 409. Scopariam & Osyridem Græcorum Dodonæi inscribit: Tabern. in Ic. & Hist. Herbarum studioforum, *Scudenter* fraud: C. Bauh. phyt. Linariam 18 siue Scopariam: Gerard. Scopariam siue Osyridem Græcorum: Item Hyslopum albis floribus. Quamvis autem Gerardus aliquam in floris colore differentiam assignet, tamen Linariam Belvidere repræsentat. Tabern. quoque licet pro Satureia Romana 1. eam iconem dederit, tamen nec vlli Hyslopo, nec vlli Satureiæ competit.

An Linaria Belvidere effigies 3.

Geneuz in Locus & Tempus.

ne deciduo prorumpit Aprilis, vegeta Maio. Lugduni & Montbelgardi Iunio & Iulio in vigore. Plerisque Græciæ locis spontè gigni: Æstate virere ac vigere: sub Autumno semen maturare, author est Dodon. Non perinde bellulam hanc aut speciosâ re, atque Italico nomine, propter raritatem exoticam apud Italos in

hortis & pensilibus figulinis vasis ali solitam, hodie perquam vulgatam pronunciat Lobelius.

Beluidere in arborem formatur altitudinis hominis, cuius pulchritudini iungitur gratus color viridis: folia similia Hyslopo: ex India retulerunt: propagatur semine & radice: à frigore facillè læditur, ideo serenda ad meridiem, ut tuta sit ab Aquilonio vento, & tutius in vasis terreis, aut cistis. Ex hac in Theatro Agr. de Serres scripta reperiuntur. Ego tamè haud crediderim radicib. posse propagari: annua siquidem herba est, quæ ad radicem nullos oculos habet ad propagationem aptos: itaque potius ex solo semine deciduo se propagat, ut etiam Montbelgardi experti sumus.

In Arborem formatur.

ANTIRRHINVM VVLGARE.

CAP. CI.

Nvllam ferè humum spernit Antirrhinû, & ex parietinis siccisq; maceris in cultus solû descendens, & hinc illuc translatû, de fecunditate haudquaquâ remittens: radice lignosâ, albâ: caulis

Descriptio.



lo trifido antequam in lacinias diuidi incipiat
nonnihil lateo, fimbriâque villosâ donato: pe-
ricarpia simitæ aut vituli calvariam egre men-
tiuntur, in quibus *semen* pusillum nigrum.

Anti-rinco
Das terreda
Lychau film.



Aspirin
2 lbs.

Amblyini vulgaris Icon. 3.



gloriam consequi creditur. Verū Diocoridi cum
Tom. III.

caulis pluribus, cubitalibus, sequicubitalibus & altioribus, intus iuncæ medullâ fardis: *folia* ferè alternatim exeunt, Leucij lutei, quod Cheiri vocant, sapore subacri: *flor*es in summis scapis in thyrsi morem dispositi colore carneo albo, oblongi, ritum leoninû exprimentes, bindo folio surrecto, label

Antirrhinum si-
ue Anarrhinum,
quod aliqui etiā
Lychnida silue-
stem vocauerūt,
Dioscoridi herba
est caule, foliisq;
Anagallidi simi-
lis: floribus Leu-
coij, minoribus
tamen, purpu-
reis, idē etiā
silvestri Lychnis
nominata est.
Fructum verō ge-
rit vituli narium
similem, aspectu
russcum.

Antirrhinon
vocatur (inquit
Plin.lib.25.c. 10.)
siue Anarthrinon,
siue Lychnis a-
graria, similis Li-
no, radice nulla
(minimâ, Gaza-
pud Theoph. l. 9.
hist. cap. 21.) flore
Hyacinthi, semi-
ne vituli narium.

Dioscoridi & Plinio dictū Antirrhinū, Theophr. loco proximè citato, Antirrhizum nominatur, vtilis herba ad gloriam comparandam, Aparinę similis: radice nullā. fructui insunt tāquā nares vituli, quo perūctogratia, vitęq;

Plinio cōuenit in nomine, ita ille in descriptione, dissentit tū à Plin. tū etiam à Theophrasto. Plin. namq; tribuit Anthirrh. folia Lini, rectiori similitudine, quàm Diosc. Anthirrh. folia & caules Anagallidi comparat. Hermolaus autē corruptè apud Plinium pro Aparine, Linum eo loco scribi putat. At verò quæ affinitas Anagallidi, ut Dioscorides compareret, cum Aparine, aut Lino?

Quod à Plin. describitur copiosè in Anglia, au-
thore Turnero, nascitur in segetib. primo aspectu
Lolio simile est, quoad florè, partim etià folij co-
lore accedit, quod maius & longius est Lini foliis,
formâ tamen non ita absumile. Hæc herba possit
Angl. dici *Calfs Smoort*. Antiichinò autem à
Dioscor. descriptâ, in Anglia non prouenit, quod
quidè Turnerus uiderit, nec vllâ adhuc plantâ se
uidisse ait cui Diosc. descriptio cõueniat, nullâq;
etiâ quæ rheophr. descriptioni possit accommodari.

Græcis igitur *δριββον*, & *δριββον*, si non vi-
tiosū Theophr. exemplar. & *δριββον* dicitur Latī-
nis similiter Antirrhinum. Auctore Galeno etiā
βερβον, & *Lychnis agria* siue siluestris, *λυχνίς ἀ-
γρία* nominatur. Apuleius etiā *αυθις γ. πιδάκτος*,
κυνοκεφάλιος, Canis cerebiū, Herbam Siminiam,
Vennitā minorem, & Opalim gratā appellari re-
fert. Creditur quoque esse Leo herba, quem inter
flores Columella lib. 10. refert, sic scribens:

Narcissique comas, & hiantis sana Leonis

Ora feri. Item & infra: *Officiat & Leo. Os Irenia.*
us sententia videtur fuisse Catalpinus, qui Catalp.

Et huius sententiæ videtur fuisse Cæsalpinus, qui Anthirrinū, Os leonis vulgò, appellari prodidit, herbam foliis Linariæ, florib. capitulis effigie canini capitis, in mœnibus Eloquentiæ copiosam: Equandâ in præruptis scopulis, foliis breviorib. latiusculis, tuberculatis, florib. pallescentib. Aliam in montib. similiore Linariæ, recticaulē, flore cæruleo: In vineis quoq; recticaulē, flosculis purpureis. Et has omnes Pliniū intelligere credit, appellantē herbā Cynocephaliā, quasi caninū caput, quā in Ægypto Olyritem vocari dicit, diuinā herbā, vt Appion Gramaticus asserēbat, & contra omnia venēficia: Meminisse & Canini capitis in Psyllio. Dioscoridē tam quæ roseo flore constat, Chamæpeuceū appellare quasi humilem Laricem, quo in loco deprauati quidam codices legunt Chamaleucē: Plinium tamen Chamæpeucen quoq; legere. Esse qui ad Antirrhinon has referāt, quod à Plinio tribuantur folia Lini Antirrhino: Olyritim dictam videri apud Ægyptios: quia ob similitudinem capitis vitulini dicata sit eorum Deo, vt bos.

Gesnerus contrà, Leonem Columellæ, Aquileiam esse existimavit, quam ea de causa Leonrostomium nuncupavit: sed hoc nominis Antirrhino maiori (cui de hort. flores luteos, albos, rubros & roseos adscribit) magis convenire, quàm Aquileiz, Dodonæo videtur. Nam Antirrhini hians flos, leonis rictum citius, quàm Aquileiz refert. Est verò & alius Leo, qui *εσπερίος* & leguminum Leo dicitur, alio nomine Orobanche: de quo suo loco egimus. Est & alia Amethystos herba, cuius Plutarchus meminit, *κράμνη* videlicet: de qua alio loco agitur.

Antirrhinum quod à floribus dictum vitulini
vel Leonini oris æmulantibus, potius Leonto-
stomos nominandum censuit Marantha, Ger-
mani Secrefkraut / Brackenhaupt : hœndes
fopff, hoc est, caput canis, *albesopff, id est, Ca-
put vituli, kalbonate / Nasum, vel Nares vituli,
Löwenmaul Os leonis, & Draut / cum Bel-
gis appellant, quàm aptè consule Turnerum.

Antibiotic-
ness Plus
Turners.

Bucranion?
Lychnis silu.
Amethystom.
Pistacia.

Lee.

Os. lewis.
Calalp.

Leo Columbi-
la est Aquiz-
leia Gofur.

Nomina
Lecithæmæ.
Caput caput.
Caput vitæ.
Najus vna-
li.

Galli *Mouron violet*, & *Oeil de chat*. Itali *Antirrhino*: Hisp. *Veserra yerna*, & *Cabeza detenera*: Angli *Calfes Inoere* / vel *Snap dragon*: Bohemi *Hledok*.

Synon.

Lobel. in Icon. Plant. vocat p. 404. Antirrhinum, vulgò Caput canis, & Caput vituli Apulei, Cynocephalin: Item Anthirrhinum floribus luteis. Hort. Lus. Antirrhinum maius purpureum satium, Schvvenkf. Antirrh. maius, a *trippor* Dioscoridis flore varians, incarnato, candido, luteo.

Icones.

Figuræ Fuchsianæ quas posuimus non multum placent, verum iam sculptæ emptæ erant. Matth. in post. comm. & Hist. germ. picturas duas Antirrhini exhibet, nempe primi & secundi, quæ qua in re differant ab invicem, ex figuris colligere non possum, nec etiam ex eius verbis, cum omnia Antirrhinorum suorum genera distinguat tantum coloribus.

Camer. in Matthioli Hist. germ. & Epit. duas habet Anthirrhini figuras, nomine primi & secundi, cui flores ex purpura albicantes, seu incarnatos, & rictum luteum adscribit. Idem in Hort. vocat Antirrh. maius flore roseo, in agro Montpellierensi & Nemaufensi. Item Antirrh. flore incarnato, luteo, candido: Adhuc, Antirrh. pulcherrimum flore luteo grandi, spontè inter Saonam & Genuam.

Lobel. in Adv. Antirrh. florib. purpureis, ex rubro violaceis, vel roseis & albis: Item Antirrh. luteum foliis latiorib. brevioribus.

H. Lugd. 3. icones.

H. Lugd. pag. 1340. huius plantæ figuram habet sub titulo Antirrhini 1. Matthioli. Alteram pag. 1341. sub inscriptione Antirrhini magni Dodonæi. Et tertiam pag. 330. pro Cynocephalo Plinij.

Tabern. 3. icones. Antirrh. ignotum.

Tabern. in Icon. & Hist. Antirrhinum: Item, Antirrh. album: Et Antirrh. luteum.

Antirrhinon quid sit, fatetur se ignorare Bachanellus, Sed & Anguillara Antirrh. Diosc. non novit: Theophrasti verò & Plinii in Italia nomine *Cazugelli* passim notum affirmat. Quamvis autem vnius tantum meminisse videantur Veteres, Recentioribus tamen plures sunt differentie.

C. Bauhin. not.

C. verò Bauhini in phyt. Antirrhinum 1. siue maius rotundiore folio: Et Antirrh. 2. siue maius alterum folio longiore, quod flore roseo haberi ait, rubente, aliquando maculato, ex candido dilutè purpurascens, & candido: Itemque Antirrh. 3. siue luteo flore: ad vnum hoc vulgare Antirrhinum referimus.

Ceterum inter Antirrhina numerantur, & Antirrhini nomine sequentes insigniuntur plantæ. Antirrh. angustifol. sylvestre. Antirrh. minimum. Antirrh. fol. serrato. Linaria. Linar. purp. maior. Linar. odorata. Linar. Valentina. Lutea. Alline fol. serrato. Hyppoglossum. Cyanus. Hippuris.

Antirrhini vulgaris lutea & sem. pin.

Ceterum, planta quæ solet Antirrhinum vocari copiosè provenit in via quâ itur ad sylvam Aigremont, & aliis in locis: Basileæ in horto D. Plateri & patris mei floret Augusto, & Septembri semen maturat. In horto Ill. E. C. mihi provenit purpureo, vel roseo, albo, & luteo, ac etiam mixto colore. Ex his purpureum Antirrh. occupavit muros, & Hiemem perfert: præterea deciduo semine, quamvis non annua herba sit, se propagat, florens Iunio & Augusto. In arvis & collibus Matthiolus reperit: Camer. in Italiis & Galliis, præsertim Prouinciali & Narbonensi inter

Oliueta. In hortis, inquit Dodonæus, apud Belgas, Italos, Germanos & alibi feritur, & Maio mense, quod Hiemem superavit, & reliqua deinde Æstate, floret: serius verò & sub Æstatis finem, eiusdem anni Vere satum. Hiemem autem nisi clemens admodum fuerit, aut in cellis viniis repositum, absque iniuria in Belgio non sustinet, Dodonæus.

Antirrhini semen inutile in medicina, ut Galenus ait, est: herba verò ipsa assimilis cum Dubonio facultatis, sed multò minoris: ex qua de hac coniiciendum, quod in Dioscoridis libro fortè periit. Apuleius radices in aqua decoctum, fotu epiphoras oculorum, celeriter lenire refert. Narrant, inquit Dioscorides, appensum veneficiis aduersari: & gratiam conciliare, si quis eo perunctus sit, cum oleo Liliorum, aut cyprino. Tradunt alij huius semine perunctos ex oleo venustiores fieri, nec vllò medicamento lædi posse, si quis appensum gesserit. Quinetiam Principum gratiam sibi conciliari posse putant, hoc tantum amuleto.

Vires & usus.

ANTIRRHINVM ANGVSTIFOLIVM sylvestre.

CAP. CII.



E Legatula est plantula, tenui albicans, & quæ radice: caulibus palmatis, aut cubitalibus, teretibus, hirsutis, quos alternatim ornât folia Hyslopi paria, simul plura, inferius nonnunquam rubescens, pinguis & nonnihil actia, subamara: stipes ex foliorum alis bicolores, partim albi, partim purpurascens, Antirrhini ma-

Descriptio.

ioris, sed multis numeris minores, quorum basin obuallant quinque, vel septem folia viridantia, hirsuta, quædam longa, quædam breuia: pericarpium caluariam catelli egregiè refert, ac oculorum fossas, naresque corniculo inductas, in quo sunt.

Nonnullis hanc plantam Pliniano Antirrhino eandem esse visum fuit. Agricola autem eandem cum Cynocephalia esse suspicatus fuit. Matthiolus contra istud Antirrhinon pro legitimo olim exhibuit. Habet autem Antirrhini figuram fixam, quod flores attinet: folia etiam videntur nimis ad Linum accedere. In post. comm. cum mag. fig. & Hist. germ. priorem effigiem omisit, & meritò aliam substituit, sub titulo Antirrhini quarti, quod non describit, nec ostendit qua in re ceteris suis Antirrhinis differat. Neque mirum si in prioribus comm. de Antirrhino, eiusque foliis dubitauerit, siquidem tunc non nisi vna tantum Antirrhini planta ad manus ipsi fuit, ut in epistola ad Heroldum perscripsit.

Antirrh. Plinianum.

Lacuna

Lacuna, habet fegmentū Matthioli primò exhibitum. Sed nec figura Loniceri multum placet.

H. Lugd. tres habet figuras. Harum prima est p. 140. Anthirrhinum Matthioli, sic ita vti dictū. Altera p. 1341. Anthirrh. 4. Matth. Tertia ead. pag. Anthirrhinum paruum Dodonæi, siue Orontium.

Euch. Roetslin sub nominibus *Orant / tuis* fetsband, *streck* *frant*, *salbmaul* / *Ohris*, Anthirrhinum, *Lychnis silvestris*, pingit Anthirrhinum minus, & præterea Luteam sub nomine *Streck* *frant*, confundit.

Dodon. gall. dicitur Anthirrhinum alterum, & Anthirrhinum minus. [Et sic etiam Gesnerus hort. & de coll. stirp. vbi & Anthirrh. foliis Hysopi, itemque Tabern. in Icon. & Histor. vbi quartum facit.] Eidem de Florib. Anthirrhinum silu. siue minus: Hoc Lat. in fol. Anthirrhinum silvestre inscribit, melioremque figuram, quàm in gall. Hist. habet, describitque etiam.

Synonyma. Lobel. in Adu. Obf. p. 122. & Icon. Plant. p. 405. Anthirrhinum minimum appellauit: Camer. in Matth. Hist. germ. & Epit. Anthirrh. quantum: In Horto Anthirrh. medium, & Orontium aliorum: Castor, qui plus habere similitudinis affirmat cum Phyteumate quàm satium, cum Pona Anthirrh. silvestre vocat: Thal. Anthirrh. rubrum aruense: Schvvenckf. Anthirrh. medium, Anthirrh. silu. maius, Anthirrh. Plinij, & Orontium Archigenis: Hort. Luf. Anthirrh. medium silvestre: C. Bauh. phyt. Anthirrh. 5. siue aruense maius, vno loco procerius altero breuius: Honor. Bellus Phyteuma.

An Cæsalp. Os leonis, similis Linariæ, recticaule, flore cæruleo, in montibus? An Turn. Anthirrh. Plinij?

Locus & Tempus. Monspelij reperitur mense Octobri semine maturo: inter Viennam & Valentiam florens Iunio: Basileæ etiam Maio, Iulio Augusto & Octobri: Genevæ iuxta Rhodanum versus castellum *La Basse* florens Iunio: Montbelgardi in agris prope Audincourt virens & florens Octobri. Vbiuis tandem hortorum, inculcorumque marginibus sponte plurimum innascitur.

Vires. Anthirrhinum porro hoc silvestre nullius qui dem est vsus: si autem verum Phyteuma fuerit, ad amores profuerit.

ANTIRRHINVM MINIMVM. CAP. CIII.

Descriptio.



Tota minor est hæc plântula Anthirrhino minori dicto, radice parua, dura, fibrata: caule crebris alis concauo: in quib. folia haud multò minora iam dicto, sapore non dissimili: flos corniculatus posticâ parte, anticâ hians, dilutè violaceus: capsellæ oblongæ, ventriosæ, septi crassiusculi beneficio in duos loculos dissep-

cuntur, semen continentes copiosum, minutum, atrum.

Nisi hoc sit Anthirrhinum; Matthiolo, nescio quale intelligat, pingit tantum & non describit in post. comm. cum magn. fig. lat. & Ital. itemque Hist. germ. Camerario apud Matthiolum in Hist. germ. & Epit. est Anthirrhinum tertium, floribus albis pusillis: H. Lugd. pag. 1340. Anthirrh. 3. Matthioli: Camer. hort. Thallio, Schvvenckf. & Hort. Luf. Anthirrhinum minimum: Gesn. de coll. stirp. Anthirrhinum aruense foliis perangustis. Anthirrhini genus paruis foliis. C. Bauh. phyt. Anthirrh. 6. siue aruense minus, Lob. in Icon. Plant. p. 406. Anthirrh. alterum minimum repens. Sed cur dicitur repens? figura eius siquidem repentem plantam haud repræsentat. Nostra autem figura ex emptitiis non placet.

Basileæ copiosè in agris provenit: Montbel- **Locus &**
gardi abundat florens Iunio & Augusto, in aruis **Tempus.**
& vinetis.

LVTEA PLINII QVIBVSDAM.

CAP. CIV.

Secus vias & in rudibus nascitur Luteola, radice lignosa, minimi digiti crassitie, interdò plusquam pollicari, albâ, sapore Nasturtij acris caulibus compluribus, & admodum ramosis, viridantibus, striatis, ætiori tubulo pertusis, ad cubitum vnum aut alterum excrevit: folia, ante-

Locus & Descriptio



quâ caulescat, humi in orbè post in caulibus & ramis nullo ordine crebra nascuntur, atro-virentia, semenciâ circiter lata, palmum longa, interdum crispa, aliàs æquabili superficie nitentia, sapore subacri cum lentore: florum thyrsi longi magnam caulium & ramorum partem occupant, luteis apiculis constantes, quibus setacea succedunt vascula, hiulca, ternis intrò inclinantibus prominulis punctis, extrinsecus crispa, semen continentia pusillum, rotundum, nitidum.

stantes, quibus setacea succedunt vascula, hiulca, ternis intrò inclinantibus prominulis punctis, extrinsecus crispa, semen continentia pusillum, rotundum, nitidum.

An ruellio lib. 2. cap. 115. Herba nostræ ætatis, quæ cortinis suffectoriis indita luteum lanis præbet colorem? Gaudum nostræ rura vocant, vel Gaudum ex colore, quem siccata præfert, quæ ex decocto, quod lanæ resorbentes imbibunt, Lutea meritò vocari potest.

Gesn. hort. authore Lutea, vel Luteum Vitru **Lutea Gesn.**
uij. eruditis quibusdam existimatur hæc, quam **Roseda Plinij**
aliqui Resedam Plinij voluerunt.

Herbam luteam apud Dodonæum gall. aliqui **Morceli**
Florem tinctorium vocant, & Belgæ nonnulli **lappula**
Orant, sed nò sine errore: Alia enim est Orant, cui nihil cum hac planta affine est. Lat. in fol. Lutum Herbam inscribit, ac Plinium eius lib. 33.

Ecc 3

cap. 4. obiter meminisse, & Luteam appellasse tradit: Vitruuium verò lib 7. Luteum: sed Virgilium in Bucolicis Æcloga 4. Lutum nominasse;

*Ipse sed in pratis aries iam suauè rubenti
Murex, iam croceum mutabit vellera Luto.*

A Luto aurem luteus color & Lutea dicuntur, veluti à Croco crocea, & à purpura purpurea Belgæ hanc vulgò woutwe nuncupant.

Marcell. Virgilius Vitruuij libri 7. locum inferius allegandum omnino mutilum adducit, existimans eandem cum Isatide Lutum, siue Luteum herbam esse, atque eâ cæruleum tingi: in quo à vero recessit: Differt siquidem Lutum herba ab Isatide, & nequaquam cæruleo: sed luteo, aut viridi colore, ut dicemus, inficit.

Lobelius, qui in Icon. plant. p. 353. & Obs. p. 190. [vbi Gallo-belgis maude, & Germanis, quod nomen tamen non conuenit, Aefersfrumen vocari ait.] Luteolam pingit, & in Aduers. tertiam Glasti speciem rectè constitui posse putat. Sed quæ Luteolæ cum Glasto intercedit similitudo?

Lobelij lap.
fus.

Camerarius in Hort. vocat Luteam Plinij, & *χλωδὴν* Græcorum modernorum. Ad Epit. Matthiol. eiusdemque Hist. germ. posuit figuram, quæ aridet, cui adscribit *Sterefraut*, *Pseudo-Struthium* aut *Lanariam* nominant, sed non conuenit cum Theophrasto lib. 6. cap. 3. de Hist. plant. Struthio nec etiam cum Plinij: quidam Theriacariam vocant: ut rectè annotat Matthiolus. Præterea Struthion non esse, ac multò minus Ptarmicen manifestius est quàm ut referri debeat: Folia siquidem huius magnitudine Oleæ folia superant: at Ptarmice à Dioscoride, & Struthion à Theophrasto Oleæ similia folia habere traduntur.

Tragus re-
preh.

Tragus lib. 1. cap. 118. haud rectè Antirrhini nomine pingit ac describit: ynde Thallio dicitur Antirrhinum Tragi. Alij Phyteuma esse contendunt. Herbarum icones Egeæolphi p. 69. in edit. 1551. & Lonic. in Dioscor. vocant Catanancen.

Sed & Tabern. in Ic. inscribit Catanancen, *Acopodiū* & *Leuteolā*, *Strechtraut*, *Æternfraut* Errant (inquit in Hist.) qui Antirrhinum volunt: A solo Dioscoride & Plinio describitur & græcè dicitur *κατάνανθεν*, *δαμνάνθη*, aliis Iouis radix, *Datiska* & *Crepula*: Vitruuius Luteum, Plinio Lutea, & lib. 17. cap. 8. Catanance, Herbariis Luteola, Vnguis miluinus, & Vnguimilua: It. *Vnge de Gato herba*. Hisp. & Port. *Ynhas de Gato yerna*, *Selaon*. *Carophitta* Anglicè *diernede*.

Locus &
opus.

Basileæ copiosè floret mense Iunio: Montpelij & Lugduni Maio: Geneæ viret Ianuario. In Belgio magna copia, tamen aliis etiam plerisque locis Galliarum & Angliæ rudibus & similibus occurrat, Lobelius. Seritur pingui ac restibili gleba, pluribus in Belgio locis nascitur, & spontè non modò in Belgio, verùm & in Pannonia, Bohemia, tum & alibi. Maio mense floret: semen deinde adfert: postea collecta herba siccatur in vsum tinctorium, Dodonæus.

Vius.

Hoc apud nos Mediomatrices (inquit Tragus) non nisi linamentis lectorum luteo colore tingendis vsurpatur, & si quid indico, calidæ & humidæ temperaturæ est. In exterioribus tantum corporis partibus vsum suum hodie habet. Et paulò post: Mulierculæ hanc herbam siue sicca sit, siue recens, in aqua cum alumine decoquunt, tingendis linamentis. Magno vsui & emolumento, Lobelio in Adv. assentiente, est Luteola,

recentioribus tantum cognita, ad colorem fuluū aureūve pannis conciliandum valde expetita, præsertim in Belgio, vbi magna copia. Inficiuntur [pergit Dodon.] hac Luto herbâ panni lanei, aliæque ex lana opera, & lineæ telæ colore luteo & virenti: luteo quidem candida, & nullo aliò prius imbuta: virenti verò cæruleo antè tincta: Nam Luti herbæ color cæruleo superinductus viridem efficit: Id quod & Vitruuius cognitum habuit lib. 7. de architect. cap. 14. Qui nō possunt ait, Chryfocollâ propter caritatem vti, herbâ quæ Luteum [aut potius Lutum] appellatur, cærulei inficiunt, & vtuntur viridissimo colore. *Camerario* apud Matthiolum referente, aduersus venena & morsus venenatos præstantissima creditur, inde quibusdam Theriacaria dicta: verum nihil certi habet, cum eius nullum fecerit periculum, acer radices sapor arguit calfacere, rarefacere, dissipare, aperire, vrinas & sudores citare. Lanarum porro insectoribus vsus magni esse testatur quotidiana praxis: rudes enim & albas cum alumine decocta, colore luteo tingit: cæruleas autem viridi, idque magis minusve intenso, quò saturatior dilutiorue fuerit color cæruleus. Ita panni bicolores vno eodemque tempore, vno eodemque decocto ex eadem cortina extrahuntur.

LVTEA MAXIMA CRETICA HONORII Belli.

C A P. C V.



Descriptio.

Luteam Creticam maximam à Cl. D. Honorio Bello, viro tum in arte medica, cuius nomine in Candia clarus excellit Medicus, tum in omnibus disciplinis, potissimum verò in studio Botanico versatus, cum aliis multis creticis ad nos misit, adiunctâ hac descriptione, in data ad nos epistola. *Lutea Cretica maxima:* planta pulcher-

rima est: neminique cognita: ea namque vni-co tantum loco inuenitur, qui vocatur *ἐπίδωπον* tertio ab vrbe Cydonia lapide inter montes. Nascitur in aquis & locis humentibus: ibi enim riuiulus quidam è fonte scaturit, qui per angustam vallem discurrit in quo inuenitur, & etiam iuxta eius ripas: an alibi nascatur, ignoro. Radicem maximam profert, lignosam, in multas diuisam, crasso & leno cortice vestitam. *Stolones* plures ab vna radice nascuntur, brachiali crassitudine, qui ad quinque, sex, atque etiam ad decem vsque cubita attolluntur, qui Hieme exsiccantur. Folia fert magna, pinnata, ex multis foliis magnis constantia, longis, serratis, ut *Cannabis*, alterno positu hærentis, sine tamen ordine certo. Flores minimi ex viridi pallefcunt.

Trunci

Trunci pars superior in marinam spicam fastigiatur, duos & amplius cubitos longam, ex vasculis quibusdam longis & angustis, densisque conflata, similibus eis, quæ Reseda vulgaris gerit, semine plenis ad rufum tendente. Procùl inuentibus Cannabis esse videtur. Tota herba & radix ita amara est, ut Aloem etiam & Colocyntidem ipsam, meo iudicio, superet. Colore luteo inficit Autumno, ideoque Lutea vocauere. Antiquis ignotam puto, & nemini cognitam, quam Siluerio Todeſchini Fundano Cyoniz Pharmacopæo, viro in cognitione stirpium accuratissimo, vestrique nominis studiosissimo, primus his diebus inuenit, mihiq; ostendit. Huius tam raræ stirpis eiconem à me delineatam mitto, ut vestra historia generali [si lubet] adnectere possitis. Hæc Bellus. Nos huius plantæ semina terræ concedidimus Montbelgardi in horto Ill. E. C. verum non prouenit.

RESEDA LUTEA.

CAP. CVI.

Descriptio.

Tenuem quidem, sed longam satis radicem habet Reseda nuperis dicta, lignosam, notabili acimonia præditam: à qua caules procedunt fistulosi, sesquicubitales, striati, subhirsuti, ramo-

si: folia Cakiles Serapionis diuisurâ profundâ, inordinata, crispâ seu undulata, sapore oleraceo: flores in thyrsulum spicamve digesti longam, lutei seu herbidi, foliolis ex umbilici oris extantibus, in tria segmenta (quorum duo lateralia latiora mediû fili instar tenuis & breuius utrinque

stipant) partitis, intra quorum septa apices multi sessiles, luteoli, & stilus triceps: capsulæ seminum effigie vrceoli inferius hiant, semen continentes paruum, nigrum.

Reseda, à sedandis doloribus dicta censetur: collectiones namque & inflammationes omnes discutere ipsam Resedam scribit Plinius.

Lobel. in Icon. Plant. p. 112. Resedæ maximæ titulo pingit, itemque in Obs. p. 110. An verò eam ab alba rectè distinguat, videat alii. Lucas Ghinus, Gesnero de hort. teste, Sesamoides maius nuncupat: Resedam luteam Dalechampius: Resedam Plinii, & Erucam peregrinâ, Wettſchen Rantzen / Schvecks, quem miramur hanc inter hortenses recensere: Resedas C. Bauh. Erucis subiecit, propter saporem Erucæ similem, deinde etiam eò quod à quibusdam Erucæ dicantur, & ex Erucarum siluestrium genere censeantur. An Reseda latifolia Tabernamontano?

Generæ in maris florentem maïo vidi, itemque in horto meo Hiemem etiam perferentem.

Toin. III.

Montbelgardi copiosè prouenit iuxta segetes in planitie inter Bechem & Audincourt, florens Iunio, Iulio, & Augusto, ac etiam vltra pontem Vauiaucourt.

RESEDA ALBA.

CAP. CVII.

Minus frequens est Reseda alba, cetera Luteæ frequentiori similis, nisi maior paullo videretur, id quod fortè culturæ tamen imputes: verum florum thyrsi albicant, quorum singuli quinis fimbriatis foliolis candidis contexti, apices tamen luteolos possident.

An Lobel. in Icon. Plant. p. 112. Reseda Plinii Neoterorum? Fuchsius Selamoides maius satium vocabat: Resedam candidam Dalechampius: Resedam 2. siue albam C. Bauh. phyt. vbi reperiri narrat foliis simplicioribus, & in vnoquoque pediculo. An Tabern. in Icon. & Hist. Reseda tenuifolia, Eruca Cantabrica, Spanisch Rantzen.

Mense Iulio Basileæ in horto D. Iac. Zwingeri florebat, & semine deciduo se propagabat. Ego colui Montbelgardi in horto Illust. E. C. sed plerumque perit, semine ad maturitatem non perueniente.

CHELIDONIUM MINUS VETERIBVS, & in genere.

CAP. CVIII.

Chelidonia igitur minor, quâ siluestre Triticum nuper dicitur. [Ald. v. p. 110.] Aliqui nuncupant, ex Dioscoridis autoritate, herbula est pediculis ab radice pendens, sine caule, foliis hederæ figurâ, sed multò rotundioribus ac minoribus, mollibus & subpinguibus circumdata. Radices habet ex eodem callo complures, pusillas, in granorum tritici modum acervatim congestas, quarum tamen tres quatuorve in longitudinem protenduntur. Cæterum, iuxta aquas palustriaque loca nascitur. Vim acrem obtinet, & Anemones modo [Limonii modo, alius] summam cutem exulcerat: psoras item & scabros vngues eximit. Succus verò radicibus expressus, addito melle ad purgandum caput naribus vtiliter infunditur. Similiter & huius decoctum cum melgargarizatum, strenuè caput, cunctaque pectoris vitia purgat.

Chelidonium paruum maiore actius Aëtius tradit. Et hinc in cataplasmate impositum cutem exulcerare ait, & vngues leprosos exterere: succum eius per nares fortiter purgare: esse enim quarti ordinis calefacientium ac siccantium. Vbi porro in frigida hepatis intemperie, calefacientibus, ac firmitatem addentibus vtendum est, Capnium, quam & Chelidonium herbam circa sepes enatant appellat, probat.

Luxatam autem esse Plinii lectionem (in Chelidonia minore) quis facile deprehendet, cum maiori Chelidoniz reddatur color albicans, flos luteus: minori folia Hederae, rotundiora, minus candida, succus Croci, mordax, semen Papaueris: cû hæc duo postrema de maiore tradantur à Dioscoride. Namque minor acrem possidet succum, non tamen vilo pacto luteum, nec Papaueris semen, imò florem putat Ruellius sine semine proferre, radicibus potius quàm semine natis. Sic

Descriptio.

Flores.

An Reseda Plinii Neoter. Lobel.

Locus & Tempus.

Descriptio. Tonic. flos.

Locus, Vitæ.

Aetius.

Plinii lectio luxata.

Cannabis. Sapor Alois.

Lutea cur dicitur?

Descriptio.

Reseda vnde dicitur?

Plinius.

Eruca peregrina.

An Reseda latifolia Tabern.

Locus & Tempus.

ergo in sedem restituetur luxata pars : Maiori colos albicans, flos luteus, succus Croci mordax, semen Papaueris, nisi quis ea quæ breuiter de minori Chelidonio scribuntur, parenthesi censcat interiecta.

Plinius no-
tatur.

Plinius [inquit Corn.] Chelidonio minori succum & semen attribuit, quæ Dioscorides maiori adscripsit. Quin & tota Chelidoni parui descriptio conuenire videtur herbæ, quam officinæ hodie Scrophulariam vocant. Nostri varia induunt nomina. Nam & *Scrophularia* dicitur, i.e. Herbam hæmorrhoidum vocant, & *Scharlachkraut*, & *Pfaffhoden*, *Bibernoden*, h.e. Castoris testes vocat, à radicum similitudine. At verò quod herbulam pediculis absolutam reddidi, in græcis legitur *Βεταριον* isto in *μύχρον* à *μύχρον* *βηταριον*. Significat autē *ἀμύχρον*, absoluo, perficio, ita vt tota herba ferè ex pediculis constet, quum nullum caulem habeat, quod ipsum voce *ἀμύχρον* significatur. Geranium Robertianum dici de Chelidonio minore, infra patebit. Sed & de Geranio Batrachoide habetur.

SCROPHULARIA MINOR, SIVE
Chelidonium minus vulgò dictum.
CAP. CIX.

Descriptio.



Chelidoniū minus, plātula est vt plurimū palmatis, aliàs paullo maior, minorve, quæ teste Trago quotannis nouā radice, foliis, & flore, sicut Satyriones & Aron, reuiuiscit, ea nobis insipida est, partim bulbulis aliquot, modò pyriformibus, modò longis, ferè teretibus, aut ventriosis, vtrinque acutis, modò

rotundis: Trago, torose sunt, ac instar grani Hordei elongæ, plerumquē ternæ, aut quaternæ, acutatim multis capillamentis, quibus humi hærent, fibratæ: foris pallidis, intus albis, partim fibris multis candicantibus, constantes: vnde ex surgit *caliculus*, secundum terram albicans, supernè dilutè purputascens, circa medium ferè aut paullo inferiùs, geniculo donatus, ex quo oriuntur folia bina, opposita, longis pediculis, ex lato principio coloris carnei, sensim in angustum virescens desinentibus, aliquatenus hederacea, sed molliora, minora, rotundioraque, nervosa, glabra, splendentia (sicuti & bina illa, quæ statim à radice exoriuntur) indidemque ex alis foliola minora, magis angulosa, simili colore & splendore nitentia, Trago herbaceo, viridique colore conspicua, reliqui caulis folia profundius incisa, Hederae helicis repentis foliis proxima, alterno, plerumquē situ, breuioribus pedicellis virentibus appensa: summo fastigio insidet flos vnus,

Ranunculi æmulus, ex octo aut nouem foliolis aureo fulgore radiantibus, vnguibus chloris cōpositus, in medio habens staminula multa crocea ex tenui latescencia, auersâ parte sulcata: succedit *capitulum* Ranunculi echinata, ex viridi luteolum, *semine* stipatum: Dodon. *capitulum* veluti Ranunculi, exiguum, ex seminibus cōgestum, verum minus. Floris & foliorum sapor herbaceus.

Chelidonium minus à nullis ostensum esse suo tempore vel Herbariis, vel Medicis, demiratus est Ruellius, præsertim cum nulla verno tempore frequentior occurrat, præcipuè Hirundinū aduentu. Demiratus est, quod longè dissidenti nomine, (proprio ignorato) officinæ Scrophulariæ, quod multis granorum frumenti grumis radix coaluisse videatur, vocauerint, putantes inditum fuisse appellationem, quod strumis [quas vocant græcâ imitatione, non latinâ: scrophulas] medentur: Non audiendos esse Arabicæ factionis authores testatur, qui Glaucium putant esse, quod ipsi Memithen vocant. Si quidem horum error aptior sit, quàm vt refutari desideret.

Cordus in Diosc. eadem cum Amello Virgilio Geor. 4. descripto facit, ac aurei splendoris florè, & foliis purpureis maculis, quas Dioscorides descripsit, insignito.

Fuchs. Chelidonium ideo hanc herbam vocatâ esse pronunciat, quod, vt habet Theoph. l. 7. c. 14. hirundinum aduentu florè excitet. Videtur ipsi Dioscoridis delineatio Chelidoni minoris herbæ huic, quam Scrophulariam minorem vulgò nominant, prorsus conuenire. Descriptioni subscribere ait locum, tempus, vires, & alia, quæ singula ad amissum quadrant, vt nemo hanc Chelidonium minus esse, inficias ire, sine magna impudentia, possit.

Dioscoridi autem *χελιδόνιον* nomen dici testatur quoque, licet non desint qui exiguum quoddam Scrophulariæ genus esse statuunt.

Omnes ferè rei herbariæ petiti Chelidonium minus appellant. Hetruscis eam vulgò vocari *Fauoscello* putauerim (inquit Matth.) quod Fabarum modo folia subpinguis proferat. Verum an hæc sit Chelidonium minus, cuius meminere Dioscorides & Galenus, non parum videtur esse dubitatio: quod nullam prorsus nec foliis, nec radicibus præ se ferat acrimoniam, cum tamen acerrima & mordax esse deberet, longèque magis quàm Chelidonium maius: quandoquidem, Galeno teste, Chelidonium minus eum exulcerat, & excalfacit ordine quarto. Id quod satis manifestè ostendere posset hanc non esse Chelidonium minus: nisi quis in hoc illud dixerit, quod de Aro scriptum reliquit Galenus lib. 2. de alim. facult. Nam facillè contingere potest, quod quæ admodum Arum Cyrenis minimùm medicamentosi, minimùmque acrimoniæ possidet, adeò vt in cibis vel Rapis vilius habeatur: In Italia verò, ac minori Asia contrà adeò acre, vt medicamentis dūtaxat expetatur: ita & Chelidoniū minus, quod in Italia nascitur, minimùm acrimoniæ sortiat: quod verò in Græcia prouenit, acre admodum sentiat. Siquidem, exceptâ acrimoniâ tantum, nostrati nihil præterea deesse videtur, quin legitimum Chelidonium minus dici queat. Ex quo facillè adductus sum, vt credam, quod quamuis in Italico desideretur acrimonia, non tamen id esse Chelidonium minus diffindendum est: tamen si inficias ire non liceat, nostrum Chelidonium

Chelid. mi-
nus Diosc.

Scrophula-
ria germ.

Chelidonium minus, quod omnino acrimoniz sit expert, iis morbis haudquaquam conuenire posse, quibus illud conferre, quod in Græcia gignitur, tradiderunt Dioscorides & Galenus. Nam hac deficiente qualitate, necesse quidem est, ut & vires, quæ illam consequuntur, deficient & pereant. Hinc igitur sit, ut non possim ego subscribere iudicio Fuchij, qui in lib. de compos. med. quem auctum secundò excudit, Chelidonium minus censet alteram Malacocissij speciem. Quinimò eius opinio mihi refellenda videtur, quod planta illa nullis ferè notis aliquam mollem Hederam referat. Ea quidem folijs Hederam quodammodò æmularur, sed quod magis attendendum erat, viticulas nō pro fert, quibus humil repatid quod Hederæ cuique naturā tributum est. Quidam nugator contendere nobiscum non erubuit hanc plantam non esse Chelidonium minus, sed Virgilij Amellam. Hucusque Matthiolas. Lobellus in Aduers. nimis morosus ait, qui Chelidonium minus ob ignauam acrimoniam rejiciunt.

Dioscoridis esse *χελιδόνιον minus* aut *πυρρον* *αγρον* cōcludit etiam C. Bauh. licet vires non respondeant. Hanc enim diuersitatem ratione solli obuenire, nostro iudicio, non malè suspicatur. Plioj lib. 25. c. 23. Strumean censu refert, quo loco de Ranunculis agit. Huius folia alquā to purpureā maculā notari, flore esse luteo simplici, aliquando & pleno reperiri.

Synonyma
cum nominibus
in-
guam.

Χελιδόνιον minus græcè dicitur, latine Trago-
Mathiol. Fuch. Hist. Dod. Anguill. epist. 11. Cor-
do in Diosc. & Hist. Gesn. hort. Turn. Lac. Lonic-
Guiland. Lobel. in Adu. Obs. p. 323. Ic. Plant. p. 493.
H. Lugd. p. 1048. [an eidē p. 1036. Ran. latifol.]
Cast. Thal. Tabern. Ger. & Eyst. *Chelidonium minus*:
Casp. Bauhin. Plin. *Chelidonia* 2. line [ut etiam in
phyt.] rotundifolia minor: offic. *Chelidonia* mi-
nor, & *Hirundinaria* minor: Brunfels. Ficaria &
Scrophularia minor, & secunda: Malacocissus mi-
nor Fuch. Icon. Testiculus sacerdotis Syluatico,
Fauagello Celsalp. Germ. *scinparackstaut* / *Hein*
Scholtraut / *Scho:bockstaut* / *Erdgersten* /
Blaternstaut / *Bibschödslein* / *Pfassenhöd* /
lein / *Schwalben wurn* / *scigblattern* & *Ey-
puch* / *Wenenstaut*: Belg. *Speenfrunt* / *Steyn*
(Hoye: Gall. *Esclere*, ou *petit Bafinet*, & *Couillons de*
preste: It. *Fauscello*, *Coglia di prete*: H. span. *Celido-*
nia menor: Angl. *Dylewoorte*, or *flaworte*: Ces-
sidony mussy: Arab. *Memten* & *Chilodemon*.

Locus &
Tempus.

Hirundinum aduentu florer, nec longo post tempore marcescit, sic ut izigui limites, qui largo foliorum, florūque stipatu pubescunt, confestim iis spoliari glabrescere videantur, quā de causa Chelidonium, i.e. Hirundinariam dici, nullum est Ruellio dubium. Author est Tragus Martio mēse proficere, sub finem Februarij erumpere ad humectos vinearum & pratorum quorundam colles: Maio marcescentem euanescente, folia florēque amittentem, radiculis interm vsque ad principia Februarij anni sequentis humilantibus. Marantha vidie ineunte Februarij flores protulisse, licet Dioscorides eam aduentu hirundinum [qui Martij a se flu esse solet] exoriri scribat. Omnibus Italæ locis, verno aut tæxat tempore, seque gignitur. Matthiolo, vi g. nolo, præsertim Solo, & in serobum fossarum que marginibus. Fuchius in palustribus prope aquas & limitibus humidis, omnibsq; virginosis ac hortis passim gigni scripsit, Maio mense. Nascitur [in Tom. III.

quit Dod. In pratis, secus vias ac serobas fossal- que, locis riguis ac humentibus passim vulgare: circa Martij Calēdas exit, paulò post florer, Aprili deficere incipit, Maio integrè perit, post difficile fuerit, vel radiculam eius reperire, nisi locus, vbi ptouenit, particularis noetur. Montpelij & Lugduni florer Februario & Martio: Genevæ quoque Aprili notatur.

Magnam præ se ferre acrimoniam, gustumque acerbè vellicantem narrat Ruellius. Sed non existimo eum Chelidonium minus vnquam degustasse, nec obseruasse, quod subdit, argumento Galeni & sectatoris eius Pauli, pueros sæpius probasse, illam celeriter curam exulcerare. Sic quoque non placet Tragus in tradendis viribus non citare Dioscoridem, sed ex ipso non degustato suo minori Chelidonio, ei tribuere acrimoniam Ranunculi linguam vellicantis, quā nostra planta destituitur. Acrimoniam autem deficiente caput non videtur posse purgare nec humorem trahere. Naturam habet, inquit, calidam cum acrimoniam coniunctam, quare linguam, vi Ranunculus, vellicat, solētque potius externis corporis partib. adhiberi, quā intro sumi. Herba Chelidoni minoris vnā cum radice in vino decocta, melle admixto, caput purgat, & glutinosos ac lētos humores trahit, gargarizata. Idem efficit succus radicis cum melle tritus & naribus inditus. Proinde herba ipsa, radice, succo que, puluere, & aqua distillata, in extēdis sicub⁹ maris, siue, magnā utilitate & experientia Medici nostræ ætatis vtuntur, nam impositu, & inspersu, mirificè ficos & mariscas sanant, herba, aqua distillata, & puluis. Alia huius plantæ iuramenta & vires ex commemoratis animaduerti possunt. His addit Fuchius: Chelidonium minus, Galeno teste, quartū ordinis absoluti est in calefaciendo & desiccando, ideoq; magnam præ se fert acrimoniam, gustum erodentem. Nostrum autem vsque aded acie non est, ut commanducando sæpè nullam prorsus sentias acrimoniam pouissimum in eo quod in humido loco natum sit. In eo autem quod locis siccis provenit senties & amaritudinem & acrimoniam. sensim tamen gustu erodentem. Ceterum, cum Matthiolo suprà citato loco statumus & nos Chelidonium minus Italicum, quod omnino acrimoniz sit expert, iis morbis haudquaquam conuenire posse quibus quod in Græcia gignitur tradiderunt Diosc. & Galenus: calidis siquidem & siccis qualitatibus penitus destituitur. Licet autem etiam Turnerus non consulat vtendum hac pro Chelidonio minori Dioscoridis, ad ea vi tamen licebit, ad quæ recentiores experti sunt. Dodonæus quidem non videtur degustasse Scrophulariam minorem. Ranunculis enim potentia proximam esse scribit, ac postremo em ætatem ad hæmorrhoides radicibus vnā cum adhaerentib. granulis vi, ut quæ huius succo cum vino aut laborantis vrina permixto sæpius ablutē contrahatur, ac dolore sopito resiccentur. Lobellus ut refutet opinionem eorum qui Scrophulariam rejiciunt ob defectum acrimoniz ignauam, tribuit in Aduers. acrimoniam, quinimò in Obs. acius maiore ait. Sed hac parte sibi contrarius nobis videtur ei modò ignauam acrimoniam concedendo, modò verò acius maiore Chelidonio tradendo.

Ego adhuc adolescens, inquit Solenander, vidi Tarquinium S. schnelle bergium Medicum Empiricum, omne vitium hæmorrhoidum curantem Chelidonio minore. Is secrete herbam integram, siccata, in manipulos collectam, inje-

Vires & V-
lus.

Acrimoniam
nulla.

Solenander

Hæmorrhoi-
des.

Etamque cereuisiæ macerabat, tamque propinabat. Et aquam eius exstillatam, adhibebat lotioni & fori exterius per linimenta. Postea illâ herba ego multis modis ad hunc affectum feliciter usus sum. Succus frequenter illitus expeditius id facit, quâ aqua. Herba rufa apposita medetur. Noui, qui sanantur, quos nimiam profluuium ferè confecerat, ut hydropis periculum adesse videretur, exhibita huius herbe aqua destillata: sed quia acris est admodum, libentius vtor herba ista, ut antè dixi, cereuisiâ, vel etiam vino suo loco, macerata. In pila rufæ radices incoquantur oleo, cuiusque est ad tumentes & dolentes hæmorrhoides vñs. Flores quidam, alij herbam commiscunt oui vitello, coquunt, & in placentula manè edunt. Huic herbe ego ad hæmorrhoidum vitium mirabilem efficaciam tribuo. Nam naturæ characterem in radice, cum exuberantibus hæmorrhoidibus habet. Sed illud diligentius examinabunt periti, quomodo verisimile sit, aquam Chelidoni minoris acrem admodum esse, quandoquidem hæc planta, teste Matthiolo omnino acrimoniam expers sit.

CHAMÆLEVCE ET CHAMÆPEUCE ex veteribus.

CAP. CXI.

*Diversitas
sinuatum de
ho: capite.*

MAlè & infelicitè cum Chamæleuces plantæ historia ex multo tēpore actum est. Vix enim è græcis Dioscoridis codicibus duo saltem concordēs repertiuntur. Nam Chamæleucen alius tractandam in hoc capite proponit: alius pro ea Chamæpeucen habet: in aliis nullum est hoc caput: in quibusdam cum Buglosso miscetur. Et præter id alij brevissimè rem in hunc modum absoluunt: Chamæpeuce [*χαμαπευκε*: alij *χαμαλιδιον*] lumborum doloribus propitia est, si trita ex aqua bibatur. Qui longius eius historiam referunt, ista quæ sequuntur ad finem vsque ex Ald. codicis notis cum Sarraceno adiciunt. Est autem herba tota viridis, herbaceæ coloris, foliolis, ramulisque incurvis, floribus rosaceis.

*Plin. inter
Chamæleu-
cen & Cha-
mæpeucen di-
stinguit.*

Galenus & Paulus *χαμαλιδιον*: iidem mentionem faciunt. At Plinius scorsim Chamæleuces & Chamæpeuces meminit: & Chamæpeucæ quidem eadem tribuit, quæ Dioscorides Chamæleucæ. Chamæleucen verò eam esse tradit, quæ alio nomine Farranum seu Farfagium, alijs Bechion nominetur: vitæ vera & inter Bechij synonyma in Dioscoridis notis vox illa reperitur.

Porò, quid in tam confuso intellectu, & rei inconstantiâ reddendum esset, Marcellus diu dubitavit: Accessit tandem anxio Plinius, monuitque in ancipiti Chamæpeucen potius legendum esse, quàm Chamæleucen: quoniam quod Dioscorides ait *παραπρος οφθους αλγημενα*, *εν οδω λεωσιν πινουσαν*, Plinius dixerit lumborum & spinæ doloribus propitia est, eodem rei sensu & verborum ductu. Verisimileque est ex his quæ Plinius eadem Dioscoridi reddidit, hanc Chamæpeucen legisse, & hanc fuisse eius ætate capitis huius lectiōnem. Chamæleuces enim aliæ vires & alla temedia sunt, descripsitque Plinius Chamæpeucen Laticis folio. Suspendit animo Marcellum tamen Ægineta & Aëtius, qui, nullibi tractatâ Chamæpeuce, Chamæleucen describunt. Vnde sit, ne pro comperto constituere aliquid audeat. Multis enim, iisdemque magnis indicis & auctoribus pugnat, ut quæ in tanta varietate id elegit,

quo Latini scriptoris, deficiente Græcorum, auctoritate se tueretur. Non videtur autem ipsi esse integrum hoc Dioscoridis caput. Chamæpeucen autem potius, quàm Chamæleucen, Valerij Cordi exemplo quoque legendum existimar, ut qui ita in emendationibus quibusdam Dioscoridis codicibus scriptum reperisse se asserit. Huc & illud accedit, quòd cum herbam hanc Dioscorides *ιλαχλαρον* esse profiteatur, ei minùs aptè convenit *χαμαλιδιον* appellatio: quippe quæ indubitanter humilem Populum designet: Populi verò albæ folia atrinsecus incanâ lanugine vestiri, vèdum *ιλαχλαρα* conspici, vnicuique constet.

Quæ Plinius de Chamæleuce scripsit, ea Hist. Lugd. de Chamæleuce Dioscoridis intelligi posse haud censet. sed potius secundum alios, quæ is de Chamæpeuce scripsit, ad Dioscoridis Chamæleucen pertinere contendit. Sunt tamen qui brevem apud Dioscoridē Chamæleuces descriptionem in totum rejiciendam sentiunt, & Galeni Chamæleucen diversam à Bechio statuant. Quidam enim esse Bechion (inquit Plin. lib. 16. c. 6.) & alio nomine Chamæleucen putari, &c.

Amatus de Chamæleuce scribens, ait Latine dici Chamæpeucen: promiscuè legi caput hoc de Chamæleuce, vel Chamæpeuce, Plinium tamè ut differentium meminisse. Sed quæro ex Amato (inquit Turn.) ex quo veteri scriptore, legatur caput hoc de Chamæleuce, promiscuè de Chamæleuce & Chamæpeuce? Quod si nullus veterum id facit, quis tandem ex recentioribus ita legit, qui Plinio non debeat cedere, Chamæleucen & Chamæpeucen distinguenti: &c.

Nunc reliquum est, ut Chamæleuces & Chamæpeuces æquivocationes inquiramus. Chamæleuce igitur Cordo eadem est herba cum Bechio, id est, Tussilagine. Chamæleuce etiam dicitur Petasites, Cæsalpino. Caltha palustris, Turnero. Hedera terrestris. Trago. Rosmar. silvestre, Cordo. Anthirrhinum, Cæsalpino. Pinus Mugho, Dodonæo. Camphor. Monspeliensium, Lobelo in Adue. C. Muscus terrestris, sed perperam Cordo. Chamæpitrys. Rosmar. silu. Gesnero. Erica alba Matth. Asparag. marinus Clusio.

CALTHA PALVSTRIS.

CAP. CXII.



Minori Chelidoniæ similis, per omnia tamen maior, minùs rubens huius coliculi: folia item profundiore circa pediculum sinu constant, & purpureis maculis carent; est etiam alia differentia, quòd minoris Chelidoniæ coliculi sine ramulis nascantur: hoc verò circa singula in coliculo folia binos emittit ramulos, cum in m-

*Diosc. caput
reiciendum.*

*Turn. contra
Amatum.*

Æquivoca.

Descriptio.

note

nore Chelidonia bina semper folia singulares colliculos vestiant. Flores in summitatibus singulorum colliculorum singulos producit luteos, paucioribus tamen, rotundioribus, multoque maioribus foliis, quam illius, constantes: in quorum medio stamina eiusdem coloris visuntur: radices verò subsunt minori Chelidoniz dissimilibus, Hel-lebori radici cum fibris similes, foris nigre, intus candidæ, longæ, graciles & insipidæ: folia, floresque similem minori Chelidonio saporem habent: capitulum seminum est echinatum.

Synon.

Valerius Cordus, descriptionis author Chelidonium palustrem nominat. Sed Tragus Caltham vocari posse putat, cuius in Alexi meminit Virgilius. Ionic. sic græcè vocari Chrysanthemum, sed toto cœlo aberrat: Dioscoridis Chrysanthemi descriptioni minimè responder. Gesn. hort. refert aliquos Ferrariam vocare, fortè quòd folium ferream equi soleam videatur referre.

Epimedium semere.

De Caltha palustri hæc Dodonæus scribit: Flores huic rari, vel nunquam apparent, quamobrem Epimedium esse aliquando visum fuit, sed cemerè. Non est autem Chamæleuce aut Tussilaginis species aliqua. Ineptè quoque Farfugium & Farranum habetur. Chamæleuce siquidem, quam à Plinio Farfugium ac Farranum dici perhibetur, à similitudine foliorum accens, i.e. Populialbe, appellationem accepit. Virent autem Leuces folia superius quidem, ac inferius tenui candid. q; languine incanescunt. Calthæ verò huius neutrà in albescent partem nec formâ eorum respondet. Hæc lile, qui Calthæ palustris, & alteram effigiem dedit, se. absque flore in aquis pronemienus.

Hamilis incana non est, Lob.

Caltha palustris recentiorum (inquit Lob. in Adr.) non est Chamæleuce Plinij folio Populi, siue hamilis incana. Est Dotterbloemen Belgarum, & Farfugium Recentiorum quam Cal. Bassus ex Geoponticis Malacocyssum maiorem vocat, & Matthioli ex suo cerebro Tussilaginem alteram facit, coniecturas triviales, & descriptionem ex Dodonæo, & aliis recentioribus scriptoribus emendatam, inculcando, suppressis nominibus, & mutatis classibus, quasi scopas dissolutas: hæc enim multò magis Chelidonium ipso toto vultu præfert, nisi quòd à vniuersa maiori: Flores neutiquam papposi, quinimò diu admodum & particula im florēt, aureis Ranunculi, aut Chelidoni minoris floribus: neq; folia ortu, vt Tussilago, antecurrunt, & Nymphetæ luteæ colore, vel Chelidoni minoris nitore fulgent, & similes sunt adè, vt in Angliæ vdis, vbi vberissima, sæpè pro Nympha minore Pharmacopœi & Clinici mulierculæ mihi attulerint, & ostentant. Folia non subter incana, non angulosa, non caulis tomentulos, sed potius atro-virent, polito, vti Asafu, Nympha. Radix fibrata quidem capillamentis, acris galli est, sed moderatè. Nunc si Nympha inde sit dicta, quia Lymphis, Nymphæve est conuictrix & accola, potuerunt Scraphone antiquiores Caltham palustrem dictam Nymphetæ congenerem fecisse: natales quippe, folia, & flores aluntur e hand vulgari, etiamnum persadent idem quibuldam Pharmacopœis, qui nostris medicamentis non semel subdiderunt hanc, illarum [Nymphetæ vtriusque] floce, vocabantque Nymphetam luteam. Quam mihi forent notæ Nymphetæ, certè hanc legitimam Nymphetam agnoscerem, quous potiores vel rationes, vel plantæ accommodatiores me deficerent. Et hæc Lobeus. Et alibi: Chamæleuce siue Populus pumila quænam sit, vix nisi de nomine coniectari li. er, Tom. III.

adè ignotis notis prodidit eam Diosco. id. s. &c.

Contrà, plantam hanc circa riuos aquarum & vliginosis pratis nascentem, quam Clus. Caltham palustrem vulgarem, & nonnulli, Chelidonium aquaticum nominat, Anguillara Opinior. lib. 12. Chamæleucen P. in. esse existimat, iidemq; adhuc nominibus cogni am dicit Patavino agro, quibus Plinius eam donat, nempe Frani [Plin. Farrani] & Farfugij, cuius opinioni Matthioli assentitur, assentiuntur & alij.

Apud H. Lugd. p. 1049. Caltha palustris describitur: verum reperitur descriptio à quibus mutatis sub altera Tussilaginis Matthioli p. 1052. Sed nulla apponitur figura. Meminit eadem Calthæ palustris p. 1051. sub alia Nenupharum specie Scraphionis.

Hist. Lugd. notatur.

Hier. Brunsch in edit. anni 1550. ineptam figuram ponit, Sechsumen, h. e. Nymphetæ nomine.

Maré & sem. à fact Gesn. de cell. stirp. Maré Brunsch. in ramulis tubè ionib flore magis tincto: faminâ minorè albiorib. ramulis, & flore min' tincto, trades. Mas & f. min.

Tabern. & Gerard. maiore & minorem agnoscunt. Et hinc apud Tabern. nomine Populaginis maioris & minoris designant figuræ, apud Ger. vtriusque nomine Calthæ palustris maioris & minoris.

Maior & minor.

C. Bauh. phyt. (vbi priuatim Chamæleucen Plin. vocat, item quorundam Caltham Peccarij, & Boutomon Constantin.) & Plin. [vbi Chamæleucen Amy. lil. & Turc. cl. claret, Epimedium Dodonæi, Thall. & Amellum Vagil j putatum eiusdem appellat, & Farfugium Cast.] dicitur Caltha g. siue palustris flore simplici.

Boutomon Constant.

Germ. nuncupatur Dotterbloem, Flos vitellinus, &c. et nuncupatur Flos pratensis aureus, & Flos butyri, drachlum, & Ocul. Weyenblum, luteus Maij flos. Nomina german.

Humidis palustrib. locis, veluti riguis pratis gaudet, inde ab ipsis aquis eximius folia supereminentia longioribus, aut sur. pediculis, quæ alias brevioribus insunt. Flores huic rari, vel nunquam apparent. Illa vñ cum Ranunculis Vere flores, & ferus, subinde quoque Estate: toto autem anno ipsa viot herba. Lugdani obseruavi florentem Martio, Genevz April, & Maio siliquas ferentem: nem prope passera florentem Augusto. Loens & Tempus.

CALTHA PALUSTRIS FLORE multiplicato.



Multa habet folia, Descripti circinatæ sæcè rotunditatis, succulenta, venosa, in ambitu donnihil, vulgaris foliorum instar, ferat: prodeunt inter illa palmatæ caules, interdum enā [si vdo, pingu que Solo nascatur] pedales & maiores, obliqui, in aliquot alas dimisi; quæ vt plurimum, vulgaris more, ex antro geniculis bines pro- Est 2

ferunt flores, vncialibus petiolis innitentes, multiplica foliorum textura constantes coloris plane aurei, quorum quina inferiora, reliqua veluti sustentia, & amplectentia, masculula sunt: radix non minùs quàm vulgaris, multis candidis, crassiusculisque fibris prædita est, auctore Clasio, in Hist. post.

Synon.

Autori & Camer. dicitur Caltha palustris flore pleno: Gel. hort. Caltha palustris floribus densis. Eid. de coll. stup. Chamæleuce Ruellij hortensis, florum foliis multiplicibus: Populago multiflora Tabern. Cal. ha. palust. multiplex Ger. flore multiplici Eyft. C. Bauh. pin. Caltha 10. [9. in phyt.] hæc palustris fl. pleno.

Locus.

In Anglia tponiè & plenis & odoratis floribus reperitur, Cameratio auctore. Ex Salzburgernsibus pratis (in quibus copiosè nascitur) primum Viennam Austriæ delata: Nobilibus Matronis cepit esse in delitiis, cum illie videret Clathrus: postea etiam ex Augusta Vindelicorum accersita, verum non ad eò elegans ut prima, sed paulò humilior: eius nem folia minùs vegeta, & quasi pallescentia: flus etiam dilutior, & magis pellens. Augustianæ ferè similes plantæ, paucæ tamen, inueniuntur in pratis quibuldam virginosis, Francofurti ad Moenum vicinis, anno 1591. flore quidè pleno, sed rat oribus foliis contamine, quæ in hortu illarum, sequente anno, simpliciorum florum textura præditos tale u. flores, in illat vulgaris, quæquam Lugdunum Batavorum de tui. ut illie etiam oblectare liceret, simpliciorum florum semper præbuit. Nobis Montbelgard. in hortu floret Vere & Autumno.

GERANIVM IN GENERE EX VETERIBUS & NEOTERICIS.

CAP. CXIII.

Gerania
duo Diosc.

D Vas Geranij species describit Dioscorides. Geranium, inquit, folium habet Anemone simile, incitius diffusum, at longius: radicem subrotundam (Cassio, su. o.: Orb. spoz, su. lu.) dulcè & esul aptam. Hæc drachmæ pondere in vino pote, vterit inflammationes dilcutit. Vocatur & à nonnullis alterum Geranium, habens cauliculos renues, lanuginosos, duorum palmorum altitudinis: folia verò Maluæ limba, & in summis alis quædam lurtum spectantes eminentias, veluti gruum capita cum suis rostris, aut dentes caninos. Huius in re medica nullus est vsus.

Sunt autem qui prius Geranium Dioscoridis Pelonitum, qui Tican, qui Geravogeronem vocent. Aphri Iesce, Romani Echinaltrum appellant: Posterior quidam Oxyphyllon, aliqui Merriyge, nonnulli Myr. hida, pleriq; Cardamomon, aut Origanon vocant. Magi Hierobricas, Aphri Iec, Romani Pulmoniam, Cicutariam, & Grulnam herbam appellant.

Genera duo
Plinio.

Plinius duo quoque genera Geranij describit: Et prius vnum iuxta Latinorum quorundam traditionem. Deinde ambo iuxta Dioscoridem. Galenus in Simplicium censu Geranion omisit. Sed Paulus sequutus Dioscoridem, veramque Geranion commemorat, eadem quæ Dioscorides tribuendo.

Nomina
linguarum.

Commune hatum & similium stirplum nomen græcum est γέρανιον, latinum Geranium. Appellatum autem est Geranium, à gruini capitis imagine, quæ summo eius plantæ capitulo inest, aptissima similitudine. Sic recentioribus à cico-

næ rostri effigie, Rostrum ciconiæ nominatum est. Germ. Storchen schnabel: & Rammichs schnabel: Belg. Oynares beek: Gall. Bec de Cigogne: Ital. Geranio: H. sp. Pico de cigogna: Angl. Storches bill: Boh. Čapnušek: Hung. Várron lab/h. e. Cornicis pes.

GERANII SPECIES VARIE.

CAP. CXIV.

GERANIVM MALVACEVM.



A Lteri Geranio folia sunt Maluæ magnitudine, colore & mollitie proxima, nonnihil oblonga, subhirsuta, in ambitu serrata, pediculis appendiculis, tres duæve vncias longis, interdum ferè dodranalibus: caules ex eadem radice, solo latiore & fimeris multi hirsuti, mediocriter crassi, dodranicè aut cubitū alti:

è foliorum sinu pediculus exit duas triue vncias longus, multifidus, cui flores insident multi extruati, quinque foliolis constantes: quibus decidens rostra oriuntur vnciam aut lescunciam longa. Hæc planta aliquando vix trientalis est, foliis ovatis, crenatis & Betoniæ ferè similibus, quales nos habemus in Herbario nostro sicco, lectam, al fallimur, in agro Narbonensi.

Sub Geranio secundo, siue altero quibusdam dicto hoc intelligit Dioscorides, dum ei gruum rostra tribuit. Est Geranium foliis Maluæ paulò candidioribus Plinio.

Matth. in edit. comm. anno 159. hoc intelligit, cum ait: Geranij plantam vidi in pluribus hortis, ac viridariis satam, foliis rotundis secundis [Robertian] Geranij modo per ambitum laciniatis, Maluam magnitudine æquantibus, fructu gruinis caputulis simili. Hanc Herbariorum nonnulli, Momordicam nuncupant, quemadmodum & Balsaminam alij eodem nomine vocant: eamque cæteris præferunt in portionibus ad interna vulnera glutinanda. Hæc, meâ quidem sententiâ, magis respondet alteri Dioscoridis Geranio, ut quæ tollis ad Maluam propius accedat. Quare & hanc magis eandem esse cum illo putaverim. Verumtamen haud eam inficias, quin Pes columbinus dictus, idem sit Geranium: sed cum quis rectius forte Geranium minus dixerit. Eadem repetit in comm. cum mag. fig. lat. & Italicis. Sed non existimo Matthiolo benè perspectum fuisse hoc Geranium. Siquidem modò Momordicam ab aliis appellari credit modò verò, pro Geranio tertio, Veronâ à Calzolario misso, sine erto deplngit, & utrobique describit. Quinimò nihil persuadeo, tertio eam pro Malua alterâ à Calzolario Veronâ missa in lat. comm. cum mag. fig. sine descriptione tradita comm. verò Ital. pro quarta Epit. pro hederacea siue montana.

Meminis

GERANIUM TUBEROSVM MINIMVM.

Descript.

Est folio, flosculo, & totâ facie vulgaris Maluacei, siue Balsamini, aut Pedis columbini, atamen multò minus: radice Auellanz magnitudinis, rotundâ, tuberosâ, nullis fibris, sed veluti acetabulis, aut osculis ex parietibus alimentum hauriens. Ex murorum rimis, in quibus nascitur, in hortum translatum, Geranium tuberosum minimum penitus contabuit.

Synon.

C. Bauh. phyt. Geranium 13. siue tuberosum minus folio maluaceo: Eid. Pyn. Geranium Anemones folio rotundo 10. siue Ger. tuberosum minus Camerarij.

GERANIUM GRVNALE, FOLIO tenuiter diuiso.

Descript.



Radice tili-
tut singu-
lari, parâ, in-
tus forisque ru-
bente: caules ad-
modum nume-
rosi, plurimum
supini, dodran-
tales, interdum
bicubitales, ra-
mosi, sanguineo
rubore perfusi,
hirsuti, genicu-
lari: folia Pedis
columbini, ro-
tunda, sed te-
nuer, dissecta,
subhirsuta, &
nonnihil subin-
de rubentia: flo-
res Geranij Ro-
bertiani, paullò

maiores, purpurei, folliculo laxiore, minusque
rubente obfusi: semina rollata, quàm Robertia-
no habitiora.

Casp. Geranium 3. & Collum gruis, frax
mispalis Germanorum Fuchf. Lonic. [cui &
Gruiua] Lac. Dodon. [cui & Gruinale, & Geran.
gruinale] Geran. quartum: Lobelio in Adv. ni
fallor, Geran. Robertianum 2. siue Robertia-
na secunda: Camerario horr. Geran. supinum
paruum siue vagatulus, & maius, non ita passim
obulum & notum: H. Lugd. pag. 1278. Grui-
nalis Dodonzi: Casp. Bauh. phyt. Geran. 18. siue
Robert. secundum: apud Matth. Geran. Robert.
2. Matth. 5. Tabern. violaceum: Eid. Pin.
Geran. Anemones fol. rotundo 7. siue batra-
choides, Collum gruis dictum. Sed Matthioli
quintum non est gruinale, ut eo capite demon-
stratum: Geranium quoque violaceum Taber-
næmontani esse non potest, si vel solum figuram
consideres, quæ eadem cum ipsius Geranio Ru-
pertiano.

Locus &
Tempus.

Montpelij & Genevæ observari virens Fe-
bruarij principio, Montbelgardi etiam in hor-
to Ill. E. C. spontè florens Julio & Augusto:
circa fontem admirabilem in ducatu Wirtemb.
siue caulibus Octobri.

GERANIUM ARGENTEVm

montis Baldi.



Geranium
argenteum
palmâ altius
paullò: ex radice
crassiuscula tu-
bente, medio-
cris longitudinis
folia exeunt lon-
gis ac trium
quatuorve un-
ciarum pedicu-
lis hærentia,
parva, & quæ
folliculis articulo
regas, in quinq;
racinas præci-
puas, singulas
rufus diuites,
profundè ad vi-
que pediculum
fissa, pilis infra
subtilique albis,
luculentibus ut

in Hephaphyllo montano, lanuginosa, ad Gera-
nij gruinale formam accedentia: caulis tenuis,
palmatis, in ramos abit, quorum singulis insidet
flos purpureus, quantum sicca demonstrat, in me-
dio staminulis longiusculis, quem calyx excipit
magnus foliaceus, è quo tandem emergit rostrum
gruinum, unciam plùs minus longum: perennis
herba est, ut ex reliquis plurimorum foliorum
veterum, quæ radicem quasi squammatam fa-
ciunt, colligere est.

Hoc C. Bauh. in phyt. videtur intelligere per
Geranium 8. siue argenteum, & cum Geranio sa-
ranli Thelij & Camerarij, quod idem est cū meo
lucido, siue elus decimo, turpi ex confondere.
In Pin. vocat Geranium Anemones fol. rotundo
14. siue argenteum alpinum.

Nascitur alpinis rupibus maioris montis Baldi
(ex quo petrum, mihi Bechius misit): Orientem
aspicientibus, ac ibi passim Floret initio Julij, se-
men Kalendis Augusti perficitur. Perennis est
planta. Radix amariuscule, ac quadam subadstri-
ctione donata.

C. Bauh.
not.Locus &
Tempus.

GERANIUM TUBEROSVM.



Geranium
tuberosum
dictum, nomen
invenit à ra-
dice tuberosa,
sublignâ, infi-
pida: cuius fo-
lia, semipalma-
ri & palmari
subhirsuta pe-
diculo dona-
ta, lata sunt, di-
visura octonâ,
novenave ad
ipsam usque
pediculum, sin-
gulis segmen-
tis minutius
dissectis, colo-
re ex viridi ca-
nescente: flo-
res 10

res in petiolis teretibus subrubisq; ac hirsutis, pulchri, purpurascētes, ex quinque foliis in summa diuili aliquantum, intensiore purpura striatis, & circa imum marginem nonnihil hirsutis, fibris purpurantibus: circumiecta autem sunt flori quina itidem folia acuminata, intus nonnihil rubescentia, glabra, foris virescentia, & lanuginosa. Floribus decidentibus succedunt rostra.

Synonyma.

Dioscoridis est γεράνιον foliis Anemones, diuisionibus longioribus, radice tuberosa, dulci. Plinij Geranium alterum Græcorum. Pauli Geranium folia habens Anemone similis.

A Dioscoride autem primo loco descriptum esse testatur inter alios Matthiolus, qui in priorib. comm. pro Geranio pingit, & in post. pro eo etiam describit. Mirum proinde eum in Hist. germ. Geranium quatuor statueret.

Diosc. 1. Descrip.

Pro Geranio primo, scil. Dioscoridis recipitur quoque ab Anguill. Lob. in Adu. & Obs. Cam. hort. Tabern. Cast. Gerardo, & Celsalpino: cui & Pancateolus dicitur. Pancateolus, inquit is, vulgò appellatur in montibus nomine confecto ex pane & caelo, quorum vicem in cibis explet radix: Geranium Dioscorides vocat, & Plinius similiter.

Synon.

Gesn. hort. dicitur Geranium subrotundâ radice Dioscoridis, ab Anguilla allatum. Lob. in Adu. Obs. p. 337. lc. Plant. p. 66. Geranium bulbosum. Cam. hort. Geran. tuberosum maius, admodum viuar & copiose se propagans. Gerardo Geran. tuberosum. C. Bauh. phyt. Geran. ii. siue tuber. maius: E. d. Pin. Geran. Anemones folio rotundo nonum, siue tuber. maius.

H. Lugd. icon. bina.

H. Lugd. p. 1275. Geran. i. Matthioli: E. p. 1276. Geranium tuberosum Dodonæi. Vtraque figura est Geranij bulbosi: sed prima id proponit, ut Matthiolus expressit: secunda Dodonæi, quæ melior, sufficiebat.

Tabern. mon. icon.

Tabern. lc. Geran. tuberosum siue Illyricum, windisch schnabelkraut / & Geran. bulbosum Matthioli, turschisch schnabelkraut: Hi st. Geran. septimum, Pelonitii: Geranogeron. Trica, Herba gruina, Echinastum, Vchinastum, Pulmonia, Rostrum guinum, Rostrum ciconia, & Permonia: Arab. Geramon. It. Geranto, Aco de passori, Hispan. Bico de ciguenha, Gall. Bico de cicoigne. Afric. Jesc, Hüg. Wapulab. Boh. Čapmusek. Angl. Storckes bill of 'Mlinar' Belg. knobelach nig Cranebeck. Germ. Schlovonsch Schnabelkraut, Schlawonscher Storch u schnabelwindischer storckenisch nabel: Item, Geranium decimum, primo Dioscoridis annumerandum, γεράνιον βολβοειδές, Geran. bulbosum, & rotundum à radice nūcupatum, Geran. Byzantinum, Geran. Turcicū, Germano. Zimbel schnabelkraut, Constantinopoli tanulcher Storcken schnabel / & turschischer storckenisch nabel / quia primò Constantinopoli in Germaniam delatū. Has duas non separamus, quin potius easdem esse statuimus.

Locus & Tempus.

Montbelgardi Solum commodè perfert, florens in horto Illust. E. C. Iunio & Iulio. Vires ex Veteribus lege antè.

GERANIVM ASPHODELI RADICE.

Descript.

Radice habet ex multis parvis & longis bulbis constantem, versus summum fibratam: caulem cubitalem genicularum, juxta radicem & genicula parum rubentem: è singulis geniculis duo folia longiusculis pediculis nitentia, in quinque præcipuas partes dissecta, quarum singulæ

Tom. III.

in ambitu inæqualiter incisæ sunt: è singulis juncturis, juxta foliorum exortum quinque folia mucronata exoriantur: flores in summis ramulis conjugatim parvis pediculis insistentes rosei, ex quinque foliolis constantes, colore ex purpureo rubescentes, Geranij cæruleis floribus similes, sed paulò minores.

Clusius descriptionis author facit in Pannon. p. 419. Geranium 3. In Hist. post. 4. cognomina quæ Geran. bulbosum Pennæi. Dicit autem foliorum similitudine secundum Geran. Batrachoides aliud folio Aconiti nitente [referre. C. Bauh. in phyt. est Geran. ii. siue radice ex multis bulbis constante: Eidem in Pin. Geran. Anemones folio rotundo ii. siue radice grumosa.

In Danla provenit agro Habsburgensi, vnde Turnerus Clusio attulit & dono dedit.

Locus.

GERANIVM BATRACHOIDES.

Radix pollicari est crassitudine, foris rubra, Rintus brevis, multis fibris donata, sapore vehementer adstringente: caules cubitum aut sesquicubitum æquant, tenues, spongiosi, subhirsuti:



flores speciosi, magni, cærulei; quinque foliis purpura striatis constant, in quorum medio apices alto-purpurei: folia Aconiti, magna, rugosa, profundè incisa, & quasi in orbem nonnūquam acta.

Camer. hort. & C. Bauh. duplex est: grandius floribus cæruleis, aut albis, & quidem eodem loco: minus rubris.

Trag. vocat Geran. 4. ordine postremum, Sanguinarie radice speciem: Corn. & Matthioli in post. comm. & Hist. germ. Geran. quartum: quintum Fuchs. Lac. & Lonic. qui malè quoque Chelidonium minus appellat: sextum Turn. Dod. gall. ac etiam cum lat. in fol. Geranium Batrachoides à Ranunculi similitudine, vnde & vulgò Ranunculum cæruleum appellant. Lat. præterea & alterum Geran. batrachoides pingit, aliam Geranij Batrachoidis speciem nuncupans & describens.

Synon.

H. Lugd. p. 1280. & Cast. Geranium 4. Matthioli: Gerardo Geranium batrachoides: Clus. in Pan. sine icon. pag. 419. Geran. batrach. primum, Geran. batrach. cæruleo flore Belgicum, Hist. post. Geran. 3. batrachoides maius. Thal. Geran. batrachoides Dodonæi fl. purpureo magno. Camerar. hort. Geran. batrachoides maius & minus. Lobel. Adu. Geran. batrachoides, siue magnum, cæruleum odoratum, Obs. pag. 376. Geran. batr. siue gratia Dei, lc. Pl. p. 659. gratia Dei Germanorum. Cronemb. gratia Dei, Geranij 5. species Fuchsij, Tabern. lc. Geranium siue Batrachium cæruleum, blauw storckenschnabel. Hist. Geranium sextū, Ranunculus cæruleus, gratia Dei cærulea. Hoc

Plura Syn.

quamvis neque à Dioscoride, neque ab aliis Græcis describatur, tamen ad primum Dioscoridis referri posse putat.

C. Bauh. phyt. Geran. 3. siue (ceu etiam apud Matth. ubi figuram Geranij sanguinei Tabern. assumpsit) Geran. batrachoides. Eidem in Pin. Geranium Anemones fol. rotundo 3. siue batrachoides, Ger. sanguinarium Tabern. maius Eystett.

An Geran. alterum, Geran. maiori Aconiti folio simile Gesn.?

An Balsamina vulgò Cæsalp.?

Genevæ quidem mihi florebat in horto mense Maio ex proximis montibus allatum. In Belgicis hortis quosdam aluisse etiam observavit Clusius: ac spontè provenire variis in Germaniis, Bohemiæ, & Austriæ pratis.

GERANIVM BATRACHOIDES ALBUM
& ex albo cum cæruleo colore varium.

Describe.



Folius est similibus Batrachoidis vulgaris, aut certe vix notabili differentia variantibus, quorum pediculi cubitum longitudine excedunt. Tota planta lanugine quadam albicante obdita. Caules sunt bicubitales. Flores albi lineis cæruleis striati, quidam etiam medio-cærulei, sex foliolis constantes. Calyx hirsutus, quinque constat foliis, è quo, flore decedente, rostrum emergit notabili hirsutie donatum, vixiam plus minus longum, desinens in apicem tenuem, qui in extremitate per siccitatem in tenuissima quadam filamenta capreolorum instar contorquetur. Tandem distiliens rostrum semina ostendit quina, imis rostri cottis hærentia, & in folliculo membraneo contenta, oblonga, sinuata, colore pullo, exterius viridi, sapore dulci, grato. In foliis autem nullus sapor effatu dignus.

Gerardus pro Geranio 2. Batrachoides albo assumpsit iconem à Tabern. propositam pro Geranio 13. siue sanguineo, quod non displicet: figura enim Tabern. non convenit cum sanguinei descriptione. C. Bauh. Pin. vocat Geranium Anemones fol. rotundo 6. siue Batrachoides flore variegato, Anglicum variegatum Eystett.

Ex semine Argentinae collecto in horto Frid. Meieri provenit nobis Montbelgardi: secundo anno floret & semine deciduo se propagat.

GERANIVM BATRACHOIDES ALIVD
folio Aconiti nitente Clusij.

7. Descriptio.

Prodeuntibus è radice frequentibus longoque pediculo nitentibus foliis prædicum est,



Ranunculi platyphylli, aut Aconiti lycoctoni pallido flore, folio respondētibus ferè, rugosis, sabhirsutis, in aliquot profundas lacinias diuisis, deinde in ambitu serratis, quæ gustata inuicem adstringere, & linguam exsiccare, deinde nonnihil calfacere deprehenduntur: caule cubitali ut plurimum,

firmiter, rotundo, geniculato, in multas alas diuiso, quibus supernascentur folia superioribus minora, paucioribusque lacinis diuisa, perinde tamen in ambitu serrata: summi rami in oblongis pediculis flores gestant quinque foliis contentantes, Geranij batrachoidis quod in Belgicis hortis alitur, floribus formâ pares, paulò tamen minores, nec, ut illi, cæruleos, verum ex purpura rubentes, decem staminibus cum stilo ex umbilico floris prodeuntibus: deinde oblonga, erectaque rostra, non inflexa, aut inclinata, quin vtriusque ad eorum basim turgentibus, & semina continentibus, quod maturitate exilit, aliorum Geraniorum more: radix superiori [Geranio phæo siue pullo flore] ferè responderet, & summâ tellure in plura castra, interneque rubentia capita extuberat, quæ fibras etiam agentia, singulis annis augentur.

Author Clus. in Pannon. pag. 417. & Histor. Synon. post. describit, Geranij batrachoidis alterius titulo: inscribit verò ibi pag. 418. Geranium secundum: hinc autem Geran. 1. batrachoides minus.

C. Bauh. phyt. Geran. 6. siue batrachoides maximum, Batrachij speciem tertiam Gesn. hort. & Geranium batrachoides alterum, vel montanum primum Clusij videntur appellare. Cur autem maximum cognominat, cum Clusius minus esse scribat? Ei est in Pin. Geranium Anemones folio rotundo 1. siue batrachoides folio Aconiti, Geranij species tertia Gesn. hort. Geranij maioris species prima. Eid. app. Geran. batrachoides Gerardi. Variat., inquit, flore cæruleo, albo, lineis cæruleis variegato: est & flore cæruleo duplici, sed duplici majore, & dicitur Geranium batrachoides cæruleum, & Geran. batrachoides flore albo, Eystett.

Crescit in Pannoniis, Stiriacisque Alpibus, nusquam tamen abundantius, quam supra Gamlingam, in illo ascensu ex Herren-alben jugo ad sublimes scopulos Durrenstein, in quibus floret Iulio & Augusto: in hortis autem Maio.

GERANIVM

Locus & Tempus

GERANIVM BATRACHOIDES.

maximū minus laciniatum,
folio Aconiti.

Descriptio.

Est ex eadē Batrachoidis Geranii familia aliud, eomaj^{or}, foliū ad Aconiti lutei folia accedentibus, ea verò quinque laciniis incisa, iisq; latioribus, quā in primo Batrachoidē, & per extrema serrata, hirsuta: caules magni, hirsuti, geniculati, in ramos divaricati, in longos desinentes pediculos bifidos, qui sustinent magnos flores duos, ex purpureo rubentes, quos excipiunt rostra brevia.

Synonyma.

De hoc ait Gesner. hort. Geranii tertia species ferē similis montanæ (i.e. Ischemo) maioribus & latioribus foliis, quibus Aconitum luteum representat, flore rubente. Item, Append. Geranii maioris species foliis magnis, figurā ferē & magnitudine Aconiti lutei, hirsutis, asperis.

Locus & Tempus.

An Clus. Pannon. pag. 422. & Hist. post. Geranium *quarodam* alterum?

Nascitur in humidioribus pratis in quibus ferē Bistorta, In hortum Ill. E. C. Montb. ex monte Balon translatus diu durat.

GERANIVM BATRACHOIDES LONGIUS radicatum, odoratum.

Descriptio.



Spectabili florū amœnitate nulli Geranio cedit, qui ex calyce globofo, striato, rubente hirsutoque, odorati emicant purpureo-violacei, ē quinque foliis compositi, surrecto staminum purpurascensium altiore cincto, in calibus geniculatis, dodrantalibus, cubito altioribus interdum, & hirsutis: folia diuisurā quodam-

modò Saniculæ, ex virore incana, pilosa, odorem spirant non ingratum. Radix oblique acta serpit, longa, minimi digiti crassitudine, fibris & geniculatis tuberibus donata, foris rubens, intus alba cum adstrictione valida, nescio quid aromatici gustui offerens.

Synon.

Lobel. in Obs. p. 376. Ic. Plant. p. 661. vocat Geranium Batrachoides alterum longius radicatum. Camer. hort. Geranium macrorhizon, Gallorum Banaticam, grauissimi odoris; Staticē quarundam, septem floribus roseis, ventrem sistentem à Plinio descriptam. H. Lugd. p. 1280. Geran. Batrach. alterum long. radicatum Lobelii. Casp. Bauh. phyt. Geran. 6. siue Batrachoides odoratum: Idem in Pin. Geran. Anemones folio rotundo 3. siue Batr. odoratum, Geran. montanum Gesn. coll. Geran. Batr. alterum Dod. Ger. macrorhizō. Eysterr. Pedem columb. in siluis nascentem alterum Cæsalpini.

Locus & Tempus.

Frater mihi retulit nomine Momordicæ ex horto Patanino. Obseruari ego Stutgardia in Tom. III.

horto Illust. Princ. vnde Montbelgardum in hortum Illustr. E. C. transtuli, in quo se crassa sua & repente radice multum propbat, ac diu perennat.

GERANIVM PHÆVM FLORE reflexo.



Speciosum est Sapprimē hoc Geranii genus, foliis ampliorib. quā Batrachoidis, in octo plus minus segmenta, angulata, sed lata, diuisa, subhirsuta, nigricantib. maculis aspersa, per ambitum latiusculis crenis cōspicua, nullo odore prædita. Flor. summitatibus insidet purpureus & penē fuscus, satis magnus, accedens ad florem Geranii folio odorato, qui inuersē contorquetur atque reflectitur, in medio apices, floribus decedentibus rostra oriuntur vnciam longa.

Descriptio.

Lobel. in Obs. pag. 377. Icon. Plant. p. 660. Geranium fuscum intulit. Tabern. Ic. Geran. maculatum fleckenschnabelfraut. Hist. Geran. phyt. Geran. 9. siue montanum fuscum, Eidem in Pin. Geran. Anemones folio rotundo 8. siue montanum fuscum, Geran. mont. Dodon. Geran. fuscum Lobelii, Lugd. & Eysterr.

Synon.

Colitur in Germaniæ hortis, vt Frid. Meieri Argentinensis florens Maio, & Ill. C. Wirt. Stutgardia florens Iunio.

Locus.

Geranium phæum siue pullo flore Clusii.



Author Clusius vocat in Pann. p. 415. Geranium montanum 1. siue Geran. 9. 4. 4. aut pullo flore. Hist. post. Geran. 1. pullo flore, Geranium folia habens Lycodono flore luteo non dissimilia.

Descriptio.

C. Bauh. phyt. Geran. 5. siue Batrachoides hirsutū flore atrorubente, Geran. mont. 1. Clusii, Geranii maioris species secunda, Gesneri in Ap-

pendice.

Ego, vt verū fatear, facillē crediderim, Geraniū

G g g

phæum à nobis descriptum & Lobelii fuscum, achoc Clusii pullo flore, eadē plantas esse, aut saltem valde similes. Hoc tamen diuersitatem forsitan demonstrat, aut naturæ lusum, quod Clusius scribit florum folia laciniata esse, quod non demonstrat tamen icon. Neque nos florum foliorum lacinias vnquam obseruauimus. Si non in post. Hist. folia adhuc laciniata scripsisset, suspicaremur legendum esse folia reflexa, aut tale quid simile, & hac in parte errorem esse commissum.

Locus &
Tempus.

Inuenitur in Stiriz Alpibus, vbi sylvæ definire solent: & floret Iunio: in hortis verò, in quibus felicissimè prouenit & luxuriat, Maio.

GERANIVM MAGNUM FOLIO trifido.

Descriptio.



Elegans Geranium, cuius aliquot ramos habemus cubitales, brachiatos, glabros, quibus folia per ramos ex dodrantali plùs minùs distantia, & non multò brevioribus pediculis, hærent tripartita, principio tamen quo pediculo hærent, vnciali latitudine integra, nonnihil hirsuta, per ambitum serrata, plurimis fibris se mutuo

contingentibus & interfecantibus intertexta. Summa florum occupant purpurascens.

A Voldio nobis missum est pro Geranio montano, neque descripto, neque depicto. An Pes columbinus in siluis nascens &c. Cæsalp.

Icon.

Icon nostra desumpta est ex Clusii Geranio quinto nodoso I. Plateau, & ramo Geranii 6. tuberiferi eiusdem. Hæc enim duo Clusii Gerania vnum sunt, & à nostro non differunt.

C. Bauh.
notatur.

C. Bauh. in Pin. vocat Geranium Anemones fol. rotundo 12. Geranium nodosum, quæritq; an sit Geran. ceruleum Tabern. & Batrachoides Gerardi, sed frustra, concluderat enim antè eorum Geranium esse Geran. Anemones folio rot. primum, siue Batrachoides folio Aconiti.

GERANIVM SANGVINEVM SIVE hæmatodes crassâ radice.

Descriptio.

CRassâ hæret radice, multis longis crassiusculis appendicibus auctâ, rubiâ, gustu admodum adstringente: caules emittit plures, cubitum altos, rubentes, hirsutos, geniculatos, in multas alas diuisos: ad singulas iuncturas bina nascuntur folia, circumscriptione rotunda, sed in quinque lacinias, trifidas plurimum, profundè ad pediculum ferè dissecta, hirsuta, supernè virentia, subruscanescentia, sicco & adstringente sapore prædita: fls. pediculis singularibus ex superio-

rum foliorum sinu pronatis vnicus insidet, Rosulæ æqualis, coloris purpurei, quinque magnis



foliis constans pulchrè explicatis, quæ totidem nervosis, hirsutis, viridantibus foliolis subtus natis suffulciuntur, medium verò occupant stamina: rostra suboriantur, quinque chorulis seu granis firmata, quibus diffilientibus acus rostrorum reflectuntur.

Trago hoc Geranium minime ignotum fuit, sed ab eo Geranium tertium

Synonyma.

vocatum, & Sanguinariae radice titulo pictum. Fuchf. Lonic. Lac. & Turnero dicitur Geran. sextum: Corn. & Dod. gall. quintum: Gesn. hort. Geranii altera species maior montana, & Ischæmon: Dod. gall. Camer. hort. Thal. H. Lugd. pag. 11. 9. & Clut. Pan. p. 41 [p. 49. quartum.] Geran. hæmatodes: Hist. post. Geran. 7. æquum dicit. Lob. in Adv. pag. 296. Geranii Robertiani varietatem tertiam constituit.

Gerardo Geran. sanguinarium bloudis Gerardus bill. Ceterum Geranii sanguinarii titulo due habentur apud Tabern. icones & descriptiones: posterior autem figura in Ic. p. 774. in Hist. part. 2. p. 449. melius placet priore, quæ in Ic. est pag. 61. in Hist. part. 1. p. 151. quam C. Bauh. apud Matthiolum melius Geranio 7. siue Batrachoidi accommodauit. Hic vocauit in phyt. Geran. 7. siue sanguineum maximo flore: In Pin. Geran. Anemones fol. rot. 4. sanguin. max. flore sanguinar. Eystett. Compiler porro Tabernamontani imperitiam suam stirpium summam detegit, eandem herbam bis tradendo, etiam quidem vulgò notam. Geranium tandem hæmatodes, siue sanguineum dicitur tum à radice sanguineo intus & foris colore, tum à mirifica eius in sistendo sanguine facultate.

Geran. sanguinar.

Compiler notatur.

Locus &
Tempus

Tossanus Carolus anno 1590. mense Iulio mihi transmisit ex Champagnole Burgundiæ nomine Geranii alpini, inibi in iugis altissimorum montium collectum. Montipeli floret Aprilis: Geneuæ Maio: Basileæ iuxta Leurach Iulio & Augusto. Nascitur in omnibus Pannoniæ & Austriæ infra Onasum cædis montanis siluis, editoribusque gramineis locis. Mons præterea arcu Greben imminens ultra Drauum in Pannonia Interamni, totus ferè eo Geranii genere confusus, qua parte Occidentem spectat. Siluæ etiam Francofurti ad Mænum vicinæ eo abundant. Floret Maio & plerumque totâ subsequente Æstate.

Sclauonicæ mulieres huius decoctum ex profluente aqua, mirificè commendant in capitis grauedine, si synciput, vbi dolor est, eo abluitur, deinde herba decocta superimponatur: postremo, (quod superstitione non caret) in profluentem, vnde aqua hausta, abjiciatur. Ad sanguinem vndique manantem compescendum in primis commendatur.

Vires

GERANIVM

GERANIVM MOSCHATVM FOLIO AD

Myrrhidem accedente maius & minus.

Geran. moschatum minus.

Descriptio.



SVpinos plures profert, colq; plures, & satis crassos, nodosos, teretes, & pilis hirtos, per terram supinos: folia è geniculis vtrinque exeunt, palmum plus minus longa, & pluribus foliolis ad costam rubescentem hirsuta tanque adnexis composita, quorum singulatia ad Chamædrys folia accedunt, diuisura profundiore, sapore

insuavi & subastringente: ex foliorum alis pediculi singulares oriuntur quadrantales & trientales, tenues, rigidi, villosi, rubentes, qui in pedicellos minores quatuor, quinque aut sex filii, *flosculos* in umbella gestant, Pedis columbini dicti Geranii ex cæruleo purpurascens, quibus rostratum semen succedit: *radix* simplex crassiuscula, fibrata, alba, sapore eodem cum foliis.

Huic affinis & illa species, inuentu rarior, tota maior, odore Moschi, foliis non ita altè incis, & nonnunquam tantum ferratis.

Gerania.

Est Geranion quod aliqui Myrrhin, alij Merthyda apud Plinium appellant. Ruell. vocat Acum pastoris Herbariorum, suspicaturque esse Geranium primum folio Anemones apud Dioscoridem & Plinium. An Cord. Hist. Geran. supinum majus?

Brunsch. tom. 2. rhaps. 11. pingit sub titulo Herbae Roberti, vocatque Geran. Rostrum ciconiae, Robertianam, Gratiam Dei. Quomodo autem describat, certè mihi non constat, nisi id faciat quarto loco. De hoc Geranio pauca admodum Brunsch. in priore editione (vbi nulla figura) nomine Gratiae Dei: in edit. autem anni 1750. eam pingit. Tragus Geranium primum [sc. Dioscor. facit, & pro minore pingit, sed pictura non multum valet, Apollinaris Geraniorum genera non distinguit: pingit tamen, sed satis ineptè, Geranium quod Rostrum ciconiae dicitur & moschatum.

Gratia Dei

Geran. Plin. Marib.

Matth. non dubitandum existimat, quin Geranium Plinij, Myrrhis & Myrrhida dictum, illa sit herba quam quidam Rostrum tum gruis, tum ciconiae appellant, quidam verò cum officinis Acum moschatam Ruellium hallucinatum credit, quod Acum moschatam dictam, quam ipse Herbariis etiam Acum pastoris appellari ait, primi generis Geranium Dioscoridis esse opinetur. Ex quibus patet eum in prior. comm. malè Geraniū primum inscripsisse, ac propterea in post. meliùs Geranii tertii nomine pinxisse. Quin & Amatus, licet huius figuram Geranii primi titulo exhibeat, falsò Ruellium primum Geranii genus apud Dioscoridem putasse refert.

Geranium primum vocant Cornar. Dodon. Tom. 111.

gall. Turn. Lonic. Cast. Fuchf. & Lacuna. Anguill. verd ep. 13. describit pro Herba moscata, Gruaria, Herba Roberti & Acum mulcata.

Gronemb. supra empl. Gratia Dei, deprehenditur contraria scribere. Nunc enim Ruellium idè reprehendendum ait, quod Rostrum gruis primam Dioscoridis speciem putarit: Nunc verò Geranium Dioscoridis primum, Roberti cognomine assignet. Per Roberti autem herbam hoc ciconiae Rostrum intelligit, & passim Acum moschatam vocari ait, quod ipsum haud placet.

Lob. indictam ait Diosc. vocatq; Myrrhidam Plinii in Adn. Obs. p. 376. Icon. Plant. p. 648 vbi & Geranium moschatum. Item pag. 659. Myrrhida Plinii, & Rostrum ciconiae inodorum, vulgatum. Cæsalp. Acum moschatam folio Pimpinellæ, & Pectinem Veneris Plinii. H. Lugd. p. 1277. Geranium tertium Plinii. Camer. hort. Geran. moschatum.

Tabern. lc. p. 57. vocat Geran. minus, Geran. aruense [tem. verch. schnab.] alterum flore albo. Item, p. 58. Geran. myrrhinum. Hist. Geran. 3. inodoru, ein Schnabellkraut oder Schnabellkraut: Geran. 4. aruense album: Geran. quintu, Geranii primi speciem Dioscoridis, Geran. cicutarium, Rostrum gruium, Gruinam, Gruariam, Herbam gruina siue gruariam, & Acum pastoris similem præcedenti, maiorem, odoris grati. Frustra Tabern. ponit duas icones Geranii minoris quandoquidem solo colore differunt.

Geran. Geran. moscatu, Myrrhidam Plinii: Item Geran. moschatum inodorum, Plinii Myrrhidam inodoram, Vinsauoric musc. Craues bill. Et, Geran. inodorum albu, white flowered Ninc. neede. Cur. Ger. separauit album à priore cæruleo purpurascens? cur quoque prius & posterius non reliquit vno & eodem capite?

Geran. nosp.

C. Bauh. phyt. Geran. 14. siue Cicutæ folio moschatum & primum Plinii: Item, Geran. 15. siue Cicutæ folio inodorum, Geran. supinu maius Cordi: Et, Geran. 16. siue Cicutæ folio supinum. Idem in Pin. Geran. Cicutæ fol. 1. moschatum & inodoru, Acum moschatam Columne, Ger. *ar. d. no. pullor* Thal. & moscatum Eystett. Item, Geran. Cicutæ folio 4. siue minus & supinum, Geran. 7. siue gruinum Dod. moschatum inodorum Eystett. Flos communiter Bresilici coloris: aliquando albus est: hinc duæ figuræ apud Tabern.

Geran. moschatum minus Monspeli obseruati: Basileæ floret Octobri in itinere Moutensi: Genevæ passim *au plain palai* virens mensis Februarii principio & Martio: Patauij florens medio Febuario. Maius hortensè est. Maius, inquit Tabern. solet prouenire in agris cultis, arenosis minus autem locis macris & arenosis, & rudibus.

Locus & Tempus.

GERANIVM SPECIOSVM ANNVVM, longissimis rostris, Creticum.

Descriptio.

LAtè terram obumbrat *ramulorum* hirsutioru, inodorum cogerie, *foliis* prædiorum longis, hirsutis, nonnihil rubentibus, sinuosis & ferratis, sapore acido & adstringente: *flores* cærulei amari, quinquefolii, quos circumstant calycis dehiscens folia quina, è striatis filis media membrana pellucida alba commissis composita: *acum* plusquam palmari longitudine ad basin crassiusculæ.

An Lobel. Obs. p. 377. Geranium Creticum an- Ggg 2

Vire: & Vitis.



num; Ic. Plant. Geran. Cret. annum hæmatodes. Camer. hort. Geran. Creticum lōgissimis rostris à Lobelio descriptum. Clus. Gerar. & Taber. Ic. Geraniū Creticum: Tabern. Hist. Geran. 8. Candiacum, Veneribus indictum. Cas. Bauh. phyt. Geran. 19. siue maximum latifolium longissima acu. Eidem in Pin. Geran. folio Cicutæ 7. siue latifol. longiss.

acu. Nobis aliunde missum est titulo Herbari Roberti Hispanensis.

Locus & Tempus

Montbelgardi in horto Ill. E. C. floret Iulio & Augusto, Septembri verò maturat semen: se ipsum seminat & Hiemem perfert. Mompeliano agro, Clusio teste, spontè prouenit.

GERANIV M ROBERTIANVM murale.

Descriptio.



Obiūm vbiq̃ in ruderibus Geranium Robertianum, radice tenui, colore buxæ: quæ caules surrigit dorantes & cubitales, hirsutos, geniculatos, rubentes, maximè circa articulos & propter terram, ramosos: folia partim à radice, partim ex geniculis, hirsuta, pediculo rubente hirsuto, Matricariæ ferè di-

uisurâ, segmentis primariis duntaxat tribus, odore vbi teruntur Pastinacæ, sapore adstringente, per oras aliquantū rubentia, interdum tota: flores purpurei, dilutiore purpura striati, foliis quinis constantes è calyce hirsuto, atrorubente, quinquepartito emicant, apicibus in medio croceis: succedunt rostra mucronata semen appensum habentia.

Flora can-
dida
Sideritis 3.
Kunt.

Geranium Robertianum candidissimo flore in monte Wasserfall non rarò occurrit.

Ruell. ni fallor. vocat Sideritidem tertiam: Dioscoridis. & vulgò ait vocari Acum pastoris. dicit esse Myrrhin Cicutæ foliis, & inde à nonnullis Cicutariam dici. Tragus pro altero Chelidonii genere describit, ac Gratia Dei titulo pingit: Eorum autem opinionè planè improbat

qui Pedem columbinum vocatam hanc plantam velint: Chelidonium minus esse statuens: Eius autem opinionem reprehendit Cronenburgius, cuius verba paulò post adscribemus.

Matth. nos.

Apud Matth. Figura in priorib. comm. sub Geranii alterius inscriptione designans Geranium, Robertianū, melior est; deterior in post. comm. tituli etiam diuersi: descriptio nulla bona: Camerarius pro ea ponit Geranii Robertiani nouam imaginem: C. Bauh. pro tertio pingit Geran. Robertianū ex Tabernamontano, ac præterea inep- tam addit Matth. picturam, quam præter nostrā sententiam, ac etiam, vt suspicamur, Matth. facit Geranium 4. Fuchsi, siue gruinalè. Porro, Matthiolus in prior. comm. Sideritidem postremam Diosc. eam planè refert plantam scripsit, quam vulgus Herbariorum Rubetā appellat. Sed præsentia verba silentio præterit in comm. cū mag. figuris. Quemadmodum tandem non descripsit Geraniū, ita solā picturā passim. in comm. suis & Hist. germ. exhibet Sideritim tertiam. Quam autem figura Matth. nonnihil repræsentet Geraniū, & ipse olim dixerit Sideritim Rupertam refert: existimo figuram esse partim ad descriptionem, partim ex Geranio effictam. Hinc fortè in comm. post. omisit verba, de Ruperta in prior. tradita, vt suum tueretur figmentū. Et hæc fortassis quoque occasio fuit, vt Camer. in Hist. Matth. germ. & Epit. eius iconem quoque neglexerit: C. Bauh. meam ante multos annos annotatam sententiam amplexus est. Sideritis quartæ figura inquit, videtur voluisse Geranium aliquod exprimere Matth. quoad folia maximè cum Geranium Rupertianū Sideritidis nomine donetur: flores verò nō Geranio, sed Alchimillæ conueniunt. Inscribitur hæc à Lugd. Sideritis quarta à Cast. & Tabern. tertia, à C. Bauh. quinta.

An Cronenburgius hoc Geranium à Moschatorite distinguat, ex his eius verbis percipies. Tragus Chelidonium minus appellare voluit, herbam vulgò dictam Gottesquad. h. e. Gratia Dei, improbens eos qui Geranion, qui Roberti herbam, qui Acum moschatam, qui Pedem columbinum esse contendunt: in quorum tamen catalogo habentur quorquos simplicis Medicinæ artem tradunt doctissimi. Notandus Ruellius quod Myrrhin Dioscoridis statuit herbam Roberti, sicut & Io. Tagault. de pot. vulnerariis.

Lonic suo more omnia confundens pingit pro Geranio tertio, ac secundò pro Chelidonio minore, pluribus plantis eadem nomina tribuens priori loco.

Si Valeriolæ de peste, Herba Roberti est eadem cum aliorum, non placet adiunctum Rostriconicæ nomen: id etiam perpendendum fuerit, an in carbunculis pestiferis vsus eius conueniat.

Scio Lobel. aliò refert Panacem Heracleum Sideritidem Anguillare, quem epist. 5. eundem cū Sideritide Crateæ & tertia Dioscoridis facit. Verū melius placet Tabernamontani opinio.

Tabern. Ic. & Hist. vocat Geran. Rupertianum, & Geran. primum, ac ait Tragus non sine errore Chelidontiam minorem vocare: esse Dioscoridi Sideritim Heracleam Crateæ: Anguillaram existimare esse Panacem Heracleon Diosc. sed longè aberrare: Doctos vocare geranium Rupertianum, muschatum, & vulnerarium, item Gratiam Dei, Herbam rubeam, Rubeam muschatam, Rupertianam, Rupertianā, Herbam Roberti aut Rupertti, aut diui Rupertti, & Rubetā: & has nomenclaturas ferè omnes à rubro caule & foliis rubris

C. Bauh. nos.

Panax Heracleum
rach.
Anguill.

Tabern.

Nomina
linguaram.

el impositas esse: appellari alijs etiam Acū muscha-
tā. It. Aco muschata & Ruberta: Gall. *herbe Robert*:
& *Bec de cicogne sentant le muse*: Angl. *hierb Ro-*
bert. Belg. *Xobrechts fraye / Roberts fruyt*: &
Dynacres beek die nader de Musus neet: Ger-
man. *Ruprechtshraut / S. Ruprechtshraut /*
Eichtshraut / Gottes gnad / Kettlauffshraut: q
erysipelatis medeatur, *flein Schöllwurm*: &
flein Schwalbenkraut: quod cum Chelido-
nio, aut aduentu hirundinum floreat, & hinc Tur-
nerum Geranium Chelidonium, & Geran. hiru-
ndinarium nominasse. Item, Geran. violaceum, Ger-
duodeclum, Geran. batrachoides minus, & gra-
diam Dei minorem.

Hist. Lugd.
idem eadem
reperita.

H. Lugd. pag. 1276 Geran. 2. Dioscoridis, 3. Mar-
thioli, Pes columbinus: p. 1276. *Herbæ Roberti*,
Geranii quarti genus Marthioli. *Cur eandem fi-*
guram ponit duobus locis, sub duobus titulis,
quorum prior non convenit?

Hist. Briljeb.

Apud Hier. Brunsch. in edit. anni 1505. bene
pingitur figura *Herbæ Rupert*, & melius qui-
dem quam in polter. anni 1550. ubi alterius gene-
ris icon exhibetur.

Diss. met.

Dorft. habet iconem Geranii Robertiani siue
muralls pag 147. quod à cæteris minus diligenter
distinguit.

Fuchf. Dodon. gall. Brunfels. Lac. Turn. &
Thalio dicitur Geranium tertium: Lob. in Adu.
(ubi & Sideritis Achilleadon, aut congener) Ob-
serv. p. 375. Ic. Plant. p. 657. & Camer. hort. Geran.
Robertianum: Rubertiana vulgò Cæsalpino.

C. Bauh. phyt. Geran. 17. siue Robertianum pri-
mum: Apud Marth. Geran. Robert. primum item,
Geran. 5. Marthioli. *Cur autem Geranium Mar-*
thioli diversum facit à Robertiano? Eadem Pin.
Geran. folio Cicutz 5. siue Robert. 1. Duplex est:
alia omnino viridis, quam sceminam faciunt: alia
rubens, quæ præfertur, teste Camerario.

Locus &
Tempus.

Solet provenire in veteribus muris, in cælis
arboribus, locis frigidis, humidis & umbratis: A-
prili florer & tota penè Æstate, teste Tabern.

Fuchf. vltm adstringendi & siccandi tribuit. Tra-
gus videtur ei Chelidoni minoris vires adscribe-
re. Rard, inquit, intrò sumitur propter nimiam
quam obtinet frigiditatem: efficacissimè erysipe-
latis imponitur herba rufa: succus & aqua distilla-
ta quibusvis exulcerationibus oris, mammilla-
rum & pudendorum, tam muliebrum, quam vi-
rilium medetur. Succus mariscas mundificat, sa-
nâque: tumores deprimit, duricias mammilla-
rum, aliorumque membrorum, si fortè conquassa-
ta fuerint, discutit. Ioannis de monte experimen-
tum parvi facimus, qui multos oculorum mor-
bos, appensâ nudo collo radice, certo anni tem-
pore collectâ, Nicolâi quendam Magistrû curasse
scribit. Geranium Robertianum, aliàs Sangu-
nariam dictam, rubens præferunt pastores, aquæ
incoquentes & potui dantes pecori, armentisve
cruenta mingentibus.

GERANIVM LUCIDVM.

Descriptio.

Geranium nostrum lucidum folia habet Mo-
mordicæ siue Geranii batrachoidis longius
radicati formâ, sed minora quam illa, Geranii co-
lumbini, in quatuor profundas lacinias ferè sem-
per tripartitas diuisa, ex virore obscuro pulchrè
lucentia, nonnihil hirsuta, pediculis herentis,
palmaribus aut vnciâ duntaxat longioribus: can-
les multi subit, lucidi, rubentes, in varios ramos
diuisi, interdum ferè cubitales: flores Geranii
Tom. III.

Robertiani floribus similes & partes: restat bre-
uia.

Synonyma.

Cur C. Bauh. in phyt. Geranium suum 8. siue
argenteum, Geran. laxatile Camer. hort. Geran.
fax. *ὕψιστον* Thal. à Geranio sud decimo, si-
ue lucido nostro separatuit. *Si diversa sunt, cur in*



in Pinace v-
num fecit? Vo-
cat Geran. A-
nemones folio
rotundo 15. si-
ue lucidum la-
xat. rotundifo-
lium Colum-
næ.

Genevæ co-
piosè abundat
ad lacum extra
portâ de Rive
in muris Item
inter Lugdunû
& Genevam à
Chastillon flo-
rens Maio. Ex
semine proue-
nit Montbel-
gardi in horto
meo, postea
perit.

Locus &
TempusCHELIDONIUM MAIVS VETERVM.
CAP. CXVI.

Qvam apud Theophrastum Gaza Hirundi-
nariam interpretatus est, eam Dioscorides
sic delineavit. Chelidonium magnum [*χελιδόνιον*
μῆλα] caulem producit cubitalem, aut etiâ maio-
rem, gracilem, qui propagines habet foliis plo-
nas. Folia similia sunt Ranunculi, teneriora ta-
men, & colore subglauca. Iuxta singula verò so-
lia flos est, velut Viola alba. Succus autem cro-
ceus, acris, mordax, aliquo modo subamarus, &
graucolens. Radix supernè quidem vna est, in-
fernè verò plures. Fructus est velut Papaueris cor-
nuti, tenuis, longus velut Pinæ nucis conus, in
quo sunt semina Papauere maiora. Huius suc-
cus melli admixtus, & in æreo vase ad prunas co-
ctus, ad acuendum visum commodus est. Expri-
mitur autem succus è foliis, & radice, & fructu,
sub initiû Æstatis, siccaturque & in pastillos ef-
formatur. At radix pota cum Aniso ex vino albo,
morbum regium curat. Herpetas item cum vino
imposita. Et dentium dolores sedat comman-
ducata. Videtur autem Chelidonium nomen
reperisse, quod simul atque hirundines,
quæ Chelidones vocantur, apparent, è ter-
ra prodeat, earumque discessu emarcescat, vel
quod si quis pullus hirundinum excæcetur, ma-
tres ipsorum herbam illis exhibere narrentur, &
cæcitati ipsorum mederi.

Hirundina-
ria Theoph.Hirund-
inis.

Chelidonium inter spuria quidam Pæoniam Appellat
[*παωνίαν*] vocant, alij Crateam [*κρατάειαν*] quæ-
gregiis pollentem viribus, alij Aubion [*αὐβιον*]: alij
Glaucion [*γλαυκίων*]: alij Pandionis radicem
[*πανδίωνος ῥίζαν*]: alij Philomedion [*φιλωμείδιον*]: alij
Othonion [*ὀθωνίον*]: Romani Fabium [*φάβιον*]:
Galli Thona [*θώναν*]: Ægyptij Mothoth [*μοθόθ*]:
Daci Crustanen, h. e. *κρυστάνας*.

Appellat
Nothæ.
Plinis.

Chelidonium (inquit Plin. lib. 8. cap. 28.) visui
saluberrimam hirundines monstrauere, vexatis
pullorum oculis illâ medentes. Et rursus lib. 25.

cap. 8. Animalia quoque inuenire herbas, in primisque Chelidonium. Hac enim hirundines oculis pullorum in nido restitunt visum, ut quidam volunt (hoc ridet Cels. lib. 6. Aristoteles verò cap. 6. lib. 4. de ortu animalium causam reddit: nempe eos renasci si pungantur ac euellantur, cum adhuc sunt, non autem ubi perfecti fuerint) etiam erutis oculis. Genera eius duo: Maior fruticosa caule, folio Pastinacæ erraticæ ampliore, ipsa altitudie duum cubitorum. Color albicans, flos latens. Minori folia Hederæ rotundiora, minus candida. Succus Croci mordax, semen Papaueris. Florent aduentu hirundinum, discessu marcescunt. Florentibus succus exprimitur, & in æreo vase cum melle Attico leniter cinere seruati decoquitur, singulari remedio contra caliginis oculorum. Vtuntur & per se succo in collyriis, quæ Chelidonia appellantur ab ea. Et hæc de duplici Chelidonia genere Plinius, quæ cum inuicem commisceat, atque confundat, alibi de iis agere non placuit, licet figurâ multum differant.

Plin. nat.

Galen.

Galeno 8. simpl. med. Chelidonium extergentis admodum & calidæ facultatis est, sed & succus eius ad acuendum visum commodus est, utique in quibus crassum quiddam in pupillis colligitur digestionem atque discussionem indigens. Vbi sunt radice eius quidam ad auriginem ab obstructione jecoris proficiscentem, in vino eam albo potui exhibentes. Similiter mansa confert dentium doloribus. Porro, Chelidonium minus, cum acius sit maiore, celeriter illitum cutem exulcerat, vnguesque scabros exterit. Succus eius per nares purgat, utpote admodum acer. Itaque hæc herba quarti ordinis fuerit (calfacientium incipientis. Majus autem Chelidonium tertii est ordinis) absoluti iam, idque tum in calfaciendo, tum in siccando. Aëtius, qui eundem usum Chelidonio magno adscribit, extensoriam & calidam vim abunde possidere ait.

Chelidonii nominis appellationem quod attingit, duplicem eius rationem cum Diosc. tradit Marcellus: reliquas verò dicit non satis certum habere intellectum. Fuchsius Chelidonio suam hirundinem nomen indidisse perhibet, vel quod primum hanc inuenit, vel quod eius aduentu floreat, discessuue commarcescat, id quod de minore verè dici putat. Sed Chelidonium minus longè ante discessum hirundinum marcescit. Dictum verò scribit Dodonæus Chelidonium maius non quod aduentu *χελιδόνων*, i. e. hirundinum proveniat, aut abeuntibus illis pereat, cum toto anno reperitur, sed quia excæcatis pullis hac herba matres restituere visum in opinione sit. Hanc tamen opinionem ceu vanam & à veritate alienam, auctore Celso, tanquam fabulam, ad græcas ablegat calendas.

Fuchf. resuscitans.

Æquiuoca.

Chelidonii nomine sequentes plantæ passim ab authoribus donantur: Chelid. maius. Chel. fol. laciniato. Cucurma, de qua lib. 19. Fumaria Split. Fumaria bulbosa. Aquilegia. Clymenum.

Chelidonium verò minus, Scrophulariæ minori, vnanimis ferè authorum consensus, competere ait. Chelidonium minus dicitur etiam de Geranio batrachoides, quàm bene autem facile iudicabunt lectores. Nec melius Chelidonii speciem minorem Geranium Robertianum esse contendunt. Gesn. in ascr. Diosc. Chelidonium micron Fumariam appellari refert. Scrophulariam flore pleno Camer. hort. cognominat Che-

lidonium minus flore pleno. Chelidonium minus palustre Cordi, est nobis Caltha aquatica. Lonic. in Diosc. lib. 2. cap. 167. Ranunculum & Chelidonium turpi errore confundit. Chelidonium dici de Anagallide ostendunt ex Dioscoride Tragus, Lonic. & Gesnerus. Idem Gesnerus in ascript. Diosc. refert dici Chelidonium de Vite alba, siue Bryonia de qua libro 15. Sunt Chelidonia Ficus *ισχάρις* & *χελιδόνιος*, Atticæ scilicet quæ & Chelidones vocantur: Pollux. Commendantur eadem ab Athenæo lib. 14. De purpureis Chelidoniis Columella inter Ficus. Nouissima, sub Hieme maturatur Chelidonia Ficus, inquit Plinius. Eas Grammatici quidam à Chelidoniis populis in Britannia dictas coniiciunt, nescio quàm rectè.

CHELIDONIA.

CAP. CXVI.



Passim in Description. parietinis & maceris occurrit Chelidonium maius, cuius radix minimo digito crassior, fibrosa rubra, rubrum croceumve succum, ut & folia caulesque fundit: aliquot caules producit, reteres, hirsutos, propter radicem & genicula tuberosos, ut in ea planta quæ

Noli me tangere vocant, rufum mordacemque in ingratum illum succum fractos remittentes: folia cum Aquilegiæ foliis similitudinem aliquam habent, utcumque tamen maiora, longiora [Lobel. ait tota facie ad Plinianum Capnum, vel Aquilegiam, comparatam, foliis cæcis] numeroque plura, ad costam ex interuallis adnexa, ut plurimum sena, septimo alam claudente: singularia folia Quercinorum æmulam diuisuram habent, Trago tenera, colore herbaceo, altera verò parte ex cæsis viridi. Flores crocei quatuor foliis constant, multisque staminibus concoloribus: siliqua oblongæ semen continent: Trago siliquæ oblongæ ceu corniculati Papaueris semen pallidum recludunt: folia, caules, & flores croceum stillant lac, in primis radix, quæ & ipsa aureo planè prædita est colore, succo simili, lento, gustu amaro, grauissimique odoris: Lobel. succo croceo fuluiore, virofiore quàm Papaueris cornuti.

χελιδόνιος μέγας Græcies: Latinis, ut Ruell. Synonymorum nomina: Trago, Fuchf. Cordo in Dioscorid. & Histor. Matth. Lac. Cast. Dod. Lob. Adu. Obs. & Ic. Plant. Gesn. hort. Cæsalp. Thal. Tabern. & Gerardo, Chelidonium maius: Brunfels. Chelidonia. Anguill. Chelidonia maior: Turn. hirudinaria: Lob. Adv. hirudinaria maior: C. Bauh. phyt. Chelid. siue maius, vulg. in Pin. & Clus. in hist. Apuleio

Apuleio Hirundinina, aliis etiam Herba lucis, Herba impetiginaria, Herba hirundinis: offic. Celidonium, & Celidonia, etiam vulgò in Herbaria. At ab imperitis, præsertim Chymistis, qui multorum stultitiâ Poetas facillè imitantur, quod græci nominis vim ignorent, quod latinè nil aliud quàm Hirundinariam significat, *Celi donum* corruptè nominatur. Serap. de simpl. cap. 296. *Kantoch, Curcuma, & Chelimonthoma*: Bellunenſi *Chalidunum & Memiron*: Glossographo Auicennæ *Alguduenne, Hantoch, Hantoc, Chelidomon, & Memirifis*: Apud Auic cap. 129. *Canchum, Aluardachale, Aluardachule, & Alxardahune*. Germ. *Schellwerk, Schelltraut, Schwallenfraut, Voldtraut, & Vilttraut*. Bel. *Schelerum, Bondt-vortel, groote Gouwe, (in)ctende Gouwe*. Gall. *Eselere ou Eslaire* (quòd caligantibus oculis aciem vidèdi restituat.) *Chelidonia, & Pelougne*: Ital. *Chelidonia maggiore, Herba donna, & Cedrognà*: Hisp. *Chelidonia, Terna de las golondrinas aut golondrinhas, Celiduenà, & Celiduenha*: Angl. *Eclendine*: Boh. *Celidom & Celdonia wictij*: Hung. *Cynadonia, & Fekke ſiu.*

An Virga
tulerit
necnon

Locus.

Tempus

Vires &
vires

Lobel. indagandum proponit, num sit Virga tinctorum Auicennæ: Est Alberto Magno Herba quarta, à Chaldaeis Aquilaris dicta quòd tempore quo Aquilæ suos natos faciunt, nascatur, à Græcis Valis, à Lat. Chelidonia.

Locus gignitur incultis, in vepribus, propter sepes, inter cætera herbarum vitia, inter rudera, in scrobium ripis, in vetustis citius, quàm in apri- cis. Toto anno viret: ab Aprili mense in multam æstatem floret, siliquæ interea perficiuntur, seminâque maturantur.

Vires quas tribuunt Chelidonio suo Diosc. Plin. Galen. & Aëtius, itemq; fabulâ per Celsum reiectam, videre licet antè. Radix Chelidonijs maioris, quantum eius manus capere possit, purgata, in sextario [quem Germani *Sin halb maff* exponunt] rosacei aceti decocta, ita vt deinceps percoletur, decoctoq; adjiciatur theariacæ Vicia cum dimidia. cyathique vulgaris mensura exhibita, à peste correptos (attestante id certâ experientiâ, inquit Trag.) liberabit, si postquam bibent in lectum se composuerint, & sudauerint. Aqua eius distillata oculis indita: claritatem iis adfert, maculas eorum rubras emendat, sicut & faciei si inde colluantur: eodem modo anthracis pestilentes sanat: serofi humoris ad articulos vulneratos decurrentis fluxum sistit, quem Germani *das glidewasser* vocât. Aqua distillata per aliquot dies pota, obstructos meatus hepatis adaperit morboque regio medetur. Herba cum radice tusa ac vmbilico [cum oleo chamæmelino feruēfacta] inposita torminibus & vteri doloribus opitulatur. Eius pulvis vlcera & vulnera purgat, sanatque inspersus. Chelidonium tritam cum axungia verrucas absumere refert Rondeletius. Lobel. rariùs intrò sumendam censet, sed commodiùs foris vtendam ad impetigines & psoras puerorum, necnon metallorum chymicas medicationes. Succus Chelidonijs [inquit Paracels.] colore suo imponit oculis, ac si dotatum esset auro: verùm Chymistæ, qui animam vel quintam essentiam, vnde coagulantem ac permutantem tincturam efficerent, venati sunt, nihil præter fatuum errorem assecuti sunt. Chymistæ [addit Matth.] Cæli donum appellitant, quâ nominis præstantiâ freti, ex hac herba quandam quintam essentiam fieri prædicant, non modò suis vanis alchymicis imaginationibus ac-

Tom. 111.

commodatissimam, sed ad tuendam etiam sanitatem hominum, morbosque quàm plurimos profligandos vtilem. Herba in calceis delata si nudis pedibus teratur, ictericos sanare creditur: eadem mensium abundantiam sistit, mam- mis mulierum admota. Succus cavis dentibus inditus eos frangit & eiicit. Hanc herbam, si Alberto credimus, si quis cum corde talpæ habuerit deuincet omnes hostes, omnes causas, & omnes lites amouebit. Et si prædicta ponantur super caput infirmi, si debet mori statim cantabit altâ voce, si nò, lachrymabit. Sed mittamus aniles fabulas, vndeque digressi sumus, redeamus. Succus ad oculorum maculas, argemas, nubeculas, & cicatrices plurimùm commendatur. Verùm cum acerrimus sit, adhibendus non est, nisi iis additis, quæ eius acrimoniam retundunt, cuiusmodi dicitur esse lac muliebre.

CHELIDONIVM FOLIO LACINIATO.



Q Vivulga. Descriptio?
rius illud Chelidonium maius nouit, facillè oblata hanc eius varietatē discet cætera similia, folia minora, cocciniùs crebriùsque incisa: floram itidē folia aliquib' incisuris lecta, & veluti sim- briata, accedē- tia ad flores plantæ, quæ quibusdam di- citur Cuminū siliquolum & Hipocoum

Clusij.

Dicitur Spreng. hort. Chelidonia maior folijs Syonij, & floribus incisis: Clus. Hist. post. Chelidonium maius laciniato florē, siue maius multifido folio. C. Bauh. apud Matth. Chelid. maius alterum: Eisdem in phyt. & Pin. Chelidonium 2. siue maius folijs quernis.

Vidi primò Heidelbergæ in horro Sprengeri Locu? spontè natam. Ex seminibus ab illo oblatis à pluribus annis Montbelgardi coluimus in horro. III. E. C. vbi ex deciduo semine quotannis re- pullulat.

AQVILEGIA IN GENERE.

C A P. CXVII.

A Quilegiâ subijcimus, cùm quibusdâ Che- Descriptio.
lidonia siluestris dicatur, & folijs aliquo- modo conueniat, nisi quòd sint paulò rotundio- ra & molliora. Videtur autem dicta quali Aquilina; ob florum mucrones aduncos, vt sunt aquilini vngues. Veterib' nē fuerit nota, ambigitur. Costæus quidem & Aldroandus Pothon [Desiderium Gaza,] veterum, Theophrasti scil. esse contendunt: Cæsalpinus verò eiusdem Theoph. lationem credit: Dalechambio contra apud A-

thenzum Theophrasti *σινδὸς ἄνθος*: est, Iouis flos: Gesnero tamen Leontostomon Theoph. dicitur, & Leo Columellæ; Leo herba Dodonæo. Alii *Ægilopa* Græcorum credunt, omnesque facultates eidem tribuunt, sed non parum aberrant. *Tragus Centaureum Germanicum* siue maius esse autumat, eiusque illi vires, sed temerè & citra omnem rationem tribuit. Sunt etiam, referente Matthiolo (qui flori inter alios colores aureum adscribit, qualem nos nunquam obseruauimus) qui *Chelidonium maius* nuncupent. Gesner. in *cat. pl. Cantabricam* opinatur; Ruell. *cæruleas Violas*, aut quæ sint se nescire fatetur. Sed eis minus conuenire deprehenditur. Dodon. in gall. hist. antiquis incognitam ait. Fabius Columna eam *Aquilinam* quæ simplici flore est, *Isopyro* Dioscoridis esse cæset, cuius iudicium Clusio valdè probatur. Lobelius tamen Columnæ opinionem *Aquilegiam* pro *Isopyro* Dioscoridis ponentis in suis plantarum illustrationibus rejicit atque damnat.

Angelica.
Amor perfectus.

Gesnerus de *Aquila* annorat, aliquos herbam hanc, quam plerique *Aquilegiam*, aut cum Matthiolo *Aquilinam* nominant, *Angelicam*, & *Amorem perfectum* vocare: Germ. *Obischelen/* *viacten* / & *viacten* Belg. *viacten*: Galli *Ancholies*: Itali *Aquileia*, & *Celidonia saluatica*: Angli *Colubine*.

Locus & Tempus.

Aquilegia flore simplici in montium pratis luxuriat, ea scilicet quæ cæruleo est flore: seritur etiam in hortis: caulescit mense Iunio. In hortis quidem diuersorum colorum conspicitur: itemque multiplex.

AQVILEGIA FLORE SIMPLICI.

Figura 1765 Fusch.

Descriptio.



Plusquam pollicari crassitudine est radix, candida, sapore subdulci: folia ex longis, rigidis, hirsutis pediculis ter terna, *Chelidonia* maioris, infra glauca, supra viridatia, cum obscurâ acrimonia exsiccantia, relicta tandem dulcedine effatu digna: caules tenuis, sed rigidi, hirsuti, geniculati, ramosi, amœnos flores sustinent,

corniculis rostratis compositos, ut passis alis columbam (si cum lateribus alternatim interjectis foliis vnum ex corniculis exemteris) egregio naturæ artificio deformant: atque hi quidem vel siluestres, vix alterius coloris, quàm punicei, vel hortenses, colore cæruleo, rubro, candido, carneo, herbaceo, versicolore, infinitam pariunt varietatem: omnibus tamen semen *Consolidæ* regalis, nigrum, lubricum, in corniculis surrectis *Aconitorum* continetur.



Aquilegia siluestris dicitur, *Aquilegia* simpliciter Trago, Fusch. H. Lugd. p. 830. Lonic. Cæsalpin. & Gerardo: *Aquileia* Fusch. Gesner. hort. & Dod. syluestris Thallio: *Aquileia* simplex Camer. *Aquilina* Matth. Lobel. Adv. Obs. p. 440. Ic. Plar. 761. Cast. & Tabern. *Aquilegia* siue simpliciter Trago, Fusch. H. Lugdun. pag. 830. Lonic. Cæsalp. & Gerardo: *Aquileia* Fusch. Gesner. hort. & Dod. syluestris Thallio: *Aquileia* simplex Camer. *Aquilina* Matth. Lobel. Adv. Obs. p. 440. Ic. Plar. 761. Cast. & Tabern. *Aquilegia* siue simplex siluestris.

Syluestria.

Hortensis.

Synonyma.

Aquilegia montana magno flore C. Baub. *Aquilina* Lob. Icon. p. 761. *Aquilina* Cast. alba Tabern. Ic. & Hist. quoad iconem, quoad ordinem 1. 2. 3. & 7. siue niuea, purpurea & rubra.

Aquilegia montana magno flore C. Baub.

Aquilegia montana magno flore, 3. in Pin. in *Aquilegiæ* vulgaris altitudine excresecit, quidem, sed foliis primùm differt, cum in lacinas tenuiores, easque non obtusas, ut in aliis, sed acutius diuidantur, & folia penè subrotunda sint: sic & floribus est cæruleis, vulgari similibus, sed multò maioribus. In monte prope *Thermas Fabarias* copiosè prouenit.

Descriptio.

Locus.

Aquilegia montana paruo flore, Thaliætri folio.

Ex radice parua, folia *Thaliætri* formâ, sed exigua, pallidè virentia, prodeunt: inter quæ cauliculus tenuis, palmo minor, duobus, tribusve foliolis brevibus, oblongis, minimè diuisis, exsurgit, florum vnicum cæruleum sustinens, formâ quidem vulgari similem, sed quintuplè minorem.

Descriptio.

In *Helvetiorum Alpibus* reperitur: in *Morania* prope urbem *Trevis*, sub arce *Smilo*, in pratis vernali tēpore copiosissimè reperiri relatum est C.

est C. Bauhino, qui in Prod. secundam facit, & in Pin. quartam.

AQVILEGIA FLORE PLENO, sive multiplici.

Descript.

OB floris elegantia in hortis culta hæc stirps modò pluribus, densioribus, & altioribus corniculis observatur: floribus etiam vberiore fertur à multiplicibus, qui vel cærulei prorsus sunt, vel violacei, vel cineracei, vel blandè rubentes, vel satiore rubri, vel albi, vel ex albo & cæruleo, violaceove multifariam commixti, vel alterius coloris, quos enim omnes enumeret? cætera similia.

Synon.

Aquilegia multiplex Hort. Lus. flore pleno cæruleo, albo, incarnato, purpureo, rubro, sive 1. 1. 1. 4. & 5. Eyst. multiflora variegata Lob. Ic. p. 762. (Ibidem & Aquilegia multiplici vario colore flore:) Aquileia multiplex Gerard. multiplici flore Dod. Aquilina multiplex Tabern. Ic. & Histor. quoad iconem; quoad ordinem 4. 5. 6. & 8. sive cærulea, alba, purpurea & variegata. Aquilina pleno flore Clusij hist.

C. Bauh. hyr. Aquilegia 3. sive hortensis multiplex: Am. Aquilegia pleno flore 1. sive hortensis multiplex flore magno, Aquilegia flore rubro 5. Eyst. fl. variegato duplici Syver. Aquileia 6. sive variegata Bry. Aquilina fl. rubro Bry, Syver. Item, Aquilegia pleno flore 2. sive hort. multiplex fl. parvo.

AQVILEGIA FLORE PLENO INVERSO.

Descript.

Non tãtùm fertur à vberiore hi multiplices flores & colore diversitatem patiunt multiplicem, sed & figurâ discrepare iidem quotidieprehenduntur, & diversitas interdum fortitè facies, sive naturæ lusi, sive artificio quodam, ut inuersi flores propemodum videantur.

Synon.

Clus. hist. Aquilina pleno inuerso flore. Lobel. Ic. p. 761. (Ibidem & Aquilina inuersa multiplici albo colore) Aquilina plenis multiplicibus floribus: Obl. p. 440. Aquilina plenis & multiplicibus aspectu suauissimis floribus inuersis cum hortensii multiplici eadem: Tabern. Histor. Aquilina 9. prorsus nigra flore magno & lato sursum reflexo: H. Lugd. pag. 821. Aquilina plenis & multiplicibus floribus Lobelij: Aquilina carnei coloris Bry. Aquilegia inuersa Camer. C. Bauh. phyt. Aquilegia 4. sive hortensis multiplex inuersis floribus. Pin. Aquileg. pl. flore 3. sive hort. multiplici flor. inuerso, Aquileg. cærulea inuerso flore, Eyst.

AQVILEGIA FLORE SIMPLICI ET pleno, non corniculato.

Aquilina
res. fl.

Aquilegiam floribus non corniculatis, sed Nigellæ citrinæ instar foliosis, vocamus, quâ Clusius pro Aquilina roseo flore pleno pingit, & describit.

C. Bauh. pin. Aquilegia pleno flore 3. sive flore roseo multiplici, colore communiter cæruleo, rariùs albo, rarissimè carneo, sive blandè rubente: vel albo nigris punctis asperso: hinc Aquilegia stellata flore purpureo, rubescente, violaceo, & albo minutissimis nigris punctis ornato, sive 1. 2. 3. & 4. Eyst. Aquilegia stellata cæruleo-violacea Syverij.

Tom. III.

AQVILEGIA DEGENER.

CAP. CXVIII.

Ita nonnunquam degenerat Aquilegia, ut scilicet pusculè flores proferat strigiosiores, & cum quidem aut colore languidiore, & quasi dilutione apparent, aut prorsus virorem induunt, Camer.

Descriptio:



Aquilinam degenerem conspicere meminit Clusius exiguæ Rosæ formam æmulantes flores ferentem, coloris vel omnino viridis, vel ex viridi purpureascentis, mutatâ videlicet pristinâ formâ, sive potius vitio contracto, ex stirpium intemperstina ex vno loco in alium translatione.

Lobel icon. Synon:

pag. 674. & Hort. Lusar. Aquilegia degener. C. Bauh. phyt. Aquileg. 5. [in Pin. fl. pleno] sive degener virescens: Aquilina 10. herbacea rubro variegata Tabern. Hist. Aquilina degener Bry: Aquilegia stellata rosea Syver.

Aquilegiæ semen iustum ac pondere drachmæ cum croconum pondere è vino bibitum, præstantissimum est medicamentum aduersus morbum regium [experientiâ certâ id attestante Trag.] si postquam sumpsissetis, in lectum te composueris, probè connectum, ac sudorem eliceris: eodem modo usurpatum meatus iecinoris obstrictos, unde multæ ægritudines oriuntur, aperit, Aqua florum Aquilegiæ distillata, pota eadem efficit, præstatque leuamentum aduersus syncopen. Abscessus proinde internos discentis, venenum quodvis expellit, ac tormina mitigat.

Ceterum, quæ de Aquilinæ facultatibus Clusius accipiebat à Rapardo, libet hîc subscribere: nimirum Aquilinæ vulgaris semen tenuissimè confusum, & ex vino propinatum, mulieribus in partûs difficultate cum optimo successu exhiberi: si prior tamen haustus minus fuerit efficax, alium similem propinandum esse.

THALICTRUM VETERIBVS.

CAP. CXIX.

Fecit in hac herba vnus literæ ambigua similitudo, ut authorum exemplaria partim Thalicttrum, *Thalicttrum*, partim *Thalicttrum* legerent, pro ut pro x apud Græcos, apud Latinos verò postea e pro e litera fuit agnita.

Sunt autem Plinio & Dioscoridi, paucis exceptis, de Thalictro eadem omnia: Thalicttrum, ait hic libro quarto, folia Coriandri habet, at pingiora, cauliculum Rutæ crassitudine, in quo folia, quæritâ imposita, vlcerâ diuturna

Thalicttrum:

Thalicttrum:

Dios.

H h h

ad cicericem perducunt, nascitur præcipuè in campestribus. Ille lib. 27. cap. vii. Thaliætrum folia Coriandri habet, pinguiora paulò, caulem Papaneris. (Sed Coriandri legit quoque Galenus sequutus Dioscoridem. Et fieri potest, ut Plinius g: acâ lectione deceptus, *anædotes* pro *anædotes* legerit) nascitur ubique in campestribus: medentur viceribus folia cum melle. Agineta cum Galeno siccandi vim sine erosione habere ait.

Annotat Goupylus in veteribus Dioscoridis exemplaribus hoc loco caput esse de Typha. Sed de Typha priori libro tertio egit.

Æquiuoc.

Thaliætri nomen sequentes adeptæ sunt plantæ. Thaliætrum nigrum caule & semine striato. Thaliætrum folio saturatius virente, calliculo nō striato. Thaliætrum speciosissimum glaucum, semine & caule striato. Thaliætrum montanum album Clusij. Thaliætrum maius folliculis angustifolium C. Bauhini Clusij. Thaliætrum prætense angustifolium C. Bauhini. Thaliætrum minus, siue Rutæ prætensis genus minus, semine striato. Thaliætrum minimum foetidissimum. Aquilegia ab Heroldo, sed malè. Pimp. saxif. minor Rondelerii, à Lobelio & H. Lugd. Seriphium germ. Chamæmel. scrid. à Gesnero. Potentilla à Ruellio, sed falsò. Coniolum regalis Tragou, sed etiam falsò. Phelandri. Plinij à nonnullis, sed magno errore.

THALICTRVM NIGRIVS CAULE ET semine striato.

Describe.



Pluchre videntibus foliis, licet saturatius cinctis, splendentibus tamen, longis, angulosis donatur: caules rigidi, striati, inanes, virescunt, & ad viri altitudinem & maiorem aliquando exerceunt: *flosculi* perquam exigui, mucosi, herbidi, obtusum ferè in orbem gomeratis flaminulis herbidis, aut ex herbaceo flaves-

centibus constant: radix fibrosa buxci coloris, ingrati amaricantis saporis.

Cordus in Diosc. verum Thaliætrum facit, ac germ. *hensblat*, hoc est, Folium sanum appellat, quod rustici Saxones hæc maxima curent vulnera, sine aliquo adiutore medico: ait tamen aliquos *videt* non vocare, sed hoc vocabulum latè patere. In Hist. verò Thaliætri nigri nomine describitur.

Gesn. hort. Saxifragam luteam appellat à colore florum vel radice luteo, ac Rutæ prætensi cognatam ait: alibi Barbam caprinam minorem vocat.

Dod. gall. ad Barbam capri refert, ac pro secun-

la siue minore specie describit, & pro Pigano pingit. Ignaros pharmacopæos pro sylvestri Ruta, non sine magno errore vii scribit, & mulierculas Belgicas Rhabarbarum spurium vocare: Doctorem quorundam opinionem, Thaliætrum existimantium, veritati haud consentaneam videri. Icon quidem à Dodonæo proposita responderet huic nostro Thaliætro nigri. Sed parui folliculi, quorum in descriptione meminit, siliquarum instar, conueniunt Thaliætro, nobis à folliculis denominato. Quas verò radices nigras tribuit, Tragus Barbam caprinæ vulgaris adscripsit, qualem ipse pro prima specie pingit: nobis igitur videtur Dodonæus diuersas plantas confundere.

Lobel. in Adu. author est industrius quosdam Thaliætrum Dioscoridis opinari, Saxifragam prætensem, quam Rutam foetidam sine luteam, & post Rutam prætensem Herbariorum, commodiore vocabulo appellat, accedam in Icon. Plant. tom. 2. pag. 56. & Obs. pag. 58. eodem titulo donat.

Icon Tabernæmontani Rutæ prætensis maioris quidem conuenit cum nostro Thaliætro nigriore. Verum in descriptione non conueniunt quæ scribit de triangularibus folliculis. Rutam prætensem maiorem primam, contra doctos negat esse Thaliætrum Dioscoridis, concludens esse Phelandrium Plinij, cognominans Rutam vulneariam, & Rhabarbarum adulterinum, germ. *wundttraut*, & *gros wesen* *Kantchen*.

Schwenckfeldius plura Thaliætra inuicem confundit: videtur autem eius Thaliætrum prætense, Thaliætrum Thalætrum maius folliculis angulosis: Eius verò Luteum, nostrum nigrum: ad quod etiam referendum censemus Alpinum.

Clus. in Pann. p. 30. & Hist. post. vocat Thaliætrum 1. siue prætense 2. elatius, longioribus & Synonymis aris foliis, & quodammodo splendentibus. C. Bauh. Pin. Thaliætrum 1. siue maius siliqua angulosa aut striata, Thaliætrum nigrum Thalij, secundum siue laesol. germanicum Camerarij. Ru. am. siue stem. Cæsalpini: Et autem adscribit florum mucosa flamina è pallido candicantia, rarius purpurascantia. Quæ occasio ut huc etiam referat Thaliætrum flore incarnato, & albo, Ey. dett.

Abundat in collum pratis linere Monbel-
gardeni quæ inter *l'yle* & Vesonium, in multis
etiam Germaniæ locis, ut inter Electorales vrbes
Oppenheim & Worms, in campis.

Dodonæo Thaliætra maiora temperatè calida ac vni reficcantia apparent: Folia eorum oleribus admixta, alium nonnihil commouent: Radicis decoctum idem potius præstat. In Hist. gall. plures vires tribuebat quas in lat. omisit. Lutetiani nonnulli ad calculum laudabant Lobelio. Thaliætris quibusdam in locis in Italia, teste Camerario, vruntur contra pestem in Saxonia contra ictericiam. Non autem placet Dodonæum & alios, seu Tabernæ. eisdem virtutibus Thaliætrorum generibus adscribere, quum ipsi non fuerint bene nota.

THALICTRVM SPECIOSISSIMVM glaucum, semine & caule striato.

Hominis interdum proceri staturam adæquat, vel etiam superat, radix flaua, multas
fibras.



fibras à latere obliquis circumaque spargente, sapore amaro: *caulis* autem rectus, singularis, nullis alis, ramisve brachiarum, purpureo, inanis, crassitudine digitali, perquam longis internodiis interceptus: *folia* ex articulis nascuntur, quos vaginam amplectuntur, Thalictri maioris nigrioris latiora,

si singularia spectes, colore utrinque subcaeruleo, vel glauco, sapore amaro, & acri, odore graui: summum caulis fastigium in furculos aliquot abit, quibus flores insident muscosi, ex meris fibrillis luteis compositi: *semen* tegitur tunica tenui, non anguloso folliculo.

Dodon. in purg. append. & Hist. in fol. lat. Thalictrum maius tertium facit, Camer. hort. Thalictrum 1. italicum vulgè. Casp. Bauh. Pin. Thalictrum 3. siue minus flauum, staminibus luteis, vel glauco folio, Thalictrum maius Ger. Thalictrum in Herruria vulgè *Verdemacum* Casalp. Clusius Pann. pag. 380. & Hist. post. Thalictrum 1. siue Hispanicum. Lobel. Obs. p. 509. Ruta pratensis siue Thalictrum longè maius & multò speciosissimū. Tabern. Ruta pratensis maior quatuor, Phelandrium Hispanicum, Grew. w. p. 1. Xanthoxylum? An Pes milui Anguillaræ?

Ex Hispaniis in Belgium venit, & deinde operâ Clusij Pannonicis Austriacisque provinciis vulgare factum est. Nobis ex S. Lupo Burgundie missa planta fuit nomine Rutæ capratæ. Excreuit in horro Ill. E. C. ad altitudinem hominis flores Junio & Iulio.

THALICTRUM MAIUS FOLLICVLIS angulosis caule laui.

Descript.



Tom. III.

QUOD D. Gesnerus Thalictrum maius appellare solitus est, in cubitalem, vel sesquicubitalem altitudinem excreuit, ramosis, rigidis, politis, lauibique & concavis caulibus donatū: *folia* Aquilegiæ, lauia eiusdem penè coloris, & ferè inodora, amaricantia cū acrimonia: *flores* cœnula, cœferta, ex-

radiatis staminibus in orbem actis, dilutam Violæ nigre purpuram referentibus, apicibus tan en obsoleto colore luteo præditis, compacti. *Radices* fibrosæ, multiplices, tenues, externæ nigricantes, internæ albæ, sapore non ingratus, quatuor veluti collis conitant: *semen* in folliculis angulosis tenue, longum, fuscum.

Lobel. Adu. Ruta triangulo pericarpio: Tabern. Synon. Hist. sine icone, Ruta pratensis maior tertia. Dodon. Thalictrum magnum quartum: Clus. Pann. pag. 380. Thalictrum 4. siue montanum 3. à prioribus [montano albo 1. & 2.] solo floris colore differens. Thalictrum 5. flore purpureo Camer. hort.

In monte Saleuz Genevæ observari flores Junio & Iulio seminematurus; in Sabaudia flores Autumno: Montbelgardi ad Dubim itinere versus L'Isle inter dumeta Junio. Ex semine in horto provenit.

Locus & Tempus

Thalictrum pratense angustifolium.

Clusio est in Pann. p. 380. & Hist. post. Thalictrum sextum, siue pratense secundum, humillius, flore candicante: Thalictrum 3. angustifolium Camer. Thalictrum 4. siue pratense angustifolium C. Bauh. Pin. Ruta pratensis maior 5. Tabern. in Hist. sine icone.

THALICTRUM MINUS, SIVE RUTÆ pratensis genus minus, semine striato.



THALICTRO majori cum folliculis limillis, non ea tamen vè plurimam huic præceteras: caules tenuiores, non minus tamen rigidi: *folia* confimilia, crassiuscula, sed minora, siue sit spontanea siue culta, situ & dispositione eadem: *radix* tenuis, fibrosa, lutea, repens: *flores* ex radiatis staminibus componuntur, capitulis minoribus, colore ex fusco ad luteum

vergente: *sementi* idem responder.

Dodon. gall. Barbæ capræ tertia species, forè Hypocœum Dioscoridis, quod etiam vocatur: El. Synon. dem in Purg. app. & Hist. Thalictrum parvum, Thalictri quintum genus minimum, Thalictrum minus, vè etiam Gerardo: Thalictrum 4. parvum Camer. hort. Thalictrum tenuifol. Cordo hist. Thalictrum Cordi tenuifolium Lobel. in Adu. & Ic. Plant. p. 56. tom. 2. & Obs. p. 508. Clusio Thalictrum 7. siue omnium minimum, foliis minoribus, cineracei coloris, pallido floris colore: radice omnium maximè flava & serpente, subindeque noua germina producente: Thalictrum 8. siue minus C. Bauh. Pin.

Hhh 2

Hynecomum H. Lugd. pag. 1082. *Czsalp.* *Ruta pratensis* alia minor, *Cicuta Ahen'ensium* quorundam. *Ruta pratensis* minor *Tabernemont.*

Locus.

In campetribus maritimis locis apud Belgas reperitur, alibi etiam in montosis, ut in Baldo Italiz monte provenire fertur.

Thalictrum minimum fatidissimum C. Bauhini.

Describe.

Caulis est pedalis, rotundo, in ramulos diuisos: folioli pluribus in tres lacinias diuisis, anterioribus duabus incisuris denticulatis, superne atropurulentibus, inferne pallescibus: in ramulorum fastigiis strobili parui, muscoli, ex plurimis staminibus compositi, quibus succedunt exiguae valvulae, oblongae, senae, septenae, striatae, apice incuruo donatae. ubique inuicem iunctae, capillaceo oblongo pediculo insidentes, semen exiguum includentes. Tota planta odorem foetidissimum spirat: in Vallesia reperitur.

BARBA CAPRI.

CAP. CXX.

Describe.



Radicem corticata est: medulla crassa, fibre sum, cortice intermediana crassiusculo, ad rufedinem declinante, cui subest lignosa substantia cum copiosa medulla alba, fatua: caules, duos, tres cubitos alti, & maiores, multis alis concavi, laeves, teretes, medullofi, arcto tubulo (qui in alio nullus est) perforati: folia Castaneae, oblonga, acuminata,

serrata, plura ad costam alligata, nullis intercedentibus minoribus foliolis ut in Vlmaria, à qua & flores huius plurimum differunt, in ligulis videlicet racematim collocati, perpusilli, candidi.

Acetarium olim.

Hermolaum in Diosc. hanc per *Acetarium* olos, quam quidam *Tragopogon* saltem esse volunt, & vulgò *Barbam petrae*, & in Gallia *Cispadana* *Barbulam* hircinam vocant, intelligere putat.

Tragus *Barbulam caprae* inscribit, proque *Barba caprina* 2. siue sylvestri delineat, ac cum *Vlmaria* ad *Pycnocomon* *Dioscoridis* refert. Sed hanc opinionem improbat *Fuchsius*. *Parauij* alibi que in Italia *Christophoriana* (*Crossosauaria* *Anguill. epistol. 14.*) æquius vocari ait *Gesnerus*, qui quondam *Asparagum* sylvestrem vocabat.

C. Bauh. Pin. *Barba caprae* 1. siue floribus oblongis, *Melandryon* *Plinij*, *Barba capri* *Fuchsi*. *Dodon. gall.* *caprae* *H. Lugd. Eyf.* *caprina altera* *Lonic.* *Potentilla* 2. *Anguill.* *Drymopogon* 1. *Tab.* Nobis quidem iudicibus *H. Lugd. p. 1081.* pingit *Barbam caprae*, verum in descriptione cum ea confundit *Vlmariam*.

Locus.

Geneux copiose provenit in monticulo la *Bastie*, à *Bastie* ad *Rhenum* prope domum ru-

nam. Alunt *Vngariz*, *Austriæ*, *Scitiz*, vicinarumque provinciarum montanarum silvarum *Barbam caprinam* *Fuchsi* & *Tragi*, ab *Vlmaria* diuersam, referente *Clusio*.

VLMARIA.

CAP. CXXI.



Caulis recto, Synon. anguloso, rubente, concavo, firmo, ad duos aut tres cubitos adolefcit, folia lato vitore nitentia, quina aut septena, ad costam connexa, in ercedentibus compluribus minoribus: singularia folia, segmentum folij *Imperatoriz* referunt, serrata & nonnulli sinuata: interdum verò crispo contextu plicatum

Locus.

Describe.

ad *Vlmi* folia accedunt; sapore citra morsum strenuè siccant: flores trauolentes positi & formâ *Filipendulae* vulgaris, albi, qui ique folijs constant, apicibus crebris similiter albis, aut in luteum vergeantibus: succedunt capitula parua acuminata ex contortis oblongis seminulis composita: radix digitalis, infinitis fibris rubentibus capillata. *Trago*, longa, fibrisque multis capillata, foris nigra, intus subfusca, grauissimi odoris, amari simul & adstringentis, non aliter quam glandes.

Cordo Histor. *Medefussium*, *Argentilla* maior quorundam, *frampfweursel*. *Tragus* describit pro *Barba caprae* prima, refertque cum secunda ad *Pycnocomon* *Plinij* & *Dioscoridis*. Nobis autem opinio *Tragi* plane displicet, nec vlla nota nobis continere videretur cum *Pycnocomo*. *Quin* *Cortulus*, cum *Parauij* essemus, *Chrytocomen* faciebat. *Gesner.* verò nobis *Apum* herbam, *Ymbrofratit*, denominabat, quia ea apes summopere delectentur, si aluearia illinantur. *Rupellæ* in Gallia vocant *Fignette*. *Anguill. epist. 17.* dicitur *Potentilla* libro de dynamis *Galen* laudata. *Barba caprina* 1. *Lon.* itemque *Dod. gall.* quoad descriptionem: figura enim non responderet, ideoque eam in folijs mutauit, depinxitque sub titulo *Reglæ prati*, vocauitque genus *Vicifibart* Belg. *Aennette*. *Gall. Barbe de cheure*. Cum *Rhodera* *Plinij* similitudinis aliquid obtinere ait. Sed tamen eandem esse, affirmandum, contra *C. Bauhinum*, haud censeo.

Gesn. hort. *Christophoriana*, *Barba capri* maior, *Regina prati* (sic dicitur etiam *Gerardo*) & *Vlmaria* quorundam. *Barbicapra* & *Vlmaria* vulgi *Lob. in Adu. & Obs. p. 209.* *H. Belg. p. 869.* *Icon. Plant. pag. 711.* *Vlmaria* *Car. Steph. Horti p. 66.* *H. Lugd. p. 1081.* *Gesn. cat.* *Camer. hort. & Tabern.*

C. Bauh. Pin. *Barba caprae altera*, siue floribus com-

paſſis. Potentilla L. Anguill. Argentilla maior Thalij.

Locus

Alunt Vngariæ, Austriæ, Stiriz, vicinarumque provinciarum prata humidiora, & torrentium ripæ, Vlmariam ab ulmaceis foliis dictam, temperamento, atque etiam odore Pimpinellæ maiori Italiæ quodammodo respondentem, referente Cluſio. Non raro in virginotis pratis, sæpè etiam inter spinas, & in collibus quibusdam, quotannis novos caules emittit, florèque Iunio mense, auctore Trago. Montbelgardis passim circa aquarum riuos abundat; Basilæ in itinere, quo itur Leirach, & Genevæ in pratis ultra Arne florens Maio & Iunio, copiose Iulio inter Durlacum & Ellingen.

tempus.

Vires & Vius.

Calidam & siccam indicat Tragus. Mulierculæ autem verno tempore tenera folia legunt, oleibuscque suis adiungunt. Si in vino rubro & quasi nigro decoquatur radix & bibatur, disenteric utilis est. Eadem vero vino & melle decocta & pota alium soluit, bilem extrahit. Semen in cibo comminandum, capiti noxam adfert. Herba cum farinatura & impolita, tumores discutit, furculos præterea excitat, cuspides & tela, tusa & impolita. Folia adulescentia pustulas excitant, quemadmodum Ranunculus. Ego contra Tragum, ludico hanc plantam potius frigidam, quam calidam, & postteriores vires, quas ponit Tragus (que potiss. Pycnocomi Dioscoridis) non convenire sed planè contrarias esse his, quas ex eo primo loco recensemus. Præterea Dioscorides ait Pycnocomon constare Erucæ foliis acrioribus, non tamen pustulas Ranunculi modo excitare scribit. Tragus in sua descriptione nullius acrimoniæ meminit, sed tantum amari & astringentis saporis. Rupellensis Renatus dicit hydromelici ex eius flore conciliari gratum odorem, & ita parari ut æmuletur vinum Creticum quod Malvaticum vocant: se etiam vidisse qui Lutetiz adversus pestem commendarent.

LEONTOPETALON IN GENERE EX antiquis & recentioribus.

CAP. CXXII.

Diosc.

Leontopetalum caulem profert dodrantalem [δωδρανταίων vet.] aut etiam altiore, plurimis alis concavum, in quarum cacuminibus siliquæ sunt cicerum modo [quidam carent his vocibus, & maioris [sc. λεω] ἰσχυροδαι.] ac in his duo triæve minuta semina, flores punicei, Anemonæ similes, folia Brassicæ, Papaveris foliorum divisa: radix nigra, Rapo similis [ρίζα μίλανα ὁμοίη ροζύλῃ: hæc vet. patenthesi includit.] quæ eminentias seu nodos quosdam habet. Nasctur in aruis, ac inter segetes. Radix ex vino pota commotis à serpente auxiliatur, dolorem omnem celeriter eximens. Miscetur & ischiadicorum clysteribus, Diosc.

Sunt qui inter spuria Leontopodion, qui Leucetion, qui Leontion, qui Dorida, qui Doriden-da, qui Lychnidem agrestem, qui Pardalium, qui Therybettum, qui Rapelium, qui Papaver cornutum, qui Anemonem vocant. Romani Papaver culum, aut Semen leoninum dicunt. Ex quibus constat nomen à ferocissimo & generosissimo omnium animali quondam inuenisse. Quid autem illi cum leone conveniat, non satis certum est. Si nominis origo expendatur, nihil Leontopetalon erit, annotante Marcello, quam leonis folium. Sed quæ leonis partem, verbi causa, pedem, aurem, linguam, a-

Tom. III.

læmve huiusmodi, folium referat, non satis pro competito est, præsertim variantibus appellationibus, Leontio, Leontopodio, & Leonino semine, quæ quidem omnes à leone causam nominis, sed non eodem modo habent: Siquidem Leontion leunculus est, Leontopodion autem leonis pedem significat, & Leoninum semen causam nominis in semine non in folio esse ostendit. Cur autem agrestis Lychnis diceretur, floris figura in causa est, quæ Anemonem & silvestre Papaver dici etiam Leontopetalon fecit. Omnes enim hi flores magnitudine, colore, totaque figurâ similes, aut saltem non multum dissimiles inter se sunt.

Descripsit Leontopetalon lib. 27. c. 31. Plinius iisdem verbis: Rhapelon aliis vocari dicens, folio Brassicæ, caule semip: dali, alis multis, semine in cacumine in siliquis Ciceris modo, radice Rapo simili, grandi & nigra: nasci eam in aruis: & omnium generum serpentibus in vino potam radicem adversari, nec quicquam celerius perficere: dari & ischiadicis.

Maximè autem, auctore Galeno, radice vimur, quæ discutiendi vim habet, siccatur & calefacit in terreo ordine.

Leontopetalon quidam eam herbam esse vocant Equinoce luteæ, quam sequenti capite describemus. Alij Fumariam bulbosam Leontopetali genus esse existimant. Alij, teste Gesnero, Helleborum nigrum. Garyophyllatam aquaticam Tragus, Alchimillâ Cornarius, sed non sine magno errore.

LEONTOPETALON QUORVNDAM.

Radix pugnum implet, rotunda, tuberibus multis inæqualis, cortice cinereo, pulpa vi-
rente in luteo, sapore amaro: hinc exeunt pediculi pedales, trifariam divisi, quorum singulæ divi-
siones bina aut
terna gerunt
folia circinate
ferè rotundita-
tis, alia inte-
gra, alia laci-
niata, & velut
crispa, colore
ex glauco fla-
vescente, veno-
sa: floræ in vi-
cialibus pedi-
culis, foliis ob-
longis interie-
ctis, in caulibus
spicatim
congesti, lutei
Ranunculi flo-
rum magnitu-
dine, quinque
striatis oblon-
gis foliis con-
stant, apicibus
lateolis umbilicum circumstantibus, quibus mar-
cescentibus prolongantur pediculi in palmarem
longitudinem, in extremo utriculo venosum
Halicacabi sustinentes: semen nigrum Cannæ In-
dicæ semini persimile.



lateolis umbilicum circumstantibus, quibus marcescentibus prolongantur pediculi in palmarem longitudinem, in extremo utriculo venosum Halicacabi sustinentes: semen nigrum Cannæ Indicæ semini persimile.

Leontopetalum Matth. Gesn. hort. & Camer. 3yaon
Leontopetalon Lobel. in Adn. Obs. pag. 391. lc.
Plant. p. 685. Cast. Lonic. Rauvolf. Lac. Cr.
salsp. & H. Lug. p. 168.

H h h 3

Leontopetalum hoc quod ex Græcia adfertur descriptioni Dioscoridis nec foliis, nec flore respondere ait Anguillara epllt. 11. ac propterea an verum sit, aliis iudicandum proponit.

Ex femine quidem Camerario prodit foliis bintis oblongis, crispatis oris, sed ad frugem non peruenit, & quidem quoad radicem & fructum conuenit descriptioni Dioscoridis, sed folia & flores planè discrepant. Incolæ Orientalium regionum circa Alepum, vbi Rauuolst. reperit, suâ linguâ *Aslab* vocant, atque radicem maiorem pulvere vestes fricant, & hac ratione maculas delent.

Hanc plantam, eiusq; nigram exuberantemque radicem Rapti instar vidisse se ait Matthioli non modò Venetiis, & Patauij in quibuldam hortis, verùm etiam in Hetruriz aruis, aliisque Italiz locis, nascique frequentem in Apolis.

PEONIA VETERIBVS ET Neotericis.

CAP. CXXIII.

Theoph.

Theophrasto cognita fuit. Sic enim libr. 9. H. n. p. ca. 9 de ea dicitur. At illud veluti adiectitium, & elonginquo petitiū videtur, quod sc. Pzoniam. Callam reddit Gaza] quam alij Glycyfidam [*γλυκύσιδα*, Gaza Dulcis nam.] vocant, noctu effodiendam præcipi ut sibi imaginantes, si interdum quispiam erunt, & à pico marito conspiciatur, enim fructum qui lem legere, sed oculis periclitari radicem autem secant, sedē procidere.

Pzoniam siue Glycyfidem [*γλυκύσιδα* & *γλυκύσιδα*] quibusdam Pentorobon. Sic Apuleius à numero gran. tum Ervo similitum vocat, quin & Sarraceni Galeno sic legere mauult, græcè tamen legitur *πεντορόβον* per habet] dicitur.

In nothis vocatur Pzonia mas Orobeltum [*ὀροβελίον*, à granis Ervo similibus:] aliis Orobox [*ὀροβόξ*]: aliis, quòd menstruum sanguinem educat, Hamagogum [*ἡμαγόγον*]: aliis Pæzede, [*παίζεδα*]: aliis Aglaophorida [*ἀγλαοφρίδα*]: quibusdam quali Diuini donum, Theodonium [*θεοδώνιον*]: aliis, quali Lunaris, Selenion [*σελεώνιον*]: Prophetis, quali Lunæ gemitus, Selinogonum [*σελενόγονον*]: aliis Phylis [*φύλις*]: Romanis Calla. Sunt qui idæos dactylos [*ἰδαίος δακτύλος*] radicem Pzoniz vocant.

Describe.

Caulis ferè in duorum dodrantum altitudinem adolefcit, inquit Dioscorides, adnascente numerosè sobole comitatus: ac mari quidem folia sunt, qualia Iuglandis [*βασιλικὴ κάρφα*: Plinio qualia Iatis, pinguiora, rotundioraque & minora. Sed Sarracen. pro Iatis, Iuglandis reponendum esse suspicatur.] Fæminæ verò incisuris Smyrni modo diuisa [*ὡς τὰ σμύρνης*]. Plinio fæminæ folia Myrrham redolent, & densiora sunt: ex quo patet, *ἀπὸ τῶ σμύρνης*, *σμύρνη* legisse, manifesto errore: quamvis & Smyrnum à Myrrhæ odore sapore, quem refert, ita dictum est. Sarrac.) Summo cæle fert utraque filiquas quasdam, veluti Græcas nuces [*καὶ ὡς ἀμύγδαλον*] quibus dehiscenibus grana multa rubentia, parua, acinis Paniculæ [*πανικου*] similia inueniuntur, & inter hæc media quinque aut sex, nigra, purpurea. Radix maris digitali ferè est crassitudine & palmi longitudine, gustu adstringens, candida [*λευκὴ* ver. caret] Fæminæ verò radicibus ceu glandes septem octo uel adhærent, quales Hamula regæ [*ἡμύλα ἀπὸ τῆς*] radicibus

adnascentur. Idem in aliquibus exemplaribus posteaquam de fæminæ radicibus egit: Mas, inquit, plures habet, quoniam non vnâ radice nixus est, palmi altitudine, candidaque. Sed Sarrac. ita potius legendum censet: Mas plures non habet, sed vnâ radice nixus est.

Antiqua autem pariter & honesta siue Pzoniam, siue Glycyfidem eam voces, plantæ huius appellatio est. Habet enim altera auctoritas antiquæ medicinæ peritissimum Pzonem, cuius in vera & fabulosa historia egregium nomen & æterna laus adhuc est: Altera a dulcedine, quam solo nomine indicat, non parum illi dignitatem & gratiam illi acquirit. Accedit his quòd nihil non sanari Pzoniam superstitiosè credidit antiquitas, nec corporis tantum morbis, sed animi affectionibus pariter mederi: adhuc imperare tempestatibus, arcere grandines, dillicere solum rubiginem, & ne in huiusmodi longiores simus, Lemuribus etiam aduersari. Quod non aliunde in plebis animos irrepleat, quàm ex his quæ Theophrastus, & Theophrastum sequutus Plinius, pluresque alij de legenda Pzoniam didicula magis, quàm superstitiosa, tradiderunt, & ex his quæ à Dioscoride de ephialtis naturæ virtute, non deorum irâ, præcepta sunt, adicientibus contingit imperitis ex superstitione sua, deorumque metu, quæ nullam haberent naturæ rationem, religionemq; medicorū turpissimè miscuentibus. Ex quibus factum est, ut tam multis nominibus vna censeretur Pzoniam, quorum aliqua nullam, nisi ex homana superstitione causam & originem habent, quæta sunt Menion, Selenionq; Lunarem herbam significantia: qualia itidem Idæi dactyli, qui in Creta nutriti Iouem dii fuerunt in veteri superstitione quotidianis precibus exorari, quibus potestate Pzoniam comparabatur. Nisi forte quod magis verisimile est, prima huius nominis origo à radicibus eius facta fuerit, quæ Dioscorides ait in fæminæ glandium quantitate, & Asphodeli figura esse, & à digitali longitudine, quam habent, dactyli primum vocata ex eo herba fuerit, mox accedente superstitione ad Idæos dactylos transfulerint homines, & quæ simpliciter Dactyli herba nominabatur, religiosè Idæi dactyli vocari incæperit, mox Theodonion, quod diuinam opem & auxillum polliceretur. Tum Aglaophotis quod lucis splendorem ostendit, postremoque Calla herba, modò antiqua Romanorum ea appellatio sit. Ex eodem genere reliquæ sunt præterea, quæ ad numerum folliculorum, & seminum figuram in ea pertinent, qualia sunt Pentarobon quasi quinquervum, Orobeltion, & Orobox, omnia ab Ervo notissima fruge ficta, cui Pzoniz semen quantitate in cunctis, colore autem in quinque aut sex tantum par est. Sola Hamagogos vox adducendo sanguine facta fuit, pertinetq; ad vires eius, quibus puerperis à partu se non purgantibus prodest.

Cæcium, Pzoniam marem Tragus maximo cum errore existimat esse Fraxinellam, siue officinis falsò Dictamnem dictum. Equivoca

Insolam perhibet Tragus Scitolorum distinctionem, qui Pzoniam vulgarem illam, Germanis Benedictam Rosen vocatam, Lapparum esse statuunt. Eodem auctore apud Dioscoridem Pzoniz nomenclatura Chelidonio quoque tribuitur.

Laudata multum antiquis & neotericis ob vires & varias & multas vtilitates Pzoniam est. Radix (in- Vnus. quit

quit Diosc.) scilicet in partu non purgatis exhibetur: ciet quoque menses nuci græcæ magnitudine pota: ventris etiam doloribus in vino bibita auxiliatur. Prodest arquatis, & iis qui renum aut vesicæ cruciatibus infestantur. Eadem decocta in vino potaque aluum sistit. Seminis autem granula decem, duodecimve rubentia in vino nigro & austero pota, sanguinolentum fluorem muliebrem [scilicet ipso dixit, ad differentiam tamen ad nos]. Enimvero pueri etiam ipsi Dioscotidi pro coloris varietate duplex fuit, alius albus, hoc est, albus, alius ipso, i.e. rubens. Hunc porro Saracum Scribonio Largo fluorem sanguinolentum vertit: Plinius rubentes menses reddidit] siliunt: stomachicæque, qui erosiones ventriculi sentiunt, comesta opitulatur. Quin & à puerulis pota efficitur ve initia calculi eximunt. Quæ verò nigra sunt grana, suppressionib⁹ nocturnis, quas ephialtas [Incuborum suffocationibus, Faunorum in quiete ludibriis, Plin.] vocant, vulvæque strangulationibus, ac uteri doloribus, numero quindecim, in aqua mulsa aut vino pota auxiliantur. Cæterum [hæc Goupylus in antiquo vitroque codice sui capitis adscripta reperit, quæ Ald. codex ad nos haec reiecit] nascitur Pæonia in altissimis montibus, eorumque verticibus.

Ad eadem commendat libri 25. cap. 15. & libri 27. c. 10. Plinius: & ad melancholiam, & contra serpentes.

Ex autoritate Galeni, Radix Pæoniæ menses cit, ex multa Amygdalæ quantitate pota. Expurgat etiam tunc obstructum & renes. Sed hæc efficere nata est, quæ acris & subamara est, quæ verò quiddam etiam adstrictorium obtinet. Fluxiones ventris sistit. Oportet autem tunc in austerorum vinorum quopiam eam decoctam bibere. Est omnino refectoria vehementer, v. non desperaverim eam ex collo pueri suspensam, merito comitalem morbum sanare. Equidem vidit, inquit, puellum quandoque octo totis mensibus morbo comitali liberum, ex eo quo gestabat radicem tempore. Vbi autem forte fortuna quod à collo suspensum erat, decidisset, protinus morbo correptus est: rursumque suspensum in illius locum alio, inculpatè postea se habuit. Visum verò est mihi satius esse denuò id certioris experientie gratia detrahere: id quum fecissem, ac puer iterum esset convulsus, magnam ac recentem radicis partem ex collo eius suspendimus: ac deinceps prorsum sanus effectus est puer, nec postea convulsus. Sic succus Cyrenæus Columellam phlegmone affectam iuvat: Sic Nigella fricta ac odorata destillationes & grauedines delibet. *Addit*

Leuius Lemnius lib. 8. cap. 3. de occult. nat. miraculis: Pæonia Galeno non minus decantata, quam Brasica Catoni, non solum à qualitate elementari, sed totius substantiæ vi ac proprietate specifica hunc morbum [epilepsiam] expugnat. Pueros autem in quibus vis morbi minus valida, etiam à collo gestata hoc morbo collapsos erigit. Discit enim, consumitque humorem pituitosum, qui huius morbi est seminarium. Intus vero exhibita eius baccæ etiam in adultis efficacius id præstant. Siquidem statuosum, imbutumque veneno humorem absorbeant, ac corpus ad temperamentum calidius, sicque perducunt. Hoc autem semen præstantissimum nonnulli asserunt, quod à Pæoniæ, quam masculi nomine designant, prima sæcula emergit: Diu enim stolones, h. e. inutiles frutices, culmosque effætos ac semine destitutos proferit. Vbi verò perfectè adoleuit, silquis deli-

Tom. III.

scens, hinc baccis atro colore politis, hinc acinos, coccineo, fragrantique rubore nitidos, ostendunt, nigricans semen in vltimū reservandum, non tamen eā vanitate, ac superstitione, vt sequentis anni semen credatur inefficax, cum à decimo partu etiam qui emerit sœus, præsentaneam vim habeat, modò ne carlosus sit & enanidus. In confesso est (inquit Montanus lib. 1. cap. 8. Haloseos febrium) Pæoniæ radicem de collo pendentem, epilepsiam arcere, quod manifestavit Galenus *minime omnium mendax*. Egoque subinde expertus sum ad fonticos & lenaricos plurimum valere. Pæoniam masculam infantium collo subnexam, comitalem morbum sanare, verissimum esse comperit Fernelius. Quin & Apollonius Menæbenus libello de Alce cap. 7. Pæoniæ maris radicem decrecente Lunâ collectam, & recentem collo appensam, puerum epilepticum, illico sanitati restituisset, nonnullis experimentis in Suecia vidit: Fæminam autem hoc præstare non solere, multorum experimento comperit esse testatur. Nonnulli Scle Leonem occupante, die item & horâ solaribus, decrecente etiam Lunâ colligendam præcipiunt. Bisariam eiusmodi sanatio contingere potest, vel desiccatione, vel è totius substantiæ proprietate. Cæterum, quæcunque tandem ratione ista contingant, successus huius spei frustratur (verba sunt Iulij Alexandrini à Neustat in suis Galeni de simplicium medic. facul. librum notis) hodie. Vel igitur tam efficax non est nostra hæc Pæonia, quàm allatum fortasse regionum aliquarum: vel leuiora erant illius temporis mala hæc, quàm nostri huius sint, ob immutatam in deterius fortè victus rationem. Quum ego asserere hoc loco causam non dubito, quum videam eiusdem rationis allatam à Galeno alibi super aliis morbis quibusdam, Hippocratiel temporis victus rationem multò magis commendante quàm sui.

M rari subit Tragum, illam ex Plinio fabulant de Lemnibus & Faunis, quasi planta hæc malignis spiritibus adheretur, approbare, & non potius ex Dioscotide ad ephialtas, qui morbus naturalis est, facere, scribere.

Fuchsius Pæoniæ radicem tribuit leniter adstringentem, cum quadam dulcedine. Si verò plusculum dentibus mandatur, acrimoniam quampiam subamaram percipit, in radice præsentis nostratis Pæoniæ, quam fæminam esse dicit. Pæoniæ verò in vniuersum temperamentum tenuium esse partium, exiccatorium, haud tamen insigniter calidum, sed aut symmetrum, aut paulò calidius.

Aquam stillatitiam sic parat Wirt. Empiricus: Pæoniam floribus abundantem eruit, in tenues particulas conscindit, in cantharo bene obturato & lotato in cellam frigidam supra fundum reponit, ubique per quatuordecim dies relinquit, ac post distillat. Hanc autem aquam caput valde imbecille corroborare affirmat, si æger, quum in stupis fuerit, aut caput lauerit. Stillatitium liquorem repositum capiti affuderit, manūque à parte anteriore ad posteriorem deductā, affricat. Idem quum ab Epilepsia timeret, arreptas Pæoniæ radices abluit, in tenues rotulas conscindit, quarum drachmas duas in vino albo macerat, de eo per biduum bibit, & eporo aliud affundit. Altero quoque die nouis immittit radices, per quatuordecim dies crescente Lunâ in continuando. Si demum sibi valde metuat, manè per biduum aut triduum ipsius radicis duas aut tres rotulas co-

Galenus.

Morbus comitalis.

Epilepsia.

Montanus.

Tragus notat.


Temperamentum.

Caput imbecille.

medit, per duas horas à cibo abstinens: similiter iturus cubitum.

**PAEONIA MAS, VNA PRÆCOCIOR,
& altera tardior.**

Descriptio.



Paeonia mas præcocior ut rarior, ita notabili foliorum & radicum differentiâ à scemina distinetur. Ea siquidem, quam scemina, videtur aliud adurgere, ad sesquicubitalem, aut bicubitalem altitudinem, pluribus caulis, nonnihil rubentibus, in aliquot ramos divisis, foliis vestitis Nucis Ingrandis se-

positu & figura, sed latioribus, crassioribus, lanugine quadam aversa parte pubescentibus, ternis, quaternis, quinis, raris septenis, saepe virentibus, glaucoque obductis, caulium extremis ad commissuras parte interna rutilis, ex longis rubescentibus pediculis pendentibus. Flores supremis insident fastigiis singulares, parvi, quos carinata quædam folia sustinent, similes sceminae floribus Paeoniae sceminae, sed dilutiores, non sine purpurea tinctura, nervis reliqua floris parte saturationibus, in quorum medio stamina purpurantia apices croceos sustinent. Succedunt cornicula alba, villosa in principio, atque lucente lanugine pubescentia, rarius terna, saepius quatuor aut circiter, crista sanguinea incurva superne donata, iuxta cornicula stamina: uila, apicibus luteis farinaceis constituta. Cornicula vero quæ terna, quaterna, quina, rarius plura hirsuta, incana tam grandiora reddita, atque per maturitatem dehiscencia, recurvantur, elegantissimamque granorum ostentant seriem utrinque ordine politam, primum acinis Granati colore similem, mox atro-ceruleorum, tandemque nigrorum, rotundorum, crassiorumque quam in scemina, colore & substantia aliquot similem, quemadmodum & sapore. Huius flores Maij initio explicantur, moxque decidunt. Radix cepalus alio depangitur, recta, nonnunquam in adnata pauca divaricata.

Eadem hanc quæ prior proceritas: idem foliorum situs, sed numerosiora sunt, quippe quina aut septena impari aliquando bifido: dilutius quoque virent & aversa parte cum prædicta foliis collata pallent, quæ & alba quadam lanugine donata sunt. Non caulium modò extrema, sed ipsæ quoque foliorum costæ ex puniceo interna seu aversa parte rutilant. Floris corniculorumque eadem forma & ratio quæ præcedentis. Sed tardius erumpunt, nec citius quam prioris decidunt. Radix tum huius tum præcedentis pollicari crassitudine aliquot diffusis constant rectis, aliisque depactis, foris rutilis, intus candidis,

gusta à granorum sapore haud notabili diversitate prædita. Flores hæc sub finem communiter Maij.

Lob. Obs. p. 390. Ic. Plant. 684. Paeonia mas: Item, p. 685. Paeonia mas cum semine. H. Lugd. p. 856. Paeonia mas Matthioli, & Paeonia mas Dalechampij. Duas figuras unius plantæ habent.

Paeonia mas Cordo in Diosc. Math. Anguill. Lob. in Adu. Dod. Cæsalp. Tabern. & Gerardo Paeonia pulchrior, sive nobillior, vel. 2. Trago: Paeonia mas foliis Nucis Gess. hort. Paeonia 1. sine folio nigricante splendido, mas C.B. phyt. & pin. vb. alt: Variat floribus colore purpureo, incarnato: & huius herbæ folia latiora segmenta habent, quæ subius exalbida, hinc Eyst. Paeonia mas fl. purpureo: item Paeonia mas fl. incarnato: Et, Paeonia mas maior; itemque Paeonia mas maior fl. incarnato. Floris amplitudine reliquas superat: & herbæ folia in latiores & pauciores viscentes particulas dividuntur.

Genus in Generoso dicto Helvetiz monte reperiri audierat. Nos non nisi in hortis cultam observavimus. Si seminetur Vere, ut plurimum per annum latitat, & post singulis annis foliorum diffusâ augetur. Non se multiplicat ut alba, vel scemina, vel ea quæ pleno flore est: radix enim tubest crassa, profundè descendens. Paeonia autem effodiendæ commodissimum tempus est Lobelio, sub Caniculæ sydere.

PAEONIA FOEMINA VULGATIOR.



Vulgaris notitia est hæc Paeonia sceminae species, omnibusque hortis familiarissima, quæ Radix glandulosa, fibris quibusdam interceptis habet, ut Alphodelos, à quibus denud & alia nonnunquam propagantur simili modo glandulosa: caulis viridis, vix, nisi ad pediculi foliorum esortum, rub-

edinem ullam ostentat: folia variè & incondite dissecta, modò trifida, modò bifida, (de singularibus foliis intellige) aliàs etiam integra, superne virentia, inferne albicantia aliquantulum, & nonnihil hirsuta: flos qualis in mascula cum staminibus & apicibus consimilibus: perinde ut & siliquæ: ac semen oblongum, per maturitatem nigrum.

Hanc Latini, inquit Tragus, Paeoniam, & Hæstam regiam nuncupant. Ego vero Paeoniam scemina Dioscoridis esse existimo: quam ille nomenclaturis inter notha relatis, & de quibus antè, describit.

Paeonia scemina Dod. gall. Altera in fol. lat. ubi Paeoniam marem Plinij & Dioscoridis significatur. Huius inquit, Plinius folia Myrrham redolere

PAR. 100
P. 101.

redolere ait: Sed evidens est suspicio *arri* & *comp-
stis*, *comp-
stis* cum legisse, & pro *comp-
stis* aprum rectè reddidisse.

Nomina.
linguarum.

Græcis *Παωνία* & *παυωνία*: Latinis similiter, *Pæonia* & *Dulcisida* dicitur: Officinis *Pæonia*: Germ. *Pæonien blumē*, *Deonē Rosen*, *Wich-
wurk* / *summeblumen* / *Wingst Rosen* / & *Strasani Rosen*: Belgis ferè *Liocnen*: Flandris tamen *Wastbloemen*: Gallis *Piaoine*: Italis *Pæ-
nia*: Hisp. *Rosa del monte*. Angl. *Deany*: Boh. *Pævonia*: Hung. *Basi rosa*. Præter autem iam recensitas tum legitimas tum nothas appellationes, dicitur etiam *Rosa asinorum*, *Rosa fatuina*: *Herba casta*, vt & *Aglaophotis*, i. e. lucide splendens, à granis scilicet cocci colore splendentibus. *Aglaophotis* autem duæ, apud *Ælianum* lib. 14. descriptæ reperiuntur: vna marina cap. 14. altera terrestris cap. 17. *Marina*, fuci species est, quæ in profundis nascitur petris, magnitudine *Myricæ*, fructu *Papaveris*, qui æstiuo solstitio dehiscens, noctu igneum quendam, & veluti scintillantem splendorem emittit.

Terrestris.
Cynopastus.

Terrestris, quæ alio nomine *Cynopastus* dicitur, per diem ait idè inter cæteras herbas delitescere, nec ullo modo agnosci: nocte verò stellæ instar lucentem, & igneo splendore coruscantem, facile in conspectum venire. Et hæc quidem terrestris *Aglaophotis*, siue *Cynopastus*, *Pæonia* est. *Pæoniæ* enim grana rubentia, *Apuleius* ait, noctu lucere tanquam lucernam: & plurimum noctu à pastoribus inueniri ac colligi. Præcipietiam vt *Pæonia* noctu colligatur, *Theophrastus* & *Plinius* referunt. Quæ de *Aglaophotide* *Ælianus* quoque affirmat. Appellatur verò terrestris hæc *Aglaophotis* à *Iosepho* belli Iudaici scriptore l. 7. cap. 25. *Baaras*, à loco in quo reperitur de qua ante.

Synon.

Cæterum, dicitur *Pæonia* *Trago*, *Turn.* & *Lonicero*: *Pæonia* *fœmina* *Brunfels.* *Fuchsio* *Anguill.* *Cordo* in *Dioscor.* & *Hist.* (vbi *Tragi* pictura addita) *Gesner.* *hort.* *Lobel.* in *Adv.* *Obs.* p. 387. l. c. *Plant.* p. 682. & *Camer.* *hort.* *Eidem* apud *Matth.* in *Epic.* & *Hist.* germ. *Pæonia* mas. *H. Lugd.* p. 853. *Pæonia* *fœmina* altera *Dodonzi.* *Chuf. Hist.* *Pæonia* vulg. *fœmina*. *C. Bauh. phyt.* & *Pin.* *Pæonia* 2. siue communis: *Eyst.* *Pæonia* rubra flore simplici.

Locus &
Tempus.

Hæc ætate passim in hortis habetur: floret mense Maio: semen Iulio ad maturitatem peruenit: multumque se reptatu multiplicat.

PÆONIA PROMISCUA STRICTIORE FOLIO.

Descriptio.

*M*ulta tam cum mascula, quam cum fœmina vulgari *Pæonia*, communia habet. *Radix* glandulosa vt fœminæ vulgari, sed crassioribus glandibus: at folia propius ad masculæ folia accedunt, magis tamen incondita, singulatiq; longiora & strictiora, supernè vt masculæ saturè virentia, infernè verò magis albicantia, minùs tamen quàm fœminæ vulgaris, quibus etiam auersâ parte multò minùs sunt pilosa: flores saturatiùs sanguineo coccineove colore rubent, septem, aut nonem foliis constantes: apices, & stamina, ac siliquæ vt in aliis.

Synonyma.

Est *Pæonia* fœmina *Matth.* *Lac.* *Cast.* & *Camerario*: *Pæonia* fœmina prior *Dod.* *Pæonia* promiscua seu neutra *Lobel.* in *Adv.* *Observ.* pagina 390. *Icon.* pag. 679. *Pæon.* altera, vel fœmina *Tom.* III.

Dioscoridis, Cæsalp. Pæonia 3. siue fœmina altera *C. Bauh.*

PÆONIA PROMISCUA VORMARIJ folio latiore.



Descriptio.

*P*luchre hæc variat à reliquis *Pæoniæ* speciebus. *Folia* liquidem, quæ immis ramis hærent, latiora sunt, quàm cæterarum, rotundioraq; auersâ parte glauca, hirsuta, aduersâ saturatiùs virentia, nodemque pilis obstita sed paucioribus quàm in opposita *Foliâ* in terna aut quaternaria, aut etiâ quina segmenta diuisum est, nullâ diuisione certa, sed temerè variante. *Flos* à reliquarum flore haud ablimilis. *Siliquæ* verò retortæ hirsutæ albâ toræ connectæ.

Floruit *Esslingæ* in horto *D. Sebast. Volmarij* Iunij fine, cum reliquarum siliquæ iam grandiores essent.

Locus &
Tempus.

PÆONIA FLORE PLENO RUBRO.

Descriptio.

*O*mnia *Pæoniæ* specierum longè pulcherrima est polyanthes, specioso florū sanguinei saturi incremento, tam denso foliorum stipatū luxuriantis vt fidem ferè numero superet, sementisq; spem plerumque ferè omnem præripiat. *Folia* sanè floris sunt plurima, magnitudine & formâ inter se discrepantia, diuersaq; extrema. n. caulem proximè amplectentia reliquis omnibus maiora sunt, & ad instar reliquarum *Rosarum* odoratarum circinatæ rotundiatis, reliqua interiori sita mirè variant: sunt enim quædam illorum graminea ferè, oblonga nempe & angusta, interque hæc aliquando colore albo tincta conspiciuntur, cum leui rubore, quædam verò fistulosa inferiori, & quasi tubulosa, arcto satis peruiâ meatu, quædam paulò maiora, & ad latera vtraq; mirâ varietate, modò magis minùsque profundè incisa, dissecta, & aliubi serrata, quædam adhuc maiora latioraq; maioribus quoque incisuris dissecta, quædam etiâ, & quod obseruatu dignū, referunt suâ secturâ & forma ea omnia folia, quæ viridia sūt. In medio floris duo allorgūt calyces, albi, hirsuti, oblongi, inferiori latiores, in medio ventrosi, in summo denique acuminari, cum inflexa quasi galli cristam referente substantia rubra, seminum futurorum rudimenta intra se continente. *Folia* multum similia promiscuæ *Lobelij* foliis, breuiora tamen, & vtrunque latiora, nec vel tenui illa promiscuæ lanugine prona parte do-

Synonyma.

nata, sed instar masculæ glabra & virentia.

Pæonia fœmina multiplici flore Gesn. hort. Tabern. & Gerardo : Pæon. fœm. polyanthos Lobelij (in Obs. p. 391. Ic. Plant. p. 684.) H. Lugd. pag. 85. Pæoniz fœminæ multiplex flos Dod. in fol. lat. Pæon. flore pleno i. siue fœmina flore pleno rubro maiore C. Bauh. pin. polyanthos fl. rubro Eyst. *παυσαλλος* Clus. Hist. post. cuius varietates aliquot obseruauit.

Pæonia flore pleno rubro, minor.

*Pæon. pleno
rubro flore
minor.*

Pæonia pleno flore saturi rubri coloris aliud genus inuenitur, cuius folia alterius foliis haud abfimilia, supernè viridia & splendens, infernè cæsi quodammodò coloris, & lanuginis expertia: flos alterius flore minor, nec aded plenus, illi pænè qui carnei coloris plenus est, par, non minùs tamen saturi rubri coloris quàm maioris, sed cutus folia interiora venis quibusdam nigricantibus aspersa conspiciuntur: medium florem occupant *cornuula* nullis *flamini*bus obfita.

Synon.

Clus. Pæonia pleno rubro flore minor: Camer. hort. Pæonia altera fl. pleno dilutior & minore: C. Bauh. Pin. Pæon. fl. pleno 2. siue fl. pleno rubro minore.

PÆONIA ALBO FLORE PLENO, SIVE
polyanthos alba fœmina.

ATQVE DE NONNVLIS ALIIS PÆONIAE SPECIEBUS.

Synonyma.



Quam Tabern. in Ic. & Hist. Pæoniæ fœminæ polyanthos flore albo, *weis gefüllte Peomen* Rosen. inscriptione pingit, & C. Bauh. in Pin. Pæoniam flore pleno tertiam facit, ac fœminam flore albo pleno cognominat, eam vidimus Basileæ in horto D. Fel. Plateri anno 1605. Iulij principio florentem, & folia v-

trinque glabra ferentem, seminumque capita hirsuta, dum apparere incipiebant.

Præter autem huc vsque recensitas Pæoniae species nonnullæ & aliæ traduntur: verbi gratia, Pæonia Byzantina prior Clusij quam C. Bauhinus Pæoniam 9. vocat, siue peregrinam flore saturè rubente. Byzantinam maiorem Eystet. Pæonia altera Clusij, C. Bauhino Pæonia 10 siue peregrina flore saturè rubente. Byzantinam maiorem Eystet. Pæonia altera Clusij, C. Bauhino Pæonia 10. siue peregrina flore dilutè rubente dicta. Pæonia foliis per oras nonnihil crispis, cineracei ferè coloris, quæ tertia Clusij inscribitur: & à C. Bauh. Pin. Pæonia 7. siue Pomi Arantij

colore: Eystettero verò peregrina flore coccineo. Pæonia foliis Aquilegiæ, supernè virentibus, infernè pubescentibus Clus. quæ C. Bauh. Pæonia 6. siue Aquilinæ foliis inscribitur. Pæonia flore variegato: quæ Pæonia 5. Clusio: C. verò Bauhino octaua est, siue flore variegato. Pæonia simplex, niueo flore, vel Cretica Clusij C. Bauhino. Pæonia simplici flore cum aliquo rubore. Pæonia alba promiscua Cretica, eidem C. Bauhino 5. dicta. Et Pæonia exalbida plena minor & major, quæ 6. siue exalbida plena Clusij inscribitur: flore pleno incarnato Eystet.

FRAXINELLA, OFFICINIS DICTAMNVS.

C A P. CXXIV.



Notissimæ Descriptio. sunt officinis Fraxinellæ radices, Dictamni albi nomine: candidæ enim sunt, variòque implexu multindæ: scapi aliquot selquicubito proceriores, hirsuti, rubescètes, medullâ multâ sarcti, thyrsum sustinent longum *florum* pulcherrimorum exintertuallis positorum odore graui, foliis

quinque ex albo purpurascens, striis saturatioribus notatis, auersâque parte nonnihil hirtis constantium, fibris longis recuruis, denis numero, purpurascens, subque apicibus luteolis ex purpureo herbidis, minutis micantibus granulis atro-purpureis respersis, medium obsidentibus: vnâ cum stylo pentagono pericarpio insidente. Semen in siliquis nigrum, lucidum, paullo maius quàm Miliij Solis. Folia septena, vndena ad costam ligata Fraxini more, supernè atro-virentia, infernè dilutiùs splendens, laurinis æqualia, crenata. In officinis radicum cortices prostant graciliores candidioresque quàm radices siue Mandragoræ, siue Capparis, quibus sunt similes sapore amaricante.

Ruell. vocat Dictamnnum tertium, aitque hunc Virgilium 12. suæ Aeneidos expressisse. Verùm decipitur Ruellius. Virgilius enim suis senariolis haud tertiam Dictamni faciem designat, sed primam. Fallitur & Syluius dum Pseudo-dictamnû Dioscoridis esse contendit. Nunc quis non Tragi erroneam damnabit opinionem, concludentis esse veram Peoniam aut Pioniam Dioscoridis? Quin & ij meritò à Matthiolo refutantur, qui Tragium primum Dioscoridis esse putant.

Non solum porro apertissimè constat, veram non esse Dictamnnum, & non sine manifesto errore Dictamnnum vocari, sed eius etiam radice pro Dictamnno pharmacopœos quosdam abusus esse, non absque ægrotantium incommodo. Nallum autem Cretensis Dictamni genus repræsentare,

tare, sed ab omnibus tribus diuersam esse testantur Cornalius, & Tragus.

Struth. filu. Pinxit Botan. Hær. Egenolphi p. 101. Fraxinellam sub inscriptione Sturckij filuestris, wild Gessentfrant / & Spengel raut.

Desfontat. Dioscoridum nesciuit quid scriberet, id demonstrare videtur, quod iuxta nomen Dictamni, & wurtz / wickwurtz / & wurdilic posuerit Fraxinellam, & ab altera parte Polygonatum: ex descriptione, quam habet, apparet cum nomina prædicta confundere. Si præterea caruimus, ut ipse ait, germana Dictamno, quis docuit ipsum tempus colligendi ad distillationem? In Germania, Gallia, & Italia, non prouenit vera seu germana Dictamnus, quæ distillari possit.

Brusch. fa. 146. Apud Hieron. Brunschweig in edit. anni 1505. malè Polygonatum pingitur sub his nominibus, wickwurtz / græcè Batis aut Diptamus, germ. Diptum / aut wickwurtz nomine falso Schwartz Diptam / wickwurtz. Edele luminadi, vel potius lumbare, ut habet impressio anni 1550. in qua melius Fraxinella exprimitur. Quin & Apollinaris in vna editione Polygonatum, & in altera Fraxinellam pictam proposuit.

An natrix Plinij Anguillæ?

Synonyma. Dictamnus potatus est Brunfelsio. Dictamnus vulgaris dicitur Trago, Gesner. hort. (cur & Fraxinella Italorum, & Rurpedij Chamæmelia, h. e. Fraxinus pomila, & Tragium Coldenbergij.) Camer. Lenic [cui & Pæonia macula] & Officinis. Dictamnus nostra Cordo in Diosc. Dictamnus albus Matth. Lac. Cæf. & Castori Diptamnium album Bello. Tragium Dodon. gall. Tragium Creticum, Guil. theone. Polemonium Tabern. Fraxinella Cordo hist. Dod. lat. Hist. Lugd. p. 872. Clus. Pan. p. 54. & Hist. Ger. & Eyst.

Locos. In Italiæ ac Germaniæ montibus ac collibus lutofo ac saxoso reperitur folio. Illius passim in Pannoniæ siluis, saltibusque Viennensibus inueniuntur duo genera. Apud Belgas hortensis est. Floret Iunio: post semen prouenit.

Tempus. Iisdem cum vulgari Pæonia pollere viribus, Tragi autoritate concludimus. Venenis omnibus aduersatur. Radix, inquit Matthiolus, cuius usus est, amara est: valet aduersus venena, & venenosorum animalium ictus. Necat interaneorum vermes drachmæ pondere hausta: datur contra frigidos veteri morbos, nam & menses & virinas mouet, partus adiuvat, secundas & emortuum foetum educit, tum supposita, tum cum Pulegio suffusa, tum ex vino meraco duarum drachmarum pondere pota. Valet quoque ad alui torsiones, & ad epiendos renum calculos. Additur quoque vtiliter in potionibus internorum vulnerum. Datur comitialibus, & in aliis cerebri affectibus. Præstat contra pestilentie contagia, quoquo modo sumatur. In summa ad multa radix vtilis est: Siquæ & flores contactu pruritum faciunt, & in calidioribus regionibus cutem exulcerant. Dodonæa radix exsiccatur & siccatur ordine secundo, digerentis, attenuantis & aperientis est facultatis: confert & stomachis & anhelosis fertur, & aduersus lethalia medicamenta antidotis vtiliter permisceri.

PRIMULA VERIS ODORATA FLORE luteo simplici.

CAP. CXXV.

Descriptio: **P**rimula Veris hæc odorata è radice modicè crassa, inæquali, subente, sapore sub-

astringente, odore suauis, aromatico, fibris albis longis donata: folia profert per terram sparsa, oblonga, subrotunda, rugosa instar Betonicæ, sed maiora: In quorum medio caulis surgitur palmatis aut dodrantalis, vnus pluresve, leuiter hirsutus, teres, foliis nudus, in cuius fastigio flores quinti, septeni, aut etiam duodeni ex oblongis calycibus in viridi flauis, lutei, odorati, simplices, in quinque laciniis diuisi, vel multiplices aliquando, in quorum medio apices croci, ac stylus viridis: quibus marcescentibus succedunt semina, quæ Tabernæmontano parua & nigra dicuntur.

Ruellio est Arthritica prior, à floribus primo Vere statim emicantibus, effi. inia Primula Veris dicta. Ruri Cuculi brachula aut Primueria. Luteræ Violæ genus quoddam esse credidit, inspicatque est esse Violam Tusculanam, quod ea cum celum silet, & tempus serenat, exitu Hiemis necdum exactis frigoribus, erumpat, & ut prima vernas texat corollas, ita confestim fugax euanescens, ut in medium Ver vix decorem suum prorogat: Vita ei complurimum mensura, nec temerè ad summum sesquimensum excedit. Nec desunt qui Philomides coronarias esse contendunt, sed notæ iam memoratæ non consentiunt.

Brunfelsius multa subinde apud autores de Paralyti herba [sic enim vocat tom. 1. Rhap. 15.] se vestigasse iactat, & plurima cum Herbaris consultis, verum nec quicquam comperisse, quod ad stomachum fecerit suum. Nomen ignotum Veteribus ait, & Barbaros tam inscitè, tam ineptè, confusæque omnia miscuisse, ut maius etiam negotium fecerint, &c.

Quod in Dioscoride & Plinio, Herba paralytis nomen habeat, Trago non constat. An verò Britannica sit Plinij, aut Britannicæ Auicennæ doctoribus discutendum relinquit, ab illis enim erudiri de veritate cupit. Apud Phrisium Chelidion, Taxifilum: Opiperam, Chelidium, & Germanicæ vocæ fastenblumen, h. e. Quadragesimalem florem nominari refert.

Et quamuis sine qui putent, ut Ruellio, Fuchsio, & recentiorum aliis placet, hanc vulgaris notitiæ plantam, quæ in quibusdam Brachaculi, officinis Primula veris, Germanis Clauis sancti Petri appellatur, esse Dioscoridis Philomidem, eorum tamen sententiæ hanc iquaquam ad stipulandum censet Matthiolus: Siquidem huc folia non insunt hirsuta, nec etiam rotunda, sed rugosa & oblonga. Addendum putat quod florum, quos hæc proferat, nusquam meminerit Dioscorides, neque è Veteribus alius. Id quod, eius quidem iudicio, silentio inuoluendum non fuerat. Matthiolus eadem hæc de Primula Veris caulifera, pallido flore inodoro intelligit, quam infra describemus.

Sed cum in eos inuehitur, qui inter Verbasci, species numerant duas illas plantas (Primulam Veris odoratam & inodoram) colore florum differentes, quæ primæ omnium Vere florent: quæque Hebræ paralytis vulgò vocantur: non re- quæ reprehensione [ut Maranthæ videtur] iuratur, dum inquit, si Verbasci essent species, eius flores essent omnino à Dioscoride descripti, quamuis [ut Maranthæ in hac re sententiam profertur] in aliis notis eorum plachum non ex omni parte acceptandum existimet.

Neoterici prima Philomidum genera Dioscoridis, censent eam herbam (inquit Spieg. Hag

lib. 1. cap. 15.) quæ Paralytica & Anæsthetica vulgò dicitur, cuius multæ sunt species. Verùm non vident Dioscoridem his folia tribuisse hirsuta, quæ in nostra Paralyti desiderantur. Sunt enim aut læuia, aut crispæ Lactucæ modo, hinc Lactuca silv. in regione Patavina vocatur.

Dorstenius. Dorstenius gravi errore, deceptus ut puto lectione Brunfelsij, Margaritæ nomen adscribit Herbz paralytis, licet postea dicat Margaritam esse Bellidem.

Dod. tax. Dodonæus, ut nobis videtur, minùs distinctè scribit de Primulis Veris: oportebat eum inter alia indicare eam quæ flore eleganter est luteo, jucundè odorato cuius iconem omisit Primulas, cum Matthiolo & Spiegelio, non hirsutas ait, contrarium tamen asserit Lobel. & quædam hirsutas esse pronunciat. Nominantur, inquit, arctica, & Herbz paralytis, quod ad artuum & nervorum dolores conferte existimantur. Quæ maior est, à nonnullis Herba S. Petri dicitur. Altera Primula Veris minor appellari consuevit. Ad præsentem, Latinis Verbascula dicta, à plerisque referuntur, sed cum folia eius nec hirsuta, nec rotunda, ægè eò pertrahuntur, &c.

Synon. Cæterùm, dicitur Herba paralytis Brunfels. Cast. deser. Herba paralytis vulgaris Trago, altera Casalp. Primula Veris Matth. H. Lugdi p. 834 Tabern. hortensis Thal. Primula Veris maior fl. luteis odoratis Dod. Primula Veris flavo flore elatior Clus. Pann. & Hist. post. Primula Veris flore luteo Eyll. Primula pratensis Lob. in Obs. p. 305. Ic. Plant. p. 367. odora lutea in Aduers. Gerardo. Verbasculum odoratum Fucht. Dod. gall. Verbasculum flore simplici 1. sine pratense odoratum. Arctica Gein. hort. simplex luteo flore Camer. hort. Alisma pratorum Columellæ. Dodecantheon Anguill.

Locus & Tempus. Vbiq; in pratis vlginosis & riguis, præsertim regionum minùs calidarum, ut Sabaudia; Flandria; Gallia; Northmannia & Anglia primo Veris tempore florent, referente Lobelio. In Austria Stiria, Pannoniaque pratis & herbosis montanisque locis atque silvis Primulæ Veris Herbariorum genera nascuntur, elatior viraque atque humilior, auctore Clusio. Basilea, Geneva, & Lugduni floret Martio & Aprili.

Vires & vñs. Recentiores duobus Verbasculis hos effectus assignant. Tuta imponuntur efficaciter articulorum doloribus. Radicis decocto vesicæ renunquæ obstructions solvantur. Ius herbæ propinatur & illinitur aduersus rupta, luxata, & liuentia. Quod verò hæc eadem possint, temperamentum eorundem palam docet: parum enim adstringunt: si gustaueris, amara & modicè acrisunt: ut hoc nomine desiccandi & detergendi facultatem, quam illis Galenus adscribit, habere nemo dubitare debeat. Nostri etiam temporis Herbarij calida & sicca esse statuunt. Et mulieres formæ stuentes, succo è floribus illorum expresso faciem illinunt, quod maculas, rugasque, & alia eiusdem vitia mirificè detergeant. Folia gustu non ingrato, in oleo, placentalis & acetariis, admodum vtilia capiti, nervis, & humorum ex decubitu putredini, aut inflammationi, ec quæ vniuersaria habetur. Esse Primulas Veris facultate quidem reticantes, sed calidas exiguum, aut nihil, prodidit Dodonæus.

PRIMULA VERIS CAVLIFERA PROLIFERA odorata.

Locus. Argentina in horto Frid. Meieri Primula Veris floret in caule geminos aut trigemi;

nos proferebat, altero alteri innato: folia inferiore parte erant valdè hirsuta.



Lugd. pag. 835. figuram Lobelij habet priori loco sub Siluarum Primulæ Veris flore multiplici inscriptione.

PRIMULA VERIS CAVLIFERA, FLORE luteo pleno, odorato.

DE hac Gesnerus hort. scribit: Primulæ Veris species magis colorata & odoratior, quæ vi descripta Vere floret: cuius genus dasypodium seu densifolium habeo, inquit, quod semen non profert.

Synonyma Tabern. in Icon. & Hist. pingit eam sub titulo Primulæ Veris multifloræ, gesuit Schüsselblumen.

C. Bauh. Pin. Verbasculum, flore multiplici 1. [5. phyt.] sine hortense multiplex, Primula hortensis Anglica Lobelij. Hanc nos aliam statuimus.

Frequens in variis Germaniæ hortis occurrat: Locus & floret maio. Flore matore obseruati Argentinae Tempus magis luteo & odorato apud D. Frid. Meierum.

PRIMULA VERIS CAVLIFERA PALLIDO flore, inodoro, aut vix odoro: Et alia maxima flore pleno.



& loculamenta, ut in illa.

Primula flore pallido radice conuenit cum ea quam in initio descripsimus, ut & caule: at folia alia quando maiora: flores laciniati, pallidi, nullo odore commendabiles, similes floribus Primulæ Veris odoratæ cum singulis pediculis, colore, & magnitudine: semen

Herba

Synonyma

Herba paralyfis alba, Brunfels. com. r. raph. 15. Secunda & sylvestris, Trago: Verbasculum non odoratū siue alterum, *Wald Schlüsselblumen* / *Wald Schlüssel* Fuchfio. Verbasculum album, Dod. gall. Primula Veris minor, floribus pallidis ac dilutius coloratis, quasi albidis Dod. lat. Antè diximus Dodonæum minus distinctè scribere de hac Primula Veris cuius iconem exhibet, qualem Lobel. habet, videriam iconem eius quæ pleno flore est. Arthritica, Primula Veris, Herba ad paralyfim, Herba Petri Nic. Myræsi, in fine Hiemis erumpens, pallidior & minus odorata, Gesn. hort. Primula Veris, Herba Paralyfis elatior, pallido flore, Clus. Pan. & H. A. Primula Veris floribus pallentibus & foliis grandioribus, odoris minus Lob. in Adu. Primula pratensis luteo pallida inodora in Obs. p. 305. Ic. Pl. p. 368. Primula silu. 3. vel [in ordine] 5. Tabern. Primula Veris, Paralyfis silu. Thal. Alismatis siue Damasonij genus alterum Plinij: secunda species Fab. Col. Verbasculum flore simplici 2. siue pratense inodorum C. Bauh. phyt. & P. nice.

Primula Veris flus multiplex, Dod. Primula veris elatior polyphyllus ex Anglia in Belgium allata, Clus. Primula Veris pallida, in hortis Anglicis & Northmannicis culta, florum maiorum proventus & feru multiplici, triplo aut quadruplo omnium Primularum magnitudine & elegantia prima, Lobel. in Adu. Primula hortensis Anglica omnium maxima & serotina floribus plenis, Obs. p. 305. Ic. Plant. pag. 367. Primula Veris multiflora silvestris, Primula 3. vel silu. 1. Tabern. Arthritica pleno flore, Camer. Primula hortensis Anglica Lobelij, H. Lugd. p. 384. Prim. Veris Anglicana fl. pleno Eytt. C. Bauhin. in Pin. Monimus antè nos dissidere à Casp. Bauhino in eo quod patet Primulam Anglicanam Lobelij eandem esse cum odorata fl. pleno: Belgæ & Angli diiudicent.

Locus & Tempus.

Idem ferè locis quibus lutea odora provenit pallens inodorata. In pratis circa Tigurum abundat. In Austria, Stiria, Pannoniaq. in pratis reperit Clusius. Montebelgardii in dumetis & siluosis floret. Aprili.

PRIMULA VERIS FLORIBVS EX SINGVLARIBVS PALLIDIS MAIORIBVS SIMPLICIBVS & plenis. Item alia flore albo.

Descriptio.

Radix longa, fibrosa gustu adstringente, Anisum redolente, promit multos pedunculos, hirsutos, teretes, exalbidos, radicem versus leniter purpurantes, semipalmates & palmates, quorum fastigio insident è calyculo oblongo pentagono, angulis hi. fuitis præditi, colore herbaceo, quinquepartito diuiso, flori ex languescente luteo palliduli, vnguibus croceis, quinque foliis cordatis constantes, odore ferè euano, in quorum medio reconduntur alie staminula lutea, pistillo herbaceo capicellum viride proferente: In singulis pediculis singuli flores, similes Primulae Veris inodoratæ, cui etiam similia folia rugosa, nervis hirsutis pronam partem percurrentibus, oblonga, obrusa, supinâ parte glabra, sapore non adeo adstringente atque radix.

Varietas

Ludere in horto Ill. E. C. Montbelg. obseruavi florem duodecim foliis cordatis stipatum. Ex eodem etiam calyce prodit flos geminus, suo quisque corniculo nixus: vni quidem folia septena, alteri quina: ipsæque adeo calyx totidem constat. Tom. III.

bat pinnatis cæsuris, quot simul vterque flos foliis. Flore etiam pleno accepi Argentina.

Synonyma

Trago dicitur Herba paralyfis sylvestris. Gesn. hort. Primula Veris, siue Herba ad paralyfim, circa Curiam Rhætorum nascens, peculiaris, flore singulari, non in corymbis: Eodem in ep. ad Fab. Cur. Arthritica species rara, floribus singularis, non in corymbis: Item, Arthritica species, singulos flores singulis petiolis sustinens: In epist. ad Zeyng. Arthritica hybernæ. Dod. gall. Verbasculum minus, officinarum Primula Veris minor lat. Primula veris minor, floribus pallide luteis, pediculis tenuibus.

Herba paralyfi humilis

Primulam Veris, Herbam paralyfis humilem flore pallido, siue *καυλός*, Vngaris & alia verag. hoc est, pulvis ex Panico & Milio cōfēctus [quasi illi Kacha vocant] florem dictum, Clusius in Anglia flore omnino niueo conspexit.

Sylvarum primula [Lobel. in Obs. pag. 305. & Ic. Plant. pag. 368. inscribitur.] Tabern. vocat Primulam silu. 2. Columna, Alismatis siue Damasonij genus alterum Plinij.

C. Bauh. phyt. & Pin. Verbasculum 3. siue silvarum maius singulari flore, Primulam Veris siluestrem flore pallido Eytt. Herbam paralyfis Cæsalp. Arthriticam caule exiguo, vel nullo, Camerarij. Eodem in Pin. Verbasculum flore multiplici 2. [6. in phyt.] siue silvestre magno plenoque flore, Primula Veris sylvarum fl. pleno specioso Eytt. flore multiplici H. Lugd. Primula Veris multi flora silu. Tabern. Prim. Veris fl. pleno Ger.

Locus & tempus.

Circa Curiam Rhætorum tota Hyeme floret, si nix sinat. Maxima copia in Vngaria cædis siluis & in Anglia flore albo etiam in cædis siluis abundè lactei candoris obseruabat Clusius & in Belgium mittebat. Labentius hæc nemorosa, vmbrosasque conualles sectatur: vt in Anglia, Delphinatu & Sabaudia. Flandris & Gallis hortensis. Bononiæ, Veronæ, Ferrariæ, & Patavij passim floret in hortis mense Febuario, Martio, & Aprili.

PRIMULA VERIS FLORIBVS PLENIS ex singularibus pediculis.

Descriptio.

DE hac antè mentionem fecimus sub hoc titulo: Primula Veris floribus ex singularibus pediculis, &c. Hanc pingit Lobel. in Icon. Pl. pa. 265. tom. 2. pro silvarum Primula Veris flore pleno specioso.

Locus.

In horto Ill. E. C. dono D. Frider. Meieri habui, qui Argentinae allam ostendit flore, albo pleno, vnguibus luteis, quæ defloruerat Mensis Maij 14. die.



PRIMVLA VERIS FLORIBVS OBSCVRÆ
virentibus fimbriatis.

Descriptio




Silvarum Pil-
mula fim-
briatis floribus,
rugosisq; plicis,
& coloris obscu-
rè viridis, Lōdi-
ni hortis fre-
quēs, alioqui as-
lumbis ceteris
an. hore. Lobelio
Adv. qui in Obs.
p. 306. Ic. Plant.
p. 69. titulo præ-
posito donatur.
Tabern. dicitur
In Ic. & Hist. Pri-
mula silu. flore
viridi, Primula
sexta: Gesn. hort.
Arthritica gen.
odoratum flore
virenti: Ded.
lat. Primula Ve-

ris minoris species floribus herbaceis, obscure-
que virentibus, & quandoque foliis multiplica-
tis. Icon quæ proponitur à Lob. & Tabern. pro
Primula Veris floribus obscure virentibus flores
habet plenos. Quare mirari subit Lobelium non
annotasse plenos esse. Ea icon optime repræ-
sentat Primulam Veris cum floribus plenis ex
singulatis pediculis: vereor ne Lobelius vi-
derit siccos flores, in quibus color facile deper-
ditur, alio successu temporis appatente, si in sic-
candis non summa diligentia adh. beatur. Sum-
ma fuit opera Clusij in annotandis Primulæ Ve-
ris differentiis, verum viddium colore non me-
minit. C. Bauh. phyt. Verbasculum 4. siue sil-
uarum minus flore singulari, quandoque multi-
plici: P. n. Verbasculum flore multiplici 3.

Lobel. cat.

PRIMVLA VERIS MINOR
purpurascens.

Descriptio.



Fibrosis Pri-
mulæ vulga-
ris radiis hæ-
ret, è quarum
capite folia pul-
lulant numero-
sa terræ incum-
bentia, sex Æali
lōgitudine, lati-
tudine vinctali
circū circa terga-
ta, subtus inca-
na & necturorum
vindium dis-
cussa, virgata,
superius viren-
ta: inter hæc
caules surgunt
plures dodran-
tales & breviores,
nudi, eno-
des, in quorum

Icon alia.



cacumine vm-
bella sedet flo-
rum numero-
forum semun-
cialibus pedi-
culis herentiu,
floribus Auri-
culæ vrsi re-
spōdentiū, co-
loris purpura-
scentis.

Huic per om-
nia similis mi-
nor species, Varietas
caule trium,
quatuorve vn-
ciarum, foliis
penè Alfinis
vulgaris & etiā
dimidio mino-
ribus, vix ap-
parētibz tren-
nis: floribus
pauca, vno sc.
duobus, vel tri-
bus.

Cū autem in figura nostra Fuchsiā flores Icon.
minùs benè exprimentur: parvam plantam ex
nostris curauimus pingendam, simulque malo-
rem ex Clusio assumpsimus.

Coronariū puniceique flores, foliis ad peren- Synon.
nem radicem oblongis, inferius candicantibus,
Cordo in Obs. silu. Arthritica, Primula Ve-
ris minor cæruleis flosculis, Gesn. hort. Para-
lytica alpina, Sanicula angustifolia maior, flori-
bus rubore & candore confusis: primula Veris
foliis Gnaphalii montani longioribus: floribus
purpurantibus, aut ex roseo & albo confusis
micantibus, Viennā Austriæ à Clusio missa: I-
tem, Sanicula alpina minor, siue media, folio
minore tantillum crenato, floribus non dispari-
bus, Lobel. Obs. pag. 307. Icon. Plant. pag.
570.

Compiler Tabern. Primulam Alpinam me- Compiler.
diam, siue secundam: itemque Primulam Alpi-
nam angustifoliam, siue tertiam, confusè ponit
cum Auricula vrsi.

C. Bauh. phyt. Verbasculum 8. siue cæruleum
umbellatum: Item, Verbasculum 9. siue Alpi-
num angustifolium maius: Et, Verbasculum 10.
siue Alpinum angustifol. minus. *Eidem in Pin.*
Verbasculum Alp. 1. siue umbellatum Alp. minus
Maieles, Cordi Obs. *Scherbenblümse* Gesneri,
monente Camerario: Verbasculum Alp. siue cæ-
ruleum H. Lugd. pag. 126. Sanicula Alp. minor
siue media Lobelij H. Lugd. Primula Veris flo-
re rubro, Gerardi: Arthritica flore purpureo,
Camerarij: Primula Veris angustifolia rubra &
alba, Eyst. Item: Verbasculum alp. 2. siue um-
bellatum maius: *Schenslin* Simleri: Paralytica Al-
pina, Sanicula angustifolia maior Lobelij H.
Lugd. Primula Veris albo flore Gerardi, va-
rius floris colore, albo, rubro, & rubore & can-
dore confuso.

Clusio videtur Gesneri *Schenslin*: & Cesar,
inter herbas aut Regulus: Austriacarum rhizo-
tomarū *Scherbenblumen*. & *Stein rot sel. Asselblu-
men*: Rusticorum Anglorum *Dirdeem*. hoc est,
Aulium oculi, teste Pennzo.

Spontè magna copia prouenit in vlginosis &
humidi:

Tempus.

midis pratis. Floret verò sub finem Aprilis & toto fere Maio. Habuit etiam in horto Clusius: in hortis tamen breui euanesceit.

Fecundum.

Quantum ex gustu deprehendere licuit Clusio, iisdem facultatibus esse præditam collegit, quibus alix Primulæ Veris polleat.

CORTUSA.

CAP. CXXVI.

Descriptio.



Cortusæ folia pediculis à radice mortuatis hærent, sextantali quoque uersus latitudine, aut maiore, circumscriptioneque rotunda, æqualitatem intercipientibus profundiusculis cæsuris: caules nudi & enodes foliacei in cacumine gerunt calicem ex quo seni aut plures prodeunt pediculi, seminales, singuli florem vnum

gerentes Auriculæ vrsi floribus respondentem, quinque purpureis constantem foliis, umbilicem obsidentibus luteis apicibus, è quo etiam stylus longiusculus extra florem prominet: radix subest è fibris numerosis contexta.

Synonyma.

Hanc in Pin. demum agnouisse videtur Casp. Bauh. reponens eam inter Saniculas Alpinas, cognominansque Saniculam rotundifoliam, siue montanam latifoliam laciniatam; Cortusam Matth. Cast. H. Lugd. & Camerarij, Caryophyllatam Veronensem fil. Saniculæ Vrsinæ Lobelij in Ada. & Obs. p. 497. 1c. Plant. p. 699. Saniculam montanam Clusij Hist. alteram in Pann. Saniculam Alpinam Tabern. & Gerardi. Duplex, inquit, figura apud Clusium, Tabern. & Gerardum. 1. Sanicula montana Clus. Hist. Sanicula alpina Clusij II. Cortusa Matthioli, Clus. Hist. & cor. post. Saniculæ alpinæ icon verior, Tabern. Cortusæ rarior icon, Gerardo: In figura Saniculæ Clusij, qui fuscè describit, malè auersâ parte puncta aspersa sunt. Hæc ille.

Figura duplex non Clusij.

Cortusa Matth.

De Cortusa hæc scribit Matthiolus. Sed de Caryophyllatis hæc tenet. Quorum gratissimus odor aliam mihi plantam reuocauit in mentem non minoribus fortasse viribus insignitam. Cortusam hanc appellare libuit, quod à Cortuso Viri optimo primum hæc planta reperta sit. Prouenit hæc foliis fere vitagineis, sed longè minoribus, subrotundis atque subasperis, stringenti quadantenus sapore, & longis nitentibus pediculis. Caules edit tenues, rectos, foliis nullis refertos, sed qui in cacumine magno naturæ artificio flores gerant, extima parte purpureos, intima verò aureo fulgore splendentes, aureisque staminibus intus refertos. Radicibus nititur numerosis tenuibus ac prolixis. Est etiam quæ violaceos, & quæ candi-

Tom. III.

dos flores gerat, sed prima frequentior. Nascitur locis vmbrosis nunquam à sole illustratis, creta- Locus. ceo & albicante solo. Nusquam hæc planta ab eius inuentore Cortuso visa est, præterquam in agro Vicentino, in eo tantum tractu, quem vulgò appellant *Valle-flagna*. Tota plena dum recens est gratissimo spirat odore, melleis fauiscerè Oder. Vues. simili, sed longè admodum gratiori ac vehemriori. Sed in sicca euanesceit. Expertum est valere hanc plantam ad mulcendum neruorum & articulorum cruciatus à quacunque causa exortos. Nam ipsius floribus in amygdalino oleo recenter presso & rotaceo, quod completum vocant, pari pondere commistis, diu insolaris, fit ad hoc medicamentum præstantissimum, vbi egelidum illinatur. Nec ambigo quin tota planta adstringere ac roborare, & vulnera, viceræque sanare valeat. Eâ recentiores videntur potè ad thoracis interna vulnera. Quin & eius succum, admixtâ æruginè cuniculosis, contumacibusque vlcibus vtiliter iniiciunt. Eadem olfactu spiritus recreat, & frigidum roborat cerebrum. Epota prodest cæliaciis, dysentericis, sciminatum profluuiis, & cruenta expuentibus. Tam intus sumpta, quam foris illita enterocelis auxilio est. Temperamentum ei excafaciens & exiccans, vt manifesto sunt indicio eius radices: quippe quæ gustu odoratæ, adstringentesque deprehendantur. Quibus qualitatibus, non modò attenuare, discutere, & adstringere valent, sed etiam roborare.

AURICULA VRSI FLORE LUTEO.

CAP. CXXVII.

Descriptio.



Maior est quam rubra: foliis per terrâ sparsis, non paulò maioribus, palmatis, sextante latioribus, crassis per extremum rotundis, modò leuiter serratis, modò minimè, sapore non nihil amaro: caules sesquipalmates, flores in cacumine gerunt positi & figurâ Auriculæ vrsi rubræ, sed colore

luteo insignes: radix crassitudine digitali, fibras longas multasque è lateribus profert.

Non dubitum est, inquit Clusius, qui Auriculæ vrsi primæ inscriptione pictam & descriptam exhibuit, quin ad Primularum classem referenda sit venusta hæc planta, adeò similes sunt & formæ, & temperamentum.

Matth. in Diosc. Saniculæ genus Germanorum, Sanicula & aliorum Herbariorum Auricula vrsi. Gesn. hort. Arthritica genus alpinum; Sabaudis quibusdam Lunaria nominatum. Ejd. hort. Lunaria arthritica. Item de Lunar. p. 21. & 24. vbi figura, herba Iuliana, Sabaudis dicta. Circa Bergamum in Italia Folium montanum: quibusdam motium

Clus. deseri

Bauariæ incolis, Morfus Diaboli. De coll. stirp. Arthritica montana, quam aliqui Lunariam, aut Folium montanum vocant. Arthritica Alpina lutea. Arthritica montana saxatilis: Arthritica montana petrea.

Paralyticam Alpinam, [ita in Icon. Plant. pag. 569. & in Obs. p. 306. vbi etiam Saniculam Alpinam, & Auriculam vrsi luteam vocat,] interdum frequentiore & maiorem vidit Lobelius, foliis, cauliculo, & flore, qui tamen non purpureus, sed luteus, aut albus, & fuscedine pullus est. In montibus arduis calidarum regionum cauliculos & folia emittit maiora, & interdum longè minora: specie tamen aut naturâ non diuersa. Luteo pallentis Saniculæ eadem ratio maioris & minoris, inquit ille in Obs. vbi Britannicam Anguillaræ esse contendit, absque tamen sufficienti ratione.

Tabern. Icon. & Hist. Primula alpina latifolia (floribus sc. purpureis) *arop alp Schüsselblumen*. Et Ic. Auricula vrsi floribus pallidis, *Schreibera Sanctel: Hist.* Auricula secunda. Item, Ic. & Hist. Auricula floribus, luteis, *gelbbere Sanctel*. Rursus Ic. & Hist. Auricula vrsi floribus aureis, *golt golt beer Sanctel*. Tandem, Ic. Auricula vrsi *Beer Sanctel: Hist.* Auricula vrsi 7. flore luteo. *Compil. not.* Compilerem Tabernemōrani oportet stirpium penitus ignarum fuisse, vt qui vnam eandem plantam tribus diuersis tradit capitibus, interpositis aliis plantis. Præterea quam vocat Primulam Alpinam, est figura Matthioli, cui tribuit flores purpureos. Ponit quinque figuras non differentes.

Auriculam vrsi, flosculos ferentem plerique locis luteos, aut albidos, alibi purpureos, aut dilutè rubentes, ad Primulas Veris pertinere testatur Dodonæus. Recentiores tamen in Solidaginum numerum adscribunt.

*Allisma ac
Damasonium
Plini &
Diosc. Co-
lumna.*

Columna Allisma atque Damasonium Dioscoridis & Plinii facit, sicque cognominat à vi propulsandi venena, & non vt Lobelius, à voce *ἀλίσμα*, maris allisionem sonante. Alceam præterea nuncupari refert, floresque ex albo lutescentes habere, haud multum odoriferos. Rectius autem Neoterici à forma foliorum Auriculam vrsi vocant. Columnæ tamen Auriculas vrsi ad Allisma siue Damasonium Dioscoridis, referentis sententiæ valdè acquiescit Clusius. Austriacarum Stiriacarumque Alpium incolis *Crassivater* fructus & *Schmidel* raris ab effectu dicitur. Comendant enim eius radices usum, ad roborandum caput, ne vertigine in præcipitiis tentetur,

cuius rei causa, caprearum & ibicum venatoribus non minus familiaris quàm Doronici radix. Medlingenses apud quos copiosè nascitur, vult *Schmidel* de *Schüsselblumen*, i.e. Primulam odoratam appellant.

H. Lugd. pag. 836. Primula Veris pachyphyllos, *Synonyma* Cæsalp. Auricula vrsi seu lupi: Cast. Auricula vrsi. *quædam.* Camer. & Eyst. Auricula vrsi floribus luteis: C. Bauh. phyt. & pin. Sanicula Alpina i. siue lutea, Sanicula Alp. foliis serratis.

Copiosè nascitur in agro Goritiensi monte *Locus.* Saluatino, vt & in variarum Austriæ & Stiriæ alpium iugis, vbi obseruauit Clusius florentem Iunio, interdum Iulio & Augusto duntaxat, videlicet statim post solutas, in iis iugis, vbi crescit, niues, nonnunquam etiam sub ipsa quasi niue, & concamerata niuis indurata crusta, reliquâ, quæ subtus erat, Solis radiorum rupes ferientium percussione solutâ. In hortos verò translata Aprili floret, & aliquando iterum Autumno, si aura sit temperatior, illis exceptis, quæ vel contabuerunt, vel nullâ diligentia, aut cultura ad florem ferendum induci potuerunt.

Cæteris Saniculis præfertur ad enterocelas, & *Vires & Vitis.* thoracis vulnera, si quotidie in potu sumatur: quin & ad alia vulnera, tam intus sumpta, quàm exterius illita: Frigida & sicca est & adstringit, teste Matthiolo & Dodonæo. Gesnerus libro de Lunariis herbis, radicem vinum suo odore commendare scribit, manducatam verò, dentium dolores, præsertim à frigida defluxione obortos iuare, capiti frigido & partibus nervosis prodesse, putrida vlcera emendare, scissuras in cute hiantes, ventorum, frigoris, aut alia quapiam iniuriâ, succum eius instillatum breuissimè sanare. Istic ubi nascitur, Soli, vt dixit Clusius, montani venatores eius radice ad corroborandum caput, ne vertigine tententur, vtuntur: à reliquis negligitur, præterquam mulierculis, quæ ex eius floribusserta & corollas conficiunt. Columna huic nostræ plantæ, vires Primulæ Veris & Allismæ Dioscoridis adscribit.

Supererant aliquot Auriculæ Vrsi species. nonnullaque alia capita, quæ pro Instituti nostri ratione superioribus in hocce Libro subnectenda erant, quæ cum lapsu quodam typographico loci huius esse non possint, in Appendicem huius Tomi relegantur: Inibi igitur habebit Lector *Reliquæ Auriculæ Vrsi species, vt & Chamæasma Alpina: Saniculæque iisdem Alpina minime pilosæ C. Bauhini, necnon Verbasorum & Blattarum ac Chrysogonorum historiam.*

FINIS LIBRI TRIGESIMI.





HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XXXI.

NERVIFOLIA, VT PLANTAGINES, GENTIANÆ,
POLYGONATA, HISQVE NONNIHIL SIMILES.

Perasta sane magna ex parte Coronariarum natura est, quarum ineffabiles varietates non minus ostendendo nos placuisse speramus, quam naturam eas probando, cum hunc genium nobis largitus sit D. O. Max. ut à se largitas indagaremus curiosius ipsi, ut ostenderemus alius. Nunc aliud gressus dirigendus Est ubi ex fructu, est ubi ex flore, est etiam ubi ex radice stirpium classes melius asstmes: nunc ad folia maximè respicere lubet. Ergo, hercle, has nunc perlustremus, quarum folia cum parallelis costis atque nervis nobiliter instructa sunt, & his as-
puitate proximis. Quamquam si & aliud respicere lubet, est ut spicati aut caudati culminis similitudinem in
plerisque contempleris.

PLANTAGO VETERIBVS.

CAPVT I.



THEOPHRASTVS simpli-
citer Arnoglossum vocat,
aliquando Stelephuron, v-
trumque verbum à Theo-
doro Plantago vertitur. De
Arnoglossò inquit: Ab ra-
dice tantum foliata est: pro-
rogat suos proventus ex sin-
gulis floribus: alibi Stelephoros, inquit, spicosa,
quæ Agnina lingua à quibusdam vocata est, & ab
aliis Coturnix (Conturnix Cæf.) similis caudæ
vulpinæ, nisi quod florem non particulatim edit,
sed per totam spicam, Tritici modo: flos lanu-
gineus, ut Frumenti: Genere autem comenit cum
Oculo canis, & Bibinella, & Cauda vulpina, quæ
spicam gerunt, non acutam, neque aristatam totâ
formâ cum Tritico similia, sed latiore folio.

Plinius seorsum de Plantagine & Stelephuro
agit: nam Stelephuros, inquit, proxima est Cau-
dæ vulpinæ, nisi quod illa particulatim floret.
Alibi duo genera Plantaginis tradit, minorem &
maiolem. Verba eius lib. 15. cap. 8. sunt hæc: Cele-
brauit & Themison Medicus vulgarem herbam
Plantaginem, tanquam innentor, volumine de
ea eduo. Duo eius genera, minor angustioribus
foliis & nigrioribus, lingue pecorum simillimis,
caule anguloso, in terram inclinato in pratis nas-
cens. Altera maior, foliis lætæum modo inclusa:
quæ quia septena sunt, quidam eam Heptapleu-
ton [ἑπτάπλευρον, h. e. Septineruiam] vocauere.
Huius & caulis cubitalis est & angulosus. Nasci-
tur in humidis multo efficacior, Vis mira siccan-

Tom. III.

do densandoque corpore, cauterij vicem obti-
nens. Nulla res æque sistit fluxiones, quas Græ-
ci rheumatismos vocant. Ita habet verus Plinij
codex, qui Dioscoridem, miras huius herbæ fa-
cultates tradentem variis aliis in locis sequitur
& declarat.

Cæterum, caput Dioscoridis [quod nonnulli
codices ἀνθρακωδὴν ἰππὸν ἰνσὶν ἰνσὶν ἰνσὶν
verò codex πολυπλέου] sic habet. Plantago (ἀνθρα-
κωδὴν. Orib. ἡ ἰππὸν ἰνσὶν ἰνσὶν ἰνσὶν) duum
est generum: minor enim vna est, maior altera.
Ac minor quidem foliis prædita est angustiori-
bus, minoribus, mollioribus: cauliculis verò an-
gulosis, ad terram inclinatis: floribus autem
pallidis, ac semine summis caulibus emicante. Ac
maior (ἡ ἰππὸν). Sunt antigrapha, in qui-
bus periodus à τὸ ἡ ἰππὸν, vltique ad γένεσιν, h. e.
nascitur, deest: sed teste Sarraceno, retinenda
sunt omnia: & amplior lætiorque est, & latifo-
lia, in oleris vsum apta [λαχνοῦς: Ald. λαχ-
νοῦς: C] Caulis huic angulosus, subruber, cubiti al-
titudine, à medio ad verticem tenui semine cir-
cumdatus. Radices subiacent teneræ, hirsutæ,
candidæ, digitali crassitudine. Nascitur in palu-
dibus, sepibus, ac locis vliginosis. Maior (ἡ ἰππὸν
vet.) potè efficacior est. Vim habent folia ex-
siccatoriam & adstringentem. Quare omnibus
malignis, elephantiam comitantibus, fluxioni
opportunis, sordidisque vlceribus illita conue-
niunt. Cohibent & sanguinis eruptiones, no-
mas: carbunculos, herpetas, & epiniæctidas, vetera
quoque & inæqualia vlcera cicatrice obducunt.

Kk k

Chironia sanant & sinns agglutinant. Moribus canis, ambustis igni, inflammationibus, parotidibus, panis ac strumis quoque & ægilops cum sale impolita profunt. Coctum verò olus cum sale & aceto sumptum, dysentericis, cæliacisque subuenit. Datur & in locum Betæ (Sideris & c. Hæc vsque ad *ἑξάμηναι* distendit, h. e. & suspitiosis data, in veteri margine reperiuntur, Sarrac.) cum Lenticula [*μυρτιά*] decoctum. Tribetur & herba decocta ad aquam intercutem, & Leucophlegmatia nomen est, post sicciorum alimentorum esum, ita tamen ut media cibis interueniat. Comitialibus quoque & suspitiosis data proficit. Foliorum succus oris vlcera repurgat, si subinde colluatur. Cum simolia aut cerussa erysipelatis medetur: fistulis infusus auxilio est: prodest & ad aurium dolores atque ophthalmias, seu instillatus, seu in collyria additus. Sanguinantibus sanguine putrescentibus, Plin.] quoque gingiuis, & sanguinem supernè rejicientibus potu confert: clystere verò dysentericis (ver. addit phthysicis & dys.) infunditur. Contra rabem datur in potu, aduersus strangulationes vuluæ subditur in velle: re: quemadmodum & si vulua rheumatismo laborer. Semen ex vino potum alvi profluuiis & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix seu colluta, seu commanducata, dentium dolores sedat. Eadem cum foliis ad vesicæ renūque vlcera in passo datur. Caterùm, ferunt ternas radices cum vini ternis cyathis & aquæ pari modo tertianis febribus, itémque quaternas quaternis auxiliari. Sunt & qui radice vinculo è collo suspensa amuleti instar vtantur ad strumas discutendas. Syri huius (leguntur hæc ad capitis calcem inter notha) & Calaminthæ ius ulum cum melle prodit mederi paralyticis febribus, Corn.] si secundâ & quartâ parasceues, i. e. Veneris die exhibeatur. Hoc autem velut arcanum accipito: est enim verissimum & experientiâ comprobatū.

Calen.

At ut eas vires habeat plantago, quas Dioscorides & Plinius ipsi attribuunt, temperamentum eius mixtum facit: habet enim (ut Gal. 6. simpl. pharm. ait) aquosum quiddam frigidum, habet & quid austeri, quod terreum est, & siccum ac frigidum, ut refrigeret simulque siccet: & secundum ambo secundi est à mediis abscessus.

Temperam.

De Plantaginis virtutibus elegantissima est Macri Poësis, quæ sic habet:

Macri Poësis.

Herbam, quæ nostra lingua Plantago vocatur, Hanc ἀγνίνηον Græci vocat, est quia lingua Agnina simili foliis. Plantaginis huius

Etymon.

Sunt gemina species, & maior prima vocatur: Altera verò minor, quam vulgò lanceolatam dicunt, quod foliis, ut lancea, surgat acutis.

Temperam.

Hu inflammandi, desiccandique videtur

Vulnera.

Tertium esse gradum: maiorem vim tamen esse

Maiori dicunt: nimis humida vulnera siccant, &c.

Nomina

liogorum.

Caterùm, ἀγνίνηον Græcis dicitur & Latini, quod folia eius agninae linguae simillima sint: Nonnulli tamen Arnion (ἄρνιον, quasi agninam,) alii Probation (πρόβατον, quasi ouillam) alii Cynoglosson (κυνογλωσσόν, quasi canis linguam,) alii Heptapleuron (ἑπτάπλευρον, quod septem fibris seu costis in dorso distincta sit:) alij Polyneuron (πολύνευρον, quasi multineruiam) appellant. Magi Caudam ichneumonis, Aegyptij Aschar, Romani Plantaginem, ducto à planta vocabulo.

Plantago.

Germani ab agni lingua Eschaffungen/ sed vulgò weckbre/ weckhebsat: Galli Plantain, & ut inter notha legitur, Turbidolpion: Itali Plantagine, & Plantagine: Hisp. Lhantem Tamebagon: & voce spuria Thefaricam: Pœni A-

Viarum herba.

tiicon. Angli Mantayne, Bobemi Bistracel:

Hungari, Riti sui, h. e. Viarum herbam. Neque aliæ maioris Plantaginis exant appellationes, nisi quod quandoque Rubra cognominatur. Quæque

Minor Plantago *ἑννεννία*, siue Quinqueneruia, & Lanceola, siue Lanceolata: Germanis *Lanceola*

Spieng r weckrich: Gall. *Lanceole*: Belgis *houstribbe*: i. e. Costa canina: Anglis, *Aibre morte*: Hung. *Hozzu* uti sui, appellatur.

Paucis vnaquæque Plantago suum hodie retinet nomen.

Est enim Plantago maior folio glabro.

Plantago Rosea.

Plantago maior panicula sparsa.

Plantago marina magna.

Plantago rosea exotica.

Plantago maior hirsuta & media.

Plantago quinqueneruia cum globulis albis pilosis.

Plantago incana & lanuginosa minor.

Plantago lanceolata foliis lanuginosis, & longis pilis hirsutis.

Plantaginis lanceolata species minima.

Plantago latifolia minor.

Plantago angustifolia maior, caulium summitate foliosa, & alia spicata.

Plantago angustifolia minor, spicâ hirsutâ albâ, foliis ex atro virentibus valdè villosis.

Plantago angustifolia alpina.

Plantago umbilicata.

Plantago Indica, Payco acris.

Plantago maritima à Dodonæo exhibita, quæ depingitur à nobis Coronopi marini nomine.

Plantago aquatica, cuius varias species tradimus lib. 38.

Qualis sit Fistula pastoris, Plantago Italica, Damafonium, Alisma, *weckrich*, Eucharis Roslin pronunciare nondum queo. Barba siluana à recentioribus Medicis inter Plantagines aquaticas reponitur. Nos Sagittam vocamus. Sunt qui Bifolium maius Plantaginem palustre appellent lib. 38. Alii verò qui Plantaginem alpinam quorundam vocent Alisma.

PLANTAGO MAIOR FOLIO GLABRO, non laciniato, ut pharumum.



Digitali crassitudine radix est, lateratim, ut Descriptio Lobel. ait, fibrosa, candida, & in medio præcisâ, siue mutilata, Morsus Diaboli ferme modo: folia rotundiora, sui medio latiora, glabra, septem nervis distincta, humi accumbentia, sapore, ut mihi videtur, aspero: cum aliqua acrimonia & amaritudine: caules pedales, lenti, thyrsus & veluti spicam florum staminumque albi-

albicansium, Lobelio obscure purpureorum & pullorū, proferunt, semum sublongum, obsoleti coloris, Lob. Portulacæ pusillam, fuscū aut ruginēū

Synonyma

Trago, Fulch. Corn. Turn. Matth. Anguill Dodon. gall. & lat. Lon. Camer. hort. Tabern. Schuuenckf. & Castori dicitur *Plantago maior*. Brunfels. & Trago *Plantago rubra*. *Plantago latifolia* Cordo in Diosc. & Gerardo. *Arnoglossa* & *Plantago maior latifol.* Lob. *Plantago vulgō Cē cinerna* Celsalp. *Plantago maior seu rubra*, Thallio. *Platago 1. siue latifol. maxima sinuata*, C. Bauh. phyt. Eidem Pin. *Plantago latifol. 2. siue sinuata*. Schuuenckf. *πικνίδος* Dioscoridis. Ab omni memoria perurgata notione, ex utilitate & feracitate vbiuis gentium penē immensa. Plurima humectis locis, in aruis, hortis, secus rinetā, & sepes. Iunio floret, semen Augusto dat.

Locus

Tempus

Mistā est temperatura, inquit Schuuenckfeldius. Habet enim quiddam aqueum frigidū, quiddam verō & austerum, quod terrenum & siccum. Refrigerat & desiccāt ordine secundo. Olus coctum estur. Dysentericis & celiacis benefacit. Comitiales & asthmaticos iuuat. Cum Lente Aliczue sorbitione stomachū roborat, & hydropticis, qui leucophlegmatia laborant prodest. Vulnera est herba, vlcera & fistulas sanat. Succus aurium doloribus, & lippitudinibus oculorum vtilissimē instillatur. Gingiuis sanguinolentis, & sanguinem reiciētibz potus confert, phthisicis & tabidis salubris. Radix crassiorum est partium, minis refrigerat, siccāt & nonnihil abiegit. Dentium dolores mulcet collutione. Iocinoris obstructions tollit. Renum & vesicæ vlcera sanat. Semen siccioris est facultatis & minis frigida; subtiliumque partium. Aloī fluxus, dysenterias & vteri hæmorrhagiam sistit. Liqueor stillatitius calidas podagras in primo impetu mirificē lenit: Hydroticis vtiliter bibitur.

Vires & Vius.

PLANTAGO ROSEA.

Descriptio



Plusquam pollicari radice perennat: fœua per terram spargens Plantaginis latifolia, pilosa & nervosa: inter quæ caules surgit satis crassos, hirsutos, in quorum fastigio folia crebra, inferioribus dimidio minora, interiore orbata. Alines, admodum parua viscēntia, Rosam deformāt.

Celsalp. vocauit Plantaginē foliato caule, frequentem in Germania. Dod. Plantaginē cum spica Rose instar: Plantaginē roseam spicatam Ger. & Eyst. Plantaginē multiplicem Tabern. Ic. & Hist. Plantaginē roseam Lob. in Adu. Plataginē roseam vulgarem, sine icone & descrip. Clus. Hist. post. Plant. roseam Penz. H. Lugd. p. 1256. Plantaginē 2. siue latifoliā maximā ro- Tom. III.

flore C.B. phyt. Idem Pin. Plantaginē latifoliā siue roseam, floribus quasi in spica dispositis.

Basilicæ Iunio mentē florentem vidi in vase famā Theod. Zvingero. In orto Ill. E. C. rosa viret Augusto.

PLANTAGO MAIOR PANNICVLA

sparsa.

Descriptio



Sola differētia Belgicis agris & hortis, in pannicula spicatum sparsa, onusta innumerā herbarum flocculorum, racematim coherentium, fœura.

Dicitur Lobi Obseru. p. 162. *Plantago rosea pannicula sparsa*: *Sarathrodes* & *Corematophora*, siue *Scoparia* Gemmæ: *Rosea Plantaginis*

varietas. Ic. Plant. p. 305. *Plantago pannicula sparsa*. Dod. gall. *Plantaginis primæ siue maioris species alia*. Lat. in fol. *Plantago maior spica multiplici*. H. Lugd. p. 1256. *Platago rosea* Lob. C.B. phyt. *Platago 4. siue latifol. maior spica multiplici*. Eid. Pin. *Plā. lat. 6. siue spica multipl. sparsa*.

Plantago marina magna.

Spithamæis pediculis nituntur folia, pari cum pediculis longitudine, palmum lata, acuminata, crassa, septem nervis donata, sapore cum Plantagine septemnerua terrestri eodem, nisi admixta esset salsedo quadam: caules cubitales, nudi, thyrsis longis florum insignes, quos semina lequuntur, iam dictæ Plantaginis similia: Hanc situs loci fortē diuersam facit videri à vulgari Plantagine maiore glabra.

Apud mare florentem vidi mense Maio, semenque proferentem Augusto.

PLANTAGO ROSEA, FLORE EXPANSO.

Descriptio



Huius florem addidit Camerarius apud Matthioli. in Hist. germ. & Epit. Plantaginis maiori. In orto vocant Plantaginē roseam. Sic quoque Lobel. in Icon. Plant. p. 304. appellauit, & Eyst. Plantag. roseam exoticam Gerard. Plant. latifoliam 2. siue roseam

Kkk 3

C. Bauh.
en.


flore expanso C. Bauhin. in Pinace. *Apparet* C. Bauhinum loco citato non parum titubare, dum Plantaginem roseam Aduersariorum ad hanc refert: dumque rursus eandem [Plantaginem roseam Penæ, H. Lugd. p. 1256.] ab hac nobiscum separat. Ipsum eadem Icon, eademque verba satis redarguunt.

Eandem cum prædicta, aut certè valdè similem Clusius describit vocatq; Plantaginem 2. siue latifoliam exoticam, Plantaginem peregrinam latifoliam Gareti.

PLANTAGO MAIOR HIRSVTA, MEDIA
à nonnullis cognominata.

Icon. Guarin.

Descriptio



Icon. Lobel.

Synonima



Matt. nos.

Plantago
maior.

Minimi digiti crassitudo est radici fibratæ, rectæ, adstringenti: folia lata, nervuola, vtrinque lanugine tenui, canescunt: caules recti, cubito altiores, teretes, hirsuti, inanes, spicam gestant, muris maioris caudæ quadantenus similem, calyculorum agmine denso compactilem, qui in quaterna foliola subpurpurea explicati stamina concoloria, apicibus autem albis, ostendant.

Brunfels.

tom. 1. rhaps. 1. Lonic. & Camer. Plantago maior. Hist. Lugd. p. 1254. Plant. maior Matth. Fuchs. Geiner. hort. Dod. Schv. & Matthiol h. germ. (vbi figura transpolita, & posita sub titulo maioris.) Plantago media. Thal. Pl. media Dodonæi. Trago Plantag media vel 2. & latifolia: Eid. Hist. germ. Plant. media vel alba, Dioscoridi & Plinio fortè non nota. Cordo in Dioscor. Plantago 3. latifolia familia habens folia multa tamen minora & leuiter hirsuta. Tab. Ic. & Hist. Plantago minor Dioscoridis: Plant 4. Lingua ouina. Lobel. in Adu. & Ger. Plantago

incana. Lobel. in Obs. p. 162. Icon. Plant. p. 324. & Clus. hist. Plantago maior incana. Turn. Plant. minor. C. Bauh. phyt. Plantago 3. siue latifolia 3. siue incana: Eid. pin. Plant. latifolia 3. siue incana: Cynoglossa quorundam, Lugd.

Ἀπὸ δὲ λανθάνοντος, Plantago quinqueneruia, mittel wearrich/weatbreit/weatris (inquit, Schvvenckf.) in hortis & secus vias, vt maior glabra, nascitur, eiusdem facultatis: In Germania abundè frequens. Æstatis tempore, vt cæteræ, conspicua, atque vnà cum spica reperitur: Hyeme quoque, vt aliarum, sola restat radix, haud facillè periens, teste Dodonzo.

Vires & r. sui

Quum Plantagines refrigerent, repellant, adstringant, & glutinent, haud consulerim applicandam commorsis à cane rabido, aut à serpentibus, licet multi Neotericorum ad eos morsus commendent. Morsibus canis [inquit Schvvenckf.] ambustis inflammationibus, calidis podagris, folia conueniunt. Tusa addito salis modico luxuriosos dolores & tumores tollunt.

PLANTAGO QVINQVENERVIA CVM
globulis albis pilosis.

Descriptio.



Numerosa per terram spargit folia, quinqueneruia, hirsuta, coeuntibus pediculis in caput radices, ita vt propter tomentum coitus vix appareat: latitudo iis semuncialis, longitudo sextantalis: caules multi, alij erecti, alij supini, palmares & spirhamæ, capitula gestant, tomento albo villosa, iulos

Salicis imitata.

C. Bauhin. phyt. vocauit Plantaginem 8. siue *Synonyma* Plantagini similem alteram. Pin. Plant. angustifolia 8. siue panniculis Lagopi.

Floret mense Aprili ad ripam lacus Aluenfis, montem Seti, & Balneum Baleructi, vbi obseruauit cum essem Monspelluli.

Tempus

Plantago incana & lanuginosa minor.

Vulgari minor foliis incanis, multaque lanugine obductis, humi stratis, maxima anni parte caule vidua, & floris expers: inter multas tamen plantas, nonnullas animaduertebat Clusius Maio mense ferentes exiguum spicam Plantaginis instar, minorem, plenam florum pallefcientium. eius radix tenuis, longa & nigra erat.

Diosc.

C. Bauhin. phyt. Plantago 6. siue Salmaticensis: Eid. pin. Plantago latifolia 10. siue villosa, seu incana lanuginosa.

In collibus Salmaticæ vicinis, aliis item Castellæ locis aridis obseruabatur à Clusio.

Locum.

PLANTAGO

pula vinum discutere, mentemque restituere author est Scrib. Largus.

PLANTAGO LANCEOLATA.

Descriptio

Plantago quinqueneruia longiuculam & fibrolam radicem demittit: caules Maiores, profundè striatos, subhirsutos: *florem* Maioris æmulum: *folia* verò plurimùm differentia, lanceæ mucronem referentia, longis pediculis appensa, oblonga, stricta, raris crenis leuiter serrata, hirsuta, quinque neruis longitudinem folij percurrentibus, aversa parte conspicuè elatis: sapor subdulce quid mandenti offert, cum adstrictione. *Notandum* græcè, Quinqueneruia latine cognominare solent, eò quòd eius folia, fibris quinque tanquam neruis, distincta sunt:



Officinæ quoniam folium acutius desinit in acumen, & veluti in lanceæ mucronem fastigiatur, Lanceolatam; vulgus autem Lanceolam appellat. Germani flum. oder Eris aur. wacri. h. vocant, quia leu. a. uminatio & longior est: & ad equinæ costæ similitudinem. *Propp*: Galli *Pe- tu* Plantain.

Brunselsij figura Plantaginis minoris tom. 1. rhaps. 1. non placet. Fuchsius pro minore mediam pingit.

Synon. Dod. gall. & lat. Gesn. hort. Schvv. Lon. & Lac. Plantago minor. Cast. Plantago media H. Lugd. p. 155. Plantago minor, longa Matthioli: Item, Plantago minor Dod. Corn. Lob. Adn. Obs. p. 163. Ic. Pl. p. 305. & Gerardo Plantago quinqueneruia. Cordo in Diosc. Plantago angustis oblongisque foliis. Trago, Plantago lanceolata, Plant. 1. vel minor, & Lanceola, Quineruia Manlij, Herlatum, Megebora & Herba Martis Phrysi. Matth. germ. Plantago longa, vulgò lanceolata, Anguill. Plantago altera dicta Lanciuola. Tab. Ic. Plant. Lanceolata: Eid. Hist. Lanceola & Lanceolata, Costa capina. C. Bauh. phyt. Plantago 9. siue angustifolia maior: Eid. pin. Plantago angustifolia 1. siue maior, Lanceola Maior Cæsalp.

Duplex Thali. Plantaginem *Thali.* & *por.* minorem, seu lanceolam, Thalius duplicem facit. Maior, inquit, folia profert bipalmata, sæpe duarum vnciarum latitudine ferè, quæ quandoque in ambitu vel pinnulis quibusdam paruis exornantur, vel omnino sine illis exsunt. Altera minor folia breviora habet & strictiora. C. Bauhinus variare ait, spicis aliquando bifidis: aliquando loco spicarum, capsulis mirè variantibus.

Locus. Passim prouenit locis & vis incultis. Floret initio Æstatis. semen Augusto legitur.

Siccior est & commendatiore dote ad vulneraria potiones, vnguenta & hernias, etiam vulgi experimento. Ebrio datam copiosam in cra-

PLANTAGINIS LANCEOLATÆ species minima.

Radice prædita est parua, ad foliorum exortum valdè villosa: *folia* gramineæ angustie, *Descriptio*:



duum aut triu vnciarum longitudine: caulium palmo longiorum cacumini capitulum breve & veluti glomeratum insidet.

Hanc esse æstimamus, quæ Tabern. in Ic. & Hist. itemque Gerard. Plantaginem angustifoliam minorem inscribit: Cæsalp. Lanceolam minorem: C. B. phyt. Plantaginem 12. siue angustifoliam

minore: Idem pin. Plantaginem angustifoliam 6. Facile crediderim à Lanceolata magnitudine tantum differre, idque ratione loci. Monspeßuli Septembri mense floret.

PLANTAGO LATIFOLIA MINOR.

Plantagini maiori in omnibus similem fecit *Descriptio*: Tabernamontanus, qui cum Gerardo Planta-

ginem latifoliam minorem inscribit. C. B. phyt. Plantagidem 1. siue latifol. minorem, & medix genus minimū Thali: Idem pin. Plantag. latifoliam 12. siue glabram minorem.

Dubium mihi est an Thalius & Tabern. de eadem Plantagine scribant. Tabern. suam refert ad rubram, quam nos latifoliam glabram maiorem vocamus: Thalius verò suam videtur ad eam referre quam mediam Dodonzi vocat, & nos latifoliam hirsutam inscribimus.



C.B. not.

PLANTAGO ANGVSTIFOLIA MAIOR,

caulium summitate foliola: & alia spicata.

Anno 1612. Augusto mente Io Lamandus Delphinus perquirens plantas horti Ill. E.

Kkk

C. Mont. reperit Plantaginem maiorem angustifoliam luxuriantem in dicti horti prato.

Icon Gerardi.

Descriptio



Icon Clusij.



Radix autem lignosa erat & insipida, fibril- que valde tenuibus nixa: folia multa cubitali longitudine, duos pollices quædam lata: costæ vel nervi elatiore quinquæ, ad pediculus apparent rari quidam pili, alioqui ipsa foliata vi- rore prædita sunt, quæ quæ gustantur, sapor nullus notabilis aut insignis sentitur, subsequenteramen post acrimonia: caules plures, non ramosi, angulosi, sesquicubitales, & quæ parte radici adhærebant, purpurascens in summitate veluti spicæ, vnciam circiter longæ, in quibus stans cum apicibus longiusculi: in capitulis albis semina longiuscula, rufa, tunicis parvis involuta.

Gerard. [cuius Iconem proponimus] Plantago quinqueneruia rosæ differt à nostra.

Ita quam descripsimus, in eo quod nostra tot foliola in supremo caule non habeat, & in eo quod ex foliolis prodeant duo cauliculi spicati. Quam ob rem Clusij Plantago exotica nostre similior.

Quam C. Bauhinus in Phyt. Plantaginem 10. siue angustifoliam maiorem in caulem excre- tem vocat, eam in prod. & in Pin. Plantaginem 2 siue quinqueneruiam caulium summitate foliosam eo nominat, ac sic describit: à vulgari in eo differt, quod cauliculi spicam florum sustinentes, in caulem palmarem excre- scunt, in cuius summitate, folia plura, eo modo quo ad radicem disposita: spicis non oblongis, sed rotundis, brevissimis pediculis lanuginosis insidentibus. In Pinace etiam vocat Plantag. angustifoliam tertiam siue proliferam.

Plantago angustifolia minor spica hirsuta alba, foliis ex- atro virentibus valde villosis.

Radix est tenui fibrosa, albicante: folia aliquan-

do vncias quinque longis, strictissimis, acutius- tribus; tribus nervis distinctis, per marginem potissimum venticulis, pilosis: inter quæ cauliculi exurgunt, alij cubitales, alij pedales, alij palma- res, aliquando triunciales, ad exortum aliquando villosi, glabri nonnunquam, quibus spicæ bre- ues, oblongæ & subrotundæ insident.

Hanc descriptionis author, C. Bauhinus, facit in phyt. Plantaginem 11. siue angustifoliam al- tetam, vel minorem angustissimo folio. In prod. Plantaginem 4. siue trinerviā angustif. folio. Pin. Plantaginem angustifoliam 9. siue trinerviā fol. angustif. o. Synon.

Sæpius hanc Plantaginem ad vias, maximè ad Locus rudera author notavit.

PLANTAGO ANGUSTIFOLIA ALPINA



Eradice crass. Descriptio
Huscula, longa, parum fibrata, circa caput crasse- scente, folia ori- untur ad lanceo- lata Plantagi- nis folia acce- dentia, sed mul- to angustiora, & circiter tri- entem vnciæ lata, sesquipal- maria, quin- queneruis, pa- rum hirsuta, nigricantia, so- lidiuscula: cau- les ad radicem hirsuti, foliis longitudine æ-

quales, capita gerunt semuncialis, plantagineis nigriora.

An Geln. hort. Lanceola montana. H. Lugd. Holosteum quorundam. C. Bauh. phyt. Holo- Synon. steum 4. (3. Pin.) siue hirsutum nigricans. Generum in monte Thuri.

Plantago Indica, Payco acris.

Herbe Payco nuncupata, Monardi ex Peru mis- sa, tribuuntur (ex versione Clusij) folia Plan- Descriptio ginis foliis cum formâ, tum colore simillima, sic- cata quidem admodum tenuia, & gustata valde acris, calidæque.

H. Lugd. pag. 1919. meminit in Peru Payconis. C. Bauhin. phyt. vocavit Plantaginem 7. siue Plā- Synon. tagini similem Peruvianam. In pin. Plantagi- nem latifoliam 7. siue Indicam.

Eius pulvis ex vino sumptus, nephriticum do- lorem è flatibus, aut frigida causa provenientem tollit: ipsa verò planta cocta, & emplastri in mo- dum dolenti loco imposita, eundem effectum præbet: quod certissimum esse ipsâ experientiâ didicisse Monardes testatur.

PLANTAGO VMBILICATA.

Radix ei Plantaginis vulgaris simillima, spi- cam longam, creberrimè fibratam: è cuius nodulo

Descriptio

nodulo siue basi, digitalis crassitudinis, plantagineum, latum, vnicum, admirabili naturæ opificio, expansum solum, paulatim propagando in latum gyrum umbilicatum excrefcens, & Coelidis instar per circuitum ascendens, in spiras duas tantum, aut semiternas conuolutum, ac veluti ex pluribus coniunctis in vnum contiguisque Plantaginis maioris foliis constatum, spithameæ, altitudinis aut pedalis ferè, cuius summum folium Platanis latifoliae seruat figuram, sinuosam tamen & rugosiorè, sapor illi prorsus plantagineus. E medio conuolutio siue umbilicatio, imò centro, foliorum quædam rudimenta conspiciuntur, è quibus caulem erumpere verisimile: De cæteris Lobelio qualiscunque descriptionis auctori



nondum constabat: In Aduers. autem umbilicatum montanum Herbariorum vocat. C. Bauh. dicitur in Pin. Plantago latifolia 8. siue peregrina sinuosa.

Monspelio Londinum semine missio Lobelio à D. Casparo Pelliterio, in horto I. Nafmyth. Chirurgi & Archibotani miræ & raræ elegantiz hæc orta planta.

PLANTAGINI ANGVSTIFOLIE similis Habbures.

Descriptio

Planta, quam Frater pro Habbures Camerarij misit, magnâ habet cum Holostio Monspeliensium similitudinem: folia sunt vncias tres circiter longa, angusta, in acumen desinentia, nervosa, hirsuta, sapore nullo insigni: caules aliquot eiusdem longitudinis cum foliis, rotundi, capitula plantaginea, longitudinis vnguis, latiuscula.

C. Bauhin. in phyt. vocat Holostium, siue hirsutum albicans alterum, addens D. Camerarium ab Alpino nomine Gotne albi cathartici accepisse. In Pin. Holostium, siue Creticum alterum, Leontopodium Creticum aliud Clusij hist. Dubitat an sit Plantagini similis planta H. Lugdunensis. Ex Oriente secum detulit D. Bern. Paludanus.

PLANTAGINI AFFINIS BIBINELLA Siciliæ herbula.

Thryallis Theophrasti & Plinij, Bibinella Theodori, auctore Cæsalpino, herbula est ex Siciliâ habita, minor Lanceolâ ac viridior: folium medio quodam modo se habet, inter Lanceolam & Plantaginem: paruis circumquaque apicibus, vt Coronopo, frequentioribus: còtinetes fert palmares, plenos semine, vt Plantago:

Herba allumitur inter olera.

Cæsp. Bauhin. pin. Coronopus 3. siue maritima maior, Plantago marina Dodon. gall. Lobel. in Adu. Obl. p. 163. lc. Plant. p. 376. Tabern. & Gerardi. Plantago maritima Gein. hort. & H. Lugdun. p. 139. Plantago angustifolia Dod. & Coronopus marinus Camerarij.

Synonima

PLANTAGINI SIMILE ANTIPHARMACUM, siue Contrayerua.

Monardes de Ind. Occid. parte 1. in epist. Petri Olmæ. meminit perniciosi cuiusdam toxici, quo in bello & venationibus incolæ vtantur, cui aduersari dicitur planta foliis latiss, Plantagini Hispanicæ haud absimilibus, si teratur & vulneribus imponatur. Sic enim venenum extinguere, & à Symptomatibus illis, quæ toxicum generare solet, liberare aiunt. Pro magno thesauro existimant Hispani, eam plantam se inuenisse: nascitur eadem regione, vbi Toxicum. Locus

Eandem esse cum iam dicta credimus, quam idem Monardes libro simpl. medicamentorum ex nouo Orbe delatorum, cap. 17. sequentibus delineauit.

Ex Charcis prouincia Peruaris radices quædam venenis aduersantes aduehantur, Iris radicibus valde similes, sed minores, & ficulnei folij odore. Hispani Indias inhabitantes Contrayerua appellant, quasi dicas Alexipharmacum, quoniam earum puluis ex albo vino sumptus, aduersus omne venenum; cuiuscunque tandem sit generis, præsentissimum est remedium (vno sublimato excepto, quod solâ lactis potione extinguitur,) vomitione illud reicere faciens, aut sudores evacuans. Sed & amatoria pocula, eo puluere hausto, educi ferunt. Ventris etiam animalia pellit. Gustata radix, aromaticum quiddam sapit cum acrimonia coniunctum: quare calida videtur secundo gradu.

Huc quoque referenda herba quædam (vt Gomara hist. gen. cap. 74. perhibet) Indis nota, cuius radices succus alexipharmacum est pestilenti & pernicioso toxico, quo ipsi sagittas illinunt.

C. Bauh. pin. dicitur Plantago latifolia 11. siue Plantagini Hispanicæ similis.

HOLOSTIVM VETERVM. CAP. II.

Holostium (ἀόστιον ita editio Parisiens. alij tamen ἀόστειον, quasi totum esui aptum, teste Cæsalp.) Dioscoridi parua est herba, tribus aut quatuor digitis eminens supra terram, foliis & viticulis Coronopo aut Gramini proximis, gustu adstringentibus: radice prætenui, usque in capillamenti speciem (pili instar alius. Cæterum, error hic notatur in Dioscoride, capillamenti similitudinem tribuenti radici cum potius herbe conueniat, Cæsalp.) alba (vulgares codices habent ἀόστειον ἄσπερον, i. e. albam, fibrosam. H. Lugd.) Nascitur in editioris terre locis. Potest & ipsa si simul coquatur, carnes cogere & congelare. Bibitur & ad rupta cum vino.

Plinius non Holostium, sed Holosteon vocat, quasi totum osseum, ex aduerso tamen appellatam à Græcis herbam, quia sine duritia, sicut fel dulce (forte Holostium ob duritiem fœtibus dictum est, non vt Plinius statuit) tenuis usque in capillamenti speciem, longitudine quatuor di-

gitorum seu Gramen. foliis angustis, adstringens gustu. nascitur in collibus terrenis. Vfus eius ad conuulsa (vulsa Corn.) rupta, in vino pota. Vulneta quoque conglutinat. Nam & carnes coquuntur (quum coquuntur, Corn.) addita.

Galenus siccantem cum adstringente vim Holosteo attribuit: vnde ad rupra commodè bibatur.

Ceterum Holosteon Cornarius Graminis speciem esse arbitratur mollioris sc. illius, quale in editioribus locis nasci tradit. Ac Holostij nomine sequentes apud Authores donantur plantae: Dens canis primus, seu Plinij Phalaris. Gramen Luzulae. Holostium lunci foliis Matthiol. Myosuros quorundam. Filix saxatilis. Holostium Plantagini simile. Plant. angustifolia. Serpentina. Gramen Fuchsj dictum, eique affine gramen. Tunica minima. Pilosella maior Fuchsj. Pilosella minor eiusdem. Herniaria. Tragos Diosc.

HOLOSTIVM PLANTAGINI SIMILE.

Descriptio



Holostium Monspessulanum.



maius Clusij: itémque in Icon. Plant. pag. 307. Ab Hist. Lugd. pag. 189. & Camer. hort. Holost. Salm. Clusij. A Gerar. Holost. Salmanticense

Holostij Montpeliani radix longa, crassa, nigricans, lignosa, plurium capitum: folia pectatam sparsa, tota albida, hirsuta, & tomentosa, palmata quaedam, quaedam multo minora, non tamen semunciam lata, quinque, nervis per longum distincta, gustu adstringenter exsiccata conuoluntur & in acumen desinunt: caules spithamei, aut breuiiores: reperiuntur etiam cubitales, similiter hirsuti, chrysium gerunt longum, aliquot vaciarum, interdum unius, Plantagini & Cornu ceruino floribus & seminibus similes.

Idem est cum Holostio Salmanticensi Clusij, quod ei duplex. Vocatur autem à Lobel. in Obs. p. 166. Holost. Salm.

Clusij: Tabern. Holost. maius: Camer. apud Matthiol. in Hist. ger. & Epit. Holostium & Holostium quorundam: C. Bauhin. phyt. & pin. Holostium i. siue hirsutum albicans maius, & Plantago angustifolia albida Dodonaei. Holostium Salmanticense alterum Clusij, vocat Holostium paruum Monspeliense. Ego diuersae sint species, Holostium maius & minus Clusij, asserere non aulam.

Monspeli observatur florens Aprili & Maio: itémque Autumno in aridis Oliuetis & non procul ab arvis, viâque Boutoneti proximâ frequens. In hortis floret primo anno, sed raro semen maturae. Frigoris impatiens est.

CORONOPVS VETERIBVS.

CAP. III.

Dioscoridis Coronopus (κορωνόπος) oblonga herbula est, humi strata, folia habens incisuris diuisa (hirsuta, cap. de Psyllio. Plura vide cap. de Holostio,) atque haec quidem oleris quoque modo cocta estur. Radicem potèd habet tenuem adstringentem, quae cœliacis in cibo præclare facit. Ceterum, provenit locis incultis, in aggeribus, & secus vias.

Meminit huius Plinius lib. 14. cap. 16. Aculeatarum [hanc vocem Plinius refert ad Cæsalpinum ad præcedentes plantas, de quibus Plinius iam dicto capite prius locutus sit:] caules aliquorum, inquit, per terram serpunt, ut eius quam Coronopus vocant. Et rursus lib. 12. cap. 19. Coronopus oblonga herba est cum fissuris. Seritur interm, quoniam radix cœliacis præclare facit in cinere tosta.

Et hunc usum eius medicum etiam Galenus & Aëtius habet. Sed in Paulo καλὴν ἀφ' ἧς λέγεται, pro καλὴν. Nec librarij est hic error, ex vocatione affinitate decepti, sed ipsius authoris Pauli: qui quum alaudam colicis opitulanti antea scripsisset, mox subiunxit, κορωνόπος δὲ πρὸς τὴν πρὸς τὴν καλὴν ἀφ' ἧς λέγεται.

Theophrastus lib. 7. cap. 9. inter ἀνθηροδύλλα, quae folia à radice ad terram habent, κορωνόπος recenset. Alibi inter aculeatas & spontè nascentes herbas. Itémque lib. 2. caus. cap. 7. inter amaras. Apud Theophrastum Gaza Silaginem & Selaginem vertit.

Inter reiectanea suo notha aliis dicitur Ammonos (ἀμμόνος) aliis Astrion (ἀστρίων) Aphris Atirsipite (ἀτρίσιπτε) Romanis Caciatrice (κακιάτριν): Jaliis Stilagine (σίλαγι) aliis Sanguinaria, γαστρίαια.

Coronopus autem cornicis pedem significat, & refert quoque, foliis ita fissis & dispositis, ut cornicis pedem repræsentent. Nec ignota herba est, inquit Cornarius, & nostri nomine græcam vocem exprimente appellant.

Potèd Manardus his ad stipulandum esse iudicavit, qui volunt Coronopum Dioscoridis eam esse herbam, quae vulgò dicitur Herba stella. Nos Coronopum siue Cornu ceruinum vulgò, Spicâ Plantaginis vocamus. Refert Cæsalpinus & alteram Herbam stellam, quam nos Coronopum serpentinam, alij verò siluestrem, cognominant. Est præterea Coronopus Massiliensis Lobelij, serpentinae fortè varietas. Coronopus serpentina omnium minima. Coronopus maritima Rainaudeti. Coronopus maritima nostras. Coronopus Ruellij, siue repens: Eodem nomine etiam

etiam insigniuntur: *Plantago marina*. Casuar-
ce quorundam. *Ranunculus*. *Caltha aquatica*.
Gramen dictum Dens canis; *Capriola*, *San-*
guinaria. *Galiopsis maior*. *Astracalis*. *Carduus*
stellatus. *Cedrus lycia*.

CORONOPVS SIVE CORNV
cerdinum vulgò. (sp. à Plantaginis.
CAP. IV.

Descriptio

VT plurimum tenuis est radix, adultior ta-
men digitali crassitudine reperitur, alba:



vix villo ex-
cellenti sapo-
re, excepta ad-
strictione: fo-
lia statim à ra-
di. e, crebra,
longa, angu-
sta, hirsuta,
nervosa, in la-
cinias aliquot
laterales, seu
ceruini cornu
ramos, unde
nomen, diui-
sa, sapore non
nihil adstrin-
gente: inter
hec caules sur-
riguntur Plā-
taginis, rigi-
duli, tenues,
teretes, hirs-
uti, dod. anta-

les & cubitales, inrsum plantagineum susti-
nentes, flores & semen Plantaginis profesen-
tem.

Qui spontè provenit, folia per terram spar-
git numerosa, in orbem, Coronopi vulgaris mo-
do diuisuris, & lacinijs crebrioribus, longiori-
bus, rigidis pilis hirsuta, eoque nomine ferè inca-
na: in viniblico ad foliorum veluti radiorum in
centro concursum multa lanugo mollis candi-
da: caules complures palmares & dodrantales,
rigidi, asperi, hirti, spicam gerunt Coronopi vul-
garis spicz similem: radix singularis, fibrata,
crassiuscula, mediocriter longa, lignosa matrice
facta.

Tabern. Icon. Coronopus, Pes cornicis &
Stella maris. Gesn. hort. Coron. vetus, Herba
Stella Italorum. Anguill. Coronop. in multis I-
taliz locis vocatus Herba Stella. Lob. in Adu.
Coronopus (sic etiam in Obs. p. 139. in Ic. Plant.
p. 417.) Cornu ceruinum. Cordo in Diosc. Coro-
nop vera: Eid. in Hist. Coronop. satina.

Fuchsius Coronopum vocat, ac inter alia hæc
addit: *Korvotour*, *h' d'ceur* Græcia, Pes cornicis &
Sanguinaria Latinis dicitur. Officinis inco-
gnita herba: Germanis commodè *Kraen*: aut
Rappensues: Gallis *Capriole*, ou *Sanguinai-*
re, ou *Dent au chien* appellari potest. Coronopus
autem non alia ratione dici cœpit, quàm quod
cornicis pedem effigie representet. Sanguina-
ria verò, Sanguinalisue vocata est, quod sangui-
ni sistendo apta sit herba. Sunt qui Herbam stel-
læ nominant, alludentes haud dubiè ad græcam
appellationem Astrion. Nonnulli quod so-
lum eius multipartitò confectum, in ceruini
cornu imaginem effigietur, Ceruinum cornu

Tom. III.

vocarunt. Ex Dioscoridis descriptione, etsi con-
cisa admodum, satis liquet, herbam hanc esse
Coronopum &c. In editione autem eius gallica
Lugdunensi annotatum legimus nomina *Ca-*
priole, *Sanguinaire*, ou *Dent au chien* ad hanc her-
bam non pertinere.

Dodonæus (qui in hist. gall. ob dissimilitudi-
nem veterum Coronopi, Pseudocoronopon vo-
cat, gall. *corne de cerf*, & quibusdam in locis, *her-
be de la comesse*) Fuchsius cōtrariatur his verbis:
Herba stella, siue Cornu ceruinum ad Plantagi-
nes accedit, nasciturque locis incultis, aridis, a-
renosis, secus vias: In Italia, Germania utraque,
Gallia, cum & alibi frequens reperitur quando-
que in hortis, ubi amplius luxuriat. Spicz eius
eodem, quo Plantaginis, tempore conspicua.
Herbam stellam non pauci nominant: sunt &
qui Stellariam nuncupent; stellaria tamen &
Alohyrilla à recentioribus dicitur: est & Aster
Atticus stellaria. Dicitur verò à Bel. *Herrsch-
ren*, & alicubi *Graunne* & *Graunne cruyt*, i. e.
Comitisse herba: Hisp. *Guabelha*: Germ. *Cra-*
ysus, quod illi nomen à Leonhardo Fuchsi-
putatur inditum, quod Coronopum Dioscori-
dis esse iudicauerit, veluti & nonnulli post eum
alii. *Korvotour* siquidem Cornicis pedem, i. e.
Crayesus sonat; non tamen hæc Dioscoridis
propter est. Neque enim oblonga herbula est, nec
villo modo repit, viticulis cauliculis destituta,
quibus serpat: folia tantummodò per terram
sternuntur. Coronopus autem herba exigua, o-
blonga & serpens, uti Dioscorides & Plinius te-
stantur. Atque hanc ob causam Herba stella ne-
quaquàm pro Coronopo haberi poterit. Sunt ta-
men inter reiectaneas Coronopi appellationes,
quæ non perperam Herbz stellæ conueniunt, ut
sunt *arenaria*, siue Arenaria, quod arenosa amēt
loca: *stella*, quod stellæ siue atri modo per ter-
ram spargatur: & Sanguinaria, quod arenosa ad-
uersus sanguinis qualidam profusiones perutilis
habeatur. Sed nomina hæc pluribus stirpibus
communia, qualia, præsertim inter nothas voces
Dioscoridi ascriptas, haud rarum est reperiri,
magni minimè sunt facienda.

Marardus tamen ijs ad stipulandum iudicauit,
qui volunt Coronopum Dioscoridis esse hanc
herbam, quæ vulgò Herba stella dicitur. Quin
& Matthioli huius opinionis sectatores non
solum, nihil falli existimant, sed et adductus
sunt, ut crediderit Coronopum tam Theophra-
sto, quàm Dioscoridi idem esse; vocarique Ita-
licè *Coronope*, quod tamen in comm. Ital. non
ait. Existimat præterea Coronopum speciem ef-
se Plantaginis. Non placet autem nomen galli-
cum *Capriole*, quod in Epitome cum Camera-
rij additionibus adeptum, & repositum, *Corne*
de serf ou *Sanguinaire*, quod ipsum postremum
non ptobo.

Camer. hort. vocat Coronopum sativum, in
acerarijs vtilem, *hirschenborn Salatt*. Turn. Co-
ronopum aut Coronopodium, Angl. *Crowe*
foote Plantayne, & Silaginem Gazz.

C. Bauh. phyt. & pin. Coronopum i. siue hor-
tensem, Coronopum Tragi, Anguill. Lac. Lon.
Tabern. & Eyfettensis, sativum Cæsalpini, Cor-
nu ceruinum Gerardi. Item phyt. Coronopum
i. siue sylvestrem, hirsutiorem, Coronopum syl-
la. Coronopum sylu. Cæsalpini, Coronopum Pro-
chytæ, Columnæ.

Castor huius Coronopi duas habet figuras
quarum una malè posita est pro Coronopo syl-

LII

Locus &
Tempus

uestri, ut ipsemet Castor in fine libri annotauit.

Coronopum spontaneum Montpelij tantum obseruari, ubi passim prouenit. Lugduni in hortis feritur, florētq; Maio. Gener Cherlerus circa Gramontium maritimi tractus collegit. Copiose nascitur circa Shene iuxta semitas & in aggeribus maritimis. Meus Dioscor. Græcus (inquit Turn.) habet *Saluaria*. Ruellius videtur legisse *χρυσάνθου*, quod magis placet: nunquam enim circa domos, sed in aggeribus, quos Græci vocant *χρυσάνθου*, frequentissime vidi. Seritur in hortis, & sponte nascitur in incultis & secus vias, teste Cæalpino. Quæ autem feritur, angustiore folio constat, mollior, & rarioribus appendicibus gravior: sylvestris hirsutior, folijs profundius lacinia. Eruca similitudine.

Vires &
vires

Quia folia sapore dulci & adstringente, ideo cruda in cibis recipiuntur. Modus autem apparandi, & post leuem coctionem in acetaria indendi, durat etiamnum in Gallia & quibusdam Angliæ locis. Prodest nephriticis in oleo, aut cibo sumpta: non tamen calculum attenuans aut expellens, sed reus debiliores roborans, caloremque eorum contemperans: sanguinis vero ex his eruptiones cohibet etiam ac sistit. Cæterum, herba manifeste adstringens, frigida & sicca, Plantagini facultate accedit.

CORONOPVS SERPENTINA.

Descriptio



Icones

Quæ à nobis pingitur desumpta est ex planta Cherleriana. Variè autem videtur herba ludere, eiusque lusus exhibitor nostræ ac Lobelij tabellæ, itémque Matthiolinæ.

Synonyma

Lobelio in Adu. pag. 17. Serpentina vernaculè vocata. Matthiolo Holostium putata, p. 186. Serpentaria Matthioli, Holostij species, p. 187. Serpentina, nō Coronopus, sed potius Holostium. Est enim folijs gramineis aut Veronicæ silvestris humi procumbentibus: radix lignosa Veronicæ Garyophyllæ, semine & spica Holostij Monspellaci. aut Coronopi vulgaris: prouenit in montibus Galloprovinciæ, Aruerniæ & passim in Italia. Hinc altera, tota similis, nisi habitioribus folijs, hosculis, cauliculis incanis & hirsutis forer: Apenninis montibus & in Delphicis repertu facilis. Hæc ille qui mihi videtur obcurior. Cur ad Holostium refert plantam p.

Lob. 18.
prob.

187. quam pag. 17. cum Holostio non conueniēte dixit. Cur etiam Serpentinam, ei plantæ, quam Coronopum vocat, demptis lacinijs, simillimam facit, posteaque longè disparem ait?

Matthiol. in prioribus comm. Serpentinam *Serpentina* depingit, sed nō describit, in Epit. vero cum addit. Camerarij Coronopum silvestrem, & *Herba stella saluatica*, Italicè nominauit. Dodonæus in fol. lat. figuram habet nomine Serpentine Matthioli, describitque prò Herba stella altera.

Gerardo Coronop. silvestris: Gesn. hort. Lob. Synon. 1. in Obs. p. 240. Coronop. silu. Serpentina Tab. Coronop. silu. siue Serpentina H. Lugd. pag. 669. Coronop. silu. siue Serpentina Matthioli Lob. in l. p. 439. Coronop. in montibus nascens inter saxa: & altera in edificijs, simplicior, Cæalpino. C. Bauhin. phyt. & pin. Holostium 6. siue strictissimo folio maius.

Figuram satius Coronopi Castor malè posuit *Castor*. pro Coronopō silvestri, Herba stella syluatica, & Serpentina, quod ipsemet in fine Herbarij annotauit.

Matthiolo teste Serpentina prouenit in Gortienfi agro diluto extenuatq; solo, non longè à Sontij fluminis ripis, & alijs etiam in agris. Geneuæ habui in horto delatam ex propinquis montibus; florentem Maio & Iunio. Frequens in Etruriæ *Montueto*.

Locus &
Tempus

Matthiolus Coronopō suo eximiam tribuit *Vires & vites* vim contra ictus & morsus venenatos serpentum: dantur autem eius puluerati drachmæ 2. ex vino albo: hoc remedij genere multi euaserunt subito, ab eiusmodi virulentis animalibus vulnerati, quemadmodum ego ipse certè obseruau. Eiusdem radix in vino albo decocta, hydropicis vtiliter propinatur, diebus aliquot continuis manè, & sudoribus postea vacandum: Semen ex vino austero aut aqua Portulacæ haustum, omnem alui fluxum sistit ac hæmorrhoidum: consuevit etiam herba in vino rubro aut aceto coqui, & ius calidum in ore teneri, contra immodicos dentium cruciatus.

CORONOPVS MASSILIENSIS LOBELII
Serpentinæ fortè varietas.

Densissimo *Descriptio.*
spatijs;
foliorum stipata
luxuriat, Sedi
minimi saxi
montani, vel
Pinastri ritu,
positu, & rigi-
ditate, innume-
ra etiam sobole
cauliculorum,
dodrantalium,
semē pusillum,
Plantaginis
aut Serpentine
vulgaris, spicis
includentium:
Radix longius-
cula, lignosa,
crassior, gustu
nonnihil cali-
da, aromatica.



Coronopi & Sedi montani mediam plantam Massiliensem [ut vocat Lob. in Adu. p. 187. Obs. Belg. p. 525. l. c. Plant. p. 438.] nouam antiquis & acoteris

scoticis indicium, visum fuit subdere, cum propter nonnullam inter se similitudinem, tum propter eisdem natales maritimos. *Mibi sane videtur iconem ex Lobelio hic appositam esse lulum Coronopi Serpentinae, & non respondere descriptioni Lobelij, quae videtur continere nostrum Coronopo maritimo.*

Tabern. Coronopus Massilioticus, *Massilischer krabensuess.* C. Bauh. phyt. & pin. Holosteum 8. sine Massiliense. Coronopus Massiliensium Hist. Lugd. Coronopus siue Serpentina minor Gerardo.

Collibus & caucibus Massiliae vicinis ad maris alluiones, inter Tragacanthum passim luxuriat.

CORONOPVS SERPENTARIA

omnium minima.

Descriptio.



Coronop⁹, cuius figuram hic damus, factam ad plantam siccam, à nobis. Iunio mense Burmij Rhætorum collectam, radice est crassa: caulis verò & floribus Coronopi serpentinae: sed foliis latioribus. Representatur sane figura Lobelij, in qua tamen non placet foliola cauliculis appicta quæ in nulla harum plantarum vidimus.

Serpentinam omnium minimam [ut vocat Lobel. in Obs. p. 240. in Ic. Plant. p. 439. nullatenus à superioribus distat ait, præterquam exilitate; coliculis enim vix vnciam æquare & sesquinciā.

Tabern. dicitur Coronopus minor, Serpentina minor, *Kleiner kraensuss.* *klein schlanger-Grass.*

C. Bauh. phyt. & pin. Holosteum 7. siue strictissimo folio. Serpentina omnium minima Lobelij. Dodonzi & Lugd. Coronopus siue Serpentina minima Gerardi. Coronopus altera in ædificijs Cæsalpini. Quod verò Lugdunensis cen'eat, inquit, nullatenus à Coronopo Serpentina distat præterquam exilitate, dubito: quod verò opinetur eam esse, quam Monspelienfes Holostium sint suspicari, omnino fallitur, cum tres distinctas plantas habeam, *Hæc frater* in phyt. Dubitamus nos an tres plantæ, quas figuris exhibet Lobelius, ab invicem sint distinguendæ, vel non potius varietates. Quæ de exilitate dicit Lugd. desumpta sunt ex Lobelio, nec ideo culpandus. An Cæsalphus eandem tradat cum Lobeliana, dubito: dicit enim lanuginosam, Lobelius verò hirsutam.

In cellis montium lugis sterilibus Sequenæ in Gallia Narbonensi copiosè provenit.

Tom. III.

CORONOPVS MARITIMVS

Rainaudeti.



Coronopi Descriptioni
maritimi nomine misit ex Prouincia Arix ad nos Rainaudetus Pharmacopœus plantam, cui radix sesquipalmaris, crassa, fusca, sicca, insipida: è qua innumere oriuntur radiorum foliorum stellæ, tali verò ferè dispositione, quam in Phyllo Dalechampi videmus,

vel Erica Marthioli. confectorum, repandorum, semunciam breuiorum, angustiorum, quam Serpentinae Marthioli: radiorum vmbilicis totus villosus, Lupini latitudine, è quo coliculus exit vncialis, nudus, hirsutus, thyristo ferè totus oblect⁹.

Coronopus à nobis nunc descriptus optimè conuenit cum descriptione plantæ, quam Lobelius in Adu. pro Coronopi & Sedi montani media planta Massiliensiam proposuit.

CORONOPVS MARITIMA NOSTRAS.



Radis brevis, nigricans, crassa, fibris aliquot donata: folia quàm in Coronopode vulgari strictiora sunt, longeque crassiora & succulentiora, interdum penè iunceæ, quadrantalæ, ac etiam palmariæ, sapore salso: flos purpureus, spicatus, vulgati, ut semen.

Cam. hort. Coronopus marinus: Lo-

bel. in Adu. Plantago marina: Dod. gall. Tabern. & Ger. Plantago maritima. Gesn. hort. & app. itemque H. Lugd. Plantago maritima. C. Bauh. phyt. Plantago 13. siue angustifolia maritima. Eid. pin. Coronopus 3. siue maritima maior: Babinella Cæsalp.

Monspelij iuxta mare mense Augusto floret; inde verò delata Monsbelgardum, floruit Iunio & Iulio semen maturuit Augusto. Terrâ grudet salia, aggeribus & littoribus salis Zelandiæ & Bergis ad Zoom copiosa.

LII 2

MYOSVROS.

CAP. V.

Descriptio

Fibras numerosas pro radicibus habet, unde folia germinant multa graminea, trium quatuorve unciorum, angusta admodum: *coliculi* vix altitudine folia excedunt, enodes, teretes, nudi, *flores* in exumine gestantes, musculos, herbacei coloris, paulatim seie explicantes, succedente clauda duarum triumve unciarum, tereti, mucronata, granulis multis compacti, caudam murinam affabre mentiente.

Synonima



C. Bauhin. in phyt. & pin. Holostium 9. sine Holosteo affinis, Cauda muris: Coronopus silvestris Tragi: Myosuros Dod. gall. [qui holostium negat. & Denticulam canis Ruellij] Myosuros, cauda muris. Lobel. adu. & l. Pl. p. 440. Myosuros cauda murina Tab.

Myosuros quorundam Thalia. Cauda muris Dod. lat. Lob. Obs. pag. 241. Camer. & Gerardo. Holostium Botan. Francofurt. Holostium Dioscoridis, Denticula canis Ruellij, & Gramen molle Lonicero Holostium Loniceri H. Lugd. p. 189. Eid. p. 1328 Cauda muris.

Nomina, linguar.

Perappositum autem à recentioribus *μυρὸς οὐρα* ἢ *μυρὸς οὐρῆς* vocatur herba: Latine Cauda muris, vel murina: german. *Mantzschwanz* in, *tausentkorn*, & *Alouffra* Belg. *Musensteecken*, Gall. *Queue de souris* Anglis *Blad strange*.

Locus.

Pinguibus agris & pratis gaudet. Aprili mense florescit: Maio semen maturum est.

Vires.

Refrigerat, nec multum à Plantagine viribus differt. Gultu Plantaginis esse scribit Pena, Lobelius legit gultu Hydropiperis.

CYNOPS, CONOPS, CVLIX HERBA

CAP. VI.

Theop.

Oculus canis.
Canaria.
Conops.
Culex.

Cynops apud Theophrastum lib. 7. hist. c. 8. numeratur cum spicatis: germinat post æquinoctium primis in hiemis. Theodorus modò Oculum canis vertit, modò Canariam. Hermolus legendum esse suspicatur Conopa, & non Cynopa, ut intelligatur herba Culex appellata: nam Græcè Conops culicem significat, de qua herba reperitur apud rei rusticæ scriptores [Plinium lib. 19. cap. 5. C. Manum lib. 12. cap. 19. Hermolaum lib. 2. Coroll. 366. Orthonem Brunfels in O. nomast. med. Constantinum Lex. græco. Gesu. in cat. pl. Idem lib. 1. Quadr. de cane agens per integrum ferè solum tractat de Conopo Theophr. eumque Psyllion esse probat, plurimis adductis rationibus, contra secus sentientes:] Cucumeres

nasci sine semine, si farinâ eius herbæ macerentur semina.

Apud Plinium quoque lib. 21. c. 15. & 17. inter Cynops easdem spicatas Cynops mentio reperitur, Cynopis licis verò herbæ lib. 19. cap. 5.

Cæsalpinus Culicem herbam censet Conizam, Culex derivato nomine à Conope, quoniam culices abigit, ut Dioscorides testatus sit.

PSYLLIUM VETERIBVS.

CAP. VII.

Psyllium [ver. add. ἡ κυνοκεφάλιος] Dioscoridi folio est Coronopidis, hirsuto, at longiore [μακροτέρου: addendum hoc annotavit Goupylus ex utroque antiquo, quod in vulgato exempli desiderabatur:] ramulis dodrantalibus, totaque herbula Fœni modo tenuis ac minutula. Coma verò ipsius à medio caule ducit initium, capitulis duobus tribusve [aut pluribus, addit ver.] conglobatis: in quibus semen pulicibus simile, nigrum atque durum. Nascitur in arvis & incolitis. Vis est refrigerans: articulorum morbis, prout idibus, tuberculis, œdematis, luxatibus, & capitis dolore cum rosaceo, aut aceto aquave impostum auxiliatur. Infantium quoque enterocolis ac eminenti umbilico illitum ex aceto medetur. Acerabuli verò mensuram tritam in duabus aquæ heminis macerari oportet, ac ubi sese aqua densaverit, lentoremve contraxerit, illini. Siquidem vehementer refrigerat: sed & in feruentem aquam immissa calorem reprimi: denique & contra erysipelata est efficax. Fama est, si virens herba domum importetur, pulices arceri. Tusa porro cum adipe, sordida malignaque vlcera repurgat. Succum fluxione infestatis ac verruculosis auribus & nelle prodest: Idem de lethaliibus autor est porum totius corporis frigiditatem inducere, & torporem cum exolutione & mœrore: contra hoc auxiliari omnia, quæ contra porum Coriandrum.

Psyllij semen maxime in usu est, inquit Galenus, ex secundo ordine existens frigidorum. Verum in siccando & humectando medium quoddammodò est & moderatum.

Phyllion [referente Plinio lib. 25. cap. 11.] alij Cynoides, alij Cystallium, alij Sicelion, alij Cynomion appellant, radice tenui, supervacua, samentosum, Fabæ granis in cacuminibus, folijs canino capiti non dissimilibus, semine autem pulici, unde & nomen: hoc in hæcitis ipsa herba in vineis invenitur. Ei vis ad refrigerandum & discutendum [ita ἀπορροιστικὴ δύναμις reddidisse videtur, id est vim repellendi: alioqui enim διαφροιστικὴ, est vis discutendi: & hæc per calida sit, & la per frigida] ingens: semen in usu. Fronti imponitur in dolore & temporibus, ex aceto & rosaceo, aut posca. Ad cætera illinitur acerabuli mensura, sextario aquæ densat ac contrahit. Tunc terere ac crassitudinem illius oportet cuicunque dolori, & collectioni, inflammationique, tensesmo in aqua cum radicibus medetur. Omnibus articulorum morbis salutare est huius semen madefactum in aqua, admixtis in hemina seminis duobus resinæ colophonix cochlearibus, thuris vno.

Psyllium inter nothas Dioscoridis appellationes ab aliquibus Cataphysis [καταψύς] ab alijs Cynoccephaliis [κυνοκεφάλιος, quasi canini capiti:] alijs Chrystallii [χρυσάλλιος], alijs Cynomiyis [κυνόμυια, quasi Canina musca:] alijs Psylleris [ψύλλης] alijs Sicelioticon [σικελιώτικον, quasi Sicula

[a herba] nuncupatur. A Siculis Conidiis] *herba* *Syr:*] Romanis Silbadium [*silbadiu*] seu Herba pulicaria, Aphris Vargugum appellatur. Crystallij porro nomenclatura à viribus notisque eius facta est: quâ indicarunt, qui eâ vti sunt, crassescendi densandique vim, quam ea habet: Crystallum enim glaciem Græci vocant, quæ in lapidis duritiem concreta densatâque frigore aqua est. Illi simile aliquid Pulicaris huius herbæ liquor habet, ut ex Dioscoride & Plinio patet.

PSYLLIVM MAIVS ERECTVM.

Descriptio.

Multis fruticat ramis, hirsutis, teretibus, variè diuaticatis, per quos *folia* incondita, graminea, tomentosa, summus *caulis* tamoridumque extrema crebros producit pediculos, umbellam quodammodo mentientes, quorum singulis capitulum insidet imbricatum, Plantaginis, crassius, breuius, squamis maioribus, floribus similibus: *semen* lubricum, lucidum, nigrum, pulicis effigie, mansu aut maceratione mucilaginem abundè reddens: *radix* exigua, fibrosa. Est exilius & habitius.

Synon.

Psyllium Græcis, *Psyllium* Latinis, ut Trago, Matth. Fuch. Turn. Corda in Diosc. & Hist. ubi annuam hanc speciem describit. Ej autem ut existimo, incuriâ typographi addita figura Contræ: quamobrem quicquid scribat Lobelius, particulare *Psyllium* non habet hoc loco Cordus.] Dodon. Gesn. hort. Lob. in Adn. Obs. p. 239. Cast. & Gerardo. *Psyllium minus* Cæsalp. secundum Anguill. primum Tab. *Psyllium alterum* C. Bauh. phyt. Eid. pin. *Psyllium 3.* siue maius erectum. *Pulicaris herba* Lob. Ic. Plant. pag. 436. *Psyllium* Matthioli H. Lugd. p. 1172.

Nomenclura.

Germanis *Psyllienkraut*, *stobe samen oder kraut*: item *stochsamenkraut*. Belgis *Vleyeruyt*. Gallis *Herbe aux puees*, i.e. Herba pulicum siue Pulicaris herba. Italis *Psilio*. Hisp. *Zargatoni*. Angl. *flerworte and fiesede*. Boh. *Chmeleyck*. Arab. Serap. Bazara chatona, Aneth. Belscaroton seu Bezercorhume. Egypt. *Chetum*.

Locus

Spontè Narbonensis & Gallo provinciæ vetusta proscissaque arua operit & insternit: Ac etiam inter oliueta, sabulosaque serobes Monspeliani agri prouenit, exilioribus ramis: Littora verò sabulosa maritima lubenter sectatur maritimum, habitiore sed non dissimili aspectu, referente Lobelio. In campis aut incultis locis subinde exire scribit, feri & quandoque semel satum facile aliquot deinde annis recurrere: Pro loci natura non raro lætius, præsertim circa maritima, gigni, alibi minus. In Germania & Anglia obseruabit Turnerus, verum semper hortense. Monspelij florentem vidi in Autumno & Vere: in Italia inter Bononiam & Florentiam, itemque inter Vinceniam & Villanouam, Aprili. Genevæ abundat vicens Iunio, & virens adhuc Ianuario, & perferens Hiemem cum floribus. Lugduni cum semine Septembri & Octobri à Anay & ad Rhodanum prope ædes. *Psyllium* copiosissimè prouenire in Egypto author est Alpinus.

Vires & Vitis.

Psyllij semen vsui in medicamentis ateriæis, & bilem siue præparantibus, siue educantibus. Seminis & herbæ mucaginosis & lactei cremoris similis succus ad purgandam choleram etiamnum à Lobelio commendatus. Expertus sum ego mucaginem seminis in penem iniectâ, ardorem eius sedare. Aqua, inquit Dodonæus, Tom. III.

in qua semen *Psyllij* quassatum, siue agitatum, maceratū neque fuerit, donec lentorem contraxerit, omnes inflammationes sedat: ardentium febrium calores mitigat: sitim restinguit: & in ore detenta asperitates linguæ lenit: Interaneorum ex acrimonia humorum dolores tollit: dysentericis, & quibus intestina, aut vesica, exulcerantur, utilis, utilior verò etiam ex semine antea tosto. Alium & hæc mollit, clementerque subducit, præsertim Saccharo aut Iulepo ex vjolis addito, vel potius ex infusione frequenti diluere rubentium Rosarum, quo modo in ardentissimis febribus utiliter exhibetur. Verum non nimis crebrò hac mucagine vtendum admonet Serapio, & post eum Fallopius, stomachum siquidem offendit, frequentique ac nimio vsu subinde syncope aut animi deliquium etiam succedit, vñ cum mortis periculo: quia nimium eius venenosum, ut ait, est: quod non modò Græci, sed & Auicenna testatur. Seminum apud Egyptios vsus est, præsertimque mucilaginis ab ipsis paratæ cum aqua rosacea in omnibus febribus biliosis, ardentibus, inflammationibusque pectoris, vti in pleuritide, & peripneumonia, sed extrahunt cum aqua Hædel, & cum Saccharo candido exhibent in aqua rosacea extracta *Psyllij* mucilage ij vtuntur in biliosis diarrhæis & dysentericis, atque omnes externas inflammationes, emplastri aut fomenti modo, cum ex viridis plantæ foliis, cum ex seminibus *Psyllij*: tota planta vtuntur.

Psyllij mucilaginem commendat Gatinaria in dolore capitis calido, malè existimans exteriorem partem admodum frigidam, interiorem calidissimam & vesicatoriam. Cornarius itidem *Psyllij* substantiam medullæ interioris calidam & siccam in quarto gradu pronunciauit: itemque venenum esse. Sed quâ ratione sit venenum non docet. Arabes quidem ponunt in *Psyllio* duas substantias diuersas, vnam in cortice, alteram in medulla, sed de ea diuersa substantia nihil dicunt Græci, quamvis ipsi frequenter vsi sint & cortice & medulla.

PSYLLIVM MAIVS SVPINVM.



Isdem in Locus Descrip.

tractibus, sed maginibus & squalidis Oliueterum incultis collibus, samentosius lignosisque proluxa foliorum & surculorum caudata, comosaque sæturiâ densissima implexa fruticæ, & repando cæspitem ornat latiore aspectu, sed hirsutie ex viridi albicante.

Semine haud dissimili: sed maiore fuscoque, siue Castanæ corticis colore: radice ligno-

Synon.

sa durâ, fibrarum procursu proliâ.
C. Bauh. phyt. Psyllium 1. siue maius: Eid. pin.
Psyllium 2. siue maius supinum: Psyllium alterum Matthiol. Cast. H. Lugd. p. 173. & Tabern.
Psyllium perenne Gesl. hist. Obs. p. 239. Ic. Plant. p. 417. Psyllium 3. Anguillatæ, maius Cæsalp.
Psyllium semper virens Gerardi.

Psyllium Indicum foliis crenatis.

Descriptio

Radice est oblonga, tenui, fibris capillatæ: caule circa radicem lignoso & rufescente, rotundo, subaspero, pedali, in frequentes ac foliosos ramulos diuiso, qui capitula plura, duodena, squamata sustinent, è quibus flosculi pusilli, pallide lutei, lanuginosi relucunt: semen nigricans, paruum, splensens, succedit: folia habet oblonga, angusta, acuta, crenata, instar foliorum Coronopi, nonnihil laciota: hirsuta: ex semine Psyllij Indici nomine (sato in horto aliquoties flores, enatum auctori C. Bauh. qui in prod. Psyllij primi nomine describit. In pin. vocat Psyllium 1. Psyllium Dioscoridis, Psyll. Indicum crenatis foliis, & Psyllium primum Anguillatæ: auctora Theophrasti: Oculum canis & Canariam Gazæ.

PSYLLIO ACCEDENS GOTNE,
Rubium quibusdam dictum.

CAP. VIII.

Descrip.



Vbi adoleuit, patula magis quam alta est plantula, gracilis, lignosa radice firmata: coliculis palmatis, quorū pleriq; nonnihil reclinati, foliis vestiti paucis, vncialibus, Psyllij angustioribus. Idē verò rursus in aduersos diui dūtur ramos, quorum diuinationi subiecta sunt folia prædictis similia: capitula Psyllij, multo breuiora, imbricata non tantum fastigio ramulorum insident, sed etiam in eorum ramulorum sessilia, ut in Gnaphalio vulgari: flosculi ex apicib. luteis succedit semen paruum relucens. Annua est planta meo quidem iudicio: nam quo anno sata est, flores, ut ipse vidi, licet alij aliter sentiant.

Psyllium minus.
C. Bauh. hist. Gotne rubri & albi.


Fratri C. Bauhino phyt. [ubi tertium facit] propter totius plantæ cum Psyllio similitudinem, Psyllium minus appellari placuit. Ei Zvingerus Gotne rubri & albi nomine misit. Is tamen differentiam statuere videtur inter Gotne album & rubrum. Siquidem Alpinus hoc Gotne rubri nomine ad Camerarium misit: nam nomine Gotne albi eam quam sub Holosteio tertio [Plantaginis angustifoliae simili] proposuit. Idem in prod. sensu & sub Psyllio secundo siue minore descripsit.

In pin. vocat Psyllium 4. siue minus, Gotne

rubri & B. et j rubri nomine acceptum, quæriturque an sit Kally tertium Alpini, minus recte pictum? Ceterū n. quam C. Bauhino in prod. pro C. Bauh. Psyllio minore pingit, descriptioni non respondet.

KALLI TERTIVM ALPINO.

CAP. IX.



Folii consistat paucis Aiuget foliis proximis, longioribus multo, caule singulari, non recto, ex quo tres quatuorve cauliculi qui recta sursum feruntur, in singulorum cæcumine caput ex quinque aut pluribus foliis Chamæpity similibus, deorsum inclinantibus, & in arcum recuruatis: in

Descrip.

quorum medio flosculi multi, Rosarum flosculis similes. Herba salsa, atque acri sapore linguam vellicante.

Descriptionis auctor vocat Kalli tertiam speciem, censetque reponendum sub Anthyllide secunda Dioscoridis.

Locut

Kalli tertium in Ægypto proueniens, ut auctor Vitis multi, in puluerem redactum, ac per os sumptum, phlegma atque bilem exustam purgat: idem ex foliis succus expressus facit. Ex hac primò & secundò exsiccata & combusta cineres parantur, qui ad vitra atque alia conficienda, conferunt, testibus iis, qui ex Ægypto Venetias conuehuntur.

LEONTOPODION VETERIBVS

atque Cemos.

CAP. X.

Dioscoride auctore Leontopodion [Λιοντοπόδιον] duorum digitorum herbula est, foliola illustrant. habens arcta [runda: Ver. non legit] robusta, quateri ūm ferè, aut etiam ter ūm digitorū longitudine, hirsuta, quæq; radices sunt proxima lanatiora [sic ut ista: Ald. odoratiora: capitula in summis caulib. quasi perforata [sic ut vet. & Marcell.] in quib. flores nigri [lutei vet.]. Semē verò vsq; ad eā spissa lanugine obuolutum [cōueru difficile] est, ut ægè deprehendi possit. Radix subiacet parua: quam etiam tradunt amuleti ratione alligatam ad amatoria prod. se. tuberculæque discutere.

Diosc. verò

Leontopodion Plinius ait lib. 26. cap. 8. alios Leuceoron, alios Dorypetron, alios Thorybetrion vocare: radicem eius aluum sistere, bilēque purgare, in aqua mulla, addito pondere denariorum duūm. Nasci in campatribus & gracili solo. Semen eius potum, lymphatica somnia facere dici. Cap. 12. Semen in aqua tritum cum polenta, omnia infixæ corpori extrahere. Cap. 14. Semen in aqua tritum & cum polenta illitum, spicula sagittarum extrahere. Libro verò 27. capite 8. silendam

filendam censet Cemon [Eccemon CH.] propter vanitates magicas. Hoc autem apud Plinium valde alienum Leontopodium bilem purgare & alium sistere. Mirum & illud, quod historiam hujus plantæ à Dioscoride prolixè tractatam ne Plinius quidem attigerit. Cum Cornario & Sarraceno Leontopodium Plinij multum discrepare à Leontopodio Dioscoridis existimavit Dalechapius, idque utriusque vires collatas ostendere. Placet & hæc opinio C. Bauh.

Galenus neque posteriores Medici Leontopodij meminerunt. Sed & quod Aetius & Apulejus Leontopodium nominant, non aliud quam Leontopetalon esse palam est.

Sarracenus Cornarium secutus Dioscoridis, Cemon Plinij esse suspicatur, tum quia vox ea in Dioscoridis notis etiam inter Leontopodij synonyma reperitur, tum quia & Cemon ad amaroria prodesse iunxit Plinius: quæ opinio etiam Marcello placet: non refragante Dalechampio.

Leontopodium verum hætenus non solum sibi, sed alijs quoque ignotum esse arbitratur Matthiolus. Sed ab omnibus in Italia ignorari falsò desinit. authore Guilandino.

Aquilegia Cæterum Leontopodij nomine sequentes donantur apud varios auctores Plantæ. Pentaphyllon montanum. Pes leonis. Leontop. Candia. Gnaphal. Alpin. Gnaphal. aliud. Gnaphalio affinis Gnaph. Fuchij. Gnaph. virgatum. Pilosella phlomod. Scorpionides aquar. Caltha. Leontopetalo. Cyclaminus. Aquilegia.

LEONTOPODIVM CANDLE quorundam Psyllio affine.

CAP. XI.

Descriptio

Radix nigra est, duriuscula, fibrata: ex qua filia emergunt pluseula, pedalia ferè, Plantaginis Alpinæ angustifoliæ, vel potius Sesamoidis minoris, sine tamen lacinijs tota villosa. Ad

radicem verò recurvis pediculis lignosis flores hærent villosi, quos capitula itidem sequuntur villosa, Psyllij similia, semen rotundum, oblongum, cinereum, Psyllio aliquantò majus continentia.

Leontopodij 1. [ut vocat C. B.] phyt. & 3. inter icones, Creticum cognominatum, Holsteum 4. in



pin. accepit nomine Leontopodij ex Candia rari.

Leontopodium, quod tradimus, est Imperatoris planta Candie propria, quæ in omnibus respondet descriptioni Dioscoridis, inde Leontopodium legitimum inscripsit. Quidam Catanancem existimant.

XXXI.

Bellus tamen in Epist. ad Clusium contrarium tenet. Cùm arescit, inquit, capitula in se contrahuntur ad speciem vnguium milui exanimati, ut in Catanance prima Dioscoridis: sed Catanance non est: nam folia Cotoniæ non sunt, neque semen Orobo simile habet. Si autem hæc duo haberet, legitima esset Catanance.

Dubitat Clusius an ad Plantaginis angustifoliæ, similiumque classem, hæc planta sit referenda, quam ex Italia Francosurti diuersâ appellatione insignitam accipiebat. Cortusius enim ipsi mittebat eam adhuc tenellam, vestigia tamen capitum adhuc retinentem, unâ cum iconè, ipsam stirpem satis scire referente, addito Catanances nomine. Iosephus verò à Casa bona ipsam plantam maturam & aridam, ac recens è Creta delatam, Leontopodij appellatione. Clusius autem diligenter conferens utramque cum Leontopodij & Catanances descriptione, animaduertit notas aliquot habere satis inter se conuenientes ut fusè enarrat.

Iconem ex virente planta in horro D. Jacobi Zvvingeri cum suis capitulis Septembri visa pingi curauimus.

Utuntur hac vulgariter ad soluendos quos putant ex maleficio Venere uti non posse: nam herbâ super prunas posita, ter parientem nudum per fumum transire faciunt, & totidem viobus indusium eius fumigant: & sine dubio liberum à maleficio fore prædicant: Bello referente.

Vfus:

ELLEBORINE, EPIPACTIS, ET Damasonium in genere CAP. XII.

Epipactis, quam alij Elleborinem [i. e. *Elleborum*] & Borien vocant, frutex est posillus [i. e. *posillus*], pro quo ver. quidam [i. e. *posillus*] perquam exigua foliola [i. e. *foliola*] habens. Contra venena & iocinoris vitia pota prodest, authore Dioscoride.

Peregrina Italia auctore Plinio Epipactis est: qui inter Græciæ & Asiæ frutices eam lib. 10. cap. 20. numerauit.

Non satis autem descripta est, ut nostra ætate cognosci possit: nec cur Elleborinen vocauerit eam antiquitas, constat. Si nomen ipsum tamen expendatur, non abs te fuerit Elleboro similem aut congenerem credere.

Si contra, Theophrastum aliquis audiat lib. 9. hist. pro candido Veratro de ea sic tradentem: Miscetur autem in Ellebori poculo, ut vomitiones adiuuet Elleborines semen. Herbula autem hæc est. Si quis, inquam, hæc dicentem Theophrastum audiat, suspicari poterit, non tam quia Elleboro congener sit, Elleborinen dici: sed quod Ellebori vim augeat, conjunctaque illi faciliores vomitiones faciat. Utramque enim ex Theophrasto colligi causam arbitratur Marcellus.

Cæterum, ubi Theophrastus Elleboro albo, Elleborines herbulae semen admisceri scribit, aliquam Sarraceno suspensionem mouet, Theophrastum hoc loco per Elleborinem, Sesamotides intelligere.

Elleborinen suam Matthiolus non describit, sed tantum pingit, nec etiam Epipactidem aut Elleborinen astruit.

Gesnerus de Lunar. ait alios etiam errare, qui aliam Ellebori nigri speciem [cui folia plerum-

que bifida aut trifida] Elleborinem appellant. Quibus quid intelligat, videant lectores. Elleborines nomine intelligi Elleborum nigrum siluestrem vulgarem putat idem de hortis. Idem rursus de Lunar. illos errate scribit, qui Consiliginem Elleborinen appellant.

Elleborinen quandam pingunt recentiores & Belgæ, quam Elleborinen Dodonæi inscribimus.

Inter Elleborines præterea considerata veniunt: Damasonium alpinum siue Elleborines species floribus albis. Damasonium purpureum dilutum est Elleborine sexta Clusij. Damasonium alpinum floribus lateis. Elleborine ex albo sublutea. Elleborine siue Damasonium montanum quorundam angustifolium, flore violaceo. Elleborine ferruginea Dalechampij, quæ nobis est Damasonij species quorundam, siue Calceolus D. Mariz.

Ac pro Elleborine à nonnullis traduntur sequentes plantæ: Bifolium. Gentianula. Buphtal. Dodon. Lunaria botrytes. Herniaria. Centaur. minus.

ELLEBORINES SPECIES VARIE.

CAP. XIII.

ELLEBORINE DODONÆI.

Descriptio.



Numerosis fibris radicatur, albidis, quàm Hellebori habitioribus, & ad Rusci radices, accedentibus, sapore amari-cante: caulis modò vnicus, modò plures pedales, aut etiam cubito altiores, nullis ramis donati, teretes, & farina quadam aspersi: quibus sine pediculo adnascuntur folia, Hellebori

albi instar nervosa, sed multis numeris minora, & vix ad foliorum Polygonati magnitudinem pertingentia, sapore itidem amaro: caulis à medio ferè ad summum vsque fastigium per intervalla alternatim floribus ornatur, Orchidum floribus non multum dissimilibus, quos constituunt folia bina albida, terna, herbacea, vtrique expansa, quorum medio ceu exenteratum melleæ cadaverulum ex albo purpureo conspicitur: flori subest canaliculatum capitulum pediculo inhaerens brevis, quo aucto semen clauditur minutissimum & pulvisculi instar.

An Damasonium calliphylon Cord. in hist?


Camæ. apud Matth. germ. ponit figuram cum inscriptione Elleborines, dicens flores variare, & quosdam virentes esse, alios albicantes, alios rubellos, siue incarnatos, & robentes, præsertim in Austria & Vngaria. In Epic. pingit sub titulo Epipactidis siue Elleborines. Quænam autem sit Helleborine Dioscoridis, difficile conjectu arbitratur.

Hæc herba appellata est à Dodon. gall. græcè *ἡ δὲ δὲ δὲ* quoddam Helleboro albo figurâ similis sit: latine Helleborine & Epipactis. Quidam existimant quoddam Helleborine sit herba quæ Helleboro viribus duntaxat assimiletur, & nō figurâ. Sed huius opinio falsa cognoscitur, quod huic nec vnicam vim Hellebori Dioscorides attribuit. Idem in fol. lat. Helleborinen inscribit, ac ait: Helleborinen non improprie dici ac nominari posse, ipsa cum Veratro albo similitudo testatur: &c.

C. Bauhin. phyt. & in pin. Helleborine: siue latifolia montana: Helleborine Dodonæi H. Lugd. pag. 172. Helleborine recentiorum secunda, Clusij. Helleborine Gerard. Epipactis latifolia, Eyst. Sigillum Salomonis, Catalpini: foliorum amplitudine [& quod altera folijs oblongis acutis, altera verò subrotundis est] & floris colore euarians.

In montibus passim occurrit Augusto, Septembri, & Octobri mense florens. Clusio provenit in opacis Gallie, Germanie, Austrie, & Vngarie locis, etiam in Pannonia interamni inter Drauum & Savaum flumina. Præcocior est reliquis & Maio plerumque florere solet.

DAMASONIVM ALPINVM SIVE Elleborine, floribus albis.



A dissimilis est Helleborine: radices fibrosæ, tenues: caulis modò dodratalis, modò maior, modò minor, gracilis, folijs alternatim amictus, Plantaginis lanceolatis, angustis, aliàs etiam viciâ latoribus: sed Hellebori albi more striatis, nitidis: flores per caulis summa spicati & velut Orchidum modo dispositi.

è siue foliorum exiguum singulares, masculi, lactei, longi calyces capitulo impositi, tribus in ambitu folijs prædicti, intra quæ duo alia minora, his verò oppositum tertium hians, & labellum luteum velut alis quibusdam munitum. Ex huius hiatus pistillos albos, nitidos, brevis, capitulum sustinet nitidissimum, tenerrimum, oblongum, summa parte per logirud. hyli impressione notatum.


C. Bauh. phyt. & in pin. Helleborine: siue flore albo, vel Damasonium montanum latifolium: Tabern. & Ger. Helleborine albo flore: Eyst. Epipactis angustis folijs: Cordo hist. Alisma cymbalanthemon.

Reperta mihi in montibus ad S. Vrsinū florèa Maio. Eademque etiam olim observata Tiguri. Genero Cherlero in syluaticis & umbrosis litioribus maris Adriatici frequentissima & speciosissima observata.

Damasonium purpureum dilutum, siue Elleborine iv. Clusij

C vbitali canle, rotundo, geniculato, quem in singulis geniculis alternatim ambiunt angusta-

Descriptio



sta folia, Secun-
di generis [El-
leborines Dodonæi] foliis nō
dissimilia erue-
re meminit
Clusius : cuius
summus caulis
delinebat in spi-
cam sex, octo,
aut plurium in
terdum *florum*,
quinis foliis e-
legantissimi di-
lutiq; purpuræ
coloris cōstan-
tem, inter quæ
latebat quedam
veluti galeola
muscarum pro-
botocidi similis,
labrū inferiore

parte adnexum habens, æqualis ferè cum foliis
longitudinis, candicans, intus striatum : susti-
nebantur flores anguloso, tortili, hirsutoque
nonnihil capitulo : radix illi fibrosa, sparsa, sub-
rufescentis coloris.

C Bauh. phyt. & Pin. Helleborine 7, siue mon-
tana angustifolia purpurascens : Helleborine 5.
Clusij pann. 6. euidem hist. Damasonium tenui-
foliū Cordi hist. Damasonium alpinum H. Lugd.
p. 1058. Alisma tenuifolium Thalij. Sigillum S.
Marie 3. Cæsalp. Helleborine angustifolia Ta-
bern. & Gerardi. Nō Damasonium H. Lugd. huc
non referimus, flores siquidem inter alia conue-
niunt.

In Pannoniæ quadam silva, magno miliari ab
arce munitissima Nemethvivar, aliisque Zol-
nok vicinis locis abundantissimè nascitur. Flo-
ret hoc genus Iunio, nonnunquam etiam Iulio.

DAMASONIUM ALPINUM floribus luteis.

Descriptio

Radix est nigra, modicè fibrata, altius descē-
dente : folia oblongis, angustis, nervosis, lan-
ceolata siue Plantagini minori similibus, ali-



quantò lōgiori-
b⁹, acuminatis :
caulis pedali-
bus : flore luteo :
seminibus oblon-
gis, angulosis,
quaternis si-
mul sic conjū-
ctis, vt hiantè
in medio spatio fe-
nestrata quz dā
meta appareat,
apice nigro su-
pereminēte, e-
leganti sanè fi-
guā, latera, quæ
nondum cornu,
chartaue obducta
est, clausaq; simili,
& huic plantæ
peculiari.

Damasonium

alpinum montanum Herbarij vocant : quidam
Clymenum, folio Plantaginis minoris, follicu-
lis Iridi similibus, fructu oblongo, cirris poly-
porum non dissimili. Sed cur Damasonij nomen
huic plantæ indiderint, haud constat. Quare li-
berum cuique aut id retinere, aut aliud verius
sufficere : H. Lugd.

In Alpium vmbrosis conuallibus gignitur.

Elleborine ex albo sublutea.

Caulis surgit recto, sesquicubitali, plūs minūs :
Folia vestitur pluribus, alterno situ positis, per-
foliatis, latioribus quàm Helleborinæ flore albo,
venosis & striatis, vt Hellebori albi, sed multis
numeris minoribus, saturè virentibus. Caulis
summa thyrsus occupat *florum* ex albo luteorum
galea alba, labello luteo & suberoseo præditorū :
e quorum sinu pistillus firmus, crassus cum api-
culis farinaceis : Ad quorum pediculos semun-
ciam longas singula extorsum conspiciuntur
foliola parua, angusta, acuminata : Radix fibrata,
ad Elleborum accedens, valde profundè radica-
ta. Sapor amarus admodum in foliis & floribus.

An Damasonium alpinum H. Lugd. p. 1057. &
1058.

Observavi florentē mense Maio in limitibus
Montbelgardensis ditionis versus Mathai arcem
in vepribus, & in monte dicto Montbar.

*Elleborine siue Damasonium montanum quorundam
flore violaceo angustifolium*

Damasonium hoc montanum, quod Dalecham-
pius olim Clymenum denominabat, floribus est
violaceis, ceteroquē Elleborinæ Dodonæi affinis
planta, sed foliis angustioribus. Prope Gene-
uam in colle *la Bassie* observauimus : item in
monte Rolsberg prope Masmunster mense O-
ctobri Helleborines flore violaceo meminit
Lobel. in Obs.

*Elleborine Borpudæ seu Alisma
racemosum.*

Sesquidodrantalis est planta, caule geniculis dis-
creto, ex quibus continuo ordine folia sua exerit,
Plantaginē maiorem ferè imitantia, sescūciam
lata : flores verò racematim quasi in longo recur-
uoque scapo dependent plurimi rubicundi.

Thalio descriptionis authori dicitur Alisma
Borpudæ seu racemosum : C. Bauh. phyt. & pin.
Helleborine 2, siue atro-rubente flore : variat
foliorum amplitudine : florum colore attror-
bente, rariùs candido.

Frequens est multis in locis, opacis tamen &
montium jugis.

*Damasonium flore herbaceo, intus non
nihil candicante*

Pari est cum Helleborine Dodonæi magnitudi-
ne, paulò latioribus foliis, minoribus floribus,
qui etiam quinque foliis constant, & galeolam
cum prominente labro amplectuntur, coloris-
que sunt herbacei, intus nonnihil candicantis,
nullius odoris, quibus torosa contorta que capita
substantur radix nominatæ similis.

Clus. pann. Elleborine 2. Fid. hist. Hellebo-
rine recentiorum 3. C. B. phyt. & pin. Hellebori-
Mmm

Locus.

ne 3. angustifolia palustris sine pratensis.

Inuentur in quibuldam Austriæ & Pannoniæ
ficcionibus pratis, & in Norimbergensi filua vbi
vicina ad Latomias.

Elleborine flore carneo.

Huic minor est altitudo, similia interdum fo-
lia, nonnunquam multò latiora: flores aut om-
niò purpurascens, aut omniò, aut prope car-
nes, Elleborines Dodonæi floribus prius simi-
les: nec radix differt.

Synon.

Elleborine 3. Clus. pann. 4. Eid. hist. Hellebo-
rine 4. siue flore carneo C. Bauh. phyt. & pin. Si-
gillum S. Mariz alterum Catalpino.

Locus.

Crescit in montanis pratis & cæuis filuis
Austriæ.

Elleborine montana angustifolia spicata.

Elleborine 4. Clus. p. nn. 5. Eid. hist. Hellebo-
rine 6. siue montana angustifolia spicata cubita-
lem altitudinem superat, & amplissima omnium
sunt illi folia, æque oblonga purpurascensium
florum spica.

Locus.

Nascitur in multis Pannoniæ & Austriæ filuis,
& ad montanorum pratorum margines: sed nus-
quam frequentius, quàm in ea filua, in qua Da-
masoniæ species, Calceolus D. Mariz abundat.

Elleborine tenella, tribus in caule foliis prædita.

Descriptio. Non inelegans est Elleborines recentiorum hoc
tenellū genus, quod Gulielmus de Meta, Medi-
cus ex Italia rediens, observabat, & Clusio Fran-
cosurgi donabat. Erat verò pedalis fere altitudi-
nis, gracili caule, tribus foliis prædita, Ellebori-
nis, gracili caule, tribus foliis prædita, Ellebori-
nes vulgaris foliis formā similibus, & quinque
neruis per longitudinem eorum excurrentibus,
sed longè minoribus, vix quæ circiter vnciam lō-
ga sint duntaxat, semunciam lata: summi cau-
lis in spicam florum desinit Elleborines vulga-
ris flores imitantium, sed minorum: radix sum-
mā quasi tellure sparsa, crassiusculas succulentas
que hbras egerat.

Elleborine 7. Clus. h. 8. C. Bauh. phyt. & pin.

DAMASONII SPECIES QVIBVSDAM siue Calceolus D. Mariz.

CAP. XII.



Damasoniæ speciem
faciunt quidam
Helleborines
affinem herbā,
foliis alterna-
tim per caulem
pedalem, illa-
rum similibus,
venosis, subhu-
latis: flos tum-
mo cauli insi-
det plerumque
singularis qua-
tuor foliis atro-
purpureis de-
cussatis acumi-
natis, virem
magnum ex lu-
teo pallentem,
bipedū Fran-
ciscanorum ca-

lopodia imitatum, supernè aliquousque patulū.
sustinentibus: siliqua pulvisculo, velo helle-
botinis & Orchidibus plena succedit: radix ob-
liqua sub terra agitur, numerosis fibris capilla-
ta, subinde caulium emarcidorum vestigia im-
pressa gerens.

Orchidi bus

Calceolum D. Mariz spuris Orchidibus co-
gnatam plantam determinant Cuius, Ellebori-
nes recentiorum primæ titulo, eam de scribens &
depingens. Germani *Wienisch uoch* & *sefer-*
schuch appellant: Hungari *Gereth amfistia* i.e.
Milleb. onam hie hant, quali *Gereth amfistia* dicat. *Milleb. onam*.

G. fœnerus in epist. lib. 3. frequenter apud Hel-
uetios inueniri sublecebat, luti umque florem illi
tribuit, Colmo sandalioneque Pausaniæ suspicatur,
quod & *Sandalij* formam referat flos, & punctis
ceci literis quibusdā notetur, et si Pausaniæ Hy-
acinthum esse conjicit, sed huc cum Sandallo
nihil. Qui tam vir doctus Lonchitium primam
esse putat. Geinetus verò de veteri nomine du-
bitat, & tamen ad Alismatis species refert. Fru-
ctus, inquit, semen, odor, sapor cum succoglu-
inoso & subacti, Sic *apoc. 20. 21. 22.* cognata esse
arguunt, et si radix testiculata non sit. De coll.
stirp. vocat *Calceolam luteam*: item postea, Cal-
ceolum D. Mariz foliis Ellebori. De hort. A-
lismatis speciem quorundam, & Calceolum D.
Virginis vulgò dictam. Similerus & Aretius,
Anten hallen (Damasonij aliquam speciem.
Dod. hist. Flor. Damasoniam nonnullis existima-
tum, Damasonium nothum: Lat. in fol. Calceol-
um maritimum, cuius inscriptione duas exhibet
figuras, & vulgò Calceolum sacerdotis, germ.
Wienisch uoch & *Papen sibe* appellari refert.
Existimari verò & à nonnullis Alisma siue Da-
masoniū esse: sed minis quàm Saponariam cum
eo conuenire. Pollum quidem Plantaginis satis
respondere: sed desiderari capitula thymiflorem
tenuem, insubstantem, & radices Veterani ni-
gri similes.

Milleb. onam

Colmo sanda-

lonij

Calceol. lu-

teum

Calceol.

maritimum

Calceol. sacer-

dotis

Recentiorum

Calceolus

Mariz

Crepida

sacerdotis

De recentiorum Calceolo Mariz (ut vocat in
Adu. & Obs. pag. 26.) siue Calceolo Mariz &
Sacerdotis crepida, Damasonio nothum (ut in le.
Plant. pag. 32. inscribit) hæc prodit Lobel. Pri-
scis etiam præterita videtur illa floris larva per-
quàm spectabilis, etiam plantagineis foliis, aut
bisoli, quam nonnulli Alisma opinari sunt, vul-
gus Septentrionalium *Wienisch uoch* & *Papen*
vel *Papen Schoen*, i.e. Virginis calceum, vel
Sacerdotis crepidam vocitat à floris effigie, quæ
quatuor cõstat foliolis diluè purpurascensibus,
& rubè ibus, sui è medio prominentibus vtricum
quendam purpureum, in eis vacuum, rotundum,
fieri, aut atylonis cadaver, vel vnedonis caliculos
florum nonnihil referens, sed supernè, aut late-
re vno patulum, instat crepida oræ patulæ, quæ
inscribitur per: foliis Plantaginis, aut Alismatis in
longitudinem venosis: radice transuersa, nec ali-
què depacta, nec multum fibrosa.

Apud Amatum lib. 3. c. 158. ponitur ex figuris
Dalechampi pro Lonchitide prima, quamvis A-
matius scribat Lonchitidem vtramque sub inod-
gnitam.

Amatius

scribat

Camer. hort. Damasonium nothum Dodonæi:
Thal. Alisma *carduus* aut *cardus* H. Lugd.
p. 146. Elleborine ferrugine Dalechampi,

C. Bauh. phyt. & pin. Helleborine 9. siue flo-
re rotundo, hoc Calceolus: Alismatis species
flore ferrugineo Gelu. hort. Lonchitium prior Da-
lechampi. in Dioscor. Damasonium nothum
Dod. gall. Pseudo Damasonium Clus. p. n.
Calceolus Mariz Eyst. Flore est luteo, & d fo-
lia ad

lia adiuncta ferruginea reperitur & albo, & vtriculo purpureo : apud Helueticos flore est duplò maiore, quàm apud Noricos.

Tempus

Vires

Intellexi, inquit Clusius, in Hercinia silua, præterea circa Fuldam, alijsque Germaniz siluosis locis copiosè nasci. Ego Tiguri florentem observavi Maio: in montibus Genevæ propinquis Iunio.

De Calceoli autem Mariani facultatibus licet nihil occurrerit Dodonæo ad scribendum : v. potè non modò veteribus, sed nec recentioribus satis cogniti : Vulnerariam tamen herbam esse, plagasque recentèr illatas sanare alunt non pauci.

ALISMA TOSSANI CAROLI. CAP. XIII.

Descriptio



Caule surgit singulari, cubitali, anguloso, glabro, fusco : cuius scapus in alas aduersas atque hæc rursus in alias surrectas omnes & in thyrsum fastigiatas diuiduntur : flores singuli insident stellati, quinque radiatis folijs [rarissimè quatuor] constantes, ijsque acuminatis, internè ex dilutione

caeruleo in albidum pallescentibus, strijs saturatioribus longitudinem percurrentibus, quæ externa parte paululùm admodum apparent, in herbaceum declinante: in medio flore surgitur vèrricosus nonnihil stilus, & quina stamina, Viola leuiter tineta, quæ nonnunquam repanda in foliorum interstitia sese insinuant: porrò autem singulis florum folijs ad basim binæ ceu pusillæ verrucæ violacæ adnascuntur: toti denique flori foliola viridantia radiata subijciuntur : folia per terram sparguntur, plantaginea, media inter Plantaginis maioris & Quinqueneruæ folia, alia cauli sine pediculo adnascuntur, angustiora, ex opposito sita, magisque acuminata, singulique aded thyrsi diuisionibus folia, sed minora, subijciuntur, ex aduerso posita: sunt ea verò pinguiscula, acronitrentia, glabra, per quorum longitudinem nervus decurrit rectus, alis vtrinque sinuatis: sapor gustanti amarus.

Synonyma

Locus & Tempus,

C. Bauh. in phyt. eius meminit, ut apud nos viso, nomine Alismatis primi, siue folio glabro. An autem eadem sit cum Gentiana Pennæ, flore punctato subcaeruleo, ut idem voluit in Pinace, ambigimus.

Pulchram hanc plantam nobis jam descriptam ante annos plures ab insigni pharmacopæo Tossiano Carolo accepimus, in Burgundiæ Champagnole locis aquosis collectam, quæ in hortum tranlata pluribus annis durauit, & quorannis floruit, & semen maturauit mense Augusto & Septembri.

Tom. III.

GENTIANA VETERIBVS. CAP. XIV.

Perisset tota Gentidis antiquissimi Illyriorum regis jam pridem cum nomine fama, nec esset regis eius fortunæ monumentum aliquod, nisi renascens quotannis Gentiana, gratâ inter homines memoriâ, honorem illi identidem augetet, amaretque hominem & laudare, posteros cogeret, qui ut generi humano prodesset, in frigidissimis regionis suæ, ventosisque montibus, neglecto regis potestatis honore, herbas querere, & inuenias nobis indicare, veritas non fuerit. Tam innocenter sibi, vtiliter verò alijs, tunc reges imperia tractabant, gaudente, ut pat est, mare omnium terra, augentibusque vires suas herbis, quæ regum manibus foderentur. Gaudente etiam Medicina, quæ reges haberet auctores, eorumque dignitate suum & ipsa honorem & gloriam augetet. Quantò Illyriorum regi honestius hoc in laudibus suis audire, quàm Cæsari centum & nonaginta duo millia hominum occisa prælijs, qui maximus fortunæ & gloriæ eius cumulus est, in honorem suum fecisset. Et quos bello alij perdididerunt, inuentæ à se Gentianæ remedijs ad sanitatem instruxisse.

Nota igitur omnibus semper Gentiana fuit. Et Dioscorides ab inuentore Gentio Illyriorum rege Gentianam appellatam scribit: folijs proximè radicem (ab radice, Cæsalp.) Iuglandi Plantaginine sinilibus, subrubentibus, à medio autem caule, & maximè circa cacumen paulùm dissectis: caule inani [concauo] laui, digiti crassitudine, ac binum cubitorum altitudine, geniculis distincto, & maioribus ex intervalis folijs circumdato: semine in calycibus lato, leui [sine pondere] aceroso (paleaceo) ad Spondylii semen accedente: radice longâ, Aristolochiæ longæ simili, crassâ & amara. Nasctur in celsissimis montium jugis, locis umbratis, aquosisque. Vis radici excalectoris & detergens. Cõtra venenatarum bestiarum morsus duabus drachmis cum Pipere & Ruta ex vino pota auxillatur. Extracti succi drachma ad laterum dolores, & casus è sublimi, ac rupta & conuulsa prodest. Hepaticis quoque & stomachicis pota cum aqua subuenit. Radix collyrij modo subdita parus efficit: impositaque ut lycium vulneraria est, & cuniculatim depascentibus vlceribus medetur. præcipuè verò succo, qui quidè oculis etiam inflammatione laborantibus illinitur. Miscetur & succus acrioribus collyrijs pro meconio [hoc loco] (cum) pro [pro] legendum esse ipsa res monstrat. Non enim medicamenti frigidissimi loco substituitur, quod calidum & siccum est, H. Lugd.] Sed & radix virilignes, alphas d'etas, absterget. Porrò extrahendi ratio hæc est : Contula radix ad dies quinque aqua maceratur : postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent, emineantque radices: ac ubi refrizit aqua, linteo excolatur, moxque discoquitur ad mellis crassitudinem, siquidque vase reconditur. Hactenus Dioscorides, in cuius nothis aliqui Centauream radicem, alij, Aloem gallicam, alij Narceon, alij Chironium, Dardanî Aloetin, Romani Gentianam seu Cicendiam, alij Cyminalem vocant.

Plinius lib. 25. cap. 7. scribit Gentianam vbique nasci, in Illyrico tamen præstantissimam, folio fragilini, sed magnitudine ne Lactucæ: caule tenero, pollicis crassitudine, cauo & inani, ex inter-

Mmm 2

vallibus foliato, trium aliquando cubitorum, radice lentâ, subnigra, sine odore, aquosa, montibus subalpinis plurima. Vsum esse in radice & succo. Radicis naturam esse exalfactoriam, sed pregnantibus non bibendam. Hæc hoc loco. Sed & reliqua à Dioscoride tradita, sparsim idem Plinius habet.

Galen.

Galenus omnem vim Gentianæ radici ex amaritudine attribuit. Gentianæ (inquit 6. simpl.) radix multum est efficax, cum opus extenuatione, absterfione, purgatione, obstructionis liberatione. Nec mirum si hæc possit, cum impensè amara sit. Hæc Galenus.

Auienna.

Auicenna Gentianam calidam esse scribit ordine tertio, siccam verò secundo. Componitur ex hac apud Mesuem, & alios plerosque Medicos, theriaca diatessaron, i.e. ex quatuor rebus, scilicet addita Aristolochia rotunda, Myrrha, & bacis Lauri, æquali portione, quæ vicem explet Theriacæ magnæ. Diosc. alio modo diatessaron facit, exhibens percussit à serpente radicis Gentianæ drachmas duas cum Pipere & Ruta & vino.

Cæterum, Gentianam Centauro similem, Centauriam radicem aliqui nominauerunt, & ex eo Narcem, quoniam Narce Centaurium etiam dicatur. Fuerunt qui Aloë gallicam nulla foliorum, sed radicis & rectitudinis & amaritudinis similitudine aliqua, quam verumque genus amaram rectâ sub terram agit. Chironia à centauro Chirone dicta itidem est, quoniam & Ceraurium ab eodem Chironia pariter nominetur. Credidit præterea Marcellus, quoniam Aloë diceretur Gentiana, à Dardanis Aloëtm pariter nominatam fuisse.

Porro licet Veteres vnius duntaxat Gentianæ meminerint, recentiores tamen cognouerunt plures, & scriptis publicauerunt. Et C. Bauhinus inter Neotericos doctè inter Gentianas sic distinxit. Aliæ sunt radice perenni, aliæ fugacissimæ, flore & semine prolato, interire non solent, sed singulis annis ex eadem radice, noua germina producunt: hæc verò flore emarcido, & semine disperso Hyeme intereunt, & ex semine renascuntur.

GENTIANA VVLGARIS MAIOR Hellebori albi folio.

Descriptio.



sequentes, singulares, læues: ex foliorum superi-

Folia Hellebori albi foliis paria, circa radicem multa, per caules ex aduerso sita, eisdem pediculis connatis amplectentia, neruis tribus aut quinque plantagineis distincta, glabra, polita, lucida, hisque notis ab Hellebori albi foliis distincta: caules cubitales, bicubitales, ac etiam interdum hominis altitudinem as-

orum minorum sine flores verticillorum modo dispositi erumpunt, calycibus inclusi primùm, postea intumescences explicantur, qui singuli longiusculi & lutei: sequuntur vascula oblonga, in duas se partes aperientia, in quibus semen numerosum, leuiter rubens, ad Leucoij semen accedens, leuius: radix crassa, lōga, multifida, intus flauescens, sapore insigniter amaro. Quæ cum sit fungosa, siccata insigniter corrugatur, & externe rufescit.

Fach. cum Cordo reprehensione dignus, quod folia per ambitum leuiter incisa Gentianæ attribuant, non obseruantes Dioscoridem esse cordigendum. Helleboro enim albo solis aded proxima est ut minus exercitatum eminus eludat.

Theod. Dorst. inepiam, nescimus cuius plantæ iconem exhibet, jam antè pro Galanga quoque positam.

Gentiana dicitur Brunfels. tom. 3. rhaps. 77. Cordo in Diosc. & Hist. Fuch. Anguill. Gesn. hort. & de coll. stirp. Matthiol. Euch. Ræss. Corn. Harch. Io. Agric. Lon. Rob. Const. Cæsalp. H. Lugd. pag. 128. Lac. Dod. Turn. & Castori, qui germ. Krenn wurg vocat, quod nomen non conuenit. Gentiana magna floribus luteis Gesn. in deser. mont. fr. Gentiana maior floribus subcæruleis, Gesn. in app. hort. Gentiana maior vulgata, Aret. in deser. mont. Stæck. Gentiana maior fl. luteo Camer. hort. Gentiana maior. Lob. in Adu. Obs. p. 164. Ic. Plant. p. 308. Gentiana floribus luteis Simlerus de Alp. Gentiana magna fl. luteo veteribus descripta. Gentiana veterum Clus. pann. & Hist. Gentiana alpina maior C. Bauhin. pin. & [ut etiam phyt.] Gentiana 1. siue maior lutea.

Nomina Gentiana: Græcis, Latinis & officinis omnibus Gentiana. Mauritanis Gentiana, Gentiana linguarum basilica, seu Basateca: Sclauonibus & Turcis Serfenicha. Germ. Gentian/ Bitterwurz/ & in Alpibus Helueticæ Nertsach: Belg. & Angl. festworte & Gentiane, ut & Gallis. Itali latinum nomen retinent, uti & Hispani.

In montium pratis ac pascuis variis in locis obseruatur, florentem lunio ac semen maturantem Augusto. Copiosam ait Turnerus in Alpibus inter Germaniam & Italiam: Matthiolus frequentissimam in excelsis Tridentinis montibus, præsertimque in Ananienfibus, in quorum cacuminibus effodi refert radices brachiali longitudine. Augusto & Septembri colligitur radix, & siccat in umbra. Singulis annis regerminat: cum verò semine se propagat, raro altero & vix tertio anno caulem producit, nata in Sueuiæ & Briscoiz montibus, Cordo. In hortis difficulter ultra triennium durat: in illis quidem florat, sed facillè postea perit, nec ex semine facillè pro-
Locus & Tempus.

uenit. Commendatur radicis puluis ad canis rabidi morsum. Hepaticis & stomachicis, qui cibum sumptum retinere non valent, Gentianæ radicis puluis è vino potandus exhiberi debet, quod qui fecerit, authore Trago, auxilium præsens sentiet. Euphoriston medicamentum in febribus, quod etiam testatur Horatius Augerius in suis epistolis. Simlerus in descriptione Alpium, refert pastores uti Gentianis ad vbera vaccarum si à muribus, araneis aut aliis bestiis venenatis lædatur. Putredinis Gentiana hostis infestissima, & veneni mors, inquit Lobelius. Pesti aded remedium præsens, ut non modò homini, sed etiam brutis incolumitatem tueatur: & amissam restau-
Vires vna.

restauraret, eoque solita Helvetia istam cum flammula porcis, & olim Monachis propinare, ne anima in viuo cadauere puteretur. Gentianæ aqua, perferitumque vase duplici balnei vapore, vitreis organis elicitor, febres (vt Matth. se sæpius expectum ait) ab infarctu tum viscerum, tum vasorum excitatas mirificè pellit. Alui tinea nec maculasque in facie qualescunque detergit, si eà frequentius macula abluantur. Succum Gentianæ magnitudine Castaneæ aut Nucis Iuglandis dimidium eius vno die, alterum post die, commendat deglutendum, contra febres, non solum tertianas longas & nothas, sed & quartanas.

GENTIANA MAGNA FLORE purpureo & albo.

Descriptio



A Vulgari maiore, luteo flore nihil formâ differt: etenim ampla habet folia, Ellebori albi folijs haud multum absimilia, sed teneriora, & saturatiore viriditate splendentia: caules digitali aut pollicari interdum crassitudine præditos, rotundos, cubitales, nonnquam bicubitales, geniculatos, quos ambiunt similia folia, aliquantulum tamen angustiora, ex aduerso sibi opposita: extremos caules ambiunt binæ aut ternæ confertorum florum coronæ, qui non sunt lutei, aut stellati, vt in vulgari maiore, sed purpurei, maiores, concavi, in fenas aut plures lacinias obtusas extremis oris secti, & purpureis quibusdam punctis, inferiore & interiore, quæ candidiores & dilutiores sunt, distincti, odoris experies, rotidem, quot sunt laciniez, staminibus longum & bifidum vasculum interne ambientibus, in quo cõrinetur copiosum semen, planum, paleaceum, minus quàm in illa flaua maiore stellato flore, subtrusum: radix crassa, longa, foris plerumque flaua, intus alba, impenitè amara, digitalibus fibris subinde prædita est, singulis annis noua germina (quemadmodum maior flaua) proferens, & multos caules ex eodem capite producentes, præsertim cum adoleuit, sed qui alternis duntaxat annis, vt plurimum floriferi esse soleant, interquiescente nimirum vno anno à partu marce. Aliud genus inuenitur nihil quidem à dicta aut formâ, aut magnitudine differens; sed cuius flores, qui in illo sunt purpurei, in hoc omnino lactei coloris conspiciuntur, authore Clusio.

Trago Gentianæ alterum genus, multò magis exiguum, vulgare per omnia referens, excepto flore (subcæruleo, & gustu amariore. Gerner. in monte fracto, Gentiana punicea, radice luteâ, amariore: Eid. coll. stirp. Gentiana punicea, radice luteâ, amariore: Eid. coll. stirp. Gentiana minor, alpina, floribus magnis puniceis, caule cubitali, radice pollicis, vel duorum. Simlero Gentiana altera minor floribus puniceis. Harch. Gentianæ

Tom. III.

species paulò maior, subcæruleo flore Dod. gall. Gentiana 2. siue flore cæruleo Trago, maiori efficitur. Camer. apud Marth. in h. germ. Gentiana cærulea maior, in Heluetia frequens à Gesn. descripta, Eid. in Epit. Gentiana maior alia: Item hort. Gentiana maior flore purpureo. Et sic etiam Clus. pann. 277. & 278. itemque hill. cui & Gentiana Pannonicarum & Noricarum Alpium maxima, Gentiana maior albo flore. C. Bauh. phyt. & pin. Gentiana 2. siue maior purpurea Lobel. Obs. p. 165. Gentianam purpureis floribus à Clusio sibi transmissam memorat, iconem tamen non exhibet.

Purpuream Gentianam collegi Burmij Rhætorum florentem Iunio. Gentiana maior purpureo flore exit spontè in Pannonicarum Noricarumque Alpium jugis abundè: Floret Angustor semen Septembri maturescit, nouâ nine in ea juga cadere incipiente. Varietas flore albo in Stiriz superioris alpiibus: Verum neque hoc genus, neque illud purpureo flore cicurare vnquâ potuit Clus. aut vllâ diligentia & culturâ efficitur vt in hortis permantere vellet, nedum flores proferre. Quin culturæ beneficio deterior euadit.

Quoniam autem gustu amariore quàm vulgaris, idè in Medicina efficacior habetur, vehementiusque & soluere, & purgare creditur. Frequens huius vsus ad morsus animalium venenatorum. Hec magnitudine & formâ dictæ planè similis, eius tamè flores paullo (vt ex sicca à Cromero missa planta, Clusio deprehendere licuit) minores, colorem habent pallidum, siue, vt Cromerus scribebat, obsole è luteum, quàm plurimis nigris maculis, intus & foris aspersum. Idem addebat, ab eo, qui ipsum in montana illa loca deduxisset, sibi relatum, in alio quodam præalto monte, aliam formâ non dispari repetiri quæ cæruleo flore esset.

Gentiana maior pallida punctis distincta & cærulea Clus. pann. p. 280. Eid. hist. Gentiana maior pallido flore punctis distincta: Et, Gentiana maior cæruleo flore. C. Bauh. phyt. Gentiana 3. siue maior pallida: Eid. pin. Gentiana 3. siue maior flore punctato.

In Silesiz montibus eruit Achilles Cromerus Nissenis.

GENTIANA FOLIO CONVOLVTO.

Planta est elegans radicibus fuscis, crassis, longis, lentis, repentibus, fibellis paucissimis adherentibus, vnde



caules exurgunt cubitales, rotundi, stellati, glabri & albi, geniculis distincti, in terram reclinati, & concavi: circa quos folia viridia, glabra, subrotunda, nervosa, uncias duas lata, paulò longiora, rarius ex singulis geniculis bina, sed ex quolibet geniculo vnum tantum, nullo

Descriptio

Mmm 3


certo ordine vel numero enascitur, quod antequam expendatur, fistulae instar caulem completur: flores in summo cauliculi, ex superiorum foliorum sinu, tenerrimis pedicellis subnixi, ex cauliculis oblongis, nonnihil hispidis prodeunt, Saponariae vulgaris formâ ex quinque foliis per oras crenatis commissi, qui colore albi sunt, leui carneo colore asperso, in quorum medio staminula quaedam exigua.

Gerardo Gentiana concava, Angl. *hol low felloort* or *Englisch Gentian*. Sed improprie à Gerardo Gentianam folio cōvoluto vocari concavam scribit in epist. ex Anglia ad nos Lobelius. C. Bauhin. phyt. in prod. (cuius descriptionem assumpsimus, ex missa ei icone concinnatam) dicitur Saponaria concava Anglica: item pin. vbi & Saponaria 2.

Locus & tempus.

Hæc Aetate media floret in Anglia, in Comitatus Northampton nemore quodam Sipanie dicto, auctore Gerardo.

GENTIANA MINOR, SEV VULGI Cruciata.



Descriptio

Reptant cum radice rami sesquipalmares, & dodrantales subrubentes: quos crebra ambiunt folia, bina semper aduersa, vel potius, vnum continuum ad genicula, tanquam vagina caulem inuoluens, cuius utrinque exit segmentum Gentianæ, sextuplò ferè minus, leue, pingue, amarum: flores in ramulis

extremis ex foliorum alis confert, caerulei, quinquepartiti: semen copiosum, minutum, oblongum, sulcum, insipidum, vasculis continetur oblongis bipartitis: folliculo membraneo obnoluto.

Bruticell. Herba fullonum. Com. Gentianæ Herbitorum altera species. Anguillare Cruciatâ in Apennino copiosa, nomine Gentianellæ. Gesnero hortor: Gentiana cruciata. Camer. hortor Gentiana media, siue Cruciatâ, libentius hortor aluescens: Eid. apud Matthiol. Gentiana minor. Et sic etiam ipsi Matthiol. Tabern. Gerardo, Lobel. Obs. pag. 166. Icon. Plant. pag. 309. & Adu. quibus & Cruciatâ recentiorum. H. Lugd. p. 129. Cruciatâ siue Gentiana minor Matthiol. Cast p. 203. *Floriam purp.* non Pettimborsa, sed Metimborsa vocanda. Et sic etiam pag. 154. Sed cur Durâncæ eandem plantam duobus locis tradit? Nonne hoc factum ignorantia stirpium? postremo enim loco sub titulo *Floriam purp.*, Cruciatâ & Pettimborsâ malè pingit Cruciatam stellatam.

Synonyma

Cruciata Fuchf. (cui & Gentianæ species) Matthiol. Lacun. Lon. & Eyst. Cruciatæ Gentianæ species Harch. Cruciatâ gentianella Thallio. Vincetoxicum alterum Cæsalp.

Hæc planta germanis vulgari vocabulo *Mos*

delagher & Creunmurs, quasi Radix cruciata Nominis (*γαυρόριος*) appellatur. Et hanc à radice ita dictam putant, sed folijs potius cruciatim cauli incumben- tibus nominis etymon debetur. A radice amara Bitterwurts. Radicem amaram, appellatis. Alij Saponariam & Isatin agriam, germ. *Seiffenfraut* & *Widweidfraut*, sed perperâ vocant. Qui Rhenum habitant Germani, *S. Petersfraut*, h. e. Herbam S. Petri: nonnulli propter vulnera quæ sanare dicitur, *Sperensstich* nominant: Alij *heil allen schaden*, quasi Chelidonium: Belgæ *Modesagher*: Angli *Grosse woort Gentian*. Intelleximus à sagis gallicè nominari *l'herbe du cry*. Ital. *Gentiana minore*: Boh. *Prostrelce forent*. Hieron. Braunsch. putat eam esse herbam, quæ Hebræis dicitur *Borith*.

Cruciatam dictam plantam, testimonio Matthioli, non parum cum Gentiana cognationem habere confirmatur. Ananienſa rura Cruciatam vulgò vocant *Pettimborsa*, sed corrupta Italica voce, pro *Metti in borsa*, quod ingentibus viisbus commenderetur, vt peris de ac gemma, crumenis afferuari mereatur: aut quodd tantum viribus excellat, vt Medici eâ viuentes ingentem argenti & auri copiam crumenis sint reposituri. Matthiolus in comm. lat. cum mag. fig. videtur nomen Pettimborsæ alteri Gentianæ tribuere. Ab Ungaris vocatur *zent lazlo*, *Araln sine*, h. e. S. Ladislai Regis herba.

Pettimborsa.

Metti in borsa.

Potius Gentianæ tertie vulgò Cruciatæ vocatæ (vt vocat) Clusius duas differentias obseruauit: vnam ramis humi procumbentibus & minorem: alteram firmis & erectis caulis, eamque maiorem: flores item alterius magis caerulei spectantur, atque illarum altera radicem in foramina sectam minime habet.

Differentia
duas Clusio.

C. Bauhin. qui in phyt. Gentianam quartam facit, & in pin. Gentianam pratensem i. & Gentianam cruciatam vocat, triplicem differentiam constituit. Vnam procumbentem & minorem: alteram erectam & maiorem: Et tertiam radicem non pertusâ.

Differentia
triplex
C. Bauh.

Nascuntur verò eæ per vniuersam Pannoniam cum in collibus, montibusq; apertis & gramineis, tum siccioribus pratis, & herbosis, secundum publicas vias, locis. Sed obseruatur etiam Viennæ Austriæ in pratis Dornacilibus, siluæ adiacentibus. Item prope Wernigerodam. Locis nō ita arduis, hæc Gentiana, multa & passim oritur, vti prope Basileam, & Macontum Burgundie Gallicæ, de presis collibus. Lobelio. In collibus & montibus, inquit Dodonæus, nec non in alijs incultis agris & alpeis locis (& secus itinera, Trag.) reperitur, & in Germania quidem frequenter. Septembri quiddē in Germaniæ agris, Iulio mense in Belgij hortis floret. Ego vid. florentem Basileæ extra portam S. Albani in colle Iunio & Iulio: mense Augusto prope Leurach, & in montibus Wasserfal. Genue mensis Februarij principio inueni in proximis montibus, vt Saleuz, cum reliquis foliorum & caulium præcedentis Aetatis.

Locus

Huius Radices recentioribus magnis laudibus vires & effertur contra pestilentiam & venenosorum animalium idus. Matthiolus quidem illud se experienuâ compertum habere scribit, quodd radicem rusâ, & ventri emplastri modo impositâ, vermes, qui in intestinis fuerint, procul dubio necentur: & vlcerate strumæ sanentur, si ijs eodem modo con. usâ, quæ nuper effusa sit, vel sicca & in puluerem contrita adhibeatur. In summa non

Temperam non defunt, qui afferant, hanc ea omnia præstare posse, quæ Gentiana. Cæterum amara & foliis est & radice; temperiem calidam & siccam obtinet: præstat quæcumque amara possunt. Pastores pecorum apud Mediomatiles mihi superstitionibus hanc plantam fardant (inquit Tragus, qui hanc plantam *zirdpa* esse existimat) nam vbi pectus porcorum ingreuerit, illius herham ac radicem minutim concisas cum aliis qui buldam pulueribus, in cibo ac potu exhibet, adiunctis quibusdam preculis, planè sibi persuadentes quotquot huiusmodi escas degustauerint porci, eos à pesti lentia tutos fore.

Superfluo.

GENTIANA FOLIO ASCLEPIADIS vulgò creditur.

Descriptio



Caules plures ex radice ad cubitum altos tollit, graciles, articulatos, quorum singulis iunctis bina ex aduerso posita folia adnascuntur, Asclepiadis foliis formâ & magnitudine, respondentia, quinque secundum longitudinem nervis: e quorum singulorum sinu flori nascitur v-nus, magnus,

oblongus, calathi formâ, quinque laciniis per extremum diuisus, cæruleus, totidem in medio staminibus: *Siliqua*, inquit Clusius subsequitur bicornis, quæ per maturitatem dehiscens, semen ostendit platum, paleaceum, colore cinereo, radix digitali crassitudine, lutea, multas oblongas eiusdem colapdisin latum spargit, singulis annis augescens, & noua germina proferens, gustu impensè amaro. In nostra icone male picta radix.

Item.

Gentiana folio Asclepiadis.

Gentiana. Gentianæ species foliis ferè Asclepiadis [Hirundinariæ Simler. de Alpib.] floribus cæruleis. Item, hort. Gentiana foliis Hirundinariæ seu Asclepiadis quorundam (Sistimur) Echelutifrant: quæ copiosa ubique apud Tigures locis montanis circa semitas, alibi que apparet.

Gent. spec.

Arct. in deser. mont. Stockhornij & Nelli, *Quemur* puer, caulem habens flores, Campanulæ figura: foliis Asclepiadem referens: caule tubescens: radice bifida, lutea, longâ, amarâ: semine compresso: Gen. a. x. species.

Gent. minor.

Dodon. lat. in dñl. Cruciatæ siue Gentianæ minoris species Gineu & Tragi, foliis Hirundinariæ, nonibus confusa: in Germania secus semitas. Veluti Dodonæum indicasse, vbi Tragus Gentianæ folio Hirundinariæ meminerit, Gentianam potius eam, in Germania secus semitas obferre non memini, sed neque confarctos flores obseruavi. Vereor ne Dodonæus diuersas plantas confundat.

Tom. III.

C. Bauh. pin. Gentiana alpina maior 4. siue Asclepiadis folio (sic etiam cognominatur in synon. phyt. vbi sexto loco ponitur) Gentiana 3. Tragi, & Dodon. gall. Gentiana 2. Clusij Tabern. Gentiana minor alcea Dodon. lat. Vincetoxicum primum Cæsalpini. Quicquid dicat C. Bauhinus, ex sententia etiam Clusij & Dodonæi, hanc apud Tragum non comperio. Est ea mihi alia.

Copiosè in Pannonia, Sciria, Austriaque inferiori re prouerit ad montium radices, vmbrosis collibus, nusquam verò in summis & apertis iugis in hæzicis montibus Schlickius Medicus eruit. Fl. ret Augusto: semen maturefcit Septembri. Fertilis hæc est, nec interquiescit, sed singulis annis, vetustior videlicet, multos caules floribus onustos producit. Peritua autem est, & ferè in iugiora loca respuit, interdum tamen curâ & del gentiâ effecti Clusius, vt in hortis comprehenderet, & singulis annis repullularet & flores ferret: attamen quatinus aëre & pabulo priuata, atque tanquam compedibus vincta, lugere videbatur, ac pristinè vigeris & elegantiz plurimum amittere.

De Vincetoxico Mathæus Sylo, scribit valere contra venenum: ingredi in Theriacam Diatellaron, quasi hæc pro Gentiana accipiat. Nam vt Cæsalpinus monet, apud Mesuem & reliquos authores non Vincetoxicum legitur, sed Gentiana. Celebrantur radices huius in febribus pestilentibus, & ad vermes enecandos singulari temedio. Sclauonici rustici, huius radice decoctum feliciter calculosis propinari, experimento se comperit habere affirmant. Aretius & Iosias Siml. tradunt eâ pastores vt ad vbera vacarum, si à muribus, araneis, aut aliis venenatis bestis lædantur, curanda. Amara & hæc foliis & radice est; temperie calida & sicca.

Locus.

Tempus.

Vires & Vfus.

GENTIANA ALPINA MAGNO FLORE.



Graciles habet radices, longiusculas, plures coherentes, flauescens, propagines ex lateribus producentes. Folia humi fusa in orbem, crebra, duplò triplove Hippit maiora, vnicis duabus interdum longiora, semunciam aut vnciam ferè lata, in acumen delincentia, crassiuscula.

Descriptio.

vnico nonnunquam, aliàs tribus per longum nervis donata, amara: pediculi vnciales, binis ex aduerso positis foliis ornati, ex calyce dimidio breuiore, quàm Hippio, florum emicantem sustinent magnum, Violæ Marianæ patem, calathoeide, duarum, triumve vnciarum longitu-

ne, unifolium per oras supremas in quinque laciniis diuisum, quarum spatia intercedit appendix, auriculæ instar, continua: color foris ex albo subcæruleus, laciniarum tamen spatia cærulea sunt: qui color vegetior & cyaneus hilaris laciniis intrinsecus tingit, penitus autem si intrucare, striis picturatis ad fundum usque ex cæruleo purpureis, aspersis, hinc inde eiusdem coloris punctulis: è fundo emergit turbinatus stylus, angulosus, puluisculo lateo-circiter circumspersus, in summo tandem cacumine bifidus florem, teste Clusio, consequitur oblongum acuminatum capitulum, quod sese in duas æquales partes aperiens, semen ostendit exiguum, striatum terrei coloris.

Synonyma

Trago Gentiana postrema, siue quarta. Gesn. horto Gentianula, siue Gentianella alpina: Et cat. Gentianella pumila. Arct. Gentiana 4. minima. Clus. Pann. p. 284. & 285. itemque in Histor. post. Gentianella 5. siue Gentianella maior verna. Lob. in Adu. pag. 110. Gentianella.

Amato addita est figura Dalechampij, in sine posita pro Elleborine. An autem Amatus hanc intellexerit, ignoro, quia à se visam in horto Magnifici Azafoli Ferrariensis, Epipactim non describit. Hist. Lugd. p. 828. inscribit Gentianellam minimam latifoliam, atque quorundam esse Helleborinem, siue Epipactim, posse verò & Thylactim maiorem dici: Allobroges *Repires* nominare.

C. Bauh. III.

C. Bauhin. Gentiana 15. siue Gentianella alpina angustifolia magno flore: Item Gentiana 16. siue Gentianella Alpina latifolia magno flore. Has diuersas esse plantas perperam statuit Frater.

Locus & Tempus.


Crescit in Schneeberg & Etscher abundantissime, atque alibiq; alpibus continuâ serie productis, perpetuâque quasi niue obsitis: ubi Iunio & Iulio h. e. primo istic Vere, floret: sub Iulij verò finem & Augusto semen maturitatem adipiscitur: at mitioribus locis, in quibus authore Clusio, rarius inuenitur, atque in hortos translata, Aprili & Maio. Inueni ego in monte Rhætorum Septimo dicto florentem Iunio. In altissimis Diocæsibus Curialis alpibus in tractu prope Cœnobium *Repires*: appellatum, quo loco thetine sunt decantatissima, primum Trago sese obtulit. Lobellus in Patauinis collibus & decliuibus, ubi viperæ capi solita sunt, obseruauit. Hist. Lugd. crescit in aridis, niuosis, persaritis, montosis: floret mense Aprili.

Amarissimus est totius plantæ sapor, ideoque locinoris vitis nempè regio morbo, & obstructionibus auxiliatur, pari cum Gentiana facultate, cui amaritudine non cadit.

GENTIANÆ SPECIES, CALATHIANA quibuldam radice perpetua siue palustris.

VDos amar pratorum margines, singulari, aliis multiplici supra cubitalem altitudinē, recto caule assurgens, per quem æqualibus spaciis aduersa concidunt folia, palmari nonnunquam altitudine, culmum lata, superius atrouerentia, inferne dilutiora, è quorum sinu à medio ferè caule, summo tenus, flores ita singulares, iam duo, aut plures, cærulei, quinquepartiti, calathiforma, Gentianellæ Helueticæ pares, vel etiam minores: radices plures longæ, luteæ, amaræ, quæ non bene exprimentur in nostra Fuchiana figura, quæ causa cur aliam pingi iusserimus.

Description.



Trago Gentianæ tertia species radice longa & admodum amara, cauliculis tenuibus, teretibusque, foliis acutis, angustis. Campanulæ, oblongis, cæruleis.

Matthiolum in prior. commemorat duarum Gentianarum minorum, quibus in comm. It. cum mag. fig. tribuit radices albas, figuram vnam tantum exhibens, titulo Gentianæ minimæ. In Lat. adscribit caules humi plerumque accubantes, vocatque Ananiensum rurum genus vltimum Pettimborla vulgò dictum. Considerant autem lectores an fuerit ritè nota hæc Gentianula Matthiolo, describens radices albas, & caulibus humi accumbentibus.

An in figura folia non sint penè maiora, quam in ipsa herba, licet graphicè descriptam dicant Aduersaria. Figura Gesneri melius mihi placet. In com. lat. cum mag. fig. circa nomen Pettimborla sibi contradicere videtur, id enim nomen olim Cruciatæ tribuebat.

Figuram habet Cast. Dur. p. 204. pro Gentiana minima, Italicè Gentianella & Pettimborla vocata, flore ex cæruleo purpureo, quæ representat aliquatenus Violam Calathianam.

Dod. gall. lib. 2. cap. 17. Calathiana Viola, Calathiana Plinij, & Viola autumnalis, *Prolesse d'Aut.* Viola Dod. *Belgis blau lilien*, & *Sinient schoon*. Eid. lib. 4. ca. 12. Gentiana tertia, sine iconè. Idem de Flor. ait vulgò apud Belgas nomen non habere, esse tamen qui cæruleum Liliū nuncupant.

Gesn. hort. Calathiana Viola autumnalis, amara, humidioribus pratis pronens, profundioribus radiculis, cærulei coloris saturati flore: Gentianæ genus. Item, Gentianæ species pulchra, Pictis dicta Kreichio, fortè Plinij Calathianæ species, Dodonæo propter floris figuram, Calathiana vocata. Sed ne Gesnero, nec Dodonæo assentiri possim, Gentianæ enim minori, quam pictura exhibet Dodon. & Gesnerus pro Pennanthe

monanthe, radices non sunt annuæ, quales dicit Cordus esse Pneumonanthes. An Gesn. coll. Calathianæ, autumnales Violæ cæruleæ, ex quarum genere Perilium florem Plinii dixerit, radicibus amarissimis? An rursus, Gentiana palustris, florens Augusto medicæ & sine.

Pneumom.
Cord. Lob. Pneumonanthe [sic in Icon. Plant. Lobelius p. 309.] Cordi, Gentianæ minoris species [Calathiana Viola Plinii Dodon. additur in Obs. pag. 166.] Germ. *Wangen blum*. Cruciatæ similis, aut eadem, quæ in pratis etiam montosis oritur, foliis angustioribus, minoribus, flore cæruleo, Calathi modo, radice fibrosâ, nequaquam incisâ: à Matthiolo graphicè descripta. Nam duntaxat, & huic similem sed floribus albis alii hortus professoris in Academia Louanienſi Petri Brughelii. *Lob. notat.* *Iam autè* diximus, Pneumonanthen Cordi differre à Matthioli Gentiana minore & à Calathiana Dodonæi. Præterea, tantam similitudinem haud animaduertimus cum Cruciatâ, quantum perhibet Lobelius.

Gentianæ quartæ siue angustifoliæ procul dubio genus est illa, quæ à Dodonæo Campanula autumnalis nominatur, & quod Augusto floreat atque Autumno, à Ruellio Calathiana Viola appellata est, à Cordo Pneumonanthe: Miror Clusium cum aliis eandem facere istam Calathianâ cum Pneumonanthe Cordi multum differente.

Gesn. Lugd. 3.
icones. H. Lugd. huius plantæ tres figuras habet: p. 824. Calathiana Viola. Item, Campanula pratensis: pag. 1259. Cruciatâ siue Gentiana minima Matthioli.

Gentia. palustris Tabern. Gentianella palustris, de qua hoc loco agimus, proponitur à Gerardo & Tabern. pro Pneumonanthe. Thallio dicitur Viola Calathiana tertiam.

C. B. not. C. Bauh. phyt. Gentiana 7. siue palustris: Apud Matth. Gentiana minima Matth. & Castoris, quoad descriptionem, non iconem, Viola Calathiana 1. Thalii, Pneumonanthe humentium ericetorum Lobelii. Non mihi verò videtur Violam Calathianam Thalii secundam cum hac convenire: Pneumonanthen ericetorum Lobelii suspicor esse Gentianellam quadrifolio flore. Eid. pin. Gentianella palustris 1. siue angustifolia, flore cæruleo, violaceo, & purpureo.


Locus & Tempus. In Ducatûs Vvircembergici loco humido circa Aichelberg observari florentem Septembri: Lob. in Pedemontanis pratis prope Susam & Rioli multam testatur. Reperit Dodonæus in pratis, frequenter in aliis incultis, & iisdem quibus Erica humidioribus locis. Clusio auctore crescit in Austriæ pratis ad montium radices sitis, Floret Augusto. Aliquoties à Gesnero fuit plantata, paulò post tamen periiit. Quamvis autem radix ei non simplex sit, locum tamen desiderat palustrem.

Virib. Cruc. Viribus iisdem quibus Cruciatam præditam ait Matthiolus. Dodonæus qualitate calidam statuit, Gentianæ facultate quodammodò similè, multò tamen imbecilliorern. Efficax à recentioribus aduersus pestilentes morbos habetur, & ad virulentorum animalium morsus & ictus. Alii præclaras ei vires in sanandis pulmonum affectionibus ac hepatis adscribunt.

GENTIANULA LANVGINE AD SINGV-
lorum foliorum floris laciniis donata,
flore quadripartito.

Descriptio **R**adix tenuis quasi repens, albida, amara: caules sæpè singulares, aliquando plures, Tom. III.

dodrantales & minores, quadranguli, in ramos aliquot diuisi: filia ex aduerso posita ad nodos oriuntur, inferiora quidem vnciâ breuiora, superiora verò longiora, culmum lata, nervo unico



secundum longitudinem decurrente: floris in vniuersumque ramuli extremo singularis, calathi formâ, longus, colore cæruleo, in quatuor partes duntaxat profundas diuisus, non mucronatus sed rotundas modicè & crenatus, quarum latera utrinque barbiculis donata cæruleo, nec ullam

habent ad imum laciniae intrinsecus lanuginem; medium occupant apices quatuor obsoleto minio tincti, staminibus albidis insidentibus, nec non calycis vasculum longum quadrangulum in duos apices albicantes desinens, in quo semen continetur minutissimum, puluerulentum, ad instar Orobanthes, aut Helleborines: ex radice Autumno evulsa, præter floriferos caules, oculi in sequentis anni germinationem apparebant. In tota planta gustu nullum saporem percipio præter paucam amaritudinem in foliis.

An Dodon. in fol. lat. Campanula autumnalis, in ericastris tenuior ac minor? Thallius vocat Violam Calathianam seu autumnalem primam. Gesn. hort. Calathiana Viola autumnalis alia minor, flore dilutiori, radice inutili. An eid. coll. stirp. Gentiana pumila flosculo cæruleo, radiculis albis? An Camer. hort. Gentianella pratensis Bauarica minutissima, Autumno florens? An Lob. Obs. p. 166. Gentianella siue Pneumonathes varietas, strigosior tota, humentium Brabantiae ericetorum? An Clusio in Pann. p. 284. & Hist. post. Gentianæ quartæ, siue angustifoliæ varietas?

C. Bauh. phyt. Gentiana 8. siue angustifolia autumnalis, Pneumonanthe Cordi & Lob. Calathiana Viola autumnalis minor Gesn. flore cæruleo, dilutiore, nigro, rariùs albo. Apud Matthioli. Gentiana minor Matthioli, quoad descriptionem: Calathiana Viola Lugd. Dodon. in 8. Campanula autumnalis in fol. Viola Calathiana siue autumnalis Thal. Gentiana angustifolia 2. Clusio. Ego separo Gesner. Calathianam minorem à Pneumonathæ, nec ei tribuo colorem nigrum, ac miror neminem annotasse, flore esse quadrifolio tantum.

C. Bauh. pm. Gentiana pratensis 6. siue angustifolia autumnalis maior, Pneumonanthe Lob. Calathiana Viola autumnalis minor Gesn. hort. Calathiana autumnalis Gesner. cat. Campanula autumnalis Dodon. Eyst. Gentiana 4. siue angustifolia 2. Clus. Pannon. & Hist. flore cæruleo dilutiore: est nigro: rariùs albo. Item, Gentiana pratensis 7. siue angustifolia autumnalis minor floribus ad latera pilosis, Pneumonanthe Cordi Hist. def. Ad. Viola Calathiana Num

Viola Calathiana Thal.

C. Bauhin.
notat.
Locus &
Tempus.

autumnalis prima, Thal. Gentianella autumnalis foliis Cœtaureæ minoris flore cœruleo, Eyst. C. Bauhin. hic separat, quæ in phyt. coniunxerat. Gentianulam quadrifolio flore vidi eundo Montbelgardo à l'isle, vbi ultra Montenoy iuxta dumeta floret Octobri. Inter Vauiaucourt & Dampierre supra fontem in colle Septembri. Itē prope Blaumontium, S. Hippolytū & Basileā, in monte Moutets in pratis descendendo ad sinistra versus Augustam. In Hausbergo lenæ creberimè legit Thalius.

GENTIANA ANNUA CLVSII I. FLORE ex cœruleo purpureo exiguo.

Descriptio.

Caulicalem habet caulem, firmum, geniculatum: per quem ad singulos nodos sparsa sunt bina semper folia, sibi ex aduerso opposita, trineruia, latā sede & sine pediculo cauli inhaerentia: sensimque in longum mucronem desinentia: ab imo ferè caule ex foliorum alis nascuntur dodrantales & palmares ramuli, tenues, minoribus foliis septi quinos, septenos aut plures flores foliis cinctos, proferentes, in quinque mucronatas lacinias diuisos, exiguos pro plantæ magnitudine, purpurascens ex cœruleo coloris: iis succedunt longa & angusta vascula, tenui semine plena: radix lingularis est, exigua, paucissimis fibris prædita.

Synonima.

Clus. pann. & Hist. Gentiana fugax siue annua, vel Gentiana septima, & Tab.

C. Bauh. phyt. Gentiana 10 siue pratensis folio quasi triangulo: Eid. pin. Gentiana pratensis 2. siue autumnalis ramosa, Viola Calathiana altera siue polyanthemus Thalii, Gentianella multiflora autumnalis è cœruleo purpurascens, Eyst. flore rariùs candido. Nos referimus Thalii Violā, ad Gentianam fugacem 2. Clusij.

Vires &
vires.

Nascitur in pratis herbidiisque locis ad montium radices sitis, montiumque cliuis, Iulio & Augusto flores proferens.


GENTIANELLÆ SPECIES QVIBUSDAM, An Cordo Pneumonanthæ, aut Gentiana fugax altera Clusij?

Descriptio



Enico, est rutilum vbi pluribus donatur caulibus, vix vniā altioribus, vel dodrantalibus, ac etiam interdum cubitalibus, angulosis, ex viridi saturatè rubentibus, fractu contumacibus & multum ramosis: folia, infima quidem ex angusto principio principio sensim dilatantur, superiora verò latiore principio caulibus adnascuntur

ra verò latiore principio caulibus adnascuntur



paullatimque in mucronem acutum faciesunt obscure virentia, & in atrum nonnūquam vergentia, nervis aliquot secundum longitudinem donata, sapore subamaro, ortu opposito: flores ex foliorum alis, itēque in ramulorum extremis copiosi, purpurascens, calathiformā, fescunciam circiter longi, in quin-

que semunciales mucronatas lacinias abeunt, quarum singulis internā parte (non ad latera) pili, barbulae purpurascens adnatæ, quarum coitus tubulo inclusa quinque stamina cum stylo viridante occultat: sunt autem sapore luculentius amaro quā folia, non sine acrimonia, calyx longus semen continet rotundum, Papaveris semine minus: radix subest lignosa, dura, modò vnica fibrata, modò plures. Annua est herba.

Fuschius, cum Tubingæ degerem, vocabat Gentianam cœruleam quartam. An Cordo hist. Pneumonanthæ, i. e. Lu. gentium? An Arret. Kallers. his? An Clus. pann. pag. 189 & 296. itēque hist. Gentiana 8. siue fugax, aut annua altera?

Gesn. hort. Calathiana Viola autumnalis tertia, Gentianæ genus, radice inutuli, calathis florum puniceis, multis, confarctisque: subacris.

Thal. Viola calathiana altera, seu πολυανθεμος, floribus coloris ex pallidiore cœruleo subrubentis veluti leniter, odoris nauseosi seu virosi. Rariùs flore prorsus candido.

C. Bauhin. phyt. Gentiana nona. Eid. pin. Gentiana pratensis 3. siue flore lanuginoso: Gentiana 8. siue fugax altera Clusij. Fortè Frater non intelligit eandem, quam nos: quia Violam calathianam πολυανθεμος, ad aliam Clusij refert, nempe fugacem primam.

In Alpibus Rhæticis, & montibus Genœ propinquis, itēque Basileæ in pratis, floret Augusto & Septembri. Montbelgardi abundat supra la Crote, & circa Blaumontium, passim locis cliuosis sub Autumno.

Locus &
Tempus.

Gentianella fugax tertia Clusij, flore virenti & subcœruleo, breuiore & maiore,

Pari fermè excrefcit altitudine, nec minùs frequentibus ramis est prædita: caulis etiam quadrangulus, terni aut plures in singulis ramis flores superiori similes, sed breuiore, amplioremque virentis initio coloris, deinde subcœrulei: quibus longa cornicula seu mucronata membranacea vascula semine plena, vt in superiore succedunt: folia in singulis nodis multò latiora, mucronata, trineruia, ex aduerso inter se sita, viridis satuti & quodammodò nigricantis coloris: radix superiori similis, inquit descriptionis author Clusius, qui Gentianam 9. siue fugacem aut annuam tertiam, impensè amaram cognominat.

Descriptio.

C. Bauh. phyt. Gentianam 11. vocat. Idem pin. Gentianam

Locus &
Tempus.

Gentianam prat. 4. siue flore breuiore & maiore.
Obuia hæc est in omnibus pratis in sublimi-
sitis, & montium iugis, floretque Augusto.

GENTIANELLA FVGAX QVARTA CLV.
sui flore dilutè purpurascēte & cæ-
ruleo elegantissimo.

Descriptio.

D Odrantem non superat, *canticulis* & ra-
mulis exilibus, minoribus etiam foliis, Cē-
taurij minoris
flori penè pari-
ribus: *florēs*
minores habet,
licet formā su-
perioribus non
abfimilis, qui
aut dilutè pur-
purascunt, aut
cærulei coloris
elegantissimi
sunt: cornicu-
la subflauo e-
xili *semine* ple-
na sunt: *radix*
licet tenuior, à
duabus præce-
dentibus non
valdè differt,
autore Clusio,
cui dicitur Gē-
tiana 10. siue
fugax aut an-
nua quarta. Ei similis videtur, quam Lobelius
Gentianæ minimæ nomine describit.



Gent. fugax.
4. Clus.

Synon.

An Lob. in Adu. Gentiana minima, omnium
speciosissima, in montibus arduis fruticans.

C. Bauh. phyt. Gentiana 17. Eid. pin. Gen-
tiana alpina minor 6. siue Gentianella breui foli-
o: Gentiana minima Lob. Cost. cui & Vulne-
raria herba, in Icon. p. 485. Sed figura Lobelij
demonstrat non eandem, nec æmulam floribus.

Crescit iisdem quibus altera locis: meminit
Clusius & in Britannia observare, non procul
Douera, mense Septembri, partim dilutiore co-
lore florentem, partim semine prægnantem.

Locus &
Tempus.

GENTIANELLA FVGAX QVINTA
Clusij flore cæruleo colore ele-
gantissimo.

Descriptio



L Ongèxi-
lior [quā
quarta fugax]
vix trium vñ-
ciarum altitu-
dinem æquat,
licet multisa-
lis prædita:
foliola Cen-
taurij mino-
ris in singulis
geniculis, a-
liarum more
sita habet:
florēs minori
Gentianellæ
vernæ persi-
miles venu-
stissimo cæru-
leo colore
præditos: cor-

nicula qualia superior, admodum exili & ni-
gro *semine* plena: *radicem* quā in superioribus
minorem, sed frequentioribus fibris donatam.
Impensè amara est.

Gentianam hanc suam 11. siue fugacem aut Synon.
annuam quintam, Clusius eam suspicatur, quam
Simlerus comm. de Alpibus, *himmlstengel* ap-
pellat. In tabula proposita minor icon vide-
tur conuenire posse cum Gentiana dicta Clusij.
An autem sit Aretij *himmlstengel*, pusilla her-
ba, floribus cæruleis, radice amara, ambigo.

C Bauh. phyt. facit Gentianam 12. Idem pin.
Gentianam alpinam minorem 5. siue Gentianel-
lam alpinam æstiuam Centauræ minoris foliis,
Gentianam minorem Tab. Calathianam vern-
nam Dalechampij, Hist. Lugd. pag. 825. quæ
nobis est diuersa.

Floret in Erscheri iugis Augusti initio.

Locus.

GENTIANELLIS AFFINIS, CALATHIA-
na vernæ Dalechampij, cum albis
staminibus.

R Adice donatur breui, gracili, candidâ parum
fibratâ: *caule* singulari, palmum alto, no-
doso: *foliis* paucis, Centaurio minori similibus,
paulò longioribus, binis semper caulem ex ad-
uerso complectentibus, veluti cauo alarum sinu,
Anagallidis modo, ex interiore sinu pediculus
vnus, interdum geminus prodit, *florē* sustinens,
calathio, vel folliculo similem, è cæruleo purpu-
rascentem, albis intus staminibus.

Descriptio.

Ex Dalechampio Calathianam vernam voca-
uit H. Lugd. & Thylacitin à floris figura, *624*
vor, i.e. saccum, culcum, folliculūve referen-
te. Similitudinem autem aliquam habet cum
Gentianella fugace quinta Clusij

In pratis editissimorum iugorum Iuræ mon-
tis pronenit: floret Maio & Iunio mensibus.

Locus.

GENTIANVLA QVÆ HIPPION.
C A P. XV.

T Otum ob-
umbrat cę-
spitem pulchel-
la ista petennis
herba, fibris
hinc inde re-
ptandibus fœ-
cunda, *foliis* pet-
terram sparsis,
interdum Len-
ticulæ non ma-
ioribus, inter-
dum semuncia-
libus aut lon-
gioribus, ner-
uosis: *pediculi*
surgunt vñcia-
les aut paulò
maiores, vno
aut altero fo-
liolorum pari
vestiti, quorum

Descriptio



vnique *florēs* insidet vnus, vñcialis aut lescun-
cialis, calathio angustò è calyce pinnato exilien-
te, multò minore quam Gentianellæ Helueticæ,
oris cæruleis amœnis quinquepartitis. *Semen*
(inquit Clusius) exile, durum, rotundum.

Nnn 2

Hippion
Cordo.

Cordo Obs. fl. Hippion i. e. Viola equina, Leucoio æquales flores habens in quadrantali pediculo, cæruleos, pulcherrimos, profundo colore.

Calath.
Verna.

Gesn. hort. Calathiana verna, Violæ genus equinum à Suevis cognominatum, Hippion Cordi, Gentianella dulcis. Item, Viola Hippion à Cordo cognominata, diuersi generis herba à Gentiana, carens amaritudine. Rursum, Viola equina Suevis dicta. Demum, de coll. Calathiana verna, Brendelblümle / Blaw Jündchers blum.

Clus. pann. & Hist. Gentiana 6. siue (vt etiam in Hisp.) Gentianella verna minor. Lob. Obs. p. 67. Gentianella alpina, verna Clusij, Cantabrica quorundam (sic etiam in Icon. Plant. pag. 310. inscribitur) folio, ortu & gustu Centaurei lutei.

C. Bauhin.
nos.

Tab. Gentianella. Ger. Gentianella alpina.

C. Bauhin. phyt. Gentiana 13. Item, Gentiana 14. siue Gentianella alpina verna minor Clusij. & Gentiana angustifolia Hist. Lugdunensis. Nos vnam statuimus plantam cum Lugdunensi, & nō duas cum Fratre, qui se diuersas habere ait, & Lugdunensis & Clusij figuræ respondentes. Correxerit autem in pin. errorem in phytopinace commillum.

Locus &
Tempus.

Aliquot à Genens miliaribus in monte Thuri iuueni florentem mense Iunio: in Rhætiæ verò monte Braulio, Iulio. Celsis montium iugis gaudere, & Vere florere perhibet Lobelius: Nasci in pratis inter Vlmam & Augustam, Cordus. Pratorum humidiorum herbam annuam adstruit Gesnerus: in hortis facile nasci aut durare: cum cespite plantatam Vere per Æstatem manere. In Cantabris & Pyrenæis hanc primū obseruabat Clusius, ad angustias illius petfossi montis, quem Hispanorum vulgus D. Adriani portum nuncupat, initio Maij florentem, deinde prouenientem in celsissimis Schneeberg, Schnealben, Etscher & Durrentlein iugis herbido solo, ubi sub Iunij finem floret: at mitioribus vicinis collibus & siccioribus pratis, Maio, semēque sub extremum Iunium profert. Omnem culturam respicere videtur.

Vires.

Eadem huic vis & facultas, quæ Gentianæ alpinæ magno flore: ad colicos enim dolores, ad tormina, regium morbum, & cachexiam à rusticis laudatur.

Gentianella omnium minima C. Bauh.

Descriptio.

Ex radicle oblonga, tenui, albicante, foliola oblonga, angusta, viridia, plurima simul instar capitis coniuncta, prodeunt, inter quæ pedicelli breuissimi [tota enim planta, radice excepta ad vnciam non excedit] quibus singulis flosculus, pro plantulæ ratione magnus, pallidè cæruleis staminulis donatus, calyculo inclusus, insidet. Hæc Gentianella 2. siue omnium minima, vel, vt in pin. vocatur, Gentiana alpina minor 8. nisi summè amara esset, Muscus aliquis floridus censeretur, inquit author. In summis Alpium Helueticarum iugis reperitur.

Synonima.

Locus.

GENTIANA PUNCTATO FLORE

subcæruleo Pennzi.

CAP. XVI.

Descriptio.

Antem habet geniculatum, cubitalem, supra radicem aliquantulum tubentem, folia Gentianæ similia, ex intervallis bina, sed multo mi-

nora, venosa, quorum inferiora maiora sunt & longiora, pediculos rubentes habentia, superiora verò cauli sine pediculis adhærent, eūque ferè amplectuntur: à medio penè caule è foliorum caulis oriuntur flores pentaphylli, striati, vtrinque tres, rariùs bini, nisi circa lummum caulem, quinque subcæruleis constantes, nigricantibusque punctis elegantissimè notati [vnde nomē] quinque staminibus, quorum apices lutei, præditi: floribus succedunt vascula cum seminibus Gentianæ similia, sed minora: radix parua, multis fibris prædita, ex sulco lutea.

Tabern. Gentianam 7. Clusij vocat, non animaduertens apud Clusium errorem typographicum, numerum sc. septenarium (vu.) pro duodecimo (xii.) poni.

Tab. vii.

C. Bauhin. phyt. Gentiana 5. siue flore subcæruleo punctis nigris notato: Eid. pin. Gentiana palustris 2. siue latifolia flore punctato, Aliana folio glabro phytopinacis: floribus subcæruleis, purpureis, & violaceis, punctis alperis. An Aljma hoc huc sit referendum, dubitatur.

Locus &
Tempus.

Prouenit copiosè in Bokemuto Suitensium monte: floret Augusto. Ex radicis pictura coniecturam fecit Clusius, semine maturo planè perire, eoque deciduo renasci.

POLYGONATVM VETERIBVS.
CAP. XVII.

Polygonatum (πολύγονον) Dioscoridi in montibus nascitur, frutex cubito altior foliis Lauri latioribus & læuoribus, sapore quodammodo malum Coronzum, aut Puniceum redolentibus, siquidem gustanti astrictum saporem respiciunt: flores autem per singulos foliorum exortus promit candidos, foliolis ipsis numerosiores, incepta à radice supputatione: radicem verò habet albam, mollem, longam, crebris nodis ceu geniculis cinctam, densam, graecolentem, ac digitali crassitudine, quæ vulneribus efficaciter imponitur, ac maculas etiam in facie delet.

Descriptio.

Galeno Polygonatum mixtæ facultatis & qualitatis. Habet enim quid astrictiōis, & acrimoniæ, & amaritudinis, & cuiusdam inexplicabilis iniucunditatis. Eapropter neque in multo vsu est, sed eo solum quod radicem quidam vulneribus imponunt. Sunt & qui maculas in facie per ipsum deterunt.

Galien.

Inter Polygoni genera, quæ à Plinio plura, ex aliquorum historia numerantur, Polygonatos hæc refertur, Marcello tamen toto genere differre hæc ab illa videtur. Iacet enim (quod præcipuum inter eas discrimen est) & Graminis modo per terram spargitur Polygonum, Polygonatum autem cubitali & ferè semper prociore caule erigitur. Quod quantum Polygoni genus sylvestre Plinius facit, cum hoc Dioscoridis Polygonato nulla parte consentit, quàm quod Mali Coronei saporem & spissandi naturam habet. Itaque aliud illud ab hoc esse minimè dubitandum putat etiam Cornarius.

Licet autem Dioscor. vnus tantum Polygonati meminerit, attamen Recentiores, sequentes differentes plantas eo nomine donant. Polygonatum Dioscoridis quod quidam esse dicunt Siggillum Salomonis: Sed nescit Tragus quo pacto esse possit, dubitatque Anguillara. Polygonatum maius, vulgari simile. Polygonatum floribus ex singularibus pediculis. Polygonatum cum singularibus floribus, prope Basileam. Polygonatum

Æquidoca.

Polygonatum amplitudinis foliorum Ellebori albi. Polygonatum ramosum latifolium. Polygonatum angustifolium. Polygonatum ramosum angustifolium. Liliū conuallium (Heroldus & Alois.) Been album. Ocimoides [Tragus.]

POLYGONATVM, VVLGO SIGILLVM Salomonis.

CAP. XVIII.

Descriptio.

Summo capite transuersa vagatur Polyg. radix, digiti crassitudine, pyxidata commissurâ inæqualis & tuberosa, cādore marmoreo, dēso fibrarū agmine capillata, sapore subdulci: *caules* cubitales & sesquicubitales, teretes, odore si frangantur, dissecantūre, nauseoso: in quibus alternatim disposita sunt *folia*, Liliū conuallium, necuosa, superne in atro virore splendentia, inferne cælia: ex



quorum alis *floris* exeunt ex pediculo semunciali aut vnciali, in pedicellos breues subinde subdiuio, singulares, bini, terni, cylindracei, albi, oris herbidis, in sena segmenta diuisis, quibus rotidem adnascuntur apices crocei, stylo albo intus vnâ cum apicibus latente: hisce deudentibus bacce

oriuntur virentes, mox glaucæ, corymbis hederaceis pares, aut paulo etiam maiores, tribus zonulis à summo ad imum pictæ, in quibus *semina* sena vel septena, dura, magnitudine Viciz.

Sigillum Salomonis dicitur Brunfels. tom. 3. rhaps. 32. & in 4. pag. 146. Ioan. Agricola & Eut. Cordo. Sigillum Salomonis latifolium Trago. Polygonatum Matth. Turn. Cordo in Diosc. & hist. Lonic. Lac. Cast. Lob. in obs. p. 361. Icon. Plant. p. 631. & Wirsung. Polygonatum vulgare Gesn. hort. & Camer. hort. Is ad Historiam Matthioli ger. & Epit. ponit duas figuras (1. Polygonati titulo, cui adscribit baccas rubentes & quandoque purpureas. Secundam inscribit Polygonatum vulgare, baccis nigris,) quæ an diuersarum specierum, iudicent lectores, perpendantque an cultura & situs mutationem non faciant.

Polygonatum vulgare omnibus provinciis familiare, Clusio. Polyg. maius Lob. in Aduers. Polygon. latifolium Fuchs. Dodon. gall. & Tabern. Polygon. maius seu vulgare aut latifolium Thallio. C. Bauh. pin. Polygonatum 1. (3. phyt.) siue latifolium vulgare, Polygon. vulgare Eyst. Polygon. 1. Gerard. Fraxinella Anguillar. & Cæsalpini. Variat baccis rubentibus, purpureis, quandoque nigris, vt Camer. in Epit. monet.

Græci *παραδισα*, Latini similiter Polygona Tom. III.

tum appellant, quæ radix crebrò geniculata sit. Officina vulgò Sigillum Salomonis, haud dubiè à vestigiis, radici sigilli instar impressis. Germani *weisswurz* / h. e. Albam radicem & *Helmswurz*: Belgæ *Salomons seel*: Galli *Siguet ou Sean de Salomon*: Itali *Gimochietto*: Hetrusci *Fraxinella* & *Fraxinella*: alij Geniculatam aut Genicellam: Angli *Scala cely* / & *whitewurt*. Hung. *Salomon pöcheti*.

In syluis, locis vmbrosis & iuxta margines nascitur, necmodò in mōtosis, sed & in planis. Maio ac Iunio flores, Augusto fructus colligi possunt.

Hodie quoq; mulieres Sigillo Salomonis sibi faciem extergunt & fucant, vt planè nullum sit dubium, quin Polygonatum esse constanter credamus, inquit Fuchsius. Matthiolus è Polygonati radicibus aquam elici refert, quæ ad faciem abstergendam mulieres italæ vtantur. Quidam tamen radicem crematam factò lixiuio ad eundem vsum exhibent. Agricola aquam distillatam concretum sanguinem inter cutim & carnè discutere asserit, si in ea intinctus pannus imponatur, sique nxi totius corporis ex ea lauentur, delere posse.

Locus & Tempus

Vires & vltus.

POLYGONATVM MAIVS VVLGARI simile.

Polygonatum vulgari planè simile, nisi quòd in duplò maiorem excrescit altitudinē, crassioresque habet *radices* & *caules*, ampliora *folia*, longè plures *floris*, maioresque *baccas*.

Clus. pann. p. 263. Polygonatum maius: Eid. Hist. Polygonatum latifolium primum. Camer. hort. Polygonatum Pannonicum. C. Bauh. pin. Polygonatum 2. (1. phyt.) siue latifolium maximum, Polyg. maius Eyst.

Spontè nascitur, vulgari permixtum, in quibusdam Austriæ & Pannoniæ vmbrosis locis.

Synonyma.

Locus

POLYGONATVM FLORIBVS EX SINGULARIBVS PEDICULIS.



Pedales huic sunt *caules* striati, firmi, non valdè inflexi, sed recti ferme: *folia* vulgari similia, eodemque modo, h. e. alternatim, circa caulem disposita, breuioribus tamè quàm in illo spatii, minora etiam, firmiora, ingrati gustus: ex singulis alarum sinibus, duo aut tres exeunt *floris*, bre-

uius, magnaue ex parte singularibus petiolis inhaerentes, vulgari cum formâ tum colore similes, verum maiores, & odore (qui in vulgari

Nnn 3

nullus est,) floris spinæ Appendicis, siue Oxyacanthæ vulgò creditæ: bacca deinde virides initio, & sphericæ, quemadmodum in vulgari, maiores tamen, postea nigricantes, semen continentes ossium, durum: radix longa, obliqua, geniculata, candida initio dum recens eruta, deinde pallescens, nonnunquam etiam purpurascens, præsertim circa germina, vulgaris radici ferè par, tãetsi etiam aliquantulum tenuior inueniatur, interdum verò amplior, vbi videlicet pingue & bene subactum solum nacta est.

Clus. pan. pag. 163. & 164. Polygonatum pannonicum i. siue flore odorato. Eid. h. Polygonat. 2. latiore folio & Polygonat. latifolium secundum. Tabern. Polygonatum latifolium minus. Casp. Bauhin. phyt. & pin. Polygonatum 4. siue latifolium flore maiore odore, Polygonatum Gerardi, an angulosum Cordi hist.

Frequens est in nemorosis illis montibus, vulgò Leytenberg nuncupatis, supra Manderstorf, Bruterstorf, & in plerisque aliis Pannoniæ montih trãs-Danubianis inter saxa, atque etiam vltra Drauum in Pannoniæ interamnibus montibus, præsertim ad arcem Greben. Sed nuper admodum abundè nascens reperiebat Clusius in silua Quercubus consita ad læuam Mœni fluminis, paullo infra urbem Imperialem Francofurtum: Floret Maio: bacca matura sunt Augusto: interdum etiam multâ Hieme, atque ipsâ penè brumâ, è caule pendentes conspiciuntur.

Polygonatum amplitudinis foliorum Ellebori albi.

Descriptio

Polygonato floribus ex singularibus pediculis similem habet caulem, eiusdemque vel maioris etiam altitudinis, nõ adeò tamen rectum, sed magis inflexum: folia duplò ampliora quàm reliquorum, ad Ellebori albi foliorum amplitudinè nonnunquam accedentia, dura, nervosa, læuia, dilucius virentia, neque subtus incana, nonnihil acidi gustûs initio, deinde paululum acris: flores alteri similes, inodoros tamen, neque ex singularibus petiolis singulos, sed binos aut plures ex oblongiore pediculo dependentes, vt in vulgari, cui etiam similem fructum habet: radicem albam, longam, obliquam, geniculatam, dicto Polygonato magnitudine parem.

Synonyma.

Clus. pann. p. 165. Polygonatum pannonicum alterum siue *παραπόνηλον*: Eid. hist. Polygonatum 3. latiore folio. C. Bauhin. pin. Polygonatum 3. (2. phyt.) siue latifolium foliis Ellebori albi, Polygonat. latifolium Dod. post.

Locus & Tempus

Crescit copiosè vmbrosis locis inter Brünam & Weyspach, aliisque vicinis montanis siluis supra Viennam Austriæ: floret Maio.

Polygonatum latifolium perfoliatum Brasilianum.

Caule est bicubitali, striato, folia Perfoliatæ modo transeuntè: foliis pallidè virentibus, tenuibus, nervosis, vncias duas latis, quatuor longis: t compoſito, qui ex longo, tenuissimo pediculo dependet.

Polygonatum hoc C. Bauhino sextum in pin. secundum in prod. siue latifolium perfoliatum Brasilianum, auctori à Buxero communicatum, in Brasilia apud Toupinambaultios crenit.

POLYGONATVM LATIFOLIVM ramosum.

Folia huic per caulem cubitalem ramósque, Polygonati foliis similia, equaliaque, acutiora



re mucrone, venosa, mollia, alternato posita, imâ parte Perfoliatæ modo cõplectuntur: è quorum vniuscuiusque sinu, longas exiit pediculus, vnicus, nuda, bundus, tenuis, cui inhaeret flos maiusculus, Lilij conuallium, laciniatis oris extorsum reflexis, quem inferiore parte scribit Clusius nigricantibus quibusdam maculis aspersum, odore prope modum Oxyacanthæ: fructus Polygonati minoris siue angustifolij fructui similis, trigonus initio & viridis, per maturitatem verò oblongior & rubescens, paruaque corna interdum æquans, in quo multa grana albicantia congesta sunt: radix à Polygonati vulgaris radice differt: nam neque crassa est, neque adeò candida, sed exilis & nodosa, siue in frequentes nodos extuberans, pluribus crassis fibris constat, vti Thaletti quædam genera.

Matthiolus vocat *Zapffenfraut* / *Kaußblatt* / *Aussenblatt* & *Recktraut* in Hist. germ. h.e. Idem Vuulariam, Bonifaciam, & Paganam, & linguam: In comm. Ital. *Lauro Alessandrino*: In Lat. *Laurum Alexandrinum*, veram sc. & legitimam. Sed turper confundit Matthiolus historiam Hippoglossi cum plantâ hac quam exhibet pro *Lauro Alexandrina*: malè etiam nomina germanica ei tribuit Hippoglossi. Solerius olim meritiò quidem *Laurum Alexandrinum* veterum, negabat, sed minis rectè Perfoliatam ementiri annotabat, aut genus esse Lauri Alexandrinæ veteribus indictum. Nec melius Dalechampius quondam verum Hippoglossum suspicabatur.

Polygonati tertia species Clusij Obs. pann. (inquit Camerarius in Hist. germ. Matthioli lib. 4. cap. 6.) non rectè missa Matthiolo pro *Laureola Alexandrina*, vt satis demonstrat descriptio. Idem cap. 151. repetit *Laurum Alexandrinum* à Matthiolo exhibitam esse extra omne dubium speciem *Weyspach*: ibidem novam iconem proponens. Sed nec ipsa Matthioli figura pro Polygonato ramoso displicet, quanquam illam taxet Clusius vt minimè scitè expressam & mutila descriptione adumbratam.

C. Bauh. phyt. pin. Polygonatum 7. (6. phyt.) siue latifolium ramosum: *Laurus Alexandrina* Matthioli. Dodon. gall. Camer. Hippoglossum Hist. Lugdun. pag. 107. Rusco affinis tertia Cæsalpin. Polygonato affinis planta Lobel. Obs. pag. 362. Polygonatum latifolium 3. & 4. Tab. Polygonatum ramosum & acutum Gerardi.

Florentem vnam aut alteram huius generis plantam in vmbrosis montis Wechsel siluis, deinde in Durrenstein inter saxa & frutices mēsis. Iunio & Iulio anni 1576. inueniebat Clusius, quæ

Locus & Tempus.

quondam lapsus.

Synon.

Synonyma.

Locus & Tempus.


quæ

* flore magno, albo, ex foliis quique angustis, binas vncias longis.

quæ in hortum translata, fructum ad maturitatem perduxerunt: frequentiore in biennio potest magnamque, & in multas alas diuisam, vmbrosis quibusdam scrobibus inter filicis stirpes, in descensu Durrenstein, paulò supra mapalia à montanis pastoribus habitata æstiuis mensibus, florentem Augusto. Rami verò cum fructu ex Silesia vsque (vbi frequens nasci dicitur) Clusio prius communicabantur: deinde etiam aliquot radices illinc transmissæ. Persistit in hortis, vmbroso loco reposita, florésque & semina suo tempore profert.

POLYGONATVM ANGVSTIFOLIVM.

Descriptio.



Alba radix geniculatim incedit haud secus ac prioris Polygonati: caules cubito altiores, similes: sed in his folia multis numeris angustiora. Rubiæ foliis paria, læuia, venosa, quaterna, aut quina, radiatim ex caulium geniculis enascuntur, ceu & herbacei flo-

ris Polygonati vulgaris, succedentibus bacis minoribus: Clusio; fructu initio versicolore, qualis est Graminis Parnassi quorundam, siue Vnifolij fructus, deinde per maturitatem rubro.

Synonyma.

Polygonatum angustifolium Fuchf. Dodon. gall. Turn. & Eyst. Polygonatum angustifolium Fuchf. Hist. Lugd. p. 1623. Polygonatum minus Herbariorum Clus. Pann. p. 263. Polygonatum 1. angustifolium 1. Clus. Hist. & sic etiam Tabern. Polygonatum tenuifolium Cordo hist. & Camer. hort. Polygonatum tenuifolium maius Thallio. Polygon. erectum Gesn. hort. & de Lunar. itemque apud Cordum. Polygon. alterum Dodon. in fol. lat. Polygonati genus erectum Simlero. Polygonato similis in alpibus Cæsaly. Sigillum Salomonis angustifolium: Sigillum Salomonium alterum, putatq; cum Mutono esse Chamædaphnen Dioscoridis, quæ opinio non recipienda.

C. Bauh. pin. Polygonatum 8. (7. phyt.) siue angustifolium non ramosum, Polyg. minus foliis Rubiæ Lob. in Adu. Ephemerum quorundam Diosc. & Plinij.

Locus.

In montanis quibusdam Stiræ pratis, circa frutices & in vmbra abundè nascens obseruabat Clusius. In editis & montanis vmbrosis locis, veluti in Bohemiæ ac Moraviæ densis syluis reperiri testatur Dodonæus, ac Maio & Iunio flores; Augusto fructus colligi posse. In saltibus Hærciniæ frequens. Genevæ in monte prope Thuri copioso fructu mense Iulio, in Wassertall autem Augusto obseruabam.

Tempus.

POLYGONATVM ANGVSTIFOLIVM
ramosum.

Habet caulem cubitalem, angulosum in multas tenues alas diuisum, quæ æqualiter ex singulis angulis exoriuntur, quaternæ interdum, nonnunquam & quina, pro angulorum, qui in caule, numero: ramuli tenues, longis & angustis foliis obfusi sunt, binis ternis aut quaternis, æqualiter in circuitu prodeuntibus, in quibus flores, Polygonato proximè descripto similes,

Descriptio.



paulò tamen minores, breui petiolo dependentes inter foliorum alas sparsi sunt: quibus succedit fructus rotundus, ruber pulpâ plenus, aliquot ossea grana continens: radix vulgarissimilis est, candida, nodosa, propagines ad latera fundens, & candicantibus fibris obfusa.

Polygonatum Synon.


tum 4. siue ramosum angustifolium Clus. Pann. p. 268. Polygonatum 6. angustifolium 1. Clus. hist. & sic Tabern. angustifolium Ger. Polygonatum tenuifolium minus Thal. Polygonatum 9. in pin. 8. phyt. siue angustifolium ramosum.

Clusio anno 1580. communicatum elegantissimum hoc Polygonatigenus ab Achille Cromero Silesio, quod iisdem quibus saxatilem Rubum locis eruisse assererat.

Locus.

LILIVM CONVALLIVM VVLGO.

CAP. XIX.



Radix tenui & albâ, fibratâ, summo celsipite reptante, donatum colicolum profert palmarem circiter, angulosum, à cuius medio ad summum flores pulchri in vnam ferè partem vergentes per interualla penduli & nutantes in pediculis tenuibus curuisque nascuntur, par-

Descriptio.

uæ nolæ effigie, oris in sex lacinias dissectis, totidem staminibus ex herbido luteis, fundo adnatis, stylum triquetrum circumstantibus, odore suauissimo, sapore amaricante: quibus succedunt rubra *seminum* conceptacula globosa, vt in Asparagis: *folia* bina aut terna, oblonga, Orchidis foliis similia.

*Oenanthe
dithusa.*

Fuchf. not.

Dalechampsius apud Athenæum interpretatur Oenanthem. Anguillara verò, Camerario apud Matthiolum referente, Theophrasti *πιδν* esse, scriptum relinquit. Fuchsius pro Ephemero non lethali describit & depingit, dicens Iridem siluestrem cognominari. Ephemeron autem dictum fuisse, non quòd eadem die iugulet [nullam enim ei vim mortiferam inesse ait] sed quòd flos illius confestim marcescat, nec longius vno & altero die commoretur. Sed hoc argumento infinita non lethalia Ephemeræ statuenda forent. Ac præterea, non sine errore Fuchsius putat Liliū conuallium, Ephemeron Dioscoridis esse, cùm nihil sit in Ephemeræ descriptione, quod huic nostro Lilio conuenire videatur.

*Lil. conuallium
& siluestre
Brunfels.*

*Hemerocallis
non est.*

Brunfelsius, qui tom. i. chap. 36. & in 4. p. 84. Liliū conuallium, & Liliū siluestre vocat, Hemerocallida Dioscoridis esse putat. Quia verò Hemerocallis bulbosam radicem habere à Dioscoride traditur, non constat quo pacto Hemerocallis ad Liliū conuallium, quod serpentē hinc inde habet radicem, referri queat. Sed vel inde eorum errorem euidentissimè deprehendi posse arbitrat̃ Matthiolus, qui Liliū conuallium vulgò dictum Hemerocallim esse existimant. Si quidem illud foliis constat ferè Plantaginis, tenuioribus tamen, minùsque striatis: cauliculis iunceis, tenuibus, ac mollibus: in quibus cacumē versus plures prodeunt flores albicantes, Balaustrii, & Arbuti effigie, odore perquam iucundo: Radices demittit laxas, longas, fibris capilla mētisque refertas, nullis adjacentibus bulbis. Hemerocallis verò, Dioscoride teste, folia & caulem profert Lilio similia: flores colore admodum pallido: radicem magnam bulbosamque: Quæ sanè notæ, si diligenter conferantur, manifestissimè indicabunt, eos hallucinari, qui Liliū Hemerocallim esse contendunt.

*Cacalia
Lent.*

Lonicerus in ea fuit opinione vt crediderit à Græcis Cacalia & Leonticen vocari.

*Lil. inter
spinas
Lob. taxatur.*

Lobelius de Lilio Conuallium, vel verno Theophrasti (vt in Obs. p. 87. & Ic. Pl. p. 172. inscribit) ait in Ad herbam esse antiquis Græcis indictam, putarēque quosdam Liliū inter spinas in Salomone memoratum. Mirum autem in titulo eum addere nomen Theophrasti, & in textu dicere, herbam esse antiquis Græcis indictam.

*Lil. vernum.
1.*

Dod. gall. refert ad Liliū conuallium à Theophr. pro Liliū verni prima specie descriptum, Sed Latinus videtur sententiam mutare, eam solum Liliū conuallium nostræ ætatis vocans.

*Lil. vernum
2.*

Tragus non primum, sed secundum Liliū Theophrasti Vere apparens Theophrasti facit.

*Damaconium
nigrius Plin.*

Rob. Const. in Lex. prodidit quosdā existimare Damaconii alterum genus, à Plinio lib. 25. c. 10. descriptum, nigrius sc. esse herbam, quam vulgò *Muguet* vocant Galli, Germani *Weyenblum* tun h. e. Florem Maii. Belgæ *Weyenbloem* fene/ Latini vulgò Liliū conuallium, quòd in opacis & lucis nascatur.

Callionymū.

Liliū conuallium vulgò dictum, si libet, Callionymum appellamus, iustiori ratione, auctore Gesn. hort. quàm Anonymon olim quidā, ignoto tibi nomine, plantam vocitarūt, vel Cha-

mæcytinum: vulgò *Weyenblum*. In cat. appellat Ephemeron, vulgò Liliū conuallium & Muschetum majus. C. Bauhin. phyt. Liliū 23. siue conuallium: Idem pin. Liliū conuallium 2. siue album.

*Locus &
Tempus.*

Inter nymphas locum natalem sibi delegit. In siluis enim & locis vmbrosis spontè exit. Aprilī mense noua germina protrudit, gemina sc. folia, vnico pediculo suffultra, in initio complicata, quæ vbi primum à se inuicem discedere cœperint, tumē medio illorum pediculus emergit, qui mox quinis aut senis globulis ornatur, qui Maio mense panduntur, inq; flosculos euadunt, quibus petentibus Iulio mense appropinquante fructum profert rubrum. Monspelii flores Aprilī in hortis.

Temperam.

Calidæ & siccæ qualitat̃ flores & fructus participes esse statuit Dodonæus: Flores ex-calfacere, attenuare, digerere, & prouocare Matthiolus. Tragus autem quamuis dixerit flores calidi temperamenti esse, & laudet particulatim ad reuocandam amissam vocem, commendatque aduersus morbos frigidos, nihilominus tamen ait aquam stillatitiam ex eo paratam, omnem oculorum calorē refrigerare. Apollinaris verò non solum refrigerare ait Liliū conuallium, sed & humectare secundo gradu. Vtra porro opinio de temperamento probabilior sit & amplexanda, iudicabis ex odore suauissimo, saporeque amaricante, quicumque Philosophiam Medicam vel primis labris degustasti.

*Virtus & v-
sus*

Cæterum, inquit Fuchsius, recentiores eius succum, aut decoctum, syncope, vertigine, morboque comitiali correptis, attonitis & phreneticis exhibent. Sunt etiam [addit Dodon.] qui velint decocto aut succo, oculorū caligines discuti. Feruntur flores aduersus apoplexiam, nervorum resolutiones, ac alios cum cerebri frigida humidāque intemperie morbos, auxiliares esse. Sunt etiam qui velint flores istos cor roborare, ac cardiacis quoquo modo assumptos prodesse. Incipienti porro elephantie, ne latius serpat & alius radices agat, viam præcludere scribunt. Quin & istis (pergit Matthiol.) seu commotis à venenosis animalibus præbent. Itē, ægrè parturientibus maximo esse auxilio prædicant Magnus in summa Liliū conuallium apud Germanos in medicamentis est vsus, ad varios corporis morbos. Aiunt enim eo roborari omnes principes facultates. Conficiunt autem ex floribus per æstatem siccatis vinum vindemiariū tempore, ipsos calcatis vuis admiscentes, quo postea vtuntur ad prædicta. Sunt & qui recentiores flores vetere vino macerent, & in vitro vase diu insolēt, admistis Lauendulæ vocatæ, & Rosimarini floribus, additisque odoramentis nonnullis: deinde ex eis stillatitiam aquam in calentis aquæ balneo vitreis organis eliciunt, eaque aureis, argenteisque vasculis reponunt. Hanc aquam auream appellant: quā vtuntur ad omnes prædictos corporis affectus. Quinimò eam iam iam animam expirantis ori infundunt, rati ex eius assumptione homines morientes in vita retineri posse per plusculum temporis spatium. Sed quàm vanā isti ferantur opinione, Marth. quidē sæpenuerò experimēto deprehensum est. Quod etiam iis quoque irritum comperiat: ea tamen est huiusce aquæ apud omnes authoritas, vt plerique ab eius exhibitione abstinere nequeant, etiam in morbis calidissimis. Concludit tandem Came-

*Aqua stilla-
ticia.*

Camer. Radicis, inquit, quæ dulcis ac aromatica, odoratâque est pulvis naribus attractus pituitam elicit & fluxiones mouet sine vehementia. Floribus vas impletur bene obturatâ, & in acervum formicantem reconditur per mensem. Liqueor inde collectus instat olei sedandis doloribus podagricis & humilibus affectibus exterius adhibitus perutilis.

Lilium conuallium latifolium.

Descriptio

Quod C. Bauhinus in pin. Lilium conuallium n. siue latifolium cognominauit, id in prod. sic descripsit. Radicibus est tenuibus, longis, repentibus: caule pedali, foliis ternis, viridibus, nervosis, subrotundis, lauibus, palmaribus, vncias quatuor latis, basi suâ caulem, fistulæ modo ambientibus: floribus magnis, albis, rotundis, hian- tibus, reflexis, & odoratis, quibus fructus rotundus rubeus, semen durum continens, succedit. In hortis quibusdam colitur.

Locus

Lilium conuallium cum pluribus florum ordinibus.

Descriptio

Non alia huic folia, quam vulgari siluestriq; Lilio conuallium: at culiculus inter ea surgens, non tantum contentus est florum ordine, sed vtrinque producit flores, vncialibus & semuncia- libus pediculis, pendulos & nutabundos, vul- gari similes, quorum vnique ad exortum pe- diculo ligula albicans, parâ cum eo longitudi- nis, apponitur.

Lilium conuallium magnum.

Descriptio

Foliorum dispositio fibrosa striatâque textura cum nitido virore, respondet foliis Lilij con- uallium vulgaris: duplò tamen aut triplò maio- ra.

An Lilium
conuall. 1.
alp. Cam.

Hoc putamus esse, quod Camer. hort Lilium conuallium alterum alpinum, flore maiore & o- doratiore nominat, quodque apud Matthiolum in montibus Tyrolentibus prouenire scribit.

An Lilium
fl. maiore
C. Bauh.

An C. Bauh. phyt. Lilium 24. siue conuallium flore maiore, An eid. pin. Lilium conuallium 3. siue alpinum, Lilium conuallium flore albo, Eyst.

In horto Frid. Meyer Argentinz, mense Maio obseruauit.

LILIVM CONVALLIVM

Flore rubente.

Descriptio



Synonyma.

Huius è flore pe- tira est quæ- dam differen- tia, cæteroqui Lilio conual- lium albo vulgari per omnia respõ- dens: flos solummodò ex albo ru- bet, colore pictus car- neo.

Cæterum, hoc est illud, quod appel- latum est à Lobelio in Obs. pag. 87. Lilium con-

uallum agri Louanienfis. propè Thenes Paban- torum urbem, floribus candore & rubore confu- sè mixtis, siluosis gaudens: in Icon Plant. p. 173. Lilium conuallium floribus suauè rubentibus.

A Camer. hort. Lilium conuallium 3. rarum admodum, flore subrubro à Sebizio missum. A Tabern. Lilium conuallium rubrum. C. Bauh. Lilium 24. siue Lilium conuallium flore ruben- te: Eid. 4. in pin. & Lilium conuallium flore incarnato, Eyst. Montbelgardi in horto E. C. Vvixtemb.

BIFOLIUM MAIVS SIVE OPHRYS

maior quibusdam.

CAP. XX.



Q Vin ex Orchidâ Descriptio
fit familia Bi- folium ambi- gi vix posset, nisi radices multiplices fibrosæque ob- starent, siqui- dem flores ele- ganti thyrsis dispositi, quàm proximè acce- dunt, herba- cei, culicum serè formam exprimente bífido labello, galeâ laterali- bus foliis in- cumbente,

quibus in caule singulari, tereti, modò vix sesquipalmum alto, aliàs pedali, aut etiam cubitali, hirsuto, vtricu- li succedunt, vt in Orchidibus puluisculo refer- ti: folia verò duo solummodò habet, Plantagi- nis latifoliæ, opposita, altero ex alterius sinu prodeunte. Sapor radices subamarus cum ali- qua acrimonia, non sine visciditate: Caulis vero & foliorum sapor viscidus.

Tragus Bifolium cap. de Coryledone syluestri, secundo loco describit & depingit, atque wils Bifol. Trag. den durchwachs nonnullos, h. e. Persoliatam siluestrem appellare, vt etiam Brunfelsius testa- tum reliquerit, sed plûs cum Satyrio affinitatis habere, quàm cum Persoliata. Esse qui wasser wegerich / h. e. Plantaginem palustrem nomi- nent. Euricium Cordum in ea esse sententia, vt statuerit Alisma Dioscoridis esse. Hoc tamen verisimile ei non fieri.

Lobel. in Adu. Alisma negat, Ophring; Plinij adstruere videtur. Obs. p. 161. Bifolium in- scribit, eiusque titulo in Icon. Plant. duas ima- gines pingit, vnâ p. 302. Alteram tom. 2. p. 161.

Matth. Ophris recentiorum. Anguill. Ophris Plinii, à Fuchio & Matthiolo bene depicta. Ang- lus Gerar. intitulat Gramen Parnassii maius, sed Tabern. imitatus Bifolii minoris malam Mat- thioli iconem proponit.

Dodonæus Pseudoorchis & Bifolii inscriptione pingit, & veram Plinii Ophrim, denticulato o- leri similem esse posse negat, nec cum Alis- mate conuenire concedit, sed nouam aliquam stirpem esse & à veteribus præteritam asserit.

Pseudorchis
Dodon.

Tab. Ic. & H. Ophris: item Ophris trifolia. Schvv. Bifolium maius, Ophris Plinij: item Bifolium 1. Ophris trifolia.

Ophris 1.
phr.

C. Bauhin. phyt. Ophris 1. siue vulgata & minor, Satirion 10. Tragi, sine icone: Item bifoliū eiusdem, & Lobelij. Ophris 2. siue bifolia maior, Perfoliata mascula Brunfels. tom. 1. rhaps. 31. p. 182. & Perfoliata sylvestris mas eiusdem in 4. p. 101. sine tamen descriptione: foliis & floribus illā duplō triplōque maioribus, formā priori respondentibus: caule minore. Et Ophris 3. siue trifolia maior, Perfoliata fœmina Brunfels. dicto tomo & th. p. 183. & Perfoliata syl. fœmina in 4. p. 101. in eo solum à proxima, 2. sc. differens, quod tribus donetur foliis: duobus quidem ex opposito sitis: tertio verò ex coitu foliorum duorum orto, non tamen pari magnitudine. Tandem, Ophris 4. siue trifolia minor, à priori differens, ut bifolia minor à maiore. *Est. pm* Ophris 1. siue bifolia, Perfol. sil. mas Brunf. Satyrium 10. & Bifolium Tragi, Alifina Cordi, Gesn. hort. & in cat. pl. Ophris Marth. Fuchf. Ang. Ges. cat. Caß. Tab. Cam. Cxf. Thal. Franco. Bifolium Dod. gal. Ad. Lob. Lon. Cam. Pseudoorchis seu Bifolium Dod. Ophris bifolia Gerardi: Maior & minor, tam in hac, quam in trifolia. Item, Ophris 2. siue trifolia, Perfol. sil. fœmina Brunf. Ophris trifolia Tab. & Gerardi.

Locus &
Tempus

Fuchsio teste nascitur in montibus, & nullibi maiori copia, quam Tubingæ in pede mōtis Auliaci provenit: Maio & Iunio mense floret, quo tempore potissimum colligenda. Ego in monte Wasserfal reperi florentem Augusto: in monte verò Saleuz prope Genuā In Silesiæ montib. & conuallibus, vdis & opacis locis collegit Schvv.

Vires & f.
sus

Gustanti hæc herba glutinosa esse apparet, & quodammodo dulcis, ideoque calidam & siccam esse coniecit Fuchsius: contrahendi porro constringendique facultate præditam esse non dubitat, hinc est quodd ad rupta & vulnera conglutinanda hac herba commodè uti recentiores scribar secundum Matthiolum, ad denigrandos capillos. Schvvenc. tamen calidæ & humidæ esse naturæ prodit.

Vnifolium, siue Ophris vnifolia.

Descriptio.



odorati, quatuor foliis totidemque staminibus concoloribus cum stilo constant: bacca succedunt Lili conuallium per maturitatem rubentes.

R Efrundo *fruticosa* profert tenuis radice, subdulcis, candida: vnde *coliculus* palmaris exurgit, tenuis, folio vno aut altero, rarius tribus donatus, formā ad folia Sigilli B. Mariæ dictæ proximè accedentibus, minoribus, per longitudinem, nervosis, aversaque parte hirsutis: *stef-culi* candidi,

Tragus vnifolium (sic enim docendi gratiāingere vocabulum necesse duxit) Cotyledonis primi, siue silvestris nomine descripsit, censuitque Germanicè, *mit drey vach* appellandam esse, quod caulis eius folium ex parte penetraret: Et ab vnico folio, Ceratij, nisi radicem adeo exiguum haberet. Sed hæc opinio non placet.

Apud Amatum in Diosc. pro Cyclaminio vnico folio malè ponitur icon Vnifolij, quandoquidem eius non meminit.

Dodon. lat. in fol. eiusdem cum Lilio conuallium generis esse putat Vnifolium, vulgò *Blat*, græcè *μυρίφλλον*, nuncupatum, nec apud veteres nomen habere, nisi tertia Plinij sic Cyclaminos, cui similis videretur, si modò in exemplaribus error non est.

Gesn. in cat. pl. Folium herba: altera mas *diff- rōyov*, altera fœmina *δραχμύρον*: Item postea Marifica herba. Lobel. in Adu. Monophyllum recentiorum, & Obs. pag. 161 vbi & Gramen Parnassi Cordi & Leonice: Icon. Plant. pag. 303. Monophyllum, Vnifolium recentiorum. C. Bauh. phyt. Monophyllum Vnifolium dictum, eò quod cum primò prodit, vnico sit folio, nam cùm cauliculum acquirit, folia bina habet, rarius tria, qualem Richterius ex monte fracto attulit: propter similitudinem cum Lilio conuallium, Liliis subieci conuallium, ac ideo etiam [inquit in pin.] Liliū conuallium minus appellare lubuit: Sunt qui Cyclaminum tertium Plinij lib. 25. cap. 9. veliunt. Vnifolium Brunfelsius tom. 2. rhaps. 18. (cuius figura, ut & Camerarij apud Matthiolum nomine Graminis Parnassi, reliquorum melior est.) Dodon. Hist. Lugd. pag. 1260. & Eyst. Gramen Parnassi Hist. Lugd. p. 423. Gramen Parnassi maius Germ. Henophyllum vel Monophyllum Gesn. hort. Cyclaminum vnico folio Dalech. in Diosc. Monophyllum Lobel. Thal. Ger. Bifolium primum Lonic.

Montbelg in siluis, ac etiam in monte prope Clareual oppidum Ill. E. C. floret Maio & Iunio. In monte *Salent* solet cum Lilio conuallium provenire.

Vulnerariam esse plantam iudicat Tragus, ut quæ recentibus vulneribus utrinque adhiberi commodè possit.

BIFOLIUM MINIMUM.

Descriptio




E radice subflauescente fibrosa & Orchides redolente, cauliculus simplex trium, quatuorue vnciarū: sub foliolis prodit, cui foliola duo Ophris vulgaris modo apponuntur, quæ parua sunt, glabra, splendens, coloris Vnifolij & nonnihil in cordatam effigiem è rotundiuscula figurā discedentia, quibus

quibus calliculi altera pars, similiter trium, quatuorve vnciarum supereminet, cuius summo flosculi parvi herbacei insident, ab Ophris vulgaris floribus, exilitate solâ recedentes, quibus vascula exigua succedunt, teste C. Bauh. phyt. qui in prod. Ophrin minimam vocavit, & in pin. quartam fecit.

AD. Fureo Ophridii seu Bifolii Broccenbergi minoris nomine accepit frater, qui iis in locis, opacis sc. muscosisque silvis Broccio & Offmannino vertici dicto, interuenientibus, vbi sponte prouenit, Iulio potissimum mense, florere ait: at in hortos cum gleba foli natalitii translatam, citius.

PYROLA.
CAP. XXI.

Descriptio



PYROLA tenui rubetque serpunt radice, subindeque ex caule demissis fibris radican- tur. Vulgatio- r ea est quæ quinque aut sex folia humi spargit subrotunda, Pyra- ceis paria, crassa, atrovi- rentia, glabra, nitidaque facie superna, pediculis palmaribus ferè in- hazentia: inter quæ caulis nas-

citur dodrantalis, angulosus, paruis & acutis foliis aliquot donatus, nullam ramorum diuisionem agnoscens, thyrsus gerens am- norum sterum, quinque foliolis constantium, albidorum, Orchidum ferè modo, supernis duobus galeas, imò verò labellum bifidum referen- tium, multis umbilicum obsidentibus apicibus croceis, ex quibus pistillus recuruus prodit & ima versus reflexus, & quandam velut proboscidem referens: Flores capitula sequuntur angu- losa, puluisculo minuto plena. Sapor totius plan- tæ amarus, non sine insigni adstrictione. Minus felicitè figura hæc facta est.

Lim. Fuchf.
Beta filu.
Tintinnab.
P. rola.

Fuchsius Limonium inscribit, ac latine Betam syluestrem dici testatur, quod in siluis & locis muscosis, hortensi Betæ primùm erumpenti haud dissimilis prouenit, Tintinnabulum verò à flori- bus eius tintinnabulo similibus: Et, Pyrolam, quod eius folia arboris Pyri folio similia sint. Limonium quoque statuit cum Cornario Turne- rus. Sed eorum sententiam haud esse approban- dam, qui Pyrolam herbam Limonium genuinum faciunt, authorem habemus Matthiolum. Qua- re Tragus nobis magè satisfacit eam inscribens Limonium syluestre, itatuenque nihil aliud esse, quàm Beta syluestris quandam speciem.

Pyrolæ Dioscoridem non meminisse testatur quoque Cordus in Dioscor. syluestris Betæ genus eam cognominans.

Amato cap.

de Limonio malè addita est figu-
Tom. III.

ra Pyrolæ, quum de ea sub Limonio non scribat.

Fuchsius Pyrolam Limonium exillimans, Ger- manicè hofmanqolt, & waldentanqolt h.e. Fuchf. nos. Betam syluestrem, nominauit, inquit Dodonæus: Sed Limonium non in montibus ac siluis, sed in pratibus palustribus nascitur, nomenque ab ipsis accepit, *λεπυρον* siquidem prata Græci appel- lant. Non defuerunt, teste Lobelio, qui Britan- nicam diuinarint.

Pyrola Brunfelsi tom. 3. rhaps. 30. & in 4. pag. 92. Camer. apud Matth. Cast. H. Lug. p. 841. Syon. Gerat. & Eyst. Pyrola vulgò dicta Grin. hort. & coll. Pyrola alia campestris Cæsalp. Pyro- la vulgatio (vulgaris in Pann.) i. satis amplo, mollique folio. Clus. hist. Pyrola maior siue Be- ta filu. Thal. Pyrola i. vulgata rotundifolia C. Bauh. phyt. rotundifolia maior pin. Pyrola pro Limonio picta Anguill. Pyrola, Limonium germanicum Lob. in Adu. Pyrola, Limonium Cordi & Germanorum, Eid. in Obs. p. 117. Py- rola à Pyri folio, in Ic. Plant. p. 294. Limonii & Pyrolæ species altera Harch.

Est & altera Pyrola vulgaris, folio, vt inquit Variat. Clusius, minore & duriore, Soldanellæ alpinae minutiore folio, ferè aequali. Thal. Pyrola minor foliis breuioribus, Pyri foliis responden- tibus, vnde & vulgus ad differentiam prioris, Pyrinam cognominat.

Germani quater Grin appellant, i. e. Viro- rem Hiemis, aut Viride hiemale: Belgæ similiter wintergroen: Bohemi chrassitica. Nom. ling.

Locis gaudet montanis ac umbrosis, in mul- tis, per Germaniam, Bohemiam ac Morauiam syluis occurrit, authore Dodonæo: Cum flori- bus autem Iunio ac Iulio viget: toto anno viret: Hiemis & frigoris patiens. Aeterno virore pe- nè atro aduersum Brumæ rigores perstat (inquit Lob.) montosis, siluosis, & frigidis vdis, præ- quibus tepidos hortorum recessus, locaque urba- na & mitiora viridaria spernit, Inque illis quasi inuita ægrotat, ac tandem emoritur. Loc. & Tempus.

Recentiores Medici nonnulli hanc herbam Vires & filu. in tertium gradum calidorum & siccorum, & vlt- tra locant. Brunfelsius verò Peruinæ naturæ si- milem existimat. Decoctum eius, aut aqua di- stillata, interna & externa vulnera sanat pota, & vulneribus ex taloris. Similiter & fistulas cum aliis malis vlceribus sanat. Ex tota plantæ sub- stantia, cum Sanicula & Pede leonis ex oleo vti- le faciunt cataplasma. Huius vnguentum cum flore aris & Aristolochia longa, viridis euadit coloris, carnemque malam exedit. Quod si al- bum habere velis, Cerussam & cancri oculos puluerisatos adde, tum lenit & sanat. Si rubrum esse velis, Bolum adde, cum Sanguine Draconis, tum refrigerat & sanat. Dodonæus Pyrolam re- centem rufam & applicatam commendat vulne- ribus, vlceribus & vitionibus, aut puluerem inspersum. Coctam cum pauco Symphico in aqua plurimum in purulentis renibus confecte scribit Cameracius. Chirurgi prænominati prin- cipem vnam & vulnerariis potionibus esse exi- stimant. Pyrolæ folia & semen gustu vehemen- ter adstringunt, quæ occasio vt quidam herbam exsiccatam ac in puluerem redactam inneteratis ac fluentibus vlceribus, quæ exsiccare intendunt, aspergere soleant. Pyrolæ verò minori maiorem efficaciam in glutinandis vulneribus & rupturis attribuit vulgus, quàm maiori.

Vnguentum

Viridis

PYROLA FOLIO SERRATO.

Descriptio



Tenerior est altera, *radice* repente, *caule* brevior, infirmiore, *folia* circa imum ornato dimidio minoribus, teruioribus, oblongis, acuminatis, ciliolum in ambitu crenatis: *flores* per caulem thyrsoides, precedenti similes, minores, capitula relinquunt angulosa, stylum ex umbilico proferentia. Flores non placent in icone

nostra quæ nobis absentibus facta ad imaginem Clusij.

Ambrosia.

Apud Amatum in edit. Lugd. malè ponitur huius plantæ figura nomine Ambrosiæ. Sed & H. Lugd. eam Ambrosiæ montanæ titulo p. 1148. pictam dedit, eodem errore.

Synonyma.

Clus. Pann. p. 503. & h. Pyrola 2. tenuior. C. Bauh. pin. Pyrola 3. [2. phyt.] siue folio mucronato serrato, Pyrola minor Thalio, Pyrola Pannonica 2. Camer.

Locus & Tempus

Crescit in Alpium Austriacarum & Stiriacarum iugis, loco umbrato inter frutices, muscumque terrestrem, sed vberimè in silua illa acris Entzestorf vicina. Meminit etiam Clusius olim colligere in iugis Lausannæ Allobrogum ad Lemannum lacum proximis. Floret Iunio & Iulio, interdum etiam Augusto.

PYROLA FRUTICANS.

Descriptio.



Elegantissimum pyrolæ genus, interdum quodammodo fruticans nam nouelli breuesque ramuli, singulis annis succrescentes, aliquot annos firmi, videnturque permanēt, & supra tellurem eminent, donec tandem pondere suo depressi, humi procumbant, & musco se cōdant, fibrasque interdum agāt:

folia ut plurimum ad singula internodia, vbi noui ramuli succrescunt, bina, terna, aut quaterna habet, carnosa, superne saturatiùs viridia, & splendens, Chamædaphnes (quam vulgus Laureola

vocat) foliis, formâ, & magnitudine propè similia, in ambitu tamen serrata, gustu admodum exsiccante, deinde amaricante, vt reliquarum Pyrolarum folia: ex horum medio solent Aprilis noua germina prodire, quæ foliolis veluti squamulis prædita, in virgulas tandem desinunt, quibus terni, quaterni, interdum etiam quini insident flores, vulgaris Pyrolæ floribus similes, paullo tamen maiores, ex albo purpurascens: quibus excussis, succedunt pentagona capitula, tenui semine instar scobis plena, quæ cum suis virgulis Hieme exarescunt: radix siue potius canaliculi sub musco latentes, longè latèque summâ tellure sparguntur, & subinde fibras agunt.

Clus. Pann. pag. 503. & hist. Pyrola 3. fruticans: Camer. hort. Pyrola Pannonica secunda. Casp. *Synonyma* Bauhin. phyt. Pyrola 3. fruticans: Eid. pin. Pyrola 6. siue frutescens Arbuti folio.

Abundè prouenit in siluis Entzestorf vicinis aliisque, vulgari & primo permixtum interdum. Camerario referente horti culturam altero anno respuat.

Locus.

PYROLA MINIMA ALPINA.

Descriptio



Minima Pyrola ex radice repente folia emittit quatuor aut quinque vncialia ferè, rotunda, in ambitu serrata: caulum nudus, palmaris, florem in cacumine fert vnicum maiusculum, Pyrolarum aliarum floribus similem, succedente capitulo maiore anguloso, è cuius medio

prodit stylus præpilatus.

Clusio in Obs. Pannon. 508. & Hist. post. est Pyrola 4. minima: C. Bauhin. phyt. Pyrola 4. siue minima flore vnicò Graminis Parnassi: Eid. pin. Pyrola 2. siue rotundifolia minor: Pyrola minima Eyst.

Synonyma

Nascitur umbratis locis in Alpibus Sueberg, Hochbergerin, Durrenstein, & aliis vicinis, circa radices summorum illorum iugorum. Floret sub finem Iunij & Iulio: semen Augusto maturum. Obseruatur in monte Pilati, vnicò flore incarnato.

Locus

Tempus

Non dubium autem est quin omnes hæ plantæ similibus cum vulgari Pyrola facultatibus sint præditæ, quandoquidem, teste Clusio, easdem qualitates habent.

Vires

HERBA TRIENTALIS.

Coliculo adfurgit simplici, tenello, gracili, palmum plus minus alto, tereti, nudo, glabro, qui summo tenus velut in umbella folia sustinet ex breui pediculo sex, septemue pallide virentia, ouia,

ouata, vicia vix longiora, latitudine proportionata ad figuram ouatam, quædam e iam minora, nonnulla maiorum vix mediam aut tertiam partem æquantia. E quorum costa venulæ eminentiores alterno posito exeunt ad ambitum. Sed & minimum quoddam vnum aut alterum Serpilli folij facie & magnitudine cauliculo adnascitur. Porro è medio foliorum exortu *pediculi* communiter bini surriguntur, scilicet unciales, aut duarum vnciarum, ac ferè capillares, subrussi, *flosculos* sustinentes singulares, stellatos, albicantes, quos foliola prædictis foliis concoloria, & stellam pulchrè posito exprimentia, ambiunt octona plus minus.

Synonima



Cordo obs. silu. Herba trientalis, foliis oblongis, veluti Neriadij minoris, flore candido, stellatoque. Auctori horti Lusatiæ Herba pusilla trientalis cauliculo singulari. Thal. *à l'arab. thal. & à l'arab. thal.* Camer. apud Thaliu Peculiaris quædam Pyrolæ species, folio Arbuti potius, quam Pyri. C. Bauh.

pro d. Pyrola Alpinæ flore, Europæa, Alpinæ alpina Schv. Alsinanthemos maior & minor Helmsstadij. Pyrola Bohemica maior & minor Doldij. Minore verò, nomine Anonymi Betulæ folio, in Betuletis Scotiæ natam Cargillus misit. Eid. pin. Pyrola 4. siue Alpinæ flore Europæa, maior & minor. Habet Idē C. Bauh. etiā Pyr. Alpinæ flore Brasilianam, cuius figura extat in prodr. p. 100.

Locus.

Nascitur inter vallem D. Ioachimi & Bisenthalum, metallica oppida, in montibus non ita herbosis, solo neque nimis madido, neque nimis arido, nec syluoso: addit H. Lusatiæ inter Ericas. Alsinanthemum Thaliij familiare est Brockenbergo ac montibus vicinis vligine perpetuâ irriguis. Pyrolæ hanc speciem in syluis Franco-niæ quoque & potissimum circa Greuenthalium obseruauit Camerarius.

GRAMEN PARNASSI DODONÆO,
quibusdam Hepaticus flos,
CAP. XXIII.

Descriptio

Gramen Parnassi hodie dictum, radicem habet modicè crassam, fibratam, ex albo rubentem, cum vestigio leni caloris adstringentem: vnde folijs prodeunt satis frequentia, longis pediculis rubescentibus appensa, Hederaceis non angulosis similia, multò minora, crassiuscula, sinuatis à pediculo neruis excurrentibus, non ignaua adstrictione prædita: inter hæc caules surgunt angulosi, sesquipalmares, indiuidui, inferiore parte rubentes, folio vt plurimum vnicuique, eoque ampliusculi donati: quorum vnicui-

que flos vnus infidet, candidus, Louroij bulbosi Theophrasti flori par. sed calathio ætulum pectus, folijs quinque còstans, quæ lre altitudo formâ exarant: medium obsidet conicum capitellum purpurascens, quinque radiatis staminibus albis apicibusque concoloribus circumdatum, quibus totidem interiecta alternatim staminum fluorescentium muscariola: totum verò florem sustinent quinque folia viridantia: tandem conicum illud capitellum paulatim in Ciceris maiusculi

molem excrescit, quod in quatuor carinas dehiscens, semen ostendit copiosum, minutum, rufum.

Cordo hist. Hepatica alba. Gesner. coll. Enneadynamis Polonorum: Eid. hor. Gramen Parnassi non verum. Lobel. Obs. p. 330. & Adu. Gramen Parnassi hederaceum recentiorum. Hist. Lugd. p. 1005. Gramen Parnassi Dodonzi. Clus. Pann. & Histor. Gramen Parnassi vulgò, Tabern. Icon. & hist. Gramen hederaceum, flos Hepaticus: Gramen Parnassi minus, Gerard. Gramen Parnassi 1. siue albo simplici flore C. Bauh. phyt. & pin.

Nascitur macris & putridis pratis, quæ nunciam omnino succantur: in quibus variis in locis obseruauit.

Locus & Tempus.

Roborat hepar & obstructions tollit cum flore cocta in vino aut aqua: puluis in cibo aut potu conducit hepati. Vtilis in alui fluoribus & potionibus vulnerariis.

BRITANNICA VETERIBVS.

CAP. XXIV.

Britannica seu Vettonica Dioscoridi herba *Britannica* Best folijs siluestris Lapathi [similibus, vet.] at *Dioscoridi* nigrioribus ac pilosioribus, gustu adstringentibus: caulem verò promit non ita magnum: radice autem tenui, breuique nititur. Folijs exprimitur succus, qui Sole aut igne cogitur & inspissatur. Vim porro habet adstrictoriam, priuatim oris ac tonsillarum depascentibus vlceribus accommodatam. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione opus est.

Britannicam ex Oceani insulis extra terras positis, rerum naturam ostendisse, ait libri 27. initio Plinius: ac de eadem antea lib. 15. cap. 3. disserit. Galeno Britannicæ herbæ folia adstringunt & vulnera glutinant, similia folijs Lapathi siluestris, præterquam quod nigriora & hirsutiora apparent. Est autem & succus ex ipsis similiter adstringens. Quare & coctum ipsum quidam reponunt, velut efficacissimum stomaticum medicamentum. Videtur enim

sanare etiam iam putrescentia. Hermolaus Plinii simia eadem quæ ille habet. Ruellius verba Dioscoridis, Plinii & Hermolai repetit suo more pro suis.

Officinæ, inquit Cornarius, Britannicam non nouere: nec Herbarii, nisi quod quidam de Bistorta appellata coniectant. Ac quanquam, ait Matthiolus, Ruellius tradat Britannicam esse plantam Italix cognitam, atque ibi vulgò *Piatamano* appellari: mihi tamen hæcenus non solum nomen illud incompertum est, sed nullum etiam inuenire obtigit, qui Britannicam ostenderet.


Plin. error. Errasse Plinium ait Goropius illo in loco, vbi citra hæsitacionem de nomine asseruerit Britannicam ex Oceani insulis, extra terras positis, asserri.

Æquiuoca. Sed ad Britannicæ æquiuocationes diligentius animaduertendum. Pro Britannica itaque Dioscoridis Ruellius perhibet plantam, Italix *Piatamano* dictâ. Quæ autem hæc sit, nec nobis hæcenus constat. Aliàs Britannica dicitur Bistorta. Consol. media. Prunella. Betonica. Herbariparalytis. Auricula vris. Pulmonaria Italica. Aster luteus. Pyrola. Persicaria. Cochlearia. Damasonium. Beton. coron. Caryoph. marinus Halimus. Eryngium maritimum.

BISTORTA MAIOR RUGOSIORIBUS FOLIIS.

C A P. XXV.

Descriptio.



Connonnam altitudine superant Bistortæ caules, tenues, glabri, geniculati: in quorum fastigio spica florum coloris carnei, Persicariæ, quorum singuli explicari quinque foliolis contat oblongis, apicibus in medio, flori concoloribus: quibus succedit semen rufum & ferè nigricans, triquetrum

Lapathorum modo. Folia Rumicis seu Lapathi acuti, minora, supernè in atro virentia, infernè glauca, pediculo vtrinque foliaceas appendices angustas largientia: Radix articulum digiti refert in se contortum, rubra, sapore adstringente strenuè.

Bistortam fuere, qui secundam Catanances speciem apud Dioscoridè esse putarent, sed, Agricola teste, repugnant radix & folia. Alii minorem Lappam, alii minorem Bardanam vocant. Errant qui radicem Bech rubri putant. Quidam Astragalum existimarunt, sed erroneè. Qui Serpentiurum putant, frigidum pro calido ponunt. Ap. illius pingit quidem Bistortam, verum adiciendis viribus nullus fidat, quas confundit

cum viribus Ari & Dracunculi maioris.

Britannica quo nomine vocetur sibi haud cõtare ait Cordus, nisi quis Bistortam seu Herbam paralyseos eam esse dixerit, quorum neutrum neque affirmat, neque negat. Ruellium errare, quod Bistortam, alteram Catanancen esse crediderit, ait. Item Dracunculum magno errore Bistortam esse hæcenus credidisse totam ferè Medicorum & Pharmacopolarum multitudinem. Ab illo in H. Bistorta doctè describitur.

Dodo. gall. figuram Fuchsi Bistortæ maioris titulo exhibuit. Lat. in fol. aliam Bistortæ inscriptione pingit, ac ait ab intortis & conuolutis radicibus nomen habere: Belgas *Schertouche* / Germanos *Waternurn* / Gallos *Bistorta*, Bohemos *hadjfereny*. Colubrinam & Serpentariâ à germanica voce etiam dici, & à quibusdam Dracunculum. Sed à Dioscoridis Dracontio multum differre. Plinianorum autem Dracunculorum aliquam fortasse speciem asse, secundâ scilicet. Esse tamen ex recentioribus, qui Bistortam omnino aliam esse velint. Matthiolus quidem in epi. medic. Behen rubrum esse scribere. Gesnerum ad Limonium referre. Aliis placere Britannicam esse: sed omnes eos inualido niti fundamento, vt fusè demonstrat.

Lobelius in Adv. eorum tuetur opinionem, qui Britannicam putant. Vocat autem Bistortam maiorem: In Obs. pag. 155. Icon. Plant. pag. 191 Bistortam Britannicam. / Fracastorius de contrag. lib. 3. cap. 3. Bistortam Bulapathon esse suspicatur. Bistortæ loco, cornutum quid coralloides Pet. Crescentius exhibet.

Fuchf. Colubrinam & Serpentariam feminâ vocat. Tragus Colubrinam, ac Bistortam t. maiorem. Anguillare Bistorta magna. H. Luf. Bistorta maior alpina. Gesn. hort. Limonium Bistorta: Eid. coll. Bistorta maior rugosioribus foliis: Et Limonium vulgò Bistorta. Brunfel. in Herba. germ. pag. 71. Serpentaria: p. 78. Hermolai Dioscoridis Catanance.

C. Bauhinus Molybdenam Plinii lib. 15. cap. 13. id est plumbaginè, quod plumbum (virii genus) ex oculo tollat, arbitrat. Vocatur in phyt. & pin. Bistorta 1. siue maior, radice minus intortâ, Colubrina & Dracunculus maior Brunf. Bistorta femina, Eiusd. Bistorta maior, Thal. Tabern. Ger. & Clus. hist. Bistorta Matth. Cæsalpin. Cast. & Hist. Lugd. pag. 128. vbi duæ figuræ, Bistortæ Matthioli & Bistortæ maioris. Non autem monet quænam harum sit.

Nobis est Britannica maior. Serpentiariam herbarii & officinæ appellant, quod vbi primum è terra erumpit, linguæ serpentis tenui pelle vestita formam obtineat.

Reperitur Bistorta locis humentibus, in opacis siluis, pingui ac lutofo solo. Matthiolus in montibus exire refert. Adolefcit etiam feliciter in hortis: perenni radice nititur. Montepellii reperi in montibus circa Gangen, Genex in monte Thuri. Ad Austriacarum & Stiriacarum Alpium iuga, accliuibus locis & circa scopulorum radices spontè nascitur.

BISTORTA MEDIA FOLIO minus rugoso.

Tragus, qui Bistortam secundam facit & pro Colubrina minore describit, non autem depingit, testatur radicem habere capillatam, non minus quam altera.

Dodo.

Ruellii error.

Medicorum error.

Bistorta maior. Dodo. gall.

Britannica.


Synon.

Molybden Plinii.

Lappa m. Bardana minor. Astragalus.

Bist. minor.

Synonyma.



nor, Eid.

A priori differt foliis minoribus & laevibus, radiceque magis intorta. Rependo multum se multiplicat. In monte Iura reperitur.

Bistorta Alpina maxima C. Bauhin.

Descriptio

Ex radice quadruplò quàm in vulgari maiore, contorta, geniculata, fibris capillata, foris nigricante, intus alba, caules bicubitales, nodosi, striati, maiori ex parte nudi exurgunt, quorum quilibet spicam florum subpurpureorum, vnciarum quatuor, sustinet: folia habet oblonga, in acumen desinentia, venosa, supernè virentia, infernè caesia, vel etiam incana: quorum quædà ad cubiti altitudinem accedunt, sed angusta, vncias tres lata, inquit author, qui Bistortam tertiam in pin. facit.

Locus.

In altissimis Silesiorum montibus reperitur ut in Sudetorum ingis, velut ad Gigantem, ac ad Albis fontes Schnee-gruben.

BISTORTA MINIMA.

Descriptio.



Bistorta minima radicem pollicari habet minorem, contortam, breuiem, exteriùs albam, fibris capillatam: caulis surgit dodrantalis, vel palmari paulò maior, aut etiam minor, tanta est varietas, foliis vestitus paucis angustis, oblongis, acutis, nullo pediculo hærentibus, alia

verò ex radice orta folia, vncialia, aut sextan-

Dod. gall. Fuchij unagi nem interibit Bistortam minorem, facitque secundà.

C. Bauhin. phyt. & pin. Bistorta 1. siue maior. radice magis intorta: Bistorta Lon. minor Gesn. hort. Lacun. Lob. in Adu. & Tabern. media Anguill. Latifolia Gesn. maior Eyst. mas Brunf. Colubrina & Dracunculus mi-

talìa, vnciam plùs lata, infernè glauca, supernè viridantia, spica vnciam longitudine superat, floribus comata albicantibus, sequente demum mine, non triangulo, ut in primis duabus, sed rotundo, ruffo.

Apud Gesn. hort. Aretius in descript. montis Stockh. vocat Bistortam minimam: Lobel. in Adu. Bistortam minorem & minimam, Britannicæ speciem: Anguill. paruum: C. Bauhin. phyt. Bistortam 3. siue minorem, pin. Bistortam 4. siue alpinam mediam, Limonij speciem minorem Gesn. hort. Bistortam minorem seu alpinam Camer. apud Matth.

Genevæ in monte Thuri fleret Iunio & Iulio.

Certū est iisdem facultatibus esse præditam cum aliis quibus maior: de qua varia varij scripserūt. Radix, inquit Tragus, in puluerem redacta, ac drachmæ pondere in potu sumpta, venenose silentiæ resistit, ac illud per sudores expellit. Eisdem viribus pollet aqua distillata, & radice in vino decoctio ad eadem valet. Radix Colubrinæ, nec non aqua distillata & radice decoctū sanguinis eruptiones, dysenterias, aliasque id genus fluxiones cohibet. Radix in puluerem redacta, ac cum aqua distillata temperata, grumos sanguinis ex casu, contusione, aut alia quavis causa concreti discutit, nec non morbum quoque regium. Radix Colubrinæ, Pyrethrum & Alumen adustum, æquali pondere in puluerem redacta, melle temperata, ac magnitudine Pisi, canis dentibus indita, fluxiones ac destillationes à capite fluentes sedant, & caput purgant: ad cancerum dorsi, polypos, & maligna vlcera, quæ cacoëthe vocant, aqua [è radice & herba] & pulvis conducunt apprimè, si cum aqua abluantur, & pulvere aspergantur: pulvis Pari ratione vsurpatus, sanguinem è vulneribus abundanter manantem cohibet.

Herbarij compertum habent (scribit Matth.) iisdem pollere facultatibus Bistortam & Tormetillam. Quamobrem utræque abortum prohibent bibitæ, ac ventri, renibusque ex aceto illitæ: vrinæ incontinentiam supprimunt, cum succo Plantaginis potæ: sistunt menses, si in earum decocto ad umbilicum vsque confederint fœminæ: Idem præstant [de radicibus tamen intellige] si tritæ, & ex melle atque Spica subactæ, ventri ac pubi illinantur. Sanguinem è vulneribus manantem cohibent, superasperso earum pulvere: qui item potus biliosas coercet vomitiones, si ongrum albo exceptus super fictili regulâ inassetur, moxq; comedatur: aqua quæ ex his duplici organo elicitur, siue è radicibus decoctum, venenis omnibus remedium est: utræque dysentericos sanant, & visceribus fuerint illata, non modò ipsis vulneribus illitæ, sed & in potionibus haustæ. Pulvis radice Bistortæ cū conferva Rosarum assumptus egregiè compescit sanguinis sputum, dysenteriam, aliasque fluxiones, menses nimios sistit: potest idem pulvis ex succo Cydoniorum bibi. Abortum prohibet pulueris drachma semis, cum pari Succini portione, ex ovo sorbili, diebus aliquot continuis vsurpata. Præter quæ omnia, tonsillarum (inquit Dod.) faucium & oris inflammationibus succurrit: eandemque cū radice vim tribuit foliis & seminibus, sed tamen minùs efficacem.

Pyrola omnes iisdem facultatibus.

Torm. facul. variorum.

LIMONIUM VETERIBVS.
CAP. XXVI.Limonium
Dios.

Limonium [*λεμονιον*] aliis Neurodes dictum, folia habet Betæ, verum tenuiora, & minora (vulg. longiora) decem aut plura: *caulem* tenuem, rectum, Lilio æqualem, rubro *femine* refertum, quod gustu adstringit. Semen tritum & ex vino acetabuli mensura potum, dysentericis, cæliaci que prodest, ac rubentem fœminarum fluxum cohibet. Nascitur in pratis (*ἢ λεμονιον*) & palustribus, auctore Dioscoride.

Beta silu.
Plin.

Plinius Betam siluestrem vocari tradit. Est & Beta silvestris [inquit lib. 21. cap. 8.] quam Limonium vocant, alij Neurodes, multo minoribus, tenuioribusque ac densioribus foliis, vndecim scilicet caulium. Huius folia ambustis virilia, guttaria adstringunt. Semen acetabuli mensura dysentericis prodest. Aquâ & radice cocta, maculas vestium elui dicunt, itemque membranarum. Quod autem vulgari codices, *vndecim scilicet caulium* habent, ex veteris codicis vestigiis non est: nam, teste Cornario, voces, *vndecim scilicet*, ad folia præcedentia pertinent: & *caulium* vox ex caule Lilij corrupta est. Vtrumque ex Dioscoride clarum est, qui pro vndecim *ἢ λεμονιον* habet: καὶ λεον αἰσιν λεμονιον addit.

Galen.

Limonij semē quod austerum est, inquit Galenus, cum vino dant cæliacis, & dysentericis, & hæmoptoicis. Prodest etiam ad fluxum muliebrem. Satis autem est dare acetabuli mensura.

Æquiuoca.

Inter Limonia recensentur sequentia: Limonium Dioscoridis, nullis reclamantibus notis; auctore Matthiolo, Sepalsis falsò Behen rubrū dicitur nobis: Limonium maius multorum. Li-

monium Matthiolinum, quod nec nouimus, nec scimus, an vsq̃ am ipse viderit. Limonium Maranthæ cui siliquas Antirrhini attribuit. Limonium Narbonense siue Olee-foliū, quod Limonium minus inscribimus. Limonium rarum quorundam, Imperatus Cichoriam globularem vocat. Limonium peregrinum aliud Clusij.

Eodem nomine insigniuntur etiam sequentes plantæ: Bistorta maior rugosiorib. foliis, à Gesnero. Ab Anguillara Plantago aquatica: lib. 38. Alisma Monsp. siue Doria. A Lobelio Sanguis Draconis. A multis Pyrola: quod non conuenit, licet non errarit qui cāpro Limonio vultus fuerit. Ab aliis Valeriana rubra latifolia, quæ tamen non respondet. Ab aliis Dentellaria Rondeletij sed falsò. A Germanis quibusdam Trifolium palustre referente Corto, de quo H. nostræ l. 17. Ab Aërio Cynoglossum, de quo etiam H. n. l. 33. A Rondeletio Glastum silvestre. A Plinio Carduus silvestris, teste Dod. Ab aliis Carduus dictus Spina Iuxca. A Gesnero Inrybi sylvestris genus in pratis nascens [à quibus Limonium nomen] vt & Hieracium. A nonnullis Odontis teste Dodonzo: cui tamen non placet ea opinio. Gesn. hort. Limonij nomine videtur miscere duas plantas, nempe Polemonium Dodonzi, & Polemonium fruticem (Trifolium fruticans luteum, n. g. l. 11.) cuius meminit sub Ruta capraria Gallorum Monspelij. Tandem audiendi non sunt Medici illi, qui contendunt Limonium apud Æginetam esse fructum vulgò Limonem dictum, siue Citrium malum de quo lib. 1.

De Limonio plura & quidem speciatim in huius Tomi Appendice.

FINIS LIBRI TRIGESIMI PRIMI.





HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM LIBER XXXII.

ROTVNDIFOLIAE ET COGNATAE.

R Estant rotundifolia atque his cognata, vno fasciculo comprehendenda, quando aliò commodius referri hâ-
bent non possunt.

DE IO, ID EST, VIOLA, VETERVM.

CAPVT I.

Theoph.



Vandoquidem variae circa *io* in Theophrasto, & circa Violam in Plinio acceptiones occurrunt, malimus omnes locos adducere, vt liberum habeât iudicium Lectores. Viola [*io*] nigra, flos odoratus; vsui

Ramulis
capit.

est, & naturâ magna ex parte suffruticosa est, sed annuâ non diurnior. Hæc enim ramulis caret, sed ab radice foliata constat, & perpetuò viret: vtque aliqui ferunt, etiam florem semper promere potest, si modo quodam colatur. Ex floribus verò nulla parte discerni potest; namq; differentiam nullam habere videtur, quâquam albâ haberi concedatur: colorem eius variari liquidò constat. Apud Cyrenam huius floris odor syncerus præcipuè sentitur: semine exit. Nam & ipsa, & eius radix ligno constat, authore Theoph. lib. 6. hist. cap. 6. Florum prima Viola alba se ostendit (ait cap. 7.) emicat enim vbi cælum clementius statim, etiam nondum Hieme exactâ, vbi verò immitius postea, Vere sc. exit: & cum ea, quæ Viola flammea vocatur, siluestris duntaxat. Hæc cæteris omnibus, quibus coronarij vtuntur, longè præcurrunt, & inter vernos flores tam siluestres, quàm vrbano plurimùm durant. Vita Violæ albæ anni maximè tres, senescens diminuitur, candidioresque assidue flores fert. Ad iucundam autem Violarum olentiam solum cælumque accommodatum plurimùm confert. Videtur & annus [vt dictu] ad bonam olentiam referre, cum sc. talis aut talis incesserit: non imbrium squalorumque tantum ratione, sed etiam quum tempus certum, & aq. & status, & in totum cæli comoda mutationes accesserit. Montibus autem [vt & hoc simplici transigam ratione] & Violæ, ceu & reliqui omnes flores, odore longè deteriore emigrant. Hoc mirum, Violæ florem, odorem sua-

Tom. III.

uissimum reddere: cum eius nulla alia pars bene oleat, vt lib. caus. 6. cap. 15. prodidit. Cæterum, eius flores distantes odoratiores quàm proximi sentiuntur, ibid. cap. 15. Sed nec locis admodum sitientibus atque tenuibus *io* *io* *io* odoratum est, nec vbi cælum vehementer feruidum æstuosumque est. Quia supra modum resicca-

Ad iucundam
de Viola.

Plinius Violarum infra scriptis locis meminit. Lib. 21. cap. 6. Violis honos [Lilio] proximus. Earum plura genera. Purpureæ, luteæ, albæ: *plinius* plantis omnes (lutea & alba semine purpureæ plantâ, Dal.) vt olus satæ. Ex iis verò, quæ spontè apricis & macris locis proueniunt purpureæ, latiore folio statim ab radice carnosâ exeunt, idæque græco nomine à cæteris discernuntur, appellata la [*μυδάρα* Theoph. Dal.] vt ab his lanthina vestis. Sed è satius maxima autoritas luteis. Genera iis Tusculana, & quæ marina appellatur, folio aliquantò latiore, sed minùs odorato. In totum verò sine odore, minutòque folio, Calathiana, munus Autumni, cæteræ Veris. Eodem lib. cap. 11. Florum prima Ver nuntiantium Viola alba (*αδανίον* Theoph. nempe bulbosum, Dal. 7. Tepidioribus verò locis etiam Hieme efficit. Postea quæ appellatur purpurea, proximè flammea, quæ & Phlox vocatur. Vita longissima Viola albæ est bimatus. Ab eo tempore degenerat.

Hippocrates agnouit Violæ duo tantum genera, nigrum & album: Nicander in Georgi pallidum & luteum. Dioscorides Violam albam à purpurea non tantum capite, sed & libro separauit. Viola purpurea (*io* *io* *io*) inquit, folium habet minus & tenuius quàm Hedera, sed nigrius, & non dissimile: cauliculum medium à radice, in quo flosculus est valde odoratus, purpureus. Nascitur in embrosis & asperis locis.

io inter spina Dioscoridis vocatur. Dal. 6.

PPP

ἰον, ὡς αὐτὸν ἔχον, καὶ βίλον, Romanis πετάλις, μύρρις, βίλα σαρπύρις.

Ionis.

*Ion
Gracorum.*

*Loripes.
Viola
sarrana.
Vaccinia.
Hyacinth.*


*Viola clau-
da.*

Violam Græci *Ion* pro flore *Violarum*: *Ioniam* pro frutice appellant, inquit Marcellus. *Cum* *Ion* Græci dicunt, inquit Herimolaus, nigram siue purpuream ferè intelligunt: humilis hæc & latiore folio statim ab radice multa carnoso exeunte sine ramis: ob id vulgò *Loripedem* voco. *Violas* *sarranas* à colore cum purpureis easdem esse apud Columellam arbitror: purpureas *Vaccinia* & *Hyacinthum* dici *Seruius Grammaticus* existimat. *Dioscorides* quoque *Hyacinthum* latine *Vaccinium* appellari scribit. Admonendi sunt, qui hæc legunt, purpureas *Violas*, duorum generum haberi: alias inter *Loripedes* siue sessiles, de quibus hîc ago, alias inter *Leucoia*, odoratasque omnes esse. Sed & candidarum quoque gemina hæc discrimina cernuntur. Alię *Loripedes*, alię *Leucoia*. *Leucoia* intelligo, quas *Mauritania* *Cheiri* appellat. *Loripedes*, quæ vulgò *Claudæ* nominantur, & *Mauricæ* *Semphigi*. Horum nonnulla recepit *Ruellius*, quæ repetere haud est opus.

VIOLA MARTIA PURPUREA

CAP. II.

Descriptio.



IN primis *Veris* muneribus sunt *Viola Martia* purpurea, ex radicibus fibrosis aliquando in plura capita diuisis, folia emittentes ex rotundo nonnihil oblonga, serrata, longis pediculis appensa: inter quæ petioli è radice quoque enati alij, singuli florem sustinent ex cæruleo purpureo rāscem o-

doris suauissimi, calcari donatum, è quinque foliolis compositum, quo euanescente, ex alijs pediculis ad radicem oriuntur rotunda capitula, in tres carinas dehiscencia semine plena paruo, rotundo.

Synonyma.

Hermolao *Viola Martia* purpurea: *Viola* Græcis simpliciter *Ion* vocata, *Viola Loripes* sessilis, & *clauda* vulgò. *Monachis* in *Mel.* *Viola* absolute descripta, *Viola purpurea*, *Mamula*. *Trago* *Viola nigra* seu purpurea, *Viola odorata* purpureis prædita foliolis, *Viola Martia*, & quadragesimalis quorundam, ἰον παρρησιον vocata à *Virgine Io*, in *vaccam* à *Ioue* conuersa, & *Leucoium nigrum* *Hippocratis*. *Gesn. hort.* *Viola* simpliciter dicta vel *nigra* cognomine *H. Lugd.* p. 797. *Viola purpurea* *Matthioli*. *Tabern.* *Viola Martia* purpurea. *C. Bauh. phyt.* *Viola Martia* i. siue purpurea odora simplex: *Eid. pin.* *Viola Martia* rotundifolia i. siue purpurea flore simplici odore. *Viola fatiua* *Brunfels. tom.* i. rhaps. 22. p. 138. & in 4. p. 48. *Viola purpurea* *Fuchs.*

Matth. Lac. Lob. in *Adu. Casalp. & Cast.* *Viola nigra* *Dod.* *Cordo* in *Diosc. Ger. & Clus. hist.* *Viola Lon.* *Viola Martia* præcox purpurea *Lob.* ic. p. 608. *Viola Martia* flos simplex *Obi* p. 334. Flos communiter coloris in cæruleo subnigro purpurei: qui culturâ grandior fit: quandoque foliis latioribus *Calthæ æmulis*, quæ *Viola matronalis* flore purpureo *Eyst.*

Violam autem Græci ἰον & ἰον παρρησιον, i. e. *Nomling.* *Violam purpuream* nuncupant. *Theophrastus* verò & ἰον & ἰον παρρησιον, h. e. nigram *Violam*: à nigricantis purpuræ florum colore. *Plinius* solam hanc græcò nomine, à cæteris *Violis* discerni, appellarique ἰον, & ab his lanthinam vestem dici refert. *Officina* latinum nomen seruant: ac herbam *Violariam* nominant & *Matrem Violarum*. *Germani* florem *Blawoder braun* *Bach.* *Blawoder braun* *Meyen.* *Violen*: *Galli* similiter *Violette de Mari*, h. e. *Violam Martiam*: *Itali* *Viola Mamula*: *Hisp.* *Viola*: *Belgæ* *Violotten* dicunt: *Angli* *Viola*: *Bohemi* *Viola*: *Hung.* *Viola*: *Arabes* *Senesfigi*, *Sonofrig*, siue *Benesefegi*.

ἰον autem Græcis vocatum in *Geoponicis* *Nicander* credit, vt perhibet *Hermolaus*, quod *Nymphæ* quædam *Ionie*, florem eum *Ioui* primum dedere muneri. Alij ἰον dictum affirmant, quod cum io puellam adamatam *Iupiter* in *vaccam* conuertisset, terra florem hunc pabulo eius produxerit: qui propter ipsam factus, ab ipsa nomen accepit. Atque inde etiam *Latinis* *Viola* quasi *Vitula*, extrita litera t dici putatur. *Seruius* *Violam*, *Latinis* etiam *Vaccinium* eadem etiam occasione dici refert, locum enarrans *Vitigilij* in *Bucolicis*:

Alba ligustica cadunt, Vaccinia nigra leguntur.

Virgilius tamen *Æcloga* 10. *Vaccinium* à *Viola* differre ostendit.

Et nigra Viola sunt, & Vaccinia nigra.

Vitruuius etiam *Architecturæ* lib. 7. *Violam* à *Vaccinio* distinguit. Nam ex *Viola* *Silis Attici* colorem: ex *Vaccinio* purpuram fieri elegantem memoriæ prodidit. *Tinctores*, inquit, cum volunt *Sile Atticum* imitari, *Violam* aridam coniciunt in vas cum aqua conferuere faciunt ad ignem: deinde cum est temperatum, coniciunt in linteum, & inde manibus exprimentes, recipiunt in mortarium aquam ex *Violis* coloratam, & ex ea *Erethriam* infundentes, & eam terentes efficiunt *Silis Attici* colorem. Eadem ratione *Vaccinium* temperantes, & lac miscentes, purpureum faciunt elegantem.

Ad *Violam nigram* reuertimur, quæ *Hyeme* pariter ac *Æstate* viret, frigoris patientissima. *Locus* opacis, iuxta dumos, muros, agrorum hortorumque margines, pingui solo plurima frequensque emicat. Flores vt plurimum *Martio*, vbi seriùs, *Aprili* prodeunt mense. Flores *Martio* potissimum mense colliguntur: *Semina* verò in *Æstate*, & nonnunquam *Aprili*. *Montpelij* ego obseruari florentem *Ianuario*. *Genue* *Februario* & *Octobri*: *Basileæ* in monte circa *Dornack* *Augusto*, *Montbelgardi* in *Dumetis* *Octobri*.

VIOLA MARTIA PURPUREA FLORE multiplicato maiore.

Hortorum fragrantès puluillos ornat foliis ferè minoribus quàm insulæstri. floribus odoris fragrantissimi purpureis, siluestris paribus.

bus, sed numerofo foliorum agmine multiplicibus.

Synonyma.

Camer. hort. Viola Martia pleno flore biflora, purpurea: quam [apud Matth.] non transplantatam loco calido simplicem euadere ait. Hist. Lugd. p. 797. Viola purpurea sativa, in hortos



translata: maxime loco aprico insolata, floreque saepius vulto, alioque cultu, denso foliorum stipatu, globosa facta, ideoque duplex Gallis dicta, *Violate de Mars double*, olitoribus in delitiis habitata. Dodon. gallic. & lat. Viola cum purpurea, tum candida, hortensis utraque, florum foliola multi-

plicans. Gesn. hort. Viola simpliciter dicta, vel nigra, cognomine, *Dasypodium*, vel potius *Dasyphyllum*, h. e. multiplici flore, cognominatum. Lob. in Adv. Viola duplex: in Obs. p. 334. Viola Martia purpurea, Tabern. multiplex.

C. Bauh. pin. Viola Martia rotundifolia 4. [1. phyt.] siue multiplici flore; Viola nigra flore pleno, Dod. Viola purpurea & alba multiplex Tabern. Ger. Eyf. Viola flore multiplici Dod. fl. pleno Cast. Cam. Viola caerulea floribus numerosis foliis constantibus Celsalp. Variat floris colore purpureo, rubello, candido, ex purpureo & albo variegato.

Locus & Tempus.

Non nisi hortensis à me fuit observata florens Montbelgardi mense Septembri; Geneus Octobri.

Viola Martia intensè purpurea, flore minore pleno.

Descriptio.

Radix prolixa, crassiuscula: clemata Violæ Martiæ vulgaris: nec dissimilia folia: flores autem multiplici foliorum fœturâ pleni, minores, saturatioreque purpurâ tincti.

Nescio unde illustriss. Principissa nacta sit Violam hanc Martiam alibi non conspectam, flora multiplicato minore, colore intensè purpureo. Colitur in horto Ill. E. C.

Locus.

Viola flore pleno maximo.

Hoc est illud Violæ purpureæ genus, quod Costerus in suis comm. in Mesuem, Constantinopoli reperiit scribit, flore pleno, magnitudinis Rosæ parvæ Moschatellinæ, odoris suavissimi, cuius flores duos ante cibum comestos alvum solvere narrat. Huius, meminit Camerarius in Horto, & apud Matth. in Hist. germ.

Viola Martia, flore ex albo & caeruleo mixto, multiplicato, odoratissimo.

Descriptio.

Serpit & hæc, & subinde clemata demissis fibris radicatur folia non alia, quam vulgarioris Violæ: Tom. III.

flores eodem modo pediculis longis nituntur, statim è radice ortis, odoratissimi, multiplici foliorum agmine fæcti, albo caeruleoque mistis versicolores.

Dodon. lat. Viola foliola multiplicans candida. Camer. apud Matth. germ. Viola alba & rubella H. Lug. p. 797. Viola candida globosa. Tabern. Viola alba multiplex.

Hanc attuli Bisantio, & Claresvallii vidi florētem adhuc mense Septembri, & postea Aprili.

Viola Martia flore albo odorato, & non odorato.

Longissimis serpit radicibus, & subinde nonas demittit fibras: folia iuxta pediculum falcata, minora, quam Violæ Martiæ purpureæ, magis hirsuta, concinnè crenata: flores formâ quidem & odore purpureæ persimiles, sed minores, coloris albi & planè nivei, odoratissimi, interdum calcaria purpurascunt.

Hæc aliquando foliis est gracilioribus, floribusque nullo aut languido odore donatis.

Sunt in Violarum genere non modò purpureæ (inquit Matth.) sed etiam candidæ, frigidis & viginosis locis nascentes, prorsus tamen inodoræ, de quibus nihil, quod extet, memoriæ prodidit Dioscorides. Hæ numerosæ proueniunt in Ananienſi agro supra Tridentum, vbi mense Aprili aded copiosè florent, vt si longè prospiciantur, oculos fallant, & extensâ lintea videantur. In Hist. Germ. ait Violas albas non ita suauiter olere vt purpureas, quod locis frigidis proueniant.

Lob. in Adv. Flores albi vbiq; vulgatiore, nullo, aut sanè languido odore. H. Lugd. p. 797. Violæ albi nullo aut languido odore. Trago. Viola candido flore & odorato. Viola alba vt nix: Eid. Viola candidis floribus Gesn. hort. Viola Martia flore albo. Tabern. Viola Martia alba Monach. in Mes. Viola mamula alba in montibus prope Brixam.

C. Bauh. pin. Viola Martia rotundifolia 3. siue alba; Viola alba Brunfels. Candida Dod. Cels. flore albo Ger. Viola Martia candida Trago, alba Tab. Eyf. Viola silv. albo flore Gesn. Hort. Viola Martia alba hort. & campestris odora Lob. Ic. Plant. p. 608.

An Hermolao in Diosc. Violæ loripedes siue sessiles, candidæ, vulgò Claudæ nominatæ, & Mauricè Semphigi?

Geneus prope la Bassie florentem vidi mense Martio & Aprili. Frater inuenit eam in silua circa Augustam Rauracorum, plerumque in dumetis prouenientem. In sepibus circa Valentiam & Decan in Delphinatu passim observatur copiosissima. Montbelgardi ex siluestribus translata in hortum Ill. E. C. acquirit calcaria purpurascencia.

VIOLA CÆRVLEA MARTIA

inodora siluatica, in cacumine semen ferens.

Radice est sarmentosa, tenui, lignosa, & longâ, vario reptatu hinc inde penetrante, densâ & longâ fibrarum comâ per intervalla prædicta: folia circinatæ ferè rotunditatis, nisi in mucronem acutiorem definerent, supinâ parte leniter hirsuta, viridantia, pronâ verò glabra, dilutiùs virentia, & ferè luteola, interdum subpurpurea, in ambitu serrata, gustu viscido, pedi-

Descriptio

culis tenuibus, quadrantalibus: cauliculi pauci, quos ad alas inuolucra foliosa, acuta, in



ambitu hirsuta completuntur, flosculi in ramulorum summitate proferunt, Viola Martia odoratae similes, ex quinque foliis constantes, quorum supremum longius protentum reliquis; calcar deformat, purpuream vtrinque secante fasciâ albâ, quâ ipsâ albedine reliquorum quatuor

foliorum saturatâ purpurâ tinctorum vngues colorantur, nullâ odoris gratiâ: in medio stamina lutea, cum stilo virente: caules subinde cubitalem nanciscuntur longitudinem, inque ramos diducti foliis vestiuntur: flores, ut mox diximus, gerentes, quos subsequuntur siliquæ longæ, in tres carinas dehiscentes, semine sætæ copioso, ex rotunditate oblongo.

Icon.

Nostri figura minùs accurata partes omnes non exprimit: quare eò accuratiorem dedimus descriptionem.

Synonyma.

C. Bauh. pin. Viola Martia rotundifolia 2. siue Viola Martia inodora silvestris: Et sic in phyt. ubi tertia est. Viola silvestris Brunfels. in 4. p. 48. & Anguill. inodora Dodon. Viola 2. siue purpurea silvestris, Viola nigræ alterum genus cæruleo & inodoro flore: & p. seq. 158. Viola canina seu silvestris, Trago. Viola nigræ silv. species Gesn. hort. Viola canina Loh. & Tab. sylv. Ger. Viola canina cærulea inodora silv. serotina Lob. Ic. Plant. p. 609. Viola Martia silv. Thal. Martia canina. Eyst.

Varietas.

Flos cæruleus, aliquando pallidus: duplex est, altera maior, foliis maioribus & rotundioribus: altera minor foliis mucronatis oblongis ac striatioribus: Gesner. in monte fracto meminit montanæ, quæ solùm foliis minoribus & solidioribus à vulgari differat: est & Viola Martia flore rubro purpurascens, Eyst. Dalechampsius olim vocabat nostram plantam, Matrem Violarum.

Locus.

Observatur passim ad macrorum & siccorum agrorum ac pratorum margines: item in dumetis & silvis, florens eodem tempore, quo purpurea vulgaris, sed multò diutius illâ perdurâs.

VIOLA MONTANA FOLIO multifido.

Descriptio.

Rarum Violæ genus mihi in monte Nombres Rhætorum prope balneum Marmis inventum, simplici ferè radice hærebat: folia pediculis longiusculis nitebantur è radice statim ortis, in decem longiuscula & angusta segmenta [singula Linariæ folium referentia, neruo secundum longitudinem decurrente] ad pediculum usque



res dissecto.

dissecta, gustu glutinoso, reliquarum Violarum more: florem, qui tum deciderat, non observavi, superstitionibus adhuc siliquis in tres carinas hiantibus, quas pediculi breviores quàm foliorum sustinebant.

C. Bauh. pin. Synonyma. Viola Martia rotundifolia 5. siue Viola Alpina folio in plures partes dissecto.

VIOLA MONTANA PURPUREA, SOLIDIORE FOLIO.

Exit hæc in summi Sneebberg iugi vertice, perquam exiguis foliis, & quali circinatæ rotunditatis, in ambitu leuiter serratis, crassiusculis, longiusculo pediculo inhaerentibus: cauliculus assurgit è medio foliorum, duas uncias longus, unicum florem sustinens purpureum, vulgari similem, sed longè maiorem & inodorum: cui succedit triangula siliqua: radix nonnihil serpit, & aliquot fibris donata est. Floret sub finem Iunii. Hanc nonnulli Melanium [fortè restituendum Melanthium:] montanum appellare videntur, inquit author Clusius, qui in Pann. p. 356. Violam montanam 2. [ita quoque in hist.] siue montanam purpureo flore vocat. C. Bauh. pin. Violam Martiam rotundifoliam 6. siue Violam Alpinam purpuream exiguis foliis.

Locus. Descriptio.

Synonyma.

VIOLA MARTIA LUTEA.

Admodum fibrosa est radix: folia circinatæ rotunditatis ferè, ad pediculum longum, tenuem falcata, parva, cæterarum Violarum foliis delicatiora, tenuiora: flores pediculis è radice mox ortis insident, exigui, lutei.

Descriptio.

Matth. Viola aureo colore. Monach. in Mel. Viola mamulæ luteæ seu croceæ. Gesn. hort. Viola flore luteo. Aret. Viola lutea, & Lob. Ic. p. 609. Eid. Obs. p. 33. Viola Martia cauliculis ramosis, floribus luteis. Clus. pann. p. 356. Viola 1. montana (sic etiam p. 357. & Hist.) flore luteo. Dalechampsius olim Paronychiam vocabat.

Synonyma.

C. Bauh. phyt. Viola 4. Eid. pin. Viola Martia rotundifolia 7. siue Viola alpina rotundifolia lutea: Viola luteola minore flore Gesn. hort. Viola lutea Cæsalp. Cast. Viola Martia lutea inodora alpina Camer. Gramen Parnassi aliud H. Lugd. p. 1005.

Semina circa Genèuam in montibus collecta, terræque in horto Ill. E. C. mandata plantam dedere, quæ Aprili & Martio florebat. Reperta quoque ultra citràque montem Gotthardi, & in Apennino, qui vulgò Cornea dicitur, inter Italiam & Prouinciam. Abundanter nascitur in omnibus Austriæ & Stiria Alpibus: Iunio atque Iulio

Locus & Tempus.

que Iulio florens, in cultis autem Aprili. In Borealibus etiam Angliæ montibus inueniri intelligebat Clusius.

Cæterum Viola refrigerandi vim habet, Dioscoride auctore. Folia eius per se & cum polenta illita stomacho æstuanti, oculorum inflammationibus, sedisque procidentibus auxiliantur. Præterea id quod in flore purpureum est, cum aqua potum angina correptis, & comitiali in pueris morbo mederi affirmant. Quam postremam sententiam quidam hinc excludunt, tanquam supposititiam, nec eam Ruellius conuertit, quod eadem capite de Altere legatur. Alij contrà, Plinium & eos auctores, ex quibus illa descripta, sequendos indicant, idque de Viola purpurea rectè legi, & à Dioscoride scriptum esse content, capiti que de Altere Attico falsò adiecta, quod neque Plinius neque Græcus aliquis auctor ea de Altere memoriz prodiderit.

De Viola verò hæc Plinius. Viola siluestres sunt & sariæ. Purpureæ refrigerant, contra inflammationes illinantur, stomacho ardenti imponuntur, & capiti in fronte. Oculorum priuatum epiphoris, & sede procidente, vuluæ, & contra suppurationes. Crapulam & grauedines capitis impositis coronis olfactuæ discutit. Anginas ex aqua potæ. Id quod purpureum est ex iis, comitialibus medetur, maximè pueris in aqua potum. Semen Viola scorpionibus aduersatur, contrà flos albæ suppurationem aperit vel discutit. Hæc Plinius. Et sanè hoc ex Violis purpureis auxilium videtur non manifestis ipsarum



qualitatibus aut facultatibus, sed potius & cæco effectu anginis & epilepsiæ mederi.

Viola folia [inquit. Galen. 6. simpl.] aqueam & subfrigidam substantiam superantem possident. Quare tum per se, tum cum polenta illita calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur & ori ventriculi æstuanti, & oculis.

Mesues multò accuratius Viola vires declarat his verbis. Viola recens, frigida est & humida, siccata minùs tum frigida, tum humida. In recente enim excrementola in superficie humiditas purgatrix lubricando, caliditate obtundit, ipsius perfectionis & formæ causam. Hæc cum siccando resoluta fuerit, caliditas primò obrupta, & ab ea sapor amarus, sitque purgatrix trahendo. Viola recens refrigerat, narcoticorum ritu dolores calidos sedat, inflammationes omnes extinguit, asperam arteriam & thoracem lenit, expurgat bilem fluam, & ab ea calorem extinguit, & cephalalgiam à causa calida: somniferæ sunt, conferunt vix, cynanchæ, præter cæteras verò pleuritidi, & cæteris tumoribus thoracis: phlegmonem

Tom. III.

hepatitis, obstructionem eius siccam, iæctum valde iuuant, & febres symptomáticas, seu inflammatorias: sitim sedant, sed coryzam excitant. Melior est Viola matutina, cuius virtutem neque Solis calor resoluit, neque pluvia dissipauit. Succus Violarum & syrupus leniendo soluit. Viola melle conditæ magis tergent, minùs refrigerant, cum saccharo contrà. Oleum sit omphacinum aut amygdalinum, in quo oleum Violarum fiet. Nec Viola, nec harum succus multam coctionem sistent. Acetum Violarum febrium ardorem mirè sedat. Dantur potu expresso ab Vnciis iij. ad Vncias viij. Succus ab Vncia vna, ad Vncias duas. Syrupus violaceus ab Vnciis duabus, vsque ad Vncias quatuor. Conditum Violarum ab Vncia vna & semisse ad Vncias tres. Hactenus Mesues. Flores Violarum bibiti cum aqua destillationis, vel decoctionis florum Violarum, conferre à proprietate Epilepsiæ puerorum, & propriè illi quæ dicitur Mater puerorum, & in qua febris est acuta, legimus apud Bayrum.

Adiunt siccata humiditate, quæ in superficie continetur, gustu amaritudinem deprehendi, à calido se. prouenientem: & hinc fieri ut esciccatæ magis calidæ, minusque humidæ habeantur. Ego autem [inquit Matth.] nullam sanè amaritudinem, nec in siccis, nec in virentibus obseruari: foliola quidem florum sunt ita acria, ut fauces vellicent: quamobrem Violas nec frigidas simpliciter nec narcoticas existimarim dicendas.

Semen certè scrupuli pondere ex iure gallinaceo sumptum, purgat. Aqua, oleum, & acetum violaceum cephalalgias ardentissimas vel per se, vel cum linteis impositæ compescunt. Nec minùs calidæ hepatis intemperiei auxiliatur.

Succus herbarum tumores calidos reprimat. Aqua oculorum dolores cum linteis inducta mitigat. Ad dysariam præstans medicamentum est oleum violaceum vmbilicali regioni illitum. Semen calculosis vtilissimum. E Violis igitur nigris seu purpureis, ut vocant, Acetum, Oleum, Conferuæ, Zulapia, & Serapia conficiuntur. Ad quatuor calidas affectiones adhibere, præsertim verò pueris, qui morbo comitiali & ardentibus febribus, non rarò infestantur, comendat Tragus, iteratam violarum macerationem in aqua fontana factam addito saccharo propinans. Serapium Violarum, mensura duum, aut trium cochlearium sumptum, ardores febrium acutarum tollere idem testatur: laxam præterea aluum conseruare, emollire aposthemata, cor roborare: pleuritidi mederi breuiter omnibus calidis affectionibus summè conducere. Esse qui Serapium Violarum aqua fontana misceant, sitique restinguendæ exhibeant, quam sanè potionem ægrotantibus gratam esse fateatur. Additque postremò, id quod in medio residet Viola luteum punctum, negligi non debere, sed diligenter asseruari, nam decoctum in aqua & potum anginae auxilio esse, & comitialibus maximè in pueris, iuxta Dioscoridis præceptum. Tandem Violarum oleum, aquam distillatam, & acetum, dolorem capitis sedandi vim habere illitu, nec non inflammationibus hepatis foris, imposito, opitulari. Hæc inter alia Tragus, quem miror, ut & Dodonæum eum sequuntur, tribuere luteæ parti Viola, quod Dioscorides & Plinius purpureæ.

Simeon Sethi ait prodesse ad intestinum dolores, cor verò offendere. Dolores capitis à

P P P 3

Vires & vsus.

Sede procidentibus Angi-
za.

Crapula.

Destillat.

Dofu.

Seminis
dofu.

Serapij
Viol. dofu.

Temper.
Mes.

flauâ bile factos sopire, potas & odoratas: Ventriculum irritare, & flauam in eo inuentâ bilem: caput siccum humectare, calidumque refrigerare suo odoratu: Somnum inducere: humida capita destillationibus obnoxia reddere.

PINGVICULA GESNERI.

CAP. III.

Hoc nomine appellabat Gesnerus foliorum argumento, quæ per terræ superficiē sparsa, quinque aut sex, & plura interdum pinguiuscula sunt & nitida, binas vncias longa, vnciam circiter lata, per extremum nonnihil obtusa: inter hæc sur-

Descriptio.

0



Gesneria verna. præbenditur.

gunt pediculi aliquot, palmares, aut altiores, quorum vnicuique in summo fastigio hæret flos vnus purpureo-violaceus aut alb⁹, hians, longo calcari donatus, facili pediculum relinquens: radix fibrosa.

Miror Gesnerum dicere Pinguiculam [vt vocat in monte fracto, & de hort. vbi Liparum vo-

candam censet] folia Oleæ habere. Sanè ea similitudo videtur longè perita: multò enim latiora sunt, nec dura, sed tenera & breui euanescentia: color quoque diuersus.

Pinguiculæ nomine depingitur & describitur à Clusio in pann. & hist. placuit enim id illi relinquere quo à Gesnero donata est. An verò Lingua, vel Lingulaca Plinii sit, quam lib. 24. cap. 19. & lib. 21. cap. 11. circa fontes nasci tradit, non asserit, sed inquirendi duntaxat causâ proponit. Pinguiculam & Saniculam Eboracensem, h. e. Voss hirc Samete nominat, Quibusdâ xpianis Apuleii putatur. H. Lugd. p. 1106. Cuculatam inscribere inuoluit.

Dodecatheon Plinij

C. Bauh. phyt. dicitur Pinguicula Dodecatheon Plinii quorundam: Eid. pin. Sanicula rotundifolia & siue Sanicula montana flore calcari donata: Pinguicula vel *ibid.* Viola humida & palustris: Dodecatheon Plinii, Gesn. & Camerarii. Sunt qui Oleosam appellant.

Varietates & Loca.

Quæ albo est flore spontè provenit non modò in Schneeberg, Durrenstein, aliarumque Alpiū iugis, in locis à soluta recens niue adhuc madentibus: sed etiam illa quæ purpureo est flore permixta in omnibus ferè pratis vliginosis, in quibus Maio floret, & Iunio semen profert: in Alpibus verò ferè siccis, Clusio authore. Altissimis autem & niuosis montibus gaudere, eque saxis prosilire, rivulo quopiā præterfluente madentibus, & florere Iunio etiam antequam niuib. liquatis montium cacumina detecta appareant, annotatum est in H. Lugdunensi. Obseruavi ego in monte Thuri flore purpureo & albo, & ultra Gothardum ad radicem montis. Reperit

loh. Schvab copiosam flore purpureo in Iuræ montis tractu illo, non tam variis, quàm raris stirpibus refertissimo, cui rupes & falcones Falconum rupes nomen dedere. Referebant ei eius loci pastores, se plagas sibi illatas feliciter curare, foliis eius contusis & impositis: eiusque succo pingui & butyroso fissuras in vaccarum vberibus litu curare.

IACEA TRICOLOR SIVE TRINITATIS flos.

CAP. IV.



Plucherrimi floris, Descriptio.

eorumque varietas efficit ut in hortos translata cultu digna iudicaretur: quos quinque foliis constantes, delicias suas aduersâ facie spectatori offerre videas: modò totos purpureos, modò luteos, caruleo, purpureo variegatos: aliterque etiâ versicolores,

in pediculis longis, concavis, ex foliorum alis quæ modò Hederae terrestris instar rotunda, modò oblonga, in ambitu serrata, in *caulibus* reptantibus, ramosis, ex *radice* tenui & fibrosâ exortis: *semen* in pericarpis turgidulis, ferè triangularis, minutum, splendidum, copiosum. *Minus* bona est nostra figura ex Fuchsiis. An hæc sit Iacea illa, quam ad intestinorum ramices magni faciunt recentiorum quidam, dubitat Matthiolum. In post. comm. addit quosdam vocare Herbam trinitatis, ac duas statuit species, minorem & maiorem.

Camer. apud Matthiolum germ. demptâ figurâ Matthioli, alias duas exhibet [vni titulus, Iacea, Viola trinitatis: alteri, Iacea siluestris] quarum vna sufficere posset.

Tragus Herbae Trinitatis duo tradit genera, fatiua & siluestris. Hanc vitium frugum & hortorum vocat. Porro ambas has Violas, eas esse credit, quas Columella Sarranas nominat. Nec dubitat quin per Flammeam & Phlogem, eas intellexerit Plinius, ita ut Phlogion dicatur fatiua, Phlox verò siluestris. Tandem non sine errore Herbarios Iaceam appellare sibi persuader, & lasmen potiùs dicendam arbitratur, & cum nonnullis Violam Albeter.

Viola hæc tricolor Dodonæo quoque conuenire videtur cum Phlogio Theophrasti, quam Gaza Violam flammeam interpretatur. Sed hæc opinionem improbat Gesnerus.

Lobel. in Adv. scribit errare Senensem, ut qui Iacæ nigrae facultates, Violæ flammeæ attribuat, & hanc à scabiosis discernere nesciat: sed decipisse illum nomenclaturam Iacæ utriusque communem. Quare hanc tricolorem Iaceam mavult dictam *Viola*, à Viola, ut etiamnum vocatur, quam

Viola Sarrana.

quàm quòd plurimùm humi iaceat, vt quidam autumant.

Viola nigre perſimilis flos (inquit Geſn.) quẽ aliqui Trinitatis cognominant. A colorum numero ſeptenario, vulgari nomenclaturâ Heptachrum noſtrâ appellat: inodorus, ſolùm colorum elegantia & varietate placet. Aliquinon rectè Antoram vocant.

Iacea tricolori adſcribit Doſthenius caulem inſtar Lanendule, acutis & paruis foliis. Sed non video, quomodo conuenire poſſint, quæ ſcribit de caule & foliis. Videndum etiam an Ruellius alicubi Ocimoides nominauerit, & Tragus Polygalon Dioſcoridis, quod vult Doſthenius. Ruellius Viola inodoræ genus eſſe dixit, quam vulgus gallicum Panſeam vocat.

C. Bauh. phyt. Viola 8. ſiue tricolor hortensis, repens, &c. & 9. & 10. i. e. Viola flamma & flammea (vtrouque enim modo Gaza vertit) Theophrasti. Eid. pin. Viola martia foliis oblongis & an 9. & 10. Theophrasti: Herba Trinitatis Brunf. tom. 2. rhaſ. 17. & in 4. p. 63. Fuchſ. Lonſatina Trago: Iacea maior, ſiue Viola tricolor Caſt. Viola flammea Dod. gall. Ceſalp. Viola tricolor Dod. Cluſ. Ger. Viola flammea colorata Lob. Obſ. p. 335. Ic. Plant. p. 611. calida in Adu. Viola flammea ſeu tricolor maior H. Lugd. Viola Trinitatis i. Tabern.

Flos colore & magnitudine variat: & flore purpureo & cæruleo: albo & luteo: cum pallido cæruleo, purpureus & luteus etiam permiſcetur, quandoque lituris quibudam notatur: rarò flore penitus albo reperitur, quæ eſt Viola Trinitatis. Tabern. Datur quæ duplò maiore flore eſt, coloris vnus, nigre purpureæ, & inſtar holoserici nitente, vel pallido, hinc Flos Trinitatis maior, Eyſt.


Nomina
linguarum. Germanis drenſaltigſere blûmen, freiffam/
freiffamtraut, & Rheni tractum incolentibus,
vinnûſſorq. Belgis drenvaldichſer blûemen:
Gall. De la Penſee: It. Iacea: Angl. hartys naſe/
ſoue idle Names.

Locus &
Tempus. In Aruiſ pluribus locis exit: naſcitur & in
hortis, & crebrò quidem ſua ſponte, ſilueſtri ſpe-
cioſior & elegantior. Vere vnâ cum Viola ni-
gra aut paulò poſt emicat, æſtate dein totâ, &
maximâ Autumni parte ac ſubinde etiam Hie-
me, floret, vt Geneuæ menſe Octobri. Decem-
bri, Ianuario, & Februario. Montbelgardi in
agris obſeruam luteam inter Arbouans & Au-
dinſcourt; in agris verſus La Chan flore albican-
te & ſubluteo, à ſatua non diuerſam, niſi mino-
rem: eiufmodi etiam vidi in agris inter Maſmû-
ſter & S. Germain, Septembri & Octobri.

Vires &
vſus. Aqua diſtillata puerorum inflammationibus
& torminibus ventris auxilio eſſe quandoque
pota traditur: hodie apud mulieres in vſu eſt:
eadem (vti teſtantur plerique apud Tragum) puſ
in pulmone & thorace collectum purgat, ſi con-
tinuò bibatur, eaque vinum miſceatur. Herba
angina ſuam medetur: flores præcipuè virginum
fertulis nati ſunt. Quum verò acrimoniæ ra-
tione incidendi vim quampiam habeat, idèò
(inquit Fuchſ.) rectè recentiores aſthmatis, pul-
monisque inflammationibus prodeſſe tradunt:
hâc ratione puerorum etiam comitialibus mor-
bis auxilio eſſe ſolet: cæterùm, non parum ad
pruritus & ſcabiem confert, omniaque cutis vi-
tia emendat, idque mediocriſ acrimoniæ & ſic-
citatſ ratione: vlcera etiam, quia viſcoſitatem

obtinet, glutinare poreſt. Ad calorem & ſiccita-
tè inclinare authorem habemus Matthiolum,
qui multâ experienciâ competum air, aquam
ſtillaritiæ ex ea ſudores potenter mouere. Mat-
thiolum declarat Camerarius: Stillaritiuſ liquor,
inquit, ex herba, caulibus, & floribus exhibetur
bibenda laborantibus lue venereâ per nouem
dies aut plures, & mouetur eis ſudor. Qualitatem
herba habet Dodonæo, frigidam quidem obſcu-
ram, ſed humidam maniſeſtiorẽ, lenti, glutin-
oſique ſucci, vt Maluæ, particeps: emollientis
ea de cauſa quoque facultatis, verùm minùs
quàm illa.

IACEA TRICOLOR SVRRECTIS caulibus quibuſdam arborea dicta.



Viola ar-
borea
quibuſdam di-
cta, ſurrectis
eſt caulibus,
cubitus altis
ac etiam altio-
ribus, angulo-
ſis: folia priora
vulgaris Viola
tricoloris ſi-
milia, ſubrotû-
da, cætera lon-
ga ad vncias
quinque, alia
longiora, vel
breuiora, an-
guſta, quæ cul-
tu variant, &
latiora reddi-
ta Viola Mar-
tiz folia æmu-

Deſcriptio:

lantur, ad quorum genicula foliola alia emicant,
modò parua, modò maiora, quædam etiam laci-
niata, & per ambitum ſerrata, colore laccæ vul-
garis: flores quoque dictæ laccæ, quinque folio-
lis conſtantes in ambitu dilutè violaceis, longis
inſident pediculis, è foliorum ſinu ortis, quorum
folia duo lateralia interna parte albis villis obſi-
ta, & cum imo pulchellis ſtriis decorata. Quibus
ſuccedunt ſiliquæ longè in ternas carinas dehif-
centes, ſemen continentes album, paruum: radix
tota fibroſa eſt ac perennis.

Tota planta ſapore viſcido eſt, & multa com-
munia habet cum Viola ſiue Iacea tricolori. Sed
cur arboream dixerint nonnulli non video.

Arboſcentem Violam è Baldo monte alla-
tam, odore perquàm incundo, ſibi dono datam
ait Matthiolum à Calzolario, floribus Conſolidæ
regalis perſimilibus: plantam duorum cubito-
rum altitudine, pluribus ab vna radice ſublatis
caulibus. In poſt. comm. cum mag. fig. (vbi ea-
dem verba allegat) huius figuram dedit Iaccæ ſiue
Floris trinitatis inſcriptione: In hiſt. germ. Iaccæ
Viola trinitatis titulo. Sed figuram hanc abſtu-
lit Camerarius in Hiſt. germ. Ea ſanè non malè
conuenit arboreæ multis dictæ quam nos hoc
capite exhibemus.

Camer. apud Matth. germ. [vbi Violam frutico-
ſam inſcribit] & in eiufdem Epit. [vbi Violam ar-
boſcentem vocat] Violam erectam potiùs,
quàm arboſcentẽ nuncupandam ſcribit, abun-
dantem in monte Baldo, flore ex purpureo al-
beſcente, ſine odore, in hortis ex ſemine deci-

duo multum se propagantem. Et licet alicui figuram Camerarij Matthiolo appositam consideranti, ea diuersa videri possit, à Viola Martia surrectis caulibus, aliam tamen non existimo, sed naturæ lusum, cum semina profert.

An Lobel. in Obs. p. 314. Icon. verò Planti p. 610. Viola Martia surrectis cauliculis? Figura Matris Violarum Dalechampi, H. Lugd. p. 798. videtur lacea surrectis caulibus, quæ Matthiolo arborea dicitur, licet minus feliciter expressa, descriptio tamen non mihi videtur in omnibus competere: veteor ne confundantur duæ plantæ. Melior figura est, quæ pingitur p. 800. sub Violæ flammeæ siue tricoloris maioris Matthioli inscriptione.

Violam arborescentem Matthioli, & Violam Martiam surrectis cauliculis Lobelij, C. Bauh. in phyt. sub vna, nempe Violâ 7. siue tricolore erectâ, quam Iouis florem Theophrasti arbitratur comprehensus est. At in pin. mutatâ sententiâ, à se inuicem distinxit. Viola Martia foliis oblongis 2. siue arborescens purpurea, est, inquit, Viola arborescens Matth. Cast. Tab. vel potius recta Camerarij: Viola fruticosa Gesn. hort. Mater Violarum Dalech. Lugd. Viola elatior Clusij: Viola erecta flore cæruleo & albo Eyst. Flore est ex cæruleo purpurascens vel ex cyaneo albescente. Viola Martia foliis oblongis 3. siue Viola tricolor erecta, an Iouis fls. Theophrasti 6. hist. 6. Viola assurgens tricolor Dod. Ger. Violæ purpureæ varietas Lob. in Aduers. Viola Martia surrectis cauliculis in Obs. & Icon.

Spontanea occurrit inter vepres in limitibus Montbelgardenfibus, itinere versus Matthai arcem, florens Maio: eodem hoc mense florentem vidi Esslingæ in horto Volmarij, & Argentinz Frid. Meieri, ac etiam Lutetiz in horto Robini Augusto, & Sturgardiz cum seminibus & foliis valde latis, quasi Violariæ Nouembri.

*Lacea tricolori siue Floris trientalis genus flore
luteo & purpureo magno, repens,
non annuum.*

Clus. Pann. p. 358. Viola 3. siue tricolor odoratissima p. 359. Viola montana 3. siue tricolor 1. Eid. hist. Item pann. Viola 3. siue tricoloris odoratissimæ aliud genus, ei per omnia simile, floris colore excepto: Eid. hist. Viola montana tricolor 2. primæ per omnia similis floris colore excepto, omnino flauo, purpurascens radis ex umbilico emicantibus: fertur & alia varietas coloris reperiri (flore sc. toto purpureo) quam seminio accidere putat Clusius.

Camer. apud Matth. Germ. lacea flore maiori luteo valde odorato: alia huius generis flore purpureo.

C. Bauh. pin. Viola Martia foliis oblongis 4. siue Viola montana tricolor odoratissima (11. phyt.) Viola flamea maior violaceo colore mixta, Eist. Eid. Viola Martia foliis oblongis 7. siue Viola montana lutea grandi flore (12. phyt.) & Camer. Violæ nigre per similes montana lutea Gesn. hort. Viola flammea lutea H. Lugd. Viola Martia arborescens lutea Tabern. Viola flammea maior pallido colore mixta Eyst. Flore est luteo, sed magna ex parte lineis purpureis intermixtis, aliquando sine licuris: rarius flore albo reperitur.

In montibus Rheticis mediis in niuib. flore purpureo magno: floribus minus speciosis in cacuminemontis Rossberg. prope Masmunster.

Luteo flore in diuersis hortis florens Aprili & Maio, at nisi transplantetur, facile perire solet. Spontè in Helueticis montibus nasci, pænèque totâ Æstate florere fertur.

*Lacea bicolor, Frugum & hortorum vitium
Trago.*


Herbam Trinitatis secundam, siue siluestrem (vt vocat) quæ spontè in hortis & frumentis nascitur, Vitium frugum & hortorum meritò censuit Tragus, latius per omnia similem nisi quod flosculos magis exiguos procreat, candidos & luteos, interdum etiam cæruleos & luteos.

Lacea, siue Herba Trinitatis altera, cum lacea tricolore vulgari iisdem pariter locis nascitur, & fertur in hortis, minoribus tamen ac breuioribus tum foliis, tum floribus, qui tamen non tribus, sed duobus tantum constant coloribus, candido videlicet, & lutescente, inquit Camerarius in Epit. Matth. ubi figura. Italis dicitur lacea seu *Minuti pensieri minori*. Germ. wild frey-samer aut *Stettmütterlin*.

C. Bauh. pin. Viola Martia foliis oblongis 6. siue Viola bicolor arvensis (9. in phyt.) lacea minor Cast. Violæ nigre similis arvensis minor, Gesn. hort. Viola siluestris Lob. Icon p. 611. Viola flammea minor Hist. Lugd. Viola Trinitatis minor petræa Tabern. Viola tricolor petræa Gerardi. *Hactenus* trium colorum non obseruui, sed candido & luteo, cæruleo & luteo, cæruleo & candido: aliquando tamen totus luteus vel totus albus occurrit: Alia est valde parua Augusto florens.

A S A R V M.

CAP. V.



NON immetitè Nardis Asarum accensuit antiquitas, tanta est in radice tenui reptatrice, fibratâque odoris affinitas: folia verò Cyclaminî, circinatæ rotunditatis, lato virore supernâ parte splendent, rigida, infernâ autem magis albescent, tenerâ lanugine pubescentia utrinque, magis tamen

infra quàm supra: inter folia proximè terram, in breuib. pediculis hirsuti sexanguli, cytini purpurascens hiosciamî, in tres lacinias diuisi, oriuntur, internè atro-purpureas, externè ex virore rubescentes; medium occupantibus staminibus purpureis: semen sex distinctis loculis comprehensum continetur, acinis vuarum simile quoad formam, externam, tuniculâ fuscâ, quæ interiùs medullam albam continet, acriusculum est gustu.

Asarum

Asarum [ἀσάρι] quod alij Nardum sive eilem [ἐλεμ] vocant, Dioscoridi hæc est odorata & coronaria [ut Par. addit, πικρὸν ὄσφρ. Cat. pro πικρὸν habet βότανον.] folia habens Hederæ [ἡδέρæ]. Quidam addit (ἡ ἀριστοχρία) similia, sed densiora [πυκνότερα. Pat. μικρότερα.] & multo rotundiora: florem inter folia iuxta radicem caeruleum [καeruleόν. Parif. εὐδὴ, πορφυρὰ ἰσώδης. Cat. πορφυρὰ, λευκὰ ἰσώδης.] Hyosciami cytinum referentem, in quo semen acini nucleo simile [Addit hic alter codex, ἔχει καυλὸν γονιόδην ὁποῖον ἀχίαν, at neque Oribasius, neque Serapio ita legerunt.] Radices subiacent numerosæ, geniculatæ, tenues, oblique Gramini similes, longe tamen graciliores & odoratæ, linguam exalfacientes, valdeque mordentes.

Vocatur Inter notha, à Magis Sanguis Martis (αἷμα Ἀφροδ.) ab Osthane Thesam [Θησάμ:] Aegyptiis Cercera [κερκέρα:] Romanis Vespenta, ab aliis Baccaris [βία χαρ] Herculis Succinum (σύνκεσμα:) alius Nardus cultica (νάρδος κύλικα:) Galliis Baccar.

In Dioscoridis textu verba hæc πικρὸν ὄσφρ. Cat. [sic] quidam relinquunt, alij tollunt. Tagautius ea Bacchari potius, cui hanc naturâ, viribus & effectu proximam esse ait, convenire putat. Baccharem, inquit, Plutarchus coronis esse dicatam concedit, cuius sententiæ accedit & Virgilius, inquitens:

& Bacchare frontem.

Cingite, ne noceat vati mala lingua futuro.

Itaque quod herba coronaria dicatur Asarum Dioscoridi, id errore cuiusdam sciolli, de & i putant accidisse, qui Baccharem Asaro commiscuit. His Tagautij rationibus, adde, Serapionem omisit coronariam esse, & Plinium dicere coronis addi.

Exemplaria autem Dioscoridea depravata esse testatur Fuchsius, ita differens: Habent exemplaria πυκνότερα vel μικρότερα, cum potius scribendum sit μαλακότερα; id quod partim Plinij testimonio, partim etiam iudice sensu ipso comprobari potest. Plinius habet molliora. Sensu iudice, Asari certe foliis, neque densiora, neque minora Hederæ foliis sunt: sed maiora multo, & longè Hederæ molliora. Ego considerandum propono an non legi possit μικρότερα?

Plinius lib. 12. cap. 13. scribit Asarum, quod & ipsum aliqui Nardum sylvestre appellant, Nardi vim habere, foliis Hederæ, rotundioribus, mollioribusque, flore purpureo: radice gallici Nardi: semine acinoso, saporis calidi ac virosi: Montibus in umbrosis bis anno florescere: Optimum in Ponto, proximum in Phrygia, tertium in Illyria reperiri: fodi cum folia mittere incipit: & in Sole sicari, celeriter sicut trahens ac senescens: Inuentam & in Thracia herbam esse, cuius folia nihil ab Indico Nardo distent. Lib. 21. cap. 6. eorum errorem corrigendum esse monet, qui Bacchar Nardum rusticum appellauerunt. Esse enim aliam herbam sic cognominatam, quam Græci Asaron vocant, quoniam in coronis addatur.

Constant. autem in annot. in Amatum licet Baccar siue Baccarin Plinij lib. 21. c. 6. & 19. Item lib. 11. cap. 12. Asarum esse dicat, ac eo nomine à nonnullis Nardum falsò vocari, Baccarimur Dioscoridis aliam à Pliniana esse herbam, nomenque affinitate falli, quotquot rei herbarie recentes scriptores unam faciant: Ego tamen contrarium assero, dicoque cum Amato Plin.

Tom. III.

ulum illis in locis de planta ab Asaro diuersa loqui.

Brassauolus [verba sunt Marthioli] immeritò in Plinium spiculum contorsit, ubi dicit, ipsum eo etiam in errore versari, ut Asarum Baccharim esse existimarit. Plinius enim lib. 21. eos arguit, qui Baccharem & sylvestrem Nardum idem esse contendunt. Id autem quod dicit libro 12. Baccharim vocari Nardum rusticum, non propterea ait idem esse, sed malè ita dici, etiam si ita vocetur.

Si quis porro à me inquirat, quid de Bacchare sentiam, & an idem sit cum Asaro, vel diuersum, ei respondeo me non inuenire Dioscoridem sub nomine Baccharis ullam herbam agnouisse, sed caput illud in Dioscoride adulterinum esse, & ab aliis additum. Multæ autem sunt rationes, quæ ad id credendum me induxerunt. Et in primis videtur hæc vox Baccharis latina potius quàm græca. Nec inuenitur ullus author ex iis, qui Dioscoridem præcesserunt, vel eodem tempore vixerunt, aut post sequuti sunt, qui ullius plantæ sub hoc nomine meminerit, quemadmodum in Galeno & Aëtio videri potest, qui ne unico solum verbo Baccharem nominauerunt. Nec refert appellasse Athenæum vocem Baccarim, siue Pancarim: non est enim planta, ut errantes quidam existimant, sed vnguentum. Si quis autem institerit, in Aëglena & Oribasio inueniri caput de Bacchari separatim à capite de Asaro: inficias non ibo hæc duo capita apud Paulum reperiri. Verùm affirmabo satis longo tempore post Galenum venisse apud Græcos in lucem hoc nomen Baccharis. Cum igitur inueniam Paulum, qui de simplicibus Galeni scribit, agere de Bacchari, de qua nulla sit mentio in Galeno, necessariò sequitur unum ex his duobus, vel deesse in Galeno, vel additum à Paulo, neutrum tamen credendum est, sed certò concludendum hoc additum in Paulo à librorum corruptore aliquo. Idem in Oribasio accidisse dico. His addo apparere totum caput de Bacchare in Dioscoride, excerptum esse à principio ad calcem ex capite Asari, ferè de verbo ad verbum, ut animaduertet is, qui utrumque conferet caput. Idem nonnulli videntes fortè hæc duo capita similia esse, qui certò sibi persuadentes Dioscoridem scripsisse de Bacchari, cum Paulus & Oribasius de hac tractarent, nescientes qua ratione rem componerent, sibi imaginati sunt bonam partem capitis de Asaro (nempe eam quæ inserta capiti de Bacchari) spuriam esse, quam idè ut abiectam ab aliis, abstulerunt à reliqua parte. Atqui error nimis magnus est, demere legitimo capiti, quod à Dioscoride totum ac integrum & non truncatum fuerit traditum, & defendere adulterinum. Dioscorides autem scribens de Asaro, desumit partem unam ex capite Cratenæ, qui minùs exactè, ut oportebat, de Asaro tractauit, & in suum inseruit, reliquum ut non necessarium omisit, subnectitque huius herbarum suas, quàm Cratenæ facultates, addens in fine capitis, Cratenam herbarium ita scribere ad verbum. Rem autem ita se habere testantur fragmenta variorum autorum Græcorum manuscriptorum, quæ apud ne habeo in quibus omnia leguntur, quæ Cratenæ de Asaro scripsi. Et hinc colligere licet totum caput de Asaro in Dioscoride legitimum esse. Et hæc æqui lectores consulant, & de nostra controuersia iudicent: collatis quidem iis, quæ

Autorum opinio.

hic de difficultate, Matthiolus, Cordus, Dodonæus, Lobel. & Casalpinus præ cæteris memorie prodiderunt.

Ex quorum scriptis constat Matthiolum, Cordum, Dodonæum, Lobelium & Casalpinum præ cæteris Asarum & Baccharum ab invicem distinguere, nullum inter Baccharum Dioscoridis suppositiciam, & Plinij genuinam, discrimen agnoscere.

Anguillara epist. r. ostendere conatur Dioscoridis caput de Bacchari esse spurium, vii & in Paulo & Orbasio: Item ex Dioscoridis capite de Asaro nihil demendum: Baccharis caput desumptum esse ex capite Asari: Baccharum verò Plinij differre à Dioscoridis existimat.

Synon.

C. Bauh. phyt. & pin. Asarum r. Asarum B. unself. tom. i. rhaps. 8. & in 4. pag. 6. Trago, Matth. Fuch. Dod. Lac. Cordus in Diosc. & hist. Turn. Gein. hort. Casalp. Cast. H. Lugd. p. 913. Thal. Tabern. Lobel. Obs. p. 318. Ger. & Eyst. Asarum Baccaris sine Baccarus, Lob. in Adu. & Ic. Plant. p. 601.

Varietas.

Quandam Asari speciem diversam, vulgari multo maiorem & odoratiorem in Helueticis Alpibus, circa Eremum D. Virginis, cum Censid. f. reperiri aiunt, testibus Camerario & Gesnero, qui quàm verum sit, dubitat.

Nomina
linguar.

Ἀσάρων & ῥάσδος ὄσπον Græcis, Asarum & Nardum silvestre aut Nardus agrestis Latinis, Asaron Arab. Germanis Haselwurz. Belg. haselwortel / Mauseren. Gall. Cabaret, Oreille d'homme, & alibi Oreille: Montbelgardi quibusdam Girard rouffin: & Burgundis nonnullis Rondelle. It. Asaro: Hesp. Ἀζαρα baccara: Angl. fellsore (quod solum habeat rotundam, pulli equini pedi simile) Mara bacca. Boh. Kopyrnst-Hung. Kapatnoff.

Locus.

Amat montium opaca ac umbrosa loca, & plerumque sub Corylis, ut Cordus refert, inveniuntur. Minimus autem, auctore Dioscoride in Ponto nascitur, & Phrygia, & Illyrico, & Iustina Italia. Hoc ens est Angli. Germanis subinde spontaneum. Aspera maculae & sicca loca amat, in silvis etiam nasci & sepibus, apud Fuchium prolium est. Perpetuè viret herba, novatamen vna cum hibernis folia Vere promittit interdum tamen & Autumnus flores. Colligendum in fine Augusti, à die decimo quinto eius mensis v. p. ad octavum Septembris. In montium cernitibus humentis usitatis Allobrogum, Sabaudorum, Gallo-prouinciæ, & Pyrenæorum Lob.

Vires &
vius.

Dioscorides vim tribuit Asaro calefactoriam, & urinam cientem, conuenientem hydropicis, & coxendicæ morbo diutino. Scribit præterea mentes cum aqua multa potas radices pondere drach. sex ducere, & velat Veratrum album purgare: misceri etiam vnguentis. Hoc cognitu dignum est, quod Galenus radicibus Asari similem vim attribuit, et quàm Acori radices habent, & magis etiam intensam, & proinde ea quæ de Acoro dixit, etiam ad Asarum referenda esse. Plinius Nardi vim habere Asarum scribit. Mesues laudat radicem amplam, spissam, odore tenui, sapore acri & parum styptico. Asari radix, inquit, calida sicca ordine tertio, vel potius cum Dioscoride calida secundo sicca tertio [vbi hoc dixerit Dioscorides, nondum inuenio, tenuat, resoluunt, obstincta aperit hepatis & lienis, & horum dritiem soluit, & affectus alios inde natos, febres putidas & diuturnas, icterum, hydropem, p. æterum vnum infusum. Purgat vomitu &

vrinis bilem, sed pituitam manifestius: etiam exilibus, ichio, & aliis articulis: ob id harum partium dolores mitigat, præsertim Infusum, vel aliter exhibitum. Oleum Asari cum Ladano spinæ illitum sudores mouet, & rigorem febrilem inhibet, urinas mouet, semen augeat. Valentius agit cum sero lactis, Spica & hydromelite. Mastum his radicibus conditum, post tertium mensem hydropis & splenem sanat. Mediocriter coqui & ceteri potest: & quod tenuius est tritum, eo magis urinas mouet, riuus autem aluum ducit. Datur infuso ab aureis duobus ad drachmas quatuor: puluere autem à Drachma vna ad aureos duos.

De Asari virtutibus Æmilij Macri elegantissima Poësis extat:

Est Asarum gracè, Vulgago dicta Latine:

Temper.

Hæc calida & sicca virtutu dicitur esse,

Tertium est illi gradus, ut dicunt, in viroque:

Prouocat urinam, potatæque menstrua purgat,

Hocque modo uicini medicantur sumpta dolori.

Hydropicisquæ iuuat, sciasim fugat hausta frequenter,

Et vulua morbus decoctio subuenit ei.

Dicitur illerium potata repellere morbum,

Helleborique modo vomitu præcordia purgat,

Sed non est huius purgatio tam violenta.

Hæc metuenda quidem, si fiat: saluer illa,

Ætatem & vires eius circumspice primum,

Quem purgare voles, & tempus quale sit anni

Es si sit regio feruens, vel frigida valde,

Aut si temperiem mediâ tenet inter utramque, &c.

Ex Asari b. xivium.

Fuchius hixiaum, in quo Asarum decoctum est, si eo caput laetetur, cerebrum roborare refert, & memoriam: succum autem eius cum Pompholige, caliginantibus oculis conferre. Sylvius de comp. med. scribit Asarum valere, foliis, flore & semine, sed efficacissimum esse radice. Subdit Tragus, Asari foliis carpo admotis ut mulierculas Argentoratenses ad febris ardorem depellendum, cum tamen tota planta aromatica sit, & gustu mordax, quod insignis caliditatis indicium est. Ceterum, cum folia adstringendi naturam habeant, calorem ipsum febilem sic admodum ad interiora recidunt, atque ita morbum adaugent.

Andros folium.

Amatus Asarum à semuncia ad integram consilium propinati posse sibi imaginatur. Sed hoc consilium impugnat Rob. Constantinus, his verbis: Perniciosum consilium: siquidem experientia constat valentem esse vim Asari, etiam Dioscoride teste, cuius Vncla sumpta Amati sua-

Amati opinio de Asari dosi reprobanda.

tu riuus ὀσπερ ὄσπον, inducet. Consultus igitur mule in frâ subistere, quàm ita temerè periclitari. Certum quidem Dioscoridem Asari drachmas senas exhibere: sed hæc etiam codex impressus corruptus est: nam in vetustissimo manuscripto, proq. legitur: quinarij nota. Adde quod vires nostræ ætatis hominum, antiquorum viribus nequaquam respondeant, ut innoxie ferre possit complurium pharmacorum præscriptum pondus à maioribus, quod quia in confesso est, existimamus multoties potius, quàm multum vna vice, in purgando securius esse. Hæc Constantinus.

Matthiolus, qui vnciam semis in infusione non excedit, nec pulueris ultra drachmam dat, à Galeni sententia maxime dissentit. Cum nulla, inquit, in Acoro defectoria sit facultas, & Asarum, ut Dioscorides ait, & Mesues fatetur, & mihi eximento compertum est, Veratri modo expugnet, non video sanè cur Acoro in omnibus suis facul-

Matthiolus Galeno contradicent.

suis facultatibus tam facile à Galeno comparari possit. Galenus autem non dicit omnibus facultatibus respondere, quinimò intensioribus esse præditum Asarum. Verissimè quidem ait radices Asari facultatibus Acoro similes: vix enim vllz à Dioscoride attribuantur Acoro, quæ in Asaro reperire non liceat. Interea tamen non ita potest comparari Acorus Asaro, ut Asarum Acoro. Nec etiam ob id sequitur facultates non esse similes Acoro, etiam si plures habeat Asarum.

Feb. quartana.

In hist. germ. commendat Matthioli rusticis seu optimum in febribus (maximè quartanis, Camer.) medicamentum, si manipulum foliorum sumant, in vino aut aqua decoquant, & melle dulce reddant, bibantque per aliquot dies mane: hoc enim euacuare per alvum pituitam & bilem, ac etiam interdum per superiora: sed cum assumere volunt, iubet illos aliquid Macis, vel Cinnamomi, aut similibus aromatum addere. Mulieribus autem gravidis non sine detrimento tum proprio, tum alieno, scilicet, exhiberi testatur. Rondeletius in coxendico dolore vitur Asari seminis vel radicem decocto ad vomitum ciendum, scilicet, ut ait, successu. Ad verrucas in facie Asarum temperat in aqua Rosarum per biduum, & illinit. Si Asarum absolute dicitur, Camerarius radicem sumendam intelligit.

Mulierib. gravidis. notum.

Quod denique Asarum si tenuissimè teratur, potu lotium: si negligentius, alium & vomitum ducere asseritur, id sanè contingere putat Lobelius, quia tenuissimarum partium decoctum celerrimè per ventriculi fundum & duodenum transfuehitur, ac illic in hepatis venas & mesaraicas rapitur vix dum collutis ductibus, aut leuissimè impressione inibi relictâ: at subest ratio argutior: hydropotæ non pauci, præsertim splenetici, etiam referto cibus ventriculo, mox quàm frigidam hauserunt, rugitum, gravitatemque in splene præsentunt, nullo ventriculi aut hepatis percepto fastidio. Nempe venæ, quæ superiores mediâque stomachi partes à liene trahunt, suis ramis hauriunt illic maximam liquoris copiam, rapiuntque in splenis maiores venas, unde status, gravitas, murmur illi. Ex hæc Lobelius.

ASARVM MVRI.



Tom. III.

Erymos.

Locus.

Descriptio.

Asarum muri Herbarij vocant, quod Asarum foliis imitetur, & quod nusquam alibi, quàm in muris gignatur. Ex parietum fissuris profilit, radice crassiusculâ, nodosâ, è rufo nigrescente, Polypodij ferè colore, in plurimos villos divisa: folia paucis, Asaro similibus, venosis longo pe-

diculo subnixis: nec semine, nec flore in se vidente tradit author H Lugdunensis p. 1. 34. ex qua iconi præcedentia desumpta sunt.

Temeraria autem valdè est descriptio, non ostendens qualis planta, an glabra vel pubesca, aut quali sapore: nec monstrans quod loci in muris obsecratur, aut qui Herbarij Asarum muti vocent.

H Lugd. iconi.

HERBÆ A SVE SIVE PORCO nominatæ. CAP. VI.

Non penitus à proposito nostro nos declinatos speramus, si antequam ulterius progrediamur, & ad Cyclaminum, (qui ipse apud Germanos & Gallos præsertim, à porco denominationem suam accepit) describendum nos accingamus, plantas à lue vocatas, hinc nomine tenus solum, seu proprio loco fusiùs quamlibet scorsim tractaturi, commemoremus. Sunt autem hæc, teste Gesnero de Quad. Fungorum tertium genus, suillum Plinio dictum, Germanis fortè Werrheten: H g. lib. 40. Hypochaeris. Hyosiris Intubo similis, sed minor Plinio, Tigurenlibus Sodiscl. Rostrum porcinum, aliis Dens canis, Helvetiis Subtium dictum, Panis porcinus. Scinos. Astrabus, i.e. Pes porcinus, Adiantum, aliquibus Capillus porcinus. Miliu Solis, i.e. Cauda porcina Sylvarum. Peucedanum. Scrophularia, quæ alio nomine Milleborbia: vel Faba inversa. Hyoscyamum, Trago germanicè Sambonem dictum, i. e. Sujlla Faba. Chenopus, german. Schwindel, i.e. Porcorum mors, & Scrophlaa. Solanum silvarum cui baccæ nigra, germ. Scrofrant.

CYCLAMINVS FOLIO

rotundiore vulgatio.

CAP. VII.



Orbiculata nititur radice Cyclaminus fibras circû circa emittente, è cuius parte superiore capita exoriantur, quæ plura fundunt folia, palmaribus plus minus pediculis hærentia, rotunda ferè, aut ex rotundo aliquantum oblonga, inque acumen desinentia, crassiuscula, superius atrouirentia, aspersis subinde maculis lacteis, inferius purpurascencia, nonnihil per margines sinuata: flores inter folia ferè latens violacei coloris quinque foliis constantes sursum reflexis, producto ex umbilico stylo.

Cyclamino Dioscorides folia tribuit Hederae similia, purpurea [quæque ver. caret.] inter à superiusque maculis albicantibus distincta, eandem vero

Q99 2

quaternum digitorum, inane ac nudum: in cuius summo flores emicant Rosarum effigie purpurascetes. Radicem nigram, Rapo proximam, & aliquantulum latam.

Plin. fortè
errat.

Cyclaminum folia habere minora [maiora fortè legendum] quàm Hedera, nigrioraque & tenuiora, sine angulis: in quibus albicant maculae: caulem verò exiguum inane: flores purpureos: radicem latam, ut rapum videri possit, cortice nigro: nasci in vmbrosis, & à Romanis Tuber terræ vocari prodidit lib. 2. cap. 9. Plinius.

Barbaros, Arabes, & Mauritanos duas Cyclamini species, sc. Arthanitam, & Buthormarien confundere, refert Cornarius. Verùm Rhafin eas tanquam diuersas ad infusum per Clysterem immittere. Appellatur, inquit, Cyclaminus, Latinis græcam vocem vsurpantibus, item Tuber terræ, & Rapum, & Vmbilicus terræ, officinæ vocant Cyclamen, & Panem porcinum, & Panem terræ, & Arthanitam, omnibus appellationibus à similitudine ductis. Verùm Barbari, Arabes, ac Mauritani Medici utramque Cyclamini speciem confundunt, Cyclamen, & Arthanitam, & Panem porcinum, & Buthormarien, eandem, priorem videlicet speciem appellantes: quum Buthormarien propriè secunda species appelleretur, sc. Tuber Mariæ, quam postea officinæ Sigillum Mariæ dixerunt. Atque hæc distinctio recte facta, ac primum prodita est à Ruellio. Rhafis tamè lib. 9. c. 1. & Buthormarien, & Arthanitâ, tanquam diuersa, ad infusum per clysterem immitit. Cornarij opinionem improbat Matthiolum vnum & idem faciens contra Ruellium.

Anguillæ Cyclamini varietates fortè referendæ sunt ad Cyclaminum angulosum, de quo suo capite. Est autem quedam florens Autumno, quedam flore odorato, quedam inodoro, quedam flore purpureo (rosso), alia albo, alia luteo, qualis videtur in regione Bolarum: verùm omnes habent folia Hederae, & radicem rotundam, Rapo similem, inquit epist. 11. Idem rursus ait Petilium florem Plinij, nihil aliud esse, quàm Cyclaminus speciem florentem Autumno, flore odorato.

Petilium flor.

Radice instar
capitis arietis.

Cyclamini nostri speciem habet Coudenbergius, radice instar capitis arietis: Volmarus autem orbiculatam, nec oblongam, qualem Rhæticam ait Gesnerus.

Cordo in Diosc. Cyclaminus, & Panis porcinus: Dod lat. Cyclaminus orbicularis rotundifolius, floribus anguloso Cyclamino similibus, odoratoribus, radice aliquantulo minore.

Cyclam. odorato
flore 1.

Clus. Pann. p. 232. refert Cyclamini odorati, siue Cyclamini, non nisi Autumni initio flores suos producentis, & statim folia, quæ postquam tota Hyeme perstitent, sub Aprilis finem, aut Maio enascere solita, in Pannonicis prouinciis duas obseruari differentias. Primam in Hist. post. Cyclamini odorato purpureo flore titulo pingit: Alteram speciem vocat Cyclaminum odorato flore secundum, primo planè similem, pauciora tamen semper folia proferentem, eaque non purpurascens ut illius subrus coloris, sed albicantis quodammodo, aut pallescentis, cui viridis mistus, ut in Asari avertis foliis.

Synonyma.

C. Bauh. phyt. & pin. Cyclamen 1. siue orbiculato folio infernè purpurascens: Cyclaminus minor, & vmbilicus terræ Trago: Cyclaminus, Matth. Dod. gall. Cordo in Diosc. & hist. Gesn. hort. Lac. Turin. Lon. & Tabern. Cyclaminus maior Calt. Cyclaminus rotunda Fuchl. Cyclamen vulgare Eyst. officinarum orbiculato folio, Panis

porcinus & Arthanita Lob. Icon. p. 604. Cyclaminus flore odorato Clus. Pann. & Hist. Cyclaminus vulgaris & Cyclaminus prior cum iconè Matth. & Lobelij H. Lugd. Cyclaminus æstiuus vulgaris Camer. Cyclamen orbiculato folio, Gerard. Cyclamen 2. siue orbiculato folio infernè ex viridi pallente Gesnero. Cyclamini odorati altera species Clus. Pann. Cyclamen odorato flore 2. Eist. hist. Camer. in Hist. gerin. vocat Cyclamen radice oblonga: Κυκλαμίνος μακρὴ, Eidem in Epistom. Matthioli.

C. Bauhin. pin. Cyclamen 10. [5. phyt.] siue oblonga radice: Cyclaminus radice oblonga malo in hac adnex. Gein. hort. Cyclaminus oblongus Lid. app. Cyclaminus longius radicans. Item pin. Cyclamen 3. [7. phyt. siue Cyclamini species radice instar capitis arietis Gein.] radice maxima foliis infernè rubentibus, Cyclamen Romanum Eyst. An Cyclamen à Mutono, Clus. hist.

Nos Cyclamini longius radicati picturam hic danius, quamuis diuersam non statuimus, ab ea quæ orbiculato est folio siue Asari. In hoc enim Cyclamino nullam differentiam obseruamus, nisi quod caput longius exerescat, & in duo-

alia iterum partitur, qualia habere solet Cyclaminus Asari folio, modò breuia, modò longa, quæ minùs benè in figura nostra Fuchsiana exprimuntur.

Nolim igitur cum Camerario apud Matthiolum particular. genus constituere, & pon post Cyclaminum Hedera folio, sed potius post Cyclaminum folio

Nothæ
appellat.



orbiculato, cum quo idem. Ei quamuis Camer. dicat esse Hedera folio, tamen effigies monstrat, Gesnerianum illud Cyclaminum fuisse folio non anguloso: variant etiam Hedera folia. Nolim quoque particularem facere speciem ex Cyclamino capitis arietis instar, quod intelligo de figura quodummodò arietis caput imitante, non de magnitudine. Nec difficile fuerit in ea radice tale quid sibi imaginari, quandoquidem non semper orbiculata existit, ac non raro supra tuber veluti cornua producit, quæ Herbarij radices capita vocare consueverunt.

Κυκλαμίνος. Græci appellant: dicitur & Cissanthemon [κισσανθήμενος] aliis Cissophyllon [κισσοφύλλον], ab hederaceis flore & folio: aliis Chelonion [χελωνιον]: aliis Ichthyothera [ιχθυοθηρα], quod sit venandis & inescandis piscibus aptum: Zoroastri Chelona [χελώνα]: seu Triumphantes [τεμπραλίντες]: Olthani Aspho [ασφω] Magis Miaspho [μιασφο]: (Ægyptiis Theike [θεικε] ut inter nothas voces reperitur: item Tuber terræ, & Rapum terræ, aut Vmbilicus terræ, à Marcello Orbicularis, ab Apuleio similiter Orbicularis, & Palalia: Rapum porcinum

Nom. iag.

Nomina
linguar.

porcinum, Terræ malum: in offic. Cyclamen,
Pau. s. porcinus. Archania: German. Schwamm
brodt / Swebrodt / Erdschaben / waldrü-
ben / Erdrüben / Erdwurm: Belgis Berckens
broet / siucahen broet: Gallis Pain de porcean: tralls
Pan porcino: Hisp. Pan de puerco & nonnullis Mazan
de porco: Angl. Swebrodt: Boh. morech
Schwamm: Digno repa, quod porcinum
R apum significat.

Locus & cē-
pus.

Generis copiosè provenit in Mōre Saleur, & in
Rhaetis montibus Iunio & Iulio florens. Nulli
sunt in Pann. & Austria siluosi montes nulli sal-
rus aut in montium accliuatibus vda prara, quæ
Cyclamino odorato Clusij non abundant, ubi
varie magnitudinis radices eruantur, tantè inter-
dum, ut manum implere queant. Nasci in editis
montanis & stirpibus non sacris locis testatur
Cordes: solum item amare lutosum quemadmo-
dum Alarum. In Arduena silua ac vicinis locis
apud Belgas repetit scribit Dedonæus.

CYCLAMINUS PARVA RADICE.



Cyclam. ipar-
na radice.

Nō hic pro-
ponimus i-
conē Cyclami-
ni cū parvā ra-
dice, qualem in-
ter Fuchianas
sculptam emi-
simus, quam ne-
scimus an eadē
vel diuersā à no-
stra priore non
angulosa. Quæ
autem de Cycla-
mino parvā ra-
dice dicuntur,
huius figuræ sub-
jicimus, donec
aprior plāta, vel
à nobis, vel à te
pro Cyclamino
parvā radice de-
mōstratur. Hūc

Mesues videtur intellexisse per Cyclaminum mi-
norem parvā radice, magnitudine Nucis Auella-
næ, Cicerumque. Matthiolum hunc se vidisse re-
fert solum in Tridentino agro, in vallis Ananiz
montibus copiosè nascentem. Anguillara eam
esse existimat Cyclaminum Mesues, quæ in mon-
te S. Iuliani Lucæ reperitur, radice omnium mini-
mā, Martio florens.

Reprehendit meritò Lobelius Senensem Do-
ctorem Matthiolum, ex Mesue maiorem Cycla-
minum referentem, dicentemque vno solum tra-
ctū se minorem vidisse: eam tamen neque verbo,
aut iconē docuisse: Docuisse tamen illum indi-
casse, quamvis illa esset radix, & an à Cyclamino
folio mucronato differret.

Matthiol. re-
preh.

Cyclam. alio-
ra sine exi-
gua
Trago.

Kundamocētopa, siue exigua Cyclaminus, su-
periori per omnia respondet, nisi quod non p-
rinde acris est, & feruida, ut illa. Nascitur & hæc
in umbrosis siluis. Eam ego (inquit Trago, lib. 2.
cap. 134.) in Rhæia superiori non præcūda Cu-
ria oppido primum vidi. Dicebant mihi tunc
Hermodæolum eam esse, sed falsò, nam Cy-
clamini exigua veræ species est.

C. Bauh. pin. Cyclamen. 9. (. phyt.) sine ra-
dice exigua: Cyclaminus exigua veræ species H.
Lugd. Cyclaminus æstiuus Clus. hist. Cyclam.
Tom. III.

minore Castori.

Cyclaminus flore albo.

Anguill. Cyclaminus flore albo. Gesn. hort. Cy-
claminum foliis subrotundis albo flore circa
Neocomum Sabaudiz repertum. Clusio scribe-
bat Iosephus Casabona & Candia Creiz insule
vibe se Nouembri Cyclaminum albo flore ob-
seruasse. Gallus quidam Rhyzotomus Galliam,
Italiam, Germaniam peragrare solitus adfere-
bat in Bataviam Cyclamini radices, quas albos
flores dare referebat.

Cyclaminus vernus flore luteo.

Anguill. Cyclaminus flore luteo, folio Hederæ. Locus
in regione Botoz: Lob. in Adu. Cyclaminus lu-
teo flore: folio mucronato, verno tempore, in
Narbonæ montibus: Eid. hist. Belg. Cyclamen
flore luteo, in Lombardia circa Bouoniam. Cy-
claminum quem Lobelius apud Insulubres flore
luteo obseruasse scribit, Clusio videre non con-
tingit.

C. Bauh. phyt. Cyclamen s. siue luteo flore: Eid.
pin. Cyclamen n. siue vernum luteum, Cyclam-
en luteo flore H. Lugd.

Cyclaminus folio anguloso.



Orbicula- Descl.
Oils huius
ut prioris radice:
folia selquial-
maribus nixa
pediculis, cras-
sa, superius
purpurea, albi-
dis maculis no-
tata, inferius
dilute virentia,
triquetra, He-
deraceis simi-
lia, longiora
quàm latiora,
circumscissa: flo-
res alterius flori-
bus respondent;
inuersi, colore
albo (in sicca
planta.)

Gesn. hort.
Cyclaminus

foliis angulosis eucnemaceis ferè, Cyclaminus
folio quadrato. Antè diximus huc fortè refe-
rendam Anguillaræ Cyclaminum flore odorato
& inodoro, folio Hederæ.

Clusij sequentes Cyclamini species ad hoc
caput referimus de quibus in Hist. hæc scribit: rari duplex
Ceterum, duas Cyclamini species se habere ad
me scribebat Ioab Hoghelande, ab ipsius fratre
Theobaldo in montibus quibusdam erutas dum
ex Italia rediret. Illas verò non Autumni ini-
cio sed ipso Solstitio æstiuo florere incipere:
perseuerareque ad autumnale vsque Equino-
dium: eius item semine natas plantas idem or-
tus sui tempus obseruare: eam ob causam æsti-
uum Cyclaminum potius dicendum, quàm au-
tumnalem: Priorem habere folia albis maculis
obscurè notata, aversâ parte rubentia, aliquan-
tulum angulosa, flores saturatiùs purpurascen-
tes: Alteram folia promere aversâ parte viren-
tes.

Cyclam. alio-
ra duplex
varietas
Clusij.

*Cyclaminus
Byzantinus.*

ria, aduersâ maculis albis litque valde conspicuis alperis, rotundiora superioribus, & flores dilutiores, utrosque autem suauissimi odoris, nates etiam procul ferentis. Vtique hoc peculiare, quod vetera folia retineat, donec noua nascentur. Anni porro 1581, Autumno, pèrgit, missi sunt Constantinopoli, D. de Heusentain aliquot Cyclamini radices orbiculares, quas Castaneæ magnitudinem non superasse, & valde tersum expoliturumque corticem habuisse aiebat, &c. Bini verò subsequentibus annis multo maiores & plani omnino bulbi Cyclamini missi sunt Byzantio, *Rubur mereni* & *Dobum* appellatione: &c. Vidit postea idem Clusius Cyclaminis hederaceo folio plantâs, in quarum foliis magna conspiciatur varietas: è Belgio, Britannia Galliz, aliisque eius regni provinciis, diuersisque Italiz locis allatas.

De Cyclamino folio anguloso hæc scribunt Aduersaria. Ex montibus Alpibus Rhæticis in Italiam proficiscentibus, locis vdis & saxeis itineribus, obuia passim alia Cyclaminus, quæ non folio cucinato vt Asari aut vulgati Cyclaminis est, sed potius triplici mucrone distincto, Herbari Trinitatis aut Hederæ helici modo. Eadem etiam Norbonæ rguis montibus & hotis crebra. Eius radices quæ ventulio es magnitudine alterius sunt: quæ nouellæ aded exiguæ, vt Auelanzæ magnitudinem vix superent: flores purpurei, communis Cyclaminis prorsum similes, interdum odorati, alii non.

*Cycl. fol.
Hedera*

Lobel. in Obs. p. 31. Cyclamen folio Hederæ: Et sic etiam in Ic. Plant. p. 605. & Hist. Belg. p. 718. Hic rursus Cyclamen Belgicum folio hederaceo rotundiore: Item Cyclamen Romanum flore breuiore.

Dod. lat. Cyclaminus orbicularis: Cyclamini prima species, foliis lauis, angulosis, Hederæ similibus: floribus purpureo Violæ nigre colore, non tamen intenso, odoris exigui.

C. Bauh.

C. Bauh. phyt. Cyclamen 4. siue Hederæ folio: *Eidem* pin. Cyclamen 9. siue odoratum æstiuo Solstitio florens, folio maculato: Cyclamini odorati duplex varietas Clus. hist. Cyclamen 6. siue Hederæ folio: & Adu. Lob. clus. pann. Cyclamini alia species Dod. gall. Cyclaminus orbicularis Eid. orbicularis alter H. Lugd. Cyclaminus inodoro purpurascens flore, Cyclamen Belgicum hederaceo folio Clus. hist. Cyclamen 1. siue æstiuus folio hederaceo Camer. Cyclamen ferounum foliis hederaceis Eyt. Cyclamen 7. siue folio hederaceo polyanthes, Cyclaminus Byzantinus alter, tubere palmaris latitudinis *Waldardis*: tulit flores 10. 50. 100. Clus. hist. Cyclamen 8. siue radice Castaneæ magnitudinis, Cyclaminum Constantinopolitanum, vel Byzantinum Clus. pann. & hist.

Locus.

Cyclaminum folio anguloso obseruavi Vfontij in hort. D. à *Bellefontaine*. Similem attulit gener Cherlerus in Apenninis jugis collectam.

Vires

Huius vires communi pares, & vsus frequens Norbonensibus ad veneream lucem, auctore Lobelio.

CYCLAMINVS FLORE RVBRO, graciliori, & flore albo, vernus.

*Cyclamen
vernum
Lob.*

Lobel. Obs. p. 331. Cyclamen vernum flore rubro, Pancij, foliis Martio erumpentib. Aprilis & Maio florens: semëque maturans initio Iunij: Hist. Belg. pag. 718. Cyclamen ver-



num Pancij Aprilis folia proferens, rotundiora quàm in Hederaceo, palchre maculata, Maio floribus longis ex purpureo rubris admixto carneo colore.

De hoc Clus. pann. p. 234. & Hist. post. Habul etiam aliquando Cyclamini verno tempore florentis paucas plantas, semine ex Belgica

mihî misso natas, quæ tertio à savi anno flores proferte cæperunt, odoratissimos sanè, & vulgari saturatiore, pauloque graciliores: folia alia minora in ambitu ferè crispâ & foliorum Hederæ formam imitantia, teneriora tamen, suprà patte candicantibus maculis aspersa, angulorum etiam mucronibus albicantibus, pronâ omnino purpurascens. &c.

An Anguill. Cyclaminus folio Hederæ Vere florens? An Dod. lat. Cyclamini certa species foliis haud angulosis, sed ambitu eorum aliquantulum crenatis, maculatis, sed umbilico nigriore: flore intensiore colore purpurascens, odoris suauissimi: radice quàm aliarum minore: Rarior est, sed tamen Italiz non peregrina.

C. Bauh. pin. Cyclamen 4. (3. phyt.) siue folio anguloso: Cyclamen foliis angulosis Gesn. hort. Cyclamen vernum Lob. Ic. Camer. & Eyt. *Gesnerium* per Cyclaminum angulosum, diuersum à verno Lobelij intelligere scimus.

Cyclamini Verni bulbos se à Venerio anno 1604. accepisse tradit Clusius qui verno tempore flores albos protulerint: accepisse & alios, qui ex bulbis primo anno folia quidem habuerunt, flores verò nullos.

C. Bauh. pin. Cyclamen 8. siue vernum album: flore albo Lob. Adu. part. alterâ. Clus. Hist. ap. Synon. alt. auct. & cur. post.

Cyclaminus vernus spurium flore lacteo.

Biennio antè miserat idem Venerius aliam plantam in Pyrenæis montibus erutam, quam flauos flores proferre scribebat, & Cyclaminum vernum spurium nominabat, quia eius radix diuersam habebat formam à legitimi Cyclamini radice: tuberosa quidem erat, sed cordis, vt vulgò pingitur, formam quodammodo referebat, siue illorum loculorum, quos tenuis fortuna mulieres apud Belgas gestare solent ad aciculas in eorum ambitu excipiendum. Hoghelandio singulis annis aliquot folia protulit: ac hoc ann. 1605. etiam flosculos.

C. Bauh. pin. Cyclamen 13. siue foliis Violariæ, radice cordis effigie.

Cæterum, teste Dioscoride, Cyclamini radix cum melle pota pituitam aquamque detrahit, menses potu apposituræ ciet. Tradunt, si præguans radicem transgrediatur: abortum fieri partum

Vires Cyclaminis vulgarioris.

partum appensa accelerat: contra venena, præsertim leparis marini, ex vino bibitur: illita contra serpentium ictus, remedio est: immista vino inebriat: regium morbum discutit, tribus drachmis pota cum passō aut diluto mulsō: sed oportet eum qui ebriat, multis vestibus contextum, loco calido, & à perf. ictionibus tuto, recumbere, quod facillius exsudet: erecti autem sudores fellei colore inveniuntur. Succus eius ad purgandum caput, naribus infunditur: ad deicienda quoque alvi excrementa, in vellere sedi subicitur: illico umbilico & imo ventre coxarum tenus, alium emollit & abortum elicit: sufflationibus, & resusc. oculorum aciei, oblitus cum melle succus prodest. Medicamentis abortum inferentibus admisceatur. Cum aceto illitus, prociuiam sedem restituit: exprimitur tusa radice succus, & ad mellis crassitudinem decoquitur. Radix eadem purgat, eruptiones papularum reprimat. Vulneribus ex aceto per se aut cum melle medetur, lienem absumit, vitia cutis in facie, & alopecias emendat: eius decocto laxata, potagras & capitis vlculcula, peritionesque foetui congruum est: ipsaque in oleo veteri fructu, illico oleo, vlcera ad cicatricem perducit. Cauata radix oleo explatur, & elneri secienti imponitur, ad lecto interdum Tyrrhenicæ ceræ momento, ut stigmata crassius lineam vnguentum contrahat, cumprimis vile peritionibus. Radix Scillæ modo concisa reponitur.

Dosi.

Varia habet vires ait G. lenus: nam & absterget, & ora venarum aperit, & attrahit, & digerit, clatum id est ex particularibus operibus: nam succus eius hæmorrhoidas refert, violenterque ad scæssum prouocat in trocide sine floccis appositus: sic etiam faculaibus phymata, strumas, aliaque durities digerentibus commisceatur, ac suffatus cum melle illitus compertit: adhuc quoque per nares expurgat: adeo vehemens eius facultas est, ut abdomine illito ventrem subducit, & foetum interimit: nam & alioqui validum interrimendo foetui medicamen est, in passō additus: tota autem radix succo imbecillior est, quam & ipsa vehemens sit, nam & menses siue epota, siue apposita euocat, & aurigini prodest, non modò ipsum viscus expurgans, sed etiam quæ in toto corpore bilis fuerit, eam per sudorem euiciens: proinde sanè post eius portionem omnibus modis sudoris adluuanda prouocatio est, modus eius bibendi est drachmarum trium, siue cum melicrato, siue cum passō. Cutem detergit cum in aliis, tum quod alopecias, ephelidas, omniaque exanthemata siue efflorescentias curret: lienem quoque induratum iuuat emplastri modo illita tum recens, tum arida: Sunt qui radicem siccam asthmaticis & anhelantibus exhibeant.

Mesur.

Temper.

Illa Mesueus quoque in suum librum transtulit, cuius testimonio calidus & siccus est initio terui ordinis: pituitam lentam & crassam sumptus, & vicinis partibus illitus, purgat: obstructions viscerum, præcipue splenis aperit, maximeque ex oxymelite: & sumptus & emplastri modo ad moros colicum dolorem à pituita aut stercore suppresso sanat, caput & oculos insigniter expurgat, scilicet erithino ex ipso in nares recepto, præsertim post purgationem per hieram, aut theodoricon, aut cataporia scetida, aut similia: quapropter visui imbecillo, & aquis in ipsum iuentibus, hemigraniz, cephalalgia, tortura, paralyti, & cat. ris cerebri affectibus frigidis confert, githino, ut dixi,

attractus: icterum sanat experientia certâ præsertim succo cum oxymelite, vel ænomelice sumptus, & operto deinde diligenter corpore: nam sic sudore longo materia etiam in vaporem versa, bilioso excremento exonerabitur: dato lieni confert quouis vtendi modo, & tumoribus aliis, ut etiam strumas iuuat. Eius radix collo mulieris appensa, conceptum prohibere dicitur. Sedis procidentiam illius lunat. Corrigitur ut Dracunculus & Bryonia. Vnguentum præterea est Alexandri ex Cyclamino, quod ventri, femorilibus inunctum, aluum deiectione purgat: stomacho autem vomitu vacuat aquas ferolias, idoneum hydropicis, & à medicamento abhorrentibus: Vnguentum quoque alterum ex Cyclamino fit ad resoluendam duritiem splenis etiam lapidosam, & strumas.

Corrodis

Vnguentum

Vnguentum

Drachmaz duar, auctore Matthiolo, succi cum pari portione mellis rosati, addito momento Nuclei Myristicæ, & Mastiches, assumptæ, aluum soluant, obstructions jecoris & lienis expediunt, eaque ratione conferunt hydropicis & ictericis: semoni parturientis alligata partum accelerat: Ad tinnitum & sibilum aurium singulare est remedium, quod recipit Cyclamini radicem lib. delibratam & minutim incisatam, attuso Oleorum Chamæmelini, Rosari & Amygdalarum ana. lb. ꝑ. coquantur ad mediam, post per pannum colentur: huius olei repentis quatuor aut sex guttulæ auri affectu instillantur, sub somni tempore: radix autem decocta calida toti auri imponitur, & ne excidat, fasciis ligatur: manè aufertur, & auri vino generoso eluitur, hoc remedio continuis decem diebus vtendum. Aliud ad aures expertum, ꝑ. radice Cyclamini repurgati & concisi Vnc. ꝑ. Aquæ Vitæ Vnc. iij. Nucleorum Persicorum & Amygdalarum ana n°. iij. Contusi nuclei vnâ cum radice, tribus diebus continuis in aqua vitæ macerentur: postea per pannum colata aqua, reseruetur: efficacissima est: sub tempore somni duæ aut tres guttæ repentes auri instillantur, quæ dein xylo occludenda: huius remedij per dies aliquot continuos vsus certò lunat: posset etiam radix excuari, inque eam oleum Amygdalarum amarum infundi, occlusoque rursus foramine, in calidis cineribus torreti, post verò succus exprimi, & in calidis cineribus torreti, & in aurem, ut dictum, instillari. Succus radice per nares attractus sternutamenta eler, caput repurgat, sed validum est remedium ideoque vehementiam eius sunt qui addito lacte vaccino aut caprino temperent: idem cum pari mellis portione aphthas efficaciter curat, & lingue vlcerata: eodem remedio possunt dentes dolentes inungi. Succus cum aqua Prunellæ, gargarisatu ad faucium vlcerata facit. Herniosis si non potest intromitti intestinum, vltius eo sæpè illinitur: aqua stillatida radice in nares attracta, mirificè sanguinem sistit: id quod præstat hoc quoque, quod recipit, succi radice Cyclamini & Plantaginis ana partes æquales, adde parum Thuris, Aloës, Myrrhæ, in hanc miscellam turunda ex xylo aut lino tincta in nares induitur: sicut & anacolle mata ex eadem mixtura fronti applicanda.

Ex Matib.

Plinij verba quædam coronidis loco subscribere placuit. Cyclaminus, inquit, in omnibus ferenda domibus, si verum est, ubi fata sit nihil nocere mala medicamenta (amuletum vocant): narrantque & ebrietatem re- præsentari, addita in vinum radice.

DE ARISTOLOCHII IN GENERE.

CAP. VIII.

Aristolochia [*ἀριστοχία*] vocata est à Græcis, Theophrasto, Dioscoride, & Galeno: itemque Latinis, ut Plinio, qui tamen & Malum terræ, quoddam radicem habeat instar Mali rotundam, latius vocari testatur. Barbaris & officinis corrupto nomine Aristologia dicitur: aliis Adrathyza, aliis Melocarpon, aliis Ephesia, aliis Clematidis, aliis Pyxionos, aliis Dardanos, aliis Ionitis, aliis Tocites, aliis Teuxinos, aliis Chamamelon, aliis Opetis, Ægyptiis Sopoe[alias Sophosph.] Italis Terræ malum, Dacis Absinthium rusticum, aliis Scordian, ut apud Apuleium cap. 19. scriptum habetur. Videtur autem diuersarum Aristolochiarum nomina confundere. Siquidem inter nothas Dioscoridis appellationes, longa duntaxat Aristolochia, Melocarpon, & Teuxinon nominatur: Clematidis verò, & Atariza, & Melesprum, & Ephesios, & Leititis, & Pyxionyx, & Dardanion, & Ionitis: Hanc Galli vocant Teximon, Ægyptij Sophæph, Siculi Chamamelum, Itali terræ Malum, Daci Absinthium choricum. Arabibus porro in genere dicitur *Zarand Masmoera* seu *Zarand*. Germ. *Sterflucen*, *Biberwurk*, *Hirschwurk*, & non tamen sine errore, *holwürk*: Belgæ *Sarasyn* erugt: Galli *Sarasine* & *Fotene*: Angl. *hauwürk* vel *Birchwürk*.

Erymon.

Plinius.

Adrathyza.

Melocarpon.

Terra malum.

Chamamelon.

Opetis.

Ceterum, dicta est Aristolochia, quoddam puerperis egregie opituletur, & ut Dioscorides ait, quoniam esset *ἀρίστη τὰς λοχίους* (*λοχίαις* alij) i.e. optima, non grauidæ, ut malè interpretatus est Plinius, sed puerperis: *ἀρίστη* enim idem est quod optima: *λοχίους* verò, seu *λοχίαις*, sunt quæ jam pariunt, aut paulò antè pepererunt, & non grauidæ, quæ vterum gerunt: *λοχία* verò sunt partus dolores, partus ipse, & post partum secundæ, purgationesque alix omnes, quæ tunc fiunt. *Adrathyza* dicta est à radicis crassitudine, quasi e alli-ta: *ix*: *ἀδρα* enim crassum, robustum, & magnum significat: *ρίζα* verò radix est. *Aristolochia rotunda* (inquit Humelbergius) *Melocarpon* appellata est, à mali seu pomi quod Græcis *μήλον* dicitur forma globosa: Et quia sub terra latet, Latini etiam, præsertim Itali *Terra malum*, & Græci *Chamamelon* vocant. Et *Opetis* quoddam in terræ caueina sublateat, quæ Græcè *ὀπη* dicitur. *Ephesia* dicta est à Diana, quæ Ephesi colebatur, eò quod quemadmodum Dea illa puerperis & parturientibus opitulari credebatur, sic etiam herba hæc iisdem adfumento & auxilio esse soleat. *Clematidis*, i.e. Sarmentaria dicta est propitiè tertia species, à sarmentis eius, quibus vnguentarij vii solent. *Pyxionos*, id est buxæ à colore buxæ, quem vtriusque radicis intus habet: *πύξος* enim Buxus est. *Dardanos* si herbarum appellatio est, ut omnia, quæ videre licuit, exemplaria præstendunt, à loco sic dicta erit, eò quod illic forsitan copiosior, speciosior ac melior nasceretur. *Ionitis*, vel ut quidam habent exemplaria *locites* etiam dicta fuit, atque *Teuxinos*, seu ponens vna dempta litera *Texinos*, sic scilicet eadem ratione & causâ, quæ dicta est ab initio in dictione *Aristolochia*, quoniam parturientibus vtilis sit, quoddam memoratos menses, hærentes secundas, & reliquias omnes à partu expellat. *Ionitis* verò à *Ἰωνί*, quæ *ἰ* dicitur, cui flos purpureo colore

similatur. Et hæc secundo generi conuenit appellatio. *Aristolochiam Dactylitum* requirit Galenus libr. de comp. med. secundum locos 7. cap. 2.

Theophrastus lib. 9. Hist. cap. 13. scribit *Aristolochiam* esse olfactu suauem [*ἰωδύμης*]: at gustatu valde amaram: colore verò nigram: nati in montibus optimam: folium habere simile folio *Alfinæ*, sed rotundius ad multa vtilem. Capite verò 11. ubi eadem repetit folium ei simpliciter rotundum tribuit.

Porro quamvis Theophrastus inter *Aristolochias* non distinxerit. Dioscorides tamen & posterij Græci *Aristolochia* tria genera esse statuerunt. Vnam rotundam feminam dictam: alteram longam, masculam: & tertiam *Clematidim* appellaram. Plinius his tribus generibus quartum addit, ac *Pistolochiam* & *polyrrhizon* vocat.

Tria genera sic describit Dioscorides. *Aristolochia* ex eo nomen accepit, quoddam puerperis optimè auxiliari videtur. Est autem quædam rotunda femina appellata. Folia hæc habet hederacea, odorata cum acrimonia, subrotunda, tenera iuxta multa germina, in vna radice: surculos [*καμάτα*] autem oblongos: flores albos, veluti pileolos. Quod verò in ipsis rubicundum est, graueolens est. At *longa* *Aristolochia* mas vocatur. Eadem etiam *Dactylitis* folia habet oblongiora quàm rotunda: ramulos tenues magnitudine dodrantali: florem purpureum graueolentem, qui ubi defloruit, Pyro similis euadit. Radix autem rotundæ quidem globosa, Rapo similis: Longæ verò radix digiti crassitudinem habet, dodrantalis, aut etiam maior. Ambæ autem plerumque intus buxæum colorem habent: suntque amaræ saporis ac virosæ. Est & *tertia* quædam longa, quæ *Clematidis* vocatur. Ramulos habet hæc tenues, foliis subrotundis, paruo *Semperuiuo* similibus refertos: flores Ruræ similes: radices longiores, tenues, quæ corticem habent crassum & odoratum [*αρμαλιστότα*] & priuatim commodæ sunt ad spissanda vnguenta. Ceterum pro *ἀριστοχίᾳ* *μακρῇ* *ἰωνίᾳ*, ut habent vulgata exemplaria, id est, *Semperuiuo* minori similibus, legendum annotat Dodonæus, *ἀδρα* *ἰωνίᾳ*, *μακρῇ*. id est, *Ataro* similibus paruis.

De iisdem & *Pistolochia* sic scribit Plinius lib. 25. cap. 8. Inter nobilissimas *Aristolochia* nomen dedisse grauidæ videntur, quoniam est *ἀρίστη λοχίους*. Nostri *Malum terræ* vocant, & quatuor eius genera seruant. Primum tuberibus radicem rotundis, foliis inter *Maluam* & *Hederam* nigrioribus mollioribusque. Alterum masculæ, radice longâ, quatuor digitorum longitudine, baculi crassitudine. Tertium longissimæ tenuitatis, Viris nouellæ, cui sit præcipua vis, quæ *Clematidis* vocatur, ab aliis *Cretica*. Omnes colore buxæ, caulibus paruis, flore purpureo. Ferunt bacculas paruas ut *Capparis*. Valent radice tantum. Est & quæ *Pistolochia* vocatur, quarti generis, tenuior quàm proximè dicta, densis radicis capillamentis, lunci plenioris crassitudine. Hanc quidam *Polyrrhizon* cognominant. Odor omnium medicatus, sed oblongæ radici tenuiorique gratior. Carnosi enim est corticis, vnguentis quoque nardinis conueniens. Nascuntur pinguis locis & campestribus. Effodere eas mælibus tempestiuum, ita desquamato terreno seruantur. Maxime tamen laudatur Pontica, & in quocunque genere ponderosissima quæque medicinis aptior. Rotunda contra, &c.

Diuer-

Diversitatem vetustatis ratione in Plinij Pistolochia, quæ vberum in Neapolitano tractu provenit) accidero posse, se observasse ait Marantha. Depingit, inquit, Pistolochiæ radicem Plinius lunci plenioris crassitudine: quod quidem in omnibus pulchre quadrat; sed nonnullas digitum æquare adinueni, quod non aliunde effectum esse, quam ex eius vetustate non leni coniecturâ credidi: erat enim in plantis illis cespes radicibus connatus, satis crassus, ex quo viticularum prope infinitus exortus, quæ in aliis non videbantur. Videmus & Aristolochiam longam in Germania, aliisque quibusdam regionibus frigidis multo tenuiorem esse eam, quam Dioscorides describit: neque enim digiti crassitudinem æquat, quam ob rem multi non obscuri nominis viri duorum generum longam Aristolochiam statuere coacti sunt: alteram crassam, alteram tenuem appellantes: &c. Marantham autem miramur scribere Aristolochiam longam, veram scilicet in Germania provenire. Ea enim quæ in Germania reperitur, à vera longa plurimum differt. Sunt etiam plures Aristolochiæ, quam numeret Marantha.

Ex verbis Dioscoridis Sole clariùs fieri, Aristolochiam rotundam officinarum, quam Germani Rinde, Holswurp vocant, qua communiter omnes utuntur, non esse eam quam Dioscorides atque alij veteres placent, contendit Fuchsius variis nec levis momenti rationibus, quæ hic longum foret recensere: is autem censet vulgarem Aristolochiam esse longam, non Clematitim.

Cum Aristolochiæ secundæ vulgaris historiam absolvisset Tragus, peruenit ad manus eius vera Aristolochia rotunda, quam omni ex parte Dioscoridis descriptioni respondere ait. Radix siquidem eius rotunda sit, rugata, pulla, ac undique impressiones quasdam referens, in superiori parte, quæ caulem ex se mittit, in acumen quoddam turbinata, ita ut Rapulam marcidam repræsentet, gustu amara, sicut & longa Aristolochia, intus suberosa. Hanc in montanis Montis Pessulani provenire, ac Lugduni venundari refert Gelsnerus.

Aristolochiam tenuem, Cordus in Theriacam ait esse illam quæ longa cognominatur, cuiusque radices gracilitate sua & longitudine sarmenta vitium imitentur. Aristolochiam verò rotundam negat esse illam radice in Diateslato, quam Germani Holswurp vocant, sed aliam multo maiorem, & tuberosam, intus solidam, colore Buxi flavo, odore & sapore similem Aristolochiæ longæ: Asserri ex Italia & Helvetia.

Aristolochiæ Clematidis longa radix nobis est (inquit Syll. de med. simpl. nar. lib. I.) persicqueus, longa, rata, Rotunda verò in agro Neomaufensi plurima, etiam hic excrevit. Effodienda est messibus, & desquamata terreno servanda. Legendam vitamque Plenilunio, ut alias prope omnes quidam contendunt: sic enim pleniores cum sint, siccando minus flavescent, alio tempore lectis magna sui parte siccando vaporantibus & marcescentibus. Eligenda vitæ bene habita, & si est sicca, minus alæ rugis striata, carne multa, firma, odore & sapore vegeto, non pulverulenta dum frangitur, nec situ obruta, nec carie aut teredinibus exesa. Quæ bonitatis notæ reliquis propè plantarum partibus sunt communes. Pontica autem & Cretica est præstantior.

Tom. III.

De Aristolochia in genere hæc scribit Matthiolus: Aristolochiæ tria statuuntur genera, nempe rotunda, longa & Clematidis. Hæc rara admodum & paucis nota: illæ verò omnibus ferè herbarum studiosis notissimæ. Quæ rotunda vocatur, etsi non ubique in Italia proveniat: in agro tamen Goritienfi plurima, pulcherrimaque nascitur, præstanti odore, vitæque flores edit in toto ferè caule oblongos, & ex parvo capitulo in auriculæ modum desinentes, subluteo colore, & internè quadantenus ex atro purpurascens, & quibus oriuntur fructus: qui in longa Pyri imaginem referunt, suntque luglandibus longè majores: in rotunda verò rotundiores, pauloque minores spectantur. Quæ in re non potui non maxime Plinium admirari, quod lib. V. c. 3. vitæque ferè baculas parvas veluti cappares tradiderit: nisi quis illud dixerit, quod Plinio contigerit, Aristolochiæ utriusque fructus vidisse, priusquam ad summum adoleverent. Sed certè is eodem in loco exculari, meo iudicio, non potest, quin manifestè hallucinatus, & græci sermonis non admodum peritus deprehendatur, cum Aristolochiæ nomen dedisse gravidas tradat. Quandoquidem non ab utroque generibus mulieribus, sed à puerperis Aristolochia [ut Dioscorides scribit] id nomen sibi comparavit. Cuius rei non modò indicium præbet nomen ipsum ἀριστολογία, quod nihil denotat. quàm optima puerperis, non [ut Plinius] gravidis: sed etiam ipsius facultas, quæ ad remorantes à partu secundas, mensesque clendos, magnopere commendatur. Quapropter fuerit hæc prægnantibus, proculdubio exitiale, potius, quàm salubre medicamentum, cum ea sanè omnia quæ secundas & menses educunt, sortum etiam trahant, & quandoque interficiant, præsertim amara, Aristolochiæ modo. Nec minus præterea Leoniceum satis admirari possunt quod dum de Cyclamino, & Aristolochiis Plinium accusat, in eandem, in quam Plinius, foetam ceciderit, asserens cum Plinio Aristolochiam à prægnantibus sibi nomen adinvenisse. Quod ne sine auctore pronunciasse videretur, Dioscoridem quidem adducit, sed eius historiam quantum equidem sentio, corrumpit ac pervertit. Sunt & recentioribus Cordus, Lonicerus, & Monachi illi, qui in Mesuem commentaria edidère, qui sibi certò persuadent, eam esse Dioscoridi Aristolochiam Clematitim, quæ officinis omnibus passim longa cognominatur: argumento, quod hæc radices proferat admodum longas, & sarmentorum modo prætenues. Quin & ut suam tueantur, ac magis roborent sententiam, hoc in loco Dioscoridis codicem omnino depravatam esse contendunt: & ubi vulgata lectio habet *κλωνία ἔχουσα λεπιά, πολλοῖς ὑποσπορῶνλοις ἀγλαῖς μακρῶν εἰκίσι*. hoc est ad verbum ramulos habens tenues foliis subrotundis Sempervivis parvis similibus, non *ἀνζῶν μακρῶν*: sed *ἀσπρῶν μακρῶν*, quod Asaro parvis similia sint folia legendum esse censent. Horum sanè sententiam nunquam probare potui, neque probandam arbitror, pluribus cum rationibus, tum auctoritatibus adductis [eas ex ipsius Matthioli Commentariis petendas relinquitur.] Sunt præterea recentiorum quidam rei herbariæ & studiosi & periti, quibus persuasum est, non tamen sine aliqua ratione, quod Aristolochiæ longæ præter Clematitim duo habeantur genera: quarum altera sit radice [ut Diosc. inquit] digiti crassitudine & Dodratis longitudine: altera verò tenui & longiore, quæ [ut

R r r

Alia optima
refusata.

*Aristol. te-
nuis.*

amunt] ab Andromacho & Galeno lib. i. de Antid. *ἀριστολόχια λεπτή*, hoc est Aristolochia tenuis appellatur: quin & hanc affirmant eam longam esse, cuius hinc imaginem exhibuimus, cu usque passim est usus. Quo fit ut pro certo existiment haud esse eam Aristolochiam, quæ in Andromachi Theriacam addi debeat, Andromachi junioris & Democratis testimonio innixi, quod ij in Theriaces compositione huiusce tenuis tantum meminerint. Id quod (ut dicunt) præ se ferre videtur, alterum etiamnum ipsius Aristolochiæ longæ genus esse præter Clematidum, radice constans tenuiore & longiore. Hoc autem comprobatur fuisse putant a Galeno libro antè citato, ubi docens quomodo nonnulla, quæ ab Andromacho seniori obscurè tradita sunt, explicari debeant, ita scribit. Siquid adhuc aliud superest, quod minus dilucidè ab Andromacho Seniori elegiacis versibus dictum, planum fiet Theriacam legentibus ab eius filio solu à oratione descriptam. Quod enim ille Cecropium mel obscurius appellat, id Atticum apertè nominat. Centaurium ille nullà adhibita distinctione in carmine pronunciat, hic verò in prosa tenue apponit, eò quod aliud quoque Centaurium exierat, crassum appellatum. Idem & in Aristolochia fecit, cum præter tenuem Aristolochiam, alia quoque reperitur, quæ crassam radicem habeat, & rursus tertia, quæ rotundam. Hæcenus Galenus. Quibus nimirum verbis illi credunt suam satis firmasse sententiam. Sed ego quidem aliter sentio, ut qui putem, Aristolochiam tenuem non aliud Andromacho & Galeno fuisse, quàm Clematidum cognominatam. Etenim, ut omittam, quod Dioscorides & Galenus non plura, quantum inuenerim, quàm tria Aristolochiæ genera commemorant, nempe rotundam, longam, & Clematidum: Clematidis præsertim à Dioscoride Aristolochiæ longæ subicitur, & quodammodo eius species constituitur, ramulis tenuibus, radicibus etiam tenuibus ac longioribus. Ut hinc facile nobis liceat conicere, Andromachum & Galenum, non aliud supra dicto loco per tenuem Aristolochiam intellexisse, quàm Clematidum. Adde quod si ad omnium qualitates & facultates spectes, sanè Clematidis dignior est, quæ in Theriacam recipiatur. Hæc enim radicem habet, Dioscoride teste, cortice odorato vestitam, vnguentorum spiliamentis convenientem. Plinius deinde lib. 25. cap. 8. Clematidum cæteris prætulit his verbis. Tenuis longissimæ tenuitatis, Vitis nouella, cui sit præcipua vis, quæ Clematidis vocatur, ab aliis Cretica. Et paulò post idem ait. Olor omnium medicatus, sed oblonga radice tenuiori que gravior, hæc ille. Quibus utique aditipulari videtur etiam Gal. libro 6. Simpl. med. ubi de Aristolochiarum viribus disseruit, ut infra patebit in earum commentatione. Quare non est, meo quidem iudicio, asserendum, quod *ἀριστολόχια λεπτή* Andromacho & Galeno sit aliquod quantum Aristolochiæ genus ita vocatum: quandoquidem *λεπτή* hinc nullum facit per se genus: neque solum tenuem indicat, sed etiam minorem: atque cerè in longarum genere huiusmodi est Clematidis: &c. Atque colligendum esse arbitror, quod Aristolochia tenuis dicta ab Andromacho, non sit genus distinctum ab aliis, sed eadem cum Clematide & quod sub Aristolochiæ tenuis nomine Clematidum intellexerunt Andromachus & Galenus: &c.

Circa montem Idæ in Creta inueniri scribit

Bellonius lib. 1. Obs. cap. 17. quartam speciem Aristolochiæ differentem à tribus aliis descriptis ab antiquis, arbores scandentem ac opprimentem, ut Ephedram & Smilacem: Interea foliis, floribus, semine, radice, sapore & odore cum Clematide convenientem.

Antidor. Florent. Aristolochiæ tria genera Dioscoridis agnoscere videtur. Rotunda, inquit, hodie notissima, radicem habet rotundam, Rapi modo, reliquæque notas, quas illi tribuit Diosc. Longa autem paucis adhuc cognita, quandoquidem ea quæ hodie pro longa exhibetur vulgo, quibusdā est tertia species Clematidis dicta, quod non habeat radices quaternos digitos longas, velut longa Dioscoridis, sed longissimas & graciles, quales Clematidis describuntur, tamen si Dioscoridis textus non est mendosus, ut aliqui existimant, folia Semperparvi minoris non illi conueniant. Itaque quænam sit Aristolochia longa & Clematidis dubitatur. Cum verò rotunda sit omnium efficacissima, eius usus esse debet, quotiescunque Aristolochiæ nomen absolute reperitur: imò etiam longæ & Clematidis loco usurpari potest. Vulgaris lōga omnium imbecillima est.

Tragus corrigens Dioscoridem capite de Aristolochia longa, pro flore purpureo ponit candidum, quæ correctione non est opus: cum vera longa purpureum florem habeat, non candidum. Erat Tragus in ea opinione, in qua Matthiolus, scilicet, vulgarem Aristolochiam esse longam, ideòque pro longa depinxit & descripsit. Eiusdem etiam fuit opinionis Cornarius. Tragus autem agnoscit Radicem cauam non esse Aristolochiam, ut dicetur suo loco: verum cum exhibet rotundam, miror eum appingere capreolos, cum nullos ferat. Quæ autem de ea dicit ponentur proprio capite: de aliis Aristolochiis nihil ait. Radicem illam cauam miror. Contrarium dicere esse rotundam, cum id jam ostensum fuisset manifestè à Trago & Fuchio. Hic eandem longam cum Trago exhibet, & insuper Pistolochiam, quam merito rejicit Matthiolus.

Matthioli opinionem circa Aristolochiam præsertim verò Clematidum ut examinemus, lupinis eum dicere miror, longam suam Aristolochiam habere flores ex atròpurpureascentes, quum ea quam picturā exprimit, eiusmodi flores nunquam proferat, quod unquam obseruare meminerim. Secundò, errorem in Plinio haud fuisse commissum animaduertit, id quod sibi persuasit Marcellus, Matthiolus, & Hamelbergius. Nec enim asserit Aristolochiam [ut falsò etiam ab Albino Mundella accusatur] optimam esse gravidam. Sed nec hoc affirmat, id significare Aristolochiæ vocabulum: Ast videri gravidam nomen id dedisse, quoniam esset *ἀρσιγαστή*, id est optima puerperis. Itaque mulieres gravidæ videntes eam esse bonam *ἀρσιγαστή*, vocarunt Aristolochiam. Quæ in re haud contrariatur Dioscoridi. Perinde etiam est, siue dicas mulieres gravidas nomen dedisse, quod sciebant eam vtilem fore sibi puerperis, siue eam inde denominatam quod bona esset *τὰς ἀρσιγαστὲς*. Mox, hercè, opinionis fuisse videtur Cornarius, qui Plinium erroris haud infimular, ast Plinium de appellatione idem quod Dioscoridem sentire scribit. Nunc Cordum errasse, ut Matthiolus, non ausim asserere, siquidem Matthioli rationes non sufficientes videntur. Primum quod ad Oribasium attinet, concedere quis poterit fieri posse ut corruptum Dioscoridis ex-

*Aristolochia
arbores. na.
dens Balan.*

*De tribus
Aristolochiis
genus
tenuis*

*Clematidis
longa Aristolochia
quædam*

*Tragus. mis-
sur.*

*Cornarius. hinc
nascitur.*

*Matthioli
gemma, quæ
dam sunt
valde ambu-
cillæ*

*Aristol. te-
nuis & Cle-
matidis idem.*

*Clematidis in
Theriacam
receptum.*

*Aristol. te-
nuis per se ge-
nus non fa-
cit.*

*Aristol. te-
nuis Andro-
machi non
distinguitur
à Clematide
Diosc.*

dis exemplar habuerit. Quod ad Serapionem & Auicennam; dico Matthiolum eos in sua lingua scriptos non legisse, & idem Matthiolum, Arabum interpretes secutum, Dioscoridis versione fuisse vitum. Quod ad folia Asari attinet, quum sæpe pro diuersitate locorum Asarum maxima habeat folia, vel parua, quid quæso in eo absurdi, si dicatur folia esse similia Asaro parua, & non magno? Flores porro similes sunt Rutæ, melini quippe, quanquam Plinius dicat omnes esse flore purpureo, quod à Dioscoride non affirmatur. De au horitate ex Nicandro desumpta, conceditur quidem pro diuersitate locorum variari multa: sed necesse esse, vt in latitudinem & profunditatem latus ille locorum protendatur, quem non semel auropia notauimus in suo nosse illo genere: nec quod tam fortiaur transmutationem, vt ex breui, dodrantali, & crassa, fiat longissima, trium cubitorum, & tenuissima. Cortex tandem admodum crassus esse non potest, habet ratione radicum longiorum, vel longissimarum ac tenuium. Vltimo, quicquid dicat Matthiolum de odore, videtur mihi aromaticus & gratio. Et si hæc conferatur cum reliquis Aristolochiis, nullam inuenio odoratorem. Igiturque videns, quod ad me attinet, donec in hi ostendatur Aristolochia, quæ melius conueniat descriptioni Clematidis, hanc pro ea retinebo. Si quidem à Bellonio vitam inspexissem, inspectamque examinarem, iudicarem an melius descriptioni quadraret. Næc opiniois fauorem habemus Dodonæum, qui vulgarem depingit, & describit pro Clematide: Rotundæ etiam figuram exhibet, alias solum commemorans.

Repositio.

Aristolochiam vitem ait Theophr. lib. 9. huius cap. 17. annis quinque aut sex: anno autem in umbra seruari Plinius lib. 27. cap. 14. dixit. Nascentur, vt inter notha Dioscoridis habetur, in locis montanis, & calidis ac planis: aut asperis & petrosis: & cultis Apuleio. Bellon. in Obseru. libro 1. capit. 66. longam in Thraciæ agris frequentem inueniri scribit: Dodonæus longam & rotundam testatur provenire in multis locis Italiæ: Item in quibusdam Galliæ, vt in Prouincia & Linguædo circa Monspelium, vbi & quantam abundare refert speciem, indeque adferri Antuerpiam rotundam vendendam: Tertiam lubenter provenire in vineis & multis locis Brabantiæ, circa elatos agros. Florent Aristolochiæ Maio & Iunio.

Locus.


Tempus.

ARISTOLOCHIA ROTUNDA.

Descript.

Aristolochia rotunda multa fundit à radice sarmenta cubitalia, imbecilliora quam Clematidis vulgaris, quibus alternatim adnascuntur folia, admodum breui pediculo hærentia, caulibus suis penitus complexa, omnium maximè rotunda, mollia, palleſcentia: ex quorum alia flores exeunt semunciali pediculo hærentes, tubulo ex luteo palleſcente in palam ex rubro nigricantem desinentes: viriculi sequuntur turbinati, striati, qui in partes sex dehiscences semen ostendunt nigrum, copiosum: radix tuberosa & rotunda, à cuius imo longæ dependent fibræ colore pallido, trissi amaroque gultum afficiens.

Figura Fuchſiana cum nihil valeat, aliam imaginem dare erat necessum. Proponit Eüch. Roessl. pro Aristolochia rotunda, Fumariam bulbosam, sed malè. Eundem errorem committit e-
Tom. III.



riam. Hæc. B. u. c. v. g. & Donthe. n. qui præ cæteris summè ineptit, dicit enim Aristolochiam rotundam vocari holubum: flores producere puniceos aut candidos, & radicem habere concanam, sed detentius & crassâ nimis ignorantia folia eius Hæde & terreſtris foliis comparat. Talia enim folia sunt Iconi, quæ Fumariæ bulbosæ est; hæc competunt.

Quia & Lo. Ionic. not. vt nictus pro & Trago.

Aristolochiæ rotundæ figurâ, signum exhibet. Sed & Tragus effictam imaginem proponit: siquidem Aristolochia rotunda nullo capiteolos producit. Videt, vt existimo, radicem tantum, & non folia, flores & fructus.

C. Bauh. phyt. & pin. Aristolochia i. siue rotunda, flore ex purpureo nigro: Aristoloch. rotunda vera Trago, Lonic. Cam. Aristol. rotunda Matth. Dod. Anguill. Cordo in Diosc. Gesl. h. Turn. Lac. Lobel. in Adu. Obs. p. 131. Ic. Plantar. p. 605. Cast. & Eyst. Arist. rotunda i. Clus. hisp. & hist. Aristolochia i. Cæſalp. Aristolochia femina siue rotunda H. Lug. p. 977. Eid. H. Lugd. nos. p. 978. Aristolochia rotunda Dodon. & Clusij. Vnius herba due figura.

Synon.

Monspelij frequens est, fructum ferens Iunio. Locus & Spontaneam reperit inter Mediolanum & Bar. Tampus. lausone. Aristolochia rotunda i. Clusij crescit pingui solo, in pratis & humidioribus agrorum marginibus Hispaniæ, Narbonensis Galliæ, & etiam Italiæ. Floret calidioribus regionibus in eunte Vere: in Germania & Belgica non nisi Maio & Iunio.

Aristolochia rotunda altera Clusij.

R Amulos seu palmites habet prioris, sed frequentiores & breuiiores: fructus longæ qui-
Rrr 2

Descriptio.

dem formam & colorem æmulantia, sed majora, longiorēque pediculo quàm superioris fulta: *stomem* ex albo purpurascens, Interiori fuscum, longæ flori penè similem: eius *fructus* priore longior, pyri in modum turbinatos, graciliore quàm in illa metà: *semen* platum, minus priore & rufum: *radix* superiori similis, cortice tamen magis flauo.

Synon.

C. Bauh. phyt. & pin. Aristolochia 2. siue rotunda *stomem* ex albo purpurascens: Aristolochia rotunda altera Clus. hisp. & hist.

Anguillata plures species inueniri scribit: verum hæc non solum colore floris, sed & fructu à priore differt.

Locus & Tempus.

Floret paulò maturius superiore, omnēque semen ferè abiecit quando prioris maturescere incipit. Hanc non nisi campestribus, & inter segetes spontè nascentem conspiciat Clusius. Superiori firmior est & in iuratum Hæmis tolerantior.

ARISTOLOCHIA LONGA.

Descriptio.



Longæ *sarmenta* per terram funduntur cubitali circiter longitudine, quadrata, aliq̃ue multis concava: per quæ folia nascuntur falcata, acutoloba quàm rotunda, longioribusque pediculis hæcentis; ex quorum sinu floris longi, Rotundæ similes, oriuntur, minùs flauis, fructu succrescente pyriformi.

semine farto, ut in Rotunda dictum: *radix* pollicari aut brachiali crassitie, pedem circiter longa, amaro Rotundæ.

Synon.

C. Bauh. phyt. & pin. Aristolochia 3. siue longa vera: & Ang. all. & Camer. Aristolochia longa Dod. Cord. in Diosc. Geln. horr. Lob. Obs. & ic. Plant. pag. 606. & Clus. hisp. & hist. Aristolochia longa Fuchsij. Cæsalp. Aristolochia altera radice pollicis crassitudine.

Locus & Tempus.

Prouenit campestribus locis inter segetes, & quibusdam vineis in Narbonensi Gallia: meminit & Clusius nouo Vere florentem eruere in insula medijs in stagnis sita, ubi templum Magalona nuncupatum, olim Episcopi Mompellani sedes, circa oppidulum Villa noua nominatum secundo à Mompelio miliar.

Aristolochia longa altera Clusij.

Aristol. longa differentia.


Quædam etiam differentia in Aristolochia longa notatur: nam illius, quàm in Hispania Clusius obseruabat (tamen Gallicæ ferè per omnia similem) flos à diligentius inspicientibus nonnihil diff. rie deprehenditur, quippe cuius extrema pars interiore parte purpurei coloris sit, qui in alia herbaceus: Hispanicæ item radix

extima parte non est gracilis in nouellis plantis, ut altera, sed plerumque obtusior, & ipsa radix 6 reulor.

Aristolochia 4. siue longa Hispanica C. Bauh. phyt. & pin. Aristolochia longa altera, Clus. hisp. & hist.

Nascitur in Hispaniis inter Vites, regno Valentino frequentissima, ubi Martio florentem, & jam semen perficere incipientem eruebat Clusius: Vtraque autem eum in Germania, tum in Belgica frigoris est impatiens, & diligenti curâ adseruari debet. Al. quoties Viennæ periculum facere voluit anthor, an Hiemem in horto ferre posset, etiam Abiens frondibus testâ, ut reliquæ, quas hac ratione conseruare solebat, plantæ: sed operâ lusit, & semper corruptæ sunt. Itaque accepto damno prudentior factus, in vasis fictilibus postea semper aluit.

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS vulgaris.



Tenax *radix*, multiq̃ fribis capillata, odore non ingrato, sapore amaro, adeoque tenulum partium ut statim gustata fauces eo imbuat, serpit: *utricula* pedales, infirmæ, striatæ, geniculatæ: folia ex geniculis singulis singula, Hederaea, rugosa quâ pediculo longo annexatur, anchoræ in formâ curuata: ex eorundēque

alis oriuntur floris oblongi, lutei, palæ effigiatæ, canali intrus lanuginoso, cui pro basi subijcitur orbiculatum, capitulum in quo sent sessiles apices colore herbaceo: fructus pyriformis striatus, suglandis magnitudine.

Anguill. Aristolochia vsualis Italica, Aristolochia Italica cõmunis, Aristolochia vulgaris longa, forè Clematitis. Cordo in Diosc. Aristolochia Clematitis, simpliciter longa vocata. Trago [qui frustra textum Dioscoridis mutat, ut hanc suam longæ accommodet] Aristolochia longa, mascula, Dactylitis: Et sic etiam Lonicero dicitur.

Dorsth. pro Aristolochia longa malè exhibet eam cui floris lutei, & radices longissimæ.

C. Bauh. pin. Aristolochia 5. siue Clematitis recta (1. phyt. pro recta.) Aristolochia Brunfels. in 4. p. 73. longa Trago, Math. Fuchs. Tourn. Lac. Lon. & Castori. Aristolochia longa altera, & Clematitis veterum Cordo in Diosc. Aristolochia longa vulgaris, Ang. Cam. ep. & hort. Eyst. Aristolochia Clematitis Dodon. gall. Ang. Geln. hort. Lob. Obs. p. 332. & ic. Plant. p. 606. Tab. & Gerardo. Aristolochia Clematitis 1. Clus. hisp. Clematitis vulgarior, Eid. hist. Aristolochia Clematitis, siue longa vulgaris, Farkas alma, hoc est, Lupinum malum, seu pomum. Eid. in stip. nomencl.

menelat. pannonico. Aristolochia Saracenica Dod. in fol. lat. Aristolochia altera radice tenui Cæsalp. Aristolochia longa Matthioli, Clematidis Penç & Lob. H. Lugd. p. 977. Aristolochia Saracenica Dodonæi, Clematidis prior Clusij Eid. p. 979. Eiusdem figuræ duæ imagines.

Hist. Lugd.
notatur.

Locus.

Obseruatur in variis hortis, in quibus suo re-
ptatu valde molesta: Monspelij, spontanea cre-
scit. Passim in agris Austriacis infra Onasum ad
Morauiam sitis prouenit: ac plerisque aliis Gal-
liæ, Hispaniæ, Vngariæ, Germaniæ superioris &
inferioris locis. Floret cum reliquis.

ARISTOLOCHIA CLEMATIDIS NON vulgaris.

Descriptio.



Hæc longa, ramosa, tenuia, striatâ, que habet sar-
menta, quibus vicinas sepes, & interdum ar-
busculas superat, iis se con-
uoluens & im-
plicâs Connol-
unli aut Lu-
puli modo. Fe-
lia illi reliquarû
Aristolochia-
rum foliis simi-
lia, seu potius
generis illius
Apocyni, quod
in maritimis
nascens, Mom-
peliani Scam-

noneam olim appellabant, extremo mucrone
acuminato, supernè laeua & viridia, infernè ex
purpure albicantia, longo pedicelo innixa: *stis*
Aristolochiæ longæ incuruus, oblongus, ex pur-
pura nigricans, intus tenui lanugine plenus, lon-
gissimo omnium pedicelo intidens: *fructus*, vt ex
illius rudimento Clusio colligere licuit, reliqua-
rum Aristolochiarum fructui similis, tale etiam
esse *semen*, ex eo quod Simon de Tonar ei mi-
serat, obseruauit, fructus verò æquè magnus, ac
in Clematide vulgata, & à pedicelo dehiscens:
radix prælonga, sarmentitia, Smilacis asperæ in-
stat (cum cuius crassioribus fibris magnam habet
affinitatem) nunc per summa serpens, mox altè
sub terra se condens, pallidi coloris, non ingrati
saporis; gustata enim, aliquantulum adstringens
deprehenditur, & manifestæ acrimoniæ. Tota
planta odorata est.

Huius neminem facere mentionem scripsit
Clusius, cum Hispanicarum quarundam stirpi-
um historiam publici iuris faceret præter vnum
Bellonium, qui eam Obs. lib. 1. cap. 17. in Creta se
obseruasse scribit. Idem in hist. denudè asserit: nec
ipsum mouet, quod qui generalem illam plan-
tarum Historiam Rouilianis typis Lugduni ex-
pressit, scribat, Dodonæum eandem Clematidi-
dis nomine depinxisse. Fatetur imò Clusius eam
Dodonæum iconè dedisse, sed à se acceptam, &
totam aded Aristolochiarum historiâ, cum Pur-
gantium historiam medicaretur Dodonæus, ipsi
liberaliter [vt & pleraque alia] communicasse
ait.

Dicitur Aristolochia Clematidis Dod. in fol. lat.
Tom. III.

Hist. Lugd.
not.

Synon.

& Cast. describenti. Aristolochia Clematidis
altera Hispanica Lobel. Obs. p. 333. Icon Plant. p.
608. Aristolochia Clematidis Dodonæi H. Lug.
p. 980. Aristolochia 6. siue Clematidis [altera
interponitur in phyt.] serpens.

Circa Hispalim itinere Olyssiponenfi, pluri-
mis Bæticæ locis, ac etiam circa Cordubam, pin-
gui solo, in dumetis, vepribus, & vetustis qui-
busdam Oleis spontè nascens Aristolochiæ hoc
genus obseruabat Clusius.

Locus.

ARISTOLOCHIA POLYRRHIZOS.

Aristolochia polyrrhizos ex radice argu-
mento nomen inuenit, quæ ex plurimis
longis iuncæ tenuitatis, buxi coloris, radicu-
lis in vnum tandem caput coeuntibus est com-
posita: *viticula* dodrantes, graciles, ramosæ:
folia longæ foliis similia, longioribus hærent pe-
diculis, minora, fortuitò per margines sinuata:
floris ex earum alis pronati, aliarum similes, her-
bacei aut per extremum ex herbaceo nigricantes:
fructus turgidus, *semine* plenus, vt in prioribus
diximus.

Etymol.

Lobel. in Adu. Aristolochia polyrrhizon, siue
Pistolochia Plinii, gratiore odore multò & aro-
maticitate:

Synonyma.



Polyrrhiza A-
ristolochia, in-
dicta Diosco-
ridi, & inco-
gnita commē-
tatori, sed in
vsum à Ron-
deletio reuo-
cata. Pistolo-
chia Dodon.
Gesner. hort.
Clus. hisp. &
hist. Camer-
epit. & Casto-
ri. Pistolochia
& Polyrrhi-
zon b Plinii
Lobel. Obs. p.
333. sine tamen
icone. Aristo-
lochia altera
plures radices

spargens Cæsalp. Aristolochia 7. siue Pistolochia
dicta C. Bauh. phyt. & pin.

H. Lugd. p. 980. Pistolochia Clusii: item, Pi-
stolochia Dodonæi: Dux vnus herbæ effigies.
Adrianus Spieg. Hag. lib. 1. cap. 9. perperam Fu-
mariam bulbolam vocat Pistolochiam.

Hist. Lugd.
1. figura.

Oritur in oliuetis, & petrosis Hispaniæ, Gal-
liæque Narbonensis locis. Serius floret reliquis
Aristolochiarum generibus: ac hoc peculiare
eius fructus habet, vt, dum maturuit, eâ, qua pe-
diculo adheret, parte, dehiscat, vt in Bætica Cle-
matide: longæ verò, & reliquarum, ab extrema.

Locus &
Tempus.

Cæterùm, Aristolochia iam olim Theophra-
sto multiplici vsu excellere videbatur. Sic enim
lib. 9. hist. cap. 13. scriptum reliquit. Vsum eius ad
multa commendant. Sed optima ad capitis eru-
ptiones & ad reliqua tamen vlcera satis valet: &
contra serpentum morsus, & ad somnum, & ad
secundas modo passi, partim aquâ subacta & il-
lita, partim in melle, oleoque derafa: Sed contra
serpentes è vino acescente pota, & vulneri [mor-
fo Gaza, qui non Aristolochiam, sed Malum

Vires &
Vius.

terre interpretatur inspersa. Ad somnū v. in vino nigro austero trita. At si vulva penderint, ex aqua colluere conveniet. Idem antea c. 13. Aristolochia [Malum terre, Gaza.] olfactu odorata, gustatu vehementer amara: perutilis ad caput, & reliqua viscera, & ad serpentes, & ad somnum, & ad alia multa: vlcibus capitis adhibere præcipiunt in in aqua subactam, reliquis ratam in melle & oleo: contra ictus serpentum ex vino acido bibi debet, atque inspergi morfui: ad somnum in vino nigro austero pertrita datur. Si vulva prociderit decocto abluisse iuuabit.

Theophrast. Ex illis constat Theophrastum bis eadem de Aristolochia scribere, nec inter illam distinguere, contra quā Dioscorides faciat. Rotunda, inquit, ad alia quidem venena facit: sed aduersus serpentes & lethalia medicamenta, longa drachmæ pondere bibitur cum vino, & imponitur. Eadem pota cum Pipere & Mirtha, omnia in vtero contentia pariter purgamenta, & menses, & fetus ejicit. Sed & in pello apposita eadem facit. At rotunda ad eadem quidem facit, sed ex abundanti auxiliatur anhelationi, singultui rigori, spleni, ruptis, conuulsis, luterum doloribus, pota cum aqua. Educit etiam aculeos & spicula. Et ossium squamas in cataplasmate impolita remouet: & putrefacta circumscribit, & vlcera sordida repurgat, & caus[us] [aspici] Lac. ex vet. cod.] explet eam in oleo & melle. Extergit etiam gingiuas & dentes. Putatur & Clematis is ad eadem facere, verum viribus inferor est prædictis.

Clematis. De Aristolochia Galen. 6. simpl. med. hæc prodit. Aristolochia radix multo est ad meditationes utilissima, amara & subactis. Sed ex illis omnium subtilissima est rotunda: aliam vero duarum quæ Clematis appellatur fragrantior est: itaque eā ad vnguenta vtuntur vnguentarij: sed ad sanationes infirmior. At longè minus quidem tenuitatis obtinet quā rotunda: sed nec ipsa inefficax est, verum abstergendi atque exaltacientia potentiam possidet, minus quidem quā rotunda abstergens & digerens, sed non minus calfaciens, imo forsitan plus quoque. Ita in quibus usus est modice absterfionis, commodior est longa putata in vlcibus in carne explendis, & fomentationibus vteri. At in quibus crassum humorem validius extenuare oportet, illic usus est rotunda. Proinde dolores ab infarctu aut crassitie crudorum spirituum natos magis curat rotunda & spicula extrahit, & putredines sanat, & sordida vlcera expurgat, dentes & gingiuas candidas efficit. Auxilio est & Asthmaticis, singultientibus, comitialibus & podagricis, si cum aqua bibatur: tum ruptis & conuulsis, vt si quod aliud medicamentum, auxilio est.

Demonia fugat. Apuleius quoque testatur Aristolochiam herbam pisatam & cum mero potui datam vim veneni vincere: siccam verò suffumigatam febricitantem hilariorem facere: fugare & demonia: Radicem fistulis insertam celeriter expurgare & ad sanitatem perducere: Medicos quoque sine ea nihil feliciter curare posse: Herbam ex oleo usque ad calefactionem in frigore exultis vim habere cum porcina: Radicem pondere denarii vnus in vini hemina sæpius bibitam serpentium & hominum morsum venena discutere: Herba suffumigatam infantem, si contristatus fuerit, fugato demonio, hilarem fieri & conualescere: eandem cum Cypero & Draconte frimine tritam & cum melle impostam, canceromata, quæ in naribus nascuntur, emendare. Plinius lib. 25. cap. 8.

Radix. Aristolochias radice valere tantum scripsit: odorem omnium esse medicatum, sed oblongæ radice tenuiori quæ gravior, vnguentis nardinis conuenientem. Maxime tamen laudari Ponticam: & in quocunque genere ponderosissimam quæque, medicinis aptiorem. Rotundam contra serpentes. Oblongam tamen in summa gloria esse, si modò à conceptu admota vuluis in carne bubula, mares figurat, vt traditur: Reliqua quæ sparsim habet cum ex aliis hic recensentur studio prætermittimus: Is verò tandè lib. 15. concludit plurimis modis Aristolochia prodesse: nam & menses & secundas ciere: vulvas quoque procidentes inhibere fori, vel subactam maxime tenuem.

Tempor. ii Majus. Menses omnes quidem calidas esse concedit in principio ordinis tertij, siccas secundo: longam tamen calidiotem iudicat, quamvis terreæ in ea substantiæ plus sit, quā in rotunda, quæ ob id tenuioris est substantiæ, & ad omnia efficacior. Vtraque tamen obstructions apertæ, resolut, attrahit, spinas extrahit, & lignorum fragmenta carni infixæ, reuocat: sed hæc omnia rotunda magis ob dictam prius causam: pituitam purgat, & quorundam sententiā etiam bilem thoracem quoque & pulmones pituitā etiam puri expurgat insigniter: quapropter tussi humide & asthmaticæ etiam antiquo maxime prodest quouis vsus modo, vt etiam si sufficit &c. Aristolochia quoque, præsertim rotunda, cerebrum expurgat, ob id epileptiæ confert: Stomachum etiam eadem iuuat, singulis à flatibus constitutum. Hos enim non modò à stomacho, sed liene & alijs visceribus dissipat, horumque obstructions liberat, & natos inde dolores sedat, præsertim cum oxymelite radicato. Omnis autem Aristolochia vterum à paru expurgat, menses mouet, abortum facit. Rotunda præter hæc vlcera maligna, fistulas mirè iuuat, quia terget, & carne implet. Podagram quoque & musculos contusos cum melle & pauco sale emplastri modo admota iuuat: cum hydromelite vero curat aurium vlcera & auditum roborat. Accutum denique cui incocta est, gingiuas adstringit, & putredinem ab his aufert: dentes quoque conficatu deterget. Rigori etiam febrili remedium est singulare. Purgatio non nocet, sed visceribus confert. Quod ad alta attinet, vt Dracunculus corrigenda. Coqui tenique plurimum potest. Datur à drachma vna ad aureum vnum.

Vinum, in quo decocta fuerit Aristolochia, mundificat vlcera putrida & sordida præsertim genitalium, si ex illa decoctione colluuntur, quod vt felicitus exequatur, radicem in puluerem redactam inspergere oportet. Idem vinum admixto modico mellis, calidum, auribus indurum, parotidas eorum sanat, doloremque mitigat, inquit Tragus. De electuario Aristolochiæ vide Clementinum de med. met. cap. 6.

Rotundæ radix (addit Lobel.) iam valde nota Italiæ & Galliæ Narbonensi: sed non perinde in vsum deducta, ac potius Chirurgis, quā Medicis, magno sanè dedecore artis, & incommodo ægrotum & iis enim maxime commendantur Indiciæ merces, plerumque tempore vitæ, aut cariolæ: hæc autem nostratia recentissima ignorare non puer. Tam efficaces quippe sunt longa, & polytrichon præsertim, vt radices vtriusque parimomento, partim intro datæ, partim in pessario admotæ, eliciuntur sæuim, iam sesquidulæ frustra erumpere conatum, fetusque inuolucra lacera- ta, ac etiam puerperam, tridul cruciatibus penè enecatam: eo quæ multis omnium vsum apud Mon- spelienses

pelienfis. Polythizæ quidem Aristolochiæ, indi-
cæ Dioscoridi, & incognitæ Commentatori, ra-
dices, in vñm Rondeletius reuocarat, propter
plantæ ignorationem jamdiu defictum, & tamen
præferendum reliquis duabus, cum suauitatem
aromaticitatem, tum medicatâ efficaciorē facultate, cuius
causâ metiendū Andromachi & Gal. theriacis aplo-
rem piæ rotunda & longa præceperant: at v-
trumque de odore & sapore exploranti, multo
ignatior comperit Clematis, quàm falsò re-
nuem apud antiquos Theriacæ scriptores vo-
catam putabant Itali.

Ex Macri poëti de Aristolochiæ viribus liceat
etiam coronidis loco hîc aliquid addere.

Aristolochia speciosa res dicimus esse:

Longa prior, radix est cuius longa, & aur:

Dicta Rotunda sequens, quod sit radice rotunda:

Tertia Clematis græco sermone vocatur:

Viribus hac penè par dicitur esse rotunda.

*Omnis vim calidam, siccamque leguntur ha-
bere.*

In primo vi sicca gradu, feruensque secundo est:

Pessiferos morsus cum vino sumpta rotunda

Curat, & assumptu prodest sic hausta veneni:

Hocque modo tardas educit sumpta secundas,

Cum peperit & Myrrha putredine mundas ab

emni: &c. quæ suprà in aliorum tum Veterum
tum Recentiorum soluta oratione fuêre pro-
posita.

ARISTOLOCHIA PISTOLO- chia altera.

Descriptio.




Multa desum-
mo radice
capite proferte
scribentur iacob.
Placæ (qui an-
no 1600. illius a-
liquor ramulos
cum icone ipsius
manu delineata,
additis quibusdā
notis, descriptio-
nis huius autho-
ri Clusio mitte-
bat:) tenuia sar-
menta pedem aut
plus vel minus
longa, angulosa,
striata, ramosa
lenta, fractu con-
tumacia, humi
sparsa, & ex ar-
virentia, in qui-

bus incondito ordine nascuntur folia nervosa su-
periori similia, magis tamen mucronata, & ad
similacis asperæ foliorum formam quodammo-
dò accedentia, minora, atraque & immarcesci-
bill viriditate prædita, oblongis pediculis nitentia,
è quorum sinu nascuntur longi caulique flores,
Aristolochiæ longæ floribus formâ similes, sa-
turâ tamen rubedine foris magis distincti, inter-
nè verò aliquantulum flavescentes, oblongisque
pediculis inherentes: his succedit fructus Aristo-
lochiæ longæ fructui non dissimilis, sed minor:
numerosas autem hoc genus habet radices, instar
præcedentis [Pistolochiæ, siue Polythizæ] vel
Smilacis asperæ: verum graciliores, & fibris qui-
busdam tenuibus donatas, odoratas. Flores præ-
ferre monebat Iulio & Augusto.

C. Bauh. pin. Aristolochia 8. siue Pistolochia
Creuca: Pistolochia altera semper virens Clus.
hist. ap. 1. Creuco semine nata.

ARISTOLOCHIS SIMILIS RHASUT & Rumigi Maurorum.

Aliquem spirat odorem sed ingratum. Ex De
radice forculi prodeunt plerumque quatuor
albicantes, filii modo tenues ad radicem, ex qui-
bus parte supernâ hærent foliola vtrinque septem
aut octo, cinerea; opposita verò magnitudine,



& sicut folius Fi-
licis floridæ re-
spondentia: nisi
quod verius
immo aduixa sint
ad instar Saluiz
minoris. Inter
quorum ima,
superioribus
magis aliquan-
tò inter se di-
stantia, flores hæ-
rent Aristolo-
chiæ similes,
paullò maiores,
colore magis
fusco, longiore-
que pediculo.
Radix aliè depa-
cta, est qualitate
sicca calidaque,
ut amaritudi-
nem eius docet
reputat Rauvol-

filius in 1. in. part. 1. cap. 9. ubi ait incolas Halepi
vocare Rhasut & Rumigi: Item part. 4. Icon. N^o.
121. Peregrina incognita herba, Maurit. Rhasut &
Rhumigi. Hist. Lugd. p. 29. append. Maurorum
Rhasut & Rhumigi non incommodè ad Aristo-
lochiæ referri posse existimat. C. Bauh. phyt. Synon.
Aristolochia 8. siue Aristolochiæ similis: Eid.
pin. Aristolochia 9. siue Maurorum: Aristolochia
peregrina Rauvolffi. Clus. hist.

TVSSILAGO. CAP. IX.



Dioscori-
des Tus-
silagin (Ex Descript.
xiv) folia tri-
buit Hederae
[xiv: xiv: xiv:
da, hederacels
vet.] similia,
maiuscula, le-
nâ, septenâue,
à radice pro-
deuntia, infer-
nè subalbida
superne verò
virentia, plu-
ribus angulis
prædita: ead-
em palmi al-
titudine: flo-
rem ex lateo
albicantem,
qui verno tē-

pore prodit, at quāprimū vnā cum caule amittitur. Ex quo factum vt nonnulli herbam hanc sine caule ac sine flore esse existimauerint. Radicem tenuem, nec superuacuum. Natales circa scaturigines aquarum, & rigua loca.

Plinius.

Tussim sedat Bechion [inquit Plin. lib. 16. cap. 6.] quæ & Tussilago dicitur. Duo eius genera. Siluestris vbi nascitur, subesse aquas credunt: & hoc habent signum aquileges. Folia sunt majuscula, quā Hederæ, quinque aut septem, subalbida à terra, supernè pallida, sine caule, sine flore, sine semine, radice tenui. Quidam eandem esse Bechion [Arcion M. & CH.] & alio nomine Chamæleucen putant. Huius aridæ cum radice fumus per arundinem haustus & deuoratus, veterem sanare dicitur tussim: sed in singulos haustus passum gustandum est. Altera à quibusdam Saluia (Quidā voluit hinc describi Sphacelon Theoph. quidam Stachim vulgarem: alij Horminum vulgare: quidam, Æthiopida pectoris morbis utilissimam, Dalech.) appellatur similis Verbasco: conteritur ea, & colata calefit, atque ita ad tussim lateritq; re dolores b bitur: contra scorpiones eadem & Dracones marinos efficax. Contra serpentes quoque ex oleo perangi ea prodest.

Hermol. n. s. Plinius.

Hermol. Coroll. 53. Bechion siue Bechleon quoque duo genera habere ait, & siluestre Plinium aliter, quā Dioscoridem describere folia eius tradendo supernè pallida, subalbida à terra, sine flore, sine semine. Alteram à quibusdam Saluiam dictam, à Dioscoride Verbascum siluestre dici putat. Priorem verò quosdam Arcion, & alio nomine Chamæleucen ab Italis Farfugium appellatum, folio Populi, sed ampliori, nascens iuxta flumines, vnde ab iisdem Populago dicta sit. Sed hanc & Farfariam vocat, Dioscoridem tementem esse, à fluuio fortasse Farfaro, quem Virgilius in Sabinis Pabatum appellat. Plautus, dissipabo, inquit, re vt folia Farfari.

Ruell.

De Bechio Ruellius hæc scripsit: Latinis Tussilago, alijs Farfaria, nonnullis Populago dicitur: florem verè pallidum sustinet, breui cum suo caule deciduum: atque hinc data credentibus occasio, sine caule atque flore hanc herbam nasci. Quare obseruandum diligenter, caulem & flores Tussilaginis esse fugacissimos, iisque enatis breui vigor vitæque durat, longissimæque mora biduum: post quod illud tempus flacciscentes euanescent, & caduci marcent. Quare non nisi iis, qui medio Vere sese fortunâ ferunt obuiam, & flos & caulis cernitur: namque die vno locum vniuersum caule & floribus pubescere videre licet, postridie prorsus eos contabuisse, frondæque solâ virescere, quapropter sine caule & floribus nasci plerisque, quātam etiam caulis iacturam non conspexerunt, creditum est [imprudenter naturæ negantibus quod obseruatum non fuerat, inquit Marcellus.] Plinius porrò duo Tussilaginis, siue Bechij genera facit siluestre sc. & alterum Salvia dictum, quod à Dioscoride Verbascum siluestre dici puto. Dioscorides autem vno Tussilaginis tantum genere contentus est. Tussilago herbaris & officinis Vngula caballina dicitur, vulgò Para equina, à foliorum cum vngula caballina similitudine. Hallucinantur itaque (ait cap. 12.) (qui Vngulam caballinam vulgò dictam Arcion esse sentiunt, Ruellium sequuntur Ryff. Dodon. & H. Lugdunensis.)

Arcion non est.

Porrò alidè Marcellus, corruptè legi credo in nothis appellationibus Richion (ρίχιον) & pro ea legendum Bechion (βέχιον) ab eadem tussi fa-

cto nomine. Sunt & alie Appellationes nothæ quarum nondū reddida ratio. Sunt enim qui Perinam seu Petrinè (πετρίνη) qui Peganò (πέγανος), h. e. Rutam] qui Pichion (πίχιον) qui Pagonathon (παγονάθων) qui Procheton (πρόχεται) qui Acrophyllo (ἀκροφύλλον) qui Sarrac. vocet. Egyptis Saatha (σααθα), Suatha legit Marcell. Romanis Tussilago (τυσίλαγος) seu Farfaria (φαρφαρία) aut Pustulago (πυσυλάγος: suspicatur legendum Populago, Sarac.) Bessis Alo (ἀλσα) dicitur.

Humelbergus videtur Tussilaginem [Roff. Humelberg. vocat] Arcion facere, ibidemque obscure omnia tradere, vt fufius in capite de Personatia dicitur.

Sibi contradicendo hallucinari deprehenditur Brunfelsius. Ait enim tom. 1. thap. 4. Personatiam & Lappam vocari Vngulam caballinam. Postea verò dicit Ianuensem & Pandectarum scriptorem ignorasse Vngulam caballinam, & impositum illis à Plinio: quoniam alicubi Lappam vocet Personatiam. Addit se opinari illos non legisse quodnam esset Arcion apud Dioscoridem: Hoc ad vnguem prorsus quadrare descriptioni Vngulæ caballinæ: ac secum habere Barbatum.

Cornarius scribit Plinium esse ex eorum numero, quos Dioscorides relarguit, tum hoc de Bechio capite, tum in totius operis præfatione, vt qui falsò opinatus sit, Bechion sine caule, sine flore, sine semine esse. Addit præterea in Dioscoride errorem subesse, esse manifestissimum: Et pro ρίχα λωλή ἀχνησος, legendum esse ἀχνησος. Cuius correctionis assecram habet Fuchsiæ. Bechion notam esse & officinis & vulgo, non tamen græco Bechij, nec latino Tussilaginis nomine, sed Vngulæ caballinæ appellatione.

Tussilaginem Pefasii quoad folia in initio ad eò similem asserit Tragus, vt d. cerni vix possint, nisi quis diligenter animaduertat, & consideret flores, & substantiam vtriusque, quæ ex vtrius descriptione petenda. Germani, addit, hanc plantam Brandt lattich quasi ambustorum Lacteam, quod ambustis & inflammationibus quibusvis medeatur: & Roffhub, hoc est Vngulam equinam, à foliorum cum vngula equi similitudine: & nonnulli Brandtscheich, h. e. Arcion, & Personatiam (sed quā rectè ipsi viderint) appellant. Plinius Tussilaginem, Cacaliam, Fartanum, & Farfugium cognominat, quibus vocibus maxime duabus posterioribus errorem subesse puto, rectius enim Farfarius legeretur. Vides igitur vnā & eandem herbam quamplurimas obtinere nomenclaturas, &c.

Bechium & Chamæleucen diuersas esse plantas, Turnerus sic ostendere conatur, Chamæleuce, dicta etiam Populago, Falfugium, & Fartanum, non eadē est planta Aëtio & Diosc. Videtur enim Aëtius Chamæleucen Bechio eandem facere: in reme illis enim contra tussim, eandem tribuit vires Chamæleucæ, quas Dioscorides Tussilagini seu Bechio: cumque Galenus & Paulus duobus distinctis locis de Bechio & Chamæleuce scribant, Aëtius Bechij penitus non meminit, sub Chamæleuce, vt mihi videtur, complexus. Plinius quoque suo tempore ait, fuisse qui Chamæleucen & Tussilaginem pro vna eademque haberent. Et in spuris Dioscoridis, Tussilago Chamæleuce dicitur, etsi apud Dioscoridem duæ diuersæ sint plantæ, agit enim de iis, duobus distinctis libris & capitibus. Chamæleucæ quidem folia tribuit intus reflexa, atque ramis esse præditam: Tussilaginem autem folia habere plana & recta

recta, nullisque ramis donatam esse, singulis foliis à radice, non autem caule, exeantibus. Scribit Dioscorides Chamæleucen Plantam esse vi-
rentem, foliis interdò reflexis, ramis quibusdà do-
natam, floce Rosam imitante: Ex quo sequitur,
cùm Tusilago folia habeat albida & directà, nul-
lis autem ramis sit prædita, nec florem habeat
Rose similem, non posse vnam eâdemque esse
plantam.

Ceterum, non defuerunt, qui Tiphium Theophrasti lib. 7. cap. 12. affererunt, quod ante solis ortum & occasum floret,

Synon.

Brussell. & Trago dicitur *Vogula caballina*:
Eur. Cordo, *Vogula asinina*, & *Lactuca vstularia*
Germanorum: Matth. Anguill. Fuchs. Turc.
Cordo in Diofca. (cui & *Farfarella*) Lac. Gesh.
hort. Lon. Dod. Lob. in Adv. & Obl. 320. Icô.
Plant. p. 549. (cat. & *Farfara*) Cæfalp. Cast. &
H. Lugd. p. 1030. *Tussilago*: Camer. *Tussilago*
vulgaris: Dodg. l. & *Cordo hist.* Bechlon. Cha-
maleace Plinij, Bechlon, *Tussilago*, vulgi *Vn-*
gula caballina, & *Parranum vel Partugium*
Gesh. etc. *Tussilago* sive *vulgaris C. Bauhin.*
p. 172. & plin.

Nomina
linguarum.

A commodè, competiffimo quod præstat
 anhelosis & mihi afflictis dicta *Beyon*, Bechiam
 Grecis, Tuffi-go Latinis, vel Vngula Caballina
 recentioribus: Germ. *Koffi üß / Koffhüb /*
huylattich, *Lera*, *Stattich* & *Gelfthind*: Bel.
herbladeren: Gallis *Pas d'Asne*, *Herbe de pater*, *Pa-*
te de Cheval: Ital. *carfara*, *Vnglia di cavallo*: Hisp.
Vaba de ajno: Angl. *fole foot* / & *Lotter foot*:
 Boh. *rouffe foyne*: Hung. *fodi töl* / eodem
 vide iacet nomine, quo *Byonia*: Nonnullis ta-
 men *Lo korom*, h. e. Vngula caballina, etiam
 appellatur.

**Locus &
Tempus.**

Secus fontes, & rivulorum fluviorumque ripas, scrobium ac fossarum margines, atque humentibus & aquosis locis sponde nascitur. Sub finem Martii & circa Aprilis calendas fugacissimum flores conspicui sunt, qui cum vna cum pediculis marcescent, inde folia progignuntur totaestate in vigore futura, Dodonzo recte. Vda sara, crepidumque fluminum amare, & Februario & Martio nondum egressis foliis florere perhibet Lobelius. Ego etiam Ianuario mense flores in pappos evanescere observavi. Ex quanquam arenosa loca quoque amat illa, quippe quibus aqua subest, nasci tamen etiam in hortis, & aliquot annis durare potest locis umbrosis.

Vires &
vires.

Cæterum, Bechii folia, Dioscoridis quidem testimonio, trita & cum melle imposita, ignes sacros & omnem inflammationem sanant. Eadem arida suffita per infundibulum, ut hiæntes fumum ore suscipiant ac deovent à tussi sicca, & erecta cervicis spiratione vexatos curant. Rumpunt & abscessus in thorace. Idem facit & radix suffita. Et in aqua multa cocta pota mortuos fœtus elicit. Bechium (inquit Galenus 6. sim.) inde aded nuncupatum est, quod bechias, h. e. tusses & orihopneas iunare sit creditum, si quis folia arida, aut radicem in prunis vrens, ascendentem inde fuliginem inspiratu attrahat. Est autem modicè acris, ut sine molestia, noxæ omnes thoracis abscessus credita sit rumpere. Sanè folia virentia partes crudæ phlegmone obfusas illitu extrinsecus adiuvant, nempe ob aquæ substantiæ admissionem, qua omnia viridia tenera que participant, alia plus, alia minus. Nam licet Bechii folia acriora sunt, quàm ut phlegmonis conveniant.

Quæ Dodonæus de Bechii siue Farfæ (vt vocat) vsu & facultatibus scripti, Dioscoridis & Galeni verba clariora reddunt. Bechii, inquit, recentia & adhuc virescentia folia refrigerandi nonnullam vnâ cum resiccandi potentia vim obtinent: viceribus calidis, & partibus inflammatione laborantibus impolita profunt. Arida verò folia calida sunt & siccæ, & modicè acris; horum in prunas candentes infectorum fumus per infundibulum aut harundinem patente ac hiante ore receptus, orthopnoæ & tussis siccæ medetur: præstant idem radices aridæ recepto quoque eorum fumo. Auxiliantur verò & eadē in tabellis ex saccharo, suc eclegmate permixtæ aduersus tussim veterem & respirandi difficultatem. Recentium verò foliorum & radicum decoctum, vel ex his Serapium, recenti & extenui destillatione tussis medetur. Virtembergicus ad epilepsiam dat aquæ Tussilaginis puero ante & in paroxismo cochleare vnum: adultis autem bonum haustum, ab q̃; optimum remedium & certum. Ad Thoracicos plurimum etiam commendatur Tussilaginis conditura, cuius præparandi modus, tum ab aliis tum præfestim à Ioubersto traditur.

TVSSILAGO ALPINA MINOR
folio rotundo.

Q Vinque aut sex, interdum duodecim *folia* Descriptio:
humifusa, crassa, rugosa, circinata: rotun-
dioris, nisi leui sinuum vestigio inæqualia
essent, superne cum saturo virore splenden-

tia, infernè to-
 mento albo
 obducta, ma-
 gnitudine se-
 munciali, aut
 plusquam vn-
 ciali, longius-
 culis hirsutis
 pediculis nixa:
caulis purpu-
 rascens, vnicus,
 palmatis aut
 cubitalis, lanu-
 ginosus *florem*
 in summo ge-
 stat singularem,
 magnum, pur-
 purascentem, a-
 lloqui Tussila-
 ginis similem,
 in pappos facil-
 centem, *semine*
 affixo lōgo gra-



cili: radix villo obvoluta, satis crassa, longis
fibris capillata.

Duo Bechii Alpini genera tradit & describit Clusius: Is vero in Pann. p. 497. Tussilaginem r. pingit, & p. 495. pro Tussilagine alpina canescente folio describit. Ex hec est illa quam in hist. secundo loco pro Tussilagine alpina i. cuanido flore, pictam exhibet. Quam Porro in Pannon. pag. 498. inscribit Tussilaginem alpinam secundam, & pag. seq. pro Tussilagine alpina glabro folio delineat, in histor. Tussilaginem alpinam i. flore aperto intitulat, & titulo Tussilaginis alpinae primae canescente folio describit, secundaque Tussilaginis alpinae loco novam effigiem proponit sine caule & flore, & Tussilaginem

Synonymy.

alp. 2. glabro folio cognominat. Et hæc, illo i-
pſomet teſte, à Tuſſilagine alp. 1. flore aperto in
hiſt. (1. in Pann.) folio glabro, ceu & altera flore
euano (1. in Pann.) haud parum differt. Quæ
occafio vt vnicam demus imaginem, ex plantis
Tuſſilaginis tomentofæ, quas habemus.

Lob. dant
habitu
tintulo.

Cætera ſyno-
nima.

C. Bauh.

Locus &
Tempus

Lobel. etiam in Ic. Plant. p. 590. pingit vtram-
que Tuſſilaginem alpinam Cluſii in hiſt. hoc eſt,
primam & ſecundam: ſiue folio canefcente, &
glabro: ſiue cauliferam & caule viduam, vnâ ſo-
lâ, Tuſſilaginis ſc. môtanæ minime, inſcriptione.

Quæ caulibus deſtituitur, dicitur à Lobelio in
Obſ. p. 311. Tuſſilago montana minima foliis Sol-
danellæ alpinæ, auerſâ parte tomentofa. H.
Lugd. p. 1051. Tuſſilago montana minima Lobe-
lij. C. Bauh. pin. Tuſſilago 2. ſiue alpina rotundi-
folia (ferè addit in phyt. vbi quartam facit) gla-
bra. Caulifera vocatur apud H. Lugdunenſem
p. 1051. Tuſſilago altera alpina Cluſii (ſic & Cam.
hort.) in Pann. quippe Obſervationibus. Eſt
enim ei in hiſt. Tuſſilago alpina 1. vna flore a-
perto, & altera euano, & non candido, vt legit
C. Bauh. in pin. vbi vocat Tuſſilaginem 3. (5. in
phyt.) ſiue alpinam rotundifoliam canefcentem,
Tuſſilaginem diuerſam à vulgari, foliis minori-
bus, & ſolidioribus, Gefn. fr.

Tuſſilago alpina canefcente folio Cluſij oritur
in ſummis Aſtriæ & Stiriz iugis, & totos inter-
dum ceſpites occupat. Sub Iunij finem vt pluri-
mum floret, interdum verò tantum Auguſto
menſe, pro æris ratione & conſtitutione, in hor-
tis maturius, Aprili videlicet, in quibus etiam
cauliculus magis adoleſcit. Tuſſilago alpina gla-
bro folio inuenitur in ſuperiore collis parte poſt
monaſterium Neuberg ad radices celliſſimi ju-
gi eiufdem nominis. Obſeruatur etiam in infe-
rioribus iugis aliarum Alpium, gramineis locis.
Maio floret in hortos tranſlata & Aprili, vbi for-
mam non inmutat, quemadmodum nec ſupe-
rior. Huius autem cauliculus paulò longior eſt
ſuperiore. Ego in Rhætiæ monte Braplio ado-
leſcens inueni florentem menſe Iulio: poſtea
Genevæ in Allobrogum monte Thuri Iunio.
Ibidem in hortum tranſlata folia producebat
Martio, & florem Maio. Iunio ſemen in pappos
abibat.

Cluſius tribuit vires Tuſſilaginis.

ASARINA MATTHIOLI FLORE AN- themidis, ſubnectenda Tuſſilagini alpinæ

CAP. X.

Deſcriptio.



Eſt planta
in Bohe-
miæ montibus
nascens, quam
Aſarinam vo-
care libuit
Matthiolo,
quod Aſaro
congener vi-
deatur: Re-
pit hæc humi
ſolis Aſaro
rotundiore ac
ſcabriore. leui-
ter circum ſer-
rato: cauliculi
piloſi: floribus
melinis Anthe-
midis modo,
ſed longè mi-
noribus, haud

inodoriſ: radicibus tenuibus, longiſque, ſummâ
tellure repentibus, acuto guſtu, quadam cum
leuicula amaritudine.

Miror Matthiolum paſſim in comm. non cla-
rius indicare, quales ſint flores: ait quidem eſſe
melinos Anthemidis, ſed non indicat, an in to-
tum, vel ſolo diſco, quod cuperem intelligere ab
Herbario perito.


Cæterum, dicitur Aſarina Matth. Caſt. Taber.
& Gerardo: Aſarina Matthioli H. Lugd. p. 915. &
Cluſ. pan. & hiſt. Aſarum 2 ſiue Aſarina foliis
Aſari C. Bauh. phyt. apud Matth. & pin.

Synonyma.

PETASITES VULGARIS RVBENS rotundiori folio.

CAP. XI.

Deſcriptio.



Caulis pri-
mo omni-
um erumpunt
dodrantes
plus minus,
concaui lanu-
ginoli: foliis
angultis, acu-
minatis vesti-
ti, qui in thy-
ſum ſaſtigan-
tur ſorum pur-
puraſcentium,
in pappos tan-
dem euaneſ-
centium, quo-
rum delapſui
ſuccedunt
marceſcente
caule folia Pe-
taſitis magni-
tudine, ad pe-
diculum ſalcata, rotunda ferè, & in ambitu dun-
taxat ſerrata, non anguloſa vt Petafitidis albæ:
infernè lanugine incanâ pubeſcentia, ſupernè
obſcurè virentia, nec penitus tomenti expertia:
radix craſſa amareſcit.

Hermolaum hallucinari manifeſtè colligitur
ex iis quæ ſequuntur. Arcion [inquit Coroll.
711.] ſiue Proſopites, Perſonaciam quidem in
latino ſonat. Sed pro Petafite capitur à Plinio,
dicente: folio Perſonatiæ nullum eſt latius, gran-
des lappas ferentis: quas non in Arcio, ſed in Pe-
taſite cernimus. Petafiten interpretor, quam
vulgò Bardanam & Lappam maiorem vocant:
Arcion, quam Vngulam caballinam dicunt. Pli-
nius differentiam in nomine tenuis conſtituit,
Petafitem, Perſonatam; Arcion, Perſoſatam ap-
pellando: &c. Animaduertis, credo, Hermolao
non probè perſpectam fuiſſe differentiam inter
Petafitem vocatam plantam, & Perſonatam, quæ
Lappa maior dicitur.

Tragus reſert hanc herbâ Germanos Noſpape-
peſ, h. e. Malvam equinâ, vocare propter ampli-
tudinem foliorum, & Deſilents vurtz, h. e. Pe-
ſtilentialem radicem, propterea quoddam experien-
tiâ comprobatur ſit mirificè peſtilentialibus
febris confectre: Latinis poſſe Galeritam dici.
Is ſi foliorum amplitudinem intuetur, & ſi
quidem Dioſcoridis eſſe ſuſpicatur. Sed cùm vi-
res & odorem exactius conſiderat, Coſti genus
eſſe aſſeruat. At hanc Tragi opinionem Cordus
in Dioſc. omnino improbandam cæter.

Matthio-

Matthioli pingit in prioribus comm. libro 4. cap. 102. Personatæ alterius inscriptione, sine caule tamen. Fuchiumque & nonnullos alios Recentiores reprehendit qui Petasitem esse hoc Personatæ genus existimant: Ipse Persolatam Plinij esse volens. In post. comm. Ital. lib. 4. cap. 109. mutavit omnino sententiam Matthiolus, nec hanc amplius Plinij Persolatam facit. Cap. verò 110. Petasitem [vii & olun] negat, dicens vanam eiusmodi opinionem, à se demonstratam tom. 1. epist. Et repetit tom. 3. Petasitem hanc esse Plinij Personatam, ac maiorem Tussilaginem potius existimat, ibidemque *apertior*. Dioscoridis existimare videtur. Lib. 3. in Dioscorid. cap. 110. in com. Ital. picturam exhibet cum flore & describit, vocans Tussilaginem maiorem. In histor. germ. inscribit Tussilaginem maiorem, Petasitem vulgò dictam non Dioscoridis appellandam, sed Tussilaginem magnam, imò maximam.

Camærad H. st. Matthioli germ. pulchram habet figuram. Eidem in horto dicitur, Petasites flore purpureo, & odorato, quem marem vocant.

Matthiol. redarguitur. Patrociniolum Ruellij contra Matthiolum suscipit Turnerus. Matthiolus, inquit, abiq. e omni ratione de hac p. 2. a. carpit Ruellium & Fuchium. Amatus Lusitanus Matthioli summa, in doctius & mendacius ipso Matthiolo scribit in hunc modum. Quid Petasites sit ignoramus, nisi fungi genus sit. Ruellius in Gallia nasci refert, &c. Non novit Amatus Petasitem, nisi fungi genus sit, & tamen germanicè vocat *Petasites* *maris*, petide ac si nosset. Scilicet, dignus qui in Dioscoridem commentetur. Fuchius pro Petasite non proponit Lappam maiorem, ut falsò ei imponit Amatus. Proposuerat enim *apertè* verum, seu Personatam, vocans *Prosylacten*, multisque modis à Petasite distinguit. Probet Matthiolus, & qui eum sequitur Amatus, Dioscoridem duo facere Personatæ genera. Quid si nequeunt, quemadmodum cerò scio minime posse, ut ita quæcunque contra Fuchium declamant. Citat Plinium Matthiolum, ut probet duo esse Personatæ genera. Sit ira. Non sequitur tamen Petasitem Fuchij esse Personatam alteram Plinij, neque etiam Dioscoridem duo facere Petasitis genera: Scilicet enim Plinius plura facit herbarum genera quàm Dioscorides. Porro quàm injustè duo faciat Arcij genera, non solum Leoniceus, sed etiam omnes viri docti vident, ac nullam eiusmodi causam ei à Dioscoride præbitam. Quàm rectè Plinius à Matthiolo contra Leoniceum defendatur, facile perspicient quicunque sine affectu iudicabunt, quàm parum honestè & prudenter faciat Matthiolus. Sed esto, age, duo sunt Arcij genera. Primum non potest esse Petasites Fuchij, quia lappas habet in cacumine, cuiusmodi non habet Petasites Fuchij, cum Arcion Plinij, ut in eo perspicuè videre est, maiora habeat folia, quàm Cucurbita: at Petasites Fuchij longè habet candidiora folia, præsertim parte inferiore. Petasites ergo Fuchij [quæ vera est Petasites Dioscor.] Ruellij, Dodonæi, & mea, non est Arcion alterum Plinij, quicquid blaterent Matthiolus & Amatus.

Joh. belius. Sed & utique similes sui negotium ex negotio ferunt studiosi, authore Lobelio: Qui Tussilaginem afferunt, Petasitem negant, plantam illam in pratis palustribus primo Vere crescentem, atque nondum foliis ortis Tom. III.

caulem erigentem. Commentatori silentium indixeris, qui dum nihil habet quod illinat paginis, in minutis istis obstreperit bonis viris, nec quid quòque modo scribat, de facultatibus nostris certioribus quicquam pensi habet. Leniusculo argumento deceptus fuit, qui rebatur propter communia natalia & florum ante foliorum egressum esse easdem Petasitem & Tussilaginem, quasi non idem contingat Tussilio hederaceo, Croco sylvestri, Ephemero, & aliis.

Herimolaum per Vngulam caballinam Petasitem accipere testatur Cæsalpinus, qui Chamæleucen Plinij, siue Farsugium à Tussilagine haud differre scribit, suspicaturque esse Nenufarum apud Auicennam, cuius flos similis Eupatorio ab eodem traditur. Sed Eupatorium Auicennæ habet flores luteos ut Nymphaea, Petasites autem hæc floribus conspicietur purpureiscentibus. Illos præterea cum Turnero erasse statuere videtur, qui Petasitem cum Persolata Plinij, siue Græcorum Arcio, eandem significari voluit, utpote herbam ab utroque Arcio longè diuersam.

C. B. Chamæleucen Plinij & Petasitem Dioscor. ad hoc caput reduxit. *Malo tamen ego cum Herimol. Tiago, Cordo, Geinero, Lob. & Cæsalpino Chamæleucen Plinij ad Tussilaginem referre, cui folia similia ora Populo, quælia requirit Plinius, quàm Petasitem. An verò cum Petasite Dioscoridis eadem sit, jam non affirmo.*

Petasites vulgò credita planta, inquit Clusius, doctiorum omnium iudicio, inter Tussilagines referenda, & à foliorum amplitudine Tussilago maior nominanda. Eam albo flore variantem aliquando videre memini.

Lobel. Obs. p. 321. Petasites, Tussilago maior Matthioli; Et, Petasites sine flore. Ic. Plant. pag. 591. & Dodon. Petasites, Et Petasites sine flore. Tabern. Petasites: Tussilago maior, Item, Petasites cum flore. C. Bauh. phyt. Petasites 1. siue flore punicante: Eid. 2. Petasites 1. siue maior vulgaris: Petasites Trago, Fuch. Ang. Turn. Dod. Cordo hist. Gein. hort. Lac. Lon. Cæsalp. Lugd. [H. Lugd. p. 1053. Petasites magnus, perperam Tussilago maior Matth.] Tab. Ger. Clus. hist. Petasites flore punicante Thal. mas Cam. Tussilago maior, Matth. Cast.

Petasites ab amplitudine folij, *τῆς* siue galierum referente, unde & Galerita. Germanis *Petasites* *purpurea*, quod, ut dictum, eius radix præsentaneum sit contra febres pestilentes remedium: Belg. *Sockeladern*. Desilence worteln: Gall. *Herbe aux tigneux*, & *Espece de Napolier*: Ital. *Cappella*: Hisp. *Sembarera*: Angl. *Bütter bitter*.

Cæsalpino referente, Petasites in alpihus nascitur, locis riguis, copiosa in vallè umbrosa Heruriz, quæ pratum magnum vocatur. Abundè in Pannonia, Austria & Syria sponde nascentem reperit Clusius: In humidis propè fluviorum ripas, juxta lacuum & stagnorum margines ac vicinos aggeres Dodonæus. Circa Calendas Aprilis spica cum floribus viget, sequantur inde folia in Hyemem usque permansura, novis subinde subnascentibus. Lugduni etiam Februario, &, ut quoque Genevæ, Martio florebat.

Petasites albus Anguloso folio.

Petasites leucanthemos radicem habet validam, crassitudine pollicati aut maiore, long. Descript.

gam, proserpentem, geniculatam, nonnihil ad calamum offi. linatam radices accedentem, cortice rubro tectam, cui alius subest lignosus, & in medio cartilaginea matrix alba, gustu calido, aro-



matico, acri, subamaroque, cui adnatæ fibræ multæ, medioeriter crassæ & longæ colore albo: caulibus proferit sessilibus palmatis, striatos, molli lanugine incanos, crassos, concavos, in quibus folia eadem lanugine pubescentia, striata, oblonga, thucronata, senu septenave aut plura, alterato sita, sine pediculo vaginæ

instar caulem fouentia: in summo caule flores ante folia multi simul congesti, albi, quorum singuli componuntur ex strobilis plurimis quinquepartitis, in medio fibrillâ pallidâ donatis, multis foliolis viridantibus circumdantibus: folia angulosa, infernè densiore lanugine quàm supernè tecta, albioraque, ex pediculis longis lanuginosis, albis, statim à radice exortis appensa.

Huncquem Petasitem 1. siue minorem flore albo vocat in pin. nescimus cur Casp. Bauh. in phyt. contra Camerarii sententiam inodorum vocet. Est Petasites flore candido Clus. hist. & Thal. Petasites odorati flor. H. Lugd. p. 1054. Hæc videtur nobis in app. p. 16. sub titulo Aconit Pardalianches primi describere Petasitem album, ac flores foliis præuenientes figuræ Matthioli appingere, in qua folia Doronici & radix si Alia.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. se multiplicat rependo: florat Martio & Aprili.

Locus &
Tempus
Vires &
vires

Radix Petasidis dubio procul sicco & calido est temperamento, ideoque aduersus omne venenum vrisque corporis partibus adhiberi efficaciter potest. Hæc verò posse, amaritudo eius euidentissimè demonstrat: sius enim saporis amari est abstergere, sicuti Galenus lib. 4. de simpl. facult. cap. 17. falsus docet. Pestilentialis radix dicitur, propterea quòd experientia comprobatum sit radicem hanc misicè conferre pestilentialibus febribus, quòd sudorem vehementer moueat, si in puluerem redacta in vino (vt decet) sumatur. Nec minori efficiaciâ bibitur à mulieribus, quas vteri tormina & præfociones exercent. Facit & ad lateris ventris vermes, qui femina Cucurbitarum referunt, ex vino decocta & pota: succurrit iis qui spiritus difficultate laborant: vrisnam & menses elicit. Radix siccata in puluerem redacta, efficax est ad quæuis fluentia & præhumida vulnera. Oleum ex hac radice confectum, si illo inungantur febricitantes ante accessionem febris, apprimè conducit. Idem & ad reliquas cutis scorditates facit & persfrictionibus neruorum & membrorum vnicè prodest. Non desunt etiam veterinaril quidam, qui ciuf-

modi radice vrantur aduersus vermes, qui equos molestant, & alios ipsorum, tam interiores quàm exteriores morbos.

Petasites Indica.

Tametsi Petasitem ad umbree, ortu & ambli- Descrip-
tu exactè circinato, vāgrandis folii galerum ferè æquantis: nihilominus cespitè radice amplexo, multa sobole lateratim repullulante, & caules fundente, aut potius fol. pediculis bicubitalis, culmosos, medullosos, singulis singulo folio he-
rente, anfractuosum, lauatum sinum pediculus fulcit, vt in Bardana: fungoso cespitè, carioso, & supernè denicè circum caules, vt Meum cornan-
te, maximam Osmundam æquante, torulis vimineis subtris latè fufis, gustu sicco adstringente: auulsam hanc ex annosa arbore, ni fallat memo-
ria, dicebant Lobelius & Pena.

CACALIA SIVE LEONTICE VETERI- bus & in genere.

CAP. XII.

Cacalia siue Leontice *κακάλια* si *λεοντική* Diosc. *C*folia proferit candida, prægrandiaq: è quorum medio caulis emicat rectus, albus: flores ferè Dioniz similem (ionis, quæ vox in antiquo non legitur, Lac. Quin & vulg. exempl. pro *σπονι* legunt *σπονι* *ιόνια*.) Nascitur in montibus. Huius radix in vino macerata cen Tragacantha, & delin-
cta, commanducatur per se, tussi & artære scabritiei medetur. Grana verò quæ post excus-
sum florem subnascuntur tuta & cerato excepta illitq:, extendunt cutem in facie, eamque à rogi vindicant, id tradente Diosc.

Aliiter hæc Plinius recitat quàm Dioscorides. Plin.
Cacalia [inquit lib. 25. cap. 11.] siue Leontice vocatur: semen Margaritis minutis simile, dependens inter folia grandia, in montibus ferè. Huius grana xv. in oleo macerantur, atq: ita aduerso capillo caput vngitur. Radix [addit lib. 26. cap. 6. Cacalia commanducata, & in vino madefacta, non tussi tantum, sed & faucibus prodest. Cap. 15. Cacalia grana mista ceræ liquide, extendere cutem in facie, erugareque scribit. Et hæc magna ex parte consona sunt his, quæ Dioscorides habet.

Galenus Cacaliæ non habet, sed Cacanum *Galenus vo-*
eandem appellare videtur, Cacalia voce suppressa-
tatur. sâ, quod mirum est, quum alias vnam atque alteram appellationem, teste Cornario, libenter adijciat. Quòd autem Cacanum legendum sit in Galeno, & non Cacanum, velut exemplaria vulgata habent: & quòd Cacalia eadem sit, quæ Cacanum, ex Paulo patet, qui apertè habet Cacanum vocem, & Cacaliæ expressè dicit: quum tamen eandem esse dicere debuisset, siquidem eandem Galenus facit, in eo, quòd eadem de Cacano, quæ Dioscorides de Cacalia prodit, nisi locus sit mendosus. *Galenus verba hæc sunt:* Cacani radix vim habet mordacitatis exortem, & moderate siccantem: substantiam verò crassarum partium meatus abducentem. Vnde in vino macerata, velut Tragacantha, & delin-
cta, artære asperitates sanat. Nec minus etiam si quis manducet ipsum: defluens ab ipsa succus artære similiter velut Glycyrrhizæ succus prodest. Quòd porò Bac-
ni vox, pro Cacanum suppressa sit, aliquot locis a-
pud Paulum & Aëcium lib. 3. cap. 46. Dolabella-
rum in Paulum abundè ostendit Cornarios. Et tamen neque sic satis constat de Cacalia, siue C-
cano

Vermes &
quorum.

cano, quæ sit hodie herba censenda, quæ vltim illam exhibeat.

Galenum & Paulum de eadem planta, diuersis locis, sub diuersis nominibus, Cacalia sc. & Cancani pertraxisse, perhibet Gualandinus in Theone. Quin & Eur. Cordus Cacaliæ eandem cum Cancano statuit, & non diuersam vt Aginetam putasse ait.

Ceterum, quæ Acacali, de qua lib. 12. H. n. actû Equiuoca est, conueniunt, Cacalia Plinium tribuisse, falsò sibi persuadet Amatus. Cacaliæ Lithospermum nigrum malè statuit Tragus: Liliæ conuallium Lonio. & Reginus. Perfoliatam alij perperam, teste Anguillio. Perperam etiam alij Agrestis Carul, teste Cord. in Diosc. Cacaliæ diel de Tussilagine apud Plinium, author est Tragus. Rob. Constantinus in Lexico, *canadiv* inter præturat Narcissum. H. n. lib. 19. Galenum de Cacalia sub Cancano tradidisse refert Amatus. Sed non demonstrat quam per Cacaliæ intelligat.

CACALIA QVIBVSDAM.

Descript.



Vulgò Cacaliæ vocant in summis montibus iugis, & ad eorum torrentes nasci solent plantam, caule cubitali, & bicubitali, in ramos circa cacumen aliquot diuiso, liliato, hirsuto, meduloso: flores summis ramulis confertim cohercent in muscarij modum, purpureascentes, quædam solitæ constantes, stilo longiusculo prominentes, qui in pappos

abunt, semine appenso paruo, oblongo: folia plerumque multò minora, quam Petasitidis. interdum ferè paria, non multum tamen abstantia, ad pediculi insertionem falcata, circumscriptione rotunda, serrata, sed & angulosa, infra tomentosa, candicante, supra verò glabra: radix minimo digito super plurimum capiti fibris longis capillata.

Alterum Cacaliæ genus, leuiorem tollit caulē, folia limilia, sed utrinque viridantia, nec vllò tomento oblecta: flores iidem solent, ni dilutiore purpureâ titerent.

Apud Amatum lib. 4. cap. 124. Cacalia pingitur, & in fine operis eadem figura ponitur ex Dalechampi figuris. Amatus tamen Cacaliæ hanc non tradit, anhorante propriâ manu Casp. Bauhino.

Anguill. est Petasites montana, in monte Baldo proueniens: Vnde etiam se habere ait C. Bauh.

Cacalia duo genera Clus.

De hac Clusius in pann. & hist. Ad Tussilaginis genera haud dubiè referenda est planta illa, quæ à nonnullis Cacalia appellatur, cuius duo genera obseruantur, sc. Cacalia i. vulgaris incano folio, saporis ingrati, amariusculi & calidi, flo-

Tom. III.

ris odore admodum tenui, sed non ingrato. Cacalia 2. glabro folio, magis cutaneo & duriore, superiù saturatius virente, nec subrus incano, nec anteriose parte simul coënte, vt in priori, pediculovestrato innitente, sed rotundo & læu, non minus tamen venoso, & in ambi u serrato. Observabam & aliam quandam plantam in montanis pratis nascentem, secundum villarum stabula, cuius folia postremæ Cacaliæ foliis valde erant similia: neque radix etiam erat dissimilis. Verum *duas* illam semper deprehendi: nec vnquam ab illis montanis hominibus intelligere potui, florēne ferat, an non. Tamen porro dubitari possit, an quæ Cacaliæ nomine vulgò agnoscitur, cum Cacalia Dioscoridi descripta, & Pliniana conueniat: facultates tamen uterque sue Cacaliæ tribuit, à Tussilaginis (cuius haud dub. è hæc Cacalia genus est) facultatibus non alienas. Hactenus ille, qui duas icones habet Cacaliæ incano folio & Cacaliæ glabro folio.

H. Lugd. p. 102. iconem proponit cum hac inscriptione: Tussilago alpina, siue montana Dalechampi, addens alios herbarios duo alia Tussilaginis genera facere, & à natalibus Tussilagines alpinas vocare.

Cacaliæ [vt vocat Lobel. in Ic. Plant. p. 591.] multum Petasitidi assimilari, foliis præsertim, eamque etiam odore quadantenus imitari, dixit Lobelius. An verò Cacalia sit, ambigit.

Io. du Choul. deser. mont. Pilati p. 71. Cacaliæ species; & p. 87. Cacalia Ghini passim in nemore Pilatino, foliis latissimis, altera parte cædicanibus.

An sit Cacalia veterum quærit & dubitat C. Bauhinus: atque Cacaliæ tres facere videtur species: Cacaliæ scilicet tomentosam, Cacaliæ hirsutam, Cacaliæ glabram, & Cacaliæ congenerem plantam Clus. Pann. & hist. Rectè autem in pin. Tussilaginem alpinam Dalechampi, Cacaliæ iunxit, & à Tussilagine, quod in phyt. non fecerat, separauit.

In omnibus Austriacis, Stiriacisque iugis ad silvarum margines, inter frutices & umbratis locis obuia Cacaliæ genera Clusij. Cacaliæ Lobelius in Gallie Na. bonensis cello monte Calcaris nuncupato primùm vidit, prope illius montis verticem, qui DEI paradisus à plebè vocatur. In Delphinatus & Allobrogum finibus montes, qui Pilati monumento è regione visuntur, istam habent. Genevæ, ex vicinis montibus petita, & plantata, in horto meo florebat mense Maio, & Iulio ac Augusto semen mutabar.

Locus & tempus.

ARCION VETERIBVS.

CAP. XIII.

Arcion, quod alij Prosopida, aut Prosopion, quasi Personatam [ἀρκεύον, ἢ ὑποκωνίδιον, ἢ ὑποκωνίδιον] vocant, folia habet Cucurbitarum, maiora tamen, duriora, nigrioraque & hirsuta: caulem albicantem [ista non habet nisi inter notha Ald. codex: vt neque vetus manuscriptus & Oribas.] quanquam & interdum herba hæc vicia caule reperiatur: radix grandis est, & intus quidem alba, foris verò nigra. Hæc drachmæ vnus pondere pota cum pineis nucleis, cruenta expuentibus, purulentaque excreantibus auxiliatur. Trita quoque articulorum dolores ex contorsionibus contractos illitu sedat. Folia

Sff 3

denique antiquis vlceribus vtiliter imponuntur
auctore Dioscoride.

Plinius

Quidam Arcion Personatam vocant, cuius folio nullum est latius, grandes lappas ferentem. Huius radicem decoctam ex aceto dant potui. Ita Plinius lib. 25. cap. 9. Et non longè inferius: Personata (vulgata tamen exemplaria falsò Persolata habent, inquit Corn.) quam nemo ignorat, Græci Arcion vocant, folia habet maiora etiam Cucurbitis, & hirsutiora, nigrioraque & crassiora: radicem albam & grandem. Hæc ex vino bibitur denariorum duorum pondere.

Arcion alterum Galeno.

Galenus hanc non Arcion, sed Arction alterum vocat, & Prosopida, cuius folia Cucurbitæ foliis similia sunt, nisi quòd maiora & duriora: itaque discutienti & siccandi vim habere. Habere etiam quid quod moderatè adstringat, & propterea folia eius antiqua vlcera sanare. Plura sequi capite.

ARCTION VETERIBVS.

CAP. XIV.

Describe.

Arcion, inquit Diosc. aliqui Arcturum vocant, folia habet Verbalco similia, nisi quòd hirsutior, rotundioraque sunt: radicem teneram, dulcem, & albam: caulem mollem, longum: semen Cumino paruo simile] vel καυλὸν μαλακόν, μακρὸν: καρπὸν ὅμοιον ὑμῖν ὁμοῖον, μακρὸν, hoc est, canlem mollem, paruum: fructum verò Cumino similem, paruum.] Radix cum semine in vino decocta denitum dolores mulcet, si quidem o. e. decoctum contineatur. Ambusta, pernionisque eodem fouentur. Bibitur & propter ischiada, vitiæque difficultatem è vino, vt Dioscorides nobis auctor est.

Latitudo varia.

Diosc. sententiam planè reddit Plinius lib. 26. c. 12. & lib. 27. c. 5. Tenuiū patrium esse tradit Galenus, & propter ei siccantem & moderatè ex-tergentem esse, cetera quæ habet eadem sunt cum illis quæ Diosc. & Plinius.

Marcell. volunt.

Animaduertisse, docuisseque jam pridem Leoniceum, Plinium viciniate nominis deceptum Arction cum Arcio miscuisse, Personatamque appellasse, refert Marcellus: cum tamen Arcij non Arcij proptia sit Personatæ appellatio, id quod ex Dioscoridis historia nominis facillimè omnes possunt. Diuersæ enim plantæ sunt diuersis nominibus & vitiis descriptæ. Ideoque Græcorum Medicorum & Herbarij omnes priuatim, secusque vitamque descripserunt: & alteram folio Cucurbitæ, alteram Verbalco similem fecerunt. Vtebantur autem Arcio siue Personatæ quondam ad personas in tota Græcia & Italia gentes omnes, quoties in theatris, aliisque locis, qui cognosci populo nolent, egisse quidpiam volebant, facili, sed non toto anno (hyeme enim non suppetebat) ad eam rem ex incultis & pinguibus locis apparari. Causæque hæc est cur Græci etiam ab eodem eorum viro Prosopida & Prosopion vocauerint: neque enim voces illæ aliud quàm Personam indicant. Neque immerito Dioscorides Cucurbitarum foliis comparauit. Figura enim illis respondent, & si pinguiore leco nascuntur, magnitudine etiam superant. Fuerunt præterea qui Arcion in Græcis Aparinen, in Latinis verò Lappam vocauerint. Sed, teste Marantha, stupiditas est credere Personatam esse Aparinam.

Arctij nomina sunt.

Denum, Arctij & Arcturi, ab Vrfa, Vrsæque custode nomina esse ducta, à similitudine forsitan à qua solorum suspicatur Lonicærus.

Lappæ siue Arcij, inquit C. Bauhinus, genera duo Galeno 6. simpl. Primum Verbalco simile, quod Dioscorides Ἀρκίον ἢ Ἀρκύριον vocat, & Plinio lib. 27. cap. 9. Arction dicitur. Alterum, foliis Cucurbitæ, quod Dioscoridis est Ἀρκύριον, siue Ἀρκύριον aut Ἀρκύριον (i. e. Personata quasi Larva) & Plinij Persolata, & etiam Personata: At vulgò alia est maior, quæ Arcium & Arctium est Dioscoridis: alia minor, quæ Dioscoridi Ἀρκύριον [quòd flavos capillos reddat dicitur &] Ἀρκύριον, quasi strumarum petulcies: hinc quibusdam Strumaria nominatur.

Cornarius sit officinas Arction Lappam minorem vocare. Sed quid velit, non intelligo: Suspicerem eum Xanthium tradere, nisi hoc alibi Fabam inuersam vocaret. Lappa minor dicitur de Xanthio, vt apparebit suo capite.

Ryffius in Diosc. Ἀρκύριον græcum vocat Prosopion maius, vel Arcturum, officinarum Lappam siue Bardanam maiorem, germ. Nien Nletten/ gall. petite Bardane & Gletteron. Videtur autem is ignorasse quid scriberet, & confundere diuersarum plantarum nomina. Nomen germanicum & gallicum sunt qui Xanthio ascribunt. Verum id postea exhibet. Cetera competunt plantæ, quam pro Personatæ proponit.

Arcij, Ἀρκύριον, ac etiam Arctij nomine insignitur etiam Sequentes plantæ: Personata. Persaltera. Tussilago. Person. hirsuta. Arction capitulis mollibus hirsutis. Xanthium. Conyzæ maior. Acanth. siue Brancha vrsina. Bunion

PERSONATA SIVE LAPPA MAIOR,

aut Bardana.

CVR. XV.



DVos c. blos al-
ta & procerior
aliquando, ra-
dice longâ, cras-
sâ, fons nigra,
inter alba, sa-
pore subduco:
caules recti,
litari, lann-
ginosi, ruben-
tes, ramuli: fo-
lia Verbalci
aut Helenij,
breuiora, ro-
tundiora, su-
perne atro-vi-
renna, inferne
canâ lanugine
pubescentia:
capitula echi-

nata recuruis ad obuias vestes & similia pertinaciter adhærescentibus vncis horrida, flores sustinent purpurascens, singulares: stilum è vaginula atro-purpurea emittit colore carneo præditum.

Nisi reprehensio quædam Trago timenda foret, affirmare non dubitaret, Lappam maiorem, primo & secundo anno, antequam excaulescit, seu Lappas suas profert, Germanis non Nletten/ sed (Groslet) hen/ Personatam, de qua Dioscorides lib. 4. egit, vocandam: rursus eandem cum caules & fructus produxerit, Germanis non amplius Gletten, sed Nletten, i. e. Lappam appellari, & ad Xanthion Dioscoridis pertinere.

Gorzeus statuit Lappam maiorem esse herbam palustrem, sed quàm verè, demonstrat natales

Arctij nomina sunt Galeno.

Ryffius igno-
rante.

Describe.

Personatæ
Xanthij Dio-
sc. Trago.

Gorzeus bal-
neum.

natales. Ruffus, ceniam monni, & eum sequutus Rheginus, Lappam hanc maiorem à minore non rite distinguit. Toxites quoque in Onom. philosoph. p. 27. Arcij titulo distinctas confundit plātas. Videtur Amatus lib. 4. cap. 107. & seq. eandem plantam tradere, in qua se aberrasse deprehenditur. Displicet autem, Amato Dalechampii figuram appositam esse, quum Amatus de ea stirpe non loquatur.

*Lamie. com-
pla Pliniam.* Leoniceus de error. med. apud Brunfels. tom. 1. chapl. 4. ubi pro Arctio apud Plinium lib. 25. errore cecidit Echion legi arbitratur, itemque pro Personacia, viciose Persolata, de Bardana seu Lappa hac maiore, loquitur. Tomo verò 2. p. 193. Plinium in suo libello notandum putavit, quod lib. 25. eodem capite, bis Personaciam descripserit, altero tamen loco Personatiam, & altero Persolatam dici insinuaverit. Sed Leoniceus [inquit Pandolph. Collinutius] Plinium taxat, quod duplicem Personatam esse crediderit. Nulla ratione Echion pro Arctio positum dicit. Non ided duplicem Personatam esse credidit Plinius, quia quosdam Echion Personatam dicere & ex aceto radicem dare scripsit. Arction Græci duplicem esse tradiderunt, quorum 1. Plinius 27. & alterum 25. pinxit, ego ambas Personatam & Lappam voco.

*Agricola mo-
tatur.* Non placet Agricola, Lappam maiorem Vngulæ speciem constituere. Euch. Roess. Bardana maioris plura assignat genera, quæ aut eiuſdem ferè naturæ, calida & sicca tertio gradu: vni adscribens acuta folia, quam meliorem facit; alteri verò rotunda, quæ non æquè bona; tertiz lata & magna, quam eſui inutilem scribit: Quartam vocat Lapatium acutum, quam Acetolam vocant multi. Sed quid obſectro commune habet Acetola cum Lappis & Bardana, vel forma, vel viribus. Bardana picturam habet, verum non indicat, quæ ea sit ex ſuis Lappis.


Synon. C. Bauh. phyt. & pin. Lappa siue maior, Arcium Dioſcoridis: Lappa maior Brunfels. Trago. Turm. & Cæſalp. Personata Lac. Lon. Lob. Obſ. p. 118. Ic. Plant. p. 88. & Lugd. p. 1055. Personata maior Matth. Cæſt. Personacia Fuchs. & Fracas. Bardana siue Lappa maior Dod. Arcium Anguill. Dodon. gall. Cordo in Dioſc. Arction Personata, Thallio.

Non ling. Germanis dicitur Grooff, Hettten: Belg. Grootte Eſſen. Gall. Gletteron ou Napoliere. It. Lapolla maggiore. Hiſp. Bardana, Pegamacea mayr. Angl. great burr. Hung. Zelos lappu.

*Viret &
viva.* Quæ Dioſcorides & Plinius atque Galenus de Personatæ facultatibus memoriæ prodiderunt antè annotauimus. Personatæ herbæ ſuccus vino veteri in potionem datus, omnes morſus ſerpentum mirificè ſanat. Eiuſdem foliis cingit febricitantem Apuleius, & ſtatim febrem mitigat, caloremque ſanat. Vulnus, etiamſi cancer ſit, cū aqua decoctionis foliorum eius ſouet: deinde iplum cum nitro & axungia cum aceto terit & panno inducit & imponit. Ad canum rabidorum morſus, radicem cum modico ſale tritam morſui indit & ſtatim ægrum liberat: ſuccum foliorum cum melle propinat, ad vrinam prouocandam, & veſicæ dolorem tollendam. Puluerem ſeminis eius cum vino optimo per quadraginta dies dat, & iſchiadicos mirabiliter ſanat. Foliis tritis cum albumine oui & iſchiadicos mirificè curat. Holerius in pleuritide, radicis Lappæ ſiccæ, quæ purpureum florem gerit: aut floris eius drach. duas è mulſa propinat. Bardana

maioris ſolum ſummo capite geſtatum, matricem ſurſum tollere, ſub planta verò pedis deorſum, memorat Mizaldus. Et hoc remedium præſtantiffimum habetur aduerſus tuſſificationes, præcipitationes, ac diſſecationes matricis. Folia capiti impoſita, eius dolorem mitigare ſcribit Viſtembergicus. Personatæ caples, primo Vere erumpentes, deſeſo cortice, crudi coctique prima menſa mandi cœpere: aliis ex ſolo ſale, aliis ex oleo, ac ſeque placet: in tantum recepta gratiâ, vt largiffimè à quibuſdam manducetur, errore manifeſto (ſi Bruyero credimus,) quem reſellere intereſt vitæ. Eſt enim [vt cætera olera agreſtia] ſucci improbi. Ajunt calculis renum prodeſſe, vrinæque ciendæ idoneam.

PERSONATA ALTERA CVM capitulis villoſis.



Descriptio Vix aliud inter hanc & Descriptio priorem vulgariorem diſcrimè animaduertito, quàm in echinis, quorum ſpinæ aduncæ lanugine incantæ teu araneorum telis intertextæ ſunt: ceteroqui ſor huic quoque purpureus: ſole item non abſimilia.

Synonyma. C. Bauh. phyt. Lappa siue maior lanuginosus capitulis, quam mihi ſiccam acceptam reſert, & à Lappa ſua 3. siue

maiore montana, Arctio Dioſcoridis, vt vocat, & Personata altera Matthioli, Arctione montano ſeu Lappa minore Galeni Lobelij, ſeparat, quam opinionem probare non poſſum donec diuerſæ demonſtrentur plantæ.

Beſfordiæ extra portam ſuperiorem obſeruam.

ARCTION CAPITVLIS MOLLIBVS hirsutis. CAP. XVI.



Descriptio Hæc forma Arction in vetuſto Cæſareæ bibliothecæ codice, auctore Dodonæo, foliis videlicet latis, in ambitu crenatis: canle tenero erecto: capitulis aliquot in ſtigi- gio mollibus ac lanuginolis, vt primi Cymini ſilueſtris.

Arction ex codice Cæſareo [vt inſcribitur apud Dod. & H. Lugd. p. 1307.] siue

Arction quintum, C. B. phyt. & pin. quid:

XANTHIUM SIVE LAPPA MINOR.

CAP. XVII.

Descriptio.



Xanthium caule est cubitali circiter, hirsuto, punctis rubris guttato, ramoso: folia alternata pediculis nituntur vncias tres longis, cauli concoloribus, Tus-silaginis foliis quodammodo similia, sinuata & crenata, colore[s] id quod nomen ipsum loquitur] xantho, utrinque hirsuta, sapore acrisculo &

quodammodo aromatico: quâ foliorum pediculis est ortus, plura simul capitula se promunt bulbata, stilos stamineos emittentia, quibus delapsis tubi succrescunt lappacei, vestibulis adherentes, oblongi, in duos acutos rigidosque mucrones desinentes, qui duobus distinctis loculis toridem grana condunt, hordeacea: radix parua multas undique fibras profert.

Dise.

Xanthium Dioscoridi caule est cubitali, pingui, anguloso, & prodeuntibus ex eo alis compluribus: folia verò habet triplicis incisuras habentia, Nasturtium odore imitantia: fructum teretem, grandis Olij instar, & Platani pilulatum modo spinosum, qui quidem contactu vestibulis adherescit.

Appellationes
rebus Cœ
radolabrum.

Hanc aliqui Phasganon seu Phasganion, alij Antichelion, alij Chascanon, alij Chæradolechthon, quasi Strumarum pernitiem, alij & Aparinen vocant, & Philantropon, addit Paulus. Et sanè (inquit Corn.) Philantropi appellatio, rectius Aparinæ conveniet. Nam de hac scribit Dioscorides quòd axungia trita excepta strumas discutit. Hoc autem significat vox cæradolechthon strumarum nimirum pernitiem. Videtur

itaque & Xanthium ex Lapparum genere esse, velut etiam Aparine: officinæ Lappam inuersam vocant. Xanthium quidem nomen ab effectu inditum esse concludit Ryfius, quòd ruffet capillum. Phasganon porro dici, i.e. ense, à similitudine aliqua caulis & foliorum: ~~χάννα~~ verò ab hiato foliorum: Aparinen denique & Lappam à formæ quâdam imagine quâ nonnihil huic cum Aparinæ & Lappa convenit. Ceterum qui cum Ruellio credunt Arction hanc esse plantam, quam vulgus Lappam seu Bardanam minorem vocat, falluntur. Aliud non est quàm Xanthium testibus inter alios Trago, Fuchf. March. Dod. Lob. Lac. Amato, C. Bauh. & Apolline. Dorsthenius ignoranter Lapathum minus flectit vocat, & cum Lapatho confundit. Plinius huius non meminit.

Lappa minor Brunfels. tom. 3. Rhaph. 16. Tra-
gos[qui & Tribulum terrestrem nuncupat,] Eric. Cordo, Euch. Rôl C. Bauh. phyt. & pin. cui & Lappa sexta. Xanthium Matth. Anguill. Dod. Fuchf. Turn. Cordo in Diosc. & hist. Gesn. hor. Lac. Lon. Thal. Cef. Cast. Tabern. Lobel. Obs. p. 119. Ic. Plant. p. 588. & Hist. Lugd. p. 1036. Xanthium siue Strumaria Lob. in Adv. Bardana minor Gerardo. Arction vel Arcturus Gesn. car.

~~Εάνθη~~ & ~~φάρμακον~~ Græcis, Germ. Bettler-
scup, Klein Flecten & Syph. Flecten: Belg. Heine
Cussen: Gall. petit Glecteron. It. Lappola minore.
Hisp. Lappa, seu Bardana minor: Angl. Yowse but-
ter & esser/burre.

Non. ling.

Laeto & pingui solo; ac in scrobibus & lacubus ubi exaruerunt, facile gignitur: Iulio & Augusto vigent Xanthij lappæ: seminibus prægnantes mense Octobri.

Locus &
Tempus.

Fructus antè collectus quàm perfectè siccus, deinde tusus & fictili vate reconditus, flauor facit capillos: si quidem, cum vsus exigit, eius sextarij semissem aquâ tepidâ diluas, moxque co- caput, nitro ante perfrictum, illinas. Sunt & qui in vino tundant, itaque asservent. Ceterum, commodè quoque ædematis imponitur. Plura addit Aërius: fructus, inquit, discutendi vim habet: decoctum verò corticis potum, lienes consumit: & dentes motos firmat eiusdem decoctum ex vino collatum. Cum autem discutendi vires habeat, facile colligitur, ait Ryfius, temperamento esse calido & siccò prædictum, id quod ex sapore etiam, qui amarus est & subacris, deprehendi potest.

Vires &
Vfus.

FINIS LIBRI TRIGESIMI SECVNDI.





HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER XXXIII.

ECHIA, BVGLOSSA, CYNOGLOSSÆ, HELIOTROPIA, ET SIMILES.

Proxima nunc cura habenda earum, quas nec ipsas temerè miscas aliis, aut à se invicem dinellas. Estque præcipua affinitatis nota in semine, & quod folia pleraque habeant aspera, pilisque hirta.

BVGLOSSVM VETERIBVS.

CAPVT I.



BVGLOSSVM Verbalco (Βούλκο-
ον φάειν) simile est, folio in-
tra spatio, verum aspero, ni-
giore, bubulæ linguæ simili,
quod vino inditum animi vo-
luptates augere, hilaritatemq;
afferre creditur [εὐφρόσυτον δὲ

πρὸς τὴν ψυχὴν, pro quo Codex vet. δὲ καὶ διὰ τὸν εὐφρόσυτον φάειν
τὸ πρὸς τὴν ψυχὴν ἐκτείνει τὸν νοῦν. Videntur calidum esse:
cortex radicit facit ad Ichuriam] inquit Diosco-
rides: Qui antè Buglossum Circio folijs simile
esse scribit, modicè hirsutis, & longioribus [με-
κρότερα. Vet. μικρότερα minoribus. Idem rursus
cum Symphyti secundi folijs comparat, cum sit.
Symphyto secundo, quod aliqui Perion vocant,
circa caulem ex intervallis haud ita magnis folia
exeunt hirsuta, angusta [Ver. subangusta & sub-
exigua] longiuscula, ad Buglossi foliorum simili-
tudinem.

Buglosson in vinum iniectum aiunt voluptates
augere, quod perhibent quoque Galenus, Paulus,
Plinius, Simeon Serbi, Apuleius, Serapio, Avi-
cenna, & Quintus Serenus. Galenus quidem sic
scribit. Buglossum humidæ calidæque temperet
est. Itaque vinis iniectum lætitiæ ac hilaritatis
causa esse creditur. Sed & ijs qui ob gutturi
asperitatem tussiant, coctum in melicrato conue-
nit. Et Paulus his verbis, Buglossum humidum est
& calidum temperamento, quamobrem vino im-
missum lætitiæ ac animi voluptates efficere di-
citur. *Fungur*, inquit l. 24. c. 8. Plinius huc [Plan-
tagini] Buglossos, boum linguæ similis, [similitu-
dinem hanc ad figuram pariter & asperitatem re-
fert Gesnerus] cui præcipuum, quod in vinum
adiecta animi voluptates auget, & vocatur Eu-
phrosyon. Et lib. 26. cap. 11. Buglossum inarescen-
te si quis medullam de caule eximat, dicaturque ad

Tom. III.

quem liberandum febre id faciat, & alliget ei
septem folia antè accessionem, aiunt è febre li-
berari. Buglossum vrinam, inquit Simeon Serbi,
& sicim sed it. Caules eius cocti, & crudi comesti,
iecoris affectibus prosunt. A viatoribus ex eo
conficitur Zolapion, & est utile.

Nascitur, inquit Apuleius locis cultis & sabu-
losis. Buglossa dicta est eo quod folia aspera in
modum linguæ bubulæ habeat. Folia habet aspe-
ra, obscura terrestria. Hæc in vino mixta hilari-
tatem conuiuii facit: in cibum etiam cocta pro
olere sumitur, vel trita pro condimento. Herba
Buglossæ quæ treis thyrsos seminis mittit [Ea-
dem hæc Dioscorides Buglossum: Plinius vero lo-
co supra primò citato Cynoglossum tribuit] radi-
cem totam cum aqua decoque, ipsam aquam de-
coctam potui dato, remediabis tertianas: quæ
autem quatuor thyrsos habet, faciet ad quarta-
nas, dabis autem ut supra. Alia item herba simi-
lis est ei, quæ folia Lethæi f. r. minuta, eius ra-
dis potata ex aqua, ranis & serpentibus aduersa-
tur. Herba Buglossæ succum cum melle dabis
bibere, miserabiliter suspitium tollit. Herbam
cum melle & pane contritam vice malagmatis
impones, mirificè rumpit apostema.

Lingua Bouis, inquit Avicenna lib. 2. Canon.
tract. 2. cap. 116. Lingua Bouis quid est? Herba
lata, habens folia sicut Almaru & aspera ad ta-
ctum, & rami eius asperi sunt sicut pedes locu-
starum: & color eius est ex viridi & Citrino. O-
portet ut administretur illa quæ est Corascenti,
grossa habens folia, super quorum faciem sunt
puncta, quæ sunt radices spinarum & pilorum
exeuntium ab eis. Quæ autem in hac terra repe-
riuntur, & quæ vtuntur medici, plurimum eius est
genus Almaru, & non est lingua Bouis, & ne-
que confert ut iuuamentum illius est. Proxima

T 11

Hilaritas.
Euphrosyon

Elyman P.
res ad Hila-
ritatem.

Superstitio.

Tempera.

est æqualitati in calore: ad caliditatem enim declinat parum, & est in fine primi in humiditate: & quæ sicca est, est minoris humiditatis. Et dixerunt aliqui, quod est frigida & humida in fine secundæ illud est longinquum. Virtus eius quæ adusta est, remouet alcola quæ sunt in infantibus. Et sedat inflammationes, & similiter ipsam: sed ipsa est debilior. Est laxificatiua, confortatiua cordis, bona melancholiz ex solitudine, & tremori cordis, in vino, & dispositionibus melancholicis: & quidam in potu eam tribuunt ad tremorem cordis, cum luti Armeni ponderi 2. drach. & confert tussi & asperitati canæ, & propriè cum coquitur cum hydromelite & Zuccaro. Idem de med. cor. tract. 2. Lingua Bouis calida est & humida in primo: cuius proprietas est laxificare, & confortare ipsum magnificè, & adiuuat ipsum illud quod in ea est de solutione melancholiz subtilis. Quare per illam mundificatur sanguis cordis, & substantia spiritus. Mellior tamen est quæ de regione Corasceni affertur, habens spissum folium, velatum plurima lanugine: quod, inquam, post exsiccationem nec contrahitur, nec est sicum: quæ autem in his partibus reperitur est ex genere Maru, & vsitur pro lingua Bouis, propter similitudinem illius ad illam, cum tamen non sit illa. Et iam aggregatur in hac medicina victus proprietatis cum natura propinqua temperamento, quare non eligatur alia super eam.

Serapioni *Lifen Althaur* dicitur, & est Planta quæ assimilatur herbæ quæ dicitur Caromas: vires verò quod attinet, is pleraque ex varijs tradit quæ supra ex Auicenna retulimus.

Æquiuoca.

Cæterum Buglossi hæc recensentur species, Buglossi que nomine sequentes donantur plantæ: Borrago. Borrago siluestris tenuifolia. Buglossum folio Borraginis Hispanicum siue semper virens. Buglossum vulgare: maius flore purpureo & albo, cultum & spontaneum, Buglossum angustiore folio & flore minore, purpureo & albo. Buglossus minor anoua. Buglossus rubra. Bugloss. siluestre, Echium multis. Bugloss. silu. pharmacopolarum. Bugl. silu. Pulmonaria dictum. Buglossum peregrinum radice multifida, Pulmonaria Penz & Lobel. Aduers. pag. 247. & Lob. Observation. Buglossæ siluestris species Thallio, quæ nobis est Cynoglossa topiaria fortè Plinij. Cynoglossum quod à Plinio aliusq; nonnullis cum Buglossis confunditur. Buglossum Echiodes Anglorum Penz & Lob. Aduers. p. 24. de quo H. n. g. l. 24. hoc titulo, *Βούλωσσον μέγα*, de quo l. H. nostr. lib. 26. Buglossum magnum siue Carduus Pratenfis Tragi, de quo lib. 26. Buglossum Antarcicum quibusdam, Petum Teueta H. Lugd. 18. cap. 128.

Cæterum, quia Borrago à quamplurimis Buglossum censetur, sciendum est ipsiusmet etiam Borragini vocabulo plures & diuersas plantas inueniri, vt: Borrago vulgaris trium quatuorve colorum. Borrago siluestris tenuifolia. Borrago hiemalis siue Buglossum folio Borraginis Hispanicum. Borraginis siluestris species Buglossa Simoni Genuensi, Buglossum vulgare maiori & minori flore. Borrago siluestris quorundam, siue Echium Fuchij, secundum nostram inscriptionem. Borrago minima herbariorum siue Symphyrum pumilum. Borrago montana flore flauo de qua Gesnerus de collat. stirp. pag. 63. quæ qualis adhuc nos latet.

Borragine deficiente sumit Chichorium Tractatus qui pro quo. Borragini etiam substitui potest, secundum eundem tractatum qui pro quo, Scariola.

BORRAGO FLORIBVS CÆRVLEIS & albis.

C A P. II.



Infirma est planta, & quæ ægri se humo tollat: radix alba, digitali crassitudine, mansu viscida: folia lata, subrotunda, aspera: rugosa ac plicata, per terram sparsa, eminentibus pullis rennissimisq; aculeis: caulis hispidus, teres, inanis, cubitalis, ramis brachiat: flores amœni, stellati, radiatâ quinque foliorum

acuminatarum serie explicari, umbone medio, in quo stamina, circumposito, facili à quinque foliorum hirsutorum calyce cui insident, cedentes, colore cæruleo purpurascenre, vel albo. Semen illi nigrum, striatum: [Anchusæ aut Lycophis Lobel.]

Simon Genuensis in lit. B. Borraginem vocat, ac notam ait, aptamque medicinæ & flore & folio, & semine: Buglossamque dici speciem eius siluestrem: se verò non reperire aliquem autorem authenticum facientem capitulum de utraque: si scribat de vna non scribere de altera. Pandectarus tamen cap. 2. Scribit alterum de Borragine, in quo allegat Dioscoridem: Et alterum de Buglossa, in quo citat Serapionem, ex eiusdem Dioscoridis auctoritate de Buglossa loquentem.

Borraginem cum Buglossis Heimolaum miscere, patebit infra, vbi de Buglossis agitur. Id porro videtur Cirsion statuere. Sed audiendi non sunt, inquit Ruellius, qui esse putant Cirsion herbam quam Borraginem oliuores vocant. Quam Buglossam, linguam Bouis Romani appellant, ea est quæ hodie officinis Borrago dicitur. Sed ipse quoque Ruellius Buglossum & Borraginem inter se confundit.

Leonicerus de err. med. Borraginem veterum Buglossum esse concludit. Descriptio, inquit, Buglossi apud Diosc. potius Borragini convenit &c. In Borragine capitula cærulea non purpurea conspiciuntur. In authore de simplici medicina leguntur hæc verba: Buglossum Romani Linguam Bubulam, Lucani Corago, nascitur locis cultis & sabulosis. Fortè autem pro Borrago verbo Corago vitiosè scribitur, aut nomen Coraginis vnâ literâ variatâ est in Borraginem versum. Pandectarus quoque si qua est huius hominis auctoritas in litera L. Lifen althaur, quod nomen apud Arabes significat Linguam

Bouis

Bonis, ipse Borragnem interpretatur. Quare forte melius fuerit cum Buglossam de qua Dioscorides, Galenus, & Authores Arabes utrumque allegantes ad usum medicinae adhibemus, Borragnem potius quam illam quae passim Buglossa nuncupatur recipere. Atque ita falsum erit quod Montagnana existimauit, Auicennam nihil de Borragine dixisse. Nam nisi me fallit opinio, caput de Buglossa, seu Lingua Bouis, apud Auicennam est caput de Borragine, sicuti etiam apud Serapionem. Falsum etiam erit, id quod Simon scribit, qui putauit neminem autorem de utraque herba simul scripsisse. Negari non potest quin Borrago sit alterum duorum apud Diosc. aut Cirrhon, Buglossum magnum dictum, aut Buglossum, ab eis praesertim qui Borragnem Buglossae, vel Buglossam Borragnis speciem constituentur: Si Borrago sit Cirrhon apud Graecos: verum erit quod à Montagnana scribitur, tam multa de Borragine à iunioribus medicis temere praedicari: Nam Dioscorides hoc tantum de Cirrho retulit &c. Quare medici iuniores utrum velint acceptent, aut quod Borrago sit vera Buglossa, ut nos opinamur, aut quod eius herbae usus non sit ad omnia illa utilis ad quae ipsi arbitrantur.

Marcellus Virgilius lib. 4. cap. 119. in Dioscoridem inuuit ad imitationem Leonici Borragnem esse Buglossum Veterum, idque pluribus rationibus contendit. Et huius sententiae adimplatur Monardes lib. 5. epist. Syluius de comp. med. lib. 1. Cordus in Dioscor. lib. 4. cap. 128. & 129. Item Hist. lib. 2. cap. 74. ubi 78. Brunfels. in Herbario germ. Fuchs. Hist. cap. 51. & de error. Med. errore 6. Corn. in Dioscor. lib. 4. cap. 110. Euchas. Rostk. Ryff. in Dioscor. cap. 112. Matthiol. in Dioscor. cap. 113. Leonici. 5. c. 157. Io. Agric. Medic. Herbar. Humelbelg. in Apuleium cap. 41. Lacuna in Dioscor. cap. 118. Amatus cap. 129. Cast. Durante, qui flore caruleo tradit & albo. Textor lib. 1. cap. 70. de peste. Apollo rad. 1. Rhegin in exerc. Rob. Const. in Lex. & apud Amat. Gesnerus in cat. pl. Dod. gall. & Lat. Lobel. Io. Bapt. Port. Villæ lib. 10. & phyt. lib. 4. cap. 16. Hist. Lugd. lib. 3. cap. 19. atque alii rei herbariae periti.

Qui diligenter Buglossi historiam expendunt, inquit Matthiolus, omnes herbam Borragnem vulgò vocatam, in horto aliisque locis nascetem, potius legitimum Buglossum esse censent, quam illam, quae Buglossa vulgò nominatur, cuius in officinis communis est usus. Quorum equidem iudicio non dubitauerim subscribere: siquidem Borrago dicta foliis est in vlnetum verbasco similibus, nigrioribus tamen, & asperioribus: quibus etiam haec symphytum alterum emulatur, quod folia Buglossi proxima ferre alibi prodidit Dioscorides. Adde praeterea quod folia Borragnis in terram procumbant, & bubulas linguas, tum forma, tum asperitate imitentur. Contra quae Buglossi nomen sibi falsò vendicauit, folia habet longa, echio similia, non vsque aded lata, ut bubulas referant linguas, minusque humi depressa, quae potius à toto ferme cespice sursum aspiciunt, nec aliqua ex parte verba scumatur symphytum alterum representant. Quod insuper Borrago sit facile legitimum Buglossum, Auicennae testimonio comprobari potest, qui lib. 2. sui canonis ita scribit. Lingua bouis herba est lata, habens folia sicut Almaru, & ad tactum aspera, & ramieius asperi, sicut pedes locustarum. Oportet autem, ut illa administretur, quae est in Corascenti, crassa habens folia, super quorum

Tom. III.

ciem sunt puncta, quae sunt radices spinarum & pilorum exentium ab ea. Quibus notis adeò nostram Borragnem expressit Auicenna, ut nemo non intelligat esse Linguam bubulam. Eam praeter morem descripsit Auicenna, quod suo quoque tempore non deessent, qui veri Buglossi loco aliam quandam substituerent plantam, ut aperte eius verba declarant, dum subdit. Quae autem in hac terra reperitur, & quae videntur medici plurimum eius est genus Almaru, & non est lingua bouis, & neque confert, ut iuramentum illius est. His omnibus illud denique accedit, quod apud Apuleium in eo libello, qui de herbarum medicaminibus inscribitur, inuenio Buglossum Lucanis Borragnem nuncupari, prioris tantum literarum mutatione, quod cordis affectibus quam maxime opituletur. Quae sane opinio, si fallor, clarissime ostendunt, Borragnem esse verum ac legitimum Buglossum.

Et hinc metuo ait Hist. Lugdunensis. Rei herbariae periti, Buglossum Veterum, eam procul dubio herbam esse putant quam Borragnem vocamus, non illam quae vulgò Buglossa nominatur, & cuius in officinis communis est usus, nec id temere, ac sine iudicio. Descriptio etiam Buglossi à Dioscoride tradita, Borragini ita conuenit, ut nulla prorsus nota ab illa discrepet. Buglossum, inquit, Verbasco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum bubulas imitans linguas. Quis nisi plane amens ex ipsa inspectione non iudicet Borragnem foliis esse Verbasco similibus, nigrioribus tamen, & asperioribus. Cum igitur euidenter demonstratum sit Borragnem nostram Veterum esse Buglossum, in posterum medici pharmacopaeique sicubi Buglossum ab antiquis in medicamentorum compositiones adhibitum legerint, Borragnem nostram, non vulgare Buglossum usurpent: &c.

Sic Theod. Dorst. Quae ab Empyricis & Herbariis tam Buglossum appellatur, inquit, Borrago est, & Clusius de plant. Hisp. Maru sine Almaru Auicennae lib. 2. tractatu 2. praesertim terria, eius species, nihil aliud mihi videtur quam vulgare nostrum Buglossum aut Borrago. Ac etiam Raimundus à Vinario de peste ex correct. Dalechampii lib. 2. pag. 1. Buglossum nominat, ibidemque Borragnem intelligit, licet postea sui obliuio Buglossum diuersum faciat à Borragine, cum ait: Borrage, Buglossae, &c.

An Borrago sit Buglossum dubitat Celsus lib. 11. cap. 3. Borrago inquit, vulgò appellatur oculus, quod in horris feritur: putant recentiores huius plantae potius conuenire Buglossi descriptionem quam supra dictae (Buglossae vulgari) cum tamen neque sponte oriatur in sabulosis, neque folia longa & angusta sint, ut in Symphyto Dioscorides tradit, & ut ostendit similitudine linguarum bouis: neque thyrsi tres vel quatuor insint. Tandem Buglossa tota cum radice & semine colligi praecipitur mense Iulio: At Borragnis radix perfecto semine exarefcit, neque collecta seruari potest incorrupta. Sed forte Auicenna hanc intelligit, cum describit herbam latam habentem folia Almaru & aspera ad tactum. Existimo autem Borragnem in Italia quondam fuisse peregrinam, cum de ea nulla fiat mentio ab antiquis inter olera.

Videtur sibi contraria scribere Anguillara & modò Borragnem Buglossum asserere modò negare. Sic enim epistola quinta ait: Quidam volunt confectum fuisse Nepenthem Homeri ex radice Borragnis, eamque Galenum per Enopion

Nepenthes

tradidisse, cui attribuit easdem vires quas Homerus Nepenthe. Intellexissem autem Gale-
num Borriginem non mihi manifestum, quan-
doquidem earum plantarum separatim meminit.
Fuerit itaque Borrigo, Buglossa optimè nota.
Epist. verb. 14. dicit: veram Buglossam esse Bor-
raginem non aſſim affirmare, in Græcia eam
etiam Borriginem vocant.

Borriginem esse Buglossum Antiquorum ne-
gant Monachi dist. 6. cens. 146. in Mesu. Quid
verè sit Borrigo vulgò dicta, à nemine prisco-
rum describitur. Iuniorum autem plurimi fir-
missimè tenent esse Buglossum antiquorum. Nos
autem (aiunt illi) diligenter examinatis om-
nium descriptionibus, Buglossum antiquorum
non esse Borriginem statuimus.

Apollo quid sibi velit cum suo Buglossa His-
panico, quod pluribus hortis familiarissimum
esse ait, & omnibus notis legitimum referre scri-
bit, ac propterea Borriginem nostram esse sta-
tuit, confiderent lectores. Monachi separant
Buglossum Hispanicum à Borragine & à vulgari
Buglossa. Monachis se opponit Turnerus, licet
interim ei inclinet animus Borriginem nostram
esse Cirsum. Guilandinus in Theone Borra-
ginem à Dioscoride Echion vocari auguratur,
contemnendâ penitus coniecturâ. Non desunt
tandem qui Borriginem Homericam Nepen-
then esse statuunt. Cuius se. succo Homerus vi-
no immisso tristitiam discuti, ac malorum omni-
um oblivionem induci scriptum reliquerit.

Buglossum siue Borrigo dicitur omnibus iis
quibus Borriginem hanc flore cæruleo & albo
Buglossum Veterum esse diximus. Buglossum
verum Dodon. gall. & Cordo. in Diosc. Eidem
in Hist. Buglossa urbans. Lobel. Buglossum La-
tifolium. Tabern. & Gæner. hort. Borrigo flo-
ribus cæruleis & albis: In append. Borrigo
albis floribus. Hort. Lusitano Borrigo cæru-
leis floribus, & Borrigo albis floribus. Gerard.
Borrigo hortensis. C. Bauh. apud Marth. &
phyr. Buglossa siue latifolia, Borrigo dicta flo-
re cæruleo, aliquando candido: sic & expalle-
scente rosco. Amatus nomine Buglossi quod
Borriginem facit, falsam habet iconem. Har-
chius cui Italicè Buglossa dicitur, Gallicè *Bray-
nage* aut *Borage* [quæ quidem nomina ubi inue-
neris nescio:] videtur Historiam eius confunde-
re cum Buglossa. Officinis Borrigo dicitur:
Germanis *Burraiseb*, Italis *Borragine*. Hip.
Borraces, Bohemis *Boract*, Hungaris *Dinye za-
guszu* à nonnullis Porrigo: Veterum est βού-
βουλον, quod Latinis Lingua bubula, Lingua
bovis, Buglossus & Libanium dicitur, Apuleio
& Corago: inde fortassis borriginis nomen C
in B mutatum nisi apud Apuleium Borrigo pro
Corago legendum sit. A Plinio verò ἐφροσίνον
siue Euphrosinum quoddam hilaritatē excitet: quod
& antiquus vericulus testatur.

Dicit Borrigo gaudia semper ago

Borriginis radix, Si Lonicero lib. 5. cap. 157. non
sit fides deneganda, dulcis est, Rapo accedens:
flores stellati, cærulei, cani, niuci, & pallidi: cæ-
rulei vino impositi ob eius acrimoniam reddun-
tur ex rubro purpurei: semen nigrum, dulce,
nota herba in hortis & in culina, vius foliorum
est viridum non siccorum. Eandem floris per-
mutationem refert etiam Io. Bapt. Porta villæ l.
20. dicens: Dioscoridis βούβουλον, Plinij Eu-
phrosinon & buglossum, Latini bubulam Lin-
guam, Neapolitani aorriginem vocant, quasi

borraginem dicas, versa ac peruersa voce ex
buglossa. Flos cæruleus in Apulia in purpureo
& rubrum vertitur nimii caloris vi, quod idem
evenit, si in acetariis aliquantisper immoratum
fuerit.

Dioscorides campestribus & sabulosis locis
nasci scripsit inquit Porta. Nos pingue, subactum,
humidū solū in hortis damus, & in vinearū hor-
torumque torulis plantamus, quibus semel facta
importuna fecunditate luxuriat, & ex se-
ipsa feritur. Riguis in toto anno feri potest.
Semine feritur Aprili & Maio, ut æstate fruamur.
Vel Augusto & Septembri pro hieme. Trans-
plantatur quum quinque foliorum esse cœperit,
aut meliùs Octobri ac Novembri. Semina ne
decidant, colligantur immatura, ac triduo in
fascēs colligata resiccantur Sole, ubi maturue-
rint, substratis lineis decutiantur: biennio se-
men asseruatur: ne hieme gelu adurantur, lita-
men aspergatur, hoc munimento aduersus fri-
gora se timentur. Borrigo hiemis frigora mini-
mè ferre potest additur ex Trago nisi ea quæ non
ita pridem è terra enata fuerit, nollomquē adhuc
fructum procreauerit, deinde ut summo studio
contegatur necesse est. Quæ caules emisit pla-
nè alioſa est, cum ætate enim in qua excau-
lescere cœpit, perit, neque alteram attingere
potest. Iunio mense floret. E semine deciduo
quotannis repullulascit, ita ut cum semel occu-
parit locum, non facilè in posterum deserat, ne-
que enim extirpari se vnquam patitur. Potest
autè semel humi per hiemem illæsum delitescere,
nisi à muribus deuoretur, qui propter dulce-
dinem, quam cum radice & floribus commu-
nem possidet, illo plurimū delectantur. Borrigo
Monspelii floret tota hieme, nasilex vidi flo-
rentem Octobri, Lugduni Maio, Genex flo-
rentem Maio & Aprili, habui flore albo in hor-
to meo Novembri, ut etiam Patavii. Mont-
belg. prouenit & sæpe hiemem perfert: in horto
E. C. habemus flore cæruleo & albo.

Vires & virtutes Veterum de buglossa antè
annotatz sunt. Aquæ distillata, necnon & con-
seruæ ex flosculis tribuunt vim roborandi cor
(apud Tragum recentiores) lypopsychiam re-
mouendi, lætitiā melancholicis excitandi, ac
languinem purgandi, breuiter in omnibus fe-
brium caloribus & animi deliquiis, tam aqua di-
stillata quam flores saccharo conditi vsurpari
tund possunt: Semen rasum ac in vino posum,
mulieribus lactis copiam restaurat: mihi aqua
distillata & flores Saccharo conditi probantur
in omnibus febribus & viles: Humidi euiden-
ter est temperamenti borrigo (anthore Dodo-
næo) calidi non item: Sec in calore frigoreque
medii esse apparet: Nostra ætas non modò her-
bam, sed præcipuè flores subinde in vinum con-
iicit, vel acetariis aspergit, lætitiæ ac hilarita-
tis excitandæ causâ: conduntur & in hunc vsum
cum saccharo florentum & alia ex iis parantur,
quibus ab cordis corroboracionem, tristitiā
pellendam, & animi lætitiā augendam Medi-
ci passim vtuntur, folia cum aliis oleribus de-
cocta ad aluum molliendam nonnihil cōferunt,
Herba radix, & semen, per se singula, aut si-
mul omnia in vino cocta potaque venenū à cor-
de arcer (inquit Matthiol.) sanguinemque mun-
dum reddit. Semen contusum ex vino sumptum
lac mulieribus reuocat, herba elixa comesta ad
hepatis imbecillitatem facit. Eius etiam corn-
bustæ

Buglossa.

Borrigo.

Locus &
Tempus.

Borrigo.
Buglossus.
Libanium.
Corago.

Tempus.

Bugl. vern.

Bugl. silu.

bustecinis, cum melle rosato mixtus in oris collutiones vtiliter assumitur contra lingue inflammationem, faucium excoriationes. nec non linguam ac gingivarum: Demorhis aut pūctis à serpentibus aliisque animalibus succurrit Buglossi succus aut liquor stillatius potus, eodēque locus affectus eluitur, superpositis foliis. Aquā Borruginis madens linteam oculis impositum tubentibus & calentibus, dolorem sedat & ardorem extinguit: herba, radix, & semen simul omnia, aut quæ haberi possint, contusa in vino cocta, repida coxæ superdata, dolorem ischiadicum mitigant. Radix cum oleo oliuarum & hordeacea farina in cataplasms formam cocta sphacelum corrigit & herpetem esthiomenum (Germanis est *Kalter brand und wild feur* dictum.)

Si collegeris (inquit Ioh. Heller D. Iuris Ven. lib. pite. cap. 8.) mente Iunio Buglossum herbam, & radicem redegeris in puluerem & miscuens cum paucis succo Nepetæ, manus illinueris & plicaueris, ad tuas manus venient pisces. Aut, Accipe Buglossum & calcem non extinctam, pisces morientur. A Ioan. Porta, cibo gratissimo siccis acerbis spargitur & folium tenerum, quod proprium odorem suboleat, vestustiora vero folia in quotidianis oblationis peculiarem habent gratiam. Condituram Buglossi tradit P. Platina Cremenhenfis lib. 4. de uenda valetudine & popinæ scientia. Holler. de morb. intern. lib. 1. cap. 34 ad promotionem mēstruorum, secretum esse dicit quorundam mulierum, uti conseruā Borruginis, dissoluta in vino albo tenui. Borruginem calidam dicit Lonicerus in principio primigradæ. Herbam eius cum Blito decoctam deuorantemque notabilem esse corroboratorem debiliū infirmorum, si interim de floribus bibant. Herbam in cinerem redactam, cum aqua multa contemperatam, salutarem esse medicinam contra omnis generis affectus, oris & lingue, si sepius eo lauentur. Borruginem cum Buglossio eandem habere virtutem, vnam pro altera usurpari, ac eorum nomina inter se confundi. Herbam in vino decoctam & bibitam bonum sanguinem facere. Succum cum saccharo mixtum propinatūque vertiginem depellere. Syrupum de Succo Borruginis cum saccharo & puluere ossis cordis (cui tremori cordis auxiliari. Succum cum Syropo de Sena commixtum, haustumque mane & vespere, rationem augere, melancholiāque depellere. Florum crudum mansum sanguinem bonum generare, & tremorem cordis emendare. Ictero Syrupum mederi itemque cor & spiritus vitales recreare. Aquam florum, seu etiam herbe & radicis in fine mensis Maii distillatam mane & vespere Vncie pondere propinatam, ad eandem omnia prodelle.

BORRAGO SYLVESTRIS TENVIFOLIA.

Borrages sylvestres præcipuam habent differentiā in *foliis*: quæ vel angustiora sunt, quàm in latius, vel Tabernamoutano auctore à quo planta hic à nobis proposita tam in Icon. quàm in Hist. vocatur Borrago sylvestris floribus albis [*Wilder Borres*. Item Borrago tenuifolia *Borresch mis schmalen Blätteren*.]

Gerardo Augl. Lycophis Anglica, *Vipers Bugloss* & *small Bugloss*. Item Borrago flore albo, *velut siveven* Borrago. Is ponit iconem



BVGLOSSVM FOLIO BORRAGINIS
Hispanicum.



Tabern. Borruginis tenuifolia, quàm bene iudicare poterunt lectores.

Bugloss. Hispanica bicubitales & altiores attollit caules, fistulosos, angulosos, hispido, asperisque, nec in ramos diuisos: *folia* Borruginis, rugosa & aspera, spinis mollioribus quàm in Borragine & Buglossio, interdum longo, alius nullo pediculo donata, acuta, præsertim in caulibus, quæ verò pro-

pter terram infima sunt, magis rotunda existunt, albisque punctis maculolæ: multò latiora & non ita breuia ut in Buglossio vulgari maiori, ex quorū alis *pediculi* hirsuti sextantales aut quadrantales surriguntur, duobus foliis circa fastigium donati, inter quæ flores emicant cærulei, Buglossi æmulli, sed calyce brevioris & veluti sessili non vnà se se explicantes, quinque partiti. Radix crassa, adnatis donata, cortice nigro dehusculo oblecta, intus alba, sapore lento & viscido.

De Buglossio à nobis hic descripto loquuntur Monachi in Meluem Dist. 6. cens. 48. cum dicunt. Buglossam Dioscoridis indubiè tenemus quam in Hispaniis inuenimus. Flores producit lanugineos, paruos, floribus nostræ Buglossæ penè similes &c. Hanc etiamnum pro domestica Buglossa accipiendam esse non dubitamus.

An Matthioli in Dioscoridem huius meminerit sub nomine Buglossi Hispanici perpendant lectores, non descripti nec depingit, tantam mentionem facit.

Lobelius in aduersariis pag. 247. & Icon. Plant. pagin. 575. Buglossum semper vitens appellat.

Dioscoris.

Cam. horti etiam Buglossum semperuirens. Cæsalp. lib. 11. cap. 4. Buglossa Hispana, cui conuenire dicit descriptionem Licophis apud Dioscoridem. Hist. Lugd. Buglossæ genus quod hodie ex Hispania allatum in hortis feritur. Tabern. Icon. & Hist. Buglossum Hispanicum, *Spanisch Ochsenzunge*. Non placet icon ex aduersariis Penæ & Lobeli desumpta. Catal. Franc. Buglossum Hispanicum, *Borragio hiemalis*. Dodonæo latino in fol. Anchuta prior, *βόραγιον* appellata: à nonnullis *αυγ*: à nonnullis in Belgio Buglossa Hispanica.

Locus & Tempus.

Buglossi Hispanici nomine ex horto Patauino extulit mihi Frater, vidi etiam Argentinx in horto Friderici Meier vnde habui semina, nunc Montbelgardi se non parum multiplicat semine deciduo, tota hieme viret, nec annua est planta: in horto E. C. tota æstate floret ac etiam autumno.

Vires & Vitis.

Cæterum Anchusæ Onocliæ radix refrigerat & resecat, auctore Galeno (vt refert Dodonæus) & vna adstringit: & quia subamara biliosos etiam extergit humores: folia imbecilliora, adstringunt tamen quoque & resicant. Dioscorides ad ambusta & vetera vlcera ex oleo & cerato efficacem radicem ait: erysipelatis cum polenta medet: lepris & vitiliginibus cū aceto imponi parus extrahere generali impostura: decoctum ex hiberi lictericis, nephriticis, & splenicis, febricitantibus cum melicrato: ad vnguentorum spissamenta à pigmentariis vsurpari: folia in vino pota aluum sistere.

BUGLOSSVM VVLGARE MAIVS ET minus, flore vtrumque duplici.

Descriptio.



Buglossum vulgò & officinis dictū filia habet oblonga, sed asperitate sentitcola, borraginis appellata: vtrumque mitiora, atrovi-reria & splendida: caules cubitales & sesquicubitales, iidem asperi & hirsuti in ramos plures fissi: flores per ramos serie quadam solitarii, cum in fastigiis co-

ferti, Borraginis floribus dimidio minores, colore dilutiore, cæruleo (interdū & albo), in quinque laciniis obrotas abeunt, quarum singulis ad basin fimbria aduata villosa ex purpura albescentis, totidemque subiecti apices nigricantes, in floris tubulo longiusculo, quem quinque ambiunt acuminata & hispida folia [Trago flores radiati instar rotule, partim candidi, partim purpurantes ante Solis ortum, qui si radiis suis violas percusserit, pulchrè cæruleo inficiuntur colore.] Floribus decussis in valculis tria vel quatuor semina coniunctim posita, oblonga, ru-

gosa, veluti semen Consolidæ maioris at maioris, sapore An ygdalino prædita: radix Symphyti instat, foris nigra, intus alba, gustu lenior. (Trago quandoque cubitum longa, recta, pulla foris.) Magnitudine verò differt altera huius speciei illa, foliis similiter longis, hispidis, sed contractioribus, floribus minoribus albis vel purpureiscentibus, interim caulis altitudine parum aut nihil cedit interdum. Trago breuior, angustior, acuminatior, ac quoad omnia magis exigua est, semine præsertim, quod & magis nigricat, flores similes, iique nonnulli cærulei, alij planè purpurei perpetui.

In tanta authorum de Buglossis discrepantia operæ prædum nos acturos æstimamus si separatim cuiuslibet opinionem adscribamur, nec enim facili negotio discordes eorum mentes quis conciliabit.

Simoni itaque Genuensi, Buglossa dicitur borraginis species sylvestris. Syluio de comp. med. lib. 1. Buglossum magnum, Cirsium Dioscoridis dictum Buglossus vulgaris videretur: notat tamen Dioscoridis quædam tradit desiderari. Hermolaus lib. 4. coroll. 33. Cirsion potius quàm vt quidam [Leoniceus] Cirsion legendum testatur, huicque herbæ similem esse Hircinam linguam vulgò dictam. Sed caule rotundo non anguloso vt Cirsion.

Marcus Virgilius in Dioscor. lib. 4. cap. 120. Buglossum omnibus notum ait, non tamen Antiquorum. Contra ait Guil. in Theor. Non videre satis queo, quæ causa sit. Cur vulgare officinarum Buglossum antiquorum esse Buglossum non possit. Ego profeqd subulam præse ætatis linguam, Græciæ, Italiæ, Germaniæ, Galliæ, Hispaniæ, & in summa omnium gentium vnanimi consensu, vulgare Buglossum esse defendo.

Ruellius lib. 3. cap. 126. ait: Cirsium alii Buglossum magnum, Romani Spinam mollem nominant &c. Cirsion herba est quam rustici, simul & officinæ, nec non Herbarii vocant linguâ bouis vel Buglossum. An verò de minore vel de maiore loquatur Ruellius dubito, crediderim tamē de maiore loqui, quicquid ad eū dicat Cordus, qui eius verba de minori Buglossis intellexit.

Considerandum de quibus Buglossis hæc tradat Corn. in Diosc. Officinæ Anchusam Onocliæ, Buglossum rubrum appellant, & perinde nostri *Rote Ochsenzunge*. Idem lib. 4. cap. 101. Cirsion & officinæ & vulgus herbariorum Buglossum vocant. Nostri *Ochsenzunge*. An etiam Apollinariæ. 1. nomine *Ochsenzunge* maiorem intelligat vel minorem asserere non possum.

Brunk. in hort. Germ. pag. 41. *Wild Ochsenzunge*: pag. 42. videtur tradere pro Buglossis vulgari. Textor de peste lib. 1. cap. 4. Buglossum filu. & cap. 7. Buglossam vulgare vocat. Helfricus in nomencl. cap. 23. his nominibus Buglossum, Borragio, *Ochsenzunge*, *Burreisch*, *Bob*, *Worm*: Bugloss, *Borragio*, diuersarum plantarum nomina permiscet.

Herbarium antiq. Cubæ cap. 34. pro Buglossis, *Ochsenzunge*, ineptam habet iconem eam non demonstrantem.

Tragus lib. 1. cap. 77. pingit hoc titulo, Buglossa Italica, *Welsch Ochsenzunge*; describit verò nomine Buglossis domesticæ maioris: Cæterum apud eum secunda figura Buglossis maioris superflua videtur, aut titulus notandus, nec apud eum inuenimus figuram quæ benè exprimat minorem Buglossam siue angustifoliam.

Cirsium Buglossum magnum.

Helfr. not.

Bugloss. dom. minor.

Fuchsius

Fuchsius Leon. p. 150. Echium Italicum spinosum. *Vuelfch Ochsenzung*. Item pag. 151. Echium lanug. nolum primum. *Gemein Ochsenzung*. Quam autem Fuchsius in Hist. cap. 51. de bugloisso [Borragine sc.] buglossam vulgi vocat, de ea cap. 150. hinc agit. *κίσιον* Græcè, spina mollis, buglossum magnum, Officinæ necnon Herbarii buglossum & Linguam Bouis vocant. Germ. *Ochsenzung*, nos duas damus genera, quorum vnum Germanicum, alterum vèd Italicum est, in quo omnia sunt maiora: Prius Gallis *Buglosse sauvage* aut *Langue de Bœuf*: alterum *Langue de bœuf*, officinis Barba Hircina nuncupatur.

Math. in Diosc. l. 4. c. 123. figuram habet Buglossi maioris, hoc titulo Buglossum vulgare, deinde dicit. Buglossum vulgè & c. Buglossi nomen sibi falsè vendicauit. Non tamen negare ausim quin vulgare Buglossum in campestribus nascens iisdem cum Borragine polleat viribus &c. Atque facie non multum dissidere ea inuenias, si illud genus spectes, quod hodie in hortis seruitur ex Hispaniis allatum &c. Non desunt qui asserant vulgare Buglossum Echij genus esse. Alij Cirsium existimant. Idem cap. 114. Credidere recentiores quamplurimi rei herbariæ periti, nil aliud esse Cirsium quàm vulg. re Buglossum. Sed mihi planè hæc Sententia, pæce eorum dixi, impellenda potius, quam probanda videtur: quòd Buglossum caulibus triangulis non insit, sed rotundus: quòd ab imo foliola per ambitum aculeata rosæ speciem non referant, sed longa & continua prodeant: quòd denique Buglossum flores non euanescent in pappos, sed læguentes integri decedant, relicto in folliculis semine. Cirsij autem, nusquam quod legerim, æminerunt in simplicium censu Galenus & Paulus.

Anguill. epit. 14. Licopis n. nil aliud est quàm vulgaris nostra Buglossa, quam postea ait hodie in Græcia etiam Buglossam dici.

Lacun. in Dioscorid. libro 4. cap. 129. statuit officinas pro Buglossis exhibere plantam quæ non sit Buglossum, non negatamen quin deficiente Borragine possimus uti hoc vulgari Buglossis quod existimatur Echij pæces.

Amatus in Dioscor. lib. 4. enarr. 29. capite de Echio vocat buglossum vulgare, ibique apponit figuram, sed male nomine Echij syluestris in impressione Lugd. Idem lib. 1. cap. 27. Cirsium sine Buglossam nominat. Et rursus lib. 4. cap. 120. officinarum Buglossum & vulgare in annot. Roberti Constantini. Idem lib. 1. cap. 27. per *κίσιον* Homeri quoddam Cirsium Buglossum intelligere dicit. Et l. 4. cap. 120. Cirsium nostræ vulgaræ Buglossæ respondet ut fatendum sit eandem herbam esse. Ruellius quoque patrocinatur & merito. Matthioli minus benè Cirsium aliam plantam in Buglossa esse contendit. Contra Robertus Constantinus apud Amatum ait. Officinarum Buglossum species est Echij, etiam Fuchsius teste. Nimis pertinenter Læcanus Matthiolo & rationi refutatur dum Ruellium sequitur.

Castor Durantes vocat buglossam & buglossum vulgare, traditque hortense & sylvestre, maius & minus.

Gesn. in append. dicitur Buglossus albis floribus. De hort. Buglossus minor vel communis, & Italica vel Gallica maior. De Collectione stirp. Buglossus maior. Item Buglossus vulgè dicta minor, quam alij Cirsium esse coniiciunt, Buglossus Italica.

Confusè Oeco Buglossam, *Κυλάριον* vocat Echium.

Ponit Euch. Ræss. in herb. buglossum angustifolium, cum hoc titulo, *Groß zam Ochsenzung*: alteram vèd vulgarem, latiore folio, hoc, *zam Vuelfch Ochsenzung*: Cur autem *Vuelfch* dicat nescio, in agris Germaniæ prouenientem sæpè vidi.

Ruffius in Dioscor. lib. 4. cap. 22. Echium, Buglossa vulgaris *Gemein Ochsenzung*. Hac, inquit, Officinæ ferè omnes pro vera Veterum buglossa vtuntur.

Theophrast. Golio buglossa dicitur. Harchio in Ench. Buglossum quo hætenus vsq. sunt officinæ, Cirsium Dioscoridis quibusdam. Rhegius in exerc. pag. 49. Buglossum magnum Cirsium dictum.

Lacuna lib. 4. cap. 120. in Dioscor. ait quosdam sibi persuadere ferè vulgarem buglossam aut Linguam bouis esse Cirsium, sed ratione carere eorum opinionem.

Lonic. lib. 3. cap. 152. *Gemein oder gras zam Ochsenzung*. Græcis Echion, Lat. Alcihiacum offic. Buglossum, Gallis *Langue de bœuf*, Pharmac. assumunt pro Buglossis, folia sunt angusta & acuta, flores ex cauleo purpurei: prouenit iuxta vias & aspera loca. *Lonicera* iconem habet buglossæ folio angustio, flore minore: verum facile est videre ex ei adscriptis eum diuersas plantas confundere, nec scire quid scribat, magnum & domesticum Buglossum èstne foliis angustis vbi nam prouenit iuxta vias, & in asperis locis Buglossum quod pingit? Præterea proponit alteram iconem sub titulo, *die anders wild Ochsenzung*, id est, Buglossum alterum silu. quæ videtur esse Buglossi angustifolij flore minori: nec id benè distinguit ab Echio vulgari eodem capite posito. Dicto l. cap. 155. addit *die groß Vuelfch Ochsenzung*, id est, magnum Italicum Buglossum dicitur apud Dioscor. Cirsium & Cirsium, Latinis Buglossum Italicum &c. Sic Cirsij descriptio. nem cum Buglossis latiore folio & flore maiore confundens. Is tandem iam dicto lib. cap. 157. non absque graui errore Borraginem esse ait legitimum buglossum: vulgare autem hoc buglossum sine Echion (vt ait) officinas malè nominare buglossum scribit. Sed rursus malè buglossum cum Echio confundit.

Nos, aiunt Monachi dist. 6. cens. 148. negamus Cirsium vel Cirsium esse communem atque vulgarem buglossum. Item buglossum Dioscoridis non esse buglossam nostram firmissimè asserimus. Pro sylu. buglossa Mesue accipienda quam communiter vocamus buglossam.

Maxima ac manifesta, inquit Cron. de comp. med. non videre extremæ insensitæ est: ægè tamen diu consuetam de buglossa opinionem deserunt quidam Herbarij, sed ij discant eam Dioscoridis Cirsium esse, attestantibus Ruellio, Hermolao, Leoniceo, Monardo, Syluio, Fuchsius, viris summis & rei herbariæ peritissimis. Vos tamen Hyeronimus Tragus cap. 77. lib. 1. Nicandrus Dioscoridis auctoritati confidens, Echion decernit, quamuis plerique syluestrem buglossam eo nomine verissimè intelligant. Reuera indecorum est, & detrimentosum tamen ad hæc vsque tempora extitisse buglossi ac Borraginis ignorantiam, quam Medicinæ initiati, haud sine pudore & dispendio negligere possunt. Nam quæ facis, quæve prætextu, attem medicâ proficiebuntur, si res tam necessarias ignorare conuincuntur? Nisi turpe non sit alicui, id profiteri quod nesciat. Floribus præcipua venustas ac gratia, qui hoc loco Zæ-

Barba Hircina.
Buglossum vulg. maius.

Cirsium.

Cirsium.

Cirsium negat.

Buglossum Italicum.

Amati error

Reperitur

Non Cirsium

charo condiri debent : Herba autem vnico & singulari dono prædita creditur, ad animi lætitiā augendam, & subolent nescio quid iucundi folia. Hæc Cronenburg. qui lib. 2. Nepenthen fieri è Buglossa multis ita suspicantibus noris existimat.

Robert. quoque Steph. de arb. p. 19. Buglossum siue Buglossam nostram vulgarem esse Cirsium Dioscoridis credit.

Quæ, inquit, Apollo Rad. prim. Buglossi nomen falsò sibi vendicauit, siluestre, seu erraticum Buglossum appellari poterit, quidam Echij genus putarunt, alij perpetam Lycopsim cum Anguillario: verùm Herbariorum bona pars, vt etiam Dessennius cum Fuchsio Cirsion: obstat tamen caulis rotundus, qui in Cirsio triangularis est: sicut nec foliola, ab imo rosarum specie, spinosis angulis producit, verùm longa & continua, obstat & capitulorum [etiam in idem purpureorum] forma &c.

Dodon. gall. duas habet figuras, dicitque. Buglossa aut Lingua Bouis officinarum. Gall. Buglosse aut langue de bœuf. Germ. Ochsenzunge. Belgicè Buglosse & OffenZunge, quamuis non sit verum Buglossum. Prima species *anchusæ*, Latine Lycopsis, officinis huius regionis Buglossa & Buglossa domestica maior. Secunda species est Anchusæ genus, videtur *ἀνχουσα, ἀλκιβιάδιον & ἐροχμίδης*, Latine Anchusa, Alcibiadion, Onochelides. Lat. in fol. Buglossa vulgaris, Posterior ætas Buglossam & Buglossam vulgarem appellat, ac pro vero Buglossò in vsum recepit. Hæc autem veteribus Lycopsis est dicta quam Galenus inter Anchusæ species numerat: à quo Dioscorides quoque haud alienus est, Lycopsim à nonnullis Anchusam vocari referens. Nec temerè inter Anchusas habetur, cùm omnibus partib. ipsas referat. Esse hanc Lycopsim veterum, dubitare non poterit, qui ipsam cum huius descriptione conferre voluerit &c. Audiendi minimè sunt illi, qui Buglossam vulgarem Cirsium esse existimant: Cirsion liquidem ex Carduorum est generibus cuius flos, in pappos abit, in Buglossa neutiquam.

Aduersar. p. 246. Buglossum vulgare angustifolium. Hæc planta diuersa à Buglossò minùs vera retinuit non en Buglossæ. Huius radix foris nigra, perennis, proluxa, glutinosa, edendo medendoque vri Borrage nata, & flores concolores, Primulæ veris modo aut Anchusæ, semen maius quàm Borrageinis, minùs nigrum, folia longiora, angustiora, Echio aut Lycopsi toto habitu, tam propè accedentia, vt si defuisset rubellus radici color Lycopsim domesticam facturi fuissimus, qui quia nigricat potius Echium indicat, aut vtriusque anceps natura. Lobel. icon. pl. pag. 176. obs. p. 170. Figuram habet hoc titulo, Buglossum angustifolium Aduers. 246. Cirsium italicum Fuchsio. Germ. *Vuelfsch Ochsenzunge*: deinde dicit Buglossi vulgaris varietas. Altera folio habiliore, flore cæruleo, rariùs albo. Altera strigosior, folio angusto, flore purpureo rubello, hortensis.

Camer. horto Buglossum Italicum vel Hispanicum grande, cæruleis, & interdum albis, interdum variegatis floribus. Cæsalp. lib. 11. cap. 2. Buglossa floribus cæruleis aut purpurascens: Buglossum Dioscoridis in campestribus nascens, Euphrosinon Plinij. Idem c. 3. hanc veram adstruit Buglossam à similitudine Symphiti: Aui-cennam de Buglossò agere scribit, quando dicat:

purate se esse linguam Bonis Persicæ, cuius proprietates sit lætifi. are & tristitiam remouere.

Hort. Lusit. Buglossum vulgare floribus rubris *Ochsenzunge mir roten blumen*. Item Buglossum vulgare floribus cæruleis. *Ochsenzunge mit blau-vnen blumen*. Thel. Buglossa siluestris nigra, florem nigrum obtineus vulgaris Buglossæ, sed minorem.

Georg. Pict. apud Macrum in annot. vocat *Ochsenzungen*, & Dioscor. *Βυλλώσρον*, pro quo figuram apposuit ineptam potius Cariophyllatam experimentem.

Tabern. icon. & hist. Buglossa vulgaris, *Ochsenzunge*: & Buglossa Italica mas. *Vuelfsch Ochsenzunge Manlein*. Item Buglossa Italica femina: *Vuelfsch Ochsenzunge Vuiblein*. An Tabern. Buglossa vulgaris est Buglossa angustifolia? An eiusdem Italica eadem cum Buglossa maiore latifolia, quæ eadem in Germania spontè prouenit vt obseruauit sæpiùs, abundat sanè in agris Bolvvil ad Brissacum: femina fortè illa est.

Maior domestica Buglossus in quibusdam regionibus, vt in Lotharingia in agris optimis. prouenit, authore Trago, aliàs in hortis plantari consuevit, folia mense Aprili profert, Maio mense caules emittit. Floret vt refert Dodon. à Maio aut Iunio vsq; in æstatis finem, folia hieme pereunt, vere verò noua erumpunt. Montbelgardi in horto E. C. mihi prouenit Buglossum maiori folio & maiori flore cæruleo: obseruauit propè Montpelii & prope Frontignan spontè prouenientem, necnon in Rhætia: & Lugduni in agris florentem Maio, in Allaria etiam in agris inter Brissacum & Entschheimiam: Basileæ in hortis florentem Maio & Iunio: Parauij in hortis. In Burgundia in Abatia trium regum vnde transtuli in hortum E. C. & meum: Geneuæ in pratis florent Maio. Eiusdem generis aliud creuit in horto E. C. flore albo, cum aliqua rubedine: Idem vidi Sturgardiæ in horto Ducis & folio & flore maiore. Tubingæ cùm essem Clarissimus meus præceptor Fuchsius in horto habebat duo genera Buglossi parua: vnum vocabat Echium album ob flores: alterum Echium lanuginosum purpureum. Hæc eadem habeo in horto E. C. voco Buglossum angustiore folio flore minore. Vnum est purpureum colore violæ aut Anchusæ: Alterum est flore albo. Buglossum angustifolium vidi Viennæ in cænobio S. Dominici à l'Angeli. Buglossum flore minore albo & purpureo Gæppingæ in horto Ill. E. C. & in *Vuelfschsteig* in horto Ill. Com.

Qui sibi persuadent Buglossam vulgarem esse verum Buglossum, legant autè vires attributas ei ab antiquis, nos faciliè concedimus ad Ischuriam facere, & ad asperitatem gutturis. Si Cirsium est vt alij existimant, videant caput de Cirsio: concedimus Buglossæ vulgaris radicem posse conuenire ad sedandos dolores varios. Lobelius & Pena tribuunt Buglossæ vulgari similitudinem in viribus Borrageini. Errare Medicos ait Ferrer. cùm Buglossi radicem, crasso, tenaci, lentoque succo præditam, apozematis aperiensibus inserrant. Buglossum autem cùm sit viscidissimum, vt succus extrahatur, contusum debet in pelui sensim calefieri: sic enim suum spontè fundit succum, cùm expressio frustra aliàs tentaretur.

ECHIVM FUCHSII SIVE BORRAGO
silvestris.

Descriptio

Digitali radice donata est, longiuscula, raris filamentis fibrata: ex cuius capite plures prodeunt caules dodrantales & cubitales aut etiam altiores, hirsuti, asperi, ramosi, fragiles: folia Echij, magis hispida, sinuata, sapore saturo: ad Borraginem accedente: flores purpureo-violacei, Buglosii minores, quinquepartiti, ex calice totidem folijs constante, semina quatuor Echij continente.



Fuchsi j. hist. cap. 103. huius figuram Echij titulo habet, quo nomine etiam describit. Tragus sylvestre Borriginis genus facit: Dod. Gall. figurā Fuchsi j. proponens Lycophilum silvestrem nominat. Latio in fol. dicitur. Buglossa sylvestris, Buglossa minor & species, folijs asperis ac oblongis, sed multo minoribus: flosculis quo-

que cæruleis sed exiguis: radice tenui & albida, quæ Lycophilis quamdam minor est, aut potius Anchusæ quod iam spurium genus, vulgo Buglossa silvestris nuncupata.

Pen. & Lubel. Adnerf. pag. 147. Erraticum Buglossum asperum Echiodites. Est & hæc perquam similis qualibet sui patre superiori, & penè par, macilentus & sabuletis Antuerpiæ vicinis passim spontè, vè etiam in hortis proueniens: Vtunturque Buglosii penuria Pharmacopœi, quibus silvestre Buglossum creditur: admodum horrent, hispidaque sunt folia, setaceis pilis rigida & pilulis prominulis, tanquamque & simili differt modo à superiore, quantum Labrum Veneris à Diplaco horrensi. Radix gracilior, lignosa.

Reperitur in hortis inter olera, frequenter etiam in agris frumentum ferentibus, altius mēsis vigens: Echium Fuchsi j. Montpelij prouenit. Montbelgardi inveni florens in segetibus prope Courfelle, mense Iulio: transluli in hortum E. C. ubi quotannis se renouat, semine deciduo, florens Iunio & Iulio. Genevæ in orto è regione domus Senatoriæ cum flore Mayo: Limitibus agrorum Scotiæ luxuriat, non parum segeti damnosum, referente Gargillo.

Tragus hac Borragine silvestri, pro satius, ubi id necessitas postulabat sæpenumero usus est.

ANCHUSÆ VETERIBVS IN GENERE.
CAP. III.

Dioscorides tres Anchusæ species tradit, his verbis: Anchusa, quam nonnulli calycem [αλυσαν:] alij onocleam [ονοκλειαν:] appellant, folia habet Lactucæ quæ folio visitur acuto pro-

Tom. III.

xima, hirsuta, aspera, nigra, numerosa, undecunque [αλυσαν] ab radice velut affixa, spinosa: Radix illi est digitali crassitudine, colore quodammodo sanguineo: quæ æstate vel eo agnoscitur, quod manus inficiat: Læto solo prouenit. Radici vis astringentia, ad ambusta veteraque vlcera efficax, si in oleo addita cera decoquatur. Erysipelatis cum polenta imposita medetur: itémque vitiligini & lepræ ex aceto illita. Vulus quoque subditi, parius extrahit. Datur & eius decoctum bile suffusis, nephriticis ac splenicis, si febris sit ex aqua molli. Folis verò sistant aluum in vino pota. Vtuntur & vnguentisj radice ad vnguentorum pissamenta.

Altera quam aliqui alcibiadian seu onochiles [ονοκλειαν, αλυσαν] vocauerunt, à priore distat, quod minora habeat folia, quanquam simili modo aspera, & ramulos tenues, in quibus flos putrescens in puniceum [Orb. & pomum] vergens: radices autem rubras, prælongas, quæ mellebus sanguineo succo turgere. [V. αλυσαν αματανων:] In sabulosis nascitur. Tum ipsa radix, tum & folia contra venenatarum bestiarum, maximèque viperarum, morsus efficaciter auxiliantur siue cibo, siue potu, siue etiam amuleto. Quin & si quis iis cominanducatis ad venenatæ bestię os expuerit, eam enecabit.

Hanc in nothis aliqui Cathanchusam vocant; alij Lybicam, alij Archibellion, alij Alcibiadian, alij Onophillon, alij Phorphyrida, alij Miydusan, alij Salycem, alij Noneam, alij Buinesach.

Spuria Diosc.

Est & alia terra, huic similis [videlicet secundæ] ac minore semine eoque puniceo, quo comanducato si in serpentis os inspuatur ea morietur. R. dix. autem acetabuli mensura cum Hyslopo & Nasturtio pota latus ventris tinea pellit.

Hippocrate lib. 1. De morbis mulieribus χασιδά τὴν μικρὰν, & χασιδά τὴν μεγάλαν habet, quam Galenus in Glossis τὴν ἀλυσαν exponit, atque sic etiam appellari dicit: lib. verò 6. inter viros purgantia Anchusæ [ἄλυσαν] folia ad pugillor duos in vino, pari aqua temperato, bibendum præcipit.

Paulus lib. 4. cap. 41. Anchusam quæ spinosum, & laticam, & nigrum folium habet χασιδά τὴν μικρὰν appellari dicit: & lib. 7. c. 17. in emplastro ex herbis, Anchusam chærospelethron, Onocleam esse ipse exponit. Significat autem hæc vox lugerum porcinum. Meminit eius etiam lib. 7. dolabellatum suarum in Paulum Cornarius.

Theophrast. lib. 7. hist. plant. cap. 9. Proxime quidem terram foliatam esse [ἄλυσαν] Anchusam tradit. Scalig. verò in hunc locum, se in Anchusæ stipite foliola animaduertisse notat.

Anchusam commemorat Plinius. Et quidem lib. 12. cap. 10. ait. Et Anchusæ radix in usu est, digitali crassitudine. Fruiditur papyri modo, manique inficit sanguineo colore, præparat lanas prætiosis coloribus. Sanat vlcera in cerato, præcipue tenum, itém adusta. Liquari non potest in aqua, pleci dissoluitur, idque synceræ experimentum est. Datur & ad tenum dolores drachma eius potui in vino: aut si febris sit in decocto Balani. Item Iecinorum vitij, & Lienis, & bile suffusis, Lepris & Lentigini illinitur ex aceto: Folia trita cum melle & farina luxatis imponuntur. Et pora drachmis duabus in mulso aluum sistant. Pulices necare radix in aqua decocta traditur. Capite verò sequenti at. eiusdem libri, de altera Anchusæ sic tradit. Est & alia herba proprio nomine onochiles [onochilion Cui.] quam

Vuu

Locus & Tempus.

aliqui Anchusam vocant, alij Archebion, alij Onochelimum, alij Rheziam, [Archibellion, alij Onocleam, alij Alcibiadion, alij Onocheiles. Diosc. Archebion, alij onocholin: Cn.] multi Enchusam, [enichrisam Cn.] paruo frutice, flore purpureo, alperis folijs & tenuis, radice mellibus sanguinea, cæterò nigra, in sabulosis nascentis, effica contra serpentes, maximè que viperas, & radice & folijs, æquè cibo ac potu. Vires habet mellibus. Folia tria [de Alcines folijs, id Diosc.] odorem cucumeris reddunt. Datur in cyathis tribus vulua procidente. Pellit & tincas cum hyssopo: De radice Anchusæ tertiz, quæ posthac describitur, id Diosc. tradit. Et in odore renum aut iecinoris ex aqua mulla, si febris sit: sin aliter ex vino bibitur. Lentigini [vitilagini Diosc.] ac lepris radix illinitur. Habentes eam à serpentibus feriri negantur. Et max viribus his aliunde transcriptis, addit etiam de tertia. Est & alia inquit, huic similis [Anchusa tertia Dioscoridis] flore rubro & ipsa ad eodem vsus. Traduntque commanducata ea, si inspauatur, mori serpentem.

Galenus quatuor Anchusæ genera agnoscit. Onocliam, Lycopson, Alcibiadion, & quartum paruum, quod ferè nomine carere ait: Alcibiadion tamen persimile esse, quamuis amari, & magis medicamentosum.

Onocleam.

Hermol. Barb. in Plinium lib. 22. cap. 21. Onochylon, Dioscoridem & vetustos codices, Onocheloni, id est, ὄνυχον, quasi labrum asini vocasse notat: Archerion, verò vetustiores codices Archebion. Dioscoridem Anchusæ genus vnum appellare archibellion: quod & melius. Esse enim Anchusas multiplices, vagarique per eas eadem vocabula, ut Alcibiadion & Onochelen, Cum Alcibiadion videatur propriè esse Echium. Esse qui Alcibion quoque à Nicandro in Theriacis dictam pro Alcibiadion, quæ sit Echios, accipiendam putent. Esse item qui Plin. reprehendant, qui e. 7. libro dicat: Alcibios qualis esset, apud auctores non reperi.

Archebion.

Alcibiad.
Echium.

Raram nec facilem inuentu herbam nostræ ætatis herbarij Anchusam referunt: [inquit Marcellus in Dioscoridem] quod meritò demiretur aliquis, cum lenocinio formæ quondam inseruerit: videnturque radice eius antiquæ mulieres contra pallorem: bonitatem rosei coloris radice eius vultibus suis inducentes. Quod tam quotidianum illis fuit ut ab Anchusa verbum Græcis ἀνχυσίζω in affectatione formæ luctari & colorari adhuc significet. Numerauit coniunxitque eam Theophrastus coronopodi & plerisque alijs quæ ἰσχυρὴ ῥίζα ille vocat i. folia per terram spargentia: quod ait ὀφθαλμοῦ τῆς γῆς, quod est per terram sparsa. Nicander Lactucæ similem ostendit. Plinius inter aculeatas numerat à cæteris in foliorum positura discrepans.

Quod Diosc. dixit, Vnguentarios ut radice Anchusæ ad spissanda vnguenta: hoc Plinius lib. 13. cap. 1. ad colorem retulit, inquit Cornarius. Plinius lib. 22. cap. 20. Dioscoridis sententiam planè sequitur, nisi quod vlcera senum, dixit ἡ παλαιὰ λυγρὰ, id est, vlcera antiqua. Deinde Balani decoctum habet, pro aqua mulla: Mox lentigini vox supposita est pro vitilagini. Habet enim Diosc. ἀλπεύς ἢ ὀφθαλμοῦ, id est vitilignes & lepras. Postea cum mulso dixit, pro vino: & reliqua aliunde transcripsit. Atque hæc de prima Anchusa Plinius loquutus.

Enchusa.

Phauorinus lex. Gr. ἀνχυσίζω, Enchusa, species

plantæ quæ etiam per a dicitur Anchusa, Anthi verò per e effertur. Et ἰσχυρὴ ῥίζα, de mulieribus dicitur, Enchusa faciem suam illinentibus, &c.

Anchusæ caput duplicatum ait Iulius Alexandrinus vnumque superfluum ἰσχυρὴ ῥίζα Lycopsum vocasse Diosc. radicemque robur tribuisse & adstringentem: Cæterum ex hac vnguentum sibi parare Germaniam, potabile quod dicunt. Et quidem bibi ex humore aliquo ad rupta & conuulsa, carumque ex alto, vsus frequentissimi.

Anchusa
Caput Gal.

Fuco pigmentisue illinere, Græcis ἀνχυσίζω erat [inquit Lobel.] vnde ἀνχυσίζω dicta à radice illustri cruore, coloreque florido, cui plantæ rotius cognitionem debemus: vix enim alioqui innotuisset, tum propter eam Echij Lycopside & Buglossis similitudinem, tum etiam ob versionem minus conspicuam: Quatuor animaduertimus differentias ex floribus, folijs & magnitudine. Tertiam Anchusæ speciem non meminit se vidisse Turnerus. Lycopsum Anchusæ congenerem facit Gesnerus lib. 1. quadrup. titulo de lupo: miraturque quomodo ab aspectu lupino nomen tulerit. Ruellium Linguz Canis hodie vulgò dictæ hoc nomen adjudicare refert. Idem ait Onophyllon eandem Anchusæ esse, quæ Arabicæ linguæ auctoribus etiam asini lactuca vocatur. Anchusam ipsam quoque Græci Onocleam vocant, & folijs Lactucæ describunt. Lycopsis à nonnullis Anchusa vocatur. Lactucæ folijs &c.

Asini Lact.

Cæterum, quænam hodie sit Anchusa propriè dicta, non satis conuenit inter auctores: Etenim Anchusæ nomine variè donantur Plantæ, v. g. Buglossum vulgare maius. Buglossum vulgare minus. Anchusa Montepellacæ. Anchusa lutea. Anchusa minor. Onosma. Echium vulgare. Echium Fuchij. Lithospermum nigrum, flore albo, semine Echij. Cynoglossum. Pulmonaria Matthioli & Cæsalpini. Amaranthus. Dipsacus. Hyacinthus.

Equiuoca

ANCHUSA MINOR SIGNOSIOR.



Lim nobis attulit C. Bauhin. Patavio plantam longitudinis Palmi vel paulò longiorem, Anchusæ minoris similem, vel Lithospermum nigrum, loquor de folijs ramulorum [inferiora non vidi,] quæ aspera, hispida, flores Buglossi vulgaris vel Anchusæ: Eandem habueram sic-

Descriptio

cam à Valerando Dourez, exhibuit autem frater titulo Anchusæ minoris Galeni & quatuor Dioscoridis.

Anchusa
minor

An Lobel. in Adu. p. 248. & Icon. Plant. pag. 578. Anchusa lignosior angustifolia? H. Lugh

pag. 1102. Anchusa lignosior Penz. C. Bauhin. phyt. Anchusa 3. siue Angustifolia seu Pseudo-Anchusa. Dicit C. Bauh in animadu. in H. Lugdunensem, Anchusam Lignosiotem Penz Hist. Lugdunensi pag. 1102. in eadem hist. ante pag. 889. sub Tragorigano notho Dalechampi haberi, ac utrobique describi. Ego quidem quoniam sit Anchusa lignosior Penz nondum asserere possum. Color floris à Gesnero obseruatus dubium mihi mouet, cetera videntur satis conuenire & potiss. locus: quicquid ramen sit non potest esse eadem planta cum Tragorigano notho Dalechampi fruticosa lignosa, interdum bicubitali, qui pauca habet que conuenire possint Anchusis, hos speciosius puer Dalechampi Anchusæ verò Adu. pusilli flores cerulei. Icon quam proponimus est ex Fuchianis nescimus cuius plantæ, quodammodò exprimit Anchusam nostram minorem.

ANCHUSA LVTEA.

Descriptio.



Sanguineo succo plenâ habet radicem perinde ut Onochiles, caulem hispidum, pedalem vel etiam maiorem, tenuiorem, folia per ramos breuiora, pariter tamen latitudine. flores in cacumine congestos & spicatos ferè imitatos, concavos, Symphiti maioris, exilliores, luteos: semen Echii simile, nitidum, cinereum, punctum.

Stylis nigris notatum, ferè triangulum & mucronatum, rostellum auiculæ formâ.

Lobel in Aduers. pag. 148. Lutea Anchusa: rarior & elegantior. Dodonæus lat. in fol. vocat Anchusam quartam, foliis asperis hirsutis ac pungentibus, ac non raro humi orbiculariter procumbentibus: Eam etiam illam esse posse putat quæ à Plinio lib. 23. cap. 10. Pseudo-anchusa appellatur: & à quibusdam Enchusa ac Doris.

Matthioli. Anchusam tertiam: Item H. Germ. & Epit. Ochsenzang. Anchusa tertia, cuius figura non displicet: placet etiam Camerarii ad nostram plantam olim facta & apposita h. Germanicæ & Epit. Matthioli. C. Bauhin. phyt. Anchusa 2. siue maior luteis floribus: Anchusa Gesn. hort. An Lonicer. Anchusa tertia?

Locus & Tempus.

Anchusam quartam luteam non raro in Bohemia occurrere scribit Dodonæus. Ego Anchusam luteam florentem vidi menselunio iuxta Viennam & Lugdunum, nec non Lugduni & in montibus Euganeis, ex quibus locus etiam Frater se accepisse refert.

Anchusa lutea minor.

Anchusam luteam minimam Montspel. ager spontè dat, sed rarius multò. Floribus luteis in pusillis pediculis in se conuolutis Echii ritu caule. Tom. III.

dam Scorpionis aliquantùm emulantibus: cuiusmodi ferè meminisse industrium pharmacopœum Franciscum Penninum Antuerp. testatur Lob. in Obs. pag. 312.

Anchusa C. Bauhino phyt. Anchusa quarta siue minor Patavina, quam Anchusam minorem Galeni, & Anchusam quartam Dioscoridis Guilandinum nominasse refert, quàmque Camerarium in Epit. Matthioli. pag. 736. Anchusæ tertie (Anchusæ luteæ) nomine exprimere putat.

ANCHUSA FLORE ALBO AUT pallido Clusij.

Numerosa huius sunt folia, palmatis longitudinis, valde angusta, & pungente lanugine



Descriptio.

hirsuta: è quorû medio caulis assurgit secundo año (primo enim exau-
lor est) pedalis, interdum etiam cubitalis, crassiusculus, firmus hirtus, in multos ramos diuisus, in quibus breuiora multò, hispidaque folia: extremis ramis prodeunt, è vaginulis hirsutis, & asperis flores Symphiti maioris florib. quodammodò similes albi aut ex albo nonni-

hil pallescentes, siue *αχελαιου*, in angulos quinque diuisi, quibus discussis, semen vaginulis conspicitur viperino capiti aut Echii semini simile: radix minimi digiti crassitudinem æquat, nigraque cute tecta est, qua sublata, omnino rubet, & elegantissimo colore inficit: addè autem carnositas est, ut radicem Buglossi vulgaris instar condiri possit, dulcis tamen & insipida.

Clusio Pannonico & hist. post. Anchusa exalbido flore. Casp. Bauhini phyt. Anchusæ secundæ siue maioris varietas, floris colore albo, aut ex albo pallescente. An Lobel. Ober. pag. 112. Anchusa latifolia Buglossi angustifolio par, radice cruento inficiente & flore albo? An Lonicerus lib. 3. cap. 153. *Ros Ochsenzang*, Anchusa prima copiosa arenosis locis propè Moguntiam. &c?

Nascitur arido & salebroso solo, ut in monte Badensib. thermis imminente, & aliis vicinis, apud Carnuntum præterea, Pannoniæ olim amplissimam urbem, nunc autem vile oppidulum, Patronella vocatum, maximâ copiâ, tum plerisque aliis Pannoniæ, Austriæque siccis ac aridis locis. Floret Maio & semen Iunio profert: deinde petire arbitror: ut Echii genera.

Anchusa maxima Gallia & Anglia, floribus Echii non dissimilibus, caruleis ad purpureum vergentibus.

Traditur hæc à Lobelio in Aduers. cum dicitur Quæ Calys seu Onocleia vocatur, maxima, fre-
Vuu 2

Locus.

quentissima, Galliz, & Angliz aruis latis, sed glareosis, vel argillosis. Radix intus ligneo corculo, libro corticēque crassiore amicta, sanguineo succo sandalinōue digitos inficiente: digitum æquat, sesquipalmum longa, gustu Buglossiz. Folia copiosa Echii aut Buglossi angustifolij, lanugine spinosa, incana, cespiti incumbētia: Caulis plurimum singularis, rotundus, squaber, cubitalis, cirsulis florum cæruleis ad puniceum vergentibus, Echii non dissimilibus: semen exiguum, oblongum, pullum.

C. Bauh. phyt. Anchusa prima. siue foliis floribus Echii: Anchusa Adu. pag. 247. sine icone.

An Turnero part. 1. pag. 39. (41.) Anchusa prima Diosc. in multis Germaniz locis nascens, aded Buglossi hortensi similis, ut non facile quis alterum ab altero possit distinguere, excepta sola radice intensè foris rubente, non autem intrinsecus. Posset Anglis nominari, Gallico nomine, *Orchaset*, aut *Rede Buglossi*.

ANCHUSA MONSPELIANA.

Descriptio



Anchusa Monspeliaca crassam longamque habet radicem, lignosam, rubram, roseo colore tingentem: caules dodrantales, hirti, per quos folia Echii, rigidis pilis obfusa, vnciam vnam aut alteram longa: flores extremis hærent ramulis, conferti, purpurascētes, longiusculi: semen liquet

tur sublongum, cinereum.

Alcibiadion.
Onochilos.
Locus.

Anchusa minor seu Alcibiadion vel Onochilos. Nativissima hæc & copiosissima in Nimbri-gum agro, vnde Pharmacopœi Monspelienses & Lugdunenses Lugdunum ad nudinas quotannis accedunt: ros è vineis & sabulosis aridisque collibus Graeci nuncupant, prope doctoris Asturij, quidam, in eadem curabamus, prolixior namque & carnosior pleniorēque est radice cæteris. Cætera tota minor, angustiora folia, multo numerosiora, viridantia, Buglossi. Complures fundit cauliculos teneros, graciles, floribus minoribus, Buglossi minoris ægustifolij, puniceis. Semen cinereum, oblongum, paruum, sapor Buglossi, non ingratus, acrior tamen & siccior. Hæc Lobius ad eam pinxit in Icon. Plant. p. 578. hoc titulo. Anchusa prima Ad. 248.

An Dodon. H. flor. lib. 1. cap. 11. Anchusa terria foliis quam Alcibiadion minoribus, angustioribus, nihilominus asperis & hirsutis: fæculi in alis cærulei. Galli cum hanc tum aliam *Orchanette* appellant, Hispani *Soagem*, Itali *Anchuse*. Quam Dod. intelligat ut verum fatear ignoro, appingit enim iconem Buglossi vulgaris angustiori folio. An Lonicer. Anchusa secunda. Alcibiadion Onochelos, & Onochelis à quibusdam nuncupata? C. Bauhin. phyt. Anchusa ter-

tia siue altera puniceis floribus.

Ancula altera siue Alcibiadion siue Onochilos, depingitur à Matthiolo quæ cum satis sit descripta tum à Diosc. tum à Matth. plura de ea non dicam. Florentem vidi mense Martio & Aprili, dum floret minus tingit. Prouenit non longè à Monspelio loco satis sicco.

Locus & Tempus.

LYCOPSIS VETERIBVS.

CAP. IV.

Lycopsis quam & ipsam aliqui Anchusam vocauerunt, hoc perhibente Dioscoride, folia habet Lactucæ. [*βίσαν*] similia, ac longiora, crassiora [*μακρότερα & παχύτερα*, pro quo vulgare Exempl. *μακρότερα & παχύτερα*, asperiora legunt:] latioraque, aspera, & circa radices caput ad terram decidua: caulem longum, rectum, scabrum, adnatis multis cubitalibus, & asperis, in quibus flores parui purpurascētes: radix rubra est & adstringendi vi prædita. Nascitur in campestribus. Radix cum oleo imposita, vulneribus medetur, & cum polenta, erysipelatis illinitur.

Præsertim licet eorumque à reliquis Anchusis Plinius de Lycopside hac egerit, nihil tamen illi tribuit quod à Dioscoride acceptum non fuerit. Idem & Nicander in Theriacis suis fecit, post Anchusam Lycopsidem, cum plerisque aliis numerans. Antiquiores autem Græci Anchusæ congenerem fecerunt: Secundamque in eo censu numerabant. Dioscorides vltimam docuit licetque Anchusam esse non dicat sed ab aliquibus vocari: Historiz tamen ordo & quæ illi tribuuntur notæ Anchusis aliis congenerem merito faciunt.

Lycoplosos Equiuoca hæc recensentur: Echium Equiuoca nostrum vulgare. Echium Germanicum siue Borrago sylu. Borrago. Buglossum vulg. maius. Buglossum Hispan. Pulmonaria Italicorum non maculata. Cardiaca. Amaranthus. Cynoglossum vulgare. Lycopsis Rauuolffij.

LYCOPSIS DIOSC. QVIBVSDAM.



Lycopsis Diosc. ap. primè similis planta, radice nititur rubra, ex qua caulis surgit rectus cubitalis: Ex cuius parte ima plurima prodeunt folia rugosa, rigidæque, Buglossi syl: estis, nullo ordine in ambitu extensa, quæ summa velut minora sensim euadūt in cacumen vsque. In virginet aut plures diuiduntur ramulos, quibus minora rursus adhaerent foliola ut in Echio. Ex quorum sinu

Descriptio

flosculi

flesculi emergunt tenelli, purpurei, inferiori parte integri, in ambitu verò in sex angusta foliola Gariophyllorum sylvestrium instar diffracti.

Rauwolfii Itin. parte 1. cap. 9. Lycopsi Diosc. omnino similis. Item parte quarta. Icon. N^o. 20. *Ochsenzung* seu Buglossi species quæ vera Dioscoridis Lycopsis existimanda.

H. Lugd. append. pag. 18. Lycopsis Dioscor. Planta rara Cynoglossi genus, & ut arbitror vera Lycopsis Dioscoridis.

ECHIVM VETERIBVS IN GENRE.

C A P. V.

EChion, ut testatur Dioscorides, aliqui Dorida [*οἱ γὰρ αἱ δὲ* Paulus vocari scribit] Romani Alcibiadium siue Alcibiadion (Alcibion legendum putat Sarra enus, ut sit ea quam Plinius apud authores non reperi scribit) appellant: *folia* habet oblonga, aspera, aliquantulum tenuia [*ὀπίσθια* subalbida, *ὀπίσθια* Cæsalp. ex Oribasio,] Auchutæ proxima, aut minora & pingua [sunt qui addant hoc loco, *ὀπίσθια* rubra, *δασέα*,] tenui spinosa lanugine vestita [hæc vet. delet:] *cauliculus* graciles numerosos, utrinque verò minuta folia expansa, pinnatæque, nigra, ac minora quidem proportionem quàm summo cauli propiora sunt: *flores* autem secundum folia purpureos, in quibus & *semen* viperæ capitulo simile. *Radix* est tenerior digito [*αἰπυρία* *δακτύλου* vet. *δακτύλου* *ἀμύλου* *πλάτα*] & subnigra: quæ quidem non modò demorsis à serpentibus in vino pota auxiliatur, sed & eos à quibus præbita fuerit à serpentibus feriri minuit patitur. Folia & semen idem ipsum præstant. Sed & radix lumborum dolorem sedat, lactisque vberarem facit: in vino aut sorbitione sumpta.

Echij itaque vnius duntaxat meminit Dioscorides, Plin. verò duorum eius generum his verbis. Echios utriusque generis: pulegio similis, folijs coronata, drachinis duabus ex vini cyathis quatuor datur. Item altera quæ lanugine distinguitur spinosa, cui & capitula viperæ similia sunt: Echium verò prius lib. 7. cap. 5. etiam Alcibiium vocat, inquit: Alcibion [Alcibiadion legi Corn.] qualis esset Herba apud authores non reperi. Sed radicem eius & folia trita, ad serpentis morsus imponi & bibi iubent: folia quantum manus capiat trita cum vini meri cyathis tribus: aut radicem drachmarum trium pondere, cum vini eadem mensura.

Cornarius tandem Pseudo-anchusam Plinij lib. 12. cap. 20. non aliam, quàm Echion esse putat, de qua ita tradit. Est & alia similis, Pseudo-anchusa ob id appellata, à quibudam verò Echion aut Doris, & multis alijs nominibus, lanuginosior & minus pinguis, tenuioribus folijs & languidioribus. Radix in oleum non fundit rubentem succum: & ab hoc Anchusa discernitur. Contra serpentes efficacissima potu foliorum, vel seminis. Folia ictibus imponuntur. Virus serpentes fugat. Bibitur & propter spinam. Hæc est veteris codicis lectio, & recta mea quidem sententia, inquit Cornarius. Quod itaque dicit, radicem in Oleum non fundere rubentem succum, eius contrarium antea de vera Anchusa protulerat, sanguineum videlicet fundere succum, & oleo dissolui, aqua verò non posse liquari. Quod verò ait, virus serpentes fugat, hoc ego de odore

Tom. III.

eius dum sufficitur accipio. Sed quod dicit, Bibitur & propter spinam, videtur id esse quod Dioscorides ait, Sedat item lumborum dolorem, hoc est *παύει τὸν πόσιν τῶν ὀστέων*. Porro quòd Alcibiadion seu Alcibion eadem sit, quæ Echion & Echis, Nicander in Theriacis testatur. Galenus in Simplicium censu præterijt. Sed Paulus ex Dioscor. ut apparet, hoc de ipso prodidit. Echion aliqui Dorida; alij etiam hanc Alcibiadion vocant, spinosa herba est, quæ non solum commorsis à reptili bestia, cum vino pota auxiliatur, sed etiam præpota: commorsos illesos conseruat. Quam autem & Paulus & Plinius Dorida vocari Echis testentur, haud dubiè in Dioscor. *δακτύλου* vox corrupta, in *δακτύλου* commutanda est. Decantata hæc apud Nicandrum qui posthac nobis, & ut credo legentibus, certior in Echio dux erit, quàm tot seculis fuerit Plinius: Qui longius tractata Echij historia, paulò post, Alcibion qualis herba esset apud authores non reperiisse se dixit. Cum non Dioscor. tantum sed omnium apertissimè Nicander, eandem duobus nominibus d. & am fuisse quondam ostendant: Altero à viperis quas Græci Echis vocant, aut quia earum morsibus medetur, aut quia semina viperinis capitibus similia habet: Altero ab inuentore primòque remedij huius ex ea autore: quem Nicander aliq; Alcibion vocant: scribentes fuisse quendam nomine Alcibiū, qui secus acceam dormiens à vipera dente sub genu ictus fuerit: excitatumque à somno ex herba hæc succum commanducando expressisse, expressumque bibisse, mox quòd reliquum erat expressæ herbe vulneri imposuisse contra dolorem. Quod posteriores græci latinique à Nicandro Dionisioque accipientes Echion à viperis quibus medetur & à remedij auctore possessina forma Alcibiadium, & diminutiva Alcibiadion pariter dixerunt. Agremus de his longius nisi multò antè hæc tempora Nicolaus Leoniceus intet cætera errata hoc etiam numerasset: qui in nominibus magis quàm rebus occupatus, Quæ in diuersis scriptoribus diuersis nominibus alioquin eadem legantur diuersa credens, multa in medicæ materie disciplina trificuit. Nihil autem Nicandri in hac re historia certius audiri potest. Nunc age, radices dicant [inquit in Theriac.] Serpentibus adiutrices. Tum duo Echia [*ἑχίνια*] recensito. Hoc quidem alibi Anchusæ [*Ἀγχούρας*] assimile videtur spinoso folio, paucò liquidem alieubi paròque & in terra fundum, id est radicem, extendit. Altera verò folijs, & in calycibus flos sublimis, paucò verò vitæcum purpurascit flore. Germinem sicut viperæ, hirsutum verò supernè caput. Ab his quidem partem proscindens, aut cauto in ligno, aut mortario, aut lapidea pile scil. contunde: &c.

Cæterum, Echios, ut dictum, duplex est Plinio. Prior quidem folijs Pulegij quæ à nobis inscribitur Numularia libro 29. Echium dicitur de Ocimoide: Et nobis Echium vulgare quòd Alcibiadium & sylvestre Buglossum quibudam dicitur. Echium flore albo vulgare. Echium flore albo itaius. Echium tenuifolium. Echium flore pullo. Echium flore rubro. Echium Candide flore pulchrè rubente. Echium Germanicum Fuchij siue Borrigo sylvestris. Bugloss. fl. minore angustifolium. Buglossum minim. cum folliculo. Buglossum latiore folio &c. Anchusa Montepellulana. Lythospermum. Lythosperm. sylvestr. Dod. Pulmonaria. Borrigo. Alopecuros montana quibudam. Echium scorpioides siue palustre. Chamæpitrys folijs non

Vuu 3

incis. Personata. Scropularia maior. Stachys Matthioli.

ONOSMA VETERIBVS.

CAP. VI.

Onosma, teste Dioscorid. alij Osmadem, alij Phlonitum, alij denique Ononin vocant: filia habet ad similitudinem Anchusæ, oblonga, mollis quatuor digitorum longitudine & vnius latitudine, in terra iacentia, denique Anchusæ foliis quàm simillima. Est autem sine caule, sine semine, sine flore. Radicula verò subest longiuscula, infirma, tenuis, ac modicè tubescens. Gignitur in asperis. Folia in vino pota partus extrahunt, Sed & præghans si herbam (*πια* Lacuna legit in vet. cod. *πια*) eam supergradiatur, abortum facere creditur.

Phlonitis.
Ononin. Galenus lib. 8. de simpl. tradit [& ex eo Paulus] Onosma vel Osmada, vel Phlonitis, vel Ononin, ex acris & amara constare substantia: proinde quoque credi sævus necare & ejicere, foliis eius in vino potis.

Anch. simi-
lus. Plinius lib. 27. cap. 12. Onosmati longa folia tribuit ferè ad tres [quatuor Diosc.] digitos in terra iacentia, tria, ad similitudinem Anchusæ incisa, sine caule, sine flore, sine semine. Præghans, inquit, si edat eam, aut supergradiatur, abortum facere dicitur. Notat tamen Dalechamp. in Diosc. hist. nec tria legi, nec incisa. Hippocratem eam *πια* vocare. Galenum in voc. obsol. explicatione eam describere, & habere tria folia tradere, non animaduertentè eandem esse cum Onosmate. Dioscoridem vocari etiam *ὄσμηδα*, *ὄσμη*, & *φλόνιτις*, non, ut vulgò legitur, *ὄσμητις* autorem esse.

Rhiza Hip.
Phlonitis Eadem Guilandinus suis in Diosc. Græcum manuscriptis annotationibus habet. Prædictum Galeni lapsum etiam annotauit Robertus Constantinus, cui subscribit Lobelius in Aduers. pag. 177. dicens: Plantam Onosma, Radicem absolute Hippocrates cum vocasset, & descripsisset, magnus ille interpretes Pergamenus nec Onosma esse suspicatus est, sed seorsum duobus in locis, quasi duo fuissent, vnam eandem bis, & eisdem planè verbis, de Hippocrate mutatis, describit plantam, sine caule Anchusæ similem.

Id Amatus in Dioscoridem videtur sequentibus delineasse *ὄσμηδα*. Græcè, Onosma Latine. Nascentur plerumque inter Rapuncullos sua sponte in aruis nascentes, ita illis similis, ut sæpè (interdum parua est) pro illis eradiceretur, postquam verò adulta est, & illi folia maiora facta, hirsuta aliquantulum apparent, quam nos Ferratiz in horto magnifici Azaioli Scholasticis indicauimus, humi enim serpit, nec aliud propter folia emittit.

Equiuora. Onosma autem existimant nonnulli esse Buglossum sylvestrem siue Echium, de quo mox agemus.

ECHII SPECIES VARIE.

CAP. VII.

ECHIVM VULGARE.

Descriptio **P**assim obuium est Echium, caulibus interdum tesquicubito altioribus, hispidis, punctis nigris notatis, ab imo vlque ad summum ferè fastigium floribus onustis, atque iis, pulchrè cæruleis



vel ex cæruleo purpurascētib⁹, vel carneo. interdū albo colore præditis, staminib⁹ & apicib⁹ cōcolorib⁹: *filia* aspera, hirsutaque, oblonga, angusta, satua: *Radic* longa pollicari crassitudine, lignola, gustu nullo eximio.

Echium vulgare Hermol. in Diosc. coroll. 713. Hircinam linguā

vulgi vocat ac Circio simile facit, caule tamē esse rotundo ait, non anguloso vt Cirsion. Caule etiā rotundo esse tradit Ruellius hac longè eos hallucinari qui Cirsion arbitrentur esse.

Lycopsi.
Cynoglossi Cordus in Diosc. lib. 4. cap. 26. dicit Lycopsum à florum figura dictam esse, qui [scilicet flores?] hiantes suo rictu patulas luporum fauces imitantur. Et idè malè hanc ab aliquibus Cynoglossam appellari. Cap. verò 110. vocat etiam asperam Anchusam quam similiter malè Cynoglossum vocari ait.

Brunfels. tom. 1. Rhaps. 17. habet figuram sub titulo Buglossæ sylvestris, *Wild Ochsenzung*. Sed & Tragus lib. 1. cap. 77. hist. German. *Wild Ochsenzung* vocat, quam cum cap. Dioscoridis de Lycopsi conferendam putat. Ille autem eius figuram non habet hoc capite, sed fortè mala eius figura posita pro Cynoglossi cap. 76. Sic quoque Hist. Latina lib. 1. cap. 77. hanc vocat sylvestrem Buglossam & Lycopsum, eiusque descriptionem tantū ponit, figura enim quæ apponitur alterius est plantæ: fortè transposita est, videturque esse cap. 76. malè sub titulo Cynoglossi *Hundszung*: Hæc fortè occasio vt Fuchsius olim in historia confuderit duas plantas: Echii enim titulo cap. 101. pingit Borraginem sylvestrem, Cynoglossi verò cap. 156. Echium hoc vulgare, quod ibidem Cynoglossum officinarum vocat, & *κυνόγλωσσον* Græcè, Latine Linguam caninam, Germanicè *hundszung*. Gallicè *Langue de chien ou espèce d'orchanette*. Ast vt dictum confundit Fuchsius Cynoglossum vulgare cum Echio vulgari, vt satis apparet ex descriptione & figura, quæ eadem cum Tragi, quam Echium vulgare aliquatenus exprimit: idè Fuchsius errorem fortè agnoscens in iconibus pag. 264. eam figuram Lycopicos nomine donauit, ac Germ. *falsch hundszung* appellauit.

Harchius fortè in Enchiridio Echium Buglossam sylvestrem vocat viperinam, Gallis *herbe aux Vipères*. Brabant. *Wilde Bugloss*: Germ. *Wilde Ochsenzung*: Iudicent lectores: Nomen Germanicum non conuenit ex titulo fortè figuræ malè adaptatæ in Trago vt existimo.

An Marth. in Diosc. lib. 3. pro Dioscoridis Onosmate, Echium exhibet, quod quidem pingit sine caule, quale primo anno prouenit. Planta, inquit, quædam ex collibus, quos variis herbis refertos

refertos circa Goritiam natura collocavit, in asperis nata iampridem ad me allata est, quæ folia habet minoris Anchusæ, radices verò eius ita rubescunt ut quasi rubræ videantur. Ex his notis, quæ quidem pulchrè Onosmati respondent, non potui non adduci, ut tam verum onosma non putarem. Sed certè, ut verum fatear, mihi adhuc incompertum est, an hæc caulem, flores & semen proferat: siquidem eam hæcenus non nisi caule, & reliquis viduam videre mihi licuit.

Sed & Echij titulo eandem (sed annosam,) pingit lib. 4. ac dicit: Echion à viperis omnino nomen adiuvenit (viperæ enim Græcis *ἔχιν* dicitur) vel quod semen proferat capitibus viperinis simile, vel quod viperarum moribus præstantissimum sit medicamentum &c. Ignorasse Plinium Alcibion & Echium esse, satis manifestum est, quod scilicet Plinius non satis accuratè Nicandrum legerit. Gelenus non inuenio ullam Echij mentionem fecisse in libris, quos de simplicium medicamentorum facultatibus edidit. Paulus tamen eius vires describit Dioscoridem securus libro 6. *Hæc Matthioli*, qui passim Echij titulo solam dat iconem sine propria descriptione more solito. Quam enim hoc loco ponit ex Dioscoride desumpsit. Sed & testio Echij imaginem proponere crediderim Matthiolum eodem lib. 4. pro Cynoglossio Dioscoridis, quod à vulgari distinguit. Facile, inquam, crediderim Cynoglossum legitimum depictum à Matthiolo esse Echij nostratis, priusquam caules producat, figuram, licet descriptio Matthioli non respondeat. Nec quis miretur folia esse latiora, quàm in figura Onosmatis: sæpe enim in nostro Echio hanc varietatem observavi.

Amatus testatur Echium multos Sylvestrem Buglossum appellare: Et inter hos Brunfelsium graphicè eam pro silvestri Buglossio depingere. Echion eandem esse herbam cum Alcibiadio idque ex Dioscor. percipi, quanquam Plinium hoc ignorasse satis pateat.

Lonic. lib. 5. c. 152. titulo *wild Ochsenzung*, (id est Buglossi sylvestris) iconem exhibet non demonstrans quomodo differat à Buglossio suo vulgari quod Echium dicit: nec etiam qua in re diuersum sit à Buglossio quod alterum silu. dicit: ex eius iconè tamen differentia manifesta est, quia in Buglossio silvestri eius flores hiant. Idem rursus c. 156. vocat *Falsch bandzung* [Cynoglossum falsum, quod diuersum ab aliis sit:] esseque tertium genus Cynoglossi dicit, cui folia similia vulgari Buglossio flore purpureo. Mala icon, qualis Tragi, quæ representat Echium quod antè exhibuit pro Buglossio silvestri.

Dod. Gall. lib. 1. cap. 4. describit satis commodè, figuramque addit, ac vocat *ἔχιν* & *ἀνχίσιν*, Latine Alcibiacum, atque Apuleium nominare *ἰνεδέρον*, *ἰχιδιον* Græcè viperinam & Serpentariam Latine. *Miser* autem Dod. in Hist. gall. ca. 5. Vsurpasse Tragi & Fuchsi figuram pro Cynoglossio altera Plin. ac Cynoglossio tribuere caulem asperum: perpèdant lectores an non confuderit cum Cynoglossio vulgari Echium vulgare, Fuchsium imitatus: Habet igitur Dodonæus duas Figuras Echij vulgaris non multum probandas. In Hist. lat. pro Echio iconem habet Matthioli, quemadmodum & Lobelius: præterea pro Echij altera specie, iconem quæ à Lobelio ponitur pro Lycopsi altera Anglica.

Lobel. in Advers. pag. 149. dicitur Lycopsis,

vel Lycopsis, degener Anchusa *Ægineæ*, Matth. Cynoglossum, de qua ait. Nihil hæc habet Anchusæ, præterquam radiceis fuscum ex purpureo colorem: à quo Lycopsis deriuata fuit, id est, fuscedo obscuritas quæ sub crepusculum, quibusdam, inter canem & lupum dictum, visitur: nisi sit ab hispida caulis, foliorum, & florum, imperæque hirsutie, pedem imitata lupinum &c. Dicitur & *ἔχιν*, Echium, Buglossum agreste eidem Lobel. Germ. *wilde Ochsenzung*. Gallis *Buglosse sauvage*. Belg. *wild Ose tonghe*. Angl. *wild Buglossike better*. Is in Obseruat. p. 312. duas habet figuras: Vni hunc titulum fecit: Lycopsis altera Anglica, perperam Cynoglossum Matthiolo. Alteram, quæ est Matthioli, ita inscripsit: Echium floribus purpurantibus rubellis. In Icon. Plantin. pag. 498. easdem habet figuras, sed alteram Echium siue Buglossum siluestre inscripsit. *Figuræ* ambæ nostrum Echium vulgare referunt: quæ quidem Echij nomine proponitur similis est Echio Matthioli. Et à Dodonæo exhibetur pro Echio. Prior autem à Lobel. posita pro Lycopsi altera Anglica, dicitur Dodonæo Echij altera species.

C. Bauh. phyt. Echium 1. siue vulgare. Anchusæ species quibusdam: Echium colore floris ex purpura rubente: Et Onosma Matthioli. Lac. Cast. Lonic. Hist. Lugd. pag. 1107. Et Tab. Hos vnam & eandem figuram habere ait. Esse autem Lycopsi cognatam: Plantam autem se non vidisse fatetur. Item Lycopsis prima: Cynoglossum Dioscoridis Matthioli: Lycopsis altera Anglica. Hanc aliquando caule carere scribit, ut Matthioli. pingit, aliquandò verò caulem habere, quemadmodum utrumque Lobel. sua figuræ expresserit. *Nobis non tres sed vna eademque planta videtur Echium vulgare, Onosma Matthioli, & Cynoglossum Dioscor. Matthioli, ut pluribus antè monuimus, & posthac dicemus.*

Sic Echium Matthioli Historiæ Lugd. p. 1107. Itemque Onosma Matthioli pag. 1107. Et Cynoglossum Matthioli. pag. 1161. eandem plantam statuimus.

An Turner. Anchusa 2. Dioscoridis in Anglia alicubi vocata *Cattis tagles*, aliàs *wild buglosse*? An Cæsalpino Echion passim iuxta semitas nascentis locis aridis, candidior Anchusa & lanuginosior &c?

Passim prouenit Echium Montpelij: Montbelgardi etiam prouenit & viret tota heme priusquam caulem ferat; perit enim postquam altero anno protulit: floret Iunio & Iulio passim in muris, etiam in horto E. C. Parauij vidi & Lugduni, ac Genææ florens mense Maio passim in viis & muris. Frater annotauit Guilandino dici Anchusam primam Dioscoridis. Fuchsium cum Tubingæ apud illum essem vocabat Lycopsim Germanicam purpuream. Obseruavi Basilæ florentem Octobri itinere versus Montem, ad fluuium Birse intra urbem, ad Portam *Stein & Tollenberg*, & quæ itur *Kremzsch* cum flore Iunio: flore albo Montbelgardi supra murum vidi. Secus viam & semitas, necnon agrorum margines, ac in desertis agris prouenit. Latum pingueque solum amat: Locis gaudet apricis, totaque ætate floriferum est. Semen interea maturatur: hieme folia restant, ut author est Dodonæus.

Dictis talibus, non ducimus esse necessarium multis prosequi vires & usus, tam Echij quàm Onosmatis. Hæc annotasse breuiter sufficiat.

Locis & Tempus

Echium inquit [Ioh. Fabr. de providentia Dei contempl.] habere semen instar viperini capitis, maculosum præterea caulem instar cutis serpentinæ: ex floribus autem serpentinæ linguæ modo, seu lingulas multifidas porrigere. Ideoq; ad viperarum inoritur valeat. De Buglossæ (Echij) intelligo radice experimento constare indubitato scribit Ioh. Agricola, quod si animali fuerit appensa, cuius vlcus aliquod vermibus scateat, per se & sua sponte vermiculos illos detriduos futuros atque vlcus relicturos. Vidi ego in Lutrensi dioecesi versus Belfort mulierem, Echium (quod *Rebanum* vocabat) colligentem, ut pedi equi applicaret ad extrahendam spinam. Vixit enim ad Epilepsiam & febre Echij [vulgo *Ochsenzungen vum*] radice sumendam præcipit, siccandam & in puluerem redigendam, pulueremque drachmæ semis pondere cum vino aut Cerevisia propinandum, Sylvestris Buglossæ, quam Lycophilum appellari Trag. diximus, recentibus vulneribus, morfu vel percussione ortis medetur. Radix cum farina hordeacea trita, oleo que decocta, & emplastri modo imposita, sacris ignibus auxiliatur.

ECHIUM ALBO FLORE MAIUS.



Echium hoc albis floribus hiantibus præcedenti simile est, sed multo maius, & asperius ferè, robustum, rectum, in alas valde dinaricatum, nusquam autem id vidi nisi Montspolij. Echij flore albo, et vocat Camer. in Ep. descriptio tota mea est olim missa Gellero, figura est facta ad

plantam meam si, cam. additum & transferri solet in hortos: quis transulerit hæcenus nescimus: flores picti in inferiore parte tabellæ non sunt Echij albi sed Anchusæ luceæ.

Anchus. luc.

C. Bauh. phyt. Echium flore albo maius & asperius: Echij primum siue vulgaris varietas, cuius caulis aliquando duorum triumve transectorum digitorum latus inuenitur.

ECHIUM TENUIFOLIUM.

Densis ramis præditum est, tenuissimis illis quidem, & satoreis ramulos crassitudine vix superantibus, multo tamen hispidioribus, Echij vulgaris, hoc est, & longioribus & rigidioribus, & crebrioribus, veluti spinulis horrentibus: silis satoreis foliis paria, multa etiam tenuiora, asperitate maiore quam Echij nostratis: flores



ECHIUM PVLLO FLORE.

recentibus ramulorum scapis hærentes, satis magni, patuli, caerulei: dedit Dominus Doctor Rázius collectum apud Volmam in foro Iulio.



Pedalem habet caulem, striatum, villosum, foliis Echij, aut Buglossæ sylvestris, molli lanugine præditis, & inæquali situ ipsum ambientibus ornatum, superiore parte in multas alas diuisum, quæ deinde in breues ramulos sese findentes, multis flosculis concavis, extrema parte in quinque crenulas diuisis, coloréque ex atro purpurascens, præditis, onustæ sunt, qui ex vasculis molli lanugine hirsutis & inter folia latentibus prodeunt: semen ut in eiusmodi generis plantis, viperino capiti simile: radix oblonga, minimi digiti crassitudinem æquat interdum, foris fusca, paniculata, que tenuibus fibris prædita, capita vnde caulis prodeunt exuberante, & præcedentis anni caulis vestigia seruante: præmorsa folia, nullum initio manifestum saporem peculiarem præbent: sed postea non nihil acrimoniæ habere videntur.

Clusius Pann. pag. 679. & Hist. post. Echium Synonymum & Echium pullo flore. C. Bauh. phyt. Echium 1. siue sylvestre lanuginosum.

Crescit multis locis Viennæ vicinis, tota etiam inferiore Austria & Pannoniæ parte, siccioribus præcis, & graminatis locis ad Collium radices, atque in ipsis collibus nudis & tenui duntaxat gramine obsitis.

Flore Maio.

Locus & Tempus.

ECHIUM

ECHIVM RVBRO FLORE.

Oblonga & augusta habet *folia*, villosa, vulgari Echij fere similia: paulò tamen latiora, humi strata: *caulem* modò pedalem, aliquando cubitalem, firmum, striatum, lanuginosum, maculisque purpureis conspersum: quem inconditò ordine multa ambiunt *folia*, internis breviora & angustiora, non minùs tamen hirsuta: summum caulem exornant multi breues ramuli in se veluti conuoluti, atque Scorpioni instar inflexi, pleni *florum* vulgaris Echij floribus similibus,



sed colore rubro eleganti præ litorum, qui proximè caule primùm aperti incipiunt: excusso flore, *semen* ut in aliis Echij generibus apparet in caliculis nigrum, viperino capiti simile, sed minus: *radix* satis longa, dura, & lignosa, nigro coit ce recta summo capite multos interdum caules promens, sed maxima ex

parte duntaxat vnicum.

Synon.

Clus. Pannon. pag. 680 & 681. & Hist. post. lib. 3. cap. 50. Echium rubro flore, Echium secundum C. Bauh. phyt. Echium 4. siue silvestre secundum maculatum, colore floris nunc intensiore, nunc dilatiore.

Locus & Tempus

Abundè admodum siccis pratis suprà & infrà Sopronium Vngariæ urbem, nusquam verò alibi, hanc plantam obseruabam, Maio florentem, nunc saturatè rubentem, modò dilutiore colore prædiam.

Echium Candia, flore pulchrè rubente.

Anno 1595. dedit mihi Dom. Sprengerus Heidelberg plantam siccam nomine Echij Candia. eadem mihi prouenit Moniberg. in horto E. C. Montebelgard: ex semine misso Sturgardiam per Casabonam sub titulo, Anchusæ rubræ Creticæ. Tota planta candidior erat Echio vulgari, magis ramosa, flores forma similes nempe hiantes: sed colore diuerso pulchro, scilicet rubente: florebat Iulio & Augusto.

C. Bauh. phyt. Echium 1. siue rubrum Creticum: Echio vulgari minus, sed ramosius, paucioribus floribus, eleganter rubentibus: tota facie Lycopodium alteram Anglicam Lobelij [Echium vulgare] plurimum referens. An Clusio b. post. Echium 3. Echium Creticum primam: Echium Candia, flore dilutè rubente.

ECHIVM SCORPIOIDES SOLISEQVVM.

flore minore, & aliud maiore, cæruleo & albo.

Ex radice nigra fibrosa, cauliculi tenues hirsuti aliquot assurgunt, ramosi, dodrantes, qui Tom. III.

bus sine pediculis adnascuntur *folia* vnciam circiter longa, tridentem pollicis lata, in obtusum mucronem desinentia, hirsuta, murinis auriculis similia, sapore satuo. *florum* series agminatim instar caudæ Scorpionis se contorquet, minimorum, cæruleorum, fundo luteolo, in quinque lacinas diuisorum.

Congener superiori & hæc species, ex ea quæ cognoscenda: *folia* longiora, multò minùs hirsuta, ut ferè glabra esse videantur, ut & caulibus flores paulò maiores, cærulei vel albi, eodem

Descriptio

modo se contorquent, umbilico croceo, sed plusquàm triplo maiores, æqua superficie se explicantes, radiato stellæ positæ.

Brui. feli. Tom. 1. Rapodia 28. Cynoglossum minorè, *Rembunds*, *zurg* vocat plantam à nobis primo loco descriptam.

An Tragò Auricula muris minor?

Hinc Apollinaris l. 2.

Vergiss mein nit & *Gamedern* vocat. Figura aurem eius respondet priori nomini. non item Chamædri, cuius tamen vires recitat, ita ut duas plantas confundere videatur: in alia tamen editione alia est figura nempe Chamædrii adulterina.

Marthiolo in Dioscor. lib. 4. cap. 186. est fortè Heliotropium minus quod in Tridentino agro in palustribus quibusdam locis legit: non quidem quod pinxit, picturam enim existimo ad descriptionem Dioscor. factam, & nunquam visam ut pictam, melius alioqui descripsisset. In post. com. cum magnis figuris eandem figuram retinet.

Lonic. lib. 4. cap. 335. pingit ac vocat *Vergiss mein nit*. Item *Frauen bist oder holst* quam dicunt Græcis Leontopodium Latinis pedem leonis: Item Cernos Græcis & Rhapeion Plinij Ruelio: qui vocari refert Gallis Cruciatam. Loniceros autem non mihi videtur intellexisse Ruelium, cuius Cruciatæ & Leontopodion alia planta videtur: nec descriptio à Lonicero posita respondet figuræ quam ponit, nec plantæ quæ dicitur *Vergiss mein nit*.

Gest. horr. nominat Scorpionides aquaticum, *Vergiss mein nit*, atque: Huius generis marem & feminam Dodonæum lib. 1. iconum pinxisse, quæ passim ab herbarijs Scorpionides appellabantur.

Humelb. apud Apul. cap. 96. Alteram Cynoglossam appellat sine caule, uti Diosc. tradiderit, hancque Teutonicè *Vergiss mein nit* vocari putat. At hæc herba habet caules.

An Lobel. in Aduers. pag. 193. Myosotis hirsuta reptans? An hanc in Obi. pag. 145. pingit dicens: Myosotis hirsuta reptans Adu. pag. 193. an Elatine Dioscoridis quibusdam? An ei dicitur in Icon. Plant. pag. 461. Alfine Myosotis, siue Auricula

X x x

muris. Item p. 462. Myosotis Scorpioides par-
tim repens, partim erecta.

H. Lugd. p. 1360. Heliotropium alterum Mat-
thioli. Item Heliotropium minus Matthioli:
Quod histor. pro primo exhibet: quid sit nescio.
nisi forte Echium Scorpioides, non bene pictum:
minus Heliotropium est figmentum Matthioli.

C. Bauh. phyt. Echium Scorpioides 1. siue at-
tenuate magnitudine varians. Trago Auricula mu-
ris 3. & Euphrasia 4. Euphrasia caerulea Cyno-
glossa minor Brunf. in 4. p. 83. Lobel. icon. Myo-
sotis, Echium Scorpioides 2. siue palustre.

Locus &
Tempus

Echium minus quibusdam alijs Scorpioides
minus, herba est gaudens locis aquosis, cuius fo-
lia hirsuta mollia. Flores parui inroquantur ut
soleat Echia & Heliotropium magnum. Floret
Aprilis & Maio ad ripam fluminis Montepessuli
propè Castelneuf. Basileæ vidi florens Maio &
Iunio, & circa montem Krentzak. Lugduni, ut
& Geneæ in monte Thuri pulcherrimo flore
copioso. Montbelgar di passim abundat: florens
Iunio & Iulio: ut & in horto illustr. E. C. Fuch-
sius cum apud illum esset Tubingæ vocabat E-
chium Scorpioidem flore rubello.

CYNOGLOSSA FORTE TOPIARIA

Plinio, siue Echium Lappulatum
quibusdam.



A N N O
1561. men-
se Iunio, in
Rhætia Bur-
mil prope Bal-
neum ad fon-
tem aquæ dul-
cis inuēta mi-
hi planta hæc
bucubitalibus
cauliculis, cul-
tura etiam lon-
gè altioribus,
angulosis bra-
chiatis, conca-
uis, vncinulis
rigidis, asperis,
ad vestes ad-
hærentibus, per
terram se spar-
gentibus, nisi
in propinquo
sit quod scan-

dant: folijs binis, aut ternis, duas vncias longis,
vtrinque reductis & angustis, quorum infima su-
perioribus obtrusiora, subrotunda, *flosculi* ex vio-
la purpurascens ex foliorum alis breuib. pe-
diculis donati, parui, quinquepartiti, corol-
lam in medio ex foliorum appendiculis defor-
mantes, sub qua occultantur apices lutei, quibus
succedunt in dem inclusa *semina* fusca selamoi-
deis paulò maiora: *radix* recta, minimi ferè di-
giti crassitudine, fibris aliquot donata, odor &
sapor totius plantæ qui Borragini.

Lobelio obseru. p. 466. Alysson Germanicum
Echioides. Hist. Lugd. pag. 1141. Alysson Germa-
nicum Echioides Lob. C. Bauh. phyt. Cynoglos-
sum 7. Cynoglossa topiaria seu repens: quibusdam
Aparine Plinij lib. 27. cap. 5. alijs eiusdem lib. 28.
cap. 7. Parthenium, cui potius Cynoglossos to-
piarijs operibus gratissima eiusdem.

Primum vidi in Rhætia ut dictum: Habui Ge-

neux in horto. Videretiam Basileæ florentem &
semina habentem matura mense Iulio. Habe-
bam etiam Lugduni in horto. Montbelgar di, in
horto illustr. E. C. mihi prouenit sæpius &
abundè.

LYTHOSPERMVM SIVE MILIVM SOLIS.

CAP. VIII.



Pollicari
circiter
crassitudine
est *radix*, li-
gnosa, fibras
aliquot à la-
tere fundens:
à qua surgunt
caules com-
plices, partim
erecti, partim
procidui, albi-
di, tactu aspe-
ri, in alas di-
uisi: *folia* mo-
dò alterna,
modò oppo-
sita, longa,
stricta, hirsu-
ta, sapore vix
alio quàm
herbaceo: *fo-*

sculi albi, parui, quinquefolij, in calycibus ob-
longis, hispida, quibus *semen* succedit cinereum,
inuictæ duritiæ, læuitatis eximie.

Lithospermon auctore Dioscor. propter se-
minis duritiæ: à qua & Lithospermi nomen ac-
cepit folijs est oleæ, longioribus tamen, laci-
oribus acque mollioribus, & ijs quidem quæ in imo
à terra exiliunt humi iacentibus; ramulis rectis,
tenuibus, acuti iunci crassitudine, firmis, lignosis:
χλωδον [Orib. *χλωδον*] in quorum acumine bis-
da propago cauliculorum speciem exhibet, folijs
longis [*μονα*]. Lacuna legit in vet. cod. *μονα* Sic
& Orib.] inter quæ semen [vet. addit *ωσπερ*]
Lapidea duritie, rotundum, candicans [*λευκον*]
Sic etiam Orib. & vet. codex. Lacun. verò *λευ-
κον*, vulgata exemp. *λευκον* & *λευκον*] erui parui
magnitudine. Nascitur in asperis & editis locis.
Vim habet semen cum vino albo potum calculos
frangendi, vrinæque pellendi. Inter omnes her-
bas inquit lib. 27. cap. 11. Plinius, Aliqui *Ego-
ny*, non vocant, alij *Diospyron*, alij *Heracleos*.
Herba quincuncialis [quinque caulibus M.] fe-
rè, folijs duplò maioribus quàm Rutæ [oleæ
Diosc.] ramulis furculosis, crassitudine iunci:
gerit iuxta folia singulas veluti barbulas, & ca-
rum in cæminibus lapillos candore & rotun-
ditate margaritarum, magnitudine ciceris, duri-
tia verò lapidea. Ipsi quæ pediculis adherent
[Hæc postrema verba Herbarius Anglus inel-
ligenda putat de Lithospermo arundineo, quod
lachrimam lobi officinæ vocant] cavernulas ha-
bent, & intus semen. Nascitur & in Italia, sed
laudatissimum in Creta. Nec quicquam inter
herbas maiore quidem miraculo aspexit. Tantis
est decor, velut aurificum [aurum emicans, M.
fortassis, auro emicante, & alternis] arte, alternis
inter folia candicantibus margaritis: tam ex-
quisita difficultas lapidis ex herba nascentis
lacere atque humi serpere auctores tradunt
[Lithospermon secundum describi hæc voluit]

Ego

Ego vultam, non harentem vidi. Iis lapillis drachmæ pondere potis in vino albo calculos frangi, pellique constat, & stranguriam discuri. Neque in alia herbarum fides est visus [vultus] statim, ad quam medicinam nata sit. Est autem eius species, ut etiam sine auctore visu statim nosci possit.

Galenus & Aëtius Lithospermon in simplicium censu omiserunt. Lithospermon, inquit Paulus, quod alij Liosporon, alij Heracium vocant, herba Ætonychi dictæ semen est. Lapidotum, album hoc in vino albo porum, calculos atterit, & vrinas ducit.

Sunt præterea, inquit Marcellus, qui Leontion, vel Leonticam herbam, qui Tantalixim vocent. Daci vero Gonoletam, Romani Columbam appellant: quæ appellationes suo quæque modo lo indicant Lithospermi seminis duritiem.

Nostrum Lithospermon, inquit Fuchsius, multò minus quàm Dioscor. & Plinius tradiderunt semen profert, quod soli diversitati acceptum referendum erit.

Tragus pro milio Solis describit & depingit, dicitque tantâ diligentia historiam illius persecutum esse Dioscoridem, ut vel cæcus Milium Solis solo tactu agnoscere posse videatur. Plinium semen ipsius Ciceri conferre, & rectè quidem quantum ad figuram attineat, ut si magnitudinem spectes non item. Nam milium Solis non multò maius esse milio satino, quod inter fruges & legaria refertur. Eius porro iudicio, hæc herba rectè Saxifragum album [h. e. *vulvæ Steinbroch*] diceretur, licet Officinæ Milium Solis, Granum Solis, Semen lapideum & lapidosum vocant, alij verò præter hæcenus recensita nomina, etiam Leonium lapideum, Dioplyron, Heracium & Viguem aquilinum appellarint. Mauritanii *Kalb* [Serapio semen ita vocavit, herbam verò Aftonchon Trag.] *Culb*, *Colt*, seu *Cult*. *Calit*, *Calab*: Hebræi *Do han*, Chaldaei *Armel* teste Fufio, runcuparint. Germani *Meer* & *Schiffamen*. Belgæ *Peelenkrans* & *Steinfact*: Gall. *Gemilet*, *Herbe aux perles*. Ital. *Lithospermo* & *Milium Solis*: Hisp. *Mino del Sol*, *hierua Milbart*. Angl. *Gromell*. Boh. *vvraby*.

Quod itaque Græci *λεόντιον*, Latini quoque Lithospermon vocant, hodie Seplassarij & omnes ferè medici Barbaros secuti Milium Solis nominant. Licet rectius fortasse, teste Lobelio & Matthiolo, Mauritanorum imitatione, *Milium Soler* vocaretur. Quandoquidem [ut scribit Serapio] frequens nascitur in montibus Soler: unde illi aptius fortè à loco, quàm Sole cognomentum imponeretur.

Videtur porro Amatus Lithospermon vocare Lachrimam, Lachrimam Mariæ: vulgò Lachrymam simientem, & Germanicè *Marienneben*. Negat is & pertinaciter quidem Milium Solis esse Lithospermon, quod Phalaridem esse concludit, magno errore.

Fuchsium quoque Lithospermon Dioscoridis non cognovisse arbitratu Matthioli, quod pro vero Lithospermo Milium Solis minus officinis appellatum depinxerit. Verùm ipsemet Matthioli non novit, ceu & Amatus, qui Lithospermon nigrum [de quo mox] quod maius cognominat, genuinum credit, sed fidens suæ figuræ falsæ Lithospermi maioris immeritò reprehendit Fuchsium.

Turn. part. Lithospermon Herbarijs vulgò & off. Milium. Germ. *Steinfamen*, Gall. *Gromel*. Angl. Tom. III.

vocari debet *Græmil* [i. milium griseum] non ut vulgò sit *Grommel*. Putat Matthioli Fuchsio ignotum Lithospermo verum Dioscoridis, quod [ait] Milium Solis minus pro Lithospermo proponat. Debebat tamen Matthioli ex Dioscoridis descriptione probare Milium Solis Fuchsij non esse Lithospermon verum, tum demum potuisset Fuchsium erroris insimulare. Verùm meo quidem iudicio minus notum est Lithospermon Matthioli ipsi, quàm Fuchsio. Nam quod ille proponit Lithospermon, nec Plinij nec Dioscoridis descriptioni respondet: &c.

Planta à nobis depicta & descripta dicitur *Synonyma*. Milium Solis, Milium Solis primū, siue sativum Trago. Lithospermon minus Matth. Dod. gall. Gesn. de hort. Lacun. Lobel. Castor. Lugd. Lithospermon Fuch. sol. Cord. in Dioscorid. & hist. Lonc. Lithospermon sativum Fuch. icon. Lithospermon legitimum Clus. h. Pann. Lithospermon arvense, Tab. Lithospermon vulgare minus, Cam. Saxifraga terrea, Brunfels. Sax. fraga alba & Cauda porcina. Euch. Rœsslin. Lithospermon minus Camer. in Epit. & Hist. Matthioli germ. Græcis *λεόντιον* & *λεόντιον*. *Lithospermon min. re*, *Miglio saluatico*, seu Milium Solis. Germ. *klein Meerbirse* seu *Steinfamen*.

H. Lugd. duas habet figuras vnius plantæ. V. nam pag. 1176. cui titulus est, Lithospermon minus Matthioli: alteram pag. 1176. quam sic adscripsit, Lithospermon Fuchsij: minus Dodonæ. Apud Dorsthenium pro Milio Solis malè ponitur icon Polemonij petraei Gesneri.

An Thalis [quod affirmat C. Bauh.] Lithospermon alterum fruticosum in Hærcinæ vicinis quidem montibus non infrequens versùs meridem sitis: in ipsis vero Hærcinits nondum visum.

C. Bauhin. apud Matthiolum [ubi hocce Lithospermon 2. siue malus erectum vocat] præmittit sex Lithospermi genera. Est, inquit, maius, minus, & minimum, illud vel foliis oleæ, vel arundinaceis: minus vel latifolium, vel angustifolium: minimum Passerina dictum, quod vel Germanicum, vel Monspeliacum. Sic hic quinque solummodò declarat, sextumque tanquam sibi ignotum silentio inuolat. In Phyt. [ubi septem quoque genera statuit, licet primum & secundum malè separet] Lithospermon hoc quarto loco recenset. *Pero* cum parum considerasse quæ scripserit.

Ex semine mihi provenit in hort. E. C. In varijs locis provenit spontè, ut circa Arbonans pagum Monbelgardensem, & non longè à Leproforum Domo, Genèz iuxta monticulum *la Bassie*. Lugdun. vidi florens Maio. Basileæ cum semine Octobri inter Bilsam & S. Iacobum, & in itinere versùs montes, copiose etiam inter Basileam & Ormazum: Prope Patavium in Italia & ipse Veronam & Castellum franc. Passim pluribus Italiæ Galliæ, Germaniæ, ac etiam Britanniæ locis exit. A solstitio æstivo ad Autumnum usque floret: interea & semen perficit.

Semen cum vino albo porum, calculos frangit & vrinam ducit, auctore Dioscoride. Ego quidem non existimo nec hoc semen, nec ullum remedium calculos frangere. Picuitam vel crassos humores ac viscidos arenulas vel calculos glutinantes dissolui & pelli hoc semine non dubito. Datur id utiliter potandum diebus pluribus (scilicet) qui drachmæ pòdere, addita Asplenii semidrachma, & succini scrupulis duobus ex succo plantæ.

ginis aut portulacæ aut lactucæ ad gonorrhœam cohibendam: peculiariter autem iuvat feminas ægrè parturientes, si seminis drachmæ dux in puluerem contriti ex humano lacte propinentur.

LYTHOSPERMUM NIGRUM

quibusdam flore albo, semine Echij.

Lithospermum nigrum radicem habet lignosam rubentem, mediocri crassitudine, ex qua plures surgunt caules, pedales & longiores, hispidi, ramosi, folijs vestiti, ad milij Solis vulgaris folia accedentibus, mollioribus, minoribus, asperis, nigricantibus, de quorū magnitudine quod superiorem locum obtinent, eò plus decedit: per ramos longa serie ex intervallis flores cernuntur Milij Solis, parvi, albi, quibus subiecta sunt folia oblonga, angusta: semina succedunt terna vel quaterna coniuncta, nigra, Echij aut Buglossi vulgaris seminibus similia.

Tragus plantam à nobis descriptam vocat Milium Solis secundum, & Lithospermum silvestre, vulden Meerbirff. Cacaliā Plinij esse præterea existimat, at ita describit. Silvestre Milij Solis genus, in quibusdam hortis apud Mediomatrices repertū, folio, caule, flosculo & semine iam dicto per omnia simile, nisi quod semen profert, non adeo læve & glabrum, sed rugosum aliquantulum, ad vulgarem Buglossam eatenus prope accedens. Semen huius similiter Iulio mense maturum conspicitur.

Dodon. gall. Camerarij hort. Epit. & Hist. Germ. Matth. Lithospermum silvestre, aruense vel nigrum, Græcis λιθοσπέρμον ἄγρον, Germ. vulden Meerbirff.

Gesl. de hort. vocat Lithospermon minus Worcellij. Id nimirum quod à Matthiolo pingitur & in arvis spontè exit: quod ipsum etiam in hortulo Tiguri in fine Iunij ferè defloruit. Idem verò in append. pro Echio maiore describit.

Hanc eandem de quadrup. [ut fallor] facit Lithospermi alterum genus, parua & inutili radice folijs & granis minoribus, locis culis nascens in arvis.

Lob. in Icon. Plant. pag. 459. Anchusa degener facie Milij solis, semine Buglossi aut lux rotundior, radice rubra.

Thalio in Hæc. dicitur Anchusa aruensis alba. Echium minus Gesl. in Append. Lithospermum sylv. Tragl. Anchusis autem annumerat propter radicem Anchusæ modo rubentem. Hort. Lusit. Anchusa silvestris aruensis alba. C. Bauh. phyt. Matthioli. Lithospermum, siue aruense, radice rubra. Lithospermon silvestre Trag. Fuchf. Dodon. gall. Camer. in Matth. Lithospermum tertium. Dodon. fol. Lithosp. nigrum, Lugd. Anchusa degener facie Milij Solis, Lob. Anchusa tertia Lithospermo similis, Cæsalp. Anchusa aruensis minor facie Milij solis, Tabern.

An est Anchusa minima Cordi in Hist. lib. 1. cap. 23. An Matth. Lithospermum maius, legitimum, omnibus propè, excepto Fuchfio, nunc compertum: An Amato in Diosc. lib. 4. cap. 155. Lithospermum maius? Huic qui figuram apposuerunt faciunt ei iniuriam quia eius non meminit in contextu. Forè vnus plantæ duas habet figuras, & duas plantas confundit. Gerardo Lithospermum secundum minus, Smal

Bremell. An eadem quoque Lithospermum primum maius? videtur enim imitatus Tabernamontanum diuersas confundere plantas. An Anguillaræ epist. 13. Lithospermum alterum? An R. Const. in Lex. Melampyrum semine verticillato, tribus vel sæpius quatuor granis? An Cæsalp. lib. 11. cap. 8. Anchusa alia, Anchusa tertia [minorem intelligimus] similis, iisdem locis nascens, fruticosior, seminibus non scabris, sed lævibus, initio subrubentibus, postea albescentibus, specie Lithospermi.

Sæpius habui in horto E. C. Monbelgardi ex semine quotannis se propagantem. Florat Monspelij verè: Burmij in Rhætia cum peregrinaretur Gesnerus & ego invenimus in segetibus, cum apud illum esset habebat Tiguri in horto & Echij faciebat speciem. Dalechampius verò Myagrum, quod placebat. Genevæ provenit in segetibus, habebam verò in horto ubi ex semine deciduo tota ferè hieme florebat & virebat. Basileæ inveni mense Octobri in itinere versus Krätzach ultra Renum, & Maio florens in segetibus. Patauij etiam vidi, & Veronæ in Theatro, ac inter Veronam & Villanovam florens Maio.

LYTHOSPERMUM MAIUS DODONEI

flore purpureo, semine Anchusæ.



Sproculis pluribus do-
natum est, pe-
dalibus & cu-
bitalibus, te-
nibus, nigri-
cantibus, hi-
spidis, quos
folia vestiant
vincias duas
circiter longa,
semunciam
lata, in acumē
desinentia, ex
saturato vitore
nigricantia,
hirtuta, alpe-
sa: flores ex-
tremis herent
ramulis con-
fecti, maiores

quàm Anchusæ alterius, violacæ: semina Anchusarum vel Echiorum, albicantia, rugosa: radex longa, crassa, lignificans, tortuosa, nigra.

Dodon. gall. & lat. Lithospermum maius, Grand Gremil, vocat. Hoc quidem in Italia, sed laudatissimum in Creta nascitur: repertum verò & spontè natum in Narbonensi Gallia in Germ. hortense, aut officinis incognitum esse.

Lob. in Adn. p. 191. Lithosp. minus Dod. Epit. 339. Miror hanc referri ad Lithosp. quum potius semina habeat Anchusarum vel Echiorum seminibus similia, vix etiam maiora quam in Milio solis, uti nec folia nisi fortè cultura reddatur maius: quam obrem nec mihi placet quod maius dicitur ab Aduersarijs. Hoc Lob. in Obs. p. 145. in Ic. Plant. p. 458. pingit, vocans Lithosp. maius. An verò id quod Lob. dictis in locis exhibet pro Lithos. Anchusæ facie non sit idē aliis iudicandum relinquo. Lithosp. vulg. maius florib. caeruleis. An Thalio in Hæc. Lithosp. virgariū repens florib. in cæruleo eleganter purpurascētib. Clus. in Pân.

pag. 614. & itémque in Hist. post. Lithospermum repens maius vulgò vocatum. Hist. Lugd. p. 1177. Lithospermum maius Dodonæi. Item pag. 1178. Lithospermum Anchusæ facie Lobelij. Ad hæc pag. 1128. Pulmonaria minor Dalechampiij, Aliis Echium primum Plinij. *Habet* ei multum fallor Hist. Lugd. tres figuras vnius plantæ. Gesn. hort. in append. Cynoglossus minor, ni fallitur, appellanda planta.

C. Bauhin. phyt. Lithospermum primum siue minus repens: flore partim rubente, partim cæruleo. Ad Echium, vel ad Anchusas referri potest. Hoc Lithospermum Dioscor. & Plinij esse aliqui volunt. Lithospermum Anchusæ facie Lobelij. Multum cum primo convenit, discrepat tamen in eo, quod non ut prius repit cauliculis, sed erigitur. *Nobis non duæ videntur Plantæ, sed vna, varians solum solo natali.* Lithospermum verò secundum, siue minus erectum videtur apud Maub. C. Bauhinus Lithospermum frutescens agrostifolium nunc upare.

Lithospermum maius Dodonæi copiosè provenit circa montem vicinum dictum *la Chan* in dumetis, iuxta meas vias. Frater Casparus Bauhinus invenit Basileæ in sylvis cundo Dornacum. Genoux florens observavi mense Maio in Colle iuxta *Arue* fluvium, quæ sita in *Champs*, iuxta cataractam aquarum: *Chamellum* Monspelij reperi florentem Vere circa Castelnouf inter dumeta, non longè à montibus.

SYMPHYTUM MAIUS VETERIBVS.

CAP. IX.

Dioscorides de Symphyto altero inquit: Symphytum alterum, quod aliqui Pecton vocant, *autem* emittit bicubitalem [Ver. legit hirsutum, bicubitalem] aut etiam altiore, lævem, crassum, aægulosum, & seu Sonchi inanem: (V. caret & Orib. circa quem ex intervallo haud ita magnis *filia* exeunt hirsuta, angusta, [V. subangusta & subexigua] longiuscula, ad Buglossi foliorum similitudinem: h. bet verò cauli. eminentias quasdam secundum angulos porrectas. [Al. extensas, alias tenias ad locum cuiusque ait] [Apul. adnationes secundum genicul.] adiacentibus ac velut annexis foliis tenuibus [Ald. foliis tenne] quæ è singulis prodeunt alarum sinibus: sunt insuper flores lutei [huius florè nigrum perperam dixit Apuleius, pro *phara* legens *phara*: Ald. addit in nothis, rotundi ut Rutæ] & semen circa caulem seu Verbasci. Totus autem caulis [V. semen.] ac folia quoque ipsa subaspera lanugine horrent [V. addit, subalb.] actûque pruritus excitant. Radices demittuntur foris nigre, intus candidæ glutinosæ, quarum etiam est usus [V. epit. ex contrariis constat facultatibus.] Tritæ & potæ sanguinem excreantib. ruptisq; proficiunt, & recentia vulnera imponere glutinant: Carnium quoque frusta quibuscum coquantur coeunt, ita ut coalescant. Ceterum inflammationibus præsertimque sedis, cum senecionis foliis utiliter illinuntur.

Galenus 8. simpl. ait Symphicium magnum, siue Symphytum alterum, similem dicto [sc. petrzovim] habere: non tamen gustantibus dulce esse, nec odorantibus odoratum. Sed his sanè à modò scripto diversum. Ceterum quatenus viscositatem quandam & mordacitatem obrinet, scillæ simile esse, vni que ad omnia, ad quæ petræum.

Symphyti maioris Plinius pluribus in locis meminit. Ait de hoc lib. 16. cap. 7. Symphyti radix illita Enterocelas cohibet. Idem lib. eodem cap. 15. Symphytum ad cicatricem celerimè perducit cap. 15. Symphytum tritum in vino nigro euocat [renocat Dal.] menses.

Illi etiam has vires tribuit Apuleius: Herba Consolida pulverem mollissimè contritum potui dabis in vino, mox restringet profluviū. Radicem in cinere tepido coquito, & ex melle ieiuno dabis ut convulsus & intus raptus edat, sanabitur: & thoracem totum purgabit. Herbam si cum Oxygastro edat, magnum beneficium sentiet stomachi dolore vexatus. Ad Tussim radices in Caldaria decoques cum melle & pipere & Castoreo ad quartas, & in vino vetere ieiuno dato in potu. Hæc herba hoc [virtutis & naturæ sus rationem & probationem] argumento habet, ut carne bubula concisâ & in Cicabam misâ, eius radices si immiseris drachmas duas, cocta caro in vinum coheret bit.

SYMPHYTUM MAGNUM.



Symphytum Descriptio

Symphytum lato solo satis obuium radices turculosas & crassas demittit, foris nigras, intus albas, sapore saturo sed magnopere viscido & lento: caules cubitales, crassi satis, inanes, hirsuti, asperi & membranis foliorum alatis appendicibus. adnatis inæquales: *filia* Trago Helenij folio-

rum formam penè imitantur, acuta, rugosa, hispida: flores simul multi penduli, nolarum instar, purpurei aut ferruginei, albi, ex calyce hirsuto concolori, quadripartito, in 5. lacinas acutas diuisi, quibus totidem in penito flore adnatis ligulæ herbidae, totidemque apices albi apppositi, stilo floribus concolori [Flores Trago veluti Herbae paralytis, partim ex pallido & luteo candicantes, partim cæruleo, quibus decidentib. semè in herbariis vasculis clausum relinquitur.] Dioscorides licet Symphyti maioris flores luteos esse statuerit, ego tamen [inquit Marantha lib. 1. cap. 9.] & candidos & purpureos vidi.

Cordus in Hist. tria Symphyti genera tribus distinctis capitibus describit, quæ colore tantum florum differunt. Vnum vocat Symphytum maius, candidis floribus: alterum Symphytum maius rubrum: tertium Symphytum maius purpureum. Figuram appoluit Gesn. ex Trago. Symphytum alterum, inquit Matthiæolus id ita vocas, quod secundo loco reddidit Dioscorides, nulli dubium est, quin ea sit herba, quæ hodie passim Consolida maior nominatur, quam etiam nonnulli herbariorum Alum falsò appellant. Quip-

pe quoddam eius notæ singulæ Dioscoridis historiæ ad vnguem hærere deprehendantur. Hæ frequentissima nascitur in pratis, florib. non modò luteis, vt Dioscorides inquit: sed & candidis & purpureis, eadem sanè facie, ac forma.

Dicitur Symphytum maius Castori. Ioh. Agricola. Eur. Cordo, & Camer. in Epit. & Hist. Matthiol. Germ. i. è mque hort. vbi floris, meminit purpurei & albi. Symphytum alterum Anguill. Lacunæ. Cord. in Diosc. & Turnero. Symphytum Lonicero, qui etiam consolidam, Vnctuosam, Inulam rusticam, & Alum Gallicum cognominat. Symphytum Alam & Alus Lob. in aduers. pag. 151. (vbi duplex tradit. marem floribus purpureis, fœminam florib. albis) Obs. pag. 115. Icon. Plant. p. 483. Consolida maior Brunfelsi Trago, Camer. hort. Lob. Thallio & Cord. in Dioscor. qui præterea vocat Symphytum alterum Dioscor. & Symphytum magnum Galeni, quod Plinium ignorasse scribit. Consolida, cespes magnus in palustrib. nascens Cæsalyino. Consolida magna vulgò. Solidago maior Ioh. Agricola, & Eur. Cordo.

Tab. not.

Tabern. icon. & hist. Symphytum maius flore albo: Consolida maior *Vulgaris*. Item Symphytum maius flore purpureo, *Braunvulgaris*; Frustra proponit duas icones plantæ colore tantum differentis.

Symphytum] mai & fœmina.

C. Bauhino phyt. Symphytum, seu Consolida maior 1. mas vel fœmina, illud ex purpureo cæruleum, hoc ex pallido & luteo candicans. Repertur & luteo flore. Item apud Matth. Symphytum tertium siue Consolida maior. Symphytum magnum Dioscor. Συμφυτον ἄλλο siue πικρόν Germ. *vallvuriz*, *schwarzvuriz*, *schiner-vuriz*. Gall. *Consyre & Oreille d'Asne*. It. *Consolida maggiore*. Hisp. *suelda mayor*. Anglicè *Comfrey*. Obs. Consolida maior. Boh. *Suvalvuriz*. vniuers. Hung. *Fekete nadai*. Croatis verò, qui eius radice ad cõusa & rupta feliciter viuitur, *Gauze*.

Locus & Tempus.

Altero denique anno fructus edit. Floret Iunio & Iulio mensibus, gaudet palustribus & humidis, graminosis hortis & littoribus ac ripis, neque faciliè vbi semel radices egerit propullari potest, nam vel minima radice portio humi infixæ continuò in herbam emergit. Symphytum flore luteo florens mense Maio Montepessuli, Lugduni flore albo. Mito. Basileæ flore purpureo & albo copiosè in pratis. Patavij vidi in horro Iesularum. Montbelgardi abundat, flore albo & purpureo. Bononiæ in horro di S. Saluator alburgo di Sancta Catharina flore luteo mense Aprilis. Genevæ in pratis versus Cologni flore albo, mense Maio. Sata semel in hortis vix postea extirpari potest, quia utraque particula radice facile crescit.

Vires

Vires ex veteribus legantur antè. Radix vt videre est apud Tragum in medicina maiorem habet vsum quàm herba, estque illa temperatura calidæ & humidæ vulneribus & rupturis internis commodissima. Mundata in vino decocta & pota exulcerationibus pulmonis, & vitilis thoracis expugnandis prodest. Non desunt qui ex radice aquam distillant ad suprâ dictas affectiones: Solent Chirurghi emplastris suis adiungere. Omnis generis vulnerib. rupturis & confectionibus ossium commodissima est, quotidianâ id attestante experientiâ. Ego radice Symphyti nolim vti in omnib. viris ex thorace expurgandis: tantum in his quæ eueniunt à tenui subtili & calida materia. Flores in vino rubro coctos, bisque

in die sumptos in cruenta vrina optimos scribit Can. arius. Radicem cum albumine oui applicatam sedare immodicas hæmorrhoides.

SYMPHYTVM TUBEROSVM.



Cæsali- Descriptio
Crus ita describit: Consolida minor siue altera in collibus nascens, locis vmbrosis, præcipuè sub olea; & cultis locis: folio Borraginis, minore, ac mirè aspero: caulibus dorsalib. aut paulò altiorib. si ve pallefcente: radicibus in obliquum sparsis, quibus rotunda tubercula insunt,

colore candido, mollia, sapore non ingrato: viuunt radice diutius.

An Hermolao Symphytum minus, radice intus & foris albâ. ferè Bulbi effigie, rotundâ?

Camer. in Hist. Matth. germ. dicitur Symphytum tuberosum *Gelbe Knadiche vvalvuriz*: in Epit. Symphytum radice tuberosâ, flore luteo: De hort. Symphytum maius flore subluco tuberosâ radice.

Anguillara epist. 14. Symphytum aliud, foliis Borraginis, flore luteo, radice tuberosâ [tartuffo] simili: Consolida minor vocata. *Consolida minor.*

Symphytum hoc luteis floribus obseruauit etiam Lobelius quoddam putaret esse Borraginem, nisi radix subillet tuberosa, vt fatetur in Ado. pag. 111. ac idè in obs. pag. 315. [item Icon. Plant. p. 54.] vocat Symphytum tuberosum.

Dodon. in sol. vocat Symphytum tuberosum, facitque Symphyti alteram speciem, radice exteriùs nigra, intus candida, Symphyti maioris instar, sed tuberosâ: foliis quoque minoribus, caulibusque breuioribus; floribus subinde luteis. Hist. Lugd. pag. 1074. Symphytum tuberosum Lobelij. Cæsalp. Consolidam minorem flore pallefcente. C. Bauhin. phyt. Symphytum 1. [4. apud Matthiolum, vbi in figurâ hirsuties est neglecta] seu maius tuberosa radice.

Symphytum cuius meminit Anguillara vidi circa Patavium & in montibus Euganeis. Est mihi in horro Ill. E. C. delata Basileâ ex horro D. D. Martini Schmeletzi. Vulgarissimum in Italia, sub olea, & locis cultis, mense Martio flore luteo prodit in hortis: spontè etiam circa sepes. Inuenitur auctore Clusio in omnibus Pannoniæ & Austriæ syluis vmbroso loco, præsertim verò sub fruticibus.

Miraculosam ad consolidationem & conjunctionem carnum & ossium tradit Anguillara.

PULMONARIA ITALICORVM AD
Buglossum accedens.

Descriptio

Italorum Pulmonaria dodrantali & maiore altitudine herba, radice nigris alba, fibrosa, Helilebore, sed fibris rarioribus, & quibusdam crassioribus, gustu admodum lenis & viscido: caulibus singulis, purpureis, hirsutis, vni interdum



sursum, reliqua primis germinantibus, alias plures ut in Buglossis: folia alia statim a radice exorta, conferta, per terram sparsa, alia caulem inaequali sita sine pediculo amplectentia, oblonga, vnciam lata, nervo medio per longum donata, in acuminatum mucronem desinentia, lanugine su-

pra infraque & in ambitu molli pubescentia, at adulto vere folia insignem acquirunt magnitudinem, praeter im infima, quippe quae latitudine palmum superent, longitudine sesquipalmum, tenebraeque illa lanugine nigrescente hupida redduntur, summis caulis insident flosculi ex pediculis semuncialibus & brevibus multo simul in aetate interdum reflexi caudam scorpionis simulant, ut E. h. j. ex calycibus oblongis, striatis, hirsutis, colore modo purpureo, modo violaceo, alias mixto purpureo-violaceo, idque in vno eodemque ramo, in sex laciniis diuisi: in calycis fundo succedunt semina quatuor, Buglossi seminibus similia.

Cord. Hist. lib. 1. cap. 12. Pulmonariam Italorum describit sine maculis pro Symphyto sylu cui addidit figuram Gesnerus, titulo Pulmonariae Plinij, quae placet.

Tragus libr. cap. 79. Hist. germ. vocat *klein vvalvuriz*, Symphytum syluestre.

Buglossa sylvestris.

Dubitat autem, an sit Symphytum petraeum primum Dioscoridis, sed male, cum ut ipse et factum, descriptio non conveniat. Miror praeterea apud Tragum hanc figuram esse positam cap. 77. libri dicti, pro *vvald Ochsenzung*, Buglossa sylvestris, quam postea cap. 79. Consolida maiorem syluestrem in sylvis proponentem vocat. Sed magis adhuc miror, hunc errorem nec dum in Hist. Latina esse animaduersum & correctum, sed figuram absque descriptione convenienter correspondente cap. 77. pro Buglossa sylvestri reliquisse, capite autem 79. pro Consolida tertia, seu Consolida maiore (minorem vocat inter nomenclaturas) sylvestri atque imaginem descripsisse.

An Lonicero lib. 3. cap. 134. *vvalden Ochsenzung*, species Buglossi sylvestris, quae Graecis *Lycopis* dicitur, quibusdam Germanis *scharpff Ochsenzung* & *scharpffungen*: Videntur an sit etiam Lonicero cap. 138. Symphytum sylvestre, quod Tragi verbis describit.

Matthiol. in Dioscor. Pulmonariae [Pulmonariae alterius in post. comment. cum magn. fig.] titulo plantam a nobis delineatam exhibet. In H. Germ. cum addit. Camerarii (ubi Boh. *Plicuist* vocatur). Itemque Epit. (ubi Ital. nominatur Pulmonaria Germanice *Lungenkraut*, *ste. kerk-aus*, & *klein vvalvuriz*, Gall. *herbe aux poulmons*) etiam Pulmonariam alteram appellat: Censura vero 93. in Amatum, Pulmonariam seplasiarum, ibidemque negat esse Potamogeton, id quod vult Amatus: dicens: Potamogeton, ut ego opinor, ea est herba quam officinae Pulmonariam appellat, eo forsitan quia pulmonis vitia optulatur: quae folio constat Betz hirsuta, notis albis maculato, & propè fontes & aquosos locos nascitur. vnde Fonticulis nomen traxit, de qua Gal. lib. 8. Hec ille: Rectius autem Rob. Conf. Pulmonariam herbariorum duplicem ait, hancque alteram vocat Cirsijsive Borraginis speciem, albicanibus notulis maculatam, locis opacis proponentem, non autem aquosis. Ita ut vel hinc appareat non admittendam Amati opinionem, apud quem posita Leon, quae non est plantae quam Potamogeton praeter rationem vocat.

Festiva

Amatum

Turnerus Baccharin, Saluiam Hierosolymitanam, & Pulmonariam officinarum vocat. Fracastorius lib. 3. cap. 8. de cont. Pulmonariam, Pulmonariam officinarum & Herbariorum Belgicorum, Pulmonalem Latinorum: Picardorum *Herbe de la cor* [Herbam Cordis] Belgarum *Onfer Brouwen Sijn*, Gall. *Herbe au lait de nostre Dame*, h. e. latine S. Mariae lac, quod folia maculis albis plena appareant ac si lacte conspersa essent. Lat. in fol. Symphytum maculosum aut maculatum. Non autem vocandum putat Symphytum sylvestre, quod & aliud sylvestre sua natura sit: testè etiam non parum differe ait, a Pulmonaria, de qua inter Musci genera agemus.

Baccharin

Lobel. in Aduers. pag. 252. Pulmonariam maculosam folio Borraginis, floribus primulae veris, purpureis: item pag. 121. Pulmonariam recentiorum, Britannicam putatam. In Obseru. pag. 317. Maculosam pulmonariam (ac ita etiam in Leon. Plant. p. 386.) quam in horto Moutoni floribus albis variare tradit.

Pulmonaria maculosa.

Gesn. hort. de hac loquitur cum ait. Pulmonaria Plinij, Italica hodieque vulgo sic dicta, sine maculis apud nos reperitur. Illa vero cuius Plinius meminit foliis maculosis, in Italia frequentior, est omnino Symphyro seu Consolida maiori dicta cognata herba. In Catalogo pl. ipsi Auricula muris ut & Syluio dicitur.

Pulmonariae maris & foeminae: *hirschmangelt* mentem *hirschmangelt* vel *blein* superfluum figuram habet Tab. quae propter colorem tantum posita: tolerabile fuisset si maculosam & non maculosam pinxisset.

C. Bauhin. phyt. Symphytum 4. siue maculosum, seu Pulmonaria latifolia.

Pulmonariam (siue ut audio vocatam a Fuchsio Buglossum Teophrasti) Florentem vidi mense Februarii inter Patium & Balneum Apennense, ac inter idem Balneum & Arqua, necnon in horto Priuli Patavij obseruavi. Geneuz passim florentem mense Martio & Aprili. Basileae in horto D. Plateti. Lugduni *au bois de la bonne Allemande*. Montbelgardi non maculata frequens in colle è regione pontis, floris Martio & Aprili in horto E. C. Patavij florentem vidi Martio in horto Iesuitarum: Veronae in horto D. Serrati Medici, Ferrariae in Monasterio S. Dominici à l'Angeli, & Florentiae in horto Nicolai Ferraricensis. Pulmonaria, inquit Clusius, magis

culis insignita, copiose multis Pannoniæ & Austriæ siluis sponte nascitur. Reperitur & in collibus umbrosis, opacis locis, & riguis tractibus. Et in Bohemia quidem foliis haud maculatis: In hortis facile adolescit. Primo vere erumpit: mox florifera est: pereunt Autumno folia, radix perennat.

Tempera.

Hanc herbam licet in medicina non habere peculiarem usum, nisi quod in cibis & placentis ex ovis verbasculorum modo, quibus temperamentum accedat, vsurpetur, in Hist. gall. scripserit Dodonæus. In Hist. tamen latina ait. Ceterum facultate hoc Symphytum priori responderet, si radix huius viscosa: Verum quandoquidem dura ac lignosa, siccior huius qualitas & magis adstringens. Foliorum in oleribus usus est. evitantur verò & ad pulmonis vitia ac ulcera huius quoque radices conferre, & idem quod maioris Symphyti posse. Superat autem in Symphyti radice frigida temperies, sed tamen exigua adest humiditas viscosa, ac glutinans: Hæc nequaquam pruritum excitat, nec gustu acris aut mordax, sed æræ siue exqualis, & qualitatis gustabilis expert; tantum abest ut cum Scillæ acris visciditate huius humiditas lenta ac glutinosa conferri queat. Folia pruritum excitare possunt, non caliditate aut acrimonia, sed asperitate sua, ut iam scripsimus, minus tamen quam Verticæ. Ad multa radix villis est; vulnera & enterocelas recentes imposita sanat: ad sanguinis tum tussis sputationem ac profusionem, & contra pulmonis ulcera multum prodest. paratur in hunc usum & ex ea Serapium, quod sanguinis fluores sistit: recentia pulmonis ulcera consolidat: tussim sedat: febrium calores contemperat: humorum defluentium acrimoniam retundit; descriptio hæc est. ℞ Radicum Symphyti maioris uncias duas, dulcis radicis unciam unam, foliorum tussilaginis unā cum radicibus manipulos duos, nucleorum nucum pinearum sesquionciam, Ziziphæ seminis malvæ drachmas duas, capitum papavetis drachmam unam, fiat decoctio in aqua quantum satis est ad libram unam: Colato addantur sacchari & mellis albißimorum singulorum unciæ sex, & fiat Serapium perfecte decoctum. Eadem quoque radix renum ulcera etiam diuturna cauat, & profluentem ex his sanguinem sistit: tum & superfluentes quoque muliebres purgationes suppressit, si vel decoctum eius bibatur, vel ipsa cum saccharo, aut melle condita, singulis continuis aliquot diebus assumatur. Ad omnium quoque reliquorum viscerum, ac internarum partium lisiones, & ad rupta ynicè commendatur. Tanta autem consolidandi huius vis est, ut unā cum carnibus crudis in partes concisæ cocta, eas simul cogat ac uniat. Aduersus etiam sedis inflammationes conducit, & nimium profluentes hæmorrhoides imposita reprimat. Huic plantæ rei herbariæ periti non contemnendas vires tribuunt, ad pulmonis ulcera sananda. Quia in re, utrimque in sanguinis reiectione mirabili successu se eam exhibuisse mihi (inquit Matth.) sæpius retulit Iulianus à Marostica Teruiliensis medicus: Idem in Epit. Camerarij addit, Cohibet, consolidat, siccatur, abstergit, præfertur ad pulmonis cum ulcera, tum ceteras infectiones, & ad sanguinis reiectiones: Datur totius plantæ decoctum ad supra scripta, magno auxilio, cum saccharo pluribus diebus: Idem: cum maiori quoque successu præstat foliorum succus potus. Pulmonariæ maculatæ Lobelij folia iusculis mulierculæ miscent, aut rufa ex ovis in placenta du-

cunt, adque pulmonis affectus & cordis vires conferre prædicant. Fallax admodum experimentum, ut nobis videtur, de Pulmonaria vulgari herba (quam intelligat non monstrat) tale adscribit Io. Agric. Vulg. Pulmonibus, inquit, egregie optulatur, & robur ipsorum conservat, exaureque. Quemadmodum experiri licet in pulmone animalis decocto cum hac herba, & non marcescente, neque eliquato, quamquam igni aliquandiu supposito, & quantum satis est accenso.

PULMONARIA ANGUSTIFOLIA Ceruleo flore.



Hic folia sunt angusta & villis obrita, Buglossi filii. Echiiue aut Anchusæ foliis non ab-
similia, molliora tamen, neque tam aspera villosa, nullo pediculo prædita; sed mediū caulem ample-
ctentia, qui paulatim succrescens, angulosus & hispida, interdū nonnihil pur-
purescens, in


Descrip.

pedalem tandem altitudinem excrevit, in cuius fastigio multi pentagoni caliculi, in quinque purpurescentes lacinas diuisi, & subhirsuti nascuntur, continentes oblongos, concavos flores, Buglossi hortensis, aut Pulmonariæ vulgaris floribus formâ similes, qui per oras in quinque orbiculares ferè lacinas diuisi, colore, antè quâ aperiantur, ex purpura rubere, deinde quando explicati sunt, ceruleo aded eleganti nitent, ut Gentianellæ vernæ floris venustatem si non superare, atramen proximè æmulari videantur, odore autem nullo grati: ij maturi decidunt integri, quemadmodum Buglossi hortensis & similium flores atque caliculū inanem cum stilo, & quatuor seminum rudimento reliquunt, quod maturitate nigrum euadit, Echij aut Buglossi vulgaris semini respondens. Adnascuntur deinde secundum caulis pedem, alia hirsuta folia angusta, palmaria aut amplioris longitudinis, Echij aut Anchusæ foliis latiora, mollioraque, inter quæ (licet sicca sint) subsequente vere prodiit caulis suis venustis floribus onustus: radix crassis carnosisque fibris prædita est, ut Pulmonaria maculosa folio, initio candicantibus, deinde vetustate foris nigricantibus, dulci sapore.

Clusio in Pannon. dicitur Pulmonaria x. (in hist. post.) siue angustifolia ceruleo flore. Tabern. icon. & hist. Pulmonaria t. angustifolia. C. Bauh. phyt. pag. 501. Symphytum g. siue Pulmonaria angustifolia: flore antequam aperiantur ex purpureo rubente, explicato eleganter ceruleo.

Nascitur passim per Pannoniam & Austriam Locus & inferiorem in montanis & caduicis siluis. Exiit Tempus nouo vere, florumque congestorum thyrsum ferè ante folia promit, diutissimeque floret.

PVLMO-

PULMONARIA RUBRO FLORE,
folijs Echij.

Inuenitur, inquit Clusius, & quibusdam Pannoniae locis alia rubro flore [Pulmonaria 3. quoad descriptionem, icon enim Lichen exprimit, cuius figura hoc loco errore Typographi pro Pulmonaria tertia Clusij exhibetur in Hist. Pannon. 4. in post. sine icon] superiori seae similis, nisi crassiorémque caulem

ac latiora folia haberet, & flores similiter, non ut illa caeruleos, sed pulcherrimè rubentes: alioqui & radice & temperamento conveniunt.

Huic omninò respondens cum forma, cum amplitudine ali[Pulmonaria 3. species altera in H. Pann. Pulmonaria 5. Pannonica seu Pulmonaria rubente caeruleo flore in Hist. Post.] est, cuius flores primùm rubent, ut in priore Pulmonaria: deinde caerulei saturationis coloris fiunt.

Tabern. icon. & hist. Pulmonaria 4. Plinij angustifolia. Cur compilator imitatus Clusium hanc priori angustifoliae non subnectit? C. Bauh. phyt. Symphytum seu Pulmonaria angustifolia altera.

Pulmonaria alba exotica.

Post Pulmonariam maculosam meritò & hæc referenda quam teste Lobel. in Obseru. pag. 317. alebat Petrus Coldembergius, folijs Britannicæ aut Alismatis humi prostratis, floribus Solano proximis, exilloribus, muscosis.

SYMPHYTUM PUMILUM REPENS
sive Borrago minima herbariorum.

Symphyti pumili ramulum munere Fratris Shabeo, cui paulò circa cacumen bina folia, alterum vnciale, alterum etiam minus, acuminatum utrumque: flores in surculis extremis, suo quisque pediculo niti, complures, quorum qui nondum explicati sunt Heliotropij in modum deorsum inflectantur: qui autem expansi sunt, ij Pulmonariæ Italorū flores magnitudine æquant, vni folij quidem, sed in quinque lacinias diuisi.

Hoc est illud Symphytum pumilum repens; Borriginis facie Borrago minima Herbariorum Lobelio [in Obs. pag. 311. in Icon. Plant. pag. 577.] de qua ait. Speciosam hanc plantam alunt Ill. Princeps de Chymay, D. Car. de Croy, ceterique peritiores stirpium exploratores Belgij, folijs Borriginis aut Pulmonariæ minoribus flosculis caeruleo-purpureis Borriginis, sed radix pulla Vlmariæ aut Catiophyllatæ fibris implexa. Floret

Tom. III.

hieme in pensilibus hortis, Vere etiamque Augusto in hortis. Gustanti cum muscolitate nonnulla acrimoniam exhibet, quod Borriginis aut Buglossi negatū est. Quænam sit hæc antiquis adhuc ignoramus.

De hac Dod. lat. inquit: Borriginis altera extat species folijs similibus, sed minoribus: flosculis caeruleis parvis absque staminibus, quàm vulgaris Buglossi minoribus, radix restibilis hiemè sustinens, folijs interea quoque vire-

tibus omninò rara est paucisque cognita. Hist. Lugd. pag. 881. inscribit Borriginem minimam herbariorum. C. Bauh. phyt. Symphytum 7. sive repens Borriginis facie.

CYNOGLOSSUM VETERIBVS.

CAP. X.

Post Buglossum Dioscorides, Cynoglossum tradit. caule carens. Cynoglosson, inquit, folijs latifoliae Plantaginis habet, at angustiora & minora, lanuginosa. Caule vacat, humique sternitur. Prouenit in salubetis. Folia cum suillo adipe veteri trita, canum moribus, alopecij ambustisque medentur. Ipsius verd herbæ decoctum, ex vino potum, aluum emollit.

Cynoglosson in nothis aliqui Phytion, alij Caballion [Caballiatum Marcellus,] alij Splenion, alij Scolimon, Romani Linguam canis aut caninam appellant.

Dioscor. & scripta nomina.

Buglossi quoque Cynoglosson subdit Plinius, rectè Gesneri iudicio ei caulem tribuens, quem Dioscor. negauit, dicens: Iungitur & Cynoglossos, caninas imitans linguas, topiarijs operibus gratissima. At utique tres thyrsos seminis emittit, eius radicem potam ex aqua ad tertianas prodesset: quæ quatuor ad quartanas [Hic omnia quæ Dioscorides scripsit & deo. deo. Plinius transtulit ad Cynoglossum: vnde meritò ea, ut supposita, à Plinij textu asserit Cornarius, cum, inquit, Cynoglossi adscribat quæ Diosc. Buglossi.] Est alia similis ei, quæ ferat lappas [folia Lapathi minuta Humelberg.] minutas. Eius radix pota ex aqua canis, & serpentibus aduersatur.

Galenus, Paulus, & Aëtius in simplicium censu, teste eodem Cornario, Cynoglossum omiserunt, fortè quod de Arnoglossi, i. e. Plantagine, dicta, etiam de illo intelligi voluerunt.

Nomina & virtutes herbæ Cynoglossæ hunc in modum prosequitur Apuleius. Græci Cynoglosson alij Phrygiam [alij pyrgiam,] alij Hemionion, alij splenion, alij caballion, alij scolimon, alij pygin, alij leucrion [fortè legendum Teucrion] Aegyptij zenis, Itali linguam canis, alij sub-

Y y y

labium, alij linguam Macedonicam. Ad morsum serpentis Herba Cinoglossa contrita & ex vino sumpta veneno resistit. Quæ folia quatuor habet, pisata, & ex aqua potui data, prodest quartanis Succum ex passio & oleo repessatum in aurem stillatum mitemanat eos qui minus audiunt.

Litem inter Dioscori & Plinium de caule Cynoglossi ad propositum dirimere videtur Maraptha lib. 2. cap. 4. his verbis. Scribit Dioscorides Cynoglossum caulem nullum proferre: quod ita est, multique qui verum Cynoglossum cognoscunt, hoc obsecrunt. Verum cum anno abhinc tertio nos Garganum montem Maio mense peteremus, in itinere largus Cynoglossi campus sese nobis obtulit: ex quibus multa caule vacare vidimus: multa tamen caules habere è medio frondium nascentes, nudis, dodrantis, aut amplius altitudine, in summitate scabrosos, ut sua umbra vinee (cum frondium ambitum, quæ humi sparsa jacebant, superarent: flores in illis subpurpurei, anchusæ æmuli: æque in vniuersum tota planta pulcherrima. Hanc rem nos attentius considerandam duximus. Atque ad illud vnum laboramus, ut an diuersæ essent Plantæ, certiores redderemur: tandemque nullam in frondibus, radice, saporeque dissimilitudinem inuenientes, eandem esse coacti sumus affirmare: ancipitesque rei notitas nos reddidit, an plantam illam pro Cynoglossis admitteremus donec Medicus quidam Germanus, materię medicæ studiosus, qui per multos annos Patavij artibus operam dederat, se Cynoglossum in Patavino horto consistam vidisse, quæ post tertium annum caulem edidisset, mihi affirmavit. Vnde priorem meam sententiam nihil mutans, hanc diuersitatem vetustatis ratione euenisse arbitratus sum, hocque Dioscoridi, sicuti & multa alia, incompertum fuisse.

Cum itaque olim ne veteres quidem in huius plantæ delineatione sibi consentiret [Dioscorides siquidem ei caulem ademit quem Plinius tamen ei tribuit,] non mirum est si magna adhuc hodie inter recentiores herbarios contentio perseveret, quænam ex aliquot plantis, verum sit & facie & viribus Cynoglossum. Hi siquidem ad vires attenti, & ad eff. ætus quos Cataporia de Cynoglossa inscripta pollicentur, aliud atque aliud Cynoglossum ostendunt.

Cynoglossi sequentes agnoscuntur species, eodemque nomine quæ sequuntur donantur plantæ: scilicet. Cynoglossum vulgare. Cynoglossum Mon/pessulanum. Cynoglossi vulgaris minor species & candidior. Cynoglossum minus. Cynoglossa folio virenti. Cynoglossum siluestre Thalij. Echium. Anchusa. Lithospermum majus. Echium Scorpoides, aquaticum Gesn. Cerinthe quorundam. Plantago. Narcissus. Cynoglossam etiam de Plantagine dici à Recentioribus tam verum, quàm verum est Arnoglossum & Cynoglossum Plinium & Apuleium inter se confudisse.

GYNOGLOSSVM WLGARE.

Descriptio

Nigra foris radix, intrus alba, tota crassa, Ramam exiguum representans foris coloris pulli, odore magis graui quàm sapore, qui dulcedinem nonnullam fatuam linguæ offert: caules circiter bicubitales in ramos multos diuisi, vetu-



state concaui, multâ lanugine obditi: folia longa & latiuscula primo anno, secundo ubi caulem fert, stricta, acuminata, incana, molli, lanuginosa, odore graui, flores buglossi officinarum, colore sordido rubente, quos folia quaternæ aut quinæ hirsuta incana amplexantur: quibus succedunt Lap-

pule quatuor conis suis ad stilum in medio prominulum concurrentes, nonnihil compressæ, spinulis hispide, quæ pertinaciter vestibus adherescunt, cavitare vuca donatæ, in qua iidem semen vnicum.

In his regionibus, inquit Cordus in Diosc. male asperam Anchusam [Echium vulgare] quam Lycosim esse diximus Cynoglosson vocant. Veram autem Cynoglossam omnes aliæ Germani gentes *hundszungen* id est, Caninam linguam vocant: quam etiam pharmacopolia habent. Dioscorides ei caulem negat: & nos etiam sine caule eam nasci vbiq; videmus, quibusdam tamen temporibus eadem caulem, purpureos flores, & post hos minutas lappas producit, quas Plinius etiam illi tribuit. Ergo imprudenter Ruellius scribit, non esse Cynoglossum quod in officinis habeatur, quoniam caules & lappas ferat. Multis enim nos annis obseruauimus Cynoglossam interdum primo anno, interdum & secundo sine caule nasci, ut Dioscorides eam depingit, reuerâ tamen caulem ferat. Duplex inueniuntur Cynogl. maior. De qua dicitur pauld post.

Vocatur hæc, inquit Tragus l. 1. c. 76. *κυνόγλωσσον* Græcis, Cynoglossa & lingua canina Latinis, *hundszung* Germanis dicitur. Posset & eadem lingua *hundszeraut*, id est, Herba canina: *hundszunizel*, id est, radix canina, appellari, cum tota sua substantia fœtore canino grauitèr oleat. Hæc alij [teste Diosc.] Phiton, alij Cabassatium, alij Splineron, alij Scolimon. Romani linguam canis aut caninam appellant. Apuleius c. 97. Phrygiarum, Hemionion, Splenion, Caballion, Scolymos, Pyrgin, Leucrion, Zenis, Sublabium, & linguam Macedonicam vocat. Manlius sup. pill. rheumat. Mesue. Cynoglossam air à quibusdam Kaliber, Censten, Alchaaber, Cabcachar. appellari. *Folia* Trag. nos. autem Cynogl. vulgaris nobis nō videntur strata, ut scribit Tragus: l. c. etiam eius non est bona, sed potius est Echij. Fuchsiana etiā nostram quā iam scūptā emimus non benè exprimit Cynogl.

Fuchs. videtur confundere hoc Cynogl. siue linguā caninā officinarū cū Echio vulgari, quod apparet ex fig. & descript. de cepus fortè fig. Tragl.

Cornar. in Dioscor. Notum est Cynoglossum & vulgè & officinis suā Græcā appellatione. Nostri illam sequentes *hundszung* dicunt, Nec aduersatur huic quod Dioscor. caulem non habere.

bere & per terram stratum esse dixit. Tale enim reuera primo ortus sui anno conspicitur. At ubi per hiemem duravit, sequenti anno assurgit, & caules producit quos thyrso Plinius appellavit: ni minimè dubium sit vulgare officinarum Cynoglossum reuera id esse quod Plinius descripsit. Hæc Cornarius qui (ut Tragus) per terram æterni Cynoglossum vulgare asserit, nimium securè suam sententiam proponens.

Cornarius
non.

Hamelberg.

Cynoglossum vulgare Buglossa vulgè vocata adeo similem ait Hamelberg. apud Apul. ut ab ea non nisi odore [qui in Cynoglossa gravis est] discerni possit. An autem tanta sit similitudo iudicent lectores.

Cynoglossum

Lonic. lib. 4. cap. 196. *hundszung*: Cynoglossum: Lingua canis: eius duo Genera. maius & minus: maius est verum Cynoglossum Diosc. Dicitur etiam *leinde hundszung*: Paruum est Cynoglossum officinarum aut vulgare. Duas icones proponit Lonicerus, primam in qua caulis male appictus: altera icon est eiusdem plantæ quom amittit priora folia: ignarus botanicus ex consideratione iconum ex vna planta duas facit.

Lonic. not.

Lycopsis
Ruellia no.
gas Amatus.

Ruelliam reprehendit Amatus quod falsè aliorum iudicio, Ly opsim eam non esse herbam contendat, quam vulgares Italici Pharmac. Cynoglossum appellant, cum reuera inter se maxime differant.

Anguillara epist. 12. demonstrat satis se hanc herbam non agnoscere pro Cynoglossa. Geln. hort. vocat Cynoglossam italicam: In carol. plant. Lycopsis & quantum genus Anchusæ, cui Ruellium Lingue canis hodie vulgè dictæ nomen attribueret ref. 11.

Dod. in fol. p. 31. duas habet icones quas Plantas exhiberi Cynoglossum absque flore: 2. Cynoglossum cum flore. & describit. Græcis *ῥυελλία* & *ῥυελλία* dicitur: Latinis Lingua canis. Germanis est *hundszungen*, Belgis *bonis tonghe*: Hispanis *Lingua del perro*: Italis *Lingua di cane*: Gallis *Langue de chien*: Anglis *bovvedes tongue*: Bohemis *ply jazyk*.

Ætius lib. 1. & Tetraboli terrij l. 1. Limonium & Cynoglossum Candium eandem stirpem sentire videntur. Rondeletius Glastum sylvestre esse voluit, sed sylvestre Glastum a sativo perquam differens est.

Lobel. in Obseru. pag. 313. (Itemque icon Pl. p. 580.) duas picturas exhibet sub his titulis. Cynoglossum vulgare sine flore, Lycopsis Lacunæ: Item Cynoglossum vulgare cum flore. Addit præterea Cynoglossum maximum occurrere in hortis Belgicis, folijs scilicet, floribus, semine, omni-que sua parte duplòque maius vulgari. Quod verò pingit in Advers. credimus esse Cynoglossi vulgaris speciem minorem & candidiorem.

Locus & it.
pus

Per hiemem folia illæsa durant: appetente Iunio mense caulem emittit, auctore Trago. Nascitur in parietinis & muris iuxta sepes, quò omnis generis sordes conici plerumque solent, fabulosus & incultis denique locis Cynoglossum vulgare seu Lingua canis provenit Patavij, Lugduni copiosè versus *la porte Neufve*. Florens Maio: Bâleæ passim. Montbelgardi inter portam *des Grâces* & Castellum extra urbem: & alibi ut in orto E. C. Genovæ cum flore & lappis Iunio mense: Mompelij provenit & præterea alia species.

Tempera.
Vires & usus

Cynoglossa frigidam & siccam temperaturam obtinet inueteratis & malignis vlcereb. & Mariscis præsertim sanandis efficacissima. Radix Cynoglossi vino decocta, vespertiq; & mane bibita, aluum emollit. Eadè fermento obducta, ac pau-

Tom. III.

latim in calido cinere tosta, & assata, postea abiecto fermento locis affectis Balani instat indura, calorem & dolorem internarum mariscarum protinus aufert, utque citò curentur efficit, experientia id attestante, neque multis hoc genus curationis notum est. Aqua Cynoglossi, succus & pulvis eius mariscis utilissima sunt, collutione & inspersu. Aqua distillata alia quoque sanat vulnera, præsertim genitalium, Lintcolis in ea madefactis ac impositis. Herba rufa, & cum Adipe suillo in farragine tosta, moribus rabiosi canis medetur & ambustis. Calvis illitu capillos reducit. Aduersus inueterata mala pustularum, fistularum, & aliorum abscessuum tumidorum, vnguentum è Cynoglossi succo confectum illitu efficax est. Confectio verò sic se habet: Succum Cynoglossi cum melle rosarum æquis portionibus paulatim, quoad succus absorbetur, decoque, post Terebentinam admisce, & fiet vnguentum Cræstissimum. Hæc Tragus qui vires tribuit pynoglossi Dioscoridis, quæ an congruant vulgari huius nescimus: nec etiam ea uti velimus ad emolliendam aluum, nec ad morsum canis rabidi. Appollinaris ait conferre applicatum moribus canis & caluitiem reparare. Dubitamus an consultum sit hæc planta in prædictis morbis uti, nos nolumus experiri: nimium frigida est.

Porro Matthioli de eius facultatibus hæc prodidit. Radix sicca in puluerem trita, ex vino rubro pora dysenteriam sanat: utilis admodum ijs quos gonorrhæa habet: item ad Catharros & grauedinem. Radix vulneraria est: stilis sistendo sanguinem & omnis generis vlcera & vulnera curat, in primis autem aphthas & maligna oris vlcera, ex lue venerea orta: nec non hæmorrhoides, si radice decocto colluantur, & pulvis eiusdem inspergatur. Succi & aquæ stillaritiæ facultas eadem. Ambustis scribunt auctores Aduersariorum opitulari, vel mulierculæ sciunt, refrigerandi scilicet manifesta qualitate, exsiccante, doloremque leniente, & maiorem effluxum prohibente, præsertim axungia alliquefacta seruida, que instillata: item alopecijs de acri & erodente humore capillis defluentibus, confert: nec non emollit aluum eius vis malactica & mucaginea vino incocta, & frigore retusa: radix odore est penè saporifero, maximi hodie usus ad acres & tenues fluxiones, magis tamen incrassat.

CYNOGLOSSI VULGARIS MINOR. Species & candidior.



Cynoglossi speciem habeo siccam, Descriptio nescio vnde nisi ex Valerandi Dourez herbis fortè: dodrantem non excedit radice nigra ut in vulgari: à qua plures caules, tres in planta quam siccam habeo, in quibus folia duas uncias longa, tomento candidantis, uti & caules. Semina lappularum æmula, aspera,

• Yyy 2

quatuor simul iuncta, non minora quam in vulgari Cynoglossa.

An Cynoglossum pusillum Narbonense Lob. in Aduers. & H. Lugdun? An Catpari Bauhini phyt. Cynoglossum 5. siue medium, Cynoglossa minor Cordo?

CYNOGLOSSVM MINVS.

Descriptio



Plantam quam exhibemus Cynoglossum minus vocauimus priusquam à quoquam factam eius mentionem animaduertere-mus: caule do-drantali, locis cultis cubito maiori ramo-so: folijs multò vulgari maiori-bus, palmari-bus, ad Buglossi minoris acco-dentibus, hispidis, grauius odoratis: flo-ribus paruis,

rubentibus succedunt semina lappacea, pulchra, quaternis, vestibis adhaerentia, multò vulgari minora.

An Cordo in Diosc. Cynoglossa minor, quam Dioscoridi incognitam fuisse scribit.

Tragus libro 1. c. 64 piogens & describens vocat Elatinem. Eius autem figura minus placet. In ea siquidem desunt satis longa folia inferiora. Melior habetur apud Tabern. hac inscriptione. Heliotropium minus rectum, *Blau Scorpion* & *trani*: Fuchsius in historia sua manuscripta Cynoglossum minus vocabat. Clusius in Pannon. pag. 681. Cynoglossum pusillum. In H. post. Cynoglossum tertium, Cynoglossum pusillum siue Austriacum alterum. H. Lugd. pag. 1140. Lappula rusticorum. Casp. Bauh. phyt. Cynoglossum sextum siue minus.

Locus & Tempus

Cynoglossum Tubingæ & Genevæ olim à me visum, Montbelgardi in horro Ill. Principis à me satum florebat Augusto. Cynoglossum pusillum Clusij crescit ad viarum & agrorum margines circa urbem Viennam in nudis & salebrosis iugis huic vibi vicinis, atque alibi. Floret verò Maio & Iunio.

Elatine, inquit Tragus, refrigerandi, exsiccan-di, & sanandi vim obtinet, eoque nomine teneris membris vtrique vtiliter adhibetur. Elatines herba in vino rubro decocta, ac pota intestinorum erosionibus à dysenteria medetur, dysenteriam sistit, dolorémque mitigat per aliquot dies continuos pota. Herba vino decocta, & gargarisata exulcerationes oris & colli persanat. Quin & stulta superstitione nonnulli persuasi, quorum supra mentionem fecimus, ab oris vlceribus, quæ Græcis Aphthæ appellantur, eos liberati credunt, qui hanc herbam saltem secum gestauerint, testanturque id experientia comprobatum. Elatine viridis adhuc, rufa ac fronti imposita, oculorum inflammationibus & fluxionibus auxiliatur. Alia verò iuuamenta quotidie

inueniri, ex his quæ annotauimus colligi poterunt.

CYNOGLOSSA FOLIO VIRENTI

Ioh. Bauhini.



Caulis a-liquorex Descriptio
radice pollicari, nigra foris, intus alba, lignosa, sapore viscido & ingrato, erigit bicubitalis, rectos, hirsutos, in alas dimissos, adulos, inanes: folia forma quidem sunt Cynogl. vulgaris, superne læto virore splendens, glabra, & tactu mollia, allicubi etiam

mollis lanugine obsita, inferne albida, hirsuta, & aspera, odore nullo, sapore satuo: flores ut in vulgari, ferruginei rubentescunt. parui, in quinque lacinias diuisi, apicibus totidem paruis & rubentibus, & calyce hirsuto, quinquefolio, in atro virente purpurantes: lappulae quales vulgari: sculptor autem ineptus corrupit bonam fig. C. Bauh. phyt. Cynogl. semper virens: Cynoglossum folio viridi Ioh. Bauhino. Sed cur dicit semper virens, cum vix ultra annum duret?

Cynoglossum hoc ante aliquot annos repperit in monte prope Malmunster plantatum in Locus & horro Ill. E. C. sæpius ex semine deciduo se renouat: floret autem Aprili & Maio: semen maturat Iulio, deinde perit planta. Tempus.

CYNOGLOSSVM CRETICVM PRIMVM

Clusij.



Meminist Clusius in Descriptio
post. Hist. præter hæc duorum Cynoglossi Cretici generum, quorum historiam, qua potuit perspicuitate & facilitate ita prosequitur. Proferit Cynoglossum Creticum primum à summo radicis capite multa folia, longa, vulgaris folijs multò angustiora, venis aliquot secundum longitudinem excu-

rentibus prædita, ex viriditate canescentia: inter quæ nascitur caulis inæqualis, minimi digiti crassitudinem non attingens, per quem, inordinato

nato situ, nascuntur folia, his quæ à radice prodeunt breuiora & angustiora ipsum quodammodo amplectentia, ex quorum alis circa summum caulem nascuntur *ramuli* aliquot cauis *flosculis*, in quinque lacinias per extremas oras diuisis, onusti, vulgaris quidem floribus forma similibus, sed minoribus & dilutioris coloris, in quorum medio quinque staminula saturè rubentia: singulis floribus succedunt, quemadmodum in vulgari, quatuor rugosa & aspera *semina* simul coniuncta (prominulo ex illorum medio stilo) vulgaris tamen seminibus minora, sed non minus quàm illa, vestibis artingentium inhaerentia: *radix* est longa, singularis, candicans, crassa & succulento cortice obducta, summa tamen cute subfusca, minimi digiti crassitudine, fractu contumax, raris tenuibus fibris per totam longitudinem prædita.

Hoc natali loco crescens nunquam vidit, sed in quorundam hortis semine natum duntaxat, quod ipsum etiam sepius in suo aluit, ac primum in Belgica semine ex Italia misso Cynoglossi Cretici nomine, deinde spontè deciduo conseruatum: florebat Maio atque etiam Iunio, quo similiter menis maturecebat.

CYNOGLOSSVM CRETICVM secundum Clusij.



Primo anno ex *radice* longa, infia digiti minimi crassitudine consistente, rarisque fibris per longitudinè sparsis prædita, crassiusculoque cortice foris fulco amicta, multa promit *folia*, palmū aut amplius longa, vnciam lata, humifusa, mollia, & tenui breuique lanugine testata, neruo satis crasso illa per longitudinem æ-

qualiter secante: inter quæ altero anno prodiit *caulis* cubitalis aut amplior, strutus, firmus, rectus, molli lanugine oblitus, quem confuso ordine vestiunt folia iā dictis similia, sed quæ breuiora sunt, quo propius ad summum caulem accedunt, ex viridi palleſcentia: summus caulis in multos graciles ramos diuiditur summo fastigio Scorpiuri aut Heliotropij maioris instar inflexos, in quibus plurimi caliculi quinque lacinias constantes, vnde *flores* emergunt primi floribus breuiores, illis tamen ampliores, in quinque lacinias orbiculares diuisi, candicans intus coloris, sed multis tenuibus purpurascentibus venis [quæ vetustate in exeruleum colorem transeunt] ornati: defluentibus floribus, conspiciuntur in caliculis quatuor *semina* coniuncta, vt in priore Cynoglossi Cretico, rugosa & aspera, è quorum medo prodiit stilus.

Cynoglossa topiaria ferit Plinij.

Ex radice geniculatis, bicubitalib. canaliculis, aspec-

ris, Aparines ritu vicina quævis arripit: folia bina & terna, atrouirentia, Echij modo hispida, Rubiæ paria, & aliquando maiora.



Flosculi purpurei, violacei, Echij minores, verticillatim

Cruciatæ modo, à medio caule sumo tenus: *semen* inuolacris foliaceis, sinuosis, Sesamo simile aut Thlaspi, fuscum, gustanti dulce clauditur, cuiusmodi primus Lobelio impertinuit peritus Muronius Neruiensis. Vniuersa planta gustu Echij æmuletur.

Descriptio.

Lobel. in Obſeru. p. 466. vocat

Aliffon Germanicum, Echioides (ita quoque Icon. Plant. p. 811.) siue facie Molluginis Herbariorum: Aparine Plinij putarum. Aliffon Germanicum Echioides Lobelij H. Lugd. pag. 144. Aparinem maiorem Plinij Tabern. Cynoglossam 7. siue topiariam seu repentem C. Bauh. phyt. cult. potius Cynoglossos topiariis operibus gratissima Plinij, quàm vel eiusdem Aparine 1. 27. cap. 5. vel etiam Parthenium lib. 21. c. 17. Alyſſum Germanicum Echioides, Aparinem maiorem Tabernamontani, *Groß Kiebkraut*, Hort. Lusit.

CERINTHE VETERIBVS.

CAP. IX.

Aluariorum & apum causâ Cerinthen ferre oportere prodidit Plin. lib. 21. cap. 12. Est autem, inquit, Cerinthe folio candido, incuruo, cubitalis, capite concauo, mellis succum habente. Huius florum anidissima sunt. Theophr. *aspideter* inter æstiuos flores annumerat hist. lib. 6. c. 7. De hac Columella lib. 9. cap. 8. de comparandis apibus ait. Sunt qui per initia veris Aphidrum atque [vt Vates ait] trita Melyphylla & Cerinthe ignobile gramen, aliâque colligant similes herbas, quibus id genus animalium delectatur, & ita aluos perficiunt, vt odor & succus vasi inhaereat, quæ deinde mundata ex quo melle respargant: &c. Vates ille est Virgilius, qui Georg. 4. sic cecinit:

..... huc tu iussos asperge saporis

Trita Melyphylla & Cerinthe ignobile gramen. Ignobile gramen Seruius & Paulus Manucius dicunt vile ob copiam, quodd ubique nascatur.

Pro Cerinthe Plinij quatuor plantæ congeneres à quibusdam proponuntur. Harum prima est Cerinthe quorundam maior versicolore flore. Secunda Cerinthe quorundam maior, spinoso folio, flauo flore. Tertia Cerinthe quorundam maior flore ex rubro purpurascente. Vltima Cerinthe quorundam, sed minore flore flauo.

Cerinthes etiam appellatione donantur & hæc plantæ. Gramen ignobile. Liliū fuluū Theophrasti Constantino: Liliū tertium genus Gesneri in Ozoon. Pasqueta Ruellio.

Equicola

CERINTHE QVORVNDAM MAIOR
versicolore flore.

Descriptio

QUATTOR aut quinque ramos siue *caules* habet primū, à summo radicis capite prodeuntes, rotundos, succulentos, interdum cubitales: quos amplectuntur numerosa *folia*, oblonga, circa pediculum latiora, mucrone obtuso, colore ex viridi ad cæruleum quasi tendente, candidis maculis aspersa, nonnihil villosa: è foliorum sinu nascuntur alij ramuli, Heliotropij maioris ramulorum instar sese intorquentes, pleni *florum* secundum ramulorum longitudinem dispositorum, longiusculorum, concavorum, à medio in extremam partem flauorum, altera quæ caliculis inhaerent, ex rubro purpureorum quibus apes valde delectantur: his decidentib. bina plerumq; in eodem caliculo *semina* conspiciuntur, nigra. Erui magnitudine, seminis Echij, aut Ciceris arietini forma: *radix* alba: ubi spontè nascentem obseruauerim ignoro.

Locus & Tempus.

Crescit autem nonnullis Lusitaniz locis, sed copiosè per totam aëticam. Floret nouo vere & Martio. Apud belgas in hortis sata multò serius, videlicet sub æstatis finem, & subinde floribus scaret in hiemem vsque, tum perit, & deciduo semine singulis annis renascitur.

Memitha. Maru.

Quidam Cerinthen esse volunt, ea ratione ni fallor ducti quòd apibus grata sit, quod de Cerinthe & testantur Virgilius & Plinius. Vulgus herbariorum etiam Memitham magno errore vocauit. Non desunt qui Maru siue Almaru Aucennæ l. 1. tract. 2. describam putent, præsertim tertiam eius speciem: qua, vt verum fatear, nihil videtur Aucenna aliud describere quàm vulgarem nostrum buglossum, aut borraginem, quib. hanc nostram temperamento proximam existimo. Hæc Clossius in Hisp. de ea etiam agens in hist. rar. plant. Cæterum iconem proposuit Maru maioris Dodonæi: nomina verò subuertit, quæ etiam minori Cerinthe de qua postea dicemus conueniunt. In lætis & umbratis collibus exit, inquit Dodonæus; tum & secus vias ac agrorum margines in bohemia, Rhætia, Vindelicia, Norico, Pannonia, ac ultra citràque Danubium locis complurimis. Floret ac viget à Maio ad multam ætatem. Recentior ætas Maru appellat. Meminit autem Maru herbari Aucenna c. 464. quinque eius species enumerans: quarum prima & secunda odorata calicæque: quarta similiter calida, sicca & attenuans: Tertia verò temperata, quæ existimatur esse buglossum: quinta refrigerans Missebar dicta: Cum qua Cerinthen (si cum aliqua) conuenire censemus. Videtur verò & Cerinthe eadem stirps esse, de qua Plinius l. 21. cap. 12. his verbis egit. Nec abhorret enim Maru ab eius descriptione: albicantibus siquidem maculis folia candicant; deorsum quoque flexa incuruantur; cubitalis stirps est; capitulum siue fastigium caulis concavos flosculos promit: è quibus apes mel legunt. Theophrastus

Missebar

Κηρίθου inter æstiuos flores l. 6. enumerat; inter quos & Maru herbari flos habendus. Meminit Virg. Georg. 4. ubi ipsam appellat ignobile gramin: quibus verbis, aut Graminis nomine Poëta (quod verisimile) abutitur, aut aliam vult intelligere Cerinthen, quæ graminis sit species. Exstat verò & apud Plinium Lencographidis herbari nomen lib. 27. cap. 11. quæ qualis esset scriptum se non reperisse refert. Quod si verò non temerè nomina stirpibus indita hæc non abs re


Cerinthe Theophrast. Cer. Virg.

Lencograph.

λευκοσπείρις dicitur, folia etenim albis maculis inscripta habet [quin, inquit Aëtius, cum subuirsidis appareat, si ad cotem asfricetur aut ad asperius pallium, locum inalbat.] Potest verò, teste Dodonæo, & Lencographis eadem cum Cerinthe esse dici. Manifestus autem est Plinij error qui de herba scribit quæ lapidi Galactitri tribui debent. Non rarò siquidem eadem stirps sub diuersis nominibus locis separatis occurrit: Non esse autem hanc Memitham, quæ Græcis *μαρίθη*, aded palam est; vè refutatione opus non habeat. Cæterum facultate hæc Maru species frigida apparet atque adstringens: & talis quoque Lencographis est Plinio authore.

Lobel. obs. p. 215. (Icon. Plant. pag. 397.) Cerinthe maior floris sese expandentis colore purpureo-luteo.

C. Bauh. phyt. Cynoglossum 8. siue montanum maius seu Cerinthe, flore purpureo-luteo.

CERINTHE QVORVNDAM MAIOR,
spinoso folio, flauo flore.

Descriptio.

FOFLICITER nobis adulescit Cerinthe maior cubitum vnum aut duos alta, radice recta, simplice: caulis digitali crassitudine, rotundis, læuibus, exalbidis, in ramos plures diuisis: *folia* glauca satui linguam æmulantia, falcatis appendicibus ramos & caules amplectuntur, ex viridi glauca, plagel-

lis candicantibus hic illic sparsis maculota, spinulifq; tam supina quàm prona parte asperata, in ambitu arguè crenata, sapore ferè herbaceo: *flores* ex ramulorum fastigijs dependent plures tantū, lutei, oblongi, in calathi formam, oris læuiusculè diductis: quorum singulis insunt occultata quina stamina lutea mucronibus artius præpilata, extrinsecus verò obuallant quinque; folia angusta, oblonga, concinnè per ambitum crenata: *semina* unicuique flori succedunt bina, Orobi ferè magnitudine, nigra foris, pulpam intus albam continentia.

Semen ex Italia misit D. Io. Henricus Cherlerus gener, vnde enata floruit mihi in horro Ill. E. C. sub initium Iunij. Prodeuntem copiosè in agro Romano idem oculatus est testis, sicut per totam ferè Hetruriam in agrorum & viarum marginibus: Spontè nascentem obseruabam Valentino regno, & florentem Martio, atque Aprilis initio. Semine tamen ex Italia misso nata in belgicis hortis, nonnisi Iunio & Iulio atque etiam serius florebat, & subinde in hiemem vsque.

Lobel obs. p. 216. Cerinthe maioris è floris sese pandentis colore luteo differentia.

C. Bauh. phyt. Cynoglossi 8. seu montani maioris, seu Cerinthe flore luteo varietas.

Locus & Tempus.

*Cerinthe quorundam maior flore ex rubro
purpurascens.*

Cerinthe tertium genus neque sponte nascens, neque in hortis cultum conspexit Clusius, sed I. Placcan Tornasensis Ciuis, in cuius horto cultissimo creuit, iconem misit: feri addens Februario, Martio, & Aprili, pro ætate verni temperie: humido solo delectari, propterea, cum æstiu dies incipiunt, & arescit solum, crebris rigationibus indigere, ut augmentum sumat: atque ut plurimum Autumno duntaxat flores promere, cum videlicet de celo crebri imbres cadere incipiunt. Annuam verò esse plantam.

Lobel. Obseru. pag. 216. *Cerinthe* maioris è flore purpureo & folio fusco glauco differentia. C. Bauh. phyt. Cynoglossi 8. siue montani maioris: seu *Cerinthe* varietas, flore purpureo.

Cerinthe quorundam minor, flore flauo.

Descriptio

Cerinthe dicta Plinij herbariis, caules plures à recta radice fundit, teretes, læues, in alas diuisos, cubitales: partim erectos, partim humum versus reflexos, folia oblonga, subrotunda, Perfoliatæ siliquosæ quodammodo formæ, caulem pinnis rotundis productioribus amplectentia, colore superne in atro-virente vel cæcio, & creberrimis seu poris impressis, non tamen ut in *Hyperico* persuis, obiecto lucis apparentia punctata, inferne magis glauca & vetuli undulata: flores inter alarum folia condit simul multos, caducos, luteos, sublongos, præfundè crenatos de quibus totidem adnascuntur *stamina* Ochreæ colore, stilo solo tenui albido extra flores calathum prominente: ex calyce quinquefolio, cui bina innascuntur femina, foris nigra, intus alba, & medullosa.

Floris lutei.

Locus & Tempus

Clus. in Hist. vocat *Cerinthe* aliam: in Hist. rar. *Cerinthe* quartam: siue *Cerinthe* quorundam minorem flore flauo. Alebatur, inquit ille, etiam in Belgicis hortis, quando Viennam euocatus sum: nec antè sponte nascentem hanc plantam conspexeram, quam in Austriam venissem, in cuius agris atque etiam Styriæ copiosè creseit, interdum etiam hieme in sua viriditate permanens. Huic Clusius in Hist. rar. particularem tribuit leonem: nomina autem ei communia cum priore *Cerinthe*. Eadem etiam illi nomina, & locus assignantur à Dodonæo quæ priori.

Gesn. hort. Cynoglossus montana à quibusdam, *Telephium* nonnullis eruditis existimatum: quæ Romæ in monte Palatino frequens nascitur ac à Græcis editur. Lobel. in Adu. pag. 171. *Cerinthe* Plinij. In Obs. pag. 216. *Cerinthe* minor.

H. Lugd. nei.

H. Lugdunensis imperfectam dat iconem si intelligat eandem plantam quam nos: nescimus etiam cur apud eam dicantur folia villosa.

C. Bauhin. phyt. Cynoglossum 9. siue montanum minus.

Cerinthe quorundam Montbelgardi in horto Ill. C. W. ex semine deciduo quotannis nouis plantis se propagat: eius semen ex Burgundia nomine Maru mihi misit Tossanus Carolus. Olim habui Genue in horto florentem Iunio, & virentem adhuc Autumno: frigore tandem consumpta femine se propagauit deciduo. Lugd. florentem habui Maio. Obseruaui etiam Basilicæ in horto D. Plateri: Tiguri in horto Gesneri: Bononiæ sponte in agris prouenientem, ut & Florentiæ.

ISATIS SIVE GLASTVM MONTANVM Dalechampij.

CAP. XII.



Glastum montanum Descriptio
in niuosis verticibus. montium gignitur, radice crassa, nigra, fibris multis capillata: foliis circa radicem multis, longo crassoque pediculo subnatis, venosis, Glasto similibus, sed in summo magis obtusis: caulibus multis, pede altioribus, in quibus folia supradictis angustiora & acutiora: flor copiosus in caulium vertice luteus niter, oblongi vasculi figura, supernè in culpidis diuisus, prominente in eius medio sinu, tenui pilo.

Vellem locum particularem annotatum ubi reperitur Glastum montanum hoc Dalechampij, quod Hist. Lugd. p. 1104. pingit: non multum forte differt à *Cerinthe*. C. Bauh. phyt. Isatis 3. siue montana vocatur.

Vellem locum particularem annotatum ubi reperitur Glastum montanum hoc Dalechampij, quod Hist. Lugd. p. 1104. pingit: non multum forte differt à *Cerinthe*. C. Bauh. phyt. Isatis 3. siue montana vocatur.

HELIOTROPIVM VETERIBVS
& in genere.

CAP. XIII.

Heliotropia duo sunt Dioscoridi: Maius unum alterum minus, de quibus ita scriptum reliquit. *Heliotropium magnum*, quod aliqui *Scorpiuron* vocauerunt à floris figura, verum *Heliotropium* [addit quidam, *Αἰς*] ab eo quod folia una cum Solis inclinatione circumaguntur: folia habet *Ocimo* similia, sed hirsutiora, nigriora [*λευκότερα* ver. quam lectionem secutus est Marcellus.] & maiora: ramulos à radice tres, aut quatuor, aut quinque: & ex his alas multas: in cacaminibus florem album, suffuluum [ita vulg. ex. ast. Sarrac. *σποδωγ*, purpurascens] incuruum, velut scorpionis cauda. Radix est tenuis & inutilis. Nascitur in asperis locis. Huius herbe fasciculus cum aqua coctus & potus, pituitam & bilem per aluum ducit. Comoda est & ictis à scorpione, cum vino pota & imposita. Adalligant eadem ut amuletum prohibens conceptionem. Tradunt seminis grana quatuor cum vino pota, una hora antè accessionem, febres quartanas sedare [finire Sarrac.] tria, tertianas. At impositum semen, formicarias ac peniles verrucas, & thymos, & epinyctidas resiccant: folia verò podagris, & luxatis, & pueris siriasi, ac partium circa cerebrum & membranas eius inflammatione affectis, vtiliter imponuntur. Mouent eadem menses, & fetus ducunt, trita apposita. Centrum *Heliotropium* paruum [quod & alio nomine *Scorpiuros* vocatur] nascitur in locis palustribus, & iuxta stagna, folia habens similia predicto, sed rotundiora: semen rotun-

semen rotundum, dependens ut peniles verrucæ. Potest herba cum semine, addito Nitro, hyssopo, & Nasturtio, ex aqua pora, latum & rotundum lumbricum expellere. Tollit & peniles verrucas cum sale imposita.

Sed & Plin. Heliotropij duo genera assignat. Heliotropij miraculum sæpius diximus, inquit, cum Sole se circum agentis, etiam nubilo die: tantus syderis amor est. Noctu velut desiderio contrahi cæruleum florem [de Cichorij flore, quæ etiam solem semper aspicit, hoc audiendum. Heliotropij flos, vel candidus est, vel subfusus Dioscorid. Dalech.] Genera eius duo tricoccum (paruum) & helioscopium [magnum.] Is præterea folijs tribuit ad terram vergere, quod Dioscorid. fructui: præterea similitudinem caudæ Scorpionis semini adscribit quam notam Dioscorides Scorpioni assignat, de qua suo diximus loco. Dicendum igitur videtur Scorpionidem congenitem esse cum Scorpiuro Dioscoridis, cum quo Diosc. illam coniunxit, perfectam eius descriptionem subiiciendo; & Plinius pro eadem planta acceperit; Quod autem apud Plinium semen comparatur caudæ Scorpionis accipitur pro cauliculo reflexo, in quo primò flos, deinde semen dispositum est. Plinius itaque Heliotropium tricoccum [minus] cum maiore Heliotropio Diosc. confundere videtur, tribuens uni, quod Dioscorides ad alterum refert. Dioscorides verò omisum Tricoccum videtur sub Heliotropio minore comprehendisse.

Duo igitur esse Heliotropia Varto quoque restatur. Nec minùs admirandum, inquit, quod sit, floribus, quos vocant Heliotropia. Idem & Paulus lib. 7. confirmat, seorsum priusque de utroque agens. Heliotropium *maius*, quod & Scorpiurum vocant, calidam, siccam, & abstergentem vim præ se fert, cuius decoctum potu ejicit pituitam, bilēque: applicatum verò semen ipsius myrmecias & huius notæ vitia perfricat. *Minus* autem Heliotropium, & hæc aboler & latissimeas interimit, si cum semine suo, adiecto nitro, hyssopo, & Nasturtio bibatur. Hæc ille, quibus notis inter se differant satis docet: nec minùs quibus etiam viribus discrepent. Galenus Heliotropium in simplicium medicamentorum catalogo præterit. Cæterum Heliotropium *maius*, seu ut vocat Marcellus, herbam Solarem maiorem, sunt qui Heliotropion, qui Dialon, qui Heliopon, qui Scorpioctonon, qui Solamum agrestis, & qui Scorpij caudam dicunt. Minus verò, qui Scorpiuron, qui Solarem minorem. Circumagitur verò cum Sole Heliotropium, non ut fabulosè quondam in transformationibus suis Nais cecinit ut priusquam in florem mutaretur Syderis illius lucem & formam vivens homo amaverat: mutata etiam continuè contempleretur: sed ut hoc etiam habeant rustici horarium, quod nubilo cælo diurna illis horarum spatia ostendat. Qualia pleraque alia humano generi consulens natura dedit, & adhuc date potest: si in cognoscenda maiestate eius diligentiores facimus. Neque enim æter nos beneficiorum suorum thesauros quæ diana liberalitate ea exhaussit, nec mutato consilio [quin voluptas illi est benefacere] quod semel animalium generi & homini dedit, indignata aliquando aufert. A nobis illi hæc invidia est, cogimurque nos malè audire eam, quæ nunquam satis laudabitur, quum gravius quicquam objicere illi non audeamus defatigatam, exhaustam, effortam & ingratam appellâtes, non aliter quam

qui commestationibus ludisque suis patum faciles patres, avaros, inauriles, deliròsque ingrati filij appellant. Benefica præsertim homini natura est, propter quem fecisse omnia videri potest. Tam multa nobis in cunctis eius partibus inferunt, idèque non contenta in Heliotropij flore diei spatia, & horas homini indicasse, radice, folijs, semineque medicinam etiam instruxit: Sciendumque illud Heliotropium, Heliotropion, & Heliotropion plantæ florisque huius veluti congenere appellationes à Sole omnes factas esse, significareque priores duas quod ad Solem se vertit: tertiam verò quod Solem aspicit. Scorpiuron mox & Scorpij cauda à floribus, vel ut nos certius dicimus, seminis inflexione, quæ Scorpionum caudæ ut Dioscorides ait speciem refert, dictum Heliotropium fuit. Scorpioctonon autem quia Scorpiones enecer. Fuerunt præterea qui Verrucariam vocaverint eò quod tam multis Verrucarum generibus medetur.

Esti multæ sint stirpes quæ Heliotropiæ & Helioscopiæ merito dici possunt, quod ad Solem semper convertantur, & cum eo circumagantur, tamen hic particulatim de Diosc. Heliotropio agitur: Id autem Græcis *ἡλιότροπον* & *σκιότροπον*, ita Latinis Heliotropium & verrucaria nominatur, Gaza Solaris, Recentioribus Herba cancri, quod adversus Carcinomata præsens sit: Ital. *Girasole*, Hisp. *Tornasol*: Gallis *Tornesol*, & *l'herbe au chancere*: Germanis *krebsblumen*, & *Sonnenwübel*: Belgis *Sonnevende*, *kanker*: & *krebscruyt*: Anglis *Scorpions tale*.

Plantæ tandem Heliotropia vocatæ, hæc nobis notæ sunt.

Heliotropium *maius* flore albo, quod Heliotropium *maius* Diosc. esse dicimus.

Heliotropium minus quorundam siue supinum, Heliotropij maioris proculdubio genus.

Heliotropium tricoccum, Heliotropium minus Dioscoridis, cum quo existimamus idem esse Heliotrop. alterum Matth.

Heliotropium minus tertium Tabernamont. quod est Cynoglossa minor.

Præterea inter Heliotropia etiam recensentur: Echium Scorpionides minus. Ocimastrum verrucosum à Gesnero. Cichorium. Calendula siue Caltha, sed magno errore: Herba maxima, de qua lib. 23. Malva apud Græcos teste Ruellio, & Guilandino. Lupinus eodem teste Ruellio teste. Lotus apud eosdem Græcos eodem teste vi & Guilandino. Ricinus, Monachis testib. Melissa, ut vult A. à Bodenstein. Elatine mas, teste Dodonæo.

Heliotropij defectu sumitur semen Rapæ, Fuchio in antiball. scriptore.

HELIOTROPIUM MAIUS flore albo.

MAjus Heliotropium duarum aut trium vinctarum est planta, alias dod. antalis & maj. Descriptio
jor, radice simplice lignosa: caule turgosâ medullâ plenus, foris ex v. rudi tocanus, tomentosus, multis alis concavus: sive ad ramulorum exortum & per ipsos ramos disposita. Ocymifoliis paria ex rotundo oblonga, nervosa, cauli concoloria, hirsuta: flores ramosi, albi, parvi, foliolis lanuginosis obiti: cæterum racemus ille spicatus cacumen in se Scorpionis caudæ imitat, contorquet: semina succedunt triangula, brevia, cinereo, quaternâ iuncta, acuminibus coëvolutibus globo-

A detailed botanical illustration of a plant, likely a species of Verbena. The plant features a thick, gnarled, and somewhat horizontal root system emerging from a rough, textured ground. A single, upright stem rises from the center of the root. This stem is densely covered with large, lanceolate leaves that have prominent veins and slightly wavy margins. At the apex of the main stem is a large, rounded, and very dense cluster of small flowers or fruits. Several smaller, similar clusters are shown branching off from the main stem at various points. The entire illustration is rendered in a classic, engraved style with fine lines and cross-hatching for shading.

Tom. III.

Virca & vfu

C. Bauh. phyt. *Heliotropium* 2. *huc repens*:
Heliotropium sopium Clusio. Item *Heliotropium*
4. huc minus alterum: Heliotropium minus

C. Bank.net.

**Locus &
Tempus**

H. Lud. nor.

Math.net?

Z z z

Lob. in Adu. & Leon. Plant. Adhæc Heliotropium 5. siue alterum Matthioli. Hoc enim quoad figuram falsam Matthioli relinquo, sub minore: quod verba attinet, referenda ea potius ad Echium Scorpionides Solis equum. Præterea Heliotropium Clusij quod secundum facit temperare non obseruavi, nec sepe à Lobeliano, quod quarto loco recenset.

Locus & Tempus.

Accepi semē milium à Casabona Sturgardiam cum inscriptione Heliotropij supini Candia: seminaui hoc Montbelgardi in horto E. G. anno 1594. Heliotropium supinum Clusius ad quorundam agrorum margines, præsertim vbi Melopepones feri solent, Salmanticæ reperiebat: Florebat sub finem Iulij & Augusto, quo mense, & interdum Septembri, semen eius ad maturitatem perducitur solet. Lobelius in quibusdam Monspelicæ siluæ paludosis scrobibus obseruauit.

Vires & v. sus.

Cæterum, ut eiusdem cum maiore est temperamentum, ita iisdem etiam viribus pollere verisimile est, inquit Clusius.

HELIOTROPIVM TRICOCCVM.

Descriptio



Heliotropio tricoeco radix subest lignosa, simplex, paucis apophysis fibrata, caulis cubitalis, rectus, incano tomento oblitus, sicuti & folia, Heliotropij maioris similia, maiora, sinuata, nervosa, flores racematum in priuatis pedicellis coherent, exigui, luteoli, nullum post se semen relin-

quentes. Siliquæ enim nullo præcedente flore nascuntur, tricoceæ, cinerei coloris, aspera superficie & verrucosa, quibus dehiscensibus semen exiit cinereum. Figura nostra ex Fuchsianis non placet, quare bonam ex Clusio parari curauimus, qui sic describit.

Descriptio

Minus Heliotropium vnico assurgit caule pedali, ramoso, illius folia superiorum folijs dissimilia, nonnihil ad Xanthij, plurimum verò ad Solani semiferi folia accedunt, mollia & candidantia: Flores pusillus, racematim congestus, luteolus, inutilis, quippe qui sine semine perit, veluti flos Ricini & quarundam aliarum stirpium, quæ sua semina è floribus non producunt: ex alarum tamen cantis dependent ex longis petiolis, sub folijs quasi occultantur, sine flore enatæ siliquæ triangulæ, quales Tithymalorum, sed asperiusculæ, scabre, nigricantes, in quibus semen cineracei

coloris, quod dehiscensibus siliqualis exiit, quemadmodum Tithymalorum & Ricini semina: Hæc capita siue siliquæ pannis affricatis, ferrido viridi colore eos sufficiunt, qui temporis momento in caeruleum, cumque elegantem, mutantur: radix inutilis, nec vires, ut quæ singulis annis, ut priores, pereat, ita, ut nouæ plantæ semine deciduo renascantur.



Heliotropium minus Græcis dicitur, Heliotropium minus Latine, ut Gesner. host. Camer. in Hist. Matthiol. germ. & Epit. nemque de hoc vbi etiam Herba Clytia vocatur, quæ in hanc mutata fingatur à Poëtis, vnde hi versus.

Herba velut Clytia semper perit obuia Solem.

Sic pia mens Christum quò proci spectet habet. Plinio qui eius historiam cum Scorpionide Dioscoridis confundit, Heliotropium tricoceum: Clusio Heliotropium minus tricoceum: Lobel. in Adu. pag. 101. Heliotropium vulgare, Tornef. Gallorum, siue Plinij tricoceum, quod Dioscoridem præterisse, aut cum minore in vnam Historiam contraxisse, scribit, quamvis immerito, si quidem ipsemet in obs. p. 133. Itemque Icon. Pl. p. 261. Heliotropium paruum Dioscoridis vocat Heliotropium minus Clusij & tricoceon Plinij Aduersariorum. H. Lugd. pag. 132. Heliotropium tricoceum Clusij. C. Bauh. phyt. Heliotropium 1. siue minus tricoceum.

Germani *klein krebssblum* vocant: Itali *Heliotropio minore*, & si Clusio credimus, Castellani *Tornasol*: Narbonenses *Tornefol*, quæ quidem voces à Græco nomine deductæ videntur: Monspelienfes apud quos copiose prouenit, Verrucariam. Huius herbe Baccas, ut Camer. scriptum reliquit, in Gallia Narbonensi insectores lanæum vocant *la Morella*.

Monspelij semine prægnans vidi mense Augusto: Geneuæ in horro meo semen proferebat, ut & Lugdunî mense Iunio. Clusius inquit Salmaticensi agro frequentissimam. Lobelius in Gallia Narbonensi. Magno questu colligit rustici Lunellæ, Narbonæ, aliisque vicinis locis matura semina Septembri, quæ distrahunt, insectoribus, & Chirurgis nonnullis, huius plantæ vires ad medica prælidia supra quàm dici potest effertentibus.

FINIS LIBRI TRIGESIMI TERTII.

HISTORIÆ



HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM LIBER XXXIV.

PLANTÆ MALIGNÆ ET VENENATÆ : VT SOLANA, ELLEBORI
Aconita, Tithymali, & affines.

Quod stirpium diuicias omnigenas ostendere professi, tacite aut luscis oculis praeferunt eas, quarum non gustum modo, sed & odoratum, & ipse quoque intempestuum contactus nocere possunt: tam a seculo suo nobis abesse videntur, ut ipsam etiam sua professionis dignitatem, estimationemque in periculum trahant. Qui ergo dixerimus herbas & florum imagines, ac plerumque huius naturae non vulgata tantum, sed & rara ac difficilia, eadem tacebimus quid in ipsis hortis nocere possit homini, ceterasque malignarum herbarum naturas, inter ceteras nascentium: cum praesertim nisi nascenti eas, ipsa possessio poena sit, aut esse possit? Minime verò. Quin omnem insumentis operam licet sustinere, sed & noxae periculum urgeat: quando ita decretum est, minorem gratiae aut voluptatis nostrae, quam utilitatem via respiciam habere. Quapropter & minus tutas homini, & perniciosissimas quasque herbarum indagabimus. Quamquam nec ista quidem medicinis caveant, sacra illa parente verum omnium nusquam non remedia ponente homini, ut medicine fierent etiam venena ipsa. Incipiemus autem à Solanis, earum promiscuo usu immensum statim periculum imminant.

SOLANVM, STRYCHNOS VETERIBVS ET IN GENERE.

CAPVT I.



SOLANVM, σόλον Græci vocant, quod Vitem vel acinum, aut tale quid signat. Theophrastus lib. 19. hist. cap. 12. 14. & 21. duo Solanorum [Vesicarium Gaza] genera tradit: Somniferum scilicet & furiosum: at Dioscorides lib. 4. genera quatuor recenset: 1. est Solanum hortense, σόλον κρηναῖος: Alterum, quod peculiari nomine Solanum Halicacabum, σόλον ἡλικακάβον, vocant. 3. Solanum somniferum, σόλον ὀπνιωπικόν: 4. & vltimum, Solanum manicum seu furiale, σόλον μακρικόν.

Solanum autem Græcos Strychnon vocare testatur lib. 2. cap. 13. Plinius, qui ante lib. 21. c. 31.

Pliniosiam. Strychni etiam quatuor genera enumerat.

Apuleius omnia Solani genera vno capite complexus nomina eorum inter se sordè permiscuit.

Gesnerus de avib. itémque de Lupo pro Cauli, ut habetur apud Syoniam, legit Cuculum, exponitque Solanum.

Æquiuoca. Cæterum, Solani vox hodie de pluribus stirpibus prædicatur. Est enim Solanum vulgare, quod Dioscoridis hortense statuimus, fructu nigro & subuiridi. Solanum vesicarium vulgare, Halicacabum Dioscoridis. Solanum siue Halicacabum Tom. III.

bum Indicum. Solanum verticillatum, quod nobis non videtur multum differre à Solano somnifero Diosc. Solanum manicum multis siue *Bella donna*. Solanum tetraphyllum quod Gesnerus Herbam Paris esse contendit. Solanum arborecens, vel fruticosum, siue Strychnodendros, vulgò Itolorum Amomum Plinij putatum. Solanum Hietichunteum Cast. Durantis. Solanum manicum ex Guinea, de quo egimus H. N. l. 3. cap. de Darura. Solanum scandens siue *καυκασικόν*, nobis Amara dulcis. Solanum tuberosum esculentum, Pappas appellatum. Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli, quod Mala aurea inscribimus. Solanum pomiferum fructu striato duro rotundo C. Bauh. Solanum peregrinum fructu rotundo, Hyosciamus peregrinus Dalechampij, H. Lugd. C. Bauh. Nobis Solani species ex Apennino quorundam. Solanum pomiferum fructu oblongo, albo, purpureo, & luteo, Mala insana nuncupatum. Solanum pomiferum fructu incuruo, flauo, cinereo, & purpureo, de Melanzana. Solanum pomiferum fructu spinoso, longo, rotundo, atro, subnigro: Melanzana nigra. Solanum spinosum fructu rotundo, Pomum Hierochonticum Imperati C. Bauh. Solanum pomiferum folio rotundo tenui, Cachos Indorum Monardis, de quo

Scriptum H. n. lib. 1. Solanum pomo spinoso, rotundo, longo flore, quod dicitur de Stramonio multorum. Solanum fœtidum pomo spinoso oblongo: vel Stramonia altera. Solanum fœtidum pomo spinoso rotundo, Stramonia Ægyptiaca dictum. Solanum Ægyptiacum flore pleno. Solani folia Circeæ dicta maior: Et altera alpina, Osimastrum verrucarium. Solanum Mexiocanum flore magno, salminum Mexiocanum. Solanum Mexiocanum flore paruo C. Bauh. Solanum Indicum hirsutum corymbiferum, Clus. Exot. lib. 4. c. 19. Solanum triphyllon Brasilianum C. Bauh. Solanum racemosum Ceraforum forma, eiusdem. Solanum 8. C. Bauh. siue Herba à militibus ad ciuitatem Philippi euulsa & gustata, quæ eos propè ad furorem & insaniam redegit. Solanum quartum Trago, quod est nobis Pes aserinus.

SOLANI SPECIES VARIE

CAP. II.

SOLANVM HORTENSE SIVE VVLGARE.

Descriptio



Primariæ radus quæ parum altè agi solet numerosæ fibræ summo cespite vagantes adnascuntur: vnde caulis surgit cubitū & sesquicubitū altus, angulosus, subhirsutus, multis alis concavus: folia quæ fors tulit posita ad Attriplicis folia accedunt, saturatiùs virentia, modò sinuosa, aliàs

integra, nec quæ pediculo adnectuntur ita falcata: flores albidus, ex quinque folijs rotidem staminibus in ea coeuntibus, confusos excipiunt ita ematim dependentes corymbi siue baccæ. Hederaceis pares, succo præguantes, in quibus semen pluriimum, minutumque: color autem baccarum variat in hac planta, inquit Matthioli: in vna enim nigra, in altera lutea, & in alia subvirides spectantur. Variat acinis rubris luteis & nigris Gesn. & Camer.

Diosc. Solanum hort. Dioscoridi Solanum hortense [ἐπὶ τοῦ καυτοῦ] frutex est esculentus, haud magnus [ὅτι ἡ ἀλφειὰ ἄλλος codex non habet] alarum cauis multis, folijs nigris, & quàm Ocymi maioribus ac latioribus, fructu rotundo, ac primùm quidem viridi, mox ubi maturitatem assecutus est, nigro aut fuluo: est verò herba innocentis gustus.

Plin. Solan. De hoc Plinius ait lib. 27. c. ultimo: Solanum Græci Strychnon vocant, ut tradit Cornelius Celsus. Huic vis reprimendi refrigerandique. Lib. verò 21. c. 31. longius omnem Strychni Historiam prosequitur.

Synonyma C. Bauh. phyt. & pin. Solanum bacciferum siue officinarum: Solanum Brunfels. tom. 2. raph. 8. & in 4. p. 94. Solanum vulgare Trago: So-

lanum minus Cæsalp. Solanum Lon. hortense Matth. Fuch. Angl. Dodon. Gesn. hort. Lobel. Obs. p. 134. Icon. Plant. p. 262. H. Lugd. p. 597. Cam. & Ger. Satiuum Tab. Solanum nigrum Cord. in Diosc. & hist. quod edendo est. Cuculus & Cacubalum Plinij, Anguill. Solanum hortense, Circeæ aut Phæcoli folio Lob. in Adu.

Variat folijs magis laciniatis, ut Fuchsi figura: alia Halicacabi, ut figura Lobelij exprimit: acinis nigricantibus & fuscis: puniceis, quod Solanum puniceum Cordo hist. rubris, luteis, quod Solanum luteum Gesn. hort. Sic in arenosis Michelsfeldæ vix palmam excedens reperitur.

Σολύχρον καταιγίδας. Arabic. *Hamebathanalab*. Nom. ling. seu *Hameb alcha chaich*, seu *Hanabalibabeh*. Germ. *Nachschatt*, quæ vox umbram nocturnam sonat. Belg. *Naschaye* & *Nachsiade*. Gall. *Morelle*. It. *Solatro*, seu *Herba morella*. Hisp. *morella* & *terna mora*. Belg. *Nigtschade*, *morell*, *petje morell*, *houvendes berre*. Hung. *Zep zolo*, h. e. pulchra vna.

Solanum istud multis gignitur locis, nec enim modò in hortis, à quibus cognomen tamen accepit, & in quibus crebrò alijs herbis permixtum reperitur; verùm & secus vias, agrorum margines tam Meridianæ, quam Septentrionalis gentis, sepimenta, veteres parietes, ruinas, & in asperis rudibus subinde reperitur. Æstate autem, & in multum quoque Autumnum floret, & tunc quidem fructus maturi conspiciuntur.

Solanum hortense frutex est esculentus, innocentis gustus. Vis ei refrigerandi: quare folia erysipelatis & herpetibus cum polline polentæ conuenienter imponuntur. Trita autem & per se imposita, ægilopa, capitisque dolorem sanant, & stomacho æstuant auxilium: parotidas cum sale detrita illi discedunt. Sed & ipsius succus valet aduersus erysipelata & herpetas cum cerussa rosaceo & argenti spuma: ægilopas verò, cum pane. Infantibus quoque inflammatione laborantibus, quam Siriasin vocant, cū rosaceo infusus proficit. Inferitur & aque, vel vit. oui vice collyrijs, quæ contra fluxiones acres illinuntur, quin & aurium dolori instillatus prodest: fluorem etiamnum mulieribus sistit in vellere subditus. Denique succus fuluo gallinarum cortallium [domesticarum, Corn.] limbo subactus, & linteo appositus, ægilopis præsentaneo est remedio. **Plinius** Plin. non. Cucubali folia trita cum aceto, serpentum ictibus & Scorpionum mederi dixit. Sed cū vi refrigerandi & reprimendi polleat, ut ipsemet Plinius ait, aduersus ictus vel morsus venenatorum animalium Solano uti nollem. Ad fugandos quidem serpentes facere, testatur in Ther. Nicander.

Accipit innocuo medicamento frigore Strumum.

Greuius tamen nullam eius rei rationem naturalem inueniri ait, quòd singulæ Solani species à Dioscoride descriptæ, frigida sint, in qua te cum terpentibus, quamvis venenosi sint, conueniunt. Existimat autem hoc fieri ob naturæ quandam contrarietatem. Trychno, quod aliqui Strychno vocant, quodque edunt, vitur **Galenus** ad ea, quæ refrigeratione & adstrictione opus habent: posse enim hæc duo ordine secundo. Succus [inquit **Matth.**] phreneticos iuuat ex aceto, & rosaceo sincipiti illitus. Illinitur fronti contra calidas oculorum fluxiones. Gargarizatur quoque cum aceto, ad faucium, & columellæ inflammationes & additur conuenienter in vnguentis, & emplastris, quorum ad vlcera contumacia est usus: erbis idoneus est. **Fontanus** de Morb. intern. lib. 3. c. 29. in serapio ad cancerum vteri præscribit folia Solani

Varietas

Tempus

Vires & v. fus

Temp. Gal.

lani dicens: proprietate oculis discutere humorem cancri. Seuerinus Gobelius in suo de Succino commentario tradit ex putredine huius herbe vermes virides maculis luteis intermixtis crelere, in quo um capite cornu apparet interdum ferme digiti longitudine.

SOLANVM HALICACABVM VVLGARE.

Descriptio



Restibilibi
terpētis
Radix ferti-
litate, licet
ei parum, af-
fatim se pro-
pagat, colicu-
lis tenuibus,
subrubenti-
bus & sub
hirsutis folia
sustinentib.,
Solani hor-
tentis, maio-
ra, leuiter
hirsuta, saepe
bina, sed in-
didem orta,
ex quorum
alis penduli
emicant flo-
res exalbidis,

in quinque laciniis diuisi, apicibus concolori-
bus, pediculo vntati: quibus succedunt verticuli
herbidi, per maturitatem rubentes, in quorum
singulis fructus Cerasi magni udine, colore, &
forma, cum pulpa semina continens Strychno-
dendry, orbiculata, comor ista: sapor fructui aci-
dus cum paruo amaro. Matthiolo, baccæ vino-
so iucco referta, ipsæque rubentes. Rusci baccis
per similes, sapore austero simul & amaro.

Dioscoridi est alterum Solanum, quod pecu-
liari nomine Halicacabum vocant, atq; Phylalida,
i.e. Vesicariam, foliis antè dicto similibus, verum
latioribus: huius caules posteaquam adoleuerūt,
proni terram sp. & int: est autem fructus intra
folliculos orbicularos vesicis similes fulvus, ro-
tundus ac lauis cen vix acinus.

Plinio Strychni dicitur alterum genus, cui
acini coccinei, granosi in folliculis: Halicacabum
vocant, alij Callion: nostri autem Vesicariam,
quoniam Vesicæ & calculis prodest.

C. Bauh. phyt. & pin. Solanum bacciferum i.
sive vesicarium: Solanum halicacabum Trago,
Matthiol. Lac. Lobel. Adue. l. Obf. pag. 114. Ic.
Plant. pag. 162. H. Lugd. Solanum vesicarium
Gefn. hort. & Dodon. Halicacabum Anguill. &
Cast. Halicacabum vulgare Fuchs. Turn. &
Eyst. Halicacabum vesicarium Camer. Halicacabum,
sive Vesicaria, Cordo h. & Gefn. hort. Vesicaria
Cordo in Dioscor. Gefn. hort. & Cæ-
salp. Vesicaria vulgaris Dod. gall. prima Cast.
Alk: Kengi Lonie.

Græcis *σολανον αλκακαβος* & *φυσαλις* Dioscor.
Germ. *Juden kirschen*, quasi dicens Cerasa Iudaica,
Judenbeutlein, *Judendack'in*, *Schlotten*, *Boberel-
len*, *Teuffelskirchen*, *Pfaffenschlöss*, *Pfaffenbied-
lein*, *Rottnacht schatten*, hoc est, Solanum ru-
brum, *Gross: oder Rottsteinbrech*, vt Brünfeli. Sa-
xisraga rubra. Belg. *Kriechen ouer zee*. Gall. *Ba-
guenaudes*. Ital. *Alchakengi*, *Halicacabo*. Hisp.
Vexiga de perro. Angl. *vivinter cherye*. Hung. *Pap*

monya, hoc est, Testiculus sacerdotis.

Nascitur in parietinis, locis vmbrosis, aliquan-
tulūm humentibus quandoque prope viginosas
sepes, & circa ag. orum margines. Sub Autum-
num fructus maturescunt: flores antè apparent
scilicet Maio, Iunio & Iulio.

Vim, authore Dioscoride, vsumque obinet
hortensis Solani, nisi quodd in cibos minimè re-
cipitur. Valet autem fructus epotus ad expur-
gandum morbum regium, quā prædictus est vrinæ
ciendæ facultate. Cæterum, ex vtriusque So-
lani herba succus elicitur, qui siccat in vmbra
reconditur, & ad eadem illa pollet. Arnoldus
de Villa noua tria Alkekengi grana cum bono
vino albo terit, potūque dat ad euacuandam vrinam
in hydropicis. Baccarum vis [addit Mat-
thiol.] habetur non solum præstantissima ad re-
num vitia, & ciendam vrinam, sed ad eius quo-
que acredinem retundendam: bibitur namque
earum succus ad ea omnia vtiliter cum Papaue-
ris albi cremore, aut seminum Melopeponum,
aut Cucurbitæ, Cucumerisue. Aspidibus autem
aduersissimum est Halicacabum, vt admotā pro-
pius eius radice, sapore inexpugnabili necentur.
Refrigerat autem & adstringit ordine secundo,
præceptore Galeno.

Locus &
Tempus.

Vires &
vires

Morb. regium

Vires &
vires
Hydops

SOLANVM SIVE HALICACABVM

Indicum.



Caulis
Chuic So-
lano cubita-
lis, crassiuscu-
lus, in crebros
ramos didu-
ctus: per quos
folia Solani
vulgaris, la-
ciniata, arro-
uientia, ven-
nulis ex me-
dio neruo ob-
liquis in la-
ciniis expor-
rectis, pedi-
culo duūm,
triumue vn-
ciarum: flores
è ramorum
diuaticatio-
ne, foliorum-
que sinu prodeunt, lutei, Solani halicacabi simi-
les, ex vnico folio in quinque angulos exacuto:
vesicæ Halicacabo pares sequuntur, virentes,
quas acinus replet magnus, semine Halicacabi
refertus, insipidus.

C. Bauhin. phyt. & pin. Solanum bacciferum
3 sive Vesicarium Indicum: Camer. hort. & Ic.
itémque Eyst. Halicacabum sive Solanum Indi-
cum.

C. Bauhin. phyt. & pin. Solanum bacciferum
3 sive Vesicarium Indicum: Camer. hort. & Ic.
itémque Eyst. Halicacabum sive Solanum Indi-
cum.

An de hoc Ollius in Musæum Calceolarij? Et
planta vocata Concordia aliunde deuecta, neque
ita nobis familiaris & domestica, quæ flos no-
ctis dicitur, Solanum vesicarium. Hic flos veluti
tenebras hortescens, nocte clauditur, die verò
Sole aduentante, diducitur, & folia cum floribus
panduntur.

Apud Germanos non nisi in hortis quibus-
dam colitur, vt Môtbelgardi, Basileæ, & Lutetia.

Solanum somniferum Veteribus.

Solanorum (Vesicarium reddit Gaza) gene-

Locus

ra duo videre licet, inquit Theophrastus Plant. l. 9. cap. 12. Alterum somnificum radice rubrâ, sanguinis modo, sed candida cum siccescit, fructu rubro, quàm Coccus (grano iligneo, Gaza) folio Tithymali [Lactariæ, Gazæ] simili, aut Malo dulci, sed piloso: huius corticem radice tondentes admodum & in vino meraculo madescentes dant, atque ita dormire faciunt: nascitur rupibus & faucibus atque sepulchris.

Solanum somniferum aliquos Halicacabum vocare testatur Dioscorides, qui sequentia de eo scribit. Frutex est numerosis prædictis ramis, densis, caudicosis, fractu contumacib. pinguium foliorum, Coronæque mali similibus plenis flore rubro, prægrandi [εὐμεγέθης, vet. caret.] fructu in folliculis [ἐν λυβοῖς, vet. συλλεκτοῖς μικροῖς] Croci colorem æmulante: Radice denique grandi, cortice subrubro vestita. Nascitur in petrosis locis [ἐν πετρώδεις τόποις. Ald. ἐν πέτραις.] non procul à mari [ἐν λίαν θάλασσης, vet. caret.] Radicis cortex drachmæ pondere in vino potus, somniferam vim habet, quàm opium mitiorem: fructus autem potenter urinam cit: atque aded corynbi duodecim hydropicis exhibentur: quod si plures numero præpinentur, mentem è sua sede & statu dimouent. Sed remedio est aqua multa copiosa potui data. Pastillis etiam, ac doloris leuamen præbentibus medicamentis succus eius admiscetur. Idem decoctus in vino, si ore continetur, dolorib. dentium succurrit. Cæterum, radicis succus cum melle inunctus, oculorum hebetudines tollit.

De hoc Solano superiori historiz hæc addit Plinius. Quin & alterum Solanum, quod Halicacabum vocant, sopotiferum est, atq; etiam Opio velocius ad mortem, ab aliis Morion, ab aliis Moly appellatum. Laudatum verò à Diocle & Euenore &c. Et paulo post: Halicacabi radicem bibunt, qui sunt varicinandi callentes, quod fure ad confirmandas superstitiones aspici se volunt. Remedio est aqua copiosa multa calida potui data.

Galenus Solani somniferi radicis corticem cum vino potum drachmæ pondere, somniferum esse ait: & ad alia Papaueris succo similem, sed in tantum debiliorem, ut terrij ordinis sit frigefacientium, illo in quarto locato. Semen eius vim citendi urinam habere, sed insatiam inducere, si plures quàm duodecim corynbi bibantur.

SOLANVM VERTICILLATVM.



Solanum verticillatum cubitale & maiorem altitudinem assequitur, caule recto, tereti, hirsuto, per quem alternata folia, Præpex folius proxima, minora ut mihi videtur, ex rotundo leuiter in acumen desinentia, hirsuta, pediculis vinctâ breuioribus hærentia: è quorum sinu flores caulem proximè verti-

cillatim oriuntur, Solani vulgaris pares, ex luteo pallescentes, ex quinque foliis compositi, apicibus aliquot in medio: succedunt vascula mascula semen continentia, utriculis hirsutis fimbriatis obuoluta.

Matth. in prior. comm. depingit nomine Solani somniferi dicens tertium Solanum esse, sibi-que Pisis à Ghino missum, omnibus planè notis legitimo respondens. Id autem non describit. In post. comm. & Hist. germ. ceu etiam in Epitome (vbi verba Dioscoridis ponit) tradit florem habere rubrum, qualem etiam suo Solano somnifico, semel tantum, ut ait, ad ripas Belgici maris viso, adscribit Amatus. Dodonæus tamen flosculos subrubentes, suo Solano somnifero attribuit. Ego autem ex luteo pallidos tantum obseruavi.

Solanum hoc vipote somniferum, Theoph. Dioscoridis, Plinij, & Galeni, negat in Adu. Lobelius, ut quod verticillatis florib., aliisq; quam plurimis indiciis, quidvis potius quàm Solanum exprimat, nec viribus aliquin respondeat. Sed debilem suam, nimisque intolentem opinionem argumentis haud comprobabat. Litem discernere h tandem poterunt, qui aliorum hac de sententiam cum antiquorum decretis conferent, & sine passione dijudicabunt.

Et rectè, meo quidem iudicio, appellantur Matthiol. Guill. Gesn. hort. Lac. Clus. hisp. & hist. Dodon. Lob. in obs. p. 155. in Icon. Plant. p. 263. Cast. H. Lugd. Camer. & Cæsalpinus, Solanum somniferum. C. Bauh. pin. Solanum baciferum 7. siue somniferum verticillatum: Et phyt. Solanum 10. acinis in folliculis hirsutis per maturitatem, nunc rubris, nunc ex rubro croceis.

Dioscoridi εὐχρηστὴν ὑπάρχοντα dicitur; Theophrasto verò εὐχρηστὸν ὑπάρχοντα; ab aliis δὲ ἱερὸν & ἀλκμαῶν; Plinio Halicacabon & Morion: ab aliis Latinis Solanum somniferum: à plerisque etiam Solanum manicum, Apollinaris minor, Vlticana herba, Obsago: Malacensisbus Oruale. Clus. & Dodonæo: Lob. verò Hisp. yerna mora que accarrea locura.

Spontaneam vidi: Clusius in Hispania in arce inferiore visis Malaga vulgò dicta: apud Belgas verò & in Germ. hyemem non ferre, sed singulis annis ferendam scribit: vidi autem Basileæ in horto D. Fælic. Plateri florentem Octobri; Montebelgardii Septembri in horto Ill. E. C.

An Solanum somniferum Alpini, Cuius foliis contusus emplastri modo ad calidas inflammationes vtuntur, atque illitis ex ipsorum succo fronte, temporibus, ac aliis corporis partib. in quibus pulsus sentiuntur: vel iisdem contusus, emplastri modo appositus, ad somnum familiarissimè vtuntur, non minusque ad exustiones?

DE SOLANO FVRIOSO ex Veteribus.

Solanorum, inquit Theophrast. (Vesicariarum, Gaza vertit. Alterum genus, furiosum sc. [δὲ δὲ μακρὸς εὐχρηστὸς] quod alij Thryoron [θεῖον. Gaza legit θύρον. Briorem] vocant, alij Periton (Perisson, Gaza) candidam, longamque & concavam cubiti ferè longitudine radicem habet. Datur bibenda drachmæ pondere, si quis per jocum efficere voluerit, ut pulcherrimus videatur, qui biberit. Si verò furere adhuc magis hominem, visâque aliqua animo eius obseruaci, duarum drachmarum: & ut furor desinat, trium: & ut

Solanum somniferum
Diosc.

Lob. opinio
reprobatur.

Synonyma

Nom. ling.

Locus & Tempus

Flores

Dioscorides
Idem.

Plinius

Morion
Moly.

Solanum somniferum
Galenus.

Descriptio

Descriptio

de veraturo, Contusurium admiscere: Et postremò si hominem perimere, quatuor. Folio Eruce est simile, sed maiore. Caulem altitudine quantum protensa veritque brachia ab altero summo medio digito. ad alterum traiecit, per pectus longitudine patens, ut vix longitudo: caput Gethyo simile, crassius, Plantani fructui par.

Dieß.

Masticum siue furiosum Solanum, ut Dioscorides ait, *Bruxæ* [ῥόζιον] similia folia habet, attamen maiora, & ad *A. amchi*, quem *Paderota* vocant, accedentia: caules producit à radice proceros [ῥαχίον] decem aut duodecim, *Orgyx* [ὄργυρα] autem montana est *Hesychio*, quanta est ambazum manuum extensio) altitudinem habentes: caput verd in fastigio eminens, ut *Oliua*, sed hirsutius, instar *Plantani* pilulæ: grandius tamen ac latus: flos niger: post hunc fructus racemosis, torundus, niger, acinos decem aut duodecim, veluti *Hedera* habens coxymbos: sed vix modo molles: radix iubeat candida, crassa, concava, cubitalis. Nascitur in montanis & vento expostitis, ac *ματαίωτον*, h. e. locis latis, magni que, mari vicinis.

Index

De hoc Solano Plinius sequentia prodit. Tertio folia sunt O ymi, minutè diligenter demonstranda, remedia non venena tractantibus: qui-
pe infantiam facti paruo quoque succo. Quan-
quam & Greci autores in iocum vertit. Dra-
chmæ enim pondere lusum gigni dixerunt. Spe-
cies vanas, imaginè que conspicuas obuolari
demonstrantes. Duplicatum hunc modum, le-
gitimam infantiam facere. Quidquid verò ad-
ciatur ponderi repræsentare moitem. Hoc est
venenum, quod innocentissimi autores Doryc-
mion appellauêre, ab eo quoddam cupidines in præ-
lia ringerentur, illo passim palcente. Qui par-
ciùs spectauerant, Manicæon cognominauêre.
Qui nequiter occultabant, Erythron, aut Neurida:
venonnulli Perithon: ne cauendi quidem cau-
sa curiosius dicendum. Ita Plinij vetus co-lex, in
quo nulla pudoris vox, aut vestigium saltem
eius habetur. Patet autem ex Theophrasto in
Plinij vulgatis exemplaribus falsè latum pudoris
legi.

Galen. 1

Galeno Solanum furiosum inuile est ad inter-
nas medelas. Si enim quatuor drachmæ fuerint
acceptæ, mortem inducunt: si p-uctiores infan-
tiam: Vna innoxia est, id neque ipsa vtile quid
habet. Extrâ corpori impolitum, vñ et maligna
proserpendo pue depalcen-ia curat. Ad hoc opti-
mus est radice cortex, siccans secundo ordine
iam completo, & tertij initio. Frige faciens initio
secundi.


Tréxer appellatur manica à nonnullis *tréxer*,
tréxer, item & *tréxer*, ab aliis *tréxer*, aut po-
 tiùs ut Theophrastus habet, *tréxer*, vel *tréxer*.
 Dicitur & *tréxer*, à *tréxer*, *tréxer*, & *tréxer*.
 Dioscor. l. 6. de lethalib. med. Dorycnion etiam à
 nonnullis Solanum manicum appellari ait.

Nom. varia.

SOLANVM MANICVM MVLTIS,
siue Bella donna.

Descriptio

TOrum pulchillum opacat pernicioſa Solani
Bella donnx dictæ luxuries : namque ex ra-
dico crassa rubi cubitis altiores caules eligit , pol-
lice crassiores , hirsutos , qui in rubet & flucen-
tes , in multos ramos indidem ferè exortos bra-
chiantor : *sic* Solani horrentis formâ , non sinua-
ta , & plusquam duplè , triplèque maiora , utrinq;
pilosa , super atro-wirentia , infernè ferè her-



bida: flores
sternati ex foli-
orum alis
rubeant, Cam-
panularum in-
star, in quin-
que laciniis
divisi, colore
inter quidem
lurido purpu-
reoque, fundo
luteo vertico-
lore, extra ve-
rò tantillum
ex herbido
rubescentes,
subhirsuti: oc-
cultae autem
fibris quinque
ad exortum
hirsutas, qua-
lis & fundus
est, apicibus
albidis: stylis
verò produ-
ctior extra
floris oras pro-
minetur capi-
tulo viridante:
decidentibus
floribus insi-
dente hirsu-
to quinque-
partito caly-
ci *bacca* niti-
da Herb. Pa-
tidis. Et hæc
descriptio
primæ debet-
ur iconi, de
qua hæc apud
autores scrip-
ta invenimus.

Apud Dod.

1927.

Solomon
Islands Diet

lat. vulgè So-
lanū lethale,
sive Solanum
lethale appel-
latur : Italis
ic , Venetia
Bella dona :
German. Dill-
pöuriz, Dill-
kraut, Secu-
kaut, &
Schlafbeeren :
Belgis Groose
Nafaze &
Dulle besien.
Sunt qui pu-
tens Fabam
inversam di-
ci. Ad Man-
trigotam
Theophrasti
(qui differt &
Dioscoridis

Mandragora) plurimum accedit: si non ipsissimum est. Theophrastus hunc caulem habere ait, & fructum ferre nigrum $\pi\alpha\acute{\omega}\delta\eta\nu\ \alpha\gamma\ \epsilon\iota\omega\delta\eta\nu\ \tau\phi\ \chi\upsilon\mu\omega$, i.e. acino vix similem, & succo vinotum. Respondent quoque faciliates.

Camerarius, cui Solanum maius dicitur, Bellam donnam Italiam vocari ait, quod succo illius mulieres faciem decorent. Clusius verò qui Solanum lethale & Bellam donnam inscribit, non ineptè Theophrasti Mandragoras esse quosdam censuisse suspicatur. Id autem duorum generum esse testatur. Vnum amplioribus foliis, breuiore pediculo pendentibus, flore maiore. Alterum minoribus foliis & magis atris, longiorèque pediculo fulcis, minore flore.

Dicitur C. Bauh. phyt. Solanum 4. sine bacca nigra Cerasi simili, Solanum Dioscoridis, fructu vix specie, & Solanum fructu nigro Theophrasti, Cacabulum Plinij, quod alij Strumum appellant, græcè Strychnon. Eisdem pin. Solanum bacciferum 4. siue *αυλαωκισπος* Q. Solanum hortense nigrum Tragi, Mandragora Theophrasti Dodon. gall. Ang. Guiland. Morion Fuchf. Icon. Lontetia, species Cordi in Diosc. Solanum maius Matth. Cast. Cæsalp. & Camerarij. Solanum somniferum Fuchf. Turn. Lob. obs. p. 134. Icon. Plant. p. 263. H. Lugd. p. 1721. Solanum lethale Dodon. & Clus. hist. Solanum syluaticum Gesn. hort. Syluestre siue lethale Thalij, & Bella donna Clus. pann.

Icon. 1.

Tragus, Dodon. gall. & Fuchf. pingunt effigiem secundo loco positam quam Solani somnifici alterius Matthioli titulo describit H. Lugd. p. 1710. Hoc Solanum, inquit Tragus, apud Dioscoridem *φύκος κηπίως*, i. e. Solanum hortense Solanum latium, vel nigrum vocatur. Alij Scibulum, alij Allelo, Altrimum, & Cacabulum appellant. Sunt qui radicem huius Solani pro Mandragora vendant, est enim Narcotica radix.

Solan. hort.
Dioscorid.

Cervus des-
deratum.

Idem lib. 3. cap. 24. Solanum hortense Cervum magno desiderio inquirere didici. Hoc mirari subit solere hanc stirpem eisdem plerumque situm cum Sambuco siluestri [racemosa] occupare. Hacce cervus vnicè delectatur, folia eius non baccas decerpens, vnde intelligi potest, fructus hocce frigidioris esse qualitatibus, ac feris, ne dum alius iumentis & hominibus, minus salutaris, id quod natura bestias docet. Præterea, quod non minus admiratione dignum censeo, obseruavi ceruum solum foliis huius plantæ vesci, non autem ceruam, nisi ea prægnans fuerit, & ceruum in vtero gestauerit, cum enim & ipsa huius stirpis desiderio tenetur, & illius folia degustare solet, aliàs nunquam. Solanum hoc hortense, ut obiter dicam, Mandragora mihi videtur, quam Theophr. lib. 6. cap. 2. describit. Id autem frigidæ naturæ esse iudico, ita quidem ut pro Sambuco siluestri [i. e. racemosa] si illa desit, usurpari queat. Verum enimvero quia Solanum hoc suis confert aduersus ardentes febres docui, quemadmodum & rei veritas habet, nonnulli in malam interpretantur partem, quod iumentorum & pecorum, & quo pacto morbis illorum subuenire possimus, mentionem faciam. At suis sua quoque remedia à Deo proposita sunt. Præterea video Catonem, Varro nem, & Columellam remedia quibus pecorum morbis mederi conueniat, quam diligentissimè descripsisse. Dissimulandum verò non est, baccas Solani hortensis somnum inducere, quod ipse tribus aut quatuor ex eo genere degustatis acinis expertus sum. Admonendi sunt ergo omnes ut à nimio eorum usu abstineant.

Mandrag.
Theophrast.

Solan. som-
nif. Fuchf.

Fuchf. Solanum somniferum intulit, ab effectu, ut ait. Esse tamen qui Solanum dormitorium, vel maridum dicant, quod rupibus non

longè mari inueniatur: gall. *Morelle marine*. Aliqui Solanum hortense non sine maximo errore esse putant, plurimumque suis conferte, ac easdem à lethalibus morbis præseruare asserunt. Ego tamen non laboro magnopere quomodo suis [hic suggillatur Tragus] succurrat, sed quid in homine possit magis confidero, quam constet plerumque aliis animalibus esse cibum, quæ homini venenum sunt. Experientiâ verò cognitum est, geminos pueros statim ex esu acinorum huius generis Solani mortuos esse. Quod sanè exemplum me monet, ut somniferum esse credam, potissimum cum in vniuersum ferè illi descriptio quadret, vno hoc dempto, quod semen non habet in siliquis croceum. Sunt autem notæ quædam in hortensis etiam delineatione, quæ illi non conueniunt. Neque enim exilis est frutex, sed propemodum arborescens: neque etiam florem candidum, sed spadiceum obrinet.

A Fuchfio dissentit Matthiolus, nec eam plantam quam Herbariorum vulgus Solanum maius nominat, Veneri verò vulgò *Herba bella donna*, Solanum somnificum Dioscoridis esse existimat. Siquidem id facie distet, & fructum non proferat: in folliculis croceum, tamen eius baccæ largius sumptæ interficiant, (facto in expugnabili somno, ut quandoque acciderit pueris, qui discriminis ignari eas vix vice deuorant) & viribus iisdem, quibus Solanum somniferum, polleant. Et hinc factum est præterea, ut eandem villa *Mandragoræ* specie comprehendere posse negarit, sed Solani quintam speciem esse antiquis incognitam putarit.

Mandrag.
negat, 2
Fuchf.

Ceterum, cum Matthiolus, Solanum maius, suæ gentis hominibus Bella donna appellatum, Strychni generibus annumerat, atque antiquis scriptoribus, silentio omissum decernit, Theophrastum sibi nunquam lectum, clarè exponit. Ille si Mandragoræ eius auctoris, differe à Bella donna ostenderit concedet Guilandinus sanè lectum ipsi Theophrastum, sed minime intellectum. Porro autem in Solani somniferi agnitione, vel ipsum, vel certè Dioscoridem falli necesse ait. Etenim quod ille expressa icone proponat plantam, & floribus, & radicibus candidis paruisque constantem; contra quod Dioscoridi describatur, flores habeat magnos, rubrosque, radice item prægrandi, rursusque vinat. In Solano denique manico Matthiolum suam ignorantiam accusare testatur, quod quia ei notum non sit, protinus ab omnibus in Italia ignorari falsè definiat. *Guilandino subscribet Apollo*.

Porro, Solanum manicum, quod secundo loco pictum proponimus, C. Bauh. in phyt. non agnouit. Collocauit autem id in pin. loco quinto, vocans Solanum somniferum bacciferum, Solanum somniferum alterum Matth. Gesn. hort. H. Lugd. pag. 1720. & Camerarij, Solani lethalis aliud genus Dodonæi, Solanum somniferum Lont. & Solanum de Hietico Castoris. Solanum autem eius nomen in phytopinace, siue somniferum alterum Vviers Camerarij hort. Dirmaris & Vvestphalis contra morbum *dis Parem*, magni existimatum, à *Bella donna* Italarum non separo.

Buchananus lib. 7. suæ hist. Scorice exponit, quo pacto huius Solani succo vina & ceruicem Scori infecerint, ynde Danos hostes suos ita demerant, & in profundum somnum induxerunt, ut eorum Ducem Senonem totum exercitu deleuerint.

Circa

Locus &
Tempus.

Circa silvas, iuxta parietes, sepimentaque agrorum, aliisque parum cultis ac desertis reperiri locis: umbrosa amare: Augusto ariditate maturas baccas: flores & ante, & eodem reperiri tempore auctor est Dod. Observavi ego Montpelij & Tiguri in silva, florentem mense Maio: itémque Montbelgardi in umbrosis circa Becham ad Dubim: spontaneam quoque inter Genevam & Lugdunum. Quin & in hortis meis passim alui. Hæc ubi in silvis depasta reperitur, indicio esse solet venatoribus cervos adesse.

HERBA PARIS.

Descriptio.



Herba Paris dicta radicem habet tenuem, geniculatam, repentem a caule mediocriter crassum, teretem, palmos duos circiter altum, rubentibus maculis, ut Serpentaria maior variatum: folia uno aut duobus eis summum caulem digitis quaterna, rarius quinque, antequam hastam producat, ter-

na sunt ex angusto principio lata, in acumen desinentia, rugosa & ne. uola, inferne splendentia, supernè non item: flos in hastula singularis, ex quatuor latiusculis acuminatis viridantibus folijs: inter quorum unumquodque, foliolum tenuissimum, acutissimumque eiusdem coloris intercedit: stamina pro foliorum numero octona, longa, acuta, viridia, additamentis croceis circa medium acuta, in flos a parte atro purpurea: in medio scissilis baccula, futuri fructus rudimentum, quadriangula, atro-purpurea, ex cuius umbilico quaterna filamenta, eiusdem cum ea coloris emicant. *Marthiol.* in medio purpureus, vix ut globulus, acinæ Vux similis, in quo semen conclusum album, minutum, copiosumque, Hallacabi modo.

*Aconitum
pardalianches Cordi.*

Cordi in Diosc. dicitur Aconitum pardalianches, quod ait Theophrastum alibi Telyphonon, alibi dyctyon, alibi etiam Scorpionem vocare. Idem in Hist. describit nomine Aconiti seu Pardalianches monococci. Annotat tamen apud eum Gesnerus Cordum falli, & Solani, non Aconiti, generibus adnumerari debere, Solani umque sylvaticum quoddam esse. Quæ occasio cur in epist. ad Platerum [ubi laudat Antidotum Saxoniam, Herbam Paris recipientem, Tigurenlibus *Krujakrus* & *Blaterkrans* vocatam, aduersus venena & pestem] Fuchsius inepte Aconitum facere scribat: cum revera Solani cognata sit herba. Cur autem Fuchsius Solanum sylvaticum tetraphyllum inter Aconita recenseat, nullam aliam rationem reddit, quam quod Dioscorides non solum calidi, sed & frigidi Aconiti, quod Scorpijs torporem inferat, mentionem faciat. Fuchsi opinionem sequutus est Cordus: huius senten-

Tom. III.

tiz fauet & Hugo Solerius. Sed occurrerunt insuper, quæ Fuchsi adduxerunt, ut existimari Herbam Paris, Dioscorides Pardalianches speciem esse. Et inter alia radix, quam refert talem esse, qualem in Pardalianche exigit Plinius. Idem etiam in epist. ad Arctium negat constanter contra Fuchsi esse Aconitum verum.

Sed & Matthiolus Fuchsi abertare testatur, utpote qui Herbam Paris, primi generis Aconitum, h. e. Pardalianches esse censet. Semini siquidem nulla deleteria vis insit. An autem Herba Paris folia habeat Sanguineæ virgæ similia, ut asseruit Matthiolus, iudicent qui utramque plantam norunt, dicantque an ex iconæ Marthioli, id quicquam possit colligere.

*Fuchf. erit.
Varietum
lappæ.*

Cæterum, Cordi & Fuchsi opinionem refutant, relictis quoque etiam Tragus, Dodonæus, Hist. Lugd. & Lobelius. Sequantur, verò recipientesque, malè tamen, Lonic. Basil. Faber. [qui *Augenkrant*, & *vvolfs vurtz* vocari testatur] & Cornarius. Turnerus an Aconitum Herba Paris sit dubitat.

Dicitur autem *Aster non atticus* Trago: *Herba Paris* Matthiol. Aug. Dod. Cast. Cæsalpin. Hist. Lugdun pag. 133. Thal. Ger. & Eyst. *Paris Herba* Camer. *Aconitum salutiferum* Tabern. *Solanum tetraphyllum*, Gesn. hort. Lobel. in Aduers. Obs. pag. 137. & Ic. Plant. pag. 267. *Solanum* num. 10. [7. in phyt.] siue quadrifolium baciferum C. Bauhin. pin. folijs communiter quatuor, aliquando, tribus, quinque, & sex.

Synonyma

Germanis inter alias appellationes dicitur *Einbeer*: Belgis *vvolfsbesen*, & *Spinnecoppen*, id est, Aranea: ab euentita videlicet araneæ forma: quam bacca una cum reflexis exiguis alabastris per maturitatem exprimit. Gallis *Raisin de renard*, *Estrangle Loup*. Hispanis, ut quidam aiunt, *Cenilla*. Anglis *One berry*.

*Nomina
linguar.*

In montium, sylvarum, conuallium & frutetorum opacis ac perinde aliis umbrosis, pingui ac læto reperitur solo. Copiosè crescit apud Morpeth in Northumbria, in silva Cottingensi. Aprilis florem exire: baccam Maio maturitatem assequi, auctor est Dodonæus. Ego Montbelgardi pluribus in locis semen maturum collegi Augusto. Genevæ vidi protumescens mense Martio, & cum bacis Iuno & Iulio.

Locus

Multi in ea sunt opiniones, ut credant herbam Vires hanc inguini impositam, dolorem finire: nec desunt, qui asserant acinos Vux lupinæ deuoratos soporem inducere. Sed Tragus illos nequam degustare vult, ne forte prorsus obdormiat. Ex Herba Paris acino semen colligitur, non modò nulla deleteria vis inest, inquit Matthiolus: sed etiam contra veneficia præstantissimum est medicamentum. Noui enim ego quosdam, quorum aliqui morborum diuturnitate, alij verò veneficiis semel stulti facti erant, hoc tantum Paris herbæ semine ad vigesimū vsque diem in puluerem hausto dragmæ pondere, pristinae sanitati omnino restitutos esse. Nos contra pronanciamus, eos semi-stultos, vel planè stultos esse, qui credunt veneficia à sagis illata (si tamen intulerint) tolli per herbas, verba, aut eiusmodi præstigia, quinimò si semi-stulti, pituitosi, & torpidi putamus huius plantæ vso stultiores reddi: nolimus tamen improbare [si ea vera sunt, quæ narrat Matthiolus de sua notitia] in stultis, phreneticis & maniacis: qui intomnes sunt. Camerarius ad Hist. Germanicam Matthioli sequentia addit: Ex Herba Paris bacis paratur oleum aduersus magnos dolores ma-

*Vires
vires*

Matthiolus

niscarum & hæmorrhoidum, quod sæpius cum xylo in linteolo applicatur. Solent cum utilitate baccas & folia applicare tumoribus & carboniculis pestilentialibus. An autem tutum sit istis pestilentialibus tumoribus applicare narcotica, merito controuertitur. A viris fide dignis accepit Turneros pueros, aliquot in locis, baccas Aconiti nigras Fuchij aliquando comedisse sine noxa, quod non facerent illæsi, si ea Pardalianches esset. Auduit Gesnerus acinis Solani tetraphylli, frigidiſſimæ herbæ deuoratis, gallinas mori. In locum acinorum Herbæ Paris, ijs deficientibus substitui posse putat idem Gesnerus, acinos Solani siluatici [Solani Bella donna] sed tantò pauciores, quando sunt maiores. Cæterum qui Aconitum coniectabant, venenatam prodiderunt. Pro Pardalianche autem recipi non potest. Omnibus enim constat, teste Trago, multum refrigerare, quod nullum Aconitum facit.

Nescit gal-
linas.

STRYCHNODENDROS.

Descriptio.

Arbuscula trium cubitorum, aut altiore proceritate, gracili stipite, quem cortex integit cinereus, in ramis viridis: folia Euphonymi, atro uirentia, sapore subacri: flores Solani horrentis, candidi, quinque folijs reflexis constantes, apicibus totidem in medio croceis coniunctis: succedit singulis floribus bacca, fructui Halicacabi Solani æqualis, coccinea, seminibus similibus reſerta luteis, orbiculatis, compressis.

Synonyma

Lob. in Adu. refert quosdam [Italos] Amomum Plinij putare, alios [Belgas] verò rectius Strychnodendron vocare. Et hinc in Obs. p. 136. nominat Strychnodendrum, Amomum Plinij vulgò Italarum, Pseudocapsicum Dod. Hispan. Guindas de las Indias, i. e. Cerasa Indica: In Ic. Plant. p. 265. Amomum Plinij, Strychnodendron, siue Solanum arborescens. Strychnodendron dicitur Eyst. & Gesn. horti. cui & Amomum. Amomum Plinij, Gerardo. Solanum arborescens Cast. Cæs. & Camer. Solanum fruticosum Gesn. hort. & Taber. Solanum Americanum H. Lugd. p. 599. Pseudocapsicum. Dodonæo. C. Bauh. phyt. Solanum 6. siue fruticosum bacis rubris: Ead. pin. Solanum 9. siue fruticosum bacciferum.

Vires & vus.

In Lugduni & Genevæ felicitet mihi in hortis ex semine prouenit: verum periit Hieme. Parisiij virebat in horto Decembri & Ianuario, ac Febuario.

SOLANI SPECIES EX APENNINO quibusdam.

Descriptio.

Herba rara est, & foliorum & fructus figurâ insignis: folijs quidem oblongis, per ambitum lineosis, venosis, ternis ferè simul ex interuallis per caulem produntibus, teretibus, digitati crassitudine, forè cubitalem: fructu autem in caulium vertice rotundo, exiguo axalo simili, Pruni magnitudine, rubescens, semine pleno.

Synonyma

Plantam hic depictam Herbarij quidam ad Hyoscyami, alij ad Solani species referunt. H. Lugd. p. 718. inscribit Hyoscyamum peregrinum Dalechampij: C. Bauh. phyt. Hyoscyamum 6. siue peregrinum fructu rotundo rubescens: Idem in pin. Solanum pomiferum 3. siue peregrinum fructu rotundo.



Vires & eius natura adhuc incognita. Præciosissima ac elegantissima pictura, in vetusti codicis manuscripti membranæ [que multarum stuprum pictarum imagines ostendunt] hæc herba proponitur rudius expressa, nomine tituloq; Apollinaria. Dalechamp. qui descripsit, & in Apenninis

siluis vmbrosis & densis reperiri retulit, ita dicta n ro auit ab Apollonio Philosopho, qui eam Plato i monstrat, eamque Græcis vocari Strygnion malchion [Strychnon manicon,] & Dorigion, hoc est Dorichnion.

MANDRAGORAS IN GENERE EX Veteribus & Neotericis.

Mandrægræ Græcis & Κερναία, vel κέρναϊς, alijs Εμπείρη, alijs ἀντίμον, seu ἀντίμων, alijs Βουκόχυλον, nonnullis μίρον, Ægyptijs ἀντίμω, Pythagoræ ἀνδροστροφον, alijs ἀλσίτη, alijs θύακισ, alijs κάρμαρον, Zoroastri δισμόρον, seu ἀρχίτη, Prophetis ημίονον, seu γορογόναι, Romanis μάλα κάρνα, seu μάλα πικρία, aut ἀντίμαλον: Latinis etiam Mandragoras, & Circea, vel Circeon, Xeranthæ alijs, aliquibus Antimnion, vel Antimion, Bombochylon, Minon, Ægyptijs Apemum: Pythagoræ Αντρομορφον, alijs Αλοέτε, Tridactyla folio Lactuce, alijs Cammoron, [Toxiti in Onom.] Zoroastri Diamnion seu Archine: Prophetæ Hemionous aut Gonogeonas: Rom. Mala canina seu Mala terrestria dicitur, Arab. vr Sorap. labora. Auertioi Lephæa, alijs Tabrobas. German. alraun, Erdapffel, & bundapffel. Officinis, Belgis & Italis Mandragora, Gallis Mandragore, Hip. Mandracula, & Mandracula. Angl. Mandrage. Hung. Natrakulya.

Nam, ling.

Circea quidem à Circe Solis filia illa venefica procurandi amoris artificie vocatur. Creditur enim huius radix ad amatoria conducere. Mandragoras autem, quod Solis seruidioris impatiens, ad mandras pecorum, antea aliasque speluncas vmbrosas proueniat. Mandre enim aprica loca quod se recipiunt & stabulantur armenta, etiam hodie Itali è græco significant. Pythagoreis etiam ἀνδροστροφον, quod humanum truncum & artus nonnihil adumbrarent radices implexæ, crura bina & clunes quasi disparata ostentantes, quam ad interpretationem alludit non inſcitè Septentrionalis nomenclatio, quæ Mandragoram quasi Man & Drageon: vitigerâ siue homigeram connotat. Et hinc à Columella epitheto dicitur Semihomo. Mandragoram Hebræi vocant Dudaim, Chaldæi labrachim pluraliter: Nam singulariter Dudai & labrach dicitur. Videtur mihi, inquit Rabbi moſes Nchemanides, Leam mā-

dragoris propter bonum odorem delectatam, nec conceptionem medicinali herba, sed precibus à Deo impetrasse. Quare attulit illi Ruben filius ramulos de Dudaim [id est Mandragora] aut fructus eius qui sunt sicut mala, & sunt bene odorati. Sed radicem, quæ habet effigiem capitis & manum non attulit, de ea nempe dicunt aliqui quod conceptionem inuenit, quod tamen ego in nullis Medicorum scriptis unquam legi. Hæc ille. Paulò post recitat idem Nehemianides sententiam quorundam, qui dicunt Dudaim, id est Mandragora, herbas esse quæ venerem stimulent, & ad amorem mulierum incitent, unde hi Dudaim, à voce Hebræa Dodim, quæ significat amores derivari: Sic ille, citante Trago, de Mandragoris. Leulin. Lemnius Mandragoram inter herbas biblicas reponit. Guliel. verò Struckius hanc antiquit. conuul. cap. 8. de Mandragora eleganter & doctè differt ex sententia sacrarum & prophanarum literarum, ita ut nihil ferè in hoc genere desiderari queat: Hinc lege.

Impostura

Ceterum ægyptiæ & impostores Circumforanei qui quotidie Mandragoram circumferunt, iactantque tanto periculo effodi, humanam formam ignare plebi eam ostendentes, ex vno Pythagoræ nomine eius Anthropomorphos, ut credimus, mendacii sui occasionem arripuerunt. Neque enim, ut diximus, vox illa aliud, quam humanæ formæ plantam significat. Accessit & Pythagore Columellæ testimonium, qui & ipse, tum vulgi opinione suæ ætatis, tum nominis superstitionis ostentatione morns, sic cecinit:

Columella nos.

*Quamvis ferè hominis vesano gramine facta
Mandragora pariat flores inestamq; Cicutam.*

Ex quibus
radicibus of-
finguntur.

Fictas quidem esse ægyptiarum imagines manūque ex aliarum stirpium radicibus adhuc recentibus efformatas, ceterò constat. Solent namque illi, exempli gratia, Altheæ, Arundinis, aliarumque plantarum, & præsertim Brionis radicibus nuper euulsis humanam viriūque sexus effigiem inculpere, insertis in ea loca, in quibus pilos exoriri voluit natura, Hordei & Milij granis. Deinde eas, factâ serobe, tenet fabulo obruunt, calidèque conseruant, ut sit aliquandiu detentæ, grana illa radicales emittant, ipsæque imagines contrahant, ac allam arte faciem induant. Et euenit, ut viginti summum dictum spatio, & terra ita enatæ appareant. Tum erunt, & radicales ex granis natas acutissimo cultello concidunt, itaque aptant, ut capillum, barbam, & cæterarum corporis partium pilos referant. Hoc pacto miseri, & imprudentes homines decepti, Bryonix, plantarumque aliarum radices pro Mandragora emunt. Sed imposturæ huius finis nondum est. Hæc sub crucibus & rotis ex vrina supplicij affectorum etas persuadent, monstrorūque earum usus pollicentur. Nec nisi magno vitæ periculo effodi posse nugantur, cand. qui effodit, radicibus adalligato, & auribus pice obtutatis, ne radicis clamorem exaudiant effodientes, ut quo audito illis pereundum sit. Cuius quidem imposturæ ac mendacii origo ex Veterum superstitione fluxisse videtur. Non enim defuerunt olim, in iactanda, cum foditur Mandragora, religione Theophrastus in Græcis: in Latinis verò Plinius. Hos, inquam, non puduit, in tanta rerum, quas scribebant, gravitate, ne quid contra communem sensum dixisse viderentur, populares, & sine ratione ritus huiusmodi, posteris tradere. Theophrastus enim de effodienda Mandragora hæc scripsit. Circumscribunt & Mā-

Figuratum
alund.

dragoram gladio ter, secantque ad occasum spectantes. Iubent & alium saltantem tripudio circumagi, multaque de veneris usu & re dicere. A Theophrasto parum euariat Plinius. Cauent, inquit, effossi contrarium ventum, & tribus circulis, antè gladio circumscribunt: postea fodiunt ad occasum spectantes. His igitur auctoribus, & quasi per manus translata huiusmodi superstitione, verisimile est, vanis periculis, religionisque, & humanæ formæ, mendacijs, etiamnum Mandragoram celebrari: cum tamen id potius querendum fuerit, cur à sapiente illo Samio honestiore hominis nomine indicata fuerit. Neque enim verisimile putat Marcellus quia binâ radice, & hominis crura imitante nitatur, sic dictam ab eo fuisse.

Plin:

Porro, Matthiolus fabulam illam, quæ ignaris Mandragoræ radices effodere volentibus tantopere minatur, ex Flauo Iosepho natam putat, qui etsi de alio radicis genere scripsit, ea tamen facile ab impostoribus ad Mandragoræ radices, detorqueri potuerunt: Hæc sunt illius de Bello Ind. lib. 7. cap. 15. verba: Vallis, qua ciuitas à parte Septentrionali cingitur, quidam lacus Baaras appellatur, ubi radix eodem nomine gignitur, quæ flammæ quidem assimilis est colore, circa vesperam verò veluti iubar fulgurans. Accedentibus, eamque euellere cupientibus facilis non est, sed tam diu refugit, nec prius manet, quam si quis vinam muliebrem, vel menstruum sanguinem super eam fuderit. Quin etiam tunc si quis eam tetigerit, mors certa est, nisi fortè illam ipsam radicem ferat de manu pendente. Capitur alio quoque modo sine peticulo. Totam eam circumfodiunt, ita ut minimùm ex radice terra sit conditum, deinde canem ad eam religant, illòque sequi eum à quo religatus est, cupiente, radix quidem facile euellitur, canis verò continuò moritur, tanquam eius vice à quo tollenda erat, traditus: nullus enim postea accipientibus metus est. Hæc Iosephus. Et his, quæ de Mandragoræ anthropomorphosi, eiusque sub patibulo nascentis periculosa euulsione ægyptiæ & circumforanei impostores fabulantur, haud duntaxat ignauum vulgus, fidem adhibet, sed nec literati homines, talibus magis seridè se opponunt, easque medio tollere curant. Quin, deplorandum est cum in mundo hodie summo loco haberi: qui alijs arte quadam imponere nouerit, ut rectè ille dixerit, *Mundus vult decipi. Darumb sein wir bis*, Proinde sciunt omnes Mandragoras ægyptiarum nihil aliud esse, quam metas imposturas.

Baras her-
ba historia.

Mandragoras namque veterum, licet humano corpori quadantenus similis esse appareat, maxime si inferiores partes radicis spectes, tamen totâ suâ substantiâ, Mandragoræ ægyptiarum fictitiæ, prorsus non responder, id quod ex veterum descriptionibus facile colligitur.

A Dioscoridè quidem, qui duo eius genera assignat, & tertium ex aliorum opinione tradit, his verbis exprimitur. Mandragoras niger, qui femina existimatur, Thridacias appellatus, folia habet angustiora & longiora [vulg. exempl. *μικρότερα*. quidam vet. *μικρότερα*] quam Lactucæ, virosæ [*δυσώδης*] ac graeolentia, in terram sparsa: atque inter ipsa, mala gerit Sorbis similia [vet. *λινθίδος ὡς ἰμενίου*] ex luteo pallida [vet. *ὡς ἑλενδῆς*] nec malè nisi Dioscorides sibi contrarius esse velit, Samb.] odorata, & in his semen cœu Pyrorum. Radices ei sunt prægrandes, duæ aut tres, invicem implicatæ, nigrae foris, intus albæ, & [Ald. *λευκῆς*] crasso cortice vestitæ: cau;

lem autem non producit. *Alterius* vero maris, seu candidi, quem aliqui *Morion* [vet. *τόριον*] vocant, folia sunt magna, alba, lata, lævia, seu Betæ: poma quàm prioris duplè maiora [Ald. *τετραδόν*], colore in Crocum inclinante, iucundè cum gravitate quadam olentia: quæque si mandantur à pastoribus, ij quodammodò soporantur: radix autè dictæ similis, at maior, atque candidior: orbata & hæc caule. Porò & alium tradunt esse *Mādragoram*, qui *Morion* etiam nominetur [hunc multi veteres, itémque Plinius non tradunt] nascatúrque in opacis & iuxta specus, folijs albi *Mandragoræ*, at minoribus, perè dodrantibus, candidis, radicem ambientibus: quæ quidem tenera est, candidaque, paulò maior palmo, pollicémque crassitudine æquat.

His consentanea sunt magna ex parte, quæ Plinius lib. 25. cap. 13. tradidit. Mandragoram, inquit, alij Circeium vocant. Duo eius genera, candidus, qui mas, & niger, quæ femina existimatur, angustioribus folijs quam Lactucæ hirsutis, & caulibus [legendum, hirsutis, æqualibus, non & caulibus: utriusque enim Mandragoræ caules defunt. Præterea hirsuta malè dixit, quasi *Saxifraga* legisset: neutrius enim folia hirsuta sunt, ut ex Dioscoride liquet] radicibus binis, ternisve, rufis, intus albis, carnosiss, tenerisque, penè cubitalibus. Ferunt mala Auellanarum nucum magnitudine, & in ijs semen, ceu Pyrorum. Album hoc alij Arsen, alij Morion, alij Hypophlomon vocant. Huius folia alba quàm alterius latiora, ut Lapathi factui.

Quæ Mandragoræ nigri poma Dioscorides
ὄνεις ἰμφοῖν, l. e. Sorbis similia facit, Oribasius
etiam ὄνεις & achradibus comparat: quorum prius
ad magnitudinem & formam, posterius ad figu-
ram tantum referendum videtur. Marcellus, ὄνεις
ἰμφοῖν legit, l. e. ovorum vitellis, ut ipse interpre-
tatur, similia. Sed & ὄνεις malè legit, & hæc vox
ovæ, non ovorum vitellos significat. Præterea
omnes probati codices & Oribasius ὄνεις habent.
Serapio Mespilum interpretatus est, quod vitum
non Serapioni, sed ipsius interpreti adscribendū.
Plinius hæc mala Nucum Avellanarum magni-
tudine esse scribit. Idem Mandragoræ fœminæ
caules tribuit, ùm utrumq; Dioscorides ἀμυλον
esse dicat. Quare Cornutus in Plinio hirsutis,
excaulis, legendum esse crederet, nisi rursus se-
queretur: Succus fit & ex malis, & è caule, &c. ut
Plinius caulem ipsi omnino attribuat. Nam quæ
de Mandragora tradidit, partim ex Dioscoride,
partim ex Theophrasto transcripsit, qui etiam in
Mandragora caulem agnoscit. Ἄν δε ἄλλων, inquit,
τὰ μὲν ὁμοίωτον τούτῳ τὴν καυλὸν ἔχει, καθάπερ ὁ
μανδραγόρας, καὶ τὸ κώνισον, l. e. Reliquorum autem
quædam similliozem huic [Ferulæ] caulem habent,
Veluti Mandragoras, & Cicuta. At Theophrasti
Mandragoras à Dioscoridis Mandragora pluri-
mum distat. Quod cum Plinius non animadvertisset,
ex utroque transcribens, utriusque Man-
dragoram confudit. Maximam autem utriusque
Mandragoræ differentiam hæc perspicuè de-
monstrant: Dioscorides Mandragoræ nigri fru-
ctus Sorbi magnitudine, & pallidos esse dixit: ali-
bi verò fructus, siue mala duplè maiora, & colo-
re in Crocum inclinante depinxit, ac utrumque
sine caule. Theophrastus apertè Mandragoram
caulem habere scripsit, ut ostendimus.

Quisnam autem sit Theophrasti Mandragoras ab Herbarijs ambigitur. Cordus quidem tertiam Mandragoræ speciem, quæ priuatim Morio

dicatur Theophrasti Mandragoram esse censet. Delineat autem is hoc nomine Solanum manicum Italici *Bella donna* dictum. Dodonæus eam Theophrasti Mandragoram esse censet, sed à Mandragora Morio Dioscoridis distinguit, quam Dioscorides non vidit. Fuchsius Solanum mortiferum esse suspicatus fuit.

Cardanus porro duo Mandragoræ genera agnouisse videtur. Est, inquit, pomum croceum, quod bene olet, scilicet Mandragoræ, sed leuiter. Aliud huic persimile, quod malè olet, & ipsum tamen parum: plantam non vidi, quæ cum frigidi temperamenti sit, non è genere Solani, quippe fructus eius sunt rotundi, plani, magnitudine & forma à pomorum sanguineorum, sed Peponum instar, parùm profundis canalibus diuisa. *Quibus* quid sibi velit Cardanus, non percipio: Pomum eius aliterum fortè erat Malum aureum siue Lycopersicum. Vciùm cur negat esse è genere Solani, quodd frigidi sit temperamenti?

Omnes Mandragoræ partes ad magnos in medicina vñs adhibet Diosc. Succus inquit fir, è cortice recentia radiceis tuto, & prælo subiecto, qui insolatus vbi concreuit, fictili reconditur. Malis quoque succus depromitur, sed aliquantò ignauior. Delibatur radix & traiectus lino cortex ad vinum suspenditur. Aliqui radices in vino ad tertias coquunt, & defæcatum ius seruant. Cyathoque vno vruntur in peruigilijs, & doloribus, & ante sectiones, vñonesque, ne sentiantur. Succus duobus obolis ex mulso potus [*ὁ δὲ ἰσὶς ποθεῖς οὗτ' ἡμετέρῳ, i. e. lachryma, siue liquor cum melicrato potus: ὅτ' ἰσὶς spontè defluit, succus χόλυσμα* tundendo exprimitur] vt Veratrum per vomitiones bilem atram, pituitamque extrahit: verum potu largiore vita admittitur. Medicamentis ocularibus, & his quæ dolores finunt, pessis quoque emollientibus, admiscetur: semiboli pondere inditus per se menses & partus expellit: subditus sedi pro balano somnificus est. Radix ebur emollit quod senis horis cum eo decoctū sit, & ad accipiendam, quā effingere optaueris, formā ipsum facile præstat. Folia recentia conuenienter oculorum inflammationibus & collectionibus, quas vlcera excitant, cum polenta illinuntur: duritias omnes, suppurationes, strumas, & tubercula discutunt: stigmata sine exulceratione delent, si quinis sensive diebus sensim perficiuntur. Folia seruantur in murijs eisdem ad vñs. Tertia radix ignibus sacris ex aceto, & serpentium ictibus ex melle aut oleo medetur: strumas atque tubercula cum aqua dissipat: articulorum cruciatus cum polenta sedat. Fit citra coctionem *vinum* è cortice radiceis ad hunc modum: Ternæ minæ in vini dulcis merretam conticiuntur. Dantur ex eo terni cyathi ijs qui secari, aut vñ debent: siquidem nullo tunc afficiuntur dolore, sed veterano quodam pressi torpescunt [*διὰ τὸ κατασβεσθαι, quidd' alto somno opprimentur.*] Mala soporem afferunt olfactu, & etiam si mandantur: item expressus ex ijs succus: nimio tamen dolore percussus obtumescunt. Semen malorum potum vulus purgat, appositumque cum sulphure ignem non experto, rubra scæminarum profluvia sistit. Scarificatâ, punctâque multifariam apertâ radice erumpens lachryma cauo vase recipitur. Liquamentum autem: iuoco lacteo præstantius est. Sed non vbiq; vt experientia docet, radices lacteu siccum delachrymant. *Vt tertiam* Mandragoræ speciem non nouisse videtur Dioscorides, ita nec eius vires certas tradere. Aliunt, inquit, eam in

Vires & t.
fus.

Figure 3
contingency table

Dieſe, noch
nicht 100-
tarm Man-
dragonen.

Lat. Pliny
corrigitur.

Orib. expli.
22147.

Plin. nat.

Mandrag.
Diosc. differt
à Theophras-
te.

patie, ossa, obsoniove, drachmæ pondere detor-
ratam vsum rationis interciperet: obdormiscit
enim homo, eo ferè quo comederit habitu, sensus
impos, ternis quaternisve ex quo data est horis.
Hoc Medici vtuntur, cum sciendendi vtendique
necessitas adest. Antidotum esse aiunt radicem
cum Solano manico potam.

Theophr.

Theophrastus Mandragoræ folia vlcisib. cum
farina vtilia esse scribit, radicem rasam, & ex ace-
to subactam ad erysipelata, ad podagricos do-
lores, ad somnum, & ad amores: dant. a. inquit, in
vino & aceto. Secant orbiculos velut ex Raphano,
quos filo transmissis in musto suspendunt su-
per fumum. Quæ fortasse Plinius [qui sua ex
Theophrasto & Dioscoride mutuatus est] expri-
mere voluit, cum dixit. Concisa quoque in or-
biculos servatur in vino. Quæ tamen alio in lo-
co dilucidius expressit. Sed is in publicis exem-
plaribus valde corruptus est. Igni sacro medetur
Mandragoræ radix. Siccatur in aëre, vt Cucumis,
&c. Quem ex vetere codice sic restituit Corna-
rius. Igni sacro medetur Mandragoræ radix: se-
catur hæc in illes, vt Cucumis, primumque super
mustum suspenditur, mox in fumo. Deinde tundi-
tur in vino & aceto.

Galen.
Tempera.

Mandragoras, auctore Galeno, vincentem ha-
bet qualitatem refrigerantem, adeo vt tertij sit
ordinis refrigerantum. Verumtamen nonnihil
etiam caloris inest, & in pomis humiditatis. Qua-
re soporem & conciliandi vim habent. Radicis
cortex cum sit valentissimus, non tantum refri-
gerat, sed & desiccatur, reliquum quod intus est im-
becillimum est. Est autem Mandragoras pharma-
cum aliqui corpus nostrum corrumpere pote,
sine quantitate tamen incommodare nequit.

Matthiol.
repreh.

Quod porro voluit Dioscorides, sumptâ Man-
dragorâ, oleum rosatum cum aceto capiti infun-
di: Matthiolus, referente Turnero, contra ratio-
nem esse contendit frigida adhibere, cum cau-
sa morbi frigida sit: similiter quoque Galenum
taxat, quod lethargicorum capiti oleum rosa-
tum cum aceto instillet. Atque vt Galenum
refellat, citat Aetium, Paulum, Trallianum, non
admittentes oleum solum & acutum, sed calidio-
ra postulantes, vt Chamæpitum, Serpillum, Pule-
gium, Castoreum, & similia addi. Galeni defen-
sionem in aliud tempus differimus. Quod ad Dio-
scoridem, respondemus. Quod si tres Galeno re-
centiores auctores satis ei confutatio essent, toti-
dem pari pacto satis sint, ad Dioscoridem ab eo
errore, quem impingit Matthiolus, vindicandum.
Sed duo ex iisdem testibus, quos ad Galenum
confutandum profert, nempe Aërius & Paulus,
& cum his è recentioribus quoque Græcis, vir do-
ctus Actuarius, consulunt eorum [qui nimium
assumpserunt Mandragoræ] capiti oleum rosa-
tum & acutum infundere. Imò Matthiolus ipse
paulò post, eodem capite tanquam sui immemor,
& accusationis in Dioscoridem & Galenum in-
tentatæ, fatetur magno ardore corripì, qui im-
matura Mandragoræ poma comederunt, multò
maturis frigidiora: quàm igitur iustè paulò antè
accusatus fuerit ab eodem Dioscorides, iubens
caput eorum qui nimium Mandragoræ bibissent,
oleo rosato & aceto perfundi: Ac an ab homine
tam obliuioso tantâ confidentia contendit taxan-
dique sunt veteres, quod sæpenuerò facis, pe-
nes viros doctos & prudentes indicium esto.

Prodiderunt Serapio & Auicēna, iemen Man-
dragoræ potum vteros purgare, idemque multos
annos antea scripserat Dioscorides: ex quo etiam

quis meritò dicat, Rachelem ante hosce omnes
facultatis pomorum Mandragoræ consciam, ob
id poma Mandragoræ experuisse, vt purgato vte-
ro aptior ad concipiendum redderetur, liberòs-
que, non minùs ac Lia soror & ancilla Silpha
procrearet.

Accipitrē aucupari nolentem quidam Man-
dragoræ radice fumigant, & confestim prom-
ptum ad aucupandum reddunt, Demetrio hoc at-
testante. And. verò Baccius Mandragoræ, aliorum-
que medicamentorum deleteriorum ebibitis suc-
cis, per lauationes in dulcibus succurrit.

MANDRAGORAS MAS.



ANthropo- Descriptio
Amorphon
dixere Mandra-
goræ radicem,
crassam, longâ,
bifidam, fibris
hinc inde pro-
deuntib. velut
hispidâ, inco-
xantem homi-
nem, vt sibi
persuadent, re-
ferentem: è cu-
ius capite, mar-
quidem folia
exerunt circiter
cubitalia, ses-
quipalium fe-
rè lata, princi-
pio & mucrone
angustis, atro
viore prædita,

seritida: inter hæc à radice quoque [nullum enim
profert caulem] pediculi exerunt crebri, duarum
vnciarum, aut palmares etiam: forem singuli su-
stinentes albidum, at nonnihil purpurascens,
modicè hirsutum, Campanulæ ferè forma, quinis
segmentis, è calyce foliato, luciniato, itidemque
villosa, odore scitido: pomum sequitur rotundû,
parui Melpiti magnitudine, ex luteo viride. Radicem
in off. prostant solūmodo cortices, maris an
femine. An vtriusque promiscuè, nobis non con-
stat, insigniter autem crassam testantur radicem:
quo nomine disti- gnas licet à Fraxinellæ & Cap-
parum corticib. adde colorè foris ex albo ferrugi-
neum, h. bistantiâ mansu lentam: amaror idem.

Mandragora mas Trago, Fuch. Matthiol. Synon.
Dod. Lic. Gordo in Diosc. Lob. in Adu. Obs.
pag. 118. Ic. Pl. p. 267. H Lugd. pag. 1716. Camer.
Masculus Turnero: Mandragora Anguillaræ.
Mandragoras Gesn. hort. Cæsalp. Mandragoras
albus seu masculus Cordo hist. Mandragoras
mas vel alba Camerario. Lobelius quidem &
Dodonæus pro vtraque Mandragora vnam pro-
ponunt iconem, ad latera tamen pomum maris
pingunt rotundum, femine pyriforme.

Germanis Alraun Manlein: Belg. Mandra-
gora manneken: It. Mandragora maschio: Gall.
Mandragore ou Mandegloire: Lob. sed fortè le-
gendum main de gloire.

In Italiæ, Prouinciæ, Narbonæ, & Hispaniæ
hortis florem malâque maturat, semine aut ra-
dicibus ex Candia & Cycladibus insulis adue-
ctis, vt scribit Lobelius. In reliqua Gallia non
perinde, tametsi quandoque florem pomâque

apprimè matura dedit Bristoiz Occiduo Angliæ
aprico & tepidiuiculo horto.

MANDRAGORA FOEMINA.

Missum semen Florentiâ pro Mandragora
Cretica scœmina, valdè paruum non maius
Melanzanz semine: negleximus autem descri-
bere plantam, quia consumpta Hieme alperiore.

Mandrag.
scœmina de-
script. Clus. Clusius Mandragoræ scœminæ folia adscribit
angustiora, minora, & nigriora quàm mari, ma-
gis etiam rugosa, crispâque, virofa & graueolen-
tia, & humi expansa: inter quæ longi pediculi exi-
liunt, per terram strati, quibus insident flores,
Melopeponum floribus formâ ferè similes, co-
loris ex cæruleo purpurascens: quibus succe-
dunt fructus, non turbinati instar Pyri, sed rotun-
di, Vesicariæ fructu triplè maiores, initio viri-
des, maturitate pallescentem ex luteo colorem
adquirentes, odorati, succi pleni, semine abundan-
tes plano ut maris fructus, sed minore, nigriorè-
que: radix pedalem aut ampliorem longitudinem
æquat, interdum bifida, intus alba, foris verdè fu-
sca, cui aliquot fibræ adnascuntur. Hæc ita Clu-
sius, cui græcè *Μανδράκη μέλας* dicitur, & *θερ-
σανίας* à foliorum Lactucæ similitudine: Latine
etiam Mandragoræ niger & scœmina.

Synon. C. Bauh. phyt. & pin. Mandragora 2. siue fru-
ctu Pyri: Mandragoras scœmina Tragi, Mat-
thioli. Cordi in Dioscor. Lac. Lob. Obs. 118. Ic.
Plant. 267. Dod. H. Lugd. p. 1716. Cæsalp. & Ca-
merarij. *Eid. phyt.* Mandragora 3. siue flore cæru-
leo: pin. Mandragora 3. siue flore subcæruleo pur-
purascens: Mandragora scœmina Clusij hisp. &
hist. Cast. & Eyst. Mandragora Lonic. altera
Cæsalpini.

Matthiolus pingit in sua icone fructum tur-
binatum, ad Sorbum accedentem, nudum, sine
foliis: ea icon non placet. Lobel. & Dodon.
folia addunt, an ex ipso fructu, nescimus. Camer-
in Epit. Matthioli. propriam iconem habet, pin-
hens fructum rotundum cum foliis. An porro
C. Bauh. not. C. Bauhinus duos faciat Mandragoras iudicet
alii: saltem illud non placet, eum vnam Trago
adscribere, cum tamen Tragus scripserit Man-
dragoram sibi nunquam visam.

Locus Matthiolus perhibet scopiosam in Gargano
Apuliæ & aliis montibus haberi. Supra Gades
itinere Hispalensi, non procul ab urbe Xerez de
la Frontera dicta, ad aruorum margines, quæ se-
cundum flumina sita sunt, & quibusdam aliis Bæ-
ticæ locis vliginosis florentem obseruabat Clu-
sius initio Februarij anno 1565. & paulò post, eo-
dem videlicet mense fructum maturum collige-
bat inter Calpen & Malacam, nimirum toto illo
maritimo tractu supra fretum Herculeum ad me-
ridiem conuerso, & valde aprico, propter mon-
tes, vno aut altero miliari à mari distantes, qui in
mediterraneis, vsque ad fretum continuè à serie
producentur. In Belgio nunquam videre memi-
nit, nec de semine quidem, quod ex Hispaniis
deferbat, germinare vnquam voluit: ut nec in
Austria, quod aliquoties ex Italia postea acci-
piebat.

MELONGENA VETERIBVS.

Æquiuoca **M**elongena in Arabum codicibus primùm
celebrata fuit. Hanc quidam suspicantur

esse Solanum pomiferum fructu rotundo. Alij
Solanum pomiferum fructu incuruo. Nonnulli
verdè Solanum pomiferum fructu nigro spinoso.
De his autem deinceps ordine dicturi sumus.

Melongena vetus, Auicenna libro quarto cap.
455. auctore, noxia est, recens melior. In ea cali-
dam temperiem superare, & siccam esse ordine
secundo, ex amore & acrimonia colligitur.
Melancholiam gignit, canerum, lepram, hæmor-
rhoidas, panos, dolorem capitis, & furorem oris.
Obstructiones hepatis & lienis efficit, nisi cum
aceto cocta fuerit, colorem corporis frædum,
atrum & cernuum, ut mirum sit Auenhoëm Ma-
la insana libro quinto Collect. cap. 101. com-
mendasse suo quodam modo parata.

SOLANVM POMIFERVM

fructu rotundo.



Fibrolas pa- Descrip-
cum altè,
desigit radice,
caule vnico pe-
dali, crassius-
culo, firmo,
subpurpureo,
hirtulo: foliis
palmaribus, &
sesquipalma-
ribus, palmum
ferè latis, per
ambitum si-
nuatis obiter,
infra supra-
que pilosis:
flores breuib.
satis pediculis
hærent, albi-
cantes aut
subpurpurei,
in stellæ modum

quibus succedunt poma, oui, vel Cucumeris cæ-
citer magnitudine, & figurâ ferè, ex rotundo sub-
longa, colore purpureo, virescente, leui corti-
ce, succosa albicanteque intus pulpa: in qua co-
piosa semina, albicantia, compressa, Piperis sili-
quæstri æmula.

Affinia cum essent Mandragoris hæc cæculo-
purpurea poma, Melongena vel Mala insana,
exotica, ex fusco violacea, effugie omni oblon-
gi, quidam Recentiorum suspicari sunt marem
Theophrasti Mandragoram, eoque esu lethalem
rati, insana mala vocarunt. Sed apud Theo-
phrastum multa lectonis labe, fortè non di-
stincta stirpium delineatio, ne dicatur farrago
omnium congenerum, è quibus hæc eximenda
est. & Cucumerum familiæ, aut potiùs Mandra-
goris vel Hyoscyamis adscribenda, ut Lobel. in
Adu. statuit.

Apud Cordum in histor. vbi Melongena fi-
gura addita, quidam annotauit Simeonem Se-
thi fortè Mazinzoniam vocare. Sed Ruellius,
qui Melensana vulgò vocari ait, quasi Mala in-
sana, de hac nihil à veteribus fuisse scriptum,
prodit. Non desunt tamen attestante Trago qui
terram Mandragoræ speciem quam Morion
vocant esse, suspicentur. Quæ opinio Fuchsius di-
splicet.

Mandrag.
affinia poma

Theophr.
maia.

An Melon-
gena Sethi.

Brassaeolus autem itemque Fuchsius Hermolaum immecitò, meo quidem iudicio, inquit Matthiolus, damnant, quòd in ea sententia cum fuisse velint, ut putarit Mala illa, quae Italis corrupto nomine *Melanzana* vocantur, Liguribus *Melanzana*, Hetruscis *Patranciani*, Hispanis *Verangenes*, Germanis *Melanzan*, & *Dollapffel*, hoc est, Poma furoris, Gallis autem *Pommes d'amour*, hoc est, Poma amoris, esse terrae Mandragorae fructus: certa ac firma Hermolai sententia, ex ipsius verbis sufficienter constat. *Ceterum*, cur Poma amoris appellentur à Gallis, haud scio, inquit Ruellius, nisi quòd fortassis elegantia & pulchritud. placeant, & ita digna quae amentur. Sunt tamen & alia Poma amoris, de quibus infra dicetur. *Melanzana* mala insana minùs sano iudicio vocat Hermolaus, inquit Scaliger: esitata namque nullo excitant furores: quippe iis in bellariis vtuntur Genuenses. Solanum pomiferum Gesn. hort. potius dixerit. Neque repugnat idem in cat. pl. si quis Hippomanes hunc fruticem esse dicat, qui Poma Melanzana vulgò dicta & amoris Poma producit.

Solan. pomiferum.

Synonyma

Mala insana Trago, Fuchf. Dod. Lac. Lon. Tab. & Gerardo: Malum insanum Gesner. hort. Melongena Matth. Cord. hist. Lob. in Aduers. Obs. p. 138. Ic. Plant. pag. 268. Cast. H. Lugd. p. 617. Camer. cui & Verengena Toletanorum: Melanzana fructu pallido Eyst. Solanum hortense & Pyra insana Cæsalp. Solanum 15. C. Bauh. phyt. Eid. pin. Solanum pomiferum 4. siue fructu oblongo: Ex videtur Strychnon hortense Dioscoridis, urbanum Theophrasti, esculentum Galeni, & tertium Genus Plinij. Variate aut flore purpureo, albo: fructu albo purpureo, luteo: figurâ quandoque oblongâ, aliquando instar mali rotundâ. An Malinathalla Theophrasti Bellonio?

Locus.

Basileæ in orto D. Cælij florabat & fructum ferebat mense Augusto, quem tamen ut plurimum difficulter maturabat: in vasis fictilibus, viridantium voluptati & gulonum auiditati colitur.

Vitus

Helluones interdum hosce fructus uti Cucumeres in acetariis helluantur, ut Romæ, Genæ, Neapoli, maiore voluptate quàm utilitate: deterior enim succus vel quolibet Pepone aut Cucumere est. Sunt ex Italia, qui horum pomorum esu venerem concitari putent: quod forsitan idè præstant, quòd Hæmus gignant. Adhuc frequenter manducati, febres generant diuturnas, & habitum totius corporis malum. Ceterum, qui Melongenae esse credunt Arabum, easdem cum illis vires huic adscribunt, de quibus consulo caput præcedens decimum-seximum.

SOLANVM POMIFERVM fructu incuruo.


Genera tria
Rauvvolff.

DE hoc Rauvvolffius in Itiner. partis primæ capite 4. Halepi reperiuntur tria genera Melanzanorum, Arabibus etiam Melongena & Bedengiam dicta, cinerea, lutea & rubella, longitudine & cunctitate eadem longis Cucubitis similia.

Hist. Lugdun. pag. 13. in append. Melanzana, Arabum Melongena: Calpar Bauhinus phyt. Solanum 16. Eid. pin. Solanum pomiferum 5. siue



SOLANVM POMIFERVM fructu spinoso.



fructu incuruo, varians colore fructus, qui flavus, cinereus, & purpureus.

Sunt præterea ^{Genera duo} Rauvvolffia, eodem ^{Rauvvolff.} auctore, Melanzanorum alia duo genera, Arabibus Bathleschain nūcupata, longa & rotunda, quæ maiora, colore nigra, lævia, ita lucida ut splendcant. Melanzana nigra, ut in Hist. Lugd. in app. p. 13. inscribitur, fructus longus, altus, alia rotundus, colore nunc atro, nunc sub-

nigro, cortice lævi, & procul inuienti splendido, salubrior est coctus, ut inquit Auerrhoes, quàm crudus.

Camer. ad hist. germ. Matthiol. Malorum insanorum species valde spinosis foliis & caulibus, floribus maioribus. C. Bauhin. phyt. Solanum 17. Eid. pin. Solanum pomiferum fructu spinoso, primum, Melanzana nigra, Bathleshaia æthiopica Rauvvolff. Lugd.

Synonyma

POMVM DE HIERICHO, Melongenae congener.

Pomum Hiericho Ferd. Imperati, peregrina Italiz plantæ, nec altis descripta, filia producit candicantia, simillima foliis Melagiane Italiz dictæ, sed paulò minora. Caulis & foliorum costæ spinosæ sunt: flores cærulei, instar florum Buglossi: fructus rotundi pomi instar [in modo d. Melo:] quorum color antequam maturescant viridis, maturorum flauus: sapore insipido, & aliquantum odorato.

C. Bauh. pin. Solanum pomiferum fructu spi-

Descriptio



noso 2. Solanum spinosum fructu rotundo: Pomum Hieri-
conticum Imperati.

SOLANVM POMIFERVM,
fructu rotundo striato duro.

Descriptio

Cautè est singulari Solanum pomiferum digitum, crassitudine digitali, cubitum alto aut matori, glabro, lætè virenti, medulla albicante pleno, spinis subinde donato, in ramos plures diuiso: folia melanzanæ foliis paria, sinuata, atro-virentia, vndique glabra, spinis fortuitis auersâ parte horrentia: flores Solani vulgaris, albi, cono luteo, poma sequuntur rotunda, torulis canaliculata, siue striata, dura.

Mala Æthiopica Dod.

Dodonæus nobis auctor est, non parum à malis insanis differre, quæ nostra ætas Æthiopica cognominat, quod ex Æthiopia in Hispaniam primum inuecta existimetur. Veteribus autem cognita fuisse difficile esse affirmare. Cum malinathalla verò Theophrasti nequaquam conuenire.

Solan. pom. Herm. Lobel.

Lobel. qui Solanum pomiferum herbariorum in Obi. pag. 135. [vbi Piper Guynæz vulgò appellari refert, quamvis minimè vult] & Icon. Plant. p. 164. in. scribit, Solano verticillato simile facit, sed fructu siue poma phœniceo, iucundissimo spectaculo, Amoris poma dicto ferè pari: folio Hyoscyami lutei: floribus Solani horrentibus: æstiuam item esse plantam, Hispano semine natam.

H. Lugd. icon. bina

Hist. Lugd. p. 632. Capsicum rotundum Dalechampi, fructu rotundo, rimis profundioribus fisso, rubro, pusillis granis sarcto, subflauis, gustu acri: viribus iisdem pollet, quibus & cætera Capsica. Eid. p. 1730. mala Æthiopica Dodonæi. Lugdunensis duas figuras vnius plantæ exhibet, dicitque prioris fructum esse gustu acri, quod non placet.

Solan. pom.

C. Bauh. in phyt. Solanum 14. Eid. pin. Solanum pomiferum 2. siue fructu rotundo striato duro; Solanum pomiferum Tab. Eyst. & Gerar. cui & mala Æthiopica: foliis magis minùve sinuosis: in caule aliquando, vt & in foliis, modò infernè, modo supernè, paruis aculeis.

Locus & Tempus

Satum Montbelgardi, Iunij principio florum vestigia producebat, sed fructum non maturabat. Tardè admodum quoque ad perfectionem Coloniz venit.

Vires & v. sus

Feruntur verò hæc mala in pinguium carniū iure cum sale ac Pipere cocta inferri ac edi: &

minùs mali succi esse, quàm Insana aut Auræa propterea videlicet, quod duriora, diutiusque aservuari queant, nec ita facillè vt illa corrumpantur. Sunt tamen nec hæc Æthiopica boni succi, & alimenti non multum corpori adferunt.

LYCOPERSICVM VETERIBVS.
& in genere.

Lycopersici meminit Galenus 4. simpl. med. cap. 18. titulo, quod sapores acres omnium sint calidissimi, his verbis: multa ipso statim odore aliena sunt, planèque pugnantiam cum homine indicant, velut & hæc ipsa quæ nunc dicta sunt, & Cicuta, Papaveris, Mandragoræ, & Hyoscyami succus. Quin & nuper quoque herbam quandam conspeximus [hæc verba non bene translata in græco textu sic leguntur: ἰδιαίτην ἑρμῆν χυλόν, i. e. contemplati sumus] quam Centurio quidam ex Barbarica circa Ægyptum regione comporta-uerat, odore aded graui, adedque inamæno, vt ne gustare quidem auderem, sed lethalem esse coniecirem: utebatur autem ad vigentes articulorum dolores: atque ipsis etiam laborantibus refrigerandi pollere facultate est visa. Est autem colore subflauo, odore tam graui, quàm Cicuta: nisi quod leuem quandam instar aromatum odoris adferat gratiam. Nomen herbæ ex qua succus hic exprimitur, Lycopersicum esse dicebat.

Ab ignaua Galeni timiditate, qui Lycopersicum herbam, quod grauius oleret, ne gustare quidem ausus est, procul abest Gesnerus: qui Lycopersicum Galeni non aliud existimat quàm Stramoniam dictam, vel fortè Cardiacam: Pomum verò auri opinantur Anguill. & Cam. alij verò teste Iulio Alexandrino Tagetem Indicum.

MALA AVREA ODORE FOETIDO,
quibusdam Lycopersion.



Tota plânta virosû & καυστικὴν ferè vt Garyophyllorû Indicorum, inquit Cam. spirat odorè, caule cubitali, & ad altitudinè quandoque humani corporis, minimi digiti ferè crassitudine, hirsuto, ramos lætè spargente: folia tenella, pinnata, hirsuta, ex verticilli flauescen-

tia, ex tribus quatuorve singularium foliorum oblongorum, sinuatorum coniugationibus, quas pusilla quædam foliola intercedunt, compositis: flores, Solani vulgaris forma, in luteū languescunt, senis ferè foliis cõtantes, quorū mediū totidè obfidet stamina saturatius flore tincta: succedunt tẽ-

dem multa poma, non multum Araneis minora, sessilia, rotulis ad oppositam usque partem canaliculata, leuore exinio, colore vel aureo, vel ochreo, vel purpurascens, vel denique versicolore: semine intus copioso, circinato, compresso, & veluti membranaceo, hirsuto: radix summa ferè terra hæret, longis sed numerosis fibris vberim capillata.

Mala infana
na Cas.
Synonyma
Lycopers.
Galen.
Pomum Indum,

Pomum aureum.
Pomum de altero mundo.

Mala infana, ut vocat, Cæsalpinus ad Solani furiosi genera pertinere existimat. Anguillar. epist. 12. Lycopersicum Galeni: Poma amoris Dod. gall. Lob. in Adu. & Obs. pag. 140. Camer. epit. Tabern. & Gerardo. Pomum amoris Cam. hort. & Pomum Indum Mediolanensium, nomine eterno *Tumula* dictum: Eid. apud Matthioli. germ. & Hist. Lugd. pag. 628. Poma aurea. Gels. hort. Pomum aureum, Pomum amoris, Pomum de altero mundo, Pomum Solanis cognatum, Solanum pomiferum alterum, & Solani pomiferi genus aliud. Lob. Obs. p. 135. Glaciū putatum, Pomum amoris: Eid. in plant. pag. 270. Poma amoris, Lycopersicum. Dod. lat. & Cast. aurea mala. Guill. pap. *Tumate* Americanorum. C. Bauh. phyt. Solanum 20. Eid. pin. Solanum pomiferum 1. siue fructu rotundo striato molli, communiter luteo, auricolore, aliquando pulchre rubente: rarius albo: est & surrectus cobitalibus cauliculis; quod per omnia minus est. Poma amoris fructu luteo, & Poma amoris fructu rubro, & Mala Peruviana. Eyst.

Nomina,
Rogant.

Locus &
Tempus

Vires & v.
lur.

Germanis *Goldapffel*, *lieb apffel*. Belg. *Gulden appelen*. Gall. *Pommes d'or*, & *Pommes d'amour*. Ital. *Pome d'oro*, alijs *Pomi del Peru*. Chani Amantulam vocant.

Habetur in hortis locisque humidis & solo pingui, vel etiam rigatione gaudet. Iulio & Augusto mensibus floret: Autumno fructus perficit.

Succus valde quàm opportunus incipienti epiphora fluxionibus oculorum feruidis glaucoma facuris, si per initia admoveatur. Non modò reuocans enim humoris insultum compescit, sed etiam calorem moderatur sæpius periculo à recentioribus facto. Quin etiam crispelatis, ignibusque sacris vehementer oblectatur. Italis nonnullis escantur poma cum Pipere, sale & oleo præparata, non secus atque Cucumeres. Sed eduntur & cocta: ast quem halat vniuersa planta teter spiritus, paruo emolumento & parum tuto in cibos venire satis prodir. Præbent autem mala corpori alimentum quidem perexiguum, & hoc ipsum tamen prauum ac vitiosum: refrigerant enim, sed aliquantò minus, quàm Mandragora. In oleo autem cocta, ad scabiem sunt efficacia. Eadem arte chymicà oleum subministrant contra partes igne, vel alia te candente, vltas curandas percommodum. Hoc oleo temporibus & carpi inuictis somnus conciliatur. Retulit olim mihi Testor vir doctus, Medicus Paterniacensis in Heluetia, se phreneticum omnia rumpentem visticasse, qui, cum ei manibus Aurea mala tenenda dedisset, eique etiam aliquot subiecisset, paullo post obdormierit.

Somnum induit.

PYCNOCOMVM IN GENERE, EX veteribus & Neotericis.

Descriptio

PYCNOCOMVM folia habet, ut scribit Dioscorid. Bruce similia [Hic interponit Lac. ex ver. cod. *μυρμερ*] sed aspera, crassa, ætioraque: caulem quadrangulum; florem Ocyimi: fructum Tom. III.

καρπὸς: semen alijs.] Marrubij [*απὸ αὐτοῦ*] habent vulgata exemplaria ita *απὸ αὐτοῦ*, i. e. Porri, scori & Oribasii legio, & Lacuna ex ver. codice] radicem nigram, rotundam [Ald. *καρπὸς*] inens pallidam, exigui Mali figura, terram olentem. Nasceitur in saxosis locis. Semen tumultuosa, granaque somnia facit, vñ drachmā potum. Discutit & edemata, impositum cum polenta: nec non & spicula, & adactos corporis aculeos extrahit. Imposita quoque folia, tubercula, furunculosque discutit. Cæterum radix eius in aqua multa drachmarum duarum pondere, alium soluit, & bilem exinanit.

Eadem Plinius lib. 26. cap. 8. & cap. 14. tradit. *Plinius* Habet autem denarios duos [10. n.] pro duabus drachmis Dioscoridis, non ita magno discrimine, quum in vñcia denarij septem drachmæ vñdo octo habeatur. Suspiciatur Cornarius hic obolotum vocē deesse, ut 10. non pro denarij ponderis nota acciperetur, sed simpliciter pro denarij numeri nota, ut ita legeretur: radix eius in aqua multa 12. obolorum pondere.

Galeo authore Pycnocomi radix, fructus, folia, omnia digerendi, attrahendique habent facultatem, utpote quæ & gustu sunt acris: folia itaque phymata, & furunculos discutit, fructus valentior est: & hæc quidem efficere potest mistus alicui digerentium cataplasmatum, cuiusmodi est quod ex hordeacea farina conficitur: palos & alia id genus infusa ad extimam cutem elicit. Porro radix ad suprā dicta quidem deterior est & infirmior, cæterum bilem fluxam expurgat. *Galeus*

Dalechampsius nullum ex rei herbariæ scriptoribus, aut se audiuisset, aut legisset fatetur, qui Pycnocomum verum nouerit. Ignorū quoque sibi scribit Cornarius. Omnibus etiam in Italia ignorū scribit Marchiolus; in quo eum carpit Guilandinus in Theone, falsò id asserti scribens.

Sunt qui suspicentur Pappas Americanum *Equinocci* Pycnocomon esse. Quorum quidem opinionem nunc probare non possumus. Fabius Columna voluit Succitā esse Pycnocomum. Pycnocomon Trago & Lonicero est Vlmaria. Apud Bruffellium ponitur icon Angelicæ pro Pycnocomo: non tamen existimamus, eam ab illo intelligi, sed potius cum Trago & Lonicero Vlmariam. Pycnocomum quidam dixerunt de Barba ceptæ ramosa, quam opinionem meritò relici Fuchsius. Pycnocomum Arguillare est quorundam Relicla lutea, sed perperam, ut rectè indicant Lob. & Camer.

PAPAS AMERICANVM.

Caulis bicubitalis & tricubitalis, ac etiam *Descriptio* altior, crassiusculus succulentus, subrotundus, striatus, sobhiscutus, viridis, è crebris punctis rubentibus maculosus, inanis, ramosus, inæqualis propter eas quas habet inde usque à foliorum pediculis adnatas membranas alas, atropurpureas, nonnunquam crispas: folia sesquipalmaria ex tribus foliorum coniugationibus componuntur, quibus impar vñum, reliquis malis ferè, alam claudit: sunt autem singularia folia hirsuta, ortu quidem inæquali, non adèò tamen quin alam quoquo modo deformant; altero tantò longiora quàm latiora, atrouirentia & splendentia superne, inferne obest & splendor, & viroris intentio: coniugationes singulas intercedunt Bbb



alia foliola rotundata, Lenti aut Lupino ferè paria, oitu & positu perinde inæquali: rami in plures pediculos abeunt, atque hi rursus in alios numerosos, hirsutos, geniculo vno donatos, vnde cum parte reliqua pediculi cedunt facillè vel sua sponte flores: quorum singuli ex calyce viridanti quin-

quepartito, floribus Maluæ siluestris procerioris magnitudine pares, foris palliduli & subhirsuti sunt, intus verò ex pallido purpurascunt, interdum albescunt, totti integri, cum quinque apicibus obtusis in ambitu, cæterùm à stilo viridante quem circumstant quinque fibræ crocæ, in vnumquemque apicem excurrit radius virens: obseruavi quoque ex eadem regione suboriri folia quædam minora, flori concoloria, quæ multiplicem florem meditantis naturæ videri possent rudimenta: succedunt *poma* floribus numero paria, Castaneæ circiter magnitudine, sed forma orbiculata, atroviuentia, subhirsuta, in iis *semina* plurima, parua, plana, Solanis similia. *Radix* bulbosa, crassa, palmari longitudine & sesquipalmari, ac etiam multò minor, foris atrotubens, intus ex albedine pallens: vnus bulbus multos profert ramos, multasque emittit fibras, è quibus dependent bulbi multi, magni & parui, insipidi. Scripi & se propagat insigniter hæc planta.

Papa Peruanum.
Openauk.

Chunno.

Est, inquit Benzo, apud Peruanos radices genus [*Pape* vocant] tuberum specie, exigui saporis. De eodem sic Thom. Henriotus, *Openauk* radices Virgineæ insulæ rotundæ, nodorum instar coherentes, coctæ elui aptæ. Sic verò Pet. Cieca, *Papas* radices coctæ teneram, instar Castanearum elixarum, pulpa habentes, sole siccatæ *Chunno* vocatæ.

In Colla, inquit H. Card. lib. 1. de rer. var. cap. 3. regione Peru, *Papas* est tuberis genus, quo pro pane vtuntur: gignitur in terra: ita natura prouidit sapienter vbique, siccantur vocanturque *Ciung*: factique quidam sunt diuites hæc sola merce, quam in prouinciam Potossi deducebant. Fert, vt dicunt, radix hæc herbam Argenome similem: forma est Castaneæ, sed suauior gustu, editurque cocta, vel in farinam redacta. Inuenitur etiam apud alias gentes eiusdem Chersonesi, velut apud accolæ prouinciæ Quiri.

Vnde primùm, inquit Clusius, qui huius historiam fusè & accuratè prosequitur, nacti sint Itali, ignorant: certum autem est, vel ex Hispanijs, vel ex America habuisse. Mirati autem subit, eum tam vulgaris & frequens esset in quibusdam, vt aiunt, locis Italiæ, vt eius tuberibus cum veruicina carne coctis, non secus ac Rapis, & Pastinacæ radicibus vescerentur, imò etiam suis in pabulum cederent, huius stirpis no-

citiam tam seò ad nos peruenisse: illud autem magis mirum, Patavinæ scholæ fuisse ignotam, ante quam amicis, qui Patavij Medicæ arti operam dabant, Francofurto eius tubera mitterent. Nunc verò plerisque Germaniæ hortis satis vulgaris est planta facta, quandoquidem adeò fecunda est. Cæterùm, dubium non est, quin sit ea planta, quam Petrus Cieca cap. 40. primæ partis Chronici sui sic describit. Locis Quiri vicinis, præter Mayzum, habent incolæ stirpis genus, quo magna ex parte vitam sustentant, *Papas* videlicet, radices tuberibus ferè similes, nullo putamine, aut ossiculo testas, quæ coctæ, teneram instar Castanearum elixarum habent pulpa: Sole siccatæ *Chunno* vocantur, & in vsum teruuntur. Prodegit hic fructus stirpem *Papaueri* [condonanda est hæc comparatio miliri] similem. *P. pas* etiam mentionem faciunt August. Carate atque Gomara in sua generali Historia Indiarum. Quibus non valde ablimiles videntur eæ radices, quas Virgineas *Openauk* nominant. An verò Veteribus cognita fuerit hæc planta dubitat Clusius, nec multum abest quin credat esse *Arachidnam Theophrasti*, quæ cum hac perhullè convenire ipsi videtur, præsertim radices historia.

Florere hanc Basilæ Junio, scribit C. Balthus & sæpe ad Autumnum vsque & à primis pruiniis offendi. Hanc ex insula Virginea primùm in Angliam, inde in Galliam, aliisque regiones delatam esse. Huius radices in Virginea *Openauk* dici: *Acostæ* verò in Hist. Indiz, *Papas*: hinc *Papas Indorum* vel Hispanorum vocari, Italij *Tartuffoli*, quo nomine, & tubera nominare solent. Germanis *Grueblinghaem*, id est Tuberum arborem dici. Se anno 1590. huius plantæ iconem, suis coloribus delineatam, à D. Scholzio *Papas Hispanorum* nomine accepisse, & à nemine descriptam inuenisse, ac adeò in phyt. sub Solano tuberoso esculento, figurâ addidit, descripsisse, eiusque iconem Clusio transmississe. Solanum quidem se appellasse, propter formam aliquam foliorum, cum Malis autem: florum, cum Malis infantis: fructuum, cum bacis Solani vulgaris: seminum, cum Solanis penè omnibus, denique propter totius plantæ odorem, quem cum Solanis communem habere ait. *Pycnocomon Dioscoridis* *Cortusum* censere, motum exemplari *Dioscorid.* manuscripto, cui similis figura adpicta. Et sanè notas florum ac radicum *Pycnocomi Dioscoridis*, huic Solano convenire: floris & seminibus non item. Tandem relatum scribit apud Burgundos [qui ex ramis in terram reclinatis, etiaque rectis propagabant, quò plura Tuberâ acquirerent] harum radicum vsum interdixtum, vt quibus persuasum sit, earum esum lepram causare: & *Arrilcokos*, Indicos vocari. *Hætenus ille*. In cuius plin. vocatur Solanum bacciferum 13. *Pycnocomum Dioscoridis*, *Cortusi*: & *Papas Peruanorum*, Eyst. *Papas Acastæ* lib. 3. cap. 10. & lib. 4. cap. 17. Non autem meretur hæc herba nomen *Grueblinghaem*, siue Tuberum arboris. Non enim caules profert arboris erectos, qui per se se sustinere possint: sed in terram reclinantes, radicesque novas, tam semel apprehensos, agentes: quotannis etiam pereunt caules. An porò hæc planta mereatur nomen Solani, ob odorem & aliquam similitudinem à fructu petitam, repugnantibus viribus & cæteris, iudicent alij. Nos huic eduli plantæ maluimus suum relinquere nomen. Non sunt

Locis & Tempus.

Openauk.
Papa Ind.

C. Balthus
lappin vnt

huic folia fructus: nec radix nigra: neque sapor, neque vires denique cum Pycnocomo veterum conveniunt, ut patet ex ijs, quæ antè cap. 23. proposita sunt: Præterea planta illa, quam Burgundus Artiscokum Indicam vocare refert, à Pappâ Americano, siue Solano eius tuberoso esculento, plurimum differt.

Vires & v. sus.

Indi, Acoſta referente, radicibus panis loco utuntur quem *Chunno* vocant. Quin & aliud edulium eodem *Chunno* nomine nuncupatum admodum diu durans, ex eiusmodi radicibus. Sole siccat, inque partes diffractis, conficiunt. Sed & viridem, vel coctam, vel assaram manducant. Ex alio autem *Papas* genere, in calidioribus fundis plantato, secula, *Leero* appellata, parant. Sic in insula Virginea, apud quos in humidis & paludosis locis nascitur, radicibus in aqua aut aliter coctis utuntur. Iis Castanearum, aut Pastinacæ in modum paratis, nonnulli vescuntur ad debiles vires firmandas. Nostrates, inquit Casp. Bauhinus, aliquando Tuberum modo sub cineribus assant, & curricula ablata, cum Pipere comedunt: alij assatas & mundatas, in talcolas dissecant, & ius pingue cum Pipere affundunt & comedunt, ad Venerem excitandam, seménque augendum: alij & tabidis quoque viles esse volunt, quod bonum alimentum præbeant, & nō minùs quàm Castanæ & Pastinacæ alant, & flatulentæ sint. Clusius elixas, deinde, epidermide verius, quæ cure purgatas [facillimè enim cedit] & inter binas lances, Naporum, aut Raporum pinguiore veruecis insculo maceratas degustabat, & sanè non minùs sapidas & palato gratas deprehendebat, ipsi Napis. Crudas vero, nimis asperas & flatulentas esse æstimat.

Venerem excitat.

SOLANVM RACEMOSVM CERASORUM formâ C. Bauhini.

EX radice fibrosa caules exurgunt bicubitales, angulosi, aliquantulum hirsuti, in multos ramos latè se spargentes diuisi, qui infirmi sunt, & nisi fidica sustineantur, in terram procumbunt, succi plenit ex caulis latere pediculis, res, quatuorve uncias longi, hispidi, flores sustinentes, prodeunt. Folia habet in multis lacinias acutas, impari semper numero, Agrimonie foliorum instar diuisa, & per marginem incisa, alijs folijs minoribus interiectis, pallide virentia, aspera, & grauem odorem spirantia. Flores plures, quorum singuli singulis pedicellis insident, luteoli, ex quinque folijs acutis compositi, à calice viridi quinquefolio sustentati, in quorum medio capitulum paruum rufescens, apicibus donatum: quibus fructus succedunt, quali in racemo dispositi, Cerasorum forma & magnitudine, virides primum, dein per maturitatem rubentes, in quibus, non secus quàm in Pomo amoris, copiosa humida medulla, & semen minutum albicans, & plantam continetur.

Descriptio

Synonyma

Solanum hoc bacciferum 14. [vt vocat in pin. vel vt in prod.] Solanum 2. siue racemosum Cerasorum forma: vel Cerasa amoris racemosa rubra, planta annua est, & singulis annis ferenda. Aliquando tamen etiam ex deciduo semine renascitur.

NUX METHEL VETERIBVS.

Nux Methel [Iue Methel] ex autoritate Auicennæ Serapioni est fructus similis Nux-

Tom. III.

civomica, & semen eius simile semini Mandragoræ [ita quoque legit Matthiol. & u. Lugd. Sed Iahi Ebenalbaranich Arabs Citeri simile dixit.] cortex asper: sapor eius delectabilis & vinctuosus. Virtus eius frigida in quarto gradu. Si detur ex ea in potu vnum Kirath cum vino inebriat fortiter: si dentur duo aurei occidit statim. Item: Nucis metellæ arbor, Vomice arbori non dissimilis fructum gerit Mandragoræ, oleosum, hirsuto cortice, sapore non iniucundo. Nucem Methel his ferè verbis describit Andreas Bellunen- sis. Nux Methel ex sententia omnium Physicorum Syriorum & Egyptiorum factus est cuiusdam plantæ magnitudine & folijs Melongene similis: unde & à quibusdam Arabibus Berber- gine nominatur, i.e. Melongine similis. Flos huic est albus, magnus oblongus. Fructus nux Methel nuncupatus, est veluti nux aspera, cortice spinoso, intus semina habens Pomi Mandragoræ se- minibus similia, dulcia, pingua.

Nux Methel Bellunen- sis,

Berbergine

Monachi in Mesopotamia dist. 5. dicunt, Nucem Methel esse fructum spinosum, plantæ cuiusdam, Solanum spinosum vulgò vocatæ, aſuntque Nucem Mechil, siue Mochil, cum nuce Methel multum convenire. Sed tamen in rei veritate Nux Mochil aliud est à nuce Methel. Qua de re fufius H. N. I. 3.

Bellon. Obs. lib. 3. cap. 50. de variarum rerum experimentis apud Turcas, scribit eos singulare medicamentum inuenisse, cognomento *Tatoula*, quod illi, qui vigilijs torquetur, quiescereque non valet, dimidij aspri pretio exhibent, statimque somnum conciliant. *Tatoula* autem nihil aliud esse quàm nucem Methel Arabibus dictam, Grecis Solanum somniferum, quam spontè nascentem in planis hiericuntis apud Hiericæi fontem se reperisse scripto prodidit. Dispicendum tamen proponit Clusius an *Tatoula* non sit *Garcia* & Acoſtæ *Datura*, quæ *Columbæ* Solanum manicum.

Fuchf. not.

Miratur verò Matthiolus quâ ratione ductus Fuchsius vltimo libello, vbi tantum stirpium imagines in exiguam formam conetaxit, dixerit, Noces Metellas hispides esse fructus peregrinæ illius plantæ, quam antea magno volumine Stramoniam vocauerat. Idem prorsus reclamare suspicatur Mauritanum sententiæ, à quibus harum historiarum prodantur.

Idem demum tam officinas, quàm Medicorum vulgus, plerumque legitimas Vomicas Merellarum loco usurpare, & contra Metellas nonnunquam Vomifarum vice supponere, magnòque errore interea confundere testatur. At de horum lapsu fufius alibi actum est.

Nux Methel, Rhafis testimonio lib. 3. cap. 30. facit stuporem, & quandoque pernicioſa existit, inebriat, & nauscam ac vomitum infert. Item lib. 8. cap. 21. Narcotica est, sedat, opilat, facit euomere. Si ex ea drachma semis detur, inebriat fortiter: si multum detur, occidit. At eadem sunt, quæ Auicenna habet. Stupefacit, inquit, cerebro noxia est, cordi aduersatur, carum adfert: drachmæ sexta pars sumpta inebriat, drachma vna eadem die interimit. Ea noces, inquit Matthiolus, cum intus in corpus sumuntur, vertigines, & faciei ruborem inducunt: quin & oculorum caligines, temulentiam, inexpugnabilemque somnum: postremò oboritur frigidus sudor, vicinæ mortis præſagium. Auxiliatur noxæ excitatus pluries vomitus aquâ calidâ & oleo: post vomitum datur conuenientissimè butyrum & vinum metacum copiosum, additis Pipere, Pyre-

Bbbb a

thro, Lauribaccis, Cinnamomo & Castoreo. Prodest & ægrotantium extremas corporis partes, nempe manus & pedes calidâ aquâ fouere, ac inde frictionibus rudi linreamine factis calorem in vniuersum corpus excitare: cum eo tamen, aut subinde balanino, aut costino oleo perungantur affecti. Præstat idem exercitatio, proinde ad celerem gressum cogendi sunt, ut vniuersum corpus incaleat: & pinguibus postea cibis dulciq; se vino refocillandi. In summa & his ea maxime conueniet curatio, quam epotum requirit opium.

STRAMONIA MULTIS DICTA, SIVE
Pomum spinosum.

Descriptio



Cvbito altior est, radice multifidâ, lignescente: folia per caulem longis appensa pediculis, ampla, sinuata, graue odorem spirantia: flores, ex longa tuba calathoides, amplii, candidi, margine anguloso, quina in medio stamina cum longis apicibus occultat: quorum vnumquemque sequitur portum orbiculatum, iuglandis putamine calloso adhuc involuta magnitudine, bullatum, brevibus que spinis asperatum, semine compresso, cinereo.

Gesl. hort. Nux methel Auicennæ, Stramonium Fuchsi, Turcarum Tatoula Bellonij, vna eademque est planta. Ego autem Tatoulum

Bellonij, à Stramonio Fuchsi separo. Ibidem potum venis quam ruce rudi autumat. Mandragoris aliter annuiterandam æstimat, aut potius sui generis plantam, quam Solaris inferendam. Vel denique Lycopersicum Galeni, vel Dioscoridis Phascum constituerit. Sed quænam ex tot, tamque varijs opinionibus, firma & postea Gesl. assertio? Tragus propter formam Strichnis & Mandragoris accensendam iudicat.

Gesl. lapsus

Gesl. taxat.

Stramonium siue Pomum spinosum dicitur Tragus: Stramonium Fuchsio. Dodon. Gesner. hort. Lac. Hist. Lugd. pag. 629. Camer. & Eyst. Stramonium peregrinum Lobel. in Ada. obs. p. 136. [vbi & Lycopersicum Galeni] Icon. Plant. pag. 164. & Gerardo: Nux methella Matth. Cast. Acoft. & Camer. Nux methel Auicennæ Anguillar. Fusch. Gesner. hort. Nux methella officinarum, Columnæ: Hyoscyamus Perruianus Cordo hist. Tatula Turcarum, Guiland. pap. Hippomanes Crateux Anguil. Gesner. hort. Paracoccalon siue Barycoccalon [*παρυκοκκαλον*, aut potius *βαρυκοκκαλον*] Græcis recentioribus: Melospinus Venetis: Malus Peruviana Gall. Malum spinosum, Cæf. Corona regia quibusdam: Solanum Romanum Monspelienfibus & Guilandino: Solani pomiferi 3. genus Cæf. & Gesl. hort. Solanum spinosum, Tab. Solanum 11. C. Bauh. phyt. Eid. pm. Solanum pomiferum fructu spinoso 4. siue pomo spinoso rotundo, longo flore.

German. Stiechpfeffell, Kanechpfeffell: Belg. do Nomina, ventpfeffell: Gallis Pomme de Peru, & Pomme esp. linguar. nense: accepimus nos Triop Gallorum nomine Nesples d'Inde, h. e. Mespili Indicæ. Italis Pomo spinoso.

Cultur in hortis Germaniæ florens Augusto, Locis & in quibus fructum difficulter maturat. Tempus

Fructus ipse ac etiam tota planta soporiferæ sunt facultatis. Oliuus refert Thraces nucibus Methellis vesci, uti Nucibus iuglandibus Italos. Stramonium fructu pharmacopæi & Physici Orientales ad stupefaciendum vtiuntur, & Nucem Methel esse affirmant, quia facultatibus ijs præditus sit, quas Nuci Methel Auicenna tribuit. Eisdem autem effectus habere, experientia comprobari testatur Dalechampius.

STRAMONIA ALTERA MAIOR,
siue Tatura quibusdam.



Est vbi hu- Descriptio emanâ proceritatem adæquet, ramis patulis brachiata, caule crasso, subhirsuto: folia sinuata, Pedis anserini vocati foliorum instar, sed quadruplò, aut quintuplò maiora, abominando putore nares ferientia: flores ad ramorum diuaticationem ferè, niueo candore insignes, ex tubulo pentagono in longum latumque calathum explicantur continuum, per marginem quinos mucrones totidem fissuris interceptos habentes, odore grato, sed oblectiore: in quibus latent stamina quinque longa herbida, apicibus ochris lineæ alba variatis, vnaque pistillum albidum. Cæterum floris tubulum obvoluit laxior folliculus

tubulo pentagono in longum latumque calathum explicantur continuum, per marginem quinos mucrones totidem fissuris interceptos habentes, odore grato, sed oblectiore: in quibus latent stamina quinque longa herbida, apicibus ochris lineæ alba variatis, vnaque pistillum albidum. Cæterum floris tubulum obvoluit laxior folliculus

culus quinquangularis, totidem laciniis, totidemque mucronibus alternis, per oram divisus: *fructus* succedit altero tantò maior quàm Iuglans suo callo adhuc obducta, oblongus turbinatus, pungentibus spinis vndique senticosus, qui per maturitatem in quatuor partes æquales dehiscit, dissepimento membranarum, quibus *semen* copiosum adhæret nigrum, compressum, medulla alba, sapore ingrato, distincta: *radix* subest ex numerosis fibris compacta.

Notæ, quas Garcias Daturæ adscribit, non videntur omnes convenire Stramoniz nostræ secundæ, quamvis nomen & vires quadrent. Foliis enim esse ait amplis, Acanthi similibus, minoribus tamen, in ambitu crenatis, gustu nonnihil amaro, odoréque Raphani folia aliquantùm æmulantibus: floribus in extremis ramis colore Rosmarini, magna ex parte rotundis. Sed inepta prorsus floris est comparatio, quandoquidem, monente Clusio, tum formâ, tum colore, cum Stramoniz aut Conuoluuli flore verius conferendus fuisset.

Acosta tria Daturæ genera describit: addens, Nomen huic plantæ esse in Malabar *Umata caya*, in Canata *Dairo*, apud Arabes *Marana*, apud Lusitanos *Datura & la Burladora*, h. e. faceta: apud Persas & Turcos, *Tatula*. Cæterùm, Stramoniz fructum per omnia fructui Daturæ similem pronunciat: atque si nonnihil ab eo differat, id locorum varietati adscribendum censet. Primum verò Acostæ Daturæ genus Clusio idem videtur esse est cum Turcorum, qui Constantinopoli viuunt, *Tatula*, cuius usus illis perquam familiaris est. Nec abluere ab eo videtur Stramonia maior quam Columna Solanum manicum Dioscoridis censet. Figura autem Clusij apud Acostam minus concinna satis respondet nostræ Stramoniz alteri.

Bellon. Obs. *Tatula* Turcarum, Nux methel Arabum, Solanum somniferum Græcorum. Camer. hort. *Tatula*, Stramoniz species maxima: Eid. apud Matth. germ. Stramoniz alterum genus, Stramonia altera. Ige *Leiben, flachelnus*: Eid. Epit. Nuci metellæ congener planta.

C. Bauh. phyt. Solanum 13. siue scetidum pomo spinoso, semine nigro: Eid. pin. Solanum pomiferum fructu spinoso 5. siue scetidum pomo spinoso oblongo: Datura Acostæ Hist. Lugd. p. 1912. & 1913. Datura 1. Cist. Datura Turcarum Eyst. Stramonium spinosum Gerardi: *Dutroa* Linschotani, & *Datula* Paludani: variat floris colore: est enim vulgari flos albus magnus: alterius flauus: tertij, Hyosciami floribus accedit: quare tres Daturæ Coltzo, inquit C. Bauhinus: nunc & purpureo habetur. Nos *Dutroam* Linschotani & *Datulam* Paludani, diuersas a nostra Stramonia altera existimamus.

Nascitur in Malauar, authore Garciam, vmbrosis locis, & secundum aquas, addit Acosta. In hortis verò Germaniæ semina supra firmum lata sæpè plantas producant, florem proferunt, & semina maturant.

De viribus, usu, & noxis dicendum restat. Inicitur, inquit Garcias, à furibus Daturæ flos aut eius semen, in cibos eorum quos depradari volunt: mente enim quodammodò alienantur, quotquot id medicamentum sumunt, & in ritum soluantur, magnâ cum libertate sentientes quod lubitum est depradari. Durat verò hæc mentis alienatio viginti quatuor horarum spatio. Prima cura esto, vomitum cientia exhibere, ut quidquid in stomacho remansit, vnâ cum cibo reiciatur:

deinde euacuare & diuertere oportet validis clysteribus, & forti brachiorum crurumque paulò supra pedem confricatione, ac fortibus ligaturis: interdum etiam cucurbitulas applicare: quæ si non iuvent, venam secare in maiore pedis articulo necesse est. Horum remediorum usu, nemo ex meis vnquam periclitatus est: sed omnes Dei beneficio intra viginti quatuor horarum spatium curati. Propinatur à plerisque hoc medicamentum ridendi & relaxandi animi gratia, cum vident eos, qui id sumplerunt, velut amentes & ebrios ferri. Attamen non placet hic ludus: & ne in seruis quidem experiri velim. *Ha-*

Temper. & Elenus Garcias. Quibus subderè lubet, quæ Acosta habet. Literati plerique, inquit, atque etiam maxima pars medicorum in Malabar & Canata: itémque apud Arabes, Persas, Turcos, & Lusitanos, legitimâ Nucem Methel esse censent, frigidâque excessu tertio, & siccam secundi sine constituunt. Primo autem Daturæ genere *Datura* 17.

frequentius videntur: eius enim aded vulgaris est vis, ut paucæ sint meretrices: quæ inter sua æquealæ illud non recondant. Mala ergo inualuit consuetudo hæc apud impudicas solùm mulieres, ut huius seminis in puluerem triti dimidiam drachmam ex vino, aut alia, quæ magis aridet, materiâ, præbeant: miser qui eum hausit, diu velut mente alienatus remanet, aut ridens, aut ciulans, aut dormiens, plerumque etiam alteri colloquens & respondens, ut interdum etiam sanâ mente esse credas, tamen si mentis non sit compos, neque eum agnoscat, cum quo sermones confert, & colloquij habiti planè sit immemor, postquam ad se rediit. Sunt verò nonnullæ aded exercitæ in hoc medicamento exhibendo, idque sic temperare norunt, ut ad certas, easque quot velint horas, quibus id propinant: mentem adiuvant. Nonnulli tamen ad prouocandas vrinas ex medicis Gentilibus videntur. Porro si ad eorum, qui hoc semen hauserunt, curam euocentur Hispani Medici, medicamenta vomitum cientia exhibent, ut, quicquid in ventriculo hæsit, reiciant: acres deinde clysteres iniiciunt ad euacuandum, fortèsq; ligaturas adhibent ad diuertendum, tum etiam cucurbitulas adponunt, & venam secant. Gentiles verò Medici & Christiani indigenæ cum à cucurbitulis & venæ sectione abhorreant, nihil aliud quàm vomitum prouocant, fortèsq; ligaturas & fricationes adhibent: quæ si non sufficiant, balnea ex aqua calida præscribunt ad eliciendum sudorem: Cæterùm, neutro ex postremis duobus videntur, nisi ad necem inferendam. Nihilominus tamè Brachmenes Medici ex secundi semine [quod floribus est flauis] catapotia faciunt, granorum piperis magnitudine, magnæ sanè efficaciz ad sistenda alui profluvia, quibus adiuncta sit febris ardens: atque etiam in dysenterijs &c.

DVRTOA HERBA SOPORIFERA.

Considerandum an cum Datura iam descripta eadem sit *Dutroa*, de qua Io. Linschotanus sequentia scribit. Est herba in Indiæ Goa, quam *Dutroan* vocant, efficaci virtute ad somnum & stolidum saporem, si potui aut cibo inspergatur. Hanc maritis præbent, iisque turpi somno victis, ac velut mente captis, adulterino coitu illudunt. Inde veneficia, paratæ in maritorum caput insidiæ, & noxia potio, morte in certum tempus, euentu nunquam irrita, destinata & prorogata. Et pariter feminis ab irato marito certa mors.

HYOSCYAMI VETERVM IN
genere.

CAP. III.

*Hyoscyami
tria gener.
Diosc.*

HYOSCYAMUS frutex est caules emittens cras-
sos [Orib. πολλοὺς,] folia lata, oblonga, diui-
sa, nigra, hirsuta: secundum verò caulem, contri-
nua quasi serie flores prodeunt [Matthioli non
floribus sed siliquis ista tribui debere censuit,
Sarracen.] tanquam Punicorum cytini, scutulis
sepi seminum plenis, ceu Papaveris. Tria por-
tò sunt eius genera, inquit Dioscorides. Vnum
siquidem flores profert penè purpureos, folia
Smilaci proxima, semen nigrum, ac cytnos præ-
duros & spinosos: alterum flores habet luteos,
folia & siliquas molliores, teneriorè lue, & se-
men sublauium, trionis semini simile. Ambo in-
fantiæ gignunt & soporem, ideòq; vix in com-
munem vsum recipiuntur. Tertium genus quod
mitissimum est, adeòque ad medicinam vtile,
pingue, molle, & læuginosum: candidis floribus
ac semine. In maritimis rudribusque nascitur.
Albo itaque vtendum est: idque si desit, fla-
uum vsurpari oportet. Nigrum enim ceu deter-
ritum improbat. *Recenti semine*, foliis cau-
libusque tulis succus exprimitur, qui ad Solem
exsiccat. Vlus autem eius ad annum duotaxat
prorogatur quia facillè corruptionem sentit. Eli-
citur & separatim succus ex semine, cum inaruit
assusâ aquâ calidâ, tulo & expresso. Est autem ex-
pressus eiusmodi succus liquore seu lacteo eius-
dem succo præstantior, leniendisque doloribus
accommodatior. Ipla verò herba vires con-
tusa, farinâ è Tritico trimestri additâ in pastil-
los conformatur & reconditur [in antiquo Lac.
codice legit *υποσύνει δ' αὐτὸς ἢ σπυρίον*, hoc est, fa-
rinâ Selsam aut Rutæ. Ald. *εὐπρίον αὐτὸς ἢ σπρίον*.]
Porro prius succi genus, & quod è sicco se-
mine exprimitur, collyriis sensum doloris aufe-
rentibus vtiliter inseruntur: profunt & contra
acres calidâsque fluxiones, aurium dolores ac
vulvæ mala. Cum farina autem polentâ, con-
tra oculorum, pedum cæterorumque partium in-
flammationes. Semen eadem præstat, præterea-
que ad tussim, destillationem, oculorum fluxio-
nes, dolorésque efficax, itémque contra fluorem
muliebrem, alâq; sanguinis eruptiones, si oboli
pondere cum Papaveris semine ex aqua multa
bibatur. Subuenit & podagris, restibus inflam-
matis, mammisq; à partu tumentibus. Deni-
que & aliis cataplasmatibus, quæ doloribus leua-
mentum præstant, vtiliter admiscetur. Quin &
in pastillos digesta folia medicamenti omni-
bus dolores sedantibus tum per se, tum etiam ex
polenta vtiliter imponuntur. At recentia fo-
lia [additur in vet. cod. Lac. *λεῖα*.] illita, ad miti-
gandos omnis generis dolores apprimè sunt ido-
nea. Eadem terna, quaternâve cum vino pota,
febres epialas depellunt. Cocta verò olerum in-
star, & tryblii mensura esitata, mediocrem men-
tis alienationem faciunt. Aiunt & idem efficere
si cui in colo vlcus sentienti infundatur. Cæ-
terum, radice in aceto decocta dentes vtiliter in
dolore colluuntur.

*Plinius gene-
ra quatuor.*

Plinius quatuor recenset genera, cum tamen
secundum & quartum vnum & idem sint.

Brevius sic Galenus. Hyoscyamus, cui semen
atrum est, infantiæ ac soporem adfert: is cui se-
men mediocriter flavum est, propinquam ei fa-
cultatem habet. Verum utriusque fugiendi sunt,

vt inutiles ac deleterij. Cæterum cuius semen
ac flos candidus est, ad sanationes maxime ido-
neus est, ex tertio quodammodò ordine refrige-
rantium.

Hyoscyami epoti noxæ auxiliatur squa musi-
sa copiosè data; auctore Dioscoride, iteq; præ-
sertim asininum: si desit, caprillum, vel bubuleum,
vel aridarum Ficuum decoctum. Faciunt etiam
ad id nuclei pinei: item Vrticæ semen, Intubus
erraticus, Sinapi, Nasturtium, Cæpa, Allium, &
hæc singula cum vino sumuntur. Postea sinendi
quiescere, quemadmodum qui vinum biberunt,
vt excoquant. Et hæc Dioscorides remediis con-
tra Hyoscyami maleficium pugnabit. Et sanè
non malè damnauerit aliquis natura eius, quæ
adèò humane menti noxia, vt in furorem homi-
nes agat. Nec minùs etiam demirabitur Gentes,
quæ non tam multis, quàm honestis appellatio-
nibus optabilem ignaris & admirabilem fecer-
int plantam, quæ alioquin ob eam, quam dixi-
mus causam, ableganda ultra Sauromatas fuerat
& glaciale Oceanum, vt aliosis locis illuc na-
scens ante maturum semen tota aliquando peri-
ret. Nisi fortè contra vota hæc nostra intulerit
aliquis tam grauem noxam non minore bono
eam rependere, optandâque in oibe nostro
plantam quæ tam efficaci remedio contra dolo-
res, quibus tota aliquando perit vita, hominis
pugnet. Nec quia menti noceat, idèò doloris li-
nimenta, quæ habet, abicienda. Parum sapienter
enim quia malo confunctum sit bonum ex altero
vitumque damnatur: cum liceat distractis in di-
uersa contrariis malo prudenter carere, bono
autem feliciter uti. Quod in Apollinari herba
præsertim faciendum, quam Græci *ὑποσύνει*, hæc
est, *suam Fabam* idèò vocauerunt, quod, vt in hi-
storia sua retulit Heliæus, pasta eius conuella-
tur suæ præsentis mortis periculo, nisi copiosâ
aquâ statim se foris & intus proluerint. Alij, vt
sit in desiderio salutis, & suauiore voluptatis sen-
su, cum ope eius à dolore ad indolentiam quâsi
diuino quodam beneficio restituti fuissent, non
amplius Hyoscyamum à suis, sed à Iouis *Dro-*
scyamum [*δισκοκύμων*, hoc est, Iouis Fabam] dixe-
runt. Eadem nominis ratione illi etiam vsi sunt,
qui à medicinæ auctore Deo Apolline, *Apollina-*
rem herbam, & *Pythionem* eam dixerunt. Fue-
runt contra qui à maleficio eius *Emmaner*, id est,
furialem, siue in infantiæ & furorem agentem
eam nominauerint, & à somno, quem facit, *Hyp-*
noticon: Superstitiosè ac incertis nominibus,
alij *Adamantem*, alij *Adamention*, alij *Atomon*,
alij *Auginon*, alij *Dithyambion* dixerunt. *Py-*
thagoras & *Osthanes* *Xyleona* vocauerunt: *Zo-*
roastres *Typhonon*: Latini *Insanam* ac *Denta-*
riam [pro his fortè malè *Trag. Inananoentia-*
riam:] *Prophetæ* *Rhaphoticum*: *Egyptij* *Saphtho*:
Hetrôsci *Fabulum* vel *Fabuloniam*: *Galli* *Bel-*
iontiam: *Daci* *Dieliām*. *Apuleio* dicitur etiam
Augmon, *Alterculum*, *Calicularis*, *Ginga*, *Rem-*
nia, & *Ligea*. *Serapioni* *Bengi*, *Auertri* *Elloc*,
Matthæus Syluaticus plura alia Hyoscyamo no-
mina tribuit, videlicet, *Dons* *caballinus*, *equinus*,
Cassilago. *Papienses* *Medicos* *Hyoscyamum*,
Herbam *pinulam*, aliòsque *Canicularem* & *Ca-*
niculatam appellare testis est *Iacobus Manlius*.
Sunt denique & inter Latinos scriptores, qui
Symphoniacam herbam etiam vocauerint, *Pal-*
ladius scilicet *Octobri* menit cap. 12. & *Apoletus*,
inquit *Marcellus*, nonnullarum illarum nomen-
clationum rationem reddens.

*Hyoscyami
epoti reme-
dia.*

*Antiq. scri-
ptoris
taxantur.*

Symphon.

Cæterum

Ceterum, Hyoscyami nomenclaturam sequentes obrinuere stirpes. Hyoscyamus vulgaris niger. Hyoscyamus albus. Hyoscyamus albus minor. Hyoscyamus luteus, Creticus. Hyoscyamus Creticus alter. Hyoscyamus peculiaris flore purpurascens. Hyoscyamus Syriacus. Hyoscyamus tertius vel potius quartus Matthioli in Epit. Camerarij, Hyoscyamus luteus Dodonæi, nobis Palapæ, quibusdam Nicotiana minor dictus. Hyoscyami tertia species Gesneri, Nicotiana maior dicta. Hyoscyamus peregrinus Dalechampij, nobis Solani species ex Apennino dictus, de quo antè.

HYOSCYAMVS VVLGARIS.

Descriptio



Olore facili se prodit Hyoscyamus niger, nusquam non obuius, folijs spinis albis, mollibus, lanuginosis, incanis, copiosis, nullo ordine in caulibus, crassis, densa lanugine obsitis: flores confertim enasuntur, calathi effigie, lutei, purpurascensium liberarum crebro discursu

versu flores, foris hirsuti, purpurantibus apicibus, suisque medium occupantibus: pericarpium hirsutum, oblongum, fistile, Glandis instar, quinquepartitis acuminatis oris seminem pulillum nigrum continet. Radix subest crassa, rugosa, foris lutea, intus alba, minus olida quam foeta.

Hyoscyamus Brunfelsi. Turn. Matthiol. Lac. H. Lugd. pag. 716. & Cæsalpino: Hyoscyamus vulgaris Gesn. hort. Thal. & Eyst. Hyoscyamus 1. Agnill. & Tabern. Secundus Garenii. T. go. Hyoscyamus niger Dodon. Lon. Lobel. in Adu. Obs. pag. 139. Icon. Plant. p. 168. Cast. & Gerardo: Hyoscyamus stans Fuchio: Hyosc. niger vulgaris Clusio. Hist. Alhercus Fallopiade vuln. Apollinaris Cordom Diofcor.

Synon.

Varietas.

Nem. lingu.

Locus & Tempus.

C. Bauhin. phyt. & pio. Hyoscyamus 1. siue vulgaris vel niger totius anni integris, modò dissectis, modò in ambitu in lacinas acutas diuisis.

Genm. Bilsensamen, Bilsenkraut, Seblasakraut, Delikraut, Sewabonen, & Terschels Augen: Item Zugesenakraut: & Rindsvunzel: Belg. Bilsen & Bilsenkrut: Gallis de la Flancbare, quibusdam de l'herbe aux signes: nonnullis Insquame & Endormie. Italis Insquam: Hispan. Velenbo, Veleno & Meimendo: Angl. Henbane: Vng. Belend, quæ vox Hispanicæ valde officinis.

Hyoscyamorum familiarissimus calidis & frigidis campestribus vbiuis Europæorum niger: floribus mense Augusto seminum pizidula succedunt, Lobelio. Secus vias vbiq; ferè gignitur in sabulosis, & locis haud coltis.

Hyoscyamus omnis refrigerat, soporifer est,

& dolores sedat: aduersus acres calidasque defluxiones oculorum, aliarumque partium prodest: sanguinis eruptiones & muliebria profluvia compescit, & ad testium aliarumque partium inflammationes adhibetur. Pictones ac Andegauenses aduersus pruriginem commendant, indeque vernaculo sermone l'herbe aux signes vocant: solent enim illarum prouinciarum rustici istam plantam, iam maturam & semine onustam, in camino suspendere, deinde Hieme cum illis manus frigore tument, citinos eius carbonibus inspergere, suntque exhalantem manibus excipere: ito enim vapore non modò tollitur manuum tumor, sed etiam prurigo illa molesta, frigore contracta: Clusium docuit Iosephus Scaliger. Nobis indicatum per nobilem fœminam Alfaricam vapore semine Hyoscyamo excitato in stuphis torpore & sopore induci lauantibus: idem accidere gallinis ex eius suffragio in gallinario. Si per tria quartana paroxysmorum principia singulis vicibus 3i. 3i. Fel. Plat. Meminum Hyoscyami optime tria cum vino generoso detur, ægrum sine dubio liberari promittit Timor. Roslinus. Ex eodem Oculum ad arthritidem conficiens: neuerum autem probamus. De Hyoscyami præparatione ad Laudanum vide Quercetani Pharmaciam restitutam.

HYOSCYAMVS ALBVS.

Descriptio



HYoscyamus albus, non tantum flore alterius part albo est, sed & alabastris striatis multò candidioribus magi que hirsutis, vasculis obvolucribus semine albedo refertum: adde folia hirsutiora, albiora, quæ tamen Nigri folijs magnitudine cedunt, laciniata: caulis quoque eadem

illa densiore lanugine est obsitus, quem ut celeritatu, eodem quo satis est anno protrudit, floremque & semen perficit, ita perennitate vincitur, ut qui non nisi semel sit vixit. In nostra empirica imagine flores porissimum displicent.

Icon.

Hyoscyamus candidus Trago [qui ieiunè describit] & Dod. gall. Hyoscyamus albus Matthiol. Dod. lat. Gesn. hort. Turn. Lac. Lob. Obs. p. 139. Icon. Plant. p. 169. Lon. Cast. Histor. Lugd. pag. 1717. Camer. Ger. & Eyst. Hyoscyamus albus mitior, hirsutior in Adu. Hyoscyamus 1. Tabern. Hyoscyami alterum genus in maritimis Cæsalp. Hyoscyamus albus admodum à communi figura differens, Alpino. Apollinaris 3. Cordo in Diofcor. Hyoscyamus 2. siue albus maior, vel 3. Diofcor. & 4. Plinij.

Synonyma

In Norbonæ ad Aurantium siue Auracum & inferius, eis, transque Rhodani ostia, variis la-

Locus

torum & veruſtorum ſecus vias marginibus ſponte aſceſcit. Belgio, Angliæ & Franciæ in hortis ſeritur & moritur quotannis. Cayri prope pyraſes naſcitur.

Vires &
vſus

Dolor Dm-
vium.

Hyofcyami albi enſa planta ſtictili vaſi inditur, cui ſubtus foramina ſunt facta, cui alterum vaſ apponitur, & in terram omnia reconduntur tam diu donec liquor exſillet. In doloribus dentium & aliis topici loco non contemnendum remedium, ſi teſte Cam. à perito Medico adhibeatur. Sic molis effraſum ſemen, & preſſum, oleum reddit ad idem vſale. Aliter ſic præparatur. Semen Hyofcyami album ſiccum ac recens accipitur, & contuſum cum aqua calida, velut de amygdalino dicitur, ſubigitur. Et dum inſolatur, partes ipſius quæ ſub manu reſiccantur, ad totam maſſam ammiſcentur, & idem hoc donec nigreſcat, ac grauiter oleat, repetitur. Dein excolatum & expreſſum reponitur. Facit ad aurium dolores, & in peſtos ammiſcetur, vt quod molliendi vim habeat. Hyofcyami albi mittor & turior multo vſus. In Cayro non ſecus quàm Scramonio vtiſur.

HYOSCYAMVS ALBVS MINOR.

Sydon.

Locus



Ob. Ic. Plac. Lom. 2. p. 261. Hyofcyamus albus minor, Teutonice p. 296. deſcript. C. Bauh. phyt. & pin. Hyofcyamus 3. ſive albus minor. Anguill. Hyofc. al. ter. Cluſ. h. Hyofcyamus, Hyofc. alb. vulgaris ſive teſtius, frequens & ſpontaneus in calidiorib. regionibus: at in frigidiſſimis, non niſi in eorum hortis, qui re herbaria delectantur, conſpicuus, candi-

diorib. mollioribusq; Nigro ſolis, nec ſta lacinia- tis, ſed potius quodammodo ſinuofis, breuiorib. ſatis craſſis, longiore pediculo ſuſtus: ſloribus albis, minoribus: calicibus leuioribus.

Hyofcyamus Creticus luteus minor.

Deſcriptio



Folio eſt ſe- ſe Xanthij, minore, circū- ſcriptione pæ- nè rotunda, la- ciniato, & ve- luti circum- roſo, hirsuto, pediculo vn- ciali: caulis cu- bitalem & ſeq- uicubitalem allequitur præ- ceritatem, ra- moſus, albedo villo obductus: ſlores vncialib. hærent pedi- culis, è longis hirsuto, ſtictato, calyce proſi-

lientes, lutei, ſando purpureſcente: ſemen mini- mum, ruſcens.

Cluſio Hyofcyamus albus Creticus, ſive quær- tus. C. Bauh. pin. Hyofc. 4. ſive Creticus luteus minor.

Ex ſemine Strugardiam per Caſabonam Hyo- ſeyami lutei Candix nomine miſſo, Montbel- gardi floruit meſe Iunio & adhuc Auguſto.

Hyofcyamus Creticus luteus alium etiam tradit & deſcribit Cluſius, qui ipſi maior inſcri- bitur: C. Bauh. verò pin. hyofcyamus 3. ſive ue Creticus luteus maior: pro quinto in phyt. prod. & Matthiolo deſcriptus & picto.

HYOSCYAMVS PECULIARIS FLORE purpureſcente.



Deſcriptio Hyofcyamus pe- culiaris, vetu- ſto quodam ſemine ſubal- bido, ſive ci- nereo, Cam. hort. natus, flore per in- ſia pallidi co- loris, elegan- tioris tamen, quam qui in vulgari habe- tur, poſtea purpureſcen- te & incuruo, non æquali- ter patulo, vt reliquorum. ſed altera par- te aliquan-

tulum, repando: ſolis alterius Hyofc. [Priapæ.] ſed latius virentibus & multo minoribus. Planta vltra cubitum non aſurgit. Conuenit autem cum Beze à D. Paludano ex Syria delato, à quo ſola foliorum latitudine diſcrepat.

A. C. Bauh. in pin. ſub Hyofcyamo ſexto com- prehenditur.

HYOSCYAMVS SYRIACVS.



Ex plan- tia rara à Deſcriptio Paludano ex Syria delata proſum cum præcedente conuenit, ſolâ foliorum lati- tudine diſcre- pans. Dicitur & Beze Germ. Syriſcher Bi- ſen: Gall. Han- ſen de Syrie. Cæterum, Ca- merario au- thore, ipſa plâ- ta plerumque huius iconis quinqueſ ſu- ſe con-

se continere deprehenditur. Describitur à Clusio in pann. p. 510. Hyoscyami peregrini rubello flore : & in post. hist. Hyoscyami Aegyptij sine 2. flore rubello intus rubellione.

Is fortè est, cuius Bellonius cap. 75. & 88. lib. 2. Observe minit, & in Aegypto frequentem esse asserit quem etiam apud Halepum se observasse scribit Rauwolfius lib. 1. cap. 9. sui Hadzporici.

C. Bauhin. pin. Hyoscyamus 6. sine rubello flore : Hyoscyamus peregrinus rubello flore Clus. pann. Hyoscyamus Syriacus Camerarij. Cur quæ lo separat Hyoscyamum Aegyptiacum Clusij h. ab eisdem Hyoscyamo peregrino in pann. Nunquid utriusque eadem descriptio ? Cursinquam, in pino. septimum facit & cauliculis spinosissimis esse ait. Cuius equidem in Hyosc. Aegypto spinarum non mentitur. Hæc de se igitur indagandum erit.

NICOTIANA MAIOR, SIVE Tabacum maius.

CAP. IV.

Descriptio.



Haud gra-
dudū no-
tro celo solū-
que affugit
Nicotiana siue
Petum Indorū,
planta nobis
æstiva, caule
tres aut quin-
que, vel plures
cubitos alto,
pollice crassio-
re, tereti, hirsu-
to, copiosa me-
tullā albicante
pleno : huius fo-
lia ampla, He-
lenio vel Hip-
polaria ma-
iora, nullo pe-
diculo, latis ap-
pendicib. cau-

lis adnata, hirsuta, modicè in acumen desinentia, à medio lævio longitudinem percurren-
te transversis, nonnihilque sinuatis productis venis,
crassis, alternatim dispositis, sapore acido & fer-
vido, sed evanido : malicaria & contrita, colore
luteo infescentia : color tum cauli, tum folijs ex
herbido in luteum pallescens, utriusque ad ta-
ctum glutinosus : caulis fistigium in furculos ali-
quot diducitur, ad quod. uti diuinationes folio-
la longiuscula, quorundam singulis floribus in-
sertis : utriusque longior, tubulo hirsuto herbæque
concolori, paulatim laxiore reddito, tandemque
in cala hum expleto purpurascens, in dui-
sum, cuius margines ramentis argulos quinque
acutur : florè continentur cum pistillo stamina,
quorum apices cinerula aspersi sunt grisea : flo-
ris autem imum obvallat utriculus in quinque
laciniis diuisus : semen copiosum, minutum, ruf-
fescens, minus quàm in Priapæa, vasculis claudi-
tur conis, Auellanae vulgaris oblongæ minori-
bus. Radix alba, fibrosa admodum, insigni aci-
monia est prædita. Tota planta odorem habet
satis grauem.

Nicotiana [à Legati nomine] Lon. & Hist.
Lugd. p. 1895. Nicotiana maior Tabern. Nico-
tiana 1. siue maior latifolia C. Bauhin. phyt. &
Tom. III.

pin. Tubac & Tobacco part. 5. Ind. or. & part.
6. & 8. Tabacum, Tabaco & Tabacca part. 8. &
9. Ind. Occid. Tabacum [nomine ab Hispanis
imposito, ab insula, in qua abundat] Monardi :
Tabacum latifolium Cam. Eyst. Petum Theuero
[cui & Herba memoriæ tollens] Camer. ad
Matthiol. germ. Petum latifolium Clus. ad Mo-
nardem : Sana sancta Indorum, Lob. in Adu. Obs.
p. 316. Ic. Plant. p. 489. & Gerardo : Herba sancta
Clus. ad Mon. Herba sanctæ crucis femina, Cas-
toris : Herba reginæ, Clus. ad Monard. & Camer.
hort. Herba panacea, Agid. Euerarto : Herba Le-
gati, Portugalesibus : Vulneraria Indica Camer.
hort. Pontiana Gelnad Arct. Hyoscyamus Pe-
ruianus Dod. Camer. ad Matthiol. & Clus.
hist. Eid. ad Monard. Hyoscyamus niger : Hio-
scyami tertia species Gesl. hort. Tornabona [quia
à Tornabono missa] Cæsalp. Peribacina, O-
uiedo : Piquet, Indis : Ypporua, Virginæ Indi-
genis : Atbustum, cuius folia exsiccant, & quo-
rum accensorum fumo inebriantur, Benzoni lib.
1. cap. 13.

Cæterum Galli, quod Ioannes Nicotus regius
aliquando in Lusitaniam Orator, eius semen pri-
mus ad Regiam Regis Galliarum matrem detule-
rit, illi utque facul artes docuerit, Nicotianam &
Herbam Reginæ nuncuparunt. Alij verò Her-
bam sanctam ob admirandas eius virtutes. Alij
Boglossum amarcticum.

Agid. Euerartus, qui Herbam panaceam [vel
dictam] vocat, & Herbam Medicam, Herbam
Prioris, & Herbam sanctæ crucis, cum habitu
ipso, tum facultatibus, Consolidam in tantum re-
ferre dixit, ut speciem eius quandam suspicari
non absurde liceat, potius, quàm hyoscyami lu-
rei, ut visum nonnullis fuerit. Nec, quod fumo
ebriantur, quodam accretat, prout hyoscyami
speciem constituerit, etsi eam tum folijs ac
calicibus, tum culmo & semine satis referat, &c.
Nos tamen nullam tantam similitudinem agnos-
cimus cum Consolidâ, ut habitu referre eam
possit, & speciem eius quandam dici queat : folia
aspera, cauli, flores, & semina plurimum diffe-
rent, ac etiam ipsæ facultates quicquid dicat A-
gidius. Non tamen etiam eum dicere siliquam in
orbem Mali specie turgescere, siliqua enim ob-
longa est : id quodammodo posset dici de Pri-
apæa, cui flos luteus. Non tandem existimamus
quemquam, cui cognita fuerit Nicotiana &
hyoscyamus, approbaturum similitudinem,
quam Agidius in et eas constituit.

Iterum asserit Nicotianam Petum dictam, ve-
rum Brasiliæ norum Petum non esse, nec quic-
quam commune habere : Autorem Domus rusti-
cæ affirmare Nicotianam, à Nicot dictam, qui
primus ex Portugallia in Galliam misit, ex
Florida allatam, quæ ultra mille leucas à Brasilia
distet : Eam verò in hortis Galliarum ob cæli incle-
mentiam adulescere non posse.

Germ. Tobacken, Indiansch voundkrans, In-
diansch Beinvuelle, der Alten Kuenigin krauk,
& bestigkraut. Gallis, Nicotiane, Herbe de la Ro-
ne, Genevæ Presidiale. Ital. Tornabona, Herba
Sancta Croce : Hisp. Petum, Tabaco. Sunt denique
qui Elemosinariam vocant.

Nascitur plerisque Indiæ locis, humidis præ-
sertim & umbrosis, & ex cultu lævisque solo. Ser-
tor omni tempore : cum verò prodit, à frigore
præseruanda est, & secundum parietes plantan-
da ad eorum ornatum : siquidem toto anno vi-
ret, Citriorum modo, referente Monarde. Nas-
citur omni solo [inquit Clus.] & semel sata, se-
Cccc

Tempus

meinq; ad maturitatem perducens, seipsam deinde fert, nec opus habet alia satione. Si tamen ferenda erit, Augusto aut Septembri id fiat, quoniam semen exiguum diutissime sub terra later, antequam germinet: & Martio aut Vere telluri credidum deinum Augusto germinat. Floret autem hæc planta calidioribus regionibus Iunio & Iulio, semen Septembri maturecit [vidi in Lusitania tota Hieme florentem,] at alibi à mense Augusto in Hiemem usque floret, & subinde semen profert; deinde primo gelu flaccellit, peritque tota; neque Hieme assuetari potest, nisi admodum difficulter, idque fictilibus aut caplis ligneis, in quibus sata, in fornecem aut penum illatis, uti Viennæ Austriæ fieri amat, ubi antè fenestras non tam ornatus & umbræ gratia, quam ob insignes facultates, de quibus deinceps sermo erit, præsertim à nobilibus quibuldam matronis, rei herbariæ studiosis, colitur.

Temperam.

Calida & sicca est in secundo gradu: itaque calefacit, resoluit, mundificat, & aliquantulum adstringit, ut ex sequentibus facultatibus iudicare licebit. Confert enim plurimum: ad Cephalæam: Hemicranium: Tetanum: Dentium dolorem: Pectoris vitia: Lienis & Iecoris obstructions: Cruditates ventriculi: ventris rineas: Nephritides: Suffocationes vteri: Articulorum dolores: Perniones: Venena: Carbunculos: Ictus virulentos: Vulnera: Polypum: Podagram, Imperigines: capitis scabiem: Asthma: Famem: Sicim: recreationem, & alia innumera, ut fusius & specialius in huius tomi Appendice docebitur.

NICOTIANA SIVE TABACVM FOLIO angustifolium.

Descriptio



capitula, semina ex maioris comparatione addiscuntur.

Petum angustifolium.

Clus. apud Monardem, est Petum angustifolium, siue Petum alterum paulò minore folio, Solano, quod Bellam donam vulgò vocant, simili; sed magis mucronato, longoque pediculo inherens: floribus per umbellas natis saturatioribus aliquantò: radice, ut illius, lignosa & multifida.

Priapeia apud quosdam non benè nuncupatur: Siquidem nec effigie, nec habitu, nec radice, nec colore, nec aliter Saryrio respondet,

Camer. hort. Tabacum angustifolium: Lob. in Synonyma Icon. Plant. p. 385. Tabacum siue Herba sancta minor: Eud. in Obi. p. 116. Herba sancta siue Tabacum minus: Cast. Herba sanctæ crucis mar. Dodon. Hyoscyamus Peruvianus alter: Schwenckf. Nicotiana minor, & Sana sancta minor: C. Bauh. phyt. & pin. Nicotiana 2. siue maior angustifolia: & Eyst. Hist. Lugd. p. 1895. Alterum Tabacum minus Lobel. sine icone: An Peribacennus eiusdem Historiæ?

NICOTIANA SIVE TABACVM MINVS.



Peti maris & stemine lemne deciduo, spontè in Belgij hortis Petum tertium siue Peti tertium quandam & dobiâ speciem sibi natam ait Clusius apud Monardem, superioribus paulò humilior, cuius folia, ut in maiore, caules amplectantur, sed multò angustiora, etiâ infra secundi generis foliorum

amplitudinem: floribus tamen saturatioribus. in p. hoc quàm illud emulatur.

Tabacum minimum Camer. hort. Tabacum, siue Sana sancta minima Lob. in Ic. Pl. p. 385. Sana Synonyma. sancta, siue Tabacum minimum eidem in Obi. p. 316. & H. Lugd. p. 1896. Nicotiana 4. siue minima C. Bauh. phyt. & pin.

PRIAPEIA QVIBVSDAM NICOTIANA MINOR.



Crebris sibi albis donata est huius radix minimo digito super: caulis cubitalis & sesquicubitalis, rotundus, ramosus, hirsutus, glutinosus: folia Belle done, pinguis, hirsuta, subalbida, gustu acti, grandi odore Matth. flores calathi effigie, ex luteo viridates, oris rursus reflexis & in quinque lacinias obiter diuisis, foris hirsu-

his hirsuti splendens, intus glabri, nullo splendore nitentes: apices flaminum cineracei: infidet apicem floris calyci hirsuto, viscido, quinquepartito: *pericarpium* subrotundum, umbilicatum, glandem virgæ virilis detectam representans, *semen* continet pusillum, maius Nicotiana, sublaevum: Lobel. Irionis, & pusillum, gustu acre, vnde Rondeletio dicta *Picipea*.

Petum 4.
Claf. *Claf.* *Petum 4.* siue Peti aliud genus, per
omnia minus, folio rotundiore, nec hirsuto, pin-
guis, licet succulento, flore minore, & per ex-
tremum rotundo, pallefcenre.

Synonyma Hyoscyamus luteus Dod. Gesn. hort. Lon. Cam-
mer. & Gerardo, atque Anguill. qui multum cum
secundæ Dioscoridis convenire ait. Lob. in Adu.
Hyoscyamus solanifolius dubius, inter Hyoscy-
amum & Solanum furiosum ambigens. Cap. de
Sana sancta Indorum dicit Hyoscyamum lu-
teum esse non posse. In Obs. p. 40. Dubius Hio-
scyamus luteolus [Solanifolius addit in Ic. Plant.
p. 269.] potius calefaciens, quàm refrigerans, ut
minus rectè scripsit Matthioli. Hyoscyamus
Peruvianus Tabernæmontano. Hyoscyamus ni-
ger vel 3. Matthioli. Cast. & Hist. Lugdun. pag.
1717. Nicotiana 3. siue minor, C. Bauhin. phyt. &
pin. itemque Eyll. Tornabonæ congener, Cæsalp.
Præpæis, à forma fructûs, Gesn. hort. Peti 3. ge-
nus Euerardo.

Locus Semel in hortum translata in semine vndique nimis copiosè repullulat, & mense Maio apparere incipit.

Vires & flos. Ad pleraque, ad quæ Petum, confertre, verum longe imbecillius esse, testatur Clusius. Matthiolum eiusdem cum cæteris Hyoscyamis nature esse scribit, adeo ut ordine tertio completo rescriberet, & soporem inducat. Sed quis obsecro assertioni { Euerardus etiam perperam humidum & frigidum statuit } Matthioli subscripserit? Lobelius neūquam vsu receptam, aut exploratam dixit. Potentui passim Nicotianam vocant & eadem nuntur. Aqua verò stillantia saporem vehementer acrem præ se fert. Herba aduersus pediculos utilis est, & imprimis pulices necat, ut in canibus periculum fieri potest. Nam folijs huius affricatis cuti, vel surco illito, tanquam incantamento fugati decidunt. In Italia semine nuntur, ad priapismum sedandum, & hinc forte Priapæ nomen illi inditum fuit.

HERBA COHOBBIA INEBRIANS.
CAP. V.

Huius meminit P. Martyr. l. 9. dec. i. sequen-
tibus: Cum de belli eventus, de annona, de
incolumitates Zemes [deos subs] regni Hispa-
niæ Insulæ consulunt, domum Zemi diuinam
ingrediuntur, ibique per nares absorpta *Cebotia*,
sic herbam vocant inebriantem, quæ & Boltij in-
sutores mistatim vertuntur &c.

¶ C. Bauhinia pinifortis est Nicotiana 7. quâ in insula Mambonit 7. Pyrazæ comestâ inebriantur & dormitantur, ita ut omnia pericula postponant: apert. 7. Ind. or. 20.

HERBA CASSIANA, FAMEM,
sicinque retardans.
CAP. VI.

E Nicotianæ fextæ [vt vocat in pin. C. Bauh.]
 siue Caffianæ herbæ succo potionem confi-
 Tom. III.

ciunt in Florida, quam, ubi in locum periculofum fe conferunt, bibunt, eoq̃ue famem & fitim per horas 24. collunt: part. 2. Amer. navig. 4.

BVGLOSSO SIMILIS PLANTA
Indica.

Nascitur apud Gangem fluvium planta hæc Buglossæ consimilis, quam conterentes succum ipsius servant, & profunda nocte latibula Tigridum circumfundunt: ipsæ verd propter facultatem effusæ viriditatis cum progredi non possint, moriuntur, sicuti memorat Plutarchus, non Chæronensis ille, ex opinione Cassisthenis in l. venationum.

HELLEBORVS ALBVS ET NIGER
veteribus.

CAP. VII

Hellebortus niger, & albus videntur equi-
uoca [veluti æquiuocè dici apparent, Ga-
za.] sed de facie differunt [varia sententiâ est,]
alii enim similes esse aiunt, & solo colore inter
se diffère [præterquam quod radices colore inter
se differant:] Esse namque vnius radicem [hoc
vocabulary radicis omittit Gaza] albam, alte-
rius nigram: Alij folium Nigri laureum [*Sagru-
dis*,] albi verò portaceum [*apocynifolius*, sed fortè le-
gendum *rupisfolius*,] reddunt: radices autem similes,
colore excepto. Qui similes dicunt, formam
huiusmodi tradunt: caulem modò prope Ab-
buci, sed longè breuiorem: folia continuò radi-
ci annexa: sparsaque humi: radicem valdè [lar-
gè Gaza,] multiplicem. Nigrum equos, boues,
iuelque necare affirmant, idèoque eos non de-
pascere [idèoque eum cauere, Gaza.] candido
autem pecudes pasci. Atque hinc primò vim de-
prehensam, cùm illo pecudes purgarentur: tem-
pestiuus Autumno, Vere autem intempestiuus
Niger vbique nascitur: nam & in Bæotia & Eu-
bœa, & multis alijs locis: sed optimus Helico-
ne, ac in totum is mons medicaminibus lauda-
tur: at candidus locis paucis exit. Optimi verò
& vilitatissimi quatuor sunt, Oetæus, Ponticus,
Eleaticus, Malliioricus: nasci Eleaticum inter
Vites aiunt, & vinum vsque ad eò reddere pro-
uocans yrinam, vt omnes qui bibunt graciles
admodum ventre adducto efficiantur. Omnium
temporũ, quàm reliquorum optimus est Oe-
tæus. Parnassius verò & Aëolicus [proueniunt
etiã ibi multi, emunt & vendunt ignari] duri
sunt & summx difficultatis. Hæc igitur quan-
quam formâ conueniant, vires tamen proprias
fortiuntur. Ellebortum non solum radice, sed
etiã fructu est vtilè. Siquidem in Anticyra [vt
fertur] fructu [cautè tamen dandus cùm vali-
dus purget] eius purgantur, quem Sesamaceum
fert: Hæc inter alia sparsim Theophrastus ad-
dens cap. 8. Ellebori imas radices, arque tenuio-
res, [supernam enim in caput extuberantem, in-
utilem esse asserunt, & canibus tantam cum
purgandum est,] succidi oportet. Item cap. 18.
addit, Chius Eudemus arte minimè laudatus,
Elleborum bibens, non purgabatur, & viginti
dies aliquando purgationes vno die sumpsisse se
reputit, foris apud vasa sedentem, nec surrexisse
priusquam esset meridies, tunc verò domo pe-
titâ, balnea ingressum cœnatumque more solito,

nec quicquam euomuisse. Hic tamen auxilio quodam preparato cohibuit : aceto enim acris aspersam pomicem bibisse se tetulit post septimam Ellebori portionem, rursumque ex mero eodem modo egisse. Tandem de caulib. 6. cap. 20. Elleborum nascens in Oeta monte, melius Parnassico est. Validius enim esse illud putatur, minusque aptum medicamini. Causa quamobrem validum ita, similis, atque in fructibus. Aëris enim duritia, nutrimenti que largitate gravitas in eo quoque tractu, sicut in Bœotia prouenit. Porro alius ager ad alias vires idoneus est, quemadmodum in fructibus quoque perficiendis animaduertimus. Sunt etenim loca, quæ ne excoquere quidem villo modo vires medicas valeant. Quippe multis in locis, & niger Elleborus hebes imbecillique comperitur. Unde credi haud temerè possit, aëre frigido & solo aperto, atque etiam alimento modico, opus esse. Et quidem veneba, in montibus plurima nasci videntur, & in ijs maximè, qui altissimi sunt, atque amplissimi.

Diosc. Elleborus albus.

Elleborus albus, ex autoritate Dioscoridis, folia ferè Plantaginis aut Betæ siluestris, sed breviora, nigriora, & [dorso] colore rubra, caulem palmi altitudine concavum: qui quidem tunicas quibus innoluit, abdicat cum arescere incipit. Radices subiacent numerosæ tenues ac fibrosæ ab exiguo & oblongo capitulo, ceu Cæpa exeuntes, eidemque annexæ. Nascitur in montosis & asperis. Radices messibus colligendæ. Optimum autem habetur Veratrum, quod modicè extensum est [temperatè vet. temperatè Sar.] candidum, fragile [subpaucor. Alter adpaucor, sed perperam, Sar.] carnosum, minimè exaratum, aut luncum referens, aut dum frangitur puluerem emittens, sed tenuem habens medullam, gustuque non admodum feruens, neque salinam subinde ciens: humosum siquidem strangular. Primatū tenet Anticyrenum. At Galaticum æque atque Cappadocicum candidius est, & puluerulentum, maioremque strangulandi vim habet. Purgat per vomitum variis coloris humores: collyrijs admiscetur, quæ caliginem oculorum discutiendi vim habet: mentes pellit partūque necat, appositum: sternutamenta mouet, ac mures interficit cum n. elle & polenta subactum: quin & carnes colliquat & absumit, si coquatur vnā. Datur & jejunis per se, itémque cum Sesamo, & pullanæ aut alicæ cremore, aut cum aqua mulsa, aut pulve, aut lente, aliāve sorbitione. Sed & cogitur cum pane, atque ita inasatur. Apparatus verò insuperque victu ratio videntibus accommodata diligenter ab ijs tradita est, qui ex professo de ipsius dosi scriptarunt. Sed maximè Philonidæ Siculo Eongo assentimur. Longum enim foret, in hac, quam præcipue instrumimus, materię medicæ tractatione, victus rationem ad medendum necessariam simul & semel exponere. Sunt tamen nonnulli qui dent ipsum cum larga sorbitione, aut copioso cremore: vel etiam exhibito parciore cibo post illic Veratrum offerant: ac ijs præsertim, quibus strangulationis suspicio imminet, ut corporis imbecillitas adest. Illo enim modo fumentibus purgatio periculo vacat, quod non inrempestiue iussu medicamentum corporibus accedit. Cæterum, & sedi subditæ ex eo balant cum aceto vomitiones concitant.

Helloborum nigrum.

Porro Helloborum nigrum aliqui Melampodion, alij Ectomon, alij Polyrhizon vocant, Melampodion verò appellatur, quoniam caprarum pastor nomine Melampus furens Præti filias eo primis purgasse & sanasse creditur. Fo-

lia ei viridia, Platani similia, sed minora, folijs Spondilij proxima [sed m. r. c. r. d. u. i. o. u. ver. car. ret. S. rac.] pluribus diuinis scissa, nigriora & subaspera: caulis brevis [Sax. ut legit etiam Serap. & non Sax. asper, Sarac.] flores candidi purpurascens, figura racemosi [Sax. ut legit etiam Serap. & non Sax. asper, Sarac.] Quidam ex Soudā, docti nonnulli Soudā, Sar.] Semen intus Cnici quod & Anticyræi Sesamoides vocant, & in purgationes adhibent. Radices subsunt, tenues, nigre velut è capitulo quodam Cæpæ simili dependentes, quarum etiam vltus est. In asperis, editioribus, siccioribusque locis nascitur. Optimum quod ex locis elusmodi petitur, quæ quod ex Anticyra: nigrum enim mihi probatissimum gignitur. Eligi debet carnosum, plenum, cui tenuis medulla sit, acie denique gustu, feruensque. Huiusmodi est quod in Helicone, Parnasso & Ætolia nascitur: attamen Heliconium præcellit. Veratrum nigrum purgat per interiora [Sax. ut legit etiam Serap. & non Sax. asper, Sarac.] Cor. legit ad m. ut ex vers. apparet, Ioh. Bauh. Sarac. addit indubitanter ita legendum] trahitque pituitam & bilem, datum per se, aut cum Scammonia & sale. Drachma vna seu obolis tribus. Deoquitur & cum Lentæ, ac iusculis quæ purgationis causa sumptantur. Prodest verò in comitialibus articulisque morbis, itémque melancholicis, insanientibus & paralyticis. Subditum menses trahit & partus necat: fistulas inditum ac tertia die exemptum purgat. Similiter in auditu difficili immititur in aurem, ibique ad bi-duum triduumve sinitur. Scabiem quoque sanat cum Thure aut cera, aut pice ac cedrino oleo perunctum. Viridini verò, impetigini ac lepris ex aceto impositum per se medetur. Dentium dolorem coctum cum aceto collutione mitigat. Septicis etiamnum medicamentis admiscetur. Quin & hydropicorum ventri cum farina hordeacea & vino vtiliter imponitur. Porro autem confitum proximè Vinum radices, vino inde expresso vim purgandi conciliat. Sed & eo domos aspergunt, purgandi expiandique vim illi tribuentes. Quamobrem & qui ipsum effodiunt, stantes Apollinem & Æsculapium [de his etiam, at obscurus Theophrastus] precantur, obseruantque aquilæ volatus: eam enim alitem tradunt non citra periculum aduolare, atque etiam ei mortem inferre, quem Veratrum effodientem [moriturum eo anno succedentem cui Aquila prope aduolauerit: Thophr.] conspexerit. Celeriter quoque effodiarum oportet, quoniam habitu auræ suæ caput aggrauat: quapropter ad id præcavendum: effodiarum Allia præsumunt, vinumque subinde sorbent: ita siquidem ab afflatu securiores, noxæque minis oportuni colliduntur. Cæterum, Veratrum hoc candidi modo etiam emedullatur. Veratrum, inquit Plinius, duo sunt candidum & nigrum. Vtrique caule palmi [quadrantis altitudine Dioscorid.] ferulaceo, buborum tunicis conuoluto, radice fibrata [similij M. & CH.] Carparum modo. Nigro equi, boues, ius necantur, itaque euent id, com candido vescantur. Tempestivum esse tradunt messibus. Plurimum autem nascitur in Oeta monte: & optimum vno eius loco circa Pyram. [Pyræ, siue Rôgus, locus est in montis vertice, in quo sacrificantem Hæculem assisse ferunt, cum impatientia doloris victus in accētum lignorum strem se proiecit.] Nigrum ubique prouenit, sed melius in Helicone, qui mons & alijs laudatur herbis. Candidum probatur Octæum: secundum Ponticum: tertio loco Eleaticum, quod

Locus.

Anticyra.

Vires.

Vitæ vim suam committit.

Optimum in Oeta Pyra.

in Vitis nasci ferunt: quarto Parnassium, quod adulteratur Aetolico [Parnassium & Aetolicum, vendentes & ementes multi discernere nesciunt: duri sunt, perquam rugosi, & staccidi, Theoph.] ex [deletur hæc vox in vet.] vicino. Nigrum ex his Melampodion vocant, quo & domosura & Dioscor.] suffiunt purgantque [pargentes [aspergentes se, M.] & pecora, cum precatione solennit: eo purgant & sues, & oves, carmen quoddam occincentes, Theophrast.] hoc & religiosius colligitur. Primum enim gladio circumscinditur. Deinde qui succisurus est, Ortum spectat: & precatur, ut id liceat sibi concedentibus Diis facere, observatque aquilæ volatus, ferè enim secantibus interest: & si prope aduolauit, moriturum illo anno, qui succidat, augurium est. Nec album [atrum Dioscor.] facile colligitur, caput aggrauans, maxime nisi præsumatur Allium: & subinde vinum forbeatur, celeriterque effoditur. Nigrum alij Entomon [Cestemon Dioscor.] vocant, alij Polyrhizon: purgat per inferna. Candidum autem vomitione, causâque morborum extrahit, &c. Drusum quoque apud nos, Tribunorum popularium clarissimum, cui ante omnes plebs stans plausit, Optimates verò bellum Maritimum imputant, constat hoc medicamento liberatum comitiali morbo in Anticyra insula. Ibi enim iucissimè sumitur, quoniam (ut diximus) Sesamoides admiscet. Cauendum est felici quoque cura, ne dubio die detur: quippe imparibiles cruciatus existunt. Nam Æstate potius, quàm Hieme dandum [Aph. 4. l. 4.] non est dubium. Corpus septem diebus ante præparandum cibis acerbis (cui radicle cum oxymelite:) abstinentia vini, quarto & tertio die vomitionibus [scilicet, Gal. comm. aphor. 13. l. 4.] pridie cænz abstinentia. Verant dari senibus & pueris: item mollis ac sceminei corporis, animæ, exilibus aut teneris, & scemini minus quàm viris. Item timidis, aut si exulcerata sint præcordia [intestina, vel renes, aut aliæ partes sub hypochondriis sitæ, ut ventriculus, Dal.] vel tumeant, minimève sanguinem excreantibus, causariis, vel latere, vel faucibus. Medetur morbis Comitialibus, vertigini &c. quæ ex ipso fonte petantur, Dal. hæc inter alia. Plinianis adscribit. Sex modis sumitur Veratrum album. I. radicle totâ nocte confixa eius festucis ad Drachmas sex, postidè sumitur ex oxymelite. II. infusum in herminæ aquæ pluuiæ ad Drachmas sex, citra decoctionem, post triduum bibitur. III. decoctum lib. 1. in duobus sextariis aquæ, admixta mellis Læ. percoctum, ad cochleat. magnum lingitur. IV. Segmenta minutim forfice concisa, suis suis magnitudine, ad drach. 11. datur cum alita, præstana, hydromelite calidis. V. pulvis crassusculus forbetur cum cremore præstana, ad drachmam 1. VI. pulvis tenuissimus ad scrupulos quatuor, cum melle formatis cataportis deuoratur. Amylus & Polidonium apud Aetium.

Tempera-
mentum
Galeni.

Galenus tam album quàm nigrum Helleborum extergentis setibz esse facultatis & excoctificantis: quomobrem ad alphas, lichenas, psoras, lepraque accommodat.

Si partes, quæ sunt sub septo transverso, dolor affligat, nulla neque ad ingulum de se significationem præbeat, alium Veratro nigro, aut Peplio emolliendam, esse docet Hippocrates, ea quidem ratione, ut Veratro quidem Daucum aut Sceli aut Cuminum, aut Anisum, aut aliud quidpiam bene olens admisceatur: Peplio verò Lactis succus. Quamquam autem inter se miscean-

tur vnus sunt generis, neque dissimiliter agunt. Sed Veratrum nigrum tum melius, quàm Peplium ventrem solvere ait, tum etiam ad indicationem magis valere: Peplium verò flatu magis erumpere facere. Dolorem autem hæc duo sedare. In subditio Veratrum album aut nigrum apponit. Porro si quid effluens ex vtero, mordeat, & summas osculi vteri oras vlceret, diurnâ flore fluxionem asserit. At si minimè copiosa fuerit, Lenticulæ decoctum cum Veratro, ut vomat exhibet. Nigrum ex aqua tenuiter tritum, & in pello suppositum, aquam velut è carnibus educere idem scribit. Veratrum etiam ex vino dulci, cum farina Lolij & Tritici melle subactum subiicit. *Ex hæc passim Hippocrates.* Quem his verbis taxabat Democritus: Ad me venisti Hippocrates, ut tanquàm insano Veratrum exhiberes à stultis hominibus, persuasus, &c. Si ab his persuasus mihi tanquàm insano Veratrum propinasses, prudenter in insaniam euassisset. Veratrum, si sapia exhiberetur, menti tenebras offundit, insaniis verò multum prodesse consequitur. *Plura de virib. vide titulo de Elleb. albo.*

Sane nonnulli
Insani pro-
ferunt.

Scaliger ait Theophrastum lib. 9. cap. 11. de Elleboris recitare sententias adeò absurdas, ut pudeat. Laurinum folium attribueret nigro, & Potri albo, pari mendacio: Album esse folio Gentianæ nigrum digitatè, ut Croronum. Elleborum album radicem habere initio non multiplicem, ut nigrum: sed simplicem, quæ postea spargatur in fibras: idque in verbis Theophrasti manifestè intelligi. Eum enim dixisse *απλὴν* non simpliciter: sed *ταῖς ῥιζαῖς* magnâ effecta articuli. In Aruernis & Rutenis, Album penè omnia animantia vel inire, sicere, vel male affecte. Strangulare enim equos & cetera iumentis. *Nunc, si Scaligero Elleborus niger est italicus flore modò albo, modò purpurascens, is nobis videtur dici posse folio Laurino: patres enim digitatæ singulares conueniunt cum folio Laurino in multis, nec ea similitudo ita absurda apparet. nolimus propterea asserere italicum Elleborum Theophrasti: multa enim obscura in eius historia. De albo Elleboro nolimus Theophrastum accusare mendacis, sed existimamus potius rectius vitium: quid enim si pro *ταρσίδος* legamus *ῥιζίδος*, necuis abundantem, quibus sanè Plantaginis modo abundat, quæ etiam *αυτῶν* dicitur: apud Plinium etiam & Dioscoridem Limonium vocatur Neuroides. Limonium verò dictum Neuroides appellatur à Plinio Betæ filicestris, cui etiam Dioscorides comparat folia Ellebori albi.*

Scaliger. in
darguunt.

HELLEBORVS ALBVS.

Helleboro albo radices subsunt fibrosæ, albæ, in caput collectæ: *caulis* bicubitalis interdum, teres, *folijs* ripatus, quorum pediculus caulem involuit: sunt verò ipso *folia* formâ quidem quodammodo plantaginea, vel potius Gentianæ similia, longitudine verò pedali, haud multò angustiora, mollia, liris densissimis striata, & velut plicata, subhirtula: caulis à medio ferè ad cacumen usque ex foliorum quorundam paruorum alis *thyrsos* emittit palmares & sesquipalmares *florum* creberrimorum, senis, ex herbaceo albicantibus foliolis radiatis constantium.

Descriptio

Vulgares herbarios confundere Dictamnium, Helleborum album, & Sigillum Salomonis, testatur Cordus in Dioscoridem.

Torpe profecto esse nouitio rhizotomo Matthiolo neminem irurum inficias arbitratu Gul-

præis quibusdam additis medicamentis. In germanico Botanologico cautionem addit: Veratrum album vehemens est medicamentum, nec sine additis refrænantibus assumendum: quamobrem nusquam legitur Galenus radicem eius intrò dedisse, sed docere duntaxat quâ ratione foris sit usurpanda, ad herpetas, scabiem, & omnem curis impuritatem, quod si placet eam intra corpus usurpare, prudenter id faciendum, idque solummodò in morbis magnis. ut epilepsia, vertigine, mania, hydrops, ischiade, convulsione, elephantia, & similibus, & quidem hoc modo: primum radices Hellebori albi, viginti quatuor horis macerantur in vino aut oximelite, post siccantur, in puluerem terantur, cuius drachma semis ex vino calido mane propinatur: Possunt eadem radices biduum in vino, aut diem vnum in iure carniū macerari. & colaminis cyathus parvus dari: non malè adderetur Cinamomum tritum. Verùm enimverò non debet radix hæc seni, puero, scæminæ, nec vlli delicato dari. Sunt qui hoc modo utantur: excavatur Raphanus, cui radix Hellebori immittitur, obdico operculo, sinuntur duos dies & noctes, postmodum abiecto Helleboro exhibetur Raphanus, qui purgationes molitur.

Morbi phlegmatici.

Elleborum utrumque dicit Gesnerus [si cum aceto & melle decoquatur, ut Syrupus fiat:] medicamentum innoxium, & ad plerisque phlegmaticos morbos [thoracis & capitis in primis, ut asthma, Dyspnoeam, epilepsiam] valè x̄ncor, sæpè utilissimè se expertum esse alium enim urinam, & meatus omnes, etiam curis, misicè nullâ molestiâ expurgare. Perplacet eidem D. Chrysost. Houber [olim discipuli sui] medicamentum, quo corpus recreatur & stomachus expurgatur. Recipit autem Ellebori albi drach. β. aq. ardentis Vnc. ij. Fit infusio per dies 14. post exprimitur per filtrum, & dantur pro vice drach. ij. cum vicia vini. Tandem eiusdem Gesneri, aquæ Elleboratæ descriptionem accipe. Ellebori albi Vnc. β. Gentianæ vnc. i. Flor. Centaurij minoris M. i. Anisi drach. ii. baccar. Iuniperi drach. vi. Cinam. cl. Vnc. β. Macis, Zingib. an. drach. β. Aq. Fœniculi, Hyssopi, an. Vnc. ii. Mellis despumati Vnc. iii. destillentur in cinere [si assor addit etiam aceti aliquot uncias: inquirendum diligentius.] Huius liquoris unciam semis dedit, cum aliquo syrupo, in gravissimis & desperatis quibusdam morbis, febribus præsertim, & summa cum admiratione profuit illicò manifestè, nec aliud incommodum attulit, nisi feruorem aliquem stomachi, sed brevem.

Aq. Elleboratæ descriptio.

Demum, ut Alianus animal. lib. i. cap. 60. perhibet, farina ad Veratrum admixta antea alucos dispersa perniciosum adfert lacertis, insidias in apes facientibus & omnibus commemoratis animalibus. De Elleboro & Hispanorum ex eo toxico consulendus est Io. Langius epist. med. l. i. epist. 68.

ELLEBORVS NIGER FLORE ALBO, interdum etiam valdè rubente.

Descriptio

Elleborus, cuius hæc iconem exhibemus, radicem habet numerosis fibris, vulgari paulò crassioribus, donatam: folia à radice pediculo spithamæo, crasso succulento, tereti, punctis purpureis, ut Dracunculi maioris, notato, appensa, diuisa vtiplurimum in folia nouem, viridantia, læuia, rigidiora, crassioraque, quam in vulgari flo-



re viridi, læta, obtusa, serrata, in extremi folij ora & paulò inferius, crenis autem vithua reliqua portione tota: pediculi singularium foliorum, ut & aucti folij seruius, purpurascens: inter folia flores occultantur pediculo plurimum palmari & sesqui-

culento & maculoso, ex foliis quinque candidis, vngue purpurascens extrinsecus, subrotundis, striato venularum discursu præditis, ad floris imum foliolum oblongum integrum, paulò que inferius aliud tanquam vagina, interdum diuisum in plura: floris medium occupant staminula multa lutea breuiusque, cum corona decem duodecimue tubulorum virentium: succedunt silique corniculatæ intortæ, septenæ, in quibus semen fit interdum, ut eunte in semina flore, eius folia tam intus quam extra colorem contrahant ferrugineum. Aliquando noster Elleborus florem habet valdè rubentem, interdum album pro anni constitutione.

Plant. Leonis
Dod. gall.
Veratrum
nigrum l.
Lob.

Dod. gall. Plantam leonis inscribit, & Ellebori secundam speciem facit, floribus albis instar niuis, qui postea virides fiunt. Lætin. Veratrum nigrum i. dicitur, quod flores habere ait initio albos, deinde purpurascens, postremò virentes. Is licet hanc plantam non recipiat pro vero Elleboro nigro, eam tamen probe nouisse non videtur, dum flores ait enadere virentes, sed potius duas plantas confundere.

Helleb. niger
Lob.

Lobel. in Adu. vocat Helleborum nigrum [le. Plant. 681.] german. Christvortz, Belg. Schvuart Nieseruytz, Angl. Ore belo, and fester vortte: Ital. [addit in Obl. p. 388. vbi etiam Napellum Auicennæ Guilandi.] Elleboro nero: Hispan. Verde gambre nero, & yerua de vallefleros. Ait autem ex Pyrenæis & Alpibus in hortos transuectum, in eunte Hyeme, itidem paulò post brumam flores dare ex candore roseos, interdum albos, nonnunquam purpureos: à se collectum in Apenninis Bononiæ. Congruè describit, sed ineptum nomen germ. belg. ital. & hispanicum, utpote alteti plantæ familiare, huic tribuit: non autem asserit an Dioscoridis, quia dubitat an textus eius corruptus.

Lob. not.

Matthiolus in Dioscor. tradit Elleborum nigrum cum candidis floribus, quod alterum facit, solo colore distingui ab eo, quod purpureos, & altero, quod herbaceos habet flores: hoc autem alterum & tertium genus aded viribus imbecillia esse, ut ferè nihil ad aluum deliciendam præstent, id quod facto periculo se didicisse scribit. Omnibus in vniuersum eandem esse foliorum speciem. Cæterum, Solerij ineptam ait esse opinionem, æstimantis in scholiis in Aetij priores libros, Elleborum hunc, flores Rosa-

rum modo purpureos ferentem, itémque albos, esse *Ly. octoni*, vel *Cynoctoni* *Aconiti* esse speciem. In comm. post. quamvis dixerit in principio solo flore differre omnes tres *Hellebori* species: tamen postea ait, folia non esse in omnibus similia: ac ibi describit speciem floribus purpureis, & alia albis, ut solo colore differentes, & folia diuersa ab *Elleboro* floribus herbaceis, proferentes. Descriptio quidem eius non male conuenire videtur cum nostro *Elleboro nigro* floribus albis: veluti etiam eius figura, quam ponit in post. comm. sub titulo *Ellebori nigri*. In *Hist. Germ.* nescio quomodo factum ut mutatz sint figuræ & descriptiones: pingit enim nostrum *Elleborum* nigrum floribus albis, pro *Ellebor. 2.* nigro: decriptio etiam quæ secundo loco data conuenit *Elleboro* floribus albis, quamvis eo loco tantum purpurei meminerit coloris, & in descriptione præcedenti faciat omnino similem eam speciem, quam herbaceum florem habere ait, cum ea quæ album profert, quod approbare non possum: *Suspicio* ipsi non bene fuisse perspecta *Hellebori nigri* vulgaris genera.

Hell. niger
caulis lauis,
semine Anisi
Turn.

De nostro *Elleboro* hæc *Turnerus*: Do lonæ^o pro *Helleboro nigro* plantam exhibet, cuius folia descriptioni optime respondent: quoniam tamen caulis læuis est, non asper, semina vero *Aniso* similia, rugo 2, non autem *Cnico*, non possum verum *Helleborum* nigrum pronunciare. Nec autem affirmare mihi vnquam obseruatum *Helleborum* nigrum legitimum. Hoc tamen ausim affirmare, eius defectu licere uti hac specie, quæ quotannis perit, quantum supra terram est.

An *Monardi* ex versione *Clus.* de nouo Orbe, *Helleborus niger* Hispanico similis, & iudem facultatib. præditus. An idem *H. Lugd.* ex *Monarde* p. 1907. sine iconē?

Elleb. niger
legitimus
Clus.

Clus. hist. *Elleborus niger* legitimus, albo, amploque, Rose iustar, flore, qui marcescens purpurascit.

Synon.

An *Veratrum nigrum* *Striacum* *Tabern.*?
C. Bauh. phyt. *Helleborus niger* 3. siue flore magno purpurascens. *Erd. pin.* *Helleborus niger* 4. siue flore roseo: *Elleborum* nigrum *Matth.* in comm. & *Icon. 4.* p. 816. *Cast. H. Lugd. & Camer.* *Planta leonis* *Dodon. gall.* *Ellebor. niger* flore magno purpureo *Gesn. hort.* *Helleborus niger* 1. *Dodonæi* [ic. gall.] *H. Lugd.* *Veratrum nigrum* 1. *Dodon. latin.* Legitimum *Clus. pinn.* *Striatum* *Tabern.* *Ellebori nigri* alterum genus *Cæf.* *Elleb. niger* annuus *Anguill.* *Niger* legitimus *Clus. hist.* *Niger* verus *Gerardi.*

Locus

In vasis hortis & siluis *Elleborum* hunc obseruamus, animaduertimusque eundem pro anni constitutione flores ferre albos aut rubentes valde, etiam non marcescentes. Flos ut plurimum initio albidus, deinde purpurascens, postremo viridis.

ELLEBORVS NIGER VVLGARIS,
flore viridi vel herbaceo, radice
diuturna.

Descriptio

Hic tum ab hortensi flore albo, tum ab adulterino manifesto discrimine se iungitur: licet enim radices fibrosæ, nigæ, exq; numerosæ, similitudinem magnam cum hortensi flore albo insinuent, dissimilitudinem vero cum adulterino, reliqua tamen plantæ facies differentie fidem faciet: folia enim ampliora, virore herbacei, te-

neriora quam vilius reliquorum duorum, in plurima segmenta conciduntur, singulaque lacinia in acutum mucronem, non obtusum more hortensis flore albo, desinunt, in ambitu serratæ, nec tam



saturo colore tinctæ, nec tam rigide ut adulterinam vero flores pediculis palmatibus & dracunculib. hærentes, colore sunt herbaceo, adulterini *Ellebori* æmuli, quinis maioribus foliis constantes, umbilicum obsidentibus apicibus crebris, pallenscibus, semen corniculis aliquot surrectis coniunctisque

aliorum more continetur.

Christu vomit, i.e. Christi radicem, appellant, inquit *Tragus*, eo quod quandoque circa *Seruatoris* nostri Christi natalem diem flores producat, præsertim quando temperatior fuerit Hiems: Aut certe *Christu vomit*, quod clysteribus quoque adiciatur, quos Germani *Cristler* vocant. Recentiores contendunt eam esse *Elleborum* nigrum *Dioscoridis*, nec multum ab illo abluere descriptionem. Ego vero sentio *Consiliginem* esse *Ruellij*, cuius meminit & *Plinius*. *Matthioli* contra *Consiliginem* esse negat, *Veratri nigri* speciem herbaceos flores proferentem esse autumans.

C. Bauh. phyt. & pin. *Helleborus niger* 2. siue *Syon.* hortensis flore viridi: *Hellebor. niger* *Brunsell.* tom. 1. thaps. 2. & in 4. p. 35. *Elleb. niger* nostras *Cordi hist.* *Elleb. niger* vulgaris *Gesner. hort. & Cæalp.* *Elleb. niger* alter *Matth.* *Elleb. niger* tertius *Dodonæi* & *Matthioli* *H. Lugd.* *Elleb. niger* adulterinus domesticus *Tragi.* *Ell. nig. adult.* hortensis *Fuchs.* *Pseudo-helleborus niger* *Dodon. gall.* *Helleboraster* alter [siue *Consiligo*] *Lob. in Aduers.* *Helleborastrum* in *Obs.* p. 87. *Icon. Plant.* p. 684. & *Gerardo*: *Veratrum nigrum* *Cordo* in *Diosc.* Secundum *Lac. Dodon.* *Clus. in pann. & hist.* itémque *Tabern.*

Elleboire noir *Gallis* dicitur, ut & *Patto du Lion.* *Belg's vueren* 7. *vueren* 7. & *vueren* 7. *Ger.* *Christu vomit*. *Anglis* *Beere* flore. *Hi. p.* *Verdegambre negro*, 7 *yerua de Valle* *Seras*: *Hung.* *Feketo* *humor.*

In hortis variis occurrit. In Italia abundat *Locus* & montibus *Euganeis*: floret mense Febr. In *Hassie* *Tempus* pratis prouenire asseruit *Gillenius*. *Clus.* authore copiose crescit ad *Viennensis* saltus initium, quæ *Vienna* ad *Carthusianorum* cœnobium *Maurbach* & *Tulbingam* iter est, vmbrosis locis, & vicinioribus etiam ad siluatum margines.

Huic cum genuino *Elleboro* easdem facultates, idémque temperamentum, testatum fecit experientia. Purgabit itaque perinde atque genuinus inferiorem ventrem, pituitam & flauam bilem ducens, & cætera eadem cum illo præstabit.

BUPHTALMUM DODONÆI,
aliis Consiligo tenuifolia.
CAP. VIII.

Non absimilis Hellebori radici huius fibro-
sa radix, quæ sicca qualis in officinis pro-

stat, sesqui-
palmaris, fi-
bris nigrican-
tibus tenuio-
ribus constat,
quàm Helle-
bori nigri ra-
dix à capite
magis etiam
diuulso pen-
dulis, sapore
amaro prædi-
tis, non parnâ
tandem acri-
moniam re-
linquentibus:
caules aliquot
proferens spi-
thameos, stri-
atos, tenues, in
quibus folia
tenuissimè
diffecta, Eran-
themii quorû-
dam, seu Flo-
ris Adonidis
modo, sapore
subamaro, o-
dore, ubi atte-
rantur digitis,
insuani: flores
pulchri, flauo
nullo excel-
lente odore,
ex foliis sedecim oblongis,
striatis acumi-
natis, circa
mucronem
nonnihil cre-
natis, compo-
siti: in medio
amena pluri-
morû stami-
num partim



herbidorum corona capitulum circumstat, ob-
longum, echinatum, ut in Ranunculis: subsunt
fibri quina folia hirsuta, viridantia.

Icones.

Dux nostræ icones sunt ex empris sculptis:
neutra verò placet, quia non adsunt omnes
partes.

Tragi verum & nigrum Elleborum Ingelhei-
mii effodiunt inter Bingium & Moguntiam, de-
feruntque Venetias.

A minoris Sesamoidis Dioscoridis historia
non multum abluere testatur Cordus in Diose.
eam herbam, quam Agyptæ pharmacopolis pro
Helleboro nigro vendunt. Vires enim eadem
habere credit. Germani *Klein Christvurtz* vo-
cant. Idem in hist. ubi figura pro Helleborina
tenuifolia describit.

Math. plingens in Dioscor. adductus est, ut
suspiciatur fuerit eam plantam esse veram Con-
siliiginem Columellæ & Plinij, quam Tragus le-
gitimum Veratrum nigrum esse putauit, non si-
Tom. III.

ne euidenti, ut ait, errore, In hist. Germ. vo-
cat Pseudo-helleborum, *Vermehrte schvurtz*
Niesvurtz.

Sunt [inquit Dod. lat.] qui volunt hanc plantam
Veratri nigri speciem esse: nonnulli Consiliigi-
nem, quidam Sesamoides: Elleborastrum aliis.
Nullam tamen harum appellationum huic stir-
pi convenire mihi visum est, sed solum Buph-
thalmi nomen apud Dioscoridem. Quare Buph-
thalmum inscribo eam.

Gesn. contra hort. author est Dodonæum non
rectè Buphtalmum facere herbam illam quâ
pro Helleboro nigro quidam utuntur. Idem
rursus Ellebori nigri speciem facit veteribus in-
dictam: In app. verò ad Anonimas potius refe-
rendam censet.

Lob. Adu. p. 335. & 344. Helleborus ferulaceus:
Item, niger Helleborus Theophrasti, caule & fo-
lii ferulæ, & Hippocratis. Obs. p. 456. ubi figu-
ra, Sesamoides minus Geineri: Buphtalmus
Anguillaræ. Icon. Plant. p. 784. Helleborus ni-
ger ferulaceus Theophrasti.

H. Lugd. sub titulis, Pseudo-elleborus sine
Consiligo Matthioli: & Buphtalmus Dodo-
næi: Duas habet figuras eiusdem plantæ.

Taber. Helleborus hippocratis: Gerat. Buph-
thalmum siue helleborus niger ferulaceus,
Ore em: Camer. apud Matth. germ. Buphtal-
mus Dodonæi, helleborine flore luteo: C. Bauh.
pin. helleborus niger 9. [7. in phyt.] siue te-
nuifolius Buphtalmi flore: Elleb. niger verus
Lon. Buphtalmum Dodonæi, Clos. pann. & hist.
Elleborastrum nigrum Gesn. hort. & Camer.
Elleborum alterum Castori. Fuchsius cum Tü-
bingæ apud eum eilem vocabat Elleborinem
Dioscoridis.

Montbelgardi in Ill. E. C. horto colui floren-
tem Aprilis & Maio Clusius vulgarem ait omnib.
apicis collibus & siccioribus versusque Panno-
niæ & Austriæ gramineis campis. Plurimam nasci
in Bohemia, præsertim in agro Pragensi testatur
Matthioli. Prouenire circa Ienam in Thuringia,
& circa Viennam in Austria prodit Ca-
mer. Apud Belgas hortensis est, Dod. Maio aut
Iunio fleret.

Quod ad facultates attinet: Tragus sepe nu-
merò vidit homines citra periculû huius radice
feliciter sanatos. Matth. ait in Bohemia tum Me-
dicorum Pharmacopolas huius radicibus pro
Veratri nigri vi: priuatim magno successu ad
pecorum morbos: sed in medicamentis radices
huius *aristhauz* radicum Veratri esse non
affirmat: idque, ut manifestum errorem, refutat
Dodonæus, expertus eas minimè per inferna
purgare. Eas etiam non sumendas esse pro Ve-
ratro nigro, quod verum haberi possit, suadet
Camerarius: addens tamen si radices externè
admoventur, durities ac in scirrhum abituras
collectiones curò dissipare.

DE SESAMOIDE EX

Dioscoride & aliis.

CAP. IX.

Incidimus in Sesamoidum mentionem, quæ
Veratro potentiâ ac viribus proxima sunt, &
ex purgantium numero: opportunum idcirco
eorum historias ex Dioscoride & aliis hic repe-
tere. Duo autem ea sunt: Vnum magnum: al-
terum paruum. In magni autem Sesamoidis
descriptione inter Veteres non satis conuenit.
Plinius lib. 22. cap. 25. Senecioni [i. e. *hieronym*]
D d d d

Elleb. veterib.
indictum.

H. Lugd.
notatur.

Cetera Sy-
nonyma.

Locus &
Tempus.

Vires &
Virus.

Sesamoides
duplex

similem herbam scribit: Oribasius Rutæ similior-
rem facit. Dioscoridis verò exemplaria utriusque
herbæ Sesamoides istud comparant. Similis est
herba, anunt. Senecioni aut Rutæ: [naryspon n an-
3 dyp] folijs longis: flore albo: radice gracili, inef-
ficace: semine simili Sesamo, amaro gustu.

Sive autem Dioscorides, sive alius, huius de-
scriptionis auctor extiterit, oculata fide Sesamoi-
des magnum non agnouisse videtur: sed ex alio-
rum scriptis tantummodò descriptionem eius
collegisse: atque idcirco disuncta particula
vñs: ignorans videlicet, cui simile Sesamoides
magnum esset: Senecio: inè an Rutæ. Vtrique
autem simile esse, vix possibile, id primùm anno-
tante Dodonæo. Sunt etenim dissimiles multum
Senecio & Ruta, qualiscunque etiam ea sit, siue
graucolens, siue altera Hyperico similis.

Recentiores, inter quos Ruellius & nonnulli
post eum, Sesamoides magnum existimant, quod
à Theophrasto Veratrum nigrum describitur.
Cognominat enim ipsum Sesamaceum, siue *σναμωδης*:
Anticyrenses, inquit, fructum sesamacei
Veratri dare solent &c. Lege plura cap. de Hel-
leboris. Et à Dioscoride, qui Sesamoides ma-
gnum apud Anticyrenses Veratrum [si modò ge-
nuina lectio] vocari refert: & à Galeno in lib. de
simpl. med. fac. ubi Sesamoides magnum, Anti-
cyræum Veratrum esse scribit. Dodonæus verò
nondum repertum esse, nec facile agnosendum
existimat.

Dicitur autem *σναμωδης*, ut Dioscoridis &
posteriorum exemplaria habent in Anticyra i-
αλίσκος. Causa additur, quoniam Veratro albo in
purgationibus miscetur. At propter hanc cau-
sam fortasse rectius *σναμωδης* nuncuparetur. Nam
Helleborines semen Theophrastus ait purga-
tioni ex Veratro misceri, quod haud aliud
quàm ipsius Sesamoidis esse verisimillimum est:
Hippocrates enim, Strabo, & Dioscorides non
aliud admisceri scribunt quàm Sesamoidis se-
men. In *φουκία*, ait Strabo, nascitur *σναμωδης*, cui
permixtum præparant Osterium Helleborum.
A Sesamo autem forma & similitudine, Sesamoi-
des nomen, ut Plinius ait, accepit.

In abstergendo, excofaciendo, desiccandò
que similem Veratro vim, Galeno auctore, ob-
tinet. Purgat pituitam & bilem supernè, ut Dio-
scorides refert, quantum tribus digitis capi po-
test tritum, acceptum cum Veratri albi sesquibo-
lo, in aqua mulsà. Eadem de hoc ferè Hippo-
crates sub finem libri de vict. rat. in morb. acut.
attamen non cum aqua mulsà, sed cum aceto
mulsò siue oxymelice exhibet.

DE SESAMOIDE PARVO EX DIO- SCORIDE.

Descriptio. Sesamoidi parua, ut Dioscorides habet, do-
drantales sunt cauleculi, folia habentes Coro-
nopo similià, hirsutiora tamen ac minora: in
summo cauliculorum capitula sunt florum sub-
purpureorum, quorum medium album, in qui-
bus semen Sesamo simile, minutum, & rufum: ra-
dix tenuis: nascitur locis asperis.

Nomina. Nonnulli *σναμωδης* siue *σναμωδης*, alij *σναμωδης*
vñs *σναμωδης* vocant: Galenus *σναμωδης* siue *σναμωδης*: &
semen eius anar. in qualitate continere, mul-
tùmque amarum esse, excofacere, rumpere exter-
gereque scribit.

Vires Purgat, inquit, Dioscorides, pituitam & bilem

deorsum semen acetabuli mensura porum cum
aqua mulsà. Idem impositum cum aqua turber-
cula & tumores discutit.

SANICVLA FOEMINA QVIBVSDAM, alijs Elleborus niger.

CAP. X.



CVbitum Descriptio
Caltos ma-
ioresque pro-
mit caules, tere-
tes, striatos, qui
mansu saporem
exhibent Imperatorix: folia
Pentaphylli
modo quin-
quepartita, sin-
gulis segmen-
tis serratis, Im-
peratorix foli-
is supparia;
rugosa, supernè
atro-virencia;
infernè ex vi-
rote in luteum
tendentia. Flo-
res simul ali-
quot Saniculæ,

longè, maiores, ex multis glomeratis flosculis vi-
rescētibus, quos folia obuallant multa striata, ex
albo virescentia, pauca admista purpurâ: semen
oblongum, alterâ facie planum, alterâ gibbum
& caniculatum, colore cinereo: radix multum
fibrosa, Hellebori modo, atra.

Sanicula altera Fuchsi ab omnibus ferè Her-
barijs pro specie Osteriij vulgò vocari habetur,
sed falsò quando neque in folijs, neque in radi-
ce vlla appareat acrimonia, sed perinde atque in
mare Sanicula amaritudo & adstrictio. Germa-
nis etiam errore quodâ die *klein Mestervunn*,
hæ Imperatoria minor, nominatur. Fuchsius e-
andem quòd & forma & facultate ad veram Sa-
niculam, quam maxem facit, proximè accedere
crediderit, Saniculam foeminam nuncupauit.

Dod. gall. vocat Veratrum nigrum & Ellebo-
rum nigrum, nullâ factâ mentione Neoterico-
rum: sed tantum veterum nomina, quæ Elleboro
competunt, apponens. Idem de purg. & in fol.
lat. pro Veratro nigro, non quidem Theophrasti,
Dioscoridis depingit & describit.

Trago est lib. 1. cap. 144. de Smyrnio, Osteri-
tium 3. siue montanum, quinque folijs diuisum
vnteo pediculo insidentibus, Osteriij veri aut
Saniculæ modo. Eid. cap. 173. Sanicula 1. siue fo-
mina adulterina.

Tantò minùs Lobel. in Ado. huic quadrare
contendit Astrantiæ nigre, siue atræ nomen,
[huic Astrantiæ nigre nomen minime conueni-
re tradit etiam Dodon.] Germ. *Scherbiariz A-
strentz* oder *Muettervunniz*, quam periti Sanicu-
lam alteram putarunt, alij Helleborum nigrum,
leuiusculâ, ut ait, coniecturâ. Is à luteo, quem ef-
fundit, succo vniuersa planta ac etiam alijs no-
ris Astrantiæ, assimilauit, idcirco que nigram appel-
lauit: Obs. p. 181. Ic. p. 681.

Apollo Rad. 1. supra elect. Iustinum, quartam
facit Pentaphylli speciem, dicens foeminam nun-
cupari, Diapensiam & Saniculam. Sed vbinam
quæto legit vocatam fuisse Diapensiam?

Gesl.

Veratrum
Anticyrense.

Vires

Veratrum
nigrum
Diosc. Dod.

Apollo. not.

Gesn. hort. Saniculam feminam cognominatam à Sanicula genere toto differre contra Fuchsum concludit. Dodonæum verò falli scribit, putantem esse verum Elleborum nigrum Dioscoridis.

Cetera
Synonyma.

C. Bauh. pin. Elleborus niger 5. [4. in phyt.] siue Sanicula folio, maior: Sanicula femina Fuchsi, H. Lugd. & Clus. hist. Veratrum nigrum Dioscoridis, Lac. & Eysl. Veratrum nigrum 2. Clus. pann. Imperatoria nigra Tabern. Elleborus niger Dodonæi, H. Lugd.

Locus &
Tempus.

Saniculæ feminae Fuchsi semina Montbelgardi sæpius terræ mandavi, sed nunquam provenit. Observavi Lugduni *au bois de la bonne Allemande* provenientem Martio mense: Basileæ florentem Iunio ac etiam Septembri. In monte Thuri Iulio, vnde in hortum translata, Genevæ folia producebat Aprili, florebatque Maio ac Iunio. In montibus ac sylvis Tübingæ vicinis quoque reperimus. Abundant hæc etiam Pannoniæ vtriusque & vicinarum Prouinciarum prata, vmbrosæ silvæ, & montes. Talibus in locis montis luteæ frequentem collegit Io. Schvab, in asperis ac incolitis, xiliis montibus florentem, totoque anno virentem.

Vires & v-
lus,

Fuchsius affirmat Saniculam suam feminam formâ & facultate ad veram Saniculam proximè accedere, & in ea ut in mare amaritudinem & adstrictionem esse. Dodonæo tamen visa est Veratrum nigrum Dioscoridis, forma & viribus respondere. Ad omnia tamen efficacius habendum.

Atrox autem aliisque humores radices huius expurgat, testes habet in German. nonnullos exercitissimos Medicos, qui his melancholicos purgatos feliciter ad sanitatem reducere. Purgandi quoque huic facultatem adesse, testatur etiam Gesnerus in epistola quadam ad Octonem, in qua Astantiæ nigre Helleboro albo ferè similem vim, sed tamen mitiorem, & & per alium purgatricem primum se expertum refert. Quæ sententiam Dodonæi, Dioscoridis scilicet Veratrum nigrum esse, confirmant. Fab. Hildanus ad curationem scirrhii lenis in spozemate præscribit Saniculam feminam Fuchsi.

Descriptio

Nos minimam Fuchsi Saniculam feminam invenimus in Rheticiis montibus, quæ vix uncias duas excedebat, nec floribus, folijs & radicibus nisi quantitate, differbat. Hæc C. Bauh. phyt. Helleborus niger 5. [Pin. 6.] siue *Sanicula* folio minor dicitur.

SANICULA MAS FUCHSII siue Diapensia.

Concinnæ sunt Saniculæ folia, quæ à radice adstringente, foris nigra, intus, alba, fibrosa, exeunt, cum splendore virentia, rigidula, ferè rotunda, quinquepartita, singulis segmentis subdivisis, quorum omnium pulchre crent: *caulis* cubitalis, enodis, lævis, in fastigio diuisus *flores* sustinet, tanquam in umbellis exiguis confertos, albos, quinquefolios, quos *lappule* excipiunt, veltibus adhærescentes.

Brunfels. tomo 1. rapl. Diapensia, Sennicula, Pelium Hermolai [Coroll. 739.] Pentaphyllum Collinutij. Pentaphyllum verò sic sit, cur affit-
Tom. III.

met non habet, cur neget non videt. Ait vulgo Herbariorum Diapensiam græcè, latinè Ferrariam maiorem, & Consolidam minorem dici. Dod. verò gall. cum Io. Agricola negat speciem Pentaphylli.

Camer. hort. scribit Saniculæ delineationem Ruellij nostræ non omnino conuenire: eam etiam inter Ranunculos ipsum retulisse. Sed non video vbi Ruellius hanc Saniculam ad Ranunculos retulerit: tradit quidem cap. de Ranunculis plantam *Seniclon* dictam sed ab hac diuersam. Satis autem conuenit descriptio Saniculæ Ruellij cum Sanicula mas Fuchsi.

Corn. constanter affirmat hanc Symphyti Græcis appellari aliquam speciem esse, videturque Consolidam minorem appellare.

Quam Fuchsi. Saniculæ matris nomine depingit & describit, quamque à nullo veterum describit, eam Gesn. hort. præcipue & Simpliciter Saniculam appellat. Matthiolus Quinquefolium siue Pentaphyllum quintum vocat, ac in Hist. germ. annotat quibusdam Saniculam nigram dici. Apollo rad. 1. facit Pentaphylli 4. speciem matrem: Amatus confondit Coralloidem cum Diapensia.

Quid veteribus fuerit Sanicula, inter Ranunculos se dicturum promittit lib. 1. cap. 147. Ruellius. Inuenio ego, cap. 106. vbi de Ranunculis tractat, cum hæc dicere: Ranunculum 4. flore lacteo, rura nostra, ab Herbarijs, ut arbitror, edocta, *Seniclon*, quasi verò Saniculam appellant, &c. Sed emendanda Plinij lectio, qui pro lacteo in hac specie luteo habet, quod verbis Dioscoridis conspicuum cognoscitur. Si Ruellius Saniculam ad Ranunculum refert, quomodo à confusione exculandus sit, non video.

Trago est vulneraria herba, quam Consolidam minorem dicendam putat. Ipsi certè videtur verum esse *Seniclon* *Seniclon* Dioscoridis. Quæ causa fortè et Apollinaris Saniculæ eas vires tribuit, quæ Symphyto propriæ sunt.

C. Bauh. pin. & phyt. Sanicula officinarum: Sanicula Brunf. Trago, Anguill. Gesn. hort. Lac. Lon. Cam. Camer. Thal. Tabern. [cui & Consolidam quinquefoliam] & Eysl. Sanicula & Diapensia. Lob. Adu. Obs. 385. Icon. Plant. p. 663. & Gerardo. Diapensia Brunfels. Matth. Cast. cui & Pentaphylli 5. species. Sideritis 3. Dioscoridis Colicæ.

Saniculi à sanandis vulneribus nomen traxit, se videtur Germ. Belg. & Angl. *Sanickel*: Gall. *Sanicle*, ou *Senicle*: Ital. *Canquefoglio maggiore*: Bæth. *Zanikel*: Vngar. *Saniclar*.

In radice montis Saleuz viret Februario. In silvis vmbrosis nascitur: gaudet pingui gleba, læto, humidoque solo: Florem Maio ac Iunio profert: semen deinde maturat: herbæ verò folia toto anno virent, nec hybernū horrent frigus. Abundant Sanicula vulgari, subdit Clusius, Pannoniæ vtriusque & vicinarum Prouinciarum prata, vmbrosæ silvæ & montes. Translata ad hortos subinde adolescit.

Tragus, qui sibi persuadet, sed malè: Saniculam esse Symphyti petrum, ascribit ei omnes vires, à Dioscor. ei attributas, quæ an quadrent, aliorum relinquit iudicijs. Inter alia verò Chiturgis familiarissimam ait, & sicum obtinere temperamentum, ac ipsam penè cum Tormentilla pollere viribus, & posse adhiberi ad omnia interna vicia herbam hanc cum radice, sicut &

D d d d 2

Tormentillam : vulgè nomen Saniculæ traxisse à mira sanandi vi, indeque potionibus vulnerarijs addi. *Fuchsio* non est simplicis naturæ, gustu id indicante adstringit simul & amara est, ut hoc nomine calfactoriam & exsiccatariam esse nulli dubium sit. Satuitur autem calida & sicca ordine secundo. Herbarum succum vulneratis in potu mirificè conferre, experientiâ compertum est. Tumores quoque reprimere decoctam herbam impositam, aut eius succum illitum tam in homine, quàm in pecoribus constat. Neque enim aliud præsentius est auxilium, cum ad fauces, vel pulmones vitium decubuit. Et in summa omnia quæ Symphyton præstat etiam Sanicula. Porcissimum verò sanguinis spatio, dysenteriaz, renumque vitijs medetur. Nos contra, non omnibus renum vitijs conuenire putamus, sed duntaxat exhiberi posse, ubi aliqua vena in renibus rupta, vel in diabete, vel in vlceribus, si vires habet Symphyti, ut *Fuchsio* quoque perhibet. Internis & externis vulneribus, inquit *Lobel.* sanguinis eruptionibus, vlceribus, dysenterijs, ruptis & vllis auxiliatur, decocta, pota & imposita. *Dodon.* qui siccam facit tertio gradu, sumptam & admotam commendat aduersus hernias. Saniculæ puluerem intritum melle & Glycyrrhizæ succo, ieiuno ventriculo potum, interanea omnia phlegminantia & pituita obducta expurgare dicit *Brunfels.* Idem efficere quoque eius decoctum cum melle rosaceo, & saccharo. Sic & *Lonicerus*, qui varias attribuit vires tum aquæ, tum herbarum, quæ ferè ab alijs ascripserunt, purgatricem quoque herbam pronunciat. Sed & *Wirsung.* ad aluum mouendam Saniculam cum radicibus & melle rosato optimè decoquit, decoctique uncias quatuor sumendas præcipit. Sed si tantam glutinandi & adstringendi vim possidet, qualem non solum alij perhibent, sed etiam quotidiana praxis comprobat, quomodo aluum ducet? Iudicent lectores an qui purgatricem statuerunt, non eorum errore, qui *Peplidem* pronunciarunt, seducti decipiantur. Quia denique Saniculæ succus vulneratis in potu commendatur: ideo *Gallis* in adagium venit vulgè iactatum, *res non egere Chirurgo, qui Saniculam habuerint.*

EPIPACTIS ET ELLEBORINE VETERIBUS & IN GENERE.

CAP. XII.

Disse.

Epipactis, referente *Dioscoride*, ab alijs Elleborine vocata est, estque frutex [*Quædam* vet. quidam *prole* *luxa*. herba parua:] pusillus, perquam exiguis constans foliolis [*Ald.* folijs, vet. addit *dr. n. r. p. p. n. d. n.*] contra venena, & iecnoris vitia pota prodest.

Epipactis, inquit *Plinius* lib. 17. c. 9. ab alijs Elleborine vocatur, herba, exiguis folijs. iecnoris vitijs veillissima, & contra venena pota. Porro non sine mendo in aliquibus *Plinij* codicibus *Epipactis* pro *Epipactis*, & *Emboline* pro *Elleborine* legitur, ut rectè annotat *Gesnerus*. *Galenus* huius mentionem omisit. *Paulus* sua ex *Dioscoride* transcripsit. *Epipactis*, inquit, quæ & Elleborine dicitur. Bibitur ad lethalia medicamenta, & ad hepatis morbos.

Theophrastus lib. 9. cap. 11. vbi de Veratro agit, ad Ellebori albi potionem, ut probè vomitus succedat miscetur, inquit, Elleborines semen. Hæc autem herbula est. *Cornarius* tamen hanc *Theophrasti* Elleborinem, aliam rectè putat ab

ea quam *Dioscorides* etiam *Epipactin* appellari dicit.

Epipactis, *Helieborine*, *Gesnero* incognita herba est, ut fatetur in cat. pl. Idem de *Lunarijs* dicit apud *Dioscoridem* vocem *Bipin* inter spuria mutilam esse pro *Helieborine*. At autem *Plinius* lib. 17. c. 10. ineptissimè *Epipactin* inter arbores, & frutices reponere: commodius autem inter herbas. Ceterum, Elleborinem dictam suspicatur à facilitate vomitoria.

Epipactidis & Elleborines nomine proponuntur sequentes plantæ: *Epipactis* *Matthioli*, quæ commentitia videtur. *Consiligo* seu *Helieb. niger* fil. adulterinus. *Sanicula*. *Damaconium* quorundam. *Gentianella*. *Herniaria*. *Lunaria* botritis. *Albine*.

EPIPACTIS MATTHIOLI.

Si *Epipactis* Elleborine ex eo dicta est, quod *Locus*. Scum *Helieboro* nigro similitudinem habeat, eam equidem crediderim [inquit *Matth.*] in *Gorritenti* agro nasci. Quandoquidem inibi frequens quædam parua herba reperitur, cuius figuram do, quæ folijs floribus & radicibus Elleborum nigrum repræsentat.

Scio *Matthiolum* herbarum cuiusdam, inquit *Gesnerus*, iconem dare cuius folia non absimilia inquit esse Ellebori nigri folijs: sed quis veterum præferim, *Epipactidis* folia Elleboro nigro comparauit: Adde quod neque fruticosa est, quam pingit herba &c.

Lobel. in *Adu. de Epipactide*, contra *Matthiolum* præsertim inter alia hæc scribit: Non inde quia similis foret *Helieboro* videtur *Epipactis* dicta *Helieborine*, sed propterea quod *Helieboris* misceretur, forèq; quasi frænum impressioni vehementissimæ pharmaci *Helieborati*: neque veri *Helieboro* *Dioscorides* similem fecerit constat, in d. ne fecisse quidem. Ea propter quid hic *Commentator* hærioletur, qui volet videat, & rideat &c. Et *Senensis* arbiter decernit nobis *Epipactidem* pictam, nec descriptam: ut solet innumeris locis, ut pote aliunde mutatus nec stirpem conspicatus: ut sicubi fuerit nactus *Brassicæ* aut *Vericæ* describendas, vel alienas inuaserit delinationes, enecat verbis, aut *Crambe* recocta. Sed rariores & cognitu digniores, pictori mandat: & illico elogio illo centies inculcato addit, *Est similis prorsus nullis reclamantibus notis*: (subditque non ad nostram cognitionem, sed ad sui ostentationem, non quidem se scire num *Helieborine* sit: sed tamen *Epipactida* esse ridiculè perinde ac si dicat quis, incertum esse num sit *Helieborum*, sed tamen certum, esse *Veratrum*.)

C. Bauhin apud *Matth.* scribit sibi *Epipactidem* *Matthioli* nondum conspectam. In pin. tamen vocat *Helieborum* nigrum 7. [6. phyt.] siue *Saniculæ* facie: *Epipactidem* *Matthioli* & *Lacunæ*: Elleborinæ, *Matth. H. Lugd.* & *Tabern.* Elleborinem alpinam *Saniculæ* & Ellebori nigri facie, *Lob. Obs.* p. 478. 1c. *Plant.* p. 664. *Helieborinem* *Matthioli* commentitiam *Ad. Clus.* in *Itup.* nomencl. pann. *Helieborine* *Matthioli* dicitur *Sarkokarchina*.

POLYRRHIZOS PLINII DALECHAMPIJ.

CAP. XIII.

Polyrrhizos hæc *Plinij* *Dalechampi*, apud *H. Lugd.* p. 1140. pingitur & sic describitur.

Radice

Gesneri E. pipactis incognita.

Matthioli error.

Synonyma

Descriptio



Radix est multiplici, nigra, caulibus multis, angulosis, palmum altis: *foliis* Myrti paulo obtusioribus, per intervalla geminis: *floribus* pallidis: *semine* in oblongis vasculis: gaudet asperis. A radicum multitudine herbe hunc nomen datum.

Polyrrhizo Plinij hanc congruere autumant, de quo ait: Folia habet Myrti & radices

multas, quæ tuse dantur in vino contra serpentes: profunt & quadrupedibus. H. St. Lugd. aliam habet ibidem Polyrrhizon latifolium Dalechampij, quam Ranunculum montanum album esse suspicantur, de quo H. N. lib. 30.

Cæterum, quid sit Polyrrhizos hæc Plinij Hist. Lugdunensi, ut verum fatear, ignoro. C. Bauh. in pin. querit an sit Elleborus niger & siue Elleborine nigræ species.

Diosc.

STAPHIS AGRIA VETERIBVS.

CAP. XIV.

Staphisagria Dioscoridis *filia* habet veluti Vitis silvestris, *filia*: *cauliculis* rectos, molles, nigros: *floribus* fert latidi similem: *semine* in folliculis viridibus, veluti Cicci, triangulare, asperum ex nigro lobulatum, intus album, gustu acre. Cæterum, ubi flos Glasto similis, non de signa herbe Cæsalpino accipiens videtur, sed de colore, quem Glastum inicit.

Plinius lib. 23. cap. 11. Astaphisagriam & Staphim vocat, quam Vuam taminiam aliqui vocant. Eisd. suum enim genus habet: cauliculis nigra, rectis: foliis Labruteæ: fert folliculos verius quam a. mos, virides, similes Cicci in his nucleum triangulum. Maturis & vindemiâ, nigrescitque, quom Taminia rubens norimus acinos, sciatisque illam in spicis nasci, hanc non nisi in opus: *Hicelle*. Qui sibi in hoc non constat, testis Cornario, quod Staphydem agriam falso vuam taminiam vocari asserit: & quod paulo post de Labrusca dicit: Itaque potius crediderim esse, quam vulgus Vuam taminiam vocat. Nam contra hæc lib. 26. cap. 11. in fine ait Vuam taminiam resistere phibet, si, id est, morbo pediculari, his verbis: Nasuntur in sanguine ipso hominis animalia exesura corpus. Resistitur Væ taminia succo, aut Veratrum oleo perunctis corporibus, Taminia quidem in aceto decocta, etiam vestes eo tadio liberat: Hic itaque Vuam taminiam dixit Staphidem agriam. Nam de hac Staphide silvestri idem tradit Galenus lib. 1. cap. 7. secundum loca. Cornelius autem Celsus lib. 3. cap. 2. Vuam taminiam, *scilicet* dicitur Græcis nominari a peste dicit, quem sanè Plinius refellere voluisse videtur. In Scribonio appellatur Herba pedicularis: in Marcello verere empirico, Peduncularia, eod quod pediculus necat. Officinæ & græcam appellationem retinent, & Pituitariam vocant, itidem ut Plinius priori loco cetero. Sed tamen Pedunculariam potius, quam Pituitariam legendum censer Cornarius. Cur autem non æque Pituitaria, & pituita, quam e capite ducit?

Staphidis agrie si quis grana decem, aut quindecim, trita in aqua multa exhibeat, crassa per vomitus educunt, authore Dioscoride: qui autem hauserunt, obambulare debent: Et diligenter animaduertendum est, ut aqua multa assidue detur, eod quod strangulationis periculum affert, & fauces vrit: Herba ipsa trita & cum oleo illita, ad morbum pedicularem, pruritus & scabiem facit: Communia verò pituitam plurimam ducit: Cum aceto cocta si colluatur os, ad dentium dolores prodest, & gingivas fluidas constringit: feruida oris vlcera sanat cum melle: miscetur & malagmatis feruorem inducentibus.

Astaphidis agrie nucleis ad purgationem vti non censuerit Plinius, idque propter ancipitem strangulationem: nec ad pituitam, oris siccam, fauces enim lædunt. Phthiriasi caput & reliquum corpus liberant triti, facilius admixta Sandarachâ: Item pruritu & psoria. Ad dentium dolores coquantur in aceto, ad aurium vitia, rheumatismos cicatricum, vlcera manantia. Flos tritus in vino contra serpentes bibitur. Semen idem abdicauerit propter nimiam vim ardoris: Quidam eam Pituitariam vocant.

In Plinio in eo quod dixit rheumatismos cicatricum, manifestus error est *ovæ* i. e. cicatrices, pro *ovæ* agnoscente. Dioscorides enim *ovæ* *ovæ* i. e. gingivas fluidas habet: & alioqui cicatricum nulli sunt rheumatismi.

Galeno Astaphis agria acrem vehementer vim habet, ut pituitam de capite ducat, & valde extergeat. Quare etiam ad scabiem commoda est. Participat & vrente quadam facultate.

Apud Hippocratem morbo muliebris. statuitur *ovæ* *ovæ* medicamentum, quod illinatur ad anginam.

STAPHIS AGRIA.

Descriptio



Habet Staphis agria *cauliculis*, cubito altioribus, ceteris in multis ramos diductam: in his *foliis* longis hærentia pediculis, ampla, viriginea, unde tota plantæ nomen comparatum, vel Ricini magnitudine, & diuisura digitatâ, pilosa: *floribus* pediculis frequentibus, tum e foliorum sinu, tum ex caulis

fastigio, tum ex ramis insident, singuli suo, cæculi, e quinque foliolis hirsutis compositi, apicibus & staminibus foliaceis medium tenentibus *semine* rugosum, nigrum, angulosum, vridæ fa-

D d d d 3

*Pedicularia
vera.*



cultatis vi-
statu os incen-
dit.

Hanc sunt
qui veram Pe-
diculariam.
quod sc. pedi-
culos & lendes
enecet, statuat
& eam quæ
Dioscoridi, Pli-
nio, Galeno, &
aliis veteribus
Staphis agria
dicitur, sed cū
descriptione
non planè re-
spondet, inquit
Tragus. Quo-
re dicam eam
Staphidis a-
grias speciem

esse, non ipsam Staphidem. Alij Pituitariam la-
tiuè. *Speichel wurcz* germanicè appellant, quod
commanducata feruore multam pituitam tra-
hat. Ego germanicè *Leusz wurzel*, Pediculariam,
leuszwurder: semen verd, *Meeusz vnn* Pfeffer,
q.e. Piper murum aut glirium appellabo. Porro
alijs *Bismour* germani. etiam vocant: Belgæ
leusz, ruyt, *leuszphadre*, Galli *Herbe aux poux*:
It. *Staphisaria*: H. sp. *Terna pioienta*, *Capard* siue
Fabarez & *Paparraz*: *Terna plothrya*: Angl.
Stenifack.

Synon.

Staphis agria Trago, Matth. Fuchf. Dodon.
Gefn. hort. Lac. Turn. Lob. Adu. Obs. p. 393. Icon.
Plant. pag. 689 [vbi & vitifolia.] H. Lugd. Cæsalp.
Cast. Camer. & C. Bauhino: Pedicularis Cordo in
Diosc.

Quia autem vnanimi consensu præsens planta
Staphidem agriam Dioscoridis esse statuitur, non
abique ratione antiquorum appellationes adscri-
bimus. *Staphis agria* igitur Dioscoridi dicitur:
ἀσάπης ἀγρία Galeno: aliquib. *τρίφυλλον* [Trifolium]
alijs *ἀσάπης* [it. sim] alijs *ἀσάπης* [Astaphida:] alijs
ἐδωδόνιον [Philus octonon, quasi pediculos ene-
cans: alijs *ἐδωδόνιον* [Philonon:] alijs *ἀπαρθρον*
[Apanthronon:] alijs *πολυδής* [Polyides:] alijs
ψευδοπυθής [Pseudopythis:] alijs *ἀρσηνόν* [Arse-
non:] Egyptijs *βισμαρ* [Ibelaoedes] Has appel-
lationes alius discutiendas relinquimus. Astaphi-
sagria, & Staphis Punico: Latinis Herba pedi-
cularis ab effectu, vnde & Pchiroctonum dicta
est, & nunc in Græciis *ἐδωδόνιον* granum pedi-
cularium nominatur.

Locus

Nascitur in opacis. In Istria, inquit Matthi-
olus, Dalmatia, Apulia, & Calabria frequentissima
prouenit. Apud Germanos non nisi in hortis lata
reperitur. Requirit terram cultam & irrigatam,
non nimium soli expolitam, placet meridionalis
umbra: verno tempore feritur, semen colligitur
principio Iulij, iuxta Olinerium de Serres: Do-
donæo tamen semen maturum sit & nigrescit cum
vindemia.

Tempus

RICINVS EX VETERIBVS.

CAP. XIV.

Diosc.

Cici aut Croton [*κίκιν* ἢ *κρότων* *κρότων* quidem
nominat, à Crotonis animalis similitudine.]
aliqui, referente Dioscoride, Sesamum silvestre

[*κρότων* ἢ *κρότων*] alij Seseli Cyprium [*κίκιν* *κρότων*]
appellant. Ricini verd nomen [*κρότων*] accepit à
similitudine quæ est illius semini cum ricino a-
nimali. Arbuscula autem est parvæ Ficus, sive Pla-
tani, at maiore, leuiore & nigriore: ramis, cau-
dicibus quæ cauis in Arundinis modum: *semine*
[altius fructu] in vis asperis, quod decoratum
ricinum animal repræsentat. Ex eo oleum nomi-
ne cicinum [sive ricinum] exprimitur, cibis qui-
dem ineptum ac scdum: sed aliàs lacernis &
emplastris vtile, [Hodie in Officiis non est in
vfu: de eo vide plura apud Diosc. lib. 1. cap. 33. &
apud Plinium lib. 15. cap. 7.] Grana numero tri-
ginta [Math. tria.] purgata & tria pota, pituitam,
bilis, aqua quæ per alium extrahunt, ac vomit-
iones etiam eient. Veruntamen admodum ingra-
ta laboriosa quæ est eiusmodi purgatio: siquidem
valenter stomachum subuertit. Tusa verd & im-
polita eadem varos & vitia cutis à Sole contra-
cta depurgant. At folia cum potentæ polline tri-
ta, oculorum cedemat inflammationis quæ le-
niunt. Eadem seu per se, seu etiam ex aceto illita,
lactis ubertate surgentes mammas cohibent, &
erysipelata extinguunt.

Theophrastus aliarum arborum folia ipsa si-
biplis similia esse dicit, sed Populi, & Hederæ, &
eius, quæ Croton appellatur, dissimilia & figurâ
alterata. In hac enim noua rotunda sunt: veta-
stiora angulosa. Et hæc lib. 1. hist. loquutus, repe-
tit lib. 2. de caus. cap. 22. Foliorum transfiguratio
percipitur in Croton. Nam postquam cum ro-
tundo principio proveniunt, in angulum deinde
se colligunt: quasi formam istam suæ perfectio-
nis demum capere debeat. Quod ita sit, quia res
simplex facilius est, quàm multiformis: & princi-
pium re difficile peragere nequit, quia debile est.

Galeno Ricini semen, quod & purgat, exter-
gendi & discutiendi vim habet. Ita & folium, sed
omnino debilius. Oleum verd ex semine calidi-
us, & magis tenuium partium est, quàm oleum
commune, & propterea discutiendi vi præditum.

Gulland. in epist. ad Andr. Patricium multa
verborum contentione, magna constantia & as-
sensatione irrevocabili tueretur atque defendit,
Ricinum hic à veteribus descriptum esse He-
bræorum *kikajon*, idque etiam contra omnium
interpretum sententiam: atque tum ex Hierony-
mi verbis, tum ex Arabica, Syriaca, & Maurita-
nica dictione comprobet.

Eandem Silipem, quam scilicet Deus Iouis
Prophetæ iuxta Niniven pro umbraculo præpa-
ranit, & quæ subito à verme corrosa est [cuius
forte imaginem fructus adhuc hodie etiam im-
pressam retinet, si opinari haud nefas sit] & col-
lapsa, Ricinum fuisse, Arias Montanus in comm.
suis in Ionam quoque contendit, & *κρότων* He-
bræis dici euidenter ostendit. Idem etiam super
per hac re concludit contra August. & Hierony-
mum Lambert. Dinæus suis in Ionæ c. 4. Comm.
kikajon Ricinum interpretans. Ac eius etiam
meminit I. G. Stuckius l. 3. antiq. conuivial. citans
Leuinum Lemnium cap. 33. de Herb. biblicis, &
Ariam Montanum, eadem cum his docens.

RICINVS VVLGARIS.

Ricinus insigni auctu celeriter adolescit, can-
do crasso, striato, glauco, geniculato, inani,
trium, quatuor & plurium cubitorum, Dodonæo
superius

Descriptio

superius ramoso, ex obscura purpura nimente & glabro; candido videlicet, deterfo, tenui instar farinæ, pulvere, quo veluti conspersus subinde apparet: folia ampla, Cordo Platano & Aceri similia, digitata: in septem, octo, aut nouem, acuminata, serrataque segmenta, in quorum singula neruus è folij centro exprogitur, diuiduntur, atrourentia, splendida & interdum acetabuli instar, concava, porissimum loco quo segmentorum nerui cōcunt, vnde & pediculus auer-



so folio oritur dodrantalis, purpurascens, concavus: quanto autem superiora fuerint folia, tanto etiam ampliora existant, sic ut ex his petalum equatitia sit reperiri, nullum è vulnere lac manantia: flores longâ serie thyrsoeide surculo peculiari racemati insidēt,

è sanguineis, crispisque staminibus, quæ terna è fructus rudimento emicant, conflati: quibus mucicata vascula triquetra succedunt, quæ semina claudunt oblonga, Ricini animalculi æmula, Dod. totis lund: & maculosa, interiore medullâ candidâ, quæ capitulis per maturitatem fissis ac rimas facientibus, cum imperu exilunt: ac præter flores videre est in eodem thyrso muscosa glomerata nucamenta coloris herbacei, quæ nullo relicto fructu tandem marcescunt: radix subest simplex, longâ, crassâ, lutea, candida, crebras circumcinctas fibras emittens.

Bellun. apud Aſic. vocat Cataputiam maiorem, Venetorum vulgi *Mirasol*, & Granum regale quorundam. Bunnelsius Cataputiam arborescentem esse, vel palmam Christi suspicatus est. Tragus, qui huius purgatione non delectatur, Dioscoridis Croton asserit, auctoremque adducit M. Vngilum in Hetruria & Thucia Phaselum Romanum vocari.

Monachi in Mef. dist. 12. cens. 378. Brassanolan admittunt dicentem, interpretem Serapionis errasse interpretando Cheruam esse Cataputiam maiorem: quin ipsum deceptum autumant. Serapioni, inquit, Cherua dicitur Cataputia maior, Mesueo Albemesuch maior: Granum regium: Ricinus, Cici seu Cicum Dioscoridis nonnullis Pentadactylus, Custos horri, Heliotropia, Girasolis, Mirasolis, & Sponsa Solis: Incolis Fieghiera del inferno: Auerihoi & coll. Halbarea.

Σίκι ἢ *ῥότω* Græcis dicitur, Ricinus Latinis, ut Trago, Matth. Fuchs. Dod. Anguill. Cordo in Diole. & hist. Gesn. hort. Lac. Lon. Lobel. Adn. Obl. 392. & 10. Pl. [vbi & Cerua maior, Cataputia maior: Granum regium Mesue] Cæs. Cast. H. Lugd. & Tab. Cici Gesn. hort. Ricinus vulgaris Camer. Ricinus maior Eyst. Ricinus, kerua Tripoli Ranzwolf. Cerua aut Cataputia maior, Frag. Palma Christi Gall. Manus Christi Offici-

narum Corn. Sillotyprum Herodoti Gesn. car. Ricinus i. siue minor C. Bauh. phyt. Eid. pin. Ricinus i. siue vulgaris: Foliis ludit, inquit: quare Theoph. i. hist. cap. 16. [ut iam antè annotatum] Crotonis folia initio cum proueniunt, rotunda sunt deinde in angulos formantur: tanquam perfecte articulata: Ratione loci magnitudine variat: nam hominis crassitudine in Hispania Clusius, & magnas arbores in Creta Bellonius vidit, ut scalis admotis conscendi debeant: ex quo apud Hispanos oleum conficitur, quod oleum Ficus infernalis nominant, Monarde & Fragoto monentibus. Fit etiam in horto Eystettenfimentio Ricini minoris, qui omni ex parte prædicto magnitudine cedit.

Germ. dicitur *vrunderbaum*, siue *vrunderblauum*, *Cereuzbaum*, *Tourekischer hanff* & *Kamshenbanf* ægyptis aliquibus: *Kaonschische Bonen*: vel *Kaonschische Bonen*. Semen ipsum *Zeckenkerne*, Nati Ricinus animal, Cornario perhibente Germanis *Zeck* appellatur. Belg. *vrunderboom*, *Mollencruys*. Gall. *Palme de Christ*. It. *Girasole*, *Mirasole*, aliquib. *Fagiuolo Turcheste*. Hisp. *Figueira del inferno*. Angl. *Palma Christi*: Clus. in stirp. nomencl. pannon. *Sar sin*. Officinis passim Cerua siue Cataputia maior.

In Ægypto sponte nasci author est Matthiolus. Locus & Tempus
Seritur in hortis, cum apud Germanos & Gallos; tum & alibi, non modò ad spectaculum, verum etiam aduerfus talparum iniuriam, quas ferunt Ricinum fugere. Annua verò in Germania stirps est: perficitur eodem quo sata est anno: semen, si Æstas calida fuerit, Autumno maturatur. In calidis regionibus multos restat annos, vbi in maiorem excreuit altitudinem.

Vires & usus ex Dioscoride, Plinio, & Galeno Vires & vsus
priori capite adscripsimus. Eadem ferè de granis istis, quæ Dioscorides, Mesues habet, sed Desis.
quinque aut septem, vel ad summum quindecim numero tantum exhibenda tradit: eademque ex iure veteris galli, colli, iunctorarum, & coxendicis doloribus utilia; & cum aqua casei, vel lacte caprino, hydropicis prodesse. Matthiolus suspicatur in Dioscoridis exemplari subesse mendum. Grana enim triginta seminis non sine periculo vitæ dari posse, nostro iudicio, rectè statuit, Quo sic ut cum Oribasio legat tria grana, non triginta.

RICINVS MAIOR AMERICANVS CVRCAS dictus, & Faba purgatrix Indiarum occiduarum.



Clusius Ricinum Americum sic Descriptio
describit: Hoc Ricini genus, inquit, ego vidi quod ante aliquot annos ex America adferri cepit, vulgari paullo maius, cuius operimentum, seu siliqua illa triangulari, quæ semina continet, tuberculis asperis non est obrita, ut in vulgari; sed

Brassan.
carpant.

Synonyma.

lavis & cinerei coloris. Ipsum granum siue semen vulgari simile, nigrum tamen & non maculosum, vti illud. An arbor quæ Curcas Americorum profert similis sit Ricino in Hispania & Creta prouenienti, planè ignoro, cum qui inde fructum attulisset, arboris formam describere non posset.

Synonima.

Clus. apud Monardem [qui Hispanorum Ficum infernalem, Arborem cum fructu, tum foliis Ricino similem, sed in maiorem altitudinem ob soli vbertatem excrecentem, vocat] Ricinus Americus, & Curcas Americorum, Ricinus Americus Lob. Obser. pag. 391. Icon. Plant. pag. 688. H. Lugd. pag. 1790. Tab. & Ferd. Imperato, qui ab aliquibus Dende falsò existimari refert. C. Bauh. phyt. & pin. Ricinus 2. siue maior Americanus: Camer. Ricinus Syriacus.

Habeo ex dono Illustrissimi mei Principis, à Paludano missum.

Vires & vfas

Mirificà, vt aiunt, purgandi facultate præditi: nam etiam si dimidia tantum vnius grani pars sumatur, valenter supernè & infernè purgare relatum est Clusio. Gelileo, nouæ Hispaniæ prouincia, oleum, seu liquor quidam adfertur, cui Hispani. Oleum Ficus infernalis, nomen indiderunt, eò quod ex arbore Ricino simili elicitur. Eadem verò ratione hoc oleum Indi eliciunt, quam docuit Dioscorides, h. e. contuso semine, deinde in aqua cocto, postremum oleo innatante cochlearibus excepto. Hæc elicientium oleorum ratio è seminibus & fructibus, Indis admodum familiaris est, quippe qui nullam expressionem norint: sed etiam hoc oleum isto modo quàm expressione facilius elicitur.

Oleum

Modi frigid.

Magni viribus pollet, veluti experientiâ & multo eius vfu comprobatum est, cum in India, tum in Hispania. Omnes morbos ab humoribus frigidis prouenientes sanat, omnes tumores dissoluit, statulque discutit, præsertim ventris, eamque ob causam non modò in Anasarca vtile, sed in omnibus hydropis generibus, si, ventre illo inuncto, aliquot guttæ vino aut alio liquore commodo exceptæ sorbeantur: etenim aquas euacuat: quod etiam minore noxa facit clysteribus injectum. Venter frigidis humoribus & flatibus liberat: & coli doloribus vtile, si partes affectæ eo inungantur, & aliquot guttule sumantur. Efficacius subuenit ilei doloribus, vt experientiâ didicit Monardes. Articulorum morbis, à causa non admodum calida natis, auxiliatur, humorem euacuando, si aliquot huius olei guttæ pingui iure gallinæ dissolutæ sumantur. Contractos artus, si eo inungantur, curat, nervos mollit, distendendo, stomachum, vterum, & lienem obstructionibus liberat inunctione. Alium puerorum emollit, illito toto ventre, atque ventris animalia pellit, maximè si eius vna aut altera gutta è lacte aut iure pingui propinentur. Ad ploræ & vlceris capitis manantia valet: confert aurium doloribus, & surditati: omnibus præterea cutis vitis, præsertim faciei: varoque mulieribus plerumque infestis, illitu expurgat.


RICINVS PARVS ORIENTALIS,
Dende dictus, quibusdam
& Faba purgatrix.

Locus

Fructus hic, pro Dende Auicennæ ex Creta delato mihi à Bernh. Paludano, qui est Fabæ

purgantis India Orientalis nomine eundem misit, & ab Ill. Medico à Saxonia, ac etiam fratre C. Bauhino oblatus, est dimidio minor Ricino Americo, cortice tectus cineritio, maculis hinc inde pullis asperso, gibbo, altera parte elatiore, pauloque planiore, tribus interdum eleuatis costis còspicuo: cortici vulgari simili, tenui pellicula inuolutus subest nucleus, bipartitus, consistentiâ Ricini maioris Americi, sed colore pallido: saporis non ingrati, aeris, & fauces diu & multum vellit.

Descriptio



Huius icon exprimitur præcedenti capite in tabella Ricini maioris Americani, loco infimo. Ex aliis eiusdem hic ex Imperato traduntur Icones.

Porro Ricinum paruum Orientalem sic describere videtur Monardes: Fabæ purgatricis, quæ Carthagini & Nominis Dei nascuntur, nostris similes sunt, sed minores, eiusdem cum nostris formæ & coloris, pellicula quadam tenui, vt Ceparum tunica exterior, illas per medium intersecante, quam cum cortice abicienda est, &c. vide inter vires.

Aliquot peregrinos fructus Fabæ purgatiuæ nomine insignitos accepit Clusius:

sed nullus ipsi conspectus est, qui Fabæ purgatiuæ Monardi descriptæ conueniret. Nos contra, nostro Ricino Orientali, & Fabæ purgatrici, siue Dende, has purgatrices subiungimus. Quare lectorum erit iudicare an conueniant, nec ne.

Semen plantæ dictæ Mauritanis Albelmoluck, à Serapione aliisque Arabum antiquis scriptoribus descriptæ sub nomine Dende, hodie apud eandem nationem in frequenti est vfu ad corporum euacuationes. Quia magnam habet similitudinem cum semine Cataputiæ multi idem putarunt cum Ricino Americano quamuis falsò, inquit Imperator. Serapio cæterique Arabes tres species Dende describunt, Chinesem, Indicum, & Saharicum ex quibus Chinoense semen fert crassitudine & similitudine Pistachiorum

Albelmoluck Mauritanorum

rum : Sahaticum magnitudine seminis Cataputiae : Indicum verò mediae proportionis inter illa duo. Idem prae alijs celebrat Chinenſe : Sahaticum verò reſcit propter operationis tarditatem & ſtatu quoſ generat , & alia, grauiſſima ſymptomata quae producit aſſumptum. Repurgari debent ſemina vt idem docet , à cortice extimo, & lingulis interioribus , à quibus maxime periculum imminet. Habent namque vim cauſticam & carnis corrupticem , vt vel ſola maſticatione tactuque labiorum colorem immutent. Vnde mirari ſubit à tam eximie calido pharmaco cauſari poſſe ſtatu. Nos vt non aſſerimus Auicennae Dend ſine Dende noſtro Ricino paruo Orientali conuenire : ita etiam negare nolimus, inter obſcuram & Barbaram eius delineationem. Lectores poterunt apud Auicennam legere, quae ſunt de Dende ſcribit.

Synonyma

C. Bauh. pin. Ricinus 4. ſive Americanus falſo creditus : Dende Serapionis , & Abelmoluch Mauritanorum , Imperato : Serapioni , ſpecies tres ſunt, Seni, Sahati, & Indiat Imperatus legit, Chinenſe , Indianum, & Sahatenſe, minus probatum.

Cautio.

Faba purgatricis tenuis pellicula cum cortice abſcienda eſt ; alioqui tanta vehementia ſuperne & inferne purgant , vt in vitæ diſcrimen ſumentem conſiciat. Aſſandae autem ſunt vt illarum acrimonia infringatur ; deinde in puluerem comminuendae. Datur hic puluis vino aut ſaccharo exceptus : ad cochleare vnum ; deinde hauſtus vini ſumitur. Apud Indos hoc medicamentum celebre eſt ob ſumendi facilitatem : nam ſine moleſtia bilem, pituitam, & craſſos humores , multo lenius & facilius , quàm Nuclei pinet cathartici, Auellanæ purgatrices, & alia id genus medicamenta : Dantur in febribus diuturnis & importunis, in colidoloribus , & articulorum morbis. Doſis eſto aſſarum à quaternario numero ad ſenarium , pluriusve aut pauciorum, pro aegri viribus. Calide in ſecundo, ſiccæ in primo, Fabarum vulgaribus ſimilium, quae vomitum ciunt & aluum valenter purgant meminit Ferd. Lopez de Caſtagneda capit. 78. lib. 7. Hiſt. Indicae.

Vires

Temperam.

ERAVVAY RICINI PVSILLVM GENVS.

Eravvay.

Valichius Syuerttz anno 1599. redemerat de nauis ex America reducibus, Eravvay, Ricini puſillum genus , quale ex Guinea etiam aliquoties aduehi meminit Cluſius in Exot. lib. 2. c. 27. Eo porro nonnullos empiricos aduerſus varios morbos vii. non ſemel obſeruabat etenim quom vehementer purget , ſuccedit illis interdum ex animi ſententia : eam ob cauſam valde commendabant , & tanquam peculiare ſecretum ſibi reſeruabant.

Synonyma.

C. Bauh. pin. Ricinus 3. ſive Americanus minor : Eravvay Cluſ. Exot. lib. 2. cap. 21. & Ricini ſemina exigua, eodem lib. cap. 25. ſub fructu notat. Veer ex ſtatibus melius docet : An Eravvay à Ricini ſeminibus diſtinguitur ?

RICINO SIMILIS FRVCTVS.

Inter exoticos fructus , qui anno à Chriſti natiuitate 1601. ex Orientali India aduecti fuere, praeter eos, quos in certas claſſes diſtribuire poterat , quatuor videbat , qui antè non conſpecti Tom. III.

ipſi fuerant. Horum autem quartus Ricini fructum valde æmulabatur , nam triangularis erat



& in tres cellulas diſtinctus, quarum ſingula ſemen continebant rugoſum , vt antè maturitatem lectus fuiſſe videretur , niſi exterior cortex fuſeus & glaber erat , pendebarque inter quinque foliola longiuscula & latiuscula [quae medium fructum tegebant] è pediculo ſemunciali, ſatis firmo.

Synonyma.

C. Bauh. pin.

Ricinus 5. ſive

Ricino affinis fructus : exoticus fructus 4. Cluſ. exot. lib. 2. cap. 14.

TOXICVM IN GENERE.

CAP. XVI.

Toxicum Dioſcorides in proemio libri ſexti inter ea plantarum ramoſarum herbarumque genera reponit quae exitialem ac maleficam vim ſortita ſunt, quorumque ſæpè continuo vſu homo in perniciem agitur. Conſequenterque quae priuatim Toxico conueniunt auxilia, eiſdem libri capite 10. ſequentibus docet. Toxicum [τοξικόν] ex eo appellatum creditur, quod Barbarorum ſagittae eo illinerentur [Plin. tingerentur.] Qui biberunt haud ita multo poſt labiorum & linguae inflammatione prehendantur, iſſque furor mentis incoercitus varias imagines obuerſat : quare vix medicinae locus eſt , raroque qui hauſerunt, incolumes euadere contingit. Vinculis atamen cohibendi , vt vinum dulce [Ald. paſſum] cum roſaceo bibere , protinuſque remouere, ac Rapi quoque ſemen ex vino haurire cogantur. Priuatim verò iſis conuenit Quinquefolij radix, itemque hircinus ſanguis, aut caprilus eodem modo ſumptus : proſicit & Roboris, Fagi, aut Illici cortex cum lacte tritus. Proſunt etiam Mala cotonea in cibo ſumpta , aut trita [non habet Ald.] cum Pulegio & aqua bibita. Amomum denique bene facit, vt & Baſſami ſemen [βαλάνιον καρπός. Vet. tamen καρπός ὁμίου λαμβάνεται, i. e. fructus ſimiliter ſumptus] ex vino. Quod ſi qui periculis deſuncti ſunt, longo tamen tempore in ſtratis decumbunt , ac vbi ſurrexerint, ſui impotes ac velut attoniti [ἰστανόμενοι.] Manardus legendum cenſet ἰσθμίου, i. e. tabeſcenti. Et tale quid etiam habet Auicennas cap. de Napello, qui Toxicum eſſe videtur, Sarac.] reliquum vitæ tempus tranſigunt. Et hæc Dioſcoridis de Toxico verba reſert etiam P. Aegineta lib. 5. cap. 54. Quin & Acrius tetr. 4. ſerm. 1. cap. 70. ſerè eadem cum Dioſcoride habet, inter alia, alexipharmacum, corticem quercinum commemorans tantum. Cùm tamen, teſte etiam Galeo lib. 2. de antid. cap. 7. ſi quis Toxicum ebiberit, auxilium quoque aſſerat vinum dulce, oleum ro- Eccc

larum, sanguis caprinus, semen Napi contusum ex vino, Polygoni succus. Plantaginifve, aut Origani, vel Thymietiam aliquantulum vino admistum.

*Tuffon cor-
rupte Anic.* Signa porro quæ ab Auicenna [qui lib. 4. fen. 6. cr. 1. summa 2. cap. 29. nominat corrupto vocabulo Tuffon.] ponuntur in eo qui hauserit Napellum, sunt eadem his quæ hic à Dioscoride & Paulo scribuntur in iis, qui Toxicum biberint.

Vtrum autem Toxicum frequenter nominatum à scriptoribus, sit reponendum inter Aconitigena, nunc deceptendum est. Promotus Græcus fuit huius sententiæ Toxicum fuisse non simplex genus stirpis, sed venenum quoddam compositum. Sed Mercurialis de venen. lib. 2. cap. 10. putat Toxicum, neque fuisse apud veteres vllum genus stirpis venenatæ, neque medicamenti venenati composiri. Sed appellatum fuisse Toxicum omne veneni genus, quo tela & sagittæ venenabantur, quæ à Græcis vocantur *τοξικα* seu *τοξικατα*. Vnde cum inueniatur [apud Virgilium *Æneid.* 9.

Vngere tela manu, ferrumque armare veneno.
Itemque apud Ovid. lib. Trist. 4.

Nam volucri ferro tinctile virus inest.]

Veteres consueuisse tingere sagittas Napellos, Aconito, Pardalanche, Elleboro, & plerisque alijs succis vene ratis, cum simplicibus, cum mixtis, sit ut putet, omnia hæc & potuisse & posse hoc tempore appellari toxica, scilicet à sagittis, quæ tinguntur ipsis.

*Coria vene-
ni species.* Gorrh. defin. *τοξικόν* apud Antiquos certam quandam speciem veneni terribissimi fuisse concedit quidem, nec tamen quid esset constare arbitratur. Plinius cum scribit auctores esse qui à Taxo arbore toxica denominent venena, merito controuertitur. Sunt enim hæc duo genera venenorum manifestò distincta apud Nicandrum & Dioscoridem, sunt que tam sibi aduersa virisque symptomata, ut iure dubitare liceat. Taxus vniuerso corpori frigus infert, &c. Toxicum verò inflammationes & furorem. Toxicum porro, ut diximus, inter herbas exitiosas cum Taxo lapararum nominatur & describitur.

*contra Pli-
nium*

Apud Galenum lib. de Ther. ad Pisonem cap. 10 scripta est quedam historia Helenij, qua videtur existimasse Helenium esse venenum, quo tingebantur sagittæ, & quia certum est apud stirpium scriptores Helenium non fuisse, neque esse venenum, sed herbam quandam aliam ab Helena reperiã, Lal. Scaliger in comm. ad librum Aristotelis de plantis putat locum illum Galeni ita esse corrigendum, ut loco Helenij scribatur Velenium, sc. *ἀπὸ τοῦ ἑλέαν*, h. e. ab armis, & sagittis, quasi eo in loco vsus sit hac voce populari & romana, quæ idem significat, quod sonat apud Græcos vox *Τόξικι*. Et certe hæc coniectura Hier. Mercuriali non displicet, et si enim huiusmodi vox, nimirum Velenium, non reperitur apud scriptores Græcos, nihil refert, quia vox est materna populi Romani, & Galenus solet interdum vsurpare huiusmodi voces, quemadmodum 7. m. m. nominat decoctam, quæ vox erat non græca, sed populi Romani.

Velenium

Toxico veneno, seu ante obiter insinuatum est, venena cuncta, quibus sagittæ tinguntur, generali appellatione denotantur. Huiusmodi sunt [stirpes intelligimus] Aconitum, Napellus, Taxus, Dorycnium, Sardoa herba, Cicuta, &c. Ladanium etiam quod in Syria atque Africa sit, auctore Plinio, Toxicon vocatur.

ACONITVM IN GENERE.

C A P. XVI.

IN Aconiti historia tradenda eum obseruamus Iordinem, quo ipsemet auctor it nobis delineandum proposuit.

Aconitum igitur iuxta Theophrasti auctoritatem, in Creta atque Zacyntho, sed plurimum, optimumque in Heraclia Ponti. *Folium* habet Cichoria simile [*αἰχμαῖδης* : sed fortasse legendum cum Dodonæo *βατραχίωδης* : Gesnerus autem *πλατύνωδης* legit : quod & Dioscorides Platani folium ei tribuat, & ipse eã facie Lupariam suam, cuius flores esse ait, mouerit.] *Radix* figura coloreque Nuci [*καρυφῆ* ita Gesn. cum Gaza vertit, aut etiam *καρυφῆ*, i. e. aridæ ficui Dod. addit : sed neutrum legendum, quin potius *καρδῆ*, i. e. Squillæ :] similem, & vim in hac lethalem : folium autem & fructum nihil facere aiunt : *fructus* est herba, non humilis materiæ, brevis est herba & nihil superuacui habens, sed frumento similis : [ita Gaza. Alius sic. Herba autem semen est, non furculosæ materiæ. Brevis tamen herba ipsa nequequam egregium habens [hæc omittit Dod.] Tritico similis. Cæterum, *καρδῆ*, nihil egregium, vel eximium, vertit quoque Marcellus, & probat Gesnerus : quasi dicatur, etsi maximè venenosum sit Aconitum, & miris facultatibus præditum, nihil tamen herba ipsa insigne habet, aut admiratione dignum, nisi radicem fortassis.] non tamen semen illi spiccum [semen tamen in spica non habet, Gesn. Matthioli nescio quomodo negationem non vidit, & semen in spica, velut frumentum habere falsò scripsit.] nascitur ubique, & non in Aconis solum, à quibus habet nomenclaturam. Est autem vicus in Periadynorum [Dodonæo attestante, alij rectius Mariandynorum legunt. Theophrastus, inquit Gesn. de Lupo, loquitur de secundo Dioscoridis Aconitigena. Non Periadynorum, ut græcè & latine legitur, & à Marcello aliisque citatur, sed Mariandynorum legendum est : sunt enim Mariandyni populi vicini Paphlagoniæ, ut Dionys. Afæ scribit, & eius interpretes Eustathius, &c.] agro. Amat maximè locos petrosos. Non vescitur eo ouis, neque vllum aliud animal. Componi id quodammodò ferunt ad operandum, & hoc non cuiusvis esse [Gaza, confici ad officendum modo quodam enarrant, nec nosse quemque.] Et ideo Medicos componendi ignaros pro corrodeute vti. Et si ad alia quædam bibatur, nulum sui sensum inducere, neque in vino, neque in aqua mulsâ. Componi autem ita ferunt, ut certis occidere temporibus possit, videlicet duobus, aut tribus, aut sex mensibus, item anno : nonnullos etiam duobus annis elapsis. Pessimè verò illos de vita decedere volunt, quibus plurimo tempore corpus consumitur ; facillimè quibus statim [qui plurimum temporis resistere possint, quod paulatim tabescat corpus & languore pereat diuturno ; facillimè illos, qui confestim obeunt, Gaza.] Nullum autem aliud pharmacum repperit esse, quod nasceretur, sed quædam auxilia his qui illud ingererunt, excogitata esse. [Remedium nusquam esse compertum, sed falsò dici quoddam aliud resistens illi adhiberi, Gaza.] Nam incolæ seruasse quosdam non herba, sed melle & vino & quibusdam eiusmodi : atque id ratò factum, summaque difficultate. Aconitum verò inutile ijs esse qui præparare ignorent, nec licitum

*Theoph.
Locat.*

*Matth. loc.
psu.*

*Theoph. cor-
rigit.*

*Lap/m qui-
rundam.*

licitum possidere, sed capitalem poenam institutam. Temporis differentiam pro collectionis ratione sequi autumant, mortes collectuum temporibus cōpares euenire. *Hallenus Theophrastus de Aconito*. Ea autem neque Plinius, neque Dioscorides de posteriore Aconito habet: vno excepto, inquit Cornarius, quod Dioscorides etiam radices *πλακτίναις καϊδόν* comparauit, id est cirris Squillarum. Quinquam in Theophrasto non *καϊδόν* sed *καϊδόν* legatur, & Nuci, non Squillæ Gaza verterit.

De Nepæ [ita Gaza malè *καϊδόν* reddit] vocatur radice, quàm 9. hist. c. 14. figura scorpioni similem ait, vtilemque ad eius ictum, sub Telyphono, planta diuersa a Scorpio spinoso, cap. 19. sequentibus agit. Telyphonon aliqui Scorpionem vocant, eò quod radice[m] similem scorpioni habet: hoc super scorpionem d. rasum, ipsum occidit. Si verò quis veratrum album inspergat, rursus resurgere dicunt. Interiunt & boues & iumenta, & oves, & in summa omnes quadrupedes eodem die, si radix aut solum in pudenta ponatur. Vtile verò est ad scorpionis plagam potum. Folium habet simile Cyclamini: radicem, velut dictum est, scorpioni similem. Nascitur velut Gramen, & genicula habet: amat loca vmbrosa. Si autem vera sunt quæ de scorpionibus dicuntur, iam etiam alia huiusmodi non incredibilia existunt.

Dioscorides duo ponit Aconiti summa genera. Vnum, quod aliqui Pardalianches, alij Cammaron, alij Thelyphonon: alij Myoctonon, alij Therophonon [Ruell. Theriophonon] vocant, & folia habet tria aut quatuor, similia Cyclamini, aut Cucumeri [Cucur. Marc. Cucumeri filu.] sed minora [*μικρότερα*: nam perperâ legunt Dioscoridis exemplaria *μακρότερα*, Dod] & subaspera [*συντραχία*, quidam veniunt subhirsuta. Marcell.] caulem palmi altitudine: radicem similem scorpionis caudæ, Alabastrum modo splendentem. Hæc scorpioni admodum, resoluere ipsum dicitur: excitari autem iussus Veratrum apposito. Ammiscetur & ocularibus dolorem eximentibus compositionibus. Occidit & pantheras, & lupos, & omnes feras, carnibus inditum & obiectum. Aconitum alterum [iuxta Gelsnerum qui se etæanea retinet] sunt qui Cynoctonon, qui Lycoctonon, qui Cyanon leucon, Romani Colomestrum appellant. Huius tria genera sunt: vnum quo venatores, duo quibus Medici vtuntur. Ex his rectius, quod Ponticum plurimum in Italiæ Iustini montibus nascitur, ante dicto [Gelsnero altero, quo Medici vtuntur, quod non descripsit, vt neque venenatorium] efficacius: Platani folia habet, sed magis incisa [Gelsner. *μειονίσια χυλίσια*, pluribus quàm Platanus incisuris diuisa, Marcell. & Ruellius: sed licet etiam profundiores non crebriores incisuras accipere:] multoque longiora [Gelsn. Ruellius & Matthioli, qui *μικρότερα* legerunt: breuiora, Marcellus qui *μικρότερα* legit: quam vocem commodius fortè latine reddas minora vel angustiora] & nigriora: caulem instar pediculi in Filice, glabrum, altitudine cubitali, & aliquando maiore: semen in siliquis quadrantenus oblongis, radices cirris marinarum Squillarum similes & nigras: quibus ad venationem luporum vtuntur, crudis eas carnibus imponentes: quæ in cibo ab illis sumptæ eos cecant: *Hæc Dioscorides*. Hic tamen dissimulandum non est, verba illa, Huius tria genera, &c. in vulgaris codicibus

Tom. III.

Græcis exarata non esse, sed statim huius Aconiti nominibus, natalem & descriptionem subiungi, sine vlla generum distinctione: quæ nec in Orbasio reperias, & Marcell. vt spuria respuit.

Sed antiquorum inquit lib. 27. cap. 2. Plinius, curam diuigentiamque quis possit satis venerari, cum constet omnium venenorum ocysimum esse Aconitum, & tactis quoque genitalibus feminini sexus animalium eodem die inferre mortem. Hoc fuit venenum, quo interemptas dormientes a Calphurnio Bestia uxoris M. Cæcilius accusator obicit. Hinc illa atrox peroratio, eius in digito mortuas. Fabulæ narratur de spumis Cerberæ canis, extrahente ab inferis Hercule: ideoque apud Heracleam Ponticam, vbi monstratur eius ad inferos aditus, gignit. Hoc tamen in vsus humanos verè e scorpionum ictibus aduersari experiendo, datum in vino calido. Ea est natura vt hominem occidat, nisi inueniet quod in homine perimat. Cum eo scilicet colluctatur, velut pari iussu inuenio. Sola hæc pugna est, quum ver enim in visceribus reperit: nunquam, exitia per se anibo quum sint, diu venena in homine commorantur, vt homo supersit. Et paulò post: Torpescunt scorpiones Aconiti tactu, Rupentque pallentes & vincti se conuertunt. Auxiliatur his Elleberum album, tactu resoluente: reditque Aconitum duobus malis, suo & omnium. [Locum hunc esse corruptum, nemo huc usque animaduertit: Cum tamen non facile possit intelligi, quomodo Aconitum duobus malis cedat, suo scilicet & omnium: nec verus codex ita habet: fortè legendum ita: Ceditque Aconitum duobus malis suo dominio, proclui lapu vocis Dominio in voces & omnium.] Et rursus: Tangunt carnes Aconito, necantque gustu earum pantheras, nisi hoc fieret, repleturas illos sitis. Ob id quidam Pardalianches appellauere. At illas statim liberari morte, ex ore enim eorum heminis gustu, demonstratum. Quod certè casu reperiunt quis dubitet? & quoties fiat etiam in nunc vt nonum nasci, quoniam feris ratio & vsus inter se tradi non possit. Putandumque rursus, omnia animalia, quæ sint saluaria ipsis noisse, præter hominem. Sed maiores oculorum quoque medicamentis Aconitum miseri, saluberrimè promulgare, apertâ professione malum quiddam nullum esse, sine aliquo bono. Fas ergo nobis erit, qui nulla diximus venena, monstrare quale sit Aconitum, vel deprehendendi gratia. Folia habet Cyclamini aut Cucumeris, non plura quatuor, ab radice tenner hirsuta [Plinius legisse videtur *συντραχία*, pro *συντραχία*, subaspera, Dal.] Radicem modicam, cammato similem marino: Quare quidam Cammaron appellauere, alij Thelyphonon, ex qua diximus causa. Radix incuruatur paulum, Scorpionum modo, quare & Scorpion aliqui appellauere. Nec desinere, qui Myoctonon appellare mallent, quoniam procul è longinquo odore mures necat. Nascitur in nudis castris, quas aconas [*ἀκόνια* saxa ne pulvere quidem tecta, *ἀκόνια* cotes, Dal.] nominant. Et ideo Aconitum aliqui dixere, nullo iuxta, ne pulvere quidem nutriente. Hanc aliqui rationem nominis attulerunt. Alij, quoniam vis eadem in morte esset, quæ conbus ad ferri aciem deterendam, statimque ad mora velocitas leniretur. *Huc usque Plinius*, qui de vno & priore Dioscoridis Aconito scribit variegatius quàm ille, eadem omnia tradens, & plura insuper ad-

Eccc 2

dens. De posteriore Dioscoridis Aconito, velut sibi ignoto, penitus silet: Theoph. seorsim de Thelyphono agit, & seorsim de Aconito, velut ab illo diuerso. Quæ autem de Thelyphono prodidit, ea omnia, inquit Cornarius, ad prius Dioscoridis Aconiti genus pertinent, velut etiam Plinius transcripsit.

Aconiti sumpti signa

Porro de Aconito hæc passim apud Plinium leguntur. Pantheras perfricatâ carne Aconito Barbari venantur: occupat ilicò fauces earum angor, quare Pardalianches appellauere quidam, &c. Aconitum statim in lingua inter bibendum, cum adstrictione quadam dulcescit, & subinde, potissimum cum qui biberunt, exurgere conantur, vertigines effundit: lachrymas ciet: grauitatem pectori & præcordijs adfert, simulque crebri spiritus distillantur. Oleum balsaminum aduersatur Aconito ex lacte potum, ex Heraclide verò Eryngion in iure asperis decocta: Omasi item ius, ac vitulinum seuum, & castores ex lacte, aut aqua. *Hæc ille.*

Ceterum, Panthera cum Pardalianches venenum ederet, stercois hominis quærit: eo enim ipse iuuatur. Quocirca venatores stercois sibi propinquum suspendunt ex arbore aliqua, ne procul bellua abeat, petens suum medicamentum. Itaque insiliens ibidem, & spe capiendi perseuerans, in se efferranda emoritur.

Locus

Hoc Acheronea littora gignunt, authore Nicandro in Alex. pharmacis, vbi vorago irremediabilis inferni, & vrbes Priolai subuerse resonant. Cuius omnes dentes, & superius palatum, gingiuaque adstringit amarus potus. Circa verò prima voluitur pectora malo errore grauians, Viri cor conscendens. Calamitate verò mordet summum ventris limi, non clausum attollens os ventriculi. Porro autem obstruit principia, primùm colli. Vbi omnis mortalium confestim inuehitur cibus. Sempet verò ex luminibus humidis substillat sudor. Ipse verò ventriculus turbatus [inflatus] sursum quidem eructat spiritus: plurimi verò intus supra medium umbilicum flatus sedent. In capite verò onus inimicum, sub temporibus verò palpitatio densa [crebra] inseritur. Duplicia videntur oculis, qualia meraco noctu domiti vino &c. [tradit verò & ipse Nicander hausti Aconiti remedia: quæ apud eum videnda relinquimus, ea in genere tum ex eo tum ex alijs dilucidius tradituri.] Idæ in conuallibus, Phalacris saltibus foeminas necans, & Cammorum. In cautibus verò foeminam Aconitum producit in cacuminibus. Hæc Nicandri verba Diphilus ita interpretatur. Aconitum ex vomitu aiant factum. Est verò plantæ radícula, similis Gramini, cuius potio amara cum sit, os quidem omne constringit: cor autem mordet. Spiritum verò ob refrigerationem pulmonis præcidit, singultus crebros perficiens. Ideo etiam stomachum continuò se mouentem impediens claudit. Ventrem verò flatibus implet & colon. Temporibus verò palpitationem exhibens, & capiti onus, & membris sudores dementes facit & debiles. Aconitum species plantæ est, quod vocant ex accidente Pardalianches, quoddam pereat ab ipso Pardalis. Ille verò remedium habet humanum stercois. Et non prius comedunt illud [scilicet Aconitum] pardales, nisi habeant stercois vicinum, ut statim offendant auxilium. Pastores igitur oletum suspendunt in arbore. Deinde postquam comederint pardales Aconitum & impetum faciunt in stercois, retrahunt verò illud pastores, & circumflicentes moriuntur.

Valerius

Memorat Aristoteles de animal. Aconitum ex vomitu Cerberi apparuisse. Recensetur enim Cerberum ex inferis emersisse, cumque non posset sustinere Solis radios, euomuisse, & ex ipsius vomitu hanc natam esse plantam. Acheron autem esse fluuius in Heraclea Ponti, vbi infernalem canem Hercules eduxit. Hæc inter alia Diphilus Nicandri explicaturus sententiam tradit.

Galeno 6. simpl. septice & deleteria facultatis est. Aconitum itaque in cibo, potuque fungiendum: attamen ad putrefaciendum quædam extra os & sedem aptum est: herba autem radix ad hæc est vilis. Est & Aconitum lycostonum similis alteri facultatis, sed peculiariter lupos interficat, sicut illud pardos. Idem ad Paterniacum Aconitum herbula est, quæ folia habet à sua radice duo vel tria similia Cucumeri, & thyrsolum non alium, radicem oblongam, & ad vnum magis tenuiorem & minutiorem: Speciem & colores ad similitudinem scorpionis pusilli sunt pediculis. Vires autem habet quasi Thapsia, & valde venenosa dicitur.

De duobus Aconiti generibus Auicenna Galenum securus sub nomine strangulatoris adib, id est Lupi, & strangulatoris Leopardi, seorsim à Napello tractauit.

Auicenna

Ætius terr. l. 1. Aconitum pardalianches simile facit Scridi siluestri, eademque quæ Galenus de simpl. ei adscribit, habet. Tetr. verò 4. sect. 1. cap. 39. eius recenset Symptomata & remedia. Facit, inquit contra assumptum Aconitum ius Pulli gallinacei, ut & vitulinum pingue ius potatum & vomitu reiectum. Maxime verò propriè Truxago potata, & Castorium, & Iris & Ruta. Quamquam aliqui à nullo horum se auxilium sensisse asserant.

Ætius

Diogenes Laert. lib. 5. de Aristotelis vita & genis, refert eum ex Aconito hausto mortuum esse septuagesimo ætatis anno. In enim autem hoc scripsit epigramma:

Aconiti potio Aristoteli

*Nuper Aristotelem, lasa vi pietate nocentem
Deiuli Eurymedon sacrificus (crevis:
Ille Aconita bibens subterfugit: cecidit Aconiti
Hoc erat iniustum vincere sacrificum.*

Theopompus Hist. scribit Agatarchum tyrannum multos Aconiti veneno sustulisse, conatumque esse latere: verò detectâ, plethosque Heracleoratum non antè domo egressos, quàm Rutam edissent: Diodorus verò Siculus lib. 4. de antiquor. gestis, refert Hecateon foeminam omnium primam Aconitum inuocasse, quæ scilicet ad venena mortifera conficienda summum studium operamque impendisset.

Tempor.

Aconiti genere duplex esse statuit Gortianus: Vnum cui folia Cucumeris (specie, minora tamen & subhirsuta: alterius tria facit genera, &c. Ceterum, cuiusnam temperamenti sit Aconitum, nondum à Medicis definitum esse ait: humidum & frigidum statuens, ac non illis, sed totius substantiæ qualitatibus deleterium. Contrà verò, Gortianum carpens, calidum & humidum, vepote, septicum, statuit Mercurialis, eo fundamento, quod Galeno & Auicenna dictantibus calida & humida sunt Septica omnia, seu pu reficientia venena. Quod etiam Plinius dixit Aconitum esse omnium venenorum ocissimum, fallum esse ita contendit Mercurialis. Si veteres cognouissent venena reperi quæ hodie habentur & præsertim in regionibus Indicis & Mauritanis, dixissent mul. d acutiora & celeriora Aconito haberi. Planta hæc neque folio quicquam nocet, sed tantummodò succo radices, ut apud Theophrastum

Num quidam aiunt. Cur autem potius in radice venenum hæc planta gerat, quam in folio, vel in fructu, puto ego nullam potius posse assignari causam: quam proprietatem specificam ipsius. Nicander unum genus Aconiti videtur proposuisse: Dioscorides duo fecit: sunt quæ tria, & recentiores inuenerunt quoque nouem genera, inter quæ adnumerant Napellum, celeberrimum venenum, ad id quod quæcunque de Aconito dicuntur, possint quoque referri ad ipsum Napellum, &c.

Diost. vii.
à Matth.

Dioscoridi duo, inquit Matthiolus, produntur Aconiti genera, quorum postremum triplici distinguit differentia. Primum, quod pardos enecat, Pardalianchen: alterum verò quod canes luposque conficiat, Cynoctonon, Lycoctononque vocari ait. Hoc (ut diximus, in tria genera distribuit: verumtamen postremum tantum describens, duorum priorum historiam, & vires silentio præterit. Quo fit ut Hermolai & Marcelli sententiam probandam putet Matthiolus: qui non temere quidem suspicantur, in altero capite plura desiderari, quibus & priorum historia, & quoniam pacto rum Medici, tum venatores, his antiquis vterentur, palam fieret.

Considerandum an Lacuna in Dioscor. bene attribuat Aconito nomen Vux versæ, & Vux lupicæ.

Ex veterum autem sententia sic inter Aconita distinguit Dodonæus: Dicitur Græcis ἀκόνιτον παρδαλιανχόν: item & κυνοκτόνον, λυκοκτόνον, & θηροκτόνον. Theophrastus tamen de Aconito, Myophono & Telyphono [quod Aconito Pardalianchi Dioscoridis respondet] seorsum egit. Existimat Marcellus, quæ de primo Aconito & altero traduntur, spuria esse, & vnicum tantum à Dioscoride describi, quod videlicet plurimum in Iustinis gignitur montibus. Is olim [Dodonæus] dicebat in hist. gall. folia subhisura, similia Cucumeri silvestri, ut ait Dioscorides, minora tamen: in postremis tamen: quia Doronicum, Aconitum existimat, dicit Cyclamini ampliora, ad Cucumeris magis accedentia, minora: suspicor enim intelligere Cucumerem sativum.

Ceterum, nomen Aconito ab ipsis cauitibus præruptis & laxolis locis esse, quæ Græcis ἀκόνις dicuntur, præter Theophrastum & Plinium, sentit quoque Ovidius Metamorph. 7. his versibus:

*Quæ quia nascuntur durâ vinacia cote
Ægrestes Aconita vocant.*

Natales &
Epitheta.

Auson. in c. idyll. 12. monosyllaborum tantum in sine positum:

Asperget cautes, & dira Aconita creat eos.

Pallida, etiam, Nigra, Virola, & Stygia dicuntur potius Aconita, ut & Lurida, vnde Ouid. Metamorph. 13.

Lurida terribiles nascunt Aconita nouerca.

Mythologia
alia
vires.

Sed aprior, inquit Aduersaria, fuerit Aconiti nomenclaturæ interpretatio, si eam ab herba succo, vel radice, quibus quasi cote spicula à venatoribus afficta & subacta celerius subirent, & perniciem afficerent, quam si à cauitibus, aut à pago cognomine deducas: tamen si possit etiam à τὸ ἀκόντιον deduci. Eustatius in Dionis. Afrum scribens, Aconitum sonare putat inexpugnabile venenum. Xenophon sanè in libro de venat. ἀκόντιον φάρμακον, hoc est, Aconiticum venenum, nominat, pro quo apud Helychium & Varium non rectè ἀκόντιον legitur, ut testatur Gesn. de lupo. Cammaron appellatum esse testat Agricola, quod malo fato & malo interitu occidat.

Tom. III.

In insula Ceo Menander scribit lege sancitum fuisse, ne turpiter viverent, qui bene vivere non possent: nempe ut essent capularésque senes Aconito vitam finirent, ne reliquis alimentum deesset.

Lex. de iud.
flanda.

Ex hæcenus dictis certè constat Aconitum plurimum stirpium vnum fuisse nomen, quæ inter multas lethales conspersionem esset celerissimam & certissimam mortem adferre: de quibus quia veteres succinctè nimis, atque minùs apertè scripserunt, factum est, ut alij atque alij Aconita alia atque alia statuerint. Aconitum autem dici posse omnem herbam venenosam, Syluaticus & alij quidam huius farinae stultè persuasi sunt.

Equiuocè

Infelicitatem Matthioli de primo suo Aconito mox demonstrabimus.

Ceterum inter Aconita recensentur sequentes Aconiti species, aliaque plantæ: Thora Valdensis, Herba paris, à Fuchio malè. Doronica. Petasites alba. Luparia. Ranunc. fl. in medio folio. Acon. lycoct. siliquosum. Dentaria. Hecateis Ouidij. Aconitum magnum purpureo flore, vulgo Napellus. Aconitum Napello simile sed minus, ceruleum, præcocius. Aconitum, lycoctonum autumnale Napello simile. Aconitum lycoctonum cum magno calcari, ceruleum. Aconitum Napello simile flore, purpureo Neubergerse, foliis latioribus. Aconitum lycoctonum Lynceanum Napello simile. Aconitum coma mutante, maximum. Aconitum 4. Matthioli, fortè Delphinij flore. Aconitum, lycoctonum flore Delphinij. Aconitum, lycoctonum flore maximo. Aconitum lycoctonum radice bulbosâ, flore ceruleo, siue galea elatiori. Aconitum saluiferum, vocant Antitoram flore luteo Aconiti. Aconitum racemosum, à cæca quibusdam. Elleb. niger. Iris silvestris. Ephemerum. Ranunc. fl. globoso, siue Trollius flos.

ACONITVM PRIMVM MATTHIOLI folius Doronici.

Aconiti primum genus Thelyphorum appellatum græcè ἀκόνιτον παρδαλιανχόν, Ital. Aconita pardalianche. germ. vvolffs beer & Dolvenne. Hisp. Cefnelba, gall. Herbe de la tora. scriptis legi [inquit Matthiol. in comm. impr. anno 1554.] in Tridentinis montibus. Huius generis est & illud, quo vinctur quidam in Romano & Neapolitano agro, lupis eo tantum eadem procurantes. Radices eius pluries venales vidi Romæ in aurelio ponte iuxta molem adriani: quandoquidem non desunt, qui eas expetant ad mures, canes & lupos enecandos. Hæc ille, dans iconem sine descriptione, in qua deest flos: radix autem sine vllis fibris aliquomodo exprimit caudam scorpionis: videtur autem nobis fictitia: folia quaternæ accedunt ad Doronicum vulgare. In editione anni 1559. prædicta repetit, nihil addens, præter appendicem, in qua inuehitur in Gesnerum, qui existimat & scripserit imaginem esse fictitiam, allegans pro teste, contra Gesnerum, suum pictorem, & alios: Sed ipsemet si vidit plantam integram, cur non descripsit ante quinque annos, aut nunc saltem describit, accersit ex Frid. montibus vel Roma, ubi venalem (si fas est ei credere) pluries vidit, vel Neapol. agro. Si misisset aliquam radicem Gesnero, melius conlulisset suo honori, quam temerè de bacchando in tam modestum virum, veritatis studiosissimum. Si radices venales Romæ, &

Aconitum

Locks

Eccc 3

Contra no-
mina.
Matthioli
in Hæstia.

us earum sit in Romano & Neapolitano agro, procul dubio suum habebat nomen Italicum, quod reticendum haud erat. In Hist. germ. impressa anno 1593. hæc habet: Aconitum pardalianches noui scriptores nunquam cognouerunt: ego autem primus reperi non longe à Tidento in monte vallis Ananix: ne quis paret me fabulari, ostendi, &c. Aconitum quod Matthiolus primò inuenit, totum eradicaui, vt nullus hæcenus simile potuerit reperire. Ei in Editione anni 1571. folia maiora quàm sunt cucumeris tribuit, quæ olim in prioribus editionibus minora Cucumerinis vixerat. Tanta est huius planta cognitio apud Matthiolum.

Lacuna not.

Lacuna in Diosc. Aconiti primi Matthioli foliam effigiem habet, & præter veritatem dicit bene cognitam in Italia. Dodon. verò Gall. Aconiti Pardalianch. Matthioli eandem cum eo dat Iconem, nec aliam se dare posse scribit, eò quod in Belgicis regionibus non proueniat, quæ excusatio an sufficiens sit, iudicent alii.

Sed & Clusius in fine historix Dodonæ eam plantam, quam Matthiolus pro Aconito pingit, fictitiam dicit. Quare constanter adhuc crediderimus, Fuchium & Marantham sequuti, folia quæ pingit Matthiolus, esse Doronici vulgò dicti.

Matthioli verò defensionem suscepit author H. Lugdunensis in Append. pag. 16. Eius picturam & verissimam & certissimam asserens, sed mutilam & radice tantum picta cum foliis: ac se integram nactum plantam à Sepiasario quodam in cuius horro mulæ extiterint. Nasci verò in Allobrogibus in arduo & confragoso monte dicto les Eschelles. Quis autem quæso non miretur hominis impudentiam & temeritatem? Si vidit Aconiti Matthioli integram plantam, tantopere à Gesnero & Guilandino, aliisque pluribus expectam, & quæ nunquam potuit integra à Matth. demonstrari: cur non reposuit & misit doctis Viris, ac pingi curauit, non emendicans folia Doronici Matthioli cum eius radice ficta, cuius ipsemet Matthiolus petasus, postea eam mutauit, non tamen restituta meliore: cur appingit ei præter mentem Matthioli flores Petasidis flore albo. An non videt ille stultus, florem quem describit, non respondere Matthioli dictis, qui in vno loco scripsit flores Chrysanthemo similes esse: & in alio dicit, caulem edere hirsutum, florem videre non licuisse, verum (si sua non fallat opinio) Doronici æmulum illum esse se existimare. Quid blaterat mendax impostor de radice simili æmulæ scorpionum quam nunquam vidit in planta. quam describit, diuersa admodum à Matthiolina, Icon quam proponit, magis est falsa, quàm Matthioli, composita ex floribus Petasidis, foliis Doronici, & falsa radice Matthioli, ægregium profecto monstrum.

Aconitum
Matthioli
nondum
visum.

Aconitum pardalianches Matthioli (inquit Camer. in Epir. in append. vbi quemadmodum & in Hist. germ. curauit sculpendam iconem, qualem Matth. habet in suis comm. cum mag. fig.) tam rara est planta, vt nondum etiam diligentissimis rei herbariæ studiosis sese vspiam offerre voluerit. De ea itaque nihil adhuc certi indicare possum: alii planè negant exare.

Synon.

C. Bauh. pin. Aconitum pardalianches 3. siue Dioscoridis creditum Matthiolo: Aconit. pardalianches Matth. Lac Dod. gall. Cast. H. Lugd. & Tabern. An in rerum natura sit Aconitum Matthioli, dubitat Gesnerus de hort. & lunariis. In Lugd. hist. primum Matthioli figura exhibe-

tur: dein in append. iconi prius propositæ, ramulus floribus onustus adpingitur: Quod aliqui fictitium existimant: Lugd. historix author plantam in Allobrogibus nasci scribit: quid sit ignoro.

THORA FOLIO CYCLAMINI.

Caulis habet singularem, palmarem, aut ferè etiam dodrantalem, iuncum: folia duo aut tria ex radice statim principio oriuntur, cauli quoque circiter medium adnascitur, nullo interueniente



pediculo, folium vnum aut alterum, vnuquodque singulare, ordine caulem conscendens, circinnatæ ferè rotunditatis, Cyclamini foliis par, aut etiam duplè maius, in medio per marginem aliquando sinuatum, interdum minus, rigidum, nervosum, glabrum, argutis denticulis conicione in ambitu crenatum: reliqua supe-

riore caulis parte parua, oblonga, acuminata, simplicia, aut in lacinias aliquot fissa. Thalictri folia æmulatur: flos summo cauli insidet vnicus [interdum bifidus caulis in singulis ramis singulos gerit flores] Ranunculi & figuræ, & colore luteo nec dissimile Ranunculorum echino capitulum è seminibus coæternatis conglobatum: radix numerosis constat habitusculis, oblongis, Asphodeli imitatione ad caput vnum obliquum annexis radiculis, in tenuia longaque filamenta desinentibus.

C. Bauh. pin. Gesnerum sequutus Thoram duplicem statuit maiorem & minorem. Maior, inquit, foliorum exortu & numero variat: enascitur enim vno folio, vel duobus, idque vel statim à radice, vel nullo à radice, sed in caule duobus maiusculis, vel trib. vel quatuor, vel quinque ad summum: hinc Tabernaemont. feminam quatuor, marem duobus foliis magnis pingit. Minoris folia breviora, superne latiora, & magis incisâ: huius flos cluso quinis, illorum, quaternis [quina nec pauciora in Clusii figura oblectuo] dum axat foliis exprimitur.

Thora du-
plex. Maior.

Gesn. de Lun. Tora venenata, Dora fortè dicenda potè: Lunaria quorundam, Aconitum 1. Dioscoridis: Aconitum verum pardalianches Alexandri Peierii, & Gabr. Fallopii. Eid. de quadr. in hist. lupi p. 748. Herba rara, Tora nomine in Baldo proueniens, flore violaceo. p. 947. Aconiti primum genus, folio Cyclamini, Tora Valdensium. p. 69. Aconitum Dioscoridis primum, Tora quorundam. De hort. Aconitum 1. siue pardalianches, Tora siue Toxicum vulgò Valdensium, folio nunc singulari, nunc binis, ternis, quaternis, aut etiam quinis ab vna radice. Hæc quidem sunt Synonyma Tora Ges-

re Gesneri, qui Matthiolum merito in eo labi affirmat, quod scribit folium ei semper singulare esse. Sed rursus aberrat, quod Toiz contra aliorum sententiam violaceum dicit.

Anguill. epist. 14. huius plantæ meminit, dicens, Ghinum Aconitum vocasse: ipse autem eam opinionem, non probat.

Thora. Tora.

Thoram, Tauram, aut Turam, ut vocant, Dodon. Valdensium cognominat, ad differentiam Napelli, qui & ipse Thora vocatur. An porro cum Farsio Auicennæ eadem fuerit, disquirendum proponit, quod hoc affirmare difficile sit;

Rhog. not.

Rhegin. in exercit. refert Nepam, *enopion*, ex Theophrasto Aconitum primum esse: hoc autem seculo produci herbam quandam nomine Nepæ, quæ alioqui plerisque herbariis Thora existimetur. Consi lerent quæso lectores an Rheginus non confundat nomina duarum plantarum?

An sit verum Aconitum dubitat Gesnerus.

De *phæa* Valdensium hæc in Adu. Lobelius. Non incutit quis inferet huc [inter Gramen Parnassi & Cyclamen] illam istis persimilem herbulam, quæ passim montium, Alpiumque accolis vocatur Thora, interdum nulla adiectione, interdum Valdensium. Etenim multum dūque venatores illius alpinæ gentis hæc vti sunt, vti etiamnum multi alij, ad ferarum capturam, quibus solo sacco expresso, & spiculis illito certam citamque parant perniciem, quā namque hæserit telum, aut vulnus fecerit, subire repente virus, quo ilico ora vulneribus [nisi præcisione anteverrant] corrumpuntur, putrescunt, verunde Phthora nuncupata, vestigio manifesto de Græcis relicto: quippe *phæa* corruptio, nex, venenum, aut mors. At hi quibus multis periculis notæ sunt vites earum omnium herbarum, quæ vulgò nuncupantur Sagittariæ, cuiusmodi cum multis Aconitis, etiam Hellebori sunt, Hispanis vocari *Hierua de los abalestreros*, propterea ista est, cæteras prope eulumbes & incertas ducunt. Huius verò incunite Vere ius premitur, atque vesiculis, aut potius vngulis & cornibus bouillis reconditum emittur, mittiturque venenum ad emporia finitima, vbi ad vsus annuos venationum sibi comparant ferarum insidiatores, quos vicini Delphinates, Allobrogi & Prouinciales vocant, *Bessiers*, vel *Lo batters*. Qui quidem monere potuissent pseudo-commentatorem Matthiolum, ne Pseudo-Aconitum astrueret, ut quæ funesta dote superet quoduis Aconitum & toxicum.

Matth. not.

Ranunculus grumosa radice.

Thoram Valdensium Clusius inter Ranunculi genera, quæ grumosa radice constant, referendam censuit, ideoque Ranunculum grumosa radice testium cognominauit, inferens Gesnerum voluisse in epistolis operâ Wolstij editis, esse Cyclaminum testiam Plinij lib. 25. c. 9. & Limeum eiusdem lib. 27. c. 11. descripta.

Synonyma.

C. Bauhin. pin. Aconitum pardalianches l. seu Thora maior: Pseudo-Aconitum pardalianches Matthioli: Aconitum l. seu pardalianches maius Gesn. hort. Aconitum Ghini Anguill. Limeum Plinij Anguill. H. Lugd. Herba thora, Limeum falsò vocari creditum Gnull. pap. Tora venenata Gesn. lun. Phthora Valdensium Lob. in Adu. & Icon. Plant. p. 604. ac Clus. hist. Thora Valdensis Clus. pan. Cast. H. Lugd. & Camer. Thora mas & femina Tabern. & Gerar. Thora maior Cam. epit. Huc nos referimus Vulpariam alteram Cæsalpini. Eid. Acon. pardalianches alterum siue Thora minor: Aconitum 3. minus Gesn. hort.

Thora minor Gesn. de Acon. & Cam. epit. Thora. Valdensis Dod. Thora Sabaudica & Thora montis Bald. Tab. & Gerar. Limeum pardal. genus vno folio H. Lugd. Ranunculus grumosa radice 3. Clus. hist.

Clusius cum Tabern. non demonstrat qua in re binæ illius icones differant: in folijs florum nulla est diuersitas. Vtraque enim tam Phthora Valdensium montis Baldi, quàm Ranunculus 3. grumosa radice, quinque folia floris habet.

Thoram copiosè inuenimus in monte Iura, non solum vno folio, sed etiam duobus, tribus & quatuor: florebat Iunio: semen dabat Iulio. Cæterum, in Alpibus, & Allobrogum, Heluetiorumque montibus gigni refertur, & apud Valdenses, ac Baldo Italiz monte frequens.

Perniciosa autem & venifica huius Thoræ vis, Napelli excedere fertur maliciam. Tantam autem esse alunt, ut homo quidem præcipue, deinde & quadrupedes, ac aliud etiam quodlibet ferarum, vulneratum aut ictum telo huius succo imbuto, illi ome intra semi-horam pereat ac moriatur. Negatur tamen mortiferum, si bibatur, aut deuoretur, tamen absque noxa id non fit. Venatores succi vim expecturi, acum eo insciant, quā ranam pungunt: quæ si ilico moriatur, præsentaneum iudicant: auctor Gesnerus.

Locus & tempus.

Vires & vitiis

THORA APVLA FOLIO ALCHIMILLA.



Mirum nō annotare Tabernmontanum, vbiinam terrarum Thoram suam hanc Apulam siue Neapolitanā, Alchimillæ siue Stellariæ foliis, asperis & maculosis, ut ait, alioqui aliis Thoris similibus, obseruari. Si vidit vquam cur non diligentius descripsit? De hac nobis nihil constat, quare

posteris de ea cogitandi occasionem non eripimus. Vbi etiam C. Bauhin, in suo pinace eius meminerit, nondum intelleximus.

ANTITHORA SILVATICI folio rotundo.

Antithora 3. à Siluatico descripta, radicem habet ex rotundo oblongam, magnitudine & figurâ oliuari: folijs rotunda, asari similia, pet ambatum leuiter serrata, nullis fibris donata, asari instat. Hanc herbam semel tantum mihi contigit [inquit Tabern.] videre ab Italo quodam

ex monte Gargano allatam [qui & in Sabaudia & Pedemontij montibus copiosè provenire adferebat] sed sine floribus, quos Cyclaminis floribus similes perhibebat, colore violaceo, quales ei Silvaricus, authore Pandectarum, tribuit. Eum pro pictura nunquam licuit nancisci. Radix sapore est amaro. Qui aliquando Garganum confendent montem, Silvarici Antitoram perquirent. Nos non multum tribuimus relationi Tabernamontani, & minus eius Rhizotomo, auctori Pandectarum.

Hermod. & Ruell. Antitaura vel Antithora, herbae Tauræ siue Toræ venenosæ, per antipathiam occurrent. Gesn. de lun. Antithora flore subrubeco, foliis rotundis & modicè incis. Eid. de Aconit. Anchora folio Violarum, floribus subrubecis. Cæsalp. Fig. 26.

Quid per Antithoram intelligant affirmare non ausimus, rem diligentius ex mineant le- flores.

ACONITVM FOLIO PLATANI, FLORE luteo pallescente.

Descriptio



EX radice flexuosis, numerosis, nigricantibusque fibris, citriscue implexis satis iucundo odore præditis, caulis surgit leuiter hirsutus, duobus cubitis altior, inanis, striatus, rotundus, tenuis, leuiter, & nonnihil flexuosus, in alaridius: folia ampla quinquepartitè primariò diuisa, singulis segmen-

tis denudè subdivisis, superius ex atro virentia inferius albicantia: vel, ut ait Lobelius, folia viticæ, alè incis, nigricantia, & Geranii maioris ut similia, ita maiora: flores ex pediculis vncialibus, & plerumque sextantalibus, quorum singulis appositum foliolum oblongum, interdum dissectum, sæpius integrum, lutei, aut ex luteo albæ herbacei, oblongi, concavi, inferius hiantes, è foliolis quinque compositi, duobus lateralibus breuibus & latis, inferiorum altero lato, altero acuminato, quinto in tubi modum, concavo, in cuius intimo recessu, duo cornicula in spiram conuoluta extremo, dorso breuem hiulem canaliculum sustentia occuluntur, ad quorum coitum in floris hiatu staminum conspicitur congeries herbidorum, apicibus vel albidis, vel herbidis, vel nigro mixto versicoloribus: Lobello, flores lutei sunt, vel pallentes, Linariæ colore & effigie: siliquæ ternæ vel quaternæ, Aquilegiæ, rectæ, simul iunctæ, in quibus semen, Lob. angulosum & atrum, Trago pullum, Cepæ vel Nigellæ semini non dissimile, quod degustatum crebra sputa prouocat, naturâ calidissimum, veluti Pyrethrum.

Luparia Ruell.

Ruellius ait Lupariam vulgè nominatam, quod se. lupos enecat, folio Vitis, multas habente diuisuras & maculas: flore oblongo, luteo,

ideoque recentiores Lycoctonon esse arbitratos.

Matthiolus Aconitum Ponticum statuit, in omnibus ferè Italiae montibus præsertim verò Tridentinis nascent, foliis magis quam Platani incis, caule filicis: floribus luteis, figurâ similibus Ranunculi floribus, sed multò maioribus: vulgè Lupariam vocari perhibet, quanquâ in Tridentino, Herba vulpis nominetur, quod radices eius rite & caribus mixtæ vulpes interimat.

Duas autem proponit Matthiolus in impress. anni 1554. icones: vni titulus est Aconitum 2. Et hæc icon est Aconiti quod nos hoc capite exhibemus flore luteo. Alteri titulus est. Aconitum tertium: quod nobis figmentum est, compositum fortè ex præcedenti & Trollio flore: de hoc autem agimus H. n. lib. 30. sub titulo, Ranunculi flore globoso. De hoc ait Gesn. de lupo: Matthiolus in in prior. com. medic. Pontici Aconiti, quod Dioscorides descripsit, flores luteos figurâ similes Ranunculi floribus, sed multò maiores, &c. vulgè Lupariam dicit. Verùm nostra Luparia & lutea, & cærulea, flores habet cucullatos, ut ito dicam, Ranunculi floribus longè dissimiles, quare deceptum hic Matthiolum puto. Hæc Gesnerus de Pontico Aconito Matthioli quod in impress. anni 1554. Aconitum tertium inscribit. Cæterum, ritè consideranti verba Matthioli, apparebit illud nesciuisse, quid scriberet, eique incognitas plantas fuisse, ac duas confudisse: Tridentini Medici & pharmacopœi perpendant an utraque planta, Aconitum 2. & 3. in proximis montibus proveniat, an ibi sit in usu Aconitum Matthioli flore Ranunculi, quod nobis persuadere haud possumus. In comm. anno 1559. impressis, antè citatis, de tertio genere loquens, hæc addit: Quanquam Gesnerus de animalibus, negat inueniri Aconitum cuius flores lutei sint, atque Rosas emulentur, attamen de cipitur: siquidem plures exant montes, qui hoc Aconiti genere sciant. Quare me hic vera scripsisse, Gesnerum contra veritati refragari, posteris omnibus testatum relinquitur. Sed modestè Gesnerus scripsit, ut ante ostendimus, prudenter quoque fecisset Matthiolus, falsus si fuisset suum lapsum, pari modestiâ erga Gesnerum usus. Ille nunquam, nec eius buccinatores patroni, fautores, & discipuli monstrabunt Aconitum provenire in Tridentinis montibus, nec in aliis, quale suâ iconè proponit Matthiolus. Esto sanè proveniret planta planè similis eius figmento: non tamen propterea foret Aconitum Dioscoridi lycoctonum, & Luparia communiter dicta, de qua Gesnerus & nos hoc capite agimus. De Aconito Matthioli flore Ranunculi, pluribus loco à nobis dicto agimus, quod non negavit Gesnerus provenire in Tridentinis montibus, si vera iconè exhiberetur, nec veritati refragatur in his, quæ scripsit contra Matthiolum loco allegato. In comm. cum magna figura eadem scribit cum præcedentibus, mutatâ nonnihil iconè. In icon. impressis anno 1571. Aconito suo secundo, in altis montibus nascenti, & præsertim in Baldo in Veronensi agro, & Aconito tertio flores adscribit purpureos, ita ut manifestè appareat has plantas non sibi notas fuisse: eum in aliis Editionibus Luteos, ut reuera sunt, utrisque Aconitis flores tribuat.

Matthioli censura.

Matthioli icon.

Per tertiam & ultimam Lycoctoni Dioscoridis speciem, licet Lacuna intelligat hanc plantam, Lupariam vulgè dictam, & aliquibus Nappellum exilimaram, floribus luteis, Linariæ similibus

millibus, attamen Aconitum secundum inscribit.

Synonyma

Gesn. hort. Aconitum secundum, vel lycoctonum, Radix lupi Tigurensum: efficacior floribus luteis: Item, Aconitum 2. flore albo, Napellus albus. Eid. in app. Aconitum pallido flore Luparia vel Lycoctoni nomine vulgo dictum; Aconiti species alia floribus albis, folijs minoribus, radice simili, nempe latiuscula, dissecta: In monte fr. Aconitum luteum. De quadr. secundi Dioscoridis Aconiti genera duo agnoscit, luteum & caeruleum: quorum illud multo venenosius & vehementius est, à Theophrasto & Dioscoride descriptum, ac Germanis Luparia per excellentiam dictum. Hoc quoniam radix interdum minus nigra, fusca scilicet & nonnunquam albicans Lupariam albam nominant. Alij Patam lupinam vocant.

Luparia [inquit Silust.] est herba interficiens lupos, & porissimum pulvis ex ea: quidam falsò dicunt Radiculam esse, siue Helleborum nigrum, eam revera si Strangulator adip.

Turn. Aconitum alterum Dioscoridis, folio Platani profundè inciso, floribus luteis, siliquis brevibus, semina nigra continentibus, in hortis duntaxat nascens.

Dod. Aconitum ponticum: Eid. de purg. Aconitum luteum maius & officinarum plerarum Napellus: strangulator lupi Arabum, hoc est Canach adip: Auicennæ: In fol. lat. Aconitum lycoctonum maius.

Thal. Aconitum licoct. luteum. Lob. in Icon. Plant. p. 677. & Obs. p. 385. Acon. luteum ponticum, Lupicida.

Luparia duplex.

Camer. hort. Acon. lycoctonum fl. luteo, Lupariam Helvetiz duplicem statuit: & Maiorem folio latissimo, minus nigro, & serotino magis flore alt à minore discrepare, alioqui similes esse plantas. Hinc in Epir. & Hist. Matthioli duas habet figuras: Vnam inscribit Aconitum secundum, floribus luridis, aut luteis pallescentibus: Alteram, Aconitum sextum, Napello simili folio, sed multò maiore: & albis quibusdam lineiscente venolis, floris figura ad Lupariam accedens, colore pallescente luteo ve. Cæsalp. lib. 19. cap. 32. Napellus primus, folio Platani, &c. Eid. cap. 33. Lycoctonum ponticum Dioscoridis, folijs effigie Platani.

Tabern. Icon. & Hist. Aconitum Matthioli secundum: Item, Aconitum 7. siue luteum seu ponticum. Eid. hist. Aconitum 8.

Florum varietas C. B. nota.

C. Bauh. phyt. Aconitum 2. siue lycoctonum luteum: dilucidius quandoque viret, interdum & flor pallidior, communiter ex pallido luteus. Habetur & flore albo in monte Mureteto. Eid. Aconitum 7. siue inflexa comâ, folijs latoribus: Acon. 6. Matthioli, floribus purpureis, Camerario pallescentibus luteis ve. Apud Matth. Acon. siue lycoct. luteum; Acon. 2. Matthioli floribus purpureis: Item, Acon. 10. siue sextum Matthioli floribus splendens purpureis. *Nos nusquam comperimus Matthiolum dixisse Aconitum suum 2. floribus esse purpureis, imò manifestè ait subluteis. Sexto quidem adscribit purpureos, verum ubi splendete dixerit, nondum legimus. Illud nobis constat, cum nihil certi aut serij de hoc Aconito, sed tantum ineptam proposuisse figuram sine descriptione: descriptio, quam hic addit, convenit descriptioni 2. à Matthiolo positæ: frater etiam ponit figuram Tabernamontani. Quæ occasionem ut non separemus hoc sextum à secundo Matthioli, donec nobis de-*
Tom. III.

demonstretur, cuius plantæ imaginem Matthioli exhibuerit.

Ακόνιτον ἵτερον, ἀκόνιτον κυνέκτον & λυκόκτον Synonyma
Græcis: Germ. *vvolfsvunne*, Luparia: Rhetis Nom. ling.
Ris de lup, id est Radix lupi: Gall. *Tue loup*. *Estrangle loup*: Madriettes, Fuch. It. *Aconito per amasser lupi & cani*: Hisp. *Terna mata lous*: Angl. *vvolfshayne*, *Telobbe vvolfshayne*, Playne: Boh. *vvomeg*.

In altissimis montium vallibus nascitur in variis Germaniæ Austriæ & Pann. ac Helvetiæ locis: in sylva Hercynia præsertim. Refert Matthioli in Italiæ omnibus ferè montibus nasci, præsertim in monte Baldo in Veronensi agro: Thal. in montibus caudis, præsertim ubi graminum maxima est luxuries, Scölbergz, Ilfeldz, &c. Gesnerus sæpissimè iuxta petras montium emicare vidit, etiam in ipsis petris & rupibus sed terra interdictis. Maio floret: in hortis ex semine nimilum propagatur.

Vires & Vfus.

Qui Aconitum antiquorum esse admittunt, vires ex antè dictis petant. Lupariæ herbæ, semen aut radix in pulverem redacta, & cum oleo temperata, ut yognentum inde fiat, illicitu pediculos ac furfures quocumque tandem inveniuntur loco, enecat ac expellit: idem radix præstare potest, si in aqua vel lixivio decoquatur, ac cum illa postea caput abluatur: est autem adurentis fatidicæ sicut & Napellus: quare interdum sumi non debet, inquit Tragus. Quam enim noxia sit planta internis corporis partibus, interitu conuulsarum Antuerpiensium, qui in acetarijs harum radice vescentes diem suum obierunt, abundè demonstratum fuit. Perhibet & Dodonæus, cui olim calida & sicca erat in quarto gradu, facultatem huius, veluti & reliquorum Lycoctonorum homini exitialem esse, & reliquis quoque animantibus perniciosam. Inter venena atrocissima reponitur à Lobelio. Pro deteriore cæteris Aconitis veneno habent venatores, inquit, qui Lupicidam vocant, non quoddam idem non faciant aliæ, sed quia citius & certius: quin nonnullis in locis adultæ flores, vel solo mansu fauces linguamque tumore excitato adiuvant & vertiginem cient. Germani rhizotomi mures occidi promittunt, si Lupariæ radicem tritam cum pulve ex Auenæ aut Frumenti farina mixtam gustauerint.

NAPELLVS VETERIBVS.

CAP. XVIII.

A Vicennæ Napellus est venenum perniciosum, natum in summo caliditatis & siccitatis gradu. Est venenum destruens bibentem se, maior verò potio est medietas drach. & minus hoc interficit. Theriaca verò eius est mus Napelli, qui eo nutritur, semen se. ex eo cibans. Ex omnibus autem confectionibus diamoschum magis Napello resistit: lib. 2. Coll. tractat. 2. cap. 499. Est & Napellus Moyfi buha [subdit cap. 500.] quæ est herba nascens cum Napello. Et cuiusque Napellus appropinquat, non crescit, vel non fructificat arbor eius. Et est maior Theriaca Napello, & in ipso sunt omnia iuamenta, quæ sunt in Napello ad albaras & ad lepram. Napellus verò Moyfi est animal, quod moratur in radice Napelli, sicut mus. Confert ad albaras & ad lepram. Est Theriaca omni veneno
Ffff

Temperam.

& viperæ. Napellus porro est [vt refert lib. quarto sen. 6. tract. 1. summa 2. cap. 1.] de deterioribus. Et accidit potanti ipsum, vt apostementur labia ipsius, Et lingua eius, & egrediuntur oculi eius, & frequens sunt super ipsum vertigo, & Syncope, & non exercere seu non mouere potest crura ipsius, & est malum, & qui euadunt ex eo rari euadunt quin cadant in hecticam, aut phthisim, & quandoque facit epilepsiam odor eius. Et eius succo imbibuntur sagitte, & interficiunt, quem inueniunt, statim. Oportet autem vt festinetur ad faciendum vomere bibentem ipsum cum decoctione seminis Napi: & Rapæ, & dentur in potu vinum, & butyrum coctum vaccinum, dando potum super potum, & similiter decoctio corticum glandium cum vino. Deinde cura eius principalis est Bezahar, & medicamen de muscho, & Algeduar, & buha seu bis mus buha, & theriaca magna quandoq; confert in eo vsque ad terminum. Et de melioribus rebus est vt detur in potu muschus in fricatione albezahard: aut quantitas 3 j. de medicamine muschi cum siliqua vna muschi. Et existimant quidam quod radices Capparis sunt Bezahar Napelli. Et omnia albezaharad sunt bona ei, & propriè illud quod simulatur alumini, & habet fila sicut fila lithargyrii. Et animal mus nominatum Napelli, & est mus contrarius Napello, & destituitur eius operatio, cum comeditur ex ipso. Resistit & Zedoaria Napello, cum quo illa crescit. De Napelli assumpti signis & curatione consulendus etiam Rhazis & Haly.

Cæterum, crediderunt aliqui Napellum Auicennæ esse speciem Aconiti: Verum Manardus eius fuit opinionis Napellum Arabum & Toxicum Græcorum idem esse venenum, quam opinionem non omnino repudiandam censuit Lacuna.

Auicenna [inquit Leonie. de err. Med.] existimat Cicutam, Succatam, esse Napellum, aut venenum, quod interficat hominem, & non interficit turdos. Galenus non de Napello & turdis, sed potius de Cicuta & sturnis hæc intelligi voluit. Signa quæ ab Auicenna ponuntur in eo qui hauserit Napellum sunt eadem quæ à Diosc. & Paulo scribuntur, de ijs qui Toxicum biberint. Quod in authore Pandectarum legitur, atque ab omnibus ferè Medicis creditur, Napellum esse speciem Aconiti, id ex Auicennæ sententia affirmari non potest. Aconitum enim duplex est authore Galeno: de ijs autem duobus Aconiti generibus Auicenna eundem Galenum secutus est, sub nomine strangulatoris adip, id est lupi, & strangulatoris leopardi, ac seorsim à Napello tractauit. Quod Galenus de Cicuta & sturnis, non autem de Napello & turdis, vt in ore est omnium ferè Medicorum, qui solà Auicennæ auctoritate freti id constanter affirmant, interpretandus sit, experientiâ compertum habetur. Quis enim dixerit an Turdi sine noxa Napello vescantur: cum quid sit Napellus ex ipso Auicenna non constet.

Idem Pandect. author, vnum Aconiti genus idem facit cum Napello apud Arabes celebri, sed falsò, cum potius videatur Goserio Ellebori nigri species esse.

Cæterum inter Napellos sequentes recipiuntur & recensentur plantæ: scilicet, Aconitum folio Platani flore luteo pallescente, quod est Napelli primum genus Clysio, Napellus officinarum plerarumq; de quo antè. Aconitum magnum

purpureo flore. Aconitum Lycoctonum surmonele Napello simile. Aconitum lycoct. Napello simile, flore purpureo, Neubergerse. folijs latioribus. Aconitum lycoctonum flore maximo. Acon. lycoct. radice bulbosâ, flore cæruleo, galei elatiori. Aconitum racemosum, Acon. quorandam. Antithora, flore luteo Aconiti. Cætesentij Napellus, siue, vt ait, Napus marinus, in littore maris crescens, venenum pessimum & perniciosum, summè calidum & succum, quod limbum delet maculas cutis, &c.

NAPELLI MUS VEL MUSCA.

De animali, quod Napello nutritur, hodie autores minds conueniunt. Sunt enim qui murem: sunt & alij qui muscam esse contendunt.

Aduersus Napellum tam perniciosum venenosi remedia quædam enumerat Auicenna, quæ post venenum ipsum vomitione redditum præsidio sunt: atque inter ea murem etiam [vt antè videre licet] reperiri Napello enutritum, qui naturæ eius maleficæ totâ substantiâ aduersetur, & assumentem ab omni vindicet ac liberet periculo.

Antonius Guainerius Papiensis suâ ætate celebris Medicus, in tractatu suo de venenis, hunc non murem, sed muscas esse existimat. Refert siquidem quendam Philosophiæ ac veritatis studiosum, sollicitè admodum ac diligenter murem huiusmodi quæsiuisse, neque vnquam vel murem, vel arrosam etiam Napelli radicem ab eo repperit: sed muscas abundè multas folia depascentes inuentas, quas Philosophus ille muris loco accipiens, antidotum ex ijs confecit, quam & aduersus venena alia, sed contra Napelli vtilissimam ac efficacissimam comperit. Accipit hæc terræ Lemniæ, baccharum Lauri, antidoti Michridatis singulorum Vnc. duas, muscas Napelli 24. mellis & olei, quantum satis est.

In eadem cum Guainerio & Philosopho illo sententia sunt quoque P. Pena, & M. Lobelius, qui murem Napellum depascentem nusquam asserunt visum: sed muscas esse, quæ turmatim aduolent, & floribus huius insideant. Napellus, inquit, à quouis animalium illebarus perstat, præterquam à muscis quæ illi turmatim insident & aduolant, & floribus fortè inuascuntur, sunt enim ferè concolores, maiores quàm communes, alis capitulisque ex lurido viridive cæso virentes, quasi cantharides, vel cinceolæ. Hæc attentius obseruauimus quidem continenter de floribus rostello delibantes: cæterum murem Napelli frustra diu & multis aulicis plantis quæsiuimus, & an vidissent optiones perennati, vsquam sibi visum negabant: Quare puto sine murem, è musca siue musca fecisse istos Arabes, iam tum suspicio nos incescit: quippe nullum antidotum è mure parant, è muscis præstantissimum, aduersus funestum tarantæ morbum, atque epidemicos morbos, cuiusmodi est hæc: Muscas quæ pastum ceperint de Napello n. 20. Aristolochiæ, boli Armeni añ. Dra. h. i.

Cælias porro muscas, quæ ex Aconiti cærulei seu Napelli floribus viuunt, studiosè Anglos obseruasse testatur etiam Thalius.

Matthiolum eorà gloriatur se murem, qui Napelli radicibus victitat, pluries in Ananienfibus montibus inuenisse. Sed quandoquidem contronertitur, an mus vel musca ab Arabibus rectè reddatur, cur Matthiolum non descripsit murem, & quo

Cura

Toxicum
GræcorumPandect.
error alius

Equiuoca

Remedium
aduersus
NapellumMusca
Guainerij.Musca cæru-
leaCælia musca
Anglorum

& quo in loco, quaque figura, quibus auxilijs denique eum deprehenderit? cur non indicavit, an eum noctu vel interdiu observavit? cur non iconem, quâ formâ radicem atroscam et ætæ, expressit? cur diversimodè eam pingit?

Verisimile iraque est, vel Dodonæo teste, non murè esse, qui Napello sustèteretur, sed muscas esse, quæ linctæ eius vivunt. Nam Aconitum, cuius Napellus species, mures ipsos interim: atque inde *μυροκτόνον καὶ μύροφονον*, siue Muricida dicitur.

ACONITVM MAGNV. PVRPVREO flore, vulgò Napellus.

Locus

Descriptio.



Consultius ex hortis exularet perneabile Napelli virus, nisi stultæ voluptas illecebrarum quàm sanitatis studio flores esse velimus, facileq; illice hoc oculorum pabulo in cæta floriscum, si lubrum aut saltem innocentium, tum amœnorum fecunditate carere possent viridaria & paradisi: est autem trium circiter cubitorum altitudine, ac etiam

humanâ, rigido, fractuque contumaci *caule*, teretibus, purpurascens: qui in ramos ductus, in singulis longâ gestat *florum spicam* cæruleorum. & cucullo *folia* reliqua, quaterna numero, obtegentium quos sequuntur, singulos tria fere Aquilegiæ *cornicula*, *semine* plena: *folia* alterno situ ex vncialibus pediculis, atro virore nitentia, Aconiti lutei lycoctoni folijs maiora, in crebriores lacinias angustas multum divisa: *radix* Napi parvi magnitudine, nigra, fibras è lateribus producit, sæpè & alios Napos collaterales adnatos habens.

Herbam, Germanis *Eisenhuetlin* dictam radice Lupariæ, satis iucundo odore, Tragus trium generum esse statuit. Maximam, Minorem, & Flore luteo. Nos hoc præsentis capite de maxima specie agimus, & de minore fortè sequenti. Fruticem flore roseo suspicamur esse Nerium. In Hist. germ. Aconiti facit speciem alteram, Napellum vulgò dictum, eius tamen picturam non exhibet.

Locus & Tempus.

Lobelio in Aduers. [vt etiam in Obs. p. 687. Icon. Plantar. pag. 679. vocat] Napellus vulgaris, vulgò Germanis *Kappenblumen*, dicitur, & propter similitudinem Brabantis *Muenchscappen*: Insignis, inquit, radix, insignior & flos, arguto naturæ opere: præ se namque fert cucullæ hiantis aut cassidis speciem. Huius videas acclives montium salus Iunio & Iulio perquam elegantem, & luxuriantem fundere vberitatem in Rhæticiis alpinis, cui tamen [cuncto illic atroso Gramine] parcat quantum est pecoris, præsertim secus iter, quo Constantia Nasaretum versus itur, ubi à quovis animalium illibatum perstat, præterquam à muscis Nec in villa
Tom. III.

planta huic Napello congenere, muscæ hæc cæruleæ insident aut victitant, quo certior est coniectura istum Napellum esse Arabum, idemque Dioscoridis unum ex Aconitis: Fortè autem Rappen pro Cappen legit Lobelius.

Turnerûs vocat alterum Aconiti secundi genus, folio magni alicuius Ranunculi, copiosè proutniens in ipsius Alpium iugis inter Splengen & Clavennam. Fuchsius in suis paradoxis, nihil aliud Aconitum esse putat Mauritanis & præsertim Auicennæ quàm Napellum. Quâ in re meo quidem iudicio [Matthioli verba sunt] fallitur, quippe quòd reperio Auicennam de utroque Aconiti genere scriptitasse, & alterum appellasse Strangulatorem adib, alterum verò Strangulatorem Leopardi quæ nomina eadem sunt, quæ apud Græcos *Lycoctonos* & *Pardalianches*: atque eundem prius magnâ differentiâ speciatim de Napello egisse constat. Præterea Napellus iudicem Aconitis longe dissimilem profert: sicuti & folia, quæ potius Artemisiæ, quàm Cyclaminum & Platanum referunt. Flores item edit purpureos, qui antequam dehiscant, mortui hominis caltariam repræsentant, dehisc. entes verò pandunt se re Vitiæ mortuæ modo. Caules et bicubitales, & aliquando maiores: semen paruum, nigrum, corniculis conclusum brevibus. Quæ ceterè omnia & harum plantarum discrimen aperit ostendunt, simul & Fuchsi sententiam refellunt. Hinc itaque colligendum putaverim Aconitum cuiusque generis nullam habere cum Napello cognationem &c. Ceterum addit, existimant Marardus & Leonie, quod Napellus & Toxicum Græcis vocatum inter se non differant: sed isti aberrant. Hæc Matth. qui pro Napello iconem exhibet minùs artificiosam, & fortè ipsi minùs cognitam: quandoquidem Napello radicem assignat Aconitis longè dissimilem. Quæ autem est dissimilitudo in radicibus Aconiti eius 2. & 4. & Napello? Quæ item in com. cum mag. fig. in radicibus Aconiti sexti & septimi, ubi Napelli longè diu etiam proponit iconem, ponit radice & folijs: caules etiam Aconitorum Matthioli aliquid commune habent, cum caulibus Artemisiæ: flores etiam, quamvis colore variant, formâ conveniunt: sed & vires quoque penè eadem sunt.

Lacuna Napellus, caulibus Artemisiæ maioris, floribus purpureis. Thal. Acon. cæruleum seu Napellus cum cæliis muscis. Gesn. hort. Aconiti altera species cæruleo flore: Tota Italorum quorundam, etiam flore purpureo: Suævi aliique Gerthani utramque Lupi radicem vocant. Eid. de lupo, Aconiti secundi Diosc. genus alterum cæruleum, luteo minus venenosum & vehementius: Napellus Arabum: Luparia nigra.

C. Bauh. pin. Aconitum 10. [n. phyt.] siue cæruleum, seu Napellus 1. *Tsenhuetlin* Brunf. in. 4. p. 292. sine icones Trago. Napellus Matth. Lon. Dod. Cast. H. Lugd. & Cam. vulgaris Clus. pann. Napell. arboreus Eyf. Napellus verus Lob. Obs. p. 387. cæruleus in Adu. & Ic. Plant. pag. 679. Napellus maior lat. folius & angustifolius Tabern. Napellus reticulatus, Cæsalp. Aconitum lycoct. cæruleum Dod. gall. Aconitum 1. vel lycoctoni species altera Gesn. hort. Aconitum lycoct. 6. Clus. hist. Aconitum cæruleum Gesn. coll. Thal.

Folius est latioribus, & angustioribus [siue maior & minor, vt habet in phyt. & hinc apud Tabern. binæ figuræ:] flore communiter cæruleo, aliquando purpureo, roseo, albo, & è cæruleo &c.

Ffff 2

Matth. non.

Synonyma
plura.

Synonyma

Varietas.

albo colore variegatus, qui Napellus flore variegato Eyst.

Germ. Eisen buetslin, Narren cappen, Cappenblumen, blau vvolffsvuriz, & Teuffelsvuriz. Belg. vvolffsvuriele, lt. & Hisp. Napello. Angl. Blau wels baynie, Gall. Capps de Moyn, & blentus loup.

Locus

In Alpibus Ananiz & Rhætiæ, tum alibi in montibus, vt Hærcynia Saxo nothuringica, sæpè quidem iuxta saxa, sed magis in terrenis, nullo serente prouenit: apud Belgas quandoque in hortis reperitur, teste Dodonæo. Maio aut Iunio, interdum etiam serius, aliosis locis flores vigent: semen Augusto dat. Montbelgardi spontè copiosè prouenit inter pontem Vaniaucourt & Dampierre, ac vltèriùs inter dumeta. Non longè à pagò Audincourt ad Dubin elatiori loco, qui non alluitur, Septembri mense copiosis floribus vidi anno 1608. ad hominis circiter altitudinem excrescere.

Tempus

Vires & Vfus.

Vis & facultas Napelli & homini & quadrupedibus multis perniciosa est. Euidenti, sed perquam miserabili experimento, id Antuerpiæ olim compertum, in recenti adhuc est memoria. Cùm enim ab imperitis huius inter acetaria illata essent radices, quicunque eas ederunt, mox fæuissimis correpti symptomatibus breui vitam cum morte commutarunt, testimonio Dodonæi, qui olim calidum & siccum ad quartum gradum pronunciabat. Quin & Turnerus perhibet Gallos quosdam Antuerpiæ, pro Imperatoris, in acetario comestis Napelli radicibus, intra biduum omnes obiisse, exceptis duobus histrionibus, qui eas reuomuerint. Caueant sibi igitur mortales, ne brevis florum elegantia, graui dispendio veneni radicum compensetur. Cærulei Aconiti radicibus qui pro Elleboro nigro vterentur, pharmacopolas in Sabaudia vidit Gesnerus. Sed & Syluius alicubi reprehendit idem à nonnullis in Gallia fieri: cuius erroris occasio eis fuit radicis color, & quodd ventris profluvium similiter moueant, & quodd Elleborus ipse eis deesset. Saxonia se audiuisse narrat fuisse Medicum Germanum, qui omnes peste correptos curarit imposito pro vesicante Napello, eo scilicet virulentiam omnem ad se trahente. Narrauit nobis nobilis quædam fœmina, multas aliquando gallinas, quæ Narren Capps comedissent, fuisse mortuas: quibus verò Allia & acetum fuisse exhibitum, eussisse.

Pestis

ACONITVM NAPELLO SIMILE, SED minus, cæruleum, præcocius.

Descriptio.

Vnius aut duorum cubitorum proceritatem assequitur minor Napellus, caule gracili, subhisuto & subrubente, non ita recto: folia Napelli, minùs tamen crebrè partita, licet in quinque lacinias profundas primarias diuisa, quarum singulæ rursus variè subdividuntur, colore atro-virente nitrido, ex pediculis duas tresve uncias longis: flores cærulei, cucullati, pilosi, quorum galea lingulas duas occultat purpurascens, quorum capitulis impositus vitriculus liquorem melleum continet: duæ florum alæ supremo suo margine galeam ingrediuntur, infimos margines excipiunt duo subiecta folia, quorum quatuor complexu comprehenduntur atro-purpureorum staminum villi: radix subest nigra, oblonga, fibrata.



Inuenitur in Tauricis montium jugis, non procul à Salisburgo, in quibus floret Iulio, in cultis verò multò maturius, imò reliquis Lycostoni generibus præcocius, nempe Maio interdum mense, autore Clusio, Montbelgardi floret Iulio, & citius Napello, cui adeò simile, vt difficulter ab illo distinxeris.

ACONITVM LYCOCT. AUTUMNALE, Napello simile.

Folia huius media quodammodò sunt inter Thoræ [Aconiti lycoct. radice bulbosâ] & terrij generis peregrini [Aconiti lycoct. Neubergeri] folia, Thoræ quidem Italice foliorum quasi æmula, nonnihil tamen ad terrij generis peregrini foliorum formam accedentia, nec illis minùs ampla, atra viriditate splendentia supernè: caulis illi bicubitalis, crassus, firmus, striatus, virens & splendens, summo fastigio florum spicam, terrio peregrino generi fere similem gestans: quibus etiam succedunt pares siliqua seu capita, & simile semen: radix illius etiam radici par, perennis, & multis ad latera adnatis se propagans.

Descriptionis auctori Clusio dicitur in pann. & hist. Aconitum lycoctonum 7. vel autumnale: Dod. purg. & in fol. lat. Aconitum lycoct. alterum tota externa facie Napellum referens, sed radicum filamentis accitis multis tantummodò confibratarum ac Napo nequaquam similibus differens, Napello seriùs multò, proliferum. Lob. Obs. pag. 386. Aconitum autumnale, facie Napelli roto vultu, & parilitate Napellum referens, Belgis hortense, Augusto & Septembri florens.

C. Bauh. phyt. Aconitum 6. siue cæruleum Napelli flore, radice fibrosâ, Acon. lyc. & 2. Dodonæi. Eid. Aconitum 15. siue purpureum autumnale seu Napellus, Acon. lycoct. 7. siue autumnale Clusij. Non duo sunt, sed vnum Aconitum. Quare in pin. sub Aconito 7: siue cæruleo Napelli flore meritiò comprehendit.

C. Bauh.

Alebat hoc genus in Belgicâ Clusius, Braxellâ primùm ipsi communicatum, deinde eius doperâ Viennam delatum, eius vbis elegantiores hortos ornare cepit. Florebat seriùs, nempe Augusto, eam ob causam Napellum Autumnale appellare solebat.

Locus

ACONI-

Camer. hort. Aconitum alterum, Napellus citius florens & vulgarior. Trago Aconitum minus. Clus. pann. p. 406. & 407. Aconitum Lycostonum 2. siue præcox Tauricū: Eid. hist. Aconit. lycoct. 4. Tauricum. C. Bauh. pin. Aconitum 11. [siue phyt. 12.] violaceū seu Napellus secundus.

Synonyma.

Tempus.

Synonyma.

ACONITVM LYCOCT. CÆRVLEVUM,
calcar magno.

Altitudine vix cedit Napello, *caule* inani, purpurascens, qui subhirsutus videtur: *folia* Aconiti lycoctoni lutei foliis simillima, in latas dissecta lacinias, hirsuta: summus caulis in longam abie *spicam* florum pulcherrimorum cæruleorum, longo rostrato Aquilegiz, vel Consolida regalis corniculo, libranis se columbe æmulo, cuius extremo hianti folia subsunt quateroa, aliorum Aconitorum modo, & in horum medio stamina multa: ad florum verò exortum bina foliola angusta ceu cornicula quedam eriguntur: hisce succedunt terne iunctæ corniculatæ siliquæ, *semen* continentes, nigricans, rugosum: *radix*, autore Clusio, crassa, tuberosa, ut alterius Lycoctoni flore Delphiniij quod apud Belgas aliud, nigra, rugosa, concava, grauciter olens, multis tenuibus, fuliginosæque lanugine pubescentibus fibris prædita, ad cuius latera secundum infimum caulem singulis annis noua germina repullulant.

Descriptio



terne iunctæ corniculatæ siliquæ, *semen* continentes, nigricans, rugosum: *radix*, autore Clusio, crassa, tuberosa, ut alterius Lycoctoni flore Delphiniij quod apud Belgas aliud, nigra, rugosa, concava, grauciter olens, multis tenuibus, fuliginosæque lanugine pubescentibus fibris prædita, ad cuius latera secundum infimum caulem singulis annis noua germina repullulant.

Synon.

Camer. hort. Aconitum flore Delphiniij, trium vel plurium cubitorum. Clus. pann. p. 404. Aconitum lycoct. 1. Lycoctonum flore Delphiniij cæruleo, Silesiæ incolarum Lupina radix: Eid. hist. Aconitum lycoct. flore Delphiniij 1. Silesiacum. Gesn. hort. & in App. Acon. cæruleum aliud, luteo illi, quod Lupariam vocant, cognatum, in montibus quibusdam Bernensium ditionis, *Groszberg Rutenforren*:

Tab. nat.

Camer. apud Matth. in hist. Aconitum 3. Eid. in Epit. Aconitum 4. flore cæruleo caudato. Taber. Icon. Aconitum matthioli sextum: Eid. hist. Aconitum 7. matthioli 6. flore Consolida regalis. *Tabern. longe* diuersam ponit figuram à matthioli. Ea enim in floribus calcaria habet, matthioli contra nulla.

C. Bauh.

C. Bauh. pin. Aconitum 5. [4. phyt.] siue cæruleum hirsutum flore Consolida regalis, Acon. lycoct. cæruleum aliud Gesn. hort. *Hoc Aconitum* Gesneri C. Bauhin. olim referebat ad Aconitum suum cæruleum glabrum, quod inscribimus Acon. lycoct. flore Delphiniij.

An Alcionium Anguillare epist. 12?

Nascitur referente Achille Cromero frequens in montibus territorij Freyvoldensis in Silesia, ubi in tricubitalem altit. interdum excresecit & Augusto florere ait; in horto verò Iunio.

Radix huic amara est sicut Antithoræ, & virium, ut Gesnerus coniicit, earundem, non ita venenosa ut cætera Aconita.

Tom. III.

ACONITVM LYCOCT. NAPELLO
simile, Neubergerse, foliis latioribus,
flore purpureo.

Actiora vulgari Napello habet *folia*, licet similiter incisa & lacinata, magis atra similiter & splendentia: *caulem* rectum, firmum, rotundum, trium interdum cubitorum altitudinem æ-

Descriptio



quantem, & in multos ramulos superiore parte sæpenu-merò diuisum, qui *flores* spicæ instar congestos, ferunt, colore purpureos. Napelli vulgaris floribus planè respondentes, hoc est, quatuor foliis constantes, quinto veluti galeola supereminente, & bina circumuoluta, instar litul. cornicula occulte, stami-

num tamen media congeries magis fusca est: florum spica in extremo caule nascens, reliquis oblongior est, & magis expansa: singulis floribus terna succedunt *cornicula*, interdum quaterna aut quina in caput vnum congesta, semen atrum & inæquale continentia: *radix* illi vulgaris Napelli instar, paruo Napo similis, cui in lateribus adherent alij Napi, fibris præditi, quibus se propagat.

Clusio, descriptionis auctori, dicitur in pann. p. 406. Aconitum lycoct. 3. vel Neubergerse. Eid. hist. Acon. lycoctonum 5. quoad iconem, 3. quoad descriptionem, Neubergerse. C. Bauh. pin. Aconitum 12. [13. phyt. siue purpureum foliis Napello latioribus] siue purpureum, seu Napellus tertius.

Synon.

Crescit in montis Neuberger Ducatus Stiriz iugo, ad vaccarum, istis æstiuis mensibus pascendum, stabula. Floret paulò post vulgarem, videlicet Iulio.

Locus & tempus.

Aconitum lycoct. Lyncearum Napello simile.

Medium quodammodò inter vulgarem Napellum, & genus Aconiti præcedens, quantum hoc peregrinum genus, siue ordine septimū, statuit Clusius: *folia* enim illis similia obtinere scribit: *caulem* inter illos medium, infirmiore tamen, & supernâ parte aliquantulum nutantem, *flores* vtriusque floribus prorsus respondentes, nisi cassis supra quatuor folia eminens, magis subleuaretur & hiaret, rostròq; magis mucronato esset: *semina* in ternis corniculis simul iunctis similia: *radicem* etiam non multum variantem.

Descriptio

C. Bauh. phyt. & pin. Aconitum 8. siue comâ inflexâ foliis angustioribus. Acon. 7. Matthioli H. Lugd. Acon. lycoctonum 4. vel lyncearum Clus. pann. p. 409. & hist. Eid. apud Matth. Acon. 11. siue sextum Matthioli. *Non audemus nos certo*

Ffff 3

asserere huc esse referendam ineptam Matthioli figuram Aconiti eius 7. flore purpureo. Siquidem de ea, ut ei consuevit, nihil solidi scribit. Stuprum igitur peritiss. Clusij iudicio assentimus. Titulum porro inflexæ comæ nolimus ei tribuere, ex sola inani Matth. oli figura, quia Clusius suo Lycoctono inflexam comam non adscribit.

Vires &
vires

Mallum fuit Vennam hoc genus Clusio, è Lynceanis montibus erutum, quod postea in horto aluit, florens cum superioribus, aut paulò etiam ferrus.

ACONITVM LYCOCT. COMA nutante maximum.

Descriptio



Trium interdem cubitorum altitudine assurgit, caule tamen satis gracili, torondo, superiore parte in multos ramos diuiso & nutante: summo caule longam *floribus spicâ* fert; Lycoctoni cærulei vulgaris, siue Napelli dicti floribus similitum sed paulò dilutioris purpuræ splendentium,

quorum singulis (ut in aliis Lycoctoni generibus) succedunt tereta longitudo cornicula ex eodem pediculo nascentia, semine inæquali, fusco plena: *folia* ampla & oblonga, in multas tenues profundasque laciniâs magis diuiduntur, quam in vltio alio Lycoctoni [præter id quod à Belg. flore Delphinij] omni calitur, inquit Clus.] genere, quæ superne atra quidem viriditate prædita sunt, non splendunt tamen: *radicem* habet crassam & longam, Napi serè magnitudine, foris nigricantem, & per intervalla multis fibris donatam, ac superiore parte in multa capita extuberantem, quibus caules emergunt: subinde tamen recentes exiguos Napi ad latera enatos habet, quibus se propagat.

Synonyma

Clus. pann. p. 410. Acon. lycoct. comâ nutante siue Lycoct. maximum: Eid. hist. Acon. lycoct. siue quoad descrip. 8. quoad iconem, comâ nutante: fortè Matthioli nonum. C. Bauh. pin. Aconitum 9: siue inflexâ comâ maximum: Acon. 9. Matthioli: H. Lugd. Aconitum comâ nutante Clusij. C. Bauh. in phyt. Acon. 9. Matthioli diuersum erat ab hoc Clusij. Hoc quidem, nonum ipsi erat: Illud verò decimum, siue bulbosum inflexâ comâ. Nos autem potius existimamus Aconitum 9. Matthioli esse Antithoam, licet aliter sentiat Clusius. Suspicionem nostram mouere flores, quos luteos ait, & figura, quæ aliquo modo Antithoæ respondet.

Locus.

Hoc Aconitum à Eud. Sebizio primò. n ex Italia Viennam delatum est, & Clusio communicatum. Floret autem Iulio.

Aconitum 4. Matthioli fortè Delphinij flore.

Apud Matthiolam in impress. anni 1554. est icon sine vlla descriptione, nec indicat, à quo habuerit eam, contentus solâ inscriptione Aconiti quarti. Habet autem ea icon *folia* in multa segmenta diuisa, ad Napellum accedentia: *caulis* vnus diuiditur in aliquot ramos, abundantes floribus, in quibus *calcaria*: *radix* fibrosa est. In iconè Compendij impressi anno 1571. non sunt flores magni, quales ei in delineatione ipsius textus adscribit. Quare existimarem ea verba, *fl. res mittit aureos magnos*, pertinere ad Aconitum tertium, sed id prohibent post dicenda. In comm. in pressis 1559. præter iconem & titulum nihil habet Matthiolus. In comm. cum mag. fig. anno 1583. hæc addit: Sunt mihi sex Aconiti species, de quibus qui meminerit habeo neminem. Harum imagines, quas appingi curauimus, sit ad me Hier. Donzellinus, qui tamen Dominico Moules. uro has acceptas referebat. Harum historiam describere operæ pretium non duxi, quod appictæ imagines eas ad viuum repræsentent. De floribus tantum dicam, qui in quarto & nono aurei sunt, in reliquis verò purpurei. Ex quibus Matthioli verbis apparet, ignotas ei fuisse plantas sex, quarum proponit icones. Quartæ tribuit colorem luteum. Ego putabam fuisse aliquem Typographicum errorem, nunc tribuo ignorantie Matthioli, qui omnes sex scribit ad viuum repræsentari cum tamen quinque pessimæ sint. Nec potuit ferre sententiam Matthioli, non visis plantis ipsis sicis, vel virentibus. Nec plura in comm. Ital. habet, impressis anno 1568. Ibidem etiam tribuit colorem *giallo*: in Hist. verò germ. dicuntur flores purpurei.

Floris color
giallo.

Camer. apud Matth. in hist. german. Aconitum 4. Eid. in Epit. Acon. 4 floribus cæruleis caudatis. *Synonyma*

C. Bauh. phyt. Aconitum 5. siue cæruleum glabrum flore Consolidæ regalis: An quantum Matthioli nam licet floribus dicat aureis, Camerarius tamen in Matth. dictis cæruleis: Acon. cæruleum aliud Gesn. hort. Eid. apud Matth. Acon. 5. siue 4. Matthioli: An fortè Acon. lycoct. flore Delphinij cæruleo Lobelij & Dodonzi? Item pin. Acon. 6. siue cæruleum glabrum flore Consolidæ regalis: Aconiti genus floribus cæruleis Gesn. hort. Acon. Lycoct. flore Delphinij Dod. Lob. Acon. secundum Clus. hist. Acon. lycoct. cæruleum i. fl. Delphinij Dodonzi Hist. Lugd. p. 1741. An. Acon. 4. Matth. Lac. & H. Lugd. p. 1740?

Aconitum cærul. aliud ego potius ad Acon. C. Bauh. lycoct. cum magno calcari, quod ipsi 4. est in phyt. referendum censio. Idem in pin. ad Aconitum 5. quod ei in phyt. 4. est retulit. Acon. flore Delphinij Dod. Lob. Clus. & H. Lugdunensis hic commemoratum, ab eius glabro separo.

ACONITVM LYCOCTONVM Flore Delphinij.

Aconitum lycoctonum, quod à flore Delphinij cognominatur à Dodonzo, proceris assurgit *caulis* instat Napellæ: *folia* variè similiter & creberrimis incuruis diuisa: *floris* secundum caules superius, veluti in longam compoliti spicâ, è puniceo ac obliuore colore purpuream

Descriptio

puram emulantur; formâ ferè floris Regij, in posterius videlicet corniculum desinentes: *siliqua* & *semen*, ut maioris lycoctoni succi: *radices* oblongæ, crassæ, tres aut quatuor demittuntur, patetis adhaerentibus filamentis.

Ob floris differentiam, Aconitum lycoctonum flore Delphinij [inquit Lob. in Obs. pag. 386.] discernunt nuperi; cui radices ternæ, quaternæue Anthoræ, quasi nodulo aptæ in fibras desinen-

tes: caulis binum, interdum ternum cubitorum: folia altè & minutim diuisa, Anthoræ vel Napelli, sed minora: semine & siliquis non diuersis.

H. Lugd. p. 1741. Acon. lycoct. cæruleum 1. flore Delphinij Dodonæi. Clus. Acon. lycoct. fl. Delphinij.

Hanc plantam esse Aconitum quat-

tum Matthioli nondum asserere audemus. Matthiolo radix est fibrosa: Dodonæo verò & Lobelio bulbosa: Iconem nostram sculptam emimus.

Hoc Aconitum munere Robini hortulani Regij Parisi s. primò vidi. Montbelgardi semen terræ commissum plantam dedit, quæ floruit Iulio.

ACONITVM LYCOCT. FLORE maximo.

Descriptio



lem nonnunquam, rotundum, non valde crassum, firmum rari en & rectum, ex viridi purpuriscentem, superne quinos aut senos ferentem,

floris, inter omnia Lycoctoni genera maximos, quatuor foliis ut reliquorum generum, constanter, supereminente galeâ longè maiore, & vncialis aliquando longitudinis, elegantis è cæruleo purpurei coloris, sub qua bina longa cornicula extimâ parte latiora, & litui veterum Romanorum ferè instar inflexa, coloris dilucidi purpurascens, teguntur, staminibus nigris medium florem occupantibus, floribus succedunt tria plurimum cornicula, coniunctim ex eodem pediculo nascentia, interdum quaterna & quina, ut in tertio peregrino Clusij genere [in Lycoct. Neubergeri,] sed longè maiora, *semen* inæquale, & fuscum continentia: *radix* parui Napi formam æmulatur, nigricantibus fibris prædita: alias præterea similes radices lateribus adnatas habet, tenuioribus adhuc fibris quæ singulis annis adhuc recentes caules proferunt: sed etiam infimi caulis nodis adnascuntur tubercula, non secus ac in Italica Thora.

Clusio dicitur in pann. p. 410. Aconitum lycoct. 6. [9. ad itonem] Iudenbergen. C. Bauhin. *Synon.* pin. Aconitum 13. [14. in phyt.] siue cæruleo purpureum, flore maximo, siue Napellus 4. Acon. fl. cæruleo. Napellus serotinus Camerarij.

Sponçe provenit in Iudenberg, altissimo totius Stiria monte: Floret Augusto; in hortis *Locus & tempus* verò sub extremum Iulium, serius reliquis superioribus. Anno 1585. copiosè quoque inueniebat Clusius, in quodam Schneeberg iugo, quâ difficillimus est ascensus.

ACONITVM LYCOCT. FLORE cæruleo, galea elatiori, radice bulbosa.



Descriptio
Præter fibras quibus subinde radicatâ terræ hæret, bulbos gerit turbina- tos, è quorum basi fibræ aliæ exeunt: folia ex caule alternatim produ- cuntur, me- diocri ampli- tudine, quæ in quinque pro- fundas laci- nias, rursus leuius subdi- uisâ, conscin- duntur, splen- denti virore prædita, sub-

hirsuta: floris galeati, rari, cassidem longam eri- gunt, colore dilucè cæruleo.

Clusio Aconitum Lycoctonum 10. dicitur. C. Bauh. pin. Aconitum 14. [16. phyt. & 11. apud C. B. in corp. Matth.] siue cæruleum minus, siue Napellus mi- *Paris.* nor, in editoribus locis exilior proveniens. In phyt. dubitat an esset Aconitum 8. Matthioli: apud Matthiolum id asserit: in pin. negat, & facit 15. Aconitum, siue ramosum paruo flore; Aconitum 8. Matthioli H. Lugd. Floribusque altè esse luteis: Matth. purpurascens: at Camerario rubescentibus.

Describitur à Dod. de purg. & fol. pro Aconi-

Dod. notat.

to lycoctono tertio, pingiturque sub titulo Aconiti lycoctoni caerulei parui. Dod. huc refert Aconitum minus Tragi, contra opinionem nostrā.

Lab. taurin.

Descriptiones duas habet Lobel. in Obs. pag. 186. Vnam titulo Lycoctoni caerulei parui, Napelli facie: Alteram titulo Aconiti minimi. Neutra autem cum descriptione Dodonzi in torum conuenit, cuius figuram etiam in Ic. Plant. p. 678. sub priori titulo proponit. Rem-perpendant lectores.

Camer. apud Matth. huius ineptam figuram habet, sub Aconito octauo. Eid. hort. Thora Italica.

An Alcionium Anguillarum?

Aconiti genus hoc radice paruo Napo simili Tiguri in Gelneri hortu, Iulio mense florebat.

Locus

ACONITVM RACEMOSVM, ACTÆA quibuldam.

Descript.

Christophoriana herbariis dicta, radice crassiorcula, foris nigra nititur, fibris donata Dodonzo interius flexi colore lutea: caules sesquicubitales, ramoli, reues, teretes, geniculati: folia rugula, inferne spicidentia, nonnunquam utrinque, & si tota con siderentur, valde ampla: abeunt enim in tria segmenta pediculis palmari- bus & sesquipalmatis donata, atque hæc rur-



sum trifariam diuisa, sæpius- que interdum triplici illā di- uisū. à disse- cta. ut tandem ierna simul fo- lia singularia cōspiciantur, Imperatoris quodammodo similia, ob- longa, acuta, profunde satis incisa, quorū medium foliū incisiuris duab profundiori- bus dissectum tripaturū ap- parer: Flores racematim di- spositi, cā ludi, ex foliis quin- que caducis

compositi, intra quæ stamina candida, herbido nonnunquam apice: bæta succedunt, vel, ut ait Dod. fructus rotundi, paulò longiores, per matu- ritatem nigri, striam lineamue, ab vna parte ostendentes, vuarum acinis aliqui similes, & in vix modum coherentes. Nostram interim æta- tem Christophorianam, & S. Christophori her- bam vocitate tradit Lobelios (qui quod vvas fe- rat æqualeis annumerauit.) fuisseque qui Costum nigrum dixerunt: alios tamen maluisse Aconitum bacciferum nominare. Costo autem nihil habere respondens. Aconitis veld annumerari, propter perniciosam & Aconito similem, quam habere credatur, facultatem.

Cz. alpino Baiba capri quorundam. Aret. apud Gesn. Aconitum racemosum. Gesn. hort. Chri- stophoriana vulgo Italorum. C. Bauh. pin. Aco-

nitum 16. [17. phyt.] siue racemosum: An Actæa Plin. lib. 27. cap. 7. Christophoriana Clus. hist. Tab. Camer. & Eyst cui & Costus niger quorun- dam. Napellus racemosus H. Lugd.

Napelli rae- mosus.

Plerisque Germaniæ & circa Rhenum Mo- samque locis, in syluis præsertim montosis oc- currit, viuaci & diuturna radice, quotannis cau- liculos & folia regenerans. Flores Maio, sed fru- ctus Augusto, aut serius, perficiuntur.

Local.

Tempus

Fertur exitialis Christophoriana, ac non mi- nus noxia quam Aconitum.

Vires

ANTITHORA FLORE LVTEO, ACONITI.



Antithora Descriptio

Aperneca- bili Thoræ ve- neno aduersa, dodrantem al- ta, interdum & cubito pro- cerior, caule est singulari, rigido, angu- loto, subhirtu- to, cui folia al- ternatim ad- nascentur, Napelli æmu- la, tenuius dis- secta, & splen- doris illius experta, auer- sa parte albi- cantia, sapore amaro prædica

Lobel. Nigellæ quadantenus similia: flores non ingrato odore præditi, cucullati, & rictu hian- te Napelli penitus, excepto colore, qui huic ex fluo pallefcens: corniculata seminis vascula iti- dem consimilia: radix ex bulbis oliuariis con- stat, foris fusca, intus albis, gustu amaris, fibratis.

Lob. lio geminæ radices, Cyperi aut Orchidis, foris rugosæ, solidæ. Dod. foris sublauesce- tes, interius candicantes, fractu, ubi resiccatæ, costumaces, friabiles tamen, ubi quidem suæ spontis est: fecunditate enim læt aut hortensis soli, lasciuienti subinde longiores ac plures sub- nascentur radices.

Pro Zerumbet à Constantinopolitanis vsur- patis radicibus mihi olim eiusmodi exhibita, nempe pyri-formes, siue turbinatæ, aliæ vnciales, aliæ duplò maiores, crassiusculæ, quædam rugosæ modicæ, quædam minimæ, in quibus Zonula quædam, & auulsa fibrarum vestigia, coloris extrinsecus fusci, intus albi, capite umbilicato, vnde emerisse videtur caulis: consistentia dura, solida: sapor amarus.

Zerumbet Constantinopolitanorum.

Matthiolus in prior. comm. est Napelli genus alterum. In hoc tantum pingit. Meminit quidem Napelli Moyfi, quam aliqui Anthoram vocent, quæque antidotum sit: verum non demonstrat quæ herba sit. In post. comm. lib. 4. cap. 80. ean- dem pingit sub Antoræ titulo, immutatâ tamen nonnihil figurâ, cui ex audita flores purpureos adscribit, ac addit: missam sibi esse radicem An- thoræ orientalis à Qualecbengo, dicere, mercato- res vo-

tes vocasse Zedoariam, ideoque se existimare, quod si Anthora, Zedoaria Auicennæ non fuerit, nihil aliud esse quam Napellum Moyfi, ab eodem descriptum: Imò se credere Napellum Moyfi, & Zedoariam apud Auicennam idem cum planta hac, quam integrè non cognouerit.

*Anthora
lana Cam.*

Camer. in Epit. Matth. Antoræ attribuit flores in luteo pallecentes, refertque purpureos à se non visos. Adhæc se obseruasse, non vnus modi figuram representare radices Anthoræ: aliàs enim singulare tuber habere, aliàs geminas coherere: esseque vel turbinatas, vel oblongas, nonnunquam triplices inueniri, nonnunquam quæ scorpionum imaginem imitentur. Et hanc varietatem iconibus binis hic adiectis rei herbariæ studiosis indicari voluit. Eadem in hist. germ. tradit. An eadem Aconitum nonum?

Gesl. hort. Antithora vera, Aconitis cognata, Antora & Napellus Moyfi Matthioli, Item, A-

conitum salu-
tiferum, Anti-
thora & Anto-
ra vocatum.

Eid. de Lun. in
sine, loquenti
se Antithora,
Anthullia Gal-
lorum Alpibus
Italiz finitimo-
rum.

Anthora, in-
quit Dodon.
ethigie Napel-
lum refert. Lac-
us Lemani ac-
colæ & Taurini
Ligures vulgo
Antithora appel-
lant. Dicta au-
tem Anthora,

quasi *antithora*
quod nempe
Thoræ aduerle-
tur, & alexi-
pharmacum e-
ius sit. Thoræ
autem ac An-
thoræ, siue Tu-
ræ & Anturæ
voces, nouæ
quidem viden-
tur: sed tamen
exant apud
veterem Mar-
cellum Empi-
ricum, qui ex
Tura & Antu-
ra aduersus leu-
comata & al-
bugines oculo-
rum medica-
mentum con-
ficere docet.
Meminerunt
quoque Antho-

sz Simon Ianuensis in Synonymis & Arnold. Villanoua in tractatu de venenis: sed quæ adferuntur, non satis notam aut cognitam ipsi fuisse Anchoram ostendunt.

Lobelium quod attinet, is in Adu. p. 329. Anthoram Delphini delineationem explere posse Tom. III.

credidit.

Tabern. Anthoræ duas species tradit. Harum primam ait esse flore ex luteo pallido: Alteram solo flore cæruleo à prima distinguit, & iisdem locis prouenire scribit, sed rariorem. Anthoram Dioscoridis Delphinium arbitratur. An autem flore cæruleo viderit Tabernam. dubito: fortè recordatur Antithoræ Matthioli. Sed quæ rarior sit, cur non particulatim describit, & loca, ubi reperiret indicat? Medici & pharmacopœi ab eiusmodi Anthora sibi cauèant. C. Bauh. pin. ignorat & quærit quid sit.

Gerardo Anthora, siue Aconitum salutiferum Calp. Bauhino phyt. & pin. Aconitum 17. siue salutiferum, Napellus Moyfi, & herba Napello similis eiusque veneno repugnans, Auicennæ: Anthora Matth. Gesl. hort. Lon. Cæsalp. Cast. & Camerar. Anthora Lob. Dod. Tabern. & Ger. Vulgaris Clus. hist. Aconitum salu-
tiferum Gesl. hort.

Zedoaria vera Serap. Zedoaria Gieduar Actio, Actuariop Zadoura, Zadoaria, Zadoa. Zadoar Auic. Napellus Moyfi. Germ. Griffithyll. Gall. Anthole. Ital. Antora. Angl. holfonce vvoe-
ses harru.

Anthora Rhæticiis atque Sabandiciis alpibus emicat Æstare: quæ Taurinorum, Ligurum & Lemnorum accolarum operâ, plurima copiâ cæpta Venetias adferri plusculis ab hinc annis. Est enim prope Geneuam & ad Allobrogum Delphinensium alpes multa, Lobelio: Vt & in Gallia Cispalpina & Liguriz montibus; Matthiolo: Ac in Helueticorum Alpibus Tabern. Ex his autem in Germaniam infertur & colitur in hortis, ac facillè ex radicibus prouenit: ex semine rarè ante triennium oritur. Geneuæ in monte Thuri floret copiosè Iulio: semen maturat Septembri.

Anthoram magno quodam prouidentia diu. munere aduersum Thoræ pernecabile virus comparatâ rentur Taurini, Ligures & Lemani accolæ. Addit Anton. Guainerius tractatu de peste, diff. 2. cap. 3. magnæ etiam esse aduersus pestem efficaciz. Præstant Antoræ radices [inquit Matthiol.] non solùm ad epotum Napellum, sed ad cætera quæcunque venena, quinetiam ad viperarum & reliquorum venenosorum morsum. Ligures Anthoræ radicibus [vi audio] felicissimè vtuntur ad intestinorum vermes. Dantur quoque vtiliter aduersus pestilentiam: & ad omnes internos dolores. Auxiliantur omnibus cordis affectibus, nec minùs præstare dicuntur, iis in febribus pestilentibus in quibus exanthemata lentium figura exoriuntur. *Hacilla.* Sed iuuenes Medici & prudentes non nimium credant viribus quæ à Matthiolo huius plantæ radicibus tribuuntur: caueant ne pro Antithora [Matthioli opinionem sequentes, dicentesque Antithoram esse flore luteo] sumant Aconiti, vel Napelli speciem: caueant etiam à radicibus sibi incognitis; quæ venduntur pro Anthora siue Antithora, facillè enim venenata radix pro salutifera obrudi potest: fortè Matthiolus habuit copiosè missas Constantinopoli, quas cupiebat diuendi, dum tantopere eas extollit, & ad omnes internos dolores vtiliter dari scribit, & auxiliari omnibus affectibus cordis [cur ita vendit radices plantæ sibi incognitæ. Considerent lectores an radix purgans conueniat commorlis à viperis & cane rabido: itemque peste laborantibus? Quis tandem credat radicem purgantem

*Tab. dua
Anthora.*

Tab. not.

Synon.

Locus.

Tempus.

*Locus &
Tempus.*

Matth. not.



*Napelli of-
fig.*

W.



Etymon.

auxiliati omni'bus cordis affectibus. Agrytis plurimi fit, ad omnium venenorum amolienda nocumenta, dum plebeculam panægyricis declamationibus excitam præstigiis illis oblectant, & illudunt. Amarorem auersatur plebecula illic, atque si quidpiam peramarum gustarit, amarior esse Anthora. Aduersus morbos cōtagiosos & febres vtuntur Veneti. Dodonæo Anthoræ radix est valdè & insigniter amara: aduersatur venenis omnibus: utilis ad purgationes: serosos siquidem & mucosos etiam per inferiorem ventrem educit humores: lumbricos & ventris tineas pellit educitque, Hugo Solerius non modò per inferiorem ventrem, sed & per superiorem largas ait Anthoræ radices expurgationes moliri: modum esse ad quantitatem Faselii [quem vulgò Fabam vocat] ex iusculo aliquo aut vino: darique duris corpore.

DE TITHYMALO IN GENERE.

CAP. XIX.

*Tithymali
genera no-
men Diof.*

Tithymali genera, Dioscoridi, Plinio, Galeno & Apuleio auctoribus septem sunt. Primus Characias siue masculus; Alter Myrtites siue Myrsinites, scæmina; Tertius Paralys; Quartus Helioscopius; Quintus Cyparissias; Sextus Dendroides; Septimus Platyphyllos.

Theophrastus tres tantùm enumerat 9. hist. c. 12. maritimum: masculum Oleæ folio: myrtarium candidum, folio Myrti: Vel, secundum Dodonæum, Paralys, marem & scæminam Myrtitem: Vel, Characion, Myrtiten & Paralys, Corn.

*Differentia
plures.*

Plures autem hodie, quàm vel apud Dioscoridem extant, habemus Tithymalos, quarum partim consulas ab authoribus, nec verbis designatas, partim affectas orationi non intellectæ Dioscoridis, quambilet suis iudiciis deinceps illustrabimus & emendabimus. Dioscoridis quidem oratione quasi filo Ariadnæ ducti, sed notum ordinem sequuti, accuratioremque ex inspectione descriptionem, quò qualibet planta, cui propius quadret, magis perspicuum fiat. Tithymalorum historiam satis confusè Mauritanii tradiderunt. Mihi difficile videretur, inquit Matthioli, decernere quæ Tithymali genera ex iis quæ à Græcis representantur, ea duo sint quæ à Mesue & Auicenna Scebram & Alsebram nominantur: quoniam horum neuter, quod extet, earum plantarum faciem notis explicauit. Credidit Brassauolus illud esse Mesuei Alsebram minus & Auicennæ Scebram, quod Dioscoridi paralys. Sed ab eo dissentio, quòd nusquam legerim in horum monumentis Alsebram minus in maritimis nasci, & Auicenna dicat Scebram in hortis coli, foliis Tarco similibus. Nec possum cum eodem sentire, quòd Alsebram maius apud Mesuem, & Mehezehgi apud Auicennam, idem sint Mauritanis, quòd Græcis Tithymalus platyphyllos. Putauerim minoris generis, Scebram siue Sebram esse officinarum Esulam minorem, Tithy. cyparissiam Dioscoridis. Alsebram maius siue Mehezeregi eam omninò plantam, quæ Pityusa.

*Nomina
linguar.*

Τιθύμαλον Dioscorides: τιθύμαλλον Theoph. Lactariam Gaza vertit. Latini, Plinio auctore lib. 26 cap. 8. Lactariam herbam, & Lactucam caprinam nominant. Sic etiam Columella, à lacti li-

mili humore, qui secto aut vulnerato folio, caule, aliæque parte defluit. At Celsus lib. 5 cap. 7. Lactucam marinam appellat. Non tamen omnis Tithymalus, sed marinus ita propriè vocandus. Reperitur & Lactoris Esulam officinæ dicunt, teste C. Bauhino. Rei herbariæ periti etiam apud Germanos omnia Tithymalorum genera, *Wulffsmilch* & *Tuffels milch* vocant, h. e. Diabolicum lac, sicut illud Lupinum lac. Belgæ *wulfs melck*: Galli *Herbe à lait* nominant: Itali *Tithymalo*: Hisp. *Lesebe fresca*. Angli. *wilde spurge*: Boh. *kolovratce* & *Ebrvagka*. In vniuersum Tithymalus ab Arabibus nominatur Xanser & Eshuha, Matth. Mauritanis Xanxer & Ethulia, H. Lugd. A succo lacteo quo turgent differentie cunctæ, nomen factum commune Tithymalis vel per diphthongum potius, auctore Lobelio, Tithoimalis, quòd mammam siue papillam vberis exitiosam virosamue non insecitè interpretatur.

Quod porro Theophrastus lib. 9. cap. 15. è Tithymalo Hippomanes fieri dicit, Theod. Gaza *Hippomane* legendum contendit, & multi sunt qui ipsum sequuntur, sed haud ita clarum quæ ratione ducantur, teste Cornario. De Hippophæe & Hippomane agemus ante Tithymalum serratum.

Cæterum, florem semenque Tithymali æstate perficiunt: nonnulli seriùs, alii citius; in quibusdam regionibus priùs; in frigidioribus tardius.

Omnes porro vincentem habent acrem calidamque facultatem, inest verò & amaritudo. Valèntissimus eorum est liquor: dein fructus & folia: postremò radix. Hæc aceto incocta, sanat erolorum dentium dolores: liquor in ipsa foramina inditur. Cæterum, si aliam partem contingat, continuò adurit, vlceratque illam, ex quarto existens calefacientium ordine, qui ad exurentia pertinet. Sic pilos quoque & verrucas, & myrmecias, & pterygia, & thymos, cum oleo inunctus succus euellit: detergitque lichenas & psoras, propter amaritudinem: nec non vlcera phagedæmica, anthracode, & gangrænode, quia valenter calfacit & desiccatur, aliquando iuuare poterit. Ad hæc fistularum callos eximit. Prædicta omnia folia & fructus præstare possunt, sed imbecillius. Quibus sanè & ad pisces in aqua stagnali capiendos vel assolent: celerrimè enim ab illis in vertiginem acti, ac semimortui red diti, ad aquæ superficiem feruntur. Porro cum septem sint Tithymalorum genera, valentissimus est, quem Characion maremque nominant: & scæmina vocata myrsinites: & qui in petris nascitur arborescens. Deinceps qui Phlomo assimilis est: & Cyparissias. Dein marinus: ac denique Helioscopius. Proportionè autem facultatis ipsorum & cinis, & lixiuium existet, *authore Galeno*. His similia Tragus habet. Omnia Tithymalorum genera adurendi vim obtinent, inquit, in primis verò lacteus eorum succus, quare rariò citra noxam sumi possunt. Semina pares habent facultates, ac calidiora & actiora sunt, aliomque turbant, & vomitiones potenter excitant. E radicibus, herbis & lacteo Esularum succo vnguuntur, efficacissimum aduersus scabiem capitis contagiosam, quàm Germani *Den herbgrasde* vocant, confici potest, estque hoc singulare quoddam medicamentum. Tithymalorum verò omnium succum per inferna purgandi validam vim habere atque potentiam: Bilem, puritatem & quo-

& aquosos humores ducere etiam in exigua quantitate sumptum; sed ventriculum vehementer conturbare, & interna viscera inflammare: eamque ob causam ab eius usu doctos ac prudentes medicos abstinere, refert Dodonæus, qui nec foris eos turbè adhiberi monet. Farinam Tithymali succo suffulam ante alucos dispersam gillantibus lacertis, omnibusque animalibus aliis pernitiem adferre testatur Ælianus. *Narrant* apud Plinium lacte tithymali inscripto corpore, quum inaruerit, si cinis inspergatur, apparere literas, & ita quidem adulteras alloqui maluere, quàm codicillis. Nonnulli tandem succo Tithymali albo propter calorem intensum in eo existentem coagularunt Mercurium, & eiusmodi liquorem Lac virginis appellarunt: verum falsum fundamentum hoc fuisse perhibet Paracelsus.

TITHYMALVS CYPARISSIAS.

Descriptio

Radix minimo digito crassior, sæpè tenuior, fibrata, lignosa, & nonnunquam terpens, caules promit dodrantales, & cubitales, primò simplices, postea ramosos, in quibus *forta* primò



Limantæ, mollia, quæ postea tenuiora mulrò cum in ramos huiusmodi: flores in umbellæ quasi formâ dispositi, longis pediculis folia quibus donantur perforantibus lutei, ex quatuor quasi semilunulis coniunctis extrorsum vergentibus corniculis, apicibus item luteis: quibus triquetri succe-

dunt *loculi*, in quibus *semen*: ab eadem quoque radice exurgit *cauliculus*, (ego) ror abortu habeo, licet à nonnullis pro priuata specie proponatur, quorum folia breviora multò, pinguiora, subrotunda, auersâ parte plurimis punctulis seu stigmatibus rufi notata, in quibus ramulis non memini florem obseruare: est mihi etiam planticulis, lacte autem partibus omnibus turget.

Variet.

Hic Tithymalus pro anni tempore & ætate insigniter variat. Quare nemo posthac mirabitur, si authores in eo delineando non parum variare perceperit.

Dioscor. Tithymalus quintus siue Cyparissias caulem profert dodrantalem [*ὀκτώδαντος*] aut etiam altiore, subrubrum [*ὀκτώδαντος*, ver. non habet] ex quo folia Pini similitudine pullulant, molliora tamen, tenuioraque: arque in totum nuper nascentem pinum æmulatur, vnde & cognomen traxit.

Plin. quia tunc Tithymalum Cyparissiam vocari testatur propter foliorum similitudinem, caule gemino aut triplici, nascentem in campis.

Tom. III,

Tragicon *τὸ θυμὸν καὶ τὰ πύρρα* non differt à *Icon Trag.* Fuchsi iconè, quæ est Tithymali Cyparissias verno tempore prouenientis priusquam in ramos diuicetur.

Si Matthiolo coniectandum esset, putaret nil aliud Matritanis esse minoris generis Alcebram siue Scebum, quam plantam hanc, officinis Esulam minorem vocatam. Hanc autem eam esse suspicatur, quam Dioscorides Tithymalum Cyparissiam. In post. comm. item Hist. germ. & Ept. miratur quod Dioscorides hoc Tithymali genus *καὶ τὰ πύρρα* appellauerit, cū in Pinum, non Cyparissium referat. Matthiolum imitatur La-

Diosc. not.

Lonic. duas habet icones Tithymali Cyparissias, quarum Altera male posita est pro Tithymalo dendroide.

Gesl. hort. Tithymalum Cyparissiam Matthioli, Pityusam aliorum esse, & non aliam quam Esulam vulgo dictam videri refert, sc. minorem, ut etiam Anguill. testatur: Pityusam ad hanc etiam refert Cordus in Dioscoridem, eamque Tithymalum Cyparissium siue Lactariam quintam vocat.

In Obs. pag. 192. figuram habet sub falso titulo Tithymali cyparissias. Sub titulo enim Pityusæ, siue Pineæ, officinarum Esulæ minoris, Turpeti in Actuarii, & Tithymali Cyparissias Tragi, Adu. p. 151. Augl. *Pine spurge*, Hist. *Esula minor*, posita figura eam non pertinet: alioqui sibi contrarius esset Lobelius: pingit namque ex Dodonæo Tithymalum pityusam. In Ic. Pl. p. 356. est eadem etiam figuratum transpositio. Nam ex mente Lobel. in Adu. non conuenit titulus Tithymali cyparissias, sed Tithymali Pineæ.

Dod. gall. vnius plantæ duas proponit figuras: prior autem est ex Matthiolo sub inscriptione Tithymali Cyparissias: posterior ex Fuchsi, sub titulo Pityusæ minoris. fieri tamen potest ut intelligat Pityusæ siue Esulæ minoris nomine aliam plantam, quæ non demonstratur per effigiem eo titulo propositam.

H. Lugd. p. 1644. Tithymalus cyparissias Matthioli: p. 1648. Tithymalus cyparissias Dodonæi: p. 1654. Pityusa siue Esula minor, Dod. hist. stirp. Tithymalus cyparissias Fuchsi. Confascinator H. Lugd. tres icones vnius plantæ posuit.

H. Lugd. effigies vnius

Compil. Tabern. tres quoque picturas dedit. 1. est Tithymalus cyparissias: 2. Tithym. cupressinus primus: 3. Tithym. cupressinus alter. Prior effigies est plantæ verno tempore prouenientis.

C. Bauh. apud Matth. Tithym. cypar. maior: Tithym. pinea Lob. in Ic. Plant. Esula minor Dod. in sol. & Lugd. Pityusa minor Dodon. gall. Pityusa siue pinea, & Turpetum nigrum Actuarii Lob. in Obs. Nos Tithymalum pineam & Turpetum nigrum Lobelii, quoad iconem, huc non referimus. Esulam etiam minorem Dod. in sol. hoc capite non relinquimus, sicuti neque H. Lugdunensis. Pityusam autem minorem Dod. gall. quoad iconem huc referimus.

Eid. phyt. Tithym. 14. siue Cypariss. maior purpurascens coma: Pityusa siue Pineæ offic. Lob. Obs. & Icon Plant. Item, Tithym. 15. siue Cypar. minor; Tithym. cypar. Dod. lat. & Lobel. Obs. & Ic. Plant. Huius species minor, vix palmum alta, rubente capitulo. Nos Tithym. cyparissiam Dodonæi & Lobelii ad hoc caput pertinere non negamus.

Gggg 2

Synon. Eid. pin. Tithym. cypariss. 2. Tithym. cypar. Matth. Trago (cui & Esula vulg. maior & quinta) Fuchs. Anguill. Dod. (vt & Pityusa minor.) Turn. Lac. Gefn. hort. Lon. Lob. is Adu. & Obs. Cast. Thal. H. Lugd. (quæ Matthioli & Dodonæi figuram habet) Tab. Cam. & Calceol. in itin. Baldi: Tithymalus pinea & *πικνύδα* Disc. *Efelskraut* Schvvenckf. Tithymalus cupressinus, siue Humipinus, Lob. ic. Plant. Esula officinarum Cæsalpini.

Varietas. Variat: 1. foliis Lini virentibus, corâ flauâ, aliquando subrubente, Tithym. cyparissias rubente capitulo Schvvenckf. in collibus & montibus sterili & aridiore Solo. 2. in montibus candidior, foliis angustis, Esula candidior Cæsalpini 3. vix palmum altus, capitulo rubente. Iudicium nostrum supra nouissima hæc C. Bauhini synonyma ex prioribus colliges. Hoc duntaxat monemus nos latere, quam plantam Cæsalp. intelligat per Esulam suam candidam: C. Bauh. hæc plantas coniungit, quas in phyt. olim separauerat.

Locus. Prætorum margines & sepium istam sepius alunt Esulam: in Francia, Belgio, & Anglia non nisi horri pharimacopæorum, Lobelio: Turnerus testatur provenire plurimum in agris inter stipulas, demersis segetibus, aded Chamæpity similem, vt non aduertentes facillè fallat.

Vites & usus. Vim habet similem Characiæ, Myrsiniti, Pallio, & Helioscopio, Diosc. & Plinio auctoribus. Vtilissima inter omnes Esulas ea est, inquit Tragus, quæ longis & strictis, veluti Linaria, foliis vestitur ita tamen vt radix solummodò intra corpus vsurpetur, repudiato lacteo liquore: vt pote ad hydropem optimæ præparantur pilulæ.

TITHYMALVS STICTOPHYLLOS.

Ætymolog. Tithymali genus hoc *caulibus* foliosis, simplicibus, non brachiatis, seu Tithymalus *στεικφυλλος*, quod sic nominare solet Thalius, ob foliola mirè punctelli notata, duplex est, *Maas* & *Minus*. Præcedentis autem abortum existimamus.

Synon. C. Bauh. phyt. Tithymalus 16. siue foliis punctis croceis notatis, Eid. pin. Tithymal. cyparissias 1. siue foliis &c. Tithym. *στεικφυλλος* Schvvenckf. duplex Thali: Tithym. aruensis Camer. Esula scabiosa Gefn. coll.

Locus. Ceterum, Schvvenckf. se hunc Tithymalum in asperis & tabulosis passim cum Pineæ secus itinera & agrorum margines collegisse perhibet.

TITHYMALVS MINIMVS ANGVSTIFOLIUS annuus.

Descrip. P Almaris aut semipalmatis est plantula, *radicula* nitens tenui, tres aut quatuor uncias longâ, *cauliculus* & ramulos multos eâ quâ iam dixi longitudine, ac etiam dodrantes, *foliolis* stipatos semunciam, vncieque trientem longis, semiculmum latis, crebris, sursum spectantibus, lacte turgidis: *stipulus* herbidi, & pericarpium triquetrum, Tithymali Cyparissiq, sed multis numeris minora.

Synon. Trago Esula exigua, Dioscoridis Peplos &



spomeum Papauer. Lob. Obs. p. 193. Ic. Plant. p. 357. Esula exigua Tragi. Ponè in Baldo Esula minor Tragi. H. Lugd. p. 1656. Esula minima Tragi: Eid. p. 1659. Peplis minor Dalechampii: *Dna figura.*

Dod. gall. Tithymali genus admodum paruum: Lat. Tithymali Cyparissii species minor, vel

Schvvenckf. nos.

Tithym. cypariss. alter. Tabern. Tithym. minimus. C. Schvv. Tithym. leptophyllos, *Steinmitch* h. e. Tithym. petreus: *Nomen* autem hoc germanicum minus placet: nec enim in locis petrosis, sed in agris provenit.

Thal. Tithym. leptophyllos Matthioli: & sic etiam Camer. in epit. Apud Matth. hist. germ. Tithym. minor.

C. Bauh. phyt. Tithym. 24. seu Esula exigua Eid. pin. Tithym. Cyparissias 3. Esula minima Tragi, & Peplis minor Dalechampij, ac etiam Tithymalus leptophyllos Matthioli [sine descriptione, addit in Animad.] H. Lugd. Vna eademque est planta. *Summus* Tithymali Matth. multum euarians à summitate Tithym. minimi facit vt diuersum statuam, nec dicam in H. Lugdunensi tres icones esse vnius plantæ, & Matthiolum potius mereri reprehensionem ob neglectam descriptionem, quàm Compilatorem H. Lugdunensis.

In segetibus Gallo-Belgii & Angliæ sepius æstiuo tempore reperit Lobelius: Tragus in agris à mense, autumnali tempore.

Tota planta lacteo succo turget, & corpus vehementer purgat.

Tithymalus siue Esula exigua, foliis obtusis.

Tithymalus 2. in prod. 4. Cyparissias in pin. siue Esula exigua foliis obtusis C. Bauhini, *radices* est exili, oblongiuscula, capillata, *cauliculus* pluribus Locu ad terram resupinatis, aliquantum repentibus, biuncialibus, triuncialibus, aliis palmo minoribus, rotundis, lacteo succo turgentibus, qui foliolis oblongis, angustis, sed semper in summo obtusis & velut absctis, inordinatè vestiuntur. Hic in agris Patauinis & Massiliensibus reperitur.

Tithymalus exiguus saxatilis C. B.

Tithymalus 3. in prod. Cyparissias 5. siue exiguus saxatilis in pin. C. Bauhini, *radicula* habet *Describe.* capilli modo tenuem, longiusculam, *cauliculus* tenues, vnciales & biunciales, angustissimis & breuib. *foliolis* cinctos, *stipulus* exiguos, ruben- *Synon.* tes: circa Monspelium locis asperis provenit.

PITYVSA VETERIBVS ET IN GENERE.

Pityusa, quam alii Clema, alii Crambion, alii Diosc. Paralion, alii denique Canopicon vocant, à Cyparissia Tithymalo specie differre existimatur, ideoque etiam & in Tithymali genere cõnum-
mejatur

meratur. *Caulem* profert cubito altiore, crebris geniculis interseptum, *foliis* acutis ac tenuibus circumdatum, Pini (*πίπυρος*) folia imitantibus: *flores* exiguos penè purpureos (Lac. legit in ver. cod. *ἀνδρ. μαρτ. λουνα' οἱς ἀντρίπου*: *Jerem* latū instar Lenticulæ: *radicem* candidam, crassam, lacteo succo refertam: quibusdam in locis frutex hic prægrandis reperitur. Purgat per inferna radix drachmis duabus data in aqua mulla: semen verò, drachma vna. At succi farina excepti cochlearium in catapotio datur: foliorum denique modus, drachmæ tres.

Plinius.

Plinius lib. 24. cap. 6 de herbis propter cognitionem nominis cum Pino & Picea agens: Et Pityusa, inquit, simili de causa dicitur, quam quidam in Tithymali genere numerant, frutex similis Piceæ, flore paruo purpureo. Bilem & pituitam per aluum detrahit radix, decocti hemina, aut seminis ligula in Balanis. Folia in aceto decocta, fursures capitis emendant: mammas quoque mixto Ruta decocto, & tormina, & serpentium ictus, & in totum collectiones incipientes.

Ita vetus codex, inquit Cornarius. Nam verba quæ præmittuntur in vulgaris exemplaribus, cum honore (ut etiam legit C. Bauhin.) & redundant, & penitus inep. è adiecta sunt. Cæterum vñs medicus à Plinio traditus, in Dioscoride non habetur: nec descriptionem totam Plinius expressit. Quod verò Dioscorides inter Tithymalos connumerari dicit, & à Cyparissia solum specie differre: hoc etiam Pityusæ nomen probat, cui descriptio Cyparissis magis conuenit, quam ipsi Cyparissis Tithymalo. Sed & Galeus confirmat Pityusam quosdam Tithymali speciem esse putare, eò quòd succū habeat quemadmodum Tithymali: & quòd similiter purget, ut illi: & per alia omnia viribus ipsis similis sit. Pityusam officinarum, itemque Herbarum periti Esulam hodie vocant. Nostri (Germani) communi reliquis appellatione *wolffsinich*: Arabes magna ex parte Turbit vocant. Nec est fortè cum Leonicono & aliis, Syluioteste, hæc vox expungenda. Arabes sequuntur etiam recentiores Græci, inter quos & Actuarius est, qui Turpeti duo genera faciunt, alterum nigrum, Pityusam; alterum album, Alypon. At contra hos, altera Arabum pars, Serapio, & qui ipsum sequitur Turbit asseruat esse Tripolium: & totum Dioscoridis de Tripolio caput, ipso autore citato, suo Turbit attribunt, ut qui illos sequi velit, cautum esse oporteat etiam hac in parte, sicut sanè etiam in omnibus aliis. Nullus autem est potior cauendi modus, quam ut illis in totum relicto, Græcos Medicos tutissime sequamur. *Hucusque Cornarius.*

Alfcedra Arabum.

Dodonæo videtur Pityusa esse, Arabum Alfcedra, aut Alfcedra & Scebra, officinarum Esula, siue Ezula, quod nomen à *πίπυρος* luxatum esse suspicatur, duabus sc. prioribus syllabis sublaris. Sic enim remanet *es*, cuius diminutivum *Vsula*, & vocali primâ mutata, Esula.

Censerem, inquit Matthioli, Alfcedram maius, siue Mehezèrègi esse quæ Græcia dicitur Pityusa. Serapio de Scebram agens, ea omnia ex Dioscoride illi attribuit, quæ Pityusæ idem Dioscorides assignauit. Myrepsus quibusdam in antid. Esulam imponit cognomine Chamæpityn, quam Fuchsius nihil aliud quam Chamæpityn, non autem Tithymali speciem, retate scribit: ego tamen æstimo Myrepsum Dioscoridis, Pityu-

sam intellexisse.

Sententiam Plinii de Pysilio nonnulli minus accurate de eius lacte gummsue expendentes Tithymali quoddam genus Pityusa dictum interpretantur. Sed Anguillara non potuit reperire plantam quæ respondeat Pityusæ Dioscoridis.

TITHYMALO CYPARISSIÆ SIMILIS.

Pityusa multis.

Tithymalus hic rarus, etsi Cyparissis vulgò dicto similis, ab eo tamen alius est. *radice* longiore, crassiore, minusque fibrosa: *caules* multi, serè cubitales, simplices; interdum in ramos multos dodrantes diducti; per quos *folia* conferta, crassiora firmioraque quam Cyparissis, & magis glauca: ex venis ramorum insident *umbelle* magnæ, solus pelatis, non maioribus Cyparissis.

Descriptio

Icon quam proponit Dod. gall. Pityusæ minoris titulo, est Tithymali Cyparissii ex Fuchsi, verno tempore prouenientis, quicquid dicat C. Bauh. Lat. Ezulæ minoris inscriptione nostro Tithymalo correspondentem quidem proponit: verum eius descriptio non placet.

C. Bauh.

Lob. in Adu. Tithym. Cyparissias, siue Cupressinus, vel Humipinus. Eid. in Obs. p. 192. Tithymalus Cyparissias, quoad titulum, quo verò ad effigiem, Pityusa, siue Pinea, officinarum Esula minor, Turpetum nigrum Actuarii, Tithym. Cyparissias Tragi Adu. p. 151. Videntur namque figuræ transpositæ in Obs. alioqui non respondere quæ in Obs. scribit, iis quæ in Adu. prodit. In Ic. quoque Plant. p. 357. Tithym. pineæ titulus huic figuræ non competit.

Schvvenckf. Tithym. cupressinus, Lobelio Humipinus, Tithym. Cyparissias Dodonæi. *Nos* non intelligimus Schvvenckfeldium: Tithym. cyparissias Dod. non est diuersus à Tith. Cyparissia Matthioli & Tragi, quem Pityusam Dioscoridis facit. Nec etiam icon Lobelii in Obs. transposita sub titulo Tithym. cupressini, diuersa est à Matthioli Tith. cyparissia.

C. Bauh. phyt. Tithym. 14 siue Cyparissias maior purpurascens comâ: Eid. pin. Pityusa 1. siue Tithymalus foliis Pini, fortè Pityusa Dioscoridis: Esula vulgaris maior & 3. Trago: Pityusa Esula vulgo dicta Geln. hort. Pityusa siue Pinea, Esula minor officinarum Lob. in Adu. & Ob. Tithym. pinea, in Ic. Esula minor Dodonæi Histor. Lugd. p. 1633. Esula maior ad Pityusam reducenda Cæi. Tithym. cupressinus 2. Tabern.

Synon.

Crepidines sabulosa fluminum, & vicini colles frequentius hunc alunt. Ego florentem Aprilis in Sabaudia collegi. Abundat in planitie arenosa prope Argentinam, & Basileæ ad Rhenum versus Haltingen: ut & prope Monspelium.

Locus & Tempus.

TITHYMALVS, FORTE DICTVS

Lucæ Ghino Pityusa, quibusdam Characias Pannonicus.

Pityusa Lucæ Ghino dicta est ea, si rectè conicio, quam in Gallia Narbonensi memini me olim colligere, *radice* magnâ, longâ crassâ: è qua crebri nascuntur *caules* inæquales, dodrantes, sextantes, ac fortè dodrante maiores: *foliis* raultis amicti, Paralii foliorum latitudine, longitudine maiore, interdum breuiore, acuminatis, spissis, colore serè Myrsinitis.

Descriptio

Gggg 3

An Tith. Characias pannonicus, siue Characias 3. Austriacus Clusio.

Nascitur plerisque Pannoniæ locis: sed Viennensi agro tantâ copia in graminibus & siccioribus palcuis, ut Iunio mense, tum enim floret, omnino pallescere videantur.

*Pityusa
Gibba
Angl.*

Quidam demonstrant, Anguill. epist. 14. referente, pro Pityusa plantam foliis similibus Myrto Tarentino, in acumen desinentibus quæ omnino Tithymalum Myrsinitem representant; verum caules nullos habent nodos, nec florem purpureum, nec semen Lentis: dicendum igitur non esse Dioscoridis Pityusam, aut textum Dioscoridis corruptum. Prædicta planta provenit in maritimis: reperitur & in monte nigro Livorni Pitianorum.

Dod. gall. Tithymali Cyparissæ species tertia foliis omnino albis, in cæteris Cyparissæ similibus. Lat. Tithym. Characias 4. quam nonnulli perperam Myrsinitem faciunt.

Dodonæus lat. eandem cum Clusio habet figuram, sicut & Lobel. in Ic. Plant. p. 361. titulo Tithymali Myrsinitis alterius: & Obs. p. 196. sub intitulatione Myrsinitis alterius, & Turbith Alexandrini quorundam, Characiæ quartæ Dod. & Belgarum. Sed nec H. Lugd. p. 1646. sub inscriptione Tithymali Characiæ quartæ Dodonæi, diversam pingit: Hanc autem affirmat esse Myrsinitem alteram Lobelii. Et hinc Sole meridiano clarius patet, C. Bauhinum manifesto errore inter Tithymalum Characiam tertium Clusii, seu quartum Dodonæi, & Myrsinitem alteram Lobelii, H. Lugdunensis, discrimen facere.

C. B. lapsus

Synon.

In phyt. Tithym. 3. siue Characias rubens germanicus, etiam in palustribus Michelfeldensibus frequens: Tithym. Char. pannonicus Clusii Item, Tithym. 4. siue Charac. longifolius: Myrsinites altera Lobelii: *Eid. pin.* Tithym. Char. 4. siue rubens germanicus: Tithym. pentadactylon Cordi hist. Tithym. Char. 4. Dod. Characias pannonicus Clus. pann. Charac. 3. Austriacus, *Eid. hist.* Tithym. fruticosus alius stipitibus rubris Camer. an Tithym. latifolius alter, Cæsalp. Item, Tithym. 5. siue Charac. angustifolius: Tithym. myrsinites altera, Lob. Lugd. Tithym. myrsinites angustiorib. foliis Cæsalp. Tithym. myrsin. 3. angustifolius Tabern.

Locus

Frutetosus locis nasci scribit Cordus: Dodonæus verò latinus nasci in Belgii hortis.

Tithymalus incanus hirsutus C. Bauh. dictus Pityusa Anglica Camerario.

Descriptio

Caulis pedales, rotundos, rufescentesque proferit: foliis incanis & hirsutis, Myrsinitis legitimi forma, confuso ordine vestitis, in summitate in virgulas diuisos, quibus ut in Myrsinites, flores & capitula triangula, semina continentia, insident.

Synonyma

Tithymalum hunc 20. siue foliis per ambitum hirsutis (ita in phyt. vocat:) Aut [ut in prod.] Tithymalum 1. siue incanum hirsutum: Vel denique (ut in pin.) Pityusam siue Esulam 4. C. Bauhino ex Italia Neudorfferus attulit. In phyt. autem admittit esse Pityusam Anglicam Camerarii: aut in pin. dubitat, non tamen meliora docet.

C. B. not.

Pityusa Anglica, missa Camerario à Th. Pennæo, foliis Tithymali arborecentis, sed magis glaucis & per ambitum hirsutis prodiit, sed neque in fictili sub tecto, neque sub dio per Hiemem durare voluit. Semen erat non dissimile arborecentis Tithymali semini.

APIOS.

Facilis è radice est Apii cognitio, quæ quia oblonga, turgida, inque Pyri modum turbinata, plantæ nomen secit, quam Napi radici rectè comparaueris: huius è capite ramuli aliquot exeunt palmo breviores, foliis satis frequentibus amicti Esulæ rotundæ seu Peplii, at minoribus, ex angusto principio sensim dilatatis, perque extremum rotundis.

Apios, aliis Ischas (ἰσχάδα ἢ ἰσχάδα. Malim inquit Saracenus, ἰσχάδα vel potius ἰσχάς. in recto casu. Sic enim nominant Theophrastus & Plinius: sitque verisimilius ex radicis cum carica similitudine id nominis inditum illi fuisse, quàm Chamæbalis efficacia contra coxendicum dolorem: aliis Chamæbalanos (Sed & ἀντίχαραμβάλανος χαμπαλάνας ex Paulo legendum censuerim, Sarac.

nam Plinius etiam hanc ipsam radicem ἰσχάδα vocari testatur) aliis montanus aut silvestris [αἰδὶ ἰσχυρὸς ὄρεον, h. e. Raphanus montanus legendum suspicatur Sarac. pro ἰσχυρὸς ὄρεον] aliis denique Linozosis dicitur. Ramulos autem duos siue tres in terram spargit, innocuos, tenues, rubentes (αἰνὶα ἰσχυρὰ. Ald. ὄρεον, h. rectos:) & paululum à terra sese attollentes, foliis Rutæ (αἰσχάδα addit πύριον. Cat.) oblongioribus ramen & angustioribus, herbaceis: semine paruo: radice Hastulæ regie (αἰσχάδα. Sunt qui πονδύλιον seu πονδύλιον legere malint, uti Marcellus & Cordus. Cæteri, αἰσχάδα, indubitanter legunt, uti etiam legitur apud Theophrastum. At Plinius Apion radice Cepæ describit) & ad Pyri formam accedente, rotundiore ramen, lacteique succi plena, cortice, extrâ quidem nigro, intus verò candido.

Plinius auctor est lib. 26. cap. 8. Apion, Ischada, siue Raphanon agrum innocuos duos siue tres spargere in terra, rubentes, foliis Rutæ, radice Cepæ, sed ampliore, ideoque quosdam Raphanum silvestrem vocare.

Ischada siue Apion (ἰσχάδα ἢ ἰσχάδα. Gaza reddit Carciam seu Pyrum.) describit Theoph. lib. 9. cap. 10. folio quidem rutaceo, sed breui: caulis ternis, aut quaternis humi stratis: radice, quam Albucum, verum squamosa.

Galenus, Paulus & Aetius, inter simplicia Apion non recensent. Sed Paulus inter ea quæ pituitam euacuant, Appij dimidium habet. Hoc quale sit, iam diximus.

Apios antiquis dicta radix à Bellonio Obs. lib. 1. cap. 43. verò depingitur. Nostra autem icon Guariniæ non placet: fortè ad radicem siccam facta est. Dicitur, illo referente Chamæpidia.

Anguillæ verò in Apulia Esula rotunda: in Græcia



Descriptio

Chama

lani

Chama

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

phani

Græcia & in Candia Pittaria.

Apios dicitur Matth. Anguill. Dod.gall. Lac. H. Lugd. p. 1595. (habet hæc & alteram figuram & descriptionem, sc. Dodonæi lat. p. 1651. hoc titulo: Tithymalus tuberosus siue Apios) Tabern. & Castori. Dodon. lat. Tithymalum tuberosum inscribit: Clusius Tithymalum tuberosa radice. Apios vera Gesn.hort. & Lob.in Ic. Plant.p.364. Apios Aduersariorum, eid.in Obs. p.198. Radix prægrandis, turbinata, Americi orbis Chinam emēta, in Adu.p.29. Item p.204. Apios vera, siue Pyriformis radix Dioscoridis, malè à quibusdam China existimata.

Planta à Matth. [inquit Turn.] proposita pro Apio, pro vero potuisset ab omnib. haberi, si probasset semen habere paruum, radicemque purgantem, quod de Apio scribit Dioscorides. Verum cum neutrum faciat, tam de ipsius Apio dubitare quis posset, quàm ille de Apio Ruellii dubitat. Hæc ille, cuius rationes ceu infirmas pluribus refutandas haud decreuimus.

G.Bauh. phyt. Tithymalum 25. siue tuberosa radice; In pin. Apium siue Tithym. tuberosum, siue Tithymalum tuberosa pyriformi radice. Hunc duplicem tradit: 1. est radice crassiore & maiore, foliis & ramulis minoribus: 2. radice minore, ramulis longioribus & foliis maioribus. Hanc ipsum distinctionem ex iconum diuersitate desumpsisse dicimus.

H. Lugd. *ῥαχά* dicitur, quod *ῥαχά*, i.e. Caricam seu Ficum aridam radix referat, Saraceno monente. Item & *χαμαβάλας* siue Terrestris glans à figura quoque. Sunt tamen & alii Chamæbalani Germaniæ familiares ac edules, de quibus alibi. Et hinc factum est, ut quidam ex herbarum petitisæam radicem, quæ *Erdinus*, & *Seivbrat*, & *Erdseygen* Germanis dicitur. Apion esse uoluerint. Alii Ornithogalon esse asserunt. Alii rursus ad Cyclaminum referunt. Cornarius Raphani siluestris genus quoddam esse putauit, ignotum tamen.

Locus. Nascitur in montosis & asperis aliquando & herbosis, authore Plinio: effoditur Vere. Ischas Dioscoridea adfertur ex Creta. Sed Apuleiæ etiam peculiarem esse monet Imperator.

Vires & Vitis. Superior pars radicis assumpta, vomitione bilem pituitamque extrahit; inferior per aluum. Tota uero sumpta, utraque parte purgat. Liquorem si libet excipere, radices tundito, & crateri aqua inditas agitato, ac liquorem qui supernat penna collectum exsiccat. Huius sesquibolus potus, per superna infernaque purgat. Hæc Dioscorides, à quo in succi collectione dissentit Plinius. Effoditur Vere, inquit, totaque in fœtili mergitur, deiectoquo quod supernat, reliquus succus purgat utraque parte, sesquibolo in aqua mulsæ. Sic & Hydropicis datur acetabuli mensura. Inspargitur & aridæ radicis farina potioni, aiuntque superiorem partem eius, vomitione biles extrahere: inferiorem, per aluum. Non autem omnes partes ad idem utiles esse, fortassis mirum non est, verum eiusdem radicis has partes sursum, illas deorsum purgare, magis admiratione dignum est, velut Thapsiæ & Ichiadis. Nam eadem rursus & sursum & deorsum purgare, velut Veratrum nihil absurdum est, authore Theophrasto. Hanc autem purgatricem esse norunt omnes Monachi in monte Athor, teste Bellonio. Facultate & temperamento vehementer calidus & siccus, est, reliquis Tithymalis similis, ac perinde quoque molestus ac noxijs.

Temper.

Apios siue Ischas altera.



Tithymalum tuberosa oblonga radice.

CHAMÆSYCE.



Gracilem Descriptionem habet, longitudine circiter palmari fibris aliquot tenuissimis donatam: ramulos quadranteles ac etiam pedales, in alas subdiuisos, rubentes, subhirsutos, in orbem terræ apprimunt: quibus ad genicula adnascuntur foliola coniugatum opposita, subrotunda, quæ terram spectant rubentia, supernè viridantia, nisi quoddam in medio purpurea nota sint maculosa, quædam tamen in extremis ramulis supra infraque omnino saturâ rubedine tincta sunt: stolis ad ramulorum diuicationes inter folia emicant purpurei: tota planta lac fundit vulnerata: pericarpia tricoeca Esulæ exiguæ Trago dictæ, sub foliis latitant.

Chamæsyce, quam aliqui Sycen (*χαμασύνη*, *σιχέν*) nominant, refert Dioscorides ramos emittere quaternum digitorum, per terram stratos, teretes, lactei succi plenos: folia Lentis figurâ, Peplo similia, parua, tenuia, ac terræ inherentia: semen sub foliis rotundum, ceu Pepli radicem tenuem, ac superuacua: sed neque florem, neque caulem promere.

Chamæsyce Plinius lib. 24. cap. 15. Lentis folia adscribit, nihil se attollentia.

Chamæsyce Tithymali species est Cord. lib. 5. hist. cap. 6. Nam Matthioli in Pepli genere reponit, Peplumque minorem suspicatur. Haud uero ipsi notam fuisse satis patet, quod ne vnicâ

Description

Description

Chamæsyce
Diosc. Sycen

quidem notam scribat, quæ non habeatur in Dioscoride. Præterea in Epist. & Hist. germ. eam planè omisit.

H. Lugd. H. Lugdunensis Chamæsyce Dalechampiij p. 1660. quam Dioscoridis Chamæsyce constituit, à Chamæsyce Penæ & Lobelii separat, sed absque ratione.

C. B. 101. Chamæsyces figuram cum Matthiolus non haberet, existimabat C. Bauhinus se eam ipsi apposuisse in comm. per ipsum illustratis. Ast figura apposita Matthiolo non est Chamæsyces, sed Anthyllidis Valentini Clusij, quam Compilator Tabern. malè pro Chamæsyce exhibuit.

Synon. Chamæsyce Dioscoridi & Plinio, quasi humilis Ficus, C. Bauh. phyt. *Eid. pin.* Chamæsyce Matth. Anguill. Hesn. hort. Dod. (*μικρὸν ἀφ' ὧν καὶ ἀπὸ τοῦ ὀνόματος* appellari dicitur.) Lob. in Adu. Obs. p. 198. Ic. Plant. p. 363. Clus. hisp. & hist. (hic author est Salmanticensis *Nogueruela* appellare, quasi pumilam nucem exprimere vellent, à seminibus nimium, uti putat, forma.) Cæsalp. H. Lugd. (quæ duplicem figuram habet, ex C. Bauhini opinione) Camer. Tabern. & Gerardo. *Nes* H. Lugdunensis figuram alteram p. 1381. Anthyllidis Valentini Clusij titulo propositam, à Tabernamontano falsò pro Chamæsyce, ac etiam à C. Bauhino apud Matthiolum exhibitam, huc non referimus. Si H. Lugd. duas habet figuras, habebit & Clusius duas.

Locus & Tempus. In aridis, squalidis, petrosisque locis nasci dixit Plinius & Dioscorides. Nusquam in Italia aut Germania apparet, inquit Lobelius, sed duntaxat in Narbonensis Gallie oliuetis vinetisque, ubi plurima præsertim aridis sabulosis, non procul Monspelio ad patibulum viâ, & tractibus maritimis. Montbelgardi in horto Ill. E. C. Aprili sata, floruit Iunio & Iulio: ex semine deciduo quotannis propagatur, etiam apud Belgas. Nasci aridis & sitientibus hortorum areis, solo aspero, omnibus locis in finibus Bononiensium, etiam intra urbem, testatur Cordus. Comosam ubique vidit Clusius in agro Salmanticensi squalidis & petrosis locis, atque etiam inter ipsa vineta, & plerisque aliis Hispanie locis.

Rami ex vino triti vuluæ dolores sedant in pello appositi: tollunt tumores ac verrucas omnium generum illiti: decoctorum cibo alius resolvitur: succus simili affectui prodest: illitus contra scorpionis ictum auxiliatur: aduersus caligines oculorum utilis, hebetudines, incipientes suffusiones, nubeculas, cicatrices, cum melle inunctus. Plinius à Dioscoride euarians, linteo-lum pro pello usurpat, & amplius orthopnoicis prodesse addit. Chamæsyce abstergentem simul & acrem vim Galenus attribuit. Itaque acrochordonas, & myrmecias, caules eius teneriores intriti, in modum cataplasmatum admoti, quique ex eis profluit liquor, auferunt. Cum melle verò crassas oculorum cicatrices deterguunt: hebetudinem visus à crassitie ortam, adiuuant: sicuti & suffusionum principia.

PEPLIS.

Tertæ faciem ceu muliebre flammæum patulis ramis variè diuaticatis sesquipalmarib⁹, rubentibus, crassiusculis operit, per quos veluti ad articellos *folia* aduersa nascuntur, rubentia, duplò triplòue Chamæsyces maiora, crassiora

paullò, per extremum rotunda, quorum pars ea quæ sub nervo est, productior est quàm quæ supra nervum, & veluti pinnata, flosculi luteoli proxime ramos oriuntur: capitula triococca, leuia, duplò maiora quàm Chamæsyces: ubique vulneretur, lac fundit, radix longiuscula, crassiuscula, simplex.

Peplis, quam Dioscorides aliquos siluestrem Portulacam (*ἀνδράχην ὀφύραν*), Hippocratem verò Peplion [*πέπλιον*] vocare refert, in maritimis maximè nascitur, Frutex autem est *ramulus* *sem.* quoquo versum expandens, vel in latitudinem sese diffundens, candidi succi plenus, *folius* hortensis Portulacæ, rotundis, & infernè rubentibus: *semen* sub foliis rotundo, ceu Pepli [*τὸ πέπλον*] seruento gustu: *radice* tenui, singulari, ac superuacua.

Plinii, Galeni, Pauli, & Actii de Peplide (*πέπλις*) verba inter vires dicemus.

Apud Matthiolum in comm. lat. cum mag. *H. Lugd.* fig. Peplis vocatur, sed tanquam non visa non describitur. In ital. icon transposita est pro Peplio. In Hist. germ. malè inscribitur Peplus.

Verisimile est Dodonæum Peplidem non nouisse: siquidem in Hist. gall. nullam dedit iconem: in lat. verò pro ea Anthyllidem Valentini Clusij pinxit.

H. Lugd. huius plantæ duas effigies eadem p. 1639. sub diuersa tamen inscriptione proponit. *Pepli eff.* 1. Peplis Matthioli. 2. Peplion Dalechampiij.

Peplis, ut nomine, sic effigie Peplum præ se fert, & propius adhuc etymum Pepli vel Flammeoli exprimit, authore Lobelio, ac idcirco *δαμνὸν ἀμφοτέρων* Dioscoridi designari ait.

Plinium autem Portulacam siluestrem eiusdem generis ac naturæ cum Portulaca satius, cum Peplio herba diuersissima confundere, idèd quod nonnulli Peplion, agrestem Portulacam vocarint, rectè Dalechampius monet.

Dioscorides quamuis vnius tantum meminerit Peplidis, Anguillara tamen duplicem facit, & hanc priorem constituit: Alteram verò se obseruasse scribit in monte Maiellæ in Abruzzo, se extendentem per terram sicuti prior, foliis denariorum modo orbiculatis, Numulariæ modo dispositis, spissis, semine albo, radice digitum crassâ.

Peplis Matth. Turn. Lob. in Adu. Obs. p. 197. & Ic. Plant. p. 363. Clus. hisp. & hist. Cæsalp. quoad descr. Cam. Tab. ic. & Ger. Peplus Cæsalp. quoad iconem: Peplus minor Tab. hist. Peplium Cæsalp. Peplis 1. siue maritima folio obtuso, varians caule rubro & albo C. Bauh. pin.

Littora Norbonensia Thyrreni & Adriatici maris hanc repticem abundè fundunt, ignoram a- *Loca* liouin Septentrionalibus, nisi hortis. Obseruatur quoque in insulis circa Venetias ab vtraque parte maris. Sed & abundè nascitur in omnibus Hispaniæ Mediterranei maris litoribus: in Oceani littoribus nunquam obseruauit Clusius: imò nec in cultissimis quidem Belgicis hortis ipsi conspecta.

Colligi, reponi, darique uti Peplum, itidemque condiri solere: ac eadem quoque vires habere, *Colledis* authorem habemus Dioscoridem. Est & Portulaca, quam Peplion vocant, non multum satius efficacior, cuius memorabiles traduntur vsus. Ita Plinius lib. 8. cap. 20. Hic mox subiungit per

git per longum eius usum. Sed quum ea omnia à Dioscoride penitus omissa sint, ibidemque Peplion cum Portulaca filuestri confundat, etiam nos hoc loco tanquam aliena omittenda duximus. Peplion tunc sursum, tum deorsum, pituitam bilemque purgare, flatulque deducere prodidit Hippocrates. Galeno Peplion frutex succum habet velut Tithymali, radicem quidem inutilem, quemadmodum etiam Peplos: succum autem fortem, & nec ipsum admodum vilem. Sed vile est semen, & feruidum: similiter ut Pepli semen purgans. *At hoc Galeni loco, quod feruidum dicitur, quædæ in græcis codicibus falsò legitur, i.e. statuosum, pro σπῆδος, velut Dioscorides & Paulus habent: & alioquin Peplion esse σπῆδος καταρρηκτικόν, Aëtius ex Hippocratis sententia scribit. Quod itaque status sumpt ac discunt, statuosum oeci non potest.*

Galen.

TITHYMALVS HELIOSCOPIVS sive Solissequus.

Descriptio



BRevis huius & plerumque singularis caulis, revesmodiè hirsutus: folia Portulacæ, vel proprius Peplios, minus pingua quam Portulacæ, ex viridi lutea, in ambitu crenata: surculi è caule summo nati umbellam quodammodo efficiunt, flores lutescentes exiguos, herbidos, Mytilinæ facie peltatos: semen in pericarpio

inquectis. Radix singularis, fibrosa.

Qui Helioscopius Tithymalus Dioscoridi dicitur, foliis est Portulacæ, attamen tenuioribus rotundioribusque, ramulis ab radice quaternis aut quinis, deorsum altitudine, tenuibus ac rubentibus, lactei succi copiosi plenis, capite Aëti: semine velut inter folia locato. Comam cum Sole circumagat, ideoque Helioscopii nomen accepit.

Tithymali quartum genus Plinii, Helioscopion appellatum, quoniam capita cum Sole circumagat, foliis est Portulacæ, ramulis stantibus, à radice quatuor aut quinque rubentibus, semipedali altitudine, succi plenis: semine albo, columbis gratissimo.

Matthiolus pro more suo ponit sine descriptione iconem Tithymali Helioscopii in descriptione, foliis non serratis, Peplion potius representantem, quam Tithymalum helioscopium. Camerarius aliam pinxit, ac etiam Casparus Bauhinus. Lacuna qui & Tithym. coronatum vocat, iconem Matthioli referuat, ac etiam Hist. Lugd. p. 1644. Sed p. 1648. meliorem exhibet Tithym. Helioscopii Dodonæi titulo.

Tom. II.

C. Bauh. phyt. Tithym. 13. sive Helioscopius: Eid. in animadu. in Hist. Lugd. Tithym. heliosc. Matthioli, foliis non crenatis p. 1644. Tithym. heliosc. Dodonæi, p. 1647. foliis integris, cuius in contextu non meminit H. Lugdunensis: Item, p. 1648 Tithym. heliosc. Dodonæi, quæ vera icon. Videtur nobis prior icon H. Lugdunensis esse Pepli. Secundam suspicamur esse Tithymali verucosæ: ergo huius plantæ hoc loco unica figura, & non tres.

C. Bauh.

Esula Brunfels. tom. 1. rhaps. 13. sine icon: in 4.º pag. 124. cum icon. Esula vulgaris & tertia Trago.

Helioscopius Tithymalus Ang. Fuch. Dodon. Cordo in Diolc. Turn. Geln. hort. Lac. Lonig. Loban. Adl. Obi. p. 192. Icon. p. 336. Thal. Camer. Tabern. & Hist. Lugd. cum icon. Dodonæi pag. 1648. Item C. Bauhin. qui in Pin. præterea vocat Tithymalum Dendroidem Dodon. in icon. & Thali.

Caterium, hunc Tithymalum duplicem facit: alium foliis crenatis, non usque tamen ad caulem; alium non crenatis & rotundioribus, caule legitur hirsuto.

Græcis τῖθύμαλος ἡλιοσκοπιος: Germ. Sonnenwend uvolffsmich, & groß uvolffsmilch: Belg. Croonkenscruyt. Gall. Renelle matin suuant le Soleil: It. Torreonaglio, Tithymalo helioscopio: Angl. uverigraffe: Lat. Tithym. solsequius, & Lactaria tollequia.

Locus.

Cunctis gentibus familiaris, & hortis etiam olitoris frequenter molestus: quin & passim provenit, circa rudera, prope vibium & oppidorum incerta, in campis incultis, collibus, & vique, tam cultis quam incultis solo.

Colligitur cum & semen huius Tithymali, vel etiam aliorum: ac vim eandem habere cum Characia Myrsinæ, & Paralio, sed non ita intentam, docet Dioscorides: Plinius addit bilem trahere per internam oxymelite, dimidio acetabulo.

Vites.

PEPLOS SIVE ESULA ROTVND.



Peplos, quem aliqui Syccen [συκκέν] alii Papauer pumeum (μυκκον αἰσπιδόν) vocant, referente Dioscoride, frutex est succo albo plenus, folium paruum habens, Rutæ simile, sed latius: vniuersa coma palmi altitudine est, rotunda, per terram diffusâ, & sub vtrâ vet. Lacunæ codex legit ὅτι τῖθύμαλος] foliis se-

Descript.

men est paruum, rotundum, minus quam Papaueris albi. Multi autem vltis herba est, radicem vnam habens, inutilem, à qua totus frutex enascitur. Ita etiam descriunt Plinius.

H h h h

Peplon dici etiam Chamæsyce (χαμαίσις) & Papauer (papaver) (μυῖον) & Meconium (μεκόνιον) testatur Galenus in gloss. in Hipp. Meminit & Pepli Papaueris (punci) de simp.

Fuch. sa-
natur.

An Vineale Reuelium Ruellii? De Esula rotunda officinarum & vulgi, Fuchsius ita scribit quasi eam nunquam viderit. Icon, quam Lonic. etiam & Dod. gal. exhibent non repræsentat Esulam rotundam: folia longa & acuta sunt in eorum icon.

Matth. &
Lacuna
notatur.

Non placet quoque Pepli effigies apud Matth. in prior. com. & adhuc minus ea quæ in post. cum mag. fig. habetur. Non malè nostro iudicio huc retulisset iconem sui Tithymali helioscopii: neutrum describit, quare diuinatione opus est. Matthiolum imitatus est Lacuna icon & descriptione nulla.

Peplum passim in hortis Venetis & Patavinis prouenire, nec tamen Esulam rotundam vocari testatur Anguillara. Cæsalpino verò non fuisse notum Peplum, suspicamus quia nihil proponit de eo præter verba Dioscoridis & Plinii.

Synon.

Peplus Matth. Fuch. Anguill. Dod. Cordo in Diosc. & hist. Turn. Lat. Lon. Lob. Obs. p. 162. H. Lugd. p. 1658. Cast. desc. Thal. Tabern. Ger. Calc. & Camerario: Peplus Cast. icon. Esula rotunda Gesn. coll. Peplus siue Esula rotunda prima C. Bauh. pin.

Etymon.

Peplus autem siue Esula rotunda, quod I ramulorum ambitu & quasi rotundo amictu velum efformaret, aut tellurem operiret, dicta fuit, nisi potius, ut Lobelius opinatur, ob purpuream foliorum superficiem, siue xerampelinam, quæ huic in vineis nascenti & Peplidi in maritimis sabuletis degenti, ut plurimum inest. Peplum namque fuisse purpurei vel phœnicæ coloris, multæ historiæ testantur. Succus lacteus, quem tota fundit planta, Tithymali speciem facit.

Nomina
ling.

Πῑπλος, quibusdam cunctis appellatur. Germ. Teuffels milch, Rinde vvolffsmilch, Gall. Reuille matin de vigne, i.e. Eugilium matutinum vineale. Hisp. & It. Pepto.

Locus.

Germanus & Gallus passim Peplus spontè prouenit, secus sepes, fossimenta, margines hortorum & in vineis, in quibus etiam Diosc. & Plinius nasci scribunt.

Peplus colligitur in messe, siccaturque in umbra, & assidue versatur. Reponitur semen contusum & depurgatum. Ducit pituitam & bilem acetabuli mensura cum aquæ melle hemina (αυαθη, κοτύλη) legendum iudicat Corn. potum. Sed & obsoniis amixtum alium turbat. Conditur etiam muria, auctore Dioscoride. Sic ferè & Plinius Galeno Peplus frutex parvus, succum habet similem Tithymali, qui purgat velut illi.

PEPLVS MINOR.

Descript.

Atollis in orbem ramis, varièque dinaricatis terram subiectam obumbrat: foliis Pepli maioris rotundis ferè, in modicum acumen leuiter desinentibus, dimidio minoribus: pericarpie pusilla Maioris aut Chamæsyces, triquetra, læuis, tribus locellis totidem claudunt semina.


Synon.

Tabern. ic. & hist. Peplus minor, Peplus Diosc. Portulaca filn. vocata, Peplion ab Hippocrate, ab aliis αἰνδάριον ὀξίν.

Montepeli & Montbelgardi prouenit.

TITHYMALVS PLATYPHYLLOS

Fuchsin.



Annus est planta ex deciduo semine seles reparans: etiam radix lignosa interum lutea, scilicet cubitalis & bicubitalis, rectus, singularis modo, modò plures, inter quos eminere medius, inter contrariis altitudinis socios, per quos tamen omnes frequentes obseruantur ra-

mi, quorum exortui folium magnam semper apponitur, duarum uncularum longitudine, latitudine unciali, talia quæque fortuito ortu per caules ramisque spectantur; at caulis fastigium in pediculos aliquot umbellam mentientes abit, quo modo in Helioscopio diximus, quorum corum, coronat rosa foliorum oblongorum, nec ad Helioscopii rotunditatem vllatenus accedentium, crenis parum conspicuis denticulorum: è quibus pediculis vnusquisque subducitur, ramulis ex acetabulo exeuntibus: stolis corylis insident lateoli, quos sequuntur vix dum delapsos tricoeci fructus, minores paulò quam Verucosi, quibus & asperitate cedunt, in quibus semina parua, oblonga, cærulea.

Dod. gall. Fuchsin figuram Tithymali septimi siue platyphylli i.e. latifolii, applicat Esulæ maioris siue Pityusæ maiori, cum tamen in descriptione, Fuchsin plantam, quæ non est Tithymali πλατύφυλλος Dioscoridis, haud intelligere putamus.

Tabern. ic. & hist. inscribit Tithymalum characiam Matthioli, licet Matthioli non sit, nec descriptio, quam in histor. dat, cum icona conueniat.

An Tithymalus annuus Pityusæ facie Lobelio?

Lonic. qui iconem Fuchsin habet, ut 2: Ponæ in Baldo, & Turn. dicitur Tithym. platyphyllos. C. Bauh. phyt. Titym. 18. Eid. pin. vbi duplicem statuit, sc. maiorem & minorem, & hunc foliis hirsutis. Tithym. arvensis latifolius siue germanicus. H. Lugd. p. 1659. Pityusæ siue Esulæ minor (legendum maior.) Dod. hist. stirp. Tithym. platyphyllos Fuchsin.

Ceterum, plantam exprimere videtur Fuchsius primò prouenientem, antequam umbella sit ramosa.

Geneux & Basileæ atque Montbelgardi crebram in agris & circa dumera obseruauit, florentem adhuc Augusto & Septembri, sed rariùs. Cum prodit initio Veris folia sanguineis guttis, in hoc Tithymalo aruensi annuo Camerarii, aspersa conspiciuntur.

TITHY-

TITHYMALVS MAGNVS MVLTIGAV-
lis, siue Esula maior.

Deser.

Mirum quàm luxuriet fecundiore solo enatus Tithymalus ille, quem vulgò Esulam maiorem germanicam vocant. Lignosa enim candidaque radix non brachii modò humani crassitudinem assequitur, sed & sura nonnunquam superat, longè latèque vario implexu propagata, perennat: nec minor caulium quos emittit luxuriosa vbertas, minimi digiti circiter crassitie, rubescentes & compluribus alis concavos: folia Cataputiz minoris, oblonga, multùm illis magnitudine cedentia, Hyeme decidunt: *flosculi* ymbellati, concavi, luteoli, quatuor peltata foliola surrigunt, ut & è staminibus totidem, reliqua in concavitate occultantes: *semen* in loculis triquetrum, reliquis non dissimile.

Per Pityusam & Esulam maiorem Matthioli, cuius radices è Gargano pro Turpetho adferri dicuntur, Dodonæus eam intelligit, de qua hoc capite agimus, quamvis icon Matthioli non respondeat, & alia sit, ut diximus proprio de Pityusa Matthioli capite. An Gelsæo Esula maior foliis Oleæ?

Tab. 101.

Icon Tithymali maximi apud Tabern. quamvis non placeat, tamen ad Esulam maiorem accedere videtur: descriptio quidem non quadrat. *Verum nihil mirum*, ignato Compilatori quadrata rotundis antecere placuit, nec forte Tithymalos hoc capite distinguere nouit.

Esulam maiorem germanicam, ut vso crebro apud Germanos & Belgas receptam ait, sic sanè nulli Tithymali speciei, quàm Pityusæ grandi frutescenti propiorem statuit in Aduers. Lobelius, addens nisi huc accommodetur, Dioscoridi aut minus notam, aut prætermisam fuisse.

Synon.

Trago Tithymali alterum genus *Grosz teufels milch*, Esula magna siue maior, Esula dendrodes seu arborescens. Cæsalp. Tithym. palustris, frequens in paludibus Pisanis. Schvv. Tithym. fruticosus palustris, *vnasser vnolffs milch*. Camer. hort. Tithym. fruticosus germanicus, in litore Rheni frequens. Cordo in Diosc. Pityusa maior Dioscoridis, Esula maior recentiorum. Lob. Ic. p. 358. Esula maior germanica, ut & Obs. p. 194. ubi & Turbith nigrum & adulterinum; Gall. *Turbith noir*: Hist. *Esula mayor: Esula maggiore* Ital. Pityusa grandis Thallio. C. Bauh. phyt. Tithym. 19. Eid. pin. Pityusa siue Esula. 2. seu Tithym. palustr. fruticosus. H. Lugd. p. 1653. Esula maior Dodonæi Hist. purgant. Esula maior germanica Penz., Eid. p. 1654. *Dua effigies unius plan-*

H. Lugd. 14. net.

Ratior in Italia & Gallia & Anglia nisi in hortis colatur: in Germania verò superiore & inferiore ad Rhenum: ut & in Silesia ad sabulosas fluminum crepidines.

Locus

Melues Esulam purgatorium rusticorum esse scribit, & maiorem viscera interna exulcerare, atque eam ob causam perniciosam, monente Dodonæo. Impensè calida est, acris & exulcerans, ventriculoque molestissima. Errant verò non parum qui cortices harum radicum in medicamentorum compositionibus Turbith loco substituere temerè audent.

Pityusa Matthioli.

Pityusæ radices, quam officinæ Esulam maiorem nominant, Herbarii è Gargano Apu-

litz monte ad nos (inquit Matthiolus) comportant, & magnà imposturâ pro Turpetho venditant. Quod cum non ignorasset Actuarius album Turpethum Alypiæ esse radicem prodidit, nigrum verò Pityusæ. Nec hîc obstat quod dixerit Dioscorides Pityusæ radicem sub esse candidam: nam is de interiore substantia tantùm intellexit, non autem de exteriori corticis membranula, quæ viridis rufescit, siccata nigrescit &c. (*æterium* quæ planta ab ipso tradatur, Pityusæ siue Esulæ maioris titulo (etiam in Epit. & Hist. germ.) donata, nondum certò concludimus. Nullibi enim eam describit, præterquam in Hist. germ. ubi tamen Dioscorideam solummodò delineationem, ipso quidem non citato, dedit: in qua radix dicitur alba, quam ipse Matth. in comm. fatetur cortice esse rufescente & nigrescente. Glossatorum hîc & Patronorum eius declarationem requirimus ampliorem, qui nihil lucis ipsi auulerunt. Iconem in comm. cum mag. fig. & Hist. germ. nonnihil variat quidem, sed ad priorem videtur facta effigiem, & non ad plantam ipsam. In neutra portò icon folia æmulantur Tithym. cyparissiam ab ipso Matthiolo depictum, qualia sunt Pityusæ in Italia passim prouenientis: licet in omnibus maioris. In eius picturis folia latiora multò sunt, sed longiora, nec simile quicquam cum prædictæ Esulæ foliis habentia, sed potius cum Tithymali nostri Verrucosi.

Castori & C. Bauh. apud Matth. cuius iconem Synon. pinxit, Pityusa: Eid. in pin. Pityusa siue Esula 5. Tithymalus foliis breuibus aculeatis.

Lonic. 101.

Lonic. (ut & Camerarius) quoque Matthioli imaginem habet, iam dictis addens, quæ Dioscorides de Pityusa scripsit, confundens suo more omnia. Sed & Lacuna suo nomine eandem cum Matthiolo stirpem pingit, eademque refert, additque in toto regno Neapolitano haberi Pityusam Esulæ minori similem, sed in omnibus maiorem: verùm non indicat quam plantam intelligat. Hos imitatur etiam H. Lugdunensis, quæ & ipsa præter Pityusæ Matthioli siue Esulæ maioris effigiem p. 1652. exhibitam, & Matthioli inania verba nihil docet.

TITHYMALVS SYLVATICVS
toto anno folia retinens.

Tithymalus sylvaticus radice nititur albâ, validâ, lignosâ intortâ, variè diuisâ, multis fibris donatâ: à qua exsurgunt rami lignosi, cubitali longitudine maiores, flexiles, cortice exteriori insigniter rubente, & hirsuto: interiore virente, foliis supra

H b h 2

rami medietatem crebris, quatuor ferè uncias longis, semunciam aut pauld plùs latis, infernè canà lanugine pubescentibus, excurrente per lógum nervo ad medium vsque folium rubente, deinceps viridi, supernè quoque pilis, sed minùs euidèntibus, leuiter hirsutis, atro virore splendentibus. Ex summis ramis oriuntur pediculi in umbellæ formam, rubentes similiter & hirsuti, singuli singula folia ad exortum, iis quæ in ramis sunt minora, reliquis similia, habentes, fescunciam longi ad geniculum quoddam, vbi rursus duo folia præcedentibus minora, opposita, pedicellique bini ex præcedentium pedicellorum vnoquoque explantantur, iique rursus cum foliolis suis minimis bipartiti *flosculos* sustinent foliolis circumdatos, minimos, herbaceo colore præditos, ita compositos ac si quatuor semilunulæ gibbis omnibus intrò spectantibus rhombum aliquo modo quis imitetur. Tota planta odore graui est, præter lignosam radicem, & lac fundit.

Odr.

Cordus in Diosc. Tithym. dendroides, Tithymalus sextum locum habens, Lactaria Germanis *Stein milch* vocata. Lobel. in Adu. Tithymalus characias Anglicus & Francus. Anguill. Tithymalus platyphyllos Dioscoridis. Cam. hort. Tith. fruticosus alius stipitibus rubicundis perennibus, foliis modicè hirsutis, latiusculis. Clus. hisp. & hist. Tithymalus characias alter, floribus pallidis, sine icone.

C. Bauh. nos.

C. Bauh. phyt. Tithy. 7. siue syluaticus: an Esula multicaulis Tragi, Tithymalus quibusdam Esula rotunda. *Nos Tragi* Esulam huc non referimus, quia meliùs conuenire videtur cum Tithymalo verrucoso quem Esulam rotundam Cæsalpini suspicamus. Eid. pin. Tithym. characias 3. siue folio lanuginoso: Tithymalo characiæ primo similis Clus. hisp. Tithym. characias alter, eid. hist.

An Ti b. mar. Gaj.

An Geln. hort. Tithym. dendroides? An Cæsalp. Tithymalo characiæ similis in montibus. An Calceol. in Baldo Tithym. maior? An Tabern. Tithym. amygdaloides latifolius? Schvv. Tithy. πλατύφυλλος latifol. montanus, Esula latifolia, Berg. vvolffsmilch. An aliqua ex Tithymali Characiæ speciebus Thali?

Locus & Tempus.

Cæterùm, i. ueni florentem in montibus Euganeis inter Balneum Aponense & Arqua, aliisque in locis. Basileæ in montibus prope Krenzack, Dornack, ac Mutets. Geneux virentem in principio Februarii circa montē *Salene* & pontem d'Arne: Montbelgardi abundat in siluis, & circa fontem admirabilem. Clusio referente crescit etiam in Hispaniis: deinde in Gallia tam Narbonensi quàm reliqua, Heluetiis, & reliqua Germania: in Belgii hortis semel satum copiosè prouenit. Lobelio teste, frequentior in Germaniis & Franciæ Aureliæ vicinis siluosis, quàm calidiori solo: nullibi quàm in Anglia copiosior: primo Vere floret: per Iunii menses sætura. Anguillara ait copiosè in Italia prouenire, & Illyria potiss. in Baldo & in Maiella di Abruzzo.

TITHYMALVS AMYGDALOIDES, siue characias.

Theoph. 9. hist. 12. Lactuariarum [*τιθυμάλων*] mascula vocitata, Oleæ folio constat, & magnitudine cubitum æquat: huius lac, cùm vindemia incipit, exprimunt, & præparato vtuntur: purgat interius.

Dioscor. Tithymalorum masculus characias

[*χαρακίς*, i.e. Vallaris.] vocatur: ab aliquibus Comatus (ita reddit Sarac. vocem græcam *καμάτις*) quæ ab effusa & ampla coma nomen traxit.) Amygdaloides (*αμυγδαλοειδής*, à foliorum forma, Amygdalæ similium:) aut Gobius (*γούβις*) nominatur. Porro sunt huic *caules* supra cubiti altitudinem, rubicundi, acri lacteoque succo repleti: *folia* circa ramulos Oleaginis (*ὀλεαγίνης*) sed longiora:



radix crassa & lignosa: in caulium cacuminibus coma est linceorum virgultorum (*χαιτάριον παρδίων*) & sub ipsis [*ἐν αὐτοῖς*, Daclech. putat legendum *ἐν αὐτοῖς*, supra ipsa] cauet quædam peluibus aut alucolis similes, ac in iis *semen*.

A Plinio lib. Tithym. 26. cap. 8. pri-mus Tithymalus cognominatur Characias, qui & masculus existimatur.

ramis digitali crassitudine, rubris, rugosis [succosis ex vet. cod. reponendum] quinque aut sex, cubitali longitudine, è radice foliis pendulis, in cacuminibus coma lunci. Et hæc est Plinii de Tithym. characia opinio.

C. Bauh. pin. Tithymalus Characias 1. [*1 Synon. phyt.*] siue rubens peregrinus: Tithym. characias Matth. Lac. Lon. Cast. & Tauern. Tithym. characias Matthioli, secundus Dodonzi, H. Lugd. pag. 1642. Tithym. characias legitimus L. Clus. hisp. & hist. Tith. characias alter Dod. & Cæsalp. *Dicimus* nos Cæsalpinum hunc intelligere per Characiam 1. siue magnitudine præstantem, in asperis maritimis ortum: Camer. per Tithymalum characiam circa Veronam plurimū: Et fortè Calceolarium in Baldo, & Anguillaram per Tithymalum Characiam, in Italiæ quibusdam locis Herba lazza, ac etiam Tortomaglio magiore dictum.

Spontè prouenientem nullibi obseruavi, præterquam Montpelii, vbi abundat locis saxosis Tempus. circa Castelnau, florens Februario & Martio. Nascitur, authore Clusio, in asperis montosisque per Hispanias, Valentino regno, circa Malacam, atque etiam supra Arelatē itinere Massiliensī, & quibusdam aliis Narbonensis Galliæ locis: Martio flores profert.

Dioscoridis succus lacteus per aluum pituiti-vires & tam bilemque trahit, obolis binis in posca sumptis: at cum aqua multa vomitiones etiam mouet: circa vindemiam succus is congestis ramulis, mox dissectis, & in vas inclinatis, excipitur. Aliqui adiecta Erui farina pastillos ex eo fingunt, qui Erui magnitudinē impleant. Alii in ficos quæ exsiccantur ternas quaternasue guttas instillant, vt cum iis marcescant, eiusmodique ficos ad vsum recondunt. Sed & per se tritus in pila cogitur in pastillos, atque reponitur. Porro, qui succum colligit, minimè obuersum vento stare, aut oculis manus admouere oportet: quinimò antequam


quam operi sese accingat, corpus, præsertimque faciem, collum, scrotumque & vicinas partes, adipe aut oleo cum vino perungere. Quoniam verò fauces idem exasperat, catapotia quæ ex eo concinnantur cera aut decocto melle oblini, atque ita dari par est. Caricas verò binas ternasve soluendæ alui gratia satis est. Recens idem succus ex oleo illitos in Sole capillos detrahit, renascentesque flauos & exiles efficit, tandemque omnes abolet. Dentium cauis inditus, eorum dolores leuat: sed cera dentes oblinendi: ne forte præterlapsus is, fauces, linguamue malè afficiat. Tollit & illitu myrmecias, peniles verrucas, & quæ Thymi florem representant, itemque lichenas. Valet idem aduersus pterygia, carbunculos, phagædenas, gangrænas, atque fistulas. Legitur semen Autumno, & siccatum Sole leuiter tunditur, tandemque ab acerbis repurgatum loco mundo reponitur. Similiter & folia siccata reponuntur: quæ haud secus ac semen lactei succi effectum præbent, dumidio acetabulo pota. Sunt qui ipsa inueterant, admisto etiam cum lacte Lepidio, caseoque contuso. Sed & radix drachmæ pondere hydromelini inspersa potaque per aluum purgat. Decocta eadem cum aceto, dentium doloribus auxiliatur, siquidem eâ colluantur.

Plinius.

Trahit pituitam, inquit inter alia Plinius, (ale addito in potu, bilem aphronitro. Si per aluum purgari libeat, in posca: si vomitione, in passo, aut aqua mulsa. Est enim tam feruentis naturæ, ut per se extra corpori impositus, pustulas ignium modo faciat, & pro caustico in vtu sit.

TITHYMALVS VERRUCOSVS.

Descript.



Plures huius radices, tenues, in vnam tandem coeunt, minymi digiti crassitudine, ac etiam maiore, lignosam, cubitalem ferè, cortice externè nigro, interne albo, lacte viscido prægnante: virga multæ, lentæ, & fractu contumaces, tenues, subrubentes, pedales, ac etiam

cubitales, alternatim adnata, folia sustinent, dorsum ferè secundum caulem reflexa, vnciâ longiora, semunciam ferè lata, tenui lanugine oblecta, magis tamen infra, quàm supra quo sit ut inferior quoque pars magis quàm superna albicet: inferiora folia interdum rubent, nec non etiam superiora: flores in umbella flauescunt, ex foliolis pettatis, ut Umbilici veneris primulùm à satù è terra prorumpentis: quibus succedunt capitula rotunda, crispo ceu arenularum minutissimarum congestu, aut verrucarum instar asperata: quæ maturata vbi se aperiant, in tres partes diuiduntur, in quibus terna semina, colore & figura ferè similia Gallitricis, inedullam habentia albam, oleaginofam valde.

Tom. III.

Trago Tithymali genus quartum, Tithymali Helioscopii species. H. Lugd. p. 1647. Tithym. helioscopius Dodonæi: Item p. 1650. Tithym. verrucosus Dalechampi: figura dua. Thal. Tithym. helioscopius Dodonæi. Ponæ in Baldo Tithym. verrucosus Dalecham. C. Bauhin. phyt. Tithym. 6. siue Myrtifolia fructu Vertucae simili: In aridis & sabulosis gignitur propè Lugdunum ad Rhodani fluenta: obseruari & alibi.

Tithymalus non acris, flore rubro.

Tuberculis inæqualem habet radicem, longiusculam, fibratam: caules pedales, vel cubitales, primò purpurascens, non sine adnatis ramulis, foliis amicti Tithymali verrucosi, modicè in acumen rotundum desinentibus; glabris: pediculi è caulis fastigio aliquos exeunt (subiecta foliorum oblongorum rosula) umbellæ formæ, in furculos tubdiuifi singuli, flosculi in medio foliorum duorum, similium acetabulis, parui, quadripartiti, rubentes: è medio flosculo rubro exoritur ex breui pediculo fructus parvus triqueter, ut in cæteris Tithymalis, tuberculis exasperatus, ex cuius medio stilus & ad latus pediculus vel ramulus sustinens folia alia duo, & in medio alium florem ac fructum. Cæterùm, manat è vulnere lacteus liquor ut in reliquis Tithymalis, verùm nequaquam acris aut feruidus, sed astringens, vnde Tithymali aut Esulæ dulcis nomen meruit.

Eosertate scribit Tragus qui Miliariam Plinii statuunt. Gesn. hort. Erino cognatam herbam dixit, ut & Lobelius qui lupinum dulce suscepsit, vult simile nuncupat] vel Lactoridi, Miliariæ, Esulam dulcem Tragi. Esulam dulcem vel 7. Tragi etiam C. Bauhinus: & H. Lugdunensis, cui etiam Pitrusa.

Erino cognata lupinum dulce suscepsit, vult simile nuncupat] Lobel.

Montbelgardi & Genevæ obseruari florentem Maio, nec non in vmbrosis ac viginosis montibus ac vallibus.

Radix vulnera mirificè glutinat, sed intrò assumpta vehementer vomitiones mouet. Eius exterior cortex lacte ex aceto per diem & noctem maceratus, deinceps autem resecatus, tulus & in puluerem redactus postea dimidiæ drachmæ pondere in vino vel melicrato potus, quosuis aquosos humores & choleram expellit, & hydropticis apprimè conducit, inquit Tiagus.

TITHYMALVS SERRATVS.

Dalechampi.



Tithymalus serratus cubitali caule præditus est, per quem falsa vncialia, alia culmo latio, alia etiam minus lata, pleraque non acuminata, sed subrotunda, denticulata per ambitum crenata, glabra, ut verò quæ umbellæ pediculis adcoitum subiectantur folia;


Descript.

Hhhh 3

multò latiora quàm longiora, nonnulla quoque orbiculara, nihilque secius in ambitu serrata: flores acetabulorum eaeo insidentes, muscoli, lutei: *capitula* maiuscula, triquetra, ex tenui pediculo Myrsinitis ferè patia. In nostra imagine non bene representantur serraturæ: folia etiam nimium acuta pinguntur. In Narbonensi agro frequens est, nec alibi temerè reperitur.

TITHYMALVS MYRSINITES.

Descriptio



Ramis dodrantalibus crassiusculis per terram maxima ex parte funditur, quos ferè quadam ambiunt folia Myrti, pinguiscula, colore glauco prædita, in acumen desinètia. Ramorum extrema in furculos abeunt indidem ortos, pyxidata folia rotunda transfadigètes, umbellatim dis-

positos: quibus inter folia insident flores colore herbido, quorum singularia foliola puluilli instar habentia, anisulis croceis donata sunt: pericarpia triquetra totidem grana continent.

Myrtaria cognominata candida, Lactaria [*τιθυμάλος*] est foliis Myrti condita, verè aculeatis parte postrema, sarmentula in terram demittens longitudine palmi, quæ non simul, sed alternatis annis, Theophrasto quidem authore, fructificant, alia hoc anno, alia postero, quam omnia eadem radice exorta: loca montuosa desiderat: fructus Nux [*κάρυον*, unde huic Tithymalo *καρυίτης* cognomen.] appellatur, &c.

Tithymalum alterum, qui *scævina* [*θαλίς*] existimatur, Myrtitem [*μυρτίτην* sc. à foliorum cum myrto cognatione] quem & Caryitem [*καρυίτην*] aut Myrsiniten [*μυρσινίτην*] vocant, Dioscorides similem scribit suapte natura Daphnoidi, foliis Myrti, sed maioribus ac firmis, in summitate aculeatis: sarmentis ab radice dodrantalibus: addens fructum proferre, alternis annis, Nuci [*κάρυος* Lac. legit in vet. cod. *καρύς* al. *καρίης*] similem, sed leniter linguam mordentem: nasci & hunc in asperis.

Alterum genus Tithymali, quod Myrtiten vocant, alij Caryitem, Plinio est foliis Myrti acutis, pungentibus, sed mollioribus [ex vet. cod. maioribus] & ipsum etiam in asperis nascens. Colliguntur comæ eius Hordeo turgescente, siccaturque in umbra diebus novem in Sole inarescunt. Fructus non pariter maturefcit, sed pars anno sequente, & Nux vocatur. Inde cognomen Græci dedère. Demetitur, &c.

Matth. 16.
Nux.

Matthiolum in Diosc. hist. germ. & epit. Tithymalum myrsiniten ita pingit, ut eum nunquam observasse videatur, vel voluisse accommodare

descriptioni Dioscoridis malè intellectæ, nullam *Lacuna* appingens umbellam cum nuculis, sed veluti magnam nucem: præterea eum non describit. Matthiolum imitatur Lacuna.

Tithymali Myrsinitis nomen vulgare italicum, præter *Tortomaglio* nullum novit Anguillara. Eos falli testatur cum Gesnero qui existimant hanc plantam nucem ferre fructum quidem concedit nuci similem, sed, non magnum ut nux, quemadmodum voluit Matthiolum, & Lonicerus.

Quin & Lobel. in Aduers. commentitiam Tithymali myrsinitis effigiaturam risit Matthiolum.

Duas icones proponit compilatq; Tabern. *Tabern. Lob. & C. Bauh. nomenclat.* sine descriptione: Tithym. myrsinites. 1. & 2. Duas quoque Lob. in Ic. p. 353. Tithymalus myrsifolius Obl. p. 192. Item, Tithym. myrsinites Dioscoridis Adu. p. 150. Ego has duas non separo, licet C. Bauhinus diueritas statuerit in pin. ut mox dicemus.

Duas quoque habet H. Lugdunensis: Vnam p. 1642. Tithymali myrsinitis seu *scævina* Matthioli titulo: alteram p. 1643. Tithymali myrsinitis melius expressi inscriptione.

Nunc quamuis C. Bauhinus in phyt. Tithym. 8. siue myrsinitis primi duas apud Lobelium & Tabern. icones existere dixerit, atamen in pin. easdem rursus separat, tanquam ab invicem differentes, minus sano, meâ quidem sententia, iudicio. Tithymalus myrsinites 3. siue latifolius, inquit, est Tithym. myrsinites Matth. Anguill. Dod. Gesn. hort. & app. Lac. Lon. Lob. Cæsal. Lugd. Cast. Camer. (hic addimus) Bellon. Obl. lib. 1. cap. 18. & 55. & Schvvenckf. cui & Esula myrsifolia dicitur: Tithymalus myrsinites, myrsifolius *scævina* repens Dioscoridis Aduers. Tithym. myrsin. legitimus (hunc Hispanis & Gallis ignotum ait) Clusio: Tithym. myrsin. 1. Tabern. Tithymalus verò myrsinites 4. siue angustifolius, est Tithym. myrsinites Dioscoridis Adu. Lob. icon. Tithym. myrs. alter Tabern. Tithym. myrsinites in montibus Cæsalpino.

Non alibi quàm in Angliæ, Belgij & Franciæ *Locus & hortis* natum vidit Lobelius. Anguillara repetit *Temper.* in Maris, & multis Abruzzo locis, & montibus Nursiæ. In hortis diuersis diuerso tempore & florentem & semina maturantem ego observavi. Semel verò in hortum translatus, inquit Camerarius, sese variis in locis propagat, ac illi facillè affuescit. Non caret admiratione, quod aliquando superfluas plantas à me euulsas, & in orto per acerrimam Hiemem proiectas, sequente Vere repererim adhuc integras & illæsas, quæ postea à quodam amico rursus aliò transplantatæ fuerunt. Crescit sua sponte in Samnitibus.

Succus lacteus, radix, semen, & folia confimi- *Vitis & lem* antè dicto [masculo characiæ] sortiuntur *sa- vus.* cultarem. Sed ille ad citandas vomitiones hoc ipso efficacior, præceptore Dioscoride.

TITHYMALVS PARALIVS.

Lactarium (*τιθυμάλων*) quod maritimū *Descriptio* *num* [*παράλιον κάρυον*] appellant, Theophrasto folio est rotundo: caule, totaque magnitudine ad palmum, fructu candido: demetitur cū vus nigrescere incipit, & siccatus fructus tritus potui datur, acetabuli tertia parte.

Textus

Tertius Tithymalus παραλίος Dioscoridi vocatus, quē aliqui Tithymalia (τιθυμάλια) aut Mecona (μικονα, Dalech. mallet γαλαρα.) appellavere, nascitur in maritimis, rarius palmum altis (σπιθαμιαίς) erectis (ἐρθίοις). Sic vet. cod. Lacuna etiam legit ἐρθίοις Ita & Serapio, & Apul. Subrubentibus, quinis, senisue à radice exeuntibus: circa quos folia serie quadam digesta: eaque parua, quadantenus angusta, oblonga, & limbo foliis similia (ὁμοία λίαν, vet. ἰσχυρὰ: capite in acumine orbiculari (vet. addit πικρὸν. Sic etiam legunt Lac. & Orib.) in quo semen Erui simile, varium (album Plinio, Semen is incipiente vna colligi, & Siccatū teri sumique acetabuli mēlura ad purgationes tradit) flores albi. Frutex totus cu

radice lacteo succo turgēt.

Icon hic exhibita facta est nobis absētibz, non ut optauimus.

Credidit Braslauolus illud esse Althebran Melucimius, & Auccēz Scabiā, quod Dioscoridi Paralius est: sed ab eo mēto dūfēcit Matthiolum. Huc autem tūllē notum Tithymalum paraliū dicere non possum:

non enim describit, nec umbellam appropit: sed in extremitate caulis quiddam oroboides forte, quia Dioscorides ait semen esse Erui semini simile.

Lacuna & Lonicerus Matthiolum imitantur, eādem censurā digni.

Dod. in fol. (ubi ait à Celso Tithym. marinum propriē Lactueam marinam vocari) duas proponit icones: vni, titulus, paralius ex locis maritimis: alteri Tithym. paralius ex hortis. Dubitat Celso. hort. ad Tithym. paralius à Matthiolo & Dodonæo pictus sit Cyparissias?

Synon. C. Bauh. phyt. Tithymalus n. siue maritimus: Eid. pin. Tithym. maritimus 1. Tithym. paralius Matth. Ang. Dod. Lac. Gesn. hort. Clus. hisp. Lob. Lon. Cast. Lugd. qui tres figuras vnius eiusdemque plantæ habet, Camer. & Tabern. Tithym. maritimus Cæsalp.

Variet. Variet is, qui in maritimis natus ab hortensi, hinc duæ figuræ apud Dod. Aduers. præter Tithym. paraliū virgis rubellis, foliis subnigris, floribus ex herbaceo luteolis, meminit & cærulei in totum. Non modò in Italia & Hispaniæ, sed & in Hollandiæ, Zelandiæ, reliquaque inferioris Germaniæ ora, locis incolis, ardis & præaltis subinde nasci testatur Dodonæus: atque hunc ad hortos translatum, luxuriantibus cauliculis & in longitudo excrecentibus, rarioribus efficit folijs. Ego apud nare prope Mons-

Vires & Vfus. Parali Tithymali vñs & reponendi modus similis est Characiæ & Myrsinitis, Dioscoridi.

Tithymalus Dendroides.

Tithymalus sextus *Suspidis* vocatus, inquit Descript. Dioscorides, qui in petris nascitur, *foliosus* est in acumine, dentatque spargit *comam*, succo lacteo prægnans, subrubentibus ramis, *folijs* circa ipsum Myrti tenuioris *semine* Characiæ.

Septimum Tithymalum, inquit Plinius, Dendroidem cognominant, alij Cobion, alij Leptophyllon, in petris nascentem, comosissimum ex omnibus maximè (maximis in vet.) cauliculis rubentibus, & semine copiosissimum, eiusdem effectus cuius Characiæ.

Tithymalum arborecentem dictum Dendroidem in Creta vidit exercecere Bellonius ad altitudinem duorum hominum, caudice crassitudine cruris.

Dod. gall. Tithym. 6. siue *Suspidis*, leptophyllos quorundam, Bellonij. Eid. de purg. & in fol. lat. Tithymal. characiæ 3. siue caule non rubens, sed exalbidus ac candidus, sicut Dendroides Matthioli: Item, Tithym. dendroides ex codice Cæsareo. Iconem à Lobelio pro Tithymalo dendroide propositam, exhibet Dodonæus pro Characiæ tertio, ac distinguit eum ab arboreo, cuius effigiem proponit ex cod. Cæsareo, cuius folia nostra plantæ sunt satis similia. Dendroidem [subdit] in petrosis locis exire Dioscorides prodidit: in Creta Bellonius: Aloisius in Tuscia, Liguria, & prope Mammiam. Matthiolum Dendroidem extra Terracinam agri Neapolitani urbem ostendisse se refert inter lxx antiquissimæ speciei plantæ arborecentis effigie: & in Tergestino littore haud procul Timaio fonte in saxosis quibundam rupibus. Qui tamen ab eo exhibitur, nequaquam amplius est coma aut Myrti folijs, sed oblongis, & Characiæ amulis pingitur: *Hæc* etc. Et tamen mirum est Matthiolum non describere Tithymalum dendroidem, & ei appingere comam siue umbellam quæ nihil commune habet cum villo Tithymalorum genere.

H. Lugd. duas proponit figuras: p. 1644. Tithym. dendroidis Matthioli: p. 1645. Tithym. dendroidis Dodonæi ex cod. Cæsareo.

Arguill. narrat Tithym. dendroidem vel petreum ad altitudinem magni hominis crescere, truncis folijs vacuo, lignosissimo: comâ constare ex tenuibus turculis: folijs similibus Myrti, paullo angustioribus: floribus luteis, aliorum Tithymalorum.

Cameralio Tithym. arborecens siue petreus, est altitudine trium cubitorum, copiosissimo lacte abundans.

Separat C. Bauh. Dendroidem Lobelij à Dodonæi ex cod. Cæsareo, præter nostram opinionem: In phyt. Tithym. 9. siue arboreus folio Myrti: Item, Tithym. 10. siue dendroides ex cod. Cæsareo. Eid. pin. Tithym. myrsinites 1. siue arboreus: Tithym. dendroides Matth. Gesn. hort. Lac. Lob. in Adv. & Obs. p. 194. & Castor. Tithym. charac. 3. Dod. Tith. arbor. myrtifolius Lob. ic. p. 359. Tithym. arborecens Cæsalp. Item Tithym. myrsinites 2. siue dendroides ex cod. Cæsareo, Dod.

E semine facile in Germania nascitur, sed difficulter tenellæ plantæ, utpote frigoris impatientes in alterum annum durant, in hortis: Cæterâ de loco ex Dodonæo antè habentur.

Tithymalus Dendroides similiter ut Charac. Myrsinites, Paralius, Helioscopius & Cyparissias reponitur & similiter operatur.

ALYPVM MATTHIOLI, TITHYMALIS
affine. CAP. XX.

Descript.



Alypi Matthio-
li nomine mi-
hi Stutgar-
diz per D.
Schvartzium
demonstrata
hæc planta.
Ex ea autem
ramulus quem
afferuo, tenu-
is est, dodrā-
tali longitudi-
ne, foliis onu-
stus, alterna-
tim positis,
vnciam plūs
minūs longis,
vix culmum
latis, in acu-
men desinen-

ribus, secundum longitudinē decurrente nervo.

Verba autem Matthioli de Alypo, si quis cum
figura plantæ quam describit, conferat, depre-
hendet eum sibi non constare, ut meritis eum
inerepat Dalechamplus.

Ac hallucinatur Coldenbergius in eo, quod
in Dispensat. Cordi supra diacast. dicit, herbam
quæ Alypi nomine hodie cognoscatur, affabre
Matthiolum in suis comm. depictam exhibere.

An Anguill. epist. 14. Alypum passim in Scla-
uoniz (Illyriz) insulis proueniens?

ALYPVM QVIBVSDAM, SIVE ESULA
rara flore purpureo.

Descript.



Sesquicubito
profert caules,
non sine ramis
frequentibus &
longis, per
quos folia Len-
tisci, vel Gly-
cyrrhizæ, ob-
longa, per ex-
tremum obru-
ta, nisi quod
nervus qui se-
cundum longi-
tudinē visitur,
in exiguum de-
sinit stylum,
glabra, euiden-
tibus obliquis
crebris nervis
in margines ex-
potrectis distin-

cta, coniugatim ex modicis intervallis, breuibus
pediculis donata: flores è ramorum cacumine

pendent, aliā depositione quàm villo Tithymalo-
rum, coacernati in racemum penilem, singuli
oblōgi, nolæ exiguæ formā, colore purpurascen-
te: radix valdè proluxa & satis crassa. Lac ex om-
nibus partibus acre & feruidum Tithymalorum
more fundit.

Duas figuras habet Lobel. in Ic. Plant. p. 372.
sub titulo Esulæ raræ è Lio Venetorum insula,
In Obf. vers. p. 201. vnam tantum.

C. Bauh. phyt. Tithymalus 21. siue purpuraf-
centibus floribus marina. Eid. pin. Tithym-
maritimus 4. siue purpurascens floribus: an A-
lypum Anguill?

H. Lugd. p. 1655. Esula rara, Penz & Lobelii:
Item Esula rara è Lio Venetorum insula, Penz
alia. *Dua eisdem planta effigies.*

Loca.

Non alibi quàm littoribus, & insulis sinūs A-
diatici reperitur, & in Lio insula exigua.

Vires.

Licet autem Turbith Antiquorum esse neget
Casp. Bartholinus in suis parad. inter Botanica:
posse tamen huius radicem succedaneum veri
Turbith esse admittit, & Turbith Venetum ap-
pellari, quod partes in purganda pituita molitur
effectus.

TITHYMALVS APHYLLOS.

Descriptio



Caudes recti
nudi qua-
les Sparti aut
Genistæ, aut
certè paucif-
simis foliis do-
nati circa Veris
medium & Au-
tumni; cum flo-
ribus in summi-
tate pallidis,
qui breui deci-
dentes, caulicu-
los nudos re-
linquunt, anni
reliquo. Intra
stolosos au-
tumnales semen
latitat, etsi autè
perfectè matu-
ra, apud nos ta-
men lata non

crescit. Attamen frequens admodum est hæc
planta in maritimis Africa. Ex ea lac abundanter
exstillat colore albo, sapore acutissimo & quasi
caustico.

Æthiopes hæc plantā siccata & in puluerem
redacta vtuntur in condimentis, sicut nos Pipe-
re, inquit hist. nat. lib. 28. cap. 1. Ferd. Imperator.
Quidam existimant esse Xabram & Camarro-
num Rhasis, quam Rauvolfius se circa Tripo-
lim obseruasse scribit, & quæ H. Lugd. Planta la-
ctaria: vt & C. Bauh. phyt. dicitur. In Africa de-
nominatur vocabulo quod nobis Piper longum
denotat.

FINIS LIBRI TRIGESIMI QVARTI.





HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XXXV.


HERBÆ CRASSIFOLIÆ ET SVCCVLENTÆ.

Nunc reuertemur ad eas, quæ penè totæ succi sunt, quarum quadam inter eas, peculiari privilegio donata, ut easam radice tenuis euulsa vivant & crescant, etiam nullo suscepto nutrimento, quod in-
vaculoquis proximum putet.

PORTVLACA, ANDRACHNE, VETERIBVS.

CAP. I.

Æquiuoca



DRACHNES [τῆς ἀδραχ-
νῆς] nomine diuersa stirpium
genera comprehenduntur.
Theophrastus enim libr. 1.
hist. plant. cap. 8. & 15. item
4. hist. 4. Andrachnes arboris,
quam Portulacam Gaza red-
didit, meminit. Sed de hoc
Andrachnes genere cū n alibi petraetatum, plura
hic repetere instituti nostri non est. De herba
duntaxat, quam 1. caular. 10. & 4. caular. 3. exhi-
bet, sermonem facere decreuimus.

Andrachne
duplex
Dioscorid.

Huius igitur Dioscorides duo genera consti-
tuit: Ἀνδραχὺν [satiuam intellige] & Ἀνδραχὺν
ἀγρίαν, h. e. Andrachnem siluestrem. Hanc sic de-
scribit. Portulaca siluestris [sic Ald. Paris. ca-
ret] cognominata, foliolis est quam antè me-
morata [satiua] crassioribus ac densis. Locis
petrosis nascitur: interdum & in hortis. Folia
verdè habet Oleæ, sed minora multò, verùm plu-
ra, eaque tenera: *cauliculus* rubicundos, ab vna
radice frequentes, in terram inclinatos: qui
quidem commanducati succulenti percipiuntur,
viscidi & subaslo gustu: Vim calfactoriam, a-
crem & exulcerantem: ac strumas quoque cum
azungia imposita discutit.

Andrachne
filia. Diosc.
quid?

Et hæc portulaca syluestris Dioscoridis, hirsu-
ta, exulcerans, quænam planta sit, nos adhuc la-
tere, ingenuè fitemur. Dodonæus autem Ille-
cebram esse sibi persuadet. Præter Portulacam
maiolem satiuam, & minorem syluestrem, am-
bas eiusdem generis, & aliam quandam, & qui-
dem siluestrem, à Græcis quoque ἀνδραχὺν

Tom. III.

ἀγρίαν nuncupatam, veteres referunt, quæ alio
nomine Illecebra à Latinis appellata est, inquit
Dod. Confunditur autem hæc quandoque cum
minore, siue syluestri Portulaca, eiusdem sc. ge-
neris cum hortensi. Neque ab hoc errore ple-
raque Dioscoridis exemplaria libera sunt. Nam
quod in Portulacæ syluestris descriptione, *cauli-
culos manducatos bonum succum parere, viscosos &
aliquantulum salsos esse* affirmatur, ad minorem
siluestrem referendum est. Quod verdè sequitur:
vis ei excalfactoria, acris, exulcerans, &c. non huius,
sed Illecebræ facultas est.

Diosc. nat.

Iam & Peplis, ab Hippocrate Peplion, non-
nullis quoque Portulaca syluestris appellatur, *Peplis. Pe-
Dioscoride teste. Quæ occasio cur Plinius lib. 10.
& cap. 20. scripserit, Portulacam, quam Peplion
vocant, non multum satiuâ efficaciorē esse:
sed ibi Portulacam cum Peplio herba diuersissi-
ma confundit: confundit quin etiam vires sylue-
stris cum satiuæ Portulacæ viribus.*

Plinij error.

Recentior ætas & quondam superioribus ma-
rinam dictam Portulacam annumerat, quæ cū
fruticosa sit, lib. 8. H. n. post Halimum requiren-
da.

Portulaca
marina.

Telephium etiam, quod à nobis Anacamseros
inscribitur, ob formam ei concessam, Trag. Por-
tulacam maiorem dicendam putauit, licet nemo
antiquorum herbariorum ita vocarit.

Anacamys.

Sic Alsinem palustrem minorem folio oblōgo,
sibi Portulacæ aquaticæ nomine missa ait C. B.

Alsinæ pa-
lustris.

Portulaca verdè aquatica Thalii, foliis satiuæ
minoribus, seminibusque iisdem, quid sit inqui-
rendum.

liii

Cateu n'quam Græci αἰδράχην nominant, & αἰδράχην, Latini Andrachnen & Adrachnen vnius literæ elisione dicunt, & Portulacan: Germani *Burzel*, & *Burzelkraut*; porcelen item, ac porcelenkraut: Belgæ porcelleyn: Galli du Pourpier, aut Pourcellaine: Itali Porcellane, Procacchia: Hispan. *Verdelagas*, *Baldroegues*: Angli *Porcelan*.

Adrianus Turnebus Adv. l. 8. cap. 23. edit. Lut. Portulacam etiam Portulatam dicendam existimavit, quod foliis portulas imitetur. Sed exemplar antiquum voluminum deluit.

Nobis poridriplex Portulaca cognita, est, de quibus nunc agendum.

PORTULACA SILVESTRIS minor, siue spontanea.

Descriptio



Passim in hortis & vineis nascitur spontanea & silvestris Portulaca, multis numeris minor, quam sativa, tota terræ appressa, nec humo surgens, radice crassiusculâ, sicuti & ramis, succulentis, multistidis: folia vngue digiti minimi ferè paria, succulenta, crassa, atroviolenia: flores pusilli, multiflori.

Negatur
esse genus
sericum

Portulacam silvestrem siue alteram, ut vocat, Fuchsius negat esse Aizoi genus tertium, contra quam ut antiqui seducti mendosis Dioscoridis exemplaribus credunt. Nam quod plerique nomina harum plantarum confuderint, factum subinde esse ait ut multa adulterina, quæ tertii generis Aizoi debeantur, capiti de Portulaca silvestri interta fuerint, quæ omnia expungenda veniant.

Caput de
Portulaca
filu. vnde
sar superfluum.

Matthiolum integrum ex Dioscoride caput de Andrachne agria demit, licet Portulacæ silvestris genus hoc depingat. Et certe in his exemplaribus quæ Coloniae All. I. Storer excudit, cum comm. Marcelli Virgilii, vnius tantum generis Portulaca describitur, sicut & Ruelliana habent exemplaria.

Videtur de
graminum.

Quod itaque ad silvestris Portulacæ appellationes attinet, variant exemplaria Dioscoridis. Et optandum sanè esset, ut suo loco quæque plantæ, in Veterum scriptis collocaretur, quod si fieret, maiori cum fructu illa legeremus, inquit Tragus. Sed ea temper fuit colorum in deprauandis optimorum autorum scriptis peruectitas, ut cum aliquid minus intelligerent, statim immutato ordine pro libito transpicerent, aut omnino expungerent, substitutis in locum adulterinis sententiis, quo factum est, ut vetusta & emendata exemplaria prorsus perierint, relictis novis & deprauatis, quibus, si rem diligenter consideres, quod alibi deest, alio loco superfluum

inueniatur. Id cum in aliis multis capitibus Dioscoridis contigerit, tum verò in descriptione Portulacæ haud obscure videre est. Nam Andrachnen duorum generum esse ait, hortensem & agrestem, sicuti rei veritas sese habet. Rursum sub descriptione Sadi minoris, tertium illud genus, Portulacam agrestem esse, & Illecebram, ac Telephion dici tradit. Præterea Telephio proprium dicatum est caput, quo loco Portulacæ agrestis seu Illecebræ verum facta est mentio. Quis ergo non videt, in his mendosis exemplaribus, omnia esse confusa, nihilque vel suis propriis nominibus appellatum, vel suis locis dispositum? Sed cui adscribemus hæc, nisi temporis, quo omnia & variantur & abolentur, iniquitati, & herbariorum ac medicorum impetui & negligentie?

C. Bauh. pin. Portulaca 2. siue angustifolia, *Synonyma* vel silvestris, ut Trago, Matth. Anguill. Fuch. Dod. Lob. Obsp. 210. Icon. p. 388. Hist. Lugd. Cast. & Gerardo: Portulaca aruensis Tabern. Portulaca spontè nascens Cordo hist. Portulaca angustiorib. foliis Catalpin. Cepæa Cordo in Diosc. Lon. descr.

Portulaca exigua siue aruensis Camerario.

Herbula nō ab aliis, ut autor perhibet, demonstrata, pinguis, sublutea, coliculis incurvis aliquantulum procumbentibus. foliis minoribus, Portulacæ silvestris, pallidioribus tamen, semper geminis: nigro semine in vasculis parvis, Portulacæ similibus, sed quæ longioribus Pediculis, & gracilibus, nituntur, & maturè incipiunt hiare antequam semen plenè perficiatur. Sapor illi nullus qui notari queat, præterquam herbaceus, ut in Alline.

Descriptio.

Camer. Portulaca exigua siue Andrachnion aruense. C. Bauh. pin. Portulaca 3. siue exigua Camerarii. *Synon.*

Primo Vere in agris frumentariis frequens est circa Lyptiam ante Crementem portam.

PORTULACA HORTENSIS latifolia.



Simplice se-
sic est radi-
ce, progressu
temporis li-
gnescente, cui
libræ pauca
appensa: cau-
les plures e-
mittit pedali
longitudine,
non rard bre-
uiiores, tere-
tes, subruben-
tes: folia in-
condua, suc-
culenta, ex an-
gusto princi-
pio, quo cauli
adnascuntur,
sentim dila-
rantur, sapo-
re subacido:

inter quæ oriuntur *stipendi* lutei, stellati, apicibus concoloribus: hisce succedunt pericarpia rotunda, semen continentia pusillum, pullum.

Portulaca quamvis græca αἰδράχην voce ex-
prima-

primatur tamen ἀσπράγυν dicendam potius contendit Lobelius, quod teneritudine quadam lactea & carnosa in exortu luxuriat, ramulique ac folia albicent, quidam spumosa fuligine, siue tenui quapiā aspergine cinerea, & aura spuinea, quam ἀσπράγυν dicit, additque non adstringere, sed refrigerare, legendum esse apud Dioscoridem, idque nosciturum eum, qui attentius caput de Portulaca à carcere ad calcem lustraturus sit: hanc enim illius primam & summam esse facultatem. Facilem autem esse lapsum, rerum ignotorum amanuensium, typographorumque, græcè producentium, legendumque, *ΣΥΝΤΗΝΕΙΧΕΙ ΔΥΝΑΜΙΣ*, pro *ΠΟΡΤΟΥΛΑ*.

Lapsus in
Lapoid.

Synon.

Turnero dicitur Portulaca, vt & Cordo in Dioscor. satini Anguill. (*Σατινίδης* in Græcia) Cordo hist. Dodon. gall. Hist. Lugd. & Eyst. Portulaca hortensis Brunfelsi. descript. Trago, Fuchs. & Do lonæo. gall. Portulaca domestica Matth. Lob. in Obi. p. 210. Icon. p. 388. Cast. Tab. & Gerardo. Portulaca maior Camer. hortensis Gesn. hort. Portulaca latioribus foliis Celsapino.

Locus &
Tempus.

In hortis ac torum areis subactis ac stercoreatis commodè sentitur Martio aut Aprili: Iunio verò ac deinde in Autumnum vsque viget ac vi-
ret: Solum desiderat letum, pingue, non aridum.

Vites
vitas.

Vim habet, vt author est Dioscorides, adstringentiam (*Συμμετρεῖ*: *Πορτοῦλα* refrigeratorem, Lob.) Imposita cum polenta capitis doloribus, ac tum oculorum, tum ceteris quoque inflammationibus: remque stomachi ardoribus, & erysipelatis, ac vesicæ denique cruciatibus auxilio est. Pro cibo verò sumpta, dentium stuporem & stomachi ac intestinorum estuationem, fluxionemque den ulcer. Erosione tentatos renes & vesicam adiuvat, ac veneris impetus exoluit. Simili effectu prodest eius succus epotus, etiam in febribus efficax. Valet & diu multumque cocta, contra teretes lumbricos, etuentam excretionē, ac dysenteriam: itemque ad hæmorrhoides, & sanguinis eruptiones, nec non & aduersus leprosis (*λεπροσύν*) morius. Sed & oculorum medicamentis vtiliter admiscetur, ac intestinis fluxione laborantibus, erosive vuluis infunditur. Quin & ad capitis dolores ab æstu obortos cum rosaceo aut simplici oleo irrigatur. Erumpentes quoque, in capite papulas cum vino extemit. Vulneribus denique, quæ ad lisionem spectant, cum polenta imponitur.

Ex Plinio.

Ex Plinio memorabiles Portulacæ vsus perhibentur: Sagittarum venena: & serpentium hæmorrhoidum & presterum restinguit pro cibo sumpta, & plagis imposita extrahit. Item Hvoscamo paro, è passoque expresso succo. Cùm ipsa non est, semine eius simili effectu prodest. Resistit & aquarum vitæ, capitis dolori, vlceribusque in vino rosa & imposita. Reliqua vlcera cum melle, commanducata sanat. Sic & infantium cerebro imponitur, vmbilicoque proci duo, Inepiphoris verò omnium fronti, temporibusque cum polenta. Sed ipsi oculis è lacte & melle. Eadem si proci dant, prodest, foliis tritis cum corticibus Fabæ. Pustulis cum polenta & sale, & aceto, ac cerâ. Et vlcera oris, tumoremque gingivarum commanducata cruda sedat. Item dentium dolores. Toniliatum vlcera succus decoctæ. Mobiles dentes stabilit commanducata. Cruditates sedat, vocemque firmit, & sitim arcer. Cervicis dolores cum galla & Lini semine. Tom. III.

mine pari mensurâ sedat. Mammarum vitia cū melle, aut cimolia creta. Salutaris & suspiriosis, semine cum melle hausto. Stomachum in acetariis sumpta corroborat. Ardentibus febribus imponitur cum polenta. Et aliàs manducata refrigerat etiam intestina. Vomitiones silit Dysenteria & vomitis datur ex aceto, vel bibitur cum Comino. Tenesmis autem cocta, & comitialibus cibo vel potu prodest. Purgationibus mulierum acetabuli mensura in sapa. Podagris calidis cum sale illita, & sacro igni. Succus eius potus renes iuvat, & vesicas. Ventris animalia pellit. Ad vulnere dolores ex oleo cum polenta imponitur. Nervorum duritias emollit. Venerem inhibet, venerique somnia. Prætorii viri pater est Hispaniæ princeps, quem scio propter impatibiles vix morbos, radicem eius filo suspensam è collo gerere præterquam in balneis, & ita liberatum incommodo omni. Quin etiam inuent apud autores caput inde litum destillationem toto anno non sentire. Oculos tamen habetare putatur.

Portulacâ quidâ vt cibo vtuntur, inquit Gal. Galenus, 2. alim. sed imbecille præstat alimentum, idque frigidum humidum & glutinosum. Vt medicamentum autem dentium stupori medetur, oblectorem suum morsus expertem. Et rursus lib. 6. simpl. Portulaca frigida & aquea temperamento est, paucæ cuiusdam particeps austeritatis. Proinde fluxiones repellit, & maximè biliosas & calidas, cum eo quod eas mutet, & alteret, magnopere refrigerans. Et fuerit sanè in refrigerandi quidem facultate tertii excessus: à temperatis, in humectando verò secundi. Hæc ratione æstuant, vt si quid aliud, adiuvat tum ventris osculo imposita, tum totis hypochondriis, maximè in febribus hecticis. Præterea stuporem dentium sanat, nempe qui ab acidorum contractu asperè exsiccati fuerant, leniens atque replens, utpote quum viscosam habeat humiditatem. Similiter verò & succus eius. Itaque non foris modò impositus, sed epotus quoque refrigerat. Hoc sanè & toti herbe cometæ accidit. Quoniam autem restringit, vtiliter in dysenteris editur, & muliebri profluvio, & sanguinis reiectionibus. Sed ad hæc quidem multò est, quàm herba, succus ipsius efficacior. In his curdētium torporem discutiat Portulaca, causam reddit Galenus. Alexander tamen Aphrodisæus hoc Portulacæ munus cæcis rerum facultatibus, & additis causis acceptum reculit.

Stupor dē
tium

Dysenteria

Cæterum, Vallembertus infantibus laborantibus crustis faciei particulatim interdicit Portulacam nutriticibus, propter proprietatem occultam, huic morbo nocuam, si internè sumatur, licet externè applicata vtilis sit.

C E P Æ A.

CAP. II.

S Pargit per terram folia succulenta, Portulacæ similia, minora, subrotunda, alia per caules cubito proceriores, ramosos, ex oblongo per extremum rotunda: flores in caulibus à medio, summo tenus ex vncialibus pediculis plures congesti, suis tamen petiolis minoribus nixi, parvis, albicantes: radix obliqua, gracilis, brevis, multis fibris capillata.

Describe

Matthioli. veram & legitimam Cepzæ sibi

Fili 2

cognitam asseuerat: nec tamen vllam noramad-
dit, vel figuræ, vel naturæ, uedum locorum, quæ
nos certiores faciat, illum ad amussim Cepæam
exploratam habuisse.



Synon.

Color flo-
rum ex purpu-
reo candican-
tium, vel lute-
orum. mihi
dubium mo-
uet, an Cæ-
salp. l. 15. ca. 23.
nostram Ce-
peam intelli-
gat. Sed vi-
deo id adse-
rere C. Bauhi-
num, quare ei
fides habenda
erit.

Græcis vt
Dioscor. dici-
tur, *καραία*:
Latinis, vt
Plinio lib. 26.
c. 8. Matthiol.
Anguill. Lon.

[quoad iconem C. Bauhin.] Lob. in Adu. & Obs.
p. 14. ac lc. pag. 393. Cast. Cæf. Tabern. Clus.
hist. & C. Bauh. pin. *Cepæa*. Germ. *Cepeenkrant*,
Vvelsch barnkrant, Tabern.

Locus &
Tempus.

Observaui Cepæam variis in hortis virentem
Novembri, repositamque Ianuario, ac Æstare
florentem. Occurrit inter Valentiam & Lug-
dunum, *au boss de la bonne Alemande*: Genevæ
extra portam S. Geruasii. Author est Plinius
Cepæam Portulacæ similem, nigriore radice, sed
inutili, in litoribus arenosis nasci.

Vires & v-
sus.

Cepææ Dioscorideæ folia pota cum vino vi-
rinæ stillicidio & scabiose vesicæ (vesicæ malis,
Plin. nec plura) auxiliantur. Maximè tamen hoc
faciunt, si cum asparagi myacanthini appellati
radicum decocto bibantur. Paulus radicem cum
Myacanthino asparago potamvriæ stillicidiis
ex obturatione obortis prodesse scripsit.

SEDVM ECHINATVM, vel stellatum flore albo.

CAP. III.

Descriptio

EX radice breui, multis fibris capillata, *caulis*
vnius, vel plures prodeunt spichamei, pingues,
supini, teretes, sæpe simplices, aliàs in duas alas
diuisi, non tamen facillè fragiles: *folia* Portulacæ,
subacida, carnosæ & succulenta, coloris viridis,
extremâ orâ, quæ latior etiam est, serrata, saporis
Sedi maioris vulgaris: *folia* inferiora caulibus
excrecentibus exsiccantur & cōtrugantur: cau-
libus ex certis intervallis ad latus adnascuntur
flores stellati, Sedi, quinquepartiti, albi, apicibus
purpurascens, quinque foliis acuminatis, te-
retibus, viridantibus, totum florem obuallanti-
bus: *capsula* stellatæ succedunt ex radiis quinque
plurimum, rariùs sex, compressis, *semen* conti-
nentes, minutum, Aizoi vulgaris.

Aizoon pa-
reginum
Clam.

Camerario hort. qui Aizoon peregrinum vo-
cat, Cepæ non ineptè adscribi posse visum fuit.
Quidam Lunariam appellant.

Dux (Cepæ sc.) sunt Cæsalpino in parietib.
opacis nascentes, vix excedentes quatuor digi-
tos foliis latitudine vnguis, modicè angulosis:

quæ Alteri quidem prope radicem densa sunt, vt
in Semperuiuo: Alteri autem rara, quæ & ramo-
sior est: flosculi candicantes: radix tenuis: fru-
ctus stellatus. Quidam Umbilici speciem putat:
Dioscorides herbâ Paronychiam appellat. Ego

contra Cæsal-
pinum non du-
as, sed vnam
constituo, æta-
te quidem dif-
fere ntem.

Fab. Colum-
næ Semperuiui
tertium Dios-
coridis & Plinii.

C. B. phyt. di-
citur Sedum 25. Synon.
sive flore stella-
to, & Telephium
Imperati Cam.
hort. Ego Tele-
phium Impera-
ti non noui,
quod sciam, sal-
tem sub eo no-
mine. Verùm

non possum mihi persuadere Camerarium de-
scripsisse nomine Thelephium eam plantam, quam
pro Aizoon peregrino descripsit & depinxit ico-
num libro n. 1. Quis in tam excellenti Botanico
putet memoriam ita labilem circa plantas sui
horti mihi longè alia stirps est.

Fæd. Platerus in cuius horro primùm à me vi-
sa, vocabat Cepæam alteram, non obstantibus
nonnullis, qui Tragium nominandum putarunt. Locus &
Montbelgardi in horro E. C. quotannis spon-
tè pullulat, virens Hieme, virens Iunio, Iulioque
florens.

Cepæ ad-
tertia.

SEDVM ECHINATVM flore luteo.



Simile iam Descript.
dicto, sed
minus, quod
spontè ortum
vidit Columna
in pariete vete-
re ædis D. An-
tonii extra vr-
bem, postea
multis locis hu-
mentibus: toto
habitu est simi-
lis superiori, fo-
lius tamen va-
riat non sinua-
tis, magis ad
Portulacæ folia
accedentibus,
sed minoribus:
flores item non
albos, sed luteos
promit, eodẽ-

que tempore perficitur: gustu etiam simili.

Nec dubium est, inquit Columna, quin idem Vires
specie & viribus sit Semperuiuum hoc tertium
Dioscoridis flore luteo, cum Semperuiuo eiaf-
dem tertio flore albo.

ANACAM-

ANACAMPSEROS, VVLGO

Faba crassa.

CAP. IV.

Descriptio **P** Edalis & altior est Anacampseros, *caulibus* rectis, teretibus, quibus perquam crebra adnascuntur *folia*, surrecta, succulenta, Portulacae foliis longiora, colore glauco, rubedine aliqua subinde perfuso, crenata, alias integra: flores in umbellis digessi, albi, quorum singuli

quinque foliis constant: radix subest tuberculis glandulosis tumosa: nullo v. nec sapore, nec odore excellit.

Per Fabam inuertam, *Germani bonen*, herbam latis foliis, ad Halicacabi folia accedentibus, existimamus Eucharium Rast. Anacampserotem intellexisse, cuius iconem habet p. 207. sub titulo *Maur-*



Euch. Roff. caudatus.

pfeffer, Vermicularis & Crassula. Ibi tamen nulla descriptio conueniens. Fabulosum etiam est quod dicit ferre Fabas inuertas: id enim desumpsit ex nomine.

Faba inuerta. Faba autem inuersa dicta est, quia radix innumeris tuberculis scatur, quae Fabarum implent magnitudinem.

Diosc. reprob. A Dioscorido inter vulnerarias numeratur, diciturque esse Telephium Dioscoridis, argumento à pictura & viribus petito. Verum ab eo & ineptè describitur, & pro ea importunè, Orchidis maris maioris icon proponitur, quae in Botan. hæredum Egenolphi pag. 297. exprimitur.

Telephium. Pro Telephio hanc videtur quoque admittere Lobel. in Adu. Quin & Fuchius Anacampserotem ad Dioscoridis caput de Telephio reducit, esseque perhibet (nouimus Bellonium & Solenandrum) qui Acetabulum alterum esse putant, quorum sententiam non admodum obsecramus esse iudicat. Mirum autem eum credere, Illecebram Romanis dictam propriè huic plantae conuenire. Alii inter spuria Telephii hanc vocem delent.

Scrophularia in Trago. Porro an sit Telephium hæret Tragus, dicens: Quod illi in Dioscoride sit nomen. Herbarii nihil dum exposuerunt certi. Nam alius Scrophulariam, alius Fabam grossam, alius Portulacam maiorem, alius postremo Semperuium nominant: Quod ad me attinet subscribo opinionibus duabus postremis. Nam si respicias formam, Portulaca maior non ineptè dicitur: rursus si perpetuitatem eius consideres quid obstat quominus *arsen* vocetur? Et videtur mihi omnino esse Aizoon, quod Dioscorides Chrysocome appellat. Et quamvis nomine quæ eo loco adfert Dioscorides, non satis ad præsentem herbam quædrent, non tamen de nominibus semper sollicitos esse oportet, ubi de re ipsa constat. Multi

propter radicis formam ad Satyria pertinere arbitrantur. Sed si totam eius substantiam perspicias, rectius ad Portulacam, Sedum maius & minus referes. Sin verò Telephium fuerit, ut multi arbitrantur, certe id est, quod à Diosc. Portulaca agrestis dicitur. Trago verò nunquam subscripserit Cronemburgius, quod Telephium illud *hymel schlutem* vocatum Dioscoridis Chrysocomen crediderit: ac eos minus verè sentire scribit, qui Sedi genus alterum, ac Semperuium minus Fabam hanc crassam & inuertam arbitrantur, cum potius hoc nomine Telephium hoc, Cæli claus dictum, intelligendum veniat.

Tragi opinio reiecta.

Cronemburgi sententiam respicit Amatus asserens lib. 4. cap. 91. Fabam crassam, Sedum minus Dioscoridis esse. Idem lib. 2. cap. 181. negat Crassulam maiorem Telephium esse. Cuius opinionis quoque est Rob. Constantinus.

Cæli claus minus Fabam hanc crassam & inuertam arbitrantur.

Sedum minus Diosc.

Anacampseros pignitur à Matthiolo nomine Fabaria: meritoque negatur esse Telephium his verbis. Quamquam non desunt, qui existiment Telephium esse Fabariam: cum tamen nulla reperitur qualitate prædita, quæ absterforia, sicantisque facultatis particeps dici possit, ut Galenus Telephium esse testatur, foliaque proferat Portulacae longè maiora, eorum sanè sententiæ planè adstipulari non aulim: tamen ea compluribus notis Telephium referre videatur. Velim tamen in his, ut in aliis quoque dubiis plantis, suum cuique esse iudicium. Lib. verò 3. cap. de Teucrio, quosdam producit, qui Teucrium alterum Plinii esse contendunt.

Fabaria. Matth. Falso Telephium.

Dicitur Scrophularia Trago: Scrophularia media vel tertia Brunfels. tom. 1. rhap. 37. Herba crassula, Cordo disp. Crassula maior, Amato, Cæli Thal. & Dod. gall. Crassula siue Faba inuerta Gerardo: Faba inuerta Ioub. dec. 1. par. 2. Faba inuerta, siue Crassula Gesn. hort. Lob. in Adu. & Icon. p. 389. Fabaria Beton. hæret. Egen. p. 74. Matthiol. Gm. & H. Lugd. Acetabulum alterum Cordo in Diosc. Acet. alterum album Fuch. Sedum minus Amato. Sedi genus alterum, & Semperuium minus, Cronemburgio. Telephium Matthiolo, Gesn. hort. Lob. Obs. pag. 211. Tabern. Cast. & Camer. Telephium album Fuch. Telephium alterum, siue Crassula Dod. lat. Telephium 1. siue vulgare C. Bauh. pin. Telephium vulgare siue secundum, Clus. hist. Cotyledon alterum Dioscoridis. Columnæ: Umbilici veneris species Bell.

Synonyma

Alii, ut annotat C. Bauhin. pin. foliis crenatis & subrotundis, ut Basilea provenit, pingunt: Varietas alii oblongis & integris, ut Lob. Dod. & Clusius. Flore est communiter albo, est & luteo: reperitur etiam flore purpurascens, & foliis rarioribus, estque Telephium 3. purpurascens flore, Clus. hist. Huc referendum id quod solo folio glauco, caeruleo à vulgato differt, quod Telephium glaucum verius, Lob. Obs.


Cum autem aduersus hernias hæc herba usurpetur, idèd Germ. *Bruchkraut* appellata est & Nomina *knabenkraut*. Sortita est & alia nomina, nam à linguar. sanandi facultate, *vundekraut*: & à forma radicis, *zumpenkraut*, *fozzvnein*, & *fozzvnein* & à similitudine foliorum, *Bonenblatt* cognominatur. Dicitur etiam *Fettebene*, *Donnerbonen*, & à superstitione, Herba S. Iohannis. S. Iohans kraut. Inter omnes plantas, inquit Tragus, vix alia reperitur, quæ diutius vireat, & ab interitu vindicetur, hac ipsa nostra Scrophularia, quæ de causa nonnulli, præsertim Medioma:

trices in vigilia D. Ioannis illa ad superstitiones suas, uti & Artemisia virtut. Nam quamprimum ea dies transierit, suspendunt hanc herbam in conclauibus suis, alii etiam parietibus imponunt, & supra ianuas collocant, quibus in locis longo tempore virescit, & continuo repullulascit, ita ut circa festum Natiuitatis virentem eam repentias. Hoc verò illi faciunt, eâ spe & fiducia perfusi, qua credunt illi homini qui herbam suspenderit, nullam lethalem agnitudine accidere posse, tantisper dum illa incolumis sit & vigeat. Sed relictis his superstitionibus, ad propositum redeamus. Belgæ vocant *vuendecruet*, & *Smertvortele*. Gallis *Reprisé*, *loubarbe des vignes*, *Fene es pesse*, quibusdam *Grassete*, aliis *Orpin*, aliis denique *Chicotrin* dicitur. It. & Hispan. *Faba grassa*: Angl. *Orpyne* Nomencl. pann. *Suly* su.

Locus & Tempus. Nascentur sine vilo negotio, & præcipue locis vmbrosis. appetente Maio mense caules emittit, qui Iulio & Augusto flores proferunt.

ANACAMPSEROS PURPUREA.

Descriptio



Pari cum alba magnitudine *caulem* habet ex radice strumosa, rectum & rigidum: foliorum dispositio eadem quæ in hoc, angustiora, longiora, dilutioraque viride tincta, perinde denticulis quibusdam per ambitum incisa: flores surculis insident vmbellati, iam dictæ Anacamperotis, sed rubentes, quo etiam

colore sunt stamina media & apices.

Synon.

Est hæc Scrophularia seu Portulaca maior, Tragi: Fuch. & H. Lugd. *Telephium purpurascens*: Lob. in Ic. pagin. 389. H. Lugd. Cam. ep. Tab. & Ger. *Telephium floribus purpureis*: Clus. hist. *Telephium s. purpureo flore*: Fuch. sic. *Acetabulum purpureum alterum*: Lon. Fabricia: Cxf. *Crassula montana*: Columnæ par. 2. *Rapuntium vmbellatum*: C. Bauhin. pin. *Telephium 2. siue purpureum maius*. Hoc, inquit, foliis est longioribus & profundius crenatis: natis aliquando paucioribus, aliquando pluribus, quod posterius, *Telephium quartum* est Clusii in hist.

Varietas

Telephium purpureum minus (C. Bauh.)

C. 2. dist.

A radice nodosa, & aliquot veluti minimis natis constante, multisque fibris prædita, *cauliculus* vnum vel alterum rotundum, semi-palmarem, fragilem ac succulentum promit: quem *folia* crassiuscula, succulenta, parua, in ambitu crenata, sine ordine ambiunt: *flosculi* quinque folii, purpurei, velut vmbellæ insident: quibus *capitula* pentagona, minutissimum *semen* scobis instar continentia, succedunt.

In editissimo monte Brigoiz, *Belchen* dictæ, locis humidis Iulio florens, collegit auctor, quod in pin. tertio loco tr. censet.

Locus & Tempus.

ANACAMPSEROS MAXIMA.

Descriptio



Habet duos, tres, plures, vel *caules* & radice prodeuntes, cubitales succulentos, in latus se inclinantes, in quibus ordinata sunt *folia*, hoc est ex interuallis binis, semper aduersis. pediculis nascentia, crassa, succi plena, ut in *Crassula* maiore, sed maiora, & magis carnosa: *flos* in extremis ramis quasi vmbellatim nascitur, quemadmodum in *Crassula* maiore. pallidus: *radices* illi plurimæ, glandulosæ, *Crassulæ* vulgari similes: sic describit Clusius, addens, ambigi an ad *Telephium* hæc planta sit referenda nec ne.

C. Bauhin. pin. *Telephium 4. siue latifolium* **Synon.** peregrinum: *Teleph. Hispanicum* Clus. hisp. H. Lugd. & Tabern. *Telephium 1. Dodon. 1. siue Hispanicum* Clus. hist. *Telephium seu Crassula maior Hispanica* Lob. Obs. 212. Ic. Plant. pag. 390. & Gerardo. Floribus est albis atque etiam rubris.

Huic omninò simile, modò idem non sit, ad Austriacarum Stiriacarumque Alpium radices locis vmbrosis spontè nascens inueniebat Clus. Luteriæ apud Robinum hortulanum Regium, & Florentiæ in carnabio à *Innocenti* vidi.

Locus

ANACAMPSEROS MINOR
rotundiore folio temper virens.

Descriptio



Inter Anacamperota vulgò notum, & hanc speciem hoc interest discriminis, quod non tantum minor hæc, sed & *radices* fibrosæ Sedi vermicularis, non tuberosæ: *foliorum* series non minus stipata: verum ea, excepto colore glauco, ad *Portulacæ* foliaquam proximè accedunt, magni

magnitudine & circinata ferè rotunditate : suntque admodum caduca , sic ut sapè maior pars caulibus, ubi exciderint, foliis vidua conspiciatur, relictis interim ubique foliorum, ubi exciderint, vestigiis: caules graciles, teretes, nonnihil rubres, per terram repunt, dodrantem longi : flores in umbella Anacampteros vulgaris, quorum singuli quinque foliolis ex albedine in purpuram vergentibus constant : apices verò sunt lutei in medio autem flore coeunt quinque veluti alabastra mucronata.

Synon.

Telephium minus repens semper virens, Lob. Obs. p. 212. & Icon. 390. Hist. Lugd. & Camer. Telephium semper virens Gerardo : Telephium minus Tabern. Telephium 3 Dod. lex. tum, Clus. hist. fortè Dioscoridis ; Eid. Cepza Pancii, & Camerario : Telephium 4. siue minus repens, C. Bauh. phyt. Eid. pin. Telephium 5. siue repens folio deciduo.

Locus & Tempus.

Tota Hicne viret, facile se propagat : rarius est, & hortis apud Belgas & alibi familiare.

Vires.

Scropularia [ut Tragus vocat] maxime quod ad folia pertinet, humida & frigida est temperaturæ radix verò semè est calidæ qualitatis, potestque hæc planta utrinque vulneratis a thibet.

Aqua vulneraria.

Aqua verò ex herba & foliis distillata & pota, non levis est medicina ad rupta & conuulsa, ac vulnera etiam, & vlcera interna, nec non erosiones stomachi, pulmonis, hepatis, matris, & intestinorum : his omnibus vitis medetur illa aqua, per aliquot dies continuo bibita : est autem illa aqua præstantissima medendis erosionibus intestinorum, quæ ex dysenteria accidere consueverunt : radix cum melle in vino cocta & pota, iisdè pollet facultatibus : herba ipsa glutinat & sanat omnis generis vulnera, præsertim verò hernias : eadè tusa & imposita sanguinè & vulneribus manantè sistit : magna quæ dolores sedat si facultate præstat, idque tam in recentibus vulneribus, quam in veteratis ac sordidis vlcibus efficiunt tusa folia & imposita.

Dysenteria crescentia.

RHODIA RADIX.

CAP. V.

Descriptio.



stipata, substantia & posita Telephii vulgè dicti, angustorum, oblongorum, acuminatorum & circumquaque serratorum, colore glauco, excepto mucrone purpurascente, sapore adstringe-

Tuberosa radice

nitior, quæ à rosarum cõsimili odore, saporeque Rhodiam appellant, foris in fusco splendente, intus alba, fragili, roseum odorem halante, gustu Rosæ simili, non ignauiter adstringente : virgæ ab una radice plures oriuntur tenues, numeroso foliorum agmine densè

te : flores in umbella gerit, quibus succedunt siliquæ oblongæ extrà reflexæ, corniculorum Aquilegii, aut Aconiti instar, rubentes, in quibus semen minutum, oblongum & paleaceum.

Rhodia autem siue rosea radix dicitur, quoniam ut in sinuatum, contrita rosas redolet, & non à Rhodo insula, ut Fuchsius monente, imperiti putant : Gall. Racine sentant la rose : Germ. Rosenwurzel : Belg. Rosen wortelen : Italis Rhodia radice : Hispan. Rayrodia : Boh. Ruzovirkyren : Græc. ροδία ρίζα, ut Dioscorid. & Galeno.

Nom. ling.

Floris & semine carere dixit Fuchsius, id quod Galenus etiam asserit, ast contra rei veritatem. Cordo proculi flores & semina maiori Crassulæ si milia. Hos quidem nunc paleicentis, nunc rubescentis coloris est.

Rhodia radix dicitur Trago. Matth. An. Synonyma guill. Cord. in Diosc. (ubi & Rhodias & Rosaria radix) & hutor. Gesner. hort. Lac. Clus. pann. Hist. Lugd. pag. 981. Cast. Cam. & Gerardo, ac C. Bauh. phyt. & pin. Rhodia, siue Rosea radix, Fuchsi. Lobel. in Adu. & Obseru. p. 212. itemque Leon. p. 391. Rosea radix Lon. & Tab. hist. & Icon.

Dioscoridi nascitur in Macedonia : Matthiol. in altiss. montium rupibus saxosis, præruptisque locis, ubi vix tantum terra circum habet, ut illi inhære possit : Nasci copiosè in Alpibus circa Saltzburgum Cordus refert. Pennæus monuit Cinciatium in altis Angliæ montibus copiosè semper provenire. Ex Allobrogum & Delphinatium saxosis, montosis, nec nò Taurinis alpibus, translata in viretis multis Belgicis, Gallicis, Anglicis & Italicis Iulio & Iunio vmbellæ edit, referente Lobelio. Partes radices reflectæ iterumque plantatæ facillè cresunt. Nolunt autem nimis profundè terra obrui, sed ita ut gemmæ turgentes prope superficiem collocentur.

Locus.

Tempus.

Vtilem esse dixit Dioscorides in capitis dolore : si cum modico rosaceo trita imponatur, & frons & tempora ex ea irrigentur. Galeno est tenuium partium, & discutientis facultatis. In calefaciendo verò secundi recessus esse censet, aut certè tertii incipientis. Valere scribit Matthiolus ad capitis dolores à quacunque causa provenientes, si recens contracta, & rosacea aqua perfusa, ubi calidus est affectus, aut aqua Amari ci, si frigidus sit morbus, fronti temporibus illinatur : Adhæc cerebrum roborare odoris iucunditate, viresque quæ temperatis sit qualitatibus prædita. Dodonæo tamen refrigerans, & Rosæ odore & temperatura asinis videtur, & aduersus capitis ex solùm calida causa dolores efficax esse posse. Galenus, inquit Cordus, tantum digerendo capitis dolores pellere credidit, cum tamen id partim propter aliquam partium tenuitatem faciat. Constat enim ex contrariis qualitatibus, humida & calida, terrea & frigida, quemadmodum ipsæ etiam Rosæ. Nos iudicamus non procul abesse à Rosæ aut Crassulæ temperamento, quamvis Galeus, cumque secuti, secundi caloris gradum eam donarint.

Vires.

COTYLEDON VERA, RADICE

tuberosa, CAP. VI.

Radice tuberosa exiguis fibris donata pediculi exeunt palmares in medium peltati circina

rique, folii crassi succulenti, glauci, in umboné inferti, saporis viscidii & aquei: indidémque a-



Synon.

ta *Cotyledon* [κοτυλιδων] dicitur, ab aliquib. *Scytalium* (σκυταλιον:) ab aliis *Cymbalium* (κυμβαλιον:) Latinis, ut Matthiol. (cui & *Acetabulum*) Lac. Torn. Cxf. Cast. H. Lugd. Tabern. & Gerardo, *Vmbilicus veneris*: *Vmbilicus veneris* maior Camer. in epit. Math. *Vmbilici veneris* species 1. Anguill. *Cotyledon* Lobel. in Adu. & Obs. pag. 209. *Cotyledon verus* Cordo in Obs. silua. *Cotyledon vera* Dod. gall. *Cotyledon* 1. Dod. lat. *Cotyledon* 1. siue maior C. Bauhin. apud Matth. in phyt. & pin. *Cotyledon*, *Vmbilicus veneris*, Clus. hisp. & hist. *Cotyledon*, *Acetabulum*, *Vmbilicus veneris*, & *Cymbalion* mains, Lonic. *Cotyledon minus* montanum Sedi folio, Lobel. in Ic. Plant. p. 386. quo ad figuram: titulus alterius est plantæ, quam primo loco posuit sub *Vmbilici veneris* titulo. *Herba coxendicum*, Plinio: *Scatum cæli*, *Scatellum*, & *Scatuncellus*, Manlio in Luminari maiori, referente Dodonæo, qui & hæc nomina inter non has appellationes extare refert, αἰπὸς ἀφροδισίου, i. e. Hortus veneris: γῆ, ὀμφαλός, Terræ *umbilicus*, εἰς γῆ, εἰς ὀμφαλόν.

Nomina
linguar.

Germ. *Nabelkraut*, *Gross Nabelkraut*: Belgic. *Nauelecrut*: Gallis. Latinos sequentibus, *Nombril de Venus*: item *Escudes* & *Escuelles*: Ital. *Vmbilico di venere* & *Copertoiole*: nunc etiam *Oiban* in Apulia Coni à *Cotyledone* voce corrupta: in Abruzzo & Tuscana, *Cimbalaria*: in Græcia *Carichachi*, Anguill. Hisp. *Capadella*, *Scudeies* & *Oreias de monie*: Salmaricentium vulgò *Vasilas*, i. e. acetabula aut vascula, à caua folii capacitate acetabulum referente: Lusit. *Cochelos*:

Locus &
Tempus

Nascitur frequens in saxis & vetustis ædificiorum parietibus, & in oppidorum mœniis: in locis calidis in fine Autumni oriri incipit, foliaque per Hiemem seruat: Aprili & Maio florere, & tunc folia marcescunt.

Vires &
usus.

De *Cotyledonis* viribus hæc scribit Dioscorides: Succus eius cum vino circumlitus, instillatusque, contexta genitalia nudat, inflammationibus sacris ignibus, istrumis, pernionibus illitu auxiliatur: stomachi ardorem refrigerat: folia cum radice comesta calculos frangunt, urinam cient, hydropicisque ex melle dantur: herba vtuntur ad amatoria. Mistæ est Galeno 7. simpl. facultatis, nempe humidæ subfrigidæ, & cuiusdā ob-

scure adstringentis, & cum ea leuiter amara: unde refrigerat, repercutit, abstergit, & discutit: itaque phlegmonas erysipelatodeis, & erysipelata phlegmonode curat: & maximè stomachi ardore æstuantis admodum utilis epiplasma: putantur folia cum radice manducata calculos costringere, & urinam mouere.

COTYLEDON ALTERA OLIM

Matthiolo.



Cotyledō Altera Descriptio

quicquid habet foliorum, id omne per terram spargit: sunt ea verò numerosa, pedunculis vncialibus, latiusculis, unde veluti ex cernice incipiunt dilatari, ut tadem circumscriptione sit rotunda, pulchrè crenata, semuncialis magnitudinis, crassiuscula, & ne vel siccata

quidem corrugari solita: *radix* vnicus tenuis, septem vel octo digitorum altitudine, nudus plurimum, rarius vna supra radicem vnciâ foliis donatus, superius in aliquot tenues ramusculos diuisus, quorum extremis hærent *stipula* parui.

Vmbilicus Veneris alterum, *Cymbalion* quibusdam vocatum, se vidisse ait Matthiolus in Foro-lulienium ciuitate Austriae, in hortulo quodam Medici Iuliani à Marostica: porro in pluribus montibus saxi inhaerentium. Indicat omnes prorsus huic conuenire notas, quæ alteri *Vmbilico* à Dioscoride tribuuntur. Proponit autem in comm. Ital. anno 1554. & 1559. excusis, & in Epit. iconem plantæ cuius nullam dat descriptionem, & quam in post. comm. mutat: nec tamen causam mutationis indicat.

Dod. gall. titulo *Cotyledonis* alterius figuram habet Matthiolinam: ipsam autem plantam ab eo non visam existimo: nec etiam eius descriptio alicuius momenti est. Eadem tradit lat. in fol.

Quin & Lonic. pro *Vmbilico veneris* minore figuram ex Matthiolo proponit: an autem descriptio bene conueniat, alii iudicent: mihi non placet.

C. Bauh. apud Matthiol. *Cotyledon media* foliis subrotundis: *Vmbilicus veneris* alter Matthioli in 1. edit. & iis quæ minores figuras habet, Ejd. phyt. *Cotyledon* 3. siue media foliis subrotundis: *Cotyledon altera* Matthioli, Clusii. Si quis conferat iconem in Matthiolo per fratrem exhibitam cum ea quam Clusius proponit pro Matthioli *Cotyledone*, magnum comperiet discrimen.

Eiusdem adhuc opinionis est in pin. ubi inquit: *Cotyledon* alter Matthioli & Lac. *Cotyledon altera* Dod. Clus. pan. & H. Lugd. pag. 1312. *Coty*

Synon.

C. 3. nov.

Cotyledon altera quarta, Clus. hist. Phyllum thelygonum Dalechampii, Hist. Lugd. siue Lichen C.B. nr. 1. Plinii, & Semperuium montanum. Nos Clus. Cotyledonem alteram quartam, siue Matth. itemque Phyllum thelygonum Dalechampii, H. Lugd. p. 1195. referendum ducimus ad Sedum serratum, de quo infra. Gesnero de Lunaris cognominatur Crassula.

Locus Reperitur in montibus circa Comum & Gothardum; itemque in Styriae alpidibus.

CYMBALARIA FLOSCVLIS purpurascens.

CAP. VII.

Descrip.



EX parietum rimis aut apud nos vasculis figlinis, pendulas fibras, euibrat, tenues, purpurascens, teretes, laeues, longas, neruo, quem facile stringendo linquit cortex farctas, in varias variè fibrillas facientes, per quas folia est cernere longis appensa pediculis, hederacea, angulosa, supernè attrouirentia, inferiùs Cyclamini modo purpurascens, tenera, succulenta, obscuro quodam amarore prædita: ad exortum porro pediculorum quibus hærent folia, tortiles surgunt alii pediculi, quibus flores singuli insident, Elatines aut Anthirini minoris, purpurascens, calcari breui, ristu pallido; succedit capitulum globosum, semina claudens parua, crispa.

Hæc quæ vulgò Cymbalaris appellatur, non est Cotyledon, etiamsi hoc etiam Cimbaliion à Dioscoride vocetur, inquit Hermolaus in Dioscor. Est autem Cymbalaris herba folio anguloso, hederaceo, flore paruo, purpureo, in muris terræ nascens, quam nonnulli, genus alterum Capni dictæ faciunt. Est namque Capnos, siue Capnion, h.e. Fumus; duplex, &c. Plinio Pes Gallinaceus: Acrio verò Chelidonia phragmitis nuncupatur.

Apud Insulæ officinas legitimæ Cotyledonis loco Cymbalaria hanc vulgò vocatam vsurpare, euidenti quidem errore, notat Matthiolus. Is in post. comm. Ital. pulchrè depingit & describit, flores tamen luteos ei tribuit [vt & in Epit. Camer.] quales obseruare non memini: ibi inuersam oportebat esse figuram.

Cymbalaria Italica folio hederaceo (vt vocat etiam in Obs. p. 337. & Icon. p. 615.) quam Venetiis & Patavi pharmacopœi penuriâ & ignoratione Cotyledonis veri Populeo vnguento miscere testatur, flores ex luteo virentes, adscribit Lob. in Adu.

Quantum iudicio Lonicerus per Umbilicum Tom. III.

veneris officinarum intelligit Cymbalaria: an autem bene appingat adscribatque radices Olij. uarum, iudicare poterunt, qui plantam cum radice eruerunt.

Cymbalaria autem à cymbalo nomen duxisse testatur C. Bauhinus, qui Hermolaum Capnon primam Plinii fecisse credidit.

Dicitur verò Cymbalaria Matthiol. Histor. Synon. Lugd. Cæs. Cast. & C. Bauh. Cymbalaria vulgaris, Lacunæ: Cymbalaria foliis hederaceis flore cæruleo, Eyst. Linariae Hederæ folio, Column.

Nascitur, ut dictum, in antiquis viginosisque locis, edificiorum parietibus, maceris, & saxis.

Facultatis est humidæ frigidaque cum adstringente quadam. In profecto hanc plantam polere facultatibus, facto periculo constat, quibus primi generis Cotyledonem. Sunt qui eam vtantur ad alba vteri profluvia, eandem recentem in acetariis propinantes, teste Matthiolo.

SEDVM VETERIBVS ET neotericis in genere.

CAP. VIII.

Genera Sedi (ἀνζών) Dioscorides tria fecit: *Genera* *maius*, minus, & tertium, quod aliqui Andrachnem siluestrem (ἀνδράχνη δάσους) aliqui Telephium (τὸ τῆλεφίον) Romani Illecebram vocant, cuius facultates à prioribus duobus diuersæ traduntur. Huic enim vis excalectorum adscribitur: illa duo refrigerare dicuntur, ut suo quolibet loco demonstrabitur.

Plinio lib. 25. cap. 13. Aizoi duo genera sunt: *Genera* *maius*, quod aliqui Bupthalthmon vocant, alii Zoophthalmion, alii Stergethron, quod amatoris conueniat: alii Hypogeson, quoniam in subgrundiis ferè nascitur. Sunt qui Ambrosiam, à sempiterno eius virore: potius vocant, & qui Amerimnon. Itali, Sedum magnum, aut Oculum, aut Digitellum. Alterum minusculum, quod Erithales vocant, alii Trithales, quia ter floreat, alii Chrysothales, alii Isoerhes: Sed alii Itali Sedum, alii Aizoum utrumque, quoniam semper vireat: alii Semperuium. Huic similis quam Græci Andrachnen agriam vocant: Itali Illecebram: hætenus Plinius secutus Dioscoridem, à quo in eo rursum recedit, quod omnium harum vim eandem, perfrigerare & adstringere scribit.

Galenus quoque duo duntaxat Aizoi genera esse dixit. Ac sanè Dioscorides & eum secutus Oribasius, Illecebram non esse, sed videri tantum Aizoi speciem esse scripserunt, ut eam Aizois similitudinis & affinitatis gratia duntaxat subdisse videantur.

Αἰζών μᾶλλον inquit Dalech. apud Hist. Lugd. Apuleius εἰς ἀνζών & εἰς ἀνζών vocant, Galli grande loubarbe: It. semperuium maggiore: Germ. große hauszvrurtz: intelligit autem Sedum vulgare maius quod potius minori Sedo Plinii responderet. Αἰζών μικρόν (pergit Dalech.) Apuleio Erithales dicitur, Plinio vero Erithales: Gallis Triquemadame, & Petite loubarbe: German. klein hauszvrurtz, klein donderbart: Itali Semperuium minore, & Pignola, à folio tereti pineo. Αἰζών τριών, quidam ἀνδράχνη δάσους, i.e. Portulacum siluestrem, & Thelephium nominauerunt, Romani Illecebram, Arabes Andrachabara, Aljebram, & Tulafon.

Kkkk

Herbarii plura assignarunt genera, & aliter distinxerunt. Fuchsius tria descripsit & depinxit: Primum maius Aizoon, deinde minus, quod duplex facit: alterum marem, quod floribus luteis spectatur: alterum foeminam, quod floribus candidis seu pallidis conspicitur, postremo Aizoon minimum, quod tertium Dioscoridis esse putat.

Quatuor Dodonæus quatuor genera constituit, maius, minus, & Crassulam minorem siue vermicularem officinarum, quarum tertium genus statuit: his quartum addens minimum, quod Portulaca agrestis, & Romanis Illecebra dicitur.

Sedi Matthiolus ex Sedi generibus, à Dioscoride descriptis duo nota esse ait, nimirum maius & minus: minoris duo esse genera: Vnum, de quo Dioscorides tractat, quod foeminam recentiores appellant: alterum marem: tertium diu incognitum tandem Ghini opera & industria veluti in lucem prodixisse. Quibus addit Aizoon arborescens, idque varium.

Horum omnium, ac etiam aliorum, uti & nostra de Aizoi generibus sententia, ex descriptionibus dilucidior reddetur.

Nomina Cæterum, Ἀἰζὼν Græci, δὲ τὸ ἀειθαλὲς ἢ **linguar.** *qimur*, quodd perpetuò folia vireant, tam Aestate sc. quàm Hyeme nec ullis frigidibus, aut cœli iniuria, quantumvis frigida aut sicca nimis, emoriatur: quare Ἀἰζὼν nomen apud Theophrastum 1. hist. 16. Semperuium Gaza vertit, ut cui à natura datum sit, humidum, viridèque semper durare eodem autore 7. hist. 14. Semperuium & Sedum Latini vocant, Apuleius vitalem, Macer Acidulam, vulgus Iouis barbam. *Sedum*, inquit Festus, alii *Sedum* appellant, herbam quam Opilius Aurelius Sefuium vocari ait, eamque in tegulis feri: fortè, quodd nonnullis locis plebis animos inuasit opinio, non feriri fulmine domum, in cuius tegulis Sedum vireat. Hæc etiam superstitione induciti Germani *Donnerbart* & *Donderblat* appellat, magis tamen propriè *hauszervurtz*, h.e. si interpretaris, Domesticam radicem, quod sc. in culminibus domorum feratur. Belg. *Donderbaert*: Galli *Ioubarbe*: It. *Semperuuo*. Hisp. *Semperuua*: Angl. *houfelike*. Boh. *Netresk*.

SEDVM MAIVS ARBORESCENS.

Descrip. Rutex est potius quàm herba, duorum cubitorum nonnunquam altitudine, brachiali verò crassitudine, multos ferens ramos pollicaris crassitudinis aut maiores, qui in multas alas diuiduntur digitalis crassitudinis, summo fastigio velut in orbem desinentes, multis foliis confertim & imbricatim sibi mutuò incumbentibus constantem, perinde ac in Sedo maiore vulgari, siue Coryledone altera Dioscoridis. Carnosa sunt autem ea folia succi plena, & linguæ instar efformata, h.e. ab infimâ sede paulatim in latum sese dilatantia, in ambitu, crebris & minutis veluti denticulis aded leuiter serrata ut vix appareant, gustu paululum adstringente: cortice denso, carnoso, succulento totus frutex cinctus est, cuius membrana exterior subfusca, maculisque, seu potius sedis foliorum vestigiis resperfa, ut in Tithymalo characia. Interdum summis maioribus ramis emergit crassus, & veluti foliosus quidam pediculus, tanquam thyrsus gerens multarum gemmarum, quæ succellu temporis in flores sese explant ex flauo pallescentes, stellarum instar in aliquot folia diuisus, cum suis staminulis. Iam maturefcere incipientibus floribus, & ad seminis



efformationem properantibus, gracilescit hic pediculus: semina exilia est & nigrum.

Legitimum autem hoc esse Sedum aut Semperuium maius, Dioscoridi dictum, Plinio Aizoon maius, nemo est, qui inficias ire possit, si modò in stirpium cognitione mediocriter versatus sit.

Sed hæc assertio vtrorundam

que descriptionibus confirmatur. *Aizoon* ἰσχυρὸν, inquit Diosc. caules edit cubitales, aut etiam altitudinem eam excedentes, crassitudine pollicari, pingues, egregiè virentes, Characia Tithymali modo incitatis distinctos: folia pingua, pollicari magnitudine, & extremo cacumine linguæ similia, & infima quidem in terram conuexa: quæ verò sunt in capite, ita conferta adductaq; inuicem, ut orbiculato ambitu effigiem imitentur oculi.

Aizoon maius Plinio cubiti altitudinem excedit, crassitudine plusquam pollicari. Folia cacumine linguæ similia carnosæ, pingua, largo succo, latitudine pollicari, alia in terram conuexa, alia stantia, ita ut in ambitu effigiem imitentur oculi.

Sic haud dubiè Dioscor. est Ἀἰζὼν ἰσχυρὸν, quod Apuleius Vitalem ac Semperuium appellat. Quidam ab immortalitate, *Ambrosiam*: alii ab oculorum animalium similitudine, *Zophthalmen*: nonnulli ab amore, quem conciliare fertur, *Stergethon*. Anguillara annotat Semperuium maius in Chio *Amarendos*, & in Corfu *Anastasia* dici, ac vtramque vocem Immortalem significare.

Matthiol. in post. comm. Semperuium arbo-reum, Constantinopoli delatum: Item, Semperuium alterum à Cortuso ex Corfu missum. Eidem Hist. germ. *Gebaumre hauszervurtz*, Semperuium arborescens: & postea, Semperuium maximum, ex Corcyra insula Ionici maris.

H. Lugd. p. 1131. Aizoon Arborescens Matthioli: Item pag. 1132. Semperuium arborescens alterum Matthioli.

C. Bauhin. phyt. Sedum 23. siue arborescens Synonymi flosculi candidis: Item Sedum 24. siue arbore-scens alterum. *Eid. pm.* Sedum 1. siue maius arborescens flosculis candidis: Aizoon magnum Dioscoridis, si caulis altitudo, & foliorum longitudo spectetur. Semperuium arborescens Matthiol. & Cast. Sedum maius verum, Gesn. hort. Semperuium maius, Anguill. Semperuium siue Sedum arborescens maius, Dod. Sedum arborescens Græcum, Illyricum, & Anglicum siue maritimum, Lobel. in Adu. Sedum arbore-scens maius flosculis candidis, *eid. in Obs. p. 206.* Sedum arborescens maius Græcum, in *Icon. Pl. pag. 379.* & Eyst. Semperuii maioris alterum genus arboreæ specie, Cæsalp. Sedum maius, Clus. hisp. legitimum, *Eid. hist.* Aizoon arbore-scens, Camer. hort. *Eid. apud March.* Semperuium

peruium arborefcens primum & Maius. Item Sedum 2. siue Semperuium arborefcens alterū Matchiol. an diuerfum à priore? *Mirram* Lobel. not. belium dicentem floribus effe albis, quod Clusius, cuius iconem assumpfit, flores tradat effe luteos. Cur non annotat ubi candidis flouculis obleruauit, aut faltem utroque reperit colore.

Locus & Tempus

Dioscorides in locis montosis & argilosis nasci scribit, effe que (hæc tamen in quibuldam codicibus desiderantur) qui & ipsum supra domicilia ferant, in ficilibus uasis adit Plinius Planis parietinis nascitur, inquit Theophrastus, nec non & in regulis, cum terræ confluuium quoddam arenaceum factum est. Vidit Camerarius aliquando in horto regio noui castris Neapolitani in ficilibus florere: In Germania non diu uiuit: cum italicum ærem ferat. Ex Sicilia allatum ait Cæsalpinus: fert ramo, sed impatiens algoris: nani Hieme aspera amittere folia: aliquando perire ex toto. Prouenire refert Auguillara in Græcia, ut in Zante, Cefalonia & Corsu & Ohio etiam supra muros veteres Multas plantas Veronæ Patavii, Venetiis, & in Hertruzæ hortis Lobelius uidit. Vlyssipone obleruauit Clusius frequenissimum in ædium rectis & muris, Hippali uero in ficilibus, floris Decembri & Ianuario. Non vulgari autem cura indiget: Hiemis enim i. iuniam terre nequit in frigidioribus regionibus, nec cellæ cameratæ ærem conclusum patitur: quapropter in vaporario conseruari cupit.

Vires & Vius.

Dioscorides vim ei perfrigerantem & adstringentem inesse dixit. Quamobrem folia cum per se, tum etiam cum polenta imposita, valebunt ad erysipelata, herpetas, omas, oculorum inflammationes, ambusta & podagrias. *Succus* autem ad capitis dolores cum polenta & rosaceo instillabitur: morsis à phalangio dabitur, itemque profuuiio alui laborantibus atque dysentericis. Sed & teretes lumbi, itos peller ex vino potus, & fluore muliebrem sistit in vellere subditus: denique oculorum lippitudinibus, à sanguine obortis vtiliter inungitur. Adon Plinius folia imposita, vel succu inductu, vlcera oculorum purgare, exple requæ, & ad cicatricem perducere, palpebrasque deglutinare: aduersari Aconito precipue à scorpionibus quoque habentem id terri negari. Lusitanicæ mulieres ad detergendos capillos, & repurgandos dentes hoc Sedum vsurpant, referente Clusio. Leuiter quidem desiccatur (inquit 6.

Synonyma


simpl. Galenus) quandoquidè & mediocriter adstringit, omnis alterius vehemens qualitatis expers; quare in eo plus cæteris abundat essentia aquæ: ceterum non mediocriter refrigerat: est enim ex tertio ordine, & recessu refrigerantium. His Macri poësin subnectemus:

*Dicimus Acidulam, quam Græci dicunt Aizoon
Sic dici credunt sapor illi quod sit aceti.
Crescit arenosis in pratis, & secus amnes:
Hanc auidè quida comedunt in tempore veris,
Expertique ferunt sibi, quod fastidia tollat.
Virtus est illi sicca & frigida valde,
Tertius à Medicis datus est gradus huic in vitro.
que. &c.*

SEDUM MAIUS VVLGARE.

Descriptio

In orbem spargit terræ appressa folia, alia aliis incumbentia, crassa, succo lento, frigido præ-
Tom. III.



gnantia, æterni vitoris, scutim in acumen delincentia, ex fibrosa radice orta, quæ subinde se propagans numerosam similitum orbiculorum lobulem parit: caulis totus similibus sed acutioribus foliis veluti squamis obiectus, crassiusculus, pedali altitudine, superius in ramos diductus, flores scissiles

serie quadam succedentes gerit parulos, purpureoscentes.

Nostra sententia à verò longè recedunt, qui sibi temere contra doctorum librorum decretum persuadent hanc esse *alchem* magnum Dioscoridis & Plinii in hoc siquidem notè quedam desiderantur, quæ in Sedo maiore arborefcente comperiuntur. In hoc errore versantur inter alios, Cronenburgus, Trag. Fuchf. Dod. gall. Turn. Hist. Lugd. & C. Bauh. in phyt. & apud Matth. Item Amat. Tabern. & Matth. atque Lonicerus.

var. lapp.

Melius fortè cum Clusio sentiunt, qui Cotyledonem alteram esse statuunt. Nos malimus inter Semperuiua retinere, cum perpetuè viueat.

Sedum, Trago: Vulgare Eyst. Sedum maius, Fuchf. hist. & icon. Matth. Cordo in Dioscorid. Tabernam. Gesn. cat. & Fab. Columnæ Sedum maius vulgare Nomencl. panin. Sedum 1. siue magnum, Turn. Sedum 2. (3. pin.) siue maius vulgare, C. Bauh. phyt. Sedum seu Semperuium vulgare maius, Gesn. hort. Aizoon magnum Dioscor. quoad postrema Dioscoridis verba, C. Bauh. pin. Aizoon siue Semperuium maius, Camer. hort. Lobel. Obseru. pag. 101. Thal. Hist. Lugd. pag. 119. Aizoon & Sedum maius, Amato. Semperuium 1. Lon. Semperuium maius Brunfels. Camer. epit. & Dodon. gall. Semperuium maius 1. Cæsalp. Semperuium maius alterum siue Iouis barba Dodon. lat. Barba Iouis, & Sedum maius, Euch. Roess. & Theod. Dorst. Semperuium siue maius crenatum myrsifolium, Lobel. in Adu. & Icon. pag. 373. Onobletum (hoc ad aliam plantam refert C. Bauh.) Hippocratis m. m. & Cotyledon 2. Dioscoridis, Anguill. Umbilicus veneris 2. siue Cotyledon 2. & Semperuium italicum, Eid.

Huic plantæ & illæ appellationes adscribuntur, quæ capite de Sedo in genere & sequenti de Sedo maiore arborefcente, leguntur. Vocatur etiam Aithales. hæc semperuirens, & Chrysospermum ab aureo seminum colore. Aconion denique Aichryson, Holochryson, Chrysanthemon, Protonon, Boron, Norion, Paronychiam, Chrysin, Ceriam, Cuspium, Iouis caulem, Leaperem, & Pamphanen nuncupari aiunt. Ocho Brunfelsius Trithales, quod ter in anno floreat, nominat.

Kkkk 2

Sed hoc nomen ad minus Sedum pertinere testatur Plinius.

Nom. ling. Αἰζωνία, Germanis *Groß hanfz wirtz*, *groß Sonderbart*, *groß Sonderblat*, & *hanfzlauch*, hoc est Don us Porrum: Belg. *Sonderbaert* & *Tabern. Bladerloesen*: Gallis, *grande Ionbarbe* Ital. *Semperuuo maggiore*: Hispan. *Semperuua*, seu *Vernapintera*: Angli *houfelike* & *Sengrene*, rectius *houfledike*: Boh. *incny muzk*: Hung. *silbe crezo fin*.

Locus.

Nihil vspiam gentium vltatius, vulgatiúsue Semperuuo hoc, quod perenni vegetoque foliorum virore viger, eúmque Hieme & Aestate in parietibus, vel imbricamentis, etiam nullis vti videtur, radicibus nixum, aduersus quaslibet cœli impressiones tuetur. Caulis floriferus est post Solstitium æstiuum, subinde circa Augustum mensem demum assurgit, sed April, post verum videlicet æquinoctium, inter folia tenues hinc inde exeunt fibræ orbiculorum rudimenta proferentes, quibus tandem adauctis seipsam in complures orbiculos multiplicat. Caulis cum appetente Autumno desornit, protinus atrescit. Seritur in regionibus nostris in tectis & muris, quibus locis felicissimè provenit. Nam radices eius exiguae, capillaresque cum sint, facillè humi hærent, nutriunturque. Quin & inter petras, & ad macerias, & muros, ubi terra planè destituta est, virentior quandoque conspicitur.

Vires & v. sus.

Qui legitimum Aizoon maius esse contendunt, ei vires & vsus Aizoi Veterum huic attribuerent solent. Tragus planè humidæ & frigidæ esse qualitatis statuit, indeque calidis morbis, & inflammationibus adhibendum consulit, idque in externis frequentius, quàm internis corporis partibus. Et quidem in intensissimis acutarum febrium caloribus, nec non & dysenteriis, aliisque profluviis [& præterea in nonnullis aliis morbis] aqua distillata exhiberi potest, mensurâ triū aut quatuor cochlearium. Succus & aqua distillata, linteolis in eo madefactis, ac impositis, inflammationibus quibuscumque corporis, imprimis verò phrenetico morbo apprimè cōducūt. Quibus oculi, propter abscessum aliquem aut inflammationem, noctu præcluduntur, si aquam distillatam infundat, quo facto non solum inflammatio ipsa, sed & dolor tolletur, nec non fluxus oculorum calidus: idem auribus instillatus efficit. Rursus ille ipse succus & aqua distillata doloribus & inflammationibus iecoris & renum succurrunt, & articulorum morbo & podagræ medentur. Auxiliantur etiam ambustis igni, illita, & linteolis imposita. Succus Solatri succo admixtus, & cum oculis populeis decoctus in axungia suilla, ac percolatus, ut fiat vnguentum, mirè efficax est, omnibusque populeis vnguentis, Tragi iudicio præferendus, & longè gravior.

Sedum vulgari magno simile.

Visserat author noster descriptionem & figuram ex virente planta, ex horto Ill. C. Wirt. esse paradam. Verum cum inibi perierit, nec aliunde haberi queat, Lobelii effigiem assumpsimus ex Ic. Plant. p. 373. sub inscriptione Semperuiui maioris crenati myrtifolii, primo loco exhibitam, quam author Sedo suo optimè respondere dixit. Suspiciatus autem quondam fuit Semperuiuum sequens culturâ in hoc mutari,

quòd fortè veritabile. A Clusio hæc icon malè pro Sedo vulgari maiore pingitur.



SEDVM MONTANVM LATIFOLIUM
flore purpureo.



Describe. **S**edi genus Shabeo, cui radix crassa satis, ocellos circum circa crebros progignit: folia semuncia breviora; acuminata, latiuscula: caulis satis crassus, hirsutus, angustioribus vetustis foliis, mucrone subinde purpurascens, trium vnciarum altitudine, senos, plures paucioresve in cacumine, gestat flores magnos, longis, perangustis, purpurantibus foliis constantes, multis in medio luteis apicibus, folioso circumiecto calyce.

Clusius hanc plantam in pann. pag. 481. vocat Cotyledonem alteram Tauricam: p. 482. Cotyledonem alteram secundam: in hist. Cotyledonem alteram tertiam. Camer. hort. dicitur Aizoon minus odorato & purpureo flore, sermè Asteris Attici. An Lob. Obs. p. 204. Sedum minus facile & foliis maioris? An eid. ic. p. 373. Semperuiuum siue Sedum maius, primo loco pictum? An Aizoon montanum H. Lugd. p. 1131. C. Bauh. pin. Sedum maius montanum foliis non dentatis, florib. rubentibus: Sedum minus flore rubente, Eyst. Item, Sedum alpinum 14. siue rubro magno flore. Aizoon montanum H. Lugd.

In montibus Rhæticis & Tyrolensib. frequens Locus & occurrit. Clusius in Taurinatum Alpium iugis non procul Salzburgo crescere scribit: ac florere Julio, in hortis etiam Maio.

SEDVM

SEDVM QVODDAM MONTANVM
pulchrum.

Aliud quoddam Sedi genus ex Baldo nobis
allatum altitudine vix palmum minorem,

Descriptio



aut ad summum
quatuor uncias
æquat. Radix
longa & plan-
tulæ longitudi-
nem æquans,
simplex, In ca-
pite umbellam
producit dēsam,
foliorum Sedi
ferè maioris,
minutissimorū,
& vix ac ne vix
quidem conspi-
cuis serraturis
donatorū: quē-
dam etiam nul-
lā, quantum ex
sicca dignosce-
re est. Caulicu-
lus teres, sub-
hirsutus, foliis
vestitur aliquot

longiusculis, alterno ex ipsorum foliorum distā-
tia positis. Quem ordinem & flores in limbo ser-
uantes, median ferè cauliculi partem occupant,
sed breui pediculo hærentes, nec vt in plerisque
Sedis, per ramos diuiduntur, nec vt in plerisque
Sedis, per ramos diuiduntur. Flosculus ex sex fo-
liolis, vt in plerisque Sedis constare videtur, cu-
ius colorem in sicca discernere non est. Misit
fratrem in Balbo monte collectum à D. Bechio.

SEDVM LATIFOLIVM FLORIBVS
magnis albicantibus.

Descriptio

Foliorum ocellum Sedi maioris in modum
habet: folia Succulenta & acuminata sunt, a-
spersa & per totas hirtæ: coliculus palmaris, cuius
summitati plures flores insident magni, senis ob-
longis foliis constantes, calyculo in multa quo-
que folia diuiso. In sicca planta flos albicat.

An Cotyledon altera montana: vel Cotyledon
altera secunda, Clusio? An Gesn. hort. Sedum
saxorum montium, folio in margine piloso, non
serrato? An Dod. lat. Semperuiui maioris ge-
nus alterum, foliis secundum margines tenuissi-
mis veluti pilis, inftar mollium spinularum ad-
natis, floribus ex luteo pallescensibus.

Synon.

C. Bauhin. pin. Sedum 4. [2. phyt.] siue ma-
ius montanum dentatis foliis: Aizoon siue Sem-
peruiuum maius Thelio.

Nobis Agenius communicauit sub inscriptio-
ne Cotyledonis pannonicæ Clusii.

SEDI LATIFOLII FLORE ALBICANTE,
minor species, magis dentata.

Locus.

Frequens in omnibus iugis vrbi Viennæ vici-
nis, atque in Austriacis Stiriacisque alpibus,
est & hæc altera species Cotyledonis alterius
secundæ Clusii histor.: cui etiam valdè similis,
per omnia tamen minor, eiusque folia magis
dentata. In pann. pag. 481. vocatur Cotyledonis
alterius montanæ species alia minor.

Synon.


C. Bauhin. pin. Sedum 5. (3. phyt.) siue maius

montanum dentatis foliis alterum. Cotyledon
altera montana minor Clus. pann. Cotyledonis
alterius altera species, Eid. hist.

SEDVM SERRATVM.

Tenuis nigra est radix, subinde productis fi-
bris latius se propagans: folia plurimum per

Descriptio



terram sparsa
raris humo se
tollunt, Sedi,
pinguis, oblon-
ga, extremo ro-
tundo, ac etiam
quædam non-
nihil in acutum
desinentia, un-
ciam vnā, vel
duas longa, co-
lore glauca, ar-
guitissimis in
ambitu denti-
culis rigidulis,
reliquoque folio
candidioribus,
crenata, sapore
stre. uè adstrin-
gente: ex quo-
rum medio sur-
git caulis pal-
mum vnum aut

alterum altus, foliosus, in alas aliquot diuisus
flores albi quinque foliolis constant, umbilico vi-
riat apices croceos habente. Huius aliam spe-
ciem habemus multo maiorem, foliis trium, qua-
tuorue unciam.

An Cotyledon altera Matthioli Clusio?

Gesn. hort. Sedum in saxis montium, male
Phyllum nominatum. Aretio in descr. montis
Stockhornii, Sedum montanum maius folio ser-
rato. Cordo hist. Aizoon serratum: hic addit
Gesnerus ab aliquibus vocari Germ. *Fischzang*,
apponens duas figuras, vnā sub titulo Aizoi ser-
rati, & alterā pro Aizoo serrato altero: cui
autem ratiore flores sunt, eisdem punctis san-
guineis distinctos habet.

Tabern. Icon. & Hist. Palmaria: Item, Umbi-
licus veneris minor, 1. & 2. Non placet separari
Palmariam ab Umbilico veneris: prior enim fi-
gura, sc. Palmaria, est plantæ sine caule: cur au-
tem Umbilicum 1. & 2. tradat, me lateat: figuræ
non differunt.

Thelio, Aizoon serratum Cordi, seu Crassu-
la serrata. Cæs. Phyllon 1. siue foliis pusillis,
fermè oleagineis, candida quadam lineâ, in am-
bitu leuiter denticulatis.

Lob. in Adu. & Obs. p. 210. (vbi & Onobletum
Hippocratis, Anguill.) Cotyledon minor Sedi
folio: Eid. it. p. 386. Cotyledon minor montana
altera, sedifolia, umbellifera, floribus albis, pun-
ctulis rubris aspersis.

Figura Aduersariorum responderet nostro Se-
do: in Iconum libro typographi incuriā ponitur
p. 386. sub titulo Umbilici veneris: in Obs. præter
mentem Anguillare dicitur Onobletum: Figura
tom. 2. ponitur à Clusio pro Cotyledone Mat-
thioli.

An Matthiol. in post. comm. cum mag. fig. Um-
bilicus veneris minor, Cotyledon minor, Aceta-
bulum & Cymbalion minus. Camer. apud Mat-
thiol. germ. & Epit. lat. pingit titulo Umbilici ve-

neris alterius, *Sedum serratum*.

C. Bauhin. apud Matthiol. ponit iconem ex Tab. sub titulo *Coryledonis* medix foliis oblongis serratis. Habet porro C. Bauhin. in phyt. etiam *Coryledonem* sextam, siue minorem: foliis oblongis serratis, semipalmari caule, foliulis albicantibus, longè quam in priori minoribus. Eam verò in pin. silentio præterit, & cætera longè aliter recitat. Vocat autem *Coryledonem* 3, siue mediam foliis oblongis serratis, *Coryledonem* minus Eyft. Umbilicum Veneris minorem. Lonic. & Gerard. Onobletum Hippocratis Anguil.

C.B. not. latæsed præter huius mentem.

Inter Lörnick & Gotardum inuenitur, & Geneux in monte *Salve* copiosè, in saxis & rupibus apricis. In quibusdam alpinis Allobrogum [inquit Lobelius] & Pedemontii, Sabaudaque Ostensi valle vocata, & Minden montibus Auernez & Germaniæ mihi visa. In montis Iuræ rupibus ad verticem dictum *Suchet*, collegit Ioannes Schvab *Sedum serratum* frequenter.

Vires. Adstringit tota herba: folia verò efficacius.

SEDI SPECIES SIVE COTYLEDON altera Etscheriana, lanugine alba, hirsutis foliis.

Descript. Affine *Sedum Coryledoni* alteri Matthioli, sed mollius, angustioribus & longioribus foliis non dentatis, sed alba duntaxat lanugine hirsutis, minus etiam incanis, brevioris, crassioris que pediculis, & multis foliis septo, quæ plerumque tam superne quàm inferne nonnihil hirsuta sunt, paucioribus floribus hinc inde secundum cauem ad singulas alas sparsis.

Synon. Clus. pann. p. 484. *Cotyledon altera Etscheriana*: Eid. hist. *Cotyledon altera quinta*: *Cotyledonis* genus quintum affine *Cotyledoni* alteri Matthioli.

C.B. not. C. Bauhin. phyt. & pin. *Cotyledon* 4. siue medio subhirsuta floribus punctatis: *Sedum* foliis minoribus albicantibus serratis, Gesn. hort. *Cotyledon minus montanum alterum*, Lob. ic. tom. 2. p. 279. *Cotyledon altera* 5. siue Etscheriana Clus. Nihilhorum Clusius: non meminit is florum punctatorum: folia dentata negat, aut serrata, qualia sunt Gesnero, & pingit Lobelius.

Locus & Tempus. Obseruatum hoc genus ab auctore in Etscherianis iugis, mense Iunio suis floribus onustum.

COTYLEDON MINOR FOLIIS subrotundis, serratis, C. Bauhini.

Descript. *Cotyledoni* huic quintæ C. Bauh. in pin. radix subest tenuis fibrosa, fusca, circa quam folia multa, semi vngue minora, non ut in altero oblongis ligulis similia, sed subrotunda, margine crenato, crassiuscula, candicantia & nonnihil adstringentia: è quorum medio caulis semipalmaris, quandoque palmatis, subasper, minimis & paucis, foliis cinctus affurgit: in cuius summo, pedicelli, flores, multò quàm in secunda (Umbilicum veneris alterum Matthioli in prior. comm. fortè intelligit,) ex quinque, quandoque etiam sex foliis & mediis apicibus compositos, sustinentes, qui albi, aliquando rubentibus punctis aspersi: nonnquam extrinsecus lineis ternis, foliola floris percurrentibus, ita ut flores pallidè purpurascens appareant: hos

capitula exigua, nigrum semen continentia, sequuntur.

In Helueticorum alpihus ipsis saxis ac scopulis adhæret: Iunio & Iulio floret: at ea quæ floret est pallidè purpurascens, apud Montpelicienses in horto Dei collecta fuit.

Sedo Serrato humiliori Phyllon alterum, flore singulari purpureo.

Phylli [Sedi serrati] alterum hoc genus humilioris, cauliculus est simplicibus, altitudine quatuor digitorum, aut paulò altioribus, in quibus frequentis foliola specie alterius, longè exiliora: florem autem grandiusculum fert purpureum, singularem in cacumine: fructum oblongum, bifidum in extremo, in cæteris similem priori: nam & huic semina minuta ut Papaveris nigri in duplici cuitate continentur: laporèque constat adstringente: ut author est Cæsalpinus.

SEDVM MINVS, FOLIO LONGIVS- culo, tereti, flore candido.



Vermiculari huic nomen fecerunt folia, quæ pinguibus caesorum purulentium vermibus sunt simillima, alternatim in cauliculis spithameis & dodrantalibus, lignosis, rubentibus, aut viridantibus, disposita, atro-virentia, vel punctis rubris guttata: flores conferti veluti in umbella, stellati, quinque foliis con-

stantes, internæ albis, apicibus multis atropurpureis umbilicum conocidem albidum circumstantibus: radix tenuis, fibrosa. In hoc *Sedo* nullam percipio acrimoniam, quicquid dicat in Aduerlariis Lobelius.

Brunfels. tom. 3. cap. 43. *Semperuium minus* Synon. album: Eid. in 4. pag. 278. *Semperuium* semina Camer. hort. *Aizoon minus*, albo flore, staminibus purpureis: Thal. *Aizoi* minoris species, *humerbeer* vocata. H. Lugd. p. 129. *Aizoon minus* Matthioli, idem cum proximo: Item pag. 130. *Aizoon minus* semina Fuchsi, *Crassula minor* seu *Vermicularis*, & pag. 131. *Vermicularis*, siue *Illecebra maior* Lobeli, siue *Semperuium minus* alterum Dodonæi. *Aizoon minus* Matthioli Histor. Lugdunensis ad aliam plantam referimus.

Matthiol. *Sedum* siue *Semperuium minus*, floribus herbaceis seu subcandidis: *Sedum* semina recentiorum quorundam. Eid. hist. germ. *Klein hantzwurtz*, flore herbaceo, *grasz grun*, aut subcandido, *bleich gelb*: in quibusdam albo, *vveisz*: *Sedum minus*, *Vermicularis*, *Crassula minor*, *Vbinum vidit* *Sedum minus*, quod pingit Matthiolus, flore herbaceo, seu subcandido

didō. At satis in hist. germ. demonstrat sibi non notum fuisse discrimen inter hoc Sedum flore albo, & alterum flore luteo, dum ita indistincte scribit. Tragum si consulisset, non tam grauer impigisset. Duo sunt, inquit, minoris Sedi genera, quæ hoc pacto inter se differunt, vt primum candidos & stellatos flosculos ferat: alterum vero subluteos & pallidos.

Fuchf. hist. & ic. Sedum minus fœmina, *klein hauszvurtz vveible*: Eid. hist. Sedum minus alterum, gall. *loubarbe à petite feuille*.

Amat. nos. Amatus vocat Vermicularem alteram flore albo, nonnullorum fœminam: verum confundit cum Sedo paruo acris. In meo Amato adest figura nomine Semperuiui.

Crassula minor. Dodon. gall. Dodon. nos. Dodon. gall. Sedi 3. species, Crassula minor, & Vermicularis officinarum, Belg. *Bladeloose & Pappeculleken*: Lat. in fol. Semperuium minus alterum floribus albidis: Italorum *pignola*. Cur non dicit flores albos? Cord. in Dioscor. Anton. Musam errare scribit, quod Italorum Pagnolam Aizoon minus esse statuerit.

Gesl. hort. Sedum minus alterum, Crassula minor quorundam: Eid. in cat. pl. Sedum minus, vulgò Vermicularis. & Cauda muris, *anzer mur*, *Klaffenkraut*, *Katzentreibell*: Item de coll. Sedum minus vulgare album.

Anguill. Semperuiua minor dicta Vermicularis.

Sedum minus 1. Clus. Sedum minus, vulgò primum, inquit Clusius, est vulgaris illa in muris editisque aridioribus & sabulosis nascens, vulgò Vermicularis cognominata, à teretibus, breuibusque vermiculorum modo foliis, albo flore.

Lobel. in Icon. pag. 377. inscribit Vermicularem, Crassulam minorem officinarum (hunc titulum in Obs. p. 205. omittit, vocatque anglicè *Mous taile*, alias tamen *vrylde prickmadam*) & Illecebram maiorem, deque ea in Aduers. hæc scribit. Sæpissimè etiam hæc colligentes fallit propter natales eosdem, faciemque aded minoris Sedi similem, vt mirum magis sit prorsum contrariâ pollere, nempe calfaciendi facultate: tamen discernuntur foliolis rotundis, carnosissimis, magis, & supernè retusis: flosculis pallidulis, vel albidis: demumque quia non semper viret, ed ad Illecebram referenda videtur, cuius est facultas e. *Supina* admodum negligentia Commentatoris, qui nobis hanc fortè pro secundo Sedo dedit, nescius vt vulgus ignarum, facultatum, & immemor verborum Dioscoridis, qui sicuti monuimus cap. de Telephio & Portulaca, quia nec semper viret, nec refrigeraret, non asserit hanc genus Semperuiui, sed tantum cognationis & similitudinis causa proximè subdidit, viderique speciem dixit. Et hæc hætenus Lobelius. Nobis autem facile fuit dignoscere Sedum minus flore albo, à luteo, ac etiam vrente luteo. Vermicularem quam vocat Lobelius nunquam obseruari cum flosculis pallidulis vel albidis, sed tantum cum albis.

Lobel. redarg. Cur hanc Tabern. in hist. & icon. vocet *klein rot katzentreubin mit vveissen blumen*, Sedum minus hæmarodes, non video: in descriptione duntaxat florum alborum mentionem facit.

An Fab. Columnæ, Sedum seu Semperuium 2. vermicularis foliis?

C. Bauh. phyt. Sedum 5. Eid. pin. Sedum minus 1. siue teretifolium album: Semperuium minus, Cast. & Cæsalp. Sedum fœmina, Turn. Semperuium 4. Lonic. Tragus herba, Cordi.

Locus & Tempus. Passim in veteribus muris; circa aggeres sepi-menta agrorum, locis apricis exit, Dodonæo:

mensibus æstiuis flores promit.

Solenarder Sedum minus alterum inter ea medicamenta recenset, quibus dolentes cum calore, rubore, ardore, & pruritu, hæmorrhoides haud difficulter curari possunt. Succus, inquit, Vermicularis, linteolis sæpius madefactus, applicatus bene facit. Mitius est, si cum hoc succo vnguentum populeon misceatur, appliceturque, ita dolorem sedat, & pruritum tollit. Apponitur etiam emplastrum ex Vermicularis istius manipulis duobus, Semperuiui maioris, manipulo vno, & butyri insulsi vnciis duabus confectum.

Sedum minus teretifolium alterum.

Hic folia alteri penè similia sunt, sed frequentiora & densius in caule stipata. In muris & maceris etiam nascitur, sed priore minus frequens, humi procumbens, & fibris subinde se firmans.

Est hoc Clusio Sedum minus alterum Sedi minoris genus secundum. Semperuium 3. Lon. Aizoon minus Matthioli, Hist. Lugd. pag. 1139. Semperuium paruum Lob. Obs. p. 205. Sedum medius teretifolium, siue Semperuium minus officinarum, Eid. ic. p. 176. Hoc C. Bauhin. in phyt. ad Sedum teretifolium luteum retulit, non sine errore. Quare rectius in pin. vocat Sedum minus 2. siue teretifolium alterum.

Sedi minoris albi, Monspessulana species maior folio aiuto.

Parietinis hæret passim Monspeliensibus & Nemausensibus Sedum quoddam satis magnum caulibus crassiusculis, frequentibus, ex vna radice subulescentibus, quos folia vestiunt, Sedi minoris maris Fuchsi flore luteo, foliis similia, sed maiora, crassiora, longioraque, in acumen desinentia: floribus comatur albis. Floret loco natali mense Iulio.

SEDUM PARVUM FOLIO circinato, flore albo



Parvum Sedum genus cuius per ramos folia parua non maiora quam Sedi acris, sed densiora, non longa sed orbiculata, non tam hilaris viore perfusa, sed ferè glauca. Iconem ex ipsa planta dare non possumus; quapropter à Dalechampio traditam assuephimus, cui Aizoon dasphyllum, id est densifolium inscribitur.

Aizoon dasphyllum, i. e. densifolium, Dalech. in parietibus & muris Viennæ Allobrogum nasci obseruauit, radice breui, capillata, & pallida;

gracili, in exigua terra & parietum cæmento hærescente: *ramulus* plurimis, quatuor digitos altis, perquam spissè congestis, *foliis* numerosissimis, crassis, teretibus, albicantibus, confertissimè stipatis, gustu fatuis, cum leui quadam adstrictione: *flor* in virgulis tenuibus candido, copioso, Semperviui medio simili. In Gallia nusquam in eo tractu à se visam & repertam meminit.

Clusius non valdè absimile dixit Semperviui tertio Dioscoridis (Sedo minòri caustico,) sed folia paulò crassiora esse, candidiora, teneriora, nec ut illa feruidi gustus, sed viribus secundo respondentia, & frigida: florem item candidum: semen exiguum & subruffum. *Improbatur* autem appellationem Aizoi dasphylli (*aizoon dasphyllon*) ceu omnibus Sedi generibus, quorum folia sunt crassa & densa, communem.

Synon. Cordo in Obs. fil. dicitur Tragus silvestris vulgari minor: Gesn. hort. Sedum minimum: H. Lugd. p. 113. Aizoon dasphyllum Dalechampi. Clus. hisp. Sedum minimum, frigidum: Eid. h. Sedum minus septimum. C. Bauhin. pin. Sedum minus 4. siue folio circinato.

Locus & Tempus. Genevæ & Lugduni in muris viret Februario: floret Maio. In rupibus, veteribusque muris cum in Hispaniâ & Lusitania: tum in Gallia Narbonensi, præsertim Monspelij in muris suburbiorum, ad portas vrbis protensis, observabat Clusius.

Frigidum statuitur & secundo respondens.

SEDUM ALPINUM MINIMUM foliis cinereis, flore candido.

Descrip.



TAm dense foliolis minimis rigidulis cinereis stipati sunt ocelli, ut conferto incubitu *foliorum* exiguum, crassorum alterum alteri veluti locum præripere videatur, nec minus fecundus ocellorum numerus serpit *radicibus* lentis. lignosis, crassiusculis, nigricantibus, propagatorum, & quorum umbilico


coliculus nascitur trium quatuorve unciarum altitudine, fili instar gracilis, hirsutus, raris foliis angustioribus donatus, in fastigij ramulis flores maiusculos gestans, colore albos præditos, quinque foliolis constantes, cum aliquot intus staminibus luteis.

Synon. Gesn. Fr. Sedi aut Phylli genus minimis omnino foliolis, cinereis ferè: Clus. pann. p. 486. & 488. Sedum alpinum 3. siue 1. flore albo: Eid. h. Sedum minus 9. siue alpinum 3. C. Bauh. phyt. Sedum 15. Eid. pin. Sedum alpinum 2. siue album foliolis compactis: Sedi aut Phylli genus flosculis albis, Gesn. Fr.

In Baldo, Braulio, & monte Fracto siue Pilati iuxta Lucernam reperitur. In præruptis Schne-

alben iugi locis, atque inter saxa, quà descensus est ad monasterium Nevvenberg, atque etiã in Sneberg, nascitur, teste Clusio. Iulio & Augusto floret.

SEDUM PURPUREVM PRATENSE.



Folia quæ per caulem sunt, Vermicularis folia referunt, nisi quod planiora existunt: multi-plex verò est summi caulis divisio & ramuli numerosi, quibus singulis *flor* insidet unicus, non admodum magnus, Vermicularis florem æquans, foliis constantis coloris carnei, stivâ per mediû producta, apicibus in medio pallidis.

Trago, Sedi minoris 4. species in humectis, flore purpureo ac roseo: Clus. pann. pag. 486. & 487. Sedum palustre: Eid. hist. Sedum minus tertium, siue palustre: Camer. hort. Aizoon palustre à Clusio depictum: C. Bauh. phyt. Sedum 12. Eid. pin. Sedum palustre subhirsutum purpureum: Sedum palustre flore incarnato, Eyst. Huius speciem assignat alteram maiorem & candidiorem, seu marem & fœminam: flore purpurascens aut carnei coloris.

Nascitur humentibus pratis circa Norimbergam, unde siccam habuimus. Sed & Clusius hoc Sedi genus florens observabat vlginosis locis apud oppidulum Freying, quâ Pragâ iter est Norimbergam, sub finem Iunii.

SEDUM MINUS FLORE LVTEO.



Nigrat huic tenuis *radicula*, fibris aliquot donata: *rami* inde exeunt dodrâcales, qui si natalitiû folium fuerint parietine, penduli mox recollectis viribus rectâ surriguntur, quibus malè firmo nexu apposita folia, crassa, pinguis, acuminata, sursum spectantia, crebra: *flor* stellati, lutei, eiusdemque coloris apices.

An Sem-

An Semperuium paruum Diosc.? An Aizoon minus Plin.? An Sedum alterum Matthiolo?

Amat. not. Amarus Sedi huius meminisse, nomine tertii & Vermicularis flore luteo, masculi nonnullis dicti. Verum, ut monuimus, confundit cum Sedo paruo berl: est figura ipsi nomine Sedi minoris.

Fachf. in hist. & icon. dicitur Sedum minus mas, *klein hauszvumiz manlin*: Eid. hist. Sedum alterum minus, siue Aizoon Dioscoridis minus, Graecis *τρίφυλλον*: vocatum, vulgo. Vermicularis & Crassula minor: Gallis *Trigeminadans*, *Ionbarbe*, & *Rabane*: Germ. *klein donderbars*: Belg. *klein donderbaert*.


Synon. Dodon. Semperuium minus. Sedum minus. Hematodes. Tabern. & Gerardo: Aizoon hematodes, Lob. icon. p. 578. Aizoon minus, siue Semperuium Dodonaei, H. Lugd. p. 129. Sedum 2. Dioscoridis, Gallis *Trigeminadans*, Clusipp. p. 484. Eid. hist. Sedum minus 3. siue Sedum minus Dioscoridis alterum, cuius ramuli summo fastigio non incuruantur. C. Bauh. apud Matth. Sedum 3. minus: Eid. phyt. Sedum 11. Item pin. Sedum minus 5. siue luteum folio acuto.

Locus. Vulgo in hortis altitudo & sponte nascitur in Hispanis montis & maceis, referente Clusio. Montbelg. in horto, licet annua planta non sit, Hiemem pertulit. Florens Octobri obituaui Basileae ad Rheni litus: Genue in monte vicino Saluo Februario: Florens Iunio inter Monspelum & Lugdunum passim in quibusdam siluis.

Vires & Vfus. Inter acetaria multis locis recipitur, in quibus & sapit, & palato gratum: astitanti ventriculo confert, teste Dodonaeo.

SEDVM MINVS AESTIVVM luteum.

Descriptio



Palmaris, fruticosaeque est planta, folio exiguo, Sedi minoris, rotundiore, flore luteo, radice inutili gustanti, Semperuium minus aestivum Lobelii Obs. p. 295. Icon. pag. 379.

C. Bauh. phyt. Sedum 6. siue minus teretifolium album alterum: Semperuium minus aestivum Lobelii: Aizoon dasiphyllum Hist. Lugdun. Variat floris odore albo, & luteo.

C. B. not. Negamus nos Sedum hoc Lobelii reperiri flore albo: Aizoon praeterea dasiphyllum Lugd. diuersa est planta. Nec huc referimus eius Sedum minus teretifolium alterum album. Qua de re monitus in pin. tres distinctas plantas esse concludit. De Sedo minore teretifolio altero diximus alibi. De Aizoo vero da-
Tom. III.

syphylo cap. de Sedo paruo folio circinato, flore albo. Caterum in pin. Semperuium minus aestivum Lobelii H. Lugd. p. 123. sine icone, vocat Sedum minus 3. siue teretifolium luteum: Sedi minoris secundam speciem Tragi: Aizoon medium Thalii.

Belgis hortense est.

Locus.

Sedum minus luteum flore se circumflectente.

Teretibus, crassis, succo plenis, & mucrone praeditis foliis, & flauis floribus est, ut Sedum minus flore luteo, inas quorundam, eius tamen summus caulis in ramulos diuisus sese inflectit instar summitatum Scorpii siue Heliotropii maioris, teste Clusio, cui in hist. dicitur Sedum minus quantum, vel Sedum minus Dioscoridis primum: Camer. hort. Aizoon minus flore luteo inflexo: Lobel. ic. p. 377. Aizoon Scorpioides C. Bauh. pin. Aizoon minus 6. siue luteum ramulis reflexis. Eius in phyt. confusè meminit, sub Sedo 11. siue minore luteo, acuto folio.


Idem cum Sedo luteo minore mare naxali-bus gaudet, eundemque vsum habet.

SEDVM ARVENSE FLORE RVBENTE C. Bauhini.

Radice est lignosa, fibris capillata, cauliculis aliquot palmaribus, rotundis, rugoso, rubescente cortice tectis, qui in ternos, quandoque plures, ramulos (quorum aliqui recurvantur) diuiduntur: hos folia longiuscula, angusta, succulenta, sine ordine ambiunt: ramulis superiorem flores plures, vulgari Sedi floribus similes, sed rubentes insident, semenque vulgari simile succedit.

Sedum hoc minus 7. [ut in pin. vocat] Vel (ut Synon. in prod.) Sedum nonum non longe à Basilea, in agris Huningensibus, Autumno iam exsiccatum reperitur: quod etiam in agris argillosis ad Pyrenaeos, sed minus, reperitur.

Sedum paruum montanum luteum.



Caulis v. pluribus, erigit palmarem, dimidio nonnunquam minorem, foliis crebris vestitum, Sedi minoris maris, siue floribus luteis, minus acutis, planioribusque, qualia etiam per terram sparsa caulis imo adherent: superius diuiditur in ramulos satis frequentes caulis, qui flores gestant pul-

chellos, maiusculos, ex pluribus & foliolis, & apicibus luteis compositos: radice summa ferè tellure vagantur, & subinde nonas plantas pro-

Synon.

ducunt, subinde terram subeuntes.

Clus. pann. p. 484. & 485. Sedum alpinum 1. siue flore pallido, vel ex luteo colore pallescente, quinque foliis constante: Eid. hist. Sedum minus 6. siue alpinum 1.

C. Bauhin. phyt. Sedum 13. siue alpinum pallidum: Eid. pin. Sedum alpinum 5. siue flore pallido: Aretio Stockh. Sedum montanum minimum luteum.

Prouenit in monte Baldo, in monte Pilati, & Gotthardo. In Soeberg, aliisque Stiriacarum alpinum iugis, in Tauro monte, atque Iudenberg crescere scribit Clusius: florere sub finem Iulii Augusto.

SEDVM ALPINVM ERICOIDES CÆRV.
leum, nonnullæque aliæ Sedi species
C. Bauhini.

Descript.



EX prærup-
ris iugis, ac
saxis humidis
propendit, ra-
dicem habens
foliis quàm in
priori breuioribus,
crassis, cinereis, velut
in Sanamunda
2. Clusii, siue
Erica Alexandrina,
compactis, cinctos:
singulis caulicu-
lis vncialibus,
foliaceis, floris
magnus, cæru-
læus, quadrifolius,
aliquot staminibus
breuib. donatus,
insidet.

Synon.

Locus.

Varietas.

Hoc (Sedum 10. in phyt. 4. in prod. Alpinum 17. in pin.) cum anno 1579. Martio mense, per Rhæticiæ alpes iter faceret author, è rupibus, ob aquam defluentem, humidis, instar Cymbalarum dependens, florensque collegit. Idem in Gotthardi summitatibus, & in Valesia, ad thermas Leccenses supra Gemme reperitur, à priori tamen differens potissimum foliorum exilitate, & colore florum: item & colore, & magnitudine.

Tradit & describit idem C. Bauhinus & alia Sedi genera, ab ipso tum in Rhæticiis tum in Valesianis Alpibus obseruata, ut pote Sedum Alpinum Ericoides purpureum. Sedum Alpinum foliis crenatis asperis. Sedum saxatile variegato flore. Sedum saxatile atrovirentibus floribus. Sedum saxatile hirsutum purpureum.

SEDVM PARVVM ACRE, FLORE
luteo, & aliud non acre.

Descript.

Semper-
uium 3.

Diof.

Obuium in muris est, capillaribus radicularibus fibris appensum, unde ramuli plurimi, palmares aut breuiiores, tenues oriuntur, foliis exiguis admodum, densitate cum longitudine ferè pari: flores in extremis ramulis plures, lutei, quinque foliis radiatis constantes, apicibus in medio similiter luteis.

Et hoc est Semperuium illud tertium Dioscoridi creditum, quod aliquos Portulacam a-

grestem (ἀνδράχων ἀγρίαν) aut Telephium (τοῦ ἀγρίου) vocare tradit, Romanos verò Illecebram, pusillis foliis crassiusculis [παχύτιμα. Lac. legit. in vet. cod. πλατύτιμα:] ad Portulacæ similitudinem,

ac densis in petris nascens. Et huius opinionis assecclas habemus inter alios, Cæsalpinum, Matth. Lob. Dod. Gesn. Anguill. Fuchsi-um. Amat. Clus. Histor. Lugd. & Casp. Bauhinum: contra verò perpetuam sententiam Matthioli & Suspi- cantur etiam nonnulli hanc plantam non esse Semperuium tertium



Dioscoridis, quod illi folia desint. Sed Dioscorides hoc non Portulacæ esse folio, sed ad illius crassitiem tantum accedere folia refert.

An Aizoo minori similis, Plin? Malè autem eiusdem Plinii Illecebram Italorum vocat Cæsalpinus.

Tragus Sedum nostrum pingit nomine Vermicularis: non tamen nominibus distinguit ab Aizoo siue Sedo minore floribus albis, nisi colore florum. Differentia tamen non in solo florum colore consistit, sed etiam in foliis, quæ huic multò breuiora sunt, & paulò acutiora, & ab basim nonnihil latiora. Differt præter hæc ab illa sapore feruido, virentique, unde meritiò Maurpfeffer dicitur, h. e. Piper murorum, vel murale, quod sc. in muris proueniat, gustuque acris admodum sit, ut Piper. Dicitur quoque Germ. Blatsofz, quasi foliis destitutum, eò quod pro foliis acinos quosdam habeat. Alii à forma Judænsrubel, & Katzenrenbel, hoc est Vasa Iudaica, vel Felium vasa nuncupant. Belg. dicitur Muerpeper: Augl. Stone crop, & Stone bore. Quidam volunt Katzenrenbel esse Hippuridem non leui errore. In eo etiam hallucinari deprehenditur: quod calidum temperamentum ei inesse negat, quod auulsa ut reliquæ plantæ temperamento calidæ, non arescat. Nec enim omnia calida, euulsa arescunt, ut Aloe. Suo gustui potius fidere oportebat Tragum quàm friuolæ imaginationi.

Apud Apollinatem pingitur quidem Aizoom acre, sed inter vires malè omnia confunduntur, nec fit mentio acrimoniæ, licet ipsam nomen Maurpfeffer apertè denotet.

Brunfels. de Sedo paruo virente confusè egit, quare nomina & vires, quas ei assignat, non adscribo.

Eidem B. Portulaca tertia: Trago, Sedum minus tertium & Vermicularis, cuius nomine Camerarius etiam addit iconem Matthioli, cui ut & Castori Semperuium minimum siue tertium. Anguillare Gramen Plinii, & Semperuium 3. & Vermiculara acuta. Dod. lat. Illecebra siue Semperuium 3. Eid. in h. gall. Sedi 4. species. Sedi 3. genus, Fuchsi. Lac. Turn. & Cro-

& Cronemb. Aizoon minus, malè pro Vermiculari acceptum, Cordo in Diosc. Aizoon acre, Eid. hist. Sedum tertium Dioscor. Gesner. hort. Illecebra, quibuldam recentioribus Soldanella dicta: & tertia species Sedi, Eid. cat. pl. Itin., Sedum 3. Illecebra, & Portulaca siluestris Semperuium 3. quoad descr. at 2. quoad iconem. Lön. Sedum minimum, Lob. ic. p. 379. siue Illecebra, Obl. p. 208 & Sedi tertium genus non semper virens, in Adu. Semperuium tertium minimum, alterum, Czf. Aizoon minimum repens 3. Diosc. H. Lugd. p. 1130. Aizoon minus feruidi gustus, Thal. Sedum minimum, Tab. Vermicularis siue Illecebra, Ger. Sedum minus 8. Causticū Clus. h. Sedum minus seu minimum causticum. Eyst. Aizoi facie planta, quæ Dactylon 2. vel 3. Plinii, Columnæ.

C. Bauh.

apud Matth. Sedum 4 siue minimum acre. Eid. phyt. Sedum 8. seu minimum, duplex, aliud gustatum paulò post fauces exurit, aliud penè insipidum; floribus itein candicantibus aut luteis. In pin. Sedi minori 8 siue vermiculato acris, hanc varietatem à sapore peritam, non amplius adscribit, meliora docens.

Locus & Tempus.

Passim in tectis, muris & petris nascitur etiam in aggetibus, salebrosis & aridis locis, tenui gramine oblitus: adeò autem viua, vt tenuissima ramulorum fragmenta faciliè radices agant, non tamen semper viret, vt voluit Dodonæus. Astitus montibus cum floribus reperitur.

Vires. & Vfus.

Diosc. tertio Semperuii generi, vim adscribit excafactoriam, acrem & exulcerantem, atq; impositum cum axungia strumas discutere. Sed hanc facultatem iuppositiciam esse & Dioscori distextui insertam, non sine iudicio censet Columna. Foris admodum (inquit Dod.) tubificat, velicas excitat, ac tandem exulcerat. Succus eù aceto, vel alio liquore extractus vomitum mouet, & crassos, pituitosos, & biliosos humores educit, & subinde ita quartanis, aut aliis diuturnioribus febribus liberat: aduersus assumpta venena & hoc modo confert.

Sedum minimum luteum non acre.

Descriptio

Colliculis & foliis minori [acris, Gesn.] persimile exitu, multò tamen exilioribus, mino-ribusque his partibus constat: flores habet foliolis quinis stellæ modo radiatis còstantes, quinque exiguè acuminatis in medio apertibus semiserendo natis, in eademque decem staminibus circumuallatis, Aizoo acris floribus, formâ, quantitate, & luteo colore similes, politu tamen differentes, non enim minoris aut acris Aizoi modo umbellam siue capitulum constituunt, sed deinceps ab vncialibus aut longioribus coliculis adnatis vtrinque alterno situ exeunt: ex his qui ab vno latere enascuntur, oppositorum spatiis iunguntur. Radicibus nititur tenuibus & capillatis.

Cauendum monet descriptionis author Cordus, qui Aizoon minimum vocat, ne Acris & luteus similitudine fallamur, illum pro hac accipientes: addit hanc virere temper, & inde nomen inuenisse.

Synon.

C. Bauh. pin. Sedum minus 9. siue vermiculatum insipidum: Semperuium 3. minimum, Czf. Aizoon minus & Vermicularis insipida. Thal. Sedum minus seu Vermicul. insipida, Eyst. A. priore non solum gustu differt, sed etiam foliolis magis teretibus & tenuibus: floribus est vtraque luteis, rariis albis.

Tom. III.

Nascitur iisdem, quibus acre & minus Aizoon natalibus.

Locus.

Adstringunt vehementer coliculi, foliola & flores, quemadmodum minus Aizoon, sed vehementius: siccius enim est.

Vires.

Sedum minimum arborescens, vermiculatum, flore luteo.


Syriz nataliis nature munifico lusu & luxu plantulam hanc pinxit Lobelius in Obs pag. 206. Ic. 480. Sedi minimi arborescentis vermiculati, inscriptione, fruticosam; & dense geniculatam, confertisque foliis & ramulis, floribus luteolis, Vermicularis acris, vti tota facie. Et hanc in Italia quoque oriri opinatur. Hec autem figura Lobelii non demonstrat plantulâ, sed plantam arborescentem.

Descriptio

H. Lugd. p. 1132. Sedum minimum arborescens Lobelii C. Bauh. phyt. Sedum 20. siue minimum fruticosum: Eid. pin. Sedum minus 10 siue fruticosum: An Polygonum masculum fruticosum Thali?

Synon.

SEDVM ALPINVM HISPIDVM FERE, spinosum, flore pallido.



Mltos, doctores tales ferè caules tenues emittit, foliis vestitos alternante situ semuncialibus, perangustis, acuminatis, ex viridi pallentibus, spinulis per margines asperis, qualia prope terram multa, reprimantem inferiorè caulium partem ornant: ramuli in quos caules superius diuiduntur, flores in cacumine gestant singuli; Sedi montani minimi lutei parem, pallescètem, apiculis in medio multis: succedit vnicuique capitulum, Lini simile, minus, turbine bifurco patente, è quo còcussu excidit semen longè copiosissimum, minutissimum, puluiscenti instar, colore nigro.

Descriptio

Ex monte Calcaris, item Gothardo, quem traiecit Iulio ex Italia rediens florentem attulit. I. H. Cherlerus.

Locus.

SEDVM MVSCOSVM.

Cespites totos operit luxurie secunda, Sedo- cetum in morem, radicularum reptatu, folia maiora quàm Sedi alpini cinerei, acutiora, molliora, mulcum terrestrem imitatur: coliculus ex umbilico natus vnciam vnam aut duas altus, foliolis crebrioribus vestitus, vnicum plerumque in fastigio gerit florem magnum.

Descriptio

LIII 2

Locus



Frater, à quo habui, prope riuulos in Alpibus crescere annotauit.

fillum appositum] diducti, quorum vnusquisque florem gestat Spergulæ parem, albidum, striatum, valculo succedente paruo. *femibus* pleno, quod circumdat florum calyx laciniis denticulatus.

Synon.


Clus. p. 491. Sedum Alpinum Aiugæ folio. *Eid. hist.* Sedum minus 13. Casp. Bauhin. phyt. Sedum 19. siue alpinum laciniato folio: *Eid.* Sedum foliis laciniatis i. siue Sedum alpinum trifido folio.

Ex præruptis saxi, hiulcisque saxorum rimis Iunio collegit in monte Calcaris gener L.H. Cherlerus. Nasci in summo Sneberg, iugo inter saxa paullo ante à niuib. libera, florereque Augusto, testatus est Cluius.

Locus

ALOE IN GENERE.

CAP. X



Succulenta, Descriptio magna, dentata, crassa, in terram reclinata aliquantulum, æterni visoris habet folia, ad eam ut per hyernos menses extra terram etiam in hypocaustis suspensa non marcescat, sapore apud nos minimum amaro: *caulis* inter folia surgit.

Ruellius ait *Ruell. bot.* Aloe thyrsos striatos esse, quam verè autem

iudicent qui Aloen viderunt, inuenio quidem Plinium dicentem folia striata, vbi Cornarius metitò legere videtur strata. Hinc etiam lib. 3. cap. 19. in Dioscor. asserit folia utrinque ex obliquo longioribus interuallis striari: Sed hæc autopsiæ committimus.

Matthioli in h. germ. ait florum colorem esse incarnatum instar florum Granatorum: Gesn. autem hort. scribit florem ferre luteum: Tragus tamen album habere testatur, secutus Dioscoridem, dicentem: Albe *folium* habet Scillæ (scilicet) similitudine, crassum, pingue, in rotundo modicè latum, retrosum pandum. Sed utrinque habent folia ex obliquo spinulas raris interuallis prominentes, easque breues, & quasi decurtatas (mutilas, Corn.) *Caulis* verò proferat Antherico non dissimilem, *florem* album & *semen* ceu Hastulæ regię. Est autem tota odore graui & gustu amarissima. Vnicà verò radice ceu palo in terram demisso utitur.

De florib. Dioscoridis.

Aloe [inquit Plinius lib. 27. cap. 4.] Scillæ similitudinem habet, maior, & pinguioribus foliis, ex obliquo striata (strata, ut diximus, Corn. legitur) *Caulis* eius tener est, rubeus medius, non dissimilis Antherico: radice vnà ceu palo in terram demissa graui odore, gustu amara.

Ceterum, dum Dioscorides dicit Aloem folia Scillæ habere: & Plinius Scillæ similitudinem: si longitudinem tantum consideremus, recta quidem est comparatio: si verò alia, non item: ac propterea addit ille, in rotundo modicè lata, crassa, p. m.

SEDUM MINIMUM SYRIACUM,
luteolo flore, Saxifragæ albæ.

Locus.

Descriptio.



Synonyma

Omnium [Sedorū] huic longè minimo, ex Syria asportato, folia quam superioris, & petræi montani Sedi minora: *cauliculi* sesquiuiciam æquant, in quibus luteoli flores maiores pro plantæ exilitate, Saxifragæ albæ, aut Sedi petræi montani: *radix* implicata, fibrata.

Lob. Obs. p. 204. Icon. Pl.

pag. 376. Sedum minimum tertium. A Dodon. lat. huius figura pro Sedo serrato ponitur. Casp. Bauhin. phyt. Sedum 9. siue minimum peregrinum, Saxifragæ albæ flore: *Eid. pin.* Sedum alpinum i. siue Saxifragæ albæ flore, vel grandiflorum: Sedum minimum tertium Lobelii, H. Lugd. p. 1133. An Sedum alp. 4. Col. part. 2.

SEDIS AFFINIS TRISVLCA
alpina, flore albo.

CAP. IX.

Descriptio.

Summò cespite vagatur, magnūque spatiū occupat, terræ appressis *coliculis*, tenuibus, fuscis, à quibus nascuntur folia vncialia, in trifidum tridentem, latiusculum, Chamæpityos minorem desinentia, subhirsuta: alia in oblongum vtriculū glamosum conuoluta, lanugine pinnata, granum Auenæ affabre referunt, trifidus illis foliis subinde obuallata: *caules* surgunt quidam teretes, palmares, superius in pediculos aliquot [quorum foliolū indiuisum pu-

sa, pinguis, retrorsum panda, ut rectiorem comparationem redderet. Et hæc obscurè admodum a Plinio dicuntur.

Monstrosa Herbar. antiq. lo. Cubæ, Aloes monstrosam exhibet imaginem.

Lemniscus Quam benè autem Leu. Lemnius de herb. bibl. Aloen, arborem imitandini coloris factar, ipse viderit. Neque enim arbor est, neque arbutus, id quod Munsterus voluit.

Syon. Cæterum, in omnibus ferè linguis apud omnes ferè authores Christianos vnum & idem nomen hæc planta obtinet, quod est *Aloe*. Sic autè dicta videtur, quia maritimis gaudet. Particulatim tamen Camerar. Aloen communem vocavit: *Aldem* vulgarem, *Schvvenckf.* Forè ad differentiam Aloes Acollæ, quæ est Americana. Dicitur Aloe *Dioscoridis*, *Columæ*: Aloe marinum, to io planiore, Horto Scholzianno: Aloe in Rama Iudææ copiosa, Rauvvoiff. Aloe siue vulgaris, C. Bauhin. pin. Aloe in insula Socotra, part. 2. Ind. Or. cap. 6. Aloe, siue Semperuium, Arabum Sebar, Area, Catecomor, Linc. part. 4. Ind. or. cap. 38. & fig. 19. Azauar, siue Semperuium, quo campi pleni, part. 4. Ind. Or. Aloe & Semperuium marinum, Lobel. Obs. p. 102. Icon. pag. 374. Semperuium marinum, Turn. & Hort. Lusar. Semperuium quidem à recentioribus vocatur à sempiterno vitote, quo è laquearibus conclauium suspensum, quam diutissimè viger: Marinum autem, à naturali loco cognominatur.

Sedum amatum appellat Columella, ab eius succo amaro. Alii, ut inter Dioscoridis reiectanea legimus, à *imphibion* [*αμφιβιον*] quod non modo terræ matri adherens, sed inde etiam exempta, deque trabibus vomptatis gratià suspensa, in ære vitam tueatur diutissimè, nominant: alii Tragoceron (*τραγοκερον*) à cornuum hircinorum similitudine: alii Lyngion, *επ' 33. 100*: alii demum Herminon, *επ' 100*, vel, ut Corn. *επ' 100*.

Nom. ling. Germ. *Aloepatuck* & *Bittervontz*: Belge, Itali, & Angli *Aloe*: pollet tamen adlucci concreti differentiam, qui simpliciter *Aloe* nominatur, herbe *Aloe* nuncupant, Turn. Galli *Aloes* & *Perroquet*, quod foliotum habitu & colore phœtæcum viridem referat, incerto autore. Aloe vulgaris, inquit Holler. int. chir. lib. 2. cap. 5. patrio nomine *Zambana* appellatur: Hisp. *Canilla*, *yerna de acibar*, *yerna babosa*: a phris *Suber*, *Paper*, siue *Subar*. Chaldaïs *Alhannan*. Arab. ut Serapioni *Laber*: Auctihoi *Cauar*.

Quæ Aloe Latinis, & officinis, *αλδ* Græcis, hanc Arabes, Persæ & Turci, ait Garcias, *Cebat* vocant: nam quod *Laber* à Serapione dicatur, interpretis errore, aut librariorum negligentia factum esse existimo. Guzarate verò, quos Gedrosios putant, & Decan incolæ, *Area*: Canarini, *Catecomor*: Hisp. *Acibar*: Lusitani *Azeur* appellant.

Locus. Veterum de loco natali placita, inter vires recensentur. Aloes herba plurima nascitur in Cābaya, Bengala, aliisque multis locis. Cæterum laudatissima est in Socotora, quæ inde ad Arabes, Persas, Turcos, denique per vniuersam Europam deferitur, eoque ob causam Aloen socotrinam appellant. Distat autem hæc insula à fretis [maris Etyhræ] centum viginti octo leucis: qua de re non minus Arabica, quam Aethiopica dici potest quiddam alterâ parte freti Arabia terminetur, alterâ Aethiopia, teste Garcia. In regione quādam circa Caput bonæ spei, in Simu Aguada Sanbras dicto, ingentem copiam, immo

plenos campos Semperuii obseruauit Linschottanus, quod incolis *Acenar* appellatur. Vix altitudinem facillè superat, & è longinquo visas herbas loci incolæ esse existimabat. Ea ipsa est herba ex qua incolæ insule Sacotra Aloen conficiunt, quam Sacotrinam vocant. In quamplurimis Italiæ locis virefcere conspicitur, præsertim Romæ, Neapoli, Venetiis, Ticini, & Genue: Item Patavii, Veronæ, Bononiæ, & Florentiæ, quibus omnibus in locis super ædium fenestris, ac atriiis, fictilibus in vasis, terra plenis alitur, ac fouetur, ad spectaculum potius, quam medicum usum. Autio autem ibi ultra triennium non durare. Genue Allobrogum aiunt Hiemem perferre non posse. A marinis partibus ad nos [Gallos Parisienses, ait Ruell.] deferitur, sed toto cretita nunquam comprehendit, imò breuiter confecta demoritur, licet in tabularis propendens, plectroque biennio vitam protoget. In Germania, quod ad folia attrinet, nullo negotio prouenit, ac in Autumno teratissimam se ostendit. Hiemis tamen frigora in hortis ferre nequit, vnde Hieme aduente euellitur, ac in hypocaustis suspenditur, quæ causa est ut in nostris terris florere non queat. Reposita per tres septimanas quasi peritura colorem suum amittere videtur: sed tamen pauld post non tantum natium suum colorem recuperat, sed & incrementum accipit, ac si è mortuis renouiscat. Exactà Hieme in hortos rursus transferitur, & plantatur, in quibus aliquantulum augetur.

Potè nullam amaritudinem in nostrate Aloë reperire. Sed aliud quibusdam Hispaniæ locis Aloës genus inuenitur, in cuius sanè foliis manifestè amarorem cum acrimonia coniunctum inuenies, teste Clusio. Quædam de Aloes plantæ vires inferius ex Garcia obseruatione.

Præter Aloën vulgarem est & alia Americana muticata a nobis cognominata. Nunc & Aloë monstrosa Autumnum nata, à Clus. & C. Bauh. traditur, quam nondum descriptam inuenimus. Sed & Aloës, palustris tamen appellatione addita, nobis Bononiæ demonstrata planta, à D. Vlyse Aldouando, quam ad Dodonei gall. Scratotem aquaticam, Sedum aquaticum Lobelii referimus, de quo H. n. l. 38. Gentiana tandem, à Dioscor. Apuleio, pluribusque aliis quia amarissima, Aloë gallica nominatur de qua H. n. lib. 31. Est & Aloë lignum, de quo H. n. l. 4.

ALOE SVCCVS.

CAP. XI.

EX Aloës foliis expressus, succus in vesicis aut aluta concretus aduehitur. Eius autem paratio. di rationem talem intelleximus: Rhodiis herbâ ipsam accipi, in frustra dissecari & contundi, deinde in vas oblongum reponi, in eoque viginti quinque dies fini. Interea autem spumam attolli, inutilem & abiiciendam. His peractis, conchâ superiorem succi partem demi, ad quandam usque demendo apparentem eiusdem succi differentiam: hunc in vesicam reponi, adque Solem exsiccare, Aloëmque succotrinam effici. Secundò demi succum in medio consistentem, & in vitres reponi, exsiccatum, ac Aloen hepaticam confici. Postremò sequi Caballinam, cæterorum veluti faciem. Tres itaque eius hodie cognoscuntur differentiz, ex eadem tamen plantâ

expellit. *Optima Succotrina* appellatur, omnium purissima, quæ dum frigida est, malleo percussa, in splendida, nitidâque fragmenta dissilit. Colore fulva, aut rufa & pellucida, inter tractandum mollescens, in Sole diluens, arque foris nitido, fuscoque, aut nigro colore boritate in suam intus latentem, abscondens & dissimulans. Saporē habet insigniter amarum, adstringentem, aromaticum, aliquantulum tenuem, & oris halitum

Hepatica. commendantem. Odorem autem aromaticum, & tamen grauem. Impurior secunda, *Hepatica*, quo l'hepatis colorem exhibeat, dicta, prius dēfior est, aridior, iecinoris modo crenata. Colore in citrino subrufa, & Succotrina minus pellucida, vixque oculorum aciem lumēque admittēs, quanquam interim micæ splendide sint. Odore & sapore Succotrinam æmularur, grauius tamen olet, paulloque amarior existit, magisque adstringit. Et hæc quoque calido ducitur, & frigido coelo friatur. Tertia sordida, inquinamentis multis contaminata, *Caballina* vocatur, veterinariis relinquenda medicaminibus, cui ob id nomen videtur inditum. Hæc omnium ponderosissima, aridissima, dēfissimâque. Colore nigra, & minime translucens, terra arenis que plena, & maius, quam prædictæ virus olens. Gustu amarissima & valde adstringens, non sine horribili qualitate aliqua palatum & stomachum afficiens. Eligito in quouis genere pinguis simam, purissimam, Hieme friabilem, Aestate molliusculam, & in manibus lentelcentem, calculis, arenis ac terra carentem, tam gustu quam olfactu aromaticam, amaritudinem resipientem, somnum odore conciliantem, & dissolutu facillimam.

Caballina
3.
Diosc.
Aloe her-
ba locns.
De Aloes succi generibus, viribus & usu hæc Dioscorides memorie tradidit. Aloe herba plurima in India præpinguisque nascitur, ex qua etiam coactus succus importatur. Nascitur & in Arabia, Asia, ac in locis quibusdam maritimis & insulis velut in Andro, non valde eliciendo succo idonea, sed ad conglutinenda vulnera sanè quàm utilis, si trita illinatur. Duo sunt porò succi genera: alterum arenolum, quod purissimè veluti sæx, & crassamentum esse videtur: alterum, quod ad iecinoris imaginem vergit. Eligito pinguem, quæ nihil doli senserit, calculorū experiri, nitidam, sublauiam, friabilem, iecinoris modo coactam, quæque faciliè humescat, eximæque sit amaritudinis. Nigram contra fræctūque contumacem improbo, Sunt qui eam gummi adulterent: id quod gustu, amaritudine & o foris vehementia deprehenditur, cōque indicio quod attrita digitis, non ad minima usque ramenta resoluatur. Neque defunt qui Acaciam immisceant. Vim habet adstringendi, somnum conciliandi, exsiccandi corpora, corpora dēlandi, aluum soluendi, stomachūque repurgandi, si diuini cochlearium mensura ex aqua frigida, aut lactis instar, tepida seu egelida bibatur. Sanguinis etiamnum excreationes sistit, & morbum regium emendat, ex aqua tribus obolis, aut drachmæ pondere, in potu. Deuorata verò cum resina, aut aqua, vel melle cocto excepta, aluum soluit: ternū autem drachmarum pondere, perfectè purgat. Sed & aliis medicamentis purgantibus admixta, præstat ut minus stomachū infestent. Sicca verò interperia, vulnera glutinat, vicerâque ad cicatricem perducit, cohibetque: eadem peculiariter exulceratis genitalibus medetur, & disrupa puerorum præputia agglutinat. Quin & condylomata, rimâque sedis dulci vino ammixta sanat. Sanguinis ex hæmor-

rhoidibus eruptiones sistit, pterigia ad cicatricē perducit, liuida, & sugillata, hypopia dicta, ex melle tollit. Scabras quoque lippitudines, angulorumque in oculis pruriginēs mitigat. Dolorē capitis sedat, ex aceto & rosaceo fronti & temporibus illita. Sed & cum vino fluentem capillum continet: itidēque tonsillarum, gingivarum, cæterarūque oris partū vitis cum melle ac vino proficit. Cæterū, ad oculorum medicamenta torretur in munda & candente testa, ligulâque subinde versatur, donec æqualiter tostata fuerit. Lauatur & Aloe: atque id quod arenosum subidet, tanquam inutile secernitur: pinguis autem quodque læue est, recipitur. Hæcenus Dioscorides. Qui statim in proœmio Nigrum præter veritatem falsè prodidisse scribit, Aloen fossilem in Iudæa nasci.

Aloe laudatissima [ait Plinius] ex India affertur, sed nascitur & in Asia: non tamen ea vitur, nisi ad vulnera recentibus foliis: mirificè enim conglutinant, vel succo. Ob id in turbini- bus cadorum eam serunt, ut Acizoum maius. Quidam & caulem ante maturitatem seminis incidunt succi gratia, aliqui & folia. Inuenitur & per se lachryma adhærens. Ergo pauimentandum, ubi sata sit, censent, ut lachryma non absorbeat. Fuere (Niger id nugatus erat) qui traderent in Iudæa super Hierosolymam metallicam eius naturam: sed nulla magis improba est, neque alia nigrior est, aut humidior. Erit ergo optima pinguis ac nitida, rufi coloris, friabilis, ac iecinoris modo coacta, faciliè liquecēs.

Improbanda nigra & dura, harenosa quoque, quæ & gustu intelligitur. Gummi adulteratur & Acacia. Natura eius spissare, densare, & leniter calefacere. Vfus in multis, sed principalis aluū soluere, cum penè sola medicamentorum, quæ id præstant, confirmet etiam stomachum, ad id non infestet vlla vi contraria. Bibitur drachma: ad stomachi verò dissolutionem, in duobus cyathis aquæ tepidæ, vel frigidæ, cochlearis [binorum cochlearium, Diosc.] mensura, bis terue in die ex intervalis, ut res exigit. Purgationis etiam causa plurimū tribus drachmis. Efficacior, si pota cāsumatur cibus. Capillum fluentem continet cum vino austero, capite in Sole contra capillum peruncto. Dolorē capitis sedat, temporibus & fronti imposita ex aceto & rosaceo, dilutiorque (liquidior, ex alto instillata, Dal.) insula. Oculorum vitia omnia sanati eā conuenit, priuatim pruriginēs & scabiem genarum: item insignita ac liuida (generum sugillationes, τὰ ὑνέματα, Dal.) illita cum melle, maxime pontico. Tonsillas, gingiuas & omnia oris hūlcera. Sanguinis excreationes, si modicæ sint, drachmæ pondere ex aqua: si minis, ex aceto pota. Vulnerum quoque sanguinem, & vndeunque fluxum sistit per se, vel ex aceto. Aliàs est etiam vulneribus utilisima, ad cicatricem perducens. Eadem inspergitur exulceratis genitalibus virorum, condylomatibus, rimâque sedis, aliàs ex vino, aliàs ex passio, aliàs sicca per se, ut exigit mitiganda curatio aut coercenda. Hæmorrhoidum quoque abundantiam lenitet sistit. Dysenteria infunditur. Et si difficiliter concoquantur cibi, bibitur à cœna modico intervallo. Et in regio morbo tribus obolis ex aqua. Deuorantur & pilulæ cum mellis decocto, aut resina terebinthina, ad purganda interiora. Digitorum pterygia tollit. Oculorum medicamentis lauatur, ut quod sit arenosissimū, sublidat. Ant torretur in testa, penâque subinde versatur

Aloe la-
natur.

Locus.

Lachryma
spissa.

Adulteri-
um.

Non offe-
ndit.

Plin. illa-
stratur.

versatur, ut possit aequaliter torreretur. *Et hac Plin. nat.* Quod autem dixit Aloën inter torrendum pennam versari, instrumentum omnino ineptum indicavit. Contra apertissime Dioscoridis mystu ad hoc usurpanti dicit, & *μυστρωμιτακαλαδα* ait. Est autem *μυστρω* ligula, quam Germani *Einkelle* vocant. Porro quod dicit Plinius, fuisse qui traderent in Iudæa super Hierosolymam, metallicam eius naturam; sed nulla magis, &c. Dioscorides de Aloë non habet, sed Aloën fossilem in Iudæa nasci, Nigro falso dictum esse.

De Aloë si-
li contra-
rium est Gal. De Aloë duos Galei libros legenti, videtur ipse quibusdam in locis sibi maxime contradicere. Quandoquidem 8. de comp. medic. sec. loc. ubi de Hiera agit, quæ ex Aloë paratur, manifestè asserit, Aloën vim habere purgatoriam non a modum valentem, & proinde non nisi ca purgare, quæ circa ventriculum & aluum continentur. Etenim, ut ipse inquit, etiam quandoque ampliori pondere exhibita, usque ad locos circa secur se diffundat: non tamen totius corporis purgatoria Aloë existit. Atqui contratio modo scripsisse videtur. de Ther. ad Pisonem, ubi apertissime scribit, Aloën uniuersum purgare corpus, his verbis: Aloë arque etiam ætis liquamina supercrefcentes in viceribus carnes cohibent, & fluxiones quæ illis adueniunt subinde exsiccant: assumpta verò per os, uniuersum corpus purgant. Hæc ille: Quæ quidem illis maxime repugnare videntur, quæ de Aloë priori loco citato scripsit, ac etiam 6. simpl. med. ubi Aloën inter ea medicamenta ponit, quæ Gæci ab excernendo stercore, *ἰακωπῆτινα* vocant. Aloë herba, inquit, non admodum apud nos provenit: & quæ nascitur in magna Syria, aquosior est, & facultatis imbecillioris: attemen vique adeo deficere potest, ut vulnera glutinet. At in regionibus calidioribus, qualis est Cælosyria & Arabia, multo est melior.

Optima autem Indica, cuius liquor est id quod ad nos importatur cognominatum Aloe, medicamentum ad plurimas res propter siccitatem mordicationis expertem (intromptum, forisque applicatum, quod paucis medicamentis contingit. Vide Alexandrinum in Gal. cap. de Aloë) vile. Est autem non simplicis naturæ, sed, ut est indicio gustus, adstringit simul, & amara est: adstringit quidem modicè, sed fortiter amara est. Subducit & ventrem, ut puta ex numero medicamentorum Eccoproticorum. Est autem tertii ordinis exsiccantium: calfacientium autem, aut primi intensi, aut secundi remissi. Sed & ipsius facultatis mixturam attestantur particularia eius opera. Nam & gratum stomacho medicamen est, ut siquid aliud: & linus glutinat. Sanat & ulcera, quæ ægè ad cicatricem duci possunt, & maxime quæ in ano sunt & pudendo. Iuvat & eorum phlegmonas aqua subacta, & vulnera eundem ad modum glutinat. Congruit similiter videnti & ad phlegmonas in ore, ac naribus & oculis. In summa repellere & digerere simul potest, cum hoc ut paulum extergat, quantum videlicet viceribus puris non sit molestum. Hucusque Galenus 6. simpl. Idem 3. simplic. dixerat Aloën totam aut parum, aut nihil purgare. Et hinc licet 8. de comp. med. sec. loc. ante citato hæc subdit: Ad ventris subductionem illota Aloe est aptior: elota autem multum de medicamentosa vi amittit: quam etiam febricantibus dare aliquis possit, si febris sit valde mitis. Infestissima autem est Aloe, vel Iota, iis qui citra vitiosos succos intemperie affliguntur calidà &

sicca. Proximam ab his cladem percipiunt, qui siccam intemperiem habent, vel frigiditatem etiam implicatam: & in uniuersum, qui ex sola qualitate particulam aliquam affectam ac læsam habent, &c.

Diu autem multumque agitata est questio: An Aloë venarum ora aperiat, necne. Sunt autem qui negatiuam tueantur, sunt & alii qui cum Mesue affirmatiuam amplectentur, concludantque aperire. Quod quidem mirum videri non debet in multiplicium virium medicamento, ad tertium usque; à temperamento recessum, siccò, & ad secundum calido, terrestrique, si ad aperientium quoque, quæ anatomice sunt, facultatem aliquam retineat, intus à calore nostro ad actum cum deductum, ut quod foris acrimia multa faciat anatomice facultatis, intus ipsum, ignea concepta vi, & acrimonia, faciat, venarumque oscula aperiat, prolecto sanguine.

Huic autem sententiæ etiam Fallopius subscribere videtur, cuius verba hic subdimus. Mesues inter benedicta vocata medicamenta, eò quod leniter euacuent, vel saltem moderatam habeant vim purgatoriam, & nullum incommodum, molestizque nihil afferant, Aloën recenset. Est hæc duplex in officinis: una quæ succus est, & Aloes simpliciter dicitur: altera verò lignum, de qua alibi. Eius, quæ succus est, varia genera nouere Antiqui. Et Mesues primò quatuor differentes species, ratione loci, vnde deferebatur, cognouit. Harum prima, erat, quæ ex Succotri regione deferebatur: Altera ex Persia: Penultima ex Armenia: Postrema ex Arabia. Auicenna autem & Isaac nouerunt tres tantum species, Succotrinam, Arabicam, & ex Senegia delatam. In officinis licet Fuchsius & quidam alii duas tantum Aloes species nouerint tres habentur, Succotrina, Hepatica, & Caballina. Succotrinam decurtatâ voce ait Fuchf. *Fuchf. ita;* appellatam, quasi Succotrinam, à succo citrino: sed decipitur. Nec enim à succo, sed natali loco, quæ est insula Succotra, denominatur. Eius nota una inter præstantiores est, ut sit saporis in principio subdulcis, in fine autem amarescentis, anthore Mesue, quod mirum est. Nam Galenus, Rufus, Paulus, & reliqui aiunt Aloën omnem ita amaram esse, ut nihil sit amarior. Ast ego horum sententiæ adstipulari non possum, quia Absynthium, Colocynthidem & alia quædam Aloe amariora esse credo. Sed sat est quod Aloes ex communi omnium consensu sit insigniter amara, & in principio, & in fine, contra quam Mesues asserit. Variè hæc purgat. Nam si Ciceris vnus quantitate (dosi vnus scrupuli) & post cibum exhibeatur, euacuat tantum fæces. At si usque ad vnam drachmam offeratur, euacuat à tota substantia bilem ex primis venis, usque ad hepar, quod viscus sua facultas tamen non excedit. Porro tantum bilem, non autem crassos, viscidos, & frigidos humores euacuare, perhibet Galenus 8. comp. med. sec. loca. Mesues tamen & Rufus vir Galeno antiquior apud Orbasium etiam pituitam purgare testatur. Sed omnes mea sententia rectè dicunt. Nam Aloes ex se, i.e. ex sui natura & substantia euacuat bilem tantum, ut vult Galenus, Etius, & alii non pauci, teste experientia. Sed euacuat etiam humores crassos, viscidos & tenaces, quando scilicet tales humores sunt in cavitatibus ventriculi, vel intestinorum. Amara siquid est & detergit. Hæc autem inter cetera habet Aloes incommodum, quod correctione egeat, correctumque hepatis

Inquit viri
an Aloë ora
aperiat.

Aloe medi-
camentum
lupatissimum

Aloe non est
omnium a-
marior.

Mesues &
Galenus et
cilianus.

noceat, calfaciendo & aperiendo ora venarum, existentium circa sedem, ut ait Mesues & alii multi, quos tamen alii accusant, ut qui Dioscoridi aduersentur. Sed pro Mesue rursus insurgit Fuchsis, & alii. *Ego verò* ab experientia discedendum non iudico, eò quòd habeam ipsam disimentem hanc litem. Docet hæc autem, quod frequens Aloes usus, hæmorrhoidarum venas aperiat, quod ego millies obseruavi, & vos ex centum eorum qui Aloe ad excernendas fæces vtuntur, videbitis nonaginta hæmorrhoidarum fluxum pati: omisso verò Aloes usu, venas illas claudi. Cur autem Aloes aperiat ora illarum venarum, equidem credo, quòd à tota substantia id faciat: non autem quia tardè euacuet, & continuè ac sensim deorsum descendat, ut quidam volunt: quia & alia, quæ tardè euacuant, ut Mirobolani & Terebinthina idem facerent: Nec aperit venas illas adstringendo, quia multa alia etiam pharmaca cum adstringant, idem præstarent, ut Mirobolani & alia non pauca. Itaque credo quòd à tota substantia aperiat venas hæmorrhoidales. Ne igitur id faciat, oportet commiscere, ut dicit Mesues, Mastichem, Gummi Tragacanthæ, Bdellium & similia. Corrigitur etiam hoc incommodum si Aloes abluatur aqua Endiuiz, qua ablutione redditur etiam minùs purgatorium.

Io. Iuuenen. Io. Iuuenenis in annot. in Galeni lib. de Theriaca ad Pilonem statuit Aloem adstrictione suâ humores quos attingat depellere ac purgare. Malim ego cum Fallopio purgandi vim præter proprietatem, amaritudini potius quàm adstrictioni, attribueret: amara enim, non adstringentia, detergunt.

Aloes speciei duæ Rueli. Ruell. Aloem Caballinam & Succotrinam solum agnouit, volens Succotrinam iocinoris modo esse coactam. Gesnerus præfert è tribus speciebus Hepaticam, asserens Aloes plantam in Germania esse insipidam, in hypocauftis verò suspensam, amarescere, viterèque ac viuere. Amatus Succotrinam cæteris antefert, iocinoris modo concretam, rufam, splendens, &c: La cuna narrat Arabes meliorem Aloem & puriorem reliquis, Succotrinam vocare bonitate secundam, Hepaticam: malam & adulteratam, Arabicam. Succotrinam ex se distillare, idèoque qui magnâ copiam colligere desiderant, solere argillâ solum optimè inducere, ne à terra imbuatur. Apollo testis est Succotrinam cognomento præferri, optimamque ex Aegypto conuehi, vtrum particulis, globulis ac arenulis interdum vitiatam, ut pondere incautos fallat. *Sed antiphæbus* malè irradians, ait Mesuem optimam celsere Indicam, posthanc Persicam, tertio loco Armeniacam, Arabicam ignobilissimam, quæ tamen multò melior est, approbante Galeno.

Garcias redarguit. A Garcias immeritò reprehenditur Brasauolus: quasi negaret Aloem esse amaram: non enim negat hic simpliciter Aloem amaram esse, sed in Europa amaritudinem amittere. Plures etiam id cum Brasauolo asserunt.

Centra Lacuna. Cum autem nobis præ reliquis in Aloes tractatione satisfaciat Garcias, plurimos, qui in illa occurrunt soluat nodos, atque multum afferrat lucis, rei reliquum ipsi committimus. Sic autem ille. Succus hic non extrahitur in quadam duntaxat vrbe, ut ait Lacuna: sed per totam insulam, quæ nullis vrbibus exculsa est, pagosque duntaxat habet cum multis gregibus: neque laterculis ad excipiendum succum subternitur pau-

mentum, ut idem auctor est, quandoquidem in tota insula non est tanta polities. Nec audiendi sunt, qui succum ex superiori plantæ parte profluentem, eò qui mediâ, aut infimâ parte profluat, præstantiorem faciunt: liquidem omnis succus bonus est, & arena caret, si adhibita diligentia extrahatur. *Præterea* non adulteratur: nimia etenim eius est quantitas: sed quòd incolæ negligentiores sint in auferendis sordibus, quas hic succus secum trahit: alius alio peior videtur. Hanc ob causam minùs adhibenda fides est Dioscoridi & Plinio, qui eam gummi & acaciâ adulterari scribunt, cum exigua sit iis regionibus Acaciæ copia: imò nulla, quemadmodum à viris fide dignis accepi. Illud verò non negaderim, quin translatum, aliis in regionibus adulterari possit. Porro quòd laudatissima sit quæ in Socotora nascitur, non solum vulgari famâ, sed à celebribus viris accepi, qui còperum se habere aiebant, Aloem quidem plerisque aliis Indiæ locis nasci: facile tamen dignosciam quæ in Socotora nascitur ab ea quæ à Cambaya, Bengala, aliisque locis aduehitur: Socotorinæque pretium quadruplò maius esse, illius quæ aliunde adfertur pretio. *Nec minus* plura sunt genera, ut volunt Arabes, sed vnicum duntaxat, tamen variâ illi indant nomina. Quod verò Dioscorides & Plinius scribunt laudatissimam ex India adferri, alii verò ex Alexandria, aut Arabia non simpliciter id intelligendum est, sed de ea quæ ex Socotora primùm in Indiâ delata est. Nam etiam ex Cambaya & Bengala deferretur Ormus, Adem, & Gida. Itaque minùs malè Mesue, qui vnum Aloes genus ex Socotora adferri scribit, aliud è Persia, tertium ex Armenia, quartum ex Arabia. Nam quæ in Lusitaniam deferretur, ea ex Socotora allata est. Alexandrinam autem à quibusdam præferri hinc factum est, quòd pleraque aromata Ormus deferrentur, deinde Balora, Adem Gida: inde camelis Sæz, & Alexandriam, unde Veneti petentes, ea reliquæ Europæ communicabant: non autem quòd in Alexandria fiat Aloe. Nascitur verò non modò in maritimis, sed etiam desertis Indiæ locis. Nullum eius inueniri gummi certum est, sed interdum aqua quædam viscida è foliis stillat, neglecta, & nullius efficaciz. *Huius usus* est non modò apud Arabes Turcosque Medicos, sed etiâ apud Indos in purgantibus medicamentis & collyriis, tum etiam in vulneribus carne expleudis: in quem usum plerumque in suis officinis medicamentum habent, cui nomen *Moebea* ex Aloe & Myrrha paratum, quo etiam plurimum vtuntur in equis curandis, & vulnere lumbicis enecandis. *Medicini* vidi magni Sultani Badur Regis Cambaya, ipsâ herba Aloe videntem pro medicamento familiari, in hunc modum. Folia Aloes concisa cum sale coquebat, eius decocti octo uncias propinabat, quæ aluum sine molestia & nocumento subducebant quater aut quinquies. In vrbe Goa Aloem probè rufam & cum lacte mixtam propinant iis, qui vicere renum aut vesicæ laborant, vel qui purulentas excernunt vrinas, non sine magno successu & ægrotum còmodo: nam illicò curantur. Illius vius etiam ancapibus notus est, qui confracta animum crura eâ conglutinant. In India similiter maturandis phlegmonibus idonea. *Quamobrem* hallucinari mihi videtur Matthiolus qui Aloem ad spectacula potius foueri [in Italia dixit non in India] asserit quàm ad medicum usum. Quod verò Musa

Aloes Socotrina quædam.

Aloes Alexandria.

Aloes plantæ medicæ usus.

sa negat Aloen herbam amaram esse, magis mit-
tum: nam sæpè degultatam admodum amarâ in-
ueni; quoque vicinior pars erat radici, eò amarior
mihi visâ est; extrema autem folia amaritudine
carere mihi videbantur. Tota planta viroso
odore prædita est. *Ceterum*, quoniam controuersia
est inter nonnullos auctores, debeantne ea medi-
camenta quæ Aloen accipiunt, ante cibum sumi,
an vero secundum cibum, & an illic à cibo; pau-
ca visum est hic adiuicere. Galenus [Galeno ad-
scriptus ad Paterniacum, Clus.] eius quinque ca-
taporia exhibet (tria grana Ciceris magnitudi-
ne dat post cœnam, Clus.) & bene quidem, qu-
oniam hac ratione capitis dolores sedat. Plinius
autem lib. 27. cap. 5. efficaciorē esse, si potâ eâ
sumatur cibus, modicus vi scilicet & boni succi;
quæ ratio multum mihi probatur, eamque se-
quuntur Indiæ regionis Medici. Cùm enim A-
loe medicamentum sit debile, non euacuabit, nisi
statim vires confirmetur modici cibi eiusque bo-
ni succi sumptione, ut eo digesto melius euacua-
re possit. Paulus lib. 7. cap. 4. contrâ, manè su-
mendam præcipit, eoque reprehendit, qui eam
à cibo exhibent: corrumpit enim, inquit, cibum.
Sed idem rursus lib. 3. cap. 43. Aloen post cibum
quoque exhibet, quam controuersiam Nicol. Ro-
rarius in suis contradictionum veterum auctori-
um libris conciliat. Singuli autem suis nituntur

*Controuer-
sia an post
vel ante ci-
bum sumi-
da.*

*Aloe dicitur
si opus sit.*


firmis rationibus & auctoribus. Manardus a-
liique Recentiores multi acerrimè in Mesuem,
Serapionem & Auicennam inuehuntur, quod af-
firmauerint Aloen venarum oscula aded refera-
re, ut inde postea sanguis facillè fluat, eamque ob
causam hæmorrhoidibus non conuenire: dein-
de quod scripserint melli admistam minùs pur-
gare, minùsque stomacho noxiam esse, quàm reli-
qua purgantia medicamenta. Dicunt enim
Manardus & hinc similes, Aloen non modò non
aperire hæmorrhoides, sed eas potius obstruere:
neque rectè scribere Mesuen, qui illam stoma-
cho minùs noxiam faciat, quandoquidem huic
fit admodum visus, nec nocumentum aliquod
adferat, melliq; admixta magis euacuet reliquis
purgantibus medicamentis. Priora confirmant
Galeni auctoritate: postremò verò, quod mel,
cùm sit purgantis facultatis, alteri purganti ad-
iunctum necesse non magis debeat purgare. Re-
ctius Musa, nullus in verba magistri iuans, Me-
sue opinionem confirmat, sæpius expertum se ef-
fè affirmans, Aloen hæmorrhoidas aperire. Et
facile hoc præstare potest ob amaritudinē. Quod
verò oscula venarum obstruere asserant, cum Ia-
cobo de partibus respondeo, foris quidem adhi-
bitam adstringere, intus autem sumptam aperire.
Ad ea, quæ obiciunt de melle, Mesuen videlicet
asserere, Aloen cum melle mixtam minùs pur-
gare, sic responsum volo. Quandoquidem v-
trumque medicamentum purgatoria facultate
præditum est, validioris facultatem, debilioris,
mellis sc. facultate infringi: Sic etiam stoma-
chum roborat & firmat accidentaliter, euacuan-
do videlicet sine nocumento, aut eo certè pere-
xiguo, humores, qui ventriculum infestant. *Pli-
nius* mirari subit, qui Aloen metallicam inue-
niri tradit. Ego non modò modicos Iudæos, sed
etiam pharmacopolas, Hierosolymarum incolas
diligenter interrogavi de Plinii loco. Sed illi ne-
gabant unquam fuisse repertam huiusmodi Aloē
tota Palestina. *Hællenus Garcias. Non affirmat
autem Plinius, talem inueniri, sed fuisse ait, qui
traderent in Iudæa super Hierosolimam metal-
licam eius naturam.*

*Plinius im-
morsus
Garcia in
xatur.*

Tom. III.

ALOE AMERICANA MYRICATA.

CAP. XII.



Longè ma-
ioribus est *Descriptio*

foliis, bicubi-
talibus, carli-
natis, repandis,
duplò crassio-
ribus, in lon-
gum præacutū,
rigidū, rectūq;
sculeum deli-
nentibus, per
ambitum rigi-
lis quoq; sed
breuibus acu-
tis mucicatis.

Aloe Ameri-
cana, Dod. Clus.
Hisp. & histor.
Cass. Camer. a-
nd Matthioli.
Histor. Lugd.
Tab. & Eyll. *Synon.*

Aloe in Pisano vireto, Lob. in Adu. Aloe foliis
mucronato, Eid. in Obs. p. 202. Icon. pag. 374. &
Gerardo: Aloe spinosa Camer. hort. & Sch-
vveckf. Aloes alterum genus nuper ex India oc-
cid. allatum, Cass. Aloe Magnæ Mexicanum,
Bry fratribus: Aloe 2. siue folio in oblongum
sculeum abeunte: Aloe Acosta: Allagucy In-
dorum, *Fly Agulla*, id est, Filum & Acus His-
panorum, spinis venenatis, Trag. America plan-
ta Aloes facie, Column. Manguey mexicanum,
alio nomine Metl. Linsc. Part. 4. Ind. or. fig. 19.
Manguey arbor, ex qua parantur aquæ, vinæ, o-
leum, acetum, mel, syrupi, sula, acus, & res alia
infinitæ in noua Hispania, quarum plerumque
vnam domibus suis, ad vitæ sustentationem cōsi-
tam, colunt, &c. part. 9. Ind. ocid. lib. 4. cap. 25.

Circa Mexico, tanta copia nascitur, quemad-
modum apud nos vites: facit florem, & semē. *Locus,*
Eam cadere solēt antequam nimum, adolescat:
tum enim radix crassior fit, quā excauata quidam
Liquor colligitur, qui Serapii modo illic denfa-
tur: is aliquantulum coctus mel fit; depuratus
Saccharum; dilutus acetum; & addito Ocopali
(radix ea est, quā obetius præstantia, Vini
medicinam nominant) *vinum*, illis quidem in
vfu, sed parum salubre: etenim valdè caput ferit
& inebriat: nullum autem cadaver, aut impura
sentina aded feret, atque illorum anhelitus, qui
eo vino inebriati fuerint. Ex huius germini-
bus & tenellis foliis, fit *conserva*. Foliorum pru-
nis assatorum *succus*, recentibus vulneribus aut
vulneribus instillatus, breui ea curat. Germinum
& radicum succus cum Absinthii illius regionis
succo mixtus, viperarum moribus vtiliter instil-
latur. Illius folia paratur *chara* in vsum vul-
garem sacrificiorum & pictorum: & ex iis [Li-
ni aut Cannabis modo paratis videlicet] fiunt
aspergites (calcei genus Hispanis admodum fa-
miliare ex funiculis contextum) storea, *chlamy-
des*, *cingula*, *capistrum* & *funes*, denique sunt illis
cannabinum filum. Horum foliorum cuspidēs
aded firmæ sunt & acutæ, ut illis acus que su-
bulq; vicem præstent, eas cum fibris extrahendo.
Istis spinis sacerdotes illius regionis in sacri-
ficiis utuntur.

*Omnis ge-
neris remo-
dia.*

Ind. 2. 19.

Ind. 2. 19.

M m m m

ciis se pungere solent, etenim cuspis non intrin-
gitur, & satis altè penetrat exiguo foramine fa-
cto. Ex hac planta ignem struunt, & ejus cineres
parando lixiuio idonei: truncus ligni locus est,
folia vero regularum aut imbricum. *Hallenus*
Gomara. Veneream lucem hac planta Americ-
canos curare solitos tradit *Clusius*. Ac ex huius
foliorum fibris reticula contexta, vt & indusia
ex iis parata Hispali venalia inueniri.

GRANAL. HOLLANDORVM, INTER
Acizoa reponenda.
CAP. XIII.

Locus.

Propagat.

Descript.

EX Indiis in Hollandiam aduecta herba, pro-
pter nouitatem & virtutem à multis experi-
ta. Nutritur neque in terra, neque in aquis, ne-
que in aere, sed in domibus suspensa, iuxta ignem
aut longè ab eo, prout libitum fuerit. Holandi
Granal vocant patrio idiomate, quod perpet-
uū virentem significat. Propagatur hoc mo-
do. Ramus aut surculus digitis frangendus,
nec vllō ferro secandus: cum terra pingui & ar-
gillo sa oleo imbuta inuoluendus, ita vt summi-
tas sese exerat. Argilla seu terra linteā inuoluta
funiculo trabibus appendatur, vt cauliculi pro-
minentes deorsum spectent. Ita nouos ramos
proferent, latos penè, pollicem ferè crassos, lon-
gitudine sequipedali. Semper virent, sed foliis
orbis. Perpetuū noua protulit germina & sur-
culos, vetulis arescentibus. Hæc herba nec flo-
rem fert, nec fructum, nec vllum semen. Succus
eius venenatus putatur. Raritas eius merebatur
narrationem historicam, quanquam nulla ex ea
vtilitas hortis. Ex theatro agriculturæ *Oliue-
rii de Serres*, qui eam terræ tuberibus & fungis
accensuit. An fortè *Aloes Americana*, *Oliue-
rio* non bene nota?

CALI VVLGARE.
CAP. XIV.

Descriptio

Nec An-
thillis, nec
Trag. Diosc.

Planta est bicubitalis, latè se pandens, nullis
spinis hortens, intensè rubens, diuisa in ra-
mos rectos, crassiusculos, cubitales, in quibus fo-
lia, infima quidem palmaria, angusta, pingua:
superiora, minora quoque magis ad summum
scapum nascuntur, breuiora, incurua, ex lato prin-
cipio in mucronem ferè desinentia: iuxta quæ
veluti capitula, Tragi *Matthioli* capitulis similia,
sed non aculeata, in quibus semina limacibus si-
ue cochleis similia: sapor totius plantæ salus, in-
gratus: annua planta.

Kali Mauritanorum, aliqui ad Anthillidem
Dioscoridis: alii ad eiusdem Tragon referunt,
quibus meritò contradicit *Matthiolus*, & *Do-
donæus*.

Kali magnum (& Italis Soda in) *Obs.* Sedi me-
dii folio, semine cochleata dicitur *Lobelio*. A-
matuſ *Barrilham* Valentiniſ vocat: *Diosco-
ridis* *Telephium* falsò *Leoniceus*, vt idem an-
notat *Amatus*. Vñen *Auicenna* & *Serapio*. Kali
Empetron *Bapt.* *Montanus*, sed perperam.

Leon Mas-
thioli fili-
tia.

Matthiol. in *Dioscor.* l. 2. cap. de *Attriplice*, Ka-
li titulo, insigne figmentum, tribus plantis con-
stans, exhibet, confundens turpiter hanc plantā,
cuius ramulum pingit, cum *Salicornia*, & Cali
minore arboreſcente vermiculato.

Synon.

Kali appellatur à *Dod.* *lar.* *Cast.* & *Matthiol.*
Herba Kali à *Bellon.* *Obs.* l. 2. c. 25. & 35. Kali ma-
gnum *Penæ H.* *Lugd.* p. 1377. Kali *Dalechampii*,

ab eodem p. 1378. Kali cochleatum maius *Car-
mer. hort.* Kali species, ab *Eod.* apud *Matthiol*
germ. Kali 1. siue maius cochleato semine, C.
Bauh. phyt. & pin. Anthillis *Salsola* appellata,
Corn. Anthillis *Græcorum*, Kali *Arabum*, de
la Soude, *Bellon.* *Obs.* lib. 2. cap. 24. Anthillis
prima ab Italis *Salsola* & *Stercus passerum*, *Cord.*
in *Diosc.* Herba vitri, *Fontano* lib. 2. c. 3. *Salso-
la* genus vulgè *Isarum* vocatum, *Cæſalp.*

Ad lacus salſos *Montpelii* satum vidimus, vbi *Locus &
colunt* diligenter ad sal Alkali conficiendum: *Tempus.*
mense Augusto ad mare *Montpeliense* coacer-
uantes in eundem vsum conspeximus. Vere eu-
tem prouenit. Sapor & forma seminati in hor-
to nonnihil mutatur, vt obseruati in hortis meis
Geneuz, *Lugduni*, & *Basileæ*. Notiorem tra-
dunt *Aduersaria* in maritimis *Galliz* *Narbonen-
sis*, tum spontaneam, tum satam: minùs obuiam
Septentrionalibus, imò nusquam ferme

Ex Cali aurem confari sal Alkali nobis refe-
rebant confatores ipsi, hæc ratione: Scrobicu-
lo effosso propè mare transuerſim assulas ligneas
imponunt, quibus superaggetunt cumularim
herbam prædictam, ex qua accenso igne stillat
in subiectam scrobem liquor, qui tandem con-
crescens, fit Sal alkali coloris partim nigri, par-
tim cinericei, valdè acre & catharteticū, salum.
Ex saxum hoc Kali vocatum, vel Sode ad vitrum
confandum aptum, in *Italiam*, inque *Septentrio-
nem* ex *Gallia* *Narbonensi* & *Aquitania* defe-
runt.

Salem al-
kali conf-
candi ratio

CALI PARVVM HIRSVTVM.



EA quam
Cali hir-
sutum voco,
plantula est
Montpelii ad
mare Cali mi-
nori nonnihil
similis, ramo-
sa, succulenta,
altitudine fe-
rè pari: ra-
mulis multò
breuioribus,
nec ita rectis,
sed incuruis:
foliis nonnihil
breuioribus,
crassis, succu-
lentis, salis:
tota planta
albicante la-
nugine cane-

Descript.

scens, Cali minore mollior.

An C. *Bauhin.* in pin. Kali 4. siue minus villo-
sum, in prodromo Kali primum? Kali grami-
neo folio etiam tradit, quod ipsi in prod. 5. in
pinace.

CALI ARABICVM.

Cali minori nostrati haud absimilis est plan-
ta: denſo prodit cuticularem agmine in va-
rios surculos graciliores diuisorum: quibus sum-
mo tenus capitula hærent penitus repleta: sub
quibus angustissima acuminatæque sunt foliola,
formâ & viribus Cali minoris tam dicti, cum lo-
ui quadam acrimonia, infernâ parte penitus al-
ba,

ba, superiōr cinerea, inquit Rauvvolf.

Synon.

Dicitur autem ei Kali 1. Arab. eis Vīnen dictum, incolis Schinan. Kali Arab. 1. genus Hist. Lugd. p. 19 in app. Kali 4. Casp. Bauh. phyt. Kali 6. Eid. pin.

Locus.

Vfus.



Iuxta Tripolim copiosissimum obseruauit Rauvvolf. cuius cineribus ingentes naues onustas Venerias transfusi ad saponem & alba vitra conficienda idem testatur.

CALI SIVE VERMICULARI marinæ non dissimilis planta.

Descript.



R Ainaudeto maritimam ignotam Vermiculari nō dissimilem hanc acceptam refero. radice longā, & crassā pro plantæ modulo, eaq; lignosa, ramis dodrantalibus, lignosis, gracilibus, nigricantibus, multifidis & versis radice veluti in articulos distinctis: multis foliis ex inter-


uallis verticillatim ferè caulem circumstantibus, Vermicularis marinæ dimidio minoribus, ad Thymum accedentibus, omnialculatis. Hanc ex sicca describimus & pingendam curauimus.

An Lob. Ob. p. 107. Vermiculari exilis, totaque minor altera, minus crebis foliis, teretibus, oblongis; & flosculis herbaceis Centinodii, ex vireto generosi Viri Brancioni oriunda?

KALI MINVS, SIVE SEDVM minus arborescens vermiculatum.

Descript.

D Vris lignosisque ramis cobitalibus, interdū rubescentibus, alijs albidis fruticat, è quorum lateribus densissimè enascuntur propagines vnciales & sextantales, sursum spectantes, foliolis Tom. III.



perpusillis stipatè per ramorū scapos longā serie, singularibus plerumq; & longioribus, vniuscuiusque sinum implète globulo exiguo, Mili granum equante, qui vbi explicatur, apiculos ostentat numerosos luteos: semen exiguum, nigrum, lucidū compressum.

Dod. gall.

Anthyllis altera Dioscor. Borda Neotericorum, species Kali, vel Alkali. In fol. lat. verò sub Kali albo describit & depingit. Anthyllis altera Dod. gall.

Amatus vocat Anthyllidem crassam, suā sponte nascentem, Valentini Boidam dictam & Anthyllidem Dioscoridis. Sed obscurum admodum est quod folia crassa ait. Sunt verò qui Caudam muris, propter quandam cum cauda similitudinem, vocent.

Matthiæ eos errare contēdit, qui hanc Dioscoridis Anthyllidem esse dicunt. Is autem hanc cum Cali maiore & Salicornia confundit, pingens eam in summitate figuræ ad dextrum latus: In descriptione autem eius meminit his verbis: Vbi denique planta adulta senescit, folia in caulium cacuminibus longè minora exilioraque conspiciuntur, colore rufo: ex quorum ortu pilule prodeunt rotundæ ac parvæ, quibus exile semen includitur.

Kali minus Rauvvolf. Lob. in Adu. & lē. p. 394. Synon. Hist. Lugd. pag. 1377. [ibidem sub falso titulo, Kali maioris Penæ] & Eyst. Kali alterum seu minus, Camer.

C. Bauh. Kali 2. siue minus album: Eid. pin. Kali 2. siue minus album (habet & tradit etiam pin. Kali tertium, siue minus alterum. Semine splendente: Anthyllis altera Dodonæi, H. Lugd. p. 1380. Salsola quædam in maritimis, Cæsalpin. Fallitur C. Bauhinus: Anthyllis altera Dodonæi Hist. Lugd. non est Kali hoc album, sed Medica marina, quam aliò referimus.

Montepelii ad mare cum superiore crescit, mē. Locat. se Augusto semine abundans. Non solum autem calidioribus regionibus hæc, sed etiam ad Septentrionem Angliæ, Normaniæ & Belgis familiaris, Lobelio.

Eisdem ad vsus, ad quos Kali magnum, sedulo vsu colligunt coloni Narbonenses.

KALI HIRSVIO AFFINIS, ANTHYLLIDIS fortè aliqua species.

T Enella etiamnum & adolescentula est planta, radice tenui, simplice, palmā longiore, sculo duū vnciarum, statim supra radicem in ramo diuicato, tomentoso, quemadmodum etiam folia propter lanuginem dentem canescunt, quorum ortus alternatus, ita interim vt ex eodē

M m m m 2

Locus.



puncto pluf-
culanascantur,
quorum infi-
mū duplō reli-
quis maius,
Hyslopi folio-
rum forma,
fed minus, mu-
crote obruso.
In arenosis
quibufdā iuxta
Romam colle-
git gener I.H.
Cherlesus.

CALI SPECIES SIVE VERMICVLARIS
marina arborefcens.

Locus.

Descriptio



Vermicu-
laris ma-
ritimæ arbore-
fcens, & Al-
zoi maritimi
subfruticantis
nomine ex
Prouincia plā-
tam inlit Ia-
cob. Rinaude-
rus, cubitali-
bus, teretibus,
glabris, ligno-
tis stolonibus ci-
nerci coloris,
fruticantem, in
ramos longi-
usculos didu-
ctis: per quos
confertim na-
fcuntur folia
semunciā bre-
uiora, quædam

etiam vncialia, succulenta, Cali nostri hirsuti,
exceptā hirsutie, similia, alternatim disposita, fa-
pore falfo. Hæc planta habet multa, quæ cum
Caliminore conueniunt. Lobelii autem figu-
ram cum ramulo nostro pingimus.

Synon.


Anthyllis 4. siue Chamæpityides frutescens
C.Bauhin.phyt.& pin. Anthyllis altera Chamæ-
pity similis. Cordi in Dioscorid. Chamæpity
vermiculara Lobel. in Adu. & Ic. pag. 381. Cha-
mæpity prima Dioscoridis Penæ & Lobelii, H.
Lugd. p. 1160.

Locus.

Fruticat maritimis littorib. atque insulis An-
gliz & Zelandiz, nec non in squalidis campis
Arelaten inter & D. Aegidii oppidum, non pro-
cul à Rhodani fluentis vberissima perennans.

CALI SPECIES SIVE VERMICVLATI
fruticis varietas maior.

LOb. Obs. p. 207. Vermiculatæ fruticis varie-
tas maior [ita in Ic. p. 382. etiam inscribitur]




An Chamæpi-
tys altera ver-
miculata Dios-
coridis & Den-
si confertis ra-
mulis: sed quæ
maior, folijs
libis, dentissi-
mè conferta,
denticulatis,
Vermicularis
veris, maiorib.
Item Obs. pag.
613. Erica Ale-
xandrina Italō-
rum, Sanamū-
da 3. Clusii. An
autem figura e-
ius hic apposi-
ta competat a-
licui Cali Ver-
miculato asse-
rere nō aſſim,

ob historiam per Lobelium obscure traditam:
conferat obsecro lector figuram Lobelii in Adu.
p. 163. & descriptionem: Item figuram Obs. pag.
207. & p. 623. figuram Ericæ Alexandrinæ, cum
descriptione Clusii, nec inueniet quidquam cor-
respondens. Infani fuisse videntur pectores,
qui nihil simile pinxerunt, aut correspondens
Sanamundæ Ericæ & Alexandrinæ dictæ Cortu-
so, teste Clusio, quod oportuerat monuisse, & re-
ieciſſe duas figuras, vt planè inutiles.

H. Lugd. pag. 1132. Vermiculatus frutex maior
Lobelii. C. Bauhin. phyt. Sedum 21. siue minimū
fruticosum alterum: Eid. pin. Sedum minus 11.
siue fruticosum alterum: Cassiæ lignæ similis
frutex tertius, Cæsalp. An sit Chamæpity altera
Dioscoridis dubitant Lob. & H. Lugdunensis:
Selaginem Plinii Cæsalpinus suspicatur, & qui-
busdam Sempervivum maritimum, & Vermicu-
lariam arborefcntem dici.

Synon.

CALI ARABVM ALIVD.



N Vmero-
sis surgit Descrip-
tione, no-
dulis articula-
tis, instar E-
quisetis: radix
crassa, cine-
rea, lignosa:
Circa Tripo-
lim Ombia.

Locus.

Rauvvolf.
& H. Lugd. in Synon.
app. pag. 20.
Kali Arabum
secundum ge-
nus. C. Bauh.
pin. Kali 20.
[7. iophye.] si-
ue geniculatū
alterum, vel
minore.

Cali geniculatum siue Salicornia.

Salicornia dicta Dodonæo copiosissima apud
mare,

mare, frutex est sæpè cubito altior, rectus, sapore salso: folia non habet, sed ramos duntaxat teretes, denios, ut sunt folia Aizoi, Cepez, & similiū, densè geniculatos, paxillatim geniculo alio aliud excipiente, successu temporis circa radicem lignescētes, quibus succedunt noui, crassi, virides, interdum intensè rubentes; in quorum extremitate flores parui, lutei, ex apicibus paruis constantes: semina non obseruauī, nec radicem.



Matthiol. hanc confundit cū duobus aliis pro Kali in Dioic. lib. 2. cap. 112. Itq; est ramus quem ad similitudinem latus poluit, & sic describit, hinc cū primū ē terra emergit, folium est tereti formā, minori Sedo non ab simile, ac deinde erectus, caule recto, geniculato, erecto: quæ sequuntur non pertinent ad hanc plantam, sed ad ipsum Kali de quo supra.

Kali herbe, Ispen Mauritanis dictæ, Italici Soda, & Salsola, Gall. Soede, Camerarius apud Matthiolum plurima genera haberi tradit, ē quib. quat or exhibet. Mirum interea nobis videtur, cur Camerarius apud Matth. verius Kali omiserit, cuius tamen portionem Matthiolum pinxerat. Trium autem hic damus icones: quartum primo est affine.

Kali Anguill. & Leu. Lemnio, cui & Vermicularis, vel Crassula, vel Aizoon, vel Sedum maritimum. Kali geniculatum Tabern. Camer. Kali geniculatum Penz. Hist. Lugd. p. 1378. (ubi & alia figura, mala tamē ex Matthiolo, Salicorniæ, & c. titulo.) Kellu Aegyptiorum species prima, & Kali primum, Alpino: Kali 7, siue geniculatum, C. Bauhin. phyt. Kali 9, siue geniculatum maius, Eid. pin. ubi differentias duas tradit, vnum simplicius & breuius, dodrantali altitudine, teāū & anouum: alterum multis ramis fruticans, lignosum & grandius, perpetuum: Haberi testatur Tom. III.

Synonyma Kali Anguill. & Leu. Lemnio, cui & Vermicularis, vel Crassula, vel Aizoon, vel Sedum maritimum. Kali geniculatum Tabern. Camer. Kali geniculatum Penz. Hist. Lugd. p. 1378. (ubi & alia figura, mala tamē ex Matthiolo, Salicorniæ, & c. titulo.) Kellu Aegyptiorum species prima, & Kali primum, Alpino: Kali 7, siue geniculatum, C. Bauhin. phyt. Kali 9, siue geniculatum maius, Eid. pin. ubi differentias duas tradit, vnum simplicius & breuius, dodrantali altitudine, teāū & anouum: alterum multis ramis fruticans, lignosum & grandius, perpetuum: Haberi testatur Tom. III.

& rubrum & viride. Alkali Gesn. hort. & Lonic. Tract. spec.

Dodon. gall. & lat. sub titulo Salicorniæ depingit, & pro Kali testia specie describit, tamen si minùs ad vsum expectatur. Gall. porro Tragi speciem facit: Lat. verò Kali articulatum à nonnullis nominari.

Salicorniæ siue Kali geniculati vermiculati inscriptione pingitur & describitur à Lobel. in Adu. & Icon. p. 395. Clus. insp. Salicornia nonnullorum, Semperuium maritimum Montpelianorum. Anthyllis testia, Amato. Anthyllis constans veluti Trifolii granis Cordo obli. sylua. Salsolæ genus aliud, Vliet. & Kali Scorpionis, Catalp.

Multo frequentissima ad quaslibet maritimas Locis, oras, cum Oceano, tum mediterranei maris, auctore Lobelio: Ego copiosam florentem viridi Montpelii mense Augusto, iuxta mare, & inde delatam habeo Montbelgari horti: reposita per Hiemem durat.

Gustu aut esse Lobelius non in salso, nec temperamento, aut vti dispari à cæteris Kali generibus, verum ubique neglectam. Calida & sicca est herba Camerario, & calidior ex eo confectus cinis, qui ad quatum qualitatē vtriusq; gradum accedit, vrendiq; & causticam vim habet. Comburentur in cinerem hæ plantæ, quo liquefiunt contriti lapides ad parandum vitæum. Lixiuum inde percolatum acerrimum & mordacissimum, addito oleo in saponem decoquitur ad abluerdas velles vtilissimum. Herba exigua quantitas intrò assumpta, vrinas & menses potenter euocat, scaturit, aquolos per aluum humores educit, hydropicos purgat. Eius nidore fugantur serpentes: Mucetur etiam cinis, quæ scabiei & cutis scordatibus illinuntur, medicamentis: superflua & excrecentem in malignis vlcerebus carnem exest.

KALI SECVNDVM ALPINO.



Kali altera species, Kali album nonnullorum: planta salsa, atque acri sapore linguam feriens, Alpino.

C. Bauh. pin. Kali 7. siue Crassulæ minoris foliis: Kali 2. species, Anthyllis quibusdam Alpini: Kali floridum repens, Aizoides Neapolitarum, Columnæ part. 2.

In Aegypto alitur, ex qua

uri & aliis, combusta cineres fiunt, ad vitra, saponem, & alia multa.

KALI AEGYPTIACVM 3. ALPINO.

Hanc cum priore sub Anthyllidis secundæ genere reponendam censuit Guilandinus. Mim m m 3

Alpino autem dicitur Keli Aegyptiorum species tertia, & Kali Aegypt. propria.

C. Bauh. pin. Kali 8. siue Aegypt. foliis valde longis, hirsutis: Kali tertia species Alpini.

Vfus.



Ex tribus his Kali Alpini speciesbus Sole in primis exsiccat, & mox combustis cineribus parantur, qui illinc Venetias vehuntur ad vitra, atque alia conficienda. Aiunt multorum, foliarum harum plantarum, sed maximè secundæ atque tertiæ Kali, in pulverem redacta, per os sumpta phlegma atque

bilem exustam purgare. Idemque ex foliis expressum succum facere.

TRAGUS SPINOSUS MATTHIOLI,
siue Kali spinosum.



C Vbitales per terrâ fundit caules, crassos, succulentos, atroviuentes, multis alis brachiatis: per quos folia crebra, longitudinis vncialis, crassa, fassuginoso succo pragnantia, in aculeum rigidum pungentem deficientia: ex quorum sinu flosculi emicant parui, herbacei, succedente semine in co-

chlear formam condoluto, in vasculo, acutissimis rigidis spinis per oras munito: radix fibrosa, inutilis. Figura nostra ex Fuchianis non vndique placet.

Matth. n. prob.

Lob. in Ic. p. 797. Obs. pag. 463. inscribit Tragon Matthioli, & Drypin Theophrasti Guilandini: In Adu. Tragon improbum Matthioli, Kali speciem spinosam, Scorpium Theophrasti: Matthiolum reprehendens, quod Tragon Dioscoridis vocarit, & cum Scorpio Theophrasti confuderit: negat enim Tragus Dioscoridis, & melitrid.

Gesnerus contra de hort. & Tragus Dioscoridis, & Tragium maritimam herbam, & Scorpium Theophrasti & Plinii vocat, ac Fruticem pusillum aculeatum, sine foliis. Ast non bene frutex siue foliis dicitur, sed herba foliosa.

Sunt & alii qui Tragus Dioscoridis asserunt. Sed Tragus esse non potest: nam in primis frutex non est, sed herba excedens cubitum, in multos diuisa ramos, per terram se spargens. Secundo, Tragus foliis caret: hæc herba autem folia multa habet, &c. Tertio, non habet illos veluti racemos: sed iuxta folia, veluti capitula spinosa, in quibus continetur semen conuolutum cochlear instar, vnde factum ut cum primum hanc plantam intueus essem, nomen Cochleiformis ei inderem: Postremo, adstrictionem non habet, sed salsa est, & potius aperitiua.

C. Bauh. pin. 797. siue Kali spinosum, aut Kali spinosa Diosc. & Plinii: Tragus 2. siue Kali spinosa Synonyma atkins: Tragus Matthioli. Lac. Gestr. descr. Lon. & Tabern. cui germ. Meer Stachelkraut: & Scorpionkraut. Tragus & Kali 2. genus Dodon. gall. Drypis Guill. Tragon Matthioli, Lob. H. Lugd. p. 1477. & Gerardo: An Tragon Czialis pini?

Monspeli oblerbani mense Septembri iuxta lacus salios quâ itur ad mare & in agris. In hortis sata degenerare videtur, foliaque progignere longa & tenuia, hirsuta acuta & rigida, & crassa.

SAXIFRAGA ALBA, RADIX
granulosa.

CAP. XV.



R Adix ex plurimis bulbillis. Coriandri seminis magnitudine, purpurantibus, amatis, fibris tenuibus inter se commissis, constat, quam & aliis præterea fibris longioribus, crassioribusque sit donata: caulem proferit singularem nonnuquam, alias ternos, quinos & plures, teretes, purpureos, hirsutos, ramulis

brachiatis: quibus insident flores albi aliquot, quorum non idem omnium tempus florēdi, quin foliis constantes, staminibus luteolis & stilo viridi, odore nullo evidente: flores includuntur foliolis quinque viridantibus cum ora purpurea, hirsutis, & tactu nonnihil viscosis, cuius lentoris particeps est cum foliis caulis: folia ex pediculis vncialibus, & palmaribus, hirsutis, ferè rotunda, cristata, ad Hederæ terrestris folia quodammodò accedentia, pingua: eorum verò quæ in caule sunt, videas aliqua nullam dissectionem experta, integra, lanceolata, mucrone spadicæ: alia fimbriata quidem, sed non ita prope orbem complentia. Hæc nonnullis locis foliis est maioribus, altiusque exurgit: frequentius tamen minoribus est, & humilior, vel C. Bauh. n. teste, cum Dodonæo.

Tragus pingit & describit nomine Saxifragæ albae. Gesn. coll. stirp. Saxifraga maior, seu alba: Item

ba item : Item Saxifraga granata. Eid. hort. Saxifraga alba : In cat. Calcifraga, *quarvur*. Apollinaris vocat *Steinbrech* : Galli *Rompipierre* & *Saxifrage blanche* : Belgæ *vittesleinbreck*, Saxifraga, Lon. Saxifraga alba, Trago, Dodon. Fuschic. Gesner. hort. H. Lugd. p. 113. Thal. Camer. & Tabern. Saxifraga alba chelidonides, Lob. Adu. & ic. p. 612. Saxifraga alba tuberosa radice, Clus. hist. Saxifraga i. huc rotundifolia alba, C. Bauhin. phyt. & pin. Saxifraga, Brunf. rhap. 33. tom. 1. Saxifraga major, Eid. in 4. p. 100. Fusch. & Lacunæ. Saxifraga 4. Matth. in comm. cum mag. fig.

Locus & Tempus. Locis herbolis incultis, in montibus, collibus in Germania, tum & in Bohemia, gignitur Maio mense cum floribus reperitur, paulo post folia, caulesque inarescunt, relictis circa radicem granis, quæ tempestive colligenda, alioquin & eumida futura.

Vires. Saxifragam ab effectu dictam esse affirmat C. Bauhinus quod sc. eius tum stillantis, tum decoctum, lapides renales & frangere & pellere dicuntur, ut & farina granorum ad radicem, ex decocto sumpta. Grana hæc, & folia, ac radices, calida & secca statuit Dodonæus, viriusque qualitatibus ordine secundo. Feruntur autem hæc, vesicæ ac renum vitis ac doloribus mederi : calculos dissolvere : viinas prouocare : stillicidioque auxiliari.

SAXIFRAGA AVREA DODONÆI.

Descript.



Herbula est foliis multis figurâ terrestris Hederæ minoribus, interdum maioribus, præsertim postquam defloruit, rotundioribus, succulentis, in ambitu laciniatis, utrinque hirsutis, suprema tamen & minora sunt, & utrinque glabra : guttu subacido, & amaricante, stypti-

coque. Pediculi angulosi, solidi atque albidi (inferne tamen rubescentes) ad terram villosi, quasi coliculi, asurgunt palmari & dodrantali altitudine, vel paulo altius in duos ut plurimum, tresve ramos angulosos sulcatis divisi : in quorum summitate super foliis *stoculi* terni aut quaterni lutei, floribus Ribes vulgaris simillimi, inodorati, foliolis quaternis crucis instar collocatis, aliquot staminibus luteis in medio calathiscum ambientibus : semine paruo, nigro : radiculis innititur longis ex albo rubescentibus, aliis crassiusculis : geniculatis, fragilibus, reptantibus, plurimis vero fibrosis, tenuitate capillari.

Synon.

Saxifraga aurea, Dod. & Gesner. hort. Thal. Cam. Ger. & Hist. Lugd. p. 113. Saxifraga Romanorum Lobelii, Eid. p. 114. Item Saxifraga alpina. Saxifraga aurea Lichenis facie, & nata-

litiis, Lob. Adu. & Icon. p. 612. Saxifraga Sabauda, Rob. Constantino, qui cum Pileolla Herbariorum, & natalibus, & facultate, multisque figuræ notis convenire hanc scribit. Chrysosplenion, *Gulden Miltzkrant*, Tabernam. Erysimi species Aldroando. C. Bauh. pin. Saxifraga 3. (2. phyt.) siue rotundifolia aurea : hepatica palustris, Eyst.

German. *Gulden Steinbrech* dicunt : Belgæ *Gol-* Nom. ling. *den Steinbreck* : Galli *Rompipierre*, ou *Saxifrage dorée*.

Humidis, vmbrosis palustribus, riguis, muscosisque observantur locis, Maio & Aprili florentem, diuersaque gerentem folia, ita ut diuersas eius species quis existimet.

Chrysosplenio saporem quem Licheni, adscribit Tabernamontanus : hinc existimant quidam facultates easdem habere, hepaticæ & lichenis obstructions referare.

SANICULA ALPINA GUTTATA.

CAP. XVI.



Radix Saniculæ guttata est crassitudine minimi digiti, nigra, densissimo fibrarum barbitio capillata, sapore insigniter adstringente : caules hirsuti, teretes, & nonnihil tortuosi : folia rotunda, lata, pingua, hirsuta, altis per ambitum incisuris serrata, sic ut minima folia tanquam digitata videantur

sapore adstringente & subacri, alia à radice orta longis pediculis, palmaribus & sesquipalmaribus, hirsutis propter terram rubentibus, appensa : in caule, aut breui aut nullo pediculo donata : ex quorum alis pediculi semipalmares & palmares, tenues, hirsuti, intortâ ceruice prodeunt, in alios breuiore subinde diuidui : quibus insident flores rari pulchritudinis, nullo excellentes odore, stellati, sex foliis oblongis constantes, albis, sanguineis punctulis guttatis : quorum singulorum medio *stamina* singula albida apprimuntur, & totidem foliis intericiuntur : umbilicus bicornis in meditullio surgitur.

Gesner. hort. Sanicula alpina, Eid. de Lunar. Saniculæ alpinae genus, Sanicula guttata : Item lib. 3. ep. ad Zyving. Sanicula alpina Coryledoni cognata. Io. Fabricio ad Gesner. Sanicula alpina guttata Clus. pann. p. 439. Sanicula montana siue guttata Eid. histor. Sanicula montana altera, Saniculæ guttata nomine Ferrariâ missa, quia eius flores sanguineis veluti maculis aspersi sunt. Montanorum pastorum & venatorum Sanicula alba, *vveisz Sanikel*. Dubitat Clusius an ea sit quam Lobel. in Aduers. & Icon. pag. Garyophyllatam & Geum alpinum recentiorum

Synon.

folio herbaceo inferibit. Et mirum sane quid si-
bi velit Lobelius, planta enim hæc quam pingit
Lob. eum Caryophyllata nihil habet commune.

H. Lugd. H. Lugd. Caryophyllata siue Geum alpinum
Penz. Eid. Coryledon tertia Dalechampii. Dug.

effigies eiusdem stirpis.
C. Bauh. phyt. Sanicula 9. Eid. pin. Sanicula
rotundifolia 2. siue San. mont. rotundifolia ma-
ior: Sanicula mont. altera Eyst. Sanic. alpi-
na Cam. ep. guttata, Eid. hort.

Locus & Tempus. Genevæ cundo Lugdunum inter S. Germani
& Chastillon Sabaudiz repertis florentem Maio &
in principio Aprilis. Crescit in omnibus Austriæ
& Stiriz alpinis umbroso loco, h. e. ubi plerū-
que filix in alpium iugis desinere incipiunt.

Flores, junio, interdum etiam seridis in hortos
verò translati, teste Clusio, multò maturius.

SANICULÆ ALPINÆ

aliquatenus affinis.

Describe.



EX radiculis
sparsis ca-
pillaribus, do-
drantalibus sur-
git caulibus, sine
nodis, caulis,
subhirsutis, su-
perius in ramu-
los abeuntibus:
quorum extre-
mis hærent flo-
res Saniculæ al-
pinæ guttatae,
quinque candi-
dulis constan-
s foliis, apici-
bus cum bifido
umbilico tur-
binato medium
obtenentibus,
circūiectis toti
flori foliolis vi-
ridantibus: folia per terram sparguntur, subhir-
suta, vnciam aut sesunciam longa, sensim di-
latata, semuncialia, serrata, superiore potissimum
parte crassiuscula, gustu adstringente.

Locus.

Hanc repertis in rivulo fontis pulcherrimo, qui
est in cacumine Vogesi montis dicti Balon ubi
florebat Augusto.

An Saniculæ montanæ alterius species secun-
da, Clusii?

C. Bauh.

in pin. vocat Clusii Saniculæ mon-
tanæ alterius speciem secundam, Saniculam ro-
tundifoliam tertiam, vel Saniculam montanam
rotundifoliam minorem. Nostra verò in prod.
illi est Sanicula: siue montana minor.

OPHIOGLOSSON.


CAP. XVII.

Describe.

Multis fibris & satis crassis cincta, Ellebori
modo, si præsertim pinguius nanciscatur
solum, radice donatur, post dulcedinem quam
primam lingue ingerit, caloris & acrimoniz nõ-
nihil in palato relinquens, & paululum amares-
cens Camer. Huic surgit pedicellus palmaris,
solum singulare sustinens, Betæ paræ quodam-
modò, pinguius tamen & carnosum, minimè que

nervosum, modò angustum & longiusculum, mo-
dò latum & subrotundum, læve, erectum, sapore

dulciusculo cū
viscositate &
virescente ali-
qua: è cuius
sinu quæ pedi-
culo committi-
tur, ligula ex-
it, bifurcata,
non tamen se-
cta, in acumen
sensim desinens,
circa extremi-
tatem, utrinque
denticulata, sco-
binæ aut limæ
aurifabræ
effigiatæ. Se-
minis loco, in-
quit Camera-
rius, ei tenuis
quasi pollen in
linguæ incisio-
nibus, quibus



per maturitatem dehiscentibus, excidit. Ca-
salpinus ait esse vestigia seminis, ac semen nullū
conspicuum contineri, vivere tamen radicibus,
quibus copiosè propagetur.

Ophioglossum variare scribit C. Bauhinus: a-
liquando, inquit, folio est sinuato: ligula com-
muniter simplex est, aliquando duplex, & e-
tiam triplex, quemadmodum Camer. in Epit.
Match. pingit: est & abortivum à Lobelio in Icon.
p. 809. pictum.

An Plinio lib. 24. cap. Lingua herba circa fon-
tes nascens: siue Lingulaca, lib. 25. cap. 17. An
Fab. Columnæ, Epimedio congener, id est Lu-
naria?

Dicitur Ophioglossum, Trago, Fuch. Dod-
Lonic. Thal. H. Lugd. Cast. Cam. Tab. & Eyt.

Ophioglossum siue Entaphyllum Lobel. Adv.
Obs. pag. 471. & Icon. p. 808. ibi tamen Ophio-
glosson & Henophyllum legitur.

Gesn. hort. [ubi de veteri eius nomine ei con-
stat] Ophioglossum Fuchsi, Henophyllum & Mo-
nophyllum: Italorum, præsertim Bononiensium
[si non fallitur,] Serpentina: aliquorum (Belga-
rum, Dodon.) Lancea Christi, & Luciola, vel
Lucciola, quod noctu luescit. Eid. de Lunar.
Ophioglossum Fuchsi, Lingua siue Lingulaca Plin-
ii: & sic etiam in cat. plant. et. & Oeconom.
pharm. Lingua vulneraria, Cord. hist. & Cam.
Lingua serpentina, Cæf. & Cast. Serpentina
secunda, Brunfels. Echioglossum, Schvvenck.
ούλλος, Folium, Epiblasti, Amato in Diosc. non
quoad figuram, sed quoad descriptionem. C.
Bauh. pin. Ophioglossum 1. siue vulgatem.

Ophioglossum autem floris arguta cuspis, lin-
guam serpentis exertam imitata, nomen imper-
tuit, fictum quidem ex germanico, quod est
Natterzungen, & Schlangenzungen: Silesii ta-
men vocant Einblatt, aut Kechter Vuederthom
mit Zungen: Belgæ Ons geeren Speer cruyt & Nat-
tertongen: Galli Herbe sans couture, Langue de
serpent: 1. Lingua serpentina, Herba inciola: A-
gli Adders tonge: Boh. hadi jazyk.

In humidis ac palustribus pratis ve plurimum
provenit: nonnunquam tamen & in montanis
occurrit. In hortis locis umbrosis posita durat
& annua-

Varietas

Synon.

Nomina
linguar.

Locus

& annuatim repullulat. In Belgio, Germania, & nonnullis Austris & Italiz locis, Aprili vel demum Maio mense prodit, & ad vsque Iunium quandoque viget: paulò post tota marcescit, nec deinceps vsquam conspicitur. Euulsu radix contumax.

Temper. Fuchsio, extra caliditatem exsiccat insignem, id quod gustus satis indicat: vulneraria est herba, maligna siquidem & curatu difficilia vulnera sanat. Tumores etiam discutit, & ferè Symphiti facultates obtinet. Dodonæus frigidum quidem, sed moderatè asserit: siccum verò temperamento amplius esse ait, ad secundum gradum videlicet accedens. Ad recentia vulnera conglutinanda conducere, & admirabilis esse efficaciz, Bapt. Sardus scribit. Recentia folia vulnera mirificè conglutinant & enterocelas sanant. Datur potanda ex aqua Equiseti ad intrinseca vulnera: auxiliatur sanguinem reicientibus, pota ex aqua foliorum Quercus, quo modo & alba vteri excrementa sistit: decoquitur in vino austero ad collachrymantes oculos. Illinitur recens cum adipe gallinaceo ad vulnura inflammationes. Succus illitus apum ictibus auxiliatur. Herbz puluerem aliquot diebus exhibitum ramices omnes curare posse affirmat idem Sardus. Conficitur ex hoc Oleum, foliis cum oleo Oliuarum ad Solem diutius maceratis, quod non modò recentia vulnera & rupta, sed & vetera vlcera citò sanat. Laudatur & ad ramices exterius illitum.

Ophioglossum anguloso folio. C. Bauhini.

Descriptio. Ex radice crassâ, in fibras crassas abeunte, vnus vel alter pediculus, vncias quatuor longus, post medium dilatatus, effertur, cui folium vnicum, vncias tres longum, sesquiunciam latum, ad exortum vtrinque dilatatum & angulosum insidet & stylum sesquiunciale linguam referentem, pediculo donarum obtinet.

Synonyma. Helmistadio missum hoc Ophioglossum angulosum anguloso folio, quod 1. in prod. 2. in pin.

Ophioglossum minus subrotundo folio, Eiusdem.

Synonyma descriptio. Ophioglossum 2. in prod. 3. in pin. radiculis est fibrosis, pediculo simplici & breui, cui folium vnicum, subrotundum, vnciam latum, sesquiunciam longum insidet: ad cuius exortum, & veluti è folij sinu, stylus serpentis linguam referens, vnciam longus, exit: in humidis circa Monspelium provenit.

EPIMEDIUM. EPIMETRON & Epipetron.

C A P. XVIII.

Diosc. Epimedium caulis est non magnus, Hederæ foliis, denis aut duodenis, neque semen, neque flores proferens: radicibus tenuibus, nigris graui odore, gustu saturo, seu insipido: nascens in aquosis. Huius folia incisa, & cum oleo trita, mammis que cataplasmatibus instat adhibita, eas ita cohibent, vt non auferant. Et radix spem partus adimit (conceptionem impedit, Corn.) Et folia trita, postque menstruam purgationem quinis drachmis in vino pota quinque diebus præstant mulieribus ne concipiant. *Eadem & Plinius.*

Galienus. Epimedio vis est [vt ait Galen. 6. simpl.] moderatè refrigeratoria, cum aquea humiditate: quay Tom. III.

re nullam habet insignem qualitatem. Vberibus illis ea recta seruare potest. Aium verò si pota hauriatur, sterilitatem parere.

Theophrastus h. l. 7. cap. 8. inter plantas quasdam omni penitus flore carētes. Epimetrum collocat. Hoc autem Epimetron Theophrasti Gesn. in cat. pl. idem Epimedio Dioscoridis, Galeni, & Plinij esse suspicatur. Sed hæc coniectura, vt à nobis non probatur, ita nec impugnatur.

Plinius lib. 21. cap. 15. de herbis spontè nascentibus, quibus pleræque gentium vniuersum in cibis maximèque Aegyptus, Acinon commemorat, Epipetron vocatam, quæ nunquam floret. At Turnebus hoc loco Aduers. lib. 6. c. 9. legendum putat Cynops. Dalechampi tamen (Acinos) nomen in Plinio retinendum censet, & vocem copulandam [&] interponendam, ita vt sensus sit, Acinos, & quam Epipetron vocant, &c. Ait enim in Theoph. l. 7. c. 8. in principio capitis Cynopsis nomen legi, & à Gaza Canariam reddi.

Rob. Constantinus in Lexico suspicatur apud Theophrastum pro *ἑπιμετρὸν ἑπιμετρὸν* legendum. *ἑπιμετρὸν*, ait idem, cuius & meminerunt Hippocrates, & Plinius planta est ex earum genere, quæ etiam solo auulsæ, suspensæque tantum, folio diu durant.

Quare Epimedium in Dioscor. appellatum sit, ignorare fateor, inquit Columna, nisi *ἑπιμετρὸν*, quia in Media frequens oritur. Apud Theophrastum Epimetron legitur, & pro eo in Plinio Epipetron. In Dioscoride legitur fructu carere, & forsitan hic *καρπὸν*, fructum, pro semine vtriusque est censendum, non legitur enim in Theophrasto, nec in Plinio. Quare ab aliquo adiuncta hoc loco verba *ἑπιμετρὸν* censere existimanda: aut legi debere & interpretari, non semen, neque florem fert: neque etiam dici posset suspensam adhuc esse eiusmodi lectionem: nam quælibet planta, prius florem, deinde fructum, & semen perficere videtur.

Potè, quæ planta sit Epimedium asserere nondum audemus: sed præstat fortè etiam ignorari hanc malignam herbam, hominibus probis vitandam, si præcipua eius vis est ea, quam Dioscorides ei assignat, & post eum Plinius & Galenus affirmant, conceptionem impedire. Et talis vis lege non solum diuina, sed & humana videtur interdictus, & planta si nota esset, impiis minime demonstranda.

Epimedi, Epimetri & Epipetri [vna stirps & non distinctæ plantæ Colum.] æquiuocationes vt tradamus, reliquum est. Is autem nominibus sequentes donantur plantæ: sc. Lunaria minor. Trifol. hepaticum. Epimedium multorum. Morsus ranæ. Ornithogalon maius spicatum. Caltha palustris. Acinos. Ocymum. Anacampteros. Lens palustris.

LVNARIA BOTRYTIS.

C A P. XIX.

Fibrosa Ophrios radice prædicta, pediculum emittit vnicum palmarem, aut paulò longiorem latiusculum, cui vtrinque quatuor, aut quinque, aut plures adherent coniugationes foliorum falcatorum, crassorum, gibbo inferioris conuexum excipiente: ex eodè pediculo ex infirmæ coniugationis sinu surculus prodit palmaris, succulentus, crassus: è cuius lateribus alternatim nascuntur pediculi racemulis onusti, iubam imitantes.

Columna sic describit. Exit ab radice repug- Nann

subnigrâ, intus flavescente, repente, atque fibris diuisâ, folia edens rotunda, Hederæ fornâ, laxa, Soldanellæ marinæ similia, minora verò, terrij Sedi (Sedi echinati flore luteo) primis foliis ferè æqualia, quæ etiam Hederæ similia sunt, sed non ita crassa, atque molliora, singulati cauliculo



ex opposito alternatim hærentia, densa, aut duodena, vel aliquando etiam plura pauciorave: secundum loci anniue temperiem: è medio verò caulibus parum sub primis foliis producitur petiolus tenuis in summo plures edens racemos utrinque petiolo hærentes foliorum etiam numerum æquant, acinos habentes

congestos, paucos, virides, qui nec florem unquam edunt, nec semen intus habere conspiciuntur, sed pro eo pallido colore pulvis tenuissimus, atque impalpabilis inuenitur, quo sato, an ex eo planta exeat, incertum est, sæpè quidem cum expertus sim nunquam exire aliquid cognoni. Tota planta dodrantalis ad summum est. Radix granem odorem terreum, putidumque remittit, gustu insipido aqueo. Hec ille. Nobis autem degustata radix atque etiam tota planta subdulcis videtur.

Fuchs.
nov.

Fuchsio Lunaria hæc minor in caulibus summitate semen Betæ simile profert. Quod quàm verum sit, qui Betæ semen in hac planta viderunt, testentur: nos nunquam id obseruauimus. Trago quidem semen exiguum, copiosum: Gesnero sunt veluti semina quædam rotunda (sterilia, ut coniecit, non solida, sed luteo polline plena) colore giluo. Marthiolus describit semine ruffo, rotundo, minutoque. Lobelius ait ramosum florem edere, Ambrosiæ aut Botrydis, conuexione quadantenus Ophioglossi.

Lunaria
petraea
Gesn.

Lunaria, quam petræam cognominare libet (inquit Gesn. de Lunat.) ligulam habet, cui coherent racematim veluti semina colore giluo, per summum in spiram reuolutam, quæ fortè per maturitatem explicatur. Et fortè spira illa in causa est, ut à Luna sit impositum nomen, quoddam iustar Lunæ crescentis incuruetur, sicut in Filicum generibus & Phyllitide, eum folia primum crescent, radix simplex descendit, pluribus in imum adnatis: gustus è dulci adstringit. Pastores Tauram vocabant, vel Teram, quoddam vaccæ hac degustatâ, taurum requirant. Sunt in Italia qui Epipactin vocitent, quæ & Elleboriæ dicitur Dioscoridi. In agro Bernensi audini nominari ab Empirico Clauem diabolice. *tenf fets schlossel*. Denique quod cum Luna augeri & decretere quidam putant, quis non fabulosum existimet?

Lunaria minor dicitur Chymistis, ab aliis Lunaria botrytis ob semen racemosum. Ferunt autem equos in montibus, vbi hæc copiosa proue-

nit, eam supergressos, anullos ab ea clausis, suos ferreos calceatos amittere, & ob id vulgò à nonnullis *Sferra cavallo* appellari. Sed perperam, vel Marthioli indicio, quoddam alia sit planta, quæ vel ab ipso effectu legitime sic fuerit appellata, vel quod semen proferat ferreis equorum calceis simile. Magni faciunt hanc quidam, præsertim Chymici, eamque pluris ferreæ æstimant, quàm aurum. Sed quàm isti in suis venis opinionibus deludantur, ipso magno sæpè suo damno experiantur.

Chymist.
opimus &
na.

Perelegantem hanc Lunariam racemosam, Ceterach foliis, racemulis Ophioglossi, antiquis indictam, in Aduers. scribit Lobelius: recentiores autem Lunariam vocasse perhibet, à foliolis Lunæ crescentis in morem subter falcatis.

Cæsalpinus Lunariam hanc minorem cognominatam, seu racemosam, Ophioglossæ affinem tradit: quia unico exit folio, incipiente Æstare, quod citò disperit: putat verò totidem habere folia, quot Luna dies habet: & inde Lunariam dictam esse: scribit enim incipiente Luna, incipere eius exortum, augeri que in dies foliorum numerum, particulatim explicato folio, ut in Filice.

Columna ait apud Theophrastum hanc plantam Epimetron vocari, & pro eo in Plinio Epipetron, & alibi, ut in Dioscoride, Epimedium, in aliis nomenclaturis Erineos, & Thyron, quia aquosis gaudeat locis.

An veteribus cognita, ambigitur, inquit C. Bauhinus: aliqui Ceratium Plinii censent: quidam Tragium secundum Dioscoridis, quod in montibus folio Scolopendrij, radice renui & candida nasci scribit: nonnullis *hemionitis* & *silvestris*, quia aliqui Hemiontidæ Lunariâ maiore, vocant, hanc verò minorem & botrytem à plurimis racemulis utrinque thyrulo hærentibus & foliorum numerum æquantibus: Epipactis quibusdam. An *Empetrum* Dioscoridis, & Plinii Epimedium, quod forte Theophrasti Epimetrum. Lunaria hæc foliis est densis, vel duodecis: nouendecim in Baldo notant, quare putant aliqui totidem folia habere, quot Luna dies, unde nomen habeat.

An Epi-
medium.
Nouem-
decim fo-
lia.

Lunaria, Trago & Dodon. Lunaria minor Marthiol. Fuchs. Dod. gall. Gesn. hort. Lon. H. Lugd. Caf. Ger. & Thallio: Lunaria racemosa, Lob. Obi. p. 470. & Ic. pag. 807. Lunaria maior, Cast. Lunaria vulgaris minor, Clus. h. ap. alt. ad l. 4. Lunaria botrytis, Thal. Camer. hort. Col. & Eyst. Lunaria botrytis minor, Clus. hist. Ruta lunaria vel iecoraria, Tab. Epimedium Dioscoridis, Colum. *hemionitis* & *silvestris*, Schvvenckf. Lunaria i. vel minor racemosa, C. Bauhin. phyt. & pin. An Lunaria nobilis, Fabricio in epist.

Synony-
ma.

A foliis hanc plantam germanicè *Monrauten*, quasi Lunaticam kutam dicas, & *Montrauts*, Lunarem hesbam, appellare libuit: item *leber Raute*, iecorariam Rusam, & *vveisser vviderthon*, *Recht vviderthon*, Silesiis aliis nonnullis *May draßlin*: Brabantis *Clym Maentruye*. Gallis *Tauve ou Lunaria*: Ital. *Lunaria del grappolo*: Boh. *vvrat se zafse*.

Nomina
linguar.

In monte Rhetie Burmio dicto Iunio mense collegi: Genetz in monte *Salene* vigentem Maio: in monte autem Thoiri racemum suum habentem, Iulio. In quibusdam altissimis siluis nasci refert Tragus: Iulio mense apparere, deinceps verò non item: esse qui dicant cum Luna augeri & decretere, ita ut quod diebus supra terram Luna fuerit, tot etiam incisuris dissectam Lunariæ folium videatur. Tubingæ in pede montis Austriaci in fine Maij & Iunio mense copio-

Locus &
Tempus.

simam

fissimam invenit Fuchs. Gesn. in petrosis Sabaudiz montibus, & latis frequenter circa Clauennâ insignem Rheni pagu. Lobel. in Angliæ collibus. qui Grenuici regis ædibus, & Tamesi imminet, satis multum reperit. Mindena iuga cetera montium habent: ericeta, strigosa, steriliaque montioia amar. In laxis, locis alpestribus, ac frigidissimis oriri testatur Cataplinus. Columna frequenter perhibet in monte D. M. Virginis, vulgò *Môre vergine* appellato, frigidò & excelso, locis humidis aquosis, pratensibus: Vere exire, Mai o se. mense: Maio verò & Iunio cum botrybus racemolam inueniri. In montium aut colliculorum decliuib. ac herbidis locis subinde gignitur, Solo tamen gracili ac multo: Sub finem Aprilis, Maio ac Iunio inueniri potest: quærens autem mensis tempus temere fuerit nusquam apparentem requerere, inquit Dodonæus. Crescere etiam in Pannoniis, Noricisque, ex veterum Geographicorum descriptione, iugis præsertim verò in pratis, quæ siluis elegantur antè quam suprema Alpium supercilia attingas, auctor est Clusius. In monte Iura non raro occurrit. In horum translata non diu durat. In Silesiæ pratis nec non montium gramineis colliculis Maio conspicuam tradit Schvvenckfeldius.

Multi præclara quæ iam de Lunaria sibi & aliis pollicentur, præsertim vero Chymistæ, qui eam in arcanis habent, promittentes eius succo argenti viuum coagulari. T. agi iudicio exsiccatoriam habet vim [Cataplinus, frigidus & sicco est temperamento] possetque forte ad calidas ventris fluxiones usurpari. Terrestre quid præ se fert [inquit Fuchs] gustata, atque parum adstringit, ut hinc modice frigidam & siccam esse verisimile sit. Vis foliorum eius huiusmodi vulneribus efficax, glutinandi namque facultate prædita est. Constat experientia ad supprimendos mentes & album muliebrem profluvium mirifice conferre hanc herbam. Ophloglossum ipso alpestris & facultate eximia vulnera ferruginandi, ulceraque & luxata celandi, vel æmulatur, vel superat. si Lobelio credimus: gustu præfata & adstringens. Ad enterocelas & hernias magnæ commendationis & utilitatis pota & impotia. Matthiolus tot plantæ vim mirè efficacem vulneribus glutinandi ascribit: nec quæ intrinsecis, atque extrinsecis corporis fracturis sanandis. Datur vilitate commodèque per entericæ planta in pulvere contusa. Plebecula simplex ad quodvis falcinum abigendum superstitione hanc plantam celebrat. Tauram vocant pastores Gernero referente, quod vaccæ eâ degustatâ ad libidinem moueantur, & requirant taurum. In Rheni Clauenna autem rusticos ibi iumentorum ulcera hæc herbâ curare. Idem verò de Lunariis semini vim venatam attribuit.

LVNARIA BOTRYTIS MINOR multifolia.

Camerarius in Epitome Matthioli, prodidit in Anglia speciem hanc Lunariæ nostræ rariorem inueniri, pluribus foliis donatam, & nonnunquam pluribus etiam racemulis.

De hac eadem, ni fallor, à Thalia hæc scribuntur: Lunaria botrytis, πολυφυλλος, quam copiosam in montium quorundam iugis summis circa Andersbergum reperiri initio Veris, iam sub nubibus, Fauoniorum flantibus colliquefcentibus prorumpentem, est radientis paucis, multitudine.

Tom. III.

tenuibus ad luteis: *solido* primò rotundiore, luteo, palmari ferè, in brachia diducto, quæ gemino latere iterum brachiatæ. utrinque *folia* lunata, flava: secusicularum instar continent: sed breviora quàm in priori: deinde alium prope radicem colicolum exurgere obseruavi (& fortè plures prodeunt inde) eodem modo foliarum & brachiarum. Medio loco inter hos coliculos *folia* junctæ, ex omni nascuntur.



Clus. hist.

Lunaria minor racemosa Camerarij, Lunaria minoris alia elegans species etiam ramosa, ex Anglia allata.

Schvvenckfeld. Lunaria botrytis minor polyphyllis, racemosa inuenitur, Grosse vielbluetriebe leber Kautte.

C. Bauhinc. phyc. Lunaria 3. siue racemosa ramosa: Lunaria botrytis polyphyllis Thalia quidam Lunaria minor ramosa Clusij? Ed. Præ. Lun. 1. siue racemosa ramosa maior. Præter in phyc. suspicatur Lunariam botrytis polyphyllon Thaliæ eandem esse cum Lun. minore ramosa Clusij sed nos has duas ab invicem separamus, ut postea dicemus.

Schvvenckf Lunar. πολυφυλλος in hortis suis inter gramina cum priore copiose crescentem reperit. Anno à CHRISTI natiuitate 1603. ex Ioannis Bierdumphelij procerum Austriæ Medici epistola Viennæ Austriæ missa intelligebat Clusius, hanc plantam spontè nascentem fuisse obseruatam & lectam circa arcem Vveichselbach. cum vulgari illa minor copiose nascentem.

C. B. not.

LVNARIA BOTRYTIS RAMOSA Silesiaca.



Ivhari vaccæ selquipalmaris crassiusculi pediculi fastigium ornant: foliorum situs & numerus longè diuersus liquidem pediculus tetraantal, crassitie eius qui racemum sustinet, nudus, in tres abie pediculos minores, quorum singuli rursus tripliciter folia sustinent fastigium.

Descriptio p. 102

Nnnn 2

cata formâ, & positi Lunariz vulgaris, minora, subinde per marginem serrata.

Hanc habuimus munere Agerij siccam sine radice: Clusius pingit cum radice, sine racemis. Totam autem plantam sic describit.

Des. Clu.
fr.

Dodrantalus est planta, statim à radice vnâ aut aliam foliorum alam protrudens, siue folium ramosum & multifidum, frequentibus foliis, vulgaris Lunariz minoris foliis ferè similibus, constas, sed longioribus & crassiusculis, crebriusque incisurâ diuisis, colore, vt in vulgari, viridi dilutiore & quodammodò pallescente: secunda ala, vt tenerior est, & postremò nata, tenui quâdam, sed rarâ admodum lanugine pubescere videtur, succulentior: que est quàm prima: ex eius quasi vtergo, secundum radicem emergit *cauliculus* pinguis & succulentus, sustinens multâ iam & maiorem *vnâ* [florisne an fructûs dicere debeam, hæreo] quàm vulgaris, alioqui admodum similem, quæ an in albam farinam, quemadmodum in vulgari, resoluatur, affirmare non ausim, quandoquidem nondum maturæ erant fuerant, quas accipiebam, plantæ, inter quas vna fuit, quæ ternos botros protulerat: *radix* vulgaris intas, multis fi-

bris latè in ambitum sparsit, crassioribus tamen constat.

Et hanc Lunariam minorem ramosam, siue Lunariz speciem rarissimam, quam Silesij *Rechten videribon* appellant, h. e. *Trichomanes legitimum*, Clusius quidem nullibi nascentem vidit: sed in Silesiæ quodam monte natam & etiam ad ipsum mittebant Viennam Aulicæ Doctiss. viri Frid. Sebizius & Achilles Cromerus, significantes in altis Silesiæ montibus gigni: apparere autem, & florere eodem cum vulgari tempore. Cæterum, Io. Aicholzcius Medicus Viennensis, ad quem etiam mittebantur ab iisdem aliquot recentes eius plantæ, sæpè in hortum suum intulit: sed comprehendere noluerunt, omnem enim culturam respuere videntur, quemadmodum pleræque aliæ montanæ.

C. Bauhin. pin. Lunariz 3. siue racemosa multifido folio: Lunariz ramosa Silesiaca, Cam. Lunariz botryitis *πολύφυλλος* Thal. Lunariz minor ramosa Clus. pann. p. 510. & histor. *Ego Thalij* Lunariz ab hac diuersam facio, & ad præcedentem refero.

Locut.

Synon.
C. Bauh.
m.

Finis Libri trigesimi quinti.

HISTORIÆ



HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER XXXVI.

HERBÆ STELLATÆ ET COGNATÆ.

Nos sat erat artificiosissima natura, florum, fructuum, radicum atque foliorum varias & multijugas ex-
hibuisse figuras, ut etiam ipsorum foliorum in orbem positorum quodammodo stellas perbellè expri-
meret, ut in sequentibus plerisque apparet.

A PARINE.

CAPVT I.

Deseri-
pito.



A B infima radice oriun-
tur viticulæ, quadratæ, as-
peræ, geniculatæ, proxi-
ma quæque scandentes
adhærescentesque: folia
seca. Rubiæ modo, stellæ
instit radiata, singulis ge-
niculis circumnascuntur,
aspera, in spinulam desin-
entia: flosculi pusilli, albi, è quatuor foliolis
compositi, quorum singulis didymæ succedunt
lappulæ, bina semina concludentes, cortice ni-
gro, pulpa alba.

Synony-
ma.



Tom. III.

Anapla Græcis, ut Diosc. & Galeno: *φιλανθρον* &
φιλανθρον seu *φιλανθρον*, Hip-
poc. *ἀμπελόκαρ-
πον*, vel ut me-
lius ex Galeno
corrigitur, *ἐμ-
φολόκαρπον*, aliis
nonnullis *φι-
λάνθρον*, &
φιλανθρον: qui-
buldam deni-
que *ἰζὼν*.

Aparinen, in-
quunt Plinius
& Galenus, ali-
qui *omphacocar-
pon*, alii *Philan-
thropon* ab aspe-
ritate vestigium
tenaci, &c. vo-
cant.

Quum itaque appellationes hæc etiam in his au-
toribus legantur, videntur rectè quoque in Dio-
scoride legi, etiam si non desint qui ipsas cum a-
liis, ad supposititias remoueant. Galenus in gloss.
Hipp. *Phileterion* speciem herbæ esse dicit, quam
Aparinen nominant: & subdit *Plisition* eandem
esse cum Aparine, & *Phileterio*. Et alludunt cer-
tè hæc appellationes ad vocem *Philanthron*.
An verdè *ἐμφολόκαρπος*, rectè dicatur, velut Gale-
nus, Plinius, Paulus, & Aetius habent: aut potius
ἐμφολόκαρπος, ex eo quod semen subcauum sit in
medio, velut umbilicus, ut Dioscorid. ait, dubitat
Cornarius. *Philanthron* autem, quasi hominis
amica, quod vestitui eius adhærescat, dicta vider-
tur. Et ea de causa à nonnullis *Philadelphos* quo-
que appellatur.

Aparinen fuisse primùm *Asperulam* dictam,
& ab imperitiis in *Aspergulam* mutatam, ac
tandem in *Spergulā* & *Spargulā*, testatur Fuchsius
in Nicol. Myrepl. sect. 3. n. 46. & 2. comp. sect. 15.
Tamen Luminare malus negat *Spargulam* esse
eā herbā quā iustici *Rasparolam* dicunt. *Rasparolam*
autem vulgò Aparinen dici refert Apollo
rad. 10. supra Martiat.

In officinis per *Terrabis* intelligi Aparinen le-
gitur apud Cronenburgum lib. 9. de comp. in
Marc. ubi addit, à Pandeotario cap. 52. Apropari-
nen dici, & cap. 377 Lappaginem, hanc tamen ibi
cum Pettonaria eum confundere.

Aparinem *Lappa* genus Cornarius facit. Et
perhibet Dodonæus lubinde Lappam & Lappā
minorem à Latinis appellari. Sed & Lappam
Gaza apud Theophrastum 7. hist. 8. & 14. vertit.
Machiolus contra hallucinari scribit Brassauo-
lum, quod id suo simpl. examine Lappam credi-

Nonu 3

Pandectario
rij error.

Brassauoli
halluc.

derit esse Dioscoridis Aparinen.

Plin. cor-
rigitur.

Plinius Lappaginis speciem esse affirmat. Lappagines autem, ipso auctore, duæ: una aspera, Asperugo, ab asperioribus foliis dicta, ad quod nomen vulgare alludit: altera mollis, Mollugo. Et Aparine quidem Asperugo est. Lappago, inquit Plin. lib. 26. cap. 10. similis Anagallidi [forte cum Dodonzo melius legeris Galio] nisi esset ramio-
rior, ac pluribus foliis aspera, rugosa, asperioris succi, grauius odoris: quæ talis [mollis forte le-
gendum] cum Dodonzo est, Mollugo vocatur: ~~nam~~ sed asperioribus foliis, Asperugo.

Synony-
ma

Aparine Brur felf. Trago [cui & Aparina, & Vilens] Manthiol. Fischl. Anguill. qui in Græcia ~~καλαμίσκος~~ vocari scribit [Dad. Cordo in Diosc. Lac. Tora Hor. Lu. E. mta. Nomencl. pamm. Poræ phya. [vbi conceptum viperarum imitari ait. [Lob. in A. in Obi p. 4. q. & Lappago aspe-
ra] & Icon. p. 809 & H. Lugd. pag. 139. Czf. & Castori. Aparine aspera. Thal. Aparine i. si-
ue vulgaris, C. Buh. pin. vbi meminit Aparines alterius purpureis floribus, quæ nondum vidimus.

Nomina
lingua-
rum.

German. *klebkraut*, & *Nabelamen*, h. e. Semen umbilici: & quibuldam *kleben*, q. e. Lappa. Belg. *Cleeb* oder *cleefruyt*. Gall. *Reble*, ou *Grateron*. It. *Speronella*. Hup. *Preffera*, *Amar di hor-
tulan*. Ang. *Goshard*, *Skuer*, quid vestibus adhaereat. Sic & Hung. ab adhaerendo, *Raga-
duany* dicta.

Locus.

Exit iuxta margines agrorum, & quandoque in ipsis agris frugibus permixta: item secus vias, scrobes, lepes, & inter lentas. Æstivis mensibus ubique frequens. Flores quandoque etiam quan-
doque Vere, & interdum Autumno profert. Theophrastus & Galenus in Lente eam coales-
cere scribunt, & amplexu suo eam suffocare: eoque modo illi gravem ac molestanti esse.

Vit.

Aparine, inquit Dioscorides, pastores coli vi-
ce utuntur, ad eximendos è lacte pilos [nimirum circum actis per hoc foliis quorum asperitas adeo tenax est, ut facile quicquid tetigerit, apprehen-
dat, nam & vestibus hæret præterentium.] Se-
minis caulium, ac foliorum succus, potius contra viperarum, phalangiorumque morsus auxiliatur: infusus aurium dolori medetur. Herba cum azungia trita strumas discutit. Sanguinis etiam abundantiam ex vulneribus seprimere folia im-
posita Plinius tradit. Modicè autem ut Galenus ait, extergit, & desiccet, habetque nonnulli lub-
rilium parvum. A quam destitutam bis in die meolura tritum ligularem potam, aiunt alium cohibere, efficiat illius anque esse aduersus mor-
bum regium: Tragus.

Vites.

Temper.

RVBIA VETERIBVS.

CAP. II.

Erythro-
danum.

Erythrodanum, h. e. Erythrodanum, [ab *ἐρυθρός*, h. e. ruber] seu Ereuthodanum, aliquibus *ῥυθρον* vocatum, radix est rubra, tin-
gendo idonea, Dioscoridi, cui duplex est. Una quidem silvestris, sariua altera, ut in Thebana Galileæ, & Rauenæ in Italia Sed & in Caria inter Oleas feritur, velut in aruis [scilicet de *ῥυθρον* aspe-
rat, vet. caret.] Vultus autem colitur [scilicet *ῥυθρον* aspe-
rat, addit Lac. ex vet. cod.] quod multo polleat quæstu, ex eaque amplissimus redditus percipitur. Sunt ei caules quadranguli, longi, asperi, quales Aparinæ: sed omni ex parte maiores, atque ro-
bustiores, foliis in orbem per intervalla, nempe circa singula genicula, stellæ modo decussatim

Descrip-
tio.

radiatis: *femine* rotundo, inter initia viridi, mox rubro, ac postmodò, cum ematurus nigro. Radix est tenuis, longa, rubra.

Erythrodanum Theophrasto 6. hist. 1. plura sunt genera, summiſque differentiis discreta: & 7. hist. cap. 9. radices rubicunda. Verùm 9 hist. 14. folia Hederæ, sed rotundiora Rubiam (*ἐρυθρόδανον*) habere scribit, nasci humi velut Gramen, loca amare umbrosa, ciere urinam, idèoque huius usum esse, ad lumborum & coxæ dolores. Cæterum Ereuthedanon hoc, si mendo exemplaria ce-
rent, à priori multum differens est. Sunt qui Numulariam putent: sed vires non convenire pos-
sunt. Licenter nimis asperum caulem spinosum vocat Plinius lib. 19. cap. 3. Spinis Erythrodanon ca-
rere Theophrast. aperte docet 6. hist. 1. Porro quod ibidem tradit fructum eius rubrum esse, fructum principio virere, deinde demum rubere, & cum maturus est, nigrescere monuit Diosco-
rides. Sic verò idem Plinius lib. 24. cap. 11. Alia est Erythrodanum (ab Erythro, siue Rhoë, qui fructu est) quam aliqui Ereuthodanum vocant, nos (Itali) Rubiam [à radicis colore] quæ tin-
guntur, lappæ, pellèſque perficiuntur. Distat ab eo, qui Alysson vocatur, foliis tantum & ramis minoribus. De Alyſſo Plinij plura suo loco.

Genera
plura
Theo-
phrast.

Paulus Aegineta *ῥυθρον* quoque nuncupari re-
fert lib. 3. c. 2. & *ῥυθρον* præstat à Romanis: Dodo-
næus tamen *ῥυθρον* legit. Eandem ibidem *ῥυθρον* agnoscit etiam cognominat, & præstat. Sunt præterea quibus *ῥυθρον* dicitur: alius *ῥυθρον*, à rubicundo colore. Marcellus antiquus scriptor etiam Polygonon appellat. Idem tamen Millefolium, Sanguinalem & Verbenam Polygo-
non quoque facit.

Thapſia
Pauli.

Rubig.

Tragus præterea Euthron [sed malè fortè pro Teuthron] & Sophabi apud Dioscoridem no-
minari scribit: apud Marcellum verò Florenti-
num, à vulgo Radicem & Manum picantem, quod asperitate sua tractata manibus picis modo hæreat, vocare tradit: à Serapione Pauc, Gale-
no Rhodiam (Rhobiam legendum) shizam. Ipse verò vocari ait Rubiam & Rubeam tinctorum, Spargulam veram tinctorum. Crocum va-
licum quorundam, Roxam, Roxami, Falmam, Rodiam, & Enam, Diximus Rhodiam pro *ῥο-
ῖον* falsò legi.

Manum
picantem.

Tragus
corrig.

Rubiam sariuam à Dioscoride descriptam ni-
hil aliud esse affirmat quam Thapsiam Alclepiadis, Anguillara.

Rubiam Dioscoridis notam ait Cornarius in multis Germaniæ locis, & nasci in Spirensi agro, à sultionibus & tinctoribus maximè expectam. Dodonzo verò Rubiæ propriè species nullæ sunt. quamvis hodie plures cognite sunt plantæ, de quibus deinceps agemus.

Rubia
Diosc. h. e.
dia nota.

RVBIA SATIVA.

Sarmentum longa producit, quadrata, vinctu-
lis crebris hamata, geniculata, ad quæſu lin-
gulos nodos folia rotatim radiata circumponun-
tur, Aparines modo, sed multis numeris maiora, confimiliter aspera, hispida crenulis per ambitum incisa, vestibus tenaciter hærentia: ex quorum alis pediculi exeunt, flores sustinentes ex luteo herbidos, stellatos, quinque folijs constantes, apiculis luteis: quibus *femina* succedunt rotunda, per maturitatem nigra: radices subsunt nu-
merosæ, reptantes, succulentæ, rufæ, miniatæ, duæ,

Descri-
ptio.

durâ lignosâ matrice factâ, sapore mixto, dulci, acerbo, & subamaro.

Synon.

Rubia Cordo & Corp. in Diosc. Anguillar. Dodon. lat. & Cæsalpino qui Theophrastum folio Hedera d. scripsisse ait, se tamen talem non vidisse. Rubia sativa. Brunf. Trago (curus plora nomine priori titulo adscripsimus) Matth. [qui suis comm. figuram sine descriptione applicat.] Fuchl. Dol. gall. Gesner. hort. Lacun. Turn. Lon. Fracast. H. Lag. p. 1329. & Castoli. Rubia major, Lobel. in Adn. obs. p. 463. Ic. p. 768. & Clus. Hist. Rubia tinctorum, offic. Rubia l. sine tinctorum sativa C. Bauh. phyt.

Nom. ling.

Grazie ipudisator & ipudisator Germ. ferber Rote, aut simpliciter Rote; Embrimsch Rote. Rubia domestica Matth. Belg. Grappe & Alee; & pulvis radica, Meerappen. Gall. Garance; Ital. Rubbia, vel Robbia; Hisp. Ruina, Roya, Granza; Angl. Madder; Boh. Marena.

Locus & Tempus.

Scribitur Rubia non paucis Italicis Hispanis & Gallis, nonnullis etiam Germanis, præsertim apud Silesios, & plurimis Belgis locis, pingui secundoque solo. Æstare florescitur, semenque facit. Maio ac Iunio radices leguntur, quæ resiccatæ & attritæ in usus & medicinz & tinctorum veniunt.

Rub. ap. ritina Diosc.

Rubiz radix, inquit Dioscorides, ciendæ urinz vi prædita est: qua de causa arquatis auxilium pota cum aqua multa: itemque ischiadicis arque paralyticis. Crassam porro copiosamque urinam pellit, ac interdum etiam sanguinem: bibentes tamen quotidie lanari oportet, & excrementorum quæ redduntur differentiam contemplant. Contra serpentium morsus caulem cum foliis imponere prodest. Semen verò ex aceto mullo porum lienem absorbit. At subdit radix, partus menses, secundasque trahit. Albæ quoque vitiligini illita ex aceto medetur. Subdit Plinius, Rubia tinguntur lanae, eaque pelles perficiuntur: in medicina urinam citat: morbum regium sanat ex aqua multa, & lichenas ex aceto illita: & ischiadicos & paralyticos, ita ut bibentes lauentur quotidie. Radix semenque trahunt menses, alium, sistunt, & collectiones discutunt. Contra serpentes rami cum foliis imponuntur. Folia & capillum tingunt. Inuenio apud quosdam morbum regium sanari hoc frutice etiam adalligatus spectetur tantum. Galenus 7. simpl. rubram tinctorum radicem, Rubiam esse dicit, eamque acerbam & amaram, proindeque præstare omnia ea quæ ab huiusmodi facultatibus sperari possunt: nimirum quæ Dioscorides recensuit.

Typeram. ex Dodon.

Rubiz autem radices ut potentiam ac vim haud obscurè adstringentem obtineant: ita quoque natura ac temperamento, frigida sunt ac sicca: partes interio nonnullas tenues habent, quarum potentia color earum facile permeat: aded ut & urina assumentium ab his tingatur, inquit Dodonæus. Gustatæ liquidem acerbum saporem referunt, cum exigua tamen quadam dulcedine, primò occurrente, quam acerbâ & adstringens mox excipit qualitas. Quod non modò à nobis, sed & ab Auicenna observatum, qui cap. 58. Rubiz radicem pontici esse saporis scriptum reliquit. Commendatur vetò passim Rubiz radicem decoctum, tuptis, cælis, vulneratis, ex alto præcipitatis: flores reprimere, inflammationes mitigare: offensas quassatasque partes ad sanitatem perducere creditur. Miscetur his de causis portionibus, quas vulnerarias recentiores appellant. In quibus tantam earum vim ac effi-

caciam, Matthiolus quoque esse refert, ut etiam thoracis & intestinorum lethalia vulnera his curari posse speretur: Accedit huic sententia Io. Siringus, qui in chaplodis suis annotatum reliquit, Rubiz decoctum cum Triphera magna exhibuit valere aduersus fluxum menstruum, hæmorrhoidum, & dysenteriam: idque eundem experimentis comprobatum, quod Rubiam adstringentis esse facultatis confirmat. Idem sentiunt cum Dodonæo Erasius & alij. Vnde constat: extergendi aut aperienti potentiam Rubiz nullam vehementem esse: & Dioscoridem huiusmodi vim ei temere tribuisse: ac post eum Plinium, Galenum, & posteriores reliquos, in verba eius iuratos. Et hinc manifestè hallucinari deprehenditur Fallopius, qui Rubiam in portionibus vulneratis seu pessimum medicamentum damnauit, eò quod ora venarum in tantum aperire crediderit, ut etiam cruentum lorium docere, literis confirmat. Et Timoth. Reilin. qui in suppress. mensium huius puluerem cum saccharo exhibet.

Contra
Dioscor.
Plinium
Galenum
que &
alios.
Fallop.
halluci-
natur.

Tim. Ro-
stin. la-
psus.

Cæterum inficiendis lanis aptissima Rubia. Experuntur folia Senenibus mulieribus ad stan-nea vasa detergenda: liquidem mirum dictu quam pulcherrimè natescant, quæ Rubiam fuerint experta.

Rubia siluestris Monspefulana maior:

Monspelij passim prouenit: Vere flores profert paruos, luteos: fructum fert Æstate & Autumno, qui per hiemem durat: sed nec ipsa herba inarescit: inter sepes minor est, & asperior satina.

Locus & tempus.

Lob. obs. p. 463. Rubiz maximæ varietas, C. Bauh. pin. Rubia l. sine siluestris aspera, quæ siluestris Dioscoridi: Trago. Rubia erratica & siluestris: Cordo obs. sylvæ, Rubia silu. vera. Cæf. Rubia silu. in Etruria.

Synon:

ALYSSON PLINII FOLII

Eriothodani.

CAP. III.

Dicit inquit Plinius lib. 24. cap. 11. ab Eriothodano, qui Alysson vocetur folijs tantum & ramis minoribus: nomen accepit, quod à cane commorlos rabiem sentire non patitur, potius ex aceto, adalligatusque. Mirum est quod additur, infaniam [Cornar. singultum legendum putat] sanari, eo frutice conspecto. Sed adhuc alia lectio hæc est: Mirum est, &c. sanem siccari. Platarchus tamen 3. sympos. scribit Alysson. si manu teneatur, vel omnino aspiciatur, singultu liberare: quo loco pro *λυσσον* quidam legendum putant *λυρρον*.

Alysson
cur ab-
sum.

Plinii di-
uersales.

Alysson:
Plin. di-
versales.

Alysson autem hoc Plinij Dioscorides historiz nihil conuenit. Sed nec cum Alyllo Galeni, folio Præsi, flore ciano, 2. de antid. quicquam commune habet, ut ij prorsus reiciendi non sint, qui Alysson Plinij, herbariorum Asperulam cum Gesnero esse putant, authore Dalechampio.

Alysson
Plin. di-
uersales &
Diosc. &
Gal.

Est etiam apud Pausaniam, in Arcadici Alysson fons, oppido Cinethæensium vicinus, cuius aqua pota sanat à canerabido commorlos.

Alysson
fons:

RUBIA ANGVLOSA ASPERA

& parua Geneuensis.

CAP. IV.

Minus rubet huic radix, quam satina: maiori, minutque salivam tingit masticata, sa-
pior,

Descri-
ptio.

pore tamen non multum dissimili, tenuis, lignosa, albâ matrice refecta: huic surgunt *Flagella* longissima, quadrata, nonnihil rubentia, geniculata: quibus ad nodos *folia* stellatim adnascuntur.


Descriptio.



fructus.

An *Rubia* quadam minor.

Varietas.



Matth. nos.

Camer. error.

Lob. icones dua.

Cetera Synonyma.

Locus.

Temps.

Apartines modo, sed læuis, cuiusmodi est & reliqua planta: *flores* Gallimore dense stipati, seu colore albo, quatuor foliolis acuminatis constant: *semen* Maioris Rubiæ semini respondet, sed minus nonnihil est.

Figuræ Guariniæ hic posita, unam eandemque plantam denotare videntur. Geneuz obieruat parvam Rubiæ speciem, cum Cynanchia, in pratis florentem, vix pede altior: ei caules tenues, graciles: *folia* sex, vel septem angusta, Gallij seæ sed breviora: *flosculi* albi, quadripartiti, multi simul iuncti, minores, multo & breviores quam Cynan-

chiez, odorati: sapore nullo manifesto.

Matthiol. in suis comm. Rubiam siluestrem sine descriptione ponit & sub titulo non convenienti: quia non est Rubia silu. Dioscorideæ. Camer. apud Matthiol. in h. germ. & Epit. malè sub titulo Rubiæ silvestris, Rubiis accedentem. Asperulam pingit. An Mollugo Clusio? Lob. in Obs. p. 408. & Ad. dicitur Rubia silu. minor: in Ic. p. 798. Rubia silvestris. Habet & huius plantæ aliam figuram p. 801. sub falso titulo nempe Molluginis Delgarum, & Molluginis montanæ Dodonæi.

C. Bauhin. pin. Rubia 3. siue silvestris læuis: Rubia silvestris, Brunfels. Matthiol. Fuchs. Dod. gall. Gesn. hort. Lac. Turn. Lon. Lob. Ic. pag. 798. Hist. Lugd. pag. 1319. Camer. Cast. Thal. Tab. & Gerardo.

Plurima nascitur tam in Germaniæ silvis, quam Angliæ, Galliæque: copiosissima in Vecti insula: at pulcherrima maximaque apud Vincetstriam, in itinere Southantonensi. Geneuz quidem circa dumetâ Februarij principio florebat Monspelij, Lugduni & Paravijs florebat Maio: Basileæ à Iulio in Augustum usque.

RUBIA PRATENSIS LÆVIS

acuto folio C. Bauhini.

CAP. V.

EX radice caulis cubitalis, lævis, quadratus, rufo-fuscus; geniculatus, canus, & communiter vnus exurgit, ex cuius nodis ramuli semipalmates prodeunt, quorum summis *flosculi* plures quadri-folij, pallidi insident: *folia* lævia, quaterna, vncialia, in acumen abeuntia, ad quemlibet nodum in orbem disposita sunt.

Descriptio.

Rubiam hanc pratensem lævem acuto folio, 1. in prod. 4. in pin. apud Valesianos in pratis ad thermas Leucenles natam aiunt, ac etiam in pratis Lipsiensibus reperiri, inquit auctor.

Synon. Locus.

RUBIA ERECTA QUADRIFOLIA.

CAP. VI.



Locus.


Descriptio.

Rectum hoc Rubiæ genus, Geneuz, in Rhætia & alibi occurrit: caules eius non planè cubitales sūt, firmi, quadranguli, in ramos diuiscati: *folia* quaterna. Rubiæ minoris, solida & dura, geniculis circumposita: in ramorum cacumine *flores* copiosi, albi, tucūdi odoris.

Olim quidā sup̄spicabatur Spergulariæ Dodonæi, propter figuræ aliquam similitudinem. Verū ab ea multum differt: caulis enim inter cetera illi rotundus est. Floret Iunio.

RUBIA SILVATICA LÆVIS.

CAP. VII.



Descriptio.

Amosa Rpiæ reliquis est hæc, caulibus rectis læuibus, teretibus, tuberosis geniculis nodosa, per longa intervalla interceptis: *folia* circum articulos radiatim posita, Asperulæ odoratæ, mollia, ac quàm in Rubia angulosa molliora: *flores* summis ramulis & per surculos tam copiosi vt mus-

carium imitentur, candidi.

Summitas florum & striz in caulibus nostræ conis Fuchsianæ non placent. Huius alium ramum sequenti cap. pingimus.

Icones.

Trago, Matrisyluæ cognata, Matrisylua secunda,

cunda, *Asperula recentiorum*. Gener. hort. Rubia syluatica altera, siue folijs lauibus: Eid. app. Rubia syluatica major: Item coll. Alysson. Plinij maxus, *großwäld Meisler*. Dod. purg. & in fol. lat. Mollugo montana, Lappaginis species: Mollugo montana Dodonzo descripta, Thal. Mollugo altera montana Dodonzi, H. Lugd. p. 1089. Lob. obs. p. 466. Ic. p. 801. Mollugo Belgarum, Mollugo montana Dodonzi. An Mollugo Clusij? An Mollugo montana Tabernemourani?

Locus &
Tempus.

Montium incola hæc est, & in dumetis non raro abscondita: mensis Aprilis principio prodit: Iunio floret. In asperis quibuldam juxta Rhenum ad Mosam montibus nasci prodit Dodonæus.

GALLIVM LATIFOLIUM, CRUCIATA quibuldam florè luteo.

CAP. VIII.

Descript.



Multos à radice, compluribus fibris capillatâ, repantēque caules, profert, dodrantales & plulquam cubitales, genicularos, quadratos, striatos, hirsutos, ad quorū singulos articulos quaterna folia in crucis formam disposita, hirsuta, oblonga, mucrone obtuso nonni-

hil, sapore amaro: ad quorum ortum oriuntur fasciculi cruciformes, verticillari, quatuor foliolis lateis tandemque concoloribus flaminibus compositi.

Gallij secundum genus, Trago: Gallion, Turn. Gallium latifolium, Schvv. Crucata, Dod. gall. & lat. vi. Gesn. hort. quæ Gallio cognata, Cam. Cast. Ic. Crucata, Cæsalpino, (tenuit Maranthæ, dubitat Hermolaus.) Crucata herniaria, Thal. Crucata: siue hirsuta, C. Bauh. pin. Crucata autem ac Crucialis nominatur à foliorum cræcis in formam suam, licet ad Aparines & Rubiæ si similitudinem aliquomodo accedat. Inguinaria etiam Plinij dicitur à quibuldam, forte quia in herniis & rupturis plurimum præstare sibi persuadent.

Trago germ. *dasz ander Megerkaut*: alijs *Geldevalde Meisler*, hoc est *Asperula aurea*, ut Lob. alibi verò *Geslb. Krenzkaut*. Siles. *Gele Gluegonge*. Belg. *Cruseis*: Gail. *Criseis*.

Nomina
linguat.

Locus &
Tempus.

Genevæ Martio provenit Basilæ & Montebelgardis passim in sepibus, Maio floret: in Italia inter V. n. en. s. n. & Villanovam. Dodonæo teste juxta fossis, aquarum rivulos, & quandoque agrorum margines, inter sentes, à Maio in finem usque ætatis reperitur, & quidem cum flore.

Vires &
vita.

Cæterum facultate Crucata Dodonæo nonnihil videretur habere ad strictionis, simul cum re-
Tom. III.

siccatione. Recentiores inter vulnerarias distas numerant: & recentes aiunt ramicem hac curari posse, decocto ejus aliquot diebus potio, herbâ verò ipsâ loco impostâ. Folia amara ait Schwenckfeldius, abstergere & calefacere, atque siccare. Potam thoraci, ventriculo, venis melsaricis, & visceribus obstructis prodesse, excrementa pituitosa foras propellere, appetitum juvare.

RUBIA QVADRIFOLIA, GLABRA, angustifolia.



Hæc, quàm Gallium Descri-
ptio.
Tragi secundum, gracilior & delicatior esse videtur: foliorum, cætero qui ordine & posita haud absimilis: Verùm angustiora sunt, acutioraque, glabra omnino dicerentur, nisi per ambitum tantum exigua quadam hirsutie simbrata essent. Cauliculi toti glabri sunt.

Ab Agerio propè Patavium in Italia collectam nomine Cruciatæ glabræ accepimus.

Figuræ huic ramum Gallij secundi Tragi adpingi curavimus, cum Guariniana nostra non vique adeò feliciter videatur facta.

Locus

Gallium latifolium glabrum, C. Bauh.

Radice est tenuis, repente, geniculata: cauliculi tenellis, quadrangulis, genicularis, palmo minoribus: folia è singulis internodijs quaternis, decussatis, glabris, instar Plantaginis, recuosis, palidè virentibus, & sesquijuncialibus: flores habet parvos, cauliculos verticillari coronæ modo ambientes, luteus, brevibus pediculis donatos.

Descri-
ptio

Rubia quadrifolia rotunda, laevis, Einsdem.

Ex radice capillacea rufescente, cauliculi tenues, quadrati, geniculati, palmo altiores, quorum aliqui in ramos brachiati, exsurgunt: ad singula genicula folia quatuor rotunda, nervosa, tantillum aspera, in orbem disponuntur: extremis cauliculorum, fasciculi albi, quadrifolij, pedicellis capillaceis insident, quibus capitulum parvum, geminum, asperiusculum, succedit.

Descri-
ptio

Rubia hæc quadrifolia rotunda laevis, 3. in prod. 12. in pin. in montibus Helueticorum, ut Gotthardo, & ad Eremitanos provenit: hanc & circa Argentinam crescere dicunt.

RUBIA QVADRIFOLIA ITALICA hirsuta.

CAP. IX.

Plehra est hæc Rubiæ species, caulibus cubitalibus & majoribus, quorum geniculis qua-
Descri-
ptio.
ooo

terna decussatim folia circumposita, formâ plan-
taginæ, nervosa, acuminata, mollia, subhirsuta,

dus seîdè vo-
cias longa, vni-
ciam circiter
lata: flores no-
dis verticilla-
tim circûnasci-
cuntur, circa ba-
sin decussatis
folijs suffulsi,
candidi.

An Hermod-
coroll. 331. A-
lyssû cû quinis
folijs, flore al-
bo? Lobel.

Obs. p. 465. Ic.
pag. 806. Ru-
bia levis Tau-
rinensiu C. Bau-
hin. pin. Rubia
10. siue quadri-
folia, vel lati-
folia levis. H.

Ludg. pag. 1310. Rubia levis Taurinensium Lo-
belij. loc. h. Burs. Rubia latifolia albo flore glo-
buloso. Eandem accepi ex Italia (vbi & ego eam
collegi: Burierus juxta Lucernam reperit) dela-
tam, nomine Stellariæ cruciferae.

RUBIA QUADRIFOLIA, SEMINE Duplici hispido.

Colliculus
Chaber do-
drante mino-
res, multos ex
tenuibus, re-
præbus, inuti-
libus, radiculis
surgentes, qua-
dratos, folijs
quaternis cit-
cum nodosile-
cussatim posi-
tis, ad Alfinem
vulgatam accè-
dètibus, mino-
ribus quâ Ru-
biæ quadrifoliæ
Italicae, subro-
tundis, viciâ
minoribus, ve-
nosis, nonnihil
pilosis, cû dul-
cedine quadâ

amaricantibus, ornatos. Cauliculi scapûs in ra-
mos bînos, hi rursus in ternos, folijs viduos
subdistillantur, in quorum summitatibus, semina
bina, hispida, multo minora quàm Stellariæ, ni-
gricantia.

Neminem reperio qui hanc rubiæ speciem
descripserit, quam nusquam etiam observavi,
præterquam in monte Rosberg propè Malocoe-
nium [Matzmunster Germani vocant] mense
Octobri, inter saxa, locis umbrosis & frigidis.

RUBIIS ACCEDENS, ASPERVLA quibusdam, siue Hepatica stellatis.

CAP. X.

Compluribus geniculis intercepta radícula
Ctenella summâ cellulae serpit, capillaribus si-

bris demittitur, unde cauliculi surgunt, tenues, qua-
drati, palmates & dodrantes: ad quorum sin-
gula genicula, folia radiatæ Rubiæ posita nascun-
tur, subhirsuta: circa fastigium dividitur caulis in

binos ternos-
ve ramulos, ex
quibus pedi-
culi flosculos
sustinent lue-
niter olètes.

Valeriana se-
rè formâ, cadi-
dos, è quatuor
foliolis cõpo-
sitos: semè par-
uum rotundû.

An Cæfalp.
Rubiæ silue-
stris genus
quoddam, bre-
viori caule cõ-
stans, secunda
subaspero ac
nigro? An cid.
Alysson Her-
molai?

Descrip.

An Rubia
silu. genus
aliquod.
Caf.

Camer. apud
nos.

Marth. in h. germ. & Epit. malè pingit & descri-
bit Asperulam nostram pro Rubia siluestri.

Theodorus Dorst. Iconem Hepaticæ stella-
riæ apposuit quoque Caprifolio, sed ei hand
congruit.

Trago Galatij genus, & tertium quidem esse
videtur. At infelicitè nomen exprimit, dum
Gallion Dioscoridis esse definit Matrisyluam.

Stellaria hæc herbula malè pro Caprifolio
apud Brunfelsium pingitur Caprifolium enim
longè alia herba, imò quasi frutex est. Hepatica
3. ei melius dicitur in 4.

Ignaris pharmacopœis Herba moschata, &
Ina moschata dicitur, pro qua etiam non sine
errore vtuntur.

Quibusdam Alysson Dioscoridis videtur, sed
folia non respondent. Lonic. Matrisyluam, Apa-
rines speciem dicendam statuit, è semine se. lap-
pæo, quod vt Apparine vestibus adhaerescat. Ast
hæc ratione facile quoque Lappam, Aparines ge-
nus quis dixerit. Nos propter florum & folio-
rum similitudinem Rubiis adjungemus.

Matrisylua, Trago, Cordo in Diosc. Lonic. &
Thalio. Marei silua: Hier. Brunsch. Asperula.
Dod. gall. [cid. Herba stellatis & Spargula odo-
rata] Frac. & Gerardo: Asperula Dodonæi, H.
Ludg. pag. 876. Asperula odorata flore albo, Dod.
lar. Eid. de flor. Asperugo Plinij. Hort. Lus. As-
perula siue Aspergula, odorata Matrisylua.
Asperula, odora Dod. purg. Cast. & Clus. pann.
& hist. Aspergula, pande. à Morero reform.
cap. 61. Asperula aspergula, Disp. Colon. p. 11.
Asperula aut Aspergula odora nostras, Lob. in
Adn. (vbi quæritur an Mollugo, aut Asperugo
Plinij) in Obs. p. 464. & Ic. p. 801.

Rubra syluatica aspera Gesn. hort. Rubia
syluatica alia minor, Eid. app. Alysson ex
descriptione Plinij, In cat. Alysson Plinij
minus, Collect. Alysson denique Eid. hort. vt
& Lac.


Hepatica stellata, Tab. Aparine siluestris qua-
dam, Cordo in Diosc. Asperula. siue Rubiola
montana odora, C. Bauh. pin.

Germani herba freude, hoc e. Cordis lætitiæ,
& Cordialem nominant: Alij leberkraut, Hepa-
tariam, Hepaticam, Epaticam & Iecorariam:

Nomina
liogugi

elij

Synon.



Descrip.



Loces.

lij Sternleberkraut. Hepaticem Stellarem: Ex quo in silvis maximè reperitur, idèd vulgariori nomine, vvaldenreifer & vvalde Mantia vocant: Belg. vvaldenreifer, & Leuvenreys. Holl. evenreack: Gall. Muguet.

Locus & Tempus. Apud Belgas, ubi Maio, Iunio, ac seriùs floret, hortenlis est. In Germaniæ montibus, ac etiam monte Iure spontè reperitur, Iunio & Iulio, in silvis locis opacis, pingui solo.

Vires & usus. Facultatem hanc, Gallio aliquatenus similem, sed tamen imbecilliosem tribuit Dodonæus. Fertur in vinum coniecta hilaritatem efficere, cordi ac tecinori prodest. Reperitur hodie in celebrata illa portione vulnèraria, *das Ballwunderisch wunde swack*, vocata.

RUBIA CÆRVLEA ERE.
Ror clausore.

CAP. XI.

Descriptio.



Plurimum hæc differt à parva illa repente Rubia. Hæc siquidem caulis surrigit cubito maiores, angulatos: foliis vestitos ad genicula radiatis, multis, molluginis paribus: ramulorum extremis hærent ex longo pediculo flores multi simul iuncti, oblongi, cæ-

rulei, circa imum hirsuti, quibus circūposita radiata folia aliquamulta, pilosa, flores superantia, eosque veluti occultantia. Ad Rubiolam hæc cæruleo flore refertur Alysson Turn. à C. Bauhino. Nos potius ad sequentem reducendam æstimamus.

Synon. Dod. Asperulum cæruleam inscribit, ut & Lob. in Ic. p. 801. & obs. p. 464 ubi Alysson Galeni perperam vocari scribit. H. Lug. p. 870. Asperula cærulea Lob. Cam. hort. Asperula flore cæruleo. C. Bauh. pin. Asperula 2. sine cærulea aruensis.

Locus & Tempus. In Flandriæ plerisque agris spontè exit: annua est, sed ex deciduo semine seipsam ferit. In horto mihi floruit Maio, Genevæ & Lugd.

Rubia parva flore cæruleo se spargens.

Descriptio.

Palmam non temere excedit pumila hæc Rubia, coliculos per terram spargens, plures, quadratos, rubentes, hirsutos, & interdum ramosos: folia radiata pro plantulæ portione satis lata, hirsuta & asperiuscula: flores in medio aliquot foliorum, Alparines, sed colore dilutè purpurascens: vascula exigua singulis floribus succedunt gemina, coherentia, nonnihil oblonga, & in summo digitata, in quibus semen fulvum, alterâ parte gibbum, alterâ planum. Radix subell tenuis, dura, lignosa.

Synon. Turneron hanc intelligere credimus per Tom. III.



Alysson Plinij & Dioscoridis: Dalechâptum, & H. Lugd. p. 1324. per Alysson sine Stellatam, Monspeliensium cognominatam. C. Bauh. in pin. per Rubiolam sine atensem repentem cæruleam: quæ in pred. Cam. hort. per Rubiolam atensem, flore cæruleo, in agris Bavarie Itemque Hassiæ frequentem.

Genevæ, ubi altitudinem pedis aliquando assequitur, floret in agris Februarii mensis principio: Monspelij Martio: circa Basileam adhuc Octobri.

RUBIA QUADRIFOLIA
verticillato semine.

CAP. XII.

Faciei gratia meritis sanè Rubiis annumeranda plantula. Radix exigua vititur, nigricante, longissimis floribus per terram suâ: surculi exuviosum, rufi, palmates, rigiduli, repandi, humique sparsi, crebris internodiis distincti, quæ foliola quaternaria exigua, rotunda, nullis pediculis adhærescunt: Ex quorum rufus linea



diculis adhærescunt: Ex quorum rufus linea

flosculi apiculorum modo luteoli emicant, verticillatim aggregati. Quos *vascula* sequuntur triquetra, rigidula, albicantia, ac veluti rostellum asperiusculo donata: quæ vertebam spinæ serpentis figurâ pulchrè æmulantur. Eorum, vi & foliorum densior stipatus in extremis, quàm propter radiculam: Huic plantæ natura saporem amaricantem impressit.

An Cæsalp. Crucialis quædam minima in maritimis, quatuor digitorum altitudine: fructu in orbibus pungente?

Sapor.

Synonyma.

Locus

C. Bauh. pin. Asperula 4. siue verticillata luteola: Asperula verticillata muralis minima, Columnæ.

Colle&am detulit gener Cherlerus ex asperis & saxosis propter Nemausum.

RVBEOLA SAXATILIS, C. BAVH.

CAP. XIII.

Descriptio.

Locus

Plantula est tota incana, semipalmatis, cauliculo tenui quadrato, geniculato, in viciales ramulos brachiato *floris* parua, aspera, angusta, acuminata, communiter octo, totæ modo disposita habet: ramulorum summis *flosculi* plures, exigui quadrifolij, apicibus & minimis pedicellis donati, luteoli insident. In saxosis Galloprouinciæ prouenit Rubeola hæc saxatilis, 6. in prod. Rubeola 3. in pin.

Rubeola maritima aspera, C. Bauh.

Descriptio.

Synonyma.

Radice est oblongâ, tenui, reptante & rufescente: cauliculis pluribus, geniculatis, biuncialibus, per terram sparsis, & capillaceis fibellis terræ affixis, foliis pluribus, breuibus, acuminatis, virentibus & asperis, cauliculos inordinate cingentibus: *flosculis* minutis, pallidulis. Hæc Rubeola maritima aspera 7. in prod. Rubeola 4. in pin. copiose in littore maris Mediterranei non longè. Monspelio, & etiam Massiliæ occurrit.

Asperula hexaphyllos purpurea.

Descriptio.

Locus

Quam C. Bauhin. in pin. Asperulam siue hexaphyllon purpuream nominat, ea apud Hist. Lugdunensem p. 117. Myagri alterius minoris Dalechampi intitulatione pingitur, & ab herbariis quibusdam exhibetur, *radiculis* multis, candidis, tenuibus, *foliis* Erythrodani, minoribus, pallentibus: *cauliculis* multis, pede altioribus *floris* in summo cauliculorum vertice copioso, purpurascens: *semine* minutulo, pingui & oleoso.

GALLIUM VETERIBVS ET IN genere. CAP. XIV.

Nympha.

Gallipos.

Gallium, siue Galerium, aut Galatium (*γάλλιον, γαλλίριον, γαλάτιον*): nomen ex eo traxit, quod coaguli vice γάλα lac cogat & coagulare teste Galeno & Dioscoride, qui ipsum ramulo folio Aparine simillimo, ipsò iue recto, & in summo flore melino, tenui, denso, ac multum odorato, describit.

Gallij appellationem Plinius ad Galioposin retulit. Cæterum, plantæ, quibus Gallij vox ascribitur, plures occurrunt, de quibus posthac separatim dicturi sumus. Rectius autem sentire eos nulli amplius dubium sit, qui Galion plantam illam constituunt, quæ propter foliorum tenuitatem in omnibus Aparinæ simillima est, atque inter cæteras notas florem luteum in cacumine possidet. Maxime verò decipiuntur, qui

Galion Dioscoridis eam esse plantam existimant, quæ Crucialis herba à nonnullis nuncupantur.

GALLION VERVM: ET NON-nullæ Gallij species.

CAP. XV.

Fractu contumaci *radiculâ* donatum est, longo tractu repente, tenui, lignosâ, fuscâ: ex qua



virgule surgunt *Descriptio.*
dorsales, & cubitales, tenues, subhirsutæ: *folia* ad geniculæ interuallis radiatim caulem ambiunt, longiora & angustiora quàm Rubiæ filuestris, leuia, nitentia: *flosculi* copiosi in racemulos digesti, odorati quorum singuli quatuor foliolis stellarum radices imitatis constant, succedentibus unicuique binis *seminibus*.

Gallium hoc flore luteo inter Gramina prouenire, & ingruentem tempestatem suavissimo odore pronunciare, suauis ique etiam apparente lide olere, testatur Camer. hort.

Synonyma.

Gallium [vt Matthioli Lac. & Castor vocant] officinas ignorare falsò credidit Cornarius.

Gallium, Fuchf. Dod. Lon. Anguill. Apollini & Nomencl. pann. Gallium luteum, Lob. in Adu. & Obl. p. 467. ac lc. p. 804. Thal. Hort. Luf. Ger. & Ponz in Baldo. Gallium i. Tabern. ic. & hist. vbi & Gallium Dioscoridis, & Gallia muschata quorundam. Gallium tenuifolium, Schvvenckf. Gallium aruense luteum, C. Bauh. apud Matth. Gallium i. siue luteum, Eid. phyt. & pin. Gallium luteum Matthioli, H. Lugd. pag. 1088. Galion, Cordo in Diosc. Lob. Obl. p. 467. & Gesn. cat. Galion, Lappagini similis herba, Cæsalp. Galion, herba vulgaris, minor quàm Aparine, Eur. Cordo. Galion, Gesn. de lacte, & Trago, cui & Galij i. genus. Gallion, species Aspergulæ, Cordo in Mitrid. Andromachi: Alter Atticus, Aspergula minor quorundam. Gesn. cat. cui & Bubonium. Spargula Cordo supra Marriorum.

Γάλλιον siue γάλλιον. Germ. *Mergerkrant*, *Walstro*, *Wegstro*, *unser framen Berstro*, & *libkraut*: Saxonibus & Misnicis *labkraut* & *Rayurizen*. Belg. & Flammandis *Walstheos*. Gall *petit Manguet*, *Aspergense mineur*. It. *Gallio*. Hesp. *Coia lache yerna*. Angl. *Maydes here*: Boh. *Syrystio* *Wa Bylina*: Hung. *Tey sugoryto fin*, & *zeno Iuan veraga*, h. e. Flos S. Iohannis Bap.

Locus & Tempus.

Nascitur apricis locis in collibus iuxta margines agrorum, solo latiore: Iulio & Augusto floret.

Facultatem, auctore, Galeno, exlicetoriam obtinet, & subacrem. Flos eius, vt Dioscorides ait, ambustis illinitur, & sanguinis profluvia sistit: miscetur cerato rosaceo: insolatur donec albescat: & tale acopum est lassitudinibus vtile.

Vires & vici.

Radix

Radix, eodem teste, venerem excitat. Florem in-
sum & impositum sacris ignibus mederi scribit
Sevvenckfeldius : item contra cancerum & can-
crofa ulcera commendari : fori articulos luxatos
restituere : comam in lacte maceratam illud coa-
guli modo condensare.

Gallium flore pallido.

Descri-
ptio.

Radicem habet fibrosam, repentem : caules
quadrangulos, articulis distinctos, cubit a
folia ad genicula ex interuallis radiatim caulem
ambientia, predicto maiora & latiora : flores pal-
lide luteos, minimos, in racemulum digestos, non
ramé ut illud ita copiosos, nec ita odorosos. Maio
florere locis humentibus circa pratorum fossas &
riuulorum margines.

Locus &
Tempus.

Hoc Gallium Tabernamontano secundum est
quoad descriptionem, eius enim nullam propo-
nit figuram.

GALLIUM ALBUM.

Descri-
ptio.



Non male
Gallio al-
bo nomen huic
fecerunt quidam,
ad id inter se
totâ fæte con-
uenit : *coliculis*
similiter renes,
sacramenti, ra-
mosi, quadrati,
geniculati : fo-
lia stellata, Gal-
lij, multa, coli-
culorum geni-
cula ambiunt,
sapore subacri:
flosculi Apari-
nes, quadrifoli-
li, exigui ad-
modum, sed con-
ferti, candidi:
semina gemina,

rotunda, pusilla : radix reptat, quanquam & ex
reptantibus coliculis fibris demissis se quoque
propagat.

Synon.

C. Bauh. pin. Mollugo 2. siue montana angustifolia, vel. Gall. album latifolium : Gall. tertium Trago : Gallium album, Lobel. in Adn. Cam. hort. & Thelio : Galion candido flore, Cordo in Diosc. & Cxf. Mollugo 1. Dodon. H. Lugd. & Tabern. Mollugo vulgarior herbariorum, Lobel. in obs. p. 464. & Ic. p. 802.

Locus &
Tempus.

Florere Maij principio circa Burcken, & inde
versus Kenzinguen.


Gallium flore rubro Sprengerianum.

Descri-
ptio.

Magna segete ramulorum terram operit
rubrum Gallium, magis patulum, quam
procerum : caulibus angulosis tenuibus, ex satu-
rato virore rubentibus, admodum ramosis & rigi-
dusculis : geniculis folia accrescent radiata in
stellæ morem, tenuia, satis rigida, & veluti pun-
gentia flores inter folia crebri, Gallij albi floribus
pares, sed colore coccineo saturatiore tincti, qua-
drifolij.

Synony-
ma.

Clusius hist. Gallium flore rubro inscribit, ac
ab inventore Sprengero Gallium Sprengeria-
num cognominandum putat. C. Bauhin. pin.
Tom. III.



vocat Galliū
2. siue rubrum

Hanc stir-
pem prius
in Italia ob-
seruabat D.
Sprengeri fi-
lius, ipsamque
plantam cum
semine in pa-
rtiam refere-
bat. Floret
Ætate semen
sub Augusti fi-
nem maturū
est. Vidi autē
ego mensis
Septembris
principio Ba-
silez florens
in horto D.
Comitecij.

Locus &
Tempus.

RUBIA SPICATA.
CAP. XVI.



Angulosis
caulibus
est
Rubia spicata,
tenuibus, co-
loris cinerei,
in ramos plu-
res, pede lon-
giores, didu-
ctis : ad quorū
genicula ra-
diata folia, A-
parines non
maiora : rami
in spicas abeūt
semipalmares,
arque etiam
palmo longio-
res, glumis lū-
gâ serie ramo
appressis, &
quorum sinu

flosculi tenelli videntur erumpere,

Ferd. Imperato Rubia spicata, planta Can-
diz propria. Clus. hist. Rubia spicata Cretica
C. Bauh. pin. Rubia 12. siue latifolia spicata.

Rubia quidem à similitudine quadam, quant
eius folia cum Rubie folijs habere videntur, no-
minatur : & spicatz cognomen additur, quia sum-
mi cauliculi & rami in spicæ formam desinunt.
Cum autem tota planta non nihil aspera sit : non
minùs commodè Aparinem vel Asperuginem
appellandam suspicatus est Clusius.

Non ra-
tio.

RUBIA MARINA NARBONEN-
SIUM. CAP. XVII.

Rubia marina frutex est qui cubitales possi-
det caules, angulosos, candicantes, durius-
culos, multos, & radice crassa, lig. ossa, rubente, sin-
gulari, longitacula, prodeū ex, iam simplices, iam
ramosos, internodijs modò brevioribus, modò
longioribus distinctos : folia verd articulis adna-
ta aliàs frequentiora, aliàs confertissima, inal-
bent, breuia admodum, angusta, acumine leuiter
pungentia, sapore nullo : flores parui, longi, palle-
Oooo 3

Descriptio

fontes. Sceler corrupti nostram figuram potissimum in floribus.



Rubia maritima, Camer. apud Mart. & hist. germ. Clus. hist. & hist. Rubia maritima Narbonensis, in Adu. & Ic. pag. 792.

C. Bauhin. pin. Rubia 9, hinc maritima: Erythrodanum maritimum H. Lugd. p. 135. & Crucialis maritima Celsalpini. Sed quum Celsalpini Crucialis sit minima quatuor

digitorum ego ad hanc non refero.

Locus & tempus.

Montepeli apud mare abundat: fluit Vere & Autumno. Frater in litore Veneto collegit, florentem Iunia. In mediterranei maris, quod Hispanum & Gallum Narbonensem, cluit littoribus frequentem etiam nasci testatur Clusius.

SPERGULA. CAP. XVIII.



Descriptio.

Palmaris aut palmaris est planta, ad cubiti eius altitudinem excresecens, caulibus multis, teretibus, frequenter geniculatis, sub hirsutis, ramosis: folia ad singulos articulos numerosa, radiatum ut in Gallio caulem ambiunt tenuitate: unque parvi, sed nequaquam ita rigida, verum flaccidissima, superiora cum coliculis leuiter hirsuta,

auersa parte sulcata, sapore nullo evidente: capitula in ramulorum fastigiis multa, singula singulis pediculis donata (quorum unus aut alter deorsum pender, alij surriguntur, ut in Holosteocaryophyllo aruensi Tabernamontani) Alines similis, hirsuta: quæ in flosculos albos è quinque foliis compositos explicantur, apicibus luteis, quibus succedunt vascula Alines, semina continentia pusilla nigra: radix subest singularis, recta albis raris fibris donata.

Dod. gall. ait Spergulam officinis & antiquis incognitam nisi sit Selamoides minus, cuius historis satis conuenire scribit. Idem tamen sub Elatines specie collocandam censet. De purg. verd. & in fol. lat. vulgò in Brabantia Spueria, atque inde latine Spergulam appellari refert, &

nonnullos Polygonum nominare, quod laetitia abundantiam habus promoueat: non esse tamen Dioscoridi Polygonum, sed multum ab eo differre concludit.

Lob. in Obs. p. 467. itemque Ic. p. 803. Saginæ Spergulam inscribit, & Polygonum knauel Germanorum Tragi asserit. Sed secundum opinionem Dodonæi aliud ab hac Spergula censetur esse illud Polygonum.

C. Bauhin. pin. Alina Spargula dicta 1. hinc maior [Est & ei Alina Spargula facie media, & Alina Spargula facie minori.] Spargula H. Lugdun. p. 131. Alina tenui folia alba, vel testaceis altera perichloides, Col.

Spargula Spargula Lob.

Locus & tempus.

Montbelgardi in agris inter segetes provenit: fluit Iunio, Iulio & Augusto. Sæpi in agris & potissimum quidem Autumno, ut Hieme, ac primo Vere, cum alie pabula defecerint, bubus præbentur, testis est Dodonæus.

Pabuli igitur causa scribitur, nec alium usum, quod coquit, habet. Semen quidem vomitione pituitosos humores educere plerique referunt: esse tamen à gallinis & columbis, quæ non solum circa noxas id ipsum inlegunt, verum etiam, hoc passæ, & oua plura, & ciculus excludere creduntur.

Usus.

Spargula purpurea.



Spargulam purpuream voce herbulam radice singulari, longa, castifolia, apophyses quasdam è lateribus emittente, sapore heraceo: caules multi, per terram sparsi, ut in Polygono 3. Tragi, dracunculæ & minores in ramulos diuisi: ad quorum singulos nodos folia stellatim adnascuntur, tenuia, semuncialia

Descriptio.

circiter, qualia Spargula, alia aliis maiora, plurimum glabra, raris hirsuta: quibus ad exortum veluti squamulæ duæ, albæ, ut in Polygono, circumponuntur: sapor herbaceus: in extremitate ramulorum variè diuisorum flores multi purpurei Anagallidis phœniceæ floribus similes è quinque foliolis compositi, alij recti, expansi: alij penduli, oclusi, calyce quinquefolio oblongo, herbaceo, subhirsuto, pediculis longiusculis hirsutis nixi, positi florum Alpergulæ: semen in capitulis Spergulæ minutissimum, arenæ subtilioris instar fuscum, aut cinereum.

Locus.

Plantam hanc antè nunquam visam repertam mensis Maij medio, itineri à Beblingen versus Sturgardiam prope pagum Faingen an den fildern, secus viam arboribus haud confusam, nec herbosam. Basileæ etiam ad Wisam in sabuletis & salicetis haud infrequens ab aliis observata.

Spargula marina nostras.

Rassiore est radice quam mediterranea Spargula, ex qua caules similiter multos proferre palmates

Descriptio.

palmares & pedales, ad quorum genicula nascuntur radiata in orbem folia, spargula jam dicta modo, crassiuscula, fallia: ramulorum cecuminibus flores è calyculis hirsutis erumpunt, similes, quoque formâ, sed colore lutei; vascula nonnihil turbinata semen continent.



Locus & tempus.

Perpendendum an non hæc apud H. Lugdun. Elem. p. 1385. Spargula marina inscribatur, licet nostra magis brachiata & minor sit. Verum hæc euenire possunt ratione locorum.

Mense Septembri repertum apud lacum salinum prope Montepelium quâ ad mare itur.

RUBIA CYNANCHICA.

CAP. XIX.



Descriptio.

Non pauca habet cû Gallio communia, cuiusmodi sunt repletrix radix, lignosa, folia ad ramulorum genicula, radiata, perinde angusta & splendentia, sed longiora, pauciora: ramuli quadrati tenues, cubitales & minores etiam, plerumque in terram proni: foliis longè pauciores quàm

Gallij, nec racemosi, quadrifolij, rubentes, aut ex rubore in album fatiscetes, majores & longiores, quàm in Rubia angulosa non aspera: nullus flori odor. Plantæ sapor exiccans: semen ferè geminum, Apariæ modo, oblongum nonnihil laue, pulpa alba.

An Tab. Ic. & h. Gall. album minus, Klein vrsif. Megerkranz: Gall. quattuor? Gesn. hort. Rub. species sula. multò minor, circa Bononiam Squinathica aut Herba vitæ appellata: Eid. coll. Rubiz paruum genus, Aspergula, & Rubiz cognata. H. Lugd. pag. 1185. Cynanchica, quod ad anginas sumpta & admota valeat.

C. Bauh. pin. Rubia 6. siue cynanchica (tradit ille præterea & describit Rubiam cynanchicam saxatilem, circa Valentiam Delphinatûs à

D. Bursero collectam:) Aspergula herba repens Gesn. coll. Saxifraga altero Catalp. Gallium tetraphyllum montanum cruciatum Columnæ.

Genevæ florebat in E. e Meio & Ianio au plain palais: Basileæ multis in locis adhuc Octobri: Montheigardi in collibus vibi vicinis, Iulio & Augustorum sabulosis & maris locis provenit.

Cynanchica Rubi. siccatur ubique mortui: & ad anginas vtilissima est, sumpta & admota.

Locus & tempus.

Vicini

IVNCARIA.

CAP. XX.



Habet in singulis geniculis bina folia ex aduerso sita, Asperulæ odorato flore folijs quodammodo similia, breviora tamen & Lini latini folijs non absterilia: frequentes ramuli ex alarum sinu prodeunt, similibus folijs prædicti, copiosos, paleaceos, candidi & que profertentes flores: semen deinde exile, nigricans:

Descriptio.

radix tenuis est, candicans, non vinx, sed singulis annis semine deciduo, novellæ plantæ enascuntur, illo ipso anno etiam sub finem mensis Augusti.

Closius descriptionis author propter foliorum quandam similitudinem, hanc herbam, quâ Sæm auticentes à junceorum cauliculis formâ & gracilitate Iuncariam appellant, Gallio rubro flore præfigendam iudicavit.

Lob. in obl. p. 462. & Ic. p. 757. & Gerardo, Iuncaria Salmanticensis Closij. Iuncaria, Tab. Cynanchicæ species. H. Lugd. pag. 1185. Rubia 8. siue linifolia aspera, C. Bauh. pin.

Præuenit locis arenosis, inter vineta, secundo à Salmantica miliari. Floret Iulio: semen Augusto maturum est.

Gallio rubro ali- quatenus similis Closij.

Synonyma.

Locus & tempus.

ARENARIA.

CAP. XXI.

Delicula plantula, viz palmatis, ex radiculis longiusculis, albis, crebris geniculis intercepta, ramulos satis frequentes profert tenuissimos: folia ad radicem multa vncialia & geniculis inferioribus circumposita, semuncia longiora, sed insignis tenuitatis, vñ cum minoribus quibusdam adjectis: ut per articulos bina, in superioribus verò radiatim penè disposita, brevia minutaque, ut nihil supra, verticillos imitata, hirsutissimi interdum per coliculam exhibet, extremisque ramis florem Spargulæ, album, minorem, calyci insidentem viridi, foliolo.

Descriptio.



D. Stephano Sprengero à quo primò accepi dicebatur Polygonesi vel Holostei genus. Is circa Vlmam collegerat.

CRUCIALIS FRUTICOSA, CÆSALP.

CAP. XXII.

Descriptio.

CRucialis quædam dodrantalis, fruticosa: ramulis tenuibus: binis foliis, angustis, in singulis geniculis: in alijs grana singula acerabuli figura in quinque barbulae desinentia, parua, dura, viridia, & striata: intus semina bina continentur: oritur in montibus.

Cum quænam hæc fruticosa sit nos lateat, eam post Rubiolas relinquimus, eò quod & ipse Cæsalpinus eam post illas locauerit.

ASPARAGVS ET CORRUDA

in genere.

CAP. XXIII.

Asparagi generalis significatio.

Etiā Asparagus, vel Atheniensium more Aspharagus [*ἀσπάραγος*, vel Attico more *ἀσπάρυος*] vel Sparagus, ut officinæ detractâ syllabâ dicunt, Galeno 2. de alim. teste, generatum quidem omnes propè modum coliculos teneriores, & teneriora germina seu olerum & herbarum, seu suffruticum, seu fruticum, arborumque denotet: attamen peculiari generi plantæ etiam tribuitur, quæ sic dicta, quod cauliculos hos, qui prima germinatione è terra prodeunt præcipuos habeat.

Genera duo Dioscoridi.

Genera duo Dioscoridi, Asparagus in petrositis [*ἀσπάραγος πετρώδης*] nascens, quem Myacantham (*μυακάνθη*, id est morinam spinam) vocant, vulgaris notitiz: Et paulò inferius. Quidam natant quod si quis arietis cornua contrita defodiat, Asparagum quoque (*ἄσπαρον*, altilem, ver. addit) nasci: quod tamen probabile mihi non est. Altile autem hic Asparagus, frutex est ramosus folijs numerosis, longis, Fœniculo proximis: radice rotunda, grandi, tuberculum [nodum, Corn.] habente.

Galenus 2. alim. duo quoque Asparagi genera memorat, *βασιλικὸν* regium, & *ἐλευθερίον* palustre.

Asparagi Theophrasti.

Theophrasto 6. hoc i. *ἀσπάραγος* [hanc solam vocem per geminam Asparagum & Corrudam Gazæ vertit] ex toto aculeata est, & nullum juxta aculeum folium gerit. Et 6. hist. 3. ait juxta aculeos pusillum quiddam clauæ simile producere: ex quo flosculus tandem ipse erumpat: radice largâ, altâ, numerosâ, eadêque tam crebrâ inniti, ut pars superna radicum tota connexa & continua reddatur, ex qua vel ipsorum caulium prouentus facitetur, &c.

Siluestres fecisse naturam Corrudas, ut quique demeteret passim: sed ecce & altiles spectari Asparagos, horum curâ, testatur Plinius lib. 19. cap. 4. Et ait hinc ejusdem libri cap. 8. Omnium hortensiorum lautissima cura Asparagis. De origine eorum in siluestribus curis abundè dictum, & quomodo eos juberet Cato in harundinetis feri. Est & aliud genus incultis minus Corrudâ (Asparago hoc spinoso ut sponsæ coronarentur apud Bæorios in more fuisse, tradit Alex. ab Alex. c. 5. l. 1.) passim etiâ montib. nascens, refertis superioris Germaniæ cæpis, non infaceto Tiberij Cæsaris dicto, herbam ibi quandam nasci similimâ Asparago. Nam quod in Nefide Campaniæ insula sponte nascitur, longè optimum existimatur. Hortensium [hortense, Dal.] teritur spongijs. Est enim plurimæ radice, altissimèque germinat. Viret thyrlo primum emicante: qui caulem educens, tempore ipso fastigiatus in rotos striatur. Potest & semine feri. Nihil diligentius comprehendit Cato, iniquissimèque libri est, ut appareat repentinam ac nouitiam viro curam fuisse. Locum subigi jubet humidum & crassum. Semipedali vnique intervallo feri, ne calcetur. Præterea ad lineam grana bina aut terna paxillo dimitti: videlicet semine tam tantum sciebatur. Id fieri secundum æquinoctiū vernum. Stercore saturari, crebro purgari, cauere ne cū herbis euellatur Asparagus: primo anno stramento ab Hicme protegi. Vere aperiri, sarriri, runcari. Tercio incendi verno. Quò maturius incensus est, hoc melius prouenit: itaque harundinetis maxime conuenit, quæ festinant incendi. Sarriri jubet idem, non antequam Asparagus natus fuerit, ne in sarriendo radices vexentur. Ex eo velli Asparagum ab radice. Nam si defrangatur, stirpescere & intermori. Velli, donec in semen eat. Id autem maturescere ad Ver, incendi que: ac rursus, cum apparuerit Asparagus, sarriri ac stercoreari. Ac post annos nouem, cum jam vetus sit, digeri tubasto solo, stercoreatque. Tum spongijs feri, singulorum pedum intervallo. Quo & ouillo fimo nominatim vii, quoniam aliud herbarefceret. Nec quicquam postea tentatum vtilius apparuit, nisi quod circa Idus Februarij defello semine aceruatis paruulis scrobibus ferunt, plurimum maceratum fimo. Deinde nexis inter se radicibus, spongijs factas post æquinoctiū Autumni disponunt pedibus intervallicis, fertilitatè in denos annos dorante. Nullum gratius his solùm quàm Rauennatium hortorum. Indicauius & Corrudam. Hinc enim intelligo syluestrem asparagum, quem Græci Ominium aut Myacanthon vocant, alijsve omnibus. Inuenio nasci & arietis cornibus (fabulolum vni quæ id sibi videri scribit Dioscor.) tuis atque defossis Lib. 10. cap. 10. ait syluestrem Asparagum aliquos Corrudam, aliquos Lybicor vocare, Atticos Ominium, ejus efficaciore vis & candidior maior. Lib. 11. cap. 16. concludit in totum ipsam esse Asparagum.

Asparagi optima vbi

Corruda Asparagi.

Myacanthos.

Libycor. Ominium.

Corn. opinio repugnans.

Cornarius, nostro iudicio, acriter est reprehendendus, dum ait Asparagum palustrem Galeni, Dioscoridem petrum aut Myacantham appellare, & de ipso etiâ prodi affirmare, quod si quis arietis contrita cornua defodiat, nasci Asparagum, ut sic sarrius ex siluestri fiat: Plinium verò Corrudam & siluestrem Asparagum vocare.

Reperio antiquos Græcos, inquit Fallopius in Epistola ad Mercurialem, vnde vox ista originem traxit, nò solum *ἀσπάραγος* sed etiam *ἀσπάρυος*

asparagos appellasse rem, de qua loquimur. *Asparagos* quidem communior erat appellatio, quâ totâ ferme Græcia utebatur: *asparagos* verò magis selecta vox, quasi solis Atticis reteruata, vii ex Archemæo conuiniorem lib. 2. & ex Galeno lib. 6. simplic. & 2. alim. colligere possumus, videmusque (nisi scriptura mendosa sit) hoc confirmatum apud Theophrastum, cum aliquando *asparagos*, alias verò *asparagos* in hist. pl. scriptum reperimus. Vnumque hoc subinde addam, quod apud eosdem Græcos *asparagos* guttur ac fauces aliquando significat. Quamquam Apion Grammaticus tollendæ homonymiæ gratiâ non *asparagos*, sed *asparagos* scribendum dixerit, veluti multi, etiâ teste Eustathio, in hoc Homeri loco fecere, qui non *asparagos* sed *asparagos* scribendum iudicauerunt. Dicitur autem *asparagos*, quasi *asparagos*, i. e. *asparagos*, nō satis, quia, ut inquit Athenæus, inter omnes asparagos, hi qui minimè sari sunt, principem locum tenent, atque iidem medentur omnibus internis morbis: qui verò seruntur, non in eodem pretio sunt. Quid autem per Asparagum intellexerit antiquitas, satis constat ex eodem Athenæi loco, atque ex Galeni 2. alim. & ex libro de attenuandæ victu, quos secutus Oribasius 2. & 3. coll. & Paulus & Aërius lib. 2. hæc nos docuerunt. Quatuor sc. esse Asparagorum genera, quorum primum illud erat in ordine, quod omnia olerum gemina, aut caules tenerissimos, sub se continet, cum primum illos planta ad flores, seminâque procreanda, aut fructus sustentandos emitterit, talesque sunt, ut cocti, aut erudi elui aptè accommodentur. Vnde teneros Brassicæ cauliculos *asparagos* vocabant antiqui, ita etiam & reliquorū olerum, ut Bleri, Laetæ, Atriplicis, Maluæ Betæ, Napi, Raphani, Lampsnæ, Nasturtij, Pyrethri Brassicæ sylu. ac similitum, quib. hoc primum Asparagorum genus continetur. Cui adiungamus secundum, quod sub se omnia germina, aut recētes colliculos *asparagos* fruticum [ut Rusci, Oxilanthæ, Viticis, &c.] sc. complectitur, qui tenerissimi erumpentes elui apti sunt: nam quæ Vere primò erumpunt germina, huiusmodi etiam ab antiquissimis scriptoribus Asparagi nomine donata sunt.

Hic addamus iam tertium genus quod in quibusdam plâis quæ *asparagos* sūt, neq; inter olera domestica, aut syluestria, neque inter frutices commemorantur, proueniunt, suntq; tenerissima illorū germina, aut cauliculi, antequam flores vel fructus protulerint, Vitis enim albæ Bryoniæ dictæ, & vitis nigræ viticulæ asparagi nomine ab Antiquis in cibos assumebantur: ita & caules teneri elaphobosci & Hippofelini, & Anonidis, postissimæque temporibus additus lupuli & equiseti cauliculus tenerissimus, quæ plantæ omnes olera neque sūt neq; caplè annosiorē proferūt, illarūque partes tenerissimæ dum erumpunt, pro asparagis ad mensas veniunt: & quamvis asparagi isti à scriptoribus nuncupentur, alias tamen proprias appellationes possident, videnturque quasi improprie Asparagorum nomine donati cum quartum genus, ad quod jam venio, illud sibi propriè, ascriuerit. Sit itaque Asparagi quartum genus quod sub se plantam continet quādam quæ propriè & peculiari quādā dote *asparagos*, & Asparagus à scriptoribus tam Græcis, quàm Latinis vocatur. Quæ planta Asparagus propriè dicitur, & cum tenerissima est & noua, nondumque se in spinas aut folia, aut capillamenta explicauit, antiquorum, & nostrorum hominum etiam mensis valdè dignata, est eodem nomine insigni-

Tom. 2. Ill.

ta, quo tota planta, ob summam quam iniunct cum palato & sanitate corporis humani grata, atque vii de facie multiplicem nouimus plantâ hanc esse, multiplicem item legimus apud Scriptores, quoniam Asparagi petiti meminit Dioscorid. & Galenus, necnon Asparagi myacanthini vel myacanthi dicti, Regij verò meminit idem Gelenus & Oribasius: montani Athenæus, & hoc est palustris Asparagi idem Athenæus, Gal. Orib. Paulus, & Aërius mentionem fecere, ut etiam *asparagos*, id est hortensis Paulus solus: Inter Latinos verò Asparagi satui meminit Columella, quem Asparagum simpliciter, vel hororum corrudam vocat Plinius: Asparagi quoque syluestris meminit Plinius, idem & Palladius. Et quamvis plures sint voces istæ, non ob id tamen mea sententiâ, plura quàm tria infima Asparagorum genera significant, Myacanthinum sc. syluestrem, & Myacanthinum cultu emollitum, tertium palustrem, neque alia sunt Asparagorū genera ab his tribus, quæ dixi, distincta, &c. Sententiâ autem mea hæc est, magis probandas esse radices syluestris, illâque asseruandas, & in medicamentis collocandas; primò quidem quia in locis saxosis oriantur, sintque duriores, & ob id etiam incorruptiores seruari possint. Secundò, quia syluest. Asparagus efficacior est ad omnia. Tertiò, quia in satui inest vis quædam & *asparagos*, & quasi venenata, cum dicat Dioscorides vim ipsius sterilitatē ac infœcunditatem parere, quâ malâ qualitate fugiendam esse cenfeo. Quam ob rem, ut iam finem faciam [inquit Fallopius, cuius, verba hæc hactenus recitauimus] assero de syluestri tantum locutum esse Dioscoridem: Et si de vitroque, syluestrem tamen, ipsius sententiâ, meliorem, ipsumque cum ejus visus sit tutior, asseruandum. Satium verò ad delicias mensarum, ac ad gulæ irritamenta esse magni facientium.

Radices
sylu. As-
par. in
medica-
mentis
utendum

ASPARAGVS HORTENSIS ET Pratenlis.

CAP. XXIV.

Cordus Asparagum satium & campestrem Describit
Cram editis, quàm planis locis nascentem sic
describit: Asparagus caules emittit primo Vere
teneros, longos, teretes, virides, glabros sine folijs, ab vno cespere plures, qui paullatim in numerosos, tenues, lentos, diuiduntur ramos, & virgas & circa has foliola frequentia, vnciæ longia rudine, indiuidua & capillorum aut setarum modo tenuia: tota itaque herba cum Fœniculipallidâ quam in folijs similitudinem habet, & duum cubitorum altitudinem petit. Flores Sole in Geminos transeunte circa ramulos copiosos, paruos, & pallidos producit, & post eos baccas Pisi quantitate, rotundas, rubentēque, intus carne sua duo aut tria nigra & cornæ soliditatis semina claudentes. Radicibus nititur perennibus, numerosis, ab vno transuerso, & propter caulium vestigia, aspero, villosoque dorso, vtrinque in obliquum descendentes, longis teretibus, lenis, foris cineraceis, intus autem candidis, quibus dulcis & glutinosus est sapor: colliculi item adhuc teneri admodum suauem saporem habent, sic ipsa etiam semina.

Alterum Asparagi genus Cæsalpino, crassiores habet, & gustui gratiores asparagos, quàm primum [Corruda] sapore quodam fungos Prunulos imitante: caules breuiores, per se stantes: longiores ramulos: foliola mollia, non pungentia: flosculos longiore pediculo pendentes: fructus

Pppp

Aspara-
gus cur
dictus.

Asparagorum
genera
quatuor.

Asparagorum
secundum
genus.

Asparagorum
tertium
genus.

Genus 4.

et paulò crassiores, in quibus semina ad summum sex nigra continentur: amat hortorum umbrosa: floret Vere.

Synony-
ma.
Galea.

Asparagus, Brunfels. Trago: [qui non bene distinguit à Cortuda, quam ei ignotam fuisse suspicamus] Matthiol. Fuchf. Dod. gall. Cordo in Dioscor. & hist. Gesn. hort. (ubi majoris & minoris meminit. An eid. in append. Asparagus italicus, in nonnullis Germaniæ hortis crescens, & à Germanico differens? (Lon. & Eluchaf. Tab. ii. quem tamen figura non exprimit. Asparagus altilis, Fuchf. Torn. & Tabern. Asparagus domestica Bellon.

Asparagus altilis Diosc. idem cum satiuo & hortensi, Anguil. Asparagus satiuus, Lac. Cast. H. Lugd. pag. 610. & Germ. Asparagus hortensis, Hort. Lus. Dod. lac. Lob. in Adu. & Camer. Asparagus domesticus, Eyst. Aspar. domesticus vulgaris, Lobel. in Obs. pag. 452. quoad titulum.

Ἀσπαραγός: Germ. Spargen: Belg. Asperges, nonnullis Coralloruy: id est Herba coralli, à bacis coralli instar rubentibus: Gall. Esparg: It. Asparagus: Hisp. Esparagos: Angl. Spargel: Boh. Vromauve korezy: Hung. Sparga.

Locus.

Asparagus folio molli i. sue satiuus, C. Bauh. pin. qui cum in pratis Allatiz Basileæ vicinæ, & in pratis ad Danubium sitis, & in Borgundia circa Vesuntium spontè proveniat, hunc Plinium intelligere censet, eum in superioris Germaniæ campis provenire scribit, & Clusio dici Asparagum mitiorem spontè nascentem Hisp. & hist.

Asparagus altilis ubique in hortis frequens est.

Asparagus maritimus.

Minimi digiti ferè crassitudine sunt lignosa virgula, in tortuosos ramos diuticata, per quos folia breviora, crassiora, latiora, robustiora que quam in altili Asparago, multò majora molliora que quam Cortudæ: bacce duplò luniperinis majores, rubentes, aut nigricantes, semina complectuntur quatuor aut quinque majuscula.

Et hic est Asparagus *maritimus*, cujus meminit Galenus lib. 3. alim. Voco autem palustrem hunc Asparagum, quia provenit apud lacus palustres propè mare Montpelij. Qui præterea hic describitur, non multùm differe videtur à Regio, siue eo qui in hortis colitur, & tum à Fuchfio, tum à Matthiolo pingitur, nisi quod videtur contrahere saluginem aliquam propè mare. Bacce etiam, ut dictum, majores videntur, folia etiam crassiora & firmiora. Præter has notas & alia occurrit, quæ à vulgari distinguitur, nempe color subæruleus, vel cinereus, non viridis, qualis in vulgari.

C. Bauhin. pin. Asparagus folio molli i. siue Asi-

parag. maritimus crassiore folio: Asparag. *maritimus* siue palustris Galeni: Asparagus palustris Matthiol. Anguil. & Tab. Asparagus maritimus Clus. hisp. & hist. itémque Camer. Asparagus maritimus Dioscoridis Lob. in Adu. & Ic. p. 786. Asparagi alterum genus *Cesalp.* [hoc Asparagi genus alterum Ces. hic non referimus.] Asparagus sylvestris Gerardi.

Indicandum hic erat, Asparagum hunc maritimum Dioscoridis Lobelij in Obs. 438. Asparagi domestici vulgaris titulo donari, & tamen pro maritimo inibi describi. Clusius Cortudam negat, & Asparagi altilis genus asserit, & quia maritimis declivioribus & herbidis locis spontè provenit, maritimum vocat.

Montpelij ad mare provenit, floret Aprilis: baccas maturat Augusto vel Septembri.

Locus & tempus.

Asparagus platycaulis.



Monstro. In nostro judicio Asparagi horrensis varietas hæc data nobis fuit à D. Friderico Mejer Argentini: qui narrabat primo Vere in horto Ill. Comitiss à Leiningen propè Creuznach in Palatinatu, & quotannis tali formâ prodire. Caulis exerie trico-bilem, vnde etiam latum

Descriptio.

compressum, striatum, ex quo utrinque ramuli prodeunt quales Asparagi vulgaris, remerè & nullo ordine positi. Foliola, flos & fructus qualis vulgari.

Figura Asparagos è radice emergentes, & flores cum fructu & Acinis sua magnitudine appinximus.

Icon.

CORTUDA.

Duris, contorta, angulosis virgulis ad hominis altitudinè fruticat, in frequèss ramulos striatis, alternatim ferè dimisis: foliola ex vno puncto plura exeunt, veluti in Laticce, duriora & breviora quam Asparagi altilis, & spinerum, quàm foliorum nomine digniora, quippe acriter pungentia

Descriptio.



Descriptio.

Asparagus palustris Galeni.

A Regio quid differat.

Synonyma.

gentia : flores parui pallidi , altis Asparagi x-
muli : bacca prima fronte ejusdem baccis similis,
ingrati saporis , & tere dine obnoxia , in quibus
primùm occurrit pellicula alba , pellucida , dein-
de rubra , densa , terribè nigricans , postremò semen
unicum , vel duo , alba , latelescentia , duriuscula .

Asparagi primam speciem , Diolcoridi petræam
vocatam , Anguillara eandem cum Corru da fa-
cit , & Asparago spinoso , qui à Plinio Lybicus di-
citur & Horminus . Nec species diversas esse , ut
multi putant , statuit .

E tribus Corru dæ generibus prior dicitur , in-
quit Clusius , Græcè ἀσπράγοι πετράιοι καὶ μυα-
νθῖνοι , i. e. Asparagus petræus siue sylvestris , & Mu-
rina spina . Plinius , etiam à Latinis Corru dam ,
ab aliquibus Lybicum , ab Atticis Orminium
vocari tradit .

Corru dam nonnulli dictam volunt , teste
Ruellio , quod , ubi adolevit , faciliè corrumpit ,
decidatve : sic Horminium ἀπὸ τῆς ὀππῆς , q. e. tuo :
Lybicum autem , à patria , Germ. *Stein spargen* ,
siue *Strich* : aut *dorn Spargen* , & *wilder Spar-
gen* , Gall. *Esparge sauvage* : It. *Asparago sal-
natice* : Hisp. *Sparaga* & *Esparagos* indifferen-
ter , tamen si Esparagos trigueros quia in agris
fumento confitis apud eos plurimumque crecit ,
appellant . Angl. *Pricky Sparage* , propter acu-
leos .

C. Bauh. pin. Asparagus Corru da dictus : siue
Asparagus folijs acutis : Asparagus petræa Diof-
coridis & Galeni : Corru da & sylvestris Aspa-
ragus Plinij : Asparagus petræus & Corru da
Dod. gall. Cordi hist. Rauvv. Bellon. Lob. in
adû. & Icon. p. 787. (Corru da differens ab altis
Asparago) H. Lugd. p. 611. (icones duæ Dodonæi
& Penæ) & Turn. cui & Asparagi alterum ge-
nus , & Asparagus sylvestris . Asparagi prima
species Anguill. & Cæsalp. Asparagus sylvestris ,
Gefn. app. Lac. Dod. lat. Camer. epit. siue Corru-
da Bellonij : Corru da prior Clus. hisp. & hist.
itemque Tab.

Circa Monspelium locis siccis & aridis
provenit : in Italia verò , Castella & Gra-
narensi regno abundat . Floret unâ maturaef-
cente , hoc est Augusto : semen Octobri matu-
rum est .

Habet autem præterea duas alias Corru das
Clusius , quarum una quæ ipsi altera inscribitur ,
C. Bauh. pin. dicitur Asparagus Corru da dictus
2. siue Asparagus aculeatus alter , tribus aut qua-
tuor spinis ad eundem exortum . Asparagus syl-
vestris alter Dodon. & Ger. Corru da altera , Clus.
hisp. & hist. H. Lugd. p. 613. & Tab. cui in Ic. Cor-
ru da Hispanica : Corru da hispanica altera quæ
Lusitanica Lob. obs. p. 459. at suprâ iconem , ut
& in Ic. Plant. 787. Corru dæ varietas , Asparagus
petræus , & Myacanthinus Galeni : Asparagi ge-
nus quartum , Cæsalp.

Alia verò quæ ab ipso tertia inscribitur dici-
tur C. Bauh. pin. Asparagus Corru da dictus 3.
siue Asparagus aculeatus spinis horridis . Poly-
tricha , Bellon. de negl. cult. & obs. lib. 1. cap. 18.
Asparagus sylvestris tertius , Dodon. Corru da 3.
Clus. hisp. & hist. Lob. obs. pag. 459. p. & Ic. pag.
788. H. Lugd. pag. 613. & Tabern. cui in icon.
Corru da hispanica altera : Asparagus sylvest.
spinosus , Germ. Asparagi Theophrasti nomi-
ne , cui spina pro folio , ex Crete ab Honor. Bell.
transmissa . Harum verò utraque in Lusitania
& Bætica tota occurrat . Novembri fructu onu-
sta , interdum floribus hinc inde sparsis , nec alibi
vita .

Tom. III.

Asparagi vires & usus.

Hæc ita traditis , reliquum est , ut vires &
usus adscribamus . Asparagi igitur in pe-
tiolis nati canaliculus leniter decoctus , & pro ci-
bo sumptus , ventrem nullit , urinamque cit . Ra-
dicum autem decoctum epotum , ægri , meienti-
bus , regio morbo laborantibus , nephriticis & is-
chiadicis auxiliatur : itidemque morbis à phalan-
gio , siquidem & vino decoquatur . Sic & dolo-
re dentium infestatis præficit , si modò decoctum
super affecto dente contineatur . Semen quoque
potum ad eadem valet . Atunt & canes , si Aspa-
ragorum decoctum hauserint , emori . *Altilis* ve-
rò Asparagi canaliculus ex vino albo tritus , re-
num dolores sedat . Coctus autem assulve Aspa-
ragus in cibo sumptus , urinae stillicidium , difficul-
tatemque ac dytenteriam mitigat . Ejusdem ra-
dix in aceto , aut vino decocta luxatos artus mul-
cet . Cum ficibus autem , ciceribusve decocta ,
sumptaque , regium morbum sanat , & coxendi-
cum cruciatus , urinaeque stillicidium leuat . Ex-
terum , amuleti ratione alligata radix , itemque
haustum ipsius decoctum , partum impediunt ,
sterilitatemque inducunt , ex autoritate Diof-
coridis .

Utilissimus stomacho cibus Asparagi , ut tra-
ditur , inquit Plinius . Cumino quidem addito in-
flariones stomachi colique discutit itidem oculi
claritatem afferunt . Ventrem leniter molliunt .
Peccoris & spinæ doloribus , intestinorumque
vitijs profunt , vino cum coquantur addito . Ad
lumborum & renum dolores , semen tritum obol-
orum pondere , pari cumini bibitur . Venerem
stimulant . Urinam cient utilissimè præterquam
quod vesicam exulcerant . Radix quoque plu-
rimorum prædicatione trita , & ex vino albo po-
ta , calculos quoque exturbat , lumborum & re-
num dolores sedat . Quidam & ad vulvæ dolo-
rem radicem cum vino dulci propinant . Eadem
in aceto decocta contra Elephantiasin proficit ,
Asparago trito cum oleo perunctum pungi ab
apibus negant . Sylvestris Asparagi ad suprâ dicta
omnia efficacior vis , & candidiori major . Re-
gium morbum extenuat . Veneris causa aquam
eorum decoctam bibi jubent ad heminam . Ad
idem & semen valet cum Anercho , ternis utrum-
que obolis . Datur & ad serpentium ictus succus
decoctus . Radix miscetur radici Marathri inter
efficacissima auxilia . Si sanguis per urinam red-
datur , semen Asparagi , & Apij , & Cumini ternis
obolis in vini cyathis duobus , quinque diebus
Chrysippus dari jubet . Sic & hydropicis con-
trarium esse , quamvis urinam moueat , docet :
Item veneri : Vesicæ quoque , nisi decoctum :
quæ aqua si canibus detur , occidi eos (hoc Dio-
scorides tantum famâ hominumque sermonibus
vulgarum ait .) In vino decoctum radicis succum ,
si ore contineatur , dentibus mederi : *Hæc usque
Plinius* .

Asparago petræo siue myacanthino Galenus
6. simpl. extergendi vim adscribit , & neque ca-
lescere , neque frigescere manifestè , scribit .
Ideoque & renes & hepato ab oburatione libe-
rare : & maxime radices herbæ & semen . Quin
& dentium dolores siccando sanare , quo sanè
dentes maxime opus habeant .

Tradunt nonnulli , teste Muzaldo , radices As-
paragi siccatas & dentibus infixas , illos absque
doloere eradicare . Qua de re consule Schenckium
lib. 1. Obs. 414. titulo , ut dentes sine doloere & fer-
ro extrahantur .

Pppp 2

Perhibet Tragus Asparagi recentia gemina, vino cum butyro & aceto decocta, qua ratione & Lupuli turiones parari solent, aluum emolli-ri, vitia pe&toris expurgare, vrinam promouere, sed & genituram minuere, si quis continuè illis vratur. Semen aut herbam vino decoctam, & aquam distillatam, easdem cum radicibus obtinere facultates: aduersus morbum regium deco-qui radicem cum ficiis & cicere, & hac portione sumpta, morbum pelli, asseri.

DRYPIS THEOPHRASTI, ANGVILLARÆ
CAP. XXV.

Descri-
ptio.



Titulo Dry-
pis Theo-
phraſti miſſa ad
fratrem Caſpa-
rum planta, lu-
teatiora, herba-
cel potiùs, vii
videretur, quàm
fruticoſi gene-
ris: ramis in ſur-
culos diuiſi, fra-
giles, tenues, po-
liſi, geniculis
creberrimis diſ-
tincti, ad quo-
rum vnũquod-
que bina aduer-
ſo ſitu naſcun-
tur folia, ſine pe-
diculo quidem
ſed non amplexi
caulia, ſemũ-
ciam plũs minũs

longa, ab eortu latiora ſenſim acuntur, lunipe-
xinis qualibet parte anguſtiora, fragilia, & ſpi-
nam mitiorem ſerè imitantia, ſuperiùs veluti ca-
nulara, auerſa parte ſubrotunda.

Hæc Drypis videtur aliquid ſimilitudinis ha-
bere cum Camphorata glabra, quæ tamen non
ſerpit. Huic etiam quodammodo ſimilis Echi-
nopus Plutarchi quorundam, verùm illa eſt fru-
ticola planta.

Icones. Icon quam ex alijs aſſumpſimus deſcriptioni
noſtræ non reſponder. Optaſſemus vt ex planta
Fratriſ delineata fuiſſet.

**Synony-
ma.** Cæterùm, Drypis Theophrasti Anguillaræ di-
citur Lob. Obſ. p. 460. Ic. Plant. pag. 789. Tab. &
H. Lugd. p. 1439.

**Drypis
Theophr.** *Drypis* Theophrasti i. h. iſtor. 16. tantũ memi-
nis, eam ſemel duntaxat nominãs de genere ſpi-
noſo ei que loco folij ſpinam aſſignans. Dicitur
autẽ dũ τὴν ſπινὰν τὴν, i. e. ἀπαρτὴν, ὑπὸ τὴν, ἔχειν,
à lacinando, pungendo, vellicando, quodd acu-
leis ſuis attrẽctantes & colligere volentes vulne-
ret. Quibuſdam Eryngium marinum Drypis
Theophrasti videtur eſſe: Alijs Drypis eſt Aca-
nos Plinij. Sed neutra opinio arridet. Gui-
landinus Drypida Theophrasti, Tragum Mat-
thioli fecit: aſt apertè hallucinatus eſt. Sunt qui
Carduum capite nutante velint, ſed errãt & ipſi.

CAVCON, EPHEDRA, ANABASIS,
Veteribus. CAP. XXVI.

Locus

Caucon, & Ephedra, & Anabaſis [his no-
minibus appellatur quoque Hippuris c. 13.
l. 26.] ab alijs eſſe vocatam, Plinius c. 7. jam di-
cti libri, memoriæ prodidit, addens naſci vento-
ſo ſerè tractu, ſcãdens arborem, & ex ramis pro-

pendens folio nullo, citris numeroſis, qui ſint
lunci geniculati, radice pallida. Dari ex vino **Vitæ**
nigro aſtero tritam ad ruſſum, ſuſpiria, tormina,
& ſorbtione facta, in quã vinum addi conuenit.

Facile autem apparet cur Ephedra & Anaba-
ſis vocetur, quibus nominibus Plinius verba tan-
quam originis expoſitionem ſtatim adiungit, vt **Hermol.**
ſupernacua ſit Hermolai coniectura, Ephedron **not.**
legi poſſe, quoniam in aquoſis naſcatur, monen-
te Geſnero, Quad. de equo.

Porro exiſtunt quidam Plinij Caucon, **Equico-
ca.**
Ephedram & Anabaſim eſſe Hippurim, de qua
poſthac agendum.

Alij ſibi perſuadent Caucon Plinij eſſe Cuſca-
tam. Hæc autem opinio minũs placet. **Cuſcata;**

Mihi præ cæteris eorum opinio magis probat-
ur qui arbitrantur Caucon Plinij poſſe conue-
nire Trago quorundam, ſive Vux marinæ: de
qua H. n. lib. 39. **Vux
marina.**

EQVIETA VEL HIPPURIDES ANTIQVIS
CAP. XXVII.

Dioſcorides Equiſeti duo genera fecit. Pri-
mum, quod in riguis & ſcrobibus naſcitur,
cauliculoſque edit inanes, tubelſcentes, ſubſe-
ptos, ſolidos, geniculis in ſeſe ſarctis interſectos:
ac circum ipſos folia juncea, crebra, tenuia que.
In ſublime autem attollitur, vicinos ſcandens
arborum caudices, ex il que dependet, circum-
fuſum comis multis, nigris, vt eſt equi gauda:
radix lignoſa eſt ac dura. Alterum caule eſt re-
cto, æquali, cubito maiore, quodammodo inani,
comis per intervalia breuioribus, candidioribus-
que & mollioribus. **Genera
duo Dioſc.**



Plinius & tertium agnouit. Equiſetum [inquit
lib. 26. cap. 13.] Hippuris à Græcis dicta & pratis
vituperata (quoniam vliginoſius pratum eſt, ubi
naſcitur, cœu l. 18. cap. 28. ſcribit Plin.) nobis, eſt
pilus terræ, æquinæ ſetæ ſimilis. Alij Hippurim,
alijs Ephedron, alijs Anabaſin (Eadem quoque
ſunt appellationes Caucon plantæ ab hac diuerſæ,
lib. 26. cap. 7.) vocant. Traduntque juxta arbo-
res naſci, & ſcandentem eas dependere comis
juncceis multis nigris, vt eſt equorum cauda,
geniculatis ramulis folia habere pauca, tenuia.
Semen rotundum. [Nihil Dioſcorides præterea
falſum id eſt. Nullum enim ſemen edit,] ſimile
Coriandro, radice lignoſa: naſci in arbuſtis ma-
ximè. Faciunt & aliam Hippurim (hæc ſecun-
da eſt Dioſcoridis) breuioribus & mollioribus
comis, candidioribusque, per quàm vilem ilchia-
dicis, & vulneribus ex aceto impoſitam, propter
ſanguinem ſiſtendum. **Plinia
genera
tria.**

Cæterùm, Equiſetum lib. 18. cap. 28. dicta eſt
Equiſetis & Equiſelis, quoniam littera: facile in
l mutatur. Ab hac porro planta veteres Code-
ta quaſi caudeta nominarunt trans Tiberim loca
obſita candidis equinis apud Feſtum. Dicta enim
& ἵστυρις, ſive Cauda equina, quodd folia ſetis
equinis reſpondeant. **Ephedron.
Anabaſis.**

Eur. Cordus ſuſpicatur pro altera Sanguinali
poſſe Equiſetum intelligi, cùm creditum hodie
Equiſetum, hitoriz Dioſcoridis non vndiqua-
que reſpondeat. **Hipp. ter-
tia.**

EQVISETVM MAIVS. AQVATICVM.

Aſparago primũ protrudit palmares, &
cubito altiores Polygoni ſcæminæ craſſitie,
internodijs longioribus, pyxidata inſectione, di-
ſtinctos (cotyla ſimbricata nigricante alterius cu-
bulum excipiente, quã nota etiam à Polygono
ſcæmina



Icones.

Fuch. re-
prehendit

fœmina dif-
fert) striatos,
inanes, quorū
summo fasti-
gio clauatum
insidet capitu-
lum veluti nu-
camentum,
cujus diuulsis
dehiscētibus-
que commis-
suris flosculi
apparent ex
fusco albidis:
ceterum cau-
les plerumque
nudi, interdū
radiata ex ge-
niculis folia
producunt,
non explicata,
vt Polygoni
fœminæ, sed
fistulosa, & ex
pluribus attri-
culis aptata,
longè illis lō-
giora, inter-
dum pauca,
interdū mul-
ta, modò bre-
uia, modò lō-
ga: pro radice-
bus sunt cre-
berrimæ, te-
nuissimæque
nigricantes fi-
bræ, longè, è
caulium geni-
culis demis-
sæ.

Figure no-
stræ sunt ex
Fuchsiæ. Nullum autē
vidi Equise-
tum cui folia
sint qualia
pingit Matth.
simplicia, si-
ne geniculis,
quamvis bre-
uissima. Ca-
merarius in
hist. germ.
omisit hanc
figuram, &
aliā reposuit,
etiam in Epit.

Fuchsum
porrò repre-
hendit Mat-
thioli quodd
Equisetum
primi generis
in paruo libro
imaginum
aperto lapsu
pro Polygono
fœmina red-

didit. quàm antè in stirp. hist. eleganti figurā
expressit. Quam enim in hist. Equiseti longio-
Tom. III.

ris titulo donat, in se. non sine errore, Polygo-
num fœminam inscribit.

Trigi Hippurim existimo maiorem primam
& secundam, vnam speciem. Ejus quidem prio-
rem figuram exprimere Asparagus longissimos
sine folijs. Secunda autem pro maiore altera
non placet. Fuchsius etiam pro minore merito
eam exhibere videtur, vti & Dod. qui Asparagus
pingit vt Tragus, & præterea imaginem Fuchsi
exhibet. Nec ipse quidem Tragus inter no-
menclaturas. Hippurim maiorem primam, ab
altera maiore distinguit.

An Equisetum palustre Lobel.

H. Lugd. p. 1069. Equisetum 1. Matth. Item
Equiseti primi Asparagus Dodonæo: Adhanc p.
1070. & 1071. Equisetum junceum Tragi.

Tab. hist. Hippuris 1. ἵππουρις ἀφύλλος, Hippu-
ris sine folijs, Hippuris nuda, Equisetum nudum,
germ. Schaffnebeuv ohne bletter. Eid. Equi-
setum 1. Equiseti 1. species Dioscoridis, cui com-
petunt particulatim hæc nomina: Hippuris,
Equiselis. Herba equinalis, Salix equinalis, Tri-
machium, Anabasis, Ephedra, Ephedrum, Gis,
Schœniostrophum, Caucum, Saturni nutrimen-
tum, & Salpingium. Item Cauda equina, Cauda
caballina, Equi cauda, Colus columbina, Aspe-
rella Equiseta & Equisetum, Arcontilla, Cena-
cella, Cunicella, Herba caballina, & ex Arnoldo
Nonano, Hippofeta. Arabicè vocatur à Serap.
simpl. cap. 137. Dhenebalcait: ab Auerthoe, Ce-
napalcait: ab Anicenna, Danebalchail: ab alijs
etiam Denebalihiet, Denebalhelil, Denebhachil,
Denebhacals, Dnebachie, Dnebachil, Dnebnal-
chail, & Dnebalchi Ger. Rob. /schubvanz /Roszvua-
del, Rosz /zgel: Farzenschubvanz, Farzenuvadel,
Farzen /zgel: Pserdschubvanz, Farzenhelm,
Schaffnebeuv, Fantenfrant, & Taubenracken:
Flammandis & Brabantis, Peerdsteert, &
Peerdenlays, & Cattensteert: Gallis, Queue de
Cheval, Queue de chat, & Prela: It. Asprello,
Coda di cavallo, Equiseto: Venerijs Cna di caual-
lo. Hiip. Coda de cauallo, Coda de mula, Rabo de
cauallo, & Rabo de mula: Aegyptijs, Pherphra:
Boh. Preslicka: Polon. Pyza /zifa: Angl. Borse
syle: Hung. Tal mofo sin, quod è orbes & scu-
tellæ detergentur.

C. Bauh. phyt. Equisetum 1. siue aquaticum
longioribus setis: Eid. Equisetum 3. Item, Equi-
setum 6. siue junceum folijs nudum, non ramo-
sum. Eid. pin. Equisetum 1. siue palustre lon-
gioribus setis: Hippuris major, Brunf. & Dod.
Equisetum 1. Matth. Lac. Anguill. Castr. & H.
Lugd. p. 1069. quæ etiam sub Equiseti primi A-
sparago Dodonæi pinxit. Caucum Plinij, Anguill.
Equisetum majus, Dodon. gall. Lob. in Obseru.
p. 461. [vbi figura non bona Matthioli] & Ge-
rardo: Hippuris, Amato & Lob. in Auerf. &
Ic. p. 791. Equisetum 1. & Hippuris 1. Dioscori-
dis Tab. qui & ipse iconem Lobelianam habet.
Item Equisetum 3. siue palustre brevioribus setis:
Equisetum palustre, Lob. ic. p. 791. Et rursus,
Equisetum 10. folijs nudum non ramosum, siue
junceum ἵππουρις ἀφύλλος: Hippuris major,
Trago: Hipp. major altera, Lon. Sanguina-
li fœminæ similis, Cordo in Diosc. Polygonum
fœmineum, ἀφύλλος αὐλός, Thal. Equisetum
junceum, Tragi, & H. Lugd. Hippuris sine fo-
lijs & nuda, Tab. Equisetum nudum, Gerardo.
Cum autem, nos Equisetum junceum sæpius fo-
liaceum esse obseruauerimus, idè à primo Mat-
thioli non separamus. Palustre Lobelij quod at-

SECUND.

PPPP 3

Hipp. ma-
ior duplex
Trago.

Ic. secun-
da, Trago.

An Equi-
set palust.
Lob. H.
Lugd. Ic.
tras.

Tabern.
Ic. dua.

Nomina
linguar.

Synon. ex
C. Bauh.
bin.


C. Bauh.

rinet suspicamus naturæ lusum.

Locus & Tempus. In scrobibus ac locis aquas habentibus subinde & in pratis humentibus at riguis reperitur. Aprili & Maio prodit.

Equisetum minus terrestre.

Descriptio.



Hac Equisetum majus, *Asparages* emittit, sed graciliores, longioribus & laxioribus fimbriatis nigricantibus cotylis tubulos excipientibus: nucamenti æmulum capitulum apicibus albidis confertum consimile: verum ex geniculis *folia* radiatim enata, dodrantem æquant, & ipsa, quoque ex articulis sobolem radiatim pariunt, tota planta aspersa est sapore impensè siccante: radix nigra, caulibus crassitie respondet, fibris hinc inde exortis capillata, pluresque caules emittens.

Matthiol. in Dioscor. picturam tantum habet sine descriptione, sub titulo Equiseti alterius, quod ait vocari vulgò

Asprellam. In post. comm. It. eandem figuram retinet sub inscriptione, *Coda di canallo seconda*, omittens dici Asprellam, quâ occasione motus, nescio. Nullibi etiam describit suum Equisetum tertium, nec quâ in re à præcedentibus differat, declarat: suspicor ego alterius præcedentis varietatem: malè autem id C. Bauhin. phyt. Equisetum 7. siue junceum ramulosum folijs nudum, vocat. Sed cur junceum & folijs nudum: Matthioli figura demonstrat caulem cum folijs geniculatis, qualia cæteris.

Tab. Ic. Hippuris aruensis, siue segetalis minor, *grab Viller Schaffheuv*: Item, Equisetum palustre, *groß vasser Schaffheuv*. Eid. hist. Hippuris 3. siue aruensis 1. major: Dioscoridis, *ἵππουρος* *ἵππουρος* *ἵππουρος*, vel, ut quædam exemplaria legunt, *ἵππουρος*: Hippuris altera, Equisetum alterum, Gynus, Equisitium, & Equisetum raius. Equisetum aruense majus. Hippuris aruensis, & Segetalis major, ac Corfanda. Herbariorum: Italicorum, *Scuola*, & *Equiseto minore*: Gall. *Prila petit*: Angel. *Lyttel horse taylor*: Belg.

Clyon Poerdistert, & (*leyen Cattenstert*). Item Hippuris 4. Equisetum palustre majus, *groß maffer Pferdschvanz*. Et tandem, Equisetum 3. siue minus aruense, Hippuris 5. siue aruensis minor, *klein Vcker schaffheuv*.

C. Bauhin. phyt. Equisetum 4. siue pratense longissimis folijs, Hippuris maior Tragi [qui duo genera tradit, Majus & Minus]: Item, Equisetum 5. siue aruense, Hippuris minor Tragi. Eid. pin. Equisetum 8. siue pratense longissimis setis: Equisetum alterum Matth. (& apud eum, Cam.) Lac. Cæf. & H. Lugd. Hippuris altera Trago & Anato: Hippuris & Equisetum, Gesn. cat. Equisetum Fuch. ic. & Cordo in Dioscor. Equisetum longius, Dod. gall. [figurâ transpositâ] & Fuch. Hipp. major, Thal. prima, Lonic. Hipp. fontalis & Equisetum 2. Dioscor. Lobel. Hipp. minor, Lob. ic. figurâ 1. Equisetum palustre majus Tabern. palustre Gerardo. Item pin. Equisetum 9. siue aruense longioribus setis: Hippuris minor, Trago, Dod. & Thal. Hipp. altera, Gesn. cat. Equisetum, Et. Cordo, minus, Fuch. figurâ transpositâ minus vel 3. & 4. Lonic. Polygonon femina Fuch. ic. Equisetum alterum, Cordo in Dioscor. & Lob. ic. Hippuris aruensis major, Tab. Equisetum segetale, Gerardo.

In sabulosis ac arenosis exit, sed tamen haud irriguis: in vliginosis non raro. Aprili & Maio prodit.

Synonyma.
C. Bauhin.

Locus & Tempus.

EQVITI SPECIES ALIQVOT C. BAVH.

Equisetum nudum minus variegatum Basileense.

Ex radice parua nigra, transuersâ, nonnihil capillatâ, cauliculis plures inæquales, rarissimè pedales, communiter palmates, semipalmates, & multò breuiores, striati, pallidè virentes, geniculis parte inferâ nigris, supernè albidis, articulatî: folijs carentes & cauis in quorum summitatibus capitulum brevissimum juli instar insidet, quod à corona alba, ex octo, nouem, etiam duodecim, foliolis acutis composita, sustentatur: & quando pedibus calcatur, crepitat. Equisetum hoc quod auctori 4. in prod. est, in pin. verdè 12. provenit ad ripam Rheni, juxta locum *die Baar* dictum.

Descriptio.

Equisetum palustre tenuissimis & longissimis setis, Eiusdem.

Culmo est inani, bipedali, geniculis pizidatîm coherentibus articulatîo, cum cæteris conueniens, exceptis folijs, siue setis junceis, longis, multòque [Polystachio] tenuioribus. Equisetum 3. in prod. 6. in pin. in palustrib. Michelsfeldensibus.

Descriptio.


EQVISETVM SIVE HIPPURIS TENVISSIMA non aspera.

Ad caulium articulos exoritur, seta in orbem numerosa, longissima, fili instar tenues, geniculatæ, & ad singulas juncturas cristatæ, moles, siue asperitate, multò tenuiores, quàm Equiseti minoris vulgaris: diversum tamen longè, à Polygono femina, ne quis confusionem aliquam suspicetur.

Descriptio.

Tabern. hist. Equisetum 6. Hippuris sylvatica: Eid. ic. Equisetum sylvaticum, *vvaldt Schaffheuv*: Germ. *vwood horse tail*. C. Bauh. pin. Equisetum 7. siue sylvaticum tenuissimis setis, Hippuris

Locus & Tempus.



Vires & vsg.

Temper.

Vulnora tenuium intestinum.

Hippuris minor altera Trag.

In mōte Balneo admirabili proximo mēse Augusto ad torrentem in silua. Item in pratis juxta sepes loco non nimium humido, vltra Mafmonster Soncouze, non lōgē à Sibérhal vltra lacum.

Dioscorides Equiseto vim tribuit spissandi: quare sanguinem nari-


bus erumpentem succus ipse sistit: prodest dysentericis in vino potus: vrinam cit: sanguinolenta vulnora glutinatur tritis folijs & illitis: radix cum sua herba tussim, orthopneam, ruptaque adjuuat: folijs in aqua potis, dissectiones vesicæ & intestinorum, Enterocelæque in vnum coalescere, cogique feruntur. Equisetum alterum cum aceto tritum vulneribus remedio est, eademque fungitur facultate. De Cauda equina hæc prodit Galenus, Hippuris adstringentem cum amaritudine qualitatem possidet, ac proinde valenter, simulque citra mordacitatem exsiccantem. Itaque vulnora vel maxima cataplasmate imposita glutinat, etiam si prædictos esse nervos contigerit: præterea vocatas enterocelas glutinat: sed & ad rejectionem sanguinis, ad profluuium muliebrem, potissimum rubrum, ad dysenterias, & reliquos ventris fluxus, strenuum ac generosum est remedium herba ipsa, aut ex aqua aut ex vino epota. Sunt qui de ea scribant, quod nonnunquam etiam vesicæ, ac tenuium intestinorum vulnora sanant: ejus succus prodest etiam profluuium sanguinis prorumpenti ex naribus, tum fluxui obnoxii in ventre passionibus ex austerorum vinorum quopiam potus: ac si febre teneantur, ex aqua. Quæ Tragus de vfu externo habet, ante adscriptum. Germen tenerum, juglandis julo simile, refert Matthiolus, rura vulgò vocatè *Palustrale*, inque cibum assumere, jejuniij quadragesimalis tēpore: etenim illud prius elixant, mox fatinā circumspargunt, & oleo in sartagine frigunt, manduntque piscium vice: ex quo cibo alius quandoque eorum adeò constringitur, & constipatur, ut in colicruciatio facile incurrant. Sunt qui primum hoc Equiseti germen siccum asseruent per annum, quo subinde Æstate vrantur ad dysenteriam: quippe quod aqua calida nocte maceratum eo modo decoquant, quo dictum est, & in cibum magno successu exhibent. Liorea Equiseti aqua stillaritia repente madentia, erysipelas sanant imposita, ardentem ani calorem extinguunt, alui profluuium sistunt pudendorum tumores reprimunt.

EQUISETVM FOETIDVM SVB aqua repens.

CAP. XXVIII.

Descriptio.

SVpra modum fragiles habet culmos, ut vix cōstrectari possint, quin in puluerem ferè soluā-



tur, aquis autem innatat, crebris tenuibus albican-
tibus culmis, alperimis & vcluti sulphurearum aquarum sedimento arenoso oblitis.

Hæc est Hippuris minima, à Dioscorid. non descripta, semper in aquis nascens, præcipue cœnosis, & in ijs sapius demersa, interdum emergens, grauis odoris & luti-

A Diosc. non descripta.

Equis. Pini folijs simile Plinij. Dal.

Chara Lugdunens.

Equis. foetidum, C.B.

lenti, inquit Dalechampius apud Plinium. Intelligit autem Hippurim Plinianiam, Pini folijs similem, nigricantem, cujus vim admirabilem tradunt, quod sc. sanguis profluuiis vel tacto eam tantum homine sistat.

Est H. Lugd. p. 1070. Equiseti quintum genus, Equisetum minimum, aquis cœnosis innatans vel sub ijs occultatum semper breuissimis & alperis setis, ac caulibus, lutosum virus olentibus, quod Lugdunenses *Chara* vocant, & quo lances escarias & reliquam ejusmodi suppellectilem abstergunt.

C. Bauh. phyr. Equisetum 8. siue olidum, Eid. prod. Equisetum 5. (13. in pin.) siue foetidum sub aqua repens.

Solum in cœnosis demersum reperitur, quod primum Patavij in fossis Thermarum Aponitarum: dein non longè Lucernâ: tum Basileæ cis pontem, Michelsedæ & Honningæ in fossis obseruatum. Reperitur & Genevæ, vbi ejus vsus est ad emundanda vrentilia.

POLYGONVM FOEMINA, VETERIBVS.

CAP. XXIX.

Polygonū fœmina (πολύγων θήλυ Sanguinaria fœminā vertit Ruell. Romani inter spuria, Seminalē vocant.) Diolc. *frutex* est exiguus, vno caule præditus, tener, & Arūdinī similis, geniculis densus: quorum alia alijs tubarum modo inseruntur, infarciunturve. Ipsos verò geniculorū articulos cingūt in orbē apices foliolis Pini similes: radix Superuacanea [ἀργή]. Nascitur in aquosis. Huc vis adstringēs ac refrigerās, ad eadē valens, ad quæ Polygonum mas, sed inefficacior.

Diosc. leth. variat.

Plin. l. 17. c. 3. (Polygoni) genus facit ac Oreon (Horeum, ὅρειον pulchrum. Vet. Oureon.) vocari refert, in montibus nascens, Harundinī teneræ simile, vno caule, densis geniculis, & in se fractis [in se fractis, Dal.] folijs autem Picæ, radicis superuacue, inefficacius quàm superiora (quàm primum & secundum genus.) Peculiarē ischiadicis.

Plinij non.

Eodem verò nomine sequentes insigniuntur plantæ, scilicet: Polygonum 1. Dodonæ. Equisetum majus palustre. Equisetum folijs nudum non ramosum, Casp. Bauh. Equiseti facie Polygonum fœmina.

Synon.

*Equiseti facie Polygonum femina.*Descri-
ptio.

Cvbito altiores caules ex radice alba surri-
git, rectos, Equisetorum modo crebris ar-
ticulis pyxidatis geniculatos, crassiusculos, mol-
les; inenes, minimè striatos, quibus ad jun-
cturas nascuntur in orbem folia radiata, Galli
inftar aut Rubie lenis, vnciam circiter lōga per-

angusta, vni-
co nervo per
longum dona-
ta, suprā quē
ad eōdem ar-
ticellos cir-
cum circa se-
mina nuda, ex
rotūdo oblō-
ga, herbę con-
coloria, Fra-
garie seminis
paria.

Polygonon
femina Romanos eodem
nomine Semi-
nalem appel-
lare: Rura gal-
lica verò a-
quaticā Pinū
testatur Ruel-



Seminalis
Romano-
rum Pinus
aquat.
Callernm.

lius. Miratur is (vt & Dalechampius & Sarrace-
nus) Plinium, tradentem tertium Polygoni ge-
nus, Montanum siue Oreon ab eo appellari, cum
aquosis tantū sit familiare, nec in montibus
nisi forsitan opacis multiplicique aquarum sca-
turigine madentibus, inveniri constet.

Polygonum femina, Dioscor. Marthiol. Er. *Reliqua
synon.*
Cordo, Gesn. hort. & cat. Dodon. lat. Amato,
Anguill. Cast. H. Lugd. & Tab. Polygonon
femineum, Thal. Polygoni tertium genus,
quod Oreon, Plinio: Sanguinalis femina, Dod-
gall. Cauda equina femina, Gerardo.

C. Bauh. phyt. Equisetum 2. siue aquaticum bre-
uioribus setis: Eid. pin. Equisetum 4. siue palu-
stre brevioribus folijs polyspermon: Sanguina-
lis femina Cordi in Dioscor. Hoc communiter
siue semine repetitur, aliquando ad singulas ar-
ticulorum commissuras densa & plura semina
(hinc polyspermon) adnascuntur. Nos negamus
esse Sanguinalem feminam Cordi: Ejus enim
Polygonum femina est Equiseti genus.

Πολύγονον Φῆλυ Græc. German. Johannenvadel:

Ital. Polygoni femina, & Corregiola femina:

Hisp. Polygoni hembra: Gall. Rencle
femelle, & Pin aquatic. Belg.

Duyfens knoop vryfken.

Angl. the femelle
horse tail.

C. Bauh.

Nomina
linguæ

FINIS LIBRI TRIGESIMI SEXTI.





HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER XXXVII.

SAXATILES, VT FILICES ET CAPILLARES, HISQVE
ALIQUA SIMILITVDINE ACCEDENTES.

SATIS iam satis Plantarum notis atque ex his classibus assignandis inbasimus. Nunc & loci privilegia a-
ssignaturi (cum & horti, campi, prata, ac sylua satis lustrata videantur) montium praecepta & confragosa:
iterum, rudera, parietinas, crepidines, etiamq; speluncas visitemus, ut quid etiam in his rebus, videamus. Ac
per rudetorum, colliumque cassites properantibus, vulgarissima statim occurrunt Filices, & his cognata qua-
dam alia.

FILIX VETERIBVS.

CAPVT I.



THEOPHRASTVS
Hist. c. 16. folia ad-
scribit Filici multifi-
da, & quasi serrata, vt
Abieti. Porro 8. hist.
8. addit stercoreatio-
nem frumentis & re-
liquis herbis, præter-
quam Filici, prodesse:
hanc enim simo
superinjecto interire

aliquos affirmare: interire & pecore incumben-
te Libro autem 9. c. 10. tractat de Filice foemina,
& quid differat à mascula: sequentibus docet. Filix
foemina utilis contra interaneorum animalia la-
ta, melle subacta: & contra tenuia, in vino dulci
cum farina hordeacea data: si mulieribus grauidis
datur, abortum facere: si cæteris, steriles in totum
reddere, aiunt. Differat foemina Filix à mascula,
quod solum vnico actu porrectum hæc habeat,
& radicem crassam, & longam, & nigram. Harum
igitur vires sterilitati addidisse natura putatur.
Eodem lib. 9. cap. 12. addit ejus radicem colliqua-
tam tantum in vsum venire: gustum adstringere
non sine aliqua dulcedine: lumbricum latum ex-
pelleret: semine ei nullum esse, nec succum *ὡς δὲ ὄπριον*.
legendum arbitratur Cornarius *ὡς δὲ πικρὸν*: vt sit
quod Dioscorides ait, *πικρὰ ὡς δὲ ἀκνὸν*. Nam &
ipse Theoph. succum habere dixit, quem *χυλὸν*
appellauit: vt de *σπῆν* negare non debuerit] quem
emittat, hanc habere: Autumno succidi tempesti-
uè assignari. Blechri ramuli [de Filice hæc scribe-
re Theophrastum lib. 11. caul. cap. 8. concludimus]
plantâ abscissi, seruare suum vitale principium

Tom. III.

possunt, ita vt ad germen etiam excitandum mo-
uere se valeant: nam ex quoque solstitiis florer,
quod permixtum est. Et licet sicca omnino sentia-
tur, principium tamen quoddam ejusmodi ha-
beat necesse est, quod vnâ cū aëris mutatione, al-
terationeq; moueatur. Mirum præterea quod nō
remissa, sed potius intentâ siccitia temporis in-
cipiat: nisi forte dies halcyonides suffecturas pu-
taueris: nam ad imbecillorum, exiguoꝝque
mutationem, vel quantumlibet temporis satis
est.

Duplex est Dioscoridi Filix, mas & foemina.
Filicis[mari scilicet quæ simpliciter *πρίμ* etiam à
Theophrasto vocatur] quam aliqui Blechnon
[*βλάχρον*, Vet. *βλάχρον*, Theocriti scholiastes *βλά-
χρον* appellat,] alij Polyrhizon [*πολύριζον*] ap-
pellant, folia sine caule [*ἀκαυλὰ*] sine flore [*ἀνάν-
θη*], sine semine [*ἀσπρὰ*]: eaque ex vno pediculo
cubitali ferme longitudine exeunt, incisa, & pin-
narum modo vtrinque expansa, subgani odores
radicem verò habet per summa caespitem nigram
[*σπινθίον*, vet. addit.] quadantenus longam, mul-
tas fundentem propagines, quæ sunt sub adstrin-
gente gustu. Nascitur in montanis, saxosisque lo-
cis. Huius radix latum lumbricum, quem teniam
vocant, excutit, sumpta drachmis quatuor ex a-
qua mulla: melius, si cum Sammonij aut Ellebori
nigri toridem obolis datur: verum eos qui su-
munt alia prius edisse oportet. Eadem laboran-
tes ex liene efficaciter restituit. Quinetiam cum
axungia contrita & imposita, ictus ab arundine
efficaciter auxiliatur: cujus rei probatio talis fer-
tur. Perimetor Filix, quam per ambitum lata co-
piosior arundo cinxerit, & è contrâ, extinguetur
& euanescet arundo, quam multa Filix circum-
dederit.

Diosc. TM
lix du-
plex.
Marb.

Lotus
Vireo

Thelypteris
733

Thelypteris [*Θελυπτήρις*, i.e. Filix fœmina] quam aliqui *Nymphæum Pterin* (*νυμφαίων πτέριν*) nominant, *foliis* est Filicis, quæ tamen non singulari ut illa, pediculo hærent, sed è numerosis, altioribusque propaginibus exeunt. *Radices* subiacent longè in obliquam, numerosæ, ex nigro flauescerites: aliquæ etiam nouæ rubræ inveniuntur. Et hæ quoque radices cum melle in eclegmate sumptæ lara interaneorum animalis pellunt: potæ verò ex vino drachmis tribus teretes lumbricos ejiciunt. Datæ fœminis, conceptum impediunt: quod si à gruida sumantur, abortum illa faciet. Earundem farina præhumidis & ægri sanesceribus vlceribus inspergitur, ac iumentorum quoque ceruicibus medetur. Cæterùm elixa folia, quæ recens eruperint [ultima hæc periodo, vet. caret] olerum vice manduntur, ut alium emolliant.

Filix duo genera [ait Plinius lib. 27. cap. 9. nec florem habent, nec semen. Pterin Græci vocant, alij Blechnon (Nicander *βλέχνον*: Interpret *βλάχων* Sed Phanius apud Athenæum lib. 2. filicam *βλάχων* vocari scripsit, Dal. (cuius ex vna radice complures exeunt filices, bina etiam cubita excedentes longitudine, non graues odore. Hanc marem existimant. Alterum genus *Thelypterin* Græci vocant, alij *Nymphæum Pterin*. est autem singularis atque non fruticosa, breuior, molliorque & densior, foliis ad radicem canaliculata. Vtriusque radice [extremi Northmaniz populi panem conficiunt, & : Hæc Dalech. interponit] sues pinguescunt. Folio vtriusque lateribus pinnata [pinnis, *τῆς πτερῆς*, auium similia, vnde *πτερίς* Græci vocantur, & Celsus in suis Geopon, apud Columellam, Auian, quam ad iumentorum collum in opere contusum, cum saleritam & impositam, remedium esse præsentissimum scripsit, ad quem usum Filicem fœminam Dioscorides commendat. Dal. [vnde nomen Græci imposuere. Radices vtriusque longè in obliquum, nigræ, præcipuè cum maturæ. Siccare autem eas Sole oportet. Nascuntur vbique, sed maximè frigido solo. Effodi debent Vergilijs occidentibus. Vfus radice in trimatu tantum neque antea, neque postea. Pellunt interaneorum animalia, ex his tæniæ cum melle: cætera ex vino dulci tridud potæ. Vtraque stomacho inutissima. Aluum soluit: primò bilem trahens, mox aquam: melius tæniæ cum Scammonij pari pondere. Radix eius dudum obolorum pondere ex aqua, post vnus diei abstinentiam bibitur, melle prægustato contra rheumatismos. Neutra danda mulieribus, quoniam grauidis abortum, cæteris sterilitatem facit. Farina earum vlceribus tectis inspergitur: iumentorum quoque in ceruicibus. Folia cisticem necant: serpentem non recipiunt. Idem subterni vtile est in locis suspectis: vltæ etiam fugant nidore. Fecere Medici huius quoque herbæ discrimen. Optima Macedonica est, secunda Cassiopica. *Idem libro 24. cap. 11. ait Filicis radicem contritam & impositam, Harundinem corpore extrahere, & contrâ. Libro autem 18. cap. 7. dixerat Filicem biennio mori, si frondem agere non patiat. Id efficacissimè contingere, germinantis ramis baculo decussis. Succum enim ex ipsa defluentem, necare radices, Famam esse & circa Solstitium auulsas non renasci, nec Harundine sectas, aut exaratas vomeri Harundine impositâ. Similiter & Harundinem exarati Filice vomeri impositâ, præcipi.*

Cæterùm, pessimam ex furculis Harundinem

esse, quia aspera sit, eademque offensam etiam Filici inesse, Plinio prior Celsus lib. 3. cap. 16. tradidit, vsûque cognitum esse scribit, vtramque aduerius alteram medicamentum esse, si contrita superimponatur.

Galenus lib. 8. comp. med. secundum loca cap. 8. integ. auxilia hepatica ab Asclepiade conscripta hanc enumerat: vnde in hepaticis affectionibus medicis admodum superstam esse miratur Aug. Ferrerius.

M. Rulandus cent. 3. cur. 24. ad icteritiam nigram, splenem oppilatam, induratum, dolentem, & pungentem, pro potu in vino exhibet radicem Filicis.

Tragus virium non meminit vel fructus, vel seminis, quæ se in fœmina reperisse affirmat: sed nec Turnerus eas expertus est, non tamen vanâ coniecturâ se colligere scribit in multis morbis curandis maiorum esse virium, quàm radicem, aut folia.

Et licet Theophrastus, Dioscor. Plinius & Galenus Filicem *ἀσπερον* esse affirmauerint, id est, sterilem & sine semine: & nec Medici Arabes & Persæ ad magicas vanitates nati, huius seminis meminerint: tamen vel agyrtæ circumforanei, vulgi ignorantiz ad quæstum impudenter illudentes, & semen ostendunt, & vendunt, quod Filicem ferre aiunt, aueris folijs inhzrens, sed aded minutum, ut visum ferè fallat: legique abscessis prope radicem folijs, & in domo suspensis, substrato linoleo, aut papyro, circa finem Iunij, vigiliam sc. D. Io. Baptistæ. Alij ipsamet Solstitiali nocte eam florere, eademque horâ cum defloruit, maturum semen in terram cadere: ideoque nisi quis præsens tunc fuerit, nec videri florem, nec colligi semen posse, scripserunt. Et hæc tamen à plurimis commenticia esse & superstitionosa putentur, ideoque refutantur, tamen nonnulli etiam docti aliter rem se habere cognouerunt, & à Theophrasto aliter traditum sciunt. Tragus enim eadem publico scripto asserere non dubitauit, testatus se neque superstitione ductum, neque prestigijs, aut incantationibus, aut vllis caracteribus usum, rem aggressum, esse, & quater in vigiliæ D. Ioannis nocte tentasse, substratis linoleis & Verbasci folijs, an semen id deprehendere & excipere posset: & sanè contigisse sibi fatetur, ut manè ante illucens diem, semen paruum nigrum Papaueris specie repererit, & hoc amplius & copiosius sub alia atque alia Filice, alio item atque alio anno. Quare Carnarius immeritò mendacij insinuat Tragum. Numquid enim ipse Theophrastus 1. causa 8. *βλέχρον* circa Solstitium florere, velut rem maxime admirandam producit?

Nunc, Filicem contra ictus ab Harundine factos, idem vtilem ait Dioscorides, quod Filix per ambitum satâ Harundine pereat, & vice versâ, Arundo Filice septa. Sed hanc probationem ceu vanam damnat Dodonæus. Sed & vanum est, existimare Filicem Arundinis familiaritatem per singularem aliquam antipatheiam respicere seu refugere, ita quidem ut veteres perituram dicant Filicem, quam per ambitum satâ copiosior Arundo coronet, & contrâ euanescentem & abituram Arundinem, quam obseprens multâ Filix in orbem cinxerit. Hoc enim haud aliunde contingit, quàm quod Filix in humidis non adolescat, nec Harundo in sicco. Hæc enim nusquam lætids prouenit, nulloque alio genitali loco gaudet, quàm fossis, vliginosis & humectis praxis ac campis:

Semen Filicem ferre vs non esse signum.

Dioscor. opinio reprobatur.

Genera duo Plinio. Pterin.

Celsus.

pis : Illa verò sylvis, rorulentis saxis, arenosis agris, & limitibus imprimis gaudet, ita ut binæ hæ plantæ, ob diversitatem natalis loci, simul habitare non possint. Nunc verò quòd Filix loca sterilia, arida, ac deserta amet, testatur Horatius.

Tempus.

Neglectis vrenda Filix innascitur agris.

Marcescit Filix sub Hieme: noua Vere erumpunt folia, tota Æstate in vigore futura.

Filix secundum Isidorum à singularitate folij dicta, quòd ex vna virgula altitudine cubitali scissum folium gignatur: Nicander in Ther.

Εν δὲ πολυχιδίαις βλαύθρον πυρὶ βάλανιο χάρυν. Interpr. Multitudinem Filicem crepitantibus in ilice flammis.

Nomina
linguar.

Πρίρις autem & πρίριον à Græcis dicitur ab alijs, autem, ut ante ex Dalechamp. in Plinium dictum, quarum speciem in ramulis disposita ejus folia referunt: pennatus enim & pennatis folijs frutex Filix est. Vocatur ab Arab. ut Serapione, *Sarax* & *Sarachs*: Auicenna *Kildarum*, vel *Childarum*: à Germ. *Farn*, *farn*, *farnkrant*, *farnkrant*, *uvaldisaren*, *steinfaren*: Belg. *Varencruyt*: Gall. *Fougère*, *Fouchère*: Ital. *Felce*: Hisp. *Holchoyerna*: Angl. *Fern*: Boh. *Kapradý*: Hong. *Papragy*.

Aequino-
ca.

Obseruandum autem hoc loco subscripta nomina cum præcedentibus, omnibus serè Filicium generibus attribui, Pteris sc. Pterion, Filix, Filicula, Polyrhizon, Pterineon, Dasyclonon, Anasphoron, & Blechnon: item, ut magi vocant, Hermubain, vel, ut Egyptij, Asini sanguis, vel, ut alij, Iacula.

Mirari autem subit, quo pacto Filiculæ appellatio ad Catanancem de qua Dioscorides, agit, peruenit. Trichomanes autem vocari Filiculam dicitur suo capite. Filix & Filicula dicitur etiam de Polypodio. Et quæ sunt aliæ plantæ Filicis nomine donatæ, de ijs posthac agitur.

FILIX MAIOR ET PRIOR TRAGO, sive ramosa, repens.

Descri-
ptio.

Res quatuorve cubitos altus hujus caulis, inque rigidus, fibrosus & in ramos fissus, aliquatenus angulosus: *Folia*, quod nomen indicat, pinnat, alaræve, dissecta, superius, glabra, inferius hirsuta: *radix* digitum subinde crassa, foris nigricat, intus, albet, longè latèque importuno reptam terram occupans; sapore amaricante, succo que glutinoso prædita.

Filix
sive Dod.

Dodonæo est fœmina Filix, flore ac semine carens: caule unico striato, medullâ referto, versicolore, quo obliquè inciso, bicipitis aquilæ species quædam apparet: odore radicis grani.

Filix ma-
ior prima
Trago.

Trago, filicis majoris: genus, filix vstratissima, in arenosis agris proueniens, unico, purpureo, rotundo, longo & læui caule, multifidis lateribusque pinnatis & viridibus folijs vestito, radice longâ, læui, foris nigrante, longè dique intra humum sese propagante, quo nomine magno est nocumento agricolis. Ita enim in agris remotatur, ut non faciliè extirpati queat. Quamobrem ad superstitiones quidam confugiunt, persuasi si frumentarius ager, quem Filix obsedit, in die Io. Baptistæ sacro aratro vertatur, perituram filicem, nec vnquam eo in Tom. III.

agro locum habituram. Sed certiorẽ perden- di filicis rationem Theophrastus demonstra- uit. Atque hæc est Trago filix mascula prior, filicis maximum genus primum, Pteris Dios- coridis, cui florem & semen attribuit, uti an- tea diximus, & cap. de filice floribus insigni fusiùs repetemus. Et huic adscribit nomina præ- cedenti capite apposita. Hoc demum admira- tione dignum censet quod filicis, maximè ve- ro masculæ, radix incisa, utraq; in parte æqui- lam nigram duo habentem capita ex albo ostendit, quæ nil aliud re ipsa est, quàm congeries ve- narum quæ per vniuersam radicem sparsæ sunt.

Cornarius utramque filicem notam sibi ait, nec tamen inter marem & fœminam discrimen facit. Oportebat autem eum, priusquam impu- denter Tragum mendacij accusaret, circa se- stum D. Iohannis, sub filicibus sternere chartas & obseruare an vera dixerit Tragus diligens botanicus, quæ non tantum ex libris, sed repe- ritâ antopsiâ scripserat. Nec etiam veteres om- nia obseruare poruerunt, nec potest adhuc, aut vnquam poterit ullus mortalium. Et sanè plu- res hodie obseruantur plantæ semen ferre, quas veteres steriles pronunciarunt. Et hæc occasio quare contra veterum & neotericorum opinio- nem omnes filices & similes, quæ veluti flo- rem habent in folijs, semen ferre putamus, sed ita tenue, aut citò excidens, ut difficilè conspi- ciatur.

Lonicus pro Thelypteri sive filice fœmina haud congruam ponit iconem, sed talem, quæ potius filicis multifloræ videtur. Quin ea, quam pro Dryopteride exhibuit, meliùs conuenit.

Dicitur filix fœmina Cordo in Diosc. Anguil. Matth [qui eam sine descriptione pingit] Fuchf. Lac. Dod. gall. & lat. Lob. in Adn. Obs. p. 473. Ic. Plant. p. 812. Cast. Tabern. & Getar. Filix fœ- mina Matthioli, H. Lugd. p. 122. filix mas, Gesn. hort. & app. filix mas major, fœmina vulgè Herbariorum credita, Clusio pann. & hist. filix fœmina prima, Thallio.

C. Bauh. pin. filix ramosa i. sive maior pinnu- lis obtusis non dentatis, communiter per ambi- tum aliquando, tantum folijs inferioribus, ad formam foliorum Scabiosæ, diuisa. filix silue- stris, Brunfelsio.

Cæsalp. filicem singulari pediculo attollit; crasso, duro, læui, striato, cubitali, in cacumine in magnos ramos fissis, &c. foliosis in aduersa parte furfuracæ quâdam lanugine præditis, copiosiore in tenellis, nuper erumpentibus à terra: Lanugi- nem postò procedente tempore decidere, renas- ci que ex ea nouellas plantas probat, filicibus, ubi antea non fuerint, in terram projectis, aliis- que copiosè nascentibus.

Filix vbique siluis & neglectis, loculisque nas- citur agris, adeoque vitâ & restibili vberta- te luxuriat, ut etiam Sole seruidissimo, tenuique solo, vicinis enectis plantis non marcida per- ster, totòque colles impleat: ex decidua lanugi- ne renascens, ut tradit Cæsalpinus.

Rarè in medicina locum habet, quanquam ra- dix naturâ suâ siccæ temperaturæ, in puluerem redacta, ac pondere semoniz ex aqua mulla sũ- pra, latis rineis ventris enecandis conducit, teste Trago. Quòd si Scammoneam, aut Veratrum ni- grum adjeceris, ed efficacius reddes medicamen- tum. Eadem in vino decoctâ, ac per aliquot dies pota, laborantes lienis excremento recreat. Ad

Qqqq 2

Corn. H.
darg.Lonic. H.
gmel.
sum.

Synon.

Locu.

Vires &
vius.

ambusta vel igne, vel feruidâ aquâ, aut Oleo, singulari experimento radicis succus expressus facit, si ei miscueris aquam rosaceam, aquam è fimo vaccino, aut è flore Tiliz, distillatam, vel si harum nulla suppetat, fontanam. posteaque percolaueris, tum enim lentus quidam succus ex his conficietur, qui mirificè ambustis, vbi reliqua omnia medicamenta negauerint auxilium, medebitur. Armoricos & Neustriorum ultimos, qui vastas siluas colunt, in frugum inopia, è radice Filicis panem conficere norum est ex Dalechampi relatione, ejusdemque cineribus nitri loco injectis, saxa liquare, & vitrea vasa fingere, colore viridi & subobscurò, quibus vinum album, dulce, turbidum potare Andes, Voelli, Cenomani gratissimum habent.

Filix maior molis ramosa.

Descriptio.

In ramos prælongos diuisa, similis Filici ramosæ Tragi: alarum etiam tarsi particulares eodem modo alternatum habent exortum: quorum singularia segmenta paulò videntur latiora brevioraque, denticulorum expertia, vt jam dictæ Filicis, quæ non tamen vt illi dura, sed mollia, nec subrus incana quantum hætenus adinuenierim.

Locus

Filicis hoc genus, ni fallor, circa Tigurum Heluetiorum collegi meminitque ejus Gesn. in app. hort. nomine Filicis maris mollioris.

FILIX FLORIBVS INSIGNIS.

Descriptio.



EX vno perplexarū radicū lōgarū, nigricantiū cespitè caules tollit bicornitales (ad hominis altitudinem, Trago) virides, glabros [striatos, Lobel.] ramis parulos: hinc alæ exoriantur pinatis octo nouemve conjugationibus foliorum, impari vno numerū claudente, constantes: singularia autem folia omnia sur-

sum spectant, triū, quatuorve unciaū longitudine, semunciam lata, ex principio latiore sensim attenuata, in obtusum tamen utriusque mucronē desinentia, neruo per longum decurrente, exportectis in margines (qui integri sunt, nec crenis secti) infinitis oblique venulis: Tragus comparat folia Polypodio: caulis scapus in surculos aliquot diuisus, racemulos unciales in singulis surculis multos sustinet, seminibus multis confertissimos, vt obseruabat Gargillus, licet dicat Tragus florem ferre in vertice copiosum, candidum, similem Pycnocomo, qui circa festum Io. Baptistæ, nullo post se relicto semine decidat. Vel, vt dicit Lobel. palmares & sesquipalmares thyrsos & florū ligulas oblongas, densis racemulis, Lumariz & Ophiglossi æmulis, aut potius Tamari-

cis Narbonensis nuper erumpentis, quæ ex ferrugineo, fulcescunt, inque cariosum & puluerulentum sium fatiscunt, seminum speciem aut spem ostentantes: Dodonæo circa ramulos densa veluti seminum futurorum rudimenta adherent, quæ tamen semina non sunt, nam sterilis & hæc Filix, vt cæteræ.

Ruell. lib. 3. cap. 92. Sideritidis eam speciem facit, quam Chymicos & Herbarios quosdam Lunariam maiorem, alios verò nonnullos Filicastrum appellare refert. Sed vereor ne Filicæ stro falsò attribuat, semen Betæ, rotundius ac durius.

Gesnero Filix latifolia Cordi eadem aut proxima videtur cum hac nostra Filice, quam Tragus Filicis majoris alterum genus inscribit, & Filicis masculæ genus esse statuit.

Lonic. videtur picturam hujus exhibere stulo Grosz vvaldsarn vveiblin: hujus tamen Filicis descriptionem non ponit.

Gesn. hort. Filicis genus rarius, floribus insignis, à Trago depictum. De Lunar. picturam Osmundæ Dodonæi (quam Sideritidem alteram Dioscordis asserit, & Chymicorum atque herbariorum quorundam Lunariam maiorem) diuersam putat à Tragi Filice maiore & filicetiore cæteris, ejus hinc effigiem damus. Sed ab eo hac in re dissentimus. Non placet quidem figura Osmundæ Dodon. gall. quam Filicem aquaticam & Filicastrum quorundam cognominat: gall. Osmunda ou Feugiere aquatique: Belg. vvalter Varen, & vvaldi Varen, quibusdam Sinre Christophori herba. Album verò illud in medio radicis, Cor. Osmundæ vocat. In fol. lat. vbi duæ Icones vulgè quidam Osmundam in Belgio dici testatur: sed rectius Filicem palustrem aut aquaticam nuncupari sit, viderique haud dissimilem ei Filici, quæ πικρα μυρία à Theophrasto appelletur, cui Polypodium simile facit: siquidem hujus singulare folium, Polypodij folio latius simile sit.

Nullam licet viderit Turnetus plantam, quæ rectius Sideritidis alterius descriptioni conueniat quàm hæc Osmunda quibusdam dicta: veteretur tamen ne cacumen & semen ventent.

Recentiorum Osmundam, Filicem floridam, regiam cognominat in Adiu. Lobelius, à regijs, vt ait, ac præclaris viribus. In Obs. pag. 474. & lc. pag. 813. Dodonæi duas imagines hoc titulo donauit: Osmunda, Filix florida, Filix latifolia Cordi.

H. Lugd. pag. 1225. prodit Filicem aquaticam Dodonæi [gallici sc.] & Osmundam regalem, Pseudo-Lonchitidem asperam vocare Matthiolum, eoque nomine depingere: Porro Tragus aliud Filicis majoris genus exhibere, idque Osmundam vocare Lobelium, hæc tamen ab Osmunda Dodonæi differre: Item, Filicem florentem Tragi, fortè Dryophonon Plinij lib. 27. cap. 9. fore. Sed compiler, Hist. Lugdunensis dupliciter, meo judicio, fallitur. Primo, quod Filicem aquaticam Dodonæi eandem faciat cum Pseudo-Lonchitide aspera Matthioli: Secundo, quod eam Filicem separet à Tragi Filice florentem, & Lobelij Osmunda, deceptus fortè Icone minùs bona Dodonæi gallici, qui eam in fol. lat. mutauit.

G. Bauh. pin. Filix ramosa & non dentata, florida: Sideritis fortè Ruellio: Filix mas Anguill. Filix latifolia Cordi hist. Filix palustris, Gesn.

Sideritis
Ruell.

Filix
rarius
Gesneri.

Catena
lygae.

Gefn. app. Lunaria, maior, seu Filix lunaria & Filicastrum, Eiusdem de Lunar. An Filix palustris, Czf. ? Huius species tenuiter dentata reperitur.

Locus & Tempus.

Nascitur locis rignis ac palustribus: non raro in fossis aquas habentibus, in humidis quoque silvis. Apud Gallos, tum apud Britannos plerisque locis reperiri recitat Dodonæus: Germaniæ ac Belgio quoque frequentem ait. Vigere autem Æstate: Hieme marcescere folia, radice restibili. Ego in diuersis hortis obseruavi, etiam floridam.

Vires & vsus.

Quo pacto ad ambusta faciat, præcedenti capite diximus. Scribit Lobelius radicem ad hernias & ulcera exploratissimè comodi esse. Quinetiam colicis & splenicis plurimum conferre. Nonnihil calidam esse & acrem, odoris non ingrati. Radix, inquit Dodonæus, calida est & sicca, sed minus quàm vel maris, vel sceminæ Vitilis habetur, ac præsertim, pars illa radicis media, subcandida, quæ efficacissima putatur, non modò vulneratis, sed & cæcis, ruptis, ex alto deturbatis, decocta vel etiam tula, & cum liquore aliquo sumpta: In decoctis, quæ vulneraria recentiores appellant, rã de causa ab empyricis additur. Sunt qui tantam huius potentiam existiment, ut sanguinem alicubi intra corpus hærentem ac concretum dissolvere queat, & foras etiam per vulnus expellere.

HERMIONITIS ALTERA DALECHAMPJ, Filici floridæ similis.

Locus Descrip-
tio.



IN illa pro-
uenitradich.
multis capilla-
cèl tenuitate,
breuibus, sub-
nigris: caulicu-
lis, pedalem al-
titudinem vix
attingentibus,
in folia septem
seu aut nouem
diuisis: quorum
quaterna, sena
vtrinque cau-
lem pari ordi-
ne vestiunt,
terna verò in
summo caule
extantia infe-
riorum foliorum
versum claudunt.
Sunt au-

tem ea omnia longa, angusta, in ambitu nonnihil crenata, obliquis incisuris utraque parte distincta, quas per medium folium procedens & eminens costa separar. Flos ei nullus, nullum semen, arque adeò ne aersam quidem foliorum partem sublauius pulvisculus contegit, qui in alijs ad genus plantis cernitur.

Synon.

C. Bauh. pin. Hemionitis 4. siue multifida: Hemionitis altera Dalechampi, H. flor. Lugd. p. 128. Lingua ceruina ramosa, Colum. Agleosotidis seu Marmoriz, seu Phyllitidis aut Scolopendriz nomine à Cortuso accepta.

Facultas.

Vis ei eadem adscribitur quæ Hemionitidi, seu Splenio attribuitur.

Tom. III.

CHAMÆFILIX MARINA AN- glicana.

CHamæfilicem marinam Anglicanam non nisi saxorum rupumve interuenijs aut petrosi asperginibus Cornubiæ innatam, Lobelius repperit ad maris alluiones non procul ab ædibus generosi viri D. Muyle: Epusilla multis impleta pulis cirris, & compacta radice, Trichomanes aut Adiantum Pliniani, foliola binum ternumve vnciarum, rigida, carnosa, numerosa, atrovirentia, lucida, Filicis maris diuisurâ, ortu, positu, & gustu: litoris item auersâ parte extantibus ferrugineis, quorum pediculi & medius nervus seticeo nitore ex sulco lucent.

Locus.

Descriptio.

Chamæfilix marina Anglica: Lob. Obs. p. 471. Ic. p. 814. & H. Lugd. p. 126. Filicula fontana 3. siue Filicula maritima ex insulis Stœchadibus, C. Bauh. pin.

Synonyma.

DRYOPTERIS DALECHAMPJ



DAlecham-
pius hanc
pro vera Dryo-
pteride exhibet, eamque in editissimis montibus nasci tradit, ad Quercuum musculos radices, foris per terram vagantes, radice capillata fibris densis, valj de tenuibus, inter sese implexis, subatris, gustu adstringentibus cum pauca dulcedine, quæ cum aliquâ diu mense fuerint, percipitur:

Descriptio.

folijs multis, obliquis, virentibus, & herbaceum virorem constanter seruantibus, etiam in dudum collecta planta, vnico pediculo adnexis, altius incisus, pennarum ritu explicatis, supernè leuibus & glabris, infernè exiguis & sublucis punctis, & quasi vermiculis puluerulentis & asperis maculatis: siue caule, siue flore, siue semine, nisi quis [ve vulgè multi de Filice nugantur] sessiles & pensiles in aduersa foliorum parte quasi vermiculos, dum flauis adhuc hærent, florem esse putet, cum nigricantes decidunt, fructum ac semen.

Cæterùm, nimium secorè Compiler H. Lugdunensis asserit Dryopterim Dalechampi p. 128. esse veram. Et quia locus particularis huius plantæ non assignatur, non abs re quid sit dubitatur etiam à C. Bauhino in pin. vbi Filix non ramosa sexta vocatur.

Compiler notat.

FILIX VULGO MAS DICTA, siue non ramosa.

Filix mas vulgè, quæ non ramosa mense Aprilis, autore Trago, promit multos asparagos, primo exortu inflexos, cano capillitio obductos, non aliter atque Scolopendriz suæ primæ folia, atque ij progressu temporis abeant in folia am-

Descriptio.

Q 999

pla, duorum, trūmque cubitorū altitudine, crebra, recta, frangi facilia, diluto colore virentia, Trago purpurea, ferrugineā lanugine hirsuta.



(Plumarim, inquit Lobelius, foliosa, alæ figuram imitatoria, unde nomen: *Dod.* audit, odore grana, & secundum margines crenata, ac tergo veluti tenuissimo, sordidoque pulvere aspersa, qui temere semen esse à plerisque creditur, inquit ille.] Ceterum, utrinque inaequali ortu nascuntur cristæ

palmares, sensim in mucronem tenuant, laciniis obtusis seu foliolis diuisæ, in ramolæ Filicis morem: radix crassior, multis conuoluta & implexa appendicibus.

Decodem Tragus hæc scribit: Incisuræ foliorum parte auersa Maio mense quamplurimis exiguis, rotundis, & excrementis bruchorum similibus punctulis norantur, quæ cum maturuerint, ac nigra euaserint, id quod circa festum S. Ioannis fieri solet, prorsus decidunt, & à mulierculis quibusdam colliguntur, proque Filicis semine deinceps venduntur. Nolo recensere quas vanitates & superstitiones eiusmodi semine exerceant. Hoc genus Filicis saporem præ se fert subamarum ac talem prorsus, qualem glandes habent, quem neoterici Medici Ponticum nominant.

Filix, Brunfels. Brunfels, tomo 3. rhaps. 51. iconem habet titulo Filicis, Filicis siluestris, vel magor: Trag. nomine Filicis vulgaris. Eam tamen, quod plerumque in siluis, locisque saxosis moretur, à Germanis etiam *Waldsarn*, h. e. Filicem siluestrem, à Dioscoride verò *διδυμήριον*, Fœmellam Filicem, & Nymphæam Pterin dici refert.

Fil. fem. Casp. Cæsalp. dicitur quoque Filix, fœmina in vmbrosis nascens, multis ab eodem cespite folijs: Thelypteris Dioscoridis, & Filicis alterum genus Plinij.

Fil. fem. Gesa. Filix hæc non mihi (Gesneri verba sunt apud Cordum in hist. lib. 1. cap. 174. cui figuram Tragi apponit] mas, sed fœmina ex Thophrasti & Diosc. verbis videtur, etsi plerique hodie marem eandem faciant, quam hic Cordus, errore veluti per manus tradito, filicem masculam vocat. Filix fœmina hæc [erant enim qui hanc marē faciunt, inquit idem de hort.] quæ multis à radice statim folijs oritur, passim in siluis abundat. Appello enim (sit in stirp. append. ubi sequentes filicem diuersas species assignat) fœminam, quæ pluribus ab vna radice folijs germinat, nullo caule: multis iam annis horti mei incolæ: molior vel tenerior asperâ, &c. Obscurus est in sua filicem Historis Gesnerus. Nos verò contra Tragum, Gesnerum & Cæsalpinum ijs assentimur, qui filicem ramosam, fœminam constituunt: non ramosam verò marem.

Lonicerus Pterida marem Diosc. facit dicitque

in eius radice aquilæ imaginem apparere. Tragum sequutus. Verum illum oportebat annotare marem Tragi à suo mare diuersum.

Matth. Filicem marem etiam pro Dryopteride ponit, ut dicetur capite de Adiantho nigro officinarum.

H. Lugd. p. 122. Filix mas Matthioli: Item, p. 127. Dryopteris Matthioli. Modò insinuauimus has duas plantas à se inuicem non differre, nec etiam Matthiolum inter has distinguere.

Filix mas Matth. Fuch. Dod. Lac. Lon. Lob. in Adv. Obs. p. 474. lc. p. 811. Cast. Tabern. Ger. Filix mascula, Cordo in Diosc. & hist. filix mas altera, Thalyo: filix mas, Osmunda, Anguilli Filix non ramosa 3. sine dentata, C. Bauh. pin. qui duplicem asserit: alteram, cui pinnulæ in ambitu sunt dentatæ: alteram, cui non sunt serratæ: Et illam Filicem marem alteram, hanc Filicem marem primam, Talio dici.

Πρίπι & Πρίπι Græcis, Germ. *Waldsarn man- te*: Gall. *Fougère masle*. Angl. *ferne the male*: Belg. *Varen manneken*: It. *Felsche maschio*: Hisp. *Helecho*.

Passim in vmbrosis, viginosis, & arenosis val- libus, limiribus etiam agrorum, & arenosis saxis, felicissime autem in siluis, provenit.

Quod si equus conciderit, nesciasque quæ æ- gritudine laboret, tunc particulam huius radi- cis, lingæ eius subijce, eoque facto equus con- festim utrinque deficiet recrementa, rursusque consurget: id quod Tragus ipse ita se habere competit. Folia filicis tenera adhuc decocta & comesta ventrem emolliunt: radix in puluerem redacta humidis vlcibus & cicatrici repugnan- tibus inspergitur: part ratione iomentis adhibe- tur. Filices succatæ, vice straminis asservantur pro pecoribus, maxime in ijs locis, quæ à culta terra longius absunt, ut sunt pagi in Hercinia sil- ua aliisque similibus siti.

FILIX MOLLIS SIVE GLABRA, vulgari mari non ramolæ accedens.



Rectis sur- git & sim- plicibus *pediculis* Filicis vul- garis in modū, sed glabris pen- nulis, omni- que hirsutis destitotis: rursū particulares in segmenta di- uiduntur du- pld ferè lon- giora, longius multò ab inuicem distantia mucrone acu- tiore, modò æ- qualibus mar- ginibus, mo- dò obiter pro- fundius incis, nullo tamen

ordine, nec serratis aut dentatis: hanc quoque mollities à vulgari distinguit, & segmentorum modò diſtorum varietas: Circa Tigurum legi- mus:

An

An Gesner. hort. Filix mollis, cuius descriptionem dedimus sub Filice non ramosa, vulgò mas dicta.

FILIX FONTIS ADMIRABILIS AD MARE
vulgarem non ramosam accedens, non dentata.

Descriptio.



Masculæ vulgò dictæ Filicis non ramosæ in morem simplices eriguntur caules, quos rami non diuidunt, non sine hirsutia aliquæ cristæ singulares paulò videntur longiores, diuisione ferè foliorum Ceterach, segmentis minimè crenatis, sed acutioribus quorum autem sâparte puluerulenta ferruginea puncta agminatim

proximè margines circumcirca conspiciuntur, medio libero. In montibus prope Fontem admirabilem in Ducatu Wirtemb. Augusto mense collegimus.

An Gesn. hort. Filix aspera, de qua antè sub Filice mare vulgò non ramosa? An C. Bauh. pin. Filix ramosa pinulis acutissimis non dentatis, Filix ramosa altera?

FILIX LONCHITIDI AFFINIS.

Descriptio.



Lonchitidi filici folia similis est: pediculis tamen glabri sunt plures, vnde ex aduerso positæ oriuntur alæ, palmates & semipalmates, quarum vnaquæque in cristas vnciales & semunciales diuiditur, singulas denudè in alia segmenta non admodum profunda, miribus spinis donata subdivisas.

Hanc observauimus in proximis siluis fontis admirabilis Ducatus Wirtemb. & in valle fontium Griesbachiana.

Hanc (aut certè sequentem) eadem suspicamur cum Filice aculeata Casp. Bauhini, quam in Prod. in maiorem & minorem subscriptis verbis distinguit.

Tom. III.


Filix 2. siue mas aculeata maior, radicem habet nigram, fibrosam: pediculos pedales, foliosos, in multas alas pinnatas, modò maiores, modò minores, profundius diuisos, pallidè virentes, primis in ambitu dentatis, & in breuem spinulam desinentibus: in monte Wasserfall lecta.

Filix aculeata maior.

Filix 3. siue mas aculeata minor, pinulis est breuibus, totis integris, non dentatis, sed in spinulam acutam breuèque omnibus desinentibus eodem quo prior loco prouenit, & in Harcynia & Stolberga veteri. Illa in pin. est Filix aculeata 1. siue maior: Hæc, Filix aculeata 2. siue minor: Filix mas tertia Thalij, quam spinosam seu aculearam cognominat.

Minor.

FILIX TENVISSIME ET
profundè denticulata, Montbelgardica.



Magnitudine non cedit vulgari Filici mari non ramosæ: foliorum haud dispar positus, verùm cristarum folij portuuncule valde sunt coccinæ, angustæ, profundis & argutis denticulis incisæ; cristæ verò totæ costæ annexæ alternatim oriuntur: similis Rhætica, quæ tenuior, aliquid similitudinis habet cum nostro Adiantum albo officinarum folio Filicis.

Descriptio.

narum folio Filicis.

Prouenit in siluis prope Montbelgardum: item in monte Masmunster mense Octobri, ac in monte Rosberg, necnon in valle fontium acidorum Griesbachiana.

Locus & tempus.

FILIX TENVISSIME SECTA EX
monte Balon.



Folia cubito-ferum aliquot ferruginea mucos oblectis pediculis: in ramos particulares diuisa, non planè ex aduerso relæpoundentes, palmates & sesquipalmates, quorum vnusquisque cristas habet alternatim positas, semunciales & duarum unciaarum, in segmenta exigua per extremam oram crenata subdivisas.

Descriptio.

Q999 4

lici mari vulgò dicta: folia siccata corrugantur & fiunt acuta, quod ideo monemus, ne quis fallatur videns siccatam non statim inter charas dispositam.

An Pteridion masculinum Cordo? Gesnerus asserit. Nos ulterius indagandum censemus, leon Dryopteridis, aut Quercus Filicis Lobelij in leon. p. 813. posita, nobis aptè convenire videtur cū nostra planta: sed Pteridion feminam Cordi, ut in Obs. p. 475. cognominatur, aliò quoque referimus.

Tabern.
nat. H. Lu-
gd. nota-
tur.

Tabern. ic. est Filicula petrea femina tertia: Eid. hist. Filicula petr. fem. quarta, quam Compiler eius describendam superuaneum duxit. Sed quum sic Dryopteris, cum ceteris Filicibus haud ita temerè confundenda erat, sed necessariò describenda.

H Lugd. pag. 1217. huius meminit, dicens: Sunt qui aliam Dryopterim, eamque veram sic describunt, Folia hinc Polypodij prorsus, &c. Omnia autem hic ex Lobelio transcribit eo non citato, omittens etiam eius effigiem, quod mirum.

C. Bauh.
notatur.

C. Bauh. in pin. videtur vocare Filicem non ramosam s. siue quernam. plures & diuersas confundens eo titulo plantas.

Locus.

Tiguri pròpe lacum felium reperimus, & in valle acidularum Griesbach. Diu viuit in siccis etiam horris, palustribus aliàs luxurians pratis, unde Filicem aquaticam olim denominauimus.

FILIX RAMOSA MINOR.



Descript.

Parietinas & rudera sequitur, radicem habens labyrintho cōtextu multipliciter implexā, Polypodij radicib. tenuiorem, repētem, & in obliquū se spargētem, nigrā, raris fibris tenuibus & duris capillatam, inquit Clusius, sapore cū leui dulcedine insigniter acerbo: coliculi mulri, tenues, ex viridi fusci,

palmares & dodrāles, lōgiōrēsque ramosi, Filicis femine vulgò dictę instar: cū tamē magnitudine multum cedat (quibus pinnatim annexa folia Filicis, crenulā denticulata, subinde auersā parte puluerulentis tuberculis respersa).

Tragus duo Filicis exigue genera tradit, non quidam fortis sed loco natali differentia: nam vnum ex crenosis saxis & rupibus profilit: alterum verò in vetetum & ceterorum Roborum caudicibus nascitur, folio vtrumque Filiei simili, multò tenuiore.

Huc & Cordi Pteridion femininum referimus, quæ Thelypteridis, i. e. Filicis femine (sic vocat monoclōnon, i. e. vno periclo surgentem, quāminorē facit Gesn. & nos Filicem maiorem & priorē Tragi, &c. inscribimus) coliculi foliorumque si-

Filicis
exigua f.
ut arborea
genera
duo, Tra-
go.

Tom. III.

gurā secundum proportionem omnino similis est: sed multò minor, ac tenerior.

Cordus in Diosc. (annotante Gesnero) vocat Dryopteridem Thelypteridi similem, multò tamen minorem, & quoniam parua est Filix germ. Erdfarn & Liebfarn, & ad græcæ vocis imitationem, teste Cornario, Liebfarn, eò quod cæsarum Quercuum caudicibus plerumque proueniat.

Lonic. appellat Filicem quernam & Osmundulam Gallorum, Græcorum Dryopteridem, eiusdemque naturæ cum alijs Filicibus esse ait. Sed leon quam habet, est potius Filicis ramosæ, quæ vulgò femina dicitur. Præterea si eadem natura eius, quæ aliarum Filicum, non est Dryopteris, ut dicimus contra Tragum.

Tabern. ic. Filicula petrea femina 4. Eid. hist. Filicula petr. fem. tertia. Hanc Compiler, ut tegat suam ignorantiam aut negligentiam, dicit non necesse esse describere.

An Gesn. hort. Dryopteris Adiantho serè cognata herba in colle lapidoso ad Badam Heluetiorum spontè proueniens? An Eid app. Filicula palustri similis Dryopteris, Badæ infra thermas statim iuxta fluvium ad leuam?

C. Bauh. pin. Filix ramosa 4. siue minor pinnulis (malò legitur primulis) lentatis: Pteridion masculinum Cordi [hoc aliò referimus: Filix femina altera tenuifolia Thalij: Filix querna seu Dryopteris, Gerardi.]

Non vbiq; locorum duæ Filices exigue Tragi inueniuntur, sed in altissimis montibus quales sunt der ydar, Hercinia silua, Wasgoia, & mons Tonitru. Filix pumila saxatilis 1. (ita Clusius Filicem ramosam minorem vocat) copiosissimè nascitur in saxis, non modò ad Garmingam & Neuberg: sed ad omnium serè montium radices Austriæ & Stiria. Ego Tiguri, Lugduni, Genevæ, Montbelgardi & Basileæ in montibus annotavi.

Filices tuas binas exiguas temperaturā vulgari Filici multicauli respondere putat Tragus, post seque pro Filice, cui gustu satis respondere ait, usurpat. Sed si verum Dryopterim Tragi esse eadem temperaturā cum vulgari Filice, Dryopteris veterum esse non potest, consideratis ijs, quæ antè proprio cap. ex veteribus scripsimus.

ADIANTHVM ALBVM FOLIO FILICIS.

CAP. II.



Parietinarum amasium Adiantum album quibuldam dictum, fasciculatis commissuris rimas agentium, radices se insinuat transuersā, satis crassā, pro herbe magnitudine, fibrosa, ferugineo musco obhæsa, sapore cum pluri adstrictione subdulci, herbaceo Polypodij colore: ramuli, vel potius foliorum

Descript.

R r r

pediculi dodrantales & pedales, tenues, viridantes, nigricantesve inferna parte, plumarim annexis Filicis folijs stipati, inæquali ortu sæpe. minutis denticulis incisus, auersa parte stomis virentibus, tandem ferrugineis extantibus, aspersis: mollia verò sunt folia hæc, & ad folia Filicis nostræ tenuissimè dentatæ, ac etiam Rhetice accedentia minora, tamen nec diuisuris ita dispositis, & facile marescentia, sapore citra adstrictionem euidentem, dulci, tam euanido, vt penè satium dicas, cum viscido lentore. Planta ipsa commune quiddam habet cum Ruta muraria, minùs tamen quàm Adiantum nigrum officinarum, quo tenerius multò & candidius. An Pteridum masculum Cordo? An Dryopteris candida, Dod. gall. cujus Icon potissimum postrema non multùm aridet, sicut nec nostræ?

Adiantum album & nigrum Plinij Libel.

Adiantho albo & nigro Plinij, inquit Lobelius in Adu. [quo titulo in Ic. Plant. p. 810. duplicem effigiem ostendit, sed priore quæ etiam in Adu. ponitur, potissimùm demonstrare videtur nostrum Adiantum album filicifolium] pleræque omnes Belgicæ, Germanicæ, Burgundicæ, Francicæ, Sabaudicæque officinæ, non modò hoc quo, sed etiam ab omni memoria, semper vsæ sunt. Radix pusilla, filamentis crebribus compacta, atris, rectis, junctis, paulò crassioribus & prolixioribus, quàm Trichomanes: ex herbido pallentibus, foliis utrinque & altrinsecus plumarim distitis, Filicis maris diuisurâ & situ, sed multò minoribus, altera facie virentibus, altera in glauco punctulis rubiginosis series geminas habent, sesquipalmum eoque plus alta, hæc alba, immo utraq; quæ nihil planè differunt: quia nigro Adiantho cauliculi nervulive nigricant poliore nitore, foliaque sunt saturatiore virore, vires eadem proorsum, quas etiam doctis multis, nedum nobis, exploratas scimus ad quotidianas & consuetas portiones multis annis, magno commodo, nullo detrimento. Vt tandem conuictari dediscant isti tenebrofi commentatores, qui hæc Dryopteris vitium ignoratione rejiciendas autumant: nihil enim acris, nedum caustici, hæc innoxie capillates habent: nam Dryopteridem aliam [forte hinc intelligitur Filix non ramosa minor] esse scimus: audiuiusque nos in frequentissimo studiosorum cœtu, Rondeletio præceptore docente, Dryopteridem nostram nonnullis suis ægrotis (dum in Allobrogum ad Rhodanum vrbi-bus facitaret medicinam) exitio fuisse ob pharmacopœorum flagitiosam inscitiam, qui non parum Dryopteridis potiunculæ, Polypodij vice, miscuissent. Hæc proinde, conjectura certa ducti, Plinio memoratùm vtrumque album & nigrum Adiantum, Filicis folijs, imisque cauliculis fuscis & asperis, arbitramur. Hæc Aduers.

Synonyma.

C. Bauh. nov. Locus

C. Bauh. pin. Filicula fontana i. siue major, vel Adiantum album Filicis folio: Dryopteris candida, Dod. Dryopteris alba Dodonæi. H. Lugd. p. 1227. Adiantum album Plinij, Lobelij. Item Filicula fontana i. siue minor: Filicula fontana, Tab. scemina, Gerardi. *Hæc duas Filiculas fontanas C. Bauhini nondum separamus, censemusque vocandam Rotam murariam alteram.*

In muris & rupibus subinde occurrit. Blau-montij in veteri cisterna & circa castellum inter saxa obseruauimus, & Genevæ circa montem *Salève* pulchrè virens mense Februarij principio.

ADIANTHVM NIGRVM

Officinarum.

IN capillarium etiam numero habent officinæ. Quod Adiantum nigrum vocant, plantam filiciformem, aliam tamen ab Adiantho albo filiciformi. *Coliculis* huic dodrantales, firmiores, nigriores, cui inæquali ortu adnectuntur cristæ vnciali circa principium latitudine, sensim in tenuè mucronem desinèntes, quarum *segmenta* lacintas Rutæ murariæ imitantur, latiora, longiora, altius crenata, firma, punctulis puluerulèntis auersa parte de Filicem more, distincta: *radix* crassa, fibrosa, qua degustata prope Patanium, dulcedinem cum magna adstrictione lingua percepit.

An Pteridion Cordo?

Matth. scribit Dryopteridem, Filicem ad vnguem refert, nascique etiam humenti solo & inter vepres circa Quercuum caudices, vel in Goritienfi agro, pluribus in locis, nullis repugnantibus notis, norissimam etiam ipsi qui siluas ingentes frequentant. Sed vti Matthiolus temere ait Dryopterem ad vnguem Filicem refert & norissimam esse, ita temere anno 1554. & 1559. iconem parvâ nihil aliud repræsentat, quàm Filicem matrem, ei & vulgo dictam. Quin adhuc in Epit. anni 1571. Filicem pro Dryopteride proponit, nihil addens de suo, nisi dici, Ital. *Felce quercina*, Germ. *Baumfarn*. Gall. *Feuchiere des Chênes*. Admiranda sanè Matthioli levis inconstantia, vt qui in comm. cum mag. fig. lat. & ital. remanentibus allegatis verbis, aliam longè diuersam, & Adianthi nigri imaginem exprimentem, exhibeat iconem. *Camer.* in sua aucta Matthioli Epitome nouam effigiem, fortè Adiantum nigrum vulgare pro Dryopteride demonstrantem, dedidit. Verùm si id intelligit, pictura videtur minùs benè efficta.

C. Bauh. apud Matth. ponit iconem ex Tabern. sub intitulatione Dryopteridis Matthioli in minoribus iconibus. Beunfelf. Cordi in Dioscor. Gesn. hort. & app. Lobelij, & H. Lugdonensis: Dryopteridis candidæ Dodonæi gall. & lat. Pteridij scemina cordi in histo. Filiculæ petrzæ scemina primæ Tabern. & Filicis generis parui in montibus Cæsalpini. *Secundò* nimis C. Bauhinus pronunciat Filiculam Tabern. petrzæ sceminâ primam esse Dryopterem Matth. in minorib. iconib. quandoquidem ab iconè Matt. multùm differat, vt quæ sit Filicis maris, vti sæpius dictum. Concesserim quidem potius esse Dryopteridem in mag. fig. quæ Adiantum nigrum vulgi, ad quam accedere videtur Tabern. modò dicta Filicula. *Secundò*, Cordi Dryopteris, non eadem est quæ Dryopteris Matth. vel majorum, vel minorum iconum, neque etiam est Filicula Tabern. Cordus enim ait Dryopteridem suam esse Thelypteridi similem, sed multò minorem. Thelypteris verò siue Filix scemina Cordi, ramosa est planta. Quare Cordi Dryopterem merito referimus ad Tragi Filicem arboream, de qua sub titulo Filicis ramosæ minoris. *Tertiò*, per Dryopteridem Gesn. in app. eam intelligimus, quam Cordus in histo. pro Pteridio scemina descripsit, quæ nobis eadem cum Filice ramosa minore. *Quartò*, Lobelij in adu. Dryopteris diuersa & ipsa planta est non ramosa, quin imò diuersa quoque à Dryopteride Cordi, de qua sub titulo Filicis minoris non ramosæ.

Dryopteris fœm. Mac.

Dryopteris Matthioli C. Bauh. multipli-simè error

mele. *Quintè*, Matthioli Dryopteridem in commentarijs cum magnis figuris existimamus potius Dryopteridem nigram Dodonæi & Hist. Lugdunensis, de qua præsentis capite, quam albam, de qua præcedenti. *Ultimè*, Filicis genus paruum Cæsalpini, quod duplex traditur, non putamus convenire: Vnum enim non serratum, ut Polypodium, alterum denticulatum: forte intelligit duas Lonchitides asperas, ut tuo dicetur loco.

Dod. in.
constan-
tia.

Dod. gall. satis commodè pingit Dryopterim nigram, admittens eam pro Adiantho officinarum, id est, Capillo veneris. Lat. verò in f. l. contritâ, eos in errore versari scribit, qui Dryopteridem nigram Adianthi loco videntur.

Genus apud Cordum auctorat Pteridion Tiguri in muris, sed rariùs pronenire: frequens autem Badæ in colle juxta Lemagum, mox infra thermas: ibi & Dryopteris [Filicem ramolam minorem] nati: qua cum ne quis confundat, canedura esse.

Præter alia multa duo potissimum esse testatur Turneros, quæ vetant ne hæc vera sit Dryopteris, 1. quod in partem cum Trichomane nalcatur, nec non fructum radicebus, in primis earum, quæ in opacis proveniunt, non autem, Quercu, à quibus & à Filice, Dryopteris nomen habeat. 2. est, quod vim piloni & septicam (quam ei tribuit Dioscor.) hæc non possideat. Angl. vocat, *Ok-firn*.

Adiant.
nigr. Plinij.
Lob.

De Adiantho nigro Plinij, ut Lobel in Ad. & Icon. pag. 810. indicabit, præced. cap. diximus. Hist. Lugd. pag. 128. dicitur Dryopteris nigra Dodonæi.

Onopteris
major.
Tabern.

Tabern. Adianthi genus, *Groß Eßelsarn*, Onopteris major (sic in l. c. inscribitur) similis Adiantho mari (Trichomane) cum quo generali descriptione exceptâ foliorum magnitudine, convenit, quæ paulò major. Egregia descriptio & distinctio Compilatoris Tabern. nisi adesset Icon. nullus vi quam posset divinare quid velit, quod forte ipsemet haud intellexit. Quid si eadem sit cum ejusdem Tabern. Filicula perizoma feminina prima, quam Compilator non ducit esse necesse ut describeretur, quia eam procul dubio ignorat.

Clas. u-
natr.

An Filij 2. saxatilis Clusij? Is autem ejus Iconem exhibet radice repente, quæ non respondet descriptioni.

Synon. C.
Bauh.

An Cæalp. Adianthi nigri genus aliud? C. Bauh. pin. Adiantum sive Capillus veneris officinarum 2. vel Adiantum folijs longioribus pulcherrimis pediculo nigro: Adiantum pulchrum Lugdunensi simile, Thaly: Dryopteris [Onopteris falso legitur.] nigra Dod. & H. Lugd. Adiantum nigrum Plinij, Lob. Adianthi nigri aliud genus, Cæf. Onopteris major, Tab. mas Gerardi Cæterum, C. Bauh. ab Adiantho nigro separat Dryopterim Matthioli & Camerarii in Epit. item, Filiculam perizomam femininam 1. Tabern. ac Filicem saxatilem 2. Clusij, de quibus jam dictum.

Locut.

Vita.

Patani in monte di Venda inveni sesquipal-
mum excedens.

Experientiâ Turnericomperitum est plantam, quâ Lonsantenses vsi pro Adiantho, plurimum conferre contra calculum cum vino, aut emulsionem amygdalarum extracta cum aqua Capilli veneris. Dryopteridis radices (inquit Matthiol.) in pulverem contritæ & cum sulfuribus addito salis & sulphuris momento, equis deuorandæ aduersus intestinorum vermes, exhibentur: nam-

Tom. III.

que potenter illos expellant & interimunt. Cæterum, quum Matthiolus nesciverit quid exhiberet pro Dryopteri, difficile est statuere, cui Filicum generi hæc tribuendæ vires: censemus tamen sine periculo experientiâ posse fieri, ut Adiantho nigro vulgò dicto debeatur.

Adiantum nigro simile si non eadem missa pro Capilligno.

Clariss. Paludano nullâ hoc titulo: *Folia* & *Descrip-
Pila*
Adiantum Capilligno. Ramulus est spithameæ longitudinis. Adiantho nigro similis, si non idem, cujus ramuli foliati alternatim quoque ex colla pendent. *Folia* obliquis virentia, sed non in tenues adè apices per extrema divisa. Per cætera ita similia, ut ovum ovo. Summis verò folijs in dorso singulo folij segmento velut semen, quodâ Mili figurâ & magnitudine pullo colore adheret; quod per mediam corpusculi sui longitudinem una sulcatum videtur. Intus verò ex-
adus insuentei pulverulentum quid apparet. Hujus portio est in superiore parte Adianthi nigri officinarum.

An Cælp. Bauh. pin. Adiantum 4. fruticosum Icones
Brasilianum?

ADIANTHUM ALBUM TENVIFOLIUM, Rutæ murariæ accedens.



Pedales ex *Descripti-
radice*, emittit, sed tenues, caules, qui superius in ramulos alternos ferè dividuntur, arque hi de-
nuò sæpè in alios minores, nullo ferè ordine, folijs, Rutæ murariæ dimidio minoribus, incis, pulchrè viridantibus tenerioribus, mollicellis.
Ex Gothardo

attulit gener Chertenus.

C. Bauh. pin. Adiantum sive Capillus veneris officinarum 3. vel Adiantum folijs minutim in oblongum scissis, pediculo viridi. *Synon.*

LONCHITIS VETERIBVS.

CAP. III.

Lonchitis Dioscoridi duplex est. Prior, *folia*, *Lonchitis
duplex
Dioscori*
habet, Porro perquam similia, latiora tamen & rubentia, plurima ad radicem circum fræta, veluti in terram procumbentia. Habet & circa caulem pauca, in quo quidem, *flores*, seu pileoli, hiantibus comitis personis figurâ similes, sique nigri, sed è rictu albam veluti parvam linguam exerentes, quæ ad labrum inferius spectet: *semen*, involucri clausum, triangulum & lanceæ cuspidi simile, vnde etiam planta ipsa sibi cognomentum arrogavit: *radex*, Dauch.

Rerr. 1

Nascitur in asperis & frigidis.

Lonchitis altera quam alij asperam [*εραχνη*] dicunt, folia profert Scolopendrij, sed asperiora, majoraque, ac multo magis diuisa. Vim autem habet vulnerariam, inflammationēque arcer, lienem quōque pota ex aceto absumit. Meminit poro Diose. Licij, quod Indicum vocauit, & ex Lonchitide frutice fieri dixit, & illi quzdam ex altera Lonchitide adscribit.

Plin. vult
Lonchiti-
des nonit.

Lonchitis [ita Plinius l. 1. c. 1. de priore Lonchitide, nam posteriorem non nouit] non [ut plerique existimarunt] eadem est quæ Xiphion, aut Phasgaion: quanquam cuspidi similis semine. Habet enim folia Porri, rubentia ad radicem, & plura quàm in caule: capirula personis comice similis, paruum exerentibus linguam: radicibus prælongis Nascitur in frigidis.

Galenus
dicit.

Lonchitidis ejus, quæ triangulare semen habet (inquit Galenus, plures Lonchitidis species insinuans,) & figurâ simile illud cuspidi, radix similis est radici Dauci: & præterea vnam eius medicamentum. At ejus quæ Scolopendrio similia folia habet, ea viscidula quidem ad vulnera glutinanda idonea sunt: arida verò cum aceto pota, lienem induratos sanant.

Cornelius
Cassius.

Cornarius licet neutram Lonchitidem officinis noram, & Herbariorum de his meras diuinationes esse arguat, ipse interim tamen, quod pro certo pronunciet, non habet.

Lonchitidem quia parè delineat Diose. inquit Marantha, est. Cum est, ut multi multa de illa seferint: multique eam se cognouisse falsi sint, qui tamen à veritate longius aberrarunt: hi si nominis proprietatem inspexissent, non ita temerè de illa pronunciaissent, in illis enim quas ostendebant, nulla lanceæ similitudo sumi poterat, neque ex semine, neque ex folio, neque ex radice: ergo alia illis querenda erat: sicuti Ghinus, cum nulla ex his, quæ ostendebantur, illi planè satisfaceret: tandem quæsiuit, donec illam adinuenit, Diose. descriptioni & nomini ex omni parte conuenientem: nam præter id quod habet folia longè magis diuisa, & asperiora folijs Scolopendrij: ejus extremitas ita dura est, & acuminata, ut lanceæ speciem præbeat. Hanc non depinxit Matth. sed aliam: quam nescio quo pacto à Ghino pro Lonchitide ad se nullam falsè asserit.

Equico-
ca.

Tragoniam herbam Plinius suspicatur Lonchitidem alteram Gesnerus. Alij ex Recensitionibus Adiantum nigrum officinarum, Dryopteridem nigram nonnullorum, Lonchitidem asperam esse volunt, sed non est, teste Dodonæo.

LONGCHITIS ALTERA CVM FOLIIS denticularis, siue Lonchitis altera Matthioli.

Descri-
ptio.

Vnius & ejusdem plantæ nulla est foliorum diuersitas & lusus, ut in Lonchitide altera Matthioli: pinne ad costam ligatæ non penitus adnascuntur, sed breui hærent pediculo, in ima summâque ala breuiores quàm in media. longitudine circiter vnciali. foris à falcatâ, gibbo deorsum spectante, latitudine minimum duplâ ad Lonchitidis Dodonæi segmenta, & denticellis spinulis similibus circumquaque exasperatæ, subtus ferrugineo puluere obductæ: differt hæc Lonchitis à nostra Lonchitide filicifolia, cui folia magis diuisa.

Matthiolum asperam Lonchitidem maiorem



[sic in communi mag. fig. Lat. & It. intertribit.] folio delineat ad Polypodij faciem accedente, spithamæ longitudinis, utriusque disparibus incitulis dissecto, tenuibus, aculeatisque denticulis serrato, & ubique aspero, unde illi nomē: radice, multiplici, tenui, subrubente, petinde ac in Phyllinde. De hac cum Marathia Marthio. lo lōga fyt cōtenio. In com.

autem cum mag. fig. Lonchitis hæc major melius exprimitur, quàm in prioribus comm. cū paruis figuris, in quibus denticuli non, aut quàm minimū, apparent. In Epit. Matth. à Camerario in lucem edita, est Icon. in qua denticuli quodammodò exprimuntur, verū ea minis placeat quàm Matth. etiam cum minoribus Iconibus.

Synonyma.

Dicitur Gesn. hort. in app. Lōchitis altera seu aspera Matth. picta. H. Lugd. pag. 1220. Lonchitis aspera major Matth. Tabern. Ic. & hist. Lonchitis altera mai. λονχίτις & λονχίτις εραχνη, Græcis. Lat. Lanceolatis, Atplenum siluestre quorundā: Germ. Spicant manlin, Groß Miltzkrant: Belg. Brachi Varen. Notandum autem, Atplenum siluestre dici de Lonchitide Dodonæi, quàm Tabern. pro fœmina pingit.

An Lonchitis 1. siue Dalmatica, Anguillare? An Cæsalp. Filicis genus paruum alterum, folijs tenuissimè denticulatis, hirsutioribus, in parte aduersâ ferrugineis veluti fuscioribus? An Lonchitis Maranthæ Lobelio?

Syn. C.B.

C. Bauh. pin. Lonchitis 1. siue aspera: Lonchitis altera Ang. Lac. Cast. Lon. cui & Spicant, Germanorum, foris à radice, Indicam Spicam referente: Lonchitis altera, quibusdam aspera, Cord. in Dioscor. Gesn. hort. app. Lonchitis Maranthæ. Germ. Icon.

Baldi montis incolæ. Reperitur etiam Monspelij in montibus circa Gangem, & ni fallor, in monte, Vasse fall: item inter Clesual & Ran ad Dubim.

Loca.

LONGCHITIS ALTERA FOLIO Polypodij.

Radice nigra, villosa, cōpacta, ac cespitis instar cōtextæ, suprâ sexaginta aliquando folia prodeunt, primo exortu Linguz certuinæ modo recurua, postea cū se explicuerint, non tam lata quam illius, sed astutiora apparēt, & ubi excreuerunt in ambitu in terram reclinantur, pedalis aut cubitalia, nigris propter terrâ pediculis, vel, ut ait Tragus, medijs venis punice coloris, quæ vicem caulis tenent, quorum primæ celsuræ Atplenij folium satis exprimūt, superiores ad summum vsque fastigium ad Polypodium accedunt, sic tamen

Descri-
ptio.



sic tenet vi maxima segmentorum (quantum hactenus animaduertimus) longitudo vix sit vncialis, ambitu aequali nec denticulato, nec alia ratione vlla inciso: horum in medio aliud surgit foliorum genus, quae recta, longiora, raris caulis satique longo intervallo distantibus, scalarum gradus imitantur, aduersa parte puluere Filicum ferrugineo aspersa. De his Tragus, lunio mense apperiente alia multa & longe augustiora prioribus folijs subnascuntur. Polypodij instar incisa, in altum se attollentia, longissimis gallorum gallinaceorum pennis similia, exiguis & luteolis punctulis notata, sicut & Polypodij, proinde vena

ea, quae per medium folij transit, punicea est coloris. Matthiolus scribit mitiora & tenuiora, angustiora quae folia, quam praecedentem, promere, & magis Polypodio similia, hirsuta & aspera: nos autem hirsutiem non animaduertimus, firma alioqui & satis rigida sunt folia.

An Cordo hist. (in Diosc. enim vocat Lonchitidem alteram asperam cognominatam) Struthiopteris, Filicis insignis species, in Hercynia sylua prope Gossariam inuenta, figuram admodum spectabilis, &c. quae Struthiopteris ab ipso nominata quoniam aspectu ac crispo foliorum [quae gustu, cum tenuitate aliquam astringunt] habitu Struthionis siue Struthiocameli pennas imitatur? An Lonchitis aspera minor Matth?

Gesn. hort. Lonchitis altera, *Spicant*, Germanorum aliquorum. Eid. app. Lonchitis aspera alia, Asplenium sylvestre Tragi, Ghini & Maranthae Lonchitis dignior.

Tragus cap. de Scolopendria secundo loco describit & depingit pro Aspleno sylvestri, *Waldi Asplenon*, *Waldi hirtzung*, & addit esse verum Dioscotidis *Σκωλον* se existimare. Sed interim aliam rursus plantam subdit, quam verum Dioscotidis Scolopendrium statuit.

Dod. gall. & Lat. Lonchitidem asperam inscribit, facique *Λονχίτις ἄσπερος* Graecorum, Struthiopteris Tom. 111.

rim Cordi, Longinam & Calabrinam quorundam, Neotericosum Asplenium, & Asplenium sylvestre, aut Asplenium magnum, Germ. *Grosz Milzkraut*: Belg. *Gracht Varen*.

Pro Lonchitide altera pingitur in Icon. p. 814: & Obl. p. 471. etique in Ado. à Lobelio tribuntur Polypodij folia, minora, tenuiora, minutiusque incisa: palmos binos alta, pusilla, Polyttrici, Ceterachve radix: muscoli apiculi, vermiculorum in modum, praesertim prouecta etate glomerati, spemque & speciem dantes seminis luteoli & racemosi. Olea ferme: tamen sunt euanida rudimenta, uti Filicis.

H. Lugd. pag. 116. Asplenium sylvestre, Scolopendrium alterum Tragi, Lonchitis aspera Dodonaei. Item p. 121. Lonchitis aspera Dodonaei. Extat & eadem pag. Icon. Lonchitidis asperae Matthioli, verum sub titulo Pseudolonchitidis asperae Matthioli, & Lonchitidis asperae Maranthae: non autem erat exhibenda sub Pseudolonchitidis titulo, sed pagina 1210 sub suo titulo: sunt enim transpositae Icones errore fortè typographico.

H. Lugd. non.

Tabern. Ic. & histor. Lonchitis altera scemina: Eid. apud Witsug, *Löchitis altera* Diosc. *Grosz Nesselstirn*. Corn. Asplenium spicantum, nomine ad siluam Harcintam familiari. Lonic. in Diosc. Asplenium, Linguae ceruinæ sylvestris species, & Scolopendrium verum Tragi: Eid. hist. Scolopendrium majus: Item, *Spicant*, ex genere Filicum. Lonchitis aspera Dioscoridis, & Lanceolaris. *Lonscerus decipiens*, malè figuram non bene separat, *Spicant* à Scolopendrio maiore.

Cetera Synon.

C. Bauh. Lonchitis 1. siue minor: Lonchitis aspera minor Matthioli, Hist. Lugd. & Camer. Lonch. aspera, Thal. & Germ. Scolopendrium majus, Lonic. Lonch. altera Neotericosum, Clus. pann. & hist. C. Bauhinus debebat annotare apud Lugdunensem, figuram esse sub alieno titulo exhibitam.

An Filicis paruum genus Czfalp?

Elegantissimam hanc plantam non passim occurrere testatur Tragus. Vbitamen inuenitur, tenebrosis sc. & humidioribus siluis, ibi magnam copiam prouenire solere dixit Lobelio Lonchitis altera locis nemorosis & asperis, in Anglia, Belgio, & Basilea, propè montem arduum, vno ab vrbe militari distico, occurrit. Dodonaeus nasci refert in scrobibus ac fossis, locis vlginosis, humidis atque vmbrosis: nec caulem, nec florem proferre: perpetuè virere: Aestate vigere.

Locus.

Herbam esse vulneribus glutinandis, lieuibisque absumentis idoneam docet Matthiolus. Illis enim imposta, ne inflammentur vulnera, impedit.

Vires?

LONCHITIS ASPERA MARANTHÆ.

A Superioribus tribus haud obscure differt. *Descript.* ista, toto habitu alia: rami dodrantaes [ut in nostra planta sicca obseruauimus] in spadiceo nigricant, splendentique, ex rufa lanugine prodeuntes, cui longæ, nigraeque capillares fibrae numerosae subiectae: nudi supra medium sunt rami, inde verò summo tenues, breues exeunt, *pediculis folijs amicti*, quae avulsa, planè dicas Aspleno, vulgè Ceterach dicto detracta, ita arcta est similitudo diuisionum, lanuginis parte inferiore, foliorumque in Scolopendriæ formam conuolutio: nis, Camer. *radix nigra*, citrosaëque.

Rur 3

Lonch. aspera Dod.

Synony-
ma.

Matth. in comm. cum mag. fig. Pseudolonchitis: Lonchitis aspera legitima Marāthæ. Camer. in Epit. Lonchitis aspera Marāthæ. Clus. histor. Lonchitis altera maranthæ, Filiculæ elegans genus. Tab. Ic. & hist. Lonchitis adulterina. Cæsalp. Ceterach. quoddam in Ilua nascens, locis editis & saxosis. folio dodrantali, ramofo, ac magis hirsuto: Lonchitis aspera Dioscoridis.

H. Lugd.
Museum.

H. Lugd. pag. 111. Pseudolonchitis aspera Matthioli, Lonch. aspera Maranthæ. Icon. sub hoc titulo posita, haud convenit. Quæ enim ei debetur, malè pag. 120. pro Lonchitide aspera minore Matthioli pingitur. Alia præterea proponitur de scriptio & Icon. nomine Lonchitidis asperæ. Iluensis, quæ non est diuersa, ita ut duas vnus plantæ Icones habeat H. Lugd. quarum prior magis aridet.

An Anguill. Lonchitis secunda, in monte nigro Pithunenta, Ceterach ramosi species?

Syn. C.B.

C. Bauh. Lonchitis, siue folio Ceterach, magnitudine varius: hunc duæ figuræ apud H. Lugd. 1. Lonchitidis asperæ minoris titulo: 2. Lonchitidis asperæ Iluensis Lonchitis 2. Dalmatica, Anguill. Lonchitis Maranthæ, Lobel. Polypodium Iluense, H. Lugd. pag. 120. Filicula petraea mas Ger. Ic. Nos. Polypodium Iluense, H. Lugd. huc referri posse non negamus, sed Lonchitidem Dalmaticam Anguill. à Polypodio iam dicto distinguimus.

C. Bauh.
not.

Locus.

In Stiriacarum alpium iugis locis editis & saxosis, vel in nemoribus aspero loco nascitur.

POLYPODIUM VETERIBVS

CAP. IV.

Descri-
ptio.

Ratio nominis ex Dioscoridis descriptione colligitur: πολυπόδιον, Jinter spuria aliqui Scelopendron, alij Pterin: alij, à multifidis, radicem incisuris Polyrhizon. Romani Filiculum, seu Filicularem herbam vocant. Nascentur in muscosis petris, & vetustis. Quæcumque candidibus, palmi altitudine, Filici simile, subhirsutum & inestomat non penitus tenui diuoluta. Radix subjacet pilosa, citius habens seu polyporum, crassitudine minimi digiti, hæc si derata fuerit, celotus intus herbaceus compertur: acerbæ vero est, atque gustu subdulcis.

Plinius.

Detrahitur balem Polypodium quæ nostri (inquit Plin. lib. 16. cap. 44. Filicem vocant: similis enim est Filici. Radix in viâ, pilosa, coloris intus herbacei, crassitudine digiti minimi, acetabulis cauernosis, seu polyporum cavi, subdulcis, in petris nascens, aut sub arboribus vetustis, flores & semen non fert.

Semper autem post imbres erumpit, anthore Theophrasto, cni radix hirsuta (sacra) est & acetabula habet, seu polyp. citius purgat autem de ortum, & si quis adalliget, Polypum innascentem. Habet solum simile Filici magnæ, & in petris nascitur. Et sic quidem Cornarius hunc locum accipit de adalliganda Polypodij radice, & ita prohibendo ne polypus alicui in naribus nascatur. (G. 2. quod & quædam legit Cornarius, habet & quædam, sed ridicule & perperam.)

Plinius
corrigendus
citra
Maranthæ.

Iam mendem apud Plinium legimus in Polypodij historia, hanc plantam florere, & semen non ferre, cum ita potius, vel consimili modo reddendus sit locus, Nec florere, nec semen fert, inquit Marantha. At contra, florere Polypodium, veluti & Filicem nobis non dubium, nec

etiam semen ferre, licet ob tenuitatem vix appareat. *Nolimus*, igitur cum Marantha Plinij rectum corrigere: Vel, si corrigendus, potius delendum vocabulum, non existimaremus.

Ceterum, ut ad æquiuoca deueniamus, Polypodium majus & minus, nobis vnum tantum specie cum Lobelio est (nec diuersa, ut frustra quidam faciunt. Polypodium etiam Iluense pro Lonchitide aspera Maranthæ nequaquam improbamus. Dryopteris assumpta pro Polypodio, exitio fuit multis ægrotis. Est & Polypodium Indicum quod descriptum habemus in Exoticis Clusij. *De his nunc agendum.*

Æquiuoca.

POLYPODIUM.

Polypodij radix obliquè sub terræ superficie reptat, aliàs fibras suas ex tuberculis, quibus plurimis scæcet, demittens, ad crassitudinem ferè molmi digiti accedens, nunc tenuior, colore foris buxo, intus ferè herbaceo, sapore dulci, tandem acerbæ & adstringente. Lobel. radix prolixioribus anfractibus, nodulis, acetabulisque donata & flagellis, Polyptipis similibus, ejusmodi ferè Coralli albi sunt: crassitudine digiti minimi, intus portacea, gustu nonnihil adstringens & subdulcis, quæna præteritum: modò vnum, modò plura, folia extransuersâ radice, filicea, ex folijs multis, gustu adstringentibus, non denticulatis, tunc virentibus, infero ad nervi latera vtriusque ordine quodam æceruulis quasi poluituli rufi punctatis, cû interitum hoc non semper obtinetur, ad costam vnâ mediâ lapi parte folijs viduam, tenuem, rigidam, anxia.

Descri-
ptio.

Matth. Sylvaricus non absque errore, ut lac. de Mansijs scire annotauit, Polypodium Dipteris vocant. Ac melius vix fortè alij ex similitudine foliorum cum Filice Filiculam nuncupant.

Tragus, qui vnâ tantum speciem depingit, refert perperam à nonnullis, *Steinsarn*, hoc est, Filicem laxantem, sicut & Trichomanes appellari.

Matth. in Dioscoridem duas exhibet, Polypodij species. Earum autem Icones in post. comm. (non quidem variatâ priori descriptione) mutauit, ita ut difficile sit, se ex ejus historia extricare, si quis figuras conferat. Sed maiorem parione obscuritatem, sequentia ejus verba. Polypodium siue Filicula quæ in montibus prouenit in itinere, quo Goritiâ per montes in Carniolam itur, folijs angustioribus & admodum virentibus. Ceteracho per quâ similibus, quanquam paulò amplioribus. Tanquæ est similitudo, ut mihi hanc herbam inspicienti ea ferè visa sit verum Asplenium: quæ tamen effosâ radice statim pro Filicula agnoscutur. Quibus verbis quid sibi velit Matthioli, tuæ lector committimus prudentiæ.

Dod. licet in Hist. gall. vnicam tradat Polypodij speciem: in hist. tamen lat. [ubi Filicis genus facit, & flore, & semine atque caule carere scribit] duas Icones proponit. Vnâ, quæ planè nostræ similis, stylus est, Polypodium minus, alteri Polypodium majus.

Duo quoque Polypodia pingit H. Lugd. scil. Polypodium primum Matthioli, p. 129. & Polypodium secundum Matthioli, p. 130.

Com-

Compilerator apud Tabern. distinguit Polypodium 1. & 2. tantum magnitudine. Hunc sequitur C. Bauh. in pin. *Polypodium* 1. siue vulgare, faciens Polypodiū Brusei. tom. 3. rhaps. 40. Tragi, Matth. Ang. Fuch. Dodon. gall. Coroi in Diosc. & hist. Torn. Lon. Lob. in Adu. & Obl. p. 473. [ubi & Herba radioli Apulei] ac Ic. p. 814. Cels. Cast. Cam. Tab. & Gerardi: Polypodium maius Dod. lat. Polypodium 1. Lugd. *Laudatque quod* in Quercu nascitur: reperiri ait in Fago, Corylo: in antiqua & cædula salubris. gustu amariorem prouenire, quam syluaticam censeri in ruderibus saxosis. *Polypodium* 2. siue minus, est ipsi Polypodium alterum Matth. Lac. Lugd. primum Tab. Polyp. minus Dodon. lat. Polyp. quercinum Gerardi. Nobis probatur iudicium Lobelij, non distinguentis inter hæc duo Polypodia. Quercus, inquit, sola in usu, nec alia visitur, nisi si quando macilentius nata solum, gracilior. Sic etiam quibusdam opacis nemorib. paululum folio est adultiore, neutriquam tamen specie diuersa, ut frustra faciunt quidam.

Nom.
Arg.

Πολύποδιον Græcis, Lat. & Officinis Polypodiū, à radice, quæ cirrhus & acetabula polyporum modo habet, dictum est. Arab. vt Auicennæ *Desber & Budeg*: Serap. *Bübeig*: alijs Mauritanis, *Asbeig & Bessigs*, Manlio verò *Bessiga*. Phrasius in suis synonymis plura alia recenset nomina, quæ hic studio omittimus. Quis enim tot barbaras appellationes enumerare possit? Germani *Engelsuz* vocant. *Suszfaru*, h. e. Filiculam dulcem, *suszvunzel* Radiculam dulcem, à gustu quo prædita est: *Baumfaru*, & *Broppfuntz*, & *L. brallen-vunzel* à forma: alijs etiam *Dropffvunzel* à maculis quibus notatur plura quam aliud quodcunque Filicis genus. Belg. *Boom varen*, & quibusdam *Eyken Varen*, h. e. Filix quercina. Gallicè *Polypode*: Ital. *Polypodio*: Hispan. *Filipodio* Angl. *Okeferne*: Boh. *Osladye*.

Locus.

Nascitur in siluis, radice in muscosis petris serpente: necnon in collibus placidioribus, iuxta radices, caudicēve vetustos arborum, præsertim verò Quercum & Q. norum. Non raro etiam in vmbrosis & vlginosis vallibus, è musco iam memoratis arboribus adhærente Polypodium proflire vidit Tragus. In Asia, vti quoque in diuisione Dominorum Bernensium intra Auenticum & Paterniacum in capitibus antiquarum & cæduarum Salicum assatim luxuriare vidimus, gustu amariorem alterâ, quæ siluatica censetur, quâ & præstantiorem nonnulli iudicant. Nascitur in veterum arborum carie exesatū caudicibus, inquit, Dodonæus, tum & super veteres muros, ac ædiū recta: reperitur & in aggeribus secus agrorum margines, præsertim sub arboribus ac sentibus. Quouis anni tempore viret, colligique potest: Vere nouo, noua folia promit.

tempus

Delectus.

Querno Polypodio bonitatis notas octo Mesue attribuit, vt postea dicitur, sed obscure multum & non conformiter bonis autoribus. Deligendum itaque censemus, quod eas habet notas & proprietates, quas illi Dioscorides & Plinius assignat. Dioscorides quidem Polypodij radicem purgandi vi præditam esse prodit: dari autem ad aluum soluendam, coctam cum gallina, aut piscibus, aut Beta, aut Malua. Aridæ farinâ aquæ mulsa insperfam, deerrare pituitam ac bilem. Triam eandem luxatis efficaciter imponi, & aduersus arthras digitorum. *Galenus* Polypodio dulcem supul & austeram attribuit vincicem qualitatem, vt facultatis sit admodum desiccantis, citra mor-

Vires &
Vlus.

sum. Plinius testis est radicis exprimi succum aquâ madefactâ, & ipsam concisam inspergi oleri, vel Beta, vel Malua, vel fassamento, vel cum pulicula coqui, ad aluum vel in febris leniter soluendam: stomachum offendere: Aridæ farinam naribus inditam polypum consumere. Radicem cubitorum ac pedum [Digitorum in pedibus, veterum.] rimis prodesse, & illitam luxatis.

Mesue Polypodium radix est plantæ lapidibus & arboribus inrescentis, quam *Δρυοπόντιον*, i. e. arborum Filicem, Græcos vocare dixit. Quod autem lapidibus innascitur, humiditate excrementosa, crudâ, statulenta, ventriculum ad nauseam euertere, abundare prodidit. Præstantius id, quod arboribus præsertim glandiferis, innascitur, affirmat, præsertim si magnum sit, recens, solidum, foris ex nigro tubescens, colore intus herbaceo, vt Pistacium, sapore dulci, austero, tandem subamaro, non nihil aromatico. Dioscoridi calidum esse tertio gradu, sicum secundo, addit idem, quod tamen Dioscorides non dicit: item, humores crassos, lentosque tergere, digerere, siccare, bilem atram & pituitam vel crassam, vel lentam purgare, etiam à iuncturis. Affectibus ob hæc melancholicis prodesse, vt quantanis, præsertim cum mulla, Epithymo, sale Indo: colico etiam dolori, & splenis duritiæ quouis modo vsurpatum. Contra rimas verò digitorum ided trita illiniri, quod corpora extenuet & siccet. Ne porro ventriculum ad nauseam euerteret, vtque citius vacuet, dari ex mulla, vel aqua Hordei, vel vuarum passerarum, vel ex iusculo Gallorum & Gallinarum [vt Hamech suaserit] decoctum, vel tero lactis: Bibi vtilissimè cum mistis seminibus odoratis, vel alijs aromaticis, vt Dauco, Aniso, Fœniculo, Zingibere, vel simili, animam & facultatem ventricoli naturalem corroborante: Longam satis concoctionem sustinere: dari à drachmis duabus ad aureos quatuor. Auicennæ calidum est secundo gradu: sicum tertio. *Agnetia* ait radicem Polypodij lenem multum insperfam, aut cum ea contitam, eundem quem Colocynthidem, effectum præstare, & addit, corpora extenuare, & ventriculum ad nauseam euertere, quod negat Auerroes, qui Polypodium censet medicamentum, & Epithymo præstantius, cui assentitur Marisidus, asserens Polypodij imbecilliter & leniter purgare: quare corpora extenuare non posse, idemque per se exhibitum nullam stomacho inferre iniuriam. In eadem est sententia Actuarius lib. 3. meth. Filicula bilem & maximè atram ac pituitam ducit. Dantur, inquit purgatz radicis seni scrupuli affusa aqua mulla: purgat autem mediocriter: & citra molestiam, in gallinaceo iure, & in prillanz cretore cocta radix. Actius vt bilem nigram & pituitam euacuet, expurgatz radicis scrupulos sex, qui in aqua mulla præferbuerint, exhibet. Oribasius drachmas duas coquit in prillanz succo, datque bibendum succum. Sunt tandem qui vnciam integram sine noxa dederint, parum enim & sine molestia vncia nostratis Polypodij euacuat. Apuleius etiam sine labore ventrem subducere tradit, & ad capitis dolorem commendat. *Et hæc ex sententia vniuersorum scriptorū de illa sufficiant. Ad Recentiores Auenennius.* Polypodij illius radicem in usum duntaxat recipit Fallopius, quod ex Quercu assumitur, & quercinum ob id vocatur: illud autem quod accipitur ex alijs arboribus, ceu malum improbat. Raro autem per eos exhibendum suadet, sed vt plurimum in medicamentis compositis, vt infusionibus & decoctis. *Lonicæ*

Mesue

Mesuem secutus statuit Polypodium calidum in tertio gradu, & sicum in secundo. Sed tantum calorem non demonstrat quicquid dicat Lonicerus & Mesus. Polypodium, inquit Tragus, temperatura sicca est præditum, & modicè calida. Radix eius purgandi vim obtinet in hominibus & pecoribus, bilem & pituitam trahens, si cum gallinâ decoquatur, admixto semine Anisi & Zingibere, ac à teiano iusculum illud calidum bibatur. Alij nonnulli Comini Romani, seu sativi Fœniculi & Anisi semina, cum radice Polypodij & Zingibere in minutas particulas confectis, æquali pondere cum vetulo gallo gallinæ decoquunt, posteaque iusculum hoc colica passione laborantibus exhibent. Estque decoctio hæc medicamentum certè perquam vtilissimum torminibus ventris. Radix in puluerem redacta drachmæ pondere ad minùs, ex aqua mullâ pota, ita tamen ut pòst, tribus aut quatuor horis ieiunet, iidem pollet viribus, quibus & decoctio iam dicta. Aqua destillata ad febrem quarthanam, tussim, asthma, & pulmonis affectiones, aduersus melancholiam, & graua & molesta somnia, aliquot dies continuos hibita facit. Cum pestis inter suos grassatur, hæc radix in vino illis exhiberi potest, sic enim purgabuntur, & à pestifera luce conseruabuntur, quod nulla alia procul dubio de causa fieri consuevit, quam quòd constet, eam cholera trahere, quæ multum etiam subus negotij facessit. Hodie internis frequentius, quam externis adhibetur corporis partibus.

Turnerus ad quarthanam & melancholiam magis probat decoctum radicem ex vino, saccharo, aut melle dulcoratum, quàm aquam stillatitiam. Imò tam huius, quàm aliarum plantarum efficacior Turnero videtur succus aut decoctum, quàm aqua stillatitia. His coronidis loco quædã ex Dodonzo adscribamus. Purgandi inquit, vim habere Diosc. & Actuarius referunt. Alijs nulla, aut si quæ sit, exigua, elementisque subducendi vis Polypodio esse videtur. In qua sententia Manardus quoque, qui admodum imbecilliter ipsum purgare sentit: cui & accedit ipsa rerum magistra experientia: Nam re verâ Polypodium per se hanc quaquâ purgat, sed ex iure veteris galli cum Beta, aut Malua, alijsve lubricantibus aluum, decoctum, ad alui lenitionem nonnihil tantummodò confert, &c.

POLYPODIVM ILVENSE.

Locus



Ilua Tyrrheni maris insula Polypodium hoc gignit, quod H. Lugdunensis auctor ab alijs diuersum facit, sicuti etiam à Lonchitide aspera Iluensi [Lonchitide aspera Maranthæ]. Iseparat. Nascitur autem in saxis, radice ut in alijs generibus velut polyporū cistis nodosa, fibrata: caulibus pedalibus, è rufo nigrescentibus, læuibz, infernè hirsutis: fr-

lis oblongis, pinnatis, Inæquali sicut in caule dispositis, altera parte virentibus, altera puluisculo obsitis, gustu subdulcibus, & nonnihil austeris, nullo flore, nullo semine. Ad eadem valere aiunt, ad quæ alterum Polypodium, nisi quod magis siccer, ob natalium ariditatem, tum soli natura, tum maris afflatu maiorem.

An Lonchitis aspera Maranthæ;

POLYPODIVM INDICVM.



Valdè elegans Polypodij siue Filiculæ genus hoc, anno 1604. ex Orientali India adferebatur Amstelredamum, quod inuentum in sportulis Doctoris Nicolai Colij Medici, qui cum ijs, quos Mercatorum societas biennio in Indiam aromatum comparadorum gratia ablegauerat, profectus, in reditu

Locus

extinctus fuerat, Cl. V. Petrus Pavius, primarius in Academia Lugduno Batava Medicinæ professor domo acceperat.

Radice autem nitescitur sex uncias longa, vnam præne crassâ hirsâ, quemadmodum Europæi Polypodij radices, ferruginei coloris, & eodem modo summâ tellure obliquè serpente: è qua terga prodibant folia, quorum tertium reliquis duobus minus: bina autem maiora vndecim uncias longa erant, à medio verò neruo satis crasso, folij longitudinem secante, utroque latere in quinque penè vnciarum latitudinem expansa, peroras laciniata, instar foliorum Quercus in nouellis furculis natorum, quæ plerumque ampliora ijs quæ in vetustis ramis nascuntur, esse solent: è medio illo neruo alij minores in lateribus oriebantur, vsque ad laciniarum extrema propensi, inter quos multi plices venula reticuli instar contextæ, & sese inuicem secantes excurrabant, quæ magnam venositatem folio conciliabant: firma autem erant ea folia, coloris ex spadiceo fuscis, qualis in Quercus siccis folijs conspicitur, & à Gallis couleur de feuille morte appellari solet, infima parte breui pediculo à radice emergentis, etiã aliqua ex parte illam regentis, quia statim ab exortu in latera se spargebant: radix manducata Polypodij vulgaris saporem quodammodò retinebat, minùs tamen dulcem, sed leni quadam actione præditum, quam ex calidioris regionis, in qua planta nata, intemperie, aut ex vetustate fortitan contraxerat.

Descript.

Clus. Exot. lib. 4. cap. 17. Polypodium Indicum. Casp. Bauhin. pin. Polypodium 3. siue exoticum folijs Quercus Polypodium Americane incognita nomine à Pona Veronæ acceptum.

Acquisita

ASPLENYM

ASPLENVM EX VETTERIBVS, ET
in genere.

CAP. V.

Appella-
tur nō
a Diosc.Descri-
ptio.

Vires.

Plinius.

Locus.

Herba
mula
Theophr.

A Splenon, quod aliqui Scolopendrium, Sple-
nion alij Hemionion, alij Pteryga, alij Pie-
rim, quidam Louchirim, nonnulli Acutium, Apu-
leius Tencrium, aliqui Phrygiam, alij Phrygion,
alij Philodotem, Prophetz, Mustelz aut Felis
sanguinem, vocant, *folia* habet scolopendrz aut
mali similia, plura ab vna *radice* prodeuntia [sic
Corn. ex vet. quæ delet *πριχόμυνα*, id est in ambu-
tum spatia. Sic enim Sarac. reddit.] Nascitur in
petris, parietibusque confectis & calculis, filici-
busque, iisque opacis [sic enim legere malumus
cum Sarac. quàm cum Cornario *φύταις ἐν τοῖς κοι-
ταῖς πότοις*.] Nam vel inter saxa, vel in parietibus
humidioribus, qui & calculis filicibusque coa-
gmentati sint, sæpe Asplenon inuenitur. Ita verò
parietes id genus distinguere voluit author, ab
ijs qui & solida structura, nempe vel & quadrato
lapide, vel & lateribus probè junctis eriguntur.
Nec verò *caulem*, nec *florem*, nec *semen* [ἀκάρπια
ἐνυδρῶν, vet. delet.] *Folia* autem Polypodij [Filici-
ulæ, Sarac.] modo inculturis diuiduntur, subiecta
huicentia, hirsutaque, supernè verò viridia. Vires
habent liquandi [absumendi, Sarac.] splenem, fo-
lia in aceto seruata, & ad quadraginta dies
pota. Sed oportet etiam folijs cum vino tritis
lienem integrere [illini, Sarac.] Stranguriæ quo-
que, singultui, & regio morbo auxiliantur,
calculi quoque vesicæ comminuntur. Cæterum ipem
partus seu conceptionem impedire, tum per se,
tum etiam cum muli liene amuleti instat. Verùm
aiunt noctu, lunâ silente, ipsam effodere ope-
tere, ut hoc præstet. *Hæc enim Dioscorides.*

Asplenon (ait Plin. lib. 17. cap. 4.) sunt qui He-
mionium vocant, folijs trientalibus multis, radi-
ce limosâ, cauernosâ, sicut Filicis candidâ, hirsu-
tâ, nec caulem, nec florem, nec semen habet. Na-
scitur in petris, parietibusque opacis, humidis,
laudatissima in Creta. Hujus foliorum in aceto
decocto, per dies quadraginta pota, lienem ab-
sumi aiunt. Et illinuntur, [ita emendatius ex ve-
teribus in vulgatis legitur. Et, illinuntur autem,
eadem sedante singultus. Historia Lugdunon-
sis.] Non danda feminis, quoniam sterilitatem
facit.

Folium herbæ mulæ vocata (ἡμίονο), sterilitatē
mulierib. facere volunt, & aliquid vngulæ ac se-
minis [aliqui codices nō σπέρματος, sed δέρματος,
pellis, vocem præferunt] muli animalis miscendū
præcipiunt: constat hæc folio linguæ ceruinæ
[ὅμοιον τῆς ἡμίονο φύλλον σκολοπενδρίου, sic vulgati
codices habent, sed legendum ex Dioscoride τῷ σκολο-
πενδρίῳ] appellatæ, radice numerosâ & tenui:
montanas planities & saxosâs amat: mulas hæc
herbâ plurimum delectari affirmant. Vlus ejus
vel ad lienes, quemadmodum Volucti, siue vi H.
Lugd. Clymeni. Et his verbis videtur Theophras-
tus lib. 9. cap. 19. Hemionij folium Scolopédrio
simile facere: Dioscorides autem Asplenō & He-
mionion & Scolopédrium idem vocari ait. Et li-
cet Theophrastus, ἡμίονον & σκολοπενδρίον primâ
fronte aduersa fecisse cuiuspiam videatur: tamē eo
loco [ἡμίονον ἔχειν τὸ φύλλον σκολοπενδρίῳ] legendum
fortasse fuerit, ut apud Dioscorid. σκολοπενδρίῳ, vel
etiam σκολοπενδρίῳ. Nam & id animalculi genus
vtrōque modo apud Græcos efficitur. Cæterum,
ut medicamentum ad conceptionem impediē-

Tom. III.

dam, Dioscorides adalligatum tum per se, tum
cum muli splene, Asplenon commendari scri-
bit, qui vltus in Theophrasto est ambiguus: nec
enim indicat an adalligari, an potari velit, cum
vngula, aut semine muli. Sed hæc commodè igno-
rari possunt. Et quod ejus rei gratia tradit Dios-
corides silente Luna effodere oportere, Serapio
aliter expressit, nempe oportere ipsum suspendi
die aliquo in cuius nocte Luna non apparuerit.

Asplenon à Scolopendrio videtur quōque
distinxisse Galenus lib. 5. simpl. cap. 11. dum reme-
dia maioribus lienis obliuionibus dicata re-
censens, vtrūque seorsim enumerat, Scolopen-
drium sc. & eam quæ lienem nomine represen-
tat, Asplenon appellatam, Verùm eo loco alteru-
trum redundare facillè crediderimus, præter Gals-
ni sententiam inibi accreuisse Scolopendrium censet
etiam Matthiolus qui dum Plinium lapsus arguit,
quasi ipsi inter Hemionium & Asplenium nulla in-
tercederet differentia, confundit inter se Hemionij
& Hemionis vocabula quæ expressè Dioscorides
ab invicem distinxit: nec enim ipse nec Plinius vo-
luit aut scripsit Hemionisidem, Hemionium nomi-
nari, quoniam idem ipse, locis alijs, & maximè
libro nono, de compend. med. sec. loc. ἡμιονίδας,
ἀσπλάνης, καὶ σκολοπενδρίῳ nomina, huic vni ei-
demque plantæ manifestè tribuit, teste Sarace-
no. Galenus breuibus his verbis Aspleni vires
perstrinxit: tenuium quidem est patrum, non
tamen calida est herba, hac itaque ratione & la-
pides frangit, & lienes liquat.

Asplen
Galenus

ASPLENVM SIVE CETERACH.

Capillarib. Descrip-
tione
filamentis
nigricantibus
perennib. con-
texta est radix,
vnica, inquit,
Tragus, ex qua
quadraginta,
nonnunquam,
interdum &
pauciora, haud
temerè supra
digitum longa,
vel, ut ait, bre-
uibus pedicu-
lis appensa ex-
surgunt folia,
falcatis vtrin-
que incisuris,
Polypodij, sed
longè breuio-
ribus, licet ali-



quantò latioribus interdum, diuisa, pinguiscu-
la, supernè viridantia, infernè lanuginosa, ruffa
farina aspersa. Ea, inquit Dod. cum inarescunt
complicantur & in teretem figuram contracta,
foia quæ hirsuta, Scolopendrz similia apparente
Cordus ait, folia interiori sua parte viridia, ex-
teriori verò & à tergo, flauo, hirsutisque &
squammoso puluere, & quæ non punctatim
diuisa, sed continuo obducta: saporem folia ad-
stringentem & aliquantulum tenuem habent.
Cæsalp. Folia raris vtrinque diuisuris non con-
jugatim, sed alternatim digestis: color supernè
virens, infernè rubigo quædam inest fuscescens,
initio argentea, postea flauescens.

Descriptio

B.D. 172

S fff

Trag. nob.

Tragus Scolopendriæ veræ titulo pingit, & pro terra vera ac minima Scolopendria describit, statuens non ineptè Filicem petram dici posse, esseque verum Veterum Scolopendrium. Sed quonodo hæc sit verum, quum Lonicitidein, verum Asplenium & Scolopendrium eodem cap. statuat, videant lectores.

Asplenium.
Cordo.

Geln. addit figuram Tragi historiz Cordi, qui etiam in Diosc. vocat Asplenion & Asplenon, eandemque & Scolopendrium, Ceterach Arabum, Germanorum, *Nesselfaren*, & eorum quorundam *Klein Spicant*. Sed hæc germanicæ appellationes minimè approbandæ. Vocatur magis propriè *Stemfarn*, aut *Milzkrant*, vel etiam *Ceterach*, ut officinis Gallis & Anglis, quibus insuper dicitur, *Milzwaiste*, aut *fingerorne*, quòd digito non sit longior, aut *Scalsorne*, quòd squammis subtus sit obsita, inquit Turnerus, qui præterea ait, Asplenium auctore Dioscoride, vocari etiam A plenium, Splenium & Hemionium. Ac Andromachum etiam eodem libro eadem nomina Asplenio tribuere. Verum Galenum lib. 1. de si npl. cap. 12. omnibus his repugnare videri, Aspleniumque & Scolopendrium distinguere, ijs verbis, *Maxima lienu vitia*, &c.

Matth. ait tam à Medicis, quàm à Pharmacopolis, qui Mauritaniarum scripta sequuntur, Asplenium Ceterach barbarâ voce vocari: ab ipsis verò Mauritaniis Scolopendrium, seu Scolopendrium: Ital. *Asplero*, *Scolopendria*, & *Herba inodorata*: Hisp. *Doradilla*: Gall. *Ceterach*. Et hinc refutat eorum opinionem, qui contendunt Arabum Ceterach, non esse Asplenium Galenorum, quia folia Polypodij non habeat.

Græci:

Græci, inquit Dodonæus, ἀσπλήνιον, σπλήνιον ac σπλήνιον nonnullis, ex eo dicitur quòd aduersus splenis morbos efficax sit: σκολοπένδριον verò à similitudine cum scolopendra, huiusmodi ac multorum pedum verme: Theophrasto ac alijs ἡμιόβιον: Gaza Mulam herbam nominat: Dicitur & πλόρη: Nic. Myrepto λειοπλόριον, Filicula lapinosa, & [si non fallor] σπληνοδασπαστος: Hisp. *Doradilla*, *Doradilha*: Belg. *Green Varen*, *Milzkrant*.

Hæc Ceterach.

Lobelius putidos Literatores appellauit eos, qui Ceterach negare aut sunt, aut lapsi. Dioscoridem intinulare, quòd Scolopendrium non nouissent. Asplenium etiam Anguillara admodum notum dixit nomine Ceterach.

Ceterach vulgò appellatur in petris, & parietibus vetustis herbula hæc folio digitali: Dioscorides Asplenium vocat: alij Scolopendrium: Galenus tamen Asplenium diuersimodum facit à Scolopendrio. Apud Plinium perturbata videntur mihi (Cæsalp. loquitur) hujus descriptio: cum radici tradat, quæ partim loco, partim folijs conueniant: non enim radix cauernosa traditur à Dioscoride, sed in cauernulis saxorum nasci: neque similitudo Filicis, candor, & hirsuties radici Aspleni conueniunt, cum sit valdè tenuis & fibrosa, inter difficultates saxæas vix extripabilis: sed folijs potius hæc conueniunt: aut igitur Plinius aliam intellexit, ut eam, quam Polypodio similem dixit inter paruas Filices, aut deprauatus hic locus est.

Helfric.
Moracm.

Helfricus in nom. el. 2. cap. 23. frustra Scolopendrij verba reperit, quæ antè Aspleni voce tradidit.

Syn. C.B.

C. Bauh. pin. Ceterach officinarum: Scolopendria, Ang. vera, Tragi, & Tabern. Scolopendrium, Cordi hist. verum, Lon. Asplenium,

Matth. Dodon gall. Geln. hort. Lac. Turn. Lob. Adv. & Ic. pag. 807. Castr. H. Lug. p. 1215. & Camer. Asplenium, Cordi in Diosc. Dod. & Lob. Ool pag. 470.

Tragus in Asperimis montibus è scissuris petratum non aliter atque Rotam murariam profilire scripsit. Dodonæus nasci aut in vetustis parietibus, in rupibus, in taxosis, opacis, ac vmbrosis Galliz, Italiz, Hispaniz, & Britanniæ, Belg. & que satis notum: toto anno virere, remissius tamen Hyeme: æstiuis mensibus nona subinde folia promere. Scolopendriâ vniuersam occidentiam Angliam scaterere perhibet Lobelius. Montpelij passim prouenit intra & extra urbem in muris & in monte circa Esperon. Asplenium in Germania minimè frequens reperiri refert Cordus, præterquam in nigra silua inter Bulgoiam & Wirtembergensem Sueuiam sita, imò ad Rhenum etiam passim, ut in margine additum.

Locus
Tempus

Inter hujus ætatis Empeiricos sunt qui hac herba non modò lenis durities ac tumores, sed & omnes jecinoris languores ac morbos feliciter ac citò curari posse prædicant: tantæque hujus in roborando hoc viscere vires esse affirmant, ut etiam animalis alicujus excoctum jecur, si cum hac coquatur, crudo simile reddatur, & ad priorem suam constitutionem restituatur. Sed hoc inter aniles fabulas referendum, vñ cum eo quod Dioscorides de noctu colligendo Asplenio refert, & plerique alia vanissima, quæ in veterum libris subinde sparsim reperiuntur: à quibus nec recentiorum plerique abstinent, qui mendacijs ac inanibus nugis paginas quandòque implent, studiosique non parum imponunt.

Vires. &
Vfus.

ADIANTHVM VETERIBVS.

CAP. VI.

Theophrastus lib. 7. cap. 13. Adiantum appellatum scribit, quia in aqua nunquam solum ejus madescit, nec quicquam ipsi adhæsisse humoris constat, licet maximè locis humidis nascatur: perpetuò vires: ejus genera duo, candidum & nigrum: ambo ad defluuium capillorum vtilia oleo trita. Gaza aliquando Adiantum, aliquando Capillum venerit vocat.

Adian-
thum ve-
ra dicitur
Theoph.

Adianto, quod aliqui Polytrichon vocant, Dioscorides foliola adscribit Coriandro similia, in summo: fissa: *caulesculos*, ex quibus prodeunt, nigros, admodum tennes, palmi altitudine, splendentes: *folia* (impositicia & adulterina sunt hæc de folijs vocabula: siquidem ea antè descripsit. Cord. huic loco etiam aliquid deesse censent, Marcellus, Virgilius & Tragus, præsertim quòd foliorum tam dissimilium in eadem Adianti capite mentio fiat) Filici similia, valdè parua: neque *caulem*, neque *florem*, neque *fructum* fert: *radix* inutilis est.

Dioscori-
dis.

Inter spuria hæc leguntur nomina: Alij Calitrichon, alij Trichomanes, alij Ebenotrichon, alij Argion, alij Coriandrum aquaticum [*αἰγίον* *αἰγίον*] Ægyptij Epier, Romani Cincinnalem, seu Terræ capillum, seu Supercilium terræ, Daci Philophethela vocant.

Nos ut ad propositum reuertamur, recensēbimus pro more nostro, sermonem præsentis plantæ apud Plinium extantem. Est autem iste lib. 23. cap. 21.

Plinius.

cap. 21. Aliud Adiantho miraculum: Estare viret, brumâ non marcescit, aquas respuit, persufum, mensumve sicco simile est, tanta dissociato deprehenditur, vnde & nomen à Græcis, alioquin frutici roptario. Quidam Callitrichon vocant, alij Polytrichon, vtrumque ab effluuio, &c. Duo ejus genera, candidum, & nigrum breuiusque. Id quod majus est Polytrichon, aliud Trichomanes vocant. Vtrique ramuli nigro colore nitent, folijs Filicis. Ex quibus inferiora aspera ac fœca sunt: omnia autem contrarijs pediculis densa inter se ex aduerso: radix nulla: umbrosas petras, parietumque aspergines, ac fontium maxime specus sequitur, & saxa manantia, quod miremur, cum aquas non sentiat. Calculos è corpore mirè pellit, frangitque vtrique nigrum: quæ de causa potius, quàm quodd in saxis nasceretur, & à nostris Saxifragum appellatum, crediderim: bibitur è vino quantum terni decerpere digiti, &c. Lib. 21. cap. 17. Adiantho æterna folia esse scribit.

Perpetam autem Adianthi duo genera statuens, minus Trichomanes nominari refert: nam Trichomanes ab Adiantho differt. Et hoc testatur H. Lugd. talibus verbis: Plinium Theophrasti verba convertere voluisse, sed ejus sensum haud assecutum fuisse, perspicuum est. Trichomanes enim alterum facit Adianthi genus, scilicet candidum. At Theophrastus cum de vtriusque Adianthi genere dixisset, de Trichomane, cum diuersa planta, seorsim verba fecit.

Montepelij Adiantho albo & nigro abundanti. Quid autem intelligat Fernelius in suo syrupo per Adianthum simplex, me latet: inquit Sanguier, cum duotantum genera Adianthi propriè dicti reperiantur in officinis, nisi sit Polytrichum quod Filiculam vocat Gaza. Nos suspicamur Fernelium per Adianthum album, Rutam murariam intelligere, per nigrum, Polytrichum, per Adianthum simplex, legitimum.

Potèrò, vt dictum, nil aliud sonare videtur Adianthum quàm quodd non madescens, neque aquam admittens, propter siccitatem sc. superficiali, quæ aquæ contraria est, & eam solet repellere, quemadmodum, vt testatur Fracastorius lib. de symp. & antip. rerum, in pulvere & penois, & alijs siccis contingit: in quibus non consistit aqua, sed aut elabitur, aut in guttulas rotundatur. Signum autem quod in Adiantho hō consistat aqua propter siccitatem, id est, quod duabus existentibus Adianthi speciebus, albo, & nigro, nigrum quidem madescit, quodd humilis superficiali sit, album autem non, quodd siccioris. Nican- der contrà Adianthon haud dictum air, quodd folium persufum, mensumque aqua, & diu in aqua, nūquam madescat, semperque immadidum permaneat: quasi verd enim longiore morâ in aqua submersum æquè aliæ herba non intigeretur: sed quodd imbris è celo descendens stillicidia folijs ejus non infideant.

Fuchsius tamen magis placet, ab interioribus putæorum parietibus, & fontium marginibus, quos coronat, dictum esse Adiantum, quodd nigrum quasi sitiens illoz aquas, quas tamen odit & respuit, quærat.

Trichomanes à luxuria capillitij nomen habet, quodd se. faciat luxuriare capillos & subnasci. Polytrichon, autem quasi multicomans, quodd pillorum multitudinem creet, eosque densos faciat, simulque eorum profluvia expleat. Callitrichon, verò, quasi pulchricomum, quodd crines tingat, crispet, pulchriorésque reddat. Nec aliâ ratione,

Capillus veneris hæc herba dicta est, quàm à speciosis reddendis capillis: nec alio nomine veneris vox adjecta est, quàm quod hæc pulchricornia pingatur. Quibuidam etiam Ebenotrichon, appellatur, præsertim nigrum genus [Trichomanes] quæ vox nihil aliud significat, quàm Ebeni capillum, id est, nigrum, & quali colore Ebenus est. Oborta quidem suspicio est ex corrupta voce illa Ebenotricho, Latine nomen factum esse, quodd in communi vtu est, Capillus veneris. De syllabam, Græci, Ve prorsus præsumunt, facillimèque potuit lapsus esse ab audito Ebenotricho, in veneris trichas, id est, capillum. Ab H. pprocrate, teste Hermolao, dicitur, Calliphyllos id est vbi & Calliphylon scribitur. Dicitur etiam Saxifragum: non tam quia nascitur in saxis, quàm quodd calculos mirè frangit.

Sequuntur Adianthi, Polytrichi, Callitrichi, & Capilli veneris nomine donatæ plantæ. Verum Adianthum sine Capillis veneris, quodd Adianthum album dicitur Syluis & Tagaultio, vocat Tragur Adianthum magnum & verum. Idem perhibet esse qui vulgarem Capillum veneris (sic Rutam murariam vocat) contendunt Adianthum album Theophrasti, alijs interim id negantibus, aliamque in locum ejus substituentibus. Trichomanes vulgè Polytrichum dictum, quidam existimant Adianthum nigrum Syluis Adianthum alterum Dioscoridis, & nigrum Theophrasti. Anglos pro Adiantho benè videri Trichomanes autor est Turnerus. Dodonæus econtrà Plinium perpetam Trichomanes inquit Adianthi genera referre contendit, Trichomanesque ab Adiantho differre. De hæcenus autem nominata possit agere.

Filiculâ fontanâ C. Bauhini, siue Dryopteride candidâ Dodonæi, officinæ olim pro Adianto albo Plinij vsi sunt. Vide caput de Adianto folio Filicis.

Sed & Dryopteridem nigram Dodonæi, sequitur Lobelium, Adianthum nigrum officinarum inscribitur. Adiantum etiam nigrum officinarum, quidam ex recentioribus Lonchitidem asperam esse volunt: Sed hoc negat Dodonæus.

Adianthum Syriacum Tabern. quid?

Adianthum pulcherrimum Thalij non nouimus, & tamen ex eo describimus. Adianthum aphyllum aureum quibusdam dicitur de Polytrichis Apulei quibusdam dicto. Siluiam transmarinam Callitrichon Herbarij magno errore vocant, teste Tagaultio & Ruellio. Inter Adiantha recensentur præterea Adianthum Syriacum Tabernæmontani: & Adianthum pulcherrimum Thalij.


ADIANTVM SIVE CAPILLVS VENERIS.

M Vico rufoque cæspiti implexæ sunt capillares radicis fibræ nigre: caules, exeunt multi, tenues, nigri, dodrantales aut etiam cubitales, in ramos stamineæ tenuitatis diuisi, per quos tremulo filo appensa visuntur crebra, folia mollicella, tenellâque, læuia: Coriandrinis primitus erumpentibus similia, nec magnitudine multum cedentia, ferè triangularia, sectionibus per extremum rariotibus, altioribus cæsa. Folijs, Anisi Lobelio: incisa Apij modo odore velut Fungi, Cæsalp.

Syluius apud Mesuem de comp. med. libr. 6. vocat Capillum veneris, Adianthum album.

Acquino. ca.

Descriptio.



Adiantum hoc candidum & majus, Adianti appellatione indicare Dioscoridem, author est Tagautius, & Polyrichum proprie cognominari, atque hoc quidem esse verum Capillum veneris, qui in Gallia Narbonensi plurimus reperitur, circa puteorum interiores parietes & fontium margines: Huc topiarium fruticem, vulgò Capillum veneris nominatum perpetuò virere.

Cord. in hist. pro Adianto nigro describit. In Dioscor. verò aut ejus textui, *φύλλα ὁμοία πτερίδι*, adjecta esse.

Tragus quidem hoc pro Adianto magno pingit, sed non describit, ceu è peregrinis terris aridum ad se delatum. Hoc verò cum Lobelio pro Adianto verò Dioscoridis admittit, & H. Lugdunensis.

Compiler Tabern. [qui in Ic. Adiantum nigrum verum in Hist. Adiantum. 1. nigrum, *Venus hayr Weiblen*, inscribit.] crassam suam ignorantiam in descriptione Adianti demonstrat, dum ait folia folijs Rutæ esse planè similia, deinde dum addit suæ descriptioni, quod Tragus de Rutæ murtariæ duratione scripsit: nomina præterea confundit.

Cæsalpinus ad Capillum veneris vulgò appellatum, herbam nascentem in puteorum & fontium parietibus, aliisque specubus, aqua frigida irrigata, reducit Adiantum Dioscorideum, ac Theophrasti genera duo, candidum & nigrum: Ab eo tamen rursus separat Adiantum nigrum Plinij.

Verus Avicennæ glossographus, referente Gesnero, Quad. de sue, Adiantum sine Capillum veneris, Capillum porcinum vocat: nimirum quòd coliculos instar setarum proferant.

Adiantum dicitur Matth. Fuchl. Dod. (cui Adiantum nigrum Theophrasti & Plinij.) Anguill. Lac. Turn. Lob. in Adu. Obs. pag. 471. (vbi & Callitrichon Apulei.) & Icon. pag. 809. ac Castori. Adiantum Matthioli, H. Lugd. p. 1012. Adiantum Lugdunense, Camer. Capillus veneris verus, Germ.

C. Bauh. apud Matth. vocat Adiantum gallium, & quòd Monspelio Lugdunum adferatur, Lugdunense: in pln. (vbi Adiantum album & nigrum nihil differre scribit, nisi quòd nigro, cauliculi poltiore nitore nigrescent, foliaque saturatius vireant: albo minus) Adiantum sine Capillum veneris i. sine Adiantum folijs Coriandri. Hòcque variare perhibet magnitudine & foliorum crassitie.

Porro, herbæ à nobis pictæ & descriptæ etiam illa nomina adscribuntur, quæ præcedenti capite leguntur. Germani, *frayvenharr*, *lungfrayven*.

harr, & *Venus harr*, appellant. Belg. *Vrouwenharr*, *Ende Venus harr*: Gall. *Cheneux de venus*: It. *Capel Venero*: Hisp. *Cullantrillo de pozo*: Angl. *Venus hayre*: Arab. *Berfecgnascon*, seu *Berfaujan*, *Culbare albir*, & *Culbare albir*.

In parietibus, locis petrosis, umbratis, humidis, secus fontes & aquarum stillicidia exire, restatur Dodonæus: Italix verò & Gallix notius esse, quàm Germaniæ & Belgio: Virere quavis anni parte: nunquam tamen vel florem, vel semen facere. Adiantum verum Dioscoridis nullibi quàm Narbonensi tractui frequentius: Saxiis, & riguis umbratisque petrosis, Viganio, sterilibus, Seuenæ finitimis, ac rupium, fontium, & puteorum labris vel asperginibus Monspelij, Nemausi que: rarò alibi in Gallia, Germania, Belgio, & Anglia, aut nusquam provenit, quin in Italix quidem locis multis, multùm videre meminit Lobelius. Quare ex suprà dictis locis Lugdunum, Lutetiam, Antuerpiam & in alia celebriora emporia asportatur, caròque à Sepiasarijs emitur.

Quantùm thoracis affectus, hepatis, renùmque juuet, Dioscorides docet his verbis. Decoctum herbæ potum prodest spirandi difficultati, suspiciosi, lieni, & felle suffulsi, & urinx difficultatibus calculos frangit: aluum sistit: serpentium moribus auxilio est: contra stomachi fluxiones in vino bibitur. Secundas ciet & menstrua: sanguinis rejectiones inhibet. Contra serpentium morsus cruda herba illinitur: alopecias densat, strumas discutit: furfures & manantia capitis vlcera ex lixiuo emendat: defluentes capillos continet cum ladano & myrtino, aut Sulino, vel Hyssopo [sic enim vulgata habent exemplaria, *καὶ οὐσίη ἢ καὶ ὑσσίη*, vt & Ruellius conuertit, sed in vetere rectius legitur, *οὐσίη ἢ καὶ ὑσσίη*, quod est, sulino aut celypo.] vinòque. Decoctum ejus cum lixiuo & vino infusum idem præstat. Cothurnices & gallos pugnaciores facit, in cibos eorum additum. Seritur gratiæ utilitatis pecorum circa ouilia. Eadem feri de Adianto suo scripsit Plinius, tradens inter alia, Folia in vrina pueri impubis, trita quidem cum aphronitro, & illita ventri mulierum, ne rugosus fiat, præstare dici. Adiantum, inquit Galeus in caliditate symmetrum est. Verùm desiccatur, & extenuatur, & digerit. Etenim caput ex alopecia glabrum capillis conuestit, & strumas & abscessus digerit, lapidè que frangit epotum, & viscosorum crassorumque è pectore pulmonèque excreationibus non mediocriter còfert, & ventris profluuiũ sistit: nò tamè vllà manifestà caliditatē affert, sicut nec frigiditatē. Verũ posuerit ipsũ quispiã secũdũ hanc oppositionem & temperiem in ordine medio.

Melus etiam Adianti temperiem & vires insignes recenset, inter quas & vim purgatoriam ei tribuit, ei assentiente Sagniero. Græci verò & Plinius nullam: ac cum autoritate ratio & experimentum falsum id esse comprobant.

Dioscorides etiam Adianti vires & facultates multas refert, non modò differentes, sed & repugnantes: & inter alias, sanguinis rejectiones ipsum cohibere ait: paulò verò antè, secundas ac menses ciet. Quæcũque verò sanguinis rejectiones cohibent, ea etiam menses supprimunt. Addit idè in fine, Seri circa ouilia utilitatis pecorum gratia: quæ autem utilitas ex eo, non ostendit. Iam & seri Adiantum nequit, cum semine careat: nec etiam commodè transferri. Apparent idcirco hoc loco multa aliunde translata, hoc loco Dioscoridi

Locus & Tempus

Vires & vñs.

Adiant.
nigrum
Corda.
Ad m.
gnum,
Trago.

Ad. ni-
grum vo-
cunt. Ta-
bern.
Compil.
notatur.
Capil. ve-
neris vul-
gò, Caf.

Capillus
porcinus

Synon. ca-
tera,

Nomina
linguæ
germ.

Dioscoridi addita. Et fortassis, ut suspicatur Dodonæus, ex Cyrisi historia accelsere.

*Emblema
de vrupa
& Adian-
thi ramu-
lo.*

Scribit Orus, ut & hoc coronidis loco addamus, vrupam ubi senserit ex vuarum, quas appetit summopere, esse nimio noxam se incurrisse, decerpit Adianto herba, quam officinæ Capillū veneris nuncupant, mederi sibi, ramulūque ejus herbe circumferētem obambulare. Quibus itaque temulentia valetudinem concussit, ij abstinentiæ ramulo se lustrent: liquidem seipsum vincere, palmarium sit: Had. Iunius Emb. 15.

ADIANTV M PVLCHERRIMVM.

Descri-
ptio.

Adianti pulcherrimi, quod Thallius Lugdunensi simile facit, folia à tergo lanugine densa, puluerulenta ac penè rubente ex fuscedine quadam, exornantur, quasi folia Ceterach seu Scolopendrij veri. Folia autem illa sunt in brachiatis coliculis ex nigro rubentibus ac flexilibus, incisa, crenata, non ita latis aliquantulum particulis constantia ut in Lugdunensi, sed tenuioribus, oblongioribusque & mucronatis. Ipse author hoc non reperit, sed in libro quodam charæ agglutinatum in pharmacopolio Northusiano natus fuit, allatum ex Harcloia à vetula quadam herbaria. Lectorum esto judicium, an sit Adiantum nigrum officinarum, id quod vult C. Bauhinus. Vocat autem in pin. Adiantum siue Capillum veneris officinarum secundum, vel Adiantum folijs longioribus puluerulentis pediculo nigro.

Locus.

C. Bauh.

RVTÆ MVRARIÆ FORTE AFFINIS. Adiantum album crispum alpinum Schveuck.

Descri-
ptio.

E Radice pluribus tenuibus capillamentis implicata Coliculi plures, graciles, juncei, leues, in summo brachiati nascuntur, foliolis Adiantho albo [Rutæ murali] similibus, magnis, virentibus, crassioribus, crispis, ac veluti punctis Ledi insignitis, absque flore & semine: aspectu jucunda plantola.

Locus.

Vires.

Rarissimum inuentu: non nisi altissimorum montium petrosis oritur. Ita Rauschengrunds. Eiusdem cum Adiantho facultatis.

RUTA MVRARIA.

CAP. VII.

Descri-
ptio.



Radice tenuissimis fibris nigricantibus capillata, vel, ut ait Tragus, radice unica nigra & capillata, subastringente, parietinas rimosas occupat, pediculos promittens multos, Trago quadraginta aut quinquaginta coliculis, semipalmates, renues, juxta radicem nigricantes, aut aurubentes, reliqua parte

virentes, nonnihil in summo diuaticatos, ex quorum tum extremitatibus, tum lateribus folia oriuntur, Rutæ, vel Adianthi veri, sed multò minora, striata, rigidula, per ambitum crenata, superna parte viridia, inferius puluisculo ruffo aut fulco aspersa, gustu nonnihil acerbo & subadstringente, cum tuncillo dulcedinis leuiscule vestigio. Trago folijs est copiosis & quincunciali ordine inuicem conjunctis, incisuris suis instar teneri Cortandri diuisis, & quæ terrâ spectant, aureis punctulis Julio mense notatis: gustu cum Hemionide satis cōuenit, nisi quod in his austerior paulò & asperior deprehenditur. Ceterum, cum Tragus, tum alij non pauci existimant Rutam muralem non florere, sed sterilem esse, ut Filices omnes, quod nobis persuadere non possumus: quinimò, florem & semen, habere, ac semine tenuissimo propagari censemus: nec enim has placentas in muris sine semine oriri credibile est. Nihil liquidem in calce, arena & lapidibus inuaditur, quod ad generandas ejusmodi plantas aptum sit.

Fuchsi, Ræsi, & Hier. Baunschi. diuersarum plantarum nomina confundunt, vocando, *Maurrauten*, græcè Adiantum, lat. Capillum veneris, Cortandrum putei, Capillum porcinum, & Pollichium.

Russ. & Brunsch. nominant.

Sylu. de compos. med. lib. 1. Saluam vitam vulgò dictam facit Adiantum quartum quartanaliq; curandis efficacem esse scribit. Rutam murariam, vulgus Herbariorum Capillum veneris & Cinnocalem herbam nominat, inquit Tragus, estque ea Adiantum album, cuius meminerunt veteres, aut certe illius genus. Vide plura c. de Adianto veterum. Fuchsi. Saxifragam inscribit, vocatque græcè *capitispazon*, & *capitispazon*, quod calculosè corpore pellat frangatque. Empetron verò, quoniam in saxis proueniant.

Adianthum quartanaliq; sylu.

Matthiol. depingit nomine Paronychiæ etiam in comin. cum mag. fig. lat. & ital. dicens: Non desunt qui sententiæ meæ de Paronychia repugnent, atque eorum calumnias ridere soleo: potius iidem [Dodonæus] accusandi sunt, qui hanc plantam alterum Theophrasti Adiantum faciunt, nempe quod album ipse appellauit: siquidem is nullam inter nigrum & album interponit differentiam, nisi coloris in caule. Et quanquam non desint [Lacuna & Castor] qui hanc plantam vnà mecum Paronychiam faciant, quam tamen sint qui reclamant, ne dissensio vltimè protrahatur, non Dioscoridis, sed meam Paronychiam esse volo. Fuchsius pro Saxifragia Dioscoridis depinxit: verum quod hæc constet folio Rutæ, illa verò Epithymi, capillorumque modo tenui, cui planè ejus sententiæ comprobem, non habeo. *Hærentes Matthiolus*. Is autem juxta Guiland. opinionem, in hujus plantæ ignorantia, duplici de causa verberibus credi dignus est, cum quod parietum Rutam, Adiantum candidum esse, tum quod Adiantum candidum falsò pro Paronychia exhibet. Mirum ipsum erroris istius non potuisse admonere, Pepli, quam proponit, figuram. Et enim si quis Peplum & parietum Rutam juxta se collocet, eandem inter eas stirpes similitudinem deprehendet, quæ inter Andiantum nigrum & Portulacam cernitur.

Vulgò Rutam murariam, aut Rutam muralem appellant: Germani, *Maurrauten*, *Steinrauten*, & *Ejelszarn*. Belgæ *Stenraute*. Galli, *Rue des Murailles* & *Sauue vie*. Wall. *Rue*. Hung. *Keu foli Ruta*. Ruta quidem dicitur, ob quandam foliorum cum

Nomina linguarum.

culo, *Erythraea* propè Bipontium sita: deinde & in silua Bidalsensi non procul à *Waldborn*. Iuveni ego mente Septembri in monte Rang, juxta Than, inter saxa.

Vires.

Saxatilem Filicem ejusdem cum Capillo veneris temperamenti esse, & pro eo usurpari posse, author est Tragus.

PHYLLITIS VETERIBVS

CAP. IX.

Descriptio.

Dioscoridi fertur *Phyllitis Rumici* [ῥυμίδης] similia, sed oblongiora, & magis virentia (quidam ῥυμίδης ῥυμίδης) iena, septenave, recta [ῥυμίδης, ver. delet.] quæque parte anteriore lævia ceruuntur, posteriore vero tenues quasi vermiculos annexos ostendunt. Nascitur in vmbrosis locis ac viuidarijs, gustu acerbo. Neque verò *caule*, neque *semen*, neque *florem* proferit. Folia in vino pota serpentium moribus aduersantur. Quadripedibus itidem per os infusa auxilio sunt. Bibuntur & ad dysenteriam, & diarrhoeam.

Dise-
nteria
appell-
ationes.

Sunt qui *Phyllin* vocent, alij *Acaulon*, quasi caule carentem, alij *Lapathum agron*, hoc est *Rumicem* iuuestrem.

Galenus.

Phyllitidis Plinius mentionem non fecit. Galenus acerbæ qualitatis esse ait, quare non absque ratione alui pro fluxia & dysenteria pota fuit.

Elymen.

Græcis *φυλλίτις*, quasi foliosam dicas, cum nihil nisi foliolus capites appareat: Latini quoque græcum asseruauerunt nomen: officinis lingua ceruina dicitur, inquit Cæsp. Bauh. qui *Phyllitide* Theophrasti *σκολοπενδριον*, quam *Gaza* Linguam ceruinam vertit, suspicatur.

PHYLLITIS SIVE LINGVA CERVINA
vulgi.

Descriptio.



Caule vi-
dua, ex ca-
pillaris radi-
cibus nigrican-
tibus, numero-
sis, Trago:
Cordo, mascula
Filici [id est,
vulgari] simili-
bus, implici-
tis foliorum ve-
stigijs consi-
stentibus, fi-
bratis, foris ni-
gricantibus,
intus autem in
pallido viridi-
bus, folia fudic
oblonga lena,
octona, vel
dena, inquit
Lobel. dodran-

tolia aut pedalia, duarum vnciarum ple-
umque
latitudine, Cordo acuto Rumici similia Trago &
Cæsp. spleni, vel lingue exerte instar, imâ parte
salcæ Lunæ modo corniculata, læto virore
splendentia superne, inferne verò obliquis pul-
uerulentis areolis, seu lumbricijs, ruficis: Cordo
flauis aut rubentibus, Trago subluteis, virgata:
sapore subacerbo: odore, Dod. graueolente, *caule*,
flor, *semine*que destituitur. Cordo etiam ne-
que caulem, neque florem, neque semen fert, è
vermiculis tamen foliorum in puluerem resolu-

ris & sparsis nascitur: saporem habet tota herba
adstringentem, cum tenuitate aliqua. Quid de
presenti planta sentiendum, tandem inuestigan-
dum. Magna apud rei herbariæ scriptores, Ma-
nardum præsertim & Leoniceum: Ruellium
& Fuchium [qui Linguam ceruinam vulgò vo-
catam Hemionitum esse contendunt] Item Mar-
thiolum, Cordum, ac Turnerum: Dodonæum,
Marantham, & Lobelium [qui Phyllitim pro
Lingua ceruina admittunt] controversia viget,
quam nostris hæc scriptis breuitati studentes
nequaquam inferere possumus.

C. Bauh. pin. Phyllitis i. sine Lingua ceruina *Synonyma*
officinarum: Lingua ceruina Eric. Cordo, Lonice.
& Cæsp. Phyllitis sine Lingua ceruina, Tab-
emacul. Phyllitis vulgaris, Camer. & Clus. hist.
Phyllitis Matth. Dod. Ang. Lac. Turn. Cordo.
Gesn. hort. Lobel. Obs. p. 468. & 469. l. c. p. 269. H.
Lugd. p. 1219. & Thalic: Hemionitis Leonice Ma-
nardo. Ruell. & Fuchio: Scolopendrium, Brun-
sell. Scolopendria vulgaris, Trago. Est & latifolia,
teste Camerario: sæpè etiam in fontibus exi-
gua reperitur, C. Bauh.

Græcè *φυλλίτις* dicitur: Latini nomen seruant: Nomina
officinæ Linguam ceruinam appellant. Germani
hirschen Zung & *hirschen Zung* aut *hirsch Zung*:
Belgæ *hirsche* & *Steenberis*: Galli, *Langue de cerf*: Hæp. *Lingua ceruina*: Angli *barret*
range.

Cordus prodidit virere tota Hieme, & ab ijs-
dem radicibus noua folia singulis annis profer-
re, prioribus numerosiora: prouenit vmbrosis &
saxosis montibus: solum amare pingue, non ta-
men ex ipsa terra immediatè nasci, sed ex musco
lapides & præsertim calcarios regente. Nullo
ex semine, ut ait Tragus, sed spore sua in vmbro-
sis & viginosis montibus, vallibusque, nec non
quibuldam fontibus & humectis muris nascitur,
præsertim verò in montanis Heluetiæ, & silua
Federwalds vocata, è regione Mosellæ, & in ijs
montibus qui ad Comitatum Valentiniæ pertin-
gunt. Hodie passim in hortis plantari consuevit.
Folia appetente Mado prodeunt. Viret quouis
anni tempore, haud aliter quàm Polypodium.
Teste Lobellio vniuersa occidua Anglia scaret
Phyllitide. Nulla prouincia est Clusio peragra-
ta, præsertim quæ montosa sit, in qua Phylliti-
dem non obseruauit vel vmbrosis locis nascentem,
vel in ipsis puteis inter lapidum siue late-
rum commissuras. Cæsalpinus addit oriri in vmbro-
sis lapidibus & juxta vetera sepulchra.

Idem celebrem facit ad lienem extenuandum *Vitis*.
decoctam in aceto, vel aqua destillata, in potu.
Plura ex veteribus ante dicta sunt.

PHYLLITIDIS SPECIES SIVE HEMIONI-
tis Lobelio.

IN Anglia occidua, ad rupes antrosasque cautes
D. Vincentij vno miliari ab urbe petamona
Bustonia vberimè luxuriantem hanc, facie Lin-
guæ ceruicæ, plātā inuenit Lob. sed tenuis quater-
nifolia, minoribus multo: vix enim quàm ma-
xima tres digitos longitudine excedunt: minimè
crassa aut rigida, sed mollicella, quasi Adianti ve-
ri, inter quod & alias plātas capillares, alioquin
lætas & benè adultas ita exillis nascitur: nec vllia
à tergo lituris asperata, ad mucronem lateribus
vtrinque ad medium sinuatis & reductis: basi
latiore lunata: segmento quati vtrinque intem-
recuruo. Londinum in hortis plantandos cas-
pites misit author, sed parum diu superstites
facturus

Locum:



fuerunt: adeo namque tenuibus cithis radicis & foliis delicatulis injuriæ opportuna est, ut vix se attricare citra lacerationem patiantur: gustu tamen neutriquam à Lingua ceruina alio est. Hæc nō nulli Flædi putant esse aliam speciem à Phyllitide, nec tamē esse illam, quam depinxit Matthioli. In Obs. p. 469. idem Lobel. hæc subdit.

Hemionitis Anglica mihi iconæ & oratione exhibita, Mechliniæ à D. Bracione & Georgio Rye, studiosè in siccilibus diu propter raritatem & ténertatem nutrita, tandem admirabili sui metamorphosi & trāsmutatione, in Phyllitidem abiit. Quod facit, ut faciliè credam Phyllitidem & Hemionitidem easdem & congeneres esse, & cultu subite hujusmodi mutationes, nec magis differre, quàm agreste Cichorium à sativis: neque facultates, quas utriq; tribuit Dioscorides, refragantur. Attamen longitudo foliorum hujus Hemionitidis, quam Roma transmissam in siccili Mechliniæ alebat D. de Brancion, vix uncialis & sesquiuuncialis erat, fortè transplantatione, injuriæ aded obnoxia fuit, & velut semianimis, ac multum imbecilla. Pingitur in Ic. pag. 306. hoc titulo. Hemionitis sine sterilibus.

Dodonæus quoque testatur Hemionitidem ex Britannicæ umbrosæ delatam tenellam quandoq; in Belgium, posteaquam adoleuisset, Phyllitidem angustis & oblongis foliis, emulari repertam esse: foliisque angulos inferiores, paulò prominentiores, nonnihil discriminis ostendere. Idem se observasse testatur & Clusius.

PHYLLITIS POLYSCHIDES.



Alterum elegantis Phyllitidis genus solâ foliorum formâ à vulgari Phyllitide differt, alioqui reliquis notis et per similibus: prodeunt verò ipsi ex radicibus multis fibris nigris & veluti capillamentis prædita, senu, aut septena folia palmatis longitudinis, ejusdem cum vulgari foliis leuoris & viriditatis interna parte: ac externâ, nullis aut rarissimis trans-


versis lineis insignita, extrema verò parte multipliciter dissecta, inquit Clusius, qui Phyllitidem laciniato folio inscribit.

Dodonæi fere opinio Phyllitidem per ætatem quandoque folium in partes veluti lacinias quasdam sîdere, ita ut ex vno folio alia exire ac progigni videantur. Et hæc Phyllitidis varietatem Phyllitidis laciniatæ titulo pingit. Lob. Obs. p. 469. dicitur Phyllitis multi fido folio, cui in Ic. p. 805. incuria Typographi falsus titulus appositus, nempe Phyllitidis, siue Lingue ceruinæ officinarum. Tabern. Phyllitis folijs laciniatis.

C. Bauh. pin. Phyllitis 2. siue Lingua ceruina multifido folio: Phyllitis laciniata Clusii, H. Lugdun. pagina 129. Phyllitis multifida. Gerardo: Phyllitis, Cast. mucronata, Camer. In Sommerfeldt Anglicis cantibus frequentem orti refert Lobelius, in Cantabris verò Clusius, sed raram.

Cæcilii
Synoni

PHYLLITIS CRISPA.



Phyllitidem crispâ nullibi vidim⁹ quàm Basileæ in hortu Io. Heitzmänni, Pharmacopœi, amici nostri veteris ann. 1608. mense Octobri, angustiori folio quàm in vulgari, in circuitu toto valdè crispâ: sapore eodē cū vulgari. Quod dolemus, negleximus tunc virgē tē plāā accuratius delineare.

Locut

Descriptio

HEMIONITIS VETERIBVS.

C A P. X.

Hemionitis seu σπληνίς Græcis, Latins similiter Hemionitis, quasi mulariam dicas & Splenium vocatur, quodd eius folia sicut & Phyllitidis, medicorum splenia, nimirum oblongas plagulas, formâ imitant: quid si potius ab eorum usu, quodd spleni medeantur: siquidem ex aceto pota lienetum absumant, Dioscoride auctore, cui folium emittit simile Dracontuli, curuatur in cornua Lunæ modo sinuatum: radices subiacent multæ, exque tennēs: sed neque caulem, neque semen, neque florem profert: in saxosis nascitur, adstringente sapore prædita: ex aceto, &c. Suspiciatur Dodonæus ex asplenij facultatibus hæc esse translata.

Hemionitis Theophrasto lib. 9. cap. 19. mularum Gazæ vertit, quàm folio Lingue ceruinæ constare, quid Theophrasto & radice numerosâ & tenui esse, asserit. Hemionium autem Theophrasto Asplenium esse, testatur Dodonæus.

Galenus lib. 9. cap. 11. de comp. med. sec. loc. ubi ea pharmaca ab Andromachio conscripta recēdet, quæ epota splenetis opem ferunt, Hemionitidem ab aliquibus ex antiquis Asplenium, ab alijs

Hemionitis
splenia

Diosc.

Hemionitis
splenia

Galenus

Scolopendrium appellatam esse prodidit.

Si Matth. fides haud deroganda, inter Hemionium & Asplenium Plinio nulla inrecedit differentia: qua de re consule caput de Aspleno. Credimus nos jam dudum cum Hermolao & Ruellio. Teuctrium & Hemionitum, vnam tantum Plinio plantam esse deprauatis ejus exemplaribus id insinuantibus li. 17. ca. 5. ubi pro Hermionio, legendum Hermion.

HEMIONITIS.

Descriptio.



Hemionitidis folium elegans moneri nobis dedit Cl. D. Zvingerius amicus noster, Romae delatum, cujus longitudo quatuor vnciarum latitudo diametri ab uno ad alterum appendicem ferè aequalis, figurà quodammodo ad sagittam accedente: ipsum quippe folium in pyramidem fastigiatum, circa ima vtriq; appendicem insignem habet, ut apparet ex icone.

Sinu circa pediculum quales ferè Aristolochiae rotundae, quem folij præteritis quædam in angustū porrecta comitatur. Ipse pediculus an integer nescimus, videtur duarum vnciarum esse, costam insignem per folij mediam longitudinē emittens à qua ab imo statim ad ambitum quaquaversum, ipsæ etiam apophyles diriguntur. Parte aduersâ in ambitum, eminentiæ vermiculatae eminent, quales in Phyllitide cernuntur, sed magis sursum spectantes: facies opposita glabra.

Matth.

Non modò olim Matthioli compertum habebat veram Hemionitidem, quæ è Dioscoridis historia nihil prorsus dissidet. Romæ nasci in quibusdam rudibus ædificiorumque ruinis propè magnam Amphitheatrum: sed ipse quoque eam accepit ab Anguillara, qui Hemionitis plantam, cujus picturam de hoc ille, ad se Patavio misit.

Eam nonnullis rupibus, saxorum interueniis, provenire scribit Lobelius, loco autem antè à Matth. notato minime: folia breviora multò, ad basim latiora & falcata habere, inquit, conspexi, quorum aliqua palmum vix superabant, nonnulla verò sesquipalimum longitudine æquabant.

Synon.

Clus. Hemionitidem veram inscribit, quandam præterea tradens & describens quæ ipsi Hemionitis peregrina nuncupatur. Lobelio verò Hemionitis varietas. H. Lugd. pag. 1217. Hemionitidem Matthioli Hemionitum i. sive vulgarem. C. Bauh. pin. Hemionitum, Anguill. Gesn. hort. Lac. & Lonic. vocant.

Hemionitidem qualem pingit Matthiolus vidimus apud Gesnerum. Folium Romæ delatum bis communicavit D. Jac. Zvingerius, quod expressimus in tabella iconis Matthioli.

LICHEN VETERIBVS.

Lichen [*λῆχην*] qui petris innascitur, & ab aliquibus Bryon [*βρύον*] appellatur, Dioscoridæ muscus est rosædis petris inherens. Is impetigines sanguinis eruptiones sistit, inflammationes lenit, ac impetigini medetur. Inuat & arquatos cum melle illitus: cæterum defluxionibus oris ac linguæ succutrit.

Descriptio.

Sunt qui dicunt Lichen Plinio duplex esse: nos autem contrà existimamus ipsum eandem plantam bis describere, prout inuenit in diuersis autoribus traditam: & quidem postremum ejus genus desumptum esse ex eodem auctore, ex quo Dioscorides habuit.

Plinio as duplex Lichen.

Lichen qui in petris nascitur, esse quidem velut muscum quendam, sed plantarum generis rectè dici posse, vel ipse Galenus 7. simpl. testatur: ita verò nominatum suspicatur, quòd lichenos, id est impetigines cuter.

Galeno planta potius quàm Muscum.

Hermolao in Dioscor. coroll. 665. Plinium imitatur, eo tamen non citato, duas tradens Lichenas. Quæ autem prima sit, non ostendit: an potè per secundam, sive Picatellam Apulorum intelligat Lichenem herbam, quæ Hepatica fontana cognominatur, dubitamus. Si tamen, quod suspicamur, eam intelligit, non bene separat à Lichene Dioscoridis, quem simpliciter muscum dicit.


Hermol. taxatur.

In Lichenis remediis, inquit Cornarius, quem nos impetiginem dicimus, Plinius duo Lichenis herbarum genera prodit: sed Dioscorides posterius solum genus nouit, de quo etiam Galenus verba fecit. Hic Lichen officinis notus est Hepaticæ nomine. Unde & Germani *Zitterkrant* vocant.

LICHEN SIVE HEPATICA fontana.

Aspergino-
sis saxi ad
hæret, folijs
ceui ligulis mul-
tiformibus;
squamarum
incumbentibus,
perplexo textu
constans, laci-
is Lob. lactu-
cinis sinuatis,
Quercûve ter-
renæ aut potius
marinæ simili-
tudine: sunt ea
porò folia pin-
guia, crassave,
superiùs hilarè
virescentia,
inferiùs dilutio-
ra, fibrarum ca-
pillarium infi-

Descriptio.



nitis cincinnis, lanæ similibus (quos saxorum commissuris infigit) subius demissis: verustate tandem pediculos erigit vnciales & sesunciales, renes, glabros, quorum unusquisque florem stellatum herbacei coloris [Lobelio dicuntur candidi] sustinet, qui exprimit paruum galerum suis radiis deorsum nutantibus, qui satis commodè expressus in nostra figura Guariniana. Ex folijs

(quæ

[quæ saporis sunt aliquatenus aromatici & amaricantis ac nonnihil mordicantis] eminent interdum parui veluti *umbilici*, quales exprimentur apud Lobelium.

**An Her-
mol. Li-
chen Fi-
catella A-
pulorum.
Hepatica
Platear.** An Hermolao Lichen & Lechen, Apulis Iecoraria & Ficatella cognominata: de qua antè egimus.

Plateario dicitur Hepatica, quia præcipuè hepati confert: herba in aquis, & præcipuè in lapidosis locis nascens, minuta habens folia, terræ & lapidibus adherentia, quæ quidem quantò maiora habet, tantò melior est.

**Lichen
Brunfels.** Brunfels. tom. 1. rhaps. 34. huius plantæ, iconem vocans eam græcè *λεχη*, lat. Hepaticam, Hepatariam, & Iecorariam: germ. *Leberkraut*: Serapionis *Hazozalsacher*: Hieron. Herbarij Hepaticam primam.

**Lichen
Græcæ.
Leonis.** Lichen Græcis nominata, hæc, quam Medici quidam, nescio, inquit Leonis. de morbo gall. quâ ducti ratione, vel vsu, Hepaticam vocitant, neque enim apud celebrem authorem, vel Græcum, vel Arabem legitur Lichenem herbam, hepati vtilem esse.

Inscribitur à Trago, Iecoraria seu Hepatica fontana *Brunnenleberkraut*, *λεχην πηγαι*, seu aquaticus, dicente: si vires huius herbæ species, fortassis Hepatica appellari poterit: Sin autem veterum scripta consideres, nihil aliud est, quam serpens herba, quæ à Dioscoride *λεχη* appellatur. Matthiolo est Lichen Dioscoridis. Dodonæo Musci species est quam officinæ Hepaticam vocant. Ferdin. Imper. Epatica, Muscus aut Lichen.

**Nomina
diogua-
tum.** Cæterum, quam Græci *λεχη* appellant, quiddam lichenas serpentis morbi genus, imposita sistat & sanet, Latinis item Lichen dicitur: Arab. *Azez alsachez*: Ital. *Lichene*: Offic. *Hepatica*. German. *steinleberkraut*, & *Brunleberkraut*: Hispan. *Hepatica*, & *Figadella*: Gall. *Hepatique*, & *Porcorian*.

**Icones
Lob.** I. ob. in Ic. p. 246. tomo 2. itemque Obs. p. 64. 6. sub hoc titulo, Lichen, Hepatica, tres icones ponit, sed non demonstrat in quibus differant.

Compilerator quoque Tabern. in ic. & hist. easdem tres icones habet, quas Lobelius, nec tamen ipse indicat differentiam. Sed & Compilerator H. Lugd. easdem proponit p. 1084. nec tamen eas distinguit.

**Syn. C.
Taberni.** C. Bauh. pin. Muscus saxatilis 1. siue Lichen petreus latifolius, vel Hepatica fontana: Hepatica, Brunf. Leonis. prima, Tabern. Lichen, Matthioli. Fusch. Anguill. Dod. vi. Cordo in Diosc. Lac Turn. Cast. Lugd. Cæs. & Thallio: Lichen 1. Lob. petrea, Gerardo. Item, Muscus saxatilis 2. siue Lichen petreus stellatus. Lichen. 1. Lob. & Lugd. Hepatica 2. Tab. & Gerardi. Ac demum Muscus saxatilis 3. siue Lichen petreus umbellatus: Lichen tertius, Lob. & Lugd. Hepatica tertia, Tabern. *Casp. Bauh.* apud Matthiolum Lichenis vnam tantum speciem commemorat.

**Locus.
tempus.** Lichenem, Solis æstui inimicum, vmbrosis simulque humidis locis gaudere, ideoque in fontibus profundioribus ac frigidioribus, nec non rorulentis petris duntaxat nasci perhibet Tragus. Dodonæus tamen non solum vmbrosis, humidis, lapidibusque stratis viis, sed & aliis semitis, quò Solis radij rariùs perueniunt, & quas nullus viator frequentat, crebrò reperiri ait: Maio a Iunio mense capitula stellata proferre, & simul alia sæpenumero foliola prioribus addere. Lobelius verò scribit mense Iunio & Iulio proferre.

Tom. III.

Vim habet, authore Galeno, extergendi, simulque moderatè refrigerandi, & iuxta ambas siccandi: & sanè extergendi vim habet de petra, refrigerandi verò ab aquositate. Nam in humidis & roscidis petris nascitur. Quod verò eiusmodi substantiis componitur, inflammationem arcere nihil mirum est. An verò sanguinis eruptiones sistat, velut Dioscorides ait, non habet quod pronuntiet Galenus. Ego non ausim dicere abstersionem Lichenis esse à petris. Qualem enim succum abstergentem sugere potest. Lichen ex petris ita siccis? abstergere tamè non nego considerato sapore. Nec simpliciter frigidam ausim facere, sed malim calidam primo gradu & humidam dicere. Quæ illitu curare, ut volunt Dioscorides & Plinius, cedere vix possumus: fluxionibus tamèn posse vtilem esse facile concesserimus, quamvis Cornarius eam lectionem non probet. Hepatica fontana, inquit Tragus, frigida & humida est: potest vtrinque adhiberi commodè: vino decocta, aut præter decoctionem è vino pota vitis pulmonis iocinorisque medetur, inflammationes sedat, fluxiones capitis cohibet. Ad multas præterea calidas affectiones efficacior est, quam vulgò existimetur, etiam extrinsecus imposita. Tragea ex ea siccata confecta, saccharo, aliisque aromatibus & speciebus admixtis, iisdem succurrit vitis. Lonicæ de viribus eadem tradit. Dodonæo frigida & sicca ac aliquantulum adstringens temperamento est. Aduersus ioci noris inflammationes, calores, febres acutas & tertianas ex bile ortas efficax habetur. Secundum Platearium valet cõtra oppilationem hepatis & splenis ex calida materia. Quare omnibus syrupis contra dictam oppilationem, & hepatis calefactionem indidetur: soluit enim ictericam. Contra calida apostemata superponitur trita in principio: operatur enim percussione materia influentis.

LICHEN ARBOREVS SIVE PVL- monaria arborea.

Pulmonaria Licheni siue Hepaticæ fontanæ similis squamato foliorum incubitu, ineffabili laciniarum variatione, quæ quâ matri suæ hærent, albicant, alterâ verò parte virent, rugosa, lacunis, eminentiisque inæqualia, sapore amaricante, non sine adstrictione.

Hanc sic tradit Tragus: Herba, quæ vulgò Pulmonaria dicitur in muscosis Quercubus & Fagis provenit, nonnunquam etiam in muscosis petris, & vmbrosis syluis, Iecorariæ seu Hepaticæ fontanæ consimilis, sed maior per omnia. Folia habet rugosa, inuicem incumbencia, viridia, lentiora & sicciora prædictæ, eâ quâ arboribus adhærescit parte albida, lanuginosa, similiterque aspera & lenta, instar corij. Et hæc Germanis *lungenkraut* nuncupatur, potestque Lichen silvestris & arboreus, vnde *lungenkraut* vocitari. Tragus in hist. germ. turpiter hallucinatus credidit Plinium hanc ad impetigines commendasse.

Ut veteribus Græcis & Latinis nominata fuerit hæc herba, Fuchsius scire non licuit. Sufpicatus autem fuit Pulmonariæ nomine donatam esse, propter folia veluti pûtis aut punctulis quibusdam notata, atque hoc signo aliquam pulmonis humani formam referentia. Pulmonariam præterea dictam esse coniicit, quòd pulmonum vitis, exulcerationibus potissimum eorundem, præfens remedium sit.

Tabern. icon. & hist. Pulmonaria, *großbaum*.

Tert. 2

flechten, lungenkraut: Eid. ic. & hist. Lichen arboreum, *fein baumflechten*. Imperat. Pulmonaria & Muscus arboreus.

Syn. C. B.

C. Bauh. pin. Muscus arboreus 7. siue pulmonarius: Pulmonaria, Trago. Matth. Fuchf. Dodon. vt Gesn. hort. Lac Lon. & Tabern. Pulmonaria 1. Cast. tertia, Clus. pann. Pulmonaria fungosa, H. Lugd. vulgaris, Thal. Pulmonaria Lichenis quoddam genus, Cæsalp. Hepatica terrestris, Ger. icon. Muscus pulmonarius, siue Pulmonaria officinarum, Lob. Obs. p. 647. Ic. tom. 2. p. 248.

Variet.

Variat laciniis latioribus & angustioribus: & hæc Lichen arboreum, Tab. & Ger. dicitur, arboribusque, præsertim Quercui, Sorbo aucupariæ, & aliis adnascitur: petris quoque, sed hoc candidius est.

An Muscus 1. & 2.
Dod. gall.

Dod. gall. quoque fortassis exprimit iconem Lichenis arborei Tabern. sub Musci sc. titulo, de quo scribit, Primum Musci genus crescit supra arbores, quod propriè dicitur Muscus, qui constat pluribus foliolis albis, laciniatis, & profundè sectis, inter se complicatis, sine radice, flore, & semine. Secundum Musci genus crescit circa arbores, dicitur *Herbe aux poulmons*, i. e. Pulmonaria, Hepaticæ aliquo modo similis. Germ. *lungenkraut*: Belg. *longencruyt*: Angl. *lungwort*: Boh. *Pleník*.

Nomina
lingua-
rum.

Locus.

Annotis rimosisque caudicum Quercus, Fagi, aliarumque corticibus non modò, sed etiam lapidibus, & duris, paucisque germinibus, instar crustæ aut lorice inducuntur coriacea folia: nusquam tamen cauliculorum, aut florum vestigiis conspicuis extantibus, distante Lobelio. In veterum Quercuum, Fagorum, aliarumque siluestrium arborum caudicibus, in opacis ac densis silvis gigni: reperiri & in petris quandoque, vel etiam umbrosis aliis locis, testis est quoque Dodonæus. Tota Æstate inuenitur, inquit, Fuchsius.

Vires &
visus.

Pulmonaria herbâ vulgò ad pulmonis affectiones, asthma, suspiria & tussim vtuntur, confecto ex ea puluere, aut aqua distillata. Pulverem ex ea sic fieri docet Tragus. Accipitur Pulmonaria herbâ sicca, Anisi semen, pulmo vulpis in aere siccat, semen Fœniculi, Glycyrrhiza, radix Enulæ, Zingiber æqualis ponderis, eaque singula seorsim accuratè contunduntur, posteaque cribro purgantur, vt tenuissimus fiat pulvis. Deum accipitur optimum saccharum tanti ponderis, quanti reliqua omnia extiterint, & miscentur omnia simul. Vfus huius pulueris in modum Trageæ manè & vespere. Hoc & asthma soluitur, & obstructione liberantur pulmo & iecur: aspera denique tussis eo iuuatur. Magistri pecorum & veterinarij herbam, seu puluerem sale mixtum, pecori aduersus spirandi difficultatem, & tussim, singulari experimento exhibent. Recentiores quidam frigidam & humidam esse, Fuchsi quidem sententiâ, falsò statuunt: admodum enim adstringit, vt hoc nomine idem cum Quercu, in qua nascitur, habeat temperamentum. Desiccatur itaque & paulò infra media calefacit, in genere eorum quæ tepida sunt. Quia verò desiccandi & adstringendi facultatem obtinet, idèò vulnera recentia glutinat, potissimum autem pulmonis. Ad incipientes quoque ac crescentes phlegmonas utilis: vt & ad vtrumque muliebri profluuium, vlcera & discentiam.

POLYTRICHVM APVLEI MAIVS quibusdam.

CAP. XII.



Polytrichū Apulei quorundam constat radicibus tenuibus, longis: cauliculis duas vncias circiter longi abundant foliolis lungiusculis, postea nudi sunt & ad totidem vncias leues, quorum summitati innascitur capitulum sublongum, hians & nutabundum.

Desc. prim.
mi Polytrichi.

Huius aliud genus est radicibus multò lon-

Secundis

gioribus, cauliculis etiam multò maioribus, tum parte foliosâ, tum nudâ, quæ palmaris: capitula quoque maiora, hiulea, & quibus conuulso leui pulvisculus excidit luteus.

Ad Polytrichum nobile siue primum Tragi, quod secundo loco describimus, & C. Bauhinus in pinace Polytrichum aureum 1. siue medium vocat, refert idem Polytrichum Apulei aureum, vel 1. Lonic. Muscum capillarem Dodonæi, minorem Gerardi, Adiantum *apollaris* medium Thalii, Adiantum aureum minus Tabernæmontani, & Herbulam Gramini similem in parietibus maiorem & minorem Cæsalpini.

Syn. C. B.

Germani *vvidertodt* & *Gulden vvidertodt*, ac *lungfraymenhaar* appellant: Belgæ *gulden vvidertodt*.

Nom.
ling.

Montbelgardi in sylva prope Souchaut inueni: abundat quoque in silva inter Montbelgardum & Arbouans capitulis puluere plenis mensis Iunij fino.

Locus &
Tempus

Polytrichum Apulei minus quorundam.

Quam plantulam, Apulei Polytrichum minus nonnulli appellant, contemnendæ exiguitatis est: ex muscoso capite tanquam stamina capillaria, recta & rigidiuscula se attollunt, semuncialia aut vncialia, tenuissima, colore purpureo aut aureo: quorum vnicuique infidet *apiculus* falcatus, quem auicularum vngui culis minimis haud ineptè comparaueris, quem conuestit confimili figura inducta *vaginula*: quæ vbi cedere incipit, extrema cauda surrecta, galleritæ caput miro naturæ exprimere arbitris: vbi deciderit, capitellum relinquit oblongum, atropurpureum. Linguae vinosi saporis aliquid imprimit.

Descrip-
tio

Dodon. Musci capillaris altera species omninò minor ac humilior. Lobel. Obs. pag. 648. Muscus capillusve aureus minor: Addit in Hist. Belg. tom. 1. pag. 281. minus specioso nitore coloreque viuido, tristioreque aspectu. Tab. & H. Lusa. Adiantum aureum minus, *Kleiner gulden vvidertodt*, Muscus 2. siue laxatilis aut siluestris Trago.

Synon.

C. Bauh.

C. Bauh. pin. Polytrichum aureum tertium siue minus, Capillus veneris Brunfels. Polytrichum Apulei minus Fuchf. Polytrichum aureum minus Dod. gall. & H. Lugd. Polytrichum aureum tertium Lonic. Muscus quidam in parietibus & tegulis Cæsalp. Adiantum ἀπυλλος minus Thal.

Visitur in compluribus complutis ruderibus, asperginosisque limbis parietinorum vetustiorum, Galliae, Germaniae, Belgiae & Angliae.

Polytrichum scoparium.

Locus.

Descript.

Prolixae radices, cubitum plærumque longæ, rigidae, rubentes, angulosæ, tenues, in scopas excutiendo pulueri vestibulisque purgandis plesti solitæ, terræ superficiem versus foliosis squammis vel pilis nitentibus rutilisq; comosæ.

Lob. Obs. p. 645. Muscus scoparius (ita quoque Hist. Belg. p. 181. tom. 2. & Ic. p. 245 tom. 2.) muscidorum & vidorum Belgij & Frisiae Orientalis sectator.

An Polytrichon majus Trago? Lonic. fortè hoc etiam comprehendit sub titulo Polytrichi Apulei. C. Bauh. pin. Polytrichum aureum 1 siue majus. Easdem plantas existimamus apud H. Lugdunensem p. 1313. Muscum terrestrem primum Tragi, & pag. 1317. Muscum scoparium Lobelij.

Compiler Tabern. titulo Musci cresti; *basch-vrachsend. miefz.*, assumpsit iconem non bonam Lobelij & descriptionem separauit à Polytrichio Apulei, quod non oportebat: nec placet radix.

Compiler notatur.

Vires & usus.

Hodie ad philtrea amatoria, veneficia, magicas artes, multaque alia superstitiosa porius, quam ad tuendam vel instaurandam corporis sanitatem in usu esse Polytrichum Apuleianum vulgò dictum perhibuit olim Tragus. Si tamen quid de eo dicendum sit, videtur facultatibus Capilli Veneris præditum. Ego autem planè mihi persuadeo ex iis parari scopas vestium Belgicas.

ROS SOLIS.

CAPUT XIII.



Duam generum

Descriptio.

Dvum generum, petita ex foliis differentia, observatur: Ros Solis: alteri folia oblonga, alteri circinata rotunditatis: exeunt autem utriusque septena aut octona folia, pediculo longiusculo nixa, ex rubro purpurascencia, corollæ tenuissimorum staminum, veluti cilio, rubescentiumque circumquaque fimbriata, aspergine rorida guttularum per feruidissimos etiam æstus madida, modicè concava, auriscalpium imitata: *coliculi* inter hæc exsurgunt graciles palmares & altiores, *flosculos* gerentes candidulos: *radices* fibrosæ, tenues.

Tom. III.

Gesnerus Cordo in hist. Rorellæ figuram addidit, ejus sc. quæ rotundior est folio, licet ibi Salsiflora oblongifolia describatur.

Tragus Rorē Solis pingit in tabella Politrichi Apuleiani tertio loco, cum cōfundens cum primo siue nobili, quod nos Polytrichum majus quorundam inscribimus. *Idem* ejusdem figuram exhibet cap. de Musco, primo loco. Videtur autem præsentem plantam non agnouisse Lonic. pro Polytrichio Apulei; cui flosculos paruos albos adscribit, Rorem Solis exprimit.

Tragus notatur.

Lob. in Adu. & Obs. p. 472. itēque Icon. p. 81. (vbi speciem alteram majorem jungit) Roridā siue Solis rorem & Drosion recentiorum inscribit, sed aliam à Drosio Alchimilla statuit.

Tab. ic. & hist. pingit Rorellam minorem primam & secundam, magnitudine (vt ait Compiler.) tantum differentes. *Ceterum* non recordatur compiler se Rorellam antea quoque tradidisse, dicendo Lonicerum & Tragus aliud Adianthygenus floribus albis, foliis verò rotundis describere. *Nos nullam* inuenimus apud Tragus mentionem factam Adianthi floribus albis: Lonicerus quidem meminit, vt jam dictum, Polytrichi Apulei floribus albis.

Rorella i. & 1. Tabern. notatur.

C. Bauh. pin. Ros Solis 1. siue folio rotundo: Polytrichum minus, quoad figuram, Tragi: Ros Solis, Dod. Lon. Cast. Camer. (cui & Solaria) major, Gerardi: Rosa Solis vulgò, Caio Britanno: Rorida siue Ros Solis major, Lob. Salsiflora seu Sponsa Solis, Thal. Rorella minor 1. Tab. Rorella siue Ros Solis. Eyft. Mas & femina, inter Musci albicantis & subalbicantis & subrubentis genera crescunt. *Eid.* Ros Solis 2. siue folio oblongo: Rorella siue Salsiflora, Cord. histor. Ros Solis, Lunaria quibusdam & Artemilla Gesner. de lun. Ros Solis alia; Dod. Lugd. minor Ger. Polytrichum Apuleij album, Lonic. Rorida siue Solis ros, Lobel. Rorella minor 2. Tabern.

Synonyma C. Bauh.

Porro, Ros Solis, Rorella & Salsiflora, quæ veluti stellæ alicujus jubare sub Sole fulget, à mirabili natura nomen adepta est: nam quantumvis ardentissimus Solis æstus Æstate eam illustret, ejus tamen folia semper rore & humiditate madent, ebrumque lanugo guttulis aspersa manet: & quod admiratione dignum, humidum illud in foliorum acetabulis contentum, vbi extremis digitis leuiter attingitur, dum adhuc natali suo solo adhærens, aut confestim inde euulsa Solis radios experitur, mox velut in exigua filamenta sericea candidiuscula deducitur, quæ confestim concreta, ita postea semper perdurant. Hanc ob magnam cum capillaribus affinitatem, hic subjungendam duxit Casp. Bauhinus.

Exit locis desertis, arenosis, apricis, sed rigidis, & rarè alibi, quàm in ipso humi nascente candido palustri musco. Æstate viget: Maio aut lunio flores: colligendus Ros Solis cum cœli constitutio siccissima ac serenissima fuerit.

Locus & Tempus.

Mirifica hæc herbula (subdit Lobel.) & efficitate neutriquam posthabenda plærisque plantis apud antiquos decantatissimis, quibus fortè non nota fuit: ac ne quidem hodie admodum Italiae, Norbonæ, Austriae ve plagæ Herbariis. Est quippe vernacula Borealiū. In Franciæ autem & Brabantiae sabulosis ac vdis scrobibus interdum obuia fuit: Angliæ, Cantiae, & Somerseti præfecturæ hæc aded scatent, vt non procul illustri Cœnobio & monte Glossemberio vocatis, quantum sat sit equo oneranda suppetat.

Vires & usus.

PHYLLON THELYGONON

Dalechampio.

CAP. XIV.

Descript.

CRassis longis lignosisque præditū est radicibus, in tot ferè capita diuisis, vt latè natali soli faciem obumbrent: singulis radicum capitibus folia exeunt confertissima, circinatim in orbem digesta, vncià breuiora, perangusta, vnico neruo per longum donata, exsucca, minimè densa, aspera, & pilis circumcirca hirta; ex circuli umbilico caules surgunt, glabri, foliis nudi, duarum triumve vnciarum, simplices, qui à medio ferè summo tenues flores gerunt mascululos, luteos, foliaceo viridi calyculo circumdatos: siliqua succedunt Bursæ pastoris, quam *Ganszblumen* vocat Tragus, paulò acutiores, semine factæ, paruo, compresso, ruffo, intermedia membrana duobus loculis discluso.

Syn. C. B. mot.

C. Bauh. pin. Sedum saxatile 1. siue alpinū hirsutum luteum: Sedum saxatile foliis margine piloso, Gesn. hort. Phyllon thelygonon, Dalech. in Diosc. Phyllon arthenogonon Dalechampi, H. Lugd. Sedum petraeum montanum, Log. Sedum alpinum sextum, Clus. pan. p. 491. Sedum minus 12. siue alpinum 6. Eid. hist. Leucoion luteum aizoides montanum, Colum. part. 1. Sedo autem affinem facere non possumus: nihil enim hujus folia cum illis commune habent, præter situm: nec enim crassa, nec succulenta sunt, sed tenuia, angusta, & in quibusdam plantis vngue multò breuiora, in aliis longiora.

C. Bauh.

Locus.

In summis Austriacarum & Stiriacarum Alpium jugis, inter saxa prouenit, vt etiam in montis Iuræ, summitatib. Meminit quoq; Clusius dum olim è Narbonensi Gallia per Heluetios in patriam rediret in Allobrogum alpinis erueret.

Phyllo Dalechampi aliquatenus similis.

Descript.



Similiū Phyllo Dalechampi est ortu, radice rubentibus, serpentinibus ex intervalis densam radiorum filiorum coronam similiter proferentibus. situ eodem, sed foliis longioribus mollibus, glabris, è quorum centro caulis vnus, aut duo, dodrantales, teretes, glabri, superius in duos ramos sextantales diuisi, quorum

diuarcationi stellula circumposita foliolorum vix quadrantem vnciæ longorum, vnicuique ramulo in summo fastidio florinsidet vnicus, maior quàm Phylli Dalech. è calyculo striato quinquepartito, intra quem succrescit postea vasculum in quinque lacinias dehiscens, semen continens.

Sedum Alpinum 5. siue minus 2. Clus. Pann. C. Bauh. pin. Sedum saxatile 4. siue Sedum alpinum gramineo folio, lacteo flore.

Locus.

Scipens inuenitur in Sueberg. vicinis jugis,

Sub finem Iunij & Iulio istic floret, & etiam in Monte Basileensi *Vassersal*.

TRIDACTYLITES TECTORVM

flore albo.

TRidactylites pusilla est plantula radice tenui: *coliculus* duas vncias aut palmum altus, hirsutus, rubescens, in ramulos subinde diuisus: folia Lob. Rotæ, bifida, interdum trifida incisura, eademque magnitudine quadantenus nobis priora oblonga, simplicia, alia verò sine pediculo cauli apposita, pingua, siue succulenta, pallida, hirsuta, tactu glutinosa, in tria segmenta ceu digitos diuisa, vel quina, flores ex calyculo oblongo hirsuto, albi, quinque foliolis constantes: in medio *staminula* lutea: in calyculo umbilicato quinquepartito *semen*, Lob. in folliculis Scorpioidis Myosotidis non dissimilibus.

Descript.

Hanc Tragus l. c. 11. nomine *hendelkrant* describit: Lobel. Paronychiam alteram folio rutaceo appellat. Tabern. ic. & hist. Alsinem petraeam rubram, & Paronychiam tertiam. Thal. Dactyliobotanum alterum Tragi.

C. Bauh. phyt. Alfine 4. siue Tridactylites albicans: variat ratione loci, quæ enim in testis prouenit, maior est & ramosior, altera verò in arenosis & siccis proueniens minor multò. Flore aliquando est niueo, communiter pallidè purpurascens.

Eid. pin. Sedum foliis laciniatis 6. siue Sedum tridactylites tectorum: Paronychia altera, Dod. rutaceo folio, Lob. Lugd. & Ger. cui & Paronychia laciniata: Umbilici species quibusdam, Cels. Dactyliobotanum alterum Thal. Alfine petraea, rubra, & Paronychia, tertia, Tabern. *Hendelkrant*. Trago.

Syn. C. B.

In parietinis, locisq; vmbrosis & petrosis nascitur. Exiit Hieme, Vere primo flosculos edit: deinde minimo æstu marefcit, vt nusquam toto anno compareat. Montbelgardi in muris floret Aprilis: Monsp. in locis siccis & muris primo Vere.

Locus & Tempus.

Tragi iudicio *hendelkrant* binte plantæ vim habent refrigerantem & humidam, possuntque citra noxam vtrinque aduersus inflammationes vsurpari. Intrinsecus quidem cum cæteris in acetariis, Portulacæ ad modum, cui facultatib. parem statuit: Extrinsecus verò vt Anagallides.

Vires & Vitis.

TRIDACTYLITES ALPINA

Descript.

PAlmaris interdum, & major multò etiam est planta, folia pleraque humi fundens, interdum vnciali longitudine, ac etiam multò minora, per extremum tripartita: alia verò nullam agnoscant diuisionem, vt quæ in *coliculus* sūt, in ramulos pauculos diuarcatis: flores parui, vascula magna: radix vt Agerati



pur-

purpurei propagat. Inter nostras annotationes comperimus, nos anno 1561. in monte Braulio reperisse minimas plantas, floribus odoris gratissimis: & Genevæ postea in proximis alpidibus maiorem speciem invenisse.

Saxifraga alba
Petræa Pa-
na

Hanc etiam describit C. Bauhinus, titulo Alfinæ Tridactylitis Alpina: sic etiam Saxifragiam albam petræam Ponæ nuncupans: quamvis perperam, ut ex utriusque descriptione patet.

MVSCVS VETERIBVS, IN GENERE.

CAP. XVI.

Diosc.

Vires

Musci differentia multiplex. De arboreo hæc Dioscorides: Muscus, à nonnullis Splachnos appellatur. In arboribus, Cedro, Populo alba, aut Quercu reperitur. Præstat verò Cedrinus: proximus huic populneus: quo in genere probatur, qui odorator est & candidus: nigricans autem deterior censetur. *Muscum* adstringendi vim habet, in caliditate & frigiditate medius *μῦσκον* *δριπυρὸν* *καὶ* *ψυχρὸν*. Paris. hæc non habet.] facitque decoctus intellu ad vuluæ affectus. Miscetur & vnguentis [hic interponit vet. &c.] balaninis, ac oleis seu illitibus, propter eam, quæ prædictus est, inspissandi vim. Est & ad suffutium & acoporum medicamentorum preparationem utilis, & accommodatus.

Galenus.

De arboreo intelligendus est quoque Galenus simpl. 6. Bryon, vel secundum quosdam Splachnon, invenitur in Quercubus, & Piceis, & Populis albis. Vim habet adstringentem invalidam. Nec enim multum est frigidum, sed proximè ferè medijs, quæ videlicet & digerendi & emolliendi facultatis sunt, maximè quod in Cedrinis lignis reperitur. Et hic Muscus arboreus ab eodè Galeno lib. 2. cap. 1. sec. loc. etiam Bryon aromaticum appellatur. Ab Ætio verò etiam Hypnon, ac Sphagnos vocatur. Plinio etiam dicitur Sphagnos, præfertur autem Cyrenaicus: secundum locum obtinente Cyprio: tertium Phœnicio.

Hermol.

Præcelsissimum odoris genus est (ait Hermol. in Diosc.) & quod Muscus vulgò nominatur ab Ætio, itemque Paulo, sed & à Phocione Græmico recentiore, moschus odoratus capreæ, seu quod idem est, dorcadis peregrinæ sanies, ex vubilico eius & vomica. Gazellam vocant animal id barbari, &c. Quis autem sit peregrinus mus, odoratâ celebratus pelliculâ, non video, nisi quis animal id intelligat, ex quo zibetum excipitur. Bryon porro hæc Muscus, verbum ex verbo dicitur & Ipnon. Sunt ex hoc nomine panni arentes muscoso villo, quales è glandiferis sola ferè Ægilops fertur: non in cortice modò, verum è ramis dependentes, cubitali magnitudine, sed præstantes odore. Differentia hæc, quod Bryon altatum arborum cani quidam sunt villi: Bryon verò Populi candidæ, vna.

Muscus ex animalibus

Bryon, Alga mola

Appellatur, ait Cornarius, Muscus hodie Latine, qui Græcis *μύσχος* dicitur & pharmacopolarum officinis in vso est, vehementer odorata res, quæ animalis cuiusdam sanguis, aut sanies potius esse à Serapione traditur. Hic autem Galeni tempore ignotus fuit. Ætium tamen ipsum novisse putandum est, qui cum alibi, rum 12. c. 46. in medicamento purgante ex Hermodactylis, Musci si-liquam vnam habet.

Bryon, cuius Strabo meminit, Soletius *αυγύχον* reddit, & interpretem malè Algam vertit. Idem Bryon Theophrasti & Plinii diversum à Bryo Dioscoridis suspicatur: & Bryon Theo-

Tomus III.

phrasti & Plinii esse Lichenem Dioscoridis, Hepaticam officinarum. Sed apparet eum non vidisse Bryon thalassion Theophrasti, quod Plinium cum Phyco confundere credit.

Musci generis thalassion

Cæterum, Muscum vocavit Cæsalpin^{us} omnem villosam substantiam, sordidioris potius similem, quam plantæ, aut candidibus annosis hærentem, præcipuè umbrosis, aut saxis madidis: aut in aquis palustribus, aut mari. Et hinc varia genera Bryi à Græcis vocati, diuersis etiam nominibus donata esse perhibuit. Sed Dioscorides incanos villos qui ex ramis quarundam arborum pendens simpliciter Bryon vocat.

Acquiducæ

Cæterum Musci appellatione donantur sequentes plantæ scilicet. Lichen. Polytrichum. Apulei minus. Spica celtica. Lenticula palustris. Polytr. Scoparium. Lichen arboreus. Ros solis. Corallina. Lactuca marina. Elchasa. Musci propriè dicti.

MVSCVS ARBOREVS VILLOSVS.

Ex arboribus adultis, imprimis verò senio cōfectis, nisi frequenter leaserint putatoris saltum, villi dependent incani, lignosi, tenuib. contexti filis, gustu adstringentē. Trago est muscus quocunque tandem loco natus, potissimum verò incanus & albidus ille, qui vetustis & aridis arboribus & lignis adnascitur, nihil aliud quàm villosum aut capillaceum quid, quāquam aliis in hoc genere magis tenuis, alius crassior, quidam brevior, hic prolixior cernatur, provt arbor, vel lignum, cui inhæret, humidius aut siccus fuerit. Vocat *μύσχος* & Splachnon Græcorum, Vineam officinarum, & Serapionis Axnech.

Descriptio.

Dodonæo arborei musci villosa quædam sunt, ex multis tenuiter ac variè dissectis, subinde veluti folijs inter se implicatis, confusa, quæ arborū adhaerescencia corticibus, à truncis ac ramis dependent, vt plurimum colore candescentia: tamē quandoque & nigra quædam sunt, sed minora & tenuiora. Græci *μύσχος* vocant: Latini Muscus dicitur & *σπλάχνον* *σφέριον*, *καὶ* *ὄπτιον*: Oribasius *δωράδαν* appellat: Arabes & officinæ Viscinè Vineæ: Germanis *Mosch*, *Baummosch*: Belg. *Mosch*: Gall. *du Mosch*: Ital. *Musco*: Hiip. *Musco de los arboles* Aphris, *Axnech*, aut *Vinee*: Italicè, *Mosco*: Boh. & Polonis, *Mosch*.

Dodon.

Nom. linguarum.

Cani arborū villi, quales in Quercu etiam videmus, videntur Lobelio è genere earum plantarum, quas parasitas festinè quis dixerit, propterea quia non nisi alienâ quadiā maxima ex parte vescuntur. Horum omnium varietates villorum exilitate, differentiâ, & figurâ discernit.

C Bauh pin Muscus arboreus i. sine Vineæ officinarū: Muscus arboreus, Trago. Matth. Ang. Dod. H. Lugd. Cast. & Thallio: Muscus, Dod. gall. & Cordo in Diosc. Arborum Lonic. & Tabern. Muscus quernus, Lob. Obs. pag. 643. Icon. part. 2. p. 141. Musci genus priusiam Splachnon vocatum, apud Dioscoridem, apud Plinium Sphagnon, itemque alibi vna Populi albæ, Cæsalp.

Synonyma.

C. Bauhin.

Reperitur potissimum in Quercu, Robore, Populo alba & nigra, Vlmò, Betula, Pyro, Pyralto, Pomo, Pino, Pinastio, Picea, Piceastro, Abiete, Cedro, Larice, ac alijs compluribus arboribus antiquis, absque radice, ac sine folijs, nunc tenuior, nunc crassior, prolixiorque, modò brevior, modò longior, instat tubæ. Verum primæ nobilitatis & odorati sunt, Cedrinus, Lariceus, Piceus, Pineus

Locus

& Abienus: secundum locum tenet Populneus, sed candidus præstat, nigricans improbat, rutilans medium tenet: vilissimus quernus.

Vires

Cæterum, Muscus refrigerandi ac adstringendi nonnullam vim ac potentiam obtinet, quæ tamen pro natura ac facultate eius, cui adnascitur, arboris, ac potissimum eius corticis, vel remittitur, vel intenditur: eius siquidem cui adhæret corticis, veluti parentis sui, aliquam sibi asciscit ac retinet facultatem. Idcirco in Quercu natus Muscus refrigerat, ac valde adstringit: præter propriam, ascitâ etiam ipsius querni corticis vehementer adstringente facultate. Ex Cedro, Pino, Picea, Abiete, Larice, & resiniferis, minus adstringit, & præterea digerendi ac emolliendi facultatis particeps est. Serapio vinum in quo Muscus aliquot diebus maduerit, altum air somnum inducere, ventriculum roborare, vomitiones compescere, & aluum sistere. Plura de viribus lege capite præcedenti.

Muscus arboreus peltatus & scutellarius.

Descriptio.

Solet & in arboribus crescere Musci genus, ceteris crassiusculis rigidis veluti *coliculis*, ramosis, quos cuncti tenues vestiunt, incano colore, in ramorum fastigio sedente peltato orbiculo, cuius oras radij staminei circumcirca coronant.

Synonyma.

Cortusius cum Parauij essemus, vocabat Androsacen alteram. Tabern. dicitur, vi & Gerardo, Muscus ramosus floridus: H. Lugd. Muscus fenniculaceus: C. Bauh. pin. Muscus arboreus 3. siue cum orbiculis: Muscus quernus fruticosus *τροχιδάλλος*, Colūz. Ciottolara Ferd. Imperato. Hunc muscum C. Bauhinus eundem facit cum sequenti. Potissimum in Quercu & Fago variat, umbellis maioribus & minoribus, plantioribus & radijs, multò diametro longioribus ramosis ac hirsutis.

Muscus arboreus ramosus.

Ferd. Imperati *Foglio diramato*, Muscus arboreus, in truncis arborum reperitur cum scutellato iam descripto, cuius natura prope eadem, quod & odoramentis misceatur, effectu pari. Similis est Pergameno dissecto. Principium latius in ramos diuisum, ortus tamen sui latitudinem æqualem segmentis impertit.

Muscus arboreus barbatus.

Barbura seu barbatus Muscus Imperati arboreus, ramos producit similes chordis longis, cum capillamentis longis adhærentibus, colore viridante.

Muscus villosus herbaceus.

Muscus villosus, vt idem Imperatus auctor est, ex filamentis herbaceis constat, è pediculo pollicari & simplici prætensis, absque ramis.

Muscus amarus Absinthii folio.

Muscus amarus Imperato in ramos ab initium vnciarum ab ortu quaquauesu expansos. Nam hoc ei proprium quod ab angusto principio dilatatur in ramos, diuisurâ ferè cornu cerui simili. Sapor eius amarus est. Imperatus

describit hos suos Muscos lib. 27. cap. 12.

Muscus coralloides.

Ambigit inter Muscos & Fungos, in cariosis lignis & situ mucidis viginosis locis nasci solitus, duarum trifimvè vnciarum altitudinis, rectus, fundo natali veluti appressus, non descendens, ramis permultis crebroque diuiscatis, Coralli plantulam imitantibus, substantia Fungi, pallida, aut ex cinereo flauescere, compressa. Hæc est illa Musci varietas, Corallij æmulatione ramosa, Lobelij in Obs. p. 643.

Muscus arboreus Pennachio.

Plumarus Muscus arboreus [Pennachio *Musco arboreo*, inquit Ferd. Imper. lib. 27. cap. 12.] crescit in arboribus & muris impluviatis atque humidis, filis subtilibus similis, breui pilo, colore viridi, ad tactum mollis, serici instar: dum siccatus pediculos quosdam producit cum capitulis.

Fortè hic Muscus Imperati idem est cum Musco sequenti terrestri & hortensi. An C. Bauh. pin. Muscus terrestris repens 2. & 3. Muscus vulgaris pennatus maior & minor?

Muscus terrestris & hortensis.

Omalum vulgarissimus est hic mollicellus asperginæ madentibus saxis, terræque humidiori appressus, repens, mollicellus, ramis longis tenuibus, foliolis acuminatis plumarum costæ hærentibus, colore viridi, aut ex viridi flauescens.

Trago Muscus 3. siue horrensis: Lobel. Obs. pag. 643. Muscus querno vilissimo vilior, saxis & vdis terræ glebis adnascens, quum à natali atque parente suo Muscus naturam imitetur. Eid. in Ic. part. 2. pag. 241. Muscus terrestris vulgaris: vt & Dod. in fol. lat. C. Bauh. pin. Muscus terrestris repens 1. siue vulgarissimus.

Empirici hoc Musco ad sistendum sanguinem vtuntur ab vris admoniti: hi enim quamprimum vulnerati sunt, eo sanguinem sistunt. Vsum Musci huius proinde etiam norunt, qui naues, aquarica ædificia fabricant. Muscus qui hortos & prata humecta obsidet, ita vt gramen supprimat, Martio mense cinere aboletur, sed eo quo luxurium fuerit confectum.

Muscus ex cranio.

Quidam medici & Pharmacopœi reponunt cranium hominis aliquamdiu loco humido, vnde tandem oritur muscus, quem reponunt & ad vsum reseruant. Dicitur particulare experimentum contra fluxum sanguinis, si pulvis eius inspergitur. Pingitur à Tabern. in ic. & hist. muscus ex cranio humano, *Moscz Von todtem kopff*.

MVSCVS FILICINVS.

Tabern. muscum suum Filicinum à Filice, cui similem facit, denominat, germ. *fern mosz*, in ic. & hist. vbi Compilerator non monet an arboream aut terrestrem intelligat. Videtur is nobis depingere terrestris varietatem, in tenues ramos diuisam, coloris viridis, cuiusmodi memini observare iuxta rupe, in

Locus


Locus

Descriptio.

Muscus 3. siue horrensis, Trago Muscus terrestris vulg. Lob. & Dod. Vfus

Muscus filicinus, Tabern.

Varietas
eriplex.



Musci abietis facie.

Descript. **P**redictio non multum absumilis, viticulis in ramos diuisis, folijs capillaceis, vtrinque (vt in Abiete) costae oblongiusculae adnatis, multo quam in priore breuioribus & viridioribus. **Synon.** Authori C. Bauhin. in prod. Muscus tertius: Eid. pin. Muscus terrestris repens 6. siue Abietis facie Muscus.

Musci in Ericetis proueniens.

A pud Lobelium frustra delineationem aliquam huius plantae inquisueris, praeter eius picturam, quae in Icon. Plant. tom. 2. p. 243. sub dicto Musci in Ericetis proueniens titulo exprimitur, & in Belg. hist. ni fallor, beyde Mosch inscribitur.

C. Bauh. pin. Muscus terrestris ramosus 11. siue Muscus parvus stellaris dicitur.

Musci stellaris roseum.

Descript. **E**X fibellis nigris radicem constituentibus, pedicelli vnciales prodeunt, quibus singulis folijs plura instar Rosae compacta, pallide virentia, acuminata, in modum stellae disposita, insident. **Synon.** Muscum hunc octauum in prod. Muscum terrestrum ramosum 12. siue Muscum stellare roseum, author in saxosis Telamontij prouenire scribit. **Locus**

Musci sericeus quidam, forte arboreus.

Descript. **E**X cortice alicuius forte arboris tenui, aspero, huic prodeunt villi breues, sericei, tactu lenes, rufi, nullius saporis. Vnde acceperim, non recorder.


Musci pulcher parvus repens.

Descript. **S**erpit Chamæcissus modo pulchellus hic Muscus, cui ad costam tenuem, fili instar, denticulata foliola, aduersa, valde tenera, lucida, coloris Musci terrestris Tragi. Caeterum, in varios diuargatur ramulos, qui hinc inde tenues radículas emittunt.

Lobel. Icon. tom. 2. pag. 243. Muscus terrestris denticulatus, cui in Obf. pag. 644. Musci varietas Tom. III.

in siluis vmbrosis, non longè à Maszmunster & Roszberg.

In Musco filicino Tabern. & Gerardi, C. Bauhinus, qui in pin. Muscum terrestrum repentem quartum facit, & Muscum filicinum maiorem cognominat, triplicem varietatem obseruari testatur.



aliam, denticellis & samentosis viticellis pinnatis compressis arguta natura solertia elaborata, reptat ut serpiuntque innumeris flexibus implicata. Dodonaeus iconem proponit sine descriptione, Musci terrestris minoris imitatione.

Tabern. ic. *Compl. notant* Muscus tertius: Eid. histor. Muscus 2. Vbi notandum Compilatore male iconem hanc

pro Beerlapp. & Musco terrestris Tragi hoc loco exhibuisse. Habet enim iconem illam pro Lycopodio.

C. Bauhin. pin. Muscus terrestris repens 7. siue *Synon.* Muscus denticulatus maior: Muscus denticulatus Lobelij, Hist. Lugd. Muscus minor denticulatus, Ger Muscus tertius, Tabern.

Musci terrestris Lusitanicus.

Tenerrima herbula est hic Muscus, dodonaeis talibus sut pedibus interdum repens viticulis, filo tenuioribus, numerosis, vtrinque adnatis ramulis in obliquum expansis, & subinde capillaribus quibusdam, quas produunt, fibris, terre inhaerentibus. Omnes autem viticulae rectae sunt frequentissimis foliolis, siue squamulis porius tenuissimis & tenerrimis, pulcherrima serie digestis, dilutiorique & quodammodo pallescente viriditate praeditis tactu quidem mollibus, sed veluti siccis, adstringente gustu. cui tamen grata quaedam dulcedo admixta sit; inquit Clusius, qui Muscum terrestrem Lusitanicum inscribit.

Lob. in Icon. tom. 2. pag. 244. dicitur Muscus terrestris denticulatus alter, vt in Obf. p. 644. vbi praeterea Muscum terrestrem repentem Lusitanicum Clusij vocauit. *Musc. ter. denticulatus alter, Lob.*

Sola iconem proponit Dodonaeus Muscum terrestrem minorem alterum. Tabern. ic. Muscus 2. Eid. hist. Muscus I. Ineptè admodum Compilator Musci terrestris Lusitanici effigiem hoc loco ponit pro Beerlapp Tragi. Nam vera icon ab eo Lycopodio pingitur.

C. Bauhin. pin. Muscus terrestris repens 8. siue Muscus denticulatus minor: Musc. terr. repens, Clus. hisp. Muscus terrestris denticulatus alter Lobelij, Histor. Lugd. Muscus denticulatus, Ger. Muscus 2. Tab.

Nusquam hoc Musci genus Clusio conspectum, quam in vmbrosis aggeribus. Obinetorum, ad Colibriam Lusitaniae urbem, & Academiam totius regni celeberrimam, vulgò Conimbram dictam, trans flumen Mondego, Latinis Munda nuncupatam, non procul à deserto quodam facillo in colle sito.

MUSCVS TERRESTRIS REPENS
à Trago pictus.

D. d. d.
No.

Longè latèque per terram serpit, subindèque
transversis ramis demissis fibris longis li-
gnois crassiusculis radicatur: ipsi verdè ramis variè
in multos sarculos diducatur, funiculi instar



habentes cras-
siusculi, filis a-
micti, oculari-
que confertissi-
mis. Camphora-
te ferè, nisi la-
tiora essent: a-
dultis plâis suc-
crescunt pedicu-
li aliquot ex ra-
mis extremis
producti, setqui-
palmares, te-
nues, foliis ferè
nudi, singuli in
geminam tere-
tem texturalem
mollicellam im-
bricatam: cla-
vam desinen-
tes.

Tragus author
est Muscum terrestrum, *Beerlap*, caule & semine
carere, nihilque aliud esse, quàm succum & ter-
pentem quendam Muscum, multifariam, tenuis-
simis quasi filis dilatatum, quibus radicis vice v-
tatur, peritque adhærescat, seque serpendo vul-
gari filuetti & saxatili Musco admisceat, per o-
mnia vermi admodum longo[nam interdum no-
uem cubitos longitudine æquare] & hirsuto si-
millium: Mense Iunio iulos non aliter atque Co-
rylum emittere digitum longos & luteos, qui sa-
rina aspersi videantur: atque hunc illius florem
esse, qui & protinus sine fructu decidat: Addit
Germanos variis nominibus hanc plantam do-
nare, *Beerlappen*, *senffelsklavven*, *Seilodor Gursel-
kraut*. *Nounsoyl*, *Nemleych harschar*, & *Gur-
selkraut* illam appellantes, quosdam etiam
vvinkrein: Latine autem Muscum terrestrum
non malè dici arbitratur, quodd formâ sua Co-
rallium imiteretur, licet aliàs cum aliis nonnul-
lis Herbariis Soldanam & Soldanellam appel-
lare solebat, quam Serapio Chalkile & Solabas
vocat.

Lobelius, in Icon. pag. 144. tom. 1. & Obs. pag.
645. inscribit Muscum clauatum, Pedem leoni-
um, quem Cordum perperam Chamæpeuceon
vocare scribit. Non autè reperimus nos vbi Cor-
dus Chamæpeuceon appellârit: scimus quidem a-
pud Cordum hist. lib. 1. cap. 39. iconem Tragi po-
sitam esse titulo Chamæpeuces, sed non Cordi,
vbi ibi expressè annotatum.

Tragus
No. 1. Dod.
24.

Dod. gall. de pingit, sed minùs feliciter quàm
Tragus, deliribique nomine Musci quinti, vo-
cans Græcè *λυσίδιον*, id est, Pedem lupi: Bra-
bant. *vvelfs klavven* & ex quorundam opinione
vvinkrein. *Pied de loup*. Lat. in fol. meliorem ex-
hibet iconem Musci terrestris, sue, Lycopodij
inscriptione, de quo inter alia ait: Reperitur
nonnullis locis major, aliis minor & tenerior.
Officina pleræque perperam Spicam Celticam
nominant: pejus ac cum maximo errore pro Spi-

ca Celtica in medicamentorum compositionibus
substituunt.

Anguill. ep. 13. vocat Bermonasiam & Pulmo-
nariam, quâ communiter pro Spica Celtica vri
solebant. Cæsalp. etiam ex Musci genere est, quæ
pro Spica Celtica vendebatur.

*Pulmonaria & Pul-
monaria, Anguill.*

Marth. in hist. germ. vocat Muscum terrestrum,
Bohemice *Mesch Zemsky* ac *Ruzek*. In comm.
in Dioscor. narrat non deesse ignaros pharmace-
polas, qui pro Nardo Celtica plantam quan-
dam emant arbores scandentem, &c. Quamvis
Matthiolum vnaquam vidisset natali solo proue-
nientem, non dixisset arbores scandere: quod in
post. comm. omisit. Melius in hist. germ. & Epit.
Camerarij scribitur viticulas sæpe ad septem o-
ctoque vinarum longitudinem protendi, com-
pluribus utrinque adnatis ramulis: serperetque
humi.

Cordis in Dioscor. vehementer eos errare di-
cit, qui præsentem plantam, quam ipse *Karzen-
leitterlin* & *Manizengryn* appellat, montan-
nam Nardum esse putant, cum Muscus potius
sit.

Catal. Francos. pag. 21. Chamæpeuce, Muscus
serpentinus, Lycopodium, *Schlangen mose*,
Wolfs klavven.

Tabern. ic. & hist. dicitur Lycopodium. Comp-
latur autem insignem hic ignorantiam suam de-
monstrat: ponit iconem plantæ exhibitæ à Tra-
go pro Musco terrestri, cum tamen antè tradid-
erit Muscum, quem *Beerlap*, *Burtelkraut*, &c.
germanicè vocari, Tragumque eius vim decla-
rare, dixit. Considerent præterea lectores stu-
piditatem hominis: Pagina 489. ponit duas icones
pro *Beerlap*, sub titulo Musci primi & secundi,
quæ ex Lobelij iconibus desumptæ, qui eas non
pro *Beerlap*, sed pro diversis Muscis ponit.

C. Bauh. pin. Muscus terrestris repens 10. sue
Muscus terrestris clauatus, *vvinkrein* Brunf.,
quo vinum pendulum restituit: Muscus terre-
stris Trago, Marth. Lac. Dod. & Cast. Mus-
cus vrsinus, vel Pes vrsinus, Gesn. fræc. Ly-
copodium, Dodon. gall. & Tab. Chamæpeu-
ce, Cordo hist. ic. Gesn. & Turn. *Pulmona-
ria* sine *Pulmonaria*, quæ pro Spica Celtica vri
sunt, Ang. Muscus clauatus & Pes leoninus,
Lob. & Ger. Muscus terrestris 2. & alius terre-
stris, H. Lugd. Musci genus quod pro Spica
vendebatur. Cæsalp. Silaginis species altera,
Thalio.

Synops.

Matthiolo nascitur in silvis, sabulosis & inuijs
locis, inter saxa: gignit Iunio mense iulos. Tra-
gus reperit in silvis ac desertis, cuiusmodi sunt
Hercinia silva, &c. Lobelius muscidorum &
opacorum sobolem statuit nemorum & steriliam
vderum. Iunio mense spicæ vigens: reliquo
tempore inanes & effusæ apparent. Montbel-
gardico in comitatu & in monte Balon etiam ob-
servant.

Loco

Muscus hic vino decoctus ac potus calculos
comminuit & educit, experimento, vbi plerique
apud Tragum testantur, certissimo. Nonnul-
li etiam aquam ex eo distillant eandem affe-
ctionem. Contusus aut in vino decoctus dor-
lorem aut inflammationem sedandi vim obtinet
ideoque podagræ calidæ impositus prodest.
Vino pendulè impositus, intra paucos dies il-
lud restituet. Tabulam autem Musci recipien-
dum erit, quantum vas ipsum, siue magnam
postulare videbitur. His addit Matthiolum, Pul-
vis eius drachma pondere sumptus cum vino
rubro

*Vitis &
Vitis*

rubro cohibet fluxum alui & dysenteriam: in eodem vino coctus, si eo abluatur os, tremulos dentes confirmat. Vbi quis refrigerare & siccare voluerit, tunc hanc herbam vti poterit. Lonicæ eadem adscribit vires, quas Tragus: sed temperamento ait esse calido ac sicco, aliter quàm Matthiolum. Vrinæ monere scribit Dodonæus. Camerarius tenuem subtilem florem rem exsiccatum vtilem facit admodum aduersus calculum.

Muscu terrestris erectum.

Descriptio.

Locus

IN nostra peregrinatione Rhætica obseruimus hanc plantam Musco terrestris repenti ac cedentem, ramis cæcis, floribus, dodrantalibus ferè rectis, in duas ac etiam quatuor partes diuisis, vti digitos excrementibus: foliis longioribus paulò & laxioribus, sursum tendentibus. Inueniebat Gesnerus in Engadina inferiore Rhætorum, mense Iunio, Maio verò inter Bellenzonam & Lugan: in monte Gothardo quoque vidimus.

An Sauina sterilis, siue filia Trago? An Matthiolo in Diosc. est herba illa, quam aliquando vidit assumi pro Sabina, licet nec sapore, nec odore eam referat: quamque sæpius existimauit esse Selagiuem à Plinio lib. 24. cap. 11. commemoratam.

Syn. C.B. C. Bauh. in pin. Sauina sylvestris Tragi, Gesner. hort. & Lonicæ & Brachys sylvestris: Muscus terrestris tertius, H. Lugd. Chamæcyparissus, Turn. Tabern. & Gerardi: Sauina Tragi sylvestris, seu Silaginis Plinianæ prima species, Thallio: Similis herbæ Sabinae Selago appellata, Plinio lib. 24. cap. 11.

**MVSCVS TERRESTRIS, FOLIIIS
rectis reflexis.**

MVscum hunc vnde habuerimus non occurrit: ramulus quidam nobis ab Agerio datus Argentinæ: Eam autem repere satis apparet ex sicca, fibrâque in terram demittere.

Descriptio.

Hanc itaque sic describimus: Ex repentibus ramulis emittit coliculos multos, palmates, sed tenuiores multò, quàm in Musco terrestris Tragi, singulares, in singularem veluti iulum desinentes, vnciam circiter longum, qualis prædicto Musco est, sed minorem & carentem pediculo folijs nudo: folia ad Sabinam quodammodò accedunt, vel potius Iuniperum nisi essent breuiora, similia modò dicto Musco, quæ in eo differre videntur, quòd sursum non tendunt, nec cauli appressa sunt, sed expansa retrorsum, & deorsum reflexa vel repanda.

An C. Bauh. pin. Muscus terrestris ramosus 9. siue Muscus Cupressiformis ramosus?

**MVSCVS TERRESTRIS RAMOSVS
pulcher.**

Descriptio.

MVscum ramosum pulchrū vocamus quendam Musco terrestris repenti affinem, longè tamen ramosiorem, aspectu hilariore, cubitalibus sarmentis, per quæ vix vlla obseruare licet folia: rami etus accedunt vtrunque ad Arborem vitæ, pulchro virore insignes, compressi, & veluti prælum experti, denticellis hinc inde incisi: clauas tandem producit, quemadmodum in Musco

Tomus III.



terrestri ependente priore diximus. Sunt nobis alij cubitales rami, sed tenuiores præcedentibus duobus, qui & ipsi repere videntur ac etiam fibras dimittere, quibus tenax affigitur. Pro hac planta posset substitui icon Sauinæ sylvestris Tragi, nisi postea Muscus ramosior esset.

An C. Bauh. pin. Muscus terrestris ramosus 1. siue Muscus erectus ramosus saturatè viridis: Selago 4. Thallij. Hæc inter folia aliquando granula habet.

ma. C. Bauh.

MVSCVS CORNICVLATVS.

Descriptio.



Quam plâ Tabernamontanus in Ic. & Hist. Musci corniculati nomine pinxit, germanicèque Geborn Mosz appellauit, quòd similis sit multis ramis cornu ceruino, eâ C. Bauhinus in pin. ad Filicem saxatilem quintam, siue suam corniculatam reduxit, & cum Holostio petraeo Tabern. siue Filice saxatili Tragi, no-

stro quidem indicio confundit. An Eid. pin. Muscus terrestris ramosus 11. siue Muscus ceranoides maior & minor?

MVSCVS PYXIDATVS.

Descriptio.

E Corio terreo saxi instrato granulatus fungosæ substantiæ Muscus nascitur, surgentibus hinc inde semuncialibus & vncialibus pyxidulis crassis, cinerei coloris, superiùs in acetabuli formam patulis, pede angustò nixis. Vbi obseruauerimus non recordamur.

C. Bauh. pin. fortè Muscus terrestris ramosus 13. siue Muscus pyxiodes terrestris: Muscus terrestris pyxidatos alabastriculos imitatus, Lobel. belg. Eid. pin. Muscus 14. siue pyxiodes tabulia maioribus & candidioribus constans.

Muscu pyxiodes saxatilis.

TVbullis est longè minoribus, copiosioribus, nec ita candidis, qui petris saxilve latissimis

Vuuu a

innascitur, ea quæ obtegit, quemadmodum in via Telamontium versus, videre est.

Aurosi C. Bauh. prod. Muscus 16. siue pyxioides alter. siue saxatilis; Eid. pin. Muscus terrestris ramosus 14. siue Muscus pyxioides saxatilis.

MVSCVS ALPINVS FLORE INSIGNI,
dilutè rubente.

Descri-
ptio.



Cassiuscu-
las habet
radices, in mul-
ta capita diui-
sas, numerosis
fibrillis dona-
tas: vnde folia
infinita, angu-
sta, vix vnciam
longa, terre in-
cumbentia,
nascuntur, Phyl-
lum Dalecham-
pij magnitudi-
ne emulantia,
sine vlla aspe-
ritate: inter hæc
pediculis, exeunt
vix vnciales,
tenuis, quo-
rum vnicuique
flos insidet v-

nus, magnus, rubellus, ex calyce oblongo striato, Lychnidis florum formâ.

Clus. in pann. vocat hanc suam stirpem p. 324. & 316. Caryophyllum 7. siue pumilionem alpinum: In hist. Caryophyllum nonum, sulphuraturque esse Muscum alpinum Gesneri in epistolis. Testatur autem hunc Caryophyllum, in ludenberg cellissimo Stiriz monte interdum totum nuncium nasci, aliâs reliquis notis cum illo convenientem.

Casp. Balthinus phyt. Gentiana 18. siue Gentianella omnium minima, sterculo pallidè cæruleo, quam muscum aliquem floridum pronuntiaret, nisi summè amaram diceret. Ego tamen tantam amaritudinem obseruare non potui. Eid. pin. Gentiana alpina minor 8. siue Gentianella omnium minima: pro qua H. n. g. l. 31. descripta est.

Caryophyllum Clusii vocat in pin. Lychnidem alpinam 4. siue pumilam folio gramineo: & Muscum alpinum Lychnidis flore: Muscum floridum, Gesn. epist. & Fractio: Ocimoidem muscosum Ponz.

In alpibus Rætici, monte Pilati, & Corthardo prouenit. Caryophyllum Clusii summis Austriacarum & Stiriacarum alpium iugis inuenitur, nudo petrosoque solo. Floret Iunio, semen Augusto plerumque maturitatem adipiscitur. At in hortos translatus etiam sub Aprilis finem floret: nonnunquam etiam secundò sub Septembria initium.

FINIS LIBRI TRIGESIMI SEPTIMI.

HISTORIAE





HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XXXVIII.

AQVIS INNATANTES PLERÆQUE.

ET hæcenus ita se habent terrestribus gaudentes planta. Transeamus ad aquaticas, ut vel frigidis solemus umbris, vel ipsa adeo herbariorum nouitate pauli per resicillentur, omnes unâ quasi sportulâ collectas exponendo.

NYMPHÆA VETERIBVS.

CAP L

Nymphæa
medica-
mentaria
Arist.



VT HOR est Aristoteles libro 2. de plantis Nymphæam medi amentariâ [τὴν φάρμακον τὸ ἰατρικόν] in dulcibus [dixit, γλυκύποτον, ad differentiam τῆς ἀλμυρῆς. Alius fortè verni- set perennibus; Scallig.] locis, in quibus sit, venô

admodum alienetur aqua, cum aër inclusus terrâ fuerit adeprus siccitatem: & aquæ compactus humor: idemque aër manserit intra aquam: entre: extensam autem non esse, propterea quod ejus radices agantur in terræ superficiem.

Theophr.

Theophrastus Aristotelis & discipulus & scho- læ successor, scribit lib. 9. cap. 11. dulcem esse radi- cem Nymphææ: Nasci autem in lacubus & palu- stribus: vocare hanc Βεωτος Madoniam [μαδωνίαν] Gaza Madoniam verrit: aliqui tamen Madon le- gunt,] & fructum comedere: habere solum ma- gnum super aquam: dici sanguinem filtrere, si contritum quis plage imposuerit: vtilem quo- que esse ad dysenterias potam, [Dalechampij sententia Theophrastus Sidæ nomine Nym- phæam delineat]

Genera
duo.

Locus

Nymphææ generat duo Dioscoridi, Plinio; & Galeno. Cæterum, Dioscorides à Nymphis Nym- phæ nomen sibi vendicasse credidit, quoniam loca amet aquosa: Nymphæa, inquit, in palu- dibus, stagnantibusque aquis nascitur. Plurima autem invenitur in Helide, Anygroamne, & in Βεωτιæ Aliatto: folia verò habet Ægyptiæ Fa- bæ similia, ac minora, oblongioraque, plura ab una eadēque radice prodeuntia: quorum alia super aquam quodammodò exstant, alia in ea ipsa demergunt: flos album, Lilio similem, in quo

Tom. III.

medium croceum est. At cum defloruerit, calycu- lus rotundus figura Malo aut Papaueris capiti si- milis idemque niger extuberat, in quo semer. [κατὰ πῶς] nig. ū. latū [πλατύν.] dēsū [vet. pro πλατύν. καὶ πύκν.] tantū πύκν. legit:] atque gustāci lē- tum, glutinosūve recluditur. Caulis est lævis, minimè crassus, niger. Ægyptiæ Fabæ cauli simi- lis: radix nigra, scabra [τραχὺς Otib. παχὺς.] cla- uæ similis, quæ Autumno secatur. Ea sicca cum vino pota, cæliacis ac dysentericis auxiliatur, lie- nēmque consumit. Stomachi quoque ac vesicæ doloribus sedandis ipsa radix imponitur, & al- phos ex aqua emendat: alopecijs etiamnum eni- picè imposita medetur. Eadem contra veneris insomola bibitur, si quidem illa in totum adimit: quin & aliquot diebus continentur epoto, geni- tale ita inficinat, ut arigi minimè possit. Idem porro seminis quoque. poti effectus est. Est & altera Nymphæa, cuius flos [ἡ τὸ ἀνδρ. vet. non habet,] Blephara dicitur, folijs ante dictæ similis, at radice alba simul & aspera; flore luteo, splen- dente, Rosæ simili: radix & semen ad inhibenda seminarum profluvia efficaciter ex vino nigro bibuntur. Nascitur autem in Thessalia, iuxta Pe- nezum amnem. Sunt qui hanc Nymphæa vo- cent,

Vires.

Plinio lib. 15. cap. 7. prior Nymphæa nata tra- ditur Nymphæ zelotypiâ erga Herculem mor- tuâ. Quare Heracleon vocant aliqui, alij Rho- palon à radice clauæ simili. Idcoque eos qui bi- berint eam, duodecim diebus coitu genituræque priuari. Laudatissima in Orchomento & Mara- thonē. Βεωτι Madon vocant, qui & semen e- donēt. Nascitur in aquosis, folijs magnis, in sum- ma aqua, & alijs ex radice prodeuntibus, flore Lilio simili, & cum defloruit, capiti Papaueris. In caule secatur Autumno: Radix nigra in Sole sic- catur, aduersaturque aluinis: Est & alia Nym- phæa.

Plin. Nym-
phæa, &
Nymphæa
dicta.

Vuuu 3

phæa, in Thessalia, amne Peneo, radice alba, capite luteo, Rosæ magnitudine. Hæc ille loco citato. *Idem passim hæc habet.* Alopecias emendat Nymphææ radix, si vnâ cum cicuræ radice trita illinatur. Stomachi virtus sanat Nymphæa Heracليا illita: Aluum sistit semen ejus cum vino potum: Tenebmo verò radix è vino bibitur. Aluum leniter soluit (imò potius retinet. Plinius negligenter hoc prodidit li. 26. cap. 8.) & Nymphæa in vino austero. Radix è vino pota lienem consumit, & vesicæ dolores sedat. Venerem in totum adimit Nymphæa Heracليا, semel pota, in quadraginta dies: Insomnia quoque veneris à jejuno pota & in cibo sumpta. Illita quoque radix genitalibus, inhibet non solum venerem, sed & affluentiam geni uræ: ob id corpus alere vocemque [quoniam habiliores sunt & voce magis canora, qui venere non videntur] dicitur. Nymphæa trita plagis imponitur. Humidis vlceribus, priuatim ipsa, quæ calcamento facta sunt, prodest Nymphæa arida infriata. Apposita Nymphææ Thessalæ radix [quæ florem luteum gignit] vulgæ dolori medetur. In vino nigro pota profluvia inhibet. Heracليا verò illita Nymphæa omnes cutis maculas emendat.

Galenus

Galenus refert Nymphææ tum radicem, tum semen desiccandi vim habere citra morsum. Quare ventris profluvia cohibere scribit, semenque siue per insomnia, siue alio pacto immodicè profluens retinere: iuuare porro etiam dysentericos. Cæterùm, Nymphæam candidam habentem radicem, potentioris esse facultatis, vt muliebri medeatur profluvio. Verùm & hanc, & eam quoque, quæ aram habet radicem, ex vino nigro austerio bibi. Porro nonnullam habere quoque & abstergendi potentiam. Itaque & alphas sanare, & alopecias. Cæterùm, ad alphas macerari aqua: ad alopecias spice liquida. Sed ad hæc aptiorem esse eam, cuius radix nigra est, sicut ad alia, cuius alba.

Radix & semen in usu flor non est humidus,


Nymphææ radicibus & semine vtendum, non autem flore solo: & frigidam & siccam esse illam totam, neque florem esse humidum Aug. Ferretius Castig. præd. med. cap. 6. sequentibus docet. Non probant quidem inquit, quod radicibus & semine Nymphææ in medicina vtimur, absurdum existimantes aliud præter florem ex ea assumere. Sed vide quàm prudenter: Nam Dioscorides, Theophrastus, Galenus, Paulus, radicem & semen vsurpant, nulla floris ad medicinæ vsus factâ mentione: & Auicenna radicis & seminis, æquè meminit ac floris. Taxandi ergo illi potius, qui radicem & semen negligunt, & veteribus præteritum florem tanti faciunt, vt totius plantæ dignitatem in eum transferât. Est etiam in facultatibus controuersia. Auicenna enim & tota ferè Arabum familia Nymphæam frigidam statuit. Galenus verò siccam facit, de frigiditate nihil certi decernens, nisi quod ex viribus satis indicat eam quoque frigidam esse. Quod verò sicca sit apparet ex eo quod plagis imposita sanguinem sistit, Theophrasto: & ventris profluvia cohibet, semen genitale fluens retinet, dysenterias iuuat, & muliebri profluvio medetur, Galeno, Paulo, & Actio. Quas facultates Auicenna etiam agnouit in radicibus, & semine, non autem in flore. *Vnde conciliandi eos occasionem sumpserunt quidam docti, radicem & semen frigida & sicca dicentes, florem verò frigidum & humidum.* Quanquam ex comptorijs medicamentis, quibus admiscetur, facile est iudicare,

hunc non humidum, sed siccum esse. Videntur enim molierculæ aqua illius stillatila, tum solum cæteris permixta ad erugendam cutem, & poliendam faciem, quod citra absterforiam facultatem effici non potest: quæ non humiditatem, sed siccitatem potius arguit, nec mirum florem absterforium videri, cum totâ plantâ ad alphas & alopecias vsi sint veteres. Nec existimandum hos tam cæcos fuisse, qui in re tam facili & sensibus obuia distinctionem illam (si modò vera fuisset) in flore, seminibus, & radice non animaduertissent. *Syrupum ex Nymphææ floribus*, non solum frigiditatis, verùm etiam humiditatis ratione, in conciliando somno, primas à syrupo papauerino obtinere aiunt. Verùm cum solus ac simplex reuocatur in vsum, Syrupus violaceo inferior deprehenditur. Id manifestè probat recentiores floris temperaturam & vsum non bene cognouisse. Cæterùm, solebant pharmacopola parare hunc syrupum secundùm descriptionem cuiusdam Pedemontani, qui multa commiscet, nullo delectu, addens vtriusque Nymphææ flores.

Cardanus flores solum Nymphææ croceæ frigidos & humidos, eoque odoratos esse perhibet & somnum dulcem stragos conciliare.

Nymphæa crocea flores.

N Y M P H Œ A A L B A.



Nymphæa alba, lutescens paulò post describenda, ante floris productionem, similitudo est rotundioribus tamen foliis, Dod. & foliatam & florum pediculis rotundis: radix crassissima cortice tegitur: nigriore, intus candida ac sanguosa vnde plurimum exeunt fibræ, quibus in sanguine hæret: flores autem longissimis aquas

Descriptio.

trajicientibus pediculis hærentes, candoris emaculati, nonnihil odorati, liliaceis floribus similes, multiplici foliorum agmine stipati, verùm extrema folia exteriori parte ex albo virescunt, vt Ornithogali: medium occupant flamina numerosa. Dodon. autem post florem capitulum prodit rotundum, in quo semen nigricans, splendens, Milio majus.

Lorus Egyptia planè eadem est Alpino, quam Itali Nymphæa atque Arabes Nuphar appellant. In toto quidem flumine Nilo, Egyptia loca lambente nulla alia planta est inuenta, quæ notas Lori præ se ferat, quàm hæc Nymphæa, quæ profecto planta similis est, vt de Loro affirmat Dioscorides, Colocasia, seu Faba Egyptia, floremque fert album, Lilio valde similem, quàm clariùs expressit Theophrastus, qui dixit florem habere candidum,

Lorus Egyptia Alpina.

Candidum. Lilijs foliorum angustia proximum, verè enim hic maioris Nymphææ flos est, qui Sole occidente clauditur, atque sub aqua occultatur, atque Oriente suprâ aquam assurgit, & foras exit, aperiturque. Quod non modò in Ægypto, verùm in multis Italiæ locis in hac planta observatur, maximèque in locis omnibus circum Venerias lacunosis vel palustribus.

Non itaque possum non vehementer admirari Theophrastum, Dioscoridemque, atque alios, qui omnes à Nymphæa distinctissimis capitib. Lorù Ægyptiam sciunxerint, quando utraque vnum atque idem planè sit, & mirandæ ad Solem conversiones de Loro celebratæ eadem sint, quæ in communi hac Nymphæa ab omnibus animadvertuntur. Ipsa enim occidènte Sole florem claudit, deinde tota cum folijs sub aqua occultatur, eoque oriente, florem primò extra aquam demittit, aperit, atque paulò post cum omnibus folijs supra ipsam assurgit. Ægyptij caules crudos cum suis capitibus per Ætatis calores mandunt: subdulses enim sunt, atque humidi, admodumque refrigerant & humectant, quos appellant *Razel-nil*.

Plin. nota Miratur & Guilandinus Plinium lib. 13 cap. 17
et. & 18. de Loro Ægyptia scripsisse, qualia, teste Alpino, huic Nymphææ conveniunt, *Nobis quidem*
Alpin. in aridet Alpini sententia: verùm non convenit
notat decriptio radicis, quæ non malè quadrat Colocassie vulgaris, ut facillè dici possit duas plantas in Loto Ægyptia Veterum sententias mox infra prosequemur.

Apuleia- Nymphææ Apuleius falsò Cichorææ folium
psm. adscribit, id monente Eur. Cordo.

Quercus- Brunfels. germ. p. 3. Lonicerus & Dorsthenius
dam con- ignavus Botanicus plures stirpes cum Nymphæa
fuso commiscet, vocando (imitando Apuleium, qui
Varia & Herculaniæ matrem nuncupat) Clauum, vel
namina Digitum veneris, Clauam, vel Radicem Herculis, Algam palustrem: Papaver palustre: german. *Secklum, Keller Wurcz, keulwurcz, vassermaeken, haerwurcz, haerstrang, & herenswurcz*. Apud Tragum eadem nomina latina leguntur: addit tamen, quosdam Heracleon, & Heracleam Rosam vocare germ. *vveisz Secklumen, vasser Gilgen, herwurcz, & herstrang*. Apud Hist. Lugdunensem quæ extant huius Nymphææ effigies, errore quidem Compilatoris: vni hæc est inscriptio p. 1008. Nymphæa maior alba: alteri p. 1009. Nymphæa lutea maior,

Latinis sicuti Græcis *Nymphaia* vocatur: Arab. *Nilofar, Ninofar, & Nilufar, & Nenufar*: offic. *Nenufar*: Gall. *Blanc d'eau, & Lis d'estang*: Hispan. *Escudetes del rio, & Higos del rio*. *Nenufas* vocat Arabes: & græcâ voce corruptâ, propter natales aquas, *Golfano*: Itali nomen à discis mensarijs indiderunt. Belgæ *Plompén vuisse Plomoen*: Angli *water Rose, water lily, vel lilies*: Boh. *lekuo Smluk: Fizi tok*.

Matth. no- Matthioli testatur Fuchsum lib. de comp.
notat. med. alias Græcorum Nymphæas, alias Arabum putare. Habebat is in primis comm. Nymphæam albam iunctam cum lutea: in post. verò commodè propriâ figurâ utramque expressit.

Quercus- Dicitur Nymphæa alba, Brunf. in 4. p. 1. Dod.
notat. Cordo hist. Lob. in Adu. Obs. p. 323 & 324. Icon. p. 595. & tom. 2. pag. 279. Acoftæ, Tab. Thal. & Gerard. Nymphæa flore albo, Anguil. & Clus. pann. & hist. Nymphæa cædida, Trago, Fuchf. Turn. & Cæsalp. *Nenufar album*, Bauh. tom. 1. chap. 3. Nymphæa 1. siue alba maior, C. Bauh. Tom. 111.


phyl. & pin. Nymphæa maior alba, Hist. Lugd. Cast. & Eyst. Habet Eyst. aliam quæ nullatenus primæ sit dissimilis, nisi quod omnia minora habeat. Nymphæa alba minor Est.

Locus Nasctur in paludibus, stagnantibus aquis, amplioribus fossis, & pigro lapsu dilabentibus rivulis, ac subinde fluminibus, Maio & Iunio florens.

Vires Vires Nymphææ utriusque vide antè ex veteribus. Nostra ætas candidæ flores ad capitis ex causa calida affectus commendat. Nymphææ, vel Loto Ægyptiæ, inquit *Alpinus*, utuntur floribus & folijs contusis ad omnes calidas inflammationes, atque etiam succo, præsertimque ad demulcendos dolores, à calida causa obortos, lacte atque oleo rosaceo misto, eodémque itidem modo oleo, quod ex floribus parant, ad calidos dolores, inflammationes, exustiones, ulcera & dolores capitis in febricitantibus, vigilijs, tum exterius folia contusa applicant, tum eius succo cum oleo & aceto frontem & tempora, illinunt. ad conciliandum somnum syrupum ex eo paratum frequentant, atque tum seminum, tum radicis pulverem ægrotis cum eius decocto exhibet. Vitis radicis seminumque secreti loco habetur apud multos. ad gonorrhæam, & in mulieribus ad album profluvium firmandum, & ad dysenteriam. Multi verò ab huius plantæ vfu cauent, eius loco alia sequentes, eo timore ne is coeundi tum desiderium, tum vires minuantur, apud eos etenim omnes compertum est vsum seminum atque radicis homines reddere ad venerem valde frigidos ac tardos. Hinc vsum hunc multos ibi sanctos heremitas sequi aiunt, ut facilius vitam cælibem ducere queant.

NYMPHÆA LVTEA.

Haud temerè herbam aquaticam invenias, Dese-
quæ maiore radice nitatur quàm Nymphæa, **Puget**
quippe quæ humani cruris crassitudinem nonnunquam assequatur. Harum quæ lutea est, radicem habet foris virentem, intus albam, fungosam & porosam, sapore subamaro præditam cum



quadam adstri-
ctione, cui multa
appensa ad-
nata crassitudi-
ne digitali, foris
nigricantia, fi-
brisque multis
capillata: folia
aque innatant,
spithamam aut
sestqui patham
longa latitudi-
ne palmari, for-
mâ solem equi-
nam, propemodum
rotunda, paulò oblongiora
quam candida,
pinguia, l&e
tòque vires
splendentia, su-
periore parte
glabra & laevia,
inferiore verò

fibris aliquot distincta, pediculis digitali crassitudine, cubitos duos aut tres longis aut etiam longioribus, teretibus, [Dod. foliorum florumque pediculis angulosis, quod considerant

randum. Juncodulla fungosa creberrimis rectis ca-
naliculis perita : quibus ad exortum interdum
concurrentibus pluribus pediculis, lanugo candi-
diffina, quæ & folia nondum explicata, hæc inu-
troem æmulantis, exteriore parte obueſit: flores
pediculis conſimilibus inſident, ſapore cum dul-
cedine aliquâ ſtreuè adſtringente, odore Siſym-
bii Cardaminis, quinque folijs craſſiſculis con-
ſtantes, colore luteo præditi, exceptis vnguibus,
qui externa parte viſcunt: intra verò leptum
ſoliorum quinque, duplex eſt corona, prior mi-
nutiſſimorum ſoliorum quæ externis appella-
ta: goſa conſpiciuntur & ſi miſer lutea, quo etiam
colore prædita eſt interior, ſed dilutiore ex com-
plurimis ligulis retroactis & apicibus priorem
coronam contingentibus: medium occupat peri-
carpi rudimentum ex luteo viride, quod dela-
pſis coronis, ſoliſque ſorum totis jam viridanti-
bus, ſaturo virore ſed uidente tingitur papuera-
cei capitis magnitudine, ſed forma vrceum eſſa-
brè exprimens, turgido ventre in anguſtam cer-
uicem deſiciente, quæ ſenſim dilatata margines
vrcei eſſingit, ſtrijs extantibus alperatis, & ori-
ficij loco aliquotque perſuſis: in his ſemen conti-
netur Dodonææ, ſplendens, majus quàm albæ,
Trinceo grano minus.

Compil. Huic Compiler H. Lugdunenſis malè aſcri-
H. Lugd. pſit titulum Nymphææ luteæ minoris, cum ſit
notatur, & majoris figura. Matr. verò in poſt. comm. & hiſt.
Marth. germ. Nymphææ luteæ nouum habet imaginem,
cum in prior portio eſſet picta cum albo.

An Lilia Considerent lectores, an Lilia Herodoti lib. 1.
Herodoti. Reliſ ſimilia in flumine naſcentia, ſint Nymphæa
lutea, iſi ſi forſe minus cognita, & malè deſcri-
pta.

Apollin. Egregia Apellinæ comparatio, qui flores
videtur. cum Croci colore conſert.

Synon. Nymphæa lutea, Trago, Marth. Fuchſ. An-
guill. Turn. Dod. Lon. Lob. in Adv. Obſ. p.
313. & 324. & l. p. 594. Acoſtæ, Caſt. Tab. Ger. &
Eyſtæ Thalio, Geſn. de coll. ſtirp.

C. Bouh. pin. Nymphæa lutea ſiue maior:
Nenuphar luteum, Brunſell. Nymphæa lutea
maior. H. Lugd. & Cluſ. hiſt: Nymphæa altera,
Cordo in Dioſcor. flore extoto luteo, Cæſalp.
Nymphææ citrina, Cordo hiſt. *Item.* Nymphæa
lutea ſiue minor magno flore: Nymphæa lutea
minor, Lugd. Ger. Dod. ed. belg. Nymphæa
ſecunda, Tab. In phyt. Nymphæa ſiue luteo
flore maior: *Item.* Nymphæa 7. ſiue minor ma-
gno flore: Nymphæa lutea minor, H. Lugd. *Nullam*
not particularem Nymphæa luteæ ſpeciem mino-
rem in H. Lugdunenſi agnoſcimus. Icon enim quæ
proponitur hoc titulo, eſt Nymphææ luteæ maio-
ris, ut patet conſideranti iconem Nymphææ luteæ
maioris apud Tragum, Fuchſium, & Dodonæum gal-
licum, quam imitata eſt H. Lugd. licet vel Compila-
tor, vel Typographus pro minore exhibue-
rit.

Nomina Germ. gal *Secklumen*, *Gelb. Secklumen*: Belg.
linguar. *Ghels Plompen*: Gall. *Jaunes d'eau*: Hiſp. *Golfan*
amarillo: Angl. *yellow vvaſen lillie*. Græcis *Nympha*
itipa, cuius ſlos Blephara.

Locus & Naſcitur ubi alba, eodemque tempore flo-
Tempus. ret.

Vires Huius radicem, renum & veſicæ calidis morbis
mederi, & aduerſus gonorrhæam efficacem non
temerè exiſtimarunt Neoterici, vel Dodonæi
opinione;

NYPHÆA MINOR LVTEA

flore ſimbriato.



R *Adaculis* Deferi-
mukis vli-
ginoso cæuo
pua.
atque eſt, capil-
latis, è cau-
nodis prodeū-
tibus: ſeſu
multis, longo
rotundoque
pediculis nix-
is, guſtu amaris,
aque innatan-
tibus, denſis
caulis tereti-
bus, genicula-
tis: ſtrobilus lu-
teus, ſtrob. Cu-
cubitz per-
quam ſimili-
bus, quinque
tantum ſoliolis
conſtantibus,
non, ut in lo-

tea maiore, numeroſo ſtipatu congeſtis, aut mul-
tos apices inuicem gignentibus, per ambitum venu-
tiſſimè ſimbriatis: cauliculis oblongo, lato, &
compreſſo, ſeminibus pleno oblongis, lauis, in am-
bitu pilosis, Atriplicis ſeſe modo, guſtus quoque
amari.

Hanc H. Lugd. Compiler p. 1010. Nymphæā
minorem albam, pro lutea inſcripſit. Luteam an-
te in titulo eſſe legendum, ex deſcriptione col-
ligitur, quod non animaduertit C. Bauhin. cui in
phyt. dicitur Nymphæa lutea 4. ſiue minor al-
tera: In pin. Nymphæa lutea 4. ſiue minor flore
ſimbriato: Nymphæa alia (in phyt. albam dixe-
rat) minor, Lugd.

Aquarum etiam eſt alumna: verū in regionum
maximè Septentrionalium. Et quidem in Sebu-
ſianorum parte, quam vulgè *Breſſiam* vocant,
plurimis stagnis ac viuarijs innatat. Præterea in
Sequanæ ripis ad Mantam oppidum gignitur.

NYPHÆA MINOR LVTEA



E Limoso Deferi-
ſundo, in-
quit Lobelius, pio.
cujus deſcri-
ptionem &
iconem tradi-
mus, traſſie
nymphas inu-
ceis pediculis,
teretium &
quaternum
cubitorum,
craſſiſculis,
Portulacæ ſin-
gulate ſolum
in ſummo ge-
ſtantibus: ſto-
ribus ex vno
quaſi iunceo
exortu Pri-
mule minoris
Chelis

plerisque etiam Nymphæam partem, & Tit
Nymphæ: Fontinalis tamen sine Potamogeto-
nis speciem videtur: eiusdemque cum eo faculta-
tis.

Locus. Juxta arenissimam Thamesis fluentem, in vdis
scrobibus frequens.

Synonyma. Gerar. *Nymphaea alba minor*, the small white water lillie. C. Bauh. phyt. *Nymphaea* 3. line al-



Et hæc aquarū
alumna regio-
num Septen-
trionalium dū-
taxat, præfer-

NYMPHÆA MINOR, SIVE MORSVS
Descriptio **ranæ.**

Dod. goli. hied Morfui ranto denegget nomen
græcum & latinum, tamen nihilominus *Despectus*
fulpreatur. Lat. duas icones exhibet pro Rante
mortui, dicens Belgas *Derpschen-beer* appellare:
Tom. III.



Lobel. in
Adu. magis
Nymphæis,
quàm Pota-
mogetoniæ-
cedere scribit
flosculis in-
termicatibus

In lacustribus, stagnantibus, torpentibusque Locus &
aquis, ubi ranae lubentius stabulantur, vnde no- Tempus.
men: ad arcem Londini regiam & mœnia plu-
rima, Junio, Julio, & Augusto mensibus flo-
rer.

Theophrasto lib. 4. cap. 10. Lotus vocata. Locust
planis parte maximā provenit, cū in rura
inundant ut huic natura *caulis* similis Fabæ [Egy-
ptiæ] & fructus eodē modo, verū minores, gra-
ciliorēque. Nascitur fructus in capite, modo
quo in Fabæ: flos candidus, Liliis foliorum angu-
stia proximus, multus, densus & promiscuus, qui
Sole occidente comprimitur, caputque integre
ad ortum aperitur, & super aquam allurgit: idque
facit dum caput perficiatur, foliisque desiliant: ca-
pitis magnitudo quanta Papaveris maximi, &
percipitur incisuris non alio modo, quā Papa-
ver: nisi quod in his fructus frequentior habet-
ur, qui Milio non abimilis est. In Euphrate ca-
pur, florēque mergi referunt, atque descendere

X x x x

vsque in medias noctes: tantumque abire in altum, vñ ne demissa quidem manu capi possit: diluculo deinde redire, & ad diem magis, Sole oriente iam extra vndas emergere, flotemque patefacere: quo patefacto ampliùs insurgere, vt planè ab aqua ablit altè. Ægyptij capita ipsa acervis putrefaciunt, cumque tegumenta putruerint, in flumine lauando separant fructum, & siccantes, pinfentesque panem faciunt, eoque cibo vtuntur. Corfion vocant Loti radicem hanc. Ea rotunda est, Cotonei mali magnitudine, cortice nigro foris vestita, quali nux Castanea tegitur: intus candida, quæ rosta elixâq; vitellis ouorum similis sapore est, gustu suavis. Estur eadem & cruda, sed gravior decocta, seu aquâ, seu prunâ.

*Dioscor. & Plinius in-
stantur.*

In Loti Ægyptiæ historia Diosc. l. 4. & Plinius lib. 13. cap. 17. & 18. Theophrastum imitati sunt. Plinius tamen cap. 18. addit, non aliunde magis quàm purgamentis Loti radicis sues crassescere. Idem lib. 22. cap. 21. ait eos, qui Loton, arborem tantum putant esse, vel Homero autore, coargui posse. Eum enim inter herbas subnascentes Deorum voluptati, Loton primam celebrasse. Esse & Lotometram, ex Loto lata factam, ex cuius semine, simili Milio, panes in Ægypto fiant à pastoribus, maxime aquâ, vel lacte lubactis, &c. Ceterum, videtur hic Plinius Lotum Ægyptiam cum Loto latina confindere, eumque secutus fortè & Galenus 7. simpl. Ægyptiæ Loti cum Nymphaea conuenientia supra ex Alpino demonstrata, & quomodo vnum & idem sint ex eiusmet verbis probatum est.

*Estus Ho-
mari, An-
guill.*

Anguillara epist. 9. Homerum per Lotum intellexisse Ægyptiam existimat, de qua Theophrastus: sed quæ planta sit non indicat. Aliqui dicunt in ripa Nili solum Fabam Ægyptiam reperiri: eius autem radicis descriptionem & vsum, suspicionem præbere Lotum Ægyptiam & Fabam Ægyptiam idem esse: & quidem fuisse, qui Lotum, Fabam vocarint: Theophrastum autem de vtraque planta eodem capite, sed fortè de Loto ex auditu verba fecisse. Idem Anguill. epist. 14. de Loto Ægyptia nihil aliud nouit, quàm in Ægypto Colocasiam vocari: deque Loto Theophrastum sibi contradicere: huic enim semen attribuere Fabæ Ægyptiæ semini simile, sed minus & subtilius: postea verò Milio simile adscribere.

DE FABA SIVE CYAMO ÆGYPTIO ex veteribus.

CAP. III.

Theoph.

Faba in paludibus, stagnisque exit, inquit Theophrastus. *Caulis* eius, qui longissimus, quaterna cubita perficit: crassitudo digitalis est, similis calamo molli, non geniculato, rimas intrinsecus habet tendentes per totum Lilij modo: caput super hunc fauo orbiculato [*σφακίον*] vesparum non absimile: inque singulis cellis [*ἐν ἑκάστῃ τῇ κυττάρῳ*] singulæ Fabæ continentur paululò super id eminentes, multitudine plurimum ter denæ: *flos* duplex, Papaueris magnitudine: color roseus in plenum caput Papaueris super aquam, folia ad singulas fabas amplexa exeunt magnitudine galeri Thessalici, quæ caulem habent Fabarum. Fabam quamque conterenti amarum illud, ex quo pilula fit, inflexum patefcit. Fructus ita se habet. *Radix* crassissima, Harundine plenior, rimas similiter, atque caulis,

habens: manditur & cruda, & elixa, & assa, eoque cibo qui incolunt paludes vtuntur. Nascitur itaque spontè vel plurima: ceterum, & scirritur in limo, paleis largè admistis, vt descendat, incortuptrâque maneat, sicque fabeta faciunt. Sin autem semel apprehenderit perpetuò manet: radix enim valida est, nec inferior Arundinis radice, verùm spinis subhorrens: quamobrem crocodilus eam fugit, ne occutrens oculos offendat, quoniam acutè non videt. Nascitur hæc etiam in Syria, Ciliciaque, sed tractus ipsi non plenè conficiunt. Et circa Toronem agri Chalcidici quodam in lacu exit, magnitudine mediocri, vbi & percoquit, & perficit, & absoluit fructum. Et *has ex autoritate Theophrasti*. Apud quem *Gaza* ἐν ἑκάστῃ τῇ κυττάρῳ, vertit in singulis cellis, & rectè. Sunt enim *κύτταροι* τῶν σφακίων καὶ τῶν κρεῖνων καὶ ὁ ἄλλος, fauorum vesparum foramina, & fauorum cavitates. Gazam sequutus est *Hermolam*, & loquum hunc sic reddidit. Calyx in cacumine rotundus, vesparum fauo similis, triginta plurimum loculis, qui singulas singuli continent, non quidem omninò rectas, sed paulò extantes. Atque ad horum etiam imitationem reliqui Diosc. interpretes id quod ille dixit *σφακίον* ὡς αὐτῶν τῶν σφακίων ὁμοίαν, ὡς πορρόν: ita conuerterunt, Vbi defloruit, fert folliculos siue vtriculos vesparum fauis similes: quum tamen nulla *σφακίον* mentio fiat, sed dicat tantum folliculos capsulis similes proferre, in quibus sit faba parum supra operculum velut bulla eminens. Hoc autem operculum *πύμα* ab ipso dictum esse videtur à *πύμα* à Theophrasto appellata, & quam caput & calicem illi conuerterunt. Atque hoc modo etià Cornario videntur idem dicere Theophrastus & Diosc. in diuersa aded & meritò nobis moram iniiciente dictione.

Porro, Faba Ægyptia, quam nonnulli Ponticâ *Diosc. Faba Pontica* [*Αἰγυπτιος κύματος, ὅτι ἐν τῇ ποταμῷ*. Vet. codex hoc caput non habet, Sarac.] vocant, Diosc. etià teste, in Ægypto quidem magnâ copiâ prouenit, sed & in Asia quoque & Cilicia palustribus locis inuenitur. *Folium* verò habet amplum instar Petasii (*ὡς πτερόν*, vet. *πτερόν*, inquit Sarac. nimis vel temerè, vel obliuiose Dixerat enim antea vet. codicem hoc caput non habere,) seu galeri: *caulem* cubitalem, digiti crassitudine: *florem* roseum, dupla papauerini floris amplitudine. At vbi defloruit, vtriculos gerit folliculis similes, in quibus faba paululùm supra operculum instar bullæ prominere Ciborium aut Cibotium ided nominatur quasi loculamentum, quod seratur eiusmodi faba, ipsa humenti glebæ indita, atque ita in aquam demissa. *Radix* autem subiacet Harundinis radice crassior: quæ cocta, crudâque estur, & Colocasiam nominatur. Faba quoque ipsa virens comeditur: sed exsiccata nigrescit, & Fabam græcam magnitudine superat. Vm porro habet adstringendi, stomachumque iuuat. Quamobrem dyentericis, celiacisque conuenit inaspera earum farina polentæ vice: sed & in pultem quoque redacta exhibetur. Efficaciores autem sunt cortices, si decocti in vino mulso tenui cyathorum mensura propinentur. Ceterum ad anrium dolorem facit quod in earum medio viride spectatur, gustu amarum, si cum rosaceo coctum instilletur.

Plinius ex 4. hist. plant. Theophrasti sua transcripsit, & quædam variauit, quædam omisit pro sua voluntate, si non exemplaria fallunt, ita quidem vt Theophrasti verborum sententiam non reddat.

reddat. Licet autem seorsim de Faba Ægyptia, seorsim & de Colocasia egerit, tamē propriē eiusdem plantæ sunt Faba, Ciborium, seu Cibotium appellata, & Colocasia radix.

Quod verò ex Colocasia foliis, in variam vasorum speciem implexis, potare gratissimum habere tradit Ægyptios: id habet etiam Strabo lib. 17. & testatur aded magna esse illa, ut poculorum & catinorum vsum præbeant, aptam insuper ad id habentia concavitatem, ut Alexandrinæ officinæ his plenæ sint, & ut vasis utantur. Appellatur autem hæc folia, Ciboria & Cibotia: Dioscorides tamen ipsas fabas sic appellari ait.

Colocasia potè etiam Colocassium dicitur Virgilio in Pollione: Ecloga 4.

Mixtaque videnti Colocasia fundet Acantho.

Galenus lib. 2. de alim. Ciboria & Colocassium modicum alimentum corpori præbere ait, & talia omnia mali succi esse. Et, alim. Fabam Ægyptiam naturā humidiorē & excrementitiā esse dicit. Quod verò ad vltimū medicum attinet, ipsam præterit. Ita etiam Aëtius viridem quidem Fabarum Ægyptiarum fructum, Cibotium appellari dixit, & de ipso in Fabarum tractatione considerandum esse proponit. Sed hoc postea de Fabis agens, non facit. De Colocasia tamen tractās Manzianion ipsam appellari ait, & similem eius vim rapis & cepis esse, & corpus ipsius viscosum, ut extergendi vim habeat: esse etiā alio cōmodā.

Hæc longius, ut aliquam saltem huius plantæ cognitionem assequeremur, quæ Italiz etiam hodie ignota est, quamvis suo tempore seri captam Plinius dixit. Sunt tamen qui Veneriis satam vidisse, & radicem sapore Castaneæ sub cinere cōctam se comedisse, & in multis recens inuentis insulis, panem ex ipsa fieri affirmant. Sed nec desunt, ut præcedenti capite diximus, qui Fabam Ægyptiam, eandem cum Loto Ægyptia esse suspicentur. Hermolaus nobis author est, Fabam Ægyptiam siue Colocassium ab Herodoto, quemadmodum & Lotum ipsam, Lilium Ægyptiū vocari. An v. sequēs petogrin⁹ fructus valde elegans, sit Faba Ægyptia Dioscoridis, ambigit Clus.

FRUCTVS VALDE ELEGANS, FABA
fortè Ægyptia Dioscoridis.

CAP. IV.

Descriptio.

Sitne fructus alicuius arboris, an alterius plantæ: incertus sum (inquit Clus. Exot. lib. 2. cap. 13.) quia, qui mihi mutuo dabat, Emanuel Syveert, & apud quem simillē cōspiciebā Henricus ab Os, Amstelredamensis, qui eum à navis redemerant, nihil affirmare poterant: mea tamen opinio in eam partem inclinat, ut plantæ alicuius esse existimē, & forsitan in aqua nascentis, ut Nymphææ: quæ si vera sit, Dioscoridis Ægyptiam



Tom. III.

esse Fabam asserere nō verear, tamen si inter Neotericos magna sit de ea planta controuersia: nam Papaueris caput habes, nisi quoddā summā parte magis planum, & patens, cellulas insuper vesparum fanis similes habet, in quibus fabæ, quas supra tricenæ non ferre, Plinius auctor est. Si eos qui legerant conuenire mihi licuisset, magis fortè explorata prodere possem, &c.

TRIBVLVS AQUATICVS.

CAP. V.

Descriptio.



EX vno capite papaueris, & folia multa, fescuncialia, duobus quadrantibus superioribus serrata, supra glabra, subtus rugosa, Populneis quodammodo similia, pediculo palmari, & sesquipedali, fungoso, & paulò infra inferiorem tuberoso, hærentia: flores paruos albos sequuntur mucicati fructus

spinulis armati, nigrescentes, Castaneis pares, pulpâ, nucleoque non dissimiles, candido, eduli, gustu haud ingrato, qui autore Dod. & recens mandi, & arefactus, molâque contritus in panem cogi posse fertur: nos in suo cortice aqua elixum comedimus: radices longissimæ ex intervallo veluti ad genicula staminum, utrinque celsariem prouunt, partim in aqua natantes, partim limo hærentes. Cum flore à nemine pictam esse testatur Gesner. in epist. ad Col. Holst., nec etiam placet nostra ex Fuchsiæ Icon.

Hic autem est Tribulus alter siue aquaticus Dioscoridis, qui in fluminibus nascitur, & comam supra aquas attollit, aculeos verò condit, & ipsis aquis occulit: foliis latis à pediculo longo dependentibus; caule parte summâ quàm imâ crassiore: adsunt & ei adnata quædam capillamenta spicacea: fructus verò durus est, uti & Tribulus terrestris.

Fluuiorum singuli priuatim, inquit Theophrastus 4. do hist. pl. cap. 11. aliquid ferre videntur. Nec enim Tribulus in omnibus, nec ubique erumpit, sed palustribus fluminum tantum altitudine eadem profundissima quinotum cubitorum aut paulò profundiore, ut in Strymone fluuiio. Mersus in aquam, prorsus ad intum vergit: folio amplius ad effigiem vltrei, pediculo admodum longo, caule parte summa quidem crassiori, unde folia, fructusque dependent, qui nigri durique vehementer: nascitur semine decedente, germinemque in Vere suum emittit. Radicem alij annuam, alij diuturniorem affirmant, &c.

Tribulus (inquit Plin.) non nisi in palustribus nascitur, ditares alibi, iuxta Nilum & Strymonē amnes excipitur in cibis, inclinatus in vadum,

XXXX

Diosc. Tribulus alter, siue aquaticus.

Plinius.

folio ad effigiem Vlni, pediculo longo: [Quæ sequuntur [Tribulum terrestrem spectant] de hoc plura de viribus Tribuli terrestris, in Hist. nostr. gener.

Non desunt, qui populares & costius Plinio vocatas Castaneas, esse censeant tuberosos fructus, in stagnantibus aquis enalcentes, quibus rectè non adstipulatur Ruellius.

Nomina
linguarum.

Tribulum aquaticum sine descriptione pingit Matthiolus, vocans græcè *τρίβυλον ὑδατοῦ*: It. *Tribulo aquatico*: Arab. simpliciter *Tribulum Hafach*, seu *Hafak*: Hisp. *Abroyos*, & *Abrolhos*. Galli vocant *Mades*, & *Chastagne d'eau*, teste Bellonio Obs. lib. 1. cap. 18. Dod. tamen *Macres* gallicè nuncupat: Lob. *Eisbarboze*, *Saligotz*, & *Truffes d'eau*: Germ. *Wasserhüß*, *Aquaticæ nucem*, *Wasserhüß*, *See-nuß*. Lacustrem nucem *Tachelnuß*. Gallicum autem vulgus *Saliges*, *Cornuclæ*, *Truffes*, *Trapa*, *Castaneam aquaticam* & *Castaneam Ferrariensem* appellare author est lib. 1. cap. 1. & *Spinus*: Brabant, *Waternoten*: & à similitudine aculeorum ferreorum *Wintchysen*.

Aquaticus, seu lacustris Tribulus, officinis marinus dicitur. Fructus seu nuce eius aculeatæ sunt, tribus robustis aculeis, ubi induratae sunt, quo tempore etiam nucleus durus euadit, ut vix mandi possit, qui tamen recens valde mollis est, & admodum aquosus. Ab huius nucis similitudine dicti sunt tribuli, murices latine appellati, machinæ ferreæ, aculeatæ, in quacunque partem incubuerint, quæ sub terram defodiebantur, Curtio lib. 4. Nunc etiam sparguntur, maxime in fuga, ut hostium insequentium impetum morentur.

Synonyma.

Tribulus aquaticus, Trago, Matth. Dodon. Anguill. Lac. Cordo in Dioscor. Gesn. hort. Lon. Lob. Cæf. Cast. & H. Lugd. ac C. Bauhino: Tribulus lacustris, Cordo hist. Tribulus aquaticus maior, Clus.

Locus.

Nascitur variis in locis, ac ferè stagnantibus fluuiorum partibus, lutosi lacubus, & vrbium fossis, quibus limosus sit fundus: inter Montbelgardum & Basileam obseruauimus, ubi floret mense Iunio. Matthiolus in plerisque Italiæ fluminibus & lacubus prouenire ait, præsertim in agro Mantuano & Ferrariensi: neque solum in dulcibus aquis gigni, sed etiam in mari. Theophrastus autem non dixit in fluminibus nasci, sed fluminum palustribus. Si in mari prouenire obseruauit, cur locum non annotauit?

Vires &
usus.

Dioscorides adstringentis refrigerantisque esse naturæ, ut Tribulum terrestrem, aquaticum statuit, ideoque ad omnes, ad quas terrestrem commendauit, tristes sensationes adhibendum censuit. Idem & Plinius fecit. Additur tamen ab his, Thraces, ad Strymona habitantes foliis Tribuli equos saginare: ipsos verò nucleo viuere, panem facientes prædulcem, qui & ventrem contrahat. Radicem castè purèque lectam, strumas discutere. Semen adalligatum, varicum dolores sedare: tritum verò, & in aquam sparsum, pulices necare. Plura lego antè in hist. n. gen. ubi de Tribulo terrestri Refrigerantis autem Tribuli istum esse naturæ: exque humida & frigida essentia componi, inque ea aqueam magis esse, quàm in terrestri, in qua terreum frigidum potentius, ex autoritate Galeni ait Dodonæus. In vnguento Agrippæ [inquit Saguy. in pharm. Fern.] omisit Tribulos Nic. Alexandrinus. Tribuli autem marini, qui Venetiis veneunt in foro, aqueum quid possident cum calore & acrimonia, propter qualitatem aquæ maris: quæ ad foris adhibita cale-

facta elicit & discutit. Aquaticum vidisse in Burgundia extractum ex stagnis, cuius fructum in aqua coctum comedebant vulgares quasi castaneas: alij sub cineribus calidis decoquebant. Habet autem Nic. Præpositus aquaticos Tribulos non marinos, ut Fernelius. Sed hic melius quàm ille. Siquidem huius vnguenti munus est emollire, attenuare, &c. ventrem etiam illius subducere, ad quam rem marini Tribuli aquatici sunt efficaciores: qui si non sint in promptu, lauandi & macerandi erunt fluuiatiles aqua salta. Obseruatione dignum est quod scribit Plautius ex Fernelio & Cordo, Tribulos recentes esse debere, & parè coquendos, ne vis coctione perdat. Fuit tandem ex Tribulis verticilli precatorij.

POTAMOGETON. CAP. VI.


Potamogeton Dioscoridi folium habet Betæ simile densum [sard. & non ut falsò Cæsalp. legit. Plinium securus, hirsutum] & parum extra aquam eminens. Porro refrigerat & adstringit, proindeque conuenit pruriginibus ac depalcentibus vetustisque vlceribus. Nomen autem ex eo inditum est, quod in paludibus & æquosis locis nascatur. Dicitur tamen aliis inter spuria Stachyites, quasi spicata, nisi malis Stagnitem legere, corrupto à stagno vocabulo. Latinis Fontalis, seu Fontinalis, Ægyptiis Etenchis.

Medetur Potamogeton ex vino dysentericis & celiacis, similis Betæ foliis, minoribus tantum hirsutioribusque, paulatim supereminens extra aquam, peculiariter refrigerat, spissat. Vfus in foliis, cruribus vitiosis vtilis, & contra vlcerum nomas cum melle vel aceto. *Castor* hanc aliter nouerat, tenui folio (Myriophyllum aquaticum Dodon. putat Dalech.) velut equinis fetis, thyrsolongo & læui, in aquosis nascentem. Radice sanabat strumas & duritias. Potamogeton aduersatur & crocodilis, itaque secum habent eam, qui venantur illos. Ita Plinius lib. 16. cap. 8.

Potamogeton Galeno 8. simpl. adstringit & refrigerat similiter Polygono: sed essentia eius crassior, quàm Polygoni est.

Potamogeton officinis ignota est. Nomen autem eius apud Diosc. Limonio tribuitur. Et rursus apud eundem cap. de Trifolio nomen Potamogetonis inuenitur. Herbarum tamen periti eam censent esse, quæ Germani *Samfrant* vocant & *Seeshalben* / quoddam lacus occupet, cuius plures sunt species, de quibus posthac dicemus.

Potamogeton rotundifolij folio.



Potamogetonis folia plataginea, pallido virore splendens, nervis secundum longitudinem decurrentibus striata, haud aliter ac Nymphææ aquis innatant, pediculis longis appensa, ex ramis fungosis, rerebibus: ad exortum pediculi folij, quod plerumque singulare est, membrana digitum longa apponitur,

Potamo.

Æquos.

Delcriptio.

tur, folium id, ac etiam florum caulem inuoluens: flores Persicariae aut Bistortae, purpureascentes, in spicam dispositi, peciolo insident crassitudine cum caulibus pari, quos racematim congesta sequuntur semina, rufescentia, latiuscula, in aduncum mucronem leuiter desinentia, medullam albam continentia, Trago copiosa, dura, & folliculis quibusdam inclusa: radix capillaris, fibrosa.

Esym. & nomina longa. Ποταμογετον, quasi fluminibus vicinam dictam perhibet Fuchsius, quod palustribus & aquosis nascatur. Stachitidem vero quasi Spicatum, ob caulem, quem floribus & semine spicatum ex se mittit. Alij tamen lat. Fontalem & Fontinalem quoque nominant. Germ. Seefal-den & Samtraut: Belgae fonteynerum: Galli Espe d'eaue: It. Potamogeto.

Alga quarta, Trago. Tragus quartam Algarum facit, & verum Ποταμογετον Dioscoridis asserit. Sed & Rob. Constantinus apud Amatum pro genuino Potamogeto hanc pictam exhibuit.

Lob. not. Lobelius in Adu. adscribit Potamogeto Matthioli folia Plantaginis aquaticae aut Betae minorae, aut Persicariae, diuiscula: flores Bistortae aut Persicariae: radicem flexuoso anfractu excurrentem, ex geniculis multas propagantem fibras, trans aquam fundo immerfas: gustu adstringentem, siccantem. Sed haec descriptio Lobelij competit potius sequenti Potamogeto, quam Matthiolino. Existimo Lobelio non fuisse notum Potamogetonem eum, aut utrumque confundere.

Synonyma. Potamogeton t, siue rotundifolium, C. Bauh. pin. Potamogeton, Trago, Matth. Fuch. Anguill. Lac. Lon. Cael. Cast. Lugd. & Tab. Potamogeton, Dod. gall. latifolium, Ger. Potamogeton ποταμολος, Thal. Potamogetoni simili rotundiore folio, Cordo in Diolc.

Locus & Tempus. Nasctur in lacustribus & aquosis locis: floret Iunio & Iulio, quo mense & semen maturat.

Vires. Ex veteribus ante traditae sunt vires: Fuchsius ait refrigerare & exsiccare gustum abunde docere: is tamen non docet qualis sit gustus, quod oportebat.

POTAMOGEITONIS SPECIES VARIAE.

CAP. VII.

POTAMOGEITON SIVE FONTALIS
Persicariae folio.

Descriptio. Manifesto discrimine à Potamogetone primo secernunt folia, Persicariae foliis similia, nisi essent maiora, venis obliquis & transuersis in marginem à nervo, qui vnicus secundum longitudinem decurrit, ex porrectis, alioqui etiam non ita sunt obtusa, sed in acumen desinentia, & pro loci situ nonnunquam hirsuta: aquis plurimum innatantia pediculis scissuralia aut sextantalia, ex caulium geniculis orto: inter quae palmo saepe breuior pediculus exit in spicam congestos sessulos Persicariae gerens, ex albo rubentes.

Potamogeton Dod. Dod. in fol. lat. sub ante dictis Potamogeti nominibus eandem penè descriptionem, quam in fol. gall. habet: verum icon plurimum differt: folia non sunt similia Plantagini, ut olim in hist. gall. scribebat, sed Persicariae: quare suspicor non bene & notam quam in fol. gall. exhibebat. Lobelium autem hunc cum precedente confundere ante diximus.

Synonyma. C. Bauh. pin. Potamogeton t. siue Salicis folio: Phyllidis lacustris, Cordo hist. Potamogeton Toin. HI.

Dod. Potamogeton, siue Fontalis & Spicata, Lob. in Adu. Obs. & Ic. Potamogeton t. Dalechampi, Hist. Lugd. Potamogeton ποταμολος, Thal. Potamogeton angustifolium, Tabern. & Ger.

Reperitur in paludibus, lacubus, vrbium fossis, & aliis stagnantibus aquis, non raro etiam in riuis, aut fluentibus: vbique frequens: flores conspiciuntur Augusto aut Septembri, Dodon. Montbelgardi in stagnis floret Maio.

Locus & Tempus.

FONTINALIS LVCENS MAIOR.

Descriptio.



Fontinalis lucens maior, aquis innatans, in longos ramos deducitur, in varios rursus ramulos subdividendos: folia alternositu non aduerso ex breuib. latis pediculis, longiora quam Potamogetonis, angustioraque, tora lucida, nervo medio percurrente à quo in latus tenues vtrinque fibrae

disseminantur: ad singulorum foliorum minus, appositum longiusculum, aliquotique caulem amplectens. Gesnerus vocabat Vuam aquaticam. Tiguri reperi in forenset mense Maio: Montbelgardi in Dubio flumine.

Locus & Tempus.

FONTALIS MEDIA LVCENS.

Descriptio.

Fontinalem mediam lucentem voco herbulam aquis innatantem, cui ex tenuibus radi-



culis rami multi, imbecilles, pedales, dense geniculati: folia per genicula, bina sibi correspondentia, oblonga, in acumen desinentia, viridia & pellucida: flores ex pediculo vno aliquot parui simul iuncti formae & colore quodammodo Moschatellae Cordi, quibus succedunt semina similiter confecta, parua, contorta, ut

Meliloti vulgaris, cui quodammodo similia.

Clus. hist. vocat Tribuli aquarii minoris speciem alteram.


Tribuli aq. minoris species altera. Clus.

Flora
Tropica

Floris & semen profert Geneux menſe Iunio, in tomulis iuxta Rhodanum verſus caſtellum la Baſſe. Eadem etiam prouenit iuxta Dubin Mompelgardi, quā itur *Clervaux*. Cluſius videbat apud Ebeſtorſarce in lacunis, ſecundū puriſſimæ aquæ riuos decurrentes naſcentem.

FONTINALIS CRISPA.

Deſcriptio.



Fontinalis crispa, ſimilis Fontinali noſtræ mediæ niſi quod maior: folia longiora, quadrantalia ſerè, non ita crebra. crispa, aſpera, in ambitu dentata, ex oppoſito ſita, lucida: flores herbacei, parui, verrucosi, ex pediculis ſextante longioribus: tota planta inſipido guſtu natales ſuos reſert: ſemina

ramorum extremis hærent racematim cohærentia, anguloſa, acuminata, modicè recurua.

Hanc Cluſius in pann. p. 714. & hiſt. Tribulum aquaticum minorem vocat.

Alga ſecunda, Trage

Trago dicitur Alga ſecunda, in fluentibus quidam aquis naſcens, piſcinis tamen & ſtagnantibus familiarior, quæ quibuſdam in locis deuoranda decoquitur. Hanc ſub Fuco ſeu Alga marina Dioſcoridis comprehenſam iudicat, de quæ ea egiſſe Theophrastum lib. 4. cap. 7. vbi inter cætera, aquaticas plantas vulgaſſimas Gramini ſimiles eſſe calams & caulibus aſſerit.

Lobelius in lc. pag. 286. Puſillum fonti-Lapathum inſcribit, vt in Adv. vbi & Lapathium tenellum vocat.

Synonyma.
cætera.

C. Bauh. pin. Potamogeton 6 ſiue foliis criſpis, ſeu Lactuca ranarum: Potamogeton λάβουλας, ſeu criſpum, ſeu ſimbriatum, Thallio. An Alga Hydrolapathi folio, Geſn. coll.

Locus &
Tempus

Floris Iunio in fluuio Alant circa Mompelgardum: aque in variarum vrbium & arcium ſolſis inuenitur, Iunij initio floreſcens.

Potamogeton altera Dodonæi.

Deſcriptio.

Compluribus tenuibus ac teretibus cauleculis cluxuriat, in alas ſubinde diſtributis: folia huic ſunt lata, oblonga, acuminata, multò quàm prioris [Perſicariæ folio] minora: è ſinu ramulorum ac foliorum pediculi ſubinde prodeunt, in quibus ſpica breuis, ſtoſculi proferens candicantes, muſcoſos: ac dein ſemina plana, rotunda veluti Aphaces: radix fibroſa fundo adhæret.

Synonyma.

Dodon in fol. lat. Potamogeton, ſiue Spicata altera. C. Bauh. pin. Potamogeton 4. ſiue foliis latis ſplendentibus. Potamogeton μαλονόβουλας, Thallio, cui maior & minor ſpecies.

Locus.

Tota ſub vndis naſcitur, eminente tantum-



Fontalis minor lucens.

modò cacumine, ſed in aquis haud profundis & dulcibus, quæ tamen maritimo aſtu attoluntur: veluti in ſinu illo, qui à Dordracō Hollandiæ ciuitate, ad Bredam Brabantæ ciniratem patet.



Masimünſter.

Potamogeton racemosum angustifolium.

Radix eſt capillacea, ruſeſcente, cauleculis tenuiſſimis, palmatibus, in aqua ſtillantibus foliis anguſtis, longis, binis ex oppoſito reſpondentibus: aliquibus in ambitu leuiter ſinuatis, aliquibus minimè ſinuatis: petiolo tenui, breuique, ſtoſculi puſilli, vix in morem congeſti, inſident, quibus grana aculeata, ſimul innecta, ſuccedunt.

Deſcriptio

Antori C. Bauh. prod. Potamogeton 1. Eid. Synonyma pin. Potamogeton 7. ſiue ramolum [legendum vt ex deſcriptione patet, racemolum] anguſtiſolium: Tribuli aquatici minimi nomine à D. Franciſco miſſum, ex Luſitania. Idem prope Mompelium, ad molendinum in aqua ſtillans reperitur.

Potamogeton graminum ramolum.

Ex cauleculis pedali, etiam cubitali tenuiſſimo, rotundo, albicante, in plures alas brachiato, folia graminea, oblonga, atro-virentia, non alternata,

alternatim, sed multum ab invicem distita, prodeunt, quæ in alia folia, ferè capillacea, abeunt, nihilominus tamen ex primi folij ala, cauliculus in similia folia abiens, exurgit: in extremo caulis pediculus triuncialis, *flosculos* minutos, & granula subsequètia minuta & subaspera, nõ racemi modo, sed magis & velut in spica, dispersa, sustinet.

Synon. C. Bauh. authori prod. Potamogeton 1. Eid. pin. Potamogeton 8. siue gramineum ramosum: Fontilapathi graminei nomine, à D. Bursero, ex Austria missum, vbi in paludibus fluitat.

Potamogeton minimum capillaceo folio.

Descriptio. Hoc paruum est capillaceo & caule & foliis oblongis, inordinate dispositis, pallidè virentibus: in summo pedicello paruo, modò vno, modò duobus, capitulum minimum & acuminatum, prioris tamen formæ, quod minutissimo *flosculo* pallidulo successit, sustinens, quorum aliud quasi vesiculæ foliæ in acumen desinentis, inclusum est.

Synonyma. Descriptori C. Bauh. dicitur in prod. Potamogeton 3. Eid. pin. Potamogeton 9. siue minimum capillaceo folio. Hoc cum sequenti, Mouspelio D. Bursero attulit.

Locus.

Potamogeton capillaceum, capitulis ad alas trifidis.

Descriptio. Hoc cauliculo est palmari, pilo non crassiore, ramoso, articulado, ad quemlibet articulum: folia bina, oblonga, quouis pilo tenuiora, ex aduerso respondentia: quorum alis, minutissimi *flosculi*, palliduli insident, qui iuncti, nodulum quasi referunt, quo maturato, nodulus siue capitulum, ex tribus portiunculis semicircularibus in apicem abeuntibus & rufescentibus compositum conspicitur: nihilominus tamen ex priorum foliorum alis, pedicellus exurgit, qui in tria, ac etiam plura foliola absumitur, similisque in medio nodulus adponitur, in summitate namque capitulum nullum est.

Synonyma. C. Bauh. prod. Potamogeton 4. Eid. pin. Potamogeton 10. siue capillaceum, capitulis ad alas, trifidis.

FLUVIALIS PISANA, FOLIIS denticulatis. CAP. VII.

Descriptio.



Ramuli molles quaquaversum sparsi, ac variè diuiccati in aquis fluitant. Distincti sunt geniculis foliorum oppositorum, quæ imâ parte latiuscula, extremâ angustissima, utrinque eleganter serrata, vel denticulata, vbi quoque densiore stipatu hærent: ad foliorum cõmissuras, & veluti

Tom. III.

ex sinu eorum, & ex parte vestiti emergunt noduli quidam oblongi M lij semine maiores, ovati, obscurè virentes. Ramulis quoque sicut & foliis conchulæ quædam exiguæ & vel prædictis granis minores hærent, vacuæ, pellucidæ, acuminatæ. Planta hæc sicca nullo sapore manifesto prædita est, odorem autem quandam vliginosum spirat.

Lecta in flumine Pisas tendente Liburnum à Locus. D. Agerio Medico Argentinensi, qui Argentina communicavit.

PERSICARIA MITIS.

CAP. VIII.



Foliorum, quæ habet ista, cum Persicæ arboris foliis similitudo, nomen ei apud Latinos fecit: sicut enim illis similiter oblonga, acuminata, similisque venarum discursu prædita, sed subhirsuta, & interdum liuidâ maculâ notata, vnde maculose cognomen, sapore adstringente acerbo: caules

teretes, rubentes, ramosi, geniculati: flores in racemulis bistortæ æmuli, colore purpurascens, vel albo: semen fuscum, latum, lubricum: radix tenuis, obliqua, lignosa & fractu contumax.

Non clam Fuchium est quàm variè à multis diuinatum sit, quo nomine Persicaria vocata veteribus sit. Sed eius quidem sententiâ omnes decepti sunt, nec ipsi constat nû à veterib. descripta sit. Vulgus herbariorum vno consensu Persicariam nominat. Germ. Persickfraut, / Persingfraut & stöckfraut, h.e. Pulicariam: Belge Versicherunt, Versichecrone & Bloocrunt: Galli Persicaire, & Cultrage: Nomencl. pann. Bolyha fiù, Keleren fiù.

Fuchius porrò Persicariæ maculam non denegat, sed ei saporem admodum adstringentem, aliter ac Dodonæus, adscribit, qui vt plurimum saporem nullum manifestum habere ait, & præterea maculâ differentem facit ab Hydropipere, in quo contra Tragum maculam negat.

Lob. in Obs. Persicariæ plures species assignat, sc. Persicariam floribus albis Anterpiensem, & aliam pusillam repentem. flosculis aliis candidis, aliis purpurantibus: tertiam in agro Neruiensi, multo maiorem, foliis hirsutis, gustu acerbis, floribus albis, aut purpureis: Hanc quosdam Britanniam appositè dicere scribit.

Pulicaria fœmina dicitur Brûfelf. tom. 1. rhaps. 3. Persicaria fœmina, Eid. in 4. pag. 155. & Lon. Persicaria, Fuch. Dodon. Anguill. Cast. Persicaria altera Trag. Matth. Tab. Persicaria maculata, Eur. Cordo, & Ger. Persicaria maculis nigris, Gesh. hort. Persicaria mitis maculo-

Nomina linguarum.

In sapore dissensio Fuchii siue à Dod.

Persicaria plures species Lobel.

Synonyma.

sa Lob. Icon. pag. 315. Persicaria prima, Botanica Plinii, Cat. Cratogeomum, Lacunae. Persicaria Matthioli, H. Lugd. pag. 1041. Persicaria pusilla Lobelii, Eid. quam ait in Antuerpiani agri glareosis sabulosisque vdis quadruplò minorem humi repere, reliquà facie illi similem.

C. Bauh. not.

C. Bauh. phyt. Hydropiper 2, siue Persicaria mitis : Eid. pin. Hydropiper 1. seu Persicaria mitis maculosa, & non maculosa : Lapathum quorundam. Eid. phyt. Hydropiper 3. [4. pin.] siue Persicaria minor : Pulicaria pusilla, Tabern. Cur separat hanc, quæ magnitudine tantum differt.

Locus.

Vires

Reperitur similibus, & sæpe iisdem quibus Hydropiper locis, floretque eodem tempore.

Sapore acris non est, sed subacidum quippiam relipit, quare frigido siccoque est temperamento. Ob id inflammationibus incipientibus & recentibus vulneribus fertur prodesse impolita. Podagricis utilis habetur.

PERSICARIA ACRIS SIVE Hydropiper.

C A P. IX.

Descriptio.



Qui Persicaria nobis descriptam nouerit, idem Hydropiper nouerit : radix persimilis : folia Persicæ, maculosa & non maculosa : flores spicati, albi vel rubri : semen latiusculum, nigricans : Sapor verò nō, ut illi, acerbus & adstringens, sed Piperis instar acris, tum foliis, tum semine.

Dioscoridi

Hydropiper (*ὑδροπiper*, id est, aquaticum Piper, quod à loco & sapore nomen habet) apud aquas maxime stagnantes leniterve fluentes gignitur. Caulem edit geniculatum ac solidum, circa quem alarum sunt concavitates, ac folia Menthæ similia, sed maiora, delatiora, candidioraque, gustu acris Piperis modo, citra tamen ullam odoris gratiam. Fructum verò gerit in surculis parvis prope folia erumpentem, & racematim coherentem, qui & ipse acris est. Ceterum, radicem habet parvam, nullius in medicina usus.

Persicaria
semina tri-
plex varia-
ta, Trago.

A Trago Persicariæ feminæ titulo pingitur proque Primo Persicariæ genere describitur. Tres autem coloris florum ratione species constituit. Ait enim flores esse in quibusdam ex roseo rubicantes, alios colore Breslici præditos, nonnullos candidos. Hanc acrem plantam iure Piperitini vocari posse, ob insignem suam acrimoniam, plus linguam vellicantem, quam vel Piper, vel Aron : Dioscoridem tamen pro Piperis aquatico descripsisse, & Latinos quosdam Persi-

cariam, ob foliorum, quam cum Persca arbore habent, similitudinem, & Herbam S. Mariz vocasse : lac. Manlium, Sanguinem Christi : Aui-cennam lib. 2. cap. 748. Zinziber caninum. Esse autem hæc propria illius nomina, Persicariam, Molybdenam, Maculatam & Plumbaginem, Germanos porro Rassel & Stöckhfrant, id est, Pulicarem herbam, quod pulices abigar, vocare : posse & Muscetrant, id est, Muscarum herbam appellari, quod expellendis muscis, vix quicquid efficacius reperias. Si quidem quæcunque in pecoribus vulnera vel vlcera huius succo oblita fuerint, ea ab iniuria muscarum tuta mancant, etiam feruentissimâ Aestate. Idem Tragus aliud Persicariæ tradit genus, quod à priore distinguit solo sapore, quem huic postremo non adeo acrem attribuit, ut linguam mordicet, sed subacidum qualem Acetosa. Huius autem radicem per terram serpendo se propagantem, hortis & agris frumentariis, magnum ait asserere damnum. Est verò quosdam subdit qui alterum hoc Persicariæ genus, in hortis & agris nascens, Cratogeomum & Theligonon velint. Quæ de re Ruellium l. 1. c. 64. consulendum suadet : ubi is ab Hippocrate Polycriton, & à vulgo Gallorum Curaginem dici restatur. Sed tum Ruellius, tum Tragus satis intricatè tradere videntur historiam Persicariarum, ut patet ex superioribus, & potissimum si quis utriusque capita legat. In Trago porro figura vna superflua est, si plantæ sapore tantum differunt.

Dodon. de frum. vnam eandemque imaginem pro Persicaria & Hydropipere exhibet, aliter quam in fol. lat. Matthioli eorum opinionem haud censet approbandam, qui putant Cratogeomum esse quandam Persicariæ vocatæ speciem, quod Persicaria nullis ferè notis Cratogeomum æmulari videatur : contra quam sentiat Turnerus.

Ceterum, non desunt qui hanc plantam germ. *Spezial* *Paum* *Wasserpeyer* & *Wasserstigel*, h. e. Pauonæ speculum, à maculis, quibus est notata, nominent.

Malè autem à Theod. Dorsthenio Hydropiperi est apposita icon Anagallidis aquaticæ, quam Beccapungam vocant : non placet etiam ab ipso Piper montanum appellari.

Persicaria 2. [1. phyt.] siue viens, & Hydropiper, C. Bauh. pin. Persicaria macula, Brunfels. tom. 1. raph. 3. Persicaria mas, Lon. Persicariæ genus, Trago & Tabern. Hydropiper, Fusch. Ang. Dodon. Matth. Cordo in Diosc. Lac. Cast. Cat. & Gerardo. Hydropiper Matthioli, H. Lugd. pag. 1038. Cratogeomum, Anguill. Persicaria mordax, Thal. & Eur. Cordo, cui & Piperitis, Plinio Siliquastrum dicta. Hydropiperi, & Persicaria hydropiper, Lob. Ic. pag. 315. Eid. in Obs. p. 171. Persicaria viens, Hydropiper & Cratogeomum Cordi : germ. *Wasserpeyer* : gall. *Caltrage* : Angl. *Wasserpeyer* : It. *Pepo aquatica* : Hisp. *Pimenta aquatica*.

Nomina
linguarum

Nascitur locis palustribus, in fossis & serotibus, hybernis mensibus aquas habentibus, & iuxta stagnantes aquas. Iulio verò & Augusto potissimum floret.

Locus &
Tempus.

Facultatem habet euidenter calidam & siccā : non tamen, Dodonæo teste, ut Galenus affirmat, tam calidam quam Piper. Vinum autem habent folia, autore Dioscoride, cum semine impolita cœdemata veteretque duritias discutienti, & sub oculis

Vires &
vires.

oculis fogillata emendandi. Siccata verò & tusa, sali & oblonijs pro pipere admiscuntur.

COTYLEDON AQUATICA.

CAP. X.

Folij pelratis vncialibus rotundis, per marginem obiter incis, inferitur in ipsam umbilicum (vnde in oras radiatim nervi excurrunt) pediculus palmaris, tenellus, è costiculis & ramis, adeoque & ipsis perplexis capillaribus radiculis enatus, indidemque & ramulorum diuaticationibus vnciales pediculi exeunt, glomeratum sustinentes singuli caputulum. Ranunculi aquatici, flosculo præcedente non multum absimili: sapor huic acrisculus Stymbrij.

Lob. in Adu. Obs. p. 209. & Ic. p. 387. aquatica Coryledonacris Septentrionalium, an Calitriche Plinij Cordo in Diosc. Coryledonis, quâ Cimbalion Scitilion, Acerabulum & Umbilicum veneris vocant, nomine, herba à quibusdam indicata, sed plurimum ab Acerabuli descriptione differens. Dod. gall. Coryledon aquatica, *Pennsylvæ* Belgarum: Eid. in fol. lat. Coryledon palustris.

An Turn. Coryledon altera in palustribus nascens:

C. Bauh. phyt. Coryledon 2. siue palustris: Eid. p. 11. Ranunculus palustris 4. siue Ranunculus aquaticus Coryledonis folio, Ranuncul. aquat. umbilicato folio. Col.

Palustribus locis invenitur, & præsertim humidioribus, & quæ frequentius hybernis mensibus rigantur. Iusto mentis apud Belgas cum flore reperiri ait Dodonæus.

RANUNCVLVS AQUATILIS ALBVS.

Tenuitulus.

CAP. XI.



Violæ aquaticæ, de qua post ramos habet, satis crassos, longos, inque minores ramulos subinde diuisos, per quos duorum generum promiscuè folijs contpiciuntur: alia enim capillaris tenuitatis confertissimis cirrhis perplexa, alia verò supra aquam Ranunculi falsi similia, lucida, maculis quibusdam nigris no-

rata, satis crassa, subrotunda, in aliquot partes diuisa, sed non profundè: flores satis frequentes, explicante se capitulo folijs viridantibus obuoluto, apparent candidi. Violæ aquaticæ, vel Ranunculi, apicibus multis in tuberculum ranunculolum congestis, medium occupantibus: foliola octo obseruauimus in planta, ex qua facta nostra pictura.

Dodonæus inscribit Ranunculum aquatilem, Tom. III.

vocaturque etiam Polyanthemum aquatile, ac subdis, pharmacopæorum & herbariorum plectisque Hepatecam aquaticam & Hepaticam albam, perperam appellare.

Ranunculus aquaticus Hepaticæ facie Lobellij in Obs. p. 491. & Ic. tom. 2. p. 35. Ranunculus fluuiatilis, Hepatica fluuiatilis, & Polyanthemum aquatile Tabern. Ab H. Lugd. p. 1021. pingitur huius imago inscriptione Hepaticæ aquaticæ & palustris.

C. Bauh. phyt. Ranunculus 15. siue aquaticus folio integro & capillaceo. Eid. p. 11. Ranunculus palustris 5. siue Ranunc. aquaticus folio rotundo & capillaceo: Polyanthemum palust. aut aquaticum, Dod. gall. Ranunculus terribis, Gesner. hort. Ranuncul. aquatilis, Ger. Ranunculus in aquis nascens folio parum scisso, Cæf. Hepatica palustris, Thal. De hoc ait: In nostro duplicia folia obseruantur, quæ sub aqua multifida, capillacea, quæ extra aquam rotunda & crenata.

In fossis aquas habentibus & lentè decurrentibus riuis: nec non iuxta eorundem ripas, ad alijs locis humentibus gignitur. Aprili, Maio & subinde Iunio mensibus abundè & latè florer. Abunda in fluuij Necari glaciatis, ubi aqua non profunda, inter Heidelbergam & Neckergrundis vi & in alijs etiam aquis fluentibus, vi Mæno, & in Ducatus Burgundia, Seine.

Calida herba est Ranunculotum modo, non ita tamen vrens. Eius autem nullus medicus vsus est, nisi quod ab ignavis quibuldam, magno quidem errore, Hepaticæ albæ loco, medicamentis hepatis refrigerantibus miscetur, teste Dodonæo, & Tabern.

RANUNCVLVS AQUATILIS OMNINO



In hoc nulla differentia ut in Hepatica aquatica: siquidem omnia inter se similia, tenuibus illis duotaxat Hepaticæ folijs proxima, ceteroqui rami flores candidi, capitula acerola conueniunt.

Tragus pro primo Algæ genere describit, Algæque primam facit, vocans germ. generali quidem

vocabulo *Sampkraus*. Iudicat autem & hanc sub Fæco marino Dioscoridis esse comprehensam, de eaque egisse Theophrastum lib. 4. cap. 7. ubi inter ceteras aquaticas plantas vulgarissimas Gramini simile esse calamis & caulibus, asserit.

Dod. gal. huius meminit nomine Polyanthemum omnino tenuifolij, siue latioribus folijs. An Gesn. coll. stirp. Ranunculi aquatici genus alterum minimum folijs minimis multitudine, ut in Corula:

Y y y

Ranunculus Chammæmeli folijs, rara herba & caustica, locus palustribus?

Syn. C. B. C. Bauh. phy. Millefolium 14. sine aquarum n. Ranunculi capitulo. *Erd. pin.* Millefolium aquaticum & sine folijs Abrotani, Ranunculi flore & capitulo: Alga: Tragic: Alga palustris & fluitans. Gese. coll. Millefolium maritimum. 3. flore & semine Ranunculi aquatici Hepaticæ facie, Lobel. Ic. pag. 79. & Gerard: Millefolium aquat. flore albo, Clus. hist. Millefolium retortum, *Ousefachs*, *Wasserflachs* Schv. Fœniculum aquaticum, *Wasserfenchel*, Tabern. Ranunculus tricophyllon aquaticus medio luteus vel, Ranunc. aquat. fœniculaceus *verxopuller*, Colam.


Locus. & Tempus. Prope rivulos habitat: degit & interdum in ipsis: occurrit etiam ad ripas fluminum: florēt Aprilī, Maiō & Iunio mensibus.

Tragus Algam suam natā frigidam ait, ideoque non inod sumendam, sed podagricis & calidis off. etibus foris duntaxat adhibendam. Schwenck. contra hoc solum Millefolium esse causticæ facultatis & e. charoticon concludit. Vter autem vel ut iudicavit, & an ambo eandem plantam intellexerint, non abs re quæritur.

RANUNCULO SIVE POLYANTHEMO

aquaticum albo, sive Millefolium maritimum. fluitans.

C A P. XII.



Longissimis, in aliquot partes divisis, teretibus, leuibus, inanibus flagellis prociuis, aquæ impetum, cuius est alumina piata, imitatur: folijs ad gemculas fœniculi, vel potius Peucedani, multo longioribus, & quam Hepaticæ aquaticæ Dodonæi tenui folio, in pauciores partes divisis: ex iisdem etiam articulis surgunt

pediculi concavi, quibus insident flores Ranunculi, lactei, quinque foliolis striatis constantes, apicibus in medio luteis: quibus succedunt capitula consimiliter Ranunculi, viridantia, echinata.

An H. Lugd. p. 103. Fœniculus aquaticus? Huc C. Bauh. ad Millefolium maritimum palustre alterum Lobelij refert, dicens figuram eius esse imperfectam.

Fluitans abundat in fluviis Mompelgardensibus Alant dicto, & in Dubi: florēt Maio & Iunio.

RANUNCVLVS HEDERACEVS RIVVLO-

rum, sed extendens, atra macula notatus.

C A P. XIII.

Script. St. cauliculis multis, humi iacentibus, & serpentibus, rotundis, radiculis exiles & præte-



nues, & nodulis quibuldā emittentibus. folijs multis, parvulis, Hederæ similibus: [quā mobrem Hederaceus cognominatur.] atra macula notatis, pediculis brevissimis, ad quorum exortum floris conceptus emergit, granulis ruberosus, oblongus: flore luteo, Ranunculis alijs simili. Sapore

acer est feruidus.

H. Lugd. p. 1031. Ranunculus hederaceus Dalechampij. C. Bauh. phy. Ranunculus 34. *Erd. pin.* Ranunc. palustris 3. sive Ranunc. aquaticus hederaceus luteus.

Nascitur in rivulis & fluentis fonticulorum, locis locis sabulosis & macris.

MILLEFOLIUM AQUATICUM, DICTVM

Viola aquatica.

C A P. XIV.

Violam aquaticam vocant aquarum amasiam plantam, cui radices longæ subinde oblique ad se propagant sicut palmares, & quibus orti pediculi trium quatuorve vnciarum, foliolorum pinnarum adnexis segmentis vncialibus, angustis: caulis rectus, inanis, striatus, geniculis aliquot per summa nodosus, ad quorum vnumquodque quini, aut seni verticillatis nascuntur flores pulchri, maiusculi, Leucoijs similes quinque folijs albis, apicibus in medio luteis, constantes, pediculis vncialibus & sescuncialibus hærentes. [Dodonati:] florem calycis vice obvallant foliola oblonga, viridis: ipsique pediculis apposita foliola aliquot longiora acuta radiata. Tota herba, autore Dodonæo, ante caulis proventum, sub aquis conditur, atque tunc ei innatans novella videtur Abies: caulis vero ubi excreverit una cum floribus superficiem superat, ac supra aquas eminet.

Myriophyllum alterum vocat Matth. in Diosc. & Epit. Camer. id non describens, sed Dioscoridi attribuens, quod tamen asserere nolum.

Dodon. in fol. lat. inscribit Violam aquaticam, vocans Belg. *vvater Violieren*, German. *vvasser Viol*: Gall. verò *Gyrossier d'eau*. Testatur idem Matthiolum Myriophylli speciem facere, tamen cum descriptione eius parum convenire dicat. Nec enim caule esse ait singulari, nec radice vnicâ, quale Myriophyllum à Dioscoride describitur.

C. Bauh. phy. Millefolium 11. seu Viola aquaticum latiore folio: *Erd. pin.* Millefolium aquaticum 4. sine Viola aquatica caule nudo: an Potamogeton Castoris apud Pliniū l. 26. c. 5. Schwenck. Millefolium palustre secundum: Myriophyllum alterum, Matth. Lac. & H. Lugd. Myriophyllum, Czf.

Celi Myriophyllum equisetifolium fluviatile, Lob. in Ad. & Ool. p. 460. Stratiotes fluviatilis, Geln. hort. Viola palustris, Gerat. Fœniculum aquaticum 2. Tabern. German. *Uvaferfenshel*.

Locus & Tempus.

Aquarum residuum & rivulorum vadolis inaspirat lobens: Alibi etiam, ut apud Belgas frequens in lacubus occurrat, & aquis stagnantibus, aut pigridis, si sequibus: producit lunio flores.

Vires.

Est frigidam & siccam facultatem habere videtur Dodonzo.

Millefolium aquaticum, dictum Viola aquatica, seu andromeda.

Sunt qui cum priore idem velint, ac illud folio latiore, hoc vero angustiore multo est.

Synonyma.


Interibitur à Lob. in Ool. belg. p. 966. & Icon. Plant. 740. Myriophyllum equisetifolium palustre. Ad. 1. in fol. lat. Viola aquaticis al. era Icon. Ab H. Lugd. Viola palustris.

Cat. Bauh. phyt. Millefolium 13. seu Viola aquatica al. era: Eid. pin. Millefolium aquaticum 5 siue equisetifolium caule nudo.

Millefolium pennatum aquaticum.

Defect. p. 10.

Longis præditum est caulibus & fungosis, internodiis latis crebris interceptis, ad quorum nodos quinque aut plura folia circumposita re-



nerunt, pulcherrimè cristata, & plumas avium imitata: spicam Equiseti capitulo similem habet. C. Bauhin. est in phyt. Millefolium 14. In pin. Millefolium aquaticum 8. siue pennatum spicatum. Trago est Alga tercia, vel Alga Virgilij. An Myriophyllum vel Maratrophyllo palustre, Lobel. hist. An Millefolium aquat. Mathiolo? Millefo. pa-

lustre spicatum. Schv.

Locus & Tempus.

Observavi ego Genex in lacustribus circa nosodochium: postea etiam inter Mompelgardum & pontem Vapiauconr & Dubim, ac prope urbem & præterea juxta Bessfordiam, florentem mense Maio. Alga 3. Tragi nascitur in piscinis & stagnantibus aquis, humo limosa & forti. Indicitur planta terreæ substantiæ & Saturnia planè.

MILLEFOLIVM AQUATICVM minus.

Latè se fundentibus scapâ præditum est, qui lrotundi, virides, frequentibusq; nodis intercepti sunt, & quibus tenues, capillaresque fibræ spargit, quibus telluri inhaeret: superior scaporum pars palmum supra aquas eminet, quam ad singulos nodos quinque tenuium parvisque foliolis

Tom. III.

præditorum foliorum alas ambiunt, vix vnciam longæ, virides admodum quæ sensim circa scaporum summitatem minuantur, sic ut in pyramidalè quasi formam scapi desinant, qui summo fastigiorum idem flosculos, quos foliorum alas in singulis nodis ferunt, pusillos valdè, & æolis candidis foliolis simul junctis, nec sese explicantibus

præditos, qui deinde in quædam tubercula quatuor radios in capite habentia transeunt.

Clas. descriptionis auctori dicitur in pann. p. 711. & histor. Myriophyllum aquaticum minus. C. Bauhin. phyt. Millefolium 11. siue aquaticum minus. Eid. pin. Millefolium aquaticum 3. siue flosculis ad foliorum nodos.

Vulgare admodum est in Pan-

nonia, Austria, vicinarumque provinciarum lacunis, secundum rivulos litis, nec profundis. Flore & semine onustam conspiciebat auctor hanc plantam mense Junio.

MILLEFOLIVM AQUATICVM flore luteo galericulato.

Tenuissimis filamentis totum est contextum, hisque ferè indigestis, appèlis hinc inde crebris emblematis orbicularibus, Lenticulam a-

Defect. p. 10.



quaticam emulantibus: caulis tenuis, dodrantalis, nudus, in ramulos aliquot parte superiore divisus, flores gerit luteos, majusculos, cucullum referentes.

C. Bauhin. Synon. phyt. Millefolium 17. siue aquaticum lenticulatum luteum: Eid. pin. Millefolium aquat. 11. siue lenticulatum: Lenticularia, &

Meon aquaticum, Geln. coll. Millefolium aquat. flore luteo galericulato. Lobel. hist. Belg. p. 967. & Icon. p. 791. Fœniculum aquat. galericulatum, Tabern.

Vocaui autem (inquit C. Bauh.) lenticularum, quia vesiculæ parvæ lenticulares, non tantum ultimæ foliorum parti adherent, sed infinitæ omnibus foliorum partibus subjiciuntur, quod ca-

Yyyy 1

men figura Lobelii, qui solus pinxit, non proponit.

Locus & Tempus. Observauimus Genes in palustribus & in Mithelfelden. Vidimus dein florentem mense Augusto & Septembri propè Briffordiam.

Millefolium aquaticum cornutum.

Descriptio.



Innatat aquis *caulibus* donatum prælongis, fragilibus, internodiis diductis, densè genicularis, quorum singulos nodos circumcirca coronant radiata rigidol. folia in fibras per exten. u. conuulsum ceruinorum ramulorum divisionem imitatas filia, inter cetera caulium molliora delicatesioraque: flores parui geniculis adherent, herbæ fere concoloris, quibus succedunt *semine* parua, quaternis filis juncta.

Synon. C. Bauh. apud Matth. Milk fol. aquat. cornutum: In phys. Millefol. 12. siue cornutum 10. Bauh. in pin. denique Millefolium aquat. 9. siue cornutum majus. Hic addit & Millefol. aquat. 10. siue cornutum minus, quod notandum descripsit.

Locus. Abundat Mompelgardii in fossis. Repertur etiam Genes circa Notodochium in paludosis. Basilee quoque in palustribus, licet rarius, & quidam circa Hildesheim inueniatur.

GRAMEN AQVÆ INNATANS
cum viticulis, siue Fomiculacea
marina.

CAP. XVI.

Descriptio.



continetur aliquid nucamenti rugosi instar co-

herens. Hanc gener. Cherlerus in riuulis lacubus quibusdam collectam Mompelio attulit.

An Fucus ferulaceus, Lobelio & Hist. Lugdunensi; An Alga species 2. Lemn. occult. An Phacellus marinus folio fœniculi Anguillaræ?

TRICHOMANES AQUATICVM
Dalechampi.

CAP. XVII.



Stargardie **Locus.**
Sanno 1581. mense Ianuario itinere quo ad balneum ibatur, in fonte nascentem, capillatam hanc plantam obseruare memini: quam tunc, quod doleo, non descripsi. lac. Gargilli iudicio, radix est Regiæ præti, qualem aliquando Basileæ in Byria ad radices annosæ Salicis se reperiisse refert.

Erat autem ea præteritus similis ei, quæ apud H. Lugdunensem p. 1023. Consecutus trichodis siue Trichomanis aquatici titulo pingitur, sine descriptione. Dicitur hæc C. Bauhino in pin. Fucus siue Alga capillaceo folio 3. siue Alga fontalis trichodes.

LENS PALVSTRIS.

CAP. XVIII.

Stagnantium aquarum incolæ Lenticula, iisdem signatæ, totam superficiem densissimo foliorum, infernè nigricantium, supernè virentium, nitidorum, orbiculatorum, Lentisq; modò compressorum, stipatu obtegens, quæ inter se capillamentis tenuissimis & albis artè reuincuntur: iisdemque ceu radicibus è limo adhaerescere alimentum hauriunt.

Adrian. Spigellus in lentis palustris aversa parte, qua fundum spectat, radices esse apertissimas ait, quas mirum hætenus à nemine fuisse animaduersas.

Dodon. in fol. lat. testatur Lentem lacustrem, eapic, flore & fructu carere.

Muscus autem hic Lenticulæ similis, ut ait Dioscorides, dicitur Græc. *μασκος* ὁ τοῦ ὕδατος, quod solum sit Lenticulæ formæ: Latinis, ut Matth. Dod. gall. Anguill. (annorat hic in plurimis Italiæ locis, Anatinam dici) Cordo in Dioscor. Turn. Lac. Lob. in Obs. p. 648. & Ic. tom. 1. p. 149. H. Lugdn. p. 1014. & Gerardo, Lens palustris: Aliis, ut Trago, Cæs. & Tabern. Lenticola palustris: C. Bauh. in prod. & pin. Lenticula palustris 1. siue vulgaris: Brunf. & Thal. Lenticula aquæ, Pharmacopœis & officinis, quibus & Lenticularia seu Lenticularis: Lenticula, Lob. in Aduers.

Descriptio.

Radix.

Lenticulae
sive Dod.
Muscus
Dioscor.
Etymon
Synon.

Aduerſi. Sunt etiam qui Lentem lacuſtrem, Lentem aquaticam, ſeu aquatilem, & Lenrem viperalem appellant, aliqui quoque Lentiginem & Muſcum paluſtrem.

Nomina
lingua-
rum.

Vocatur denique inter Dioſcoridis notha etiam *παρὰ ἀγρῶν*, hoc eſt, Lens ſilueſtris, ſeu agreſtis, ad differentiam ſc. Lenticulæ ſatiuæ, *ἐπιπτερον* [Epiperron, ab Ariſtotele lib. 2. de plant. appellari ait Geſm. in cat.] Viperalis [Bipteris Trago,] & Icoſmigdona.

Arab. *ὑπὲρ Σερapiον*, *Tabaleb*, ſeu *Thalet*. Germ. *Meer*, & *Wafferluſen*: Belg. *Waterluſen*, ſed frequentius, *Erdengruen*, hoc eſt, Anarum herbam, quod videlicet eam anates palcantur. Gall. *Lentille de mer*, *Lentille d'eau*. Italic. *Lente di paludi*. Hiſpanicè, *Lenterja del lago*, & *Lenticia de agua*. Angl. *Duyck meat*, *Duyck meale*. Hung. *Bekalencse*, hoc eſt. Ranz leus. Boh. *Rzasa*, aut *Okrebky*.

Sunt qui putant Ipſum plantam Orchomeni lacu à Theophrasto lib. 4. cap. 11. hiſt. propoſitam, Lentem paluſtrem eſſe, & ab ipſo, ſive à Bæotis ſic nuncupatam, quod ſauillis è canino furnove euolantibus ſimilis ſit: nam *ιννοε* caninum furnumve ſignificat, coniecturâ, vt aiunt, eò probabilior, quod nunquam aliquam huius Lenticulæ herbæ frequentiffimæ noſſimæque meminerit Theophrastus.

Locus.

In lacubus, & ſtagnis, aliſque non decurrentibus aut fluctantibus aquis, vt vrbium ſoſſis, inpatans & late ſæpè ſuperficiem earum occupans reperitur. Hæc ſi (quod nonnunquam accidit) aquarum inundationibus à pigris aquis influentes transferatur, cum litioribus inhaereat, intrum in modum propagatur: nam ſubnatis quibudam capillamentis, quæ radicum vice eſſe videntur, ſeſe terræ alligat, atque ita adoleſcens tandem creſcit in plantam aquaticam. Silymbrio haud abſimilem. Id quod naturæ opus indagator Dalechampius non ſine admiratione obſeruauit. Viſ eſt ei authoribus Dioſcoride, Plinio, & Galeno refrigerans. Quare omnibus inflammationibus, ignibus ſacris, & podagris conuenit, ſum per ſe, ſum cum potens impoſita. Agglutinat etiam in pueris hernias inteſtinatorum. Magnificiunt quidam, vt tradit Matthiolus, pumilæ huius plantulæ ſtillatitiam aquam ad internas viſcerum inflammationes, & ad peſtilentia febres. Quin etiam eandem præſerunt ad oculorum ruborem & palpebrarum phlegmonas, & ad mammarum & teſticulorum collectiones antequam augeantur: nam illa non obſcurè fluentes humores repellit. Herba ipſa recens ex aquis allata, & fronti adhibita, capitis dolores mulcet, qui à calore prouenerint. Veſcuntur ea anates magnâ voluptate, vt etiam gallinæ cum aquis exempta ſuſſuribus permifcetur.

LENS PALVSTRIS QUADRIFOLIA.

Deſcri-
ptio.

Fibroſa radientis uirgatur ex craſſiore alia (licet cæſtamen tenui) tranſuerſa demiffis: vnde propagantur, rami multi, multifariam diuiſi, atque tum ex ipſis, tum ex radicibus pediculi ad aquæ ſuperficiem perſurgentes, quorum ſingulorū extremis adherent aquæ innatantia quaternaria folia, triquetra, per extremum lata, angulis acutiorebus ad pediculum coeuntibus, circa verò ramulorum diuarcationes pediculorumque exortus numeroſa ſemuncialibus pediculis nixa coherent gra-

Tom. III.

na nigra, dura Lentibus majoribus paria.

Huius plantæ Compiler, H. Lugdunenſis

duas & picturas & deſcriptiones, diuerſis quidem capitibus, dedit. Eandem prior p. 3014. Lénatis Theophrasti inſcriptione: Altera p. 1015. Lénis paluſtris alteri Matth. oli titulo.

Icones
duæ. H.
Lugd.



Lénis quæ dicitur a portu. Locuſ nem pingit C. Bauh. in phyt. tab. Icon 7. In prod. eſt ei Lén. paluſtris ſive quadrifolia: In pin. Lenticula paluſtris altera, Matth. Lac. & Call. app. An

Lenticulæ alterum genus, Cæſalp.

In lacubus ſtagnis que agnoscunt limpidum aliquem modum ex ipſis natiſcitur. Coproſa quoque in Alſatiæ ſoſſis, via illâ quâ Argentorato ad domum & pontem veſtigalis itur.

Vires &
Viſus.

LENS PALVSTRIS PATAVINA.

Ad vnâ collam longiuſculam adnaſcuntur vtrique in alæ modum, folia denſo agmine mutuo ſe-

Deſcri-
ptio.

ſe plurimum, tangentia, ex oblongo rotunda, ſemuncialia, ſuperius ſtigmatibus notata, inferius muſco obduſa.



Folia Cæſalp. ſunt rotunda, vnguis in gurgitine, læ è virentia, conjugatim in ramulis diſſecta, cruciformi figura, vt in Ablete: villi per totos ramulos deorſum ſpectan-

tes, radicem vicem gerunt.

C. Bauhio ſub folijs ſubrotundis copioſe lenticulæ, aliquando ſingulæ, aliquando ternæ, & quaternæ, ruſoſo præterit cortice donatæ adherent, quibus ſemen copioſiſſimum, miniſſimum & ſtueſcens includitur. Sapore aqueo conſtat.

C. Bauh. phyt. Lens paluſtris; Eid. prod. Lenticula paluſtris 4. (5. in pin.) ſive latifolia punctata: in ſoſſis Patavinis aquis ſupernatans, & in Sileſia circa Vratiſlaviam. Piſis in Auxet. fluuio quaſi ſtagnante, qui aquas thermales ex monte

Yyyy 3

S. Iuliani recipit, fluitat, vñ cum aqua incedens, sed multis in locis interim quiescit, & tanquam exercitus castrametatur, non enim locum ad quietem nata.

Lenticula aquatica trifolia.

Deseri-
p. 10.



Lenticula palustris vulgò vocat riu- aque stagnanti innatans vitum penè fugit fibris, tumum arripit alimentum su- durs, quibus etiam inter se committuntur folia, non vul- grem sortita connexum & formati folio- lo enim Lem- ligimule per, pinæ utrinque folia- ceæ transuer- sin squamua-

ta commissurâ ita incumbunt, vt & trahentem leuiter sequantur, & ipse detrahis tenuius reditum folium vñum transmittit, tota autem om- nium trium conexio trifolia hederacei folij for- mâ quodammodò exhibeat: at huius connexus capillari petiolo transuersum incumbit folium veluti remerè projectum, nequaquam tamen so- larum, licet adhuc ratio oculos fallat.

Synony-
ma.

Lob hist. belg & ic. Plant. tom. 1. p. 36. Hederu- la aquatica & Trinitas aquatica quorundam: Belg. *Cleyn Water Veyl*: & sic etiam Gerardo Tab. Hederula palustris, *Wasser Epheu*. C. Bauh. pin. Lenticula palustris, siue Lenticula aquatica. et alii.


Locus.

Colmarie in fossis aquæ innatat. Mosui rane permitta: Eodem cum Nymphaea lutea & Mal- lesolio aquatico cornu alunt stagnantes aquæ quæ fœdum aluiis cœdunt horum Montbel- gardens quæ copiam tribuit iungunt, ambui-

ALSINE AQVIS INNATANS FOLIIS
longiusculis.

CAP. XIX.

Deseri-
p. 10.



Lenticula- Lundo a- quis innatat, longis, tenui- bus, terribus, in ramis colli- culis, pedalo. & cubitalibus, ac etiam longio- ritus in ramu- lis subinde abeuntibus, è quorum geni- culis non tan- tum demittit- tur fibræ te- nuissimæ & al- bidæ quibus radicaetur, ve- rum etiam bina folia per genti-

culos oriuntur, Alfinæ, semuntiam fere longa, ex angustiore principio sensim parum dilatata: extrema autem ramulorum supra aquam coro- nant folia multa, alia alijs imposita, latiora, ta- diaque digesta, decrefcentibus temper inre- rioribus, inter ipsa verò stamina plerumque bi- na apparent cum minimis capitulis luteis: inter longiora folia sub innatantibus ad singulos ge- niculos duo ita sunt stamina, prædictis similia, sed longiora, obseruati etiam quatuor apices ex vno geniculo, verum aderant quatuor folia. Il- lud penè omiseram, secundum longitudinem so- liorum apparere netuos. Saporeo nullum mani- festum sentio in hac herba. An Alfine aquatica, H. Lugd?

Stellaria aquatica Lob. ic. p. 791. & Fœnicu- lom aquaticum stellatum Tabern. C. Bauh. in pin. eni Millefolium aquaticum.

Synony-
ma.

Potentius in stagno ad fossas vrbis innatans viret mensis Decembris principio: Mompelgar- di in diuersis rivulis ex fontium scaturigine obortis.

Locus.

Alfine aquatica surculior.



Radiculas Defec-
p. 10.

Agri fibræ- las repentes & quæ colentes, surripit plures nò fluctantes, vt ex quæ inna- tans dicitur, sed rectos, palma- res aut lesqu- palmates, pin- gues & succu- lentos, in duos ramulos disti- los, aliquando tres, vel qua- tuor. Ex quo- rum singulis geniculis bina oriuntur, folia, Alfinæ vulga- ris, oblonga, sa-

ture virentia, crassiuscula, interna quidem ad Cepæ folia accidentia: typicus, Portulacæ ma- gis æmula. Ad inferiorum verò geniculorum ba- sin, tenues quoque fibræ, oblongæ decursum ver- punt. Ex geniculorum sinu alterutro tantum, flo- renti emicant aliquot candidi, exigui, & quorum partes vix Lynceus dignoscat, breui pediculo donati. Tota cæterum plantula crassula est, sa- pore viscido, nec aliam manifestam qualitatem gustanti exhibente.

In rinulis quibusdam Sundgoutz Anri flo- rentem legi, & in valle Grischbachiana ad fontes acides.

Locus &
Tempus.

ALOE SIVE AIZOON PALVSTRE.

CAP. XX.

Folia habet Aloës herba similia, sed breviora & minora, per ambitus, duris quibusdam brevibus aculeis spinosa: inter quæ vagina, quædam erumpunt, canctorum forcipulis per- similes, quibus dehiscuntibus, flores exeunt can- didi, etiam foliorum, Ranz morsus persimiles, luteola exigua stamina in medio gerentes. Pro radibus, fibræ longæ sunt, torundæ, candidæ, crassiusculis

Defec-
p. 10.



Synon.
reliqua.

crassiorib. lyta-
rū fidibus, aut
longis lumbrici-
is per similes,
quæ ab ipso
folia prome-
te, breui capite
descendentes,
aquæ fundum
petunt, quem
tamē rariū as-
sequuntur. Ex-
eunt ab eodem
& aliq oblique
fibræ, quib. ubi
Ranz mortus
multiplicatur.

C. Bauh pin. Aloë 4. siue pa-
lustris: Planta
foliis Aloës.

quæ Stratiotes
non est. Anguill. Stratiotes siue Militaris aizoi-
des, Lob. in Adu. & Ic. p. 379. Stratiotes aquatica
H. Lugd. pag. 1061. Nam reperitur in stagnantium
aquarum lacubus & fossis vel pigre fluentibus,
maxima foliorum parte vna cum floribus aquas
superante, reliquis ipsius stirpis partibus sub
aquis conditis, vnde cognomen inditum.
Iunio, Iulio & subinde Augusto flores.

Ceterum, fibræ, quæ pro radicibus habet, sce-
lerati ægypti in aqua plena phiala, quod maiores
apparent, mulierculis ostentatas impudenter
mentuntur vermes esse, quos medicamentis suis
ex intestinis eduxerint, teste Dodonæo. Facul-
tatem habet refrigerandi & siccandi.

STRATIOTES ÆGYPTIA.

CAP. XXI.



Locus

Descri-
ptio.

Propè Pe-
lusiū, nunc
Damiatam vo-
catum, Ægy-
pti ciuitatem,
quam Nilus
præterlabens
largus inun-
dat, & ad li-
bitum irrigat,
in fossis, aquâ
dictis fluminis
decurrente
plenis, hæc
herba copio-
se prouenit,
aquæ Lenticulæ palustris
modo super-
natans, sine
caule, folijs
Cynoglossi,

brevioribus, latioribus, densioribus, densioribus,
hirsutioribus, quæ ac albidioribus, a quibus pro ra-
dicibus exigua ac rara quædam lanugo pender.
Quæ planta maior, Sedo est similis. Eam appel-
lant Hayhalem el maoui, quasi dixerint aquotum
Sedum. Nullo odore est referta, eo excepto, quæ
ab aqua accipit: sapore tamen adstringenti, ac
sicco linguam ferit, non secus quam Acacia facit.

Hanc plantam Alpinus & Guilandinus vo-
Tom. III.

tum esse Stratiotem Atriquorum existimant, &
verum loquuntur, nostro quidem iudicio.

Stratiotem verò fluuiatilis cognomen tum ex
eo traxisse testatur Dioscorides, quod in aquis
nascatur, inque ipsa supernatans, sine radice viuat,
quamvis solum habeat Aizoo simile, at majus.
Ægyptijs Tibus nuncupatur, Magis autem Ælu-
ri lingua.

Plinius tradit eam in Ægypto tantum nasci,
quod non credendum, cum Dioscorides indefi-
nitè dicat aquis innatate. Celebratur, inquit lib.
24. c. 18 & à Græcis Stratiotes, sed ea in Ægypto
tantum, ex inundatione, Nili nascitur, herba Ai-
zoo similis, ni maiora haberet folia.

C. Bauh. pin. Lenticula palustris 6. siue Ægy-
ptiaca, vel etiam Stratiotes aquatica folijs Sedo
maior latioribus. Cur ad Lenticulam palu-
strem referat? Quæ Stratioti & dictæ Lenticulæ
affinitas.

Folia refrigerant, & sanguinem qui defluit à
renibus, pota sistunt: vulnera quæ inflammationem
minuunt, intumescere non sinunt: ignibus
sacris & tumoribus illinuntur, Dioscor. & Plin.
auctoribus, Plinius, hæc paulo aliter: refrigerat
mirè, vulnera sanat ex aceto illata. Item ignes
sacros ac suppurationes. Sanguinem quoque qui
defluit à renibus pota cum chure malculo miri-
ficè sistit. Stratiotes aquatica, inquit Galenus 8.
simpl. humida & frigida facultate est, terre-
stris verò non nihil habet adstrictionis: proin-
de sanè vulnera glutinare potest, & vlcibus es-
se utilis. Sunt qui eo ad sanguinis eruptiones
vtuntur, & ad fistulas. His addit, Alpinus: Ægy-
ptij ad eadem ipsa mala vtuntur, quibus Planta-
ginem conducere compertum est. Ex quo mulie-
res rusticæ, quas, Redoni vocant, ad sistendam san-
guinis eruptionem ex vtero, atque aliis partibus,
eius decoctum, vel succum, vel puluerem per os
quotidie ad drachmæ pondus somunt. Rustici
quoque ad vulnera sananda folijs contusis super-
positis vtuntur, misicæque ea sanant: eamque
frigida vique ad primum gradum, & siccam su-
pra secundum esse arbitrantur.

Vires &
vires.

PLANTAGO AQUATICA.

CAP. XXII.



Descri-
ptio.

Foliorum
cum caulis
imo quod in-
uolunt ad
tenuis vsque
& numerosas
radicum fibras
turbinat' coi-
tus bulbi faciē
aliquaten' mē-
tetur: caulis au-
tē stratus, an-
gulosus, ina-
li, sobrius,
plē umq; ubi-
talis, non rarè
etiam proce-
rior, alis indi-
dē ortis in or-
bē coronatus,
atq; hē rursū in
radiatos ex in-

ternallis, furculos facessunt: quorū extremis infi-
dent, flosculi dilutioni purpurâ pallescentes, sim-

Yyyy 4

briatis folijs tribus constantes, totidem tot floribus subjectis foliolis minoribus viridantibus, herbacei coloris staminulis semis e medio strobulo exeuntibus: *semina*, Millio vix majora, vixloque compressa, margine sulcato, in trigonum, junctis lateribus, disposita, copiosa: *folia*, Plantaginis, longiora, acuminata, nervola glabra, sapore subacido prædita.

Matth. in Dioscoridem ait affirmare Ruellium, etque etiam subscribere Fuchium; Plantaginem aquaticam, Alisma esse, vocatque à nonnullis Pastorem fistulam, ac etiam Barbam sylvanam, nullis tamen notis hanc Plantaginem cum Alismate convenire. *Hallucinatur*, autem Matthiolum: Fuchius enim hanc non recipit pro Alismate. Quod autem nonnulli Alismatis nomen ad Plantaginem aquaticam pertinere contendunt, nullam aliam rationem demonstrare possunt, quam quod Alisma ad loca aquosa provenire dicatur, inquit Tragus. Qui licet & ipsemet Plantaginem aquaticam vocarit, tamen inter Plantagines connumerandam haud censuit, quin & Gela. de hort. improprie Plantaginem dici testatur: Et hinc in cas. & Alisma, & Damasonium appellavit.

*Fistula
pastoris.*

Rob. Stephano, Amato in Dioscor. Rhegino in exer. Brunshoverg. & Ruellio, idem que Bacchanello in conf. fistula pastoris & Plantago aquatica, una eademque est herba. Ceterum hi omnes Alisma esse judicant, cum quæ illis etiam Emeric. Cordus, qui tamen vulgares herbanos Alineam corruptè vocare scribit, aliamque à Barba sylvana aquaticam Plantaginem esse contendit.

Lonicerus contra cum Durante tenet Barbam sylvanam omnino eandem esse cum Plantagine aquatica, ejusdemque opinionis est quoque Paudectius Mores. cap. 8. & Eucharis, qui Barbam sylvanam etiam Centumnerulam aquaticam vocant.

*Fistula
pastoris
perperam.*

Fistulæ pastoris verbum à recentioribus perperam tribus Plantaginis aquaticæ, vix potè putantibus Damasonium esse, concludit Cæsalpinus.

Quærit Lobel etiam in Obs. num Plantago aquatica sit Limonium, aut potius Alisma huc Damasonium: Et respondet Anguillara epist. 14. nihil inveniri quod melius conveniat Limonio Plantaginis aquaticæ. Concludit etiam in Ad. Lobell. Græcis antiquis Μανθάνης & Λανίης facile incognitam.

Synon.

Nostræ ætatis Herbarij, ut B. upfelf. tom. 1. shapf. Trag. Matth. Fuch. Dodon. Turn. Geln. hort. Lob. in Obs. pag. 10. Cast. Th. Schvvenckf. Cæsalp. H. Logg. Tabern. [cui & Plantago palustris & Cochlearia palustris] & Gerardus, Plantaginem appellant aquaticam: Lob. in Adv. & Icon. p. 300. Plantaginem aquaticam folijs Berz aut Plantaginis, florè Gallij albi: C. Bauh. phyt. & pin. Plantaginem aquaticam: s. sue latifoliam, & Limonium Anguillaræ. Dubitat autem an Alisma huc Damasonium quæ Fistula pastoris dicitur Germanis, ut Cordo in Dioscor. & Lonicero, huc sit referendum. De hac nos inferius. Licet autem omnes hi Plantaginem vocent, Plantaginis tamen non admodum similis est: præter enim folium, nihil habet Plantaginis, quod tamen & ipsum Plantaginis folio non satis responderet: nam longius, magis fastigiatum, & minus nervosum est.

*Nomina
linguag.
sum.*

Germanis dicitur, *Wasser Wegrich, froschwegrich*, Plantago ranalis, *froschloeffel, froschloeffel*.

Lat., id est, Ranz cochlear, *hirsppfeil*, hoc est, Fistula pastoris, & *Wegrich* q. d. Barba sylvana, ut Simon Januensis, Eustachius, & Pampphilus Herilæus de nat. aq. lib. 1. cap. 24. vocant. Belgis, *Water weg, frosch, water wegche*: Gallis *Plantain d'eau, & Plantain aquatique*: It. *Plantagine aquatica*: Angl. *water Plantain*.

Exit humilioribus & aquas habentibus locis, in fossis juxta lacum & rivulorum margines. Floret Junio, Julio & subinde Maio & Augusto, mensibus.

*Locus &
Tempus.*

Facultatem autem hæc Plantago frigidam videtur Dodonæo habere & siccam. Videtur nobis si frigida ad tertium gradum, ut vult Ezech. in calidiori vtero ad conceptionem facere posse. Schvvenckf. refrigerare & siccare quidem testatur, non tamen prorsus caloris expertem esse, sed aliquantulum acrem abstergendi vim habere. Prociditiam curare, rubentem podagram, capitis dolorem à calida causa mulcere, cruento spitto, urinzque mederi. Radices in vino decoctas, ijs qui calculo renum & vesicæ molestantur, solatio esse. Summum secretum & expectissimum quo tubus lac in mammillis consumatur, esse ait Timot. Rosalin, succum hujus Plantaginis illis applicatum.

*Vires &
Vita.*

Plantago aquatica humilis angustifolia.



Gracilius, *caule* pedali & altiori, prædita est, verticillatim circa medium, *pediculis* quadratilib. & orientalibus ex geniculo ortis radiato, consimiliq; alijs ejusmodi umbellatim summum caulem coronantibus, quorum vix cuique flos infidet parvus, albus, ceteribus caducis foliolis compositus.

*Descriptio
pica.*

glomerato in parvi echini modum capitulo relictis: *folia* ex radice sena, septenave, junceo pediculo palmari & sesquipalmari nixa, angusta, acuminata, minora multo quam Plantaginis angustifoliz terrestris, glabra, tribus longis nervis distincta, grati odoris, saporis satui: *radix* fibrosa majoris Plantaginis aquaticæ.

Lobel. Icon. pag. 300. Plantago aquatica humilis angustifolia & longifolia: Schv. Plant. aquatica angustifolia humilis: Tabern. Ic. & hist. itemque Cæf. Plantago aquatica minor: Gerardo Plantago aquatica humilis: C. Bauh. phyt. & pin. Plantago aquatica 2. sine angustifolia. Dicitur *ges klein vasser wegich*: Angl. *du arse Plantain*. Hæc congenerem facit Clusius suam Plantaginem aquaticam minimam, vel suam Plantaginem elegans genus.

Synon.

Montepel. propè fluminum ripas, floret Aprilis & Maio. Reperitur & in Silesia vdis.

*Locus &
Tempus.*

PLANTAGO

PLANTAGO ITALICA RYFFIO, AQVO.

lis locis proveniens, quæ Fistula
pastoris multis.

CAPVT XXIII.

Plantago
italica.
Ryffio.

Descrip-
tio.

Verum hoc Alisma (si credere fas est) ex Italia adfertur curauit, quod in Germania non proveniret. Eius autem picturam dedit Ryffius in Diosc. lib. 3. cap. 144. nomine Plantaginis Italicae, germ. *Welsch Wegrich*: folio Arneglissi, sed angustiore, & temper in terram de nullo: caule unico sesquipedalium, in cuius fastigio viride alabastriculū in caulem concoloris floris dehiscit: radicibus crebris, ut Ellebori nigri, tenuibus, acris, pingui- bus: flore tenui, in candido pallescente: aquosos amat situs.

Faretur C. Bauh. in phyt. se ignorare quid sit Alisma, siue Damasonium, vel etiam Fistula pastoris, Loniceri, Ryffij & Cordi in Dioscor. lib. 3. cap. 169.

De Dis-
tinctione.

Nos verò inquirendum proponimus an Cordi Alisma, seu Herbariorum Almea, sit Bisfolium maius, id quod aliqui volunt, vel Damasonium de quo in historia eius, lib. 2. cap. 107.

Brunfels. in Diosc. lib. 4. in exeg. tom. 2. pag. 121. perhibet Alisma in aliquibus comm. pro Fistula pastoris interpretatum reperiri: in alijs pro aquatica vel palustri Plantagine. Euch. Roslino Fistula pastoris, *birten pfiff*.

Alisma
maius.

Io. Agricola asserit esse quosdam, qui Alisma seu Damasonium, Fistulam pastoris vocent, nullā tamen ad hanc herbam comparatione, binis & nunquam pluribus folijs &c. Non iniuste autem Plantaginem aquaticam fore dicendam, si non Barba silvana hoc ei nomen præcipuisset. Apparet eadem ex his Eur. Cordi verbis, ex quo ea habuit Agricola, Fistulam pastoris, à Bisfolio & Plantagine aquatica esse diversam. Non tamen nobis constat, quæ sit Fistula pastoris Eur. Cordi & Brunfelsij, & an eadem cum Ryffij Plantagine Italica.

Fuch-
sius.

Quam denique plantam Fuchsius intelligat per Pastoralem fistulam, quam nonnulli Alisma seu Damasonium putant, quāque à Plantagine aquatica vulgari, & Bisfolio, quod ei Ophrys dicitur, separat, nos latet.

DAMASONIUM STELLATUM, DALECH.

CAP. XXIV.

Descrip-
tio.

Habemus à Dalechampio nomine Damasonij stellati hanc, quæ aquaticæ Plantaginis fibrosas radicales in nodum collectas possidet, unde palmaribus nixa pediculis folia exerunt, Plantaginis aquaticæ amula, multò minor, & ad pediculi insertionem pinnata, interdum verò minimè: ciliis plures, alij triunciales, alij sesquipalmates, teretes, inanes, nodis ex longis intervallis articulati, è quorum geniculis, inque summo caulium fastigio, radiati in orbem exeunt pediculi unciales, quorum unicuique insidet quidam senumve radiorum stella pulcherrima, Aizoï illius peregrini Camerarij stellæ æmulantia.

Synony-
ma.

Lob. Obs. p. 160. Alisma pusillum angustifoliū muricatum: Eid. Icon. p. 301. Plantago aquatica minor altera: H. Lugd. p. 1058. Damasonium stellatum: C. Bauh. pin. Plantago aquatica 3. siue stellata.

Tom. III.

Humidis & aquosis locis gaudet.

Locus

SAGITTA.

CAP. XXV.



Sagittæ radi-
ces sunt mul-
tae, albæ crassiu-
sculæ, fungosæ,
non sine capil-
laribus fibris, à
quibus propa-
gines nascun-
tur longissimæ,
interdum bica-
bales, iunces
tenuitatis, sub-
ter aquam ser-
pentes, similes
radicibus Lysi-
machiz luteæ;
Matth. compa-
rat Plantaginē
aquaticæ: folia
aquis innatant
ræ formæ pul-
chræ alaræ sagit-
tæ mucronem æmulantia; fuscis hic inde in su-
perna parte maculis notata, quædam, ut Mom-
pelgardi observamus, ex primis in acumē non
desinunt, sed rotundantur. In eorum. potè sin-
gulas alas longi, terni, aut quatuor nervi per longū
porriguntur, obliquis à nervo in nervum venu-
lis intercurrentibus, lænore Plantaginis aquati-
cæ, pediculo minimi digiti crassitudine, fungoso,
striato, penè triangulo, duos aut tres cubitos lon-
go, pro aquæ profunditate, in qua vivit. Folia sa-
pore nonnihil subdulci & viscido, cum vestigijs
obscuræ acrimoniæ: caules rectos duos aut tres
emittit, non multò folijs altiores, rotundos ferè,
striatos, crassos, fungosos, in quorum parte supe-
riore plures flores exoriuntur, plerumque terni,
caulem amplectentes, ex pediculis siue ramulis
modò longiusculis, modò brevioribus, pulcher-
rimi, mediocriter magni, tribus foliolis albis con-
stantes, vngue purpurascēte notatis, florum A-
mygdalarum foliolis paulò minoribus, in medio
apices multi, rubentes. Sub flora foliola tria, viri-
dia. Flores excipiunt echinata capitula, subpurpu-
rea Matth. magnitudinis penè fructuum Arbuti,
vel Fragorum, ex aculeis veluti constantia, qui
nihil aliud sunt quam semina lata, compressa, in
acumen desinentia, vnguibz autem similia: semen
minutum ait Matth.

Descrip-
tio.

Cordo hist. Sagitta, siue Sagittalis: hic annota-
tum à Gesnero, esse Sagittam inter vndas [existi-
mo legēdum inter vndas] quam Mago apud Pli-
nium legendum inter vndas [quam Mago apud
Plinium lib. 21. cap. 17. Pistanam dicit à Græcis vo-
cari, quāque ab Idibus Maij vsque ad finem
Octobris mensis decorticari, atque leni Sole sic-
cari iubet.

Matth. in post. comm. vocat Sagittam Plinij, e-
ius maiorem & minorem assignans speciem, v-
tramque copiosam in Bohemia, vbi Sagittam
Herculis vocant. Dicitur Græcis *πιστανα*, Germ.
Pfistkrant, It. *Saetta*. Ait autem cognationis es-
se Plantaginis aquaticæ. Nos huc Sagittam mino-
rem referimus.

Lob. in Ada. dicitur Sagitta minor. Huius tam
Yyyy 3

in Obs. p. 161. quàm Icon. p. 301. duas exhibet figuras: priori titulus, Pistana Magonis, siue sagittaria aquatica Plinij: Alteri, Sagitta minor. Mirum autem eum exprimere locis iam allegatis, Sagittam suam in Adv. maiorem, per effigiem Sagittæ minoris Matthioli: utraque enim imagines eam delineant, quæ acutioribus est folijs.

Synonyma. Dicitur hæc C. Bauh. pin. Sagitta aquatica 2 siue minor lausfolia: Sagitta minor, Matth. Dod. Lob. in Adv. H. Lugd. pag. 1016. Cast. & Tabern. Sagittaria minor, Lob. in pag. 302. & Ger. Pistana Plinij, Ang. Germ. *kein Pfeilkraut*.

Locus & Tempus. Nascentur in aquis cum stagnantibus, non decurrentibus, Florer Iulio & Augusto. Ebroduni obuia est pluribus in locis, in Lacu & fossis, atque piscinis.

Temperamentum. Temperamento est frigido humidoque, & isdem cum Plantagine aquatica viribus poller, dicitur Matthiolo. Id autem temperamentum & vires sapor à nobis observatus, præ se ferre non videtur Matthiolus fortè non degusta à plantâ, nec scilicet experient à hæc asserit.

Sagitta maior.

Descriptio.



Minori per omnia similis, sed omnia maiora spectantur: verum folia non utque adeo acuminata habentur.

C. Bauh. pin. Sagitta aquatica siue maior: Sagitta maior, Matth. Dod. Cast. & Tabern. Pistana Magonis, siue Sagittaria aquatica Plinij, aut Scæbe semina, Lobel. in Adv.

Phlebos mas lausfolia, H. Lugd. p. 1016. Barban sylvaia recentioris, Cast. Sagittaria maior, Ger.

Sagitta minor.

Sagittam ponò, à foliorum forma trispidi, superne in unam, inferè in duas delinquentium, nomen habere, non dubitandum. Phleum autem Thophrasti 4 hist. 9. & esse velunt quidam: ubi tamen notandum apud Theophrastum Phleum & Phlebos differre: nam Phleum genere neutro, palestis plantarum Phlebos & Scæbe 6 hist. 1 idem sunt, & fortè Poterium erit. Plinius lib. 21. cap. 17. inter vluas, ut ante ex Gelsio traditum, Sagittam vocantemque Magonem, à Græcis Pistanam dicitur ferre prodit. Græcis itaque *πιστανα* *μυρσάν* dicitur: Germ. *groß Pfeilkraut*: Ital. *Sagitta maggiore*.


Locus

Nascentur ut altera stagnantibus & decurrentibus aquis. Per multis quidem annis ac leniter labentibus in Italia, Gallia, Germania & Anglia: subter aquas è fundo vadoso exit. Mato & luato in Anglia prope Oxonium, pone mœnia, in amœnissimis illis residibus, & limpidissimis aquis: etiam Londini ad arcis regie vallum, &

in Tamesis crepidinibus paludosis. Paribus alteri viribus præstat.

Vires

Sagitta minor angustifolia



Minori & Descrip. hæc per omnia similis, sed omnia minora sunt ei, foliaque angustiora multo, magisque acuminata.

Synonyma. Tabern. & Ger. Sagitta minor angustifolia: C. Bauh. pin. Sagitta aquatica siue minor angustifolia: H. Lugd. pag. 1016. Phlebos siue Scæbe Theophrasti, angustifolia. Germani *klein spitz Pfeilkraut* vocant.

ANAGALLIS AQUATICA, FLORE CÆRULEA, foliolo rotundiore, minor.

C. A. P. XXVI.

Anagallis aquatica folio rotundiore minor, radicibus nigris, fibrosis, quas ex geniculis subinde demittit: caules rubentes, rotundi, fungosi, in terram reclinati, quam ubi attingunt, fibris euanis radicanitur denud: folia ex aduerso bina singulis geniculis, longiusculis pediculis hærentia adulescunt, pinguiscula, arto virentia, ad vncias duas longa, subrotunda, crenata: è quorum sunt ramulus prodiens flores sustinet spicatos, cæruleos, ex quatuor foliolis compositos, striato umbilico albo, apicibus dilutissimè cæruleis, ternis, ex calycibus, quos quaternis folia viridia componunt: omen capulis superuenientibus, didymis clauditur: sapor plantæ nullus manifestus.

Descriptio.

Existimant quidam hanc plantam Sium sium non Diolcoridis esse: sed hallucinati sunt: folia enim Ousani desunt, & inodora sunt.

Putarunt tamen alij Cephæam esse. Et sardè Dodonæus cum ea Anagallidem istam aquaticam convenire posse arbitrat, si per *arrigant*, *arrigant*, id est, horrentis dicatur. Quod si verò idem *arrigant*, quod vel solum, vel plurimum in hortis nascatur, nominata sit: parum ei Anagallis hæc Cephææ respondere videtur, ut quæ nusquam minus quam in hortis nascatur: natara sua in totum silvestris, aquosa requirens loca, petenitque rigati postulant.

Cephæa nomen.

Plantæ huius in aqua nascentis verum nomen se ignorare farentur Monachi in Mel. dist. 1. cens. 4. ubi à quibusdam Lauer falsò appellari scribunt, quanquam alij etiam falsò Cretionem vocare non desinant.

Sium Brunfelsi 10 3. rhaps. 84. Sium non odoratum prim. Trag. Sium. Eur. Cordo, Theoph. Gohio in Ono Lonic & Fuch. hist. Si alterum genus, Eid. Sc. Sium non odoratum, recentiorum quorundam, Gels. hort. Sium siue Lauer commune, non repens Diplocoris descriptioni, Anguill.

Cephæa.

Cepæ, Dod. gall. & Turnero. Anagallis aquatica, Dod. de frum. & in fol. lat. Lob. Obs. p. 248. Ic. p. 466. Gesner. coll. Toxiti in Onom. philos. Harch. Thal. Hort. Lus. H. Lugd. Lon. Czf. Colum. & Ponæ in Baldo: Anagallis aquatica. Schvvenckf. Anagall. qu. minor 1. Tabern. Anagall. aqu. siue Beccabunga Lob. in Ado. Anagallidis tertium genus palustre. Ryfio in Dioscor. Anagall. aq. 2. siue minor folio subrotundo, C. Bauh. pin.

Nomina
lingua-
rum,
Græcis ἀναγallis ἑνδρος: Ger. Bachpungen, wasserpungen: Belgis wasserpungem & Beckpunghe: Gallis Berle nominatur, unde & Berula latine dicitur. Marcellus tamen Berulam dici refert, quam Græci καρδαμύνη vocant. Juss. & præsertim Herulesis: Gorgolastro.

Locus
Et hæc in seledibus exit aquis, & circa fontes, ac riuorum ac fluuiorum margines. Iunio, Iulio, ac Augusto, flores, seménque profert.


ANAGALLIS AQUATICA, FOLIO rotundiore maior.

Descript.
Anagallis hæc aquatica est iam dictæ omnino similis, nisi quod *caulibus, folijs* (quæ ubi maxima, trientem longa sunt, & sextantem lata) & *floribus* maior est, ac latius diffusa.

Synon.
Berula, siue Anagallis aquatica, Tabern. Anagallis aqu. folio maximo, Thal. Anagallis siue Beccabunga, Ger. Anagallis aquatica 1. siue maior folio subrotundo. C. Bauh. pin. Anagallis aquatica maior rotundifolia, Hort. Lus. *Esundæ*.

ANAGALLIS AQUATICA FLORE Cæruleo, folio oblongo, maior.

Descript.
quo:
Illi similis & hæc *radicibus* fibrosis ex articulis caulium hærens. Verùm *caules* recti, angulosi, crassi, cavi, cubitales, & maiores, inferuè tubentes: *folia* bina opposita, sine pediculis caulem complexa, longiora quàm iam dictæ Anagallidis,



palmi longitudine, latitudine vnciali & sesquialiali circiter crenata, sapore nullo insigni: caulis in ramulos dividitur ex foliorum alis ortos: *flores* spicati, crescendi modo, figuræque prædictæ Anagallidis similes, calyculis & capsulis didymis interdum respondentibus.

Pro hac habemus iconem

Fuchianam ex empirijs: folia tamen sunt longiora & angustiora huius plantæ.

Synon.
Tabern. Berula maior: Anagallis aquatica, Gerardo: maior Gesn. coll. Anagall. aquatica 3. siue maior folio oblongo, C. Bauh. pin.

ANAGALLIS AQUATICA FLORE purpurascens, folio oblongo minor.

Descript.
quo:
Hæc Anagallis proximè dictæ *foliorum, florumque* formâ similis: verùm *caule* rotundo,

floribusque purpurascens, & crescendi modo nonnihil differt. Non enim in caules ita brachiatum, neque radicibus tam latè propagatur.


Anagallis aquatica minor, Ger. secunda, Tabern. Anagallis aquatica 4. siue minor folio oblongo, C. Bauh. pin.

Locus:
Omnes passim in locis vligiosis ac scaturiginibus.

Vires. & Vitis. Tumorem
Cum aceto & butyro tosta Anagallis aquatica ac calida imposita, & subinde renouata, tumoribus quibuscumque & tactis ignibus prodest: apud veterinarios in magno est usus: namque in discutendis tumoribus & sananda equorum scabie, aliisque id genus affectibus curandis videntur, teste Trago. Lobelius Anagallidum vires imitari dixit, totam gustu acriore Nasturtij, odore non ingrato. Sed & Dodonæo qualiter ac temperiem Anagallis aquatica calidam habet & siccam, Nasturtio aquatico similem, remissiore tamen: editur etiam ut illud. & ad Germaniæ maritimam *scorbutum* malum, quod Scorbutum nuncupant, veris quoque, eodem quo Nasturtium aquatile sumptum modo. Facultate tamen ac viribus minùs potens.

ANAGALLIS AQUATICA Angustifolia.

Descript.
quo:
Eniculatim incedunt parvæ *radices*, demissis fibris ad juncturas ortis firmatæ: *caules* cubitales, simplices, interdum in longos ramos propagati, ad quorum singulos nodos bina nascuntur



ex aduerso sita *folia* trium quatuorve vnciarum longitudine, latitudine culmi, acuminata, nervo unico per longum donata, è quorum sinu *caulis* summitatè versus, *pedicelli* palmo longiores, tortiles pluribus cunctis propaginibus enascuntur, *floribus* omnibus parvis, sequentibus semper didymis capsellis

compressis, è fissura stamen tenue nuntur.

C. Bauh. pin. Anagallis aquatica 8. siue angustifolia scutellata.

In aquis Helvetiæ, ut Tiguri prope selium lacum, provenit. & Mompelgardi versus pagum Sochant juxta riuulos. Sic & in paludosis & fossulis Lusatiæ, etiamque circa Francofurtum ad Oderam, & Viennam reperitur.

SAMOLVS VALERANDI.

Descript.
quo:
Pro *radicibus* fibras habet capillares, albas *caulem* verò cubito altiore, *folijs* alternatis:



vestitum, vicia
vnam aut alie-
ram longis, vi-
cia antheris, ex
oblongo per ex-
tremam subro-
tundis, glabris,
neumquam in
marginis incis,
crassus, pediculo
nunc longiore,
nunc brevior,
semper latitudo
caulis super-
ius in ramos
crebros fingitur,
atq; huiusmodi in
olus maiores, in
quibus *fesculi*
pari, Anagalli-
dis aquaticae, sed
colore albo pre-

hor. *Hyslopidea* lo. Thalij. *Gefn. coll. & Cesp.*
Bauh. apud Matthiolum, *Gratiola minor*: Eid.

phyl. *Hyslopi-*
folia lo. Bauhi-
ni, Anagallis a-
quatica Mon-
speliensis. I-
tem pin. *Hyslo-*
pus, siue *Hys-*
lopus s. siue
Hyslopifolia
major latiorib.
folijs, floribus
caeruleis, raris-
sime albis, mi-
noribus: at ex
Hispania flori-
bus oblongis,
saturatioris ca-
erulei coloris.

Locus &
Tempus.

Florentem re-
peri mense Au-
gusto, locis hu-
midis circa
Bochterschen &
Falken Wiler in Alsatia. In Patavinis paludibus
etiam occurrat.



Falken Wiler in Alsatia. In Patavinis paludibus
etiam occurrat.

Hyslopifolia minor, vel potius *Thymifolia*
maritima.

Describe

Simplice li-
gnosa con-
torra radice
nigra, caulem
tollens palme-
rem, alias do-
drante altorem
in ramos didu-
ctum, per quos
crebra folia,
Camphorae,
sursum vergen-
tia: ex quorum
singulorum sinu
ab imo ad sum-
mum usque cri-
stae filiquae per-
exiguae roben-
tes *Hyslopifoliae*
majoris, semine
refert, minuto,
ex albo flaves-



cente: sicut ut alterius, minor, qui vix facile discer-
ni possit.

In vineis maritimis & ad vinearum margines
prope Gramontium in agro Monspeliensi colle-
git I. Henric. Cherlesus.

Locus

Synon.

diri.

Valerando Samolus Plinij quorundam. Lob.
Obs. p. 149. Anagallis aquatica altera, siue Sion
non odoratum alterum Tragi folio Pulegi lega-
lis: Eid. loc. pag. 467. Anagallis aquatica tenuis. *Fru-*
stra dubitat Lobelius de hac planta an sit Sium
non odoratum Tragi secundum: nec enim quic-
quam commune demonstrat possit.

Lob. not.

C. Bauh. pin. Anagallis aquatica s. siue folio to-
rundo non crenato: Anagall. aq. altera Lobelij,
H. Lugd. p.

Guiland. modò Alisma, modò Cochleariam
dominavit.

Locus &
Tempus.

In aquis Istriae florentem vidi mense Julio.

HYSSOPIFOLIA AQUATICA.

C. A. D. XXVIII.

Descri-
ptio.

Caulis multi, dodrantes, vel etiam longio-
res, striati, virides, folijs amicti alternatim
positis, *Hyslopi*, aliquando brevioribus, brevis vi-
re, nervo unico secundum longitudinem distin-
ctis, sapore nullo manifesto, è quorum sinu ab imo
fere ad summum usque cacumen *filis* unus, vel
duo, longiusculi, caerulei, sex foliolis striatis con-
stantes, è calyculo viridi, cauli adnato, succedunt
pro strobilorum numero *filiquae* longae, tetraes,
membranula viridante involutae, quae detRACTA
calyculum propriè constituens tunica fusca se-
men continet copiosum, minutum: *radix* brevis,
fibrosa. An Trago, Polygonum minus, Polygoni
genus alterum.

Cordo in Obs. silva *Grass Poley*, herba Polygoni
masculae, non humi prostrata, sed erecta: Camer.

FINIS LIBRI TRIGESIMI OCTAVI.

HISTORIAE



HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER XXXIX.

DE PLANTIS MARINIS.

COMPLERE poterant miraculum Tellus eiusque prioribus voluminibus recensita diuitia, totque genera plantarum, utilitatibus hominum, aut voluptatibus genita. Sed quanto plura, quanto difficiliora, mirabiliora que inueniuntur. Nec maria quidem, & immane illud pelagus medicinis carent, opifice natura ne in illis quidem cessante, & per undas fluctusque ac reciprocos aestus, rapidosque cursus indefessas vires suas ostendente, nec usquam miraculo maiore, si verum fateri volumus: qua ipsa est D. O. M. inestimabilis benignitas atque potentia. Ergo ut omnem insumamus operam, neque ullum fastidii periculum vrisse ostendamus, quando ita decretum est, ita continuatum, marina quoque & profundi Oceani doctes, quantum humanitus fieri poterit hoc tempore, indagabimus, ipsum adeo pelagus prouocantes: ut videat posteritas nos & cura rerum, & copia diuturnum naturalium nullo posthabito periculo institisse.

DE ALGA, FVGO, BRYO, SIVE MUSCO Veterum sententia.

CAPVT I.

Theophr.
Alga genera quinque.



HEROPHRASTVS 4. hist. c. 7. clare & diffusè quinq; Fuci marini genera assignat, Zosterà siue Prasson: capillaceū, siue sceniculaceum: Tinctorium, spongiatorium; siue Pelagium: Gramineū & Lactucaceum.

Diosc. Fa-
ci marini
genera
tria.

Dioscorides verò tria genera ponit. Fucus marinus, inquit, nascitur partim latus (ματὸς) partim oblongus (ὑπόμακτος) Orib. Ὠρίβιος & puniceus [πορρικός], partim albus, qui in Creta ad terram nascitur, valdè floridus & non putrescens. Refrigerandi vlin (φυκτίνον Orib. σφυκτίνον, adstringentem) habent omnes, in cataplasmatibus ad podagras & inflammationes efficaciter vrilè: verum ijs adhuc humentibus vti conuenit, priusquam exarescant. Nicandei puniceum affert aduersus serpentes valere: id ipsumque est, quo existimauere nonnulli colorem suum mentiri mulieres: cum tamen radícula sit eiusdem nominis, qua se se fucant. Idem Dioscorides scribit Muscum marinum (ἄψιος θαλάσσιος) in saxis testisque ad mare nasci, capillaceum, gracilem, sine caule, valdè adstringentis gustus: ad inflamma-

Tomus III.

tionem & podagras, quas refrigerare opus est, efficacem.

Plinius indistinctè & inconstanter Fuci marini genera tradidit. Tria autem genera eius facit: latum, & alterum longius, quadantenus rubens: tertium crispis folijs, quo in Creta vestes tinguntur, omnia eiusdem usus. Bryon, addit lib. 27. cap. 8. marina herba sine dubitatione est, Lactuce folijs similis, rugosa, veluti contracta, sine caule, ab ima (vna, Theoph.) radice exeuntibus folijs. Nascitur in scopulis maximè, testisque terra comprehensis. Præcipua siccandi ei spissandique vis, & collectiones omnes inflammationesque cohibendi, præcipuè podagras, & quicquid refrigerare (Hæc Plinius ex capite Diosc. de mulco marino, quo tantum agitur de Alga sceniculacea, vulgè Corallina, non autem de hac Lactuce, Dal.) opus est. Libro porro 32. c. 6. scribit Algā maris theriacem esse, Nicandri tradere. Laudatissimam, que in Creta insula iuxta terram in petris nascitur: tingendis etiam lanis ita colorem alligantè, vt elui postea nō possit. E vino autem iubet eam dari. Et hæc Plinius, qui apertè Phycos thalassion, h. e. Phucum siue Fucum marinum, Algā vertit, licet rursus in alia lingua nomen habere negarit, modò herbam vocando modò fruticem. Adde quod ἄψιος, i. e. Muscum & ἄψιος confundit, vt id clarè ex iam dictis patet.

Facit Plinius, inquit Cornarius, herbam & fruticem ex Musco, ipsique Lactuce folia attribuit.

Zzz

quum Dioscorides pilosum dicat pro folijs, h. e. *αἰχμήδες*, quod fortassis Plinius *αἰχμήδες* legit, & Laënce folio reddidit. Quod verò Dioscorides ait, podagras, quæ adstrictione opus habet, i. e. *τὰς ἐν τῷ πόδα*, fortassis *αἰχμήδες* legendum, pro *αἰχμήδες*, etiamsi utraque lectio recte habeat. Nam & Galenus Muscum marinum ex terra & aquosa essentia, utrisque frigidis, compositum esse dicit, & in gustu adstringere, & omnia calida impositum manifestè refrigerare, ipsiq; prodesse.

Nomina
linguar.

Alga, quod nomen plantis seorsim omnibus, marinis commune est, vocatur græcè ab Had. Iunio *αἰχμήδες* vel *αἰχμήδες* & *αἰχμήδες*; Lat. *Alga* & *Vlva*; hanc ait stagnorum esse: illam maris: & Fucus marinus: Germ. *Miergras*: Belg. *Wier*: Gall. *Vray* ou *Vrac* (in Oceano Normantico, *Bray*, aut, *Bras*, à voce græca *αἰχμή*.) *fucillet de mer*, *Coralline*: It. *Alga*: Hisp. *Lat. onas del mar*: Ona, *oyena de la mar*.

Poetæ cognominant Algam marinam, inutilē, mollem, viridem, flucticolorem, littoream humidam, torulem, tenuem, putrem, & vilem: hinc vilior Alga.

ALGA ANGVSTIFOLIA VITRIARIO- rum.

CAP. II.

Descri-
ptio.



Folia longissima, cubitalia, & longiora, plana, lævia, mollia fragilia, modò alba, modò rubra, vel atrouirentia, ligulas astrictorias æmulantia, ex iis quædam sūt latiora, alia angustiora: hærent substantiæ cuidam lignosæ, nigæ, umbelliferarum plantarum instar comosæ, capillamentis cinereis, quæ in fibras satif-

centia folia vetera & decidua reliquerunt. Estimamus descriptam plantam, traditam esse à Plinio lib. 2. c. 6. nomine *Alga*: à Dioscoride verò titulo Phyci marini.

Matthiol. in Dioscor. huius meminit eadem vocando Algam vulgarem Venerorum: Negare autem videtur esse Fucum marinum Antiquorum. Lacune in Dioscor. lib. 2. cap. 31. dicitur Alga marina & *Onas maridas* Hispanorum: Eid. l. 4. cap. 101. Alga vel Phucus marinus secundus Dioscoridis, quo Venetus inuoluuntur vitra & Romam deferuntur.

Fucus
mar. alter.
Dod.

Dod. in fol. lat. inscribit Fucū mariū alterum, Fuci marini proximum siue secundū genus Dioscoridis, sublongius ac rubes. Amat. contra negat Algam marinā, quā apud Muranū Venetiis vitrea vasa parantur, esse Phycos thalassii veterū genuinū.

De nostra Alga vitriariorum angustifolia hæc Rob. Constantinus apud Amatum: Phycus siue

Fucus marinus qui etiam Latinorum est Alga, vocatur in Oceano Northmanico *Vray* aut *Vrac*, [*Bray* aut *Brac*, H. Lugd.] à voce græca *αἰχμή*. Nam *Βῦρον* & Alga alterum pro altero, usurpat etiam Plinius. *Tria* autem Phyci genera existunt: vnum folio est Capicis, i. e. Graminis, sed æquabiliter lato ac molliore, nec mucronato, nihilque penè differt ab Vlva palustri, nisi colore, quem Vlva habet prafium, Alga verò tuboridei tendentem ad rufum, quem planè inducit in mari cum vel diu eu illum atque tuueteratum, vel cum in aere exaruit. Pollitari mensura latiore non vidi aut vlva vna longiore. Scilicet in nostro mari nondum visa est. Folia tanū vndis innatant figura lignæ longioris, aut teniæ vitæ in corollis lemniscatis. Hæc Algula est cui Dioscoride in odore Corallia comparat, de qua etiam Nicander ait. *Ἐρὺν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου θάλασσης*. Qui etiam scitè admodum in Alexiph. protulit, *φουόντας ἀγμέες*: Algas vias exponeret Plinius, h. e. litora. Nam ut etiam Virgilius canit,

Scopulis vlva refunditur Alga.

Quod si præsertim cum tempestuosū est, & saepe mare. Tunc abundanter latoribus electam & dispersam rusticis Acellare, ut Fœœifeces [Fœœum nam hoc marinum est] rastellis accumulanti, & in campo expositam fucillis versant quoad perarecat. Phycis siue Alga alterum genus est latifolium, folio quidem Artice, sed minimè acuminato, verū latitudine æquabili, & vndique sui simili, quales phyluræ: splenium enim longiusculum, aut fasciolam explicatam diceret cum vndis supernat. Hoc genus est quod describit Plin. l. 23. c. vlrimo, folio lato, colore viridi: congruitque optimè quod quosdam ait, Prafon & Zostera vocasse. Sed mihi videntur herba folia, quæ fruticu esse ait. Rufescent arida & complicantur, reuiscunt tamen aquæ imposita, & subito se explicant, ac distant, ut accitus viscere imaginetur, qui nunquam ipsa viderit.

Fœœum
marinum

Plin. 23.

Alga Cai-
salp.

Cæsalp. Alga in vadis limosis nascitur profundioribusque: expellitur autem ad litus cum fluctu: radices fert digitis crassitudine, geniculatas, nigras, humi repentis ramosas: quæ in multas veluti spicas desinunt, pilis sc. candidis, singulos geniculos circumuestientibus, similitudine Spicæ Nardi: folia Typhæ palustris, gracilliora tamen, mollioraque, initio virentia: dein cum exsiccantur, albescunt. Videtur Dioscorides Gnaphalion appellasse: item Galenus & Plinius. Theophrastus Phycos, & ut Theod. vertit, *Alga*, quod Prafon, i. e. Porrū vocant quidam, alii Cingulum, cuius radices Cæpis gethyis comparantur. Spicæ enim huiusmodi cæpas referunt, quas vulgo Maligias vocant.

Gnapha-
lion.
Diosc.

Imperatus Alga, plantæ marinæ folia adscribit, primo ortu iuncta, acuta. Alga autem nomen obtinuisse scribit, primo ortu iuncta, acuta. Alga autem nomen obtinuisse scribit ab effectu, quem in ligatura præstat. Et hinc quoque Baranis & Zelandis à foliorum similitudine *Nebelen* dicitur, quasi dicas ligulas astrictorias.

Algaem
dila.

Ab H. Lugd. pag. 371. huius plantæ duæ figuræ proponuntur: Prior inscribitur, Fucus siue Alga marina graminea: Altera, Fucus, seu Alga marina Lobelii. Hæc vocatur etiam Fœœum marinum & Palea marina Monspeliensium: item Algula Dioscoridis, & *αἰχμή* Nicandri.

H. Lugd.
icones duæ

Palea ma-
rina.

C. Bauh. pin. Fucus, siue Alga angustifolia siue vitriariorum: Fucus marinus primus, An- guill. Fucus marinus, Lac. altera, Dod. Alga, Carl.

Synon.
C. Bauh.

Ces. & Imper. marina, Lob. ic. p. 284. tom. 2. & in Adu. app.

Descrip. Toto tractu mediterraneo ad aquas Marianas Adriatici & Occidui maris vniuersi penè littoribus nihil vilius & frequentius fluctuante Alg.

Vires & usus. Lacuna ait esse insigne remedium & venenum lethale cimum & pulicum, aduersus eos Romæ expertum. Algam, eo quo Rob. Constantinus dixit modo, probè siccata pecorum & boum hybernæ stabulationi referuant. Ex eoq; qui hinc conficitur fimo, agros nimia defrugatione emaciatis & exinanitos stercoreant; læto segetum prouentum tametsi Alga ipsa per se, acutè est e mari aduecta, pro pingui fimo letamine sit, non secus atque marga. Alium etiam usum præstat hæc Algula tenuioris fortunæ hominibus: eā enim siccata, tomenti loco stras culcitras infarciunt. Quæ olim consimiliter ipsius cognita commoditas in fariendis centonibus, viridisque in castris, locum habuit, id quod etiam ex Vitruuio lib. 10. c. 2. intelligitur.

ALGÆ POMVM MONSPEL. CAP. III.

Descrip. Pila palmaria simile est quod vocabant Monspelij Pomum Algæ, pilæ Modò maius, modò minus: turget & plenum est aqua, coloris spongiæ, vel Fungorum Iuglandium, qui in sicco in album mutatur. Comprimitur etiam instar orbis, habetque umbricam, & iuxta illam nonnunquam pilos similes Algæ pilis.

An Alga fructus. Sine Algæ fructus, ut quidam volunt, non assero. Iuxta mare mediterraneum Narbonense collegimus, cum Alga resectum. Huius iconem in præcedenti tabella expressimus.

Nomina lingua- rum. Cæsalp. vocat Bursam marinam, pilam rotundam, intus concavam, ex muscosa substantia constantem, sc. capillari, colore viridi, relicto ostiolo rotundo, quæ lapidibus adhæret nigro quodam petiolo pendente: cum extrahitur ex aqua, ob velleris mollitiem confidet: siccatæ autem salfugo quædam tenuis & alba efflorescit, mordaci gustu. Hanc inter Alecyonia reponendam putat, & Alecyonium quartum Dioscoridis esse suspicatur. C. Bauhin. pin. dicitur Alecyonium 12. siue Bursa marina Cæsalpini.

PILA SIVE SPHÆRA MARINA.

CAPVT IV.

Descrip.



Sphæra marina rotunda est instar pilæ luforæ, minor, ac etiam maior, penè pugnum æquans: constatque pilis, capillisve tenuibus & paleis, quales in Alga vitrariorum cernuntur, coloris resuscantis. Iconem proponimus ex iis, quas sculptas ænimus. Cuius autem plantæ sit, nos latet.

Clariss. & ingeniosus. Felix Platerus existit.
Tom. III.

mabat esse Pilam marinam, cuius meminit Galenus de comp. med. lib. 1. cap. 2. in fine, & Arist. lib. 9. Sed hæc opinio non placet Lacunæ.

Pilam marinam *scilicet* *Salicornia* appellatam **Error.** Halcyonij genere esse alient Cornarius, etiam si *an* *pro* voce *scilicet* legendum esse, aliquando cum ratione, non temere putauerit.


Eos verò merito hallucinari crediderit Matthiolus, qui sibi persuadent, id esse Adarcem, quod vulgò Itali Pallam marinam vocant.

Rob. Constant. de genere Alecyonij pilam marinam esse ait & in algolis reperiri, atque etiam Algæ odorem referre: Northmannos vocare, *Pilote de mer.*

Ex maris lanugine constant Pilæ quædam in litore repertæ, inquit Cæsalpinus, sed nulla intus cauitate: agglomerantur enim festucis pilis vndis reiecti aliquando in tantam amplitudinē, ut vtraq; manu completi vix possit. Pilam marinam vocant, cuius sit mentio apud Galenum inter medicamenta ad capillos conseruandos, & apud Myrepsum ad lumbricos enecandos.

Imperator negat Ballam marinam esse de numero vegetabilium, quod sit ex minutulis paleis atque pilis congestus globus, à volutatione ab aqua marina factus. Et huius pilæ, quoad substantiam aliquot sunt species, alias litro similes, alias conuolutis paleis minutissimis, & alias glomeratis radiculis. **Bella marina, impo.**

ALGA CRISPA SCABIOSA RVBRA & pallida. CAP. V.



Ex foliis foliâ fractu contumacia nullo ordine, itēque ex ramulis, exoriantur: folia quidem sunt tenuia, lucem transmittentia, vncialia, & festucuncialia, culmum quædam lata, alia latiora, crispata, rubra, vel ex fusco pallida, in ramos diuisa, aspera, quandoque hinc inde verrucis albis, crustisque cinereis & Halcyonij, sapore præ-

ditâ salis in quibusdam adhærent radices crassæ, capite villosa, Algæ radici similes, quæ an ei propriæ asserere non aulam, potius tamen contrarium censuimus.

An Alga latifolia siue Algæ membranacea **Synonyma foris.** ceranoides C. Bauh. pin?

Gener Cherlerus attulit plantas aliquot Monspelio ex tractu Narbonensis maris mediterranei. **Cas. Bauhin.**

OLEA MARIS RVBRI, THEOPHRASTI. CAP. VI.

In mari rubro vocato in Arabia arbor exit, quam Oleam appellat Theophr. 4. hist. 8. Est autem hæc Arizæ folio similis: fructum verò proximum nostris Oliuis parit, & lachrymam emittit, ex qua Medici sistendo sanguini, medicamentum componunt.

De hac Plinius lib. 12. cap. 17. In Arabia & O.

Inhamon
not.

Plin. nos.

lea dotatur la-hryma, qua medicamentum conficitur, Græcis inhamon dictum, singularem effectum contrahendis vulnerum cicatricibus. In maritimis &c. Quæ hic sequuntur Theophrastus non de Arabicis Oleis, sed Oleis Indicarum insularum scripsit.

Diximus nos lib. 5. h. contra Apellinæ & Casalpianum, Gummi elemi & Oleam Aethiopicam non esse hanc Oleam maris rubri.

VIOVA. CAP. VII.

Alga
fili.

Vlua simillima est Algæ vitrariorum, sed multo purior. Sunt veluti teniæ angustæ coloris rubescentis, vel albi, quæ resiciuntur copiose a lacubus salis, prope Perous & Frontign. Viuæ palustris meminit Virgilius Aeneid. 2. cum ait:

Lamodæque lacu per nilem obscurus in vlua.
Delitui. Et I. 6. Aeneid.
Tandem trans fluvium incolones vluæque vi-
rumque
Insum limo glaucæque exposit in vlua.

In Bucol.

Propter aquarium vluæ præcumbit in vlua.

Et 3. Georg.

Nec nosit Salicæ flos, vluamque palustre.

Vluam commemorat & Ovidius 4. Metamorph.

Aec fletus vluæ Idem 6.

— præterque pauidibus vluam. Idem 8.

Lenis Salix, vluæque leues. Et

In medio thorus est de molibus vluæ.

Idem 5. Fast.

Fluminaam Lino celauerat vluam.

Luc ret. 2.

Ex limesa Alacius caput abdedit vlua.

Mirand.

Viridanti furit in vlua.

De Vlua loquitur etiam Virgilius lib. 2. c. 1. cum nonnullos scribit, ex Vlua palustri, componere tuguria testa. Seruius Maurus Virgilij explanator Algæ & Vluam congeneres facit. Algam quidem mari propriam ait, paludi vero Vluam. Et hinc ille versus.

Alga venit pelago, sed nascitur vlua palude.

Locus.

Et hæc occasio est, cur palustrem, lacustrem, fluuiatilemque Matthiolus cognominauerit.

Alga nihil penè differt ab vlua palustri inquit Rob. Constant. nisi colore, quem Vlua habet præsium, Alga verò subviridem, ad rufum tendentem. In virginosis autem & palustribus locis provenit, sine caule, foliis Graminis, ab imo cæspite prodeuntibus, longioribus quidem, nec accursis in summo: in stagnis sub aqua, testa, demersa conspicitur: cuius leuissimo aquæ motu vibrantur frondes quæ viridissimæ sunt: figuræ ligulæ, euulsæ ab radice aquis fluitant.

LVCVS MARINVS, DICTVS ROCCELLA tinctorum. CAP. VIII.

Locus.

Fucum multi vocant quamlibet plantam marinam, alij tamen terrestres plantæ radici similem specie faciunt. Allatum ex oceano habemus. Materies eius colorem præbet nobilissimi purpurei. Quapropter priscis fœminis tingendis generis expentum, in fucum. Vnde Fuci nomen dimanauit, quod pulchritudinem fucatam atq; apparentem tantum conciliat. Existimat Dioscorides Fucum esse herbæ radicem, sed deceptus fuit similitudine Nam & hæc & aliæ multæ marinæ radicum herbæ tum terrestrium figuram æ-

Fucus
men un-
do.
Diosc. la-
pser.

mulantur. Fucus hic antequam in tinctoram redigatur, parte interna ex rubello candicat, externa nigrescat. Euocatur viridus eius color maceratione facta in vrina. Sic paulatim tinctoram acquirit, donec ultimo species quædam (Soda) salis alkali complementi loco, & ut densetur, addatur. Fuci in compositione portio ad vrinam est quintupla, plus minus, pro bonitate Fuci. Maceratio vno mense completur. Salis pars duodecima additur, quod maceranti Fucio adiectum colorem pariter, odoremque Violæ excitat atque producit. Vocant hodie *Fucum Recellum* a colore rubro, quem præbet, inquit Imperatus lib. 27. c. 9.

Color
rando
tio.

ALGÆ TINCTORIA. CAP. IX.



Algæ habui do Doures portunculam, cuius inscriptio erat Alga 1. ex Candia quæ ei non ab similibus, quæ inuoluuntur vitra, latior, pari tenuitate, & lentore, fructu contumaci, colore purpureo obscuro, seu spadiceo, sapore nullo eidente, propter vetustatem forte: charam, cui inuoluebantur, purpureo floridiore tinxit.

An Ferd. Imperato, Alga Fucus de lata ex Synony. Candia quæ tinctorum vtuntur nomine Roccellæ.

An C. Bathin. pin. Fucus siue Alga angustifolia 6. siue Alga cornu cerui diuisurâ: Herba Cretica Imperati, quæ tinctoribus Rubella dicitur.


Fucus capillaris tinctorum.



Fucus hic capillaris, quem Imperatus lib. 27. c. Descripto citato ex o. rio. riente delatum scribit nomine Roccellæ, & excellentissimum ait ad tinctorum, cum nobis incognitus sit, fuscus describi non potuit.

An C. Bauhin. pin. Fucus ex Imperato 2. siue Fucus capillaceus Roccellæ an Fucus 3. Anguilla-

Fucus

*Fucus verrucosus tinctorius.*Descri-
ptio.

ET hic ex eo-
rum numero
est, in nobis ha-
ctenus incogni-
ti sunt, quique
apud tinctores
etiam Roccella
dicitur, eadem
Imperato, loco
sepius citato,
autore.

C. Bauh. pin.
dicitur. Fucus
ex Imperato in-
cognitus.

3. siue Fucus
verrucosus tin-
ctorius Roccel-
la.

CORALLOIDES LENTA

femineacea.

CAP. X.

Descri-
ptio.

A Pedes la-
to, quo
scopulis ap-
picilla hærere
solet, rami
prodeunt co-
plures, do-
drantales,
multipliciter
divisi, lenti,
flexiles, tena-
ces: quorum
minores in
minima femi-
neacea &
propemodum
muscosa at-
que capilla-
cea, crispaeque
segmenta te-
cantur. Colo-
re porro va-
riant. Sunt enim quæ limbo, aut pallido, ac si-
bo; aut quæ fusco, subnigro, rufis, saturate ru-
bio, vel purpureo; alia denique quæ viridi sunt
colore, & hoc in eis visum iocundum, quod bico-
lores plerumque sunt singulae plantæ, crassiores
rami vni, tenuiores alteri, colore donati plati-
que transparenti. Quorum colorum varietates
multas adferuamus. Sapor & gustus saluginosus,
pisculentus, sub dentibus nudi labuloni ex-
hibent: sed glutinis modo atteruntur, cui qui-
dam rami penè concolores visui. Qui hepatis
venas a parenchymate separatas viderunt, rem
huius Coralloidi apprime similem conspexerunt.
Quædam asperantur hinc inde crustaceis
tuberculis albis; alteri adhaerens portio spon-
giæ ramosæ Corallinae odinatum.

Pro hac placet apud H. Lypdunensem pag.
1272. Fuci siue Algæ tinctoriae figura, siue de-
scriptione. An C. Bauh. pin. Muscus marinus 4.
siue tenuissime dissectus ruber? An Læmo
Leam. de oculi. nat. mirac. Algæ altera species,
Toiq. III.

Fucus siue
Alga tin-
ctoria
Lugd.

Zelandis VVoer. nonnullis inuert dicta?

Copiose obseruatur: atque collegit Cherlerus
in tractu illo Narbonensi maritimo quo Magda-
lona Agdam tenditur.

Locus.

FUCVS. CAPILLARA. DICTVS.

CAP. XI.

Capillara dicta planta, est ramis donata lon-
gis, minutissimis, frequentibusque, ideoque
capillatibus, colore rufis atque purpureo. Trun-
cis aliarum plantarum innascitur, insar Epi-
themi. Frequenter reperitur in Fuce cupres-
sæ, inquit Imper. lib. 27. cap. 9.

Descriptio.

ALGA ANGUSTISSIMIS FOLIIS.



CAP. XII.

Alga minimum quoddam genus Cæsalpi-
ni, folijs est angustissimis, cauliculo spico-
so, Gramini simili, dodrantali, cui lanosa sub-
stantia infuse et aggregata, qualis Adarce
fertur apud Dioscoridem. Planta hæc quam
Theopr. tradit Gramini similem, reperitur in
nostro mari, inquit Illic. C. Bauh. pin. vocat Fu-
cem siue Algam angustifoliam 7. siue Algam
gramineam folio.

Descri-
ptio.

ALGA CERVICORNI DIVISURA

CAP. XIII.



EST nobis
ex Cher-
lerianis plan-
tis una, folijs
membranis,
rubentibus,
duarum aut
trium uncia-
rum, cervini
cornu denti-
culis incisa,
sapore salso.
Enascitur ex
excremento
marino vt Fu-
cus Capillara,
quam non au-
sim asserere
planè diuer-
sam esse ab
Alga crispa.

Descri-
ptio.

Icones.

Hujus figu-
ra fortè in media tabella Palmæ marinæ Chon-
dryllæ diuisuræ.

PALMA MARINÆ QVIBVSDAM.

CAP. XIV.

Palmæ marinæ Theophrasti nonnino mitte-
batur & hæc ex Italia fracta C. Bauhino.
Ejus ramuli erant plani, dimidiati cubni latitu-
dine, multifidi, nigri, aut cinerei, folijs amisti
gracilibus, bicubis, diuisuræ accedentibus ad
Chondrillam, multo tamen minoribus.

Descriptio.

C. Bauh. pin. Muscus marinus 3. siue viridis
multifido folio. Muscus marinus Clus. hist. Pal-
mula marina Imperat. Nos ad Bryi genus quod-
dam referendam censuimus.

Synon.

Coralloides tenuifolia obsequiosa minima.

Craſſuſculi ſunt ramuli, nigricantes, cornei, obſequioſi, multiſidi, Coralloeidis fruticoſi-chorulis ſimiles, ſed minus duri, perſuſilli, nulla cruſta obducti. Ex Italia Fratri C. Bauhino miſſi.

DE MARINIS ABIETE ET QUERCV,
veterum ſementiæ.

CAP. XV.

Locis.

Quercus & Abies, authore Theophrasto l. 4. cap. 7. ad mare, terrenæ quidem ambæ ſpectantur: ſed tamen naſcuntur ſuper lapides atque ſiſtilia: carent radicibus, ſed modo patellarum adherent. *Folium* ambabus velut carnoſum, oblongius, craſſumque: & Abieti craſſius, frequens, nec leguminum ſiliquis abſimile: concavum intus, nec quicquam intra ſe continens: Quercui tenue ac potiùs Tamaricis; color ambabus accedens ad purpuram: forma tota Abietis erecta, Quercus flexuoſa, atque in latitudine magis ampliata: ambæ multicaules ſunt, ſed ſimplior Abies: rami Abieti, longi, recti, ſolarii-que: Quercui breuioreſ, contortioſe, ſpiſſioréſque: magnitudo tota ambabus cubitalis: parumve altior, verùm major Abieti. Quercus ad lanas inſciendas vel mulieribus vtilis: ramis adnexa pendent pleraque animalium teſtigerorū, ſubter alia quædam cauli adherent: ad quædam tota obſa ingrediuntur millepedæ, & aliæ quædam generis ejuſdem beſtiolæ, quodque polypi ſpecimen gerit. Hæc itaque terrena, contemplatūque conſtant ſilia. Quidam porro vel alteram Quercum naſcentem in alto referunt, quæ etiam fructum fert, & glans ejus commoda eſt. Quin & alias magnitudine inſignes quaſdam compertas, homines nantes, ſequæ ſubmergentes referre, traditur. Hucſque Theophrasti interpres Gaza. *Cæteris* Quercus & Abietis hiftoriam conſuſiſſe videtur Theophrasti, multæque notas Quercui tribuiſſe exiſtimat etiam Cluſius, quæ Abieti, aut ejus generis arbori marinæ meliùs fortaliſſe convenirent.

Quercus
Alia.Theoph.
not.

CREMENEI ISTRIS ABROTONI
vel Thymi foliis.
CAP. XVI.



Deſcript.

Figura ejus & facies, teu ſi quis arborem quandam aſpiciat. Nam primum, *truncus* eſt pedali ferè, craſſuſculo, tuberoſo, ad radicis alicujus inſtar fibroſo, nigro. Ab hoc ſupernè rami exeunt compures, pedales, breuioreſ, in alios minores diuiſi, foliis veſtiti Abrotoni & multi-

plieriter diſſectis, quorum ſegmenta in oblongum intumeſcunt, turgescuntque, colore pullo

aut nigricante: plerisque cæterum locis cinerea quadam ſalfugine incruſtatur, alicubi etiam fungoſo & ſpongiolo tegumento. *Sapor* ſalfuginofus, ſicut & odor.

Valerandus qui ex Iſtria detulerat, atque à quo habuimus, hæc illi adſcripſerat: Abies marina, Cremenei vocant Iſtri. Communicauit tandem ramulum ex Italia miſſum, frater C. Bauhinus, nomine Abietis marinæ, foliis intumeſcentibus. Et hæc jam dicto nomine bene depingitur ab Imperato, qui Fuci follicularis ſpeciem facit & Gongolarum vocat. Figura etiam à Lobelio in Ol. ſp. 653. & Ic. Plant. tom. 2. p. 254. exhibita, titulo Fuci marini foliis Abrotoni maris, quident exprimit noſtrum Cremenei Iſtriacum:

Abiema-
rina,

C. Bauh. pin. Fucus folliculaceus 8. ſive foliis Abrotoni: Fucus marin. foliis Abrotoni maris Lob. Fucus marin. tenuifolius Tab. Muſcus marin. foliis Abrotoni H. Lugd. p. 178. ſine icone. Gongularis marina Theophrasti. Imperati. *Huc* nos etiam referimus Fucū, quem Hiſt. Lugdunēſis ibidem vocat *porrum* Theophrasti, & Tinctorum, in ſcopulis & petris naſcentem, unde auuſum vrinantes Spongiarii referunt, foliis tenuibus, Feniculo ſimilibus, rubris, ſic tamen, ut quædā intermixta ſpectentur adhuc albicantia.

Synony-
ma

FRUTICOSA MARINA PLANTA, QUI-
buſdam Conſerua lignoſa.

CAP. XVII.



Latè baſi vel radice ſcopulis adheret & hæc fruticosa marina planta, quæ pedalis vel cubitalis ferè. Ejus caudex lignoſus, tortuoſus, totus niger, vel pul- lus, quali aduſtus foret, ru- goſus, fragilis, in ramos pal- mares diuari- catus, quos obſident vndi- que verrucoſa tubercula, mo- dō longiora,

Deſcript.

modò breuiora, ad radicis Polypodij tubercula accedentia, quæ verſus ſuperiora Ciceris penè magnitudine, oliuari formâ, rugoſa, criſpa racemorum modo cohærentia, in quorum turbina- to ſine exeunt *coliculi*, ramulive nigri, vel ruſſi, inque ſegmenta incodita caſſi, ſubinde à medio ad ſummum uſque denticulati, in quibuſdā ſo- lia ſegmentis ad Abrotonum accedunt, paullo tamen latioribus. *Fruticosa hæc planta non parum* variat, ita ut quis diuerſas plantas ſuſpicari poſſet. Quædam enim ſtatim à radice plures ſtolo- nes producit, aliàs vnum plerumq; videtur pro- ferre. Obſeruantur etiam ad radicem pili, qua- les in Algæ vitrariorum radice: Quædam to- phaceis cinereis cruſtis obducuntur: aliis adhe- ret linum capillare, vel muſcus tenuiſſimus: aliæ mytilos habent, aliæ ova Sepiarum credita: al- iæ pilâ marinâ obuoluuntur. Sapor ligno nul- lus inſignis, niſi aliquantulum adſtringens, cum ſcui

leni fallugine, quæ in folijs euidetior.

MUSCI MARINI GENVS FOLIIS
pinnatis: & Abies Clusij Belgica,

CAP. XVIII.

Descri-
ptio

Trium vnciarum est altitudine, in pulchros
ramulos vnciales & fescunciales fissa, viuido
virore tincta, folia pinnatum annexis, vt in Viola
aquatica, apophysis nonnullis inæqualibus.

An Mus-
cus
coralloides
alter al-
bus,
Lob.

An Lob. Ic. pl. tom. 2. p. 1050. Muscus cor-
alloides alter albus? Icon Lobelij quidem con-
uenit sed color, qui nos dubitare facit, discre-
pat.

Abies
marina
Belgica,
Clus.

Clus. hisp. hist Lobelij icones habet pro Abie-
te marina Belg. de qua scribit quæ sequuntur:
Abietem marinam Theophrasti mihi ignotam
facior; memini autem obseruare annis 1566. &
66. in Flandriæ ora maritima arbusculam ostre-
orum testis & mytolorum conchylijs adnatam,
quæ Abietis figuram ita referebat, vt pumila
Abies videretur, ramulis ordine vtrinque dispo-
sitis. fragilis admodum, pusilla, rari palmi altitu-
dinem excedens, ex tenuibus veluti squamis con-
texta, nonnunquam omnino plana, & alia inter-
dum in orbem prominentibus ramulis dispo-
sita.

Locus

Synonyma
C. Bauh.

C. Bauh. pin. Fucus folliculaceus 13. siue A-
bieti similis maritima. H. Lugd. p. 1368. sine ico-
ne, Muscus candidus coralloides, squamulis lo-
catus.

ERICA MARINA QVIBVSDAM.
CAP. XIX.

Descri-
ptio.



Vt minor
est quam
Creminea Al-
gata tota te-
nuior, ramis
tenuibus, non
lignosis, rigi-
dior, non mi-
nus tamen fre-
quentibus. imò
lanius diuilius
& ad fœnicu-
laceam Algæ
accedentibus, si-
bra tamen vi-
cunq; tenuio-
ribus, inque
rigidulas ve-
siculas desinen-
tibus: nigricat
iam sicca.

Similis missa
est f. æt. C. Bauh ex Italia sine nomine, in quâ rui-
gid. l. folia non animaduertit: An eadem, vel di-
uersa asserere non ausimus: in nostra icone por-
tionem præstari exhibemus.

Synonyma
C. Bauh.

An Myrica marina Batauca Clusij
C. Bauh. pin. Fucus folliculaceus 14. siue Ta-
marisio similis maritima: Myrica marina Ba-
tauca, Clus. hist. An Tamarisciola Fucus, Im-
perati: Nos hanc sui generis plantam facimus.

FVCVS CUPRESSINVS IMPERATI.

CAP. XX.

Descri-
ptio

Fucus cupressinus, quem aliqui existimant
Quercum Theophrasti, Imperato monente,
scopulis & restaceis marinis adheret. In

ramos abit, & hi rursus in minores, fronde breui,
copiosâ, & acuminata, colore virescente atque ni-
gro, quando exsiccantur. Altitudo dodrantalis, fi-
gura quasi in conum fastigiata, & Cupresso simil-
lima. Frequens admodum est planta, qua piscato-
res ad cooperiendos pisces vtuntur quos recen-
tes conservare volunt.

Synon:

Fucum hunc cupressinum Imperati vocat C.
Bauh. pl. Fucum folliculaceum 15. siue Cupresso
lailem.

Cupressus marina Belgica, Clusij.

Me ninit Clusius anno 1566. & 1567. in Flan-
diæ ora maritima arbusculam ostreorum
testis & mytolorum conchylijs adnatas obserua-
re arbusculas, quæ Cupressos ita æmulabantur,
vt satis mirari nequiret providentiæ diuinæ opus
& artificium, ramulis frequentibus in orbem, sed
nullo ordine nascentibus, & sursum spectanti-
bus, cupressinorum foliorum modo efformatis.
Harum autem, tamen aliquot annis inter char-
tas aduersatarum & compressarum rami, si in vi-
trum aut aliud vas aqua plenum injiciantur, sta-
tim sese explicare, & in orbem diffundi, seque
surrigere incipiunt: eaque aded de causa
piscatorum vulgus satis obscurum illis nomen
indidit.

Locus

Descri-
ptio

FVCI PLVRIMI ALII. CAP. XXI.

Fucus marinus dictus Lanuta, albus.

Planta marina, dicta Imperato Lanuta Fucus
marinus, proximius quam vlla reliquarum
dictarum ad herbæ cuiusdam radicem accedit.
Ramicandidi, flexiles, lumbricis similes, super-
ficie inæquali, retis instar intertexti, breui lanu-
gine vestiti: quorum extrema in germina sinu-
tur, orbiculati, in speciem alicuius stellæ, aut
ramulorum umbellæ congesta. C. Bauh. pin. Fu-
cus Imperati incognitus 5. siue Fucus marinus la-
nuta.

Descri-
ptio

Synon.

Fucus Radicella dictus, siue Vermicu-
laris albus.

Imperato Radicella est Fucus vermicularis qui-
dam, itidemque herbarum radiculis similis.
Color albus & dū adhuc recens est aliquantulum
purpureus. Alijs herbarum stipitibus increscit
quemadmodum Epithymus: Estque Fuci cupres-
sini frequens incola. C. Bauh. pin. Fucus ex Impe-
rato incognitus 6. siue Fucus Radicella, siue Ver-
micularis.

Descri-
ptio

Synony-
ma.

Fucus Terzola, Vermicularis species, facie Myrica,
coloris crocei.

Terzola Imperato species est Fuci vermicula-
ris, summitari Myricæ quodammodo effigie
respondens. Eius substantia tenera fragilis, pelloci-
da, & ad virorem vergens rami præcipui parvis
quibusdam appendiculis circumdati ordine quo-
dam tertio quoque interstitio: quorum exma
quasi trituncata, sepe etiam bifida. Altitudo mediam
spithamam ad summum æquat. Et quavis ramis
sit subtilibus, facile tamen in aëre suapte nature
sustinetur. Appendices interdum inæquales fiunt,
alijs supereminetibus alijs. Nascitur in Trospe
agminatim, & marcescens ereceum acquirit colo-
rem.

Descrip-
tio

Locus

Synonyma.

C. Bauh. pin. Fucus ex Imperato incognitus 7. siue Fucus Terzola, Vermicularis species

FUCVS TAMARICOLA, SIVE TAMARISCIFOLIA marina.

IN ramulis palmaribus gracilibus denticulata pulchrè foliola, vt Myrica Narbonensis ramulum arbitreris.

Descriptio.

Tamariciola, inquit Imperatus, est inter Fucos teneros & fragiles recensenda, sicut Terzola. Scapus erigit rectos, teretes, in acumen delinquentes, à pede ad summa usque minutulis appendiculis circumdatos, quarum vnaquæque fronde quadam præterit vestita, à Tamarici fondibus non admodum dissimili. Color vtplurimum aqueus. Siccata pennarum fasciculum quodammodò refert.

Synonyma.

Fucum hunc Tamariciolam Imperati, C. Bauhinus in pin. eandem suspicatur cum Myrica marina Batavica Clusij, quæ ipsi est Fucus folliculaceus 14.

Fucus marinus Forcellata, Lumbricaria species.

Descriptio.

Forcellata, Imperato autore, est è numero Lumbricarum dictæ, quæ ab imo successivè in frequentes diuiscatur ramulos, tandemque in minutas terminatur fusciculas Tertiam spithameæ altitudinis partem nanciscitur. Color ex rufo & purpureo mixtus. Calp. Bauhin. pin. Fucus ex Imperato incognitus 8. siue Fucus forcellata lumbricalis species.

Synonyma.

Fucus Tremula, media inter Palmetam & Lumbricariam.

Descriptio.

Tremula Fucus medius inter Palmetam & Lumbricariam. Rami vna parte compressi, quorum diuisura foliis quibuldam ferulaceis similis aperta, expansa, varaque, quorum extrema incurvantur. Contrectati facillè tremunt, quod à mediocri crassitie cum firmitate coniuncta accidit. Innascitur testaceis marinis, vt Imper. annotauit. Calp. Bauhin. pin. Fucus ex Imperato incognitus 9. siue Fucus tremula.

FUCVS SCOTARA, SIVE PENNACHO marino.

Descriptio.

Scoparia, Pennachio marino dicta fronde villis pennarum similis est, pilis longiusculis, itè alijs brevissimis vestita. Nomen obtinuit à frondis illosi ramos ambientis specie: Summitas in æqualem & quasi derafam planitiem terminatur, idcirco & scopam quodammodò representat, aut pictorum penicillum.


ROSA MARINA.

CAP. XXII.

Descriptio.

Patulis in orbem est ramus palmo longioribus, Quercus marinæ diuisura, tenuiore, ligulis angustioribus, coloris ciuericei, per extremum digitatis, crispis, asperis.

Hanc habemus ex plantis Valerandi qui eam



Rosæ marinæ titulo donauit. An quis alius, & quo nomine, hanc agnouit, non occurrat.

BVLBVS MARINVS CRINITVS. CAP. XXIII.



DE hoc Bulbo

marino agitur de hac legumina in Navigationibus Indico sermone conscriptis. Inter quasdam insulas huius tanta stirpis elegantes expressæ copia provenit, vt naves hinc supergredi coactas quandoque remoretur. In fundo maris crescit, quatuordecim vel

quindecim brachiorum longitudine, quatuor vel quinque altitud extra aquam eminens, colore cæruleo, caule satis crasso, ex quo per intervalla oriuntur bulbi ex fastigiis capillatum quoddam emittentes. Radix crassior, bulbosa, quam plurimis fibris capillata.

H. Lugd. p. 1505. Bulbus marinus crinitus, & C. Bauhino phyt. & pin. ubi inquirunt quid sit

ALGA MEDERENSIS GRANDI FOLIO.

CAP. XXIV.

IN Algarum genere recipit Cæsalpinus grande quoddam folium, æquale, ac planum, simile prælongis chartarum schedis quod ex Medera aduenit cum saccharo: vtuntur enim eius folijs pro veste ac tomento, ne panes sacchari atterantur. Hoc genus quod adfertur cum saccharo ex Oceano Atlantico, est Theophrasti, quod admirabili magnitudine crescit circa Herculis columnas: Dioscoridis verò Phyci genus lato folio.

Imperatus lib. 27. cap. 11. vocat Fucum giganteum, alij Algam laram: Nasciturque in maris sinibus, folia sunt substantia tenaci & coriacea.

ecce. Iis vtuntur Oceani inhabitatores loco chartæ, & saccharum etiam iis inuoluunt. Eidem dicitur Palmifolium Giganteum, alijs *Brandine* à folij longitudine.

Lobelio in obs. p. 652. dicitur *Vrak* Nortmannorum. Hist. verò Lugdunensi *Zoster*, id est, Cingulum & Baltheus.

Synonyma
C. Bauh.

C. Bauh. pin. Fucus siue Alga latifolia 6. siue chartæ similis, costa carens: Folium grande ex Algæ genere &c. Eidem Fucus siue Alga latifolia 7. siue coriacea. Palmifolium giganteum, siue Fucus giganteus Imper. An vrak Nortmannorum Lobelio.

LACTUCA MARINA SIVE Intybacea.

CAP. XXV.

Descriptio.



Maris sinubus innatata quædam sunt folia, ab vno veluti pede prodeuntia, membranacea, læuia, & cum exsiccantur quasi papyracea, pellucida, inuicem incumbentia, complicataque & corrugata, colore herbido, dilutoque, Lactucam aut Intybam crispam quodammodo representantia, vel Rosam

expansam. Talis Istriaca, talis & Narbonensis quæ minor, cui adhæret Muscus marinus.

Lact. mar.
Aetio.

Lactucarum in mari meminit Aëtius lib. 17. cap. 15. aitque esse germina lata, & oblonga ac viridia, tenuia & subrugosa, ac veluti conduplicata, ad littora maris per fluctus eiecta.

Facile tamen crediderimus Bryō Theophrasti, Dioscoridis & Plinij esse stirpem de qua hoc capite agimus, & Aëtij Lactucam maritimam.

Nomina,
linguar.

Dodonæo gall. Muscus marinus, Theophrasti *ῥέον θαλάσσιον*, gall. *Mousse marine à large feuilles*, Brab. *Zee mosch*, viderur prima species *maris*, i.e. Fuci aut Algæ Dioscoridis, Lat. in sol. vocat Fucum marinum priorem, Fuci Theophrasti genus primum, non modò folio lato, sed & extenso, ac herbidi coloris: aitque hujus meminisse Aristotelem de animal. hist. c. 6. definiens esse purgamentum maris, fierique Aëstatis initio, eoque ostreas cum & pisciculos ali. Atque hujusmodi Fuci genus Oceano germanico familiare ait Dodonæus, circa saxosos scopulos, quod vnà cum mitulis, conchis, ac ostreis prima Aëstate subinde ad vicina loca deferitur.

Alg. fus.
frutic.

Rob. Constantino apud Amat. Algæ siue Fuci marini genus hoc suffrutex viderur potiùs, quàm herba. Vocat autem Viscum marinum, folio crispæ Lactucæ, & colore ab Alga differens, quod surculis rulis germinet, substantia verò & toto aspectu glutinum taurinum ementiatur. Cæsarpinus Bryon Theophrasti & Plinij vocat. Imperatus Folium marinum, siue Lactucam marinam.

Topi. III.

C. Bauh. pin. Fucus siue Alga latifolia 7. siue Muscus marinus Lactucæ folio, Fucus marinus, 1. Diosc. & Theophrasti: Bryon Lactucæ foliis Plinij & Lobelij: Muscus marinus alter, Matthiol. & Cast. Muscus marinus Theophrasti, Dodon. gall. & Lugd. Therapidion. Cratææ, Ang. Bryon. thalassion, Turn. Muscus marinus virens latifolius, Dodon. Belg. Lactuca marina, Tab. *Fallitur C. Bauhinus*: dicitur Tabern. Lichen marinus, *Meersiekten*.

Synonyma
C. Bauh.

C. Bauh.

Vires Bryi Dioscoridis & Plinij huic plantæ conuenire non negamus. Ex autem traditæ sunt cap. 1. hujus libri, Commodius autem hæc applicatur arthritidi quàm Muscus capillaceus, siue Co allina. Camer. easdem penè vires, quas Pulmonariæ arborum adscribit, nisi quod propter salsuginem magis extenuare dicant. Ea propter vtilissimam prædicat applicatam calidis tumoribus & podagræ à bile orta.

Vires
& Vfus

Fucus Linza dictus, Lactucæ marinæ similis.

Fucus Linza dicta, Lactucæ marinæ similis: sed in eo differt quod tota in fascias (Linze) longas diuisa sit, eodem Imper. auctore cap. 12.

Descriptio.

C. Bauh. pin. Fucus siue Alga latifolia 2. siue Muscus Lactucæ marinæ similis.

Synonyma

ALGA LONGISSIMA, LATO TENUIQUE folio.

CAP. XXVI.

Hæc posteriori non multum ab similibus, ex radice nigra, fibrosa, pediculus tenuem, triuicalem emittit, qui in folium sesquicubitalis longitudinis, vnciarum quinque vel sex latitudinis, planum, per margines hinc inde conuolutum absimitur: coloris pallide virentis est, substantiæ tenuissimæ membranæ: hunc cum aliis maris mediterranei purgamentis reiectum, non longè à montis Cetij radice, collegit C. Bauhinus. Dicitur autem ei in prod. Fucus maritimus 4. siue Fucus longissimo, latissimo, tenuique folio. Eid. pin. Fucus siue Alga latifolia 4. siue Alga longiss. lato tenuique folio.

Descriptio.

Alga longissimo, lato, crassoque folio.

Radice est breui ex crassis fibris composita, ex qua pediculus crassus, rotundus, semipalmaris prodit, qui in folium expanditur: folium vnum ingentis longitudinis pedes aliquot & vlnas excedit (rariùs ex vna radice duo folia ejusdem omnino formæ & longitudinis;) & latitudine vncias quatuor superat, ejusdem ferè per totum folium, principio excepto, latitudinis, in medio æqualiter planum, ad vtrumque verò latus paruum, conuolutum, tortuosum & sinuosum, obscure virens, crassum, & dum terræ adhuc affixum, tactu forma gelatinæ, viscosum & madidum: quare propter nimium madorem vix asseruari potest, licet sæpiùs Soli exponatur: nam quoties chartæ reponitur, mador iste cum fetore recrudescit, ita vt à corruptione non nisi post aliquot septimanas, donec plantæ siccetur, seruari possit. In Galliis ad maris littora versus *S. Malo* prouenit & è natali solo facile eruitur.

D.

C. Bauh. prod. Fucus maritimus 3. Eid. pin. Fucus siue Alga latifolia 5. siue Alga longissimo lato crassoque folio.

Synonyma

A a a a

Fucus axungia accedens.

Descript.

A *Sfunsiole* dicti Fuci sunt consistentiâ crassâ, & dum in aqua adhuc sunt, tenera, & axungiam referente, quippe qui contracti liquecant & dissoluantur. Sed in aërem expositi, humor exhalat, & membranæ remanent siccae atque subtiles.

Est & hujus species quædam cristæ gallinacæ similis, quæ ab exiguo principio instar Rosæ majoris dilatur. Folia ejus in eminentias terminantur, in morem cristæ galli, colore suo primario croceo.

Alia etiamnum Fuci cristati est species latifolia, cujus nimirum folia ad palmarem amplitudinem extenduntur, in ambitu Aloes Americane instar simbriata, colore ruffo & croceo sicut prædicta. Nascuntur ambæ in cœuernis & locis opacis. Dantur à nonnullis phthysicis & hæctica febre consumptis.

C. Bauh. pin. Fucus ex Imperato incognitus
1. siue Fucus axungiola.

PENNA MARINA.

CAP. XXVII.

Descriptio.

Penna marina caulem surrigit substantia Adianto similem: figura totius alam avis alijus refert pilis raris è costa prodeuntibus. Scopulis innascitur, testisque marinis modico intervallo à se invicem distica.

Synonyma

Imper. l. 2 c. 2. Penna marina C. Bauhin. pin. Muscus maritimus 3. siue pennæ similis.

Pennaria marina.

Descript.

Est hæc pennæ similis, attamen ramorum divisiura dissimilis: qui subtiles & Adianti firmiusculi in palmum expansi sunt, sicut alia plurima marina Ramorum divisiuris muscositas quædam telam araneæ referens adhæret, quæ eadem & in pennis ipsis observatur.

Synonyma

Imper. Pennaria marina: Casp. Bauhin. pin. Muscus maritimus 7. siue Adianto affinis.

MYRIOPHYLLVM PELAGIVM.

CAP. XXVIII.

Descript.



Elegantis & peregrinæ hujus plantæ picturam, Clusius cum caulis infra parte & radice à Cortuso accipiebat qui valde apto nomine Myriophyllum pelagiū Cortusi, appellavit. Muscū maritimum 6. siue Filiciæ folio, C. Bauhin. pin. Piscatores verò Italici *Pennathio delle Nisse*, & *Palma di Nettuno*: quidem etiam

Scettro di Nettuno nuncupabant.

Locus.

Nascitur in altissimis gurgitibus maris Illyrici, unde piscatores extrahunt hamis & instru-

mentis, quæ ipsi *Sperme* appellant.

Referebant præterea utilem esse aduersus morsum omnium serpentum marinorum, & virulentos piscium idus: applicatam supra leuia recentia vulnera, ea vigintiquatuor horarum spatio curare. Cortusus autem ejus periculum se fecisse scribat, ad vermes necandos & ejiciendos, illamque non minoris esse efficacis deprehendisse, quàm quævis Corallina, etiam minore quantitate datam.

POLYPODIVM MARINVM.

CAP. XXIX.

Nomen obtinuit à similitudine *caulis*, quam habet cum terrestri, qui repens hinc inde locis hæret, unde progignitur, *folia* quoque simili ratione modoq; Polypodij quercini surriguntur, sed figura dissimili, & ad Adianti folia accedentia. Scapus substantia constat lanuginosa. Sæpius Zoophytis hæret, quæ referente Imperato, Italici Neapolitanis *Carmine* dicuntur.


Etymon.

Polypodium maritimum, Imper. Muscus maritimus 8. siue Astiantæ similis alter, C. Bauh. pin.

Synonyma

SCVTELLARIA SIVE OPUNTIA MARINA.

CAP. XXX.



Iter naturalia nostra à multis iam annis pulchellam plantam marinam reservamus sub nomine *Colique*, forte à piscatoribus maritis ita dictam, unde veronacti sumus, non amplius recordamur. Pede est crassiusculo, fungoso vnciali. A quo *fiorelli* (si ita vocare fas sit) prodeunt

Descript.

plures ex meris foliis mutuo incubitu contates, ita ut alterum ex alterius margine nasci videatur, instar corollæ cujusdam qua preces connumerari solent: aut uti propius accedamus in re non viq; adeo distinctum, sicut in sicu Indica quæ Opunciam vocant. Surculi illi rursus in alios teretes divaricantur. Singularia porro illius concatenationis, *folia* orbiculata sunt, utcumque latiora quam longiora, nummi instar compressa crassiuscula tamen, nonnihil rugosa, quæ diligentius inspecta velut ex binis membranulis compacta videntur: ac prima quidem vnguis ferè latitudine, pauca quædam lupino paulo majora, alia medio modo se habentia. Cæterum superius plerumque folium qua gibbum inferioris excipit modicè sinuatum est. In exteomis quæ sunt foliola, plerumq; vix Lentena superat. Adhæret nostræ plantulæ in quibusdam totus, muscus quidam candidus, capillaris. Tota plantula saluginosa est tum odore, tum sapore. Dentibus muscus adhærens commotus stridet.

Eam ad Clusium mittebat Neapoli Imperatus, adscripto Sertulariæ nomine, quia veluti sertum aliquod, aut corollam ipsius folia ita connexa repræ-

ta representant. Cortusius verò è Corfica plantam se accepisse scribebat Coralline latifolice appellatione: nomen autem illi imposuisse, Opuntia marinae littoralis & saxatilis; satis (Clusij) quidem sententia) commodà ratione. Nā Theophrastus 1. cap. hist. c. 12. scribit circa Opuntem herbulam esse quandam, quæ ex foliis radicem mittat, ac cum suauitate mandi possit. Plinius verò ipsum sequutus lib. 11. cap. 17. circa Opuntem, inquit, Opuntia est herba, etiam hominidulcis: mirumque è folio ejus radicem fieri, ac sic eam nasci. Et certè credibile est hanc plantam recentem cum aceto, sale, & oleo, vel etiam sine sale, non minus suauiter edi posse quam Portulacæ marinæ & similium folia.

Cæterum qui Cortusio plantam è Corfica insula mittebat, addebat iisdem facultatibus eam polleere, quibus reliquæ Corallinae.

C. Bauh. apud Matth. vocat Ficum maritimum, atque in foliorum summitate producere florem paruum oblongum, modò vnum, modò plures, colore rufescente. In pin. vocat Fucum subrotundum, siue Fucum folio rotundo: Sercolariam Imp. Corallinam latifoliam & Opuntiam marinam Cortusi: Lichenem marinum Clusij histor.

PALMA SIVE MANVS MARINA quibuldam.

C A P. XXXI.

Descript.



A Mputatâ à radio cubitoq; manum affabrè exprimit, ac ex carpo crassiflore (compresso tamen) albicante, angustiore, in metacarpum sensim dilatatur, hinc in digitos quater nos, quinos, pluresve ferrugineos, angulos, fungosos, multidos diuiditur, qui rursus in minores particu-

las subdiuiditur. Tota substantia coriacea quodammodò est & membranosa: sapor & odor salus.

Gesneriana icon de Zoophytis marinis ord. 7. circa 15. digitos habet. Vocatur autem Manus marina à similitudine quadam.

C. Bauh. pin. Fucus ex Imperato incognitus 17. siue Fucus aliquibus Palma marina duplex, vel cortice rugoso, vel læui.

FVCVS CAVVS. C A P. XXXII.

Descript.

Caua dictus Fucus marinus nascitur cum foliis longis, fasciis aut tæniis similibus, sed cepaceis foliis in morem concauis atq; canaliculatis, colore viridi, substantia subtilissima.

Synon.

C. Bauh. pin. Fucus subrotundus 5. siue cauus, Herba caua Imperati.

Tom. III

CORALLIVM RVBRVM

C A P. XXXIII.

Corallium, quod aliqui Lithodendron (Κοράλλιον ὅπερ ἐστὶ λίθοδένδρον) appellant, marinâ esse plantâ constat ex Diosc. Ea quidè alto mari exēpta, duratur statim atq; emergit, quasi à circumfuso nobis aëre, lapidescat, concrescatve. Plurimum inuenitur in promontorio Syracusis imminente, cui Pachyno nomen est. Probatissimum rubens, colore Sandarachæ, aut Sandycis saturatæ, nec secus terenti facilè cedens, & æquabili vsquequaque concremento, in superq; Musci aut Fuci marini odorem referēs, & quàm ramosissimum, forma fruticis, Cinnamomi emulum. Quod autem in lapidis duritiem coit, scabrosum, fistulosum, ceu concauum, præterea & inane, seu spongiosum, viriosum existimatur.

Ouidius 4. Metam. in fabula de Andromeda & Perseo, Coralli proprietatem ita describit.

*Nunc quoque Corallus eadem natura remansit,
Dirissem tacto capiam ut ab aëre, quodq;
Vim in equore erat, sit super æquora saxum.*

Idem lib. 15. ejusdem operis:

*Sic & Corallum quo primum contigit aëras
Tempore durest, molles fuit herba sub undis.*

Corallium, marinū esse fruticem, & ex alto extractum durari statim, atq; idè Lithodendron vocari comprobant verba Plinij. Quantum apud nos (inquit lib. 31. cap. 2.) Indis margaritis pretium est, tantum apud Indos Curalio. Namque ista persuasione gentium constant. Cignitur quidem & in rubro mari, sed nigrius: item in Persico, vbi vocatur lace. Laudatissimum in gallico sinu circa Stæchadas insulas, & in Siculo circa Heliâ ac Drepanum. Nascitur & apud Grauiscas, & ante Neapolim Campaniæ: maximeque rubens, sed molle, & idè vrilissimum Erythris. Forma est ei fruticis, color viridis. Baccæ ejus candidæ, sub aqua molles: exemptæ cōfestim durantur & rubescūt, quasi Corna satiuæ, specie atq; magnitudine. Aiuunt tactu protinus lapidescere, si viuat. Itaq; occupari, euellique rebus, aut acri ferramento præcidi. Hac de causa Curalium vocitatum interpretantur. Probatissimum quàm maximè rubens, & quàm ramosissimum, nec scabrosum aut lapideū, vel rursus inane vel concauum. Authoritas baccarum ejus nō minùs Indorum (Iudæorum, malè Bas. cod.) viris quoq; pretiosa est, quàm feminis vniones Indici. Aruspices eorū vatesq; imprimis religiosum id gestamen amoliendis periculis arbitrantur. Itaq; & decore & religione gaudent. Prius quàm hoc notesceret, Galli gladios, scuta, galeas adornabant eo. Nunc tanta penuria est vendibili merce, vt perquàm rarò cernatur in suo orbe. Idem lib. 17. c. 10. ait Gorgoniam nihil aliud esse, quàm Corallium: nominis verò causam esse, quod in duritiem lapidis mutetur. Cæterum addit, sed falsò, emollire maria: legendum enim est, mollem in mari esse.

Matthiolus perhibet Coralliū ex Tyrrhenâ & Siculo mari extrahi, atque inde ad Italos deferri. Plinium miratur (vt etiam Amatus, Lacuna & Cornarius) quod tam facilè sibi persuaserit, Corallium per se baccas ferre, quasi Corna satiuæ specie atque magnitudine, perinde atque cæteræ arbores suos proferunt fructus. Quandoquidem, vt fatentur ij, qui Corallia expiscantur, & in iis mercaturam exercent, nullas per se baccas edunt, Baccæ enim quæ in-

Aaaaa 2

Coralliorum monilib. cornis ac cerasis similes visuntur, ex ipsorum truncis torino, & lima prius parantur: mox smyridis lapidis puluere, & terra quadam, quæ è Tripoli Africæ affertur, expoliuntur, & lucidum læuorem contrahunt, cum iis diutius fricantur. Adhæc Corallia è mari circumquaque muscosa eximuntur, nec tunc vlla ex parte rubescunt, verum inde artificibus tradita, derafo cortice rubent, & perpolita nitefcunt.

Casalp. Corallium frutex, inquit Casalpini, villosa substantia oblitus est, instar Musci: colore viridi, aut cinereo, intus rubro, qualis est color carnis, aut intensioris rubedinis, qualis cocci: tradunt succosam esse plantam, succo lacteo: renasci, vbi lac contigerit. Figura autem est arborea, lapidibus hærens, cubito breuior: multis ramis, tortuosis, sine foliis, sine fructu, ac sine radice. Falsò Plinius putauit baccarum formam, artificio paratam, spontè nasci.

Gesl. Gesnerus de fig. lap. inter alia, Corallium sexu distinguit. Ac rubri quidem, marem rubentiorè tradit, læminam verò dilutiorè. Ad hominis proceritatem aliquando accedere dicitur.

De Corallio vide Agricola lib. 4. de nat. fossil. & Leuini Lemnium lib. 2. c. 22. de occult. vbi ait mulieres Corallium deterius facere. Apertè autem hallucinatur Agricola credens Bryon Dioscoridis & Plinii esse Corallium.

Imper. Ferd. Imperato Corallium rubrum vegetabile marinum est, quod à primo trunco in ramos abit, qui rursus in alios, atq; minores diuariantur: sic speciem gerens arboris foliis & fructib. suis orbatæ. Substantia petrosa est, densa, quæ præclaram atque insignem polituram admittit. Scopulis aut fortè cuidam substantiæ testaceæ affixū reperitur. Vegetabile esse non tantum inde constat, quod crescentis propriis sese viribus sustinet, sed quod scandentium instar vicinis plantis lignosis innititur, atque fulcitur, quæ figura & ramorum diuaricatione ipsi Corallio similes.

Corallij hujus species colore etiamnum variantes aliquot sunt. Sunt enim aliæ saturè rubræ, aliæ lateritiæ, aliæ dilutiores, aliæ ad flauū tendentes. Sunt & quædam in fusci coloris varietate permixti, quasi earum substantia ex succo minus purgato varièque sit compacta.

Hist. Lugd. not. H. Lugdunensis Rhapsodus maxime hallucinatur, quod pro Corallis rubro & albo p. 1379. ponat figuram Coralloidis fruticis Lobelij.

Synonyma C. Bauh. apud Matth. pro Corallio albo & rubro ponit figuram ex Lobelio, qui tantum pro albo posuerat, & non pro rubro. *Eid. pin.* Corallium i. siue rubrum: Corallium Gesl. Lob. Lugd. & Casl. Corallum rubrum Imper. coloris vel intensè, vel dilutè rubri est, vel subflauescens, vel fusci.

Nomina linguar. Græcis κοράλλιον & λιδοστεινον: Lat. Corallum & Corallium: Germ. *Corallen Bassad*, Belg. *Corael* Gall. *Coral*. Ital. & Hisp. *Corallo*: Arab. *Bassad*, *Mergen Besd*, siue *Morgian*.

Vires. Corallium adstringit & refrigerat mediocriter, excrecentia coercet, oculorum cicatrices abstergit, vlcera eorundem caua explet, ac cicatrices extenuat. Contra sanguinis reiectiones excreationesve efficax est, & vrinæ difficultate laborantib. auxiliatur. Quin & potum ex aqua, lienem absorbit. Surculi infantie alligati, tutelam habere creduntur, ait Plinius. Contra verò torminum, vesicæ, ac calculorum mala in puluerem igne redacti, potiq; cum aqua auxiliantur.

Simili modo ex vino poti, aut, si febris sit, ex aqua, somnum afferunt. Ignibus diu repugnat. Sed eodem medicamine sæpius potio tradunt lienem quoq; absorbi. Sanguinem reicientibus excreantibusque medentur. Citis eorum miscetur oculorum medicamentis. Spissa enim & refrigerat. Vlcera caua explet. Cicatrices extenuat. Corallio vsque adeò abundare Italiam, addit Matthiolus, vt ferè nullibi reperiantur infantuli, nullæque puellæ quibus non gestentur Corallij monilia aut collo, aut brachiis suspensa, quo item vtuntur feminae in templis ad suas preces faciendas, Cæterum scribit comitiabilib. commodè adalligari, hauriendumque præberi. Famam esse Corallium ædes à fulminum injuria tueri. Idem mensium abundantiam cohibere, dentes commotos firmare, desquamatas gingiuas emendare, itemque oris vlcera sanare. Potum dysentericos iuuare, seminis profluuium in viris, nocturnasque pollutiones, & in mulieribus albos vteri fluores reprimere. Recenseri inter ea (Auicenna teste) quæ cordi hilaritatem adferunt. Corallio, inquit Lobelius, ædes à fulminum injuria tueri superstitiosum & fabulosum. Quoties siccandum, & sistere oportet eruptiones quasvis menstruas, dysenterias, & cruentas deiectiones, ad Corallia refugium quidem, sed vltà efficacius siccant. De iis nihil Galenus in lib. de simpl. med. facult. De variis verò eorum Hermeticis præparationibus consulantur Chymici.

CORALLIUM NIGRUM SIVE ANTIPATHES, & adulterinum.

Corallium nigrum.



PRO Corallio nigro nobis ab amico demonstrabatur stirps hæc, à vero Corallio haud paucis notis differens: Erat hoc firmum, nigrum, lentum, lucens & læue quidè, paucis tamen veluti verrucis alicubi inæquale, ramosum, durum, ac penè osseum. Verum quia flectebatur, & dentium attritu tenacissimum erat, accidit vt an fa-

Descrip-
tione.

titium esset, dubitauerimus. Saltem hoc scimus non lapideam habere substantiam, sed lentam potius. In medio neruulum habet rufum.

Quod *αντιπαθες* vocant, *κοράλλιον* esse putauit vel ipse Dioscorides, specie quidem solum differens. Describit autem colore nigrum, arboris figurâ etiam ipsum, sed magis ramosum: atque vim eandem, quam rubrum habere. Corallio simile dixit etiam Plinius & sine foliis esse.

Cornarius statuit Corallij tertium genus nigrum, rarum in Germania, Antipathes Plinij, & fort. His

fortassis eiusdem Idos Plocamon.

Corallium nigrum. Matth. *Pseudo Corallium nigrum.*



Synonyma

Neapoli; Eburnum colore referens. Post pulcherrimam eius plantam dono ipsi dedit Anzianus quidam, prope radices brachij ferè crassitudinem æquantem, & à medio trunco in ramos sese diffundentem, rarà quidem, sed visu dignam.

Amatus in Dioscor. ait se Corallium nigrum, Antipathes; vidisse Ferrariæ & Anconæ. Antipathes hodie rarissimum, siue

Corallium nigrum verum in Gallicia Hispaniæ inueniri ait Gesn. de fig. lap. c. 10. Antipathes siue Corallium nigrum Dioscoridis (vt vocatur in Obs. pag. 650. & Ic. Plant. tom. 2. pag. 151.) Massiliæ inter Corallia occurrere, insigni leuore perpolitum, colore nigerrimo, testatur Lobelius. Imperatus Corallium nigrum, substantiâ omnino simile ait rubro, & colore nigro tantum separat, atque raritate.

Antipathis siue Corallij nigri iconem ex Lobelio proponit H. Lugd. p. 1376. itemque C. Bauhin. apud Matthiolum vbi Corallium nigrum Dioscoridis vocat. Est hoc ei in pin. Corallum 2. siue nigrum.

Antipathes hirsutum. siue Corallium foliatum.

Locus



Pona in Baldo monente, Antipathes siue Corallum foliatum est foliis minutis, instar setæ porcorum, seu aristæ triticeæ. Inuenitur in maris Sardinia fundo inter Corallia piscandum. Est autem longitudine vnus hominis staturæ, & vocatur in illis partibus vulgò Sambeggia.

An C. Bauh. pin. Corallina 6. siue nigra setacea; Antipathes secunda species Ponæ.

tipathes secunda species Ponæ.

Corallium album & Corallium album officinarum oculatum.

Inter naturalia nostra Corallij albi officinarum truncum ramosum aduersamus. Maxima



crassities nostri, ferè carpi humani est, pars quâ haret lapidea, porosa, substantia solida, lapidea, ponderosa, exteriùs læuis; tota candida; multis foraminibus radiatim intus striatis donata. Rami temerè & inæqualiter diuisi, tortuosi, quos cum radice Polypodij, si figuram spectes, haud malè conferri polledixeris.

Cosnarius notum ait vulgò vbique Coralliū albo colore. Albi tamen neque Plinium, neque Dioscoridem mentionem fecisse, nisi id sit, quod Dioscorides colore pallidum dixit atque damnavit.

Suspiciatur Cæsalpinus Ebur fossile esse apud Theophrastum, quod vt Plinius refert, candido & nigro colore inuenitur. Apud Auicennam etiam mentio fit albi Corallij.

Cæsalpino porro si credimus, incertus est Corallij albi officinarum, nitore & candore Eboris, ortus. Matthiolum tamen author est Corallium niuei candoris in Tyrrheno & Siculo mari reperiri, non quidem, vt rubrum, compactum, ponderosumque, sed lænius ac rarius, spongiarum modo inane.

Rapsodus Histor. Lugdun. non bene posuit pag. 1374. figuram Coralloidis fruticis pro Corallio albo Lobelij in Obs. pag. 650. Ic. tom. 2. pag. 153.

H. Lugd. not.

Imper. distinguit Corallium album à nigro densitate & politura, quam recipit, sed in cæteris omnibus rubro simile dicit, albedine pura & lactea; non adeò frequens. Trādit & alterum Corallium album, fistulosum, valdè ramosum, in superficie foratum, quod ex Sicilia adferri testatur. Cæterum eius pictura optimè respondet iconi nostræ ex Corallio nostro paratæ.

Corallium album, Amato. Lac. Gesn. de lap. fig. & C. Bauh. pin.

Synonyma

Amatus adstringendi & refrigerandi vim adscribit omni Coralli generi, sed albo potentior, proinde eo vtuntur Medici vbi maiore est opus refrigeratione.

Virtus

Corallium candidius verrucosum punctatum, & Corallium stellatum albi puri coloris.

Corallij hæc species Imperati colore est quam vulgatè candidiore, superficie tenus punctata, tuberculosa. Trunco cæteroqui ramisque crassioribus quam rubri. Prouenit in Oceano. Reperitur quoque in Mari maiori.


Defectus

Locus

Imper. Coralli candidioris species tuberculosa punctata: *Corallo puncticchio tuberculo.* C. Bauh. pin. Corallum 7. siue album verrucosum punctatum; Corallum album punctatum, Imp.

Synonyma

Coralliū stellatū quod ab Oceano habetur substantia est cæteris Corallij speciebus simili, colore exquisitè candido, superficie tenus densò agmine stellarum minutularum impressarum oblit-



Corallium stellatum minus album.

ta, vnde & nomen indeprum. Planta est de Coralliorum genere, magna satis, trunco & ramis teretibus, quadam sui parte striata.

Imper. Corallium stellatum. C. Bauhin. pin. Corallum 8 siue album stellatum: maius & minus, quod nobis nunc describendum.

Leon. est coralli verr. pinctati.

Descript.



Synon.

stellatum minus.

Coralli albi varietas stellata.

Descriptio.



Synonyma.

siue Corallum album ramosum alterum.

Corallium geniculatum album.



EX argumen- **Descriptio.**
to nomen inditum est. Cōstat enim hoc Corallium internodiis quibusdam cū articulis animalium. Ramosum enim est, & rami, ad instar articulorum animalium, ad inuicem committuntur. Figura cetero qui sunt recta, circa articulos nodosiore, per longitudinem striata. Substantia eius densa, alba, in medio exiguum

meatum, medullæ ut puto vices suppletem, habet, qui a radice productus in omnes ramos propagatur. Est ut & alicubi velut pluribus corticibus constare videatur, alioqui cortice vnico obtectum est, vndique corallineo, albo, & reliquæ substantiæ. Percussu secundum longitudinem facto facile diffinditur.

Synon.

Imper. Corallium geniculatum: It. Corallo articulo. C. Bauh. pin. Corallum 9. siue album articulatum.

Crescit in Maiorica insula, vnde ab Imperato allatum est.

Corallium asperum candicans adulterinum.



EX lato prin- **Descriptio.**
cipio crassus exoritur caudex, qui mox in ramos diuaticatur minutius diuulos, albicantes, superficie asperos, tortuosos. Substantia interna minutissimis poris pertusa est, & quæ externa facies albicantior. Omnium maxime lapideum hoc Corallium esse videtur. Altitudo vix qua-

tuor uncias adæquat.

An Gesn. fig. lap. Gypsum quod Coralloides cognominari potest? Est enim Corallio albo persimile, ramosa seu fruticante specie. **Synon.**

CORALLIIS AFFIN. PLANTÆ MARINÆ.

CAP. XXIV.

Porosa Planta, & Porus magnus.

PORI de genere vegetabilium sunt, substantia Coralliis propinqua: at poris ab iisdem differunt, qui eorum proprii sunt & peculiare: horum tamen alij propius ad corallia accedunt, alij

alii longius distant. Omnes communiter albi sunt. Et qui candidiores, densioresque sunt, ij Coralliis similiores sunt, & eundem ramorum diuicationis modum seruant. Quorundam trunci superficie rugosâ, alij eadem punctata sunt. Qui rugosi sunt, lineas habent striatas secundum longitudinem tum truncorum, tum ramorum ad extrema vsque. Sed & meatus interna sua substantia porosa habent, per ramorum longitudinem procurrentes, medio quodam atque communi filo interposito. Quorum superficies punctata est, meatus habent, quos rami a centro à filo medio constituto ad ambitum educti interceptiunt.

Porus qui magnus dictus ab vna radice in ramos diffunditur: Truncus circa radicem crassitudine ferè est brachij humani: At cum Coralliis collata altitudine sua non respondet. Nam breui intervallo, quæ truncorum diuisura est, à crassitie sua deficit atque minuitur. Neque enim altè assurgit. Terminatur in germina crassitudine digitali. Circa truncos solidus est, instar Coralli: at vltimi rami admodum porosi sunt & fragiles. Color albus, superficies rugosa, cæterisque obdinat conditiones, poris in genere tribuit solitas.

Porus
mag.

Synon.

Imperat dicitur Porus magnus: C. Bauh. pin. Porus Corallo affinis 1. huc magnus. At hic Pori lapidis seruandis corporibus idonei meminisse Plinium lib. 36. cap. 17. his verbis: Pario similis (lapis) candore & duritie, minus tamen ponderosus, qui Porus vocatur. Sed quia Plinius ita brevis, est, an de his Pori locutus sit, ambigit. Lapidem autem hos substantiâ Corallis proximis esse non negat, & potissimum porositate, vnde nomen habere affirmat, & à Corallis differre.

Porus ramosus.


Descript.

Porus ramosus Imperati effigiem habet Coralli albi, dictus est autem ramosus, ob frequentem ramorum diuisionem & dilatationem. Circa radicem crassitudine est digiti humani: Rami exquisitè teretes, superficie tenus punctati, in amplitudinem spithamam panduntur. Durities eius præ cæteris Poris ad Corallinauram accedit. C. Bauh. pin. Porus corallo affinis 2.

CORALLIIS AFFINIS MADREPORA.

Copy XXXV.

Descript.



Matrepore quibusdâ dicta multis canis ex vno trunco proceduntibus, & circa ortum sibi mutuo coherentibus constat.

Ergo, sicut formam quodammodo repræsentant. Substantia tubulorum ossi spongiosa similis est, in quorum extremitatibus apparet, radii a centro ad ambitum




protenfis, hinc in quorum medio ceu sterculus quidam conspiciuntur, segmento plano. Crassities eorum digito paruo æqualis, ab ortu ad extrema vsque eadem superficie tenus transuersim rugosâ, quod in nullo alio à nobis descripto Poris observare licuit. Recenter exempti forde

quadam purpurea obteati sunt, quæ temporis progressu nigricat.

Madrepore, Imper. Porus Corallo affinis 4. suæ Coralliis affinis Madrepore stellata.

Synonyma

CORALLIIS AFFINIS MADREPORA ramosa.



Madrepore ramosæ extrema sūt plana, quemadmodum præcedentis. Sed in trunco & ramis magna est differentia, Quippe primarius truncus densus est & candidus, licet Corallium. Sequentes qui velut annui adjuncti sunt, rari admodum ac debili substantia, colore obscuro & purpureo. Eadem substantia aliquid habet membranei, vnde

Descript.

collegi potest, Spongiarum in morem participare aliquid de vita sensitiva.

Madrepore ramosa Imper. Porus corallo affinis Madrepore ramosa, in qua varietas & in substantia, & colore pro partium diversitate reperitur.

Synonyma

ABROTONOIDES PLANTA SAXEA

CAP. XXXVI.

Elegantem hanc plantam marinam, A. Apotomæ in saxeam Amstelredami anno à Chr. 1610 nato 1660. Glusio donabat honestissimus vir Valichius Synerz ejus yrbis Pharmacopœus, illo ipso anno à Batavis ex orientaliibus regionibus delatanti. Etat porro, inquit Glusius, ea planta tota

Locus



Synon.

Fucus folliculaceus 20. siue Abrotono similis
faxeæ C. Bauhin. pin.

Porus similis Sabina.

Porus Sabinæ similis: ramos qui habet subtilis, altera parte compressos: Superficies eminentis quibusdam acutis donata est.

C. Bauh. pin. Porus Corallo affinis 6. siue Porus facie Sabinæ, Imper.

CORALLIVM ADULTERINVM. porosum.

CAP. XXXVII.

Numeroso densoque agmine ex lapideo ferè principio exeunt fistulæ albicantes, striatæ, palmares, longiores plus minus, intus porosæ, quæ à centro ad ambitum ita radiatæ sunt, ut stellam multiplicem repræsentent Substantia earum planè lapidea est, dura, nec ita fractu facilis. Primum pondere superat.

Descriptio.

Millepora Imper.

Imper. ait Milleporam numerosa producere germina quæ cannularum iuxta se inuicem positarum instar denso stipatu nascantur. Quodlibet itaque germen formam referre cannae cum nodis suis. Eius porro superficiem secundum longitudinem esse striatam, circa extrema porosam.

Milleporam hanc Imperati ego eandem constituo, cum corallio adulterino poroso, licet hoc strias per longitudinem non præ se ferat. Pseudocorallium album aut fungosum, Gelsin. fig. lap. Porus Corallo affinis, siue Millepora Imperati, C. Bauh. pin.

Synon.

CORALLIIS AFFINE ALCYONIVM FISTULOSUM rubrum: & Tubuli marini albi.

CAP. XXXVIII.

Marinorum naturalium elegantissimū specimen inter naturæ recondita nostra adferimus, quod figura & specie partium corallio rubro quodammodo accedens totum agmentum Halycionium quibusdam æstimatur. Ex meris tubulis rubris, Corallio rubro ferè concoloribus, aut certè saturatius tinctis, crassitudine culmorum Auenæ, ex semunciali aut breviori intervallo crustulis lapideis connexis, cætera parte aequaliter diffidentibus coagmentatum est. Pleræque tamen superficietenus albicante

Descriptio.

quadam aspergine obiter vestitæ sunt. Tota substantia lapidea est, sed Corallio rubro fragilior.

Imperati Tubularia purpurea, quam quidam ^{Tubularia Imper.} inter Alcyonia



recensent, & quidam Alcyonium Milesium vocant, pororum ratione Tubulariæ purpureæ similis est, de marinorum quoque genere, ex parvis tubulis, concavis, atque ut plurimum connexis coagmentata, colore puniceis, intus politioribus, foris mediantibus quibusdam crustis transversis, æquali intervallo ordinatis, vixitis. Matriculæ putantur, an malculorum marinorum in quibus nascantur, sicut apes in favis.



Tubularia purpurea, Imper. Porus Corallo affinis 11. siue Corallio affinis Alcyonium rubrum, C. Bauhin. pin.

Vicina autem ex propositis Iconibus est Tubulorum mari-

norum alborum Imperati.

Porus tubularis.

Porus tubularis dictus, quoddam partium tubulorum formam referat, ex quibus alij tubuli etiamnum pronascuntur. Superficie interna rugosi, externa punctati & porosi. In his sæpe materia Alcyonii, aut alterius cuiusdam substantia reperitur.

Descriptio.

Porus tubularius, Imper. Porus Corallo affinis 10. Casp. Bauhin. pin.

Synon.

ADARCE EX VETERVM ET NEOTRICONVM sententia.

CAP. XXXIX.

Gignitur in Galatia quod Adarces appellatur. Est autem tanquam concreta salilago (concremetum subaluginosum, Corn.) quæ humidis & palustribus locis siccitate emergit, & circa arundines, graminæ concretescit, colore flori lapidis Asij similis, tota verò forma molli, & multiforo Alcyonio proxima, ut videri pos-

Locus in Diof.

Vires

fit Alcyonium palustre. Ad extirpandas lepras, maculas à Solis ardore contractas, lichenas, lē-
tiginas, similiaque vitia, accommodatur: & in
summa vis ei acris. Sed humores ex alto eno-
cat: quomobrem & ischiadicis opitulatur, au-
thore Dioscoride.

Calamoch-
nus.

Inter aquatilia dici debet & Calamochnus,
latine Adarce appellata. Nascitur circa arun-
dines tenues, e spuma aquæ dulcis ac marinæ,
vbi se miscent. Vim habet causticam. Ideo
acopis additur contra perfrictionum vitia. Tol-
lit & mulierum lentiginas in facie. Ita Plinius
lib. 32. cap. 10. Nec de alia Adarca loquitur l.
16. cap. 36. Est & in Italia nascens Adarca no-
mine palustris, ex cortice tantum sub ipsa coma,
utilissima dentibus, quoniam vis eadem est quæ
Sinapi. Temere ergo Plinium acculant (inquit
Corn.) qui hoc ideo Arundinis speciem ipsum
fecisse affirmant: & de eadem Arundinis spe-
cie reperit. 20. cap. 12. vbi ait: Sinapis natu-
ram effectusque eosdem habere traditur Adarca,
inter sylvas nacta, in cortice calamorum sub ipsa
coma nascens: est enim una & eadem Adarca,
de qua omnibus his locis agit. Hæc autem & Ca-
lamochnus dicitur, i. e. Arundinis lanugo. Latini
recepta Græcorum voce Adarca.

Adarcium
Galeni.

Galeno Adarcium, quod aliqui masculino ge-
nere, Adareum, aliqui feminino Adarcem
vocant, secundum essentiam velut spuma quædā
est concreta aquæ saluginosæ, quæ circum stō-
reas & Arundines concrevit. Est autem acer-
rimum & calidissimum, & per se ipsum inutile.
Miscetur autem his quæ vim ipsius obtundunt,
atque ita multi vñs euadit, in affectionibus ca-
leheri postulantibus foris adhibetur. Intra enim
corpus fieri non potest ut quis ipsum assumat, ob
virum vehementiam. Idem Galenus lib. 1. cap. 1.
Tōi λαρὲ τὸν αἰνὸν ad finem, in ænigmatica composi-
tione, Pericalamitidem appellari posse dicit, id
quod ab aliis Adarce, & Adarcium dicitur, prop-
terea quod calamis adnascatur. Appellatur &
Limnitis à paludibus, à Galeno, & Actio, & Pau-
lo, multis locis.

Aliud est Cæsalpino apud Dioscoridem Adar-
ce quàm Alcyonium, quamvis similis illi molli
figura: est enim concreta salisago, iuxta cala-
mos & festucas agglutinata, locis palustribus &
maris admittance cū aquis dulcibus: colore cā-
dido, similis cōcretioni quæ in spōgiis reperitur:
corpus omnino inanimatū, inordinata cōpage.

Conspici Adarcem in multis Hispaniæ palu-
dibus author est Amatus, dicitque voce Hispani-
ca Fluminis stercus, siue Fluminis lixum, & ad
multos vsus ab iis adseruari: circa mare verò
potentius inueniri. Ait porro Plinius & illius
defensorem Collinutium, duas Adarces ponen-
tes, nugari.

Lacuna vocat græcè λάρυνη, latine Adarcem,
Arab. Arharach [Matth. Adarchi, seu Adaraca]
Castil. Alburreca, refertque se Patavii apud Fal-
lopium verum vidisse. Quid autem pictura ex-
hibeat, cū non describat, me latet:

Gefnero Adarce planta non est, sed plantis ad-
hærens crusta.

Matthiol. verò negat legitimam Adarcem, quæ
Diosc. & Plinii placitis respondeat, in Italia nas-
ci, etsi id tradiderit Plinius.

PORVS ANGVINVS.

CAP. XL.

Porus anguinus dictus Imperato, quodd exu-
uiis serpentum similis sit. Substantia sua
Tom. III,

Discrip-



adhæret radi-
ti Algæ, alteti
alicui mate-
riæ, estque ve-
lut incrustatio
quædam ex
multis atque
subtilissimis
spoliis, sibi
mutuò incum-
bentibus coag-
gesta: similis
est spoliis Ser-
pentum, siue
colorem, siue
subtilitatem
siue impressio-
nes atque deli-
nationes spe-
ctes. Substan-
tia porosa est
& fragilis ad
modum, prop-
ter extremam subtilitatem tunicarum, colore
candido, & ea parte qua altera tunica ab altera
separata conspicitur, argenteo splendore lucida.

Porus anguinus, alias Adarce appellatus, in a-
quis salis & maris quieti stagnantibus concre-
scit. Algas aliq. corpora complectens Reperitur
in tractu Neapolitano in mari mortuo sub Baia.

Porus Corallo affinis: siue Porus anguinus
Imperati, C. Bauh. pin.

Synonyma

SALIX MARINA.

CAP. XLI.



Descriptio

Rami mul-
ti ex glau-
co nonnihil ru-
bescens in aqua
nascuntur, foliis
comantes lon-
gis, Salici simi-
libus, maxima
ex parte per o-
ras non incisus,
quibusdam ve-
luti incisuras
nonnullas o-
stendentibus,
gustu salis. In-
ter ramulos
virgula surri-
gitur, siue Sa-
licis sustinenti
furculo haud
abimiles, api-
cibus pinnatis

veluti squammatim compactis, non alia forma
quàm quæ spectatur in Salice, dum herbaceo
iulo florem parturit. Testis ostreorum & saxis
quæ sub aqua marina sunt, innascitur, & sic adhæ-
ret, vñs agglutina: tanon radice defixa, videatur

H. Lugd. p. 279. Salix marina. C. Bauh. pin. Synodj
Fucus folliculaceus 16. siue Salix marina.

ARBUSCVLA MARINA CORALLOI-

des rubra.

CAP. XLII.

Plantam hanc marinā Christianus Pottetus Descripti
pharmacopœus à quodā circumforaneo redi-
mebat anno à Christi natiuitate 1599: quam cum
Clus. ostenderet, mercedē arbusculā appellandā cē-
suit, sed quodd maiore videre nō meminerit. Tres

autem pedes alta erat, & in multos ramos laterales eoque anteriorem partem nutantes, diuisa: caudex infimâ parte septem uncias in ambitu crassius erat, firmusque & solidus quum videretur, materiâ tamen quodammodo fungosâ constabat, illaque candicante, & Zingiber relic-



catum referre: totus caudex cû ramis, innumeris tuberculis resperfus erat, ipsaque rami in maiuscula tubera desinebant, intus fungosa, & seminum, inanium tamē, speciem in cauernulis continentia, externè autē orbicularibus nodulis, lapidis stellaris instar, distincta. Tota plantâ, siue veriùs


arbuscula, genui quidem, sed grumoso cortice recta erat, eoque rubri coloris, vt minio induta videretur, qui an ascititius fuerit ignorat Clusius: aded autem falsi saporis erat tota arbusculæ cum suo cortice substantia, vt merum sal referret. E quo porro mari fuerit eruta, latet, & an scopulo alicui innata esset, an in imo maris fundo creuisset, certî quidpiam profecti non potest: nam eius truncus integer non erat, sed imâ parte rescissus.

Synon.

C. Bauhin. pin. Corallina n. siue Corallinae facie grumoso cortice: Arbuscula marina coralloides Clusii exot. lib. 6. c. 1.

CORALLOIDES FRUTICOSA PLANTA marina rectior. CAP. XLIII.

Descriptio




Fors tulit, huc illuc diuaticatos, dodrantes, & palmates, singulos thorulo corneæ duritiei & flexibilitatis, nec non coloris, fæctos, crusta obductos iam penitus niuea, iam cinerea, modò lutea, modò conchylifera viuida: aliàs cinerea &

rubra, aliàs lutea rubra, non raro omnis coloris signatibus punctata.

Has plantas redemimus à circumforaneo, qui dicebat collectas in mari Gilbratar, vocabatque Italicè Fior di corail.

Lob. Coralloidis fruticolæ in Obs. p. 650. duas ^{Corallina fruticosa} habet figuras: Lob.



sub titulo Corallinae albæ: alterâ sub inscriptione corallinae rubentis Antipathis facie. Dubitat autem an sit Quercus marina folio Myricæ Theophrasti, eiusque varietat. aliquas assignat, quippe Corallina Antipathis facie albam, rubram, & luteam, thorulo intus corneo, Antipathi còcolori & rō absimili.

Reperiti autem ait non modò in Narbonæ & Gallo provinciarum mediterraneis littoribus, sed etiam Angliæ occidentis & Nortmanicæ. In Icon. Plant. utraque effigies pingitur.

Gesn. lib. de fig. lap. de Corallina fruticosa hæc scribit: Litophyton marinum Arbusculam hanc marinam à Io. Bauhino Medico diligentiùs accepi. Collegeram autem priùs similes in mediterranei maris littore: species eius duæ sunt, vna omni ex parte albicat foris alterius crusta in quibusdam partibus rubri seu purpurei coloris est: vnde nonnulli Corallis cognatam plantam esse suspicati sunt. Ligni duritiem si spectes, Quercum marinam dixeris, aut Ebenum, Cytisumue: si aspera virgarum vestigia, Piccam aut Ericam marinam &c.

H. Lugd. p. 134. Coralli frutex saxo inherens: qui altera sui parte & furculosiore candicat, minorisque foraminibus pertusus est, altera in pauciores virgulas diuisa rubet, & tubercula quadam veluti baccas tuberosas fert, cornis latinis non dissimiles. Quare immeritò reprehenditur Plinius quòd huic frutici baccas tribuerit, vt aliis arboribus suos fructus. Et hæcenus Rhapsodus, à quo Plinius non sufficienter excusatur. Planta cuius figuram exhibet, & quam describit non est corallium, neque durescit & rubescit, vt Corna: præterea non bene Coralloidem fruticem Lobelii ponis pro corallio albo & rubro Lobelii, qui non vocauit corallium, sed corallinam. Icon H. Ludunensis depicta est ex eadem stirpe ex qua nostra Coralloides a rectior.

Anguill. luncus lapideus Theoph. in officinis quibusdam Venetis Coralli bianchi, planta extra aquam lapidescens

Tabern. ic. & hist. Corallina alba, rursus Corallen Moss: Item, corallina lutea, Beel corallenus mos: & corallina rubra, Rot corallenus mos. Quæ ignorantia Compilatoris Tab. vocare coralloides frutices germanicè corallenus mos, h. e. Muscum Coralli, cuius tres proponit valde similes figuras: Dein corallinas non describit sed tantum

alm in pelago Tyrrhenio inueniri addit, in quo corallium Lobelius reperiri dixit, & non corallinas.

Frutex Corallina vocant, inquit Cæsalpinus, ligno intus durissimo at nigro, specie Ebeni, sed ob tenuitatem inutuli operibus: crusta his obducitur verius,

quàm cortex, friabilis, pumicosa, aliis cãdida, aliis rubens: adhærent lapidibus testacea quadam substantia dilatata. Qui ex his cortice rubro integitur, tortuosis ramulis constat, durissimisque, prope radicem nigris, hi in tenuem gracilitatem desinunt, perlucidam ablato cortice. Qui cortice albo integuntur duo sunt: vnus ramulis cõstat erectis, lunci modo, flexilibus, numerosisque ab eodem veluti caudice prodeuntibus, cubitali altitudine, qui veluti punctis quibusdam signati sunt, vt Abieris ramuli. Abierem marinam puto apud Theophrastum. Alter ramos fert ad latera tendentes, crusta candida, veluti denticulatos, quibus sapè adhærent lapidosa substantia, ex maris salugine concreta, ac testacea quadam animalia. Quercus marina apud Theophrastum: folium his nullum neque muscus, sed loco eorũ crusta videtur data. Quartum genus humi scripit, sarmentosum ex lapidibus pendens, r̃ndique muscosa lanugine oblitũ, nigricãte, aut cinerea, extremit̃ capillis in tenuia veluti granula desinentibus. Vitis marina apud Theophrastum.

C. Bauh. pin. corallina 1. siue fruticosa recta alba: luncus petrosus Ang. Lithophyton marinum albicans Geln. foss. Quercus marina Theophrasti, Clus. hisp. 1. & exor. Corallina alba, Lobel. Tab. Corallium album, Lugd. Muscus marinus fruticosus, Cast. Coralliis similes frutices, Cæsalp. Corallium ligno intus durissimo & nigro, cui crusta obducitur, aliàs candida, aliàs cinerea, aliàs rubens, testacea substantia. Eid. corallina 2. siue lutea punctata: Item; Corallina 3. siue fruticosa purpurei coloris, Geln. Corallina rubens Antipathis facie, Lob. Corallina rubra, Tabern. Quercus marina Theophrasti, Clus. exor. lib. 6. cap. 4. Quercus marina cum sua basi, Eid. cur. post. An C. Bauhinus has tres Corallinas rectè separet, atque Quercum marinam Clusii huc meritò referat, aliorum esto iudicium.

ERICÆ FACIE FRUTEX MARINVS. CAP. XLIV.

Descriptio



Marinum hũc fruticem, quem Clusius anno à Christi natiuitate 1597. à Doctissimo viro Henrico Hoiero, Bergensi in Norvegia Medico accipiebat, non incommode Ericam marinã appellari posse arbitrabatur.

Erat verò is frutex cubitalis aut amplioris altitudinis, statim ab infi-

mo in frequentes ramos assurgens, atque illi denuò in minores alios diuisi erant: interdum simul coalescebant, vt in plerisque plantis in mari nascentibus euenire solet: tenui cortice regebatur, terrestrisque coloris erat. Torus, porro frutex plana forma excreuerat, & in sesquicubitali latitudinem expansus erat. Omnes autem rami tanquam quibusdam tuberculis erant oblitati: sed minores longè frequentioribus, & maioribus (quod pictor per supinam quandam negligentiam non obseruauit) vt tanquam flosculorum gemmis ornati viderentur, quæ tria in tenuissimum pollinem resoluiebantur. Tota aliõ qui planta lignosa & dura erat, atque lapidi aut scopulo innata fuisse videbatur, falsi saporis, vt quæ in Oceano nata plantæ.

C. Bauh. pin. Fucus folliculaceus 17. siue Ericæ similis maritima: Frutex marinus Ericæ facie, Clus. Exor. lib. 6. cap. 5. Eid. Corallina 4. siue rufescens exasperata: Ericæ facie frutex marinus, Clus. Exor.

Synon.

FRUTEX MARINVS ELEGANTISSIMVS albus, Corallium nautis.

CAP. XLV.



Elegantissimus hic frutex marinus, inquit Clus. Exor. lib. 6. cap. 2. Arbuscula marine Coralloidi quodammodò congener, pedẽ & septem vncias longus siue latus erat, & tredecim vnciarum amplitudinem habebat, quã parte latissimus: triũ verò pedum & decem vnciarũ erat eius ambitus; durus, porosus & ligno-

Descriptio

sus atque valde plantis, flabelli instar, in ternos aut quaternos crassiusculos ramos diuisus, à quibus innumeri alii tenuiores ramusculi exoriebatur, in longum & latum se spargentes, aded miro ordine, vt simul quodammodò coalescerent, vacuasque tantum quãdam spatia relinquerent, cribri aut reticuli maculas imitantis. Integer frutex purpurascens colore obductus fuisse videbatur, quem deinde saluginosa candida materia obduxisset, vt ex infima fruticis parte, & aliis quibusdam locis, à quibus salugo detecta erat, apparebat: illam verò saluginem creberrimis, iisq; valde exiguis, foraminulis tanquã acu impressis, tam affabrè tantoque artificio elaboratam conspiciere licebit, præsertim in minoribus ramulis, vt nullum opificem imitari posse mihi persuadeam: sed quum in aded exiguo spatio, cuius capax est lignea tabella, illam elaboratam saluginem pictor exprimere non posset, istum fruticem nudum & sine salugine delineare coactus est, vt ramulorum tenuitas

facilius obseruari & conspici posset. Latam autem habet sedem, quâ scopulo inhaerens sub marinis aquis, ex qua binæ aut ternæ aliz adnatæ plantæ, siue potius rami abrupti fuisse videbatur. Eius materies dura, ut vix cultello scindi posset. Nautæ Corallium appellabant: sed ad Palmæ marinæ à Theophrasto descriptæ genus aliquod veriùs referendum esse arbitror.

Synon.

C. Bauh. pin. Corallina 14. siue cortice reticulato maculoso purpurascens.

PLANTA MARINA RETIFORMIS.
CAP. XLVI.

Defect.



Plantam quandam marinam ex America aduectam anno à natiuitate Christi, nostri Redemptoris, 1597. mittebat ad Clusium ornatiss. idemque humaniss. vir Simon Pardynus, Consul Medioburgensis in Walachria Zelandia, valde raræ formæ. Nam instar virgulti lignosa erat, prorsus tamen


plana, in frequentes ramos eosque etiam planos, sparsa, ex quibus in longitudinem & oblique exhibant multi nervi, retis instar ferè contexti, aded firmi, ut ex æreo filo conflati viderentur, lumini tamen oppositi glutinis substantiam veriùs referrent. Tota planta cubito longior erat, prorsus, ut dictum, plana, & multis maculis, retis instar, pertusa, subrubescens, quadam tamen falsugine multi locis infecta, extima parte ferè pedem lata, infima verò palmum: sed ea non integra: nam ex utroque latere plurimum abruptum fuisse apparebat: falsus eius sapor. Cui rei ignata fuerit, non liquet, ut cuius infima pars cōfracta esset: verisimile tamen scopulo, aut lapidi innatam Corallii modo: Nam triennio post se similes conspexisse refert Clusius Amstelredami in musæo cuiusdam ciuis, quarum infima pars plana erat, ut quæ scopulo adnata fuisset. In Americano autem Oceano natas aiebat.

Casp. Bauh. pin. Corallina 15. siue reticulato cortice altera: Planta marina retiformis, Clus. Exot. lib. 6. c. 3.

HIPPVRIS SAXEA.
CAP. XLVII.


Descriptio

Clusio ostendebatur hæc venusta planta marina Amstelredami anno à Christi natiuitate 1601. à perhumano viro Ioanne Langhe Cheturgio, qui etiam illius ramo pedalis ferè longitudinis ab ipsa planta abrupto eum donabat, qui in subiecta tabella Lectoris oculis expressus proponitur.



C. Bauh. pin. Fucus folliculaceus 19. siue Equiseto similis saxea: Hippuris saxea, Clus. Exot. lib. 6. cap. 3.

RESEDÆ FACIE PLANTA MARINA.
CAP. XLVIII.



Totus lignosus & durus erat hic frutex, non sectus ac Erica fruticans, salis & albæ materiei obdus, sesquipedalis longitudinis, non tamen integer, sed infima parte fractus, in decem vel plures ramos inæqualiter & nullo ordine nascentes diuisus, quorum aliqui abruptis qui supererant,

Defect.



toti recti erant exiguis quibusdam vasculis rugosis, deorsum propendentibus, coloris ex albo cineracei, Resedæ vasculis, quæ semina iam maturata cōtinet, non valde dissimilibus, longè minoribus, & infima parte, vix plurimum connexis ipsis ramulis, quæ vacua & valde fragilia, ut quæ digitis attrita, facillimè in puluerem retoluebatur, falsi admodum saporis.

Hanc marinā plantam, quam fruticem siue suffruticem appellandam censet Clusius, nanciscatur Amstelredami anno à Christi natiuitate 1601. Quo autem in mari erutus fuisset hic frutex intelligere non potuit, quia nautas qui retulissent conuenite ipsi non contigit, & qui redmunt, ista minimè curant.

C. Bauhin. pin. Fucus folliculaceus 18. siue Resedæ similis maritima: Planta marina Resedæ facie, Clusio Exot. lib. 6. c. 6.

CORALLOIDES GRANVLOSA ALBA.
CAP. XLIX.

Ex magno ramo decerpam portionem adferuamus, quæ ceruini cornu instar plures ramos



mos de se mit-
tit modicè re-
curuos sursū-
que spectan-
tes. Tota por-
rò albo granu-
losoque cor-
tice obducta
est, ac si Sac-
charo incru-
stata esset. In-
terior eius
substantia, cui
erulta hæc
granulosa ad-
hæret, nigra
est, duraque.
Accepimus ab
amico quodā
qui ex theatro
naturaliū Se-
renissimæ

Reginæ Angliæ se accepisse referebat, ex ma-
gno ramo decerpit.

ALGA MARINA *μαρινή* POROSA.
CAP. L.

Descriptio



Maritima
elegantia
raritate pulcherrima aspectu
est. Ab vno
principio plu-
res exeunt ra-
mi trium qua-
tuorve vnciarū.
lati atque pa-
ruli, compressi,
flexiles, crusto-
si, pallidi, colo-
re exalbido, cū
striis obliquis
quasi texturam
demonstranti-
bus, damæ cor-
nua lata non
infeliciter æ-
mulatur. Vnde
μαρινή dici

potest ex re nata. Dono dedit Emanuel Vur-
fistius Medicinæ Candidatus lectam in portu
Bourensi: atque ex ea planta confecta nostra si-
gura.

Imper. lib. 27. cap. 3. Porro ceruino siue Porri ge-
nus quod ramorum diuicatione ceruina cor-
nua æmulatur, cuiusque superficies punctata al-
titudine spithamæ inferior.

G. Bauh. pin. Porus Corallo affinis 7. siue Po-
rus ceruinus, Imper.

ESCHARA. CAP. LI.

Descriptio


Quæ Eschara Rondeletio dicitur pro radice
principium habet laniusculum, ex quo fo-
liacea quædam, & Lactucæ crispæ in morem, sub-
stantia exit lapidea, crassiuscula, albicans, fragi-
lis, cribel instar, rimarum longiuscularum ple-
na: dentibus facile atteritur, nullo manifesto
nec odore nec sapore.

Synonyma Casalpino Rosæ marina inter Muscos mari-



nos. Imper.
Retepora, Es-
chara marina.
C. Bauh. Po-
rus Corallo af-
finis 8. siue
Porus reticu-
latus & Escha-
ra marina, Im-
perati.

ESCHARA MARINA FRONDIPORA.
CAP. LII.



Frondipora
Eschara
marina, Reti-
pora descriptæ
similis quodā-
modò frondes
quippe subita-
tia similes, iti-
demq; ramosæ
& inuicem, quib.
extrinsecus emi-
nentia quædā
costis aut ner-
uis foliorū si-
miles adnatæ:
quarū extrema
mutuo cōnexū
vniū poros
cōstituūt, & re-
tis formā quo-
dammodò effi-
ciunt.

RETICVLVM MARINVM.
CAP. LIII.




Nomen ex
rei ratio-
ne asciuit. Sic-
namque velu-
t stamine atq;
subtegmine in-
tertexto est, vt
rete aliquo
modo repræ-
sentate videat-
ur. Compres-
su duriuscula
est, neque reni-
tens. Colore
subcinereo ob-
solero. Odo-
re atque sapo-
re saluginosus
dentibus attri-
tum cedit ob-

lentam & tenacem substantiam, nec facile comminuitur. Maritimum accola est. Nostra icon non in omnibus placet: foramina non satis manifesta, nec stamina satis tenuia.

An Imper. lib. 28. cap. 1. Rete marinum.

RETICVLATVM TOPHACEVM
marinum. CAP. LIV.

Descript.



Filamentorum conuolutorum in morem, totum ex filis tophaceis, cādicantibus, ac etiam [quod in tanta exilitate mirum] fistulosis ac cauis coagmentatū est, ut rete quodammodō in vnum glomerem confusum repræsentet.

Ipsa crassities frusti coagmentati vncialis est, multis cauernis Spon-

giæ aut pumicis ferè instar cauata, substantia leui, & dentibus facilè friabili, dura, digitis non cedente, odore falso, sapore nullo.

An Imper. Porus in figura di Matassa, filo concauo, quamuis subtili? Adhærescit aliis substantiis & rebus marinis.

CORALLINA.
CAP. LV.

Descript.



Vnciam vnā aut alterā alta est, colore incano, cinericoque, ramulis pyxidatini genicularis, gracilibus, pinis interdum è latere excrecentibus, odore nauseoso, pisculento, sapore falso ingrato: sub dentib. lapillorum instar crepitat, & faciliè vel attritu digitorum in puluerem fatiscit.

Nomina

Corn. vocat Bryon siue Muscum marinum Dioscoridis, Plinii (qui legendum *Spizand* sit, Lactuce folio, quod Dioscorides *τριχώδης*.) & Galeni, quam Germanos *Meermoss*; officinas Corallinam vocare scribit: Et recentiores Græcos *σκαληνός* τῆς *τῆς*, ab vsu ad vermes ex alio expellendos, vulgò venalem Scoliborani proclamantes. Et quanquam hic vsus à veteribus traditus

non sit, tamen *σκαληνός* esse, non ambigit eiusdem etiam opinionis est Musa, Cordus, Anguill. Lac [cuius tamen figura vulgarem Corallinam non demonstrat] & Turnerus.

Gesl. de fig. lap. cum Medicis vulgò Corallinā appellat, herbulam maritimam, in saxis sine radice nascentem, & substantiam foris tanquam è limo quodam albicante circumnato ferè lapidescentem habentem.

Amarus ait omnium doctorum consensu muscum marinum, officinarum Corallinam esse: eam autem Anconæ magna in copia reperiri: Hispanos *Malhorquinam* appellare, quia primo ad illos ex Maiorica altera insularum balneariū aduecta sit.

Cæsalpino Muscus marinus lanugo est capillosa, in scopulis maris & petra, modò lapillis, modò testis, modò aliis fruticibus marinis inhaerens, præcipuè corallo, quam Corallinam vocant: mollis quidem quandiu sub aqua est, extractus autem & siccatus riget ob assugum: quidam erectus quidam humi sparius: color varius, nunc albus, nunc rubens, aut flauescens, aut cinereus, aliquando niger, quidam & herbaceus, mollior. Dioscorides Bryon thalassion vocat: Theophrastus Phycon trichophyllon: Gaza Algam crinato folio, & Plinius Phycon capillaceo folio.

Dod gall. quoque Corallinam hanc officinarum, græcè *σκαληνός* vocat. Lat. Muscum marinum, gall. *Mousse de mer*, Brab. *3de Mosch*: & ex quibusdam indoctis Soldanellam.

Crediderim & ego, inquit Matthiolus, Corallinam esse Muscum marinum, quod cerè sciam, eam ab iis reperiri, qui Corallia expiscantur, corallus, sicuti etiam scopulis & piscium testis inhaerentem. Is vtrique cæteris præfertur, qui corallus adnascitur, vnde ei nomen. Probatum secundo loco, qui saxis adhæret, colore rubicundo: cinereus verò improbatum. Plinium constat errasse, in historia Musci marini quod hunc perperam fecerit foliis Lactuce similem: Arab. dicitur Tahaleb. siue Taleb, quibus tamen Muscus is cum Lente palustri confunditur. Hisp. Malhorquiana yerna: Germ. *Meermoss*: Corallenmoss. In Epir. cum add. Camer. dicitur Muscus marinus gracilis, capillaceusque, provenire, caulis expers, colore, cum siccatur, subrufescente, sapore falso, odore concharum marinarum simili.

Camer. in Epir. & Hist. Matthioli vnā iconē septem species pingit. I. à Matthiolo traditur. II. parui ramuli, sulphurei coloris, articulati. III. supra tophaceum lapidem album, coloris etiam sulphurei. IV. supra rubentes lapides. V. supra testacea. VI. & VII. pulchrè alba est, aut nonnihil ex caruleo virens est: & rubescens. Subdit tandem reperiri & alias species, quas ait recenseri non posse sine nimia prolixitate, densius tamen omnes provenire, ac pictas esse.

Lobel. duas dat imagines. Prior est in Obs. p. 648. in Ic. verò p. 249. tom. 2. hoc titulo. Muscus candidus coralloides squammulis loricatis: Altera in Obs. p. 649. in Ic. pag. 250. inscribitur Corallina, citratis copiosis coralli emulacione implexis tenuibus furculis, caulis expers, colore rubicundo, aliàs luteolo, herbaceo, cinereo, aut candido. ossèa duritie, ad vermes prodigandos decantatissimis viribus.

H. Lugd. p. 1368. Muscus marinus: siue corallina Dodonzi. Item, Muscus marinus candidus coral-

Muscus marinus
Cæsalp.

Muscus marinus
Matth.

Dioscor.

Icones dant
Lob.

Hist. Lugd.
onomes 3.

Rhaph. 10.
Natur.
Compilat.
Tab.

coralloides. Ceterum, Rhapsodus suo more ponit tres figuras vnius plantæ, addens Corallina vnam speciem sine descriptione.

Tab. ic. & hist. Muscus marinus siue Corallina secunda: Eid. Corallina altera. Eius compiler non distinguit, proponendo tantum figuras: Prima Matthiolinæ imagini accedit, quam etiam C. Bauhinus apud Matthiolum posuit: Altera icon conuenit cum vulgari nostra Corallina geniculata.

Synonyma
C. Bauh.

C. Bauh. pin. Muscus coralloides 1. siue Muscus maritimus, Corallina officinarum: Muscus marinus Matth. Ang. Dodon. Cordo in Dioscor. Lac. Turn. Cast. H. Lugd. Cæsalp. & Tabern. Corallina, Lobel. Lemnio. Fucus capillaceus, Lugd. Eid. pin. Muscus coralloides 2. siue squamulis loricatus: Bryon thalassion, Turn. Muscus Marinus 3. Dodon. vel 2. Eid. Belg. Muscus candidus coralloides, Lugd. Corallina altera, Tab. Nos nondum distinguimus: præterea Bryon thalassion Turneri refert C. Bauhinus quoque ad Lactucam marinam.

Vires.

Corallinam circumforanei in puluerem contritam in plateis venditant ad puerorum vermes necandos: siquidem non modo interficit lumbricos sed eos quoque eodem die expehit, magna sæpe cum adstantium admiratione, quod quandoque visus sit puer, qui ex assumpta huius pulueris drachma, centum vermes excreuerit. Puerulis, qui nondum annum ætatis quartum attingerunt, datur drach. semis: adultioribus drach. j. Aduertendum autem inueteratam & exoletam non esse sumendam: præterea cum ea uti volumus, prius in puluerem terendam, non cum quidem subtilem nimis, sed crassiusculum, quod diutius in ventriculo & intestinis hæreat: datur puluis in vino, lacte, aut Cassia. Cui Matthioli in comm. meminit centum vermium, quos vidit reiectos: in hist. autem germ. dicit circiter septuaginta: An Matthioli circumforaneorum more scribebat quæ veniebant in mentem, siue visa, siue non visa. Quæ nunc dico non sunt ut eleuem Corallinæ vim aduersus lumbricos, sed ut demonstrem quantum in rebus dubiis credendum Matthiolo, quicquid dicant de eo glossatores, fautores, & alii in cognitione stirpium minus versari, quamuis in cæteris docti viri, qui extollunt Matthiolum, de eo iudicantes, ut cæci de coloribus. Is ait in Epit. se cum Galeno & Dioscoride facile concedere, posse quidem Muscum marinum, qui recens fuerit, refrigerare: quod verò siccus id efficere possit, quod gustu falso scietur, non ita facile sibi concedendum videri.

Matth. nec.

CORALLINA FISTULOSA


fragilis duplex.

Descriptio:

Dum triumue vnciarum numerosos progenerit coliculos, cinereo filo crassiori pares, superficie crispâ seminum saccharo conditorum, alias læui, & veluti tornio elaborata, circularibus zonis densis præcincta, intus fistulosa, decussatisque cruciformium interstitiorum cancellis distincta, fragilis admodum & læui digitorum attritu in arenam solubilis, sapore saturo, propagines mediante tenui brevissimoque filo adnectuntur. Adnascitur quoque eidem fungo rudiori Fucus ille Abrotoni nomine Lobelio pictus, quem nos Cremenei Istnorum nominamus. Gener Cherlerus collegit in mari Adriatico.

Varietas

Est nobis alia subtilior multo, ac ceu pili aut



CORALLINÆ AFFINIS, SIVE MUSCUS marinus tenui capillo.



filamenta quædam crustulas obiecta essent. Intus enim veluti pilus est tenuissimus: crusta intecta porosa est, alba; in plures ramulos vermiculatos diuisa, Corallinæ in modum, sed minimos, exiguos, delicatissimos.

Saxi aut Sconcharum fragmentis innascitur, verum latius multo se spargit, propaginibus, etiam quatuor vnciarum, ab ubi de circumfulis, ad teretem, durum, nigricantem neruum adnatis cirrhis capillaceis mollicellis, ramosis, colore albicante, cinereo, viridanti, vel denique nigro, sapore

Descriptio

Descriptio

Corallinæ fæluginosa: Verum licet ad tactum mollis sit, sub dentibus tamen Corallinæ instar crepitat, & nescio quid lapidei refert. Est & vix vnciale altitudinem superet, villis interdum ramosis, densissimis. Eiusmodi candidissimam Pilæ marinæ inhzrentem adseruamus, uti Pilæ eius figura docet. Hæret etiam aliquando Coralloidi flexiosiori.

An Imperato lib. 17. c. 3. Peluccio pettrigno.

C. Bauh. pin. Muscus maritimus 1. siue Muscus capillaceus multifido folio albidus: Muscus marinus vulgarissimus, Lobelii in Obseru. pag. 648. in Icon. tom. 2. pag. 249. & Lugdun pag. 1568. Muscus marinus 2. Dodon. [figura sine descriptione.] at 1. Eid. belg. Muscus marinus, Gerardi: Muscus marinus 3. Tabernam. Muscus marinus herbaceus mollior, Cæsal. Muscus albus marinus, Imper.

Synoni

Compilerator T. bern. exhibet adhuc aliam picturam huius Musci marini, primo loco, sine quidem descriptione, aut distinctione, per quam intelligo Muscum marinum pollicem vix excedentem, in tenuissimos tamen ramulos diuisum; quod non demonstrat icon.

CORALLINÆ AFFINIS NODYLARIA.

CAP. LVI.

Descriptio Ramulis est breuib. multifidis, coloris cinerici, concretionē lapidea, fragili: sub dentibus crepitat. Cum Corallina nescio quid commune habet, nullo tamen chorulo facta, ut sunt Corallorides frutices.

Imperatus l. 12. c. 13. Nodulariam numerandam censet inter Muscos marinos. Considerandum autem an vna ex Nodulariis Imperati non conueniat cum Coralliua officinarum à nobis descripta.

Corallina Casp. Bauhin. pin. Corallina 10. siue Corallinae affinis Nodularia, varians colore albo, pullo, puniceo. Fratri missa est hæc planta marina Neapoli nomine Nodularia, Fuci generis.

ANDROSACES VETERIBVS.

CAP. LVII.

Lotus. **Descriptio** Androsaces [Ἀνδρῶσας, Ald.] in maritimis Syriæ nascitur. Est verb. Dioscoridi herba alba λευκή, ut in Orib. legitur. Apparet autē vel ex Plinio λευκή pro λεπτή in Dioscor. legendum: Corn. quin & Marcell. & Matth. ex aliquo fortē antiquo codice, albam verterunt. Tenibus cirthis amara, sine foliis (ἄφυλλος, quidā putant legendum ἄφυλλος, Matth.) folliculum habens in cacumine, qui semen continet. Ea vim habet duarum drachmarum pondere cum vino pota, ut urinas multas in hydropicis ducat. Sed & herba decoctum, & semen potum, eundē prebet effectum. Illinitur etiam vtiliter podagricis. Inter, notia alii Picrida, alii Leucen, & alii Thalassiam vocant.

Plin. Androsaces herba est alba (inquit Plin. l. 27. c. 4.) amara, sine foliis, folliculos in cirthis habens, & in his semen: nascitur in maritimis Syriæ [Istriae, alius] maximè. Datur hydropicis drachmis duabus trita aut decocta in aqua, vel aceto, vel vino. Vehementer enim urinas ciet. Datur & podagricis, illiniturque. Idem effectus est & semini.

Galen. Galeno 6. simpl. Androsaces humida [ὑγρὰ, Paulus μῆλα, & ita quoque Dioscor. & Plinius, Corn.) & acris herba est. Potest autem siccata & pota tum ipsa, tum semen eius, urinas abundè mouere, & discutere nimium, ac siccare.

Erym. Androsaces autem dicitur, quoddam hydropicorum aquas ducat: Vel, Hydrosaces, quia non nisi in aquis crescat. Non desunt qui eam plantam, quam nos Cuscutam nominamus, Androsacen esse, affirmant. Sed falsam eorum esse opinionem, nemo non videt. Alii hoc nomine nuncupant Tragum Gesneri: Androsacen alteram, Matth. Alsinen. Androsacen Matth.

ANDROSACES MATT. SIVE FVNGVS petreus marinus, siue Vmbilicus marinus.

CAP. LVIII.

Descriptio Vitam agit sub aquis, concharum striatarum gibbis, scopulisque innascens: staminibus fili instar tenuibus, vncialibus & tescuncialibus, quorum singulorum extremum excipit vmbilicus clypeoli circinatæ rotunditatis, lineolis à centro creberrimis productis striati: color cinereus: sapor saluginosus.

Plantæ hoc genus inuentum in Hetruriæ maritimis, Matthiolo misit Pisis Lucas Ghinus, qui si Androsacen statuisset, & Androsaces in Italia nasceretur, Matthiolus ex eo non dissentiendum

putaret, quoddam præter alias notas, hæc planta tota candida spectetur, ut Oribatius ex Dioscoride transcripserit. Sed à pluribus iam annis plantam Gesnero, clarissimo præceptor, misimus, addidimusque Matthiolum multum titubare, stirpemque hanc Dioscoridis Androsaces descriptioni non respondere, sed potius Fungum esse aliquem conchis & lapidibus adnascens: nec maritimam esse, sed marinam: non amaram, sed nonnihil salis, nec acrimoniam habere manifestam: Galenum autem dicere acrem. Mordacitatem præterea non sentiri licet sint qui mordaci sapoream participare dicant. Denique semina non proferre, quæ requiruntur à Dioscoride & Plinio.

Fungus marinus minimus, inquit Cæsalpinus, inter fungos lapillis innascitur, intra aquam: ei sapor inest salus & mordens. Videretur Androsaces esse apud Dioscoridem, si eius pileoli semen continerent.


Camer. ad Epit. & hist. germ. Matthioli figuram proponit in qua Androsaces supra rupes & conchas pingitur, ac etiam, ut mihi videtur, ea species quæ minoribus est capitulis.

C. Bauh. phyt. apud Matthiol. & pin. Androsaces duas species tradit. Leidicetur Androsaces petreæ innascens, vel maior: Androsaces, Matth. Icon. Cast. & H. Lugd. p. 362. Musci marini genus, Guill. II. Androsaces chame conchæ innascens, vel minor: Androsaces, Coryledon foliosum marinum Lob. in Adu. & Ic. pag. 387. Androsaces, Eid. in Obs. pag. 110. & Lugd. (cui & Vmbilicus marinus Montpelienisium) & Camer. Epit. qui utramque vna figura exhibet, Fungus marinus minimus, Cæf. Androsace communiter conchæ, rarius petreæ innascens, in stagnis circa Magalonam & Frontignanum. Nos statim nos cum Casp. Bauh. in eo discrimen, quoddam petreæ, vel conchæ innascuntur: fungus enim latiori capitulo, qualis à Matthiolo pingitur, æquè supra petram, ac supra concham prouenit. Præterea stagnis innatantē nō obseruauimus.

Ceterum, crescit & viuit in aqua, non in aere, Locum ut Matthiolus pinxille scribit Lobelius.

Idem ventrem sistere nouit, ut hic scrupulus Anguillæ eximatur, nec expeti, ut alium soluat.


FVNGVS SIVE MVSCVS PETROSVS. CAP. LIX.



Imperatus l. 1. nat. lib. 27. cap. 8. auctor est plantam hic depictam Muscum petroselinum (Itali Musco petroso) à quibusdam nuncupari, & ab aliis Alcyonium quintum Dioscoridis statui.

Casp. Bauh. pin. facit Alcyonium u. & Fungum auriculatam, Cæsalpini: Muscæ saxatilem, Imperati.

FVNG

FVNGI LAPIDEI
CAP. LX.

VT in terra, sic etiā in mari Fungi nascuntur: at hi non molles, sed lapideā duritie præditi, quorum genera, partim in Indico mari partim in Nilo eruta sunt, ut Clusio referebat cuius quidam Amsterodamensis, apud quem eos anno 1600. conspiciebat.

E maioribus porro qui è mari eruti, nullum exprimendum curabat, quia nulla apparebat pediculi, qui eos sustinuerit, vestigia. Sed quem cuius ille dicebat in flumine Nilo natum, duntaxat tamen maiorem, quia integer, & alium præterea minorem & magis contractum, exprimi curabat, & maioris quidem pronā & supinā partem, in prima & secunda tabella, quæ hic appositæ; minorem, in tertia.

In Nilo natus, decem vnciarum habebat circumferentiam, eius diameter tres vnciæ cum semisse: totus autem saxeus erat & candicans, supernâ parte, ab umbilico ad circumferentiam multis profu-

dis striis, oblique quodammodò excurrentibus ornatus, inferna autem, minus clatis striis, inque asperis & quodammodò echinatis, erat præditus, quæ à circumferentia ad pediculum productæ

Tam. III.

desinebāt, quæ videlicet parte magis fuscus erat, pediculus eius brevis & crassiusculus, qui à scopulo aut petra abruptus videbatur.

Minoris, qui compressus, floris formam quodammodò exprimebat, circumferentia & ambitus [qui valde sinuosus,] sex vnciarum erat diameter, in longitudine duarum cum semisse, in latitudine autem, vnius aut paulò plùs, & quia in floris quodammodò formam allurgebat, altitudo pæne duarum vnciarum erat, ab extremo orbe descendendo sensim gracilescens: pediculum habebat breuem & crassiusculum: striæ quæ externâ parte à pediculo ad circumferentiam excurrebant valde conspicuæ: quæ autem in parte interna, profundiores & magis conspicuæ, simul etiam in medio coeuntes, quæ in modum ex icone in vltima tabella expressa conspiciet.

C. Bauh. pin. Fungus lapideus 1. vel maior in Nilo natus: Fungus saxeus N. II. maior Clusii Exot. lib. 6. cap. 10. Eid. Fungus lapideus: siue minor: Fungus saxeus minor, Eiusdem ibidem.

LICHEN MARINVS.
CAP. LXI.

Lichenis marini à Lobelio in It. Plant. pag. 247. tom. 2. Inscripti delineationem lege in Lob. Teut. tom. 2. p. 28.

FVCI FVNGIFORMES.
CAP. LXII.

Fuci fungulari dicti Imperato, sunt de numero foliorum marinorum, folio quasi circino orbiculato, non sine impressis lineamentis, itidem in orbem contortis. Adhærent rebus quibus innascuntur ea parte quæ in vicem est centri. Accedunt colore & figura ad Fungos quosdā qui supra arbores crescunt. Maiores redditi finduntur secundum lineas, quæ ab ambitu vergunt ad centrum. In hoc genere altera species; quæ maior est, acquirit spithamæ longitudinem siue altitudinem, atque in aqua provenit, minutulis nixa pedicellis. Hæc in ambitu foliorum crispatur. Minor verò duas vncias vix excedit, & plana est: & sæpè alterum folium stat supra alterum, color ut plurimum spadiceus est.

C. Bauh. pin. Fucus subrotundus 4. siue Fungis affinis: Fucus fungularis maior & minor, Imper.

SPONGIÆ EX ANTIQVIS ET IN
genere. CAP. LXIV.

QUÆ Latinis Spongia est, Græcis σπῆγξ dicitur: Erymologicus autem sic appellari scribit *τὸ σπῆγξ τὴν ὕλην*, quod humorem attrahat, & combibat. Dioscoride referente, ē Spongiis alias nonnulli mares appellauere, quæ tenuibus sunt fistulis, ac spissæ densæque, ē quibus rursus duriores τῶν γυναικῶν nominauerunt: alias verò fœminas, quæ cōtrario, ac antè dictæ, modo se habent.

E Plinio lib. 9. cap. 45. Spōgiarum tria genera accepimus spissū ac prædurū & asperum, Tragos id, ab odore graui vocatur: minus spissū, & mollius, Manon: tenue, densumque ex quo penicilli siue turundæ [quæ sinuosis ac cauis vlcereb. immittuntur] parantur, Achilleum. Nascuntur omnes in petris, aluntur conchis, pisce, limo: intellectū inesse iis apparet, quia vbi auulso-rem senserē, contractæ multò difficilius abstra- huntur. Hoc idem fluctu pulsante faciunt. Viuere escā, manifestò conchæ minutæ in his re- pertæ ostendunt. Circa Toronem nasci illas (ves- ci illis corrupta lectio) auulsas etiam aiunt, & ex relictis radicibus recrefcere. In petris cruo- ris quoque inhæret color, Africis præcipuè, quæ generantur in Syrtibus. Maximæ sunt Mānæ: sed mollissimæ, circa Lyciam. In profun- do autem, neq̃ ventoso, molliores. In Hellefpon- to asperæ, & densæ circa Melam, Putrescunt in apricis locis: idè optimæ in gurgitibus. Vi- uentibus idem, qui mandentibus, color nigricās. Adhærent nec parte, nec totæ: intersunt enim fi- stula quædam inanes, quaternæ ferè aut quinæ, per quas pasci existimantur. Sunt & aliæ [fistu- læ, per totum corpus earum sparæ, verū hæ su- perne oclusæ & obturatæ] sed supetnè concre- tæ. Et subesse membrana quædam radicibus earum intelligitur. Viuere constat longo tem- pore. Pessimum omnium genus est earum, quæ Aplysiæ vocantur, quia elui (quod adeò sordida sunt & inquinatæ) non possunt, in quibus ma- gnæ sunt fistulæ, & reliqua densitas spissa. Et *Hæc Plinius ex Aristotelis libro 5. de hist. animal. transcripsit.* Idem rursus lib. 31. cap. 11. per longū de Spongiis & ipsarum vsu agit, quæ nos inter vires tradituri sumus. Hæ lanè *Σπίγγα* & *Σπίγγα* dicuntur, quæ vt habet Plinius, neque fruti- cum, neque animalium, sed tertiam quandam ex vitroque naturam habent.

Fer. Imperato Spongiarum natura Fungis proxima est, de vegetabilium marinorum ge- nere, quarum substantia velut ex lana compacta, fistulosa seu foraminata, & vndique mucagine quadam membranæ vestita. Viuunt Spongiæ scopulis, testaceis & arenæ radice sua affixæ. Ha- bent intus vim quandam motiuam quā se con- trahunt atque dilatant, qui motus apprimè eius materiæ conuenit. Ergo vento aut tempestate a- liāue re extrinsecus accedente contactæ, retrahūt se versus radicem, atque constringuntur: tum meliùs rem, cui adherent, firmiusque amplectun- tur. Auulsa à sua radice, hæ nihilominus repul- lulant, & vt aliæ plantæ recrefcunt. Spongiarum eiusmodi proprium est, facillè constringi, & in pristinam amplitudinem dilatari: adhuc humo- ris esse sitibundas, quem facillè imbibant, & com- pressæ omittant. At in mucagine obhærescen- te propriè sensus earum est & vita, à qua & fa- cultatem habent se contrahendi. Dicimus er- go: alterum earum motum esse ab anima earum, alterum à conditione materiæ. Viuentes tantum

suapte Marte, vique propria se constringunt. Sed dilatatio communis est his cum non viuētibz: nam & mucore orbis si constringas, resiliunt, & in pristinam molem ampliuntur. *Differunt Spon- gix flacciditate, lentore: duritie, mollitie: densi- tate & raritate: porisque crebrioribus aut rario- ribus, quæ omnes differentiz materiæ sunt pro- priæ. A figura quoque differentiz, aliis globosis, aliis laciniatis, aliis denique ramosis existentibus.*

Spongia globosa.

NEapolitanorum littorum propria est, auto- re Ferdinando Imperato, figura pomi, ali- quantum turbinata, substantia tenera, flexili [ar- rende uole] & Spongiarum simili, sed maxime foraminata, hiantibus apertisque cauernis. Re- peritur sanè magnitudine capitis humani aut e- tiam maiori.

C. Bauh. pin. Spongia 1. siue Spongia globosa, Imperati.

Spongia compressa Schiacciata.

Figuræ sunt orbiculatæ, latæ, parum crassæ, sub- stantiā flexuosa, & quæ facillè comprimī possit, tenaci, foraminata, sed exiguis poris, ceteris om- nibus ad Spongiarū vsu, ob plures condiciones requisitas, quas habet, experita. Has Spongiæ, si Imperato credimus, antiqui Achilleas nomi- narunt propter earum subtilitatem, firmitate mi- que: quapropter ad arma sustinenda corporibus equitum interponuntur, & vtī motum eorum atque impulsū prohibeant. Fulciuntur pedicu- lo instar Fungorum, quibus similitudine quadam respondent.

Casp. Bauhin. pin. Spongia 2. siue compressa Imperati.

Spongia compressa Schiacciata, Oceani latissima.

ET hæc Oceani Spongia propter substantiam edensam atque tractabilem ad vsu à Spongiis expeti solitos valet, teste Imperato. A figuræ am- plitudine commendatur, quippe cuius diame- ter, duos æquet cubitos: crassitudo duorum di- gitorum, figura plana, expansa, atque compressa. Habet præterea foramina quædam quatuor ra- diis stellata. Centro hærens uiuit, sicut ceteræ Spongiæ.

C. Bauh. pin. Spongia 3. siue compressa magna: Spongia marina alba & flaua (weiß vnde geel Meer schwamm, Bad schwamm) Tabern. & Ge- tardi: Spongia compressa latissima Imperati.

SPONGIÆ HIRCINÆ.

C A P. L X V.

SPONGIÆ hircinæ dictæ Imperato, sunt ex quæ sduræ sunt, idèoque à Spongiarum bonitate degenerant. Tales figura sunt inæquali, cum emi- nentiis diuersis, cauitatibusque, per quas aqua marina transmeat.

C. Bauhin. pin. Spongia 4. siue hircina Impe- rati.

Vires Spongiarum in genere.

SPONGIÆ vitionem eandem habent quam Al- Seyonium. Noua verò & non pinguis vulne- raria est, & tumores reprimi, & recentia vulne- ra glutinat eum aqua posca: cum melle autem cocto

Locus
Descriptio

Synon.

Descrip-

Synon.

Descriptio

Synon.

Descriptio

Erymon.

Genera
Plinio.

Plin illu-
stratur.

cocto veteres sinus agglutinat. Verus Spongia inutilis est. Sed & si filo diligenter & ipsa arida velut linamenta indantur, conclusa vlcera & callos disparant. Si vero sicca, recentes, & inanes imponantur, fluida, cuniculosa, & diuturna vlcera resiccant. Cohibent & sanguinis eruptionem cum aceto. Vltæ eadem ad lippitudines faciunt, & vbi quid extergere opus est. Verum ad ocularia medicamenta melius faciunt lotæ. At cum pice vltæ ad sanguinis eruptionem conueniunt. Dealbantur tenerrimæ ex ipsis, in ardoribus solis, spuma salis in petris consistente madefactæ & insolatæ: quod dum fit, caua ipsarum pars sursum spectet, deorsum vero quæ refectæ sunt. Si vero fuerit serenitas æstiva, etiam sub lunam exponuntur, & spuma salis, aut aqua marina, asperguntur, & calx albulimæ fiunt, auctore Dioscoride.

Plinius. Spongiarum genera diximus [inquit Plinius lib. 31. cap. 11.] in naturis aquatiliū marinorum. Quidam eas ita distinguunt. Alias ex his mares [Lugdunenses, duriores & fistulis minoribus pettulas, mares vocant: molliores autem, laxiores, & amplioribus cauernis fistulosas feminas. Dal.] existimauere, tenui fistula, spissioreque, persorbentes: & quæ tinguntur in delictis, liquando & purpura: alias feminas maioribus fistulis, ac perpetuis, è maribus duriores alias, quas appellant Tragos, tenuissimis fistulis atque dentissimis. Candidæ curæ sunt, è nouissimis recentes per ætatem tinctæ salis spuma, ad Lunam & pruinas/ rores potius. Nam ætate nulla pruina fit) sternuntur inuersæ, h. e. qua parte adherere: ut candorem bibant. Animal esse docuimus, etiam cruore inherente. Aliqui narrant & auditu regi eas [Plutarchus Spongas ab animali, simili araneo, regi scribit] contrahique ad sonum, exprimentes abundantiam humoris, nec auelli petris posse, idè abicindi, ac saniem emittere. Quin & eas quæ ab Aquilone sunt genitæ, præferunt cæteris. Nec vquam [in aliis maris locis, quàm Aquiloniis.] diutius durare spiritum [natiuum, quem è mari natalibusque suis conceptum, & fistulis abditum celant: Medici affirmant. Sic & prodesse corporibus, quia nostro suum misceant, & idè magis recentes, magisque humidas: sed minùs in calida aqua [salsuginem citius diluit, quàm frigida.] minusque vntas (Oleosa enim ac pinguis salsuginis vim obtundunt) aut vntis corporibus impositæ: & spissas minùs adherescere. Mollissimum genus earum penicilli [Achillas Aristoteles vocat lib. 9.] oculorum tumores leuant ex multo impositi. Idem abstergendæ lippitudini utilissimi: eosque tenuissimos & mollissimos esse oportet. Imponuntur Spongiæ ipsæ epiphoris ex posca: ex aceto calido ad capitis dolores. De cætero recentes discutiunt, molliunt, mitigant. Veteres conglutinant vulnera. Vltus earum ad abstergenda (non tantum membra corporis, sed alia quæuis, ut mensas & ceteros utensiles, Homero: fouenda, operienda à fori dum aliud imponatur. Hulcera quoque humida & senilia impositæ siccant: fracturæ & vulnera Spongiis utilissimè fouentur. Et ipsæ vulnerum inflammationibus imponuntur nunc sicca, nunc ex aceto inspersæ, nunc è vino, nunc ex aqua frigida. Ex aqua verò celesti impositæ, secta recentia non patiuntur intumescere. Imponuntur & integris partibus, sed fluctuatione occultâ laborantibus, quæ discutienda sit, ut iis quæ apostemata

vocantur, melle decocto peruruntur. Item articulis alias aceto salto madidæ, aliàs è posca. Si ferueat impetus, ex aqua. Eadem & callo salta madidæ: ac contra scorpionum ictus ex aceto. In vulnere curatione & succidæ lanæ vicem implent, nunc ex vino & oleo, nunc ex eadem. Differentia hæc, quod lanæ emolliunt, Spongiæ coercunt, rapiuntque vitia, [præuos succos, sordes, excrementa, saniem] vlcera. Circumligantur & hydropicis sicca, vel ex aqua tepida poscæ, vtrunque blandioribus opus est, operiæ aut siccari eutem. Imponuntur & his morbis, quos vaporari oporteat, feruenti aqua persusa, expressæque inter duas tabulas. Sic & impositæ stomacho profunt, & in febre contra humios ardores. Sed splenetici è posca, igitur sacris ex aceto, efficaciores quàm aliud. Imponi oportet sic, ut sanas quoque partes spatiose operiant. Sanguinis profluum sustunt ex aceto, aut frigida. Liuorem ab ictu recentem, ex aqua salta calida sæpius mutata tollunt, testis tumorem, caloremque ex posca. Ad canum morbus vtiliter contitæ imponuntur ex aceto, aut frigida, aut melle, abundè subinde humectatæ. Africanæ (quæ generatur in Syriis) cinis cum Potri sectiui succo sanguinem reicientibus haustu salis ex frigida prodest. Idem cinis vel cum oleo, vel aceto fronti illitus, tertianas tollit. Priuatim Africanæ ex posca tumorem discutiunt. Omnium autem cinis cum pice crematarum, sanguinem sistit vulnere. Aliqui raras tantum, ad hoc cum pice vrunt. Et oculorum causa comburuntur in cruda olla sigulini operis, plurimum proficiente & cinere contra scabritias genarum, excrecentesque carnes, & quicquid opus sit ibi distringere, spillare, excludere. Præstant & strigilum vicem lintæolorumque affectis corporibus, & contra Solem aptè protegent capita. Medici inscitia ad duo nomina eas redegere: Africanas, quarum firmitus sit robur, Rhodiacasque ad fouendum molliores. Nunc autem mollissimæ circa muros Antiphelli vrbs reperiuntur. Trogus auctor est circa Lyciam penicillos mollissimos nasci in alto, vnde ablata sint Spongiæ. Polybius super ægum suspensos quietiores facere noctes.

Spongia vltæ Galeno actis est & digerentis potentia. Spongia nqua, non sicut lana, aut linamentum, materia duntaxat, est quæ humores irrigandos excipiat, sed etiam manifestè desiccet. Quare vulnera glutinat, si aqua, aut oxycrato, aut vino admoneatur imbuta: à qua sanè, quæ antiqua est, longo spatio relinquatur.

Subdit Quercetanus antiquos calculi remediū docuisse, ex Spongia calcinata, & in cineres adusta. Item, plerosque recentiores Medicos eisdem Spongiæ cineribus vti ex vino albo propinatis in cura broncocele, totò vnus Lunæ curriculo, certissima experientia.

SPONGIÆ LAPIS.

CAP. LXV.

L Apides, qui in Spongiis reperiuntur, cum vino potos, calculos in vesica frangere ac comminuere prodidit Dioscorides. Spongiæ lapides inueniri in Spongiis & esse natuos testatur Plinius. Quidam eos Cystolithos vocant quoniam vesicæ medeantur. Horum vires re-

Descriptio

res retulit Galenus l. 9. simpl. medic. his verbis: Lapides qui reperiuntur in spongiis, frangendi vim obtinent, non tamen ita validam, ut lapidem in vesica comminuant, unde qui id scriptum reliquerunt, mentiti sunt, verum eos qui in renibus consistunt, rumpunt: &c.


H. L. ner.

SPONGIA INFUNDIBULVM IMITATA.

CAP. LXVII.

Elegans hoc spongiæ genus, quod doct. ff. & humaniss. Vir David Sinapius adseruabat anno reparatæ salutis humanæ 1600. ac cuius etiam formam Clusii rogatu ipse delineari curabat, & ad eum mittebat, in hærebat adhuc suo saxo, etque durissimo & nigro, quod duodecim libras pēdebat.

Descriptio.



Synon.

Casp. Bauh. pin. Spongia 9. siue formâ infundibuli: Spongia elegans, Clus. Exot. l. 6. c. 11.

SPONGIÆ VELARES.

CAP. LXVIII.

Velares Spongas cum Imperato dicimus, quarum textura rara est. Nam ablata mucagine, quæ fibrarum vacua replet spatia, restat tantum quiddam lanuginosum filamentum instar, aut capillorum simul ligaturum. Harum ergo usus non est qualis spongiarum.

Descriptio.

Est & huius species quædam cuius processus auium pedes quodammodo repræsentat, quarum superficies asperitatis eminentibus oblita.

Etiānum alia huius caudæ auiis similis, cuius fibræ ab ortu ad extrema usque extenduntur.

Alia quæ cornu cerui figuram æmulatur: nam è radice allurgens in ramos vna tantum parte, siue altero tantum latere, diuiditur. Huius substantia similis est laxo alicui nec condensato filtro.

C. Bauh. pin. Spongia 5. siue velaris Imperati.

SPONGIA RAMOSA

CAP. LXIX.

Spongia ar. ser.

Ferd. Imperatus l. 17 c. 7. p. 730. vocat Spongiā ligneam arboream: Et p. 728. Fungos spongiales dictos Tufb. Hæc arbusculæ in modum à truncis in ramos diuiditur: virgulta filtro duro similia, fissilia, à radice ad extrema usque densa spongiositate, floribus Typhæ [Tufæ] plantæ palustris simili, vestita. Huius materia faciliè relaxatur, atque compressa, faciliè in pristinum redit statum: quæ in re à spongiarum natura dege-

nerat. Ramorum diuisura ferè est qualis digitorum palmæ humanæ. Sunt & aliæ in rotunditate collectæ, & ad Pini figuram quodammodo accedentes.

C. Bauh. pin. Spongia 6. siue ramosa.

DE ALCYONIO VETERVM ET

Neotericorum sententiæ.

CAP. LXX.

Alcyonii, inquit Dioscori: quinque esse genera competunt. Primum enim Spilum, acerbi saporis, spongiola facie: item tetri odoris, ponderosum, & piscem olens, quod plurimum in littoribus inuenitur. Alterum oculorum pterygio aut spongiæ simile, leue & multicanum, odore ferè Algæ. Tertium vermiculi forma & colore penè purpureum est. Quartum succidis velleribus non dissimile, multis inanitatibus hians ac leue. Quintum figura Fungi, inodorum, & ineus quidem asperum, quodammodo pumicosum, foris verdè læue, acre: quod plurimum in Propontide, circa insulam æsbycum appellatam, gignitur patrio nomine Halos achnen, quali maris spumam aut lanuginem, vocat. Duo quidem priora in sinegmata tæminarū assumuntur, contra lentigines, lichenas, lepras, vulgines, nigritias & maculas in facie, reliquosque corpore. Tertium verdè, iis qui difficili vrina vexantur, aut arenulas in vesica colligunt, idoneum est: itemque nephriticis, & ad hydropem lienisque vitia. Vltimum autem & ex vino illitum, alopecias replet. Postremum ad albicandos dentes aptum est: assumitur & in alia sinegmata, psilothraque, cum sale mistum. Quod si quis aliquod ex hisce Alcyonii generibus cremare voluerit, addito sale in crudam ollam mittat, lutoque obliquo eius spiraculo, fornaci mandet: & cum figlinum percoctum assatumque fuerit, extrahat, & ad usus recondat. Cæterum lauat uti Cadmia.

Genera quinque Diosc.

Alcyonium, ut Plinius est auctor l. 2. cap. 8. fit in mari, ex nidis, ut aliqui existimant, alcyonium & Cereum: alii ex sordibus spumarum erallescentibus: alii è limo vel quadam maris lanugine. Quatuor eius genera Cinerum, spilum odoris asperi: Alterum molle, lenius odore ferè Algæ. Tertium candidioris vermiculi. Quartum pumicosius, spongiæ putri simile, penè purpureum, quod optimum; hoc & Milesium vocatur. Quod autem candidius, hoc minus probabile est. Hæc Plinius: Qui tamen, inquit Matthioli, Quintum fungi figuræ, cuius meminere Dioscorides & Galenus, in his Dioscoridem secutus, silentio præterit.

Si Amarus Alcyonia nouit, cur non descripsit? Vocat Halcyonsum Hisp. Spuma della mar, Gall. Estume de mer, Merde de Cormarin, Ital. Alcyonia, Arab. Zebd-lhar, Germ. Meerschwam. Cæsalpino verdè ut Diosc. & Galeno quinque sunt Alcyonia.

ALCYONIVM SPONGIOSVM


officinarum.

CAP. LXXI.

Alcyonii huius frustū adseruamus quod & idè in officinis prostat. Duos pugnos crassitudine amplitudineque faciliè æquat: Substantia quæ superficie tenus veluti cortice obte-

Descriptio.

stola



stola, tota punctis canis notata, canernis pluribus inaequalis. Interior facies Spongiae similis est; sed firmitior, colore pullo, tota porosa. Nam alicula vel modico pressa facile penetrat. Pondus, pumicis lapidis non adaequat: odor & sapor saluginosus. Est & nobis frustum ex quo Alga angustifolia prorulit,

eique ceu terra inhaerescit. In nostra icone demonstrantur radices & capillamenta Algæ.

C.B. var.

C.Bauh.pin. Alcyonium 1. siue durum, aut 1. Dioscoridis Imperati: exhibet frater apud Matthiolum figuram Tabernamontani sed non indicat an eius meminerit Matthiolum, vel sub quo numero tradat.

ALCYONIVM STYPPŌSVM IMPERATI.

CAP. LXXII.

Descript.



Synon.

Styppis in glomerem conuolutis substantia interiori quodammodo simile est, ad tactum molle. Inuolucro tenuis Alcyonio duro aliquantulum simile, contum, calycis formam imitante. Ex cuius concauo odor exhalat piscosus. Et germina interdum protrudit, sicut de molli dictum.

ALCYONIVM TVBEROSVM.

CAP. LXXIII.

Descript.

Tuberosum est hoc Alcyonium, pediculo latiusculo, firmo, superficie tenuis punctato: substantia interior fibrosa, fibris directe e corticis cavitare porrectis, & circa media iunctis, & quasi in vnum conuolutis. Totum candidum est, & plurimam Algæ radicibus adhærens, figurâ tuberosa inaequali, magnitudine interdum quan-



tum vix ambo- bus brachiis amplecti liceat.

Fer. Imper. authori dicitur Alcyonium Synon. tuberosum, forma Ficûs, Alcyonium 5. Dioscoridis. C.Bauh.in. pin. Alcyonium 7: siue forma fructus aliculus Ficûs.

ALCYONIVM MOLLE IMPERATI.

CAP. LXXIV.

Descript.



Huius materia Spongiae similis est, ad tactum cedens: cortice obtectum est & quod alia germina exeunt lunicorum specie, crassitudine calami asserini, concaua: inter quæ textura quædam tessellata prætenui filo, raroque velamento obducta conspicitur.

Synon.

Imper. Alcyonium molle.

Alcyonium 4. Dioscoridis. Casp. Bauhin. pin. Alcyonium 4.

ARANTIVM MARINVM.

CAP. LXXV.


Descriptio

Arantium marinum Imperati, colore est viridi, figurâ Arantii instar rotunda: quod tamen motu quodam adaperit denuò clauditur, quasi sensu quodam & virtute contractrice, quod animalium proprium videtur, sit prædictum. Et hæc de Arantio marino Imperati, quod idem suspicamus cum Granato malo Aldroandi. Hæc tamen separat Casp. Bauhin. in pin. cap. de Vertica marina, collocans Arantia marina non loco, Malum verò granatum Aldroandi, decimo.


VESICARIA MARINA DVPLEX,
non ramosa & ramosa.

CAP. LXXVI.

L Obos adferuamus pugno maiores alicubi ad mediterranei maris ripam collectos, ex meris vtriculis vacuis Pili magnitudine coaggestos, cum foraminulis singularibus inferiore parte vesicularum: qui mutua cohaesione veluti ramos efficiunt contortos, compressu spongiæ in modum renitentes, leuissimos, colore flauescente, liquido, aut pallido.



*Alcyonium
Pila maris.*




Quidam è vulgo Spongiã marinã vocant: verum cum nihil ferè eũ spongia commune habeat quã colorem & leuitatem, ex re nata vesicariam, hoc est ex vesiculis refertam, vocitare maluimus.

Spuma maris Cefalpini, est C. Bauhino in pin. Alcyoniũ 15. siue Pila marina velut ex ampullis constans, ad spinz similitudinem.

Vesicaria ramosa prædictæ similis est, sed ramosior & plantæ figurã magis exprimens, quippe Corallinæ instar, variè diuaticati rami ex meris quoque folliculis foliaceis, coloris vel flauescentis, vel virentis, constant. Ramis verò muscus quidam coralloides, capillatus adhæret, totus candidus, tenuis & aspectu elegans. Hanc ad prioris differentiam Vesicariam ramosam vocare quis posset. Eam autem habuimus tum à D. Thoma Platero, tum à Jac. Micg.


VESICARIA MARINA NIGRA, FAVAGO
Aristotelis quorundam.
CAP. LXXVII.



Hæc duplex existit: Est enim Fauaginis Aristotelicæ species prima, quæ ex membrana-ccis cauernulis nigris constat, dispositis quidem more fauorum. Fauaginis Aristotelis secunda species, multis ex poris & cauernulis, faui in modum, coaceruata est. Earum autem vnaquæque ali-

quid inflexum habet. Materia constant subtili.

Fauaginem Aristotelicam Imperans facit Alcyonium secundum Dioscoridis. C. Bauhin. pin. Alcyonium secundum, siue (ut somniat) Fauaginem Austriacalem.



TROMBÆ.

CAP. LXXVIII.

C. Bauh. pin. Arundo Indica 7. siue fluitans. Trombæ siue arundineta fluctuantia in Bali insula: in Hist. Or. Ind. part. 3. cap. 2. & 40. & part. 4. fig. 10. Arundines longæ, seu Algæ in salso fluctuantes part. 5. Ind. Or.

Diarium nauticum itineris Batavorum in Indiam Orientalem vocat Arundines vulgò Trombas dictas, & Arundines tubiformes.

ARBORES CONCHIFERÆ VEL ANATIFERÆ falsò dictæ, vt Telinæ, ac Balani.
CAP. LXXIX.

Conchas quas anatiferas vocant, varia magnitudine accepimus, adhærentes quasdam lignis, quasdam etiam arundini, in quibus apparent veluti pennis, aut brachijs piscium. Habemus sanè vnciã lariores & longiores, colore & splendore Tellinarũ.

Balani siue Glandes Columna.



Paludanus enim nobis misit. Illustrissimus etiam noster Princeps Fridericus Dux Wirtembergicus, & eius nobiles ex Anglia reduces nobis attulerunt sibi persuadentes in Conchis illis aues generari. Atulic etiam Gener Cherlerus pie memorie.

Hector Bœtius in descriptione Scotiæ testatur hos anseres quosdam Clakis appellare, eoque perpe-

*Varian
magnus
dant.*



perperam in arboribus in Insulis Hebridibus nasci credere. Mari enim illis interfecto magis eorum procreandi vim quandam inesse, quàm alicui alii rei credit.

Britannica concha Anatifera credita, subdit Lobel. facit specimen naturæ quippiam boni vel è sordibus meditantis, ut iam multa lubeat

credere, quæ alioqui risissem apud rerum Separationum Historicos, quanquam paulò secus hi narrant, duntaxat in Scotia aut Orcadib. maris Caledonii Arctici, olim à Romana classe devictis, compertum. Nos verò non solum ex Scotia, sed etiam ad Tamesum amnem, quæ Londinū præterfluit, primùm conchas pediculo rugoso crassiores è navis annosæ carina auulsas, habuimus. Deinde Medio-castrî &c.


Has conchas contrà Rondel. in Northmannia & Britannia oriri asserit, nec aues generari ex his tradit, sed pro Balani specie exhibet atque describit: addens homines & mulieres alia fastidientes cibaria, hoc edulii genere delectari, atque elixatis in aqua, disrupisq; internam carnem ex aceto edere.

Hanc etiam communem vulgi receptam sententiā meritò refutat Columna, dicens has Conchas anatiferas putatas nihil aliud esse quàm glâdes marinas descriptas à Rondelenio. Dum Conchas hasce, ait, ex quibus anates oriri falso asseritur, minime vidissem, atque apud Lobel. quique eum secuti sunt, conspicerem in maris rupibus arborem esse, quæ fructus hos Amygdalæ pares formâ, atque magnitudine ederet: mentem sæpenumetò cogitatio huius rei perturbabat meam: neque credere poteram, etsi aliquando animum ad credendum inclinabam, ratione hac motus, quia scripta hæc erant à doctissimo Medico, atque demum ab aliis receptæ: at quidem iterum reiciebatur à sensu hæc imaginatio fortiore argumento, quia arbor fructus edens depicta exhibebatur, atque ab eodem Medico, iidem fructus Concharum nómine donati erant, quas è navis annosæ carina auulsas se habere testatur: quæ quidem inter se contraria, atque impossibilia censentur, &c.

De his apud Lobelium, Columnam & alios ex ipsis fontibus plura petat lector, nos necessariis insistentes, hic subsistimus.

FINIS LIBRI TRIGESSIMI NONI.







HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM LIBER XL.

EXCREMENTA TERRÆ, VT FVNGI ET TVBERA.

T Andem vela contrahentes & receptui canentes, adeoque portum captantes, officii in reditu nihilominus memores, Fungos contemplemur, & Boletos ac tubera ex ipsis etiam terra visceribus eruamus. Aded ad summa, vel potius infima, natura herbaria per suprascriptos ordines ventum est, ubi tamen etiamnum suā sponte occurrat imensum potentia occulta documentum, ut prorsus nec aliud ultra quari debeat, nec par, aut simile possit inueniri, ipsā se vincente naturā, dum absque semine Fungos, absque radice Boletos & Tubera, progengerat. Ided excrementa terra Sapientes appellare non dubitarunt. Et tamen hac præcipua est ventris infania. Omnia namque qua vsque ad hoc volumen tractauimus, hominum causā genita videri possunt. At in putrento sit, non contentam eorum voracitatē frugum, fructuum, herbarumque multis variarum donu, ni & Fungos, & Boletos, & Scillas, terra excrementa, sed gula nouissima irritamenta, sibi progenita sciret. Veramus hæc & magnā fat agentia quærimus, nullā aliā quā deliciarum, causā, quas transcendisse quoque mirum sit. Nam qui sitat sub his latitare venenum, hocque pro deliciis interdum sumptum, habeat quod utique cogitet, reputetque scium, qualia sint horum præcia, qua vita fugere potius, quā querere debeat.

DE FVNGIS ET BOLETIS IN GENERE.

C A P. I.



Fungorum, inquit Theophrastus, pediculus æqualitatem quandam peculiarem sortitus est: radice carent: è radicibus & iuxta radices Roborum erumpunt. Apud mare rubrum cum aquæ plures incescerint,

iuxta mare quodam in loco Sole tacti, in lapides commutantur.

Dioscoridi Fungorum differentia duplex est, aut enim in cibi vsum veniunt, aut venenosi sunt. Tales autem multis de causis fiunt. Aut enim iuxta clauos rubiginosos, aut panniculos putridos, aut reptilium bestiarum latibula, aut arbores quæ priuatim noxios ferunt fructus, nascuntur. Habent tales etiam crustam glutinosam, & posteaquam decerpti sunt, repoliti faciliè putrescentes corrumpuntur. Qui verò tales non sunt, cocti ac conditi suauis sunt. Et tamen etiam hi largius sumpti lædunt, ut qui ægrè concoquantur, strangulant, & bilis sursum ac deorsum eruptionem inducunt. Ita ut Fungi partim genere, partim copiam lædant. Idem lib. II. cap. de Populo scribit quoddam tradere Populi albæ & nigre corticem in tenuia frusta concisum & in puluinos stercora-

Tom. III.

rios seminatum, in omni anni tempore Fungos edules producere. De Populi Fungis, vide postea cap. de Fungis pluribus simul albis ad arborum radices esculentis.

De Fungis Galenus sparsim hæc prodit. Fungus [inquit 8. simpl. frigida, humidaque admodum planta est. Quamobrem etiam proximè ad deleteriam, enecantemve facultatem accedit: & sanè inter eos sunt, qui interficiant, potissimum qui ex natura istam habent qualitatem putredinosam. Rursus aliment. 2. Inter Fungos Boleti, si bellè in aqua fuerint elixi, propè accedunt ad cibos insipidos. Non tamen sic solis ipsis vulgè vtuntur, sed apparant variè & condiunt; vt alia omnia, quæ nullā insigni qualitate sunt prædita: Alimentum autem ex ipsis est perniciosum, frigidum videlicet, præcipue succi, si quis ipsis largius vtatur. Omnium igitur Fungorum minimum sunt noxii. Secundi autem post hos sunt Amanitæ. Reliquos vetèstutius est omnino ne attingere quidem: multi enim ex ipsorum esu intereunt. Equidem nqui quemdam, qui post Boletorum non satis elixorum (qui innocèntissimi putantur) vsum largiorem, ægrè feruari potuit.

Inter ea quæ temerè manduntur, Boletos

D d d d

merito reposuerim (inquit Plin. lib. 22. cap. 22.) optimi quidem hos cibi, sed immenso exemplo in crimen adductos, veneno [Hoc euentu Nero Boletos appellat *Spōta de di*, Suet.] Tiberio Claudio principi per hanc occasionem à conjugē Agrippina dato, quofacto illa terris venenum alterum, sibi que ante omnes, Neronem suum dedit. Quorundam ex his facile noscuntur venena, diluto rubore, rancido aspectu, liuido intrus colore, rimosa striâ, pallido per ambitum labro. Non sunt hæc in quibusdam, si cique & nitri similes veluti guttas in vertice albas ex tunica sua gerunt. Voluam enim terra ob hoc prius gignit, ipsum postea in volua, seu in ovo luteum. Nec tunice minor gratia in cibo infantis Boleti. Rumpitur hæc primò nascente, mox in pediculo corpus absumitur, raroque vnquam geminis ex vno pede. Origo prima causique è limo, & acescente succo madentis terræ, aut radicis ferè glandiferæ: initioque spuma lentior, dein corpus membranæ si nile, mox partus. Illa perniciosa, prorsus improbanda. Si enim Caligaris clauus ferrive aliqua rubigo, aut panni marcor affuerit nascenti, omnem illic succum alienum saporemque in venenum concoquit: deprehendisseque non nisi agrestes possunt, atque qui colligunt. Deunt ipsi alia vitio, nunc quidem si serpentis cauerna iuxta fuerit, si patescentes primò adhaluerit, capaci venenorum cognitione ad virus accipiendum. Itaque cauere conueniet, prius quàm se condant serpentes. Signa erunt tot herbe, tot arbores fruticesque, ab emerfu earum ad latebram vsque vernantes: & vel Fraxini tantum folia: nec postea nascentia, nec antè decidentia. Et Boletis quidem ortus occasusque omnis intra dies septem est.

Fungorum genera. *Fungorum autem* lentior (natura) subdit cap. 23. & numerosa genera, sed origo non nisi ex pituita arborum Tutissimi qui rubent callo, minùs diluto rubore, quàm Boleti. Max candidi, velut apice Flamini (Sic albogilerum & pileum Flamini vocat, cuius effigies in multis vetustis spectatur, præcipuè Iulij & Iulij) insignibus pediculis. Tertium genus suilli, venenis accommodatissimum. Familias nuper interemere, & tota conuiuia, Annæum Serenum præfectum Neronis vigillum, & tribunos & centuriones. Quæ voluptas tanta ancipitis cibi? Quidam discreuere arborum generibus, Fico, Ferula, & Gummi ferentibus: nos item Fago, aut Robore, aut Cupresso. Sed ista quis spondet in venalibus? Omnium colos liuidus. His aberit veneni argumentum, quò similior fuerit arborum Fici. Aduersus hæc diximus remedia, dicemusque: interim sunt aliqua & in his. Glaucias stomacho viles putat Boletos. Siccantur pendentes Suilli, Iunco transfixi, quales è Bithynia veniunt. Hi fluxionibus alui, quas rheumatismos vocant, medentur, excrecentibusque in sede carnibus: minuunt enim eas, & tempore absumunt. Item lentigines & mulierum vitia in facie. Lauantur etiam vt plumbum, in oculorum medicamenta. Sordidis vlceribus, capitis eruptionibus, vt & canum moribus ex aqua illinuntur. Libet & coquendi dare aliquas communes in omni genere obseruationes, quando ipsæ suis manibus delicias præparant hunc cibum solum, & cogitatione antè pascuntur, succineis nouaculis, aut argenteo apparatu comitante. Noxii erunt Fungi, qui in coquendo duriores fiunt, innocentes qui Nitro addito coquentur, si vtique per-

coquantur. Tutiores fiunt cum carne cocti, aut cum pediculo pyri. Profunt & pyra confestim sumpta. Debella eos aceti natura, contraria iis. Imbribus proueniunt omnia hæc. Et quidem Boletos, suillosque, gulæ nouissima irritamenta circa radices gignit Quercus probatissimos (vt idem ait lib. 16. cap. 8.) Robur autem, & Cupressus, & Pinus, noxios.

Boleto periisse Claudium Imperatorem sequentibus demonstrat Iuuenalis, Satyra 5.

*Vilibus ancipites Fungi ponuntur amicis:
Boletus dominos, sed qualem Claudius edit
Ante illum uxoris, post quem nil amplius edit.*

Item Satyra 6.

*— minùs ergo nocens erit Agrippina
Boletus, siquidem vniui præcordia pressit
Ille senis, remulunque caput descendere iussit
In cælum.*

Martialis

*Argentum atque aurum facile est, lanamque,
rogamque*

• *Mittere, Boletos mittere difficile est.*

Horat. Satyr. 4 lib. 2. Sermon.

*— Præsentibus optima Fungus
Natura est, aliu male creditur.*

Extat iocus Plauti, alludentis ad Fungum maximum vbi seruus quidam vocatur pileatus Fungus: *Pol hic quidem fungino genere est, capite se totum operit:*

Idem in Bacchidibus Fungum reddit, hominem stupidum, stolidum, inconsideratum.

Adeone me fuisse Fungum, ut qui illi crederem

Et aliquantò post.

Tanti est, quanti est Fungus putidus.

Fungi cortice, medullâ, nervo, venâ carent, pediculo admodum æquali: quanquam qui ex iis *Pezizæ* à Græcis vocantur, nec pediculum, nec radicem habeant.

Fungos, inquit Hermolaus, Græci *Myceas* vocant, nec distinguunt: quanquam Paulus etiam Boletos cognouit, *Boletas* appellando, quibus & principatum inter Fungos dedit, sicut secundum locum iis, qui *Amanita* nominantur. Sunt & *Egigeria*, sed industriâ, fermento in ipsis Populi nigrae truncis diluto, aqua protinus coalescentes. Fungos Græci Deorum cibo nasci dicunt, vt Tranquillus in Nerone meminit. Porphyrius non cibum, sed filios Deorum, Fungos & Tubera vocabat, quia prouenire viderentur sine semine: Natâ fortè diuersitate, quòd verbum *Deorum* & cum qui alit, & cum qui alitur, significat, accentu modo commeante. Porro Deorum & cibus & alim *Deorum* idè videri possunt, quoniam & eos, quorum pater ignotus est, filios terræ dicimus. Recentiores alia quoque nomina, vel genera dedere: *Quaror*, ab oui similitudine: *Spongiolos*, à *Sporgia*: *Digitales*, à digitis: *Porrigin*, à *porrigine*: *Pezizæ*, quasi sessiles, & pediculis carentes. *Lecinis* priuatim dicuntur à Castanea, magnitudine spectabiles, vt singuli sufficiant. Innocentissimi sunt è Rubis & Carduis Vere, nati rotunditate clusili, quos inde *Prunulos*, & *Spiunlos* appellant, & *Cardolos*. Oritur & è saxo, id est, lapide lyncurio, siue lynceo vulgari voce dicto, Fungus, admirabili natura. Præciditur hic in esum & alius subnascentur anno toto: pediculi pars relicta duratur in silicem, atque ita semper crescit lapis, restibili fecunditate: nec credidi, antequàm dormi natos ita manducare. Noui & hoc vita sibi competit, inuicemque multa perdit: quanquam est vbi Plinius hoc innuat. Sunt igniani

& igniarii quidam Fungi, & quibus strigilium vice constringitur.

Ruellii
differentia
Fung. ar-
tificiales.

Tarentinus porro author est, ut perhibet Ruellius, si caudice Populi nigra iuxta terram conciso, fermentum aqua resolutum infundatur illi, co profilire Agiritas Fungos: addens, si montanum aruum multis calamis, stipulis, & fruticibus scatens, cum cælum imbres parturit, incendatur, permultos sponte naturæ prorumpere Fungos. Si tamen aruo iam ignem experto fortè fortunâ non subsequatur, quamuis impenderet aqua, linteo raro stillatim imbris imitatione conspergendam. Iis itaque incensis locis nasci Fungos quidem, sed aliquantulo deteriores: siquidem meliores in hoc genere sint, qui imbre aluntur. Gallos, Fungos *Campiones*, quod in campis tepido imbre proeueniant nominare: præferre autem in montibus inter Iuniperos, & in locis apricis enatos. Qui riguis prodeunt longo pediculo, callo corporis in turbinem mucronato, *Meralios* à metæ figura, quasi Metubios nominant. Aliqui à neto fulorum glomere, *Fusis* malunt appellare. Ii moroso diuturno palato magis placent. Alij lætiore natura breui nituntur pefiolo, clusili rotunditate insignes, diluto intus rubore, exterius candidi, qui cibo non impebantur, *Campestresque* nominantur. Alij in nemoribus & ex radicum pituita, calyce patulo, nigritis intus aut lucentibus membranis horrentes, qui ut noxij cibus abdicantur. Alij terræ cohererent nullo fulti pede, in globum circinati, nec vlla sui parte patentes dehiscunt, qui cum rumpuntur, atram fuliginem eructant, toto callo in fumum abeunte: hos *Crepitus lupi* vulgus gallicum appellat: Ij nullo pacto manduntur. Alij velut succrementa quædam magnæ molis in caudicibus arborum, aut ramis tam pertinaciter hærent, ut vix auelli possint: hos *Arbores* appellant. Sunt & igniarii quidam Fungi, quibus diutius latenti condunt ignem: ijs strigilium aut delectilium Spongiarum vice constringitur vtuntur. Fungus, ut quidam volunt, à funere desectitur, quod suo veneno ad funus vefcentes deducat. Græci Mycetas ab ensis capulo, vel summo vertice vaginam occultente appellantur, à quo procidente Mycenæ nomen deduxerunt, vel ab insigni nympha cuius Homerus meminit.

Fungi
Elymon.

Differentia
Cordo.

Alcment, Tero, & fertis redimie a Mycene.

Cordo in Diosc. Fungorum multiplex est differentia: Quidam enim, inquit, edendo sunt, quidam verò iuxta corpus sumpti strangulant. Germani omnes generali vocabulo *Schwemme* vocant. Qui autem edendo sunt, suis distinguuntur generibus. Sunt, enim quidam Piperis sapore, & lacteo liquore manant, hos Germani *Pfifferling* vocant. Sunt & Boleti, quos *Bölz* eadem gens appellat, venenati Fungi. Multa habent genera, sed omnia *Doggenstül* id est, Bufonum cathedra, siue Sella, Saxonibus dicuntur. Sub *Berulis* arboribus in candido & rufo colore varij nascuntur Fungi, quos *fligenschwem* id est, Muscarios Fungos vocant, quoniam muscas lacte interiti occidunt. Pharmacopolæ in suis officinis Fungos habent, quos ceruinos nominant. Ferunt eos in syluis ex semine ceruorum nasci, & propterea Venerem stimulare: sed falsum hoc est. Inueniuntur siquidem hi ceruini Fungi in præruptissimis montium syluis, quod ne damæ aut Rupicapra quidem peruenire possunt, nedum cerui. Nec verisimile est eos venerem stimulare, cum frigidum, pituitosum, crudum & mali-

gnum succum in humano corpore gignant. Quæ enim venerem accendere debent, contrarias facultates & qualitates habere necesse est.

Multa & varia Fungorum genera commemorat Tragus: quæ nos scorum recensemus suo loco: Ceterum neque plantæ, neque flores, neque semina sunt, inquit, sed nihil aliud quàm terre, arborum, lignorum putridorum, aliarumque putrilaginum superflua humiditates, id quod inde colligi potest, quod omnes, maxime ij, qui edendo sunt, & tonitribus & pluuioso cæli statu frequentius nasci solent, quemadmodum Aquinas poeta confirmat.

Et facient lentas operta tonitrua canas;

Fungos Arabes teste Rhaze, *Goffa*, *Feslich*, & Nominantur nominant, atque *Hazar*. Græci *μυκήται*: Hebr. *Paapim*: Germ. *Schwem*: omnes scilicet vno vocabulo comprehendentes, siue edendo sint, siue perniciosi. Innocentissimos autem Boletos, quorum omnes ferè docti meminere, Germani *Mordhellen* / *Heiderling* / *Rheling* / *Bröteling* / & *Pfifferling* nominant, Latini *Tubera*, *Amantia*, & *Bolus*. Illa demum Fungorum genera, quæ superfluum, in tectis stramineis domorum, in putridis lignis, & ad arbores, Quercum sc. Fagum, Nucem, Betulam, Sambacum, pomiferisque denique, nec non in saxis & antiquis muris profiliunt, recensere neminem, vel periculosissimum rei herbariæ, posse arbitror.

Tametsi duo tantum Fungorum genera videantur recensere Dioscorides, ad Fungos duntaxat noxios & perniciosos respiciens: tamen, ut ait Matthiolus, omnibus palam est plura ac diuersa eorum, quæ in cibus expectantur, discrimina notari. Et horum quidem inter omnes Italiciæ regiones feracissima est Hetruria, ubi illi Fungi ceteros antecellunt qui vulgò dicuntur *Prignati*. Secundum verò locum apud Hetruscos tenent ij qui vulgò *P. reini* hoc est, suilli nuncupantur. Præter hæc multa alia Fungorum genera inueniuntur, ut ij qui vulgò *Prarati*, *Turini*, *Orcelle*, *Cardarelle*, *Manine*, *Ordinali*, *Parigiote*, *Vesce di lupa* appellantur. *Murini* qui Græcis, Fungus Latinis dicitur: Arab. *Hazar* seu *Father*: It. *Fonghi*: German. *Pfifferling* & *Reyaken*: Hispan. *Hungas*, *Cogomelos*, & *Cylberquas*: Gallicè, *Chamignon*, & *Parron*. Et hæc Matthiolus obfcurè de Fungis scripsit: Nec clariùs Castor Durantes.

Matthiol.
differentia

Matthiol.
& Castor
Dumort.

Ex Fungorum pluribus speciebus, Boletis in pratis plerumque principio Aprilis nascentibus, Amarus primas tribuit: & tamen tam hos, quàm Ananitas, reliquosque, tanquam noxios, ac prauissimos & frigidi nutrimenti, fugiendos ac rejiciendos consulit, ut à quorum elu vel rusticos etiam & agrestes homines mori viderit. Quinam autem sint eius Fungi pratenses Aprilis prouenientes, non docet.

FVNGI VERNI; MOVCERON
dicti, odori & esculenti.

C A P. II.

FVngi genus illud, quod, quia sub Musco communiter proueniat, ac sub eo latet, *Mouceron* nostrates dicunt, magno in pretio est, mensisque laucioribus expetitur. Fungi primulum erumpentes, pediculis b. cuius fibras

Descripti

D d d d 2

deorsum agentibus *capitula* sustinent Pilo magno æqualia : duodecuplo maiorem molem (nisi auclerentur) assecuturi. Sed pediculus ipse teres & in imo crispus vel rugosus ex terra non multum emergit. Cæterum clusiles sunt, rotundique in summo, subtus verò quæ instar tentorij reflexi, timosis à centro ad circumferentiam striis donati : vbi penitus excreuerunt, campestrium Fungorum instar expanduntur. Totâ verò substan-

tiâ intus forifque candidi, gustus gratissimi, odorisque grati.

Hermolao innocentissimi sunt Fungi è Rubis & Carduis Vere nati, rotunditate clusili, quos Prunulos & Spinulos appellat & Carduelos. ceu Ruellius, & Lacuna. Amato Boleti principio Aprilis in pratis nascentes. Matthiolo & Ca-



Fungi Vir-
tus Peziza
Plinii.

Locus &
Tempus

stori Prignoli, quos Porta villæ lib. 10. cap. 70. vulgò Virnos dici refert : Dalechampius verò apud Plinium lib. 19. cap. 3. Pezitas Plinii & Athenzi appellat.

Primo Vere sub Martii finem & Aprilis initium prorumpunt locis apricis, nemoribusque inter ipinas : Montbelgardi potissimum & per comitatum Burgundicum finitimasque oras, nullo non ferè obseruauimus Vere, vnde & in Ducatum Vvrttembergicum interdum inuehantur : latitant sub Musco, ita vt non à quolibet reperiantur, vnde dicti *Mouceron*. Rustici, & alii qui norunt loca vbi crescunt, non facillè cuiquam demonstrant, propter emolumentum, quod inde hauriunt, non paruum. Fungi hi omnium optimi, qui vulgò Virni dicuntur, inquit Clusius, quoddam verno tempore nascantur, primis Aprilis imbribus e-rumpunt, in siluis sub arborum umbris, & vbi nascuntur, quotannis repullulant. Aliquando, cæsis arboribus, è loco euanescent : Solum in quo crescunt, cinerei est coloris.

Vino alicubi imponuntur, vt gratum concilient odorem ac saporem, & ex eo eduntur.

usus

FVNGI D. GEORGII, COLORIS EXALBIDI
cum pauca flauitie, esculenti, pratenses,

C A P. III.

Descript.

Parua Fungi species est, duarum vnciarum amplitudinem vix æquans, orbiculari ferè formâ, supernè quidem aliquantulum extuberante, & quodammodò puluinatâ : internè verò concamerata, & quibusdam veluti venis distincta, pediculo crasso breuique, coloris exalbidi, cui flauus quippiam admixtum sit.

Synon.

Clusio est Fungorum esculentorum tertium genus, quod Vngari Szent Györgyi gambaia / Germani Sankt Georg schwammen appellant,

gula circa diem D. Georgio sacrum inuenitur. Fonn Fungus optimus Hora-

Fungus 4. G. Locu-
ue orbicularis
exalbidus pra-
tensis, C. Bauha-
pin.

Est verò hic *Prignoli*
Fungus, qui in
siccioribus at-
que pascuis
pratibus crescit,
aliorum Fungo-
rum modo
preparandus,
qui repurgati
vt plurimum
elixari solent,
& in frusta cõ-
cidi, quæ inter
binas lanceas
reposita, in
perfo oleo O-
liuarum vel
butyro, & Pi-
pere addito, su-
per prunas co-
quantur : aut
cum lactis in-
iicitur iuleu-
lum ex lactis
cremore para-
tum.



FVNGVS CAMPESTRIS, ALBVS SVPER-
nè, internè rubens.

C A P. IV.



FVngi quos
à natalicio
solo campestri
Montbelgardi
Champignons
denominant,
primo pullu-
latu globoli,
postmodum
paulatim ex-
plicati, mem-
branulas infrâ
ostentant ru-
bentes, supe-
rius inoffenso
laeuore aqua-
biles & albi
saporis & o-
doris sunt bo-
ni, primulùm
ex terra erum-
pentes.

Hi sunt illi Fungi Ruellio latiore natura bre-
ui petiolo nitentes, clusili rotunditate insignes,
diluto intus rubore, exterius candidi, qui cibo,
non

non improbantur & Campestres cognominantur.

Trago dicuntur Fungi vulgares, Boleti Amanite, gerin. heiderling & Drüsfling (ita quoque Lonic. vocat,) & Geln. coll. kirp. quod in campis & aridioribus locis & iumentorum pascuis proueniant: & hinc gallicè *Campinones* vocat, pileolis rotundis & latis similes, inferius prope terram puniceos, superiori verò parte membranulis huiusmodi coloris tectos.

Marth. Fungorum secundum genus facit, eoque herulosos vulgò *porcinos*, h. e. suillos, vocare scribit in Diosc. In hist. germ. pro sexto genere depingit. An verò apud Diosc. per porcinos intelligat campestres, dubito: quæ de iis scripsit relegavi ad caput Fungi nostri porosi.

Lob. hist. belg. tom. 2. p. 305. & Ic. Plant. p. 271. Fungi vulgarissimi esculenti, carne prorsus alba, inferiè subrubente, dum recentes sunt: vetustate visum contrahunt, & noxii sunt, grauem odorem contrahentes & fuscum colorem.

Synonyma
C. Bauh.

C. Bauh. pin. Fungus 13. siue pileolo lato & rotundo liuido: Marth. Lac. Lon. Dod. Cast. & H. Lugd. p. 1587.

Locus &
Tempus.

Abundanter inuenimus in Than, Bessfordiæ, & Mompelgardii Augusto & Septembri, in pratorum collibus & planicie, boni saporis & odoris recenter è terra prodeuntes. In fine Iunii palmarum manus maiores alicubi obseruavi. An verò nascantur etiam Vere, ut vult Lobelius, in sabulosis & recens stercoreatis agris, ac subinde quoque in finetis, in quibus tamen insalubres oriri tradit, nondum obseruauimus. Vulgares Fungi, qui vulgò coqui solent, in campis, graminosis agris, aridioribus pratis, potissimumque iumentorum pascuis nascuntur. Iunio mense primùm cernuntur, inquit Tragus, maximè si pluviosa & humida tum tempestas fuerit. Nam neque hæc, neque alia Fungorum genera, nisi pluviosi cæli constitutione, procreantur, quæ etiam causa est, ut vno anno tardius, altero citius oriantur, & ab eodem tempore ad Augustum usque mensem cernantur.

Græci m.
dant.

Boletis membranulas liuidi coloris, antequam in cibos veniant, detrahare oportet, ac tum demum, ipsos aqua bullire, butyroque & aromatibus condire convenit. Sunt tamen qui hos Fungos membranâ auulsâ super carbonem ignitos assare, solumque sale aspergere, cibique usurpare soleant, prout cuique videtur.

FVNGVS CANDIDVS REGIVS

odoratissimus.

C A P. V.

Descript.

Porta villæ lib. 10. c. 70. author est hunc Fungum antiquis indictum esse candidum, odoratissimum, orbem vix vtraque manu diductis pollice & indice cingentem, tam esui suauem, ut crudus edatur, præberi agris innoxie: incolæ *Richione* vocare, quasi magnum Fungorum regem dicas: Autumnalem esse. C. Bauh. pin. Fungus 18. siue candidus odoratissimus orbe magno.

FVNGVS PIPERATVS ALBVS,

lacteò succo turgens.

C A P. VI.

Descriptio

Exulant à mensis (non tamen omnibus, nec ubique) Piperati dicti Fungi, magni illi qui Tom. III.

dem lati, Campestris mole superant, pro magnitudine tamen minus densi, non supra tantum albi, sed & subter candidissimis tenuissimisque membranulis contexti, cum tæ Campestribus tubeant. Lacte turgent feruido: tandem inueteralescentes, sursum flexis oris & pileolo tabescente superius caui redditi, metam inuersam aut infundibulum referunt.

Cordo in Diosc. Fungi Piperis saporis & lacteo liquore manantes. Trago Fungi tertium genus cibis expectitum, coloris prorsus candidi, rotundum. In hoc genere ait inueniri, qui disco latiores sint, omnes tamen, quum frangantur, lacteum & feruentissimi saporis [nam omni Piperi linguam magis vellicare] succum fundere. Orbiculatos à magnitudine vocari: à Germanis *Pfifs ferling*, sed rectius *Pfefferling*.

Synonyma

Cornar. secundum genus Fungorum Plinii: Fungi candidi. Lonic. qui non meminit succi lactei, Fungorum tertium genus: Boleti orbiculares. Marthiol. Fungorum quintum genus. *Miramur* Lonicum, non meminisse succi lactei, licet Tragus tradiderit habere lacteum succum feruentem.

Euch. Rösslin. Boleti orbiculati, omnino albi, lac fundentes. Portæ, Fungus antiquis indictus, Piperitis vocatus: quia velcendo linguam vellicat, ac si Piper voraremus, ac fauces incendit: nascitur Autumno: coloris albi, vulgòque *Pipirella* dicitur.

C. B. pin. Fungus 10. siue pileolo lato orbiculari candicante: Fungi orbiculati, vel Fungorum tertium genus, Tragi: Fungi boleti, Cordi in Dioscor. & Lonic. Fungi nemorum, Lob. Belg. Fungi esculenti octauum genus, Clusii. Eld. Fungus 17. siue albus æcis. Quo pacto, quæue ratione C. Bauhin. Fungorum tertium genus Tragi, ad Fungi esculenti octauum genus Clusii referat haud dum constat. Clusius suum Fungum statuit amarum: Tragus piperei saporis. Iam quantum inter saporem amarum & acrem seu feruentem intercedat, vel Fungus iudicat, qui ab uoratio homo inconsideratus mysticè dicitur.

C. B. nat.

In altissimis & tenebrosis siluis, Septembri & Augusto mensibus nascitur.

Qui siluam vulgò *Odenwaldt* cognominatam incolunt pauperes, sale asperfos carbonibus ignitis cibo assare solent. Ceterum, quum lacteum huius succum (à quo Bollenles eum *Mildling* vocant) aliquando digitis attigissem, & ex improviso palpebras digitis absterissem, quamprimum magnas punctiones & pruritum expertus sum, talem quidem, qualem à Tithymalorum succo euenire contingit.

Locus &
Tempus

FVNGVS ALBVS, DICTVS MOMPEL- gardenlibus & vicinis Bifferre.

C A P. VII.


Augusti fine anno 1609. obseruati hos Fungos, Campestribus similes, sed infra, supraque totos albos, quos Montbelgardenses & vicini *Bifferre* vocant. Nos olim eosdem esse putabam cum *Colombettes*, verum distinguebam à Campestribus, quod tardius prouenirent, & pede longiores essent. In siluis *Quercuum*, sed rarius, occurrunt. Præcedunt *Colombettes*, & minores sunt.

Descriptio

D d d d d. 3

FMNGVS MAGNVS TOTVS ALBVS
 sine succo lacteo, edulis, Columbettes
 Montbelg. CAP. VII.

Descript.



EX odulium
 Fungorū cen-
 su sunt hi, ma-
 gnitudine ex-
 cellentes, toti
 albi, tam sub-
 rus quā su-
 prā, omnisque
 succi lactei ex-
 pettes, quo
 turgent Pipe-
 rati, illis simi-
 les. Per ambi-
 tum aliās cri-
 stati, aliquan-
 do reflexi &
 inæquales
 sunt, interdum
 non. Distin-
 guuntur autem
 Columbettes 2

Bissette pede elatiore, & quodd latiores sint, tar-
 diusque proueniant.

Locus

Inueni inter Champigni & Passauant Ludren-
 sis Abbatis. In silua item è regione vrbis Mont-
 belgardenfis dicta *le Chesnois*.

FMNGI ALBI VENENATI VISCIDI.
 CAP. VIII.

Descriptio



Interest
 sanè horum
 formam &
 naturam vel
 apprimè no-
 uisse. Eduli-
 bus albis ali-
 quo modo
 similes sunt,
 pediculodigi-
 tum crasso,
 tres quatuor-
 ue plus mi-
 nus alto, qui
 clypeum su-
 stinet orbicu-
 larem, palma-
 rem, pressum,
 subrus candi-
 didissimo mem-
 branarum te-
 nuissimarum

squarato stipatum. Superna facies subcine-
 ricea, ad albidum nonnihil vergens, vi-
 scido tactu, fungosis verrucis eminentibus cons-
 perta, quæ tamen sine membranæ noxa auulsu
 faciles, quas merè accidentarias esse putamus, vt
 quæ non in omnibus appareant. Sapore sunt mi-
 nimè ingrato, sed subdulci, succo aqueo. Vnde
 deceptus quidam optimus ciuis Mompelgar-
 bensis, vegetæ ætatis vir & corpore robusto, qui
 hos ipsos [ad quorum imitationem Eicon hæc
 nostra facta] coctos, & ad palatum eius præpa-
 ratos nimis imprudenter vorauit. Mox enim
 nauseabundo stomacho vomitus infestabat, hinc
 vertiginem sentiens, prostratis tandem viribus,
 membrisque refrigeratis, soporosus iacuit, non

Locus

sine mortis periculo. Nam & loquelâ priuatus,
 pulsu deprehensus fuit perexiguo cum suffoca-
 tionis metu. Qui tamen paullo post vomitu pro-
 nocato prius, alexipharmacis, Theriacâ potissi-
 mum, enematis item restitutus fuit, postquam
 non paucas horas dubius & velut oppressus, in-
 ter vitam & mortem quasi succubuerat.

**FMNGVS NEMORVM AMPLVS, INTER-
 dum albus, nonnunquam maculis
 nigris distinctus.**

CAP. IX.

FVngum hunc nemorum amplum pingit Descrip.
 Lobel. in Icon. Plant. tom. 2. p. 172. deque eo
 hæc scribit in hist. belg. In siluis & nemorosis lo-
 cis reperitur Fungi genus planum quod inter-
 dum in tantam amplitudinem excrescit, vt lan-



cem implere
 queat. Id ali-
 quando pror-
 sus album, nõ-
 nunquam su-
 perne maculis
 nigris & rufis
 distinctum, in-
 ferne album &
 nigris stris exa-
 ratum, pediculi
 inferiori parte
 nigra.

C. Bauh. pin. C. Bauh.
 miscet hunc cū
 Fungorum es-
 culentorum ge-
 nere octauo
 Clusii, quod ip-
 si est Fungus de-
 cimus. Vide ca-
 put nostram,
 Fungi tres sil-
 uarum, &c.

**FMNGI LONGISSIMO PEDICVLO, CAN-
 dicantes, sed maculati, esculenti.**

CAP. X.



Nillum in-
 ter Fungo-
 rum, qui inno-
 xii æstimantur,
 genera esse pu-
 tat Clusius qui
 hoc longiore
 prædicti sit pe-
 diculo. Aitenim
 in octo aut no-
 uem vnciarum
 longitudinem
 esse porrectum,
 digiti minimi
 crassitudine,
 rectum, versico-
 lorem, & macu-
 lar, stris qui-
 busdam & ma-
 culis paruis &
 magnis ex albo,
 rufis, & fulco
 coloribus com-
 mixtis distinctum, marmoris varii instar. Ipsum

Descript.

mixtis distinctum, marmoris varii instar. Ipsum

verò Fungi corpus pilei seu galeri formam quodammodo referre, valde laxi oris, deinde sensim in turbinatam metam desinens, altitudine trium vnciarum, aut ampliore, orarum diametro uncias ferè octo occupante, candicantis supernè coloris, multis tamen maculis magnis & exiguis ex fusco rufescentibus infecti, supremo fastigio prorsus fusco: inferna pars caua admodum & camerata, candicans quidem, sed plurimis striis fuscis oblique, & veluti in cincinnos compositis, distincta: duabus autem ferè vnciis infra supremum pediculi fastigium, corolla digitalis circiter latitudinis ipsum amplectitur, vnde corporis ipsius Fungi oræ abruptæ videntur, dum in laxitatem sese diffundit. Fungorum esculentorum generis huius decimi octavi unicam speciem obseruabat auctor, quæ in aruis plerumque prouenit. Tribus verò diuersis anni temporibus interdum nasci intelligebat. An autem ille sit Fungus, quem Porta à Neapolitanis *Coniacelle* uocari scribit, dubitat.

Synon.
C. Bauh.

C. Bauh. pin. Fungus 24. siue Fungus pileolo lato, longissimo pediculo variegato: Fungi esculenti 18. genus Clusii. An Fungus pratensis, quem quidam *Scarogias* vocant, Cæsal.?

FVNGI QVATVOR: 1. CANDICANTES:

2. etiam albicantes: 1. in albedine magis fusci: 4. rufescentes, silvarum esculenti.

CAP. XI.

HOs sub Fungorum esculentorum nono genere describit Clusius: Eiusdemque generis se quatuor differentias obseruasse scribit: omnes vno nomine cum apud Vngaros, tum apud Germanos dictas, illis quidem *Herench*, his verò *Kremling*.

Prior species, inquit, secundo generi valde assimilis non est: nam circinata in plano ferè est rotunditatis, vnciam aut binas vncias magna, supinâ parte puluinata & candicans, infernè autem magis est fusca, & euidentioribus striis donata, quàm secundum genus.

Ad quinti generis primam speciem (ad Fungos ferè sine pediculo,) plurimum accedit altera species: etenim angulosa est, sed amplior, vt quam vncias quatuor aut plures æquare existimem, supernè etiam albicans, non, vt illa, fusca: infernè verò non læuis & glabra, instar illius: aut alba, sed crassis striis ab umbilico siue pediculo, in oras ductis, insignita.

Tertia magnam affinitatem habet cum octauo generis [cum Fungis tribus silvarum] altera specie: quia ferè orbiculata est, & æqualis pæne magnitudinis: supernè tamen in albedine magis fusca est: infernè illi non dissimilis, nisi quòd eius striæ crassiores sunt, & pediculus illam sustinens crassior, breuior, atque magis nigricans.

Sola magnitudine ab octauo generis tertia specie differt huius quarta species. Illa enim amplior est, hæc minor, vtraque autem circinata ferè in plano rotunditatis: illa supernè rubescens, hæc multò magis rufescens, eamque aded ob causam Vngaris *Vörds Herench*: Germ. *Kote Fremling* dicta: graciliore illa pediculo nixa, hæc crassiore & magis albo, vt etiam inferna huius pars candidior est illâ, & minùs euidentibus striis exarata.

Synon.]

C. Bauh. pin. Fungus 12. siue Fungi pileolo lato

& rotundo: Fungi esculenti nonum genus Clusii.

Nascuntur quatuor hæ species in caduis vt *Locus* & plurimum siluis, sub extremum Maium, aut Iunii *Tempus*, initium.

FVNGI QVINQVE SILVARVM ASPERI

esculenti. I. ex albo virescens. II. ex cæruleo virescens. III. purpureus. IV. flauescens, inferna parte alba. V. ex albo fuscus.

CAP. XII.

Sunt hi Fungorum esculentorum Clusii decimum tertium genus. Fungorum autem esculentorum Clusii decimi-terti generis varias assignat species, quæ apud Vngaros & Germanos varia obtinent cognomina: generali autem appellatione Vngaris *Galambicza*, Germanis *Teubelinge* dicuntur.

Nascuntur omnes promiscuè in siluis, & Iunio *Locus* & Iulioque mensibus inueniuntur.

Germanorum porro distinctionem sequens author, quinque huius generis species facit.

Prima, omniù amplissima est, vt cuius plana superficies quincunciale diametrum habeat, orbicularis vt plurimum est eius figura, digitalis longitudinis pediculo, vnciam crasso, subnixæ: superna parte protuberante, colore ex albo virecente prædita: infernâ candicante & striata. Istam Germani *fram teubelinge* / h. e. Dominatum cognominant.

Alterius paulò minor est amplitudo, vt cuius diameter quaternas vncias non excedat, orbicularis etiam & planæ est figuræ, supernè tumescētis, sed in medio & quasi



*



*

centro nonnihil cōpressa, vt umbilicū mentiatur, coloris ex cæruleo, viridi & fusco commixti, infernè ex albo subfusci, pediculo sulca pollicaris crassitudinis, sed breuiore quàm prima: Huic Vngari *Keek galambicza*, Germani *blaw teubes*

linge, quod eiusdem est significationis, cognomen dederunt.

Tertia

Æqualis ferè cum superiore est tertia amplitudinis (interdum tamen vix binas uncias superat eius diameter) sed paululum angulosa, coloris supernè elegantis, ut qui ex purpureo & saturato rubro commixtus videatur, emicantibus aliquando, sed raris albis maculis, quas contrahi arbitratur auctor, flore illo ex contactu deteriso: inferna pars candicat, & fuscis striis exarata est. oris in ambitu parum & dilutè purpurascentibus, extremis nempe supernæ partis oris aliquantulum inflexis. Vngaris Veretis Galambicza: Germanis Kott teubelinge, quod idem est, dicitur.

Quarta

Quarta species minor est tertia, nec eius superficiem [quæ orbicularis est figuræ] diametrum binas uncias excedere putat Clusius. Vncialis longitudinis pediculo sustinetur, graciliore quàm superior: superna pars quodammodò pulvinata, in medio nonnihil compressa, & umbilici formam exprimens, colore flavescente, veluti fuligine infecto: inferna pars alba, fuscis striis à pediculo ad circumferentiam distincta. Germ. Schwarz teubelinge, i.e. nigrum, cognominatur.

Quinta

Quintæ speciei cognomen dederunt Vngari Waras galambicza / Germani Kauch teubelinge quasi dicas asperum. Æqualis autem est cum quarta magnitudinis, circinatæ in plano quodammodò rotunditatis, supernè etiam intumescens & pulvinata, asperiorque reliquis speciebus, coloris supernè ex albo fusci: infernà verò parte, candicante quidem, sed quam fuscæ striæ in oras excurrentes veluti inficiunt.

Iam.

Figuræ, quas proponimus, sunt secundæ speciei, Prior quidem pronam partem: altera verò supinam demonstrat.

C. Bauh. pin. Fungus 3. siue umbilicum referens variegatus.

FVNGI SILVARVM ESCULENTI TRES,

vnus candicans: albus alter cum flavescentibus maculis: & tertius ex fusco rubens.

CAPVT XIII.



Champignon & Porirum vocant: tamen in vniuer-

HOs sub Fungorum esculentorum octauo genere complectitur idem Clusius. Id autem genus in tres species dinidit: quarum primæ & secundæ discrimen in sola magnitudine consistit, nonnihil & colore: omnes tamen tres, similis formæ. Vngari Kescherev gomba, h. e. amarum Fungum: Germani Psipfferling: Galli

sum omnino pæne Fungorum genera iis nominibus donent.

Prima ergo species, binas ferè uncias lata est, planæ, sed orbiculatæ figuræ, supernè tamen quodammodò pulvinata, & candicans: infernè veluti camerata & conuexa, striis quibusdam à crasso pediculo in oras ductis distincta.

Alteræ, huic prorsus similis, sed amplioris magnitudinis, ut quæ quaternas aut plures uncias æquet, eiusdem cum prima figuræ, sed crassiore pediculo subnixa supernè alba cute, cui insperitæ aliquor maculæ fuscæ & flavescentes: infernè flavescentes aliquantulum, & magis conspicuis striis à pediculo in extremas oras productis, exarata.

Tertiam speciem Vngari Voros Kescherev gomba: Germani eadem de causa Kote Psipfferling nominant, quia magis rubet præcedentibus: sed & Vngaris Bix alya dicitur, quod sub Fagis interdum crescat. Amplior est hæc secundæ speciei, & magis circinatæ rotunditatis, longiore gracilioreque subnixa pediculo, & colore supernæ & infernæ parte ex fusco subrubente, non minus euidentibus & conspicuis striis, à pediculo in orbem diffusis, inferius distincta, quàm secunda species.

Omnes autem species, ut plurimam, in cædis siluis nascuntur, circiter Pentecosten, h. e. sub extremum Maium aut Iunij initium.

Priores duæ species, palato gratæ esse feruntur, atque iis plerumque vescuntur eodem modo paratis quo Fungus croceus magnus. Tertiam edunt etiam nonnulli, sed pauci.

C. Bauh. pin. Fungus 10. siue pileolo toto orbiculari candicante: Fungi esculenti 3. genus Clusii. Confundit C. Bauhinus hunc Fungum cum Fungorum tertio genere Tragi [qui nobis est Fungus piperatus, lacteo succo turgens,] & Fungo nemorum Lobelii, quem amplum cognominamus.

FVNGVS PÆNE CANDIDVS

prona parte erinaceus.

CAP. XIV.

Raro naturæ miraculo parte prona pro membranis innumeris veluti: cuius mucronatus, erinaceum in memoriam reuocat, unde ex argumento nomen imposuimus: maiusculus est Fungus, etiam palmo maior, albus, minus tamen quàm piperatus, & ferè exsuccus. In siluis prope Montebelgardum mense Septembri à nobis obseruatus. An salubris vel venenatus ignoramus.

FVNGI IN METAM FASTIGIATI,

esculenti, coloris albicantis

fusco tincti.

CAP. XV.

Sunt hi Fungorum esculentorum quartum genus Clusii, de quo ait, Fungorum esculentorum quarti generis, Vngaris Sylva alya dicti, quia sub Pruni arboribus nascitur, germanicum nomen nullum noui. Eius autem plures sunt species. Nam aut parue sunt aut mediocres, aut maiores. Prima vncialis duntaxat est magnitudinis aut paullo amplior, crasso subnixa pediculo, infernæ parte conuexa, & quasi fornicata, sulcis vel striis quibusdam apparentibus notata: superna autem in mucronem quodammodò vel metam fastigiata, coloris albicantis fusco



Mediar



dammodò vel metam fastigiata, coloris albicantis fusco tincti.

Media species paulò planior est, quasi in orbem circinnata, duarum vnciarum, aut maioris amplitudinis, inferna parte similiter fornicatà, & striis quibusdam veluti exarata: color idem qui in superiore.

Tertia, quæ maior, formam quidem primæ

similem habet: etenim supernâ parte in mucronem fastigiata est, infernâ caua & fornicata: sed eius magnitudo plerumque est trium vnciarum, crassiorque pediculo nitueri color huius magis fuscus est, & n- is quibusdam interdum distinctus: deinde superna pars, ut plurimum lacera & scissi apparet.

C. Bauh. pin. Fungus 3, siue in metam fastigiatus, albus fusco tinctus.

FVNGI TVBEROSI ESCVLENTI, albi fusco permixti, vel maculis distincti.

CAP. XVI.



Etiam hi sunt ex Clusii Fungorum esculentorum generibus, & septimum constituunt: Fungorum autem esculentorum septimi generis forma duplex illi visa est. Quod vel planos conspiciebat supernâ parte nonnihil tumentes, interdum etiam in ambitu laceros, coloris aut albi fusco permixti, vel maculis

quibusdam distincti: infernâ nonnihil convexâ, & veluti striis siue sulcis, à pediculo crassiore in oras usque ductis, exarata, fusci coloris. Aut orbiculati parè figurâ, supernè, immò rotâ superficiei, candicantes, ut ovum exalptum exprimere videretur, præsertim adempto pediculo.

Hoc genus Vngari Choporke gomba, i. e. tyberosum Fungum appellant: Germani Angerling / quoniam in siccioribus pratis, siue palcuis iuxta pagos sitis (quæ ipsi Angern nominant)

Tom. III.

proveniat. Ter autem in anno reperitur.

C. Bauh. pin. Fungus 9. siue orbicularis sulcatus, albus fusco permixto.

FVNGI PVNICEI, LACTE DVLCI manantes, pratenribus similes, edules.

CAP. XVII.

Sexti ordinis Fungi in nonnullis altissimis silvis, ut est Odenwalde appellata, nascuntur, puniceo præditi colore, pratenrium Fungorum, quos Boletos vocant, magnitudinem haudquam excedentes, lacteum & dulcem manantes succum. Hi à quibusdam crudi denorantur, sed qui utilitate ignoro, inquit Tragus. Germani Brötling nuncupant.

Lonic. Fungorum quintum genus: Matth. *Synonyma* gerin. Fungor. genus octauum. C. Bauh. pin. Fungus 17. siue pileolo lato puniceo, lacteum & dulcem succum fundens: Fungus sextus Tragi.

FVNGI SILVESTRES ESCVLENTI

duo. I subalb. dus II. purpureus, maculati. CAP. XVIII.

Fungorum esculentorum Clus. 15. genus faciunt hi: Prior, inquit, orbicularis ferè est figuræ, circiter quatuor vncias ferè laus, breui crassiorque pediculo sulcus: supernè nonnihil extuberans & pulvinatus, coloris subalbidi, sed veluti fuligine infecti: per quem sparsa sunt aliquot albae maculae: interna pars subalbi etiam est coloris fuligine infecti, multis crassioribus striis nigricantibus, à pediculo in circuitum excurrentibus, notata.

Alter priorem amplitudine superat, & eius oræ interior. in partem versùs magis reflexæ, orbiculatæ quodammodò figuræ, cuius superior pars pulvinata, colorèque tincta purpureo, cui ruber saturior commixtus, in medullis tamen flavescentis, & secundum oras albis maculis distincta, inferior pars ex albo fusca est, & tenuioribus striis exarata, pediculo, quàm in Alterâ, longiore.

Huius decimo-quinto generi Fungorum esculentorum Clusi nomen dederunt Vngari Dizno gomba, h. e. suilli Fungi: Germani eiusdem significationis vocabulo Schweinlin / expresserunt, & postremam speciem a rubro colore Bore Schweinlin.

Ceterum, duas has species manifesto dissimine inter se differentes, Porta Suillos antiquum nomen apud Neapolitanos adhuc retinere ait, atque illis *Silli* dici.

An porro hic Fungorum genus, tertium illud Plinii quod venenis accommodatissimum esse asserit, sit, inquit Clusius.

C. Bauh. pin. Fungus 25. siue orbicularis oris *C. Bauh.* intrò reflexis: Suillos vulgò porcinos dictos, Boletis crassiores, supernè subfuluos, infernè cinereos, internè candidos, vocat Casalpini.

Fungorum esculentorum decimum-quintum genus Clusii nascitur in silvis, & Iunio, Iulioque mensibus reperitur.

Tametsi autem non valde probetur hoc Fungi genus: non defunt tamen qui illo vescantur, adeò intemperantis gulæ reperiuntur quidam.

Eccc

FVNGI ABIETINI, ESCVLENTI, 1. RVbens. 2. mixti coloris, infernè candicans, 3. mixti quoque, rubescens.

C A P. XIX.

FVngi præsentès à Clusio ad vicesimum genus Fungorum esculentorum reuocantur, hisque describuntur.

Prima vicesimi generis esculentorum Fungorum species orbiculatæ (planæ tamen) est figuræ, binas aut ternas vncias lata, supernè, coloris vel dilutè admodum rubentis, aut lateritii, venis quibusdam sic exarata, vt hirta videatur, non secus ac Fungus villosus puniceus, cui valde similis est, in medio nonnihil compressa, & veluti umbilicata: infernè pallescens, & multis striis fuscis à pediculo, qui vnciâ paullo longior est, minimum digitorum crassus, in orbem ductis insignita.

Altera priorem magnitudine non valdè superat, paullo tamen crassiore pediculo constat, magna etiam ex parte orbiculata est, sed non compressa supernè, immò potius extuberans, coloris

ex albo, pallido, & fusco permixti: infernè candicans, & striis fuliginosis coloris, à pediculo in oras productis, exarata.

Tertia, longè amplior est binis superioribus, orbiculatæ tamen perinde atque illæ, figuræ, cuius diameter penè quincuncialis est, pediculo subnixa non maiore quàm præcedentes duæ: supernâ parte etiam ex-

tuberans, mixtisque ex albo, pallido, rufo, fuliginosoque, coloris: inferna pars plana est, rubescentis coloris, crassis striis ex atro purpurascens, à pediculo in ambitum excurrentibus notata.

Locus & Tempus.

Vicesimum hoc genus esculenti Fungi ad vulgariorem Fungorum formam redit, & sub extremum Autumnum in siluis, plerumque autem sub Abietibus nascitur: cuius rei causa Vngari Fenyô alya gomba/ Germani thauueling appellant, licet illis Gresseling etiam dicatur: nam Vngaris Fenyô-fa Abies est, atque Germanis thannebaum idem significat.

C. Bauh. pin. Fungus 15. siue pileolo magno, plano, orbiculato, venis exasperato.

Tempus.

Fungi hirsuti interna parte perniciosi.

Locus

Sub extremum Septembrem prouenit Fungorum perniciosorum vicesimum primum genus, inquit Clusius, subter Abietibus, quemadmodum & vicesimum genus esculentorum, cui persimile est: sed quoniam interiore parte hirsutum est, reicitur. Germani falsche Gresseling/ quasi spurium, nominant: Vngari Fenyô alya

gomba h. e. sub Abietibus nascentem Fungum sed additis his duabus vocibus, nem 10, vt solent omnibus Fungis non vescis.

Recens natus hic Fungus vnciâ non multò maior est, oris valdè in supinam partem inflexis, crassiusculo corpore, & veluti crassis quibusdam venis subrubentibus in orbem supernè ductis notato in albicante planicie: Adultus autem, vicesimi esculenti amplitudinem acquirit, supernè eiusdem cum primùm nascente coloris, & pariratione subrubentibus venis in orbem ductis insignito, oris tamen magis inæqualibus: inferna pars dilutè rubet, & multis rubeis striis exarata est: pediculus digitalis ferè crassitudinis, binasque vncias longus, qui contractus, rubrâ substantiâ constareprehenditur.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 34. siue abietinus oris reflexis substantia rubra.

FVNGI SILVESTRES ESCVLENTI CERuini, 1. villosus puniceus: 2. glaber ex rufo fuscus.

C A P. XX.

Decimum hi apud Clusium Fungorum esculentorum constituunt genus. Primus pediculo binas vncias longo, minimum digitorum crasso, nititur: ipsius verò Fungi orbicularis in plano est formâ [cuius diameter duarum vnciarum aut amplioris magnitudinis est] supernè nonnihil extumescens, & veluti sericeis villis oblitus, colore puniceo dilutiore, & veluti caneo, oris in infernam partem valdè reflexis, quæ ex albo rufescit, & multis striis, instar aliorum

Fungorum distincta est. Hunc Germani Kauche hirse dling/ h. e. hirsutum siue villosum ceruinum Fungum: quemadmodum alterum Schwarze hirs dling/ quod significat nigrum ceruinum Fungum, appellant.

Alter longiore constat pediculo, eiusdem tamen cum superiore crassitudinis & magnitudinis: sed in-

fima huius pars crassior est, & veluti limbo circumuoluta: ac præterea in hoc bini plerumque Fungi coniunctim ex eodem pede oriuntur: orbicularis etiam sunt in plano figuræ [præterquam quâ parte sese mutuo comprimunt:] eiusdè cū superiore est magnitudinis, aut paulo amplior, paululum extumescens superiore parte, & glaber, coloris ex rufo fusci, oris non admodum in infernam partem inflexis, quæ non inuicem frequentibus striis est prædita, quàm prior, colore ex pallido nigrescente.

C. Bauhino in pin. Fungus 14. siue pileolo in plano orbiculati villosi: Fungi esculenti 10. genus Clusii. Prima species icone exhibetur.

Nascuntur in caduis siluis sub extremum Martium aut Iunij initium.

FVNGI



C. Bauh.

Spurio

Altera sp.


Synonyma

Locus & Tempus

FVNGI LACERI SILVESTRES ESCV-
lenti, subfusci coloris, infernè
candicantes.

CAP. XXII.

Descrip:



Initidè quidem
Inæquali est fi-
gura hic Fun-
gus, magis ta-
men ad orbicu-
larem tendente
per oras lacer,
duarum vnciarum
latitudine,
superne fusci
coloris: infernè
candicantis, &
striis distincti.
Adultior autem,
magis orbicula-
re est figura, &
per oras laceræ,
quàm recens
natus, cum lon-
gè amplior, ut
cuius diameter
sit quatuor un-
ciarum: eius i-

tem color magis fuscus superne, & albicans in-
ferne, cui fuscedo quædam admixta.

C. Bauh. pin. Fungus 16. siue pileolo plano-sub-
fulco oris laceris: Fungi esculenti n. genus
Clusii, qui circa Festum Pentecostes in cædis
syluis nasci scribit.

Synon:

FVNGI FERE SINE PEDICVLO,
coloris ex rufo fusci, esculenti,
in arborum caudici-
bus nasci soliti.

CAP. XXII.



Hos sub Fun-
gentorum quinto
genere compre-
hendit Clusius:
eiusque plures
tradit differen-
tias, sed omnes
vno nomine ap-
pellatas: ab Va-
garis quidem
Peztricz, a Ger-
manis verò Pa-
sternis. Sola por-
rò earum diffe-
rentia in magni-
tudine consistit,
quandoquidem
formâ, materiâ, &
colore penè con-
ueniunt.

An autem ge-
nus est illud

quod Plinius à Græcis Pezicas dici, & sine ra-
dice sinèque pediculo nasci asserit?

Locus:

Synonyma

C. Bauh. pin. Fungus 5. siue angulosus pedicu-
lo exiguo: fungi esculenti 5. genus Clusii.

In Vlmorù Populiqu: albæ caudicibus deiectis
nasci solet, & bis plerumque, etiam ter interdum,
in anno provenire.


Tom. III.

Ceterùm, Peztricz repurgati eodem modo
condiri possunt, quo Beyserling: sed & elixi
conciduntur, atque in lance compositis frustis,
laridum accensum instillatur.

FVNGI LVTEI MAGNI, DICTI

laferan; speciosi.

CAP. XXIII.



Lactifluos

Fûgos no-

Descrip:

bis dictos ma-
gnitudine æ-
quat, specio-
sus hic Fun-
gus, & longè
aliquando e-
tiam superat,
ita ut ad pilei
magnitudinè
interdum ex-
crescat. Niti-
dus est, levis,
cuius mem-
branz subtus
citrinæ, pilei
verò facies su-
perna croceo
laturatiùs tin-
cta est. Pedi-
culus crassus,

citrinus quoque in imo aliquando cœu in fim-
briam reflexus fastidit. Quin prodiit primùm
& antequam expansus est, magnitudine oui, ac
etiam minor totus, albâ fungolæque materia cœu
involucro quodam siue volua tectus conspici-
tur. Voluâ verò hâc membranaue obtegente
detractâ, subest pilei principium, veluti vitel-
lum oui occultatum, quod crescendo paulatim
à volua detegitur.

Clusio est Fungi esculenti 17. gerus, de quo
ait: Provenit in silvis rari Quercu confinis,
iisque cædis præsertim, & siccioribus editiori-
busque locis, bis singulis annis, circa mensem vi-
delicet, & ante vindemiam. Vngari propter ex-
cellentiam Vr gomba, veluti si diceret Domi-
norum Fungum: Germani ob eandem causam
Beyserling appellat, quasi Cæsareum, quod
inter Fungos principatum teneat. Et sanè adeò
elegans est, ut non mirandum sit, si eos, qui li-
benter Fungis vescuntur, præ cæteris generi-
bus Fungorum, ad se edendum inuiter. Illius
unicam duntaxat speciem videre & observare
memini: licet ex ætate discrimen quoddam esse
videatur.

Locus:

Non dubium autem est, quin hic Fungus sit
ille veterib' adeò celebratus Boletus, ac à princi-
pibus viris sic in deliciis habitus: nam si confe-
rantur quæ de Boletis scripsit Plinius cum hu-
ius historia, similis esse deprehendetur. Infamis
autem, & immenso exemplo in crimen addu-
ctus fuit, quod olim Claudium Cæsarem
coniunx Agrippina Boletis veneno illito, sustu-
lerit, ut Neronem filium ipsi successorem im-
perio daret. Hinc illi Iunialis in Sartyris sales
primo capite huius libri de Boletis adducti per-
stant. Sed & ipse Nero, Boletum Deorum esse
cibum cauillari solebat, quia illo perisset Clau-
dius Cæsar, & defuncti Cæsares in Deorum nu-
merum referri solerent.

C. Bauh. pin. Fungus 13. siue planus orbicularis
aureus: Volua Plinii, Elucla Ciceroni, Boleti An-

Eccce 1

guil. & Cæfalpini. An Matth. germ. Fungi tertium genus, herren pelz: An Portæ Villæ, Autumnales Fungi, primis umbris nascentes, pratenses, Boleti Horatii?

Parandi ratio.

Mensas lautiores ornant ac valde expetuntur, variis modis præparati. Vel enim integri, detracto tenui cortice externo, prunis imponuntur: vel membranulæ replentur, butyro addito, sale & Pipere: vel abluti vino in sartagine eodem modo coquantur. Alii in frusta dissectos cum prædictis coquunt, quæ ratio coquendi melius placet. Sed & exsiccati seruantur, deinde quorum instar coquantur elixanturque, postea additis ZZ. Piperis, vel Caryophyllis eduntur.

FVNGI LVTEI PERNICIOSI SVB PINV habitantes.

C A P. XXIV.

Fungorum, qui sub Pinu nascuntur perniciosorum meminit Matthiæ in hist. german. atque Tragus, qui lib. 3. cap. 1. eos decimo loco ponit, statuens in gnos esse & luteos, eosque iumenta magnopere expetere, licet gustus illis in morbos incidant. Narravit mihi nobilis Baro à Thon uxorem suam ex esu Fungorum luteorum penè perisse vomitu & euacuatione per aluum, multisque suæ familiæ grauitè diuexatos in periculo suæ vitæ aliquandiu permansisse.

FVNGI STVLTORVM BOLETO SIMILES perniciosi.

C A P. XXV.

Locus & Tempus

Circa Messem & Vindemiam vndecimum Cnoxiorum Fungorum genus in siluis reperitur, quod è terra primum erumpens, valde Boletum imitatur, imò quodammodò mentitur. Vngaricum nomen nullum intellexi, inquit autor Clusius, sed Germanicum est *Narrenschwamm*, ac si diceret fatuum, vel fatuorum Fungum, quoniam fortè, si quis vescatur, mente turbetur, quod facillè contingere potest, ad eius esum inuitante, præsertim primum nascentis, tanta cum Boletis similitudine. Corpore dum è sua volua erumpit, est Boletis dissimili longiore, sescuncialis latitudinis, in metam assurgens, superna parte candida, inferna camerata & multis striis à pediculo in ambitum productis, notata.

Fungus fatuorum

Synon.

C. Bauh. pin. Fungus orbicularis ex atro rufescens, siue Fungus 17.

FVNGVS PALLIDVS

C A P. XXVI.

Locus & Tempus.

Avranni munus, Campostri similis Fungus, pari ferè magnitudine, sed variante: coloris tam internè quàm externè luteo pallidi.

Fungus capreoli. Synon.

Existimo Clusio esse Fungorum esculentorum genus duodecimum, quod prouenit in siluis & reperitur circa Pentecosten. Germanis Reheling, quasi capreoli Fungus, dictus.

Matth. germ. Fungi 4. genus Reischlein: Cordo in Diosc. Fungus edulis optimus Reischlein. C. Bauh. pin. Fungus n. siue pileolo lato orbiculari flauescens: Fungi 4. genus Trago: Capreolini Tabern. Fungi esculenti 12. genus Clusii.

FVNGVS LVTEVS SIVE PALLIDVS

Chanterelle dictus, se contorquens, esculentus. C A P. XXVII.

Descript.

Montbelgardenlib. dictus *Chanterelle* Fungus, rarò dimerientem habet palmarem,

sepiùs eam latitudinem non assequitur, plano pileo, aliàs cauo, pallidus, oris subinde contortis, vt crispi nonnihil habere videri possit, membra-



nis infra nec dentis contextus: huius pediculus rarò in umbilicum inseritur, sepiùs à medio detrahatur: odor gratus & innocentia cum commendatur, & ob id mensis lautioribus curiosioribusque expetitur.

An Trago Fungus quarti generis & vulgaris quidem, colore splendido & luteo: An Clusio Fungorum

An Fungus Trago.

esculentorum genus 14. cuius duas facit species, & quod Hungaris Virel Gomba / hoc est, Fungum leporinum: Germanis verò hasen obrlein / leporinam auriculam appellari tradit.

Corn. in Diosc. Reheling Germanorum, Fungorum Plinii genus primum. Tab. Capreolini. Synon. Lon. Fungorum 4. genus. Matth. Fungorum 7. genus. Hic imitatus Lonicærum misceat hunc suum Fungum cum Digitellis.

Lobel hist. belg. tom. 2. p. 307. & Ic. Plantar. p. 273. Fungi nemorum, sinuosis oris superne pallescentes, & maculis rubri infecti, inferne subalbidi & striati. Huius icon optime conuenit cum nostro Fungo *Chanterelle*, verum maculas rubras in nostro non animaduertimus.

C. Bauh. pin. Fungus 20. siue angulosus & velut in lacinas sectus: Fungi genus magnum à figura auriculæ leporinæ Geln. hort. Arborum Fungi auriculæ Iudz facie Lobel belg. Fungi gallinacei Cæsalp. An Fungus leporinus, quem 7. facit Tragus, qui formam interaneorum vituli representat, qui incanus & plumbei coloris? Credimus nos Fungum hunc leporinum Tragi melius ad Fungum intybaceum posse referri.

Vires

Fungorum *Chanterelle* apud Montbelgardenfes creber vsus. Fungi sinuosi nemorum Lobelii Vires. à nonnullis primum repurgari elixantur aut fringuntur, denique eduntur: ac perinde probantur vt alii eiusdem generis prope arbores, aut sub illis, nascentes, quia purioris sunt naturæ, & ab iunt à ferreis clauis aut putrilaginosis locis: nisi fortè sub pernitiolis arboribus & circa serpentium latibula crescant.

Oritur in siluis & nemorosis locis sub sagis vt Tragus. plurimum, mensè Iunio, ac etiam Septembri.

Locus & Tempus.

FVNGI LVTEOLI DICTI,

colorem mutantes, maligni.

C A P. XXVIII.

Fungus *Cambiosolus* Ital s. dictus de numero Fungorum penitus malignorum est: auctore retrante, cuius capitelli figura vulgari similia, substantia eiusmodi quæ mox vigore perit & in mucum abeat. Inferna pars blanda, quædam in retis formâ oblique intricata, facile à suo capitulo separantur. Color aliquantulum flauescens,

cens, mox tamen in virentem, & inde in azureum abit.

FVNGVS POROSVS, MAGNVS,
crassus.

CAP. XXIX.

Descrip.

Institit pedi crasso longo, pileus palmari latitudine, omnium quos vidi densissimus, turbatus, aut ex fusco albicans, inferne candidus, nullo subtus membranarum plexu textilis, sed infinitis poris tenuissimis peruius, substantia interiore albâ.

Hic Fungus videtur nobis tradi per Clusium pro tertia specie generis decimi-sexti Fungorum esulentorum, de quo hæc scribit. Prædi-

ctæ autem Tertiæ speciei duplex est differentia. Nam alia est iunioris & recens natæ facies, alia adultioris. Iunioris porro figura prorsus orbicularis est, diametrum duarum circiter uncias habens, valde in rotundum elata supernè, & fusci admodum coloris, fuliginosique: infernè caua & fornicata,

coloris albi & hullis striis deformati: pediculus illam sustinens binas uncias longus est, aut paulo longior, supremâ parte pollicaris crassitudinis, infimâ duorum digitorum. Adultior autem longè amplior est: nam quaternas aut quinas uncias latus est, ternas ferè altus, & in rotundum quasi fastigiatus, coloris supernè ex fusco rufescentis: infernè planus, æqualis, albus, nec ullis striis exaratus: pediculo fulcitur ternas uncias longo, supernâ parte unciam crasso, infernâ binas, coloris ex albicante fusci. Istam speciem Germani graßer bülz cognominant.

Habet verd hoc Fungi genus aliquot notas ob quas Pauli *amantia* esse liceat conicere: etenim colore fuliginoso sunt eius species, orbe etiam quadratum tam amplo, ut sæpè humanum caput æquent, pediculo omnium crasso, infra colore nigro virescentes. An Fungi porcini Matthioli? An Portæ villæ, Fungi autumnales, Græcis *amantia* vocati, Latinis Suilli, Neapolitanis Silli & Ammoniti, Apicio Farnei Fungi à Farno Roboris genere? An Corn. in Paulum, Boleti, nomine latino apud Germanos servato, contracto tamen, & ex trisyllabo ferè monosyllabo facto: bälz enim aut Boltze appellantur. An Eid. in Diosc. Boleti Plinii, Germanis corrupta voce Bälz dicti? An rurtus in Gal. de comp. med. sec. loc. Fungorum terrestrium genus, spongiis marinis simile; Fungi suilli? An Lob. Ic. Plant. tom. 2. p. 273. nemorum Funguli? maior ibi depictus. C. Bauh. pin. Fungus 22. sine Augusti mensis: An Fungi 8. genus Tragi: 6. & 7. genus Leonicerii

Mense Septembri inveni fungum porosum Genevæ locis siluosis & paludosis. Binos interdum Bisantii (ubi abundant) reperi. Ibi ab Italis elixabantur, sale condiebantur, & in Hiemem reponebantur, quos cum edere copiebant, oleo incoquebant. Limates hos appetere, à fide dignis intellexi.

Cæterum, decimus-sextus vescus Fungus Clusii apud Vngaros in hunc modum apparari solet. Repurgatus conciditur, frusta, paululum in clibano exliccantur, deinde in aqua elixantur: his deinde exemptis, panis vulgaris, quo videlicet familia vti solet, taleæ supra craticulam tostæ, in prædicto iusculo coquantur, id demum iusculum cribro farinario secernunt: postremò, huic condimento [quod nec tenuè nimium, nec crassum nimis esse debet] elixa fungi frusta imponuntur, additoque aceto, Piperis, Gîngiberis, atque Caryophyllorum aromaticorum possine eduntur. Tenuis autem fortunè homines & rustici, illo cum Panici semine pulvis instar decocto, & Pipe- re denique insperfo, vescuntur.

Qui vulgò Porcini Matthiolo dicuntur fungi, prius elixi ac demum farina circumliti, & oleo vel butyro frixi, magnam cum palato ineunt gratiam. Verùm hi non adeo tuti sunt, quod in suo genere perniciosi plures, quàm in aliis reperiantur. Cæterum periculosi ac malefici à petitis & oculatis viris faciliè dignoscuntur, cum à terra & cortice purgantur, inciduntque decoquendi. Nam cultello dissecti illicet [ut Plinius inquit] dilutus eius aduenit rubor, rancidus subinde aspectus, lividus intus color, rimosa stria, pallidum per ambitum labrum: postremò accedit nigredo, & ita protinus corruptescunt. Quamobrem rectè scribit Avicenna lib. 4. sen. 6. eos nocentiores esse, qui nigri, vel virides, vel in nigro putrescentes visuntur. Proinde amens quidem, & planè stupidus & stipes fuerit is qui tam repentinas mutationes videt, & non cognoverit his notis eorum virus patefieri. Sed accidit plerumque ut illos potissimum Fungi interimant, aut saltem in magnum discrimen adducant, qui eos super ferrea craticula, aut prunis, calentibusque cineribus assatos deuorant. Hoc enim modo decocti, cum in taleolas non secentur, non tam faciliè cognosci possunt, ut si qui dissecti parantur. Adhuc non semper officiant Fungi, quod per se lethiferi sint, sed quiddam copiosius, quàm par sit, ingerantur. Quandoquidem cum lenti admodum, crassissimi que succi existant, artieriarum ostia usque adeo obstruunt, ut conclusis intus spiritibus suffocent. Quod cum probè norint agrestes in Hetruria mulieres, rarissimè Fungos mandunt, nisi Allio & pipere adiectis. Asseruantur Fungi muria, præsertim qui vulgò porcini dicuntur: namque hoc modo parati innocentiores redduntur, amisso lentore.

FVNGI IN METÆ FORMAM

surrecti & perniciosi.

CAP. XXX.


Vigessimum fungorum noxiorum genus constituant hi apud Clusium [quod Vngaris Varganya dictum, Germanis verd Bülz, perinac decimum-sextum vescorum Fungorum genus:] Huius varietatem etiam sunt species Clusio, quæ circa Calendas Septembris in cæditis siluis nascentes reperiuntur.

EEEE 3

Locus &
Tempus

Noxii &
dignoscantur.

Tertia species duplex



Porcini Amantia Pauli.

FVNGI SEPTEM PERNICIOSI, FORMA
ad Fungum porosum multum accedentes.

CAP. XXXI.

Vndeicelimum perniciosorum Fungorum
genus hoc Clusio est, quod Germ. Binsling



appellant, secundum vias & in quercetis nascens circa Calendas Septembris. Huius autem multae sunt species, omnesque perniciosae, praesentemque interdum mortem iis inferentes qui vescuntur, quia similitudine, quam cum 16. genere vescorum (Fungo poroso) habet, illecti, illos ab innoxis discernere non sciuerunt.

Species

Prima quam prior imago exprimit, valde gracili subnixa est pediculo binas uncias aut amplius longo, sustinente ipsum Fungi corpus orbiculatae figurae, fere unciam latum, aliquantulum in supinam partem inflexum, coloris ex flavo, rufo, fuliginoso, commixti supernè, ex pallido fusci infernè, & multis striis exarato.

Altera amplior est, nec adeo gracilem habet pediculum: orbiculatae etiam est figurae, paululum supernè tumescens, & coloris vel rufi, raris quibusdam maculis conspersi, vel fusci omnino & fuliginosi: infernè autem pallidi, frequentibus fuscis maculis notati, vel ex fusco pallidi omnino, nec ullis striis distincti.

Tertia species, Fungi in metam fastigiati tertiam speciem plurimum imitatur: crasso etenim praedita est pediculo, unciam longo, corpore in metam assurgente, uncialis magnitudinis recens nata, & ex cineraceo fusci coloris: adulta autem binarum unciarum, colorisque magis exalbidi, & notis quibusdam distincta, lacera & hians.

Quarta species, duplex esse videtur: nam vel infra duarum unciarum magnitudinem consistit, crasso corpore, gracilioreque pediculo praedita, supernè ex atro rufescentis coloris, infernè flavi, frequentissimis parvis maculis inspersis: Vel trientalem magnitudinem acquirit, crasso & protuberante corpore, fusco supernè, & scissuris quibusdam albis lacero: infernè ex flavo palliescente, striarumque experte.

Quinta species, latis informis est, tuberis [dum innior] figurae, supernè valde fusca, infernè rubra, satura & nigricans, circa oras flava & ochrea colore, binas uncias lata: in adulta magnitudo amplior, quatuor videlicet unciarum, orbiculatae praene figurae, per intervalla protuberantis supernè, & fusci coloris, in quo dilutior rubescens color quibusdam locis elucet: infernè autem ex rubro atro atque obscuri, striis carente pediculo valde crasso, inaequali & fusco, ipsum autem Fungi corpus contractum caerulei, virescente intercepti, est coloris.

Sexta species, magnum Cyclamini tuber valde refert, tum amplitudine, tum colore, & inaequali rotunditate: infernè autem parte ochrea colore est, venis quibusdam rubescentibus, aut subfuscis distincto, nullis tamen striis. Hanc speciem Ungari Baba Varganya appellant.



Omnium autem amplissima est septima species, ut quae sesquipalmaris sit, inaequali tamen ambitu, supernè magna ex parte purpurascens coloris, cui permixti sunt rufus & fuliginosus: ipsum internè corpus subcaerulei coloris, ut etiam pars lupina cui pediculus inhaeret: reliqua pars inferior flava est, binis aut ternis magnis maculis rufis infecta. Iunior verò & primum emergens, longè minor est, duarum videlicet unciarum duntaxat, supernè & infernè eiusdem cum Adultiore coloris. Addit octaud & describit Clusius Fungum quemdam dubium quem ad Fungi in metam formam surrecti species refecti posse censet.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 29. siue orbicularis secundum vias & in Quercetis Autumno nascens: Fungorum noxiorum 19. genus, Clusii. Huius C. Bauh. quinque facit species, sc. primam, secundam, tertiam, quartam, & quintam dubiam Clusii. Eiusdem quintam speciem constituit Fungum noxius 30. tuberis figurâ. Sexta Clusii species est ipsi Fungus noxius 31. Cyclamini radicem colore & formâ referens. Septima verò Clusii species, est ei Fungus noxius 32. omnium amplissimus purpureus.

Synon.
C. Bauh.

FVNGI PLVRES SIMVL ALBI, AD ARBORUM radices, esculenti.

CAP. XXXII.



ET hi Fungorum esculentorum Clusii genus faciunt, sextum sc. Exigua autem est in sexto esculentorum Fungorum genere Clusii diversitas: aut si quae est in magnitudine differentia, eam ex aetate duntaxat provenire arbitrat author. Hoc autè peculiare habet istud genus, quod non singulare, sed confertim plures simul ple-

Descriptio

rumque crescunt: nam vel bini ternive simul coniunctim nascuntur, vel etiam quini, senive, aut plures.

Sunt autem omnes fere orbicularis formae, planae tamen, infernè parte albi, & striati, supernè aliquantulum protuberantes, mediâ autem non nihil depressi, ut umbilicum exprimere quodammodo videantur, colore magis fusco quam infernè. Minores circiter unciam lati sunt, aut paullo ampliores: Medii, binarum unciarum latitudinem adquirent, vel explent: Maximos, quaternarum amplitudinem superare existimat.

Omnes verò haec Hungarico nomine dicuntur

Nomen
Locus &
Temper.

Szil fa termeyt alya, h.e. ad Vlmos nascentes Fungi: tamen si indifferenter, ad Vlmi, Quercus, Cetti, Fagi, Ostriz (quam Galli *Hestre*, Germani *hagenbüchen* appellant) Betulz, Populi albę & luglandis radices, aut earum deiectionum radices siue caudices à nouo Vere in Autumnum vsque, crescant: Germani *Buchenschwammen* i.e. faginos Fungos nominant. Vngari autem eum, qui ad Ostriz radices nascitur, coloreque magis fusco tinctus esse videtur, peculiariter *Gilvz gyertyhan* fa termeyt appellant. Magna etiam copia nascuntur in truncis resectis supra dictarum arborum, præsertim verb Vlmi & luglandis, si leuiter terrâ, vel etiam solo stramine sepulti & tecti putrescant. Quod valde consonum est cum his quæ Matthiolus de populo scribit: cuius verba in studiosorum gratiam, hic adscribere libuit, ne quis vana esse existimet: quæ Vngari de Fungi modò descripti natalibus aiunt. Atqui [inquit Matthiol.] sciatis velim rei medicæ studiosi, Populam albam, humo tenui lectam ad radicem vsque, & aquâ calidâ, in qua fermentum fuerit dissolutum, perfusam, infra quatuordecim Fungos copiosos edere, cui quoque gratissimos.

Synon.
C. Bauh.

C. Bauh. pin. Fungus 7. siue Fungi vmbilicum exprimentes plures simul albi: Fungus in Populo alba Matth. Populnei *ayue* tu Dod. Fungi esculenti, 6. genus Clusii: Fungi sub Populo nascentes, Turini vocati, subrubentes, pediculo candido, qui in cibis minime probantur, & asalp. Fungi glauci dicti Portæ: bini aut tres vno pediculo prodeuntes, veluti Galli cristæ, odore, comâ veluti villosa.

FVNGI MVLTII EX VNO PEDE, perniciosi.

CAP. XXXIII.

Continentur hi sub 2. Fungorum noxiorum genere Clusii: quod Vngaris dicitur Tuuis alya gomba, Germanis *Vnder dorn schwammen* (quod nomen Vngarici interpretationem exprimit) quia ad spinarum, quæ vetustate corrumpi incipiunt, atque inter dumeta nascuntur. Multæ autem eius sunt species, quarum prouentus circiter Calendas Octobris.

Locor.
Tempus

Primæ speciei, seni aut septeni nascuntur ex vno pede Fungi, longis & gracilibus pediculis fulti, orbiculato ferè corpore) fornicato tamen, seu camerato infernè) vel semunciali, vel vnciali, colore flauo, quemadmodum ipsi etiam pediculi, qui maculis tamen nigris distincti.

Confertim etiam nascuntur in altera specie, octo aut nouem Fungi ex vno exortu breuiore, & perinde gracili subnizi pediculo; in orbem veluti expanso corpore, quod vnciam & secundiciam latum est, supernè pressum, & tanquam vmbilicatum, coloris flauo ruffo suffusi: infernâ autem parte flauâ, & multis fuliginosis striis distinctâ.

Rufi coloris sunt, qui confertim etiam in tertia specie nascuntur Fungi viceni & plures ex eodem pede, gracilibus pediculis fulti: ipsius corporis Fungi forma orbiculata est, latitudo inæqualis, pro ætatis forsitan vetustate: nam & inueniuntur vngue non maiores, & vnciales, & sesquiunciales, omnes ruffo colore tincti supernè, infernè fuscis striis exarati.

Quarta species plurimos habet ex eodem ortu prouenientes Fungos, tricenos videlicet aut plu-

res; pediculo, pro singulorum ætate; breui aut longo suffulto, orbiculatæ omnes figuræ, magnitudine tertiæ speciei Fungis pares: colore tamen inter se variant in hac specie: nam vel flaui sunt, multo tamen ruffo colore perfusi, aut omnino ruffi, sed nonnihil tumescentes & fuscis infernè autem nigricantibus striis notati. Germani *Schwammen* appellant, quia in ipsis truncis humi iacentibus nascuntur.

Maiorem orbem habent quintæ speciei Fungi,

quippe cuius diameter sit duarum vnciarum, & quindecim aut plures ex eodè ortu nascuntur simul, dodrantalibus; gracilibus, candidantibusque pediculis fulti, colore supernâ parte vel ruffo vel ex ruffo dilute albescente, infernâ parte quæ aliquantulum camerata est, subalbida, & crassis fuscis striis distinctâ. Figura hic appolita quinquæ est speciei.



Turbinato & quasi in metam assurgente iunt sextæ speciei Fungi corpore, seni pluresque ab eodem exortu nascentes, & oblongis gracilibusque pediculis mediâ parte crassiusculis imitæ caulibus Ceparum, fulti, latitudinem habentes vncialein, aut duarum vnciarum. supernè cineracei quodammodo ex ruffo coloris, aut fusci: infernè crassis nigris striis exarati.

C. Bauh. pin. hos Fungos distinguit: nam vice-synon? simi secundi generis noxiorum Fungorum, 2. 2. 5. & 6. Clusii speciem refert ad Fungum suum noxium 35. siue ad Fungos dumetorum ex vno pede prodeuntes: Clusii verò 3. & 4. speciem, ad Fungum truncis humi iacentibus innatum, plures ex eodem ortu producentem.

FVNGI ALBI LVCENTES, EX VNO principio plures ex radicibus arborum.

CAP. XXXIV.

In cariosis arborum truncis occurrunt Fungi ex vno principio plures: longis pediculis indentes, emaculati vndique candoris, etiam per membranas animalculorum moriunculis & arrosionibus obnoxias, maiusculi, tenues, lentore viscido superius obducto nitidi.

Descriptio

His similes ex vno pede plures, inueniuntur liuidi, variorumque colorum, etiam longis pediculis nitentes. Ex horum etiam generis sunt, quorum meminit Ruellius, dicens ex putrita radicem in nemoribus Fungos nasci, &c.

FVNGI MVLTII EX VNO PEDE, clypeiformes, lutei & rubri,

CAP. XXXV.

Fungorum clypeiformium perniciosorum luteorum forma plana quidem est, sed rugosa & per horas reflexa, flauo coloris, pediculis fuscis;

Locus.

Alia di-
uersitas.

Innascuntur
plerumque pu-
eris lignis,
aut asseribus
vetustarum æ-
dium rustica-
narum & sta-
bulorum.

hisdem locis
& secundum
rusticorum ca-
sas inueniun-
tur etiam alii
eiusdem qui-
dem formæ
planæ & orbi-
culatæ, sed qui
non sunt reflexi,
ac quorum
etiam aliqui
per oras crena-
ti.

Inueniuntur adhuc alii his non valde dissimiles
in aruorum aggeribus, sub sepibus, rubri colo-
ris, quorum nonnulli nullo peculiari odore
sunt præditi: alii verò Moschi odorem quodam-
modo referunt.

Synon.

C. Bauhin pin. Fungus noxius 23. siue Fungus
clypeiformis maior: Fungus alter venenatus
clypeiformis olivaceus Lobel. belg. tom. 2. p. 306. &
ib. p. 272. Fungus alius clypeiformis perniciosus
Clus.

FVNGI SVpra LAPIDES.

CAP. XXXVI.

Fungus
lyncurinus

DE Fungo è lapide lyncurio enato quæ Her-
mol. scribit cap. 1. huius libri habentur. Ea-
dem & Ruellius pro suis venditat. Similia &
Porta villa lib. 10. c. 70. tradit de Fungorum ge-
nere è saxi nato. Commemorat & Bapt. Fiera in
cæna Fungum lyncurium.

Lapides
fungiferi.

Tanta intercessit quondam gratia Fungis cum
mensis in Italia, vbi eorum frequentissimus
est vsus, vt Neapoli inuenti sint lapides, qui de-
fossi, & in cellas vinarias translati, terrâ aliquan-
tulùm operiti, & subinde tepidâ aquâ interspi-
si, intra quadriduum Fungos non ingratos pro-
creant. Hos lapides & Romæ & Neapoli se vi-
disse iactat Matthiolus, ibique magna seruari di-
ligentia, nempe quorum merito quolibet tem-
pore Fungos edant.

Tantus igitur fuit hominum luxus, gulosusque
vt pro habendis quotidie fungis, lapides quosdâ
excogitarent, quos in cellis vinariis summâ curâ
seruabant, & eos terrâ cooperiebant, super quos,
singulis 8. vel decem diebus, Fungi nascebantur,
de quorum natura ac malignitate tradit Galenus
lib. de attenuante dicta cap. 9. vbi omnium ole-
rum, pessimos esse Fungos scribit, inquit Ama-
tus.

Castor Durantes quoque meminit Fungorum
supra petras prouenientium ex irrigatione aquæ
tepidæ.

Tartus
fungiferi
Imper.

Fer. Imperato Tubera fungifera (Tartus fun-
gari) consistentia sunt congeneri ac simili cum
tuberibus esculentis, sed duriora magisque fibra-
ta. Magnitudo horum multiplex, & sunt qui cen-
tenarium librarum pondo superant. Fungos
educunt Vere & Autumno. Quidam modicè hy-
meætata sub terra condunt. Nimiùm enim made-
factâ marcescunt.

Synon.
C. Bauh.


C. Bauh. pin. Fungus 33. siue Fungus in saxi

proueniens: Fungi è lapidibus Matthioli: Fun-
gorum postremum genus è Saxi Porta: Fungus
in lapide fungoso Neapoli. Camerarii in Matth.
germ. & Cæsalp. Fungus petrosus Imper.

Ex hoc Fungo toto anno nasci, si aqua irri-
getur etiam domi asseruato, crescereque in dies
continua fertilitate, pediculis in lapidem indura-
tis, attestatur quoque Cæsalpinus. Porta scribit
hunc Fungum ad esum præditi, alium subnasci,
semperque nouum produci, septem diebus per-
fici: sexies anno demeti; terrâ dodrantè lapidem
operiri: ex Vesuvio, ex Fageto, ex Parthenio, ex
Gargano, & celsioribus montium partibus af-
ferri.

FVNGVS RVGOSVS, VEL CAVERNO-
sus, siue Merulius niger & albus.

CAP. XXXVII.



L Autiori-
bus men-
lis expetitus
reponitur etiâ Descript.
exliccat, vt
alienis mensi-
bus gula ser-
uiat, formâ
turbinatâ, to-
tus circûqua-
q; serobiculis
peruius, vt fa-
uos apu imi-
teretur, ex albo
nonnihil ru-
bescens, fuluus
aut niger: in-
teriori cæce-
rum parte to-
tus cauus, al-
bus & velut
farinaceo.

quodam læuore aspersus: pediculus verò qui
Fungi corpus sustinet, in limba parte crispus, rotus
albus, cauus quoque.

Quandoquidem verò Clusius horum Fungo-
rum quatuor species obseruauit, lubet etiam ea-
rum descriptiones subiungere, quæ sic habent.
Prima pollicis extremum articulum rariò superat,
valde rugosa, & quasi faui instar in cellulas di-
stinctâ membranacea cute, coloris albicantis,
quali fuligine infecti, præsertim illius venæ ru-
gosæ & prominentes, pediculo, quo nititur, cauo,
vt & totum Fungi corpus. Altera, priorem ma-
gnitudine non multum superans, aliquantulum
contractior est, & pyri in clybeo cæchi instar
rugosa, vel potius tuber aut radicem Aristoto-
chæ rotundæ vetustate contractam & multis ru-
gis præditam, valde mentitur, coloris ex rufo
fusi: cuius rei causa Germani Braun & Nau-
raden cognominant. Tertia primæ formâ non
dissimilis, sed duplò maior, orbicularis plerumque,
præter pediculum quo sustinetur: interdum autè
in trium vnciarum longitudinè, æqualemque aut
ampliorum crassitudinè, excreuit, eiusdem
cum prima coloris, nec minus quam illa rugosa,
& veluti in cellulas distincta, internè etiam caua:
Germanis Stodt & Mairach dicitur. Quarta
recens natæ figura quodammodo ad tertiam,
quæ orbicularis est, accedit, sed rugis magis tur-
batis & compressis, vt in secunda, color etiam ma-
gis candicans, & pediculus longior. Paulò adul-
tior verò, in longitudinem excreuit, metæ instar,
aut pilei, siue Petali germanici longioris, qui
lunbo

limbo caret, cuiusque apud eos vsus duntaxat hieme, foris etiam rugosa, & in cellulas distincta, quæ colorem pallescentem veluti fuliginem quadam insectum habet: internâ autem parte caua & hianse: Germani illam *Maurachen* nominant. Et hæc Clusius de primi generis Fungorum esculentorum quatuor speciebus, colore & magnitudine differentibus, quas Vngari *Szemerchya* vocant, Germani *Maurachen*.

Videtur porro ipsi hic Fungus is esse, quem Dalechampi spongiosum cognominat, in asperis & saxosis nascentem, sæpe tamen ad Castanearum radices, colore fuluo, corpore spongioso, figura in metam delinente, suauissimi gustus: quam ob rem in delitiis haberi variis modis præparatum, vt hominum palatum variis condimentis oblectatur. Gallos vocare *Morilles*, inde fortasse, quod ad Mori fructus figuram nonnihil accedat, vt & cum quem Bap. Porta à Neapolitanis Spongiolas appellati scribit, à spongiarum similitudine.

Scripsit de Fungis & Tuberibus duo capita Dioscorides quorum prius *Spongia*, h. e. Tuber vocauit, quod meâ sententia, inquit Tragus, *Morchellen* dicunt Germani. Estque ea mihi Tuberum & Fungorum prima species, quæ rotunda est pileoli instar, foris foraminulenta, non aliter atque fauis mellis, coloremque carum obtinens: Galli *Trassai* vocant, nonnulli, vt Theophrastus testatur, *Garanea*: Serapio cap. 236. *Ramech*.

Fungos, quos *Morchen* vulgò Germani appellant, Cornarius in *Æginetam* Dolab. lib. 1. cap. 77. in Diosc. & Gal. 2. alim. eos esse existimat quos Græci *Ananitas* vocant.

An Fungi Spongioli Hermolai, Ruellii, Tragi & Loniceri?

C. Bauh. pin. Fungus 1. siue porosus: Fungorum 1. genus Trago, Lonic. & Matth. germ. Fungorum præcipuum genus Geln. coll. Spongiola nonnullis Dod. & Imperat. Neapolitanorum Ponz: Fungi fauaginosis, siue Fungi rugosi, fauis mellis similes Lob. 1c. Plant. tom. 1. p. 274. & hist. belg. Fungi rugosi Cast. Fungi præcoces Dod. belg.

Nascitur prima Clusii species apud Vngaros & in Germania plerumque sub Abietibus, in dumetis atque pratis, sed in his altera præsertim: tertia verò & quarta sub Quercubus magna ex parte, mense Aprili vsque ad Maii finem: & ab eo tempore euanesceit, nec vsquam apparet, vnde vulgato proverbio apud Germanos dici solet *Qui nist zu wie die Morchellen im Meyen*/hoc est, Non aliter atque Tuberâ Maio mense cresecis & augetis. Merulii nigri abundant in syluis Abietum & Piccarum inter Montbelgardum & Porentruum.

Per vniuersam Germania aded in delitiis est hic Fungus vt filo traiectus & in corollas compositus è clauo suspendant, & adseruent, vt etiam mediâ Hieme eo vesci possint: Aqua feruente bullitur, posteaque aromatibus è butyro conditus cibus apponitur. Recens verò apud Vngaros assari solet supra craticulam, vel ex oleo decoqui, sed etiam ressecatus torresti potest, prius tamen macerari non oportet.

FVNGVS CANDIDVS, CRISTATVS, CAP. XXXVIII.

Fungi autumnales antiquis indicti qui vulgò *Galluci* dicuntur, candoris immaculati, bini Tom. III.

aut terni ab vno pediculo iuncti, formâ non rotundi, sed veluti galli cristæ, vnde nomen sumptisse suspicatur Porta villæ lib. 10. cap. 70. sunt croci odore, co. nâ uelut villosa.

FVNGVS RAMOSVS FLAVVS

& albidus.

CAP. XXXIX.



Substantiâ Sest cum cæteris Fungis parili: sed figurâ longè alia. Nam ex vno gemino-ue crasso tronco in alios minores, hi in alios adhuc minores, ad minimos vsque creberrimis & anfractuosis segmentis Corallii fruticis in morem, sed longè densiore stipatu, fingitur. Est & varietas quæ-

dam. Nam alii tenuissimas ad extremum venarum instar hepatis diuisuras abeunt: alii in corallii aut paleæ crassitudine subsistunt. Colore sunt alius flauo, aliâs albedo. Et hic curiosiori palatui expetitur.

Hoc fungi genus [Fungorum esculentorum Clusii genus vndeiciclimum] quod diuersæ à reliquis est forma, cuiusque elegantis, Clusius in tres species colore inter se differentes, nonnihil etiam formâ, diuidi posse arbitratur.

Vndeiciclimum Fungorum esculentorum genus hoc Clusii Vngari *Szermas gomba*: Germani *zigenbart* oder *Geißbart* (quod idem est, vtræque enim vox caprinam barbam significat) tum *Schäberling* appellant: nonnulli etiam *hirschling*/eodem quo Fungos villosos nomine. Porro affinitatem quandam habere videtur cum illis Fungis quos Porta è saxis ex Gargano monte erutis nasci scribit, non pileatos, sed turiones vt asparagos, & in ramos diuisos.

Huc pertinere existimo Fungos digitellos à digitis dictos, quorum mentinere Hermolai & Ruellius, itemque Lonicerus, licet non demonstrent quid velint.

Matthiæus in Diosc. secutus Lonicerum, miscet Fungum *manus* cum fungo *Xbeling*: melius autem fecisset si distinguere Tragus fuisset imitatus. In hist. germ. vocat *hendelschwam*.

Huc igitur referimus quoque Fungorum 5. genus, Digitellos (*hendelschwam*) luteos prorsus, partim ex albo palidos & roseos Tragi. Digitellos siue *Maninas* vulgò *Calsalpin*.

Quare hallucinari videtur C. Bauh. pin. distinguens inter Fungum 19. esculentum Clusii, qui ipsi est Fungus 29. siue ramosus Imperati: Et Fungos digitellos autorum iam allegatorum, qui ipsi sunt Fungus 31. siue candidus digitatus minor. Nec hic fortè eximendus Fungus 30. siue digitatus maior, Eiusdem.

Fffff

Locus & Tempus

Fungus ramosus Autumno ante Vergiliarum oceanum prodit in vmbrosis syluis. Digitelli Tragi in humectis & viginosis siluis reperiuntur: gaudent iuxta putrida ferè ligna prouenire. Fungus escul. 19. Clusii Septembri mense sub Corylis nasci gaudet.

Succosi sunt Trago digitelli eius iudicio frigidis, ac improbe distichisque concoctionis & prorsus inulubres.

FVNGI RAMOSI ARGENTEI.

CAP. XL.

Locus

In putridis deiectarum arborum caudicibus creleat, quod Clusio vicissimum quintum Fungorum non esculentorum, immo pernicialium genus est circa Calendas Nouembris. Hoc Vngari seyer szarmas gomba à candore cognominant: Germani wild hirschling/i.e. siluestrem ceruinum Fungum, ad eius differentiam, qui pro Fungo ramoso descriptus est.

Semipedalis magnitudinis est hic Fungus aut amplior, elegantissimæ formæ: nam fruticosus & in innumeros quodammodò ramulos diuisus, candoris immaculati, quorum nonnulli abiegnorum ramulorum figuram exprimunt, adedò ut si splenderet, ex puro puto argento constatum quis æstimare possit: aliquando nullum habet pediculum, sed ipsi deiectæ arboris caudici inheret: interdum fescunciali nititur pediculo.

Synon.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 40. siue ramosus candidus: Fungorum noxiorum 25. genus Clusii at figura habetur Exor. hist. ap. alt. in fine.

Varietas.

Huius generis obseruauimus Fungum digitatum nigrum veluti cornua exprimentem.

FVNGVS GALLINELLA DICTVS.

CAP. XLI.

Descrip.

Locus & Tempus.

Fungus Gallinella antiquis indictus, secundum traditionem Portæ de villa, parua est forma, Spongiis, vel nascentibus Porris similis, quatuor digitorum longitudine. Nascitur Autumno locis vmbrosis.

FVNGI DELICATISSIMI SAPORIS.

CAP. XLII.

Vltra Balatonem lacum Vngariæ, in parua insula cui nomen Fanor Simidiensi Comitatu, Aprilimense nasci intelligebat Clusius alterum genus Fungorum esculentorum delicatissimi saporis, cuius nomen ipsi indicare nemo poterat, sed illis similis esse ferebatur, qui inter perniciosos & lethales Fungi færtidi serpentine vocantur, & ab Vngaris Kygo gomba, à Germanis Vatter schwamen dicuntur: pyramidalitamen dodrantalique apice & angusto hunc Fungum esse.

Synon.

C. Bauh. pin. Fungus 2. siue apice pyramidalis & angusto: Fungi esculenti alterum genus Clusii.

FVNGI TRES FOETIDI SVB CORYLIS, serpentini dicti, perniciosi.

CAP. XLIII.

Locus & Tempus.

Decimum sextum Fungorum noxiorum genus Clusii faciunt hi, de quo ait: Extremo Sextili prouenit sub Corylis, færtidi admodum odoris, quod Rigyo gomba Vng. Germ. Vatter schwamen, quali serpentinum siue colubrinum Fungum, appellant. Eius porro tres species obseruantur magnitudine pænè inter se æquales, sed colore & formâ dispares.

Prior oblongo gracilique fulcitur pediculo, qui insidet initidò veluti ouum exalptum: vncia-

lis magnitudinis, coloris albi fuligine perfusi externâ parte, nigri striati internâ & supinâ: dein oras explicans, fescuncialem amplitudinem adquiret, in pilei, paruique galeri similitudinem formatam, albi supernè coloris, frequentibus fuscis maculis distinctam, arque ipso fastigio veluti fuligine infecto.

Alterâ longo, gracilique pediculo sustinet Fungi corpus, parui galeri figura formatum, vix vngue maius, initidò dilutiore fuligine infectum: fescuncialis autem magnitudinis cum adoleuit, galeri etiam formâ, colore superna parte atrâ fuligine tincto: internâ autem, instar forniciis camerata, & nigri striis exarata, quemadmodum & iunior.


Tertia corpus, eiusdem cum superiore magnitudinis, valde laceris est oris, & quodammodò in lacinias diuisum, rufi interdum coloris supernè, fuliginosis striis notatum internè. nonniquâ autem albi coloris fuligine infecti supernè, & nigri striis exaratum internè: aliquando etiam internâ & supinâ parte adedò inuersâ & reflexâ, surrectisque lacinis, ut florem aliquem exprime-re vel mentiri videatur.

Aliud Fungorum genus sub Corylis proueniens venenatum, ex Clusio quoque postea trademus. De quo hoc capite agimus est C. Bauhin. in pin. Fungus noxius 26. siue Fungus oris laceris & in lacinias diuisis.

FVNGVS CORALLOEIDES

cancellatus.

CAP. XLIV.



Nobilis vir N. de Cal-luas Petters toparcha misit ad me (inquit Clus. Exor. in appendicis alterius Auctario in fine) Fungum admirabilis texture Nascitur autem ipso referente, Belgæntienensi agro, tum in siluis, tum inter harundines secundum fluuiolum constitas, galinacei oui forma, dum è terra primum

erumpit, colore prorsus niueo, radicemque habere ait tenuem, candidam, in multas fibras valde tenues diuisam, qua firmetur & alimentum sibi necessarium attrahat: ouum autem illud siue voluam, dum maturefcit, sensum dirumpi & dehiscere, & inde exilire, tanquam marsupium aliquod, distinctione cancellatim reticulatâ constans, & in obliquos veluti ramos inuicem sese secantes atque summâ parte in vnum coeuntes formatum, rubri coloris: ut totidem coralli rami simul implexi videantur: sed admirabilem illam externam venustatem & elegantiam prorsus deformari & corrumpi à færtidissimo quem exhalat odore: illum autem odorem oris suspicabatur à crasso cineraceoque quodam liquore rubentes illos ramos supina parte obducentem, quem

quem, simul atque ex sua volua exclusus est Fungus, varii generis parua insecta mirificè appetunt, & tandem etiam absumunt, omnem alium cibum præ isto spernentes : imò multos alios Fungos, quos alioqui optimos esse credunt & in deliciis habere solent. Inter perniciosos autem Fungos hoc etiam genus referendum esse, nemo ut opinor, inficiabitur : &c.

C. B. var.

C. Bauh. pin. inter Fungos noxios quadragesimum tertium facit, vocatque Fungum rotundum cancellatum : Fungum lupi crepitum vulgi, efflorescentem Columnæ. Hunc C. Bauh. a Fungis puluerulentis distinguendum haud censet, licet cum & Clusius, & Columna peculiari figura exprefferint, & ipsemet hunc ab illis diuersum pronunciarit.

FVNGVS INTYBACEVS, ET ALIVS interaneis vituli similis, cinereus.

CAP. XLV.

Descrip:

Memorabilis est magnitudinis & formæ : planus & compressus, d. meriente sesquipedal, ex foliis rotus, aliis incumbens, aliis subeuntibus consarcinatus : Intybo crispo haud ineptè comparaueris : singulares foliosæ portiones cristatis crispisque oris, in quas radii ab in-



sertione producantur, petunclos imitati : color parte supinâ veluti cinericeus, pronâ albus : inuersus porosus apparet, stellamque marinam arborestem egregiè exprimit. Odor haud ingratus. Substantia lignosior quàm ut in cibos venire possit, mense Septembri repertus :

mense autem Augusto non ita durus obseruatur, quem quidam edulem dicunt. Nascitur in siluis.

An arborum Fungi Auriculæ Iudæ facie, Lobelio ? Eius Iconem nimis imitatus est pictor, nostrâ plantâ neglectâ cui exstat & crispæ oræ.

Locus.

Tempus.

Huc iam pertinere arbitramur Fungi 7. genus Tragi, quod in siluis Augusto mense reperitur, prope radices Quercuum, magnum quidem, & formam interaneorum vituli representans, incani & plumbei coloris, ac à nonnullis more aliorum Fungorum decoquitur : Germani *Wichschwemme*, & à forma *hasen ohrlin* / h. e. Lepusculos nominant. Lonic. fungos lepusculos : Matth. germ. Fungorum genus nonum : Gelsi. coll. Fungi genus magnum.

FVNGI MONSTROSI, VASTÆ amplitudinis, esculenti, coloris vel ex rufo nigricantis, vel ex albo nigri. CAP. XLVI.

Monstrum veriùs Fungi quàm Fungum censendum iudicat Clusius vicissimum primū Tom. III.

genus suorum esculentorum Fungorum, quia adeò vastâ interdum est amplitudinis, ut integram etiam *aventae* familiam explere & satiare possit : nam refertur circa Levva Dominorum Dobo oppidum, in extremæ Vngariæ limitibus Croatiae vicinis, tantâ nonnunquam amplitudine excrecere, ut bigam faciliè expleret, præsertim, ut aiunt, si quis præteriens (quod superstitione non caret) admirabundus subsistat : immò (quod magis ridiculum) asserunt nonnulli, conitiis proscindendum esse, ut in tantam molem excreseat, alioqui manere in ea magnitudine, quâ primùm conspectus est, quasi agere ferentem se negligi.

Nascitur autem in Vngaria sub extremum Autumnum, vel circiter diem D. Michaeli sacrum, ad Quercuum radices. Vocatur ab Vngaris *Bos fros gomba* : à Germanis *Scheberling*.

Locus & tempus.

Si quis porro Fungos ferè sine pediculo cum hoc monstroso Fungo conferat, non sine causa forsitan existimabit, illos esse huius generis nondum adultas species, adeò illi ad illius formam accedunt.

Considerandum autem est, an similis fuerit Fungus, qui (referente Diodoro Cassio Nicaeo) Traiano Cæsare aduersus Decebalum Daciarum Regem proficiscente, ingens latinis literis inscriptus circumferebatur à Barbaris.

Eum certò esse concludit Clusius, quem Porta à Neapolitanis Gallinaccia appellari scribit, tantæ magnitudinis, ut sexaginta libras interdum pèdat, sufficereque possit ad vniuersam familiam pascendam. Portæ verba sunt hæc : Est Fungorum species antiquis indicta, Neapolitanis Gallinaccia vulgò nuncupata, mirabili profectò forma, ut nescias cui assimiles : ad magnam crescit altitudinem, ut brachiis diductis vix homo complecti possit, pondus sexaginta librarum, non orbiculari formâ, ut ceteri, sed veluti manus in digitos plures diducta, ut Quercus frondibus assimiletur, albus, callosus, ut vix integro vniuersa familia vesci possit.

C. Bauhin. pin. tamen dubitat an Gallinaccia Neapolitanorum Portæ sit Fungi esculenti genus 21. monstrosum Clusii, quod ipsi est Fungus 32. siue maximus Vngaricus.

FVNGI LARICVM MAXIMI LVTEI esculenti.

CAP. XLVII.

FVngi non tantum humi proueniunt, sed & in arborum caudicibus, qui omni ferè periculo vacant [dummodò non sint arbores noxiæ] quod è cortice prosiliant : cui nec ferrum, nec tabefactus pannus, nec serpentis cadaver subesse potest. Ex hoc genere quidam, præter Agaricum, Laricibus innascuntur in Ananien-sibus montibus, triginta librarum pondere, aureo colore, per ambitum dissecti, in cibis gratissimi, nullo amarore præditi, licet Agaricus ab eadem arbore productus sit amarissimus, inquit Matthiæolus. C. Bauh. pin. Fungus 26. siue lariceus aurei coloris.

Fungus auritus Inglandum, albicans.

ORechinole species Fungi coriacei figura foliacei, quæ ab vno pedicello, in curuatam abit, in ambitu Rosæ dimidiatæ instar dissecta. Pars inferna, reliquorum Fungorum in mo-

Ffff 2

sem striis foliaceis lecta. Nascitur in arboribus, specialiter in Nucibus, colore albicante. Fer. Imper. lib. 27. c. 6. An species aliqua Fungorum plurimum simul alborum esculentorum, eorum sc. qui ad Iuglandis radices proueniunt?

Fungus lignosus arboreus ad fursures.

FVngus quo, autore Imperato, ad abstergendos capitis fursures utitur, de lignolorum Fungorum genere est, magnus & maximi capitis medietatem adæquans. Nullo pediculo nititur, sed arboribus immediatè affixus hæret, diuifuras infernè manifestas habens, quarum ope fursures decutiuntur.

An Hermol. coroll. 698. Fungi quibus strigilium vice constricta utitur? C. Bauh. pin. Fungus noxius 4. siue ad cutim extergendam aptus: Fungi igniarij species, quæ in constrictis pro strigili utuntur, Cæsalp.

Fungi Castanearum Lacinie dicti.

FVngorum, qui Lacinie priuatim dicuntur à Castanea, magnitudine spectabilium, ut singuli sufficiant, meminit Hermolaus loco supra citato, & post eum Ruellius.

Fungus villosus arboreus, coloris ochra, rinctioris.

Descript.

FVngus villosus dictus Imperato, mediocris magnitudinis est, duobus pugnis simul iunctis ferè æqualis, vndique tunica mucosa obiectus, quæ in villos disiungitur breues, quorum longitudo ipsam tunicæ crassitudinem æquat. Interior quoque substantia villosa est, quæ arbori adhærens in filamenta, quæ ex corio emergunt, quaquauersum terminantur. Colliguntur ex arboribus pomorum, colore intus ochra, qui exsiccati nigrescunt. Utuntur mulierculæ horum decocto ad tingenda velamenta lugubria.

Locus

CVBICVLA FVNGI ARBOREI AD ELLYCHINIA.

CAP. XLVIII.

Descript.

EX Iuglandibus colliguntur Fungi, truncis anosis adnati, substantiâ callosâ, lignosâque, in ambitu & fibris rectis contextâ, in medullis molliore, in qua (si rectè memini) vix vlla apparent fibrarum vestigia: color foris cinereus, intrinsecus obscurior ad fuscum inclinans: præparatione autem assequuntur mollitiem illam, & ignium rapacem vim, quos depopulantes ipsorum substantiam ad extremum fouent.

Ruellius Lac. & Lonic. meminerunt Fungorum arboreorum qui fortè iidem sunt cum iis quos cum Hermolao Igniarios vocant.

Fungi, inquit Tragus, qui radicibus arborum, potissimum Populi nigre adnascuntur, Ægiritæ nuncupantur: qui verò caudicibus quarumvis arborum adhærent, Arborei dicuntur, cumque igni concipiendos parantur & vsurpantur. Igniarij, germ. Zünderschwem appelluntur. Ad hos autem vsus adhibentur ea præcipuè Fungorum genera quæ Fagis & Nucibus adnascuntur: ignem enim quem semel conceperunt, non faciliè relinquunt. Sunt non pauci qui Fungos hos ad id negotij parare norunt, decoquunt enim illos in lixiuo & siccatos rudent, rursusque nitro coquunt, hoc enim pacto ad concipiendum ignem aptiores redduntur.

Ex Galeno manifestum esse ait Cornarius fuisse Galeni tempore Fungorum genus aliquod, quod Ellychnion priuatim appellaretur, cognomine *ταρχνιον*, cuius nusquam mentionem fecerit Plinius, quodd fortè Romæ nondum in vsu foret. Et licet hodie quoque qualis materia eorum Ellychniorum, quæ ex Tarso adhaerentur, fuerit, haud faciliè quis dixerit, eò quodd res, & nomen perierint: Suspiciatur tamen idem Cornarius Tarsensia hæc ellychnia ex Fungorum terrestrium genere fuisse, eorum videlicet qui similitudinem quandam ad marinas Spongas habent, & quibus etiam hodie ad ignis scintillam ex silice ad chalybem impacto excussam, excipiendam utitur, quum commodissimè ignis in his Fungis seruetur. Nec de aliis Virgilium loqui credit libi: Georg.

Nec nocturna quidem carpentes pensa puella

Nesciuerit Hyemem: testa cum ardente videat

Scintillare oleum: & putres coactescere Fungos.

Sgenerari sibi imaginantur in lucernis, dum pluuie tempestas instat, Seruium Grammaticum sequentes, qui hunc locum exponens ait, Nam ut dicit Plinius, cum aer humidus esse ceperit, sauiilla quæ cum fumo solet egredi, prohibita aeris crassitate in lucernis residet, & quasdam velut fungorum imitatur imagines. Cornarius tamen Plinium hæc dicere negat: Et nihilominus cum Seruio, tum iis qui illum hac parte sequuntur, sauiillam fungum fieri permittit, at ipsis suum commentum placere sinit: modò videant ut istum lucernarum fungum apprehendant, ne aeris crassitate depulsa, vna cum fumo elabatur, si fortè in vsu assumere velint.

Ceterum ex fungis terrestribus fiantne Ellychnia dubitamus: suspicamus, non fuisse Cornario bene perspectum ex quo fungorum genere fierent fomites ignis, Spongiis similes, dum dicit esse ex terrestrium genere: colliguntur enim in Germania ex Iuglandibus, & præparatione redduntur Spongiis similes. Hos autem fungos esse Virgilij & Plinij lucernarum non existimamus, ac hac in parte Matthiolo Cornarium reprehendenti assentimur.

An fungus *Borsaro* verd. Imper.? An Fungus Agarico similis Lobelio?

FVNGVS AVRICVLÆ IVDÆ, COLORIS
ex cineraceo nigricantis, perniciosus, in Sambuci caudice nascens.

CAP. XLIX.

Est hic Fungus perniciosus primus Clusij. Ede quo ait: Fungorum perniciosorum primi generis vnicam speciem obseruare memini, licet magnitudo eius vna non sit: sed eam diuersitatè ex ætate oriri arbitror. Quotquot autem conspexi, breuissimo, vel potius nullo pediculo nituntur, sed caudici arboris inhaerent, aut singulares, aut gemini, membranaceâ cute constantes, implicata & sinuosa, coloris ex cineraceo nigricantis. Vulgus *Auriculam Iudæ* nominat, cartilaginea enim & membranacea est substantia, quemadmodum auris. Vngari Boza faterentur: Germani *holde schwammen* appellant, quia in Sambuci caudice nascitur, cum huic arbori primum prorumpunt folia.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 1. siue membraceus auriculam referens, siue Sambucinus. ut Cast. Fungus ad Sambucum Trago: *Auricula Iudæ* vulgo: Fungorum perniciosorum 1. ga.

Vires

genus Clus. An Fungus auricularis Imperato?



tus sit, exhibere solent, ad gargarisandum, & guttur eluendum.

Fungos in Sambuco genitos omnis generis inflammationes & tumores ex aqua rosacea aut vino impositos sedare & deprimere tradidit quidam apud Tragum. Solet is Fungus, ait Clusius, tametsi non esculentus, à plerisque adseruari exsiccatum in usum: nam in gutturis tumoribus, acetum in quo maceratus sit, exhibere solent, ad gargarisandum, & guttur eluendum.

FVNGI TRES DICTI SPONGIÆ

lignorum. perniciosi.

CAP. L.

FVngorum noxiorum vicissimum quartum genus Clusii faciunt hi, quod Germ. Holzschwammen appellant, quoniam iam Octobri mense in putridis deiectionum arborum ramis crescat. Tres autem eius species obleruantur.

Prima reliquis maior in masculis ramorum fragmentis humi iacentibus nascitur: formâ Fungo Auriculæ Iudæ haud valde dissimili, sed colore elegantiore, nempe rubro, vncialis aut duarum vnciarum magnitudinis: interdum plures coherentes, & in vnum corpus veluti coalescentes, valde tamen se remittente colore.

Alterâ longè exilior est, & vnguis latitudinem interdum non superans, nonnunquam etiam latior, singularis aliquando, interdum bini simul coniuncti, formâ veluti supernæ exsculptâ, coloris egregiè rubentis, & aded floridi, ut coccineum prouocare videatur. Inhaeret plerumque tenuibus ramorum humi iacentium, aut corticis illorum fragmentis, in viis obsecris & ab arboribus obsecris, quæ Solis radios adimunt.

Tertiâ rugoso prorsus est corpore, vncialis aliquando magnitudinis, nonnunquam fescuncialis, interdum bini simul coherentes vnciâ minores, plerumque etiam terni, & illi quidem elegantiore aut eo colore præditi, reliqui flauo: adnascuntur similiter tenuibus vel ramulis, vel eorum fragmentis humi iacentibus.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 2. siue Fungus putridus, arborum ramis inhærens, plurimis simul coherentibus.

FVNGI VENENATI QVINQVE, MVSCARIi dicti. CAP. LI.

Hic Vic Fungorum noxiorum generi, quod duodecimum est Clusio Germani stiegenschwammen appellationem dederunt, à mulcis, quæ illud valde appetunt, & plerumque illi insident, non sine ipsarum perniciæ, siquidem quotquot degustant, intereunt. Quinque autem tradit Clusius eius species, omnes extremo æstili in cædis siluis pronenientes:

Tom. III.

Earum autem elegantissima est quam quartam facit quæ hac tabella exprimitur, cuius ætate duntaxat quoddam discrimen est: Junioris



enim & recentior nate corpus minorem habet orbem, & binas vncias solummodò latum, rubro colore valde saturato instar concreti sanguinis tinctum, per cuius superficiem frequentes exalbidæ sunt consperse maculæ: Adulterior in maiore latitudinem patet, ut quæ quincuncialis sit aut amplior, tumida super-

nè, rubro etiam colore, sed paulò remissione, quàm in iuniore tincta, obscurioribus veluti vndis intercurrentibus distincta, & crebris etiam exalbidis maculis infecta: pediculo autem constat protuberante infima parte, deinde trientem longo, vnciam crasso, à quo infernâ parte crassæ nigræ striæ ductæ in ambitum: bini interdum eodem pede coniunctim nascuntur.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 19. siue muscas interficiens: Fungi muscarii Trago, Cordo in Dioscor. Lon. & Tab. Fungorum noxiorum 11. genus Clusio.

Inuenitur quattuor species in cædis siluis Locustæ Francosurto ad Mœnum vicinis, vnde rusticæ mulieres lectum, in urbem deferunt venalem, cum non ignorent plerosque empturos ad muscas necandas: nam cum muscæ libenter illi insideant, diuisam in fragmenta, variis in conclauis locis ante fenestras spargere solent, ad quæ inuitatæ & excitæ muscæ, succum sugunt ipsis perniciosum, & paulò post etiam lethalem.

FVNGI BETVLARVM ALBI, MACVLATI, perniciosi. CAP. LII.

Or Cædis hi sunt genus Fungorum noxiorum Clusio, quod circa Pentecosten prouenit in siluis ad Betularum caudices & truncos, cuius rei causa Vngari Nyssa gombaya, Germani Birchenschwammen appellant, h. e. Fungum betulaceum.

Orbiculatus, inquit, pæne est figuræ, supernè paullo elatioris, albi coloris, leui fuligine adumbrati, in quo maculæ quædam inscætescentes: latitudo duarum vnciarum: inferna pars tota alba est, exceptis striis, quæ fulgine infectæ, à pediculo binas vncias longo & gracili ductæ, in extremas oras desinunt.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 16. siue Fungus ad Betulam Trago.

FVNGI PRVNORVM COMMIXTI coloris perniciosi. CAP. LIII.

H Os sub Fungorum noxiorum genere secundo tradit idem Clusius. Sub Pruni arboribus, inquit, nono Vere nascitur secundum

FFFF

genus noxiorum Fungorum, ideoque, inquit, ab Ungaris Szilvva aya nuncupatur, inquit Clusius, qui illius vnicam speciem tradit, numerosam ex eodem pede, nullo tamen pediculo conspicuo, confertim nascentem, variâ magnitudine & formâ: nam Fungorum nonnulli, binas aut ternas vncias lati sunt, atque etiam ampliores, vel orbiculatæ figuræ, aut angulosæ: alii paulo minores, nonnulli vix vnciam lati: omnes coloris ex albo pallido & fusco commixti.

yaon? C. Bauh. pin. Fungus noxius 10. siue Fungi ex eodem pede, sed non conspicuo, numerosi.
An Prunuli Trago?

FVNGI SALICVM, COLORE VARIJ, perniciosi.

C A P. LIV.

Deser. **E**st hic Fungus confertim nascens, & caudicibus Salicum firmiter inherens, Lichenis instar in corpus tuberosum excresecens, variâ formâ, & magnitudine: nam pleraque tubera vncialem magnitudinem non superant, alia binas & ternas vncias interdum ampla sunt, coloris elegantis & variè commixti: nam in eis & albedo conspicua est, & pallor, & suaue rubens color, & satur, atque etiam flauus, addo his fuscum siue fuliginosum colorem hinc inde ipsis inspersum.

Loens & Tempus. Quia autem nouo Vere post præmaturas pluuias genus hoc quod est Clusii noxiorum Fungorum quartum, plerumque nasci solet in Salicum caudicibus, ideo ab Ungaris Fiz sa gomba, à Germanis verò felber schwammen vocatur. C. Bauh. pin. Fungus salignus Lichenis forma variegatus: Fungorum noxiorum 4. genus Clus.

FVNGI SVB CORYLIS, ORBICULARIS figuræ.

C A P. LV.

Descriptio **S**extum hi constituunt genus Clusii Fungorum perniciosorum, quod quia sub Corylis crescit, Ungari *Monjaro alya gomba* vocant: orbicularis autem est figuræ, binas vncias latus aut maior, supernè nonnihil tumescens, extremis oris in supinam partem flexis, coloris ex rubescente fuliginosi, cui albedo quædam permixta videtur, interdum etiam omnino fuliginosi & fusci: infernè nonnihil rubescit, striisque exaratum est, à pediculo gracili, binas vncias longo, in ambitum ductis crassiusculis, fusci coloris.

Synon. C. Bauh. pin. Fungus noxius 13. siue coryleus orbicularis. Fungi serpentine fætidè venenati sub Corylis nascentes, quorum antea ex Clusio meminimus, fortè non absque ratione huc sunt referendi.

Inuenitur circiter Pentecosten, h. e. Maio, aut sub Iunii initium.

FVNGI CERASORVM COLORIS VARIJ, perniciosi.

C A P. LVI.

Descriptio **P**lures Fungi ex eodem pede nati, imbricatim siue tegularum instar, alter super alterum conferti nascuntur, infima parte vnciam lati, deinde sensim altitudine crescente, ternatum aut quaternarum vnciarum in extremis oris, palmum autem longi. Superna corporis Fungi pars variis coloribus infecta est: nam circa pedem ex albo pallescit ad vncialem altitudinem, deinde transuersi colores secant, ex flauo rubroque colore commixti, postea flauus: supra illum denuò transuersim secant colores flauus & ruber simul mixti: hoc sequitur flauus color, qui-

busdam tamen veluti fuliginosis maculis intertus: extimæ oræ saturâ rubedine nitent, quam nonnihil sedat linea quædam veluti farinâ conspersa: supina verò parte, aut pallescit, aut flauus est.

Est hoc Clusio perniciosorum Fungorum quintum genus, quod Vere nouo in putrescentibus Cerasorum caudicibus nascitur: eamque ob causam apud Ungaros Revves cerešnye sa

gomba, apud Germanos Kersendaim schwammen nomen inuenit. Est C. Bauhino pin. Fungus noxius 8. Fungus Cerasorum, imbricatim alter alteri innatus variegatus.

Sed & hic Fungus, tamen hominibus noxius, alicuius tamen est usus: nam rustici exliccatum recondere solent, quia illius pollinem cum sale & pabulo mixtum, ægris

bobus & vaccis salubriter dari, sibi persuadent.

FVNGI DVO LATI, ORIS LACERIS, perniciosi. C A P. LVII.

Hi Clusio sunt perniciosorum fungorum decimum septimum genus, cuius duas describit species:

Primam, dodrantalem amplitudinem habentem, & minimi digiti crassitudine præditum Pediculum, binas aut ternas vncias longum, ex cuius imo plerumque subnascitur exigua proles orbiculatæ ferè est figuræ, oris in infertorem partem nonnihil inflexis, colore supernâ parte rufo ad nigredinem tendente, cui flammescens circa medium admixtus est: infernâ pars pallida est, striisque fuliginosis exarata.

Secundam, eiusdem cum illa magnitudinis, sed graciliore pediculo præditam, circumatam etiam torunditatis, nisi laceras haberet oras in ambitu: in qua color supernè planè luridus, hoc est, ex pallescente fuliginosus, & venis quibusdam exalbidis maculosus, ipsa Fungi substantia, sub externa illa cute, omnino atra, ut etiam est pars infima, sic tamèn ut crassæ nigrae striæ obscure appareant.

Hanc speciem Schwarze hor greyllen Germani cognominare possunt, ut priorem Rote hor greyllen. C. Bauh. pin. est Fungus noxius 25. siue Fungus latus oris laceris.

Circiter diem D. Bartholomæo sacrum planis locis & apertis locis prouenit Fungorum hoc genus à tempore Germanis hor greyllen appellatum.

FVNGI VELVTI IN NODVM COLLECTI, variis coloris, perniciosi.

C A P. LVIII.

Sunt hi è perniciosorum Fungorum vigesimo tertio genere Clusii, coloris ex albo, rufo, & fusco variè commixti.

C. Bauh.



Synon.



C. Bauh. pin.
Fungi noxii 37.
sive Fungi orbicularis in palustribus, species 3. & 4.

Circiter Calendas Octobris, cum secundum vias, tum in lignis putridis & palustribus locis proveniunt.

FVNGI DVO : BVLBOSO PEDICVLO:
1. pallidus macularus. 2. tetti coloris.

CAP. LIX.

Locus & Tempus.

Decimum-quintum faciunt hi perniciosi Fungi genus, quod Clusius Vngaros Tinor gomba : Germanos vero Schmeer schwammen appellare refert: perinde ac si vnguinosum Fungum diceret, in caduis silvis crescit extremo Sextili, h. e. circa diem D. Bartholomæo sacrum. Eius autem varietatē dicuntur inveniri species: Clusius binas observabat.

Priorem, quæ hic pingitur, triuncialis amplitudinis cum suo pediculo, alio-



qui corpus ipsū Fungivnciale magnitudinem non superat, pediculus autē binas, supremā parte pollicaris crassitudinis, infernā fœcundialis, in Bulbi formam excrecens, coloris ex albo pallecentis: ipsum etiam Fungi corpus supernè pallidū est, sed maculis dilutè nigricantibus distinctū, atque oris in supinam partē

reflexis: infernè multis striis ex pallido fulcis, à pediculo in ambitum porrectis, distinctum. Hanc speciem feyer ti nor, i. e. albā, Vngari cognominant.

Alteri, cognomen dederunt à nigro colore, Vngari Fekete ti nor : Germani Schwarz schmeer schwammen. Informis hæc est species, & valdè tetti coloris, ut verius ligni, siue radicis cuiusdam, nodosum & nigrum fragmentum videatur, quàm Fungus, quod utraque manu vix comprehendi queat : crasso brevique pediculo nittitur.

Synonyma

C. Bauh. pin. Fungus noxius 22. siue Fungus pediculo in bulbi formam excrecens.

FVNGVS PHALLOIDES.

CAP. LX.

Phallum, ex Fungorum genere in Hollandiæ sabuletis passim crescentem; picturā ad vnum expressit, & delineavit Had. Iunius.

Donum, quod fecunda illa Naturæ vis atque maiestas, & sacra rerum parens Tellus (cuius utriusque benignitas nusquam clausa, tam sua sponte, quàm etiam coacta, sua dona liberalissime impertit omnibus, parca nemini, officiosa ubique, & obsequiosa etiam, nisi fortè hanc illi laudem venenorum non minùs restibilis seges deneger) paucis mortalium cognitum, à nemine Veterum Recentiorumve scriptorum ante me literis proditum; in sabuletis nostratibus nasci dederunt, in literarum monumenta referre, memoriarumque consecrate volui: siue ludentis naturæ rudimentum illud sit in exprimendo veretro, siue singulare sit eius beneficium ad vsum mortalitatis comparatum, hoc præsertim tempore, quo propter effrenatas libidines, luxumque, cui modum omnè ademit licentia, podagra & articulares morbi agminatim incubunt, ne diutius lateret incognita remedia præses virilitas, quæ permagna esse traditur in ferventi atque

Locus:

intolerabili artuum cruciatu.

Descriptio

Hunc igitur Naturæ factum alie nationes admirentur, spectent, fruantur quatenus licet: docti vero, quibus liberalius suppetit otium ad omnia faciem lectionem, & quibus felicior ingenii vena obigit, diligentius considerent atque expendant lecum virum rationem. Sed ad rem ipsam.

In medio acuratum caricum velut umbilico sub extrema atenæ superficie

massula invenitur alba, rotunda, pilam manuariam aut bulbum specie pariter & candore referens, cui nervus bitulcus, aut fibra gemina, radicis loco subest, quo succum (ut arbitror) rapit: mucco ea lento, viscido, coacti iusculi cremorisque in modum spisso abundat, graui usque aded, ut aquæ pondus superet, fusilisue plumbi fermè adæquet: eodem aded gelido, ut volæ manus apposita massa (quam Piniano vocabulo dixisse non absre licebit) penetrabilis frigoris sensum adferat. Ea ubi primam scrobe reuellitur pallidior est, mox paulatim purpurascit, intercurrentibus sparsim ceu venulis quibusdam sanguineis: à quo colore nonnihil euariat fibrarum magis lividus color, in concreti sanguinis nigrorem paulatim emoriens. At muccus reuulsa a terra volua citissime liquatur ac diffluit: quin & coles ipse non multo post flaccescit, idemque virosusque aded halitum efflat, ut vel totius cubiculi aerem sit saturaturus. Hæc volua mensis



bus autumnalibus citius tardiùsue pro diuersa anni facie ac temperie disrumpi vomica instar distindique solet: quo tempore rectus inde scapus colesue exilit, illæta volua exemptilis: actum quidem scroti faciem prope mentitur turgida voluæ moles. Neque verò silentio inuoluendum est, id quod miraculi vicem implere posse, ne dicam superare, crediderim, quod nimirum scrobe reuulsa massa, volua etianimum integra *καὶ ὅλκων* & priusquam colem effuderit, si tortè recondatur in penum, aut quemuis etiam domus angulum seponatur, post exactum diei vnus atque alterius curriculum in iustā suamque magnitudinem erectum scapum emittere, cuius rei documentum ab vno atque altero indubitæ fidei homine quum accepissem, volui & ego periculum facere, itaque abstrulis in penetrale musei mei adytum binis eiusmodi voluis, oculatus ipse testis eorum fidem approbaui. Materiam scapus fungosa constat, rarā, plumā leuiore, maculosis, cinerei propè coloris, foramine peruiro rimosus, eoque læui ac velut dedolato, interius latiore, sub exitum arctiore, teres, ad duorum palmorum mensuram accedens. *Sunt* qui etiam dodrantales inuenisse se prædicant. Huic insitit, non vti Fungo petasus, sed galea aut capitellum in figuram metæ propemodum fastigiatum, exemptile, cætera glandis virilis specie, nisi quod cancellata sit cute quale elephanti traditur esse corium, vel qualis echinus, aut bouis ventriculus, cancellis rhombiformibus præditus spectatur: eiusdem extimus vertex rugis adstrictior foramen habet quā grauis expirat halitus, propterea à muscis frequenter obfessus: id capitellum cauli est concolor, vidi etiam sæpenuero, atrum in caule prorsus nipeo, sed senio id acceptum referri debebat, exoleto namque pro candido anthracinus mutatur color: interdum etiam è leucophæo virorem induit capitellum illud, qui non multò post in fuluum abit. *Hactenus* germinis istius, ita ut volua, cole, & glandiformi capitulo constat, figuram vtrunque delineauit: *Quamobrem* autem Phallum nuncupauerim facilis explicatu ratio est, imò cuius obuia, qui vel à limine Græciam salutarit. Fecit hoc similitudo, quam habet cum coriaccio & ficulno veretro, quod in decantatis mysteriis vana gentilitas circūferre solebat, hoc Phallagogiā, illud Phallum & Ithyphallum indigante superstitione. Quid veratantem noua in re nouo vti vocabulo: quando & Fungorum diuersitas varia inuenerit nomina. *Porrò* debeatne in Fungorum classem adoptari iste Phallus, non ausim temerè velut pro comperto & explorato definire, nolens aliorum sententiæ doctiorum præiudicatum: certè materiæ raritas leuitasque: & (quæ prima Fungi origo est) terræ madentis accescens succus, vnde gignitur, fungini eum esse generis testantur: tamen striarum ductus, qui nulli huic sunt, reclamant, qui tamen in Fungis visuntur: nullum est huius etiam petasi pediculo coherentis vestigium, quippe vbi capitulum, quod petasi vicem obtinet, innoxie denique possit: natalis insuper locus repugnat, siquidem istud germen fabulæ tantum, neque ea omnia, nisi caricibus veteribus confita producant: ut Fungos formè vliginosa, rancida, situ squallida, & glandiferis radicibus vicina loca gignere scriptores ex confesso prodiderunt.

H. Lugd. p. 139. icones exhibet Had. Iunii, sc. Phallum Batanicum, eiusque separatas partes, Veratrum, Veratri præputium, & Voluam tanquam scroium, de quibus omnibus hæc

subdit: Phallus, in maritimis Hollandiæ, ac Zelandiæ arenosis gignitur, hominis pudendo suo præputio contacto ad eundem similes, ut inde nomen sit tributum. Sine integrum & partibus adhuc suis constantem: ac compactum, minimè diuisis, siue in partes, è quibus componitur, iam discillum inspiciamus, ad verendorum hominis figuram sic accedit, ut in eo generando lussisse natura videatur lasciuia, succo in arenis frigidis siccisque reperto, è quo hominis penem siugere mediata sit, afflatu etiam maris fortassis adiuta, cuius vim maximè genitalem esse periti rerum naturalium omnes testantur, & suis Poëtæ fabulis indicant, *τὴν δ' ἀδυσκίτην ἀφροδίτην* vestibulis celebrantes, nempe Venerem è maris fluctibus exorientem, ac emergentem. Posteriore parte velut inter duas prominulas nates, cauum patet, [maule enim Dalech. cum podice comparare, quàm cum muliebri vulua.] In id cauum, tanquam in scroti fundum, tenue filum subit, bifidum, quo tanquam radice, in arenoso solo deligitur. Quod terræ proximum est, Bulgæ figura, inferiora Phalli operit, extremaque ora lacinia- ta, in apices extantes diducta, vndique illum amplectitur, rugosi scroti quadam imagine: Bulgæ detracta subest aliud inuolucrum, tanquam elytrocidæ tunica in hominis testiculis, Superiore angustius, ac minus, Phallum circumdans orbe simplici linea circumeunte, non tamen continuato, sed interrupto rima, quæ veluti duorum testium interuallum ostendit. In tuberculum subrotundum id desinit, radici vicinum, cui radix inseritur. Inde penis in longum porrigitur, mentula specie, punctis quibusdam notatus, in summo, sub præputio, pertusus, rotundo foramine, quod in extremo hominis veretro fissuram imitatur, quæ vrina profluit. Munit summum illud fastigium, & vestit præputium [sic enim aptissime vocari potest] vndique circumuolutum, cutis plicatilis modo. Extrema parte præputii carnosiusculi rotundus velut apex eminet, fistulosus, pelle circumcrispata, humani præputii corrugato fini similis.

Phallus hic Hollandicus pro Satyrio primo Dioscoridis, Matthiolo tribus foliis Rumicis affixis, fuit venditus, prout Ludou. Fumanellus, qui hunc & illum qui ad Matthiolum est missus, spectauit, aperit testatur: facile autem fuit decipi, propter summam vtriusque, antequam è terra erumpat, similitudinem. M. sit autem Matthiolo Satyriionis Dioscoridis primam illam speciem, quibusdam, ut ait, Trifolium dictam, Calceolarium.

Phallus Had. Iunii paullo aliter pingitur apud Clusium sub titulo Gladii seu capitelli Phalli, ex hilt. belgica Lobeli cuius hic iconem subiicimus. Inter naturæ miracula, inquit, celebratur, hic Fungus apud Batavos anno 1559. Antuerpiam ad me missus. Similem deinde Septennio post arenoso loco ad Ligeris flumini ripam non procul Blæsis repericham Septembri. Copiose crescit in Hollandia è radicibus Sparti, diuersis fabulosis aggeribus, Sparro illo rudi confitis, præsertim veronis qui Harlemo & Alcmariæ sunt vicini. Sunt (addit) qui asserant frigidissimum illum voluæ coagulatum & lentum muccum valde vtile esse ad podagram ex humore calido progignam profligandam. Muscæ valde appetunt hunc Phallum. perinde atque alios foetidos Fungos.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 38. siue Fungus foetidus penis imaginem referens: Phallus Had. Iunio: Phallus Paramicus H. Lugd. Phallus Hollandicus,

Materia.

Longitudo.

Græce spiritus.

Phallus
Quid dicitur
dubietur

an sit Fungus.


Hominis
pudendo
fimbriaSatyrium
Diosc.
Matth.Trifolium
quoddamPhallus
Had. Iunio
Lab.

Locum

Vitis ad
podagram
calidam.

Synon.

C. Bauh.



23. generis, à Phallo Had. Iunii separat, quinimò huic duntaxat, accedere scribit. Quare & nos de ea seorsim agimus.

Mirabilem hunc Fungum Doctiss. Vir. D. Moehius Medicus & Professor Academiae Friburgensis, Brisgoiae propè sacellum in sylva, D. Barbart dicatum obseruauit, eundemque mihi transmisit.

FVNGI PHALLOIDIS GENVS.

CAP. LXI.

Descript.



FVngorum noxi-
orum 23.
generis 5. Clusio
valde accedere
videtur ad Phal-
lum ad Had. Iu-
nio olim in sa-
bulosis aggeribus
Hollandiae, O-
ceanò obiectis,
obseruatū & de-
cantatum.

Informi autem
penè figura e-
mergit, tuberis
instar: deinde ru-
pta illa externā
membranā, siue
voluā, stilus exi-
lit pollicari cras-
situdine, digitali
autē longitudine,
penis aut veretri

canini instar, & tanquam vnciali glande summo fastigio praeclitus, initio quidem ex atro virescen-
te, deinde nigrā, & cellulis quodammodo praecl-
ta, quales ferè in Fungi rugosi vel cauernosi spe-
ciebus conspiciuntur: ea autem suo tempore
expanditur, & striis infernè distincta est. Volua
ipsa cineracei quodammodo est coloris, inter-
dum etiam subrufi: Ipse stilus siue coles, initio
albus, deinde ~~mutatur~~ & varius, paruisque notis
subfuscis maculosus: stertidus est hic Fungus, &
iam periturus quodammodo liquefit, atque in
stramentum dissoluitur, nigro colore tellurem
insiciens. Dicitur etiam muscas eo degustato
interire.

Per Calendas Octobris, cum secundum vias

in lignis putridis, & palustribus locis prouenit. Locus

FVNGI DVO, A SVE APPELLATI,
albi, sed maculati, siluestres perniciosi.

CAP. LXII.

IN caudis siluis extremo Augusto crescit fun-
gorum noxiarum Clusii genus decimum quar-
tum, cuius clusius Vngaricum nomen intelli-
gere non potuit: sed Germani Saw tasch ap-
pellant, cuius nominis causa quoque laet, nisi
quod à sue appellatio defurpta videtur. Eius
autem binæ obseruantur species, magnitudine,
& supinae partis colore inter se differentes.

Locus &
Tempus

Prima inaequalem habet magnitudinem: nam
recenter natae corpus, vnciā maius non est, fa-
stigiatum, coloris albi fuligine velut infecti, vñ-
cialis longitudinis pediculo, minimum autem di-
gitum crasso, subnixum, interdum geminum ex
eodem pede nascens: Adulta triunciale diamet-
rum habet, in orbem ferè circumscripta figurā,
supernè alba quidem, sed fusco colore infecta,
flauo fastigio: infernè verò pallida, & rufis
striis, à pediculo excurrentibus, exarata: pedicu-
lus digitalis longitudinis & crassitudinis.

Alterius forma, orbiculata, & velut circino
circumducta, est rotunditatis, cuius diameter
trientem latus est, pediculo breui, pollicemque
crasso, praedita, supernā parte candida cui macu-
lae paruae fuscae, & flauescens nonnihil color
inspersus, & oris aliquantulum in infernam par-
tem conuersa: infernā ipsa parte pallidā, fuligi-
nosisque striis insignitā.

Synon.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 21. siue Fungus la-
tus, orbicularis, oris intus conuersis.

FVNGI STERQVILINI ALBI PERNI-
ciosi. CAP. LXIII.

CLUSIO Fungorum noxiarum est hoc tertium
genus, quod Vngari Ganeion: Germani
Müssschwammen appellant, quoniam in sterqui-
liniis primo Vere nascitur.

Locus &
Tempus

Vulgaris autem admodum est hic Fungus, pro-
pterea nemini non notus, formae orbicularis in
plano, veluti circino ductae, exili & tenui fulcis
pediculo, tenui non crasso corpore, candidus om-
nino, & veluti farina conspersus, cum in-
fernè tum supernè, pars tamen auersa, fulcis
striis, & à pediculo in oras ductis, distincta est.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 11. siue Fungus fi-
metarius in plano orbicularis, candidus: an Fun-
gus praeolis similis Casalpino?

Descript.

FVNGI TRES BVFFONII, PERNICIOSI.
CAP. LXIV.

MAIO aut sub Iunii initium prorumpit septi-
mum fungorum perniciosorum genus
Clusianū, quod Vngaris Bagoli gomba, Germ.
Grotten schwammen dicitur, vtriusque linguae
nomine eandem rem significantibus, nimi-
rum rubet vulgò buffonis dicitur fungum. Cu-
ius tres obseruabat author species:

Tempus

Vnam valde gracili, & plus quam duas vncias
longo pediculo fultam, pilei vel galeri penè figu-
rā in metam sublatā, vnciali ferè latitudine, o-
rarum verò circiter trientali ambitu, coloris al-
bi fuligine quodammodo infecti, summo fasti-
gio flauescen- interior & cauta pars fusca est
prorsus, & nigris striis, à pediculo in oras du-
ctis, exarata.

Alteram magis orbiculato: & tumente corpo-
re, crassiore pediculo subnixam: cuius super-
na & tumescens pars duas interdum vncias dup-

C. Bauh.

taxat est ampla, nonnunquam etiam tres, modò
fulci omnino coloris, ex albo pallescentis, mo-
dò flauo fulgine infecti, singuli autem maculis,
albis, & nigris summâ parte notati, vt rubet
color, præsertim fuscus, valde referre videatur:
pars inferna alba est, leuibus striis subfulcis, à
pediculo in oras excurrentibus distincta.

Teriam reliquis maiorem, & orbiculatæ pror-
sus in plano figuræ, cuius diameter trium vnci-
arum est, supernè albam, cui rubescens aliquan-
tulum color est admixtus, & raræ pallescentes
maculæ inspersæ: inferna pars quodammodò
pallescit, & frequentibus fuliginosis striis, à pe-
diculo minimum digitum crasso, ad extremas vl-
que oras secta.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 14. siue Fungus
buffonius orbiculatus.

FVNGI RANARVM, ALBI, PERNICIOSI.

CAP. LXV.

Est hoc Fungorum noxiarum 13. genus Clusii,
secundum vias & semitas in cædis siluis
proueniens extremo Augusto: quod Vngari
Wrselē teremng omiba, h. e. ad semitas nascentem
Fungum: Germani autem froschen stiel/
quasi ranarum sedem appellant, quoniam ranæ
his libenter insidere conspiciuntur.

In hoc genere, inquit Clusius, obseruare licet
discrimen quoddam, sed illud ex ætate duntaxat
proueniens: nam recens nati corpus, ad bina-
rum vnciarum latitudinem non pertingit, & su-
pernâ parte candidans, fuligine quadam infe-
ctum est: infernâ etiam eiusdem coloris, sed ra-
ris striis, vixque apparentibus præditum: vbi au-
tem adoleuit, maiorem habet latitudinem, qua-
tuor videlicet vnciarum, & in orbem ferè circi-
natum est, immaculati supernè candoris, nisi or-
bis centrum palleret: inferna pars etiam candi-
da est, multis purpurascens striis exarata:
pediculus gracilis & longus.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 20. siue Fungus
latus orbicularis candidus.

FVNGI QVODAMMODO ORBICVLA- ti atro-rufescentes perniciosi.

CAP. LXVI.

Circa Solstitium æstiuum inuenitur hoc ge-
nus perniciosorum Fungorum quod no-
num est Clusii, in siluis nascens: quod Vngari
Borssos gomba / Germani hohen schwammen
nominant, quia crasso tumente sit corpore:
nam satis breui est pediculo, vnciam non mul-
tùm superante, digitum aut pollicem crasso.

Eius licet binæ videantur species, ætate ta-
men eas duntaxat differre arbitratur idem Clu-
sius. Constat verò, vt dictum, crasso & protu-
berante corpore, sphericæ quodammodò & or-
bicularis figuræ, binas vncias lato in minoribus:
in adultioribus autem, tres atque etiam qua-
tuor, vel etiam ampliore, colore supernâ
parte ex atro rufescente: infernâ, exalbi-
do, & multis striis rufescentibus, à pediculo ad
oras vsque ductis, insignito.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 17. siue Fungus
orbicularis ex atro rufescens.

FVNGI DVO PERNICIOSI, PRIOR RV- bri perelegantis coloris, rufus alter.

CAP. LXVII.

Circa Calendas Octobris, cum secundum
vias, tam in lignis putridis & palustribus lo-

cis prouenit hoc Fungi genus, quod est primus
& secundus Fungus, Fungorum noxiarum vi-
gesimi tertii generis Clusiani.

Primus autem vncialis magnitudinis habet
orbem, supernè tumidum & rubri perelegantis
coloris: infernè albicantem, fuscis tamen striis
exaratum, vnciali pediculo, non valde tamen
gracili, fultum. *Alter* verò orbiculatæ etiam est
formæ, paulò tamen amplior superiore, longio-
reque pediculo subnixus, prolem Fungi ab exor-
tu plerumque proferente: supernè rufi, & ad la-
teritium tendentis coloris: infernè dilutior, &
frequentibus striis distinctus.

C. Bauh. pin. Fungi noxii 37. siue Fungi orbi-
cularis in palustribus species 1. & 2. Synon.

FVNGI SVpra LIGNA PROVENIENTES.

CAP. LXVIII.

Fungos Imperatus communes appellat, su-
pra ligna crescunt, capitello conuexo, conca-
uo, profundis striis ac sulcis foliaceis radiato à
centro ad circumferentiam: facillimè vetminan-
tur: striæ foliæ nigræ: capitella verò spi-
thamæam aliquando amplitudinem acquirunt. Delciip

FVNGI PARVI, VARII.

CAP. LXIX.



Fungos par-
uos omnino
cæruleos inue-
nimus in monte
Tarresce prope
Malsmunster.

Fungus alius
paruus, pileoli
superiore parte
alba, altera au-
tem ex lutea ru-
bente, cauliculis
duorum digito-
rum supra ligni
putridum, men-
se Septembri circa balneum mirabile reperitur.

Occurrunt & alii ibidem in præto mense Sep-
tembri, Fungi minimi, lutei, externè viscid.

Sunt quartò Fungi pediculo satis breui &
crasso donati, ex luteo pallescentes, capitello si-
ue pileo turbinato.


Inuenimus tandem Fungos multos simul,
longis & elatis pediculis non tamen crassis ni-
xos, luteolos, à radicibus arborum putamus,
mense etiam Septembri.



Fungi parui vndi-
que luteoli, pediculo
tenui admodum, ad
tres digitos longo, pi-
leolo turbinato, mo-
dio Octobri prope
stagnum balnei admi-
rabilis sub arboribus
inueniuntur. Hi Mör-
belgardi etiam, præ-
sertim supra montem
vicinum, vulgò la
Crosse, siniente An-
tumno primulam pro-
siliunt. In principio

autem turbinati sunt & vix Auellanz minoris
magnitudinem adæquant, mox expansi assis re-
git amplitudinem acquirunt, subius sulcatis striis
in orbem radiati, pediculo vnciali. Toti ad tactū
viscidi sunt.

Fun-



Fungus præterea parvus albus cum luteola parte, in summitate capituli, visco nitente resplendens, subtus cinereis plicis, altitudine quâ pingitur à nobis observatus est in Ducatu Wirtemb. non longe à fonte admirabili, in agris.

exsiccatum, isthinc olim ad se missum, exotici cuiusdam seminis nomine, explorandi gratiâ, an dignoscere posset: ut reperiuntur quædam ingenia, quæ ex aliorum ignorantia laudem capere & venari student.

FVNGI INFUNDIBVLVM REFERENTES,
flavescentes, perniciosi.
CAP. LXXII.

Hoc quod Clusio noxiorum Fungorum decimum genus est: Bis in anno reperitur: circa messim videlicet, & vindemiam, in silvis

Locus & Tempus

proueniens: Ungari Bessie gomba, Germani Geyß Schwammen appellant. h. e. caprinum Fungum.

Valde autem exilis est hic Fungus: nam primum emergens, vix vncialis est magnitudinis, interdum singularis, nonnunquam geminus, i. e. bini simul nascentes, ipso fungi corpore minimi digiti vnguam vix æquante, rufescentis coloris, cum adoleuit corpus in vncialem magnitudinem excreuit, inferna parte valde à pediculo striata sepe inuertere, ad id ut superna pars veluti camerata & caua reddatur, & cum suo pediculo, paruum infundibulum mentiri videatur.



color flavescit tam externe quàm interne & superna pars iam in umbilici speciem contracta, rufis maculis est distincta.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 18. siue Fungus minimus flavescentis infundibuli formâ.

FVNGI ALBI PILEOLO INVERSO.
CAP. LXXIII.

Fungus hic albus, parvus admodum, vix ad vnciam digiti se attollens, ac etiam multo minor, instar calicis crescit, plicaturis & foliis se externe demonstrantibus, non sub pileolo, ut in reliquis. Pileolus enim inuersus facit veluti seu-

Gggg 2

FVNGI PARVI LVTEI, ET CLYPEIFORMES albi, lethales.
CAP. LXX.

Synon.



Quos Lobel. in Ic. Plant. tom. 2. p. 272. Fungos paruos lethales galeaticulatos inscribit, de iis in hist. belg. p. 306. ut & apud Clusium ait: Vulgares exiles perniciosi Fungi passim nascuntur, in agris, pratis, hortis, & veteribus ædificiis. Horum autem, Quidam sunt exiles, in rotunditate oblongi-

gusculi, & præalti, galericuli instar concaui, colore flauo præditi. Alii ampliores, albi aut cineraceis fuscisque interdum maculis notati, infernè aut in cavitare nigri. Sunt & plani ut acetabula, nonnulli etiam parmis similes.

Synon.

C. Bauh. pin. Fungus noxius 24. siue fungus clypeiformis minor: Fungorum alterius generis alter. Dod. Fungus clypeiformis lethalis. Lob. belg. Fungus perniciosus vulgaris Clus.

FVNGVS MINIMVS, SINE PETIOLO, perniciosus.
CAP. LXXI.

Descript.

Hunc Clusius ἀνὰ ρυακὶν vocat, & omnium minimum esse existimat, vix semunciam altus est, & Autumno præterquam nullo petiolo fultus ligneis tabellis pulvinos & areolas in hortis ab inuicem segregantibus adnascitur, cineracei, vel exalbidi coloris, formâ pænè grossum immaturam referens, minimi digiti extemum articulum magnitudine & crassitudine vix æquans, singularis præterquam, vel (quando plurimi) bini, terni, aut quaterni simul cohærentes, qui maturi supernâ parte dehiscences, pleni apparent lento quodam succo, & seminibus, magnitudine quidem seminis Cyclamini, sed exiles Fungulos formâ figuræ exprimentes, cineracei, ut prærens, coloris.

C. Bauh. in pin. Fungus noxius 39. siue Fungus minimus ligneis tabellis areolarum hortorum adnascens: Fungus minimus ἀνὰ ρυακὶν Clusii.

Nasci hunc Fungum etiam in Italia, Clusio nullum est dubium: nam meminit eius semen Tom. III.



tellam: sunt etiam maiores altitudinis trium digitorū, & latitudine duos excedentes. Obseruauimus mense Septembri in prato loco cliuoso prope wälde, & in monte Teck.

citiùs curentur, efficit. Idem siccatus leuissimus & subtilissimus in podicem insertus admodum fluorem hæmorrhoidalem sistit, uti Platerus parte 3. suæ præceos docet.

FVNGVS MAXIMVS ROTVNDVS
puluerulentus, dictus Germanis Psofist.

CAP. LXXV.

Psofist nomine Germ. nūcupatus Fungus glomeratus tantā assequitur interdū magnitudinem, ut caput humanum facile æquet, aut etiam excedat, cute mēbranea satis firmā sive in principio ex albo cinerea, mox cum tempore liuida redditur] vndique cinctus, substantiā partim coherente sed rara, eorum instar, quos excipientis silice chalybeque excussis scintillis præparatos vendunt, colore etiam persimili: siccissimi sunt, ut caput humanum singuli æquantes vnciale pondus non excedant.

Descriptio

Est autem hic Clusiani noxiarum Fungorum altera & tertia species generis vigesimi sexti.

Lonicer. huius meminit sub titulo ouarorum Fungorum, non tamen distinguere videretur à crepitu lupi, licet ad magnitudinem capitis excrecere dicat. Hunc sequitur in hist. germ. Matthiolum.

Lonic. & Matth. notatur.

C. Bauh. pin. Fungi noxii 42. siue Fungi rotundi orbicularis species 2. & 3. an Pezicæ genus in siluestribus aliquando humani capitis magnitudine, quod sine periculo esitatur, Cæsalp.

Synonyma C. Bauh.

Fungum Germanis Psofist dictum marinis Spongiis annumerat Encel. de re metall. libr. 2. cap. 45.

Perelegantem huius generis Fungum vidimus Montbelgardi iuxta patibulum in densissimo dumeto: sunt qui pro certo asserant vetustiores, & iam iustam marutitatem transcendentes, præstare ad cōpescendas sanguinis eruptiones etiam periculosissimas, quo & ipsi multorum cum præsentis salutis usi sumus, in eo ipso calu.

Locus

Virex

FVNGVS OVATVS.

CAP. LXXVI.

Non aliàs mihi visus quā ex Alsatiæ Schvveghausen arce Dom. Waldnerorum à Freudenstein cuncti Buttviller, mense Aprili in pratis cingulus, cui ferè magnitudine, & figura ex rotundo oblonga, albus, quasi hirsutus, pediculo fultus longiusculo.

Locus & Tempus.

FVNGVS ROTVNDVS ALBVS.

CAP. LXXVII.

Fungus est [ut describitur à Cordo in sylua Obl.] grandis pira instar, rotundus, foris pallenti cortice, intus candida, succosa, dolique carne constans, non in puluerem transiens, sed hyemis iniuriâ, Peponum exemplo, putrescens nascitur Vere in eadem silua ex metis arenis.

Locus & Tempus

FVNGVS OLLVLARIS VEL BOTRYOIDES fimarius.

CAP. LXXVIII.

Fungus *Crupoides* vel *Buvasoides* Montbelgardi 10. Decembris anno 1606. in equino fimeto repertus fuit, vuarum autem albarum, amplarum, crassarum & longarum, veteribus Græcis *Cupes* dictarum, similitudinem quodammodo refert.

Cum verò Basileæ anno 1608. Octobri mense cum doctis Medicinæ studiosis deambulatum nullum

FVNGVS PVLVERVLENTVS

dictus Crepitus lupi.

CAP. LXXIV.

Descriptio



Nullo ferè conspicuo pediculo nititur, glomerata rotunditatis, luglandis magnitudine, & minoris & maioris, primò albà cute, & medullâ itidem albâ, cōspicua, postea cute exalbida uel liuidâ, medullâ, quum corrumpitur, in tenuissimâ, siccissimâque puluerem fusci coloris, abeunte: calca-

tus crepitum edit, & fumum puluerulentum emittit. Eius autem puluis grauem & fætidum spirat odorem: (Imper.) nec villo pacto est esculentus [Ruell.]

Clusio est Fungorum noxiarum genus vicissimum-sexum; cuius tres obseruabat differentias, magnitudine & nōnihil etiā formā inter se discrepantes, in omnibus prouinciis frequenter in siccioribus pratis nasci tradens.

Locus.
Synon.
C. Bauh.

C. B. pin. Fungi noxii 42. siue Fungi rotundi orbicularis species 1. Fungus ouatus Crepitus lupi Hermol. Trago & Lonicero, qui videtur aliud Fungi genus cum hoc confundere. Fungus orbicularis, Dod. Fungus glomerata rotunditatis Lobel. Lupi crepitus Matth. Cast. & Columnæ. Pezicæ Plinii in pratis, quem esculentum dicit, Cæsalp. Imperato dicitur vesicarius Fungus, aliis Ouum Lupinum.

Germani wolffschütz h.e. Crepitum lupi, weiber fist/i.e. muliebrem crepitum, & Bubenfist: Galli *Vesse de loup*: Ital. *Vesite de lupo*: Ungari *Poffeteg*, appellant. Helfrico in nomencl. dicitur græcè *κυστις τῷ λύκῳ* h.e. Crepitus lupi, quod nomen etiam apud Herbariorum vulgus obtinuit. Nos Mense Septembri & Octobri obseruauimus in siluis accedentem ad magnitudinem pile palmarie, nondum in puluerem conuersum, album externè & internè.

Vires & Vires

Inueteratis & fluentibus vlceribus inspergitur: ea namque, teste Trago, desiccatur, & quod

suissem, inueni ad Rheni ripam iuxta fimerum, Fungos ollares plures simul iunctos, & quosdam contractos, quorum vnum detegi, qui erat substantia lubrica, molli, globosus, concavus, magnitudine mediocris pomei in superiore eius parte, circulari foramine apertus.

REMEDIA ADVERSUS PERNICIOSOS Fungos C A P. LXXIX.

Quia haec de perniciosis Fungis sermo- nem habuimus, non abs re nos facturos existinauimus, si remedia aduersus eos nonnulla hic subiiceremus.

Auxilio est omnibus Fungis, inquit Dioscorides l. 4. c. 78. nitri, aut lixiui, cum muria acida potus: aut thymbræ, aut origani decoctum: aut gallinaceum simum cum aceto potum aut melle copiose delinctum. Probè verò alunt, & agrè dissoluntur, & plerumque vna cum excrementis integri redduntur. Fungi, inquit idem l. 6. c. 23. partim genere, partim copia laedunt. Omnes autè inducunt suffocationes, strangulationibus per laqueos similes. His statim communibus auxiliis opitulari oportet, per oleum ad vomitum cogendum. Mirificè verò opem sentiunt à lixiui cineris samentotum Vitis, aut lignorum Pirastru potum, cum posca & sale, aut nitro. Sed & Pirastru fructus aut folia cum Fungis decocta, stranguandi vim illam auferunt, escitæque eadem auxiliantur. Iuuat & sterco gallinaceum cum posca bibitum, itemque Aristolochiæ aut Absinthii drachma vna cum vino: insuperque etiam melle, seu in cibo sumptum, seu ex aqua potum. Sic & Apiastrum cum nitro, Panacis radix & semen in vino; fax quoque vini cremata cum aqua, & atramentum lutorium ex aceto, denique Radicula, Sinapi aut Nasturtium esu profunt.

Fungi à venenatis bestiis arrosi non solum suffocant, inquit Paulus & Actius, sed etiam vlcérant intestina. Quare dandum est Absinthium largum, & sicuum & Origani decoctum, & aqua multa. Conducent etiam vomitus, & solium calidum, & cruda hordeacea fatina præcordiis imposita. Nouit quendam Galenus, cui post Bole- torum non satis elixorum [qui innocentissimi esse putantur] vsum largiorem os ventriculi pressum, ac grauium, coarctatūque fuit, difficilemque habuit respirationem, & in animi deliquium incidit, sudorensque frigidum sudauit, ac demum seruari ægè, sumptis iis quæ humores crassos incidunt, potuit. Cuius generis est oxymel ipsum per se, & cum Hysso & Origano ipsi mediocriter incoctis. Is enim cum hæc sumpsit, cum nitri spumam ipsis inspersam: post quæ Fungos quos comederat, vomuit, qui iam quodammodo in succum pituitosum, frigidumque admodum ac crassum erant mutati.

Contra venena Fungorum laudantur passim apud Plinium, Cnicus siue Arctæylis, & Piorum ligni cinis, piraque ipsa, Raphanus ac Sinapi. Porrum sectitium comestum, semen & succus Brassicæ bibitus. Item Brassicæ siluestris, Vriticæ ac Myrti semen in vino potum. Ruta siue in potu, siue in cibo. Liliæ radices & Folia Myrti ex vino trita & pota. Absinthium ex aceto. Mel, Vinum merum, & vini fax pota, sed magis cruda. Cimolia creta ex posca pota. Gallinarum simum, duntaxat candidum, in Hysso decoctum, aut Mulso. Muli denique piscis recentis & capite cinis.

Confert quoque Fungis & Tubcribus pernici-
Tomp. III.

ctosis, & medicamen de Asia, & Diatriopipe- reon, & sumere in potu piper cum vino veteri.

Quod si quis Fungos vel malè coctos, aut alioquin noxios deuorauit, & inde stranguletur, aut torminibus molesteretur, eum vel Agarici per se, aut pilularum de Agarico drachmam è vino bibere iubet Tragus, vt sanetur.

Tradunt alii præter haec dicta, eum qui strangulatus, aut inflationes ex immodico Fungorum esu profectas senserit, Leuistici aut Angelicæ radicem in puluerem redactam, è vino sumere, aut Raphanum escitare, aut eius succum, aut Absinthiches vinum potare, debere.

Prodest, inquit Matthiolus, mirum in modum Theriacæ, & Mithridatis antidotus, ex acerrimo aceto pota, vt ex oxymelite, aut ex aqua vitæ vocata: quamobrem quinta essentia nostra theriacalis, in Fungorum malis mirificam fert opem. Prætulit ad hæc Auicenna calida quæcunque atomata: cuiusmodi sunt Diapipereos, Diaciminum, Diagalangi, Diamoschum. Conciliator potandum exhibet magno iuuamento vinum optimum, in quo confertuerit piper, offertque subinde Allium crudum deuorandum. Id quod vniuersa ferè rusticorum turba etiam facit, quæ [vt Gale- nus ait] Allio Theriacæ vice plerumque vitut.

Omnium tamen haec enumeratorum reme- diorum aduersus Fungorum malignitatem atque perniciem primum auxiliantur vomitiones quocunque modo omni celeritate excitatæ.

DE TUBERIBVS.

C A P. LXXIX.

Nihil aliud sunt Tubera, quàm sine caule, sine Descripti: solis radices, magnitudine variæ, pugillati



Interdum, aliàs Juglandis, Castaneæ, aut Auellaneæ, rubet, culis extantibus inæquales, externâ superfi- cie rugosa & nigra, substantia albâ, consistentiâ carnis castaneæ, gustu fatuo, odore nonnihil graui.

Dioscoridi Hydrom. Tubera [Hydrom. sic vocat & Galenus, Galenus] radix est solum rotunda, sine folio, sine caule, flaua:

Theoph. i. hist. 9. Tubera radice penitus carent.

Tuberum descriptio euidencior est apud Plinium lib. 19. cap. 2. Et quoniam, inquit, à miraculis rerum cepimus, sequemur eorum ordinem: In quibus vel maximum est, aliquid nasci aut viuere, sine vlla radice. Tubera vocantur hæc, vndique terrâ circumdata, nullisque fibris nixa, aut saltem capillamentis, nec vtrique extubescante loco, in quo gignuntur, aut rima vrgente (agente; Corn.) neque ipsa terræ coherent. Cortice etiam includuntur, vt planè nec terram esse possumus dicere, neque aliud quàm terræ callum. Excedunt sæpè magnitudinem mali Coronei, etiam librari pondere. Duo eorum genera, Ggggg 3

Diosc.

Galen.

Remedia
Pliniana
contra Fungos.

Arenosa, dentibus inimica, & *Altera* lyncera. Distinguuntur & colore rufo nigroque, & intus candido. Laudatissima quæ in Aphrica crescunt. An ne vitium id terræ? neque enim aliud intelligi potest. Malum ne id ea prothius globe- tur magnitudine, quâ futurum est? & viuat ne, aut non, haud facili arbitror intelligi posse. Putrescendi enim ratio communis est iis cum ligno. Lartio Licinio prætoris viro iura red- denti in Hispaniæ Carthagine paucis his annis scimus accidisse, mordenti tuber, vt deprehensus intus denarius primo dentes inflecteret. Quo manifestum erit terræ naturam in se globari, quod certum est ex iis, quæ nascuntur, & feri non possunt.

Tubera illa solum videtur cognouisse Diosco- rides, quæ stauescens radices sunt: sed nigra tubera, quorum maximus prouentus locis A- puliæ finitimis, quæque in ditiorum cœnas au- dissimè experuntur, non nouit, vt Marantha meth. lib. 1. cap. 10. concludit.

Imperato Tartusi [Tubera] è genere vegetabi- lium sunt, figurâ inæqualiter globosa sub terræ cortice. Substantia eorum callosa est, tenera, nu- tritioni apta. Crescunt locis arenosis, & intra stir- pes. Nostriatâ vt plurimum ad melonum crassi- tiem accedunt, cortice tectâ nigro, scabro, atque rimoso: substantiâ internâ colore lacteo, sapore communiter grato. Reperiuntur etiam quæ a- renam continent, aut lapillos, aut aliam mate- riam. Ratio cur hoc eueniat est, quod [de hoc supra Plinius] principium generationis eorum, est humor qui eiusmodi res obducendo consisten- tiam acquirit, atque ita crescit. Est & aliud tube- rum genus, alibi nascentium, quorum superfi- cies læuis, pallida, magnitudo minor, gustus gra- tus. Dignoscuntur Tuberum loca natalia ex ri- mis, quæ in terræ superficie spectantur.

Matthioli duo Tuberum in Romano agro haberi generâ prodit, quorum alteri candida, pulla verò alteri pulpa subest: rimosus vtri- que cortex ac niger. Addit & tertium genus in Ananiensi & Tridentino tractu proueniens, læui cortice, colore subrufo, cæteris longè minùs insipidum & gustu iniucundo: Tubera autem qualia pingit Matthioli, talia primo loco in ta- bella exhibemus. Lobelii in Ic. Plant. tom. 1. p. 276. Tuberum effigies à Matthioli figura diuersa est. Eius autem Tuberum vnum secundo loco de- pingimus, simile Tuberibus terræ Tab.

Cæterum, ostendit Athenæus lib. 1. cap. 22. Tu- bera dici Theophrasto Geranium (Quærit Gesn. lib. 3. de auib. in Græc. an Tuberi appellatio Cra- nii melius conueniat propter rotunditatem. Ait autem apud Theophrastum græcè legi *γεράνιον*, & Athenæum pro ea voce posuisse *γεράνιον*. Hyd- non porro esse quod aliqui Aschion vocant, & Athenæus *γεράνιον*;) & vnum genus vocari Mi- son, aliud Istum. *Tubera*, inquit, sua sponte ex terra nascuntur, locis præcipuè arenosis. Theo- phrastus Geranium nominat. Tuber apud Cy- renem nascens, quod Mison appellant, videtur valde suaue; & carnis odorem habere: quod in Thracia nascitur, Istum vocatur. De his etiam proprium quiddam narratur: dicunt enim, cum aquæ autumnales & magna tonitrua fiunt, quod magna nascuntur, atque cum maximè maxima. Biennium non absoluunt, quamuis annum vi- uant. Vlus eorum & vigor est, Vere præsertim. Sunt qui etiam seminis principium hæc habere arbitrentur, quando in Mytilenæorum littore

non prius nasci competum est, quàm pluvialis aqua semen ex Tiariis detulerit, is enim locus est in quo plura nascuntur in littoribus præcipuè, & vbi regio sit arenosa.

Porro Tubera Latinis [inter alios Hermol. Syon. Ruell. Marcello, Rythio, Lonic. Anguill. Lac. Corn. Val. Cordo. Matth. & Amato in Diosc. item Dod. Cæsalp. Lob. H. Lugd. p. 1589. & Cas- tori. Tuber. 1. C. Bauh. pin. Tubera terræ Tab. & Ger.] dicta, græcè vocantur *ἰδρα* ab imbris, & *ἰδρα* à rumore, ab *ἰδρα*, tumeo. Arab. *Ramech* *Alchamech*, *Tamer* & *Kema*. Germ. *Erde Morchel*. & quibusdam *hirschbrünst*: alii tamen Ceruibo- letum sic vocant, de quo postea. Dicuntur & alicubi *Grublein*. Gall. *Truffe*. Ital. *Tartusi*, *Tar- rofle* & *Tartusula*. Hisp. *Turmas de ricata*.

Cæterum ab iis Tuberibus alii sunt, qui Tu- beres arborum fructus dicuntur, & à Plinio lib. 15. cap. 14. describuntur sub Tuberis serici appellatione, de quo lib. 1. cap. 1. de malis fuit tracta- tum. Tuberum verò appellatione donantur & sequentes plantæ, de quibus in variis huius hi- storix Libris egimus: scilicet: Nuciperica. Nux- hendan. Fungi supra lapides. Tuber Peruvia- nus. Manobi, tortè Tragi genus. Pappas. Okre- penaux. Fungus. Fungi cauernoli siue Meru- lii. Arachidna. Vitis nigra Matth. Tuber & Sigillum Mariæ. Iuiubæ. Guaiacana. Azadara- cheni. Cyclaminus. Cerui boletus.

Vt autem ad Tuberum historiam absoluen- dam redeamus: Tubera ea quæ peculiari- ter à Plinio traduntur, trutinâ opus habere vi- dentur. Siccis, inquit, hæc ferè & sabulosis locis fruterosisque nascuntur. Quum fuerint imbres autumnales, ac tonitrua crebra, tunc nasci, & maximè è tonitribus: nec ultra annum durare feruntur. Tenerrima autem verna esse. Quibus- dam locis acceptantur riguis & feruntur, sicut Mytilenis. Negant nasci, nisi exundatione flu- minum, inuecto semine ab Tiariis. Est autem is locus in quo plurima nascuntur. Gignuntur etiam in Acarnidâ, subdit Athenæus, circa Lam- psacum: in Alopecomæso, & in Eleorum regio- ne. Ludouicus Rom. patr. nauig. lib. 1. cap. 7. scribit Damasci Tuberum ingentem esse vberta- tem: nam nonnunquam viginti quinque aut tri- ginta Camelos Tuberibus onustos illic conspi- ci, & tamen intra triduum vendi: aduehi ex Ar- menia montibus, ex Asiaque minore. Tandem Author est Matthioli, Tubera numerosa in He- truria à rusticis effodi, quod à magnatibus ma- ximè expetantur in cœnis. Bonitatis verò & vbertatis laudem sibi meritò vendicant quæ in syluula quadam Hornburgensi Vuirtember- gensis domini in Alsatia proueniunt.

Tubera & cruda & cocta in cibum venire, co- statur Dioscorid. & Galenus 8. simpl. Tubera om- nibus nota ait, & in cōpage ipsorum terream na- turam præualere, exigua quadam partim te- nuitate ammixta. At libro 2. de alim. inter radices aut bulbos, quibus nulla manifesta qualitas ad- scribitur, annumerat. Preinde vitur ipsis ad sus- cipienda condimenta, quemadmodum etiam a- liis, quæ qualitatis exortia, & innoxia ac aquosa in gustu habentur. Est autem omnibus his com- mune, vt neque alimentum quod inde in cor- pus distribuitur, eximiam aliquam vim habeat, sed subfrigidum sit, aut aliquando crassius. Mar- tialis Poëta secundum à Boletis locum ipsis tri- bujt,

Rumpimus atricem tenera de vertice terram
Tubera

Varietas

Imper.
Tuber.
triplex.

Acarb. tri-
plex

Geranium
Theoph.
Athenas.

Aequinoct.

Pomina
Suzina


Locum &
Tempus

Vites &
vitis.

Diphilus Tuberum naturam nunc facile digeri affirmat, et bonum habere succum, extenuare, facileque excerni: inter ea veluti & inter Fungos, quædam lethifera esse. Cum pauco vino & aqua Tuberæ Montbelgardi coquunt, exsiccant, & demum cineribus calidis imponunt, & calida mensis inferunt, detractoque cortice, ac pipere excepta, non ingrata gustu, edunt.

TVBERVM GENVS QVIBVSDAM
Cervi boletus. CAP. LXXX.

Descriptio



Boletum & Tuber ceruinum appellant Tuberis genus, magnitudine Jugladis, interdum Auellanae & minore, tuberosum & inaequale, substantia inter duritiem & molliem mediam cortice instructum ex cineraceo ad fulvum non nihil inclinante, superficie granulata, cui callus subest atro-purpureus eadem quæ diximus consistencia, qui

recentior subadstringit, exsiccatu adstrictione amissa dulcedinem leuissimam linguæ offert, medicullum fungosa quædam substantia ex albedo purpurascens occupat, texturæ perquam raræ, ut similiter araneorum telis conuoluatur, & in nihilum stilo vel mucrone cultelli terendo abeat, relicto quæ abscedunt calli latera spacio inani. Siccum & iam dudum repositum nihil aliud continere comperitur quàm pulvisculum ut in Crepitu lupi, sed farctiorem, sapore adstringente nonnihil, colore fuliginoso, nulla relicta in medio cavitare, cortice circumiecto satis crasso, durissimulo.

De hoc Tubere subterraneo (inquit Matth.) quod ceruinum Boletum Bohemi vocant, nulla apud antiquos extat memoria. Huic eadem ferre facies inest, quam in cæteris spectamus Tuberibus, globosa tamen, & inæqualis. Extrema cuticula subnigricat, carnosa verò & ipsa fungosa substantia albicat. Sunt etiam qui genus aliquod reperiri dicant, erectæ virilis mentulae formæ, adeo ut altera parte detecta glans, in altera globuli quidam testiculos referentes conspiciantur. Hunc autem Phallum non esse diximus antè ex Had. Iuvio.

Dicitur Fungus ceruinus siue Cervi boletus Matth. germ. & Lonic. Fungi ceruini. Boleti officinarum Cordo in Diosc. Boleti ceruini orbiculati Thallio: Tuberæ ceruina Lob. hist. belg. & Ic. Plant. tom. 2. p. 276. itemque C. Bauh. pin. cui & Tuber alterum. Sic dicta autem sunt, inquit, quia reperiuntur iis in locis ubi cerui libidinem suam exercent: quamvis Cordus inuenerit etiam in præruptissimis montium siluis, quod ne damæ & rupicaprae quidem peruenire possunt, ne dum cerui. Sanè repertus est, subdit Iordanus, iis locis, ubi ab hominum memoria, nullus unquam vi-

sus est ceruus. Ad Trenzinium nobile Hungariæ oppidum circa Carpathi iuga frequentissimos montuosos locis, syluis opacis, ubi licet ceruos reperias, non tamè eorum tanta copia, quæ plaustris Fungorum satisfaceret, siquidem vera censenda quæ de eius generatione scribuntur à Matthiolo, dicente: Fungum hunc Tuberum vulgare modo sub terra nasci affirmant venatores, ubi ceruino semine in coitu inficitur solum. Id quod plerumque fieri solet exempto è vulua genitali, adhuc seminis aliquid continere, maris impetum fugientem femina. Hunc fortasse inuenire nemo posset, ni cerui ipsi locum quodam statuto anni tempore ostenderent. Scalpunt enim naturali quodam instinctu ducti anterioribus pedibus locum, ubi globosus Fungus sub terra delitescit, quod olfactu percipere eos affirmant. Spirant enim Fungus graui odore præsertim recenter effossus. Qui secreta hæc norunt venatores & rustici, qui siluas frequentant, loca diligenter obseruant ceruinis pedibus diducta, effossaque scrobe, Fungos eximunt, & pharmacopœis vendunt, qui dissectos in particulas, & filo traiectos siccant, postea in umbra seruantur in medicum usum.

Hunc Fungum, quamvis in ciborum usum hæctenus non venerit, magnis tamen exornant elogiis, eo enim iis in medicamentis vtuntur, quæ venerem mouer, siquidem ad hoc plurimum illi valere putant, & præsertim, teste Matthiolo, qui humani genitalis faciem refert. In quem usum sicci puluerè ex dulci vino propinant, drachmæ vel sesquidrachmæ pondere. Lactis vbertatem hunc etiam afferre aiunt ex prisana vel muliebri lacte potum, sed valentiùs id agere si longi piperis aliquid addatur. Suffusus oculos Feminarum locos referare tradunt, & vuluæ strangulatus auertere. Non desunt superstitiosæ mulierculæ, quæ iis abutuntur in amatoris poculis quibusdā, prius admurmuratis incantationibus. Affirmant præterea valere ceruinum Fungum ad epora venena ex mero haustum, quin etiam ad venenosorum omnium morsum, non modò potum, sed etiam illitum, excalfacere ex odoris graucolentia, quispiam facile iudicabit. Hæctenus Matthiolus. Cordus non ait verisimile esse Fungum ceruinum venerem stimulare, cum frigidum, pituitosum, crudum & malignum succum humano in corpore gignat. Quæ enim venerem accendere debent, contrarias facultates & qualitates habeant, necesse est. Nec verò similia sunt quæ scribit Dorstenius. Si mulier accipiat Cervi boletum ad magnitudinem vnius pisi, & dimidiam partem manducet, & alia parte umbilicum oblinat, statim absque dolore parituram: si verò imprudenter granide vtantur, magnum illis malum inde oriri posse.

TERPEZ AFRICANORVM, TVBERIS
genus album. CAP. LXXXI.

Terpez Africanorum magis propriè radix quàm fructus dicitur, inquit Leo Afric. lib. 9. Crescit locis calidis in arena, & quidem copiosè iuxta urbem Sela. Abundat in Numidia desertis.

Simile autem est Tuberi sed maius: cortex ei albus: reperitur magnitudine nucis & aurantii mali. Secundum opinionem Medicorum, qui *Camba* nominat, proprietates ei refrigerandi. Arabes delectantur eius esu, quasi esset saccharum, & bona ratione: certè prunis impositum, postea mundatum, & pingui iure aspersum, singularis & terra

Viris
vsius

&
&

Synon.

Lonic.

Locus

Descriptio

delicatus est cibus. Edunt etiam coctum cum aqua aut lacte.

Credidit Dalechampius Tersez siue Tuber album Africanorum, esse Mison Plinii & Atheni. De quo hic ait, Misy [usov. Dalech. Misor] sub terra gignitur. Eius natura atque generatio eadem est, quæ & Tuberis: circa Cyrenum inuenitur, & suauissimi gustus esse creditur, odore carnis lib. 2. cap. 31.

Simile Tuberibus est, inquit ille l. 19. c. 3. quod in Cyrenaica prouincia vocant Misy [Mison, Turneb.] præcipuum suauitate odoris ac saporis, sed carnosius.

CRANION ET CERAUNION veteribus.

C A P. LXXXI.

Cranion
Theoph.

Theophrastus lib. 1. cap. 9. *κράνιον* is annumerat, quæ omnino non habent radices. Plinius loco citato simile quoque facit Tuberibus, quod in Thracia Ceraunion vocant. Quæ autem peculiariter de Tuberibus traduntur, lege proprio capite.

Athenæus dicto loco refert Theophrastum scripsisse Ceraunium (*κράνιον* quidam nuncupant) læui cortice regi, vt Tuber, &c. Hic autem Athenæo contrarius est Dalechampius, dicens, Ceraunion nigrum tuber, velut ambustum fulmine: aut Tuberis aliud genus in fectidum & nigrum puluerem euanescent; ac vtriusque huius Tuberis verrucosi, quomodo læuis cortex intelligi possit, docti viderint. Apud Theophrastum nusquam scriptum memini Tuberum læuem esse corticem: fortassis legendum fuerit læui cortice regi Fungum & Peziten: scabro Tuber & Ceraunion.

De Ceraul
boletum.

Considerandum an Cerui-boletus non possit reduci ad Cranion Theophrasti, si læui non sit cortice.

ARACHIDNA IN GENERE ET Aracoides. C A P. LXXXII.

Theop.

Arachidnam & quod Araco simile est [*ἀραχιδνα, καὶ τὸ ἀραχιδνῶδες*] ostendit Theophrastus lib. 1. cap. 11. Ambæ, inquit fructum ferunt sub terram, non minorem superno [eo qui in supernis plantæ partibus nascitur.] Pars ipsa carnosæ, radicem simplicem (vnâ) crassam, altius insigendam [in altum demissam,] mittit: cæteras verd, quibus insidet fructus, tenuiores, ac summo cæspite [ac in summo, & multipliciter fissas] coherentes agit: loca arenosa potissimum amant: neutrum folia gerit, neque foliis quicquam simile: sed quasi binorum fru-

ctuū partibus inter se oppositis, secunda potius extat, quod mirū profecto est: hæc Theophrastus.

Plinius lib. 21. cap. 15. inter herbas, quibus v. *Plin.* tunc in cibis, horum meminit, inquit: Arachidna quidē & Aracos (Arachidna & Arachoides, Theoph.) cū habeant radices ramosas, ac multiplices, tamen nec herbam vllam, aut quicquam aliud supra terram habent.

Sunt & alia, præter Tubera [inquit Hermol. *Hermol.* in Diosc. sine folio, aut herba, aut caule, supra terram, cibo idonea, in Ægypto maxime, vt Arachidna, & quod Araco simile vocatur à Theophrasto: à Plinio Arachidna & Aracos.

Rob. Constant. in Lexico Arachidnam commemorat ex Theophrasto & Plinio, quem erroris accusat, quod Araco Lentis vitio perperam tribuat, quod Aracoidi, & plantæ Araco simili, erat assignandum. Sed nec ipsemet quidem indicat quam plantam intelligat.

Pandectarius sibi contradicit, dum Arachinde arborum ait habentem radices ramosas ac multiplices, & postea negat habere folium, nec herbam: quomodo arbor denique habebit herbam?

Gein. in cat. dicitur Aracos, fructus Plinio radicibus solis, nec vlla superficie contatis: *ἀραχιδνα* & *ἀραχιδνα*: Aracoides, Aracidna, vel Arachidna *frēbduſurg* / *Ein Ägyptisch gewächse*.

Arachidna autem nomine apud authores donantur etiam Chamæbalanus leguminosa: Arachidna Belli: Trasi siue Dulcichini: Dentaria aphyllis: Fungur: Tuber tertæ: Papas Indor: Manihot: Aracus: Batatas: & Ignæne.

OVITON ET OVIGGON VETERIBVS.

C A P. LXXXIII.

Theophrastus author est lib. 1. cap. 1. illud quod in Ægypto, Vingung [*ὄβινγον* al. *ὄβιν* & *ὄβιν*] vocatum, fructum sub terra parere. Eodem libro cap. 10. *ὄβιν* inter radices quæ sub terra sunt, recenset, & radicem esse negat. Tandem cap. 11. ait, eius quod in Ægypto vocatum est *ὄβιν*, folia quidem esse magna, & germen ipsius breue: ipsam vero radicem longam: & esse tanquam fructum, Excellere autem, & edi, colligereque, quando annis defluerit, coronantes aras Deorum

Ceterum, vt inquit Dalechampius, malè Plinius reddit lib. 21. cap. 15. Vingung Theophrasti Oetum quod Indi & Æthyopes, apud quos plurimum prouenit, adhuc vocant Herich, voce corrupta. Depingit hoc Theuetus, quomodo describit Theophrastus, cuius verba non fideliter idem Plinius exposuit, id quod etiam Solerius animaduertit.

FINIS LIBRI QVADRAGESIMI ET VLTIMI,

atque addo

NOTIVS HISTORIAE VNIV. J. BAVHINE



APPENDIX.

AD ALIQUOS TOMI TERTII.

HISTORIAE PLANTARVM LIBROS.

SVBNECTENDA LIBRI VIGESIMI OCTAVI CAP. 120.

*Galeopsis sine Vrtica iners minor: folio
caulem ambiente.*



Galeopsis hęc species minor, planta sesquipedalis: interdum cubitalis, caulibus quadratis, infirmis, non nūquam surrectis, sæpius humi sparsis: folia primum prorupentia pediculis donata, similia foliis Galeopsis minoris, rotunda ferè, serrata: alia in superioribus caulium

partibus oriuntur, bina, immediatè caulibus adherentia, perfoliata ferè modò caulem ambientia, rotunda, hirsuta, profundè crenata, & crispata, odore minis fœtido quàm præcedentes Galeopseos species, sapore nullo eccellente: flores inter folia ad nodos verticillati caules, & eorum ramos, ambiunt: purpurei, hiantes, & caliculis oblongis, hirsutis, multifidis: radicem demittit simplicem, rigidulam, fibratam.

**Locus &
Tempus**

Descriptio

Est hęc Dod. gall. Vrticæ fœtidæ secunda species. Lobelio in Ic. Plant. p. 463. Morsus gallinæ folio Hederulæ alter. *Figura* placet, non autem titulus, qui huic plantæ non convenit, ceu & inscriptio Tabern. quæ Allines speciem facit. H. Lugd. p. 1253. vocat Balloten crispam, & Coronopum quorundam. Sed rectius C. Bauh. phyt. Lamium 5. siue minus folio caulem ambiente: Schvvenckf. Lamium purpureum minus.

Montspeli copiosè provenit, & circa Montbelgardum in agris: Genevæ passim abundat in hortis, mense Februario virens & florens: Basilæ Maio in hortis, itemque ag. is quæ itur Riehen, & extra portam S. Albani ad Rhenum: Veronæ quoque hanc observavi in theatro & circa urbem.

Galeopsis siue Vrtica iners magna fœtidissima.

Vrticæ radice nititur: caules cubitales & sesquicubitales, quadrati, hirsuti, inanes: nonnihil circa articulos rubentes: ubi & folia bina aduersa, Vrticæ, maiora, perquam acuminata, innocenti lanugine obsita, in ambitu serrata, admodum fœtida: eodemque loci & ramuli in quos diuiduntur caules, exoriuntur: flores in spica per verticillos digesti, oblongi, tenues, cu-

collati, colore purpureo, concoloribus fibris, labelloramen albis lineis picturato.

Tragus Herculeam Plinii esse arbitrat, Thallio dicitur Vrtica fœtida maxima *populæ* dicitur. C. Bauh. phyt. Lamium 6. siue maximum silvaticum primum. Schvvenckf. Lamium silvaticum spicatum, granissimo & ingrato odore; germ. Scharlachnessel Gottes Vergess nonnullis.

Passim in silvis provenit circa Montbelgardum, Tigurum. Basileam & Genevam, florens Junio, Julio & Augusto.

Galeopsis maxima flore magnorubro.



Cubitali caule, interdum etiam maiore, quadrangulo, crasso, secundum radicem frequentibusgeniculis prædito, à quibus bina semper inter se opposita nascuntur folia, Vrticæ foliis haud absimilia, per ora similiter crenata, sed longè maiora, palmatamque amplitudinè sep. simè superata, hirsuta quidem, sed non mordacia: à medio caule sursum

versus, ad singulos nodos, orbiculatim seni, & æoni, nonnunquam deni nascuntur flores, non simul, sed successivè sese explicantes. Lamii floribus multò maiores, saturè rubri & tanquam purpurei, galeæ instar hiantes, labro inferiore [cutus laciniata oræ] b. fido & frequentibus ad latera barbulis prædito, interiore parte purpureis, & candidis lineis dep. cto, quatuor staminibus cum stilo sub galea latentibus, odore graui, uti tota planta, si teratur, gustu etiam insuavi & amaro: laciniata *vascula*, deciduis floribus, quaternis semina continere deprehenduntur Moleculæ similia: radix crassa, fibrosa, perennis, singulis annis augetur, pluresque stolones proferens.

Closius descriptionis author vocat Galeopsis maximam Pannonicam: C. Bauh. phyt. Lamium 7. siue maximum seu silvaticum secundum.

Frequentem observavi idem Closius in nonnullis syluosis Pannoniæ montibus, Maio mense florentem, & in hortum trar. sp. in qui conservavit.

H h h h h

Galeopsis angustifolia satida.

Descripti:

Galeopsis species hæc radice nititur geniculatâ, reptante, adeoque & per fibras è caulium geniculis demissas denuò radicitur: caules duorum aut trium cubitorum altitudine, modicè rubentes, hirsuti, asperi, quadrati, inanes, folia ex nodis proferunt bina ex opposito sita, Lysimachia rubræ spicata Lobeli, angusta, acuminata, hirsuta, mollia, exceptâ aucti folii costâ rubescente, nonnihil aspera, per ambitum serrata, odore graui Galeopseos, sapore subamaro: flores spicati ex pluribus verticillis conflati, quorum singulares cucullati, Heracleæ Tragi, purpurascens, labello variegato: in floris calyculo subnascuntur quaternaria semina, nigra, niuda, serè triquetra.

Synonyma

Pingitur planta nostra in H. Lugd. p. 1357. Clymen. minoris Dalechampi titulo, describiturque pro Clymeno minore Herbariorum: A Tabern. pro Stachyde aquatica, braun wasser Andorn: Sed dissimiles plantas iungit, nec bene describit, distinguitque: A Gerardo, pro Marrubio aquatico, Scharpe paintod water borehünd. Camer. hort. vocat stachydem palustre Gesneri: C. Bauh. phyt. stachydem palustrem fœtidam, & Tertiolam Cztalpini (sic illi dictam eò quòd Tertianus sanet) q. nos in dubiū vocamus. An tandem est Trago Marrubium maris aut nigrum, gros schwarz Andorn.

Locus & tempus.

Montbelgardi passim iuxta agros abundat inter dumeta florens Iulio, semen maturans Augusto: vt & Tiguri in ripa Lacus, referente Gesnero.

Herba venti Monspeliensis

Descriptio

Herba venti Monspeliensis vocata caules habet cubitales, in multos diuisos ramos robustos, quadratos, rubentes, hirsutos: folia ex aduerso sita, Saluix, vel Parietariæ potiùs, foliis similia, dura, neruosa, supernè virentia & nitida, infernè subhirsuta, albicantia: ex quorum sinu verticillatim ramos, caulemque ambientes nascuntur calyces striati, hirsuti, in acutas barbulas desinentes, è quibus flores promicant galeati Verbasci silvestris Matth. sed coloris purpurei: verticilla autem vndique plumatis rigidulis cistis obuallantibus stipantur.

Gesnerus hort. vocat Herbam venti Monspeliensem: Herbam venti Rondeletii Lobelius, quem dubitare ait an fortè sit Othonna: itemque Parietariam Cordi Monspeliensem, Sideritidis genus Dalechampi, & Verbasci silvestris speciem Italorum in Obl. p. 286. & Ic. Plant. p. 532. H. Lugd. p. 1120. Herbam venti, Parietariam Cordi, Sideritis genus. C. Bauh. phyt. Marrubii 8. siue nigrum longifolium peregrinum, Othonnam quorundam.

Locus & Tempus.

Prope Monspelim, Castelneuf, & Lunel, florentem consexi Aprili, Maio & Iunio. Solibus æstiuis, imbris & flatu iam marcescentia folia crebrè pertusa, & multifora, quasi vento peruia, visuntur, vnde & Herbz venti nomen adepta.

Lamium ad Hederam terrestrem accedens.

Ad Lamium referenda est elegans hæc planta, quæ ex radice Vrticæ vulgari simili, plures profert pedales cauliculos, teretes, quadrangulos, frequentibus nodis cinctos: ad quos alternatim bina contrario situ in oblongis pediculis

æqualiter nascuntur folia; Lamio, siue Vrticæ nõ mordaci vulgari & fœtidæ, quæ purpureo flore est, similia, vel proximè ad Hederæ terrestres, siue Chamæssii vulgaris folia accedentia: inter quæ calyculi terni, quaterni, aut quini, continentes flores Hederæ terrestres floribus formâ proximis, hiantes, nullâ supernè galeâ eminente, sed latiusculo folio reflexo duntaxat, mixtis coloribus, cæruleo, albo & purpurascens insignitos.

Clusius descriptionis author appellat in Pannon. p. 598. Lamium 3. peregrinum: In Hist. post. Lamium Pannonicum tertium. C. Bauh. phyt. Lamium 4. siue folio Hederæ terrestres.

Nascentem plantam nunquam videre contigit authori: sed iconem sua coloribus diligentissimè expressam ipsi dono dedit anno 1579. Ill. Dn. de Batthyán.

CANNABIS SILVESTRIS VETERIBVS.

Cannabis silvestris similes Altheæ virgæ profert, minores tamen, nigriores & crassiores [asperiores aliis] cubiti altitudinem æquant: folia satiuæ similia, sed nigriora quoque & asperiora: flores rubescentes Lychnidi similes [flores Lychnidis, subrubros alii:] semen verò & radicem Altheæ. Decocta radix, illitu inflammationes mulcet, tumores discutit, topicos articulorum dissipat: cortex huius torquendis sinibus accommodatur.

Ceterum caput hoc de Cannabi silvestri, quam quidam Hydrastinan, Romani verò Termitalem & Cannabem appellant, in multis Diosc. exemplaribus cum capite de Cannabe satiuæ, de quâ antè dictum, coniunctum habetur, an autem ex Diosc. sententia, me latet Tragus illud redundare putat, quòd Diosc. contra consuetudinem suam Cannabem silvestrem primo loco ponat. Plinius certè separat. Cannabis in siluis primùm nata est [inquit lib. 20. cap. 23.] nigriore folio & asperiore, dein cultu domita seritate mæsuevit in agris, &c. Plinius cum legisset Cannabi silu. virgas esse Altheæ similes, oliscitante Cannabi tribuit, quod Altheæ proprium est, vt aquam spisset, quod infra monebimus.

Ruellius Cannabis silvestris meminit, & tamen non satis demonstrat, quid intelligat. Cordus & Lacuna omnibus notam aiunt: quæ tamen sit, non tradunt. Amatus spontè in aruis nasci dicit: verùm non describit. Sed & Matthiæus in multis Italiæ locis, cum siluosis, tum etiam campestribus eam prouenire asserit in prior. comm. sed in post. se vidisse dicere non audet. Cannabem silu. nos non habere statuit Tragus, nisi per illam subintellexerit Dioscorides satiuæ speciem aliquam. Cannabim autem spontè prouenire in Virginea, sed foliis & caule à nostra satiuâ differentem author est Thomas Hariot.

Cannabis erraticæ paludosæ titulo, nescio cuius errore, ponitur in Obl. p. 284. & Icon. Plant. p. 527. Cannabis scemina. Sunt qui silvestrem Cannabim Alceam officinarum esse contendunt. Alii Clinopodii alterius Matthioli genus alunt. Alceam pentaphylli folio alii. Cristam Galli alii, quod perpendendum. Est tandem Cannabis silvestris quorundam Vrticæ inertis affinis quæ nunc describenda venit.

Cannabis silvestris quorundam, Vrticæ inertis affinis.

Bicubitali & altiore surgit caule quadrato, hirsuto, & aspero in ramos diuiso: ad cuius articulos

viculos singulos gemina folia aduersa pediculis appenduntur, Vrticæ folius paria, acuminata, per ambitum serrata, in singulas incisuras singulis nervis obliquis à media costa exeuntibus, mollia, pilosa, atro-virentia: flores ex foliorum alia verticillarum caules coronant, Lamii ethigie, galeati, purpurantes, vel albicantes, labello parili, lineolis sanguineis luteisque versicolore, ex calyce rubente, in quinque spinas abeunte, in cuius fundo semina succedunt quaterna: radix nunc recta, nunc obliqua, ex albo nonnihil rubescit, potissimum quæ cauli committitur, fibris longiusculis donata.

Cannab.

filu. Trago

Cannabim hanc siluestrem in censu vitiorum haberi, neque cum descriptione Dioscoridis convenire placet Trago. Caulem liquidem proferat hirsutum, lanuginosum & nodosum, toto alpe-ro vestitum, Vrticæ folius similino: flore alio purpureo, alio prorsus candido, formâ ipsâ Vrticæ fatuæ similino, semine per omnia fatuæ respondente. An Cannabis erraticæ paludosa silu. Lobel.

Descriptio

Scvvenckf. Cannabis silu. spuria 1. Cannabis spuria facie Vrticæ Lob. Cannabina alba Tabern. wilder hanff/weiß hanffstrau/ wilde taub nessel/Äcker nessel: inter segetes nascitur. Item, Cannabis silu. spuria altera Lob. Vrticæ fatuæ silu. aculeata Thau. Sideritis 2. Matthiol. Stachelicht wilde taub nessel/ Stachelicht äcker nessel: segetum peritices. Et Cannabis silu. spuria 3. Vrticæ fatuæ silu. aculeata minor, flein wild taub nessel. Quam plantam intelligat Schvvenckf. per primam Cannabin siluestrem nobis nondum constat: secunda non est Sideritis Matthioli.

C. Bauh. phyt. Vrticæ 5. siue fatuæ aculeata foliis serratis: Trago Cannabis silu. propter formâ feminis: Lobelio Cannabis silu. spuria altera. Item, Vrticæ 6. siue fatuæ aculeata foliis non serratis.

Vrticam autem hanc fatuam silu. aculeatam Taali esse silu. Cannabin Lobelii, testatur Camerarius. Dod. lat. in fol. sub titulo Cannabis sterilis depingit & describit: Hist. Lugd. p. 497. pro Cannabi siluestri Dalechampii, flore puniceo.

Locus & Tempus.


Geneux copiosè floret Nouembri: Basileæ intra portam cineream & lapideam, in & extra urbem, & ad fluuium Birsæ Iulio, Augusto & adhuc Octobri. Montbelgardi passim abundat.

Ladanum segetum flore rubro quorundam: & albo.

Descriptio

EX radice digitali, aut minori, lignosa, fibrata, caules surgunt pedales, quadrati, subhirsuti, propter terram rubentes, ceteroqui ex viridi canescentes, geniculati, ramosi: folia ex articulis oriuntur, Ledi, atro-virentia, subhirsuta, ex aduerso posita, sapore exsiccante: flores indidem ex foliorum alis orti verticillarum caules ambiunt, Lamii floribus persimiles, colore nunc carneo hilariore, nunc albo, labello punctis duobus albicantibus notato; interius paullo notulis in luteum vergentibus resperso: apices sub galea teguntur lutei.

Turner. plantam, quam hic proponimus, Anteorariam vocat: atque esse Clinopodium alterum Matthioli, cuius figuram sine descriptione proponit. Tabern. Alyssum (2. statuit in Hist.) Galeni flore purpureo: C. Bauhin. phyt. Sideritim 7. siue aruentem angustifoliam rubram: Hist. Lugd. p. 443. Ladanum segetum, de quo ait. Hæc Tom. III.



herba à foliorum cum Ladanum similitudine & natalibus à Plinio Ladanum segetum dicitur, ab aliis Terrahit angustifolium. Quia autem Plinius segetum Ladanum duplex esse ait, id Herbarii sic interpretatur, ut aliud album sit, aliud rubrum.

Locus & Tempus.

Vtrumque nascitur in aruis lapidosis & inter se-

getes passim circa Montbelgardum. Obseruauimus quoque Monspelii & Geneux: itémque Basileæ florens Octobri: Flore albo & purpureo in Ducatu VVirtemberg. inter admirabile Balneum & Kirchen urbem, & arcem.

Chamaecissus, siue Hedera terrestris, Veteribus & in genere.

Hed. terr. maior.



Chamaecissus

quem quidam Chamaeleuco, sterilem Hedera, Terræ coronâ, & Selinitin appellant, & Romani Hedera syluaticâ: folia Hederae similia habet, minora tamè, tenuioraque, ac in gustu valde amara: ramulos à radice dodran-ales, foliosos, per terrâ sparsos, quinos, senolue: flores Violis similes, mi-

Virtus;

nores tamèn: radicem gracilem seu tenuem, candidam, inuilem: nascitur in cultis. Folia vtiliter bibunt ischiadici tribus obolis in aquæ cyathis tribus, quadragenis quinquagenisue [triginta aut quadraginta Celsalp.] diebus. Eodem pota modo senis aut septenis diebus, regiū morbum emendant, & expurgant.

Plinius in Cissi & Chamaecissi voce valde implicatus est, & à Dioscor. aliter us. Theophrastus quidem hederae inquit i. e. terrestris, & ut si quisque hoc est, in altu sublata meminit, nusquam verò Chamaecissi, teste Dalechampio. Ceterum, Chamaecissos hanc antiquorum esse Hedera terrestris vulgarem, negant Cordus, Matthiolus, & Marangha. E contra Hedera

Plin. not.

H h h h h 2

terrestrem officinis dictam, Chamæcissum esse volunt, effigie quidem, viribus & vulgari appellatione contentientibus, Tragus, Fuchl. Dod. Lob. Cæsalp. & alii nonnulli.

Chamæcissi verò nomine sequentes donantur plantæ: scilicet: Volubilis minor. Hedera. *Acquiuoc.* Helix. Consolida media. Consolida regalis. Gramen Fuchsi. Veronica mas.

Hederam terrestrem vulgò appellant Brunfels. tom. 1. Rhaps. 22. Trag. Matth. Tabern. & alii, i. e. *χάμεινον*, vt Dod. gall. Fuchl. Chamæcissum, vt Trag. Ruell. Humilem Hederam Lobel. & Hederulam ac Hederam terrestrem Barbarorum: Chamæclema Cord. in Hist. apud quem malè posita figura Floris tinctorii. Elatinen Brunfels. in 4. p. 17. & Gesn. in cat. pl. Elatinen Dioscoridis Comes à Neuenare, quàm malè autem, indicat vtrarumque descriptio. Germ. *Erdebeere* / & *Erden freuglin* / h. e. Coronam terræ, *iniquaror*: quidam *Gundelrebe* / & *Grundreben* / Belgæ *Onderbauen* / Galli *Lierre terrestre*, & *Rane*, Gesn. Boh. *Pourty* / Hung. *fody folyo boros* / suan fii / h. e. terrestris, serpens Hedera. Sunt nonnulli qui Asclepiada vocare velint, quorum error manifestus.

Passim spontè prouenit Monspelii, Lugduni: item Patavii & Genevæ, virens Ianuario & Februario, florens autem Martio & Aprili: Montbelgardi & Basileæ multis in locis floret Maio, Incultis pariter ac incultis locis reperitur, ac sæpenumero umbrosis, iuxta sepes, parietes, & hortorum areas. Viret non modò Æstate, sed & Hyeme, quoniam anni tempore: ab Aprili autem in multam Æstatem flores facit, teste Dodonæo.

Locus & Tempus

Sunt qui asserant apud Tragum, folia in aqua decocta, & pota, dysenterix prodesset: eademq; vino decocta & pota, vrinam & menses ciere, venenum & regium morbum expellere, obstructiones hepatis & lienis soluere, eadem aquæ destillatæ tribuunt: folia vino aquaue decocta, exulcerationi vitæque colli & faucium gargarisatu conducere: hoc decoctum scabiei aliisque oris vt & locorum muliebrium vitis mederi: & succum fistulis aliisque id genus malis purgandis maxime prodesset. Hedera terrestris ex vino decoctum, inquit Matthiolus, potu vrinas & menses ciet, vermes necat, venenum per sudores pellit, hinc fit vt veterinariis magno sit in vsu ad equos, quos scifel infestat. Frequenter eâ vtuntur Chirurghi Itali, potissimum vulnerato thorace, aut intestinis, in quem vsum compertæ efficacix porcionem *triquatim* habent. Dodonæus verò facultate Hederam terrestrem calidam & siccam esse statuit: & quia amara, abstergere, & viscera ab obstructionibus liberare posse, atque aduersus tinnitus & surditates commendari auribus impositam.

Solent [inquit Camer.] alicubi in Italia vlcera inueterata succo Hederæ terrestris eluere, postea puluerem siccæ herbæ inspergere: egregiè plerumque iuuat. Aqua distillata & 44. dies continuos bibita, auctore Ludouico de Leonibus Medico olim Bononiensi insigni, in suppuratione pulmonum efficax. Quas veteres Chamæcisso tribuunt facultates easdem omnes Hedera terrestris adscribunt, neque dubiū est Fuchsi, cum sit admodum amara, quin eandem habeat facultatē, & alia etiā possit quæ illi adscribunt, vt euocare suppressos menses, vrinam mouere, obtusum auditum remouere. Contra pestem etiam tradunt Officinarum esse id quod equites quo-

que sciunt: hi enim quoties sibi dicta pestis equum corripuerit, hac contra eandem herba magna efficacia vtuntur.

Aqua tandem aut decoctio pondere vnciarum iij. confert mulieribus, tumore membrorum aut vetricis laborantibus: idem præstat si epithemetur bis in die. Scribit Lerijs in Hist. Americana cap. vltimo, cum omnes diarrhoea & solutione ventriculi tenerentur, adeò vt nihil penitus retinere potuerint, breui tempore sanitati restitutos fuisse vsu pulvis Oryzæ cum succo Hederæ terrestris cōcoctæ, quæ amara ab igne contegenda est probè pannis, in olla postea ei commiscendi onorum vitelli, omniaque ita confusa in foculo mensario recalfacienda. Vidi ego v-

tentes quosdam ad torsiones post partum, ventri appositâ, aciple etiam vtiliter sanè vsus sum. Huius porro felicem vsus obseruaui in expellendis vermibus eorum si concisa detur cum aena.

Asarina Lobelii flore Hedera terrestris.



A Sarina, aut saxatilis Hederula, quam raro & non nisi locis montosis & saxeis vidit Lobe- Descrip- lius, in Gallo- prouinciæ Delphinatæ & Narbonæ, per plures quidem notæ sūt quæ Hedera terrestris conueniūt, proindeque nonnullis Hedera saxatilis dicitur: hanc vrinas ciere

scit: an aluum ducat, compertum haud habet: nec tamen id inficias it: nam huic fortè vsu venit, quod de Asara asserunt. Idem in Obl. p. 329. vt mihi videtur Asarinam ieiunè describit, ac perperam sterilem cognominat. Asarina sterilis, inquit, Seuenæ Narbonensis agri, diuersa ab Asarina Matthioli qui florem Anthemidis esse scribit: Huic folia & flores diluè purpurantes Hedera terrestris conueniunt: sed maiores, longiores. Rupibus & cauitibus Vegenio conterminis Seuenæ oriunda.

In Ic. Plant. p. 601. inscribitur Asarina, siue saxatilis Hederula. C. Bauh. phyt. Hedera terrestris, siue [etiam Hist. Lugd. pag. 915.] Asarina Lobelii.



pentem, & Ranunculum duplicem appellat Celsus. Ran. luteum multiplicem Schvv. Coronopum Ranunculi speciei similem flore multiplici luteo Gesn. hort. An Ran. prat. maiorem fl. multiplici Trag. An Ran. hort. multiplicem Fusch. hist. Ran. multiplicem in Icon. An Ranunculi tertiam speciem vulgarissimam, suis ramis per terram se spargentem, flore valde foliato, Anguill. epist. II. An Ranunculi septimam speciem coronariam Cord. Hist. An Ranunculum horticorum Anglorum polyanthemum Lob. Aduers. An Ran. 10. siue hortensem repentem pleno flore, C. Bauh. phyt. An Ran. hort. fl. pleno secundum siue inclinantem, idem in Pinace? An quoque Ran. hort. fl. pleno tertium siue dulcem, & Polyanthemum multiplex, Dod. gall. Lugd.?

Locus &
Tempus

RANUNCULI PLVRIMÆ species Aliæ.

RANUNCVLVS MAGNVS HIRSVTVS repens flore pleno.

Descript. EX radice fibrosa caules tollit cubitales, crassos
latus, hirsutos, iuxta terram rubentes, superius



teriora virentia aut chlora, scandulato incubitu confertim stipata exterioribus altiore situ
Tom. III.

tis simplicis herbaceo innocentis sapore prædita flus aureus multiplex: echinus confragosus.

Icon Ranunculi dulcis multiflori apud Tabern. non placet. Eandem inscribit Gerardus Ran. maximum multiplicem, Double wilde Crowfoote.

Ranunculi speciem peregrinam serpentinam, &

posita, imbricatam coni Cedri Libani dicti laminarum conelutinationem quodammodo æmulantur, reliqua duntaxat umbilicata in summo lacuna: toti flori subiecta foliola quinque hirsuta viridantia: folia alia à radice oriuntur, alia à ramis, pediculo longo fistuloso, palmari & dodrantali, hirsuto, valde lata: primaria diuitura triplici, quarum unaquæque rursus tripartita, obtusa, crassa, hirsuta, superna parte atroviuentia, splendentia & rugosa, inferna ex albedo virentia dilutius: nonnulla interdum folia, vt circa floris pediculum antequam se expandat, caulem immediatè ambiunt, in tres oblongas diuisuras acutas, ampliùs non disiectas, abeuntia.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. floret mense April.

RANUNCVLVS ROTVNDIFOLIVS vernus syluaticus.



Descript. Fibrosa ra. ducitur, minimè acris, ex qua surgunt aliquot caules fistulosi, cubitales & sesquicubitales, in ramos brachiatos, quorum singulis insidet flus Ranunculi aureus, quinque foliis caducis constans, quæ extrorsum totidem triplo minoribus virentibus circumdatur,

in medio staminibus donatus plurimis crocatis: succedit echinus qualis in vulgaribus Ranunculis: foliorum autem mira est varietas: nam ex inferioribus quædam circinata rotunditatis integra sunt, & in ambitu serrata: alia manente rotunditate triplice quintuplicem diuisurà incisa, atque ista quidem omnia longis pediculis appenda à radice statim oriuntur, & in hortis culta, insigniter crassescunt, vt alterius esse plantæ quodammodo videantur: quæ ad alas & ramorum diuinationes, in tenuissima & oblonga segmenta diuisa, radiatæ stellæ more caulem sine pediculo amplectuntur.

Tragus hunc describit nomine ranunculi siluestris, vocatque german. Mergen hanensfuß, quod Martio mense in syluis reperiatur: dulcem ait, & ad Apolei Crus galli refert. Figura autem proprio titulo non donatur, sed malè sub inscriptione Ranunculi pratensis dulcis transposita locatur.

Sed & Fuchsius Ranunculi siluestris titulo in Histor. pingit, sed non describit, nec ritè à cæteris distinguit. In Icon. Ranunculi primam speciem inscribit.

Dodon. gall. est Ran. auticomus: Anguill. epist. II. Polyanthemum Plinij: Thal. Ran. Martius Tragi: Tabern. (cuius icon non placet) in Icon. ran. dulcis nemorosus: in H. (vbi præterea

IIII

vocat Chrysanthemum Democriti; Herbariorum Ran. auricomum, aureum, & dulcem nemorosum, Pedem & Vnguem Leopardi, à foliorum quadam, cum eius animalis Vngue, similitudine.] Ran. dulcis secundus: Gerardo, Ran. nemorosus: Lob. in Ic. Pl. p. 669. Ran. auricomus: Schvv. Ran. dulcis filuaticus, *βασίλειον χρυσάνθεμον*: Casp. Bauh. phyt. Ran. syluaticus folio rotundo.

Nom. lin.

Germ. Süßer wald hanenfuß/wild goldgeel hanenfuß/ & wald schmirgelen: Belg. Lupaerts Clawen / & Soetbosch hanenuoet: Gall. Grenoilletre dorée: Italicè, *Ranuncolo dolce saluatico*: Angl. Sewte moode Cramefoor.

Zocus

Syluis familiarem hunc Ranunculum C. Bauh. Basileæ in pratis obseruauit. Montbelgardi abundat in monte Bar vnde in hortum Illust. E. C. transtuli, vbi Aprili & Maio floret.

RANUNCVLVS PALVSTRIS FLORE minimo.

Descriptio



Valde crassescit aquatico Ranunculo radix caua, & fibris multis donata: à qua caules exurgunt multi insignis interdum crassitudinis, inanes, striati, ramosi: folia Paludapij sublustri splendore virescunt, albis punctis aliquando guttata: flores inter omnes Ranunculos minimi, quinque foliolis constant

exiguus, aureis: capsula oblonga, tenuiora quam in reliquis, nec aspero semine echinata, sed lauibus & minutis granulis compacta. Sapor huius Ranunculi valde calidus & vrens Tabern.

Fuchf. sine descriptione hunc exhibet in Hist. Ranunculaquaticis [ita etiam in Ic. vocatur,] & Apij risu titulo.

Tragi figura Apij aquatici optimè conuenit, non item descriptio. Quare perpendendum an non confundat hunc Ranunculum (primum, vt vocat etiam in Hist. german.) aquaticum cum artuensi: Quà porro ratione Apium hoc suum palustre ad Anemonem agrestem, Plinio aculeatam dictam, referendum dicat, haud video.

Lobel. in Obs. pag. 382. Icon. Plant. p. 669. vocat Ranunculum palustrem rotundiore folio. In Aduers. videtur hunc miscere cum Ranunculo aruensi echinato.

Locus.

Si Matthiol. sub Ranunculo primo voluit exhibere figuram Ranunculi, quem hic tradimus, ea non vndique placet. Vellem & nostram Fuchianam fuisse meliorem. Camerar. bonam pro Matthiolina reposuit.

Synon.

Dod. gall. dicitur Ran. palustris, Ranunculi i. species: In Hist. purg. & lat. in sol. Ran. filu. primus, Ranunculi filu. i. species, Ran. aquatilis, Ran. i. Dioscoridis, *βασίλειον, ἢ σάλευρον ὁδύπνον*, Apium palustre, nec malè Apistellum: Gesner. hort. Ranunculi primum genus, Apium risus, Apium

hemorrhoidum, Ran. i. Matthioli. Thal. Germ. & Tabern. Ic. Ran. palustris: Hist. Ran. i. palustris, Batrachium palustre, Apium raninum. Schvv. Ran. palust. folio Apij, Sardoa vel Sardonia herba.

C. Bauh. phyt. Ran. i. sive palustris rotundifolius lauis: *Eidem in Pin.* Ran. palustris & aquaticus i. sive Apij folio lauis, Ran. & Sardonia Dioscor. Ranunculus, Strumea & Apistrum Plinij, Scelerata Apuleij, Apistrum Cordi in Diosc. Ran. i. Matth. Gesn. hort. Lac. Cast. Lugd. Ran. 4. Turn. 3. Lon. palustris Cord. hist. Herba Sardoa Guiland. Ran. alter hirsuto semine fol. j. Apij, Celsalp. Folij & caulibus est alibi maioribus, alibi minoribus, florib. communiter luteo-pallidis: at Cordus & purpureis obseruauit. Si Cordus Ranunculi Dioscoridis primam speciem obseruauit flore purpureo, cur non locum, cum rard talis occurrat, annotauit: suspicor eum legisse in Dioscoride, non autem vllibi vidisse.

Cordus aut.

An Anguill. epist. n. Ranunculus i. apud Patavinos locis palustribus, flore luteo: An Celsalp. Ranunculi alterum genus laue?

Germ. vocatur wasser hanenfuß/ froschpfeffer/ feigblattern Eppich/ & perperam tamen, wasser Eppich h. e. *σάλευρον ὁδύπνον*, Apium palustre. Gallis Grenoilletre aquatique, ou Grenoillere d'eau. It. Ranunculo aquatico: Belg. watter hanenuoet. Angl. watter Cramefoor.

Nomina lingua.

Rarius cetè, sed tamen alicubi in montosi strigosi que agri scrobibus, fossisque aquas habentibus, visitur. Plurimum autem videre est, vbique iuxta torpentium, aut pigre labentium aquarum riuulos, aliaque similia humida loca & vliginosa.

Locum

Tiguri obseruauit, & Genenz ad portam Rine florentem Iunio. Florem dant Maius ac Iunius menses, sed tamen rarius post sequentes dant, Dodonæo.

Placet Tabernamontano vt quotiescunque Ranunculus simpliciter scribatur, hic intelligatur. De Ranunculi viribus diximus antè. Siccat, inquit Schvv. & calefacit 4. gradu, cum radix, tum vniuersa herba. Herba in oleo violaceo macerata crustis excitandis & hemorrhoidibus referendis aptissima.

Tempus

RANUNCVLVS PALVSTRIS echinatus.



In Ta voco Ranunculum quandam vuidi foli incolam & paludum leuatore, cui folia aiquatenus Aceris minoris diuisura, sed minora, crebra: radix fibrosa: caules, plures, palmares & aluores, crebris canis brachiati: quibus flores insident ceterorum more lutei simplices: quos excipiunt capsula, Ranunculi

Descriptio

aruensis capitulis proxima, è decem, duodecimve spu-

ue spinosis oblongis compressis pericarpis congestis conflata.

An Cæsalp. Ranunc. primus, linguam exrens, semine depresso, foliis cum maculis nigris: Ranun. lævis? An Lob. in Adu. Ran. palustris semine echinato, Apium Sardonium Dioscoridis puratum?

Clus. hist. post. vocat Ranunculum præcoccem 3. Ran. Apulei quorundam, & Batrachium Apulei lac. Plateau. C. Bauh. Ran. 23. siue palustrem echinatum Io. Bauhini: cuius meminere Aduersaria: verum cum Ranunculo palustri rotundifolio læui confundunt. Idem in Pin. Ran. echinatum quartum, siue palustrem.

Locus

Gaudet locis humidis & aquis Monspelii, ac etiam in fossis. In Belgio alicubi obleruatus.

RANUNCULUS ARVENSIS echinatus.

Descript.



Caulis habet cubitalē circiter, subhirsutum, hylatervirescentem, caui, & in ramos plures diuisum: folia in oblonga segmenta tenuia profundē admodum incisa, pilosa: flores Ranunculi aquatici, minores quā in pratēsi genere, luteol., quibus succedūt echinata capitula ex pluribus

subrotundis lappulis compressis & aculeatis composita: radicem habet fibrosam.

Fuchsius, qui nec describit, nec etiam ritē ab aliis distinguit, Ranunculum hortensem simplicem in Hist. inscribit; absque ratione. Magis congruē, Ranunculi alteram speciem constituit in Icon.

Figuram Fuchsii proponit Dod. gall. titulo Ranunculi albi, siue echinati. Lat. in fol. & Hist. purg. Ranunculi silu. tertii & Aruensis nomine & inscriptione, aliam exhibet effigiem. Hanc Lobel. in Obs. p. 380. pratensis Ranunculi varietatem inticulat, & Ranunculus siluest. Dodonæi, eumque ad Ranunculum Aduersar. pag. 298. refert. Sed non inuenio Aduersaria huius meminisse iam d. cto titulo & pagina, nec etiam sequenti, nisi quod describendo Ranunculum rectum cum hoc confundant, semen attribuentes echinatum. In pratensis enim Ranunculi varietatis descriptione, capitula non dicuntur echinata, sed non diuersa à Ranunculo pratensi vulgari.

Et sanē capitula, quæ in hoc Ranunculo echinata sunt, faciunt, vt suspicer Matthiolum per Ranunculum quartum figuram Ranunculi aruensis malē pictam exhibuisse. Nec me latet alterius esse opinionis Lobelium, Camerarium, & fratrem C. Bauhinum, vt suis ostendetur locis.

Synon.

Cordo, cui est Ranunculi quinta species, à Gesnero in H. additur figura, vocaturque Ranuncu-

Tom. III.

lus aruensis, ac etiam segetalis: de hort. Ranunculus aruensis, æstiuusque à Fuchio depictus, Lob. in Ic. Plant. p. 665. & Gerardo, Ran. aruorum. Schvv. Ran. aruensis. Ponz. in Baldo Ran. echinatus Dodonæi. Tabern. Hist. Ran. 1. aruensis, Erst adter hancensfuß / Ran. 13. aruensis, latifolius sine iconē: Item, Ran. 2. aruensis, der and der Adter hancensfuß / Ran. 14. aruensis, angustifolius: & hunc in Ic. etiam pingit. C. Bauh. phyt. Ran. 21. siue Getanii tuberosi folio, Batrachium verum Cortusi: Item, Ran. 22. siue aruensis, echinatus 1. siue aruensis; Ran. satius Turneri: folio aliquando latiore, aliquando angustiore, pro ratione folii pinguioris.

Germ. dicitur feld hancensfuß / & Adter hancensfuß. Belg. Adter hancensvoet. Angl. feld Coomesdote. Gall. Grenouillere blanche, ou herissee.

Nomina
linguar.

Basileæ in agris conspicitur mense Maio, vti & Montbelgarui, Monspelii, & Genevæ, vbi in hortis parvæ plantæ tota Hieme virebant. Septembri echinata profert capitula. Vulgaris in regionibus vicinis Rheno. Inter segetes Silesiæ Iulio floret. In arvis denique pletique locis alliis, vbi humidius solum, gignitur.

Ranunculus albus simplici flore.



Radix cauli Descript. Quali appolita palmariibus aliquot fibris, crassis mediocriter, rigidis & albis, disparatis constat: ex qua surgit caulis, sesquicubitalis & bicubitalis, pallido & virente laeuore nitens, supra communem sortē Ranunculorum crassus, sol dus, in ramos aliquot diuisus, folisque ad alas donatus;

sternit gerit vncialibus & sesquiuncialibus hirtutis pediculis Ranunculorum vulgariū forma & magnitudine, sed candore niuem prouocantes, snauolentes, quinque vel sex foliis compositos, interdum cultura à longē pluribus, vt multiplicem florem iure possis dicere, quorum medium occupant apices lutei: Folia Aconiti foliis similia, quinquepartita, profundissimē serrata, infernē hilari virore splendentia: supernē viridia, squalida. Tabern. ait sapore calido & acri, sed mitiore, & non ita vrente, vt in cæteris.

Clus. Ranunculus albo flore à Dodonæo descriptus differt à maiore, humilior, folia læuora, & nonnihil altiora, flores rariores & minores, maturius floret.

Dodon. in Hist. purg. & lat. in fol. nominat Ranunculum flore albo, Ran. externorum quartum. Camer. ad Hist. germ. Matth. Ran. candido flore. Tabern. Icon. Ran. album, Batrachium album: Hist. Ran. 5. album. Ger. Ran. alpinum album. Gesn. hort. Coronopum quorundam, Ra-

liiii i

nunculo specie similem, silu. albam : Item, Ran. 3. in Bernatium montibus fideris de appellatum, Chamæplatanum deinceps forsitan vocandum: In app. Ran. album maiorem sil. fl. simplici : In cat. Ran. album simpl. flore non vrentem. Lob. in Adu. [hic dubitat an sit Ranunculus albo flore Diosc.] Aconitum batrachoides: In Obs. p. 387. item Ic. Plant. p. 663. Ran. album flore simplici: Ibi etiam Ran. album alterum, Hic Aconitum batrachoides, cuius figuram in Ad. proposuit: In Obs. & Ic. Pleistigiem Dodonæi assumit, ac magnitudine à priori in Adu. exhibitio distinguit.

Figura 3. 7
Lugd.

Figura Ranunculi montani albi apud H. Lugd. p. 1031. non displicet: Ad hanc autem Compilatore aliam duas malas reducere decebat, sc. Polyrhizi latifolia Dalechampii p. 1140. & Aconiti quinti Matthioli, p. 1740.

Pona nomen.

Pona in Baldo vocat Ran. quartum Dioscoridis: Item Ran. montanum album Dalechampii. Nobis vna solum stirps est.

Nomina
linguarum

Schvv. Ran. Alpinum candidum, Ran. Alp. maiorem leucanthemum folio Aconiti, Ran. max. *Λευκάνθημος* siue Aconitiforment, foliis amplis, profundius sinuatis, Platani instar, floribus lacteis: sapore subacri & nitroso.

Locus &
Tempus.

Perperam C. Bauh. in phyt. hunc Ranunc. 4. Matthioli nuncupat, quia in figura nihil apparet quod respondeat. Præterea Ranunculum quartum Matthioli (quem nos aruensem echinatum vocamus) eundem asserit cum Ran. mont. quarto Clusii, de quo nos proximè dicturi sumus. Sed quæ picturarum similitudo? quæ foliorum conuenientia? quæ floris colorum correspondentia?

Locus.

German. dicitur *weisser hanensfuß* / *weisser Alpenhanensfuß* / & Siles. *weiß Trolblüm*: Angl. *white montaine Crowfoote*.

Tempus.

Abundat in Episcopatu Argentinensi ultra Rhenum prope fontes acidos Griesbachianum & S. Petri ad siluam Hercyniam: Genevæ in monte *Saleve* & Thuiri florens Iulio mense. In Pannonicis montibus prouenit teste Clusio, ubi maior in Baldo frequentissimus. In vlginosis montosis Silesiæ seu ad riuulos ex montibus fluentes nascitur. Tandem in plerisque Galliæ, præsertim Narbonensis, montibus, & apud Allobroges subinde reperitur.

RANUNCVLVS ALBVS FLORE DENSO.

Descriptio

IN eo differt à Ranunculo albo simplici, quòd huic *flos* sit multiplex, magnitudinis Ranunculi pleni recti: æquè enim lacteo candore conspicuus est: *caules* recti, solidi, ramosi, sesquicubitales: *folia* quinquepartitè ad pediculum vsque dissecta: reliqua conueniunt.

Synon.

Clusio in Pann. p. 369. dicitur Ranunculus flore polyphylo albo: In Hist. post. Ran. mont. 4. alter flore pleno.

Synon.

Camer. ad Hist. germ. inscriptione Ranunculi candido flore, florum picturam exhibet. Tabern. Ic. Ran. albus multiflorus: Hist. Ran. 6. coron. albus, floribus multè maioribus, quàm silu. pleni. Ger. Ran. alb. multiplex. Gesn. hort. Coronopus quorundam Ranunculo specie similis, hortensis, flore multiplici albo: An ibidem postea, Ran. alb. magnus fl. multiplici. In app. Ran. alter alb. fl. multipl. In cat. Ran. alb. fl. pleno. Schvv. Ran. alb. multiflorus, siue coron. albus.

C. Bauh. phyt. Ran. 40. siue hortensis albus multiplici flore. Pin. Ran. hort. fl. pleno sextus, siue Ran. Aconiti folio, fl. albo multiplici, Ran. leucanthemos fl. pleno Cam.

Germ. *Gefülter weisser hanensfuß* / *gefüle weißer Nemias*
Frans. *Schmurgeln*. Angl. *double white Bats* *linguarum*
phlers/buttons or double white Crowfoote.

Ranunculus flore albo Alpinus maior.



Magna sunt *folia*, in quinque laciniis secta, viridia & in ambitu serrata, infernè dilatiora, & splendens, dura, neruola, quæ præmansa nullam manifestam acrimoniam, sed amaritudinem potius habereprehenduntur: *caulis* cubitalis aut amplior, firmus, licet tenuis, lauis, nodis aut geniculis præditus, in multas alas à medio ad summum expansus, in quibus *flores* satis ampli [interdum pleni.] Secundi (Ranunculi alpini Narcissi flore) tamen floribus minores, quinque foliis constantes, tenelli, toti lacteis aliquantulum odorati, staminibus pallentibus umbilicum occupantibus, & capituli rudimentum cingentibus, quod ex seminibus simul congestis, quemadmodum in reliquis Ranunculis, constat: *radix* præmorsa videtur, instar radicis Secundi, multasque longas & candicantes fibras habet.

Montani Alpium Austriacarum opiliones & venatores, Abbeiß / & Teuffels Abbeiß / id est, Præmorsa, & Diaboli morsus, nomen indebant.

Abundatè prouenit in accliu montis Vvech-
sel, Schneberg, & aliorum montium siluosis locis, *tempus*
per quæ ad eos montes patet aditus. Floret istic eodem tempore, quo Ranunculus mont. albus Clusii, i. e. Iunio mense: sed in cultis Maio: semen maturat Iunio.

Ranunculus alpinus Narcissi flore.

IN celsioribus earundem Alpium iugis, multè humilior & magis hirsuta crescebat hæc plâta, pedalem altitudinem non excedens, *flore* paulò maiore [& qui Narcissi florem album, medium calicem flauum habentem, æquate posset] eoque etiam magis odorato, quàm prioris: eius etiam *folia* maiore amaritudine & acrimoniâ erant prædita, tamet si primo gustu quandam dulcedinem habere viderentur. Serius florebat prior: nam eam duntaxat florentem reperiebat, quum in inferiore iugo, alteram iam semen habentem obseruasset author.

Clus. Pann. p. 366. Ranunculi 2. alterum genus, p. 367. Ranun. Alpin. secundus, siue Narcissi flore: Hist. post. Ran. mont. secundus species altera



In Silesiz montium conuallibus florēt.

Ranunculus montanus albus hirsutus.

altera. C. B. phyt. Ran. 42. siue mont. hirsut. Narcissi flore : Pin. 5. siue hirsutus humilior Narcissi flore. Schvv. Ran. mont. hirsut. Narcissiflorus, Ran. polyphyllos niueus, aliquando purpurascens, radice concaua, fibrillis candidis, miro naturæ artificio contexta. Iunio & Iulio

habet nomine Alpina Pentaphyllez Caryophyllata, quæ Ranunculo, de quo hic agimus, optime conuenit.

H. Lugd. p. 1743. Aconitum candidum *decauay* H. L. met. Dalechampi, idem est cum nostro Ranunculo & longè diuersum à Ran. Dodonæi albo, contra quam Compiler v. luerit, qui floribus sex foliola appinxit : nos plurimum septem obseruauimus. Porro cum Dalechampus Aconitum hoc suum candidum, Geranium album esse suspiceretur, Herbari quibus naturæ & facultatis huius plantæ indagandæ negotium committerat, venenatam esse, & ex Aconitorum genere adferuerunt.

C. Bauh. phyt. Ran. 41. siue montanus hirsutus purpurascens flore. Pin. Ran. mont. hirs. purp. flore.

Genue in monte Thuri mense Iulio florēt & Iunio. Crescit copiosè in monte Iuræ opacis iugis. semina maturans Augusto.

Locus & tempus.

Ranunculus minimus Alpinus, albus & luteus.



Omnium quos vidi Ranunculorum minimi sunt mihi in Raticis montibus collecti. Prior radicem oblique agit, pro platule ratione magnam, flos donatam crebris, longis, perpatum colicis cedentibus, qui duarum aut trium varietatum altitudinis est, vno altero folio lo donatus : reliqui enim tria folia, vel profusius duntaxat circūquaque Geranii columbini modo tractata, rotunda teret, crassa : flos summo caui insidet albus, aut luteus, à Ranunculo- rum aliorum flore non differens.

Descript.

Ceterum, cum Clusius Ranunculos minimos albos ad amussim describat, ac varietatē vnā,

à nobis non obseruatam, ita dat, Iubuit præter nostram figuram, amborum effigiem inspicendam, & contemplandam proponere.

Prior imago siccas nostras plantas Ranunculi minimi ob oculos ponit : Posterior Ran. mini-

IIII ;

Nigraradicis nutritur, fibris crassioribus donata, quæque altemittit perenniū platarum more, tenuibus filamentis comosa : ex hac folia nascuntur, quatuor, quinque vel sex : pediculis palmatis harentia, ampla, circūscriptione rotunda, sed in plurimas lacinias ad pediculum vsque incisa,

hirsuta : caulis vnicus cubitalis, vel sesquicubitalis, pilosus, cuius summum in quatuor, vel quinque ramulos palmares plus minus facessit, quam diuisionem folium ambit vnicum veluti perforatū, sine pediculo, non minus profundè quàm inferiora dissectum : flos vnicuique ramulo vnus insidet, albus, Ranunculi albi similis, an aliquid habeat purpurei non recordor, septem vt plurimum foliis constans, apicibus in medio : hinc oriuntur capitula è latiusculis, ex oblongo rotundis, laxius seminibus cõgesta, pluribus quàm duodecim, ad semen Pastinacæ Germanicæ accedentia.

Quandoquidem autem plantæ, quam describimus, nobis minus integra est, quàm vt possit ex ea bona effigies parari, assumimus Clusii, quæ placet. In ea tamen varietas obseruatur, quod flores constent quinque foliis. Nos semina nostræ plantæ appingenda curauimus : Picturam autem nostram sculptor non nihil corrupit.

In Hist. Pann. vocauit p. 364. Ranun. montanum purpurascens flore : p. 368. Ranun. tertium. Histor. post. Ran. mont. tertium. An Ranunculus quartus Matth. Lobelio ? Is in Ic. p. 696. effigiem

Descript.

Synoni

mi montani effigie Clustanas præ se fert.

Jegerfrucht h.c. Venatorum herbam, appellari scribit Simlerus: item, Herbam causticam, & flore albo Ranunculum montanum. Montanos verò Austriacarum Alpium opiliones & venatores *sieberfrucht* vocare, & ad pellendas febres [vnde nomen] foliis eius contusis & carpo ad-motis vti.

Synon.

Gefn. hort. Ran. mont. minimus. Lob. Obs. p. 38. Ran. minimus albus, nonnunquam sativione in luteum mutatus. Fabricio apud Gefn. hort. in epist. Ran. parvus fl. albo. C. Bauh. phyt. Ran. 16. siue minimus foliis crenatis: Item, Ran. 17. siue montanus minimus laciniatis foliis. *Eidem in Pin.* Ran. mont. 2. siue humilis rotundifolius flore minore, Ran. mont. primi species prima: Item, Ran. mont. 3. siue alp. humilis rotundifolius fl. maiore, Ran. mont. minimus Gef. hort. Ran. mont. primi species altera Clusii. Ran. montanus Dod. ed. Belg. flore interdum duplici foliorum serie constante.

Locus & tempus.

In Rhætiæ monte Albula floret Iulio. Abundanter provenire conspiciebat Clusius in summis Schneberg & vicinarum Alpium iugis, confragoso solo, & pæne in ipsis petrarum fissuris, Iunioque interdum isthic florebat, aliquando serius: ut videlicet nix maturus aut serius soluitur: in hortos autem translati, maturè admodum, & ante alios Ranunculos, Aprili sc. flores profert.

Ranunculus Thaliectri folio.

Descriptio



CAulem habet pedali altitudine assurgentem, gracilem, ex viridi rubescentem, in quo quaternaria aut quina folia, maioris Thaliectri flore albo foliis, colore & formâ valde similia, sed minora, & teneriora, amaro sapore: *stipuli* in singulis alarum sinibus singulares,

caudati, quæ foliolis constantes, suis petiolis innitentes: quibus decidentibus succedunt bina aut terna *cornicula*, *semen* rotundum, subruffum, Aconiti hiemalis vulgò appellari semini ferè par, continentia ex eadem radice, præter caulem, prodeunt bina aut terna folia suprà descriptis similia, singularibus, dodrantalibusque pediculis, eiusdè cum caule coloris innixa: radix impensè amara, multis albis fibris donata est, ex quarum capite alia exit nodosa *radicula*, subinde ad singula internodia novas fibras agens, atque hac ratione se propagans, ideoque perennis.

Synonyma

E tribus Ranunculi præcocius florentis generibus est hic Clusio in post. Hist. alter. Ideoque Ran. præcoem secundum Thaliectri folio cognominat. In Pann. ad quam potissimum classem Ranunculum Thaliectri folio referret diu secum deliberavit, sc. Ranunculine an Thaliectri vulgò

existimari generibus adscribere debebat: etenim aliquot notas cum utriusque convenientes habere credidit. H. Lugd. p. 821. Aquilegia minoris Dalechampi titulo pinxit, teste Camerl. hort. C. Bauh. phyt. vocat Ranunculum 3. siue album folio Thaliectri: Pin. Ran. nemorosus, siue Thaliectri folio.

Abundè nascebatur in saltu Leytenberg, Manderstorf vicino, ultra Leytam flumen, quinto ab vrbe Vienna Austriaca milliari, ubi primum illum observabat author, deinde quibusdam aliis umbratilis silvis Viennensi agro. Inveniebatur etiam apud Zollonock Ill. Herpis Balch. de Batthyán in Vngaria oppidum, inter vepres. Florebat Aprili, semen interdum Maio, plerumque Iunio, ad maturitatem perveniebat.

Ranunculus Creticus albo flore, maiore quàm Papaveris rhæadis.



Foliis est Ranunculi pratensis vel hortensis repentis, diuisis specie trifoliâ, rariùs quinquefoliâ, per margines crenatis, per terram sparsis: caule rotundo, pedali, qui duos vel tres flores sustinet magnos, ex sex, vel septem foliolis compositos, albos, Papaveris erratici florem magnitudine superantes, quibus succedit capitulum seminibus aliorum Ranunculorum more contractum.

Ranunculum 38. siue Creticum album accepit C. Bauh. [vt in phyt. ait] Parauio à Laurent. Rosenavv pharmacopœo germano, cui in horto crevit, nomine Ranunculi ex Candia rari.

Ranunculus montanus purpureus calyce villos. Felici Plateri.



Plantulae facies diligenti que consideratio facile differentibus differentiam suâ reliquis Ranunculi speciebus ostendet. Dodrantalis est plantula. Folia velut in digitos dissecta, partim à colorum exortu longis pediculis hærentia, partim ex ipsis pediculis

lis pendentia. In summo flos insidet singularis, Ranunculi, sed, ut sicca ostendit, purpureus, villosissimo & veluti bysseo, eique concolori lanugine oblecto, calyce præditus.

Cl. Fel. Platerus in Alpibus Valesiæ lectum in suo Herbario sicco adseruat, à quo mutuam descripsimus ac pingi curauimus.

Ranunculus racemosâ radice.

Comitali caule est, nonnihil hirsuto, quem comitantur à radice longissimis pediculis hærentia folia, orbiculata ferè, alia magis, alia minus, profundè dissecta; segmentis modò latiusculis, modò tenuioribus, subhirsuta: flos luteus Ranunculi vulgarium similis, radix Chelidoni minoris æmula, à plurimis bulbillis, quos fibræ quædam intercurrent, racematim congestis compositæ.

D. Bauh. phyt. vocat Ranunculum 26. siue racemosâ radice. Agerius siccam dedit pro Ranunculo Chelidoniæ radice.

Ranunculus Illyricus radicibus bulbosis, foliis longis.

Descript.



Ranunculus Illyricus radice donatus est ex plurimis bulbis, ceu Pini nucleis, albis, racematim quasi cõgestis, quibus se mirum in modum propagando multiplicat: folia germinatione prima ex pediculis longis subentibus parua, glabra, viridia, tam Plantagineis primigeniis similia, ut internosci vix

possint, nervis per folij longitudinem decurrentibus: adolecentiâ dissecari incipiunt in longissimas portiones ternas quaternasque, varia dein diuisurâ adhuc amplius incisa, simulque molli & incanâ lanugine vna cum pediculis pubescere: caulis cubitalis & sesquicubitalis, in ramos aliquot brachiatus, totus candidus & pilosus, flores gerit maiusculos aureo fulgore micantes, à quinque folijs compositos, interdum gemellos, inodoros: Quibus succedunt capisula aspera; Fragaria instar, oblongiuscula, semen continentia.

Cæsalp. vocauit Ranunculi peregrinam speciem alteram flore grandi, folijs candidis. Tabern. Icon. Ranunc. Illyticum: Hist. Ran. 16. Illyticum Item, Ran. secundum Diosc. Gelotophyllin Plinij libr. 24. capit. 17. σάλλον ἀγρίον Authorum Epigramm. σαρδόνιον Græcorum, σαρδόνιον τὸν ἄλλων, & σαρόνιον. Herbam secleratam Apulei: Herbanorum verò Ran. Sardonium, Sardoniam herbam, Sardoam herbam, Apium, siluestre & rusticum, German. windischer hanenfuß. German. Ran. Illyticum, Anglæ, Cromfoote of Illyria. Dodon. Externorum Ranunculorum 1. quem Dioscoridis Ranunculum se-

cundum esse vult: & Ran. Illyticum.

Lobel. in Obseru. p. 383. Icon. Plant. p. 672. & H. Lugd. pag. 1032. picturam Dodonæi Ran. Illytici habent. Clus. in Hispan. vocat Ranunculum Pannonicum: Histor. post. Ran. grumosa radice quarrum.

C. Bauh. phyt. Ran. 27. siue folijs oblongis in-Synon: cisis lanuginosis: Pin. Ran. grumosa, vel etiam C. Bauh. Alphodeli radice 1. siue lanuginos. angustifolius maior; Item, Ran. grumosa radice 2. siue lanuginos. angustifol. minor, Ran. Illyticus Eyst.

Montbelgardi in hortu Ill. E. C. suis bulbulis Locus & plurimum se multiplicat: folia æstate pereunt. Tempt. Gener. verò Cherlerus spontaneum obseruauit prope Romam, florentem Maio.

Ranunculus Tripolitanus flore phæniceo, vel Asiaticus grumosa radice. 1.



Hunc fuscè describit Clusius: cui dicitur Pannon. pag. 374. Descrip. Ran. Byzantinus 2. siue simplex flore rubro, p. 376. Ran. Tripolitanus phæniceo flore: Hist. post. Ran. Asiaticus grumosa radice primus. Gerar. Locus & Ran. Tripolitanus, Anglæ. Cromfoote Tripolite. Cal. Bauh. phyt.

Ran. 15. siue flore simplici rubro: Pin. Ran. grumosa radice 5. siue si phæniceo minimo simplici.

Peregrè inuectus & Constantinopoli allatus Tarabolos catamer lalè nomine insignitus, quod Tripolitanum plenum florem significat: flores sub finem Maij, aut initio Iunij.

Ranunculus Asiaticus polycelos, siue grumosa radice secundus.



Spectamus Scum Ranunculo hoc Clusiano eundem esse, aut certè valde similem Ranunculum Illyticum Imperati, cui Hist. nat. p. 755. folia adscribit profundè incisa, & in ambitu serrata, crassiuscula, & nonnihil pilosa, coloris pallidi & viridis, saporis ingrati & mordicantis: flores albos, interdum color. minij: semina alata

& foliola, insipida: radices tuberosas, propter quas multis dicitur Ranun. tuberosus, p. 768. Ran. Tripolitanus radice tuberosa, fl. puniceo.

C. Bauh. Pin. Ran. grumosa radice 6. siue ramosus. Ran. Asiat. grum. rad. fl. phœniceo ruberrimo, Eyst.

*Ranunculus peregrinus grumosa radice
1. 2. & 3. florib. albis.*

Ranunculi hæc noua genera, Ioanni Bridoul, Insulis Flandriæ vrbs Medico, semine ex Italia accepto, nata, Iacob. Plateau vnâ cum iconne Clusio communicabat, qui fusè describit.

C. Bauh. Pin. dicitur Ran. grum. rad. 8. siue flore albo: Item, Ran. grum. rad. 9. siue fl. albo, leuiter crenato: Et, Ran. grumosa rad. 10. siue fl. niueo.

*Ranunculus Constantinopolitanus
fl. re sanguinea pleno.*

Locus



Triplicem hunc facit pingit & describit Clusius qui Constantinopolitani quidem siue Byzantini cognomen illi dedit, quod quibuldâ hortis Byzantio vicinis & in eius vrbs conspectu, ultra tamen Bosphorum sitis, intellexisset inueniri, quâ fortè ratione Asiaticum vocare præstaret.

Primus autem Ranunculis ex-

ternis à Dbdonzo descriptis accedit, sextusque constituitur, ac pro primi generis purpurei floris Ranunculo apud Dioscoridem admittitur, & verisimile est non perpetuè & vbique multipliciter factis flore, sed & simplici non raro nasci. Is etiam inscribitur à Lob. in Obl. p. 381. & Ic. Plant. p. 672. Ran. sanguineus multiplex: & sicutidem à Germ. qui The Double red Crowfoote Anglicè vocat. A Tabern. Icon. Ran. Turcicus siue sanguineus: Hist. Ran. 15. Ran. sub prima Dioscoridis Ranunculi specie meritò reponendus, Ran. Chalcædonicus, Constantinopolitanus, hancensfüß. A C. Bauh. phyt. Ran. 24. siue fl. multiplici rubro: Ab eodem in Pin. Ran. grumosa, vel etiam Asphodeli radice 1. siue flore sanguineo.

Ran. Turcicus.

Prior reliquorum duorum Ranunculorum Clusianorum Asiaticorum fl. pleno, cuius iconem damus, est Ran. Asphodeli radice 2. siue flore subphœniceo rubente, & Ran. pl. flore ruberrimo, Eyst. Posterior, cuius etiam hic posita figura, dicitur Ran. Asphodeli radice 3. siue prolifer nuntius, Ran. Asiat. grum. rad. fl. pleno sanguineo proliifero, Eyst.

Ranunculus grumosa radice, flore niueo.

Locus

Ranunculi grumosa radice plantam semine à Creta accepto natam, ad Clusium mittebat anno à Christo nato 1601. Iac. Plateau, quæ in-



sequente anno, florem proferebat, Ranunculo peregrino similia non valde dissimilem, Flores autem explicabat Ranunculus hic Creticus grumosa radice flore pleno, mense Maio cū Asiatico phœniceum florem gerente, quibus succedebat simile capitulū, non dissimili paleaceo & acetoso semine oblitum, quod in-

Ran. Creticus grum. rad. fl. plenus.

utile esse arbitrabatur idem Clusius.

Ranunculus Pyrenæus folijs sublongioribus laciniatis albo flore.

Porsus nouum censet Clusius hoc Ranunculi genus, quod anno Christi 1604. primò illi conspectum, cultum scilicet, suisque floribus onustum sub Martij initium in hortis Ioannis ab Hogelande & Christiani Porreti, quorum vterque à Ioachimo Venerio plantas acceperat præcedente Autumno è Pyrenæis montibus erutas. Casp. Bauh. pin. Ranunculus folio longo 4. siue montan. folijs Plantaginis. Aut C. Bauh. Ille Ran. Pyrenæum albo flore Clusij in Hist. p. 2. cū tamen Clus. vnicam tantum appendicem ibi annexerit, nec in ea huius meminerit. Idem suspicatur esse Ranunculum phœniceum Myconi u. Lugd. p. 1036. sed labitur: Est Ran. angustifol. bulbosus.

Tempus
Locus

Ranunculus longifolius, alijs Flammula.



Caulis est cædodrantali, glabro, fistuloso, geniculis nodoso, nunc solitarius, nunc in ramos diuiso, reptante: folijs priora ex longis pediculis vnciam semis lata, oblonga alia, alia subrotunda, superiora per caules ex articulis oriuntur, bina, interdum serrata quæ minùs angusta, longi-

Descriptio

gitudine circiter palmari, sapore ac: flores Ran. vulgaris pratensis, contractiores, auroo fulgore nitent: radix ex fibris albicantibus confecta est: caules etiam serpunt, & quidem rursus, vt in Ranunculis quibuldâ, radican- tur.

Dodon.

Dodon. gall. Flammulam, quasi flammam, aut Herbam ignis à superante & ardenti caliditate, nominavit: gall. *Flamula aquarique*: Belg. *Ægel-coolen*: ferunt enim hanc ouillo generi esse perniciosam, ouesque hanc pastas herbâ, inflammationibus iecinoris, internorumque viscerum erosionibus ac exulcerationibus corripitur: quod malum *Ægel* vulgò appellant: unde herbæ nomen. Qualem autem nomenclaturam apud veteres adepta sit, faterur se ignorare, si non sit herba illa, quam Octavius Horatianus *Cleoma* appellat, quæ in locis quoque humidis crescit, & temperamento, admodum calida est. In Hist. verò purg. & lat. in fol. Octavii Horatiani *Cleoma* esse hic negat: quodd se. *Flamula Sinapios* forma, qualis in *Cleomate* requiritur, haud respondeat. Suspiciatur etiam non tamen affirmat, Plinio lib. 21. cap. 13. herbam illam esse, quæ ab exitio iumentorum quidem, sed præcipue caprarum, *Ægoletheon* appellata sit.

Synon.

Lob in Obs. p. 381. lc. Plac. p. 670. priorem figuram Do lonzi *Flammulam* *Ranunculum* aquat. angustifolium, *Taracois* siliq. inferibit, & *Flammulam* vulgi: Posteriorem *Ran. aquatilem* angustifolium ferratum.

Tabern. Icon. *Ranunculus lanceatus minor* *Sprehr* fratr. *langer wasser hanensfuß*: Item, *Ran. lanc. ferratus*, & *geretstier langer wasser hanensfuß*: Hist. *Ran. 8. lanc. minor*, *Sprehr* fratr. *cordi*, *Ran. latifolius*, aliorum *Famula palustris minor*: *Ran. longifolius*: Item, *Ran. 19. lanceat. ferratus*, *Flamm. aquat. ferrata*, *Ran. longifol. ferratus*.

Gels. apud Cordi *Ranunculi* duodecima species *Cordi*, leuibus & ferratis foliis: Eidem hort. *Ranunculi* alterum genus, *Dodonæo* oues occidens, Ego *Ranunculum Cordi* duodecimum refero ad *Ranunculum longo folio maximum*, *Linguam Plinii*, *Thalium* imitatus.

Cæalp. *Ranunculus* alter folio nulla ex parte scisso, *Coronopi*, *Ran. infectus*.

Gerat. *Ran. flammeus minor*: Et, *Ran. flamm. ferratus*.

Schvv. *Ran. flamm. minor* siue lanceolat. minor, *Lingua Plinii* *Lugd. Ægelfraut*: Item, *Ran. flamm. angustifol. ferratus*, *lingua maior* *Lugdunensis*. *Lingua Plinii* est *Ran. longo folio maximus*: *lingua maior*, est *Virga aurea*, siue *Solidagini angustifoliz affinis*. Quare Scvv. dupliciter labitur.

C. 8. d. 1.

C. Bauh. phyt. *Ran. 31. siue palustris angustifolius non ferratus*: Et *Ran. 33. siue palustris ferratus*. Suspicio eiusdem plantæ foliis ludentis esse synonyma. In eadem enim planca utrumque foliorum genus obseruari, quæ perbellè nostra pictura ostendit. In *Pinace* [vbi nobis videtur differentes plantas confundere] *Ran. folio longo 2. siue longifol. palustris minor*. *Ran. 1. Anguillare*: 12. *Cordi*, aquat. apr. 17. *Novæ quæ* maior *Thalii*, *Enneaphyllon Plinii* lib. 27. cap. 9. Item, *Ran. folio longo 3. siue palustris ferratus*.

Locus & Tempus

Tres huius habet icones H. Lugd. pag. sc. 1035. 1041. & 1038.


Geneæ circa S. Geruasium floret mense Maio & Iunio, eâ quidem formâ, quâ à nobis pingitur, & circa *Bussy* in paludibus. *Lugduni* & *Tiguri* copiose provenit: *Basilæ* quoque vliginosis locis obseruatur.

Vires & Flus.

Facultate cæteris *Ranunculis* similis est, acris similiter, exulcerans, & vesicas faciens. Edendo pecora enecat, & idem arcent sedulo pecus spiliotes, ne eo vorato inflammentur præcor-
Tom. III.

dia, indidemque moriantur, ut videre est in balantum extis, quæ huius pabulo ambusta fuerant, teste Lobelio in Adu.

Ranunculus longo folio maximus, Lingua Plinii.



IN vliginosis Descript.

[Solq. & palustribus exit *Ranunculus Lingua Plinii* *Dalechampia* putatus, caule bicubitali & altiore, crasso, læui, in ramos subinde diducto, per quem, veluti & per ramos, alternatim folia producantur, pedali circiter longitudine, vix vincta lata, crassiuscula, glabra,

mucronata, saporis acris & amari *Dalechampia*: flores extremis inhaerent ramulis, magni. *Ranuncolorum* aliorum formâ: quinque foliis luteis constantes, quorum medium obliquo numerosi apices concolores: eis superueniunt, atthore *Tabern.* capita erinacea, parua nucis ligandis magnitudine, cum acutis aculeis saporis calidi & vrentis: radix compluribus fibris defixa nititur.

Facile adducor, ut credam, *Cordum* Hist. per *Ranunculi* duodecimam speciem, *platyphyllon* non improprie dictam, foliis inferius *Lauri* similibus, gracilioribus tamen, *Linguam Dalechampi* intelligere, ut asserit *Thalium*, quamvis figura à *Gelsnero* addita, sit *Ranunculi folio longo*.

Cæalp. *Ran. folio nulla ex parte scisso*, *Ran. infectus*. *Tabern. Icon. Ran. lanceolatus maior*, *grosßlang wasser hanensfuß*: Hist. *Ranunc. 17. lanceolat. maior*, *Ranuncul. flammeus maior* [etiam Ger. & Schvv.] & *Flamula palustris maior*. Cæsp. Bauhin. phyt. *Ran. 31. siue palustris maior*, foliis primis aliquando subrotundis, ad *Chelidoniae minoris* aut *Cochleariz* formam accedentibus.

Synon.

Hunc à fratre habui, qui cum collegerat in paludibus circa *Michelsfelden*. Nascitur copiose circa *Walckenridam* monasterium ad piscinas inter arundines. Prouenit etiam inter urbem imperialem *Wormatiam*, & *Electoraalem Oppenheim*/ paludosis locis & fossis *Rheni* antiqui.

Locus

Lingulae circa fontes nascentis radix combusta teritur, ac adipi suis nigrae admiscetur. Sed id excipitur, ut eius sit suis quæ nunquam peperit. Sic in Sole illita, plurimum alopeciaz confert.

Vires

Ranunculus graminens pleno flore.

Exhibemus presenti capite figuram *Ranunculi folio Graminis* *Dodonæi* in fol. lat. sed descriptionem eius, quæ herbæ non conuenit, repudiamus. Est enim *Ranunculi pumili graminis* foliis, de quo paulò infra dicemus.

Sinon.

Kkkkk

Synon.



Locut.

montanus folio gramineo multiplex.
Colitur in Belgicis hortis.

Ranunculus angustifolius bulbosus.

Descript.



Ytutia, fractu contumacia, neruata, & in acutum definentia, longitudine palmi vnus: latitudine verò transuersi vnus digiti. Palmæ folium in modo substantiæ & contumacia fracturæ imitantia. Caulem habet cubitalem ferè semper, tenacem, solidum, rotundum, in quo folia minora sunt. In summo caulis flores existunt ex quinque foliolis constructi, in medio muscoli, formæ, figuraque similes Ranunculis. Semen habet candidum, magnitudine Milii. In radicibus sapor cum multa humiditate acris est, sed in foliis maior, vt vix Ranunculis cedat. Et ita in Hist. Lugd. delineatur.

Planta veteribus indicta, inter Ranunculi tamen genera Dalechamptio videtur collocanda ex sapore, formæ florum, & radicem.

Synon.

C. Bauh. phyt. vocatur Ran. 30. siue montanus longifolius: Pin. Ran. folio longo 7. siue gramineo folio bulbosus, Ran. leptomacrophyll. bulbosus, vel Ran. bulbos. gram. montanus, Columnæ. Hist. Lugd. p. 1036. Ran. phœniceus Myconi.

Locut.

Rara inuentu, frequentissima in montibus D.

Lob. in Icô.

Plantat. p. 671.

Ran. gramineus multiplex. Tabern.

Ran. 24. Ran.

gram. 2. multi-

plex, aut mul-

tiflorus, aut

Coronarius,

gesit gross-

hänlein / ge-

süßter gross-

hanensüß.

C. Bauh. phyt.

Ran. 19. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in

Pin. Ran. folio

longo 6. siue

gramineus:

flore multipli-

ci: Eisdem in</

minauit; tertiumque apud Dioscoridem esse asseruit, eiusque exemplaria pleraque *dissecta* minus bene habere, pro *tuorum* annotauit.

Lobel. in Obs. p. 384. figuram Ranunculi Lusitanici autumnalis Clusii exhibet, eique in Hist.



Belg. aliam non parum differentem, de qua seq. capite, supponit, non tamen monet cur priorem sustulerit, & aliam substituerit. nec plura in Hist. Belg. de Ran. Lusitanico Clusii, quam in Obseru. In Icon. Plant. p. 673. Ranunculi Clusii imaginem omisit, & Lusitanici titulo, Ranunculum Belgicæ Hist. h. e. bullatum, reposuit.

Tabern. Ran. Lusitanicus Portugalscher hassenfuß:

Histor. Ran. 20. Lusit. siue autumnalis. Ger. Ran. autumnalis Clusii, winter Crowfoot. C. Bauh. Ran. 36. siue foliis rotundis bullatis: Pin. Ran. grum. rad. 12. siue latifol. bullatus Asphodeli radice, flore paruo.

Locus & tempus.

Frequens est circa Olyssipponem inter Oliuetæ, & plerisque Beticæ locis, ubi florentem primum Nouembri, dein & Ianuario collegit Clusius, & amicis in Belgium misit, apud quos Octobri & Nouembri flores protulit, & tota Hieme folia retinuit in Maium usque mensem: aliis nouis, paullo ante quam florere incipiat, repululantibus. Mechliniæ ipsa bruma floret Lobelio in hortis.

Sunt in Lusitania qui Montan nominant [quam tamen appellatione ferulacea quædam planta apud eos etiam insignitur,] & ad prouocanda menstrua ex lacte propinant, referente Clusio.

Ranunculus Lusitanicus bullatus.

Synonyma Tempus



Hoc genus Ranunculi delatum est ex Lusitania opera Clusii, & primum à Lobelio [ex cuius descriptione pater esse genus præcedentis, aut ei admodum affine] in suo Herbario exhibitur, Belgico sc. p. 319. itemque Icon. Plant. pag. 673. Ranunculi Lusitanici Clusii inscriptione. Antè diximus nos admirari

sub dicto Clusii titulo Lobelium diuersas po-

nere icones nullâ indicata mutationis causâ. Tabern. Icon. Ran. Lus. 2. Clusii: Hist. Ran. 21. Lus. secundus. Ger. Ran. Lus. 2. Clusii. Clus. in Hist. post ponit iconem Ranunculi grumosi radice primi titulo, quam non habuit in Hispanicis, nec demonstrat cur id faciat: in descriptione verò nulla videtur distinctione quamuis icones sint valdè diuersæ.

C. Bauh. phyt. Ran. 36. siue foliis rotundis bullatis. Inter hunc & præcedentem Ranunculum non bene distinguit: Paullo melius in Pin. vocat Ranunculum grum. rad. 12. siue latifolium Asphodeli radice, fl. magno.

Quæ hic sequuntur subnectenda sunt libri xxx. cap. 137.

Auricula vrsi siue Primula Veris Alpina, flore rubente.



Quæ flore Descrip:

rubente Auricula vrsi, caulem proferit palmarem & maiorem, nudum, teretem, in viridi albicantem, in cuius fastigio calathiceus soliaceus exalbidus ferè & quasi farinæ conspectus, è quo prodeunt flores multi, umbellatim digesti, pediculis semuncialibus & vncialibus, calathiceo concoloribus, odorati, suauiter rubentes, fundo intus luteo, in sex laciniis cordatis diuisi; folia à radice multa, oblonga, subrotunda, in ambitu serrata, crassa, magis supra quam infra virentia, vtrinque farinaceo albo puluere confersa, sapore amaro & nonnihil acri: radix crassa, fibrosa, alba.

Figuram damus plantæ in horto cultæ, quæ vbi adultior, variat foliis & flore, non quod diuersa sit, folia enim longiora euadunt, & flores exerescunt. Ab hac non diuersam existimari olim collectam in Rhætia, flore rubro, nisi quod omnia minora floresque pauciores Lobelius in Icon. Plant. p. 170. inscribit Auriculam vrsi flore purpureo. G. in hort. Arthritica Alpina, siue Auricula vrsi species minor floribus purpureis, altius in alpidibus nascens. De Lunar. Lunar. Arthritica species flore rubro, foliis minoribus, & modicè crenatis, in silua Grindelia ditionis Bernensis. de coll. stirp. Arthritica Alpina rubra, Arthr. petra montana rubra. Arer. in descr. montis Stokhornii, flüblumen. flore purpurascente, sanguinis modo: itemque atro colore Clus. Pann. p. 146. & Hist. post. Auricula vrsi 2. vel, rubro flore, Nothe Schlüsselblumen: Florem atrum in simili planta Clusius nunquam conspexit.

C. Bauh. phyt. Sanicula Alpina 2. siue purpurea, Auricula vrsi flore purpureo Lobelii. Item Sanicula Alpina 3. siue rubra, Auricula vrsi 2. Clusii. Is animaduertens errorem commissam, in Pinace has duas non amplius separat sed

Kkkkk 2

ynam esse rectius pronunciat. Sanicula Alp. foliis serratis 2. siue Alp. purpurea, inquit, est Britannica Anguil. Auricula vrsi Cast. flore purpureo Lobelius, Auricula vrsi suae rubens Ger. Auric. vrsi 2. Clusii, Primula Alp. latifolia, Tab. & Sanicula Alp. rubra eiusdem.

Locus.

Hanc frustra per Austriacorum Styriacorumque montium altissima iuga quaeruit Clusius: primum autem contexit in horto Aicholtzii, Medici & Professoris Viennensis. Ego in Rhætici montibus inter Clauennam & Buriniam collegi. Montbelgardi in horto Ill. E. C. floret Aprili

Auricula vrsi flore rubro, maculis exalbidis, foliis subhirsutis.

Descript.

Folia habet quam praecedens minora, teneriora, minus crassa, subhirsuta, per ambitum vndique serrata, inter quae nascitur cauliculus superiori similis, flores in umbella pares ferens, & rubros, exalbidis tamen maculis aspersos; cuius radix similiter fibrosa, nouasque è lateribus propagines fundens, auctore Clusio, qui Auriculam

vrsi tertiam facit, & germ. Rose Schlässelblumen vocari alicubi ait.

Figura est Tabernamontani qui quinque proponit solo colore differentes.

Calp. Bauh. phyt. Sanicula alp. 4. siue flore rubro albis maculis asperso. Pin. Sanic. alp. fl. variegato.

In Tyrolensibus iugis, praesertim in Kirchspil inue-

hici intellexit Clusius.

Auricula vrsi carnes coloris foliis minimè serratis.



Clusius hanc Auriculam vrsi quartam vocat. Stein Rösslin autem h. c. petra Rosula, ob venustatem & roseum colorem, tum quod in scopulis nascatur, à montanis pastoribus huncupatur.

Calp. Bauh. phyt. Sanicula alpes. siue folio non serrato: In Pin. Sanic. folius non serratis 1. siue alp. rubes-

cens, fol. non serrato: Auricula vrsi 7. Tabern. robescent Gerardi.

Inuenitur in Sneeberg, reliquisque vicinis iugis & Stiriae Alpibus frequentissima. Rhizomata muliercola singulis annis in forum Viennense venalem inferunt.

Auricula vrsi orbiculata serrata coloris rubicundi.



TYrolensi { Auricula vrsi flore rubro; maculis exalbidis, foliis subhirsutis, } non valde ab similem hanc, in horto Ill. Principis Catorum Wilhelmi Castellis florentem conspiciebat: Clusius anno 1599. Ei autem Auricula vrsi quinta dicitur. C. Bauhin. pin. Sanicula alp. foliis serratis 3. siue alp. foliis

rotundis: quam etià minoribus foliis reperiri ait.

Auricula vrsi alba.

Minor est rubra. Vnicam autè plantam conspiciebat Clusius, in horto Sprengeri anno 1591. Maio mense, quaterna, aut quina ferentem folia, crassiuscula, dilute virentia, nullis crenis in ambitu donata, inter quae prodire fertur cauliculus viridi candicans, tres vncias aut amplius longus, summo fastigio ferens quinos aut plures flores, flauæ formæ æquales, sed candidos: radix superioribus respondens, aliquot fibris, et illæ, donata erat.

Est clusio Auricula vrsi sexta: C. Bauh. pin. Sanicula foliis non serratis 2. siue alp. alba foliis non crenatis. Huic similis reperitur flore pallido, quæ Auricula vrsi pallido flore, Clus. cur. post.

Auricula vrsi angustifolia coloris rubente.



Hanc etiam fuscè describit Clusius: Icon autem est Tabernamontani, Auriculæ scilicet vrsi 6. flauæ, quæ Clusii descriptioni respondet excepto quod suæ nullum Tabernamontanus assignat colorem.

C. Bauh. phyt. Sanicula alp. 6. siue angustifolia flore dilute rubente. Pin.

Pin. Sanic. alp. foliis serratis 5. siue alp. angustifolia, Auric. vrsi 5. Clus. pann. 7. in Hist. at 8. in cur. Auricula vrsi fl. purpureo, Ger. Eyst. Huic similis, brevioribus tamen foliis, cuius Clus. in cur. post. meminit.

Tempus

Crescit hæc, inquit Clus. in quibusdam Alpibus Carinthie & Styrie superioris. Floret sub finem Iulii, h. e. niuib. in summis illis iugis liquecentibus. Rara hæc, quia ex procul diffitis montibus delata, in vnius Aicholtzii horto paucos annos perdidit, omnem cultum ita relinquit ut nunquam ad frugem peruenire, imò ne florem quidem deinceps proferre voluerit.

Auricula vrsi minima flore carneo & niueo.

Locus



IN summo Sueberg iugo primus istam obseruabat Clusius anno 1574. neque villo alio vicino iugo postea ipsi sese obtulit. In Tauro tamen & ludenberg. etiam inuenitur, & cum illa rarum aliud genus per omnia simile, sed cuius folia magis pallescent, flores lactei sunt candoris.

Similem Auriculam nobis communicauit Agerius, cuius

figuram exhibemus, earum quas hactenus vidimus Auricularum minimam, non penitus vnciam altam, foliolis à radice semuncialibus, per extremum latis & fimbriatis, carnosiss, petioli inter hæc surgunt semunciales, quorum vnicuique insidet flos vnus satis magnus Auriculæ vrsi, purpureus, vel ruber, quantum ex sicca planta indicare licet: radix crassiuscula, duplò reliquâ plantâ longior, longis fibris appensis donata.

Synon.

Clus. Pann. Auricula vrsi 6. siue minima, flore carneo & niueo: Hist. post. Auric. vrsi 8. minima: 10. cur. post. Lobel. Obs. p. 108. Ic. Plant. p. 571. Sanicula alp. minima Tabern. Ic. & Hist. Auricula vrsi minima, siue 9. flore niueo, interdum singulari, interdum gemino, inodoro, Flein wets Beer Sanidel: Item, Ic. & Hist. Sanicula alpina minima, flore rubro, Flein berg Sanidel: similis Saniculæ alpina, nisi quod radice, foliis & floribus paullo maior. Tabern. habet figuram Clusii, quam etiam nos in tabella superiori loco pingimus. Secunda Tabern. figura non videtur differre à priore iam dicta: sed fortè ex illa facta, ut videatur aliquid noui habere. Nos ex planta sicca flore purpureo & rubro, in inferiore tabellæ parte, iconem eâ magnitudine, quæ eruius, expressimus.

C. Bauh. phyt. Sanicula 8. siue alp. minima. Pin. Sanicula alp. fol. serratis 7. siue alp. minima, carnea, Arthrica caruleis flosculis, Gesner. hort. Sanic. alp. minima Lobelii, Hist. Lugd. Auricula minima Gerardi. Item, Sanic. alp. minima niuea, Auricula vrsi minima flore niueo Clus. Tab. &

Gerardi: An Auricula vrsi flore albo Eyst.

Auricula vrsi Myconi: pilosa, carulea.



Dietsch' à dictis plantam. Auriculam vrsi vocauit Myconus à foliorum figura pilis multis obsitorum, eamque pinxit & delineauit his fere verbis.

Auricula vrsi Myconi

Radices multas emittit. ferè capillaceas, fuscas, petris inherentes, gustu adstringentes, circa quas folia per humum repunt, Borragini quadantenus similia, in ambitu nonnihil laciniata, aspera,

Descriptio

rugosa, crassa, nervosa, pilosa, maxime prope radices: ex iis enim ad foliorum exortum magna pilorum congeries tomento cuiusdam & veluti iubæ adsimilis enascitur. Eadem folia tam superne quàm inferne villosa sunt, atque etiam in ambitu pili vbique rufescunt. Ex foliorum medio duo aut tres cauliculi emergunt, rotundi, dodrantales, hirsuti, solidi, succosi, purpurascens, cum dulcedine, adstringentes, in quorum fastigiis flores sunt carulei, ex quinque foliolis compositi, & in horum medio stamina lutea, veluti ex vasculo, grani Hordei figurâ, sed maiora, in imo floribus posito, exeuntia.

H. Lugd. p. 837. Auricula vrsi Myconi: Auricula vrsi ex Pyrenæis, Clus. Exor. app. alt. auct. Eidem cur. post. Auricula vrsi nona. C. Bauh. phyt. Sanic. alp. foliis serratis 9. siue alp. foliis Borraginis, villosa.

Locus

Nascitur in umbrosis, montosisque locis, nonnunquam etiam humidis. In Pyrenæis præcipue reperitur.

Aqua ex hac planta per organum vitreum destillata ad frangendum calculum in velica, siue in renibus valde efficax est. Id quod Myconus se experimento confirmasse asserit. Eadem aquâ Hispani aduersus rufim vtuntur: quam ob causam plantam hæc Yerua Tissera nuncupant: à lili à foliorum copia, Pedula.

Chamaejasme Alpina.

Geniculatim serpendo incedit tenuibus artibus ex atro rubentibus radiculis, ocellum, per terram spargens foliorum semuncialium, latitudinis culmi, mucrone leuiter obtuso, hirsutiorum: è quorum umbilico cauliculus exit duarum trilmue vnciarum: nudus, enodis, hirsutus, cuius cacumen ornat umbella florum, pro plantulæ modulo, magnorum, albicantium, per ætatem rubescentium, odoratissimorum, ad Saniculæ Alpine flores accedentium, quorum vbi pediculi cauli comittuntur, foliola subsunt viridia, hirsuta, infimis humi stratis multò minora. Eadem nonnunquam ex interuallis foliorum habet ocellos plures verticillatos, in radice veluti catena

Kkkkk 3

pendulos, quorum folia singularia imbricato incubitu connectuntur, candicantia [cū alijs vt



plurimum vireant] villosa, minora: florum quoque calyculi multo hirsutiores.

Hæc est Sedum Alpinum Clusio 4. in Pann. minus siue 10. in Hist. post. cuius icō plantæ nostræ apprimè respondet, & hinc nostram ex illa desumpsimus. Iasmes enim mōtanae H. Lugdunensis p.

1204. figura non placet. Huc enim eam referimus, ac etiam Sedum 16. siue alp. hirsutum lacteo flore, C. Bauhini in phytopinace: Sedum alp. 3. P. n.

Locus & Tempus. Chamæ-lasinen alpinam inueni in Rhætia florentem Iunio, veniendo Burinio Tigurum, duplici specie traditā. Gesnerus ad meam plantam propriā manu hæc adscripsit: Flosculus in montium iugis, dum recens est, odoratissimus, lasini inſtitur, vnde Chamæ-lasinen alpinam voco, Arthriticis alpinis cognatam: flos candidus ætate rubescit.

SANICULA ALPINA MINIMA PILOSA,

Caspar. Bauhini.

CAP. CXXIX.

Synon.

Descriptio

Locus.

Sanicula alp. minima pilosa, siue montana 2. Sin Prod. Sanicula foliis non serratis 3. in Pin. plantula est duarum circiter uncularum, radiculam habens exiguam, ramulos viciales, per terram sparsos: foliola breuia, angusta, incana, nonnihil pilosa, plura stellæ in modum disposita: flosculus oblongos, luteos, pro ratione plantæ magnos, qui singuli pedicellis minutissimis, & fimbriato obtusiore calyce prodeuntes, insident. Hanc author in summitate Ventosi montis & Pyrenæis reperiri prodit.

VERBASCUM VETERIBVS, ET BLATTARIA. CAP. CXXX.

Femina.

M. 4.

Verbascum summas differentias duas habet auctore Diosc. Alterū enim albū est, alterū nigrum. Et ex albo, alterum fœmina, alterū mas. Fœminæ igitur folia sunt Brassicæ, at pilosiora multo, latioraque & candida [λευκώτερα, Orib.] Caulis cubitalis, aut amplior, albus, subhirsutus: flores candidi, aut quadantenus ex luteo pallescentes (λευκὰ ἢ ὑποχλωρὰ Orib.) Semen nigrum: radix longa, gustu acerba crassitudine digiti. Nascitur in campestribus. Quod verò mas appellatur albis est, oblongis, angustioribusque foliis, ac tenuiori quoque caule. Nigrum autem albo prorsus esset simile, nisi latioribus, nigrioribusque constaret foliis. Est & Verbascum sylvestre, virgas gerens altas & arboris specie lignosas [ἡ δὲ δὲ Sar. ἔρως Ald.] folia Saluiz similia. Habet autem, vti Marrubium, verticillato circa virgas ambitu florem luteum auro similem [χρυσόν-

Str.] Sunt porro & Phlomidæ duæ, hirsutæ, humiles (μερμερὲς τῇ γῇ: ver. ὀρεοῦς) rotundisque præditæ foliis. Tertia præter has est, quæ Lychnitis vocatur, ab alijs Thryallis, foliis tenuis quaternisue, aut etiam pluribus [ver. numero foliorum caret] crassis, pinguibus & hirsutis: ea ad lucernæum ellychnia apta est. Porro duum generum primo loco recensitorum radix adstringit: proindeque alui profluuiio laborantibus ludicri tali magnitudine, vtiliter ex vino propinatur. Decoctum ruptis, conuulsis, contulis, & antiquæ tussi auxiliatur: ac dentium quoque dolores collutione mitigat. Verbas-cum autem cui flos aureus capillos tingit, & quocunque loco reponatur, blattas in se contrahit. Cocta in aqua folia cedemaris & oculorum inflammationibus imponuntur, itemque syderatis vlceribus, ex melle aut vino. Cum aceto quoque vulneribus medentur, & à scorpione ictis opiculantur. At verò siluestris (totus hic locus, inquit Goup. non est in veteti, sed hæc omnia agnoscuntur ab interpretibus:) folia igni ambustis illinuntur. Fœminæ verò folia ferunt caricis interposita, eas incorruptas & à putredine immunes tueri. Hæc illæ, quibus plura Verbas-ci genera tradit, id sc. d. stinguendo in album & nigrum, iterumque album subdiuidendo in marem & fœminam: denique subiiciendo Phlomidæ duas hirsutas, & tertiam Lychnitidem.

Verbascū Græci Phlomon vocant, inquit Plin. Genera habet prima duo, Albū, in quo mas intelligitur: alterum nigrum, in quo fœmina. Tercium genus nō nisi in syluis inuenitur. Sunt folia Brassicæ, latiora, pilosa. Caulis erectus, cubitali amplior: semen nigrum, inutile: radix vna crassitudine digiti. Nascuntur in campestribus. Sylvestri folia Eleliphac, alta, ramis lignosis. Sūt & Phlomidæ duæ, hirsutæ, rotundis foliis, humiles. Tertia Lychnitis vocatur: &c. Paulò post: Distingui genera hæc penè superuacuum est, quum sint omnia eiusdem effectūs. Eam tamen quam Dioscorides, blattas ad se colligere dixit, Plinius non Verbascum esse, sed Verbasco similem herbam tradit. Est, inquit, similis Verbasco herba, quæ sæpè fallit pro ea capra, foliis minùs candidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hæc abiecta blattas in se contrahit, ideoque Romæ Blattariam vocant.

Diosc. in tradendis Verbas-ci quatuor differentiis sequitur & ipse Galen. 8. simpl. hisce verbis Verbascom, i. e. Phlomon aliqui per p. literā scribūt, Plomō dicētes. Et est quæ dā foliis albis, quæ dā nigris. Et ex alba Phlomo mas est, cuius folia angustiora sunt: fœmina cuius maiora. Et ad has alia est Phlomos siluestris appellata. Præfert hæc auri speciem, & melinum in floribus colorem. Est & alia præter has, quam priuati Phlomidæ & Thryallidem vocant. Primum radix in gustu acerba est, fluidisque affectuonib⁹ auxiliatur. Quidam ipsam etiam colluunt ad dentium dolores. Folia tamen discutiendi vim habent. Ita & aliarum folia, & maximè eius quæ auri colorem in floribus præfert, qui etiam capillos flavos faciunt. Omnium enim folia siccantem & moderatè extergentem vim habent.

Φλόμος à φλόγῃ, vto, quasi φλέγῃ, flamma, quia hæc herbā pro ellychniis vtuntur, vt plenius postea annotabimus.

Phlomis, Phlomidis & Phlomitidis, Verbas-ci & Verbasculorum æquiuocationes sunt hæc. Phlomos de Verbasco vulgari flore luteo, magno, folio maximo. Verbascom vulgare reperitur in terdum

*Differtia
4. Galen.*

Aequiuoc.

terdum flore maiori, planè niueo. Verbasum maximum meridionalium odoratum duplex luteum & album. Verbasum crispum & sinuatum, quod Diosc. videtur. Verbasum angustifolium ramosum flore aureo, folio crassifolium. Verbasum puluerulentum flore luteo paruo. Verbasum flore albo paruo. Verbasum nigrum fl. paruo luteo, apicib. purpureis. Blattaria fl. luteo. Blatt. pilosa Cretica. Verbas. lychn. Syriacum. Verbas. Monsp. fl. luteo hianthe. Verbas. silu. saluifolium. Verb. silu. saluifol. exoticum. Aethiopis. Iacobæa. Lychnis. Primula Veris.

Verbasum vulgare flore luteo magno, folio maximo.

Descriptio



Verbasum vulgare ad tres cubitos & aliud excrefcit, ex radice alba, lignosa, satis crassa caulem proferens iridem crassum, multis alis subinde brachiatum, lanuginosum: folia Enulæ, lata, longa, mollia, incana lanugine puberula, nullo aut breui pediculo, alia per terrâ sparsa, alia cauli

adnata, quæ pro ætate non parum variant, quædam rugosiora: alia magis polita: caules modò singulares, modò plures, modò brachiat: Hinc tanta figurarum diuersitas. Flores in longo thyrsos, plures simul iuncti, Rosulæ magnitudine, lutei, quinquepartiti, odore obscuro non ingrato: in medio apices quinque, duo glabri lutei, reliqui albi, lanuginosi: semen in capitulis rotundis succedit, minutum, papauerino suppar.

Verbasum 1. Matth. Cordo in Diosc. H. Lugd. p. 1298. & Cæsalpino. Verbasum mas Anguill. Lob. in Aduers. Tabern. & Castori. Verbas. mas & Candela regia Lob. in Obs. p. 303. Verbasum aut Phlomos vulgaris mas Dioscoridis 1c. Plant. p. 561. Verbas. candidum mas, Lon. & Lacunæ. Verb. album mas, Thallio. Verb. latius Dod. Verbas. latifolium mas, Eyst. Tapfus barbarus, Gerardo. Casp. Bauh. phyt. Verbas. 6. siue mas latifol. flore luteo: Eid. Pin. Verbas. 1. siue mas latifol. luteum.

Φλόμος Græcis, & πάλμος Galeno, ἀπὸ τῆς φλόγος à flamma, quod eius foliis & caulibus in laternis pro ellychniis vterentur. A caule thyrsom siue funale eximente, vulgò Torches vocatur apud Lobelium, & Græcis φλόμος à flamma, quam alunt funales, aut Phlomi folia & caules in lucernis. Candelariam quoque recentiores nominarunt, quod caulibus, adipe, seuo vel pingui aliquo illitis, nonnulli pro candelis siue funalibus vtantur. Officina Tapsum aut potiùs Taxum, quia toxiacis aduersetur: barbarum à densa lanugine. Qui obseruauerunt, inquit Lobelius, mustelas conflixisse cum serpente, penèque enscitas & victas, pastas

isto Tapso, & factas denud alacres, duellum instaurasse. Taxum vocarunt. Sunt denique qui Candelam regis, Lanariamque vocent. Barbaris dicitur Cauda lupina, Aspalathum, Pomphillogos, Abedonei, Buluri, Flominoi. Manlio Auidon, Auion, & vt quibusdam placet, Auicennæ lib. 2. cap. 2. Buluri appellatur.

Tragus verò Verbasum hoc maius, siue primum, vt vocat, masculum leucophyllum & Verbasum arborescens esse existimat, tametsi verba Dioscoridis aliam præ se ferre sententiam videantur.

Nomenclaturæ itaque, quas nunc recensimus satis apertæ ac planæ sunt; quare à prolixiore illarum explicatione superfedebimus, paucis nonnulla indicaturi. Differunt itaque φλόμος & Phlomos, quæ est Vipetina apud Apuleium cap. 5. appellatio. Aliud etiam est item Taxus, venenosa illa arbor, cuius Virgilius in Ælogis meminit. Aliud deinde Taxus barbarus (sic enim quidam scribunt, licet alii Tapsum dicant) quod est Verbasci nomen. Quod autem quidam Verbasum Lanarium herbam appellant [quanquam & apud Dioscoridem peculiaris sit herba, quæ hoc nomine insignita est] id sine causa non factum est, cum folia eius pilosa sint, ac veluti Salvia omnem attrahant puluerem, vnde & Blattaria dici posset, quemadmodum de Verbena Plinius scriptum reliquit.

Verbasci apud Germanos hæc sunt nomina, wulfrant / himelbrandt / Brenfrant / Bergensfrant / Funigefertz / Vnholdenferz: apud Belgas, wolleruyt / & Torsecruyt: Gallos Baulien blanc masie, & alicubi Bon homme: Italos Tasso barbasso & Verbasio: Hisp. Gornolob: Angl. Muls legne The male.

Verbasum latioris folii frequentissimum iuxta agrorum aruorumque margines, aggeres, seropes, aliisque locis haud cultis, à Iulio mense in Autumnum usque cum flore reperitur: sed altero tamen, à quo enatum est, anno 1 semen interea perficitur. Et hæc quæ de loco & tempore de hoc Verbasco dicuntur, aliis subsequen- tibus Verbasci speciebus quoque debentur. Anno 1595. mense Augusto & Septembri colui Verbasum vulgare flore magno planè niueo in horto Ill. E. C. Montb.

Recentiores mollium lanuginosorum Verbasci foliorum decocto, cum dolore promi- nentes hæmorrhoides vtiliter fouent, nam & dolorem sopiunt, & ipsas hæmorrhoides resiccando resoluunt. Flores lutei capillos tingere posse putantur: Eisdem cum exiguo oleo in fimo aliquot diebus maceratos, donec videlicet resoluti fuerint, ad hæmorrhoidum dolores Posteriores commendant. Sunt qui & gestatam radicem comitialibus prodesse rentur, præsertim eius, quæ nondum flores fecit, quæque collecta fuerit Sole Virginis dodecatimorion, Lunâ verò Arietis, peragrante: quod tamen superstitione & vanitate non caret. Verbasci decoctum tollit oculorum ardorem, si eo abluantur. Aqua stillatitia in eos iniecta, lachrymantes exsiccant. Saxonum rustica plebs vritur aridis Verbasci caulibus in Naphtham iniectis ad nuptiales faces.

Verbasum maximum meridionalium, odoratum, duplex, luteum & album.

Excellit maximus odoratus meridionalium Thapfus barbarus vt magnitudine foliorum

Locus & Tempus,

Descriptio sic etiam odore suavi, omnibus Verbasco: varietas tametsi tantum videtur descripti communi.



Synon.



Locus.

Verbascum crispum & sinuatum.



Descriptio.

Philomi: florib. quippe luteis & interdum albis exit senis foliolis: quæ arantur rubris lineolis odore suauissimo, folio longiore, latiore: radice crassa, nec aliubi dissimilis tota planta. Hæc in Adu. Lobelius, qui in Icon. Plant. p. 960. vocat maximum odoratum meridionali Tapsum barbaturæ feminam flore albo: Item p. 561. Verbascum maximum album flore subpallido.

In Belgicis & Gallicis Northmannis hortis alitur. Pedimontani verò agri, Narbonæ, Angliæ, & Italiæ, occurrit passim in campis.

sunt continua, amplexantia: flores parui, lutei; Blattariæ floribus non absimiles, caduci, in quinque segmenta laciniati, staminibus totidem villosis purpurascens, medium occupantibus apicibus troceis. Non placent pili longiores, qui huic Verbasco appingi solent.

Matth. in post. comm. Verbascum aliud foliis Papaueris corniculati. H. Lugd. p. 1302. Verbascum laciniatum Matthioli. Dod. Verbascum filu. tertium. Camer. apud Matth. germ. Verb. folio Papaueris cornuti. Tabern. Verbascum filu. saluifolium fruticosum, lignosum: Ic. Plant. Verb. sylu. saluiflorum laciniatum. C. Bauh. pin. Verbascum 4. (2. phyt. siue nigrum folio Papaueris corniculati.

Nusquam hanc speciem obseruauimus nisi Locus & Monspelii, ubi Autumnopassim floret. Gener. Tempus tamen Cherlerus plerumque secus vias in Italia obseruari retulit.

Verbascum angustifolium ramosum flore aureo, folio craspiore.



Locus.

Descriptio.

PVlchrum hoc Verbascum communicauit Agerius, collectum, ut ait, in Austria, foliis dodrantalibus, uncias duas & semis latis, spissis, albis, veluti lanugine puluerulentâ obductis: caulibus quantum ex portionibus datis iudicare possum, ramosis, ut in Verbasco flore albo minore: floribus aureis,

minoribus quam in vulgari.

An Verbascum Lychnite Matthioli? An Verbascum angustius Dodonzi?

C. Bauhinus, ut alibi apparet, Verbascum Lychnite Matthioli ad aliam plantam refert: item & Verbascum angustius Dodonzi.

Inquirendum quale Verbascum intelligat Franc. Indix de Gutter, & an sit nostrum angustifolium hic descriptum, vel aliquod aliud. Sunt quidam (inquit lib. 2. cap. 3.) qui summis laudibus Verbascum, folia angustiora habens extollunt, dicentes, id si tritum & loco affecto fuerit impositum, intra paucas horas ita dolorem tollere, ut facultatem ambulandi restituat. Experimentum neque difficile, neque periculosum est ac propterea securè tentandum.

Verbascum puluerulentum flore luteo paruo.

TOrum densissimo vndiquaque palmis candicante, inferius tamen copiosiore quam superius, obductum est, sed qui facile desadatur. foliis florum calycibus caulibusque relictis viridantibus: surgit vero caule sesquicubitali, ac etiam maiore, recto, striato, duro, fractuque conrumaci, medullam albam continente, per quem folia palmaria & sesquipalmaria, latitudine fere palmari, rugosa, acuminata, obiter in ambitu serrata, grauis li fricentur odoris, sapore herbaceo cum

Descriptio.

eum tantillo amarore: superior caulis pars in-
numeras edit propagines, foliis parvis vestitis,
numerolis floribus onustas, pediculo breui nixis,



colore ante-
quam explicetur, partim luteo partim candido, propter pulvisculum, sub quo latet, qui expansi, Verbasci vulgaris floribus respondent, sed quadruplo minores, lutei, quinquepartiti, duobus foliis superioribus minoribus, reliquis tribus maioribus, in quorum medio apices quoque luteoli, odore

nullo insigni: radix longa, crassiuscula, interius albicat, exterius tantillum rubet, sapore amaro.

Matthiolus passim in comm. pro sua consuetudine picturam exhibet Verbasci secundi titulo, sine ulla tamen descriptione, nec annotatione loci, ubi observavit. Ea mihi videtur non male quadrare Verbasco huic puluerulento.

C. Bauh. phyt. Verbasum 2. (2. in Pin.) siue mas angustioribus foliis, floribus pallidis, Verbasum 2. Matth. Lac. Cast. & Hist. Lugd. p. 1299. Verbasum silvestre maius Loniceri. An Lonic. Verbasum secundum?

Locus &
Tempus

Montebelgardii inuenitur florens Iunio & Iulio intra moenia, à porta Granier ad portam prope Castellum.

Verbasum flore albo paruo.

Descriptio



Horiundum natalibus, nec facie multum diuersa ex Verbasco luteis cognoscendum: radix compar & caulis alis concavus, lanuginosus: Verum folia inferne tantum incana illa lanugine pubescunt, supernè verò, si tenella illa & exigua floribus appollita excipias, glabra ex atro virefcunt, acuminata: flores verò parui, in alis digesti, Ver-

basci puluerulenti modo, colore albo, foliorum numero ludetes, quippe quos in eodem ramulo, imò ex eodem puncto ortos, constare modò senis, modò quinis foliolis, cernere contingat: stamina hirsuta buxi sunt coloris, apicibus minutis.

Lob. Adu. Verbasum femina albidis floribus.
Tom. III.

bus, senis foliolis diuisis, alioqui mari folio consimili & pari. Obs. p. 303. Verbasum femina, floribus albis, & caule summo alis multifido, nū Blattaria Pliniana? Hoc enim mirè capiuntur, & in eo videntur blattæ. Floribus luteis duntaxat ab hoc diuersum visitur. Icon. Plant. p. 552. Phlomos mas alter, Verbasum femina Lychnite Matthioli: Item, p. 563. Blattaria flore albo, perperam Verbasum femina vulgò. An L. belius perceperit quid scriberet de Verbasco, valde dubito.

Nec figura autem, nec descriptio Verbasci candidi femina Fuchii placet, licet eam iam sculptam ponamus. Sed nec figuram, nec delineationem Verbasci albi femina Loniceri approbo.

Trago vocat Verbasum tertium silvestre, radice & caule secundo generi [i.e. nigro] haud dissimile: foliis candicantibus, modicaque lanugine harentibus: floribus planè candidis, odore gratiis. C. Bauh. pin. Verbasum 5. (7. in phyt.) inie Lychnite flore albo paruo, Verbasco lychnite Matth. Lac. Tabern. & Gerardi: Verbasco candidum femina, albo flore Dod. gall. Lugd. pag. 1300. & Anguillara. Verbasum femina Lob. in Adu. Obs. p. 303. & H. Lugd. p. 131. Verbasum 4. Cxf. & Eyst. Phlomos mas alter Lob. Icon. p. 562. Phlomos lychnitis Matthioli, Hist. Lugd. p. 1303. Verbasci tertii altera species Castoris. Item, Pin. & phyt. Blattaria 22. siue alba, Blatt. fl. albo Lob. Ic. p. 563. Camer. Eyst. Hoc variare dixit flore paruo, eoque albo, vel viridi, vel viridi purpurascente, & magno flore, quare hanc vocauit Blattariam alteram.

Tempus

Quotannis se propagat semel satum ex semine deciduo: primo anno caulem non fert, sed folia per terram sparsa: caule productio perit.

Verbasum nigrum flore paruo apicibus purpureis.



Radix Verbasci vulgaris, ut & caulis, non minus altus, brachiat, striatus, purpurascens, minus hirsutus: folia minora, rariora, alternatim posita, pediculis rubicibus duas aut tres uncias longis appenduntur, scetida, at vitentia, minus villosa, leuiter crenata, flores sic & crebriore pares, sed minores, saturatiore

Descriptio

Croco tincti, Blattariae vulgaris, purpurantibus staminibus, quinis, vill. sis: semen ut in vulgari.

Trago Verbasum alterum, nigrum. Dodon. Verbasum tertium, nigrum: Is describit, sed pulchram notam in floribus omisit. Pingitur satis commodè à Fuchio pro Verbasco quarto, cognominaturque silvestre, & Blattaria quorundam: non describitur. Lonicerus etiam vocat

Verbascum siluestre, & duas eiusdem herbe figuras ponit, nec in descriptione vllum discrimen statuit, præter magnitudinem: facit quartum & quintum. Matthiolus Verbasci tertii in commentariis nullam facit mentionem, ponens tantum figuram.


C Bauh. Pin. Verbascum 7. [5. phyt.] siue nigrum flore ex luteo purpurascens: Verb. nigrum Tragi; Dod. Lob. Ic. Tabern. & Gerardi: Verb. 3. Matth. Lac. H. Lugd. p. 1299. & Castoris. Verb. siluestre Fuchsi, Gesn. hort. & Turneri: Verbasco. silu. minus Loniceri: Verb. nigrum. saluifol. purpureo flore Lob. Obs. Verb. nigrum latifolium, Thalii: Blattaria Plinii, seu Verbasco. nigrum Eyst. Flore variat: alterius ex citrino purpurascit: alterius ex flauo candidus est: albi flore prorsus candido reperitur.

Locus & Tempus.

Præter Brabanticis, sabulosisque & herbidis, atque in Francia & Anglia, Iulio & Iunio sponte prouenit. Basileæ & Montbelgardi frequens est.

BLATTARIA LVTEA.

Descrip:



Fleum tol-
lit caulem
& rectum alti-
tudine inter-
dum humanâ,
lenem; crassi-
tudine pollica-
ri; densissimo
ramorum sti-
patu frutican-
tem: in quibus
alternatim po-
siti flores Ver-
basci ex pedi-
culis hirsutis,
vnciâ longio-
ribus, flauis, sed
saturatius, sic
ut nonnihil ru-
bilantis rubo-
ris sit affusum,
vnguibus in-

trinsus lanugine villosa purpurascens, stamini-
bus simili: et lanuginosis, apices miniatos sus-
tinentibus, nonnihil odoratis: succedunt semina
nigra in vasculis Digitalis. ex vertice stilum pro-
ferentibus: cæterum vniuscuiusque floris pedicu-
lo appositum est folium acuminatum, vnciam
circiter longum, aut maius: reliqua autem folia
quibus multis scæter, Verbasci sunt, angustiora,
atro-virentia, & superius splendentia, nullâ la-
nugine donata, in ambitu laciniata, odore ingra-
to. Radix Napi figura, alba, sapore hescio quid
aromatici respiciente.

Blattariam Eur. Cordus Verbasci speciem fe-
cit, foliis tamen non ita hirsutis, sed viridioribus.
Tragus depingit & describit sub Blattariæ ti-
tulo, appellatque flein wülfräut/h.e. Verbascum
exiguum seu Verbasculum. Blattariam Plinii esse
concludens.

Fuchsius Blattariam nominat, & Verbascum
sic mentiri ait, ut pro cosæpiis ab imperitis de-
cerptur, esseque non paucos herbarios, qui de-
cepti eam inter Verbasci genera connumerent.
Sed cur non plantam tantæ cum Verbasco simi-
litudinis inter Verbasca connumerent? Vt,

quod sentio, verum fatear, in Blattaria similiter
dinem quandam video cum Verbasco, sed non
tantam quæ fallere possit: quæ occasio, ut
dubitem an Blattaria vulgaris sit Plinii. Illud
etiam considerandum, an nostra Blattaria abie-
cta blattas contrahat. Nolum igitur cum Trago &
Fuchsi Blattariam Plinii concludere, licet &
Matthiolus cum illis sentire videatur. Credo,
inquit, quod non aberrant, qui sibi in animum
inducunt, Blattariam Plinii, & Verbascum illud
Dioscoridis, cui flores insunt aurei, vnam & ean-
dem esse plantam. In post. comm. eadem repetit,
additque Verbasculi, Blattariæ Plinii, Dioscori-
dem & Galenum non meminisse. Sed quis non
animaduertit Matthiolum sibi contraria di-
cere?

Anguillara vult Blattariam tradi à Dioscoride
pro specie Verbasci, folia habente similia Papa-
ueri corniculato, qua in re hallucinatur. Nos
censemus Dioscoridem Verbascum crispum illis
verbis assignasse.

Lonicerus inter Verbasci genera Blattariam
depingit & describit. Dodonæo Verbasci nigri
species quædam apparet, quam cum posteriori
ætate Blattariam appellat: atque eam esse, sed
temerè, existimat, quæ à Plinio lib. 22. cap. 9. de-
scribitur. Lob. sius in Obs. contraria scribit: vul-
garem Blattariam in Brabantia perennare dicere:
& postea annuam esse plantam. Camerarius a-
pud Matth. germ. Blattariam hanc flore luteo ad
Verbascum nigrum referendam ducit. Sed &
Gesn. hort. Verbasci nigri speciem fecit. Val.
Cordus Verbascum nominat leptophyllum: Cæ-
salp. Verbascum nonum: Blattariam, ut patet,
Trag. Matth. Anguill. Fuchsi. Dod. Gesn. hort.
Lon. Lob. obs. p. 304. Cast. Tabern. & Gerardus:
Blattariam Plinii in Icon. Plant. p. 364. Lob. Eyst.
Blattariam flore luteo: C. Bauh. phyt. & pin. Blat-
tariam i. siue luteam folio longo laciniato. Is
duplicem tradit: alteram quatuor cubitorum,
tria, quatuor, quinque & plura vascula coniu-
cta habentem: alteram humiliorem, singula vas-
cula proferentem, foliis multo viridioribus.

Germani plerique Goldesniopfle nominant;
alii tamen, qui ad Rhenum præcipue habitant,
Schabenfräut & Mottenfräut: Brabantii Motten
crüyt/blattarie: Galli Herbe aux mittes, Her-
be venimense, & Blattare: Hung. Penuz siu.

In hortis Germaniæ, ut Montbelgardi in hoc
Ill. E. C. & Argentiniæ in Frid. Meiseri, observa-
ui: se ex semine deciduo propagare, & caule flo-
reque sequenti anno productis, primum perire.
Sed & passim pluribus Italiæ, & Germaniæ vtriusque
locis, iuxta aquarum margines, in lutosis agge-
ribus, & haud longè à flumini ripis prouenit.
Floret à Iunio mense in Septembrem vsque: se-
men interea perficitur.

Blattariæ folliculos, monente Trago, in qui-
bus semina includuntur, inaurare solent puellæ,
coronisque suis & sertis inferere. Cum autem
herba, scribit Matthiolus, gustu amara depre-
hendatur, hinc certò colligere licet, quod eadem
& aperire & abstergere possit. Dodonæus testa-
tur esse calidam & siccam, id quod ex sapore ut &
& amara gustabili qualitate colligit.

Blattaria flore albo.

Qua in re differat à lutea nondum annotauimus,
præterquam in colore floris, qui albus est,
& externè violacei quiddam habens, apicesque
inter-

internos capitulis luteis. Argentinz in horto Frid. Meieri collegi semen, quod Montbelgardi in horto Ill. E. C. terræ credidi, vnde plantam habui.

Blattaria magniflora.

Synon.



Hanc Camerarius apud Matthiolum germanicum ad Verbascum nigrum refert, vocatque Blattariam pulchris albis floribus nuper ex Italia illatam. Lob. in Icon. Pl. p. 554. Blattariam magnifloram. C. Bauh. phyt. Blattaria sive maxima flore: Idem Pin. Blattariam sive maxima flore.

Blattaria flore caruleo, vel purpureo.

Blattaria purpurea radix crassa est & longa, succulentaque, cortice obducta rubente, alba medulla intus referta, sapore subdulci: fo-

lis per terram expansis ad Conyzam Matthioli maiorem accedit, non tamen ita villosa sunt, sapore subacido cum aliqua acrimonia: flores & capitula Blattariae vulgari similia fert secundo anno.

Et hanc flore purpureo Blattariam ad Verbascum nigrum refert Camerarius. Blattaria autem flore pur-

pureo dicitur Gesn. hort. Lob. Icon. p. 5. H. Lugd. p. 1105. Camer. & Gerardo. Blattaria purpurea sive quarta C. Bauh. phyt. & Pinace.

Foliis est nigrioribus, non latiniatis, parumque serratis: flos modò obsoleto colore purpurascit, modò nigræ Violæ colore eleganti nitet, quandoque dilutè rubet. Et hanc vocamus Blattariam flore phœniceo. Flore cæruleo purpureoq; floret Iunio & Iulio.

Blattaria flore viridi.

Pingitur hæc à Lobelio in Iconib. Plantar. pag. 565. Blattariae flore viridi titulo. C. Bauh. Tom. III.



Blattaria flore viridi purpurascens.

phyt. hanc sub Blattaria 3. (L. in Pin.) sive alba comprehendit, vocatque Blattariam flore viridi. Hanc Blattariam nusquam mihi videre contigit, nec inuenias ququam qui eam descripserit.

Synon.



Blattaria pilosa Cretica, sive Arctus quorundam.

Ponain descriptione montis Baldi huius plantæ iconem proponit pro Arcto Cretico Belli, qui in Epist. ad Clusium sic vocat, licet, ut ipse ait, legitimus non sit, siquidem neque folia rotunda habet, neque cymino simile semen. sed folia serrata, neconica, verbasco similia, minora verò, & tota lanugine quadam, ut Æthio-

Descriptio



Synon.



pidis folia operta, cauliculi insunt recti, floribus luteis, Verbasco aut Blattariæ similibus, onusti, quibus succedunt pilulæ rotundæ, parvæ Blattariæ similes, in quibus semina parva continentur: provenit inter laxa & super parietes, nomine vero caret.

C. Bauh. in Pinace vocat Verbascum 8. [12. in Phyt.] foliis subrotundis, flore Blattariæ: caulibus cubitalibus, viridibus, rotundis, striatis, leuiter villosis, nec ramosis: foliis inferioribus oblongis, reliquis omnibus subrotundis, parvis, caulem basi sua alternatim amplexantibus, infernè incanis, supernè nigricantibus, ad quorum ferè singulorum exortum, duo minora adiaciuntur, ex quorum sinu pediculi, unus, duo, tres, rariùs quatuor, prodeunt: quibus singulis flos vnicus, luteus, parvus, ex quinque foliis compositus insidet, cuius medio stamina aliquot purpurea, quasi ex caliculo, vt in Blattaria, emergentia insident: hinc vasculum, semen minutum rotundum continens succedit.

Verbascum lychnites Syriacum incanum, summitate Floris Hieresolymitani.

Descriptio



Synon:

Hæc noua planta speciosa differt à Verbasco syluestri Monspeliensi florum ortu & modo: sunt enim Lychnidis siluestris vel Chalcedonicæ, coloris flauis: foliis item angustis, & virgultis quadratis, tomento crasso incanis, & radice lignea, inquit Lobelius, qui in Obl. p. 302. & Icon. Plant. pag. 559. inscribit Phlo-

mon Lychnitidem alteram Syriacam: H. Lugd. p. 1301. Verbascum siluestre folio Saluæ tenuifoliæ Lobelii: C. Bauh. phyt. Verbascum 3. siue exoticum acuto Saluæ folio: Idem in Pin. Verbascum saluifolium tertium.

Chrysogonum.

Descrip:

Dioscorides Chrysogono folia tribuit similia Quercui, atque fruticem esse densum: florem vero Verbasco coronario patem: radicem Rapo æqualem, intrinsecus vehementer rubram. Hanc cum aceto tritam & impositam muris aranei moribus auxiliari.

Plinius Chrysogonon non habet, nec Galen. & posteriores medici Græci eius meminerunt: nec Cornarius habet quod de ipso in mediū afferat, quum sit etiam officinis & Herbariis hodie ignota. Sunt tamen qui Caryophyllatam officinis dictam, itemque Herbam benedictam appellatam, Chrysogonum esse volunt: de quibus iudicent peritiores. De Caryophyllata lib. 30.

Videndum apud Castorem Durantem, vt & apud Rauuolsum quid per Chrysogonum intelligant: Pro Chrysogono proponunt alii Blat-

tariam de qua paullo antè: alii verò Tormentillam, de qua lib. 17.

Chrysogonum Dioscoridis quibusdam.

Chrysogonum Dioscoridis genuinum esse videtur. Altitudinem Leontopetali adsequitur, estque huic caule, floribus, radiceque rotunda [quæ internâ parte rubra est] haud ab-similes. Cauliculi tamen graciliores in terram tepandi & ab origine fili modo renues, in varios ramulos diuisi: quorum extremis flosculi adherent conspicui magis, lutei, densiorisque stipatu positi, quatuor communiter foliolis constantes.



Folia caliculorum dorso adherent gemina utrinque, & ita sibi inuicem opposita, vt crucis figuram positu suo efficiant, atro-virentia, in extremo latiora, dissecta ad instar foliorum Quercus.

Concludit descriptionis author Rauuolsum it. part. 1. cap. 9. item part. 4. Icon. Numer.

19. verum esse Dioscoridis Chrysogonum. Hinc H. Lugd. pag. 28. Append. inscribit Chrysogonum Dioscoridis.

QVÆ HIC SEQVVTVR SVBNEG-tenda sunt CAP. vltimo libri xxxi.

Limonium maius multis, alijs Eben rubrum.



Limonium maius, radice crassa, rubente, gustu adstringente: & in capita quædam diuisa: nati-tur folia inde oriuntur Lapathi minora, leniora, politioraque, minus atra, sed hilari virore tincta: inter hæc caules surgit, pedales, tenues, ramis multis late ductis parulis, per quos ordine con-cendunt flores densi, in imam ferè

partem vergentes, coloris ex albo cærulei, parui, calyculis rubentibus: Semen copiosum oblongum

gum rufescens ex caeruleo, vt notat Lobelius.

Limonium
Matth.
Locus.

Prouenit Limoniū (inquit Matth.) nullis prorsus reclamantibus notis, innumeris serè plantis in paludibus, quæ Timaui fontibus irrigantur, ac etiam Tergestino tractu. Hanc autem plantam Sepalix falsò Behen rubrum appellant, quam si quis diligenter expendit, eam, ni fallor, inueniet omnibus notis Limonio adstipulari: vnde cogetur fateri hanc verum Limonium esse, aut saltè eiusgenus, &c. *Suspicio* autè non fuisse benotum Limonium, cuius iconem exhibet, quandoquidem nullam addit descriptionem: sed tantùm frustra repetit Dioscoridis verba: Prætoris duas icones non parùm differentes proponit pro Limonio, nec tamen discrimen ostendit. Addo, illum omisâ bonâ effigie in Hist. germ. exhibere solam imaginem sui alterius.

Synonyma

Valerianæ rubræ similem pro Limonio missam inferibit Dod. in fol. lat. atque illam cum Limonij descriptione satis respondere.

Herbidus viror, pratensisque & palustres natales Limonio (ita etiam in Ic. Plant. p. 295. & Obf. p. 157. vbi & Behen rubrum Cordi, italicè que Betola saluatica dicitur) nomen dederunt, Lobelio ceste, quasi tu pratensem dicas herbam, aut cum Plinio silustre pratense Blitum, huius quippe etiam videtur, aut species, aut perquam affinis nigra Betæ, quam etiam sistere alium Dioscorides auctor est.

H. Lugd. p. 1024. & Clus. hist. Limonium Matthioli. Camer. hort. Limoniū i. Matthioli: Eid. ad Hist. germ. Been album, Limonium, Vermeiner weisser Been. Tabern. Ic. & Hist. Limonium i. Behen rubrum Cordi: Gesner. hort. Been rubrum, Tripodium Dioscoridis quorundam.

C. Bauh. phyt. Limonium i. siue maius: Eid. pin. Limonium i. siue maritimum maius, Limonium Lac. Cæf. Cast. & Gerardi: Been rubrū, Limonio seu Bistortæ cognata, Gesn. hort. Behen rubrum officinarum, Guilandini.

Locus & tempus.

Difficulus est semine prouenit. Non nisi locis herbidis & vdis maritimisue pratis vidit Lobel. vt Adriaticis & Norbonensibus littoribus, vbi maxima copia. Vbiq; in maris littoribus, præsertim autem mediterraneis, frequentem esse prodit Clusius. Obseruavi ego copiosè prouenientem Monspelij iuxta lacus salfos & mare, florentem mense Augusto & Autumno.

Vires.

Matthiolus ait esse facultatibus Limonij veterum, quas præcedenti capite adscriptimus.

Limonium Matthiolinum.

Descript.


Matthiol. Limonium aliud dicitur perperam Behen rubrum officinarum. Limonium alterum Matthioli H. Lugd. p. 1024 quæ Matthiolum meritò reprehendit [vt & Lobelius] quòd inter hoc & illud non distinxerit, nec monuerit vtrum verius Dioscoridis Limonium repræsentet. Limonium alterum Matthioli non nouit etiam frater. Tabern. Icon. & Histor. Limonium i. Pyrola.

LIMONIUM MINUS.

Facie conuenit cūm Limonio maiore: verūm caules humiliores, strobili non ita caerulei, in album magis inclināt, copiosi: radix eadem dura, rubra, adstringens: folia per terram sparsa, satis crassa, interdum tamen exigua, per extremum rotunda.

Tom. III.

Lob. in Adu. Limonium paruum Narbonense Oleæ-folium (ita etiam in Icon. Plant. p. 295.)



foliis tamen Oleæ minoribus aut Myrti paribus; humi radici proximis. H. Lugd. p. 1025: Limoniū Narbonense paruum, vt & Camer. hort. C. Bauh. pin. Limonium 3. siue maritimum (hæc vox in phyt. ommissa est.) min. Oleæ folio. Jac. Rainaudus misit hominem Phylli Dalechampi, frater C. Bauh. titulo Been lapidei & Tripodij minoris quorundam. Cæsalpino Limonium alterum exiguum: Gerardo Limonium paruum.

Monspelij floret Vere cum Limonio maiore. Frater collegit circa littora maris florētem Maio. Idem annotat prouenire in monte Ceti, sed non excedere altitudine spithamam. Inter scabrosâ littora & rupes montis Ceti & alibi, Norbonæ & Gallo-prouinciæ saxosis, oriri frequentem scribit Lobelius. Difficulus verò est semine prouenire & vix ad florem perducitur testatur Camerarius.

Limonium maritimum minus foliis cordatis.

Ad radicem crassam, lignosam, rufescentem; parūque fibrosâ, folia plurima densa, carnosa, læuis, subrotunda, per terram instar cæspitiū sparguntur, in quibusdam plantis obtusa, nullâque mucrone prædita: in aliâ, in summo sinum habentia, & cordis formam referent. Inter quæ cauliculi plures, inæquales, trium, quatuor, etiam sex vnciarum, teretes, nudi, prodeunt, in plurimos breues & recuruos ramulos diuisi, strobili frequentibus paruis, pallidè rubentibus onusti.

Limonium hæc quintum Casp. Bauhini in pin. primum in prod. siue maritimum minus foliis cordatis, in littorè maritimo, vt circa Massiliam & Liornum, reperitur. An Limonium Oleæfolium aliud fortè?

Limonium maritimum minimum C. Bauh.

Tertia plantula vncias quatuor vix excedit: nam ad radicem oblongam, rufescentem, in summo diuisam, foliola minima, subrotunda, crassa, instar Sedi compacta, inter quæ cauliculi vnciales, paucos strobilos pallidè rubentes vel subcaeruleos sustinentes, exurgunt.

Hoc in insula quadam non longè Massiliâ prouenit, inquit C. Bauh. qui Limonium i. in prod. & 6. in pin. facit.

Limonium quibusdam rarum.

Strubulos producit cubitales, subhirsutos, tribus membranis crispis secundum longum, sagittarum pennatas alas imitantibus donatis, aded vt

LIII 5

angulosi videantur: folia sesquipalmaria, hirsuta, Asplenii diuisurâ, paullo latiora: superiora, quæ per caules, ex eorum diuarcationibus oriuntur, terna ferè, palmum plùs minùs longa, acuminata, Graminis cypereidis aquarici foliis similia, triquetra, rigida: extremis ramulorum hærent nu-



merosi congesti flores, Echii florum modo nonnihil re- curui, coloris cyanei, quorum singuli vnico folio constant crispo, paruo, patulo ore ce- lum spectan- tes plurimum, Scabiozæ His- panicz florum singularibus flo- culis pares, nec ita dissimi- li figurâ: caly- culi vniuscu- iusque floris è pluribus con- texti segimen- tis, lanugine a-

speriuscula horrent: radice est auctore Rauuolffio, oblongâ, extrinsecus fusca, intus rubra.

Synon.

Rauuolff. itin. & Icon. n. 314. Limonii pulchra species. H. Lugd. in app. pag. 35. Elegans Limonii genus: C. Bauh. phyt. Limonium 4. siue foliis Asplenii: Eid. apud Matth. Limonium laciniato folio: Pin. Limonium 7. siue peregrinum foliis Asplenii: Limon. peregrinum Clus. cur. post. Lim. Syriacum Eyst.

Locus.

Cichorizæ globularis titulo ex Creta delatam accepit Imperatus. Ad portum prope Ioppe in Iudæa in pratis humidis obseruauit Rauuolff.

Vires.

Folia, eodem referente, siccandi vim habent iisque in acetiis vescuntur incolæ.

QVÆ HIC SEQVVTVR SVBNECTENDA

SVNT CAPITI VLTIMO LIBRI. XXXIII.

Heliotropio similis aliquomodo.



Deser.

cinereæ, hirsutæ, duobus loculis

Requentes per humum supinos spar- git caliculos, pal- mares & ses- quipalmares, ramis mul- tis brachiatos, tenues: foliis vestitos ex vi- ridi cinereis, as- peris, semunciam angustioribus, oblongis, & per extremum rotundis: flores luteolos, exci- piunt filiqua ob- longæ, in sty- lum desinentes, totidem semina

ruffa continentes: Radix parua lignosa alba.

Ab Agerio in Austria collectum habuimus.

An hæc est planta illa Heliotropio similis, cuius meminit Plutarchus de fluminum & mon- tium appellatione, quam incolæ ad fluuii Hidas- pis portas in tenuissimum puluerem conterunt, & succo æstibus se inungunt, vt sine periculo im- moderatioris caloris euaporationem ferant.

APPENDIX AD LIBRI XXXIV.

C A P. IV.

De Nicotiana viribus & usu.

Folia huius plantæ calefacta & imposita, præ- sens in cephalæa & hemigrania sunt remedium si morbus ex causa frigida aut flatibus ortus sit: sæpiùs verò sunt repetenda donec morbus tollatur: sunt qui caput oleo florum Mali Au- rantii priùs inungant. Idem remedium rigidis ceruicibus, siue *retano*, vtile est, & in totius corpo- ris doloribus ab eadem causa ortis. Dolores den- tum à causa frigida non modò finit, dente priùs deterfo aliquo linteo eius succo delibuto, & fo- lio in pilulam conuoluto, dentique indito, sed etiam, ne corruptio serpat, prohibet. *Pectoris* virtus, tussi veteri, asthmæ & similibus ex frigido humore ortis morbis, foliorum decoctum ex a- qua, & eclegma ex eius decocto, vtilia sunt. Se- rapium è saccharo & foliorum decocto paratum, paucaque quantitate sumptum, purres humores pectoris eiicit. Asthmaticis interdum, eorum fumus ore exceptus auxiliatur: sed necessarias euacuationes præcedere opus est, si mora ferri possit. Sub cineribus calefacta folia, & sordida, non excussis cineribus, calidaque sæpiùs imposi- ta, ventriculo perfrictionibus & flatibus labo- ranti auxilio sunt. Viridia folia alii manibus oleo inunctis confringunt & sic imponunt. *Ventriculi & lienis obstructionibus* atque scirrhis folia pau- xillo aceto intrita, diuque illita & adstricta, vtilia sunt: sed his deinde folia calefacta, aut lineus pannus succo foliorum calente intinctus, singu- lis diebus superimponenda. foliorum defectu, puluis communi vnguento obstructiones ape- riente excipitur, & pars obstructa, aut tumore affecta, diu inungitur. Indicæ mulieres valde com- mendant in puerorum, & etiam grandiorum *stomachi crudis* atibus: nam. ventre inferiore priùs inuncto oleo lucernarum, & foliis sub cineribus calefactis, altero ventriculi regioni, altero tergo- ri, quâ ventriculû spectat, imposita, eas cõcoquunt. & aluum emolliunt, si quoties opus erit, reno- uentur. Latas & teretes ventris *rimas* expellit foliorum succus cum saccharo coctus, & depura- tus, paucâ quantitate sumptus: vmbilico tamen etiam imponendum folium tritum, & aluus dein- de clystere eluenda. *Nephriticis & flatulentis* doloribus folia sub cineribus, vt antea, calefacta, & quàm calidè fieri potest adposita, magnum adferunt lenamen, idem remedium, quoties opus erit, repetendo. Commodè etiam clysteribus iniiciuntur: atque etiam fomentationibus, & em- plastris admiscebuntur.

In *suffocationibus uteri*, folia probè calefacta, & vmbilico, uterique regioni imposita, præsens ad- ferunt remedium: quod si (vt fit interdum) animi deliquium subsequatur, fumus illatum naribus obiciatur, illicd liberabitur: quod remediû In- dicis mulieribus aded vulgare est, vt ea de causa Tabaci folia diligenter adseruent & magnificat.

Sunt

Sunt verò qui odorata vmbilico prius admonet, deinde solum superimponunt. Maxime autem conferunt aut Tacamahaca, aut Oleū de Liquidambar, aut Balsamum, aut Caranna, aut ex his omnibus emplastrum constans, & in vmbilico assidue gestatum. *Arcticus* doloribus (modò humores frigidi sint, vel saltem non nimium calidi) efficacissime folia calida adhibetur, aut eorū succo calente pannus lineus intinctus: etenim humores resoluunt & digerunt, ideòque etiam tumoribus edematosis, foliorum succo calido prius elotis, vtilissime imponuntur. *Perniones* sanare, si ter aut quater huius plantæ foliis fricentur, deinde pedes & manus aqua calidā cum sale abluantur experientia docuit. *Venenis* & toxico perniciosissimo, quo Cannibales suas sagittas illinunt, resistere paucis ab hinc annis experti sunt nonnulli: nam ante sublimatum vulneribus inspergere solebāt. Eodem modo venenatis pestiferisque *carbunculis* imposita crustas inducunt, deinde curationem adferunt: & ad istius morsusque virulentorum animalium præsens sunt remedium. *Recentibus* vulneribus imposita, illicd sanguinem sistunt, eaque glutinant: si maiuscula sint, vino prius eluentur, & labiis vulnerum coniunctis, succus foliorum inspergetur, & ipsa folia trita supra vulnus alligabūtur: postmodum reliquique subsequenibus diebus idem ordo seruabitur, victusque ratio necessaria. Vetera vlcera, gangrenasque succus instillatus, & folia trita imposita detergent, curant, & ad cicatricem perducunt, purgato videlicet prius corpore ex Medici consilio & missione etiam sanguinis, si necessaria sit, facta: deinde obseruatā, quæ conuenit, victus ratione. Porro non modò in hominibus eiusmodi vlcera curare, sed etiam in animalibus ipsa experientia docuit: nam per vniuersam Indiam frequentia vlcera vacas, boues & alia animalia infestant, quæ facili ob regionis humiditatem extremam putrescunt, & vermibus scatent: quibus solebant inspergere sublimatum, melioribus remediis destituti: sed cum magno isthic veneat, plerumque quoddam vlcerebus inspergebatur, pluitis constat, quàm animal curandum æstimari potuisset. Itaque Tabaci facultates in hominibus experti, illius etiam vsu ad putrida, fetida, vermicibusque scatentia animalium vlcera transtulerunt, atque aded compererunt, succum eius instillatum non modò vermes necare, sed etiam vlcera mundare, deinde ad cicatricem perducere: prodest etiam iumentorū exulcerationibus, ideòque Indi Tabaci puluerem semper circumferunt. Quendam noui narium vlcere laborantē ē quo sanies manabat, non sine cōtagii suspitione: meo consilio instillauit foliorum Tabaci succum, à secunda instillatione multi vermes exciderūt, deinde pauciores, & post aliquot dies sanatum est vlcus: sed quæ erosa erant, non restituta. Illius etiā foliis impetigines, & capitis scabies vtiliter confricantur. Hæc est celebrata illa Indicis Sacerdotibus planta, quā vti solebat ad responsa danda. Etenim apud Indos moris erat, Sacerdotes de bellorum euentu, aliisque magni momenti negotiis consulere. Consulens, Sacerdos istius plantæ folia sicca vtebat, & eorum fumum tubulo seu cannula quadam in os excipiebat, deinde quasi in extasi quadam raptus, cadebat, omni motu priuatus, sicque permanebat aliquandiu. Discussā eius fumi facultate, ad se redibat, referebatque se negotium cum dæmone contulisse, & responsa, dabat ambigua, vt, vt cunq; euentus succederet.

Tom. III.

illis facili persuaderet, sic se prædixisse: eoque modo barbaros illos homines miserè decipiebat. Ceterum, vulgus etiam Indotum cum fumum per os & nates recipit animi gratiā, cum insomnia videre interdum, & extra se quasi rapi cupit, tum etiam de suorum negotiorum euentu, ex insomnia, quæ apparuerint, pronūciaturum. Nam vt impostor est diabolus, herbarumque facultates nouit, illos huius virgæ edocuit, quod apparentibus eiusmodi insomnia, miseris hominibus imponat. Sed & oneribus ferendis, aut aliis laboribus defatigati, Tabaci fumum hauriunt, & illicd, quasi mente alienati, corrunt: excitati verò, se resocillatos eo sōno, & vires recuperatas sentiunt. Vfus est etiam Tabaci apud Indos, famis sitisque sedandæ gratia, hoc modo. Conchyliis quædam cochlearum stauitilium vrunt, deinde atterunt calcis modo, huius & foliorum Tabaci æquas partes sumunt, manduntque, donec ex utrisque massa quædam fiat, quam in pilulas Pilo maiores formant, atque in vmbra siccata in vltu reponunt. Facturi iter per desertum, vbi neque cibum neque potum, inuenturos se putant, harum pilularum secum delatarum vnam inter labrum inferius & dentes reponentes, eius liquorem assidue sorbent, quā absumptā aliam reponunt, atque item aliam, donec peregrinationē triuāā interdum, aut quatruiduanam absoluant: istaque ratione, toto illo tempore neque simē sibi molestam esse, neque sitim asserunt: cuius causam esse puto, quod sorbentes assidue pilulas illas, etiam humores pituitosos, è cerebro eliciūt qui deglutiti, & in vtriculum demissi, naturalem eius calorem humectant, sed ab eo tandem absumuntur, aliorum ciborum defectu: vt in multis animalibus obseruare licet, quæ tota hyeme in suis latibulis se continent sine alicuius alimenti copia, quia color naturalis occupatus est in pinguedine absumenda, quam æstatis tempore collegerunt. Et hæc sunt quæ de celeberrima hac planta Tabaci eiusque facultatibus narrat Monardes simpl. hist. cap. 14. Mirum esse addens est quā insignes & varæ Tabaci facultates singulis adhuc diebus deteguntur. Ceterum cum calidam & siccam secundo gradu concludat, de sicca, nō de calida intelligendū ait Camer. Sūt qui folia singulis diebus manē ieiunio mandu iubent, vt podagrā liberentur, quia multam pituitā in os attrahat, eamque in partes inferiores defluere prohibeat. Herba (vt refert Io. Maria Bonardus) pedibus adalligata facit torpescere serpentes. Quidam referebant se expertos, aduersus herpetes quos Galli *darrres* vocant, & aduersus achorea. Vtuntur etiam huius foliis apud Belgas plerique aduersus scabiem, cutisque scedates, & ad vulnerum curationes. Calidis verò & robustis corporibus tantummodò adhibenda, sunt qui sentiunt. Debilibus siquidem ac senibus non fore tutum horum vsum. Atque hanc, vt videtur, ob causam, à Petun herba mulieres [quod ait Theuetus] in America abstinent, neque villo vtuntur modo. Mattonæ Viennenses, nobiles, præsertim rei herbariæ studiosæ, foliis eius recentibus, aut in vmbra siccatis, & stillatitio eorum liquore vitreis organis extracto, & vnguento ex eius foliis parato, frequenter vtuntur ad vlcera antiqua, putrida, maligna, gangrenas, scabiem, impetigines, lichenes, oculorum nebulas, cutis, facieique maculas, felici cum successu, multisque miseris rusticis auxilio sunt. Quin & stillatitium liquorem asthmaticis conducere, experientiā comprobaturum

LIII 4

esse scribit Car. Stephanus. Adquoslibet morbos è frigido ortos, dolorève abigendos, Panacis olim decantatissimæ more, succus hodie melle excipitur, vel cum stillaricta & saccharo syrupus conficitur, qui cochlearis mensura asthmaticis orthopnœisve medetur.

Petum Indorum [verba sunt Gillenii] hodie non in usu solùm, sed & abusu est. Et certè non tam quia salubre, quàm quia nouitate aliqua blanditur, sumitur ab omnibus indifferenter & immodestè. Ast indicatum est ex Hippocrate, qui vult rectè mederi, eum oportere humidum per sicum, sicco per humidum, calido per frigidum, frigido per calidum opitulari. Hi ingentem committunt errorem, qui omnibus naturis laborantibus, eodem succurrunt remedio. Calidi omnes non sumus, nec frigidi omnes: sic nec omnia calida remedia, nec frigida omnia iuuant.

Calida autem herba Nicotiana est, quæ gustu madet & seruet in ore: cuius folia vino calente imbuta, cutem, dropacis instar, exulcerant: cuius fumus & ipsa quoque masticata herba pituitam incidit, funditque: quod certè non fieret, nisi calefaciendi illi foret auctoritas. Hinc quibus prodest, facillè diuinabis: nimirum catarrhosis, & continua destillatione laborantibus. Nunc his quoque, qui ad Solana & Hyoscyamos referunt, satisfaciendum est. Neutrius enim facultates habet: Errant igitur, si ad vires: sin ad externam faciem spectent, danda aliqua indulgentia est: nam Hyoscyamum tota æmulatur planta. Sed nescio, an idèd facienda Hyoscyamus sit. Cur non sui generis herba?

Porro, sicum Tabaci folium, Palmæ conuolutio folio, aut tubulo inseritur: deinde illo vna à parte accenso, per alteram fumus nidorque vrentis, patente ore natibusque excipitur: dolorum ita lenimenta: famis, siutque obliuionem: & hilaritatem quâdam initio, post largiore usu ebrietatem etiam, veluti à meracissimo vino, adfert. Expurgari verò & eo modo multos per os, aiunt humores, ac cerebri superfluos absumi.

Plura qui vult, petat ex Raphaëlis Thorsij hymno de Tabaco, & Michaelis Neandri Tabacologia.

APPENDIX AD LIBRUM XXXIV. CAP. VII.

Elleborus niger siluestris adulterinus, etiam nieme virens.

Descriptio



Planta est cubitalis odoris virosi, radice fibrosa, obliqua, cortice subnigro, nonnihil cum acrimonia leui amaricante, lignosam & duram medullam obducete, caule tereti, quæ inuestit primum cortex mixto curo virore rubellus, alter pallidè virescens, cui subest caulis lignosus, copiosam medullam

viridantem complexus: folia pediculis palmarib- appensa, densissimo stipatu caulem ambiunt, in tria, quinque, sæpius nouem, folia subdiuisa, longa, striata, atro-virentia, in ambitu serrata, nullis interdum crenis incisa, dura, rigida, neruo per mediam lōgitudinem valde conspicuo decurrente, à quo vtrinque in latera obscuriores venulae prodeunt: at superiora folia, vt in pauciores portiones sunt diuisa, ita & latiores sunt tum portiones ipsius folij, tum pediculus: ex aliis prodeunt ramuli multi dilucè virentes, ob mollitiem floris ponderi imparem deorsum reflexi, paucis foliis pallidulis, paruis, integris, donati, quib. insident flores singuli, bini, terni, quaterni, ouales ferè, nec ita vt in Helleboris expansi, ex pediculis semipalmaribus, quadrantalibusue, ex foliis quinis herbaceis, extremà orâ, cum se magis explicant, rubente, striati, compositi: in medio stamina plurima, capitello sulcato, exalbida, extra quæ intra floris calathum quatuor, rariùs tres aut quinque, ceu tubuli concaui, magis virentes, breuiorèsq. quàm stamina oris simbrati, leniter interdum purpurantib.: penitissimum floris meditullium occupant cornicula, Aquilegiæ vel Hellebori, bina, ternæue, tuberculo innixa, in quibus semen.

C. Bauh. phyt. & pin. Helleborus niger 1. siue sætidus, Enneaphyllon Plinii, quod longa folia nouena habere videtur: Pedicularia sætida 3. Tragi: Elleb. niger filu. adulterinus Tragi, Fuch. & Lugd. Lycostonum 1. Dod. gall. Consiligo, Ruell. Gesn. hort. Lon. & Gerardi: Consiligo filu. Turn. Pulmonaria Vegetii, Gesn. hort. Helleborus niger alter, vel Helleborine maior, Cordo hist. Veratrum nigrum 2. Dod. Clot. hist. Sesimoides magnum Cordi, Lob. Ic. Plant. p. 680. Helleboraster siue Consiligo Aconito propior in Adv. Helleboraster maximus Obs. p. 387. & Gerardo: flore & semine prægrandi Ic. Plant. p. 679. Helleborastrum magnum Tab. Enneaphyllon Plinii Cæsalpino.

Magnitudine variat: hinc Helleborastrum magnum & minus, Tabernmontano: At Gerardus sub Consilagine Ruellij, & Helleboro maximo proponit. Et hæc C. Bauhinus, qui Ellebori præsentis alteram speciem, quam Clusius Veratrum nigrum 4. peregrinum intitulat, in pin. Helleborum nigrum 3. siue hortensem alterum cognominat.

Lugduni abundat, florètque mense Martio au bois de la bonne Alemande. Floret aliàs Ianuario, Februario, Martio & Aprili: semen maturat Iunio. Nascitur in Germaniæ ac Belgii montibus asperis & petrosis: floret circa Ver & ipso Vere.

Hanc herbam internis corporis partibus adhiberi non dehere: sed ab illa cauendum, tanquam à pestilentissima herba tradit Tragus. Dod. gall. qui Lycostonum primum facit, venenatam qualitatem ei quoque tribuit.

APPENDIX AD LIBRUM XXXIV. subnectenda eius

CAPITI XIX.

Lathyrus siue Ciceris minor.

Adnotat, quam & ipsam pediculari vocant, & inter Tithymalos reponunt aliqui auctore Dioscorido

Descriptio

Dioscoride, *caulem* producit cubiti altitudine, digiti crassitudine, vacuum: in cuius summo sunt alae: *folia* in caule quidem oblonga [ἐπὶ τοῦ ἱμαθίου] sunt, similia foliis Amygdalæ, sed latiora, læviora [καὶ ὁμαλότερα vet. cod. Lac.] in summis autem ramulis longiora [μακρότερα. Ruell. legendum censet μικρότερα minora] velut Aristolochiæ aut Hederae oblonga [ἐπὶ τοῦ ἱμαθίου] folia: fructum habet in summis ramis triplici loculo distinctum, rotundum, velut Capparim: in quo tria sunt *semina* membranis distincta inter se, rotunda, Eruo maiora, quæ decorticata cædida sunt & gustu dulcia. *Radix* est tenuis [καὶ λευκή, vet. cod. Lac.] inutilis. Totus autem frutex succo plenus est, velut Tithymalus.



candida, dulcia, facilia purgatu. infra citantur.

Lathyris [inquit Plin. lib. 27. cap. 11.] folia habet multa, Lactucæ [Lactucæ maxime legere, i.e. Tithymalo] similia, tenuiora [multum læviora] germina multa, in quibus semen tuni- culis continetur, ut Capparis: quæ quum in- tueri, eximur grana Piperis magnitudine, Galeni verba

ginibus occurrit. In Hetruria frequentissima nascitur & apud insubres. Camerarius scripsit v- bique suâ sponte ad Rhenum pullulare. Ego multa loca Rheni inspexi, verum mihi offende- re nunquam licuit. Floret Aestate: semen Augu- sto & Septembri maturat.

Lathyris, ex Dioscoridis autoritate, nullus radice vsus: grana sex aut septem in cataportio, aut cum Ficis aut Palmulis deuorata aluum pur- gant: sed aqua frigida postea sorbenda: trahunt autem bilem, pituitam aut aquas. Succus Ti- thymali modo exceptus, eundem effectum præbet. Cum gallinaceo aut oleribus folia de- coquuntur ad eundem effectum.

Actuarius grana Lathyris maiora, quindecim: minora verò viginti, iis, qui efficacius purgari cupiunt, mandenda præcipit: iis verò, qui deie- ctionem non desiderant copiosam, iubet, ut in- tegra deuorent, præsertim, si qui sumit malo fue- rit stomacho. Grana, quæ facilia purgati sunt vicena in aqua multa, inquit Plinius, pota, hy- dropicos sanant: trahunt & bilem. Qui vehem- tentius purgari volunt cum folliculis ipsis su- munt ea: stomachum lædunt, ideoque inuen- tum est, ut cum pisce aut iure gallinaceo sume- retur. Lathyridem Galenus ex quorundam o- pinione Tithymali speciem esse dicit, quod & similiter ut illi succum habeat, & eodem modo ut illi, purget, & facultate illis similis sit, præter- quam quod semen gustanti dulce appareat, & maxime purgantem vim habeat. Trago lacteus liquor calidior & acrior est herbâ & semine, quo ab empiricis, mul- ti crudeliter necati sunt. Verum si quis pilos superciliorum & frontis delere cupiat, is oleo lac Cataputæ miscet, fronti- que vel superciliis illinat sub Sole, ita tamen ne oculos aut faciem contingat lacteus ille succus: nam ea partes ubi hoc lacte infectæ fuerint, continuo inflantur ac rubescunt, ita quidem, ut lepræ spe- ciem præ se ferant. Idem succus concavis den- tibus inditus, dolorem illorum tollit, sed danda est opera, ut gingiua cerâ rubeâ muniatur. Adu- rit enim succus ut aliorum Tithymalorum, erodit, exest. Quare in superfluis carnibus, ver- rucis & terpigine exterendis maximus illius vsus esse debet. *Fernelius* Lathyræ vires tribuit Ri- cini proximas, eiusque grana haud secus præpa- rat à septem ad duodecim. In eundem quoque vsu tria quatuorve folia ex pingui iure cum oleribus vulgus coquere scribit. *Matthioli* decem duodecimve seminis grana à putami- nibus delibata, iis, qui philtia, aut alia veneficia deuorant, ad vomitum potenter citandum, v- riliter propinari asserit. Lathyris autem pro- priam antidorum esse tradit Hyperici succum, aut herbam ipsam in puluere potam. Tabern. statuit Lathyridem calidam in tertio gradu, hu- midam in primo. *Schwenckf.* ait semen cali- da & sicca esse naturæ, extenuare, menstrua & urinam ciere: paganorum qui philtia sumpse- rint esse medicinam, verum ventriculum valde lædere: & corpus debilitare. Italæ mulieres si- bi persuadent, si quis semina deorsum trahens euulserit, & ea comederit, per inferna purgari: Si verò sursum, per superna. Ab ascite egregie liberare hæc grana experientia edoctus memo- riz prodidit Brassauolus. Cataputæ folia & fructus in stagnum aut lacum proiectos, si pisces comederint, ventrem sursum verrent, quasi mor- tui sint, ita ut manu eos capere possis, quos si in

Dosis gra- nerum A- ctuarii.

Excre- scen- tia.

Foliorum dosi.

Temperam.

Synon.

C. Bauh. perhibet Lathyrum prout adulior vel iunior est, latiora, vel angustiora habere folia, hincque apud Tabern. duas esse figuras. Lathyris, siue maior (inquit in pin.) est Cataputia Brunf. tom. 1. rhap. 41. & Cæsalpin. Lathyris Brunf. in 4. p. 116. Matth. Fuch. Dod. Corn. in Dioscor. Gesner. hort. Turn. Lac. Lonic. Cam. Cast. Lathyris Matthioli Hist. Lugdun. Lathyris Dioscoridis Schwenckf. Lathyris siue Cataputia minor Obs. p. 197. Ic. p. 362. & Trago: Cataputia vulgaris, Tarrago Hispanorum Eyst.

Variet.

Ratione ætatis, latiora vel angustiora folia habet: hinc apud Tabern. Lathyridis latifol. & angustifoliz: apud Gerardum Lathyridis siue Cataputæ maioris & minoris nomine, figuræ exhibentur.

Nomina linguarum

Ædmon Græcis dicitur, Arabib. Mendana, Mē- dena seu Mahendane: germ. Springfraut / Springwurz / Springföner / Springsamen, Treibfraut, Scheißfraut, & Fuchsmilch: Belg. Sprincruyt & Spurgie: Gall. Espurge: It. La- thyræ & Cataputia minore: Insubribus Cacapuzza siue Scalapuzza, quod alui valenter euacuet, vomitionesque eliciat: vulgò Hisp. Tarrago: Angl. Spurge, Nomenclar. Pannon. Nagyob- ch tey.

Yves. Mar- chel.

Figuram Lathyridis Matthioli descriptioni non respondere dixit Turnerus: folia enim non esse Amygdalinis persimilia, neque illis latiora.

In hortis semel sata, semine quotannis se pro- pagat, etiam Hyeme virens: primo anno fructu non fert. In agrorum Anglorum & Galliz mar-

aliam aquam frigidam conieceris, requiescent,
Hollerio teste.

TURBITH VETERIBVS.

Delectus.

DE Turbith ita scripsit Metues lib. 2. cap. 2. de
simpl. purgantibus. Est radix herbæ La-
ctariæ, folia Ferulæ, sed minora habentis. Est au-
tem Turbith quoddam hortense, alterum silue-
stre: Et in his magnum & paruum: Item album,
flauum & nigrum. Locis siccioribus quia lacte est
crassiore, gummosius euadit, & melius. Laudatur
enim gummosum, album, vacuum, arundinosum,
cortice cinereo & plano, recens mediocriter,
fractu facile. Non gummosum autem imbecil-
lum est, ac ventrem conturbat. Malum quoque est
flauum & nigrum, crassum & gracile, cortice
crispo, & dum frangitur intus ceu neruoso, quod
est siluestre. Recens etiam minus viscera contur-
bat, ac euertit: Vetus imbecillum est. Corticibus
extremis liquato gummi illicitis, ipsum quidam
mentiuntur, quod si frangatur, intus gummosum
haudquaquam erit. Calidum est ordine tertio:
purgat trahendo mediocriter, status excitat, ven-
triculum ad nauseam euertentes: siccatur quoque
excrementis etiam tenuibus vacuatis. Corrosum
enim Turbith pituitam crassam, & lentam, & pu-
trem à ventriculo, thorace, neruis, etiam à remo-
tis, præcipue à iuncturis educit. Ob id ad dolo-
res arthriticos vsus eius est: à psora, lepra, baras,
& aliis vitis pituitosis, tum cutis, tum aliarum,
parium: & pituitosis febribus, aut præseruat,
aut vindicat. Hoc autem sumpto, vitabis Au-
strum, & vsum piscium. Purgat tardè & imbecil-
liter, & stomachum ad nauseam subuertit, & vsu
crebro corpus extenuat. Ob id cortex eius ad al-
bum vsque abradendus est. Aeribus autem, vt
Zingibere, sic eius actio intenditur, vt propieta-
te quadam mirabili per id commutatum, etiam à
iuncturis, & his remotissimis & profundissimis
pituitam crassam & lentam extrahat, cum per se
solum tamen pituitam educat, idque tardè. Ne
verò stomachum exagitet, ac euertat, medica-
menta stomachica misceantur, & odorata agita-
tionem eius placatura, vt Mastiche, Zingiber,
Piper longum, Gallia, & Aromatica alia. Ne de-
nique corpus emaciet, oleum amygdalinum, vel
Amygdala, vel saccharum ei miscenda sunt, vel
cum Rufo Pistachia. Iudæus autem Turbith
partem vnā, Zingiberis partem dimidiam, A-
mygdalarum duplum, cum condito, vel siccato
succo Cydoniorum miscet, tanquam purgato-
rium salubre. Hamech verò Turbith partem v-
nā, foliorum Violarum partes duas, Zingibe-
ris partem dimidiam miscet in trochiscos circa
molestiam purgantes. Ioannitius autem, Dacty-
lorum aceto dies duos infusorum, partes cen-
tum, Penidiorum partes quinquaginta, Amygda-
larum purgararum, partes triginta, Turbith par-
tes triginta quinque, Scammonii partes duode-
cim, Zingiberis longi, foliorum Rutæ siccorum,

Temper.

an. partes quatuor, miscet cum melle despumato,
& medicamentum fit mirabile. Sed filius Zazar,
Turbith partes decem: Zingiberis partes quin-
que: Sacchari partes viginti: interdum Masti-
ches drach. tres: aliā alia miscuit, pro variis indi-
cationibus, ad morbos hoc remedio egentes.
Idem quoque Turbith à raso cortice purgatum
succo Cucumeris horas viginti quatuor macerat
& siccatur, fitque siq. valentissimum ad articulares
affectus. Si quam in corpore noxam reliquit,
pota mulsa calente, aut quæ saccharo rubro est
dulcorata, aqua calida eam profligabis. Coctio-
nem & trituram mediocrem sustinet. Datur pul-
uere à drach. vna ad duas: Decocto autem à
drachmis duabus, ad quatuor. *Es haftenus Mesari.*
Aben Mesuæ Turbith est calidum & siccum in *Purgat.*
tertio gradu, & melius ex eo est illud, cuius color
est albus multum, & lene exterius, subtilis liqui,
non habens lanam. Et proprietas eius est laxare *Sapient.*
phlegma viscosum, verum ipsum infert debili-
tatem in animo, propter horribilitatem & abo-
minationem sui saporis. Porro rectificatio Tur-
bith est, conficere cum oleo de amygdalis dolci-
bus, & dosis eius est à drachma vna, vsque ad
duas, & oportet quod detur solum, &c.

Sic satis sufficienterque cum declarata sit Tur-
bith historia, missis plurimis quæ huius loci esse
possent, hic tantum quædam ex Fallopio, sub-
iiciemus: fusiùs fortè alia occasione eius hi-
storiam tradituri. Turbith, inquit, non habet
minorem vim, quàm habet Scammonium, sed
quia non est in vsu succus ipsius, vt est in vsu suc-
cus Scammonii: at est in vsu radix: idcirco vide-
tur habere minorem vim, quàm habeat Scam-
monium. Verum tamen si conferatur succus suc-
co, & radix radici: profecto Turbith non habet
minorem vim quàm habeat Scammonium. Vn-
de aliqui volunt Turbith esse dictum à turbando.
Sed decipiuntur, quia dicitur Turbith ab Ara-
bis quasi Turpethum, sumpto nomine à Græ-
cis recentioribus, & præsertim ab Actuaria, qui
vocat hoc medicamentum nomine Turpethi.

APPENDIX AD CAPVT VLTIMVM libri 40.

HABB HAZIZ ARABIBVS.

LEo Aphricanus hist. lib. 5. scribens de vrbe
Capes edificata per Romanos ad mare me-
diterraneum, recenset ibi esse regionem, quæ
non producat alios fructus, præter fructum sub
terra prouenientem, magnitudine Raphani.
Eum illos sugere, quia dulcis sit, prout Amygda-
lum, cuius saporem nonnihil referat, non tamen
alimentosum esse, & vtilem, vt amygdalum.
Communem autem esse per totum ferè regnum
Thunense: Arabibus vocari Habb Haziz.

Hunc fructum videtur Dalechampsius, qui
Thrah Thunense vocat apud Plinium, ad eius-
dem Mison, de quo capite de Tersez Africano,
referre.

FINIS APPENDICIS TOMI TERTII.






ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

OMNIVM PRAECIPVORVM CAPITVM
QVAE TVM IN PRIMA TVM IN SECVND A PARTE
TOMI TERTII HISTORIAE VNIVERSALIS
PLANTARVM CONTINENTVR

INDEX.

Per pp. donotatur pars prima : per p.2. verò pars secunda , quæ incipit à LIBRO VIGESIMO SEPTIMO.



- Bies & Quercus marina veteribus 802. part. 2.
Abroconoides planta saxea 811. p. p.
Abroconum vulgare 192. p. p.
Abroconum cum pulchris Corymbis 194. p. p.
Absynthis veterib. 164. part. p.
Absynthis marinum veteribus p. 167. part. p.
Absynthis Xantoniscum veteribus 168. p. p.
Absynthis vulgare minus. ibid. 168. part. p.
Absynthis vulgare montanum 173. part. p.
Absynthis arboreus Lobelii. ibid.
Absynthis inspidum ibid.
Absynthis maritimum latifolium siue Matthioli. 174. p. p.
Absynthis Ponticum vulgare folio inferius albo. pag. 175. p. p.
Absynthis species, quibusdam chamamelum chrysanthemum Fuchsi p. 176. p. p.
Absynthis & Ponticum & Romanum quibusdam, aliis ceriphium , & varia de eo sententia pag. 176. part. p.
Absynthis Seriphium tenuifolium Marinum Narbonense pag. 177. part. p.
Absynthis Seriphium Germanicum succulento folio siue Misnicum p. 78. part. 1.
Absynthis Seriphium Belgicum p. 178. part. 1.
Absynthis Valesianum tenuifolium candidum, siue herba alba pag. 179. p. p.
Absynthis Austriacum tenuifolium pag. 79. p. p.
Absynthis Aegyptium quibusdam pag. 182. p. 2.
Absynthis albis floribus , capitulis squarrosis 183. p. p.
Absynthis umbelliferum Matellina quibusdam pag. 183. part. p.
Absynthis Montanum flore Chamamelii. p. 184. p. p.
Acanthium veteribus 54. p. p.
Acanthis leuca, spina alba veteribus 71. p. p.
Acarua flore luteo 91. p. p.
Acarua similis flore purpureo, chamaleon Saluantiensis Clusii 91. p. p.
Acarua affinis Loo sterox flore pallido 92. p. p.
Achyllea millefolia odorata 140. p. p.
Acinus veteribus & in genere 258. p. 2.
Acinus Manardi Matth. calaminta fol. 258. p. 2.
Acinus multis 259. p. 2.
Acini pulchra species 260. p. 2.
Aconitum in genere 647. p. 2.
Aconitum primum Matthioli foliis Dronici 649. p. 2.
Aconitum folio Plarani flore luteo pallescente. 652. p. 2.
Aconitum magnum purpureo flore , vulgò Napellus 655. p. 2.
Aconitum Napello simile, sed minus, caruleum, praeacius 656. p. 2.
Aconitum lycost. Autumnale Napello simile , ibidem.
Aconitum lycost. caruleum calcari magno 657. part. 2.
Aconitum lycost. Napello simile , Neubergerse, foliis latoribus , flore purpureo ibid.
Aconitum lycost. coma nutante, maximum 658. part. 2.
Aconitum Lycost. flore Delphinii. ibid.
Aconitum lycost. flore maximo 659. p. 2.
Aconitum lycost. flore caruleo, galea elatiore, radice bulbosa ibidem.
Aconitum 5. Matthioli effigie alienius Ranunculi vel Anemones 419. p. 2.
Aconitum Racemosum Asiae quibusdam 660. p. 2.
Adarce ex veterum & neotericorum sententia 796. part. 2.
Adiantum Album folio silicis p. 749. p. 2.
Adiantum Nigrum officinarum p. 750. p. 2.
Adiantum nigro similis si non eadem missa pro Capilligno p. 751. p. 2.
Adiantum tenuifolium album Ruta maritima accedens ibid.
Adiantum veteribus 753. p. 2.
Adiantum siue Capillus veneris 759. p. 2.
Adiantum pulcherrimum 760. p. 2.
Aegyptus vel Aegyptus veteribus 298. p. 2.
Aethiops veteribus & in genere 315. p. 2.
Aethiops multis ibidem.
Ageratum veteribus pag. 142. p. 2.
Ageratum plarisque & herba Iulia quibusdam ibidem.
Ageratum purpureum Dalechamp. 144. p. p.
Agriopaslinaca Cresensium pag. 149. p. 2.
Aizoi maioris ortu persimilis exotica planta Lobel. p. 96. p. p.
Alfene verna glabra, flosculis albis, vel potius Linum minimum 455. 2.
Alcyonium Veterum & Neotericorum 818. p. 2.
Alcyonium spongiosum officinarum ibid.
Alcyonium stuposum Imperati fol. 819. p. 2.
Alcyonium tuberosum ibidem.
Alcyonium molle Imperati ibid.
Alga, & de ea, sacro, bryo, & musco, veterum sententia 781. 2.
Alga angustifolia vitriariorum 798. 2.
Alga pomum Monspel. 799. p. 2.
Alga crispa scabiosa rubra & pallida ibid.
Alga Tinctoria 800. p. 2.

INDEX:

<i>Alga angustissimis foliis</i>	801.p.2.	<i>Ananas</i> Linf. bot.	ibid.
<i>Alga cernicornu dimisura</i>	ibid.	<i>Ananas siluestris folio Aloes, fructu Cupressino.</i>	26.
<i>Alga marina porosa</i>	815.p.2.	P. p.	
<i>Alga Mederensis grandi folio</i>	804.p.2.	<i>Anchusa veteribus & in genere</i>	481.p.2.
<i>Alga longissima lato tenuique folio</i>	805.2.	<i>Anchusa minor lign. fior</i>	482.p.2.
<i>Alga longissimo, lato, crassoque folio</i>	ibid.	<i>Anchusa minor lutea</i>	481.p.2.
<i>Alisma Matthioli siue plantago montana</i>	20. p.p.	<i>Anchusa flore albo aut pallido Clusii</i>	ibid.
<i>Alisma Tissani Caroli</i>	519.p.2.	<i>Anchusa Monspeliensis</i>	584. p.2.
<i>Aloe in genere</i>	696.p.2.	<i>Androsamon veteribus & in genere</i>	381. p.2.
<i>Aloes succum</i>	697. p.2.	<i>Androsace Matthioli altera.</i>	368.p.2.
<i>Aloe Americana muricata</i>	701.p.2.	<i>Androsaces veteribus</i>	816.p.2.
<i>Aloe siue Aizoon palustre</i>	793.p.2.	<i>Androsaces Matth. siue fungus petrans marinus, sine</i>	ibid.
<i>Alypum Matthioli Tirhymalis affine,</i>	p.676.p.2.	<i>umbilicus marinus</i>	ibid.
<i>Alypum quibusdam siue Esula rara flore purpureo</i>		<i>Anethum syluestre semine exiguo, Ameos.</i>	7. p.2.
<i>ibidem.</i>		<i>Anethum</i>	5.p.2.
<i>Alysson Plinii foliis Erichrdani</i>	715.p.2.	<i>Anemone hortensis Tragi</i>	401. p.2.
<i>Alyssum in genere veterib. & neoteriis</i>	319.p.2.	<i>Anemone in genere</i>	400.p.2.
<i>Alfina veteribus & in genere</i>	362.p.2.	<i>Anemone latifolia flore flauo I. Clusii</i>	ibid.
<i>Alfina maior repens perennis</i>	ibid.	<i>Anemone latifolia duplo flore flauo II. Clusii</i>	402.
<i>Alfina maxima Fl. Lugdunensis</i>	363.p.2.	P.2.	
<i>Alfina Vulgaris sine morsus Gallina</i>	ibid.	<i>Anemone Italica latiusculis spinosis foliis III. Clusii</i>	ibid.
<i>Alfina plantaginis folio</i>	ibid.	<i>ibidem.</i>	
<i>Alfina maxima Dodon.</i>	364.p.2.	<i>Anemone latifolia ex purpura diluore albicante flore</i>	re IV. Clusii
<i>Alfina corniculata Clusii</i>	359.p.2.	<i>ibid.</i>	
<i>Alfina minima</i>	364.p.2.	<i>Anemone latifolia flore ad carneum colorem tendente, albicantibus unguibus, V. Clusii</i>	ibid.
<i>Alfina tenuifolia</i>	ibid.	<i>Anemone latifolia purpurei fere coloris, unguib. albicantibus Bizantina, VI. Clusii</i>	403. p.2.
<i>Alfina musc. sa quibusdam</i>	365.p.2.	<i>Anemone eiusque species alia varia</i>	404.
<i>Alfina longifolia uliginosis proueniens locus ibidem.</i>		404. & 405. & 406. & 407. & 408.p.2.	
<i>Alfina fatida Fabio Columna Dioscoridea</i>	ibid.	<i>Anemone magna alba plurima parte anni florens</i>	411.p.2.
<i>Alfina fatida quodammodo similis laciniata,</i>	366.		
P.2.		<i>Anemone trifolia flore albo</i>	412. p.2.
<i>Alfina serrato folio glabro</i>	ibid.	<i>Anemone similis planta, semine lato laciniato</i>	7.p.2.
<i>Alfina serrato folio hirsutiori, floribus & losulis canaliculis adhaerentibus</i>	367.p.2.	<i>Angelica fatua</i>	140. p.2.
<i>Alfina oblongo folio serrato, flore caruleo</i>	ibid.	<i>Angelica officinarum</i>	ibidem
<i>Alfina folio profunde serrato, flore purpureo sine violaceo</i>	ibidem	<i>Archangelica</i>	143.p.2.
<i>Alfinae genus Fuchsis folio hederula</i>	368.p.2.	<i>Angelica siluestris magna vulgarior</i>	144.p.2.
<i>Alfina aquis innatans</i>	793.p.2.	<i>Angelica siluestris repens</i>	145.p.2.
<i>Alcith & Anidum veterib.</i>	133. p.2.	<i>Angelica siluestris hirsuta inodora Cass. Bauhini</i>	146.p.2.
<i>Ambrosia veterib.</i>	139.	<i>Anisum veteribus & in genere</i>	92.p.2.
<i>Ambrosia quibusdam</i>	190. p.p.	<i>Anthemides siue Chamamelia veteribus</i>	115.p.p.
<i>Anmi antiquis, & in genere</i>	14.p.2.	<i>Anthyllus duplex veteribus & in genere</i>	373.p.2.
<i>Anmi odore Origani</i>	25.p.2.	<i>Anthyllidis species quibusdam</i>	ibid.
<i>Anmi semine tenuissimo & odoratissimo</i>	ibid.	<i>Anthyllus longifolia, peplos effigie, maritima</i>	374.
<i>Anmi vulgare minus latioribus foliis, semine minus odorato</i>	27.p.2.	P.2.	
<i>Ammoniacum veterum</i>	53. p.2.	<i>Antirrhinum vulgare</i>	462.p.2.
<i>Ammoniacum</i>	54. p.2.	<i>Antirrhinum angustifolium syluestre</i>	464.p.2.
<i>Anacamperos, vulgo faba crassa</i>	681.p.2.	<i>Antirrhinum minimum</i>	465.p.2.
<i>Anacamperos purpurea</i>	683.p.2.	<i>Antirrhinum album serrato folio</i>	417.p.2.
<i>Anacamperos maxima</i>	ibid.	<i>Antirrhora flore luteo Aconiti</i>	660.p.2.
<i>Anacamperos minor, rotundiore folio, semper virens ibidem.</i>		<i>Antrifus Plinii quibusdam, semine longo Cicutaria vel Charephyllis</i>	70.p.2.
<i>Anagallis phoenicea & carulea</i>	369. p.2.	<i>Antrifus quorundam semine aspero, hispido</i>	83.
<i>Anagallis phoenicea, mas</i>	ibidem	P.2.	
<i>Anagallis carulea, samina</i>	ibid.	<i>Aparine</i>	73.p.2.
<i>Anagallis lutea, numularia similis</i>	370.p.2.	<i>Aphyllantes Monspeliensibus</i>	315.p.2.
<i>Anagallis serpillifolia aquatica</i>	372.p.2.	<i>Aphyllanti affinis Scabiosa quinta Clus. Bellidi affinis</i>	
<i>Anagallis aquatica flore carulea, folio oblongo, maior</i>	796.p.2.	P.p.p.	
<i>Anagallis aquatica flore purpurascense, folio oblongo minor</i>	ibid.	<i>Aphyllantes Anguillara, siue globularia Bellidi similis ibidem.</i>	
<i>Anagallis aquatica angustifolia</i>	ibid.	<i>Apios</i>	656.p.2.
<i>Anagallis aquatica flore caruleo, folio rotundiore, minor fol.</i>	797.p.2.	<i>Apios siue Ischas altera</i>	657.p.2.
<i>Anagallis aquatica folio rotundiore maior</i>	796..	<i>Apium quod Petroselinum Dalechampi folio tenui, Apii Hortensis, semine subrubro amaro, radice nigra</i>	19.p.2.
P.2.		<i>Apium siue Petroselinum Macedonicum multis</i>	101.
<i>Ananas Acosta</i>	95.p.p.	P.2.	
		<i>Apium Moncanum siue Oroselinum veteribus</i>	103. p.2.

INDEX.

Apium montanum Dalechampii 103. p. 2.
Apium aliud, seu Orofelinum Sequanorum ibid.
Apium montanum nigrum 104. p. 2.
Apium petraeum, siue montanum album 105. p. 2.
Apium silvestre Dalechampii 106. p. 2.
Apium Selinumque Veteribus & in genere 95. p. 2.
Apium horeuse, seu Petroselinum 97. p. 2.
Apium horeuse magnum, siue Anglicanum quibusdam 99. p. 2.
Apium palustre siue Elioselinum 100. p. 2.
Apium vulgare ingratius ibid.
Apium seu Selinum quod Petroselinum Antiquis dicitur 102. p. 2.
Apium silvestre Dodonai, siue Thysselinum quorundam 188. p. 2.
Apium Cicuta foliis, seu Selinum alterum Clusii ibid.
Aquilegia flore simplici 484. p. 2.
Aquilegia flore pleno 485. p. 2.
Aquilegia flore simplici & pleno non corniculato ibid.
Aquilegia degener ibid.
Arachidna in genere & Aracoides 892. p. 2.
Arbuscula marina coralloides rubra 713. p. 2.
Arenaria 736. p. 2.
Argemone Veteribus & in genere eiusque species varia 396. p. 2.
Ageratum ferulaceum Dalech. 152. p. 2.
Aristolochia veteribus & in genere 556. p. 2.
Aristolochia rotunda eiusque species varia 559. p. 2.
Aristolochia longa eiusque species varia 560. p. 2.
Aristolochia Clematidis eiusque species varia 561. p. 2.
Aristolochia polyrhiza ibid.
Aristolochia Pistolochia altera 563. p. 2.
Artemisia veteribus & in genere 184. & 186. p. 2.
Artemisia tenuifolia siue leptophylla, aliis Abrotonum silvestre 194. p. 2.
Artemisia tenuifolia si non idem Abrotonum inodorum Lobelii 195. p. 2.
Asarina Lobelii flore Hedera terrestris 896. p. 2.
Asparagus & Corruca 738. pag. 2. p. 2.
Asparagus hortensis & pratensis 727. p. 2.
Asparagus marinus 727. p. 2.
Asperula hexaphylla purpurea 734. p. 2.
Asplenium seu Ceterach veteribus & in genere 757. p. 2.
Artium veteribus & in genere, eiusque species 569. & 570. p. 2.
Asa fida nostras officinarum 111. p. 2.
Asarum 548. p. 2.
Asarum muri 541. p. 2.
Ascyron veteribus & in genere 480. p. 2.
Attractylis veteribus & in genere eiusque species 82. & 83. p. 2.
Auriculamaris, siue Myosotis veteribus & in genere, eiusque species varia 358. 359. 360. p. 2.
Auricula leporis in genere, eiusque species varia 100. & 101. p. 2.
Auricula vrsi flore luteo 499. p. 2.
Azarina Matthioli flore Anthemidis 566. p. 2.

B

B *Accaris Dioscoridis Rauhvolffii* 163. p. 2.
Barba Capri 488. p. 2.
Bangué Cannabi simile 449. p. 2.
Batânica planta foliis Helenii 111. p. 2.
Been album officinarum 356. p. 2.
Been albo officinarum similis plaga semper virens 357. p. 2.

Been album Rauhvolffii 356. p. 2.
Bellis minor silu. spontanea 113. p. 2.
Bellis flore viridi 113. p. 2.
Bellis hortensis, siue flore multiplicato ibid.
Bellis siluatica 114. p. 2.
Bellis maior ibid.
Bellis montana seu alpina maior & minor 115. p. 2.
Betonica vulgaris purpurea 301. p. 2.
Betonica flore albo 302. p. 2.
Betonica folio Alpeccatos quorundam 303. p. 2.
Betonica coronaria siue Caryophyllea in genere, eiusque species circiter triginta elegantes 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. & 338. p. 2.
Bifolium maius, siue Ophrys maius quibusdam 533. p. 2.
Bifolium minimum 534. p. 2.
Bistorta maior rugosioribus foliis 538. p. 2.
Bistorta media folio minus rugoso ibid.
Bistorta minima 539. p. 2.
Blattaria, eiusque species varia 874. & 875. p. 2.
Blattaria, eiusque species varia 859. p. 2.
Borrago silvestris tenuifolia 577. p. 2.
Borrago floribus caruleis & albis 574. p. 2.
Borrys veteribus & in genere 297. p. 2.
Borrys plarisque Botaniciis 298. p. 2.
Borrys verticillata ibid.
Britannica veteribus 557. p. 2.
Bubulus marinus crinitus 788. p. 2.
Buglossum veteribus & in genere 523. p. 2.
Buglossum folio Borraginis Hispanicum 577. p. 2.
Buglossum vulgare maius & minus flore utrumque duplici 578. p. 2.
Buglossum similis planta Indica 631. p. 2.
Bunium & Pseudobunium veteribus & in genere 18. & 19. p. 2.
Bunium Dalechampii ibid.
Bulbo-Castanum 30. p. 2.
Bulbo-Castanum Tralliano 29. p. 2.
Buphtalmum Dodonai, aliis Consiligo tenuifolia 637. p. 2.
Buphtalmum Italicum segetum altissimum affine Chamemalo 120. p. 2.
Buphtalmum antiquis 123. p. 2.
Buphtalmum tenuifolium folio millefolii fere 124. p. 2.
Buphtalmo tenuifolio simile Chrysanthemum Valentinianum Clusii 125. p. 2.
Buprestis veteribus & in genere 199. p. 2.

C

C *Cacalia, siue Leontice veteribus & in genere* 568. p. 2.
Cacalia quibusdam 569. p. 2.
Calamintha veteribus & in genere, eiusque species varia 127. 128. 129. & 130. p. 2.
Cali vulgare 702. p. 2.
Cali Arabicum 701. & 704. p. 2.
Cali, siue vermicularis marina arborescens eiusque varietates aliquot 703. & 704. p. 2.
Calcha 101. p. 2.
Calcha flore simplici & flore pleno ibid.
Calcha prolifera 102. p. 2.
Calchamima 103. p. 2.
Calcha palustris 470. p. 2.
Calcha palustris flore multiplicato 471. p. 2.
Calochiemi Carduus Cretensibus 85. p. 2.
Camphorata Mospeliensium 379. p. 2.
Cannabis mas & femina 447. p. 2.
Cannabis silvestris quorundam vrtica inerti affinis 838. p. 2.

- Cannabis filuestris* veteribus *ibid.*
Caput aquila Hyssopi folio, summitate Stachadi 279.p.2.
Carbassus veteribus 450.p.2.
Cardiaca 320.p.2.
Carduus Carlina minor filuestris Clusio flore luteo 84.p.2.
Carduus veteribus & in genere, eiusque species varia circiter triginta sex 42.43.44.45.46. & sequentibus usque ad 96.p.2.
Carlina caulifera sine acaulos 64.p.2.
Carlina filuestris quibusdam, aliis *Atractylis* 81.p.2.
Caros veteribus & in genere 68. & 69.p.2.
Carpesium ex veterum sententia 207.p.2.
Carthamus sine *Cnicus* 79.p.2.
Carthamus sine *Cnicus* fl. caruleo 80.p.2.
Caruifolia 171.p.2.
Caryophyllus arvensis umbelliferus 361.p.2.
Cassia sine *Cuscuta* 266.p.2.
Catanance Dalechampi 26.p.2.
Catanance affinis Sesamoides 27.p.2.
Caucalis veteribus & in genere 81.p.2.
Caucalis species varia 83.84.85. & 86.p.2.
Caucon Ephedra anabasis veteribus 738.p.2.
Cali geniculatum sine *Salicornia* 704.p.2.
Centaureum Collinum Gesneri flore purpureo & albo 32.p.2.
Centaureum collinum, sine lacea spinosa flore luteo 34.p.2.
Centaureum maius veteribus & in genere 37.p.2.
Centaureum maius iuglandis folio 38.p.2.
Centaureum minus flore purpureo & albo 353.p.2.
Centauroides folio glabro, flore stanscente 40.p.2.
Centaureum maius alterum folio integro 41.p.2.
Centaureum maius, sine Rha capitatum folio Enula, subtus hirsuto & imano *ibid.*
Centaureum sine Rha ponticum alterum angustiore folio *ibid.*
Centaureum minus flore purpureo & albo 353.p.2.
Centaureum minus adulterinum, quibusdam Lychnidis viscido genus 355.p.2.
Cerinte veteribus & in genere 601.p.2.
Cerinte quorundam maior versicolore flore 602.p.2.
Cerinte quorundam maior spinoso folio, flauo flore *ibidem.*
Cerinte quorundam maior, flore ex rubro purpurascence 603.p.2.
Cerinte quorundam minor flauo flore *ibid.*
Chaa herba Iaponia 5.p.2.
Chamedrys spuria species varia sex 285. & 286.p.2.
Chamedrys veteribus & in genere *ibid.*
Chamedrys vulgo vera existimata 288.p.2.
Chamedrys spinosa 289.p.2.
Chamedrys montis Sumani *ibid.*
Chamedrys alpina, aliaque Chamedrys species 289. & 290.p.2.
Chamaecissus sine Hedera terrestris veteribus & in genere 855.p.2.
Chamamelum vulgare amarum 116.p.2.
Chamamelum odoratissimum repens flore simplici & flore multiplici 118. & 119.p.2.
Chamamelum aureum peregrinum capitulo sine foliis *ibid.*
Chamamelo affine Buphratum Italicum segetibus altissimum 120.p.2.
Chamamelum inodorum, sine Corula non furida *ibidem.*
Chamamelum furidum, sine Corula furida *ibid.*
Chamamelum furidum maritimum 121.p.2.
Chamamelum mayinum 122.p.2.
Chamamelum Chrysanthemum quorundam *ibid.*
Chamamelum purpureum 123.p.2.
Chamaefilix marina Anglicana 745.p.2.
Chamaeleon albus & niger, aliaque eius species varia 60.61.62.63. & 67.p.2.
Chamaeleon & Chamaepeuce ex veteribus 470.p.2.
Chamaecyparissus 111.p.2.
Chamaepycis vulgaris odorata 295.p.2.
Chamaepycis alia species varia 296. & 297.p.2.
Chamaerops 423.p.2.
Chamaesyce 667.p.2.
Charephyllum 75.p.2.
Chelidonium minus veteribus & in genere 465.p.2.
Chelidonium minus veterum 481.p.2.
Chelidonia 482.p.2.
Chelidonium folio laciniato 483.p.2.
Chribmum maritimum tertium Martiolo 106.p.2.
Chribmum & Batis veteribus 193.p.2.
Chribmum sine Faniculum maritimum 194. & 195.p.2.
Chrysanthemum veteribus 100.p.2.
Chrysanthemum maius, Creticum, latifolium, minus, sine Bellis lutea parua latifolia 104. & 105.p.2.
Chrysocome veteribus 155.p.2.
Chrysgonon 876.p.2.
Cicuta veteribus & neotericis in genere, eiusque species varia 174. & 175.p.2.
Cicutaria eiusque species varia 176.177.178.179.180.181.182.183. & 187.p.2.
Cirsium veteribus & in genere 42.p.2.
Cirsium Anglicum, Pannonicum, Britannicum, Tementosum, & Maximum, aliaque Cirsii species 44. & 45.p.2.
Clinopodium quibusdam Massichina Gallorum 242.p.2.
Clinopodium veteribus & in genere, eiusque species varia 150.p.2.
Consolida regalis in genere, eiusque species varia 201. & 212.p.2.
Consolida media eiusque species varia 430. & 432.p.2.
Coris veteribus & in genere 381.p.2.
Coris Monspessulana lutea & purpurea 414.p.2.
Corallii plurima species varia 808. & sequentibus p.2.
Corallii affinis Madrepora 811.p.2.
Corallii affinis Alcyonium fistulosum rubrum, & Terebuli marini albi 812.p.2.
Coralloides eiusque species varia 801.811. & 814.p.2.
Corallina eiusque species varia fol. 815.p.2. & p.2.
Corallina affinis Muscus marinus 815.p.2.
Corallina affinis Nodularia f.l. 816.p.2. & p.2.
Coriandrum veteribus & in genere 86.p.2.
Coriandri species varia 89.90. & 91.p.2.
Coronopus veteribus & in genere 508.p.2.
Coronopus eiusque species varia 509.510. & 511.p.2.
Corruda 721.p.2.
Cortusa 499.p.2.
Caryledon vera altera & minor 684.684. & 690.p.2.
Cranich & Ceranium veteribus & in genere 392.p.2.
Cremenei 802.p.2.
Crista galli mas & femina, aliaque eius species varia 436. & 437.p.2.

INDEX:

Oncodilium veteribus 62. p.2.
Crucialis fruticosa Casalp. fol. 736. pag. p.2.
Caminum sativum & silvestre veteribus & in genere, eiusque species varia 21.22. & 23. p.2.
Cunila veteribus 271. p.2.
Cupressas marina Belgica Classi 803. p.2.
Cyanus veteribus & in genere, eiusque species varia 21.22.23.24. & 25. p.2.
Cyclaminus veteribus & in genere, eiusque species varia 31.52.53. & 54. p.2.
Cymbalaria 685. p.2.
Cynoglossum veteribus & in genere 597. p.2.
Cynoglossum vulgare, minus, Creticum, aliaque *Cynoglossi* species 598.599.600. & 601. p.2.

D.

D *Damaconium* Alpinum, siue *Elleborine* floribus albis 516. p.2.
Damaconium Alpinum floribus luteis 517. p.2.
Damaconis species quibusdam alius *Calceolus* *D. Maria* 518. p.2.
Damaconium stellarum *Dalechampi* 795. p.2.
Daucus veteribus & in genere 55. p.2.
Daucus Creticus, Tybartinus, Petrus, Tenuifolius, Selinades, Cyanopus, Munranus, aliaque *Danci* species varia 56.57.58.59. & 67. p.2.
Daucus pratensis *Dalechampi* 9. p.2.
Daucus glauco folio similis *Faniculo tortuoso* 16. p.2.
Danco glauco similis *Libanotis* 17. p.2.
Delphinium veteribus 210. p.2.
Dictamnus & *pseud. dictamnus*, veteribus & in genere 251. p.2.
Dictamnus Cretica seu vera 253. p.2.
Dictamnus adulecrinum, quibusdam verticillatum, vel potius *Gnaphalium* veterum 255. p.2.
Dipsacus veteribus & in genere 72. p.2.
Dipsacus sativus 73. p.2.
Dipsacus silvestris siue *Labrum veneris* 74. & 75. p.2.
Doronicum veteribus & in genere, eiusque species varia 17.18. & 19. p.2.
Dracunculus bortenensis, siue *Tarcon* 148. p.2.
Drypis *Theophrasti* *Anguillara* fol. 738. pag.2.
Dryopteris 745. & 748. p.2.
Duroa herba soporifera 625. p.2.

E.

E *Echium* *Fuchsi*, siue *Borrage* silvestris 581. p.2.
Echium veteribus & in genere 585. p.2.
Echii species varia plurima 586.587.588. & 589. p.2.
Echinops maior 69. p.2.
Echinops minor 72. p.2.
Echinomelocactus 93. p.2.
Elaphoglossum veteribus & in genere 148. p.2.
Elasma veteribus & in genere, eiusque species varia 371. & 372. p.2.
Elleborine, *Epipactis*, & *Damaconium* in genere 515. p.2.
Elleborines species varia 516. & 517. p.2.
Elleborus niger flore albo, interdum etiam valde rubente 635. p.2.
Elleborus niger vulgaris flore viridi vel herbaceo, radice diuturna 636. p.2.
Epimedium, *Epimetrum*, & *Epipetron* 709. p.2.
Epipactis & *Elleborine* veteribus & in genere 640. p.2.
Epipactis *Matthioli* ibid.
Epithymum veteribus & in genere 264. p.2.
Equisetum minus aquaticum 738. pag. p.2.
 Tom. III.

Equisetum minus terrestre 739. pag.2. p.2.
Equisetis varia species alia ibidem & 740. p.2.
Eravvay *Ricini* pusillum genus 645. p.2.
Eruca facie frutex marinus 814. p.2.
Eruca marina quibusdam 863. p.2.
Eryngium vulgare 85. p.2.
Eryngium caruleum 86. p.2.
Eryngium marinum ibid.
Eryngium pumilum, pusillum, planum, latifolium, Alpinum, eiusque varia species alia 87. & 88. p.2.
Escbara 815. p.2.
Escbara marina frondifera ibid.
Euphrasia 432. p.2.
Euphrasia parva purpurea 433. p.2.

F.

F *Faba* seu *Cyamus* *Aegyptius* veteribus 766. p.2.
Fabregue 248. p.2.
Ferula siue *Ferulago* veterum 42. p.2.
Ferula folio *feniculi*, &c. 43. p.2.
Ferula *Gaza*, *Narbecium* *Theophrasti* 44. p.2.
Ferula facie *Thapsia* siue *Turkish* Gallorum. 45. p.2.
Ferula species alia ibid.
Filipendula 189. p.2.
Filix veteribus & in genere 741. p.2.
Filix maior & prior *Trago*, siue *ramosa* etiam 743. p.2.
Filicis varia species alia 744. & sequent.
Filix saxatilis *Tragi* 763. p.2.
Flos *Constantinopolitanus*, miniatum, albus, & varium 344. p.2.
Flos *Cuculi*, *Odontis* quibusdam 347. p.2.
Flos *Cuculi* flore multiplicato, purpureo & albo 348. p.2.
Flos *Adonis* vulgo, alius *Eranthemum* 125.
Florentis *piscina* foliis denticulatis 787. p.2.
Foeniculum seu *Marathrum* veteribus & in genere 1. p.2.
Foeniculum silvestre, siue *Hippomarathrum* duplex, semine *cachry* simili & rotundo veteribus 2. p.2.
Foeniculum vulgare minus ibid.
Foeniculi varia species alia 2.3.4. & 5. p.2.
Foeniculum tortuosum 16. p.2.
Fonrinalis media lucens 795. p.2.
Fonrinalis lucens maior ibidem.
Fonrinalis crispa 780. p.2.
Fonrinalis minor lucens ibidem.
Fraxinella, officinis *Dictamnus* 424. p.2.
Fructus valde elegans, *Faba* forte *Aegyptia* *Disco-*
dis 783. p.2.
Frutex marinus elegantissimus albus 814. p.2.
Fruticosa marina planta, quibusdam *Conserua* lignosa 802. p.2.
Fucus *cupressinus* *Imperati* 803. p.2.
Fucus marinus ibid.
Fucus *Radicella* dictus, siue *Vermicularis* albus ibid.
Fucus *Terzolla* *Vermicularis* species ibid.
Fucus *Tamariciola*, siue *Tamariscifolia* marina 804. p.2.
Fucus marina *Forcellara*, & *Lumbricaria* species ibidem.
Fucus *Tremula* ibid.
Fucus *Scopara*, siue *Pennachio* marino ibid.
Fucus *Linza* 805. p.2.
Fucus *axungia* accedens 806. p.2.
Fucus canus 807. p.2.
Fucus *capillaris* tinctorius 808. p.2.
Fucus *Capillara* dictus ibid.
Fungus siue *Muscus* *petrosus* 816. pag.2. p.2.

INDEX

Fungus & Boletus in genere [823.p.2.](#)
Fungi verni Monceron dicti odorati & esculenti [823.p.2.](#)
Fungi D. Georgii [824.p.2.](#)
Fungus campestris albus superne, inferne rubens [ibidem.](#)
Fungus candidus regius odoratissimus [825.p.2.](#)
Fungus piperatus albus lacteo succo turgens [ibidem](#)
Fungus albus Monsbelgardenfium, alius Biserte dictus [ibidem.](#)
Fungus magnus totus albus, sine succo lacteo, edulis, Columbertes Monsbelgardenfibus dictus [826.p.2.](#)
Fungi albi venenati viscidii [ibidem](#)
Fungus nemorum amplius [ibid.](#)
Fungi longissimo pediculo candicantes, sed maculati, esculenti [ibid.](#)
Fungi alii nonnulli candicantes filuarum, esculenti [827.p.2.](#)
Fungi alii plurimi esculenti [ibid.](#)
& 828.p.2.
Fungus pane candidus prona parte erinaceus [ibid.](#)
Fungi in metam fastigiati & esculenti [ibidem](#)
Fungi tuberosi & esculenti [829.p.2.](#)
Fungi puniceo lacte dulci manantes, pratensisibus similes, edules [ibidem](#)
Fungi filuefres esculenti duo: I. subalbidus, II. purpureus, maculati [ibid.](#)
Fungi abietini esculenti [830.p.2.](#)
Fungi hirsuti interna parte perniciosi [ibid.](#)
Fungi filuefres esculenti ceruini [ibid.](#)
Fungi filuefres lacerti esculenti [831.p.2.](#)
Fungi serè sine pediculo in arboribus nasci soliti, esculenti [ibidem](#)
Fungi lutei magni, laetani dicti speciosi [ibidem](#)
Fungi lutei perniciosi sub pinu habitantes [832.p.2.](#)
Fungi stultorum Boletus similes perniciosi [ibidem](#)
Fungus pallidus [ibidem](#)
Fungus luteus sine pallidus, Chanterelle dictus, se contorquens [ibidem](#)
Fungi luteoli dicti colorem musantes [ibidem](#)
Fungus porosus, magnus, crassus [833.p.2.](#)
Fungi in metam formam surrecti perniciosi [ibidem](#)
Fungi septem alii perniciosi [834.p.2.](#)
Fungi plures simul, albi, ad arborum radices, esculenti [ibidem.](#)
Fungi multi ex uno pede perniciosi [835.p.2.](#)
Fungi albi lucentes ex uno principio plures ex radicibus & borum [ibid.](#)
Fungi multi ex uno pede clypeiformes [ibid.](#)
Fungi supra lapides [836.p.2.](#)
Fungus rugosus vel cauernosus, sine sterulini, niger & albus [ibid.](#)
Fungus candidus cristatus [837.p.2.](#)
Fungus ramosus flavus & albidus [ibid.](#)
Fungi ramosi argentei [838.p.2.](#)
Fungus Gallinella dictus [ibidem](#)
Fungi delicatissimi saporis [ibidem](#)
Fungi tres fatidi sub Corylis, Serpentina dicti, perniciosi [ibid.](#)
Fungus coralloides cancellatus [ibid.](#)
Fungus luteus, & alius interaneis vituli similis, cinereus [839.p.2.](#)
Fungi monstrofi vasta amplitudinis esculenti [ibid.](#)
Fungi Laricum maximi lateri esculenti [ibid.](#)
Fungus lignosus arboreus ad surculos [840.p.2.](#)
Fungi Castaneorum Laciniæ dicti [ibidem](#)
Fungi arborei ad Ellychnia [ibid.](#)
Fungi Auricula Iuda coloris, perniciosi, in Sambucus candice nascentes [ibidem](#)
Fungi tres, dicti Spongia lignorum, perniciosi [841.p.2.](#)

Fungi quinque Muscari dicti [ibidem](#)
Fungi Betularum, albi, maculati, perniciosi [ibid.](#)
Fungi prunorum, perniciosi [ibid.](#)
Fungi Salicum, perniciosi [842.p.2.](#)
Fungi sub Corylis orbicularis figura [ibidem](#)
Fungi Cerasorum, perniciosi [ibid.](#)
Fungi laticoris lacerti [ibid.](#)
Fungi veluti in nodum collecti perniciosi [ibidem](#)
Fungus Phalloides [843.p.2.](#)
Fungi phalloidis genus [845.p.2.](#)
Fungi Scerquilini albi [ibidem](#)
Fungi à sue appellati, filuefres, perniciosi [ibid.](#)
Fungi Bufoni perniciosi [ibid.](#)
Fungi ranarum, albi, perniciosi [846.p.2.](#)
Fungi variis alii perniciosi [ibid.](#)
Fungi supra ligna pronenientes [ibid.](#)
Fungi parui varii [ibid.](#)
Fungi parui lutei & clypeiformes, atque albi lethales [847.p.2.](#)
Fungus minimus sine petiolo perniciosus [ibidem](#)
Fungi infundibulum referentes perniciosi [ibidem](#)
Fungi albi pileolo inuerso [ibidem](#)
Fungus puluerulentus, dictus Crepitus lupi [848.p.2.](#)
Fungus maximus rotundus puluerulentus, Germanis Psiffi dictus [ibid.](#)
Fungus olearius [ibid.](#)
Fungus rotundus albus [ibidem](#)
Fungus Ollularis vel Botryoides fomarum [ibid.](#)
Fungorum perniciosorum remedia [ibid.](#)
Fumaria vulgaris [201.p.2.](#)
Fumaria minor sine renifolia surrecta [201.p.2.](#)
Fumaria qua Splir dicitur [ibid.](#)
Fumaria varia species alia [204. & 205.p.2.](#)

G.

Galbanum veterum [50.p.2.](#)
Galbanum & Galbanifera Ferula [92.p.2.](#)
Galliofis Species lutea, viscida, odorata nemorensis [314.p.2.](#)
Galliofis veteribus [322.p.2.](#)
Galliofis sine verticillatis fl. purpurascens [ibidem](#)
& 322.p.2.
Galliofis flore luteo [323.p.2.](#)
Gallitrichum farinum [309.p.2.](#)
Gallitrichum exoticum [310.p.2.](#)
Gallitrichum filuestre vulgè, sine filueftris Sclarea [311. & 312.p.2.](#)
Gallitrichi varietas [ibid.](#)
Gallium veteribus & in genere, eiusque species varia [731. 732. & 733.p.2.](#)
Gentiana veteribus & in genere [719.p.2.](#)
Gentiana magna flore purpureo [921.p.2.](#)
Gentiana folio conuoluto [ibid.](#)
Gentiana vulgaris maior Ellebori albi folio [920.p.2.](#)
Gentiana minor, seu vulgi Cruciatæ [922.p.2.](#)
Gentiana species aliquot alia [923. & 924.p.2.](#)
Gentiana annua Clusii [926.p.2.](#)
Gentianula eiusque varia species plurima [926. 927. & 928.p.2.](#)
Gentianellis affinis Calathiana verna Dalechampi [928.p.2.](#)
Gentianella que Hippium quibusdam [ibid.](#)
Geranium veteribus & neotericis in genere [472.p.2.](#)
Geranium tuberosum minimum [474.p.2.](#)
Geranium tuberosum, batrachoides varietas, Asphodeli radice, Pheum [475. 476. & 477.p.2.](#)
Geranium magnum folio trifido [478.p.2.](#)
Geranium sanguineum sine Hamorodes [ibid.](#)
Geranium Columbinum [479.p.2.](#)
Geranium

INDEX

Geranium moschatum folio ad Myrrhidem accedente,
maius & minus 479. p. 2.
Geranium speciosum annum longissimis rostris, Cre-
ticum ibid.
Geranium Robertianum murale 480. p. 2.
Geranium lucidum 481. p. 2.
Gingidium veteribus & in genere 78. p. 2.
Gingidium Marthioli 79. p. 2.
Glaucium veteribus & neotericis in genere 197. p. 2.
Glaux exigua maritima 361. p. 2.
Gnaphalium veteribus & in genere, eiusque species
varia 157. 158. 159. 160. 161. & 162. p. p. &
 255. p. 2.
Gramen Parnasi Dodonae, quibusdam Hepaticum flos
 337. p. 2.
Gramen Fuchsi, siue Leucanthemon 361. p. 2.
Gramm Fuchsi affinis herba ibid.
Gramen aqua innatans cum vericulis, siue Funicula-
cea marina 791. pag. 2. p. 2.
Granat Hollandorum 702. p. 2.
Garyophyllatus flos aphyllotactos siue iuncens ma-
ior & minor 336. p. 2.
Gratiola 434. p. 2.
Gratiola alpina 435. p. 2.

H

H *Acup siue Silybum quibusdam* 84. p. p.
Helleborus albus & uiger veteribus 631. p. 2.
Helleborus albus 633. p. 2.
Helenium siue Enula campana 108. p. p.
Helichrysum, Helichryson, & Heliochrysum, & He-
leochochrysum veteribus 142. p. p.
Heliochryson quorundam folio Abrotani 150. p. p.
Heliochryson Tragi, siue Linaria sercia 151. p. p.
Heliotropium veteribus & in genere, eiusque species
varia 603. 604. 605. & 606. p. 2.
Hem. nitis veteribus 749. p. 2.
Hemonitis 750. p. 2.
Hemonitis altera Dalechampi Filici florida similis
 729. p. 2.
Herba Nalucana Acofia 3. p. p.
Herba de la Rosta 144. p. p.
Herba marina 106. p. p.
Herba à sue denominata 551. p. 2.
Herba Cobobba inebrians 631. p. 2.
Herba Cassiana, samem sitimque recardans ibidem
Herba Paris 613. p. 2.
Herba Trientalis 536. p. 2.
Herniaria glabra 378. p. 2.
Herniaria hirsuta 379. p. 2.
Hippuris saxea 814. pag. 2. p. 2.
Holostium veteribus & in genere, eiusque species va-
ria 507. p. 2.
Hypericum veteribus & in genere, eiusque species
varia 380. 381. 382. 383. 384. p. 2.
Hyssopus veteribus & in genere, eiusque species varia
 274. 275. 276. & 277. p. 2.
Hyssopifolia aquatica 796. pag. 2. p. 2.
Hyssopifolia minor, vel potius Thymifolia maritima
 ibidem.
Hyssianus veteribus & in genere, eiusque species
varia 626. 627. & 628. p. 2.

I

I *acea nigra vulgaris capitata & squammosa, aliaque*
lacea species plurima 27. 28. 29. 30. 31. 32.
 33. 34. & 35. p. p.
Iacea moschata 34. p. p.
Iacea tricolor, siue Trinitatis flos 546. 547. & 548.
 p. 2.

Tom. III.

Imperatoria 337. p. 2.
Imperatoria alpina 139. p. 2.
Isatis, siue Glastrum montanum Dalechi. 602. p. 2.
Iuncaria 736. p. 2.

K

K *Alii eiusque species varia* 914. & 707. p. 2.

L

L *Aserpium Masiliid allatum* 117. p. 2.
Laserpito similis angustifolia ibid.
Linaria, siue Struthium Diascoridis Imperato 347.
 p. 2.
Lappula Canaria flore pulchro, magno, albo 79. p. 2.
Lappula Canaria flore minore tenuifolia 80. p. 2.
Lappula Canaria lasifolia, siue Candalis ibid.
Lappula Canaria, siue Candalis maritima 81. p. 2.
Laemidula multifido folio 181. p. 2.
Lens palustris 791. p. 2.
Lens palustris quadrifolia 793. p. 2.
Lens palustris Pacauina ibidem
Lenicula aquatica trifolca 793. pag. 2. p. 2.
Leontopetalon in genere ex antiquis & recentibus
 489. p. 2.
Leontopodium veteribus atque Cemoi 514. p. 2.
Leontopodium Candia quorundam ibidem
Leucacantha 90. p. p.
Libanurides veteribus & in genere, earumque species
varia 37. 40. 41. 164. 165. & 167. p. 2.
Libanotis quibusdam siue Ferulago 41. & 42. p. 2.
Libanotidum Theophrasti species aliquot 164. &
 167. p. 2.
Libanotis altera quorundam, aliis Cerna nigra 165.
 p. 2.
Lichen veteribus & in genere 750. p. 2.
Lichen siue Hepatica fontana ibid.
Lichen arboreus, siue pulmonaria arborea 51. p. 2.
Ligusticum vulgare folius Apii 122. p. 2.
Ligusticum veteribus & in genere 146. p. 2.
Ligusticum quorundam folius Angelica 147. p. 2.
Ligusticum alterum Belgicum ibid.
Ligusticum maius, siue Imperatoria maior 147. p. 2.
Ligusticum Marthioli & Lobelii ibidem
Ligusticum Rauwolfii folius Aquilegia 148. p. 2.
Lilium conualium vulgo 131. p. 2.
Lilium conualium flore rubente 533. p. 2.
Limonium veteribus 540. p. 2.
Linaria lutea vulgaris, parua alba, parua serpens,
Pannonica, maxima Dalmatica, odorata, inodo-
ra, Monspeulana, purpurea magna & parua,
carulea &c. 456. 457. 458. 459. 460. &
 461. p. 2.
Linaria Beluedere dicta, eiusque species varia 462.
 p. 2.
Linosyris herba Aristotelis 93. p. p.
Linum 450. p. 2.
Linum siluestris species varia 452. & 453. p. 2.
Linum latifolium luteum 454. p. 2.
Linum luteum Narbonense ibid.
Linum pumilum 458. p. 2.
Lithospermum siue Milium Solis, eiusque species va-
ria 590. 591. & 592. p. 2.
Lycnis coronaria ac siluestris veteribus & in gene-
re, eiusque species varia 339. 340. 341. 343.
 351. 352. 357. & 358. p. 2.
Lycoperium veteribus & in genere 120. p. 2.
Lycopsis veteribus 584. p. 2.
Lycopsis Dioscoridis quibusdam ibid.
Lonchitis veteribus 751. p. 2.
Lonchitis Altera cum folio denticulatis siue lonchitis
altera Marthioli 748. 752. p. 2.

INDEX.

Lonchitis Altera cum foliis denticularis siue lonchitidis altera Matthioli p.752.p.2.
Lonchitis altera folio polypodii ibidem
Lonchitis Aspera Marantia p.753.p.2.
Lorus Aegyptia veteribus & neotericis in genere p.781.p.2.
Lucus marinus dictus Roccel a tinctorum. pag.784.p.2.
Luſtica marina siue Insibacea pag.800.p.2.
Lumbricorum semen pag.805.p.p.
Lumbricorum semen Rauwolfii ibid.
Lunaria borystetis. pag.709.p.2.
Lunaria borystetis minor multis folia pag.711.p.2.
Lunaria borystetis ramosa Silesiana ibidem
Lutea Plinii quibusdam 465.p.2.
Lutea maxima Cretica Honorii Belli 466.p.2.

M.

Maiorana Smirnum quibusdam dicta 128.p.2.
Maiorana varia species alia 241. & 242.p.2.
Mandragoras ex veteribus & neotericis in genere 614.p.2.
Mandragoras mas 617.p.2.
Mandragoras semina 618.p.2.
Marrubium veteribus & neotericis in genere 316.p.2.
Marrubii species varia ibid. & 317.p.2.
Marrubium nigrum siue Ballote 118.p.2.
Marrubium aquaticum quorundam ibid.
Marum Cortusi 143.p.2.
Marum veterum ibid.
Marum supinum 143.p.2.
Matricaria, vulgo minus Parthenium 129.p.2.
Matricaria flore pleno 130.p.p.
Matricaria odorata ibid.
Melanthium veteribus & in genere 207.p.2.
Melanthii species varia 207. 208. & 209.p.p.
Melanthium silvestre siue arvense 209.p.p.
Melissa vulgaris odor Citri 212.p.2.
Melissa adulterina quorundam amplis foliis, & floribus non grati odoris 213.p.2.
Melissa Turcica multis dicta 214.p.2.
Melissophyllum veteribus & in genere 214.p.2.
Mentha Corymbifera, siue Costus hortenſis 144.p.p.
Mentha Sarracenica species si. Anthemidis 146.p.p.
Mentha veteribus & in genere 215.p.2.
Mentha varia species plurima 215. 216.p.2.
Menthastrum in genere eiusque species varia 219.p.2.
Mentha aquatica siue Sisymbrium 223. & 224.p.2.
Mentha Cartaria 225.p.2.
Mentha vulgare siue radix Versina ibidem
Meum veteribus 11.p.2.
Meum alterum italicum quibusdam 15.p.2.
Millefolium aquaticum Feniculo simile 8.p.2.
Millefolium aquaticum in foliis Coriandri 9.p.2.
Millefolium Stratiotes pennatum terreſtre 136.p.p.
Millefolii alpini species 138. 139. & 140.p.p.
Millefolium tomentosum alpinum 138.p.p.
Millefolii plurima species varia 771. & sequ. p.2.
Mola aurea odore fœtido, quibusdam Lycopersum 620.p.2.
Molucca 234. & 235.p.2.
Moschardellina 206.p.2.
Muscipula eiusque species varia 349. & 350.p.2.
Muscus veteribus & in genere 7.p.2.
Muscus arboreus villosus ibid.
Muscus arboreus peltatus & scutellaris 772.p.2.

Muscus arboreus ramosus ibidem
Muscus arboreus barbarus ibidem
Muscus villosus herbaceus ibidem
Muscus amarus absynthii folio ibidem
Muscus Coralloides ibidem
Muscus terreſtris & hortenſis ibidem
Muscus ex Cranio ibidem
Muscus Filicinus ibidem
Muscus Abietis facie ibidem
Muscus in Ericetis proueniens, stellaris, roseus, sericeus, parvus, repens ibidem
Musci terreſtris species aliquot 773. 774. & 775.p.2.
Muscus corniculatus 775.p.2.
Muscus pyxidatus ibidem
Muscus pyxioides saxatilis ibid.
Muscus alpinus 776.p.2.
Muscellina 66.p.2.
Myriophyllum siue Millefolium veteribus 777.p.2.
Myriophyllum pelagium 806.p.2.
Myrtus veteribus & in genere, eiusque species varia 77. & 78.p.2.
Myosurus 912.p.2.

N.

Nana siue Scrobilus Peruvianus & Ananas 94.p.p.
Napellus veteribus 653.p.2.
Napellus Mus vel Musca 654.p.2.
Nardus Indica veteribus 201.p.2.
Nardus Indica vulgaris 202.p.2.
Nardus Celtica 203.p.2.
Nardo Celtica similis siue Hirculus 206.p.2.
Nardus, siue Saluina Neapolitana ibid.
Nardus montana veteribus ibid.
Narceſſum Theophr. Ferulago Gaza 44.p.2.
Nicotiana siue Tabacum eiusque species varia 629. & 630.p.2.
Numularia siue Centimorbia 370.p.2.
Numularia rubra 371.p.2.
Nux Morbel veteribus 623.p.2.
Nymphaea veteribus & in genere, eiusque species varia 777. 778. 779. 780. 781.p.2.
Nymphaea minor siue Morsus rana 781.p.2.

O.

Ocimum veteribus & in genere, eiusque species varia 243. 244. 245. 246. 247. 248. & 250.p.2.
Ocimum garyophyllum Monachorum, siue Actmos Columna 260.p.2.
Ocimum odoratum siue Basilicum 249.p.2.
Ocymoides eiusque species varia 342. 343. 344. 351. & 353.p.2.
Odonidi siue Flori Cucull affinis Lychnis silvestris 348.p.2.
Oenanthe veteribus & in genere 189.p.2.
Oenanthe siue Filipendula Monspessulana folio Aprilis 190.p.2.
Oenanthe, siue Filipendula aquatica 192.p.2.
Oenantes siue Filipendula species alia 192. 193.p.2.
Olea maris rubri Theophr. 799.p.2.
Onobrichis lutea Dalechampi 386.p.2.
Onosma veteribus 536.p.2.
Ophioglossum 708.p.2.
Ophioglossum minus subrotundo folio ibid.
Opium & Meconium 392.p.2.
Opium officinarum 392.p.2.
Opoponax 155.p.2.
Origanum veteribus & in genere 235.p.2.

Origanum Heracleoticum Ruellii, sine Maiorana
maior 237. p. 2.
Origanum varia. species alia 236. 237. 238. & 239.
p. 2.
Origanum silvestre 239. p. 2.
Origanum facie Corymbi 183. p. p.
Orthonna veteribus 97. p. p.
Onitum & Oniggon veteribus 836. p. 2.

P.
Alma sine manus marina 791. p. 2.
Paonia mas, semina, promiscua, aliaque eius spe-
cies varia 492. 493. & 494. p. 2.
Panaces veteribus & in genere, eiusque species varia
10. 67. 154. 155. & 158. p. 2.

Papaver fascium & silvestre veteribus 389. p. 2.
Papaver fascium 390. p. 2.
Papaver erraticum veteribus 395. p. 2.
Papaver spinosum 397. p. 2.
Papaver corniculatum ex veteribus & recentioribus
in genere, eiusque species varia 397. 398.
& 399. p. 2.

Papaver spumeum in genere 400. p. 2.
Papaveris alia species plurima varia 391. & se-
quentibus p. 2.

Pappas Americanum 611. p. 1.
Paronychia Angustata quibusdam, & Paronychia si-
ne Alfinefolia incana 466. p. 2.
Paronychia Hispanica Clusii, sine Anthyllis nivea
374. p. 2.

Parthenium veteribus & in genere 128. p. p.
Parthenium Indorum inodorum, sine inodorum Acha-
bonan Aegyptiorum 131. p. p.
Parthenium quinquifidum 141. p. p.
Passerina Lobelii 455. p. 2.
Passerina Tragi 456. p. 2.
Pastinaca silvestris, sine Scaphyllinus Graecum 62.
p. 2.

Pastinaca sativa, sine Carota lutea & alba 64. p. 2.
Pastinaca Syriaca sine Secacul Arabum 66. p. 2.
Pastinaca, sine Scaphyllinus veterum, silvestris & sa-
rina, Daucus etiam dicta 59. p. 2.
Pastinaca Germanica silvestris, quibusdam Elapho-
boscum 149. p. 2.
Pastinaca marina, quibusdam Secacul & Crithmum
spinosum 196. p. 2.
Pastinaca sativa Germanica 150. p. 2.
Pecten veneris eiusque species varia 71. 73. &
74. p. 2.
Pedicularis eiusque species varia 437. 438. & 439.
p. 2.

Penna marina 806. p. 2.
Peplis 662. p. 2.
Peplis, sine Esula rotunda 669. p. 2.
Peplis minor 670. p. 2.
Perchepter Anglorum quibusdam 74. p. 2.
Perfoliata in genere, eiusque species varia 197. 198.
& 199. p. 2.

Perfoliatum Centaurium luteum 355. p. 2.
Perficaria mitis 787. p. 2.
Perficaria acris, sine Hydropiper 788. p. 2.
Perfonata, sine Lappa maior aut Bardana 570. & 571.
p. 2.

Peristeron, Verbena, & Hierobotane, sine Herba sa-
era 441. p. 2.

Potastres 566. p. 2.
Peucedanum veteribus & in genere, eiusque species
varia 35. 36. & 37. p. 2.

Phellandrium Plinii 183. p. 2.
Phellandrium vel Cicutaria aquatica ibid.

Phytium 386. p. 2.
Phyllon rhelygonon Dalechampia 770. p. 2.
Phyllis veteribus & in genere eiusque species varia
764. & 765. p. 2.

Phyllis sine Lingua cernina vulgi 764. p. 2.
Phyllis sine Hemionitis Lobelia ibid.

Pibu veteribus & in genere 109. p. 2.
Picnocomon 227. p. 2.

Pilosella eiusque species varia 161. & 163. p. p.
Pimpinella in genere dicta 108. p. 2.
Pimpinella Saxifraga tenuifolia 112. p. 2.

Pimpinella Sanguiforba inodora 121. p. 2.
Pinguicula Gesneri 546. p. 2.
Pirysa veteribus & in genere 664. p. 2.
Pirysa Marthioli 671. p. 2.

Plantamarina retiformis fol. 764. pag. 2. p. 2.
Plantago veteribus & in genere, eiusque species va-
ria plurima 501. 502. 103. 504. 505. 106. & 507.
p. 2.

Plantagini simile Auripharicum, sine Contrayer-
ua 507. p. 2.

Plantaginis aquatica species aliquot 794. & 795. p. 2.
Polemonium petraum Gesneri 351. p. 2.
Polemonium veteribus 356. p. 2.

Polygonum quicquid & in genere eiusque species varia
109. & 300. p. 2.

Polyacanthus Casabona Acarna similis 92. p. p.
Polygonum semina veteribus 724. p. 2.
Polygonum eiusque species alia varia 376. 377. 378.
& 379. p. 2.

Polygonum 386. p. 2.
Polygonatum veteribus & in genere 528. p. 2.
Polygonatum vulgè Sigillum Salomonis, aliaque Po-
lygonati species varia 529. 530. & 531. p. 2.

Polygala eiusque species varia 387. & 388. p. 2.
Polypodium veteribus & in genere, eiusque species
varia 338. & 756. p. 2.

Polycnemom 347. p. 2.
Polytrichum eiusque species varia 768. & 769. p. 2.

Porus tubularis 814. p. 2.
Porus anguinus 815. p. 2.

Portulaca, sen Andrachne, veteribus & in genere,
eiusque species varia 677. & 678. p. 2.
Potamogeton eiusque species varia 784. 785. 786.
& 787. p. 2.

Potum de Hiericho Melongenii congener 619. p. 2.
Priapeia, quibusdam Nicotiana minor 650. p. 2.

Primula Veris veteribus & in genere, eiusque species
varia 496. 497. 498. & 499. p. 2.
Prunella in genere, eiusque species varia 428. 429.
& 430. p. 2.

Pseudo-Nardus qua vulgè Spica 281. p. 2.
Pseudo-Nardus qua vulgè Lavendula ibid.

Pseudo-Melanthium 342. p. 2.
Pseudo-Corallium nigrum 809. p. 2.

Psidium veteribus & in genere, eiusque species varia
512. 513. & 514. p. 2.

Prarnica in genere eiusque species varia 146. &
147. p. 2.

Pulegium eiusque species varia 256. & 257. p. 2.
Pulmonaria eiusque species varia 595. 596. &
597. p. 2.

Pulsatilla, eiusque species varia 409. 410. & 411.
p. 2.

Pycnocomum in genere ex veteribus & Neotericis
621. p. 2.
Pyrethrum veteribus & in genere, eiusque species va-
ria 20. & 21. p. 2.

Pyrola in genere eiusque species varia 536. & 537.
p. 2.

R.

R Anunculus, eiusque species varia	412
413.414.415.416.417.418. & 419.	p.2.
Ranunculus aquatilis	771.p.2.
Ranunculus hederaceis rinulorum se extendens, arva	
macula notatus	ibid.
Ranunculi varia species alia	857.
858.859.860.861.862.863.864.	p.2.
Reseda lutea	467.p.2.
Reseda alba	ibid.
Reseda facie planca marina	814.p.2.
Reticulum marinum	815.p.2.
Reticulum rophaceum marinum	ibid.
Ricinus veteribus & in genere	642.p.2.
Ricinus vulgaris	ibid.
Ricinus maior Americanus Carcas dictus, & Faba	
purgatrix India occidua	643.p.2.
Ricinus parvus Orientalis Dende dictus quibusdam,	
& Faba purgatrix	644.p.2.
Ricino similis fructus	645.p.2.
Rhodia radix	683.p.2.
Rosa marina	804.p.2.
Ros Solis	761.p.2.
Rubia veteribus & in genere	714.p.2.
Rubia sativa	ibid.
Rubia silvestris Monspessulana	715.p.2.
Rubia plurima species alia 715.716. & sequenti-	
bus.	
Rubeola saxatilis C. Baubini folio	718.
pagina 2.p.2.	
Rubeola muricima aspera C. Baubini	ibid.
Ruta veteribus & in genere	195.p.2.
Ruta sativa vel hortensis	197.p.2.
Ruta silvestris maior	199.p.2.
Ruta silvestris minor	200.p.2.
Ruta qua dici solet Harmala	ibid.
Ruta Hypericoides Siciliana affinis, sine Tragium	
383.p.2.	

S.

S Agapennum	156.p.2.
Sagittaria	795.p.2.
Sagittaria maior.	ibid.
Sagittaria minor	ibid.
Salix marina	810.p.2.
Salvia latifolia	304.p.2.
Salvia serrata crispata	305.p.2.
Salvia tenuifolia	306.p.2.
Salvia Absinthium redolens	307.p.2.
Salvia species alia	305. & 306.p.2.
Samolus Valerandi Dourez	795.p.2.
Sampfuchus seu Amaracus veteribus & in genere	
239.p.2.	
Sanguisorba minor	115.p.2.
Sanguisorba maior flore spadiceo	120.p.2.
Sanicula Alpina guttata	707.p.2.
Sanicula Alpina affinis	ibid.
Sanicula femina quibusdam, aliis Elleborus niger	638.p.2.
Sanicula mas Fuchsi, sine Diapensia	639.p.2.
Saponaria minor quibusdam	344.p.2.
Saponaria vulgaris	346.p.2.
Satureia sativa	272.p.2.
Satureia durior	ibid.
Satureia tenuifolia	273.p.2.
Saxifraga veteribus & in genere	274.p.2.
Saxifraga Marthioli tenuifolia & umbellifera	13.
p.2.	
Saxifraga multifido folio Pannonica	19.p.2.

Saxifraga tenuifolia affinis, quibusdam Candelis
ibidem.

Saxifraga hircina maior	109.p.2.
Saxifraga hircina media	111.p.2.
Saxifraga hircina minor	ibid.
Saxifraga hircina minima sine Pimpinella crispata	
Tragi	113.p.2.
Saxifraga Anglorum	171.p.2.
Saxifraga Antiquorum quibusdam & de Gypsophyco	
seu Symphyto maiore & minore Thulis	32.
Saxifraga Bavarica	ibid.
Saxifraga alba radice granulosa.	706.p.2.
Saxifraga aurea Dodonai	707.p.2.
Scabiosa in genere	1.p.2.
Scabiosa maior, communior, hirsuta, folio lacinioso	
non laciniato, & latifolia	22.p.2.
Scabiosa minor vulgaris	3.p.2.
Scabiosa prolifera	5.p.2.
Scabiosa rubra peregrina, quibusdam Indica	6.p.2.
Scabiose reliqua species alia plurima	7.8.9.10.
& 11.p.2.	
Succisa sine Morsus Diaboli, Scabiosa species	11.p.2.
Scabiosa squammata argentea	30.p.2.
Scandix veterum	70.p.2.
Scandix, quibusdam umbella ex quamplurimis apici-	
bus coagmentata	71.p.2.
Scordium	292.p.2.
Scordosis sine scordium folio salvia	293.p.2.
Scordosis tomentosa Cretica	294.p.2.
Scrophularia vulgaris & maior, variaeque alia eius	
species 421.422. & 423.p.2.	
Scrophularia minor, sine Chelidonium minus vulg-	
dictum	468.p.2.
Scutellaria Teucrii facie	291.p.2.
Scutellaria, sine Opuntia marina	806.p.2.
Sedum echinatum vel stellatum flore albo	630.p.2.
Sedum echinatum flore luteo	ibidem
Sedum Veteribus & Neotericis in genere	635.p.2.
Sedum maius arborescens	686.p.2.
Sedum maius vulgare, montanum, latifolium, serratum,	
aliaque nonnulla Sedi maioris species	687.
& sequentibus p.2.	
Sedum minus tenerifolium, longiusculo folio circinato,	
folio cinereo, flore luteo, flore purpureo, flore	
rubente, flore se circumstetente & praten-	
se: montanum: alpinum: arvense: alve: non acre:	
arborescens: hispidum: muscosum: Syriacum:	
nonnullaque alia Sedi minoris species.	690.
691.692.693.694.695. & 696.p.2.	
Sedis affinis trifida Alpina flore albo	696.p.2.
Selinum tuberosum	201.p.2.
Selinum montanum pumilum Clusii, foliis farnicatis	
aut Peucedani, flore albo, semine Selini	17.
p.2.	
Serpillum veteribus & in genere	267.p.2.
Serpillum vulgare	268.p.2.
Serpillum Citrii odore	270.p.2.
Serpillum angusto lanuginosque folio	270.p.2.
Serpillum Thymi folio Narbonense	ibidem
Serpillum sylvestre, Zigii Clusio, Thymo vulgare	
rigidiori similis	271.p.2.
Serratula	272.p.2.
Seseli Massiliense, Aethiopicum, & Peloponnesiacum	
veteribus & in genere	31.p.2.
Seseli Massiliense Nuperorum	31.p.2.
Seseli montanum angustifolium 3. Clusio folio Seseli	
Massiliensis Martioli, semine Angelica	34.
p.2.	
Seseli Creticum, Tordylium veteribus	84.p.2.
Seseli Aethiopici Martioli genus aliud Clusio	46.
p.2.	

INDEX.

11

Seseli alpinum siue montanum primum Clusio, folio splendente, &c. *ibid.*
Seseli siue *Siler* montanum vulgare *ibid.*
Seseli Poloponnense Matthioli, siue cicutaria quorundam *184. p. 2.*
Seseli palustre lactescens *188. p. 2.*
Seseli Arhyopicum fruticosum, folio Peridymeni *197. p. 2.*
Siciliana, aliis *Ciciliana*, vel *Androsamon* *386. p. 2.*
Sideritis veteribus & in genere eiusque species varia *424. 425. 426. 427. & 428. p. 2.*
Silauus veteribus *170. p. 2.*
Silaum quibusdam flore luteolo *ibid.*
Siler Creticum quibusdam, semine longo crispo incuruo *ibid.*
Silphium siue *Laserpizium* veterum *119. p. 2.*
Sion veteribus *171. p. 2.*
Sion umbelliferum *172. p. 2.*
Sium medium *173. p. 2.*
Sium maximum latifolium *174. p. 2.*
Sison veteribus & in genere *106. p. 2.*
Sison siue officinarum *Amomum* *107. p. 2.*
Sisymbrium veteribus & in genere *222. p. 2.*
Siser veteribus & in genere *152. p. 2.*
Sisarum multis *153. p. 2.*
Sisymbrium veteribus & in genere *222. p. 2.*
Smyrnum veteribus & in genere *124. p. 2.*
Smyrnum Creticum persiliatum *125. p. 2.*
Smyrnum peregrinum folio oblongo *126. p. 2.*
Solanum seu *strichnos* veteribus & in genere *607. p. 2.*
Solani species varia *608. p. 2.*
Solanum Halicacabum vulgare *609. p. 2.*
Solanum siue *Halicacabum* Indicum *ibid.*
Solanum verticillatum *610. p. 2.*
Solanum furiosum ex veteribus *ibidem*
Solanum manicum multis, siue *Bella dona* *611. p. 2.*
Solani species ex *Apenino* *614. p. 2.*
Solanum pomiferum fructu rotundo *618. p. 2.*
Solanum pomiferum fructu incuruo *619. p. 2.*
Solanum pomiferum fructu spinoso *ibidem.*
Solanum pomiferum fructu rotundo, striato, duro *620. p. 2.*
Spergula veteribus & in genere, eiusque species varia *719. p. 2.*
Spina alba siluestris *Fuchsi* *94. p. p.*
Spina Arabica veteribus *70. p. p.*
Spina alba quibusdam capite echinato *71. p. p.*
Spina lutea *84. p. p.*
Spina Solstitialis *90. p. p.*
Spondilium ex veteribus & Neotericis in genere eiusque, species varia & sequentibus *158. p. 2. 160. 161. & 162.*
Stachys veteribus & in genere *319. p. 2.*
Stachys *Fuchsi* *ibid.*
Staphis agria veteribus & in genere *641. p. 2.*
Struthium, *Radicula*, seu *lanaria* *Herba* veteribus, & *Conditi* *345. p. 2.*
Struthium *Dioscoridis* *Imperato* *347. p. 2.*
Struthium spinosum, siue *Conditi* *Bedunensis* *ibid.*
Stabe veteribus & Neotericis in genere, eiusque species varia *3135. & 36. p. p.*
Stachas Arabica vulgo dicta *277. p. 2.*
Stachas viridis *279. p. 2.*
Stachas serrato & crispo folio *ibid.*
Stachadis varia species alie, & *Stachadi* affines plantae *153. & sequentibus 154. 155. 156. & 157. p. p.*
Stramonium multis dicta, siue *Pomum* spinosum *624. p. 2.*
Stramonium altera maior, siue *Tarula* quibusdam *ibid.*
Stratiotes *Aegyptia* *794. p. 2.*
Strychnodendros *614. p. 2.*
Symphitum petraum veteribus *433. p. 2.*

Symphitum maius Veteribus *593. p. 2.*
Symphitum tuberosum *594. p. 2.*
Symphitum pumilum repens, siue *Borrage* *Herbariorum* *597. p. 2.*

T.

Tabacum *629. p. 2. 878 ss.*
Tarula quibusdam, siue *Stramonium* altera maior *624. p. 2.*
Tagetes Indicus minor simplici flore, siue *Caryophyllus* Indicus, siue *Flos Africanus* *pag. 98. p. p.*
Tagetes Indicus minor multiplicato flore *99. p. p.*
Tagetes Indicus medius flore luteo pallida *ibid.*
Tagetes maximus rectus flore simplici ex luteo pallido *100. p. p.*
Tagetes maximus rectus flore maximo multiplicato *ibidem*
Tanacetum vulgare flore luteo *131. p. p.*
Tanacetum crispum flore luteo *132. p. p.*
Tanacetum album *133. p. p.*
Tataria Hungarica edulis *163. p. 2.*
Telephium purpureum minus *Casp. Bauhini* *682. p. 2.*
Terres Africanorum *Tuberis* genus album *835. p. 2.*
Terres maria, aliis *Lysimachia* *galericulata* *435. p. 2.*
Terralyx veteribus *68. p. p.*
Teucrium Veteribus. *290. p. 2.*
Teucrium multis *ibidem*
Teucrium *Patricum* & *Creticum* *Clusii* *291. p. 2.*
Teucrium *Scordonia* folio *ibidem*
Thalictrum Veteribus & in genere *485. p. 2.*
Thalictrum nigrum caule & semine striato *486. p. 2.*
Thalictrum speciosissimum glaucum semine & caule striato *ibid.*
Thalictrum maius folliculis angulosis caule laui *487. p. 2.*
Thalictrum minus, siue *Ruta* *pratensis* genus minus, semine striato *ibidem*
Thapsia Veteribus & in genere *47. p. 2.*
Thapsia siue *Turbith* *Garganicum* semine latissimo *50. p. 2.*
Thapsia prima secunda, tertia & quarta *Clusii* *186. p. 2.*
Thapsia Carora facie *187. p. 2.*
Thapsia *Casalpini* semine candido crasso *ibid.*
Thora folio *Cyclamini* *650. p. 2.*
Thora *Apula* folio *Alchymilla* *651. p. 2.*
Thymbra Veteribus & in genere *271. p. 2.*
Thymbra Graca *273. p. 2.*
Thymus Veteribus & in genere *262. p. 2.*
Thymum Creticum *ibidem*
Thymum vulgare rigidius folio cinereo *263. p. 2.*
Thymus repens *Pisanus* *264. p. 2.*
Tichymalus Veteribus & in genere. *661. p. 2.*
Tichymalus *Cyparissias*. *675. p. 2.*
Tichymalus *Strytophyllus*. *664. p. 2.*
Tichymalus minimus angustifolius annuus *ibid.*
Tichymalo *Cyparissia* similis *Pityusa* multis *665. p. 2.*
Tichymalus incanus hirsutus *C. Bauh. dictus* *Pityusa* *Anglica* *Camerario* *666. p. 2.*
Tichymalus *Helioscopius* siue *Soli* sequus *669. p. 2.*
Tichymalus *platyphyllus* *Fuchsi* *670. p. 2.*
Tichymalus magnus multi caulis, siue *Esula* maior *671. p. 2.*
Tichymalus *Syluaticus* toto anno folia retinens *671. p. 2.*
Tichymalus *Amygdaloides* siue *Characias* *672. p. 2.*
Tichymalus verrucosus *673. p. 2.*
Tichymalus non acris f. rubro *ibid.*
Turbith *882. p. 2.*
Tordylium veteribus, siue *Seseli* Creticum *84. p. 2.*

<i>Tithymalus serratus</i> Dalechampi.	Ibidem	<i>Verbascum</i> in genere eiusque species varia	870. &
<i>Tithymalus Myrsinites</i>	674. p. 2.	sequentibus p. 2.	
<i>Tithymalus Paralius</i>	Ibidem	<i>Verbena vulgaris</i>	443. p. 2.
<i>Tithymalus Dendroides</i>	675. p. 2.	<i>Verbenaca supina</i>	444. p. 2.
<i>Tithymalus Aphyllus</i>	676. p. 2.	<i>Verbenaca nodiflora</i>	ibid.
<i>Tocum herba Brasiliensis</i>	450. p. 2.	<i>Verbena Peruana perpetua virens</i>	ibid.
<i>Toxicum</i> in genere	645. p. 2.	<i>Veronica</i> in genere	282. p. 2.
<i>Tragum primum & secundum veteribus & in genere</i>	381. p. 2.	<i>Veronica vulgarior folio rotundiore</i>	ibid.
<i>Tragum alterum Dioscoridis quibusdam folio Trichomanis</i>	279. p. 2.	<i>Veronica spicata recta maior & minor</i>	ibid.
<i>Tragoriganum veteribus & in genere</i>	260. p. 2.	<i>Veronica maior & latior, foliis splendentibus & non splendentibus</i>	283. p. 2.
<i>Tragorigani species varia.</i>	291. p. 2.	<i>Veronica semina quibusdam, aliis Betonica Pauli Serpillifolia</i>	285. p. 2.
<i>Tragus spinosus Matthioli, quibusdam kali spinosum</i>	706. p. 2.	<i>Veronica petraea semper virens</i>	289. p. 2.
<i>Tribulus aquaticus albus</i>	789. p. 2.	<i>Veronica maior angustifolia caulibus viridibus</i>	284. p. 2.
<i>Trichomanes Veteribus & in genere</i>	762. p. 2.	<i>Veronica spicata recta quibusdam, aliis Lysimachia carulea</i>	ibid.
<i>Trichomanes siue Polytricum</i>	Ibidem	<i>Veronica saxatilis</i>	ibid.
<i>Trichomanes minus album</i>	763. p. 2.	<i>Vinosa siue Vinacea herba, rusticis gallis Minore dicta</i>	295. p. 2.
<i>Trichomanes ramosum</i>	Ibidem	<i>Viola barbata angustifolia Dalechampi</i>	335. p. 2.
<i>Trichomanes aquaticum Dalechampi</i>	791. p. 2.	<i>Viola in genere</i>	542. p. 2.
<i>Tridactylites rectorum</i>	790. p. 2.	<i>Viola Martia purpurea flore multiplicato maiore cum speciebus</i>	ibid.
<i>Tridactylites Alpina</i>	Ibidem	<i>Viola carulea Martia inodora siluatica in cacumine semen ferens</i>	543. p. 2.
<i>Trifolium paruum quoddam, siue Lotus pratensis purpurea Dalechampi</i>	86. p. 2.	<i>Viola montana folio multifido</i>	544. p. 2.
<i>Tubera in genere</i>	849. p. 2.	<i>Viola montana purpurea solidiore folio</i>	Ibidem
<i>Tuberum genus quibusdam, aliis Cerui boletus</i>	851. pag. 2.	<i>Viola Martia lutea</i>	ibid.
<i>Tussilago</i>	563. p. 2.	<i>Virga pastoris vulgaris</i>	752. p. 2.
<i>Tussilago Alpina minor folio rotundo</i>	565. p. 2.	<i>Viscago auricula facie Cretica, & varia alia Clusii Lychnides</i>	351. p. 2.
<i>Tussilago Alpina folio longo</i>	21. p. 2.	<i>Visnaga minor quorundam, Selinum peregrinum Clusii semine hirsuto</i>	94. p. 2.
V			
<i>Valeriana in genere</i>	207. & 208. p. 2.	<i>Visnaga</i>	31. p. 2.
<i>Valeriana maior odorata radice</i>	209. p. 2.	<i>Vlmaria</i>	88. p. 2.
<i>Valeriana sylvestris magna aquatica</i>	210. p. 2.	<i>Vluva</i>	799. p. 2.
<i>Valeriana minor pratensis.</i>	211. p. 2.	<i>Vmbellifera maximo semine, quibusdam Cachris panicula</i>	41. p. 2.
<i>Valeriana rubra latifolia & angustifolia</i>	Ibid.	<i>Vmbellifera Alsatica magna, umbella parua sabulea</i>	106. p. 2.
<i>Valeriana graca quorundam colore caruleo & albo.</i>	212. p. 2.	<i>Vrtica Romana siue mas cum glebulis</i>	445. p. 2.
<i>Valeriana peregrina, seu Indica</i>	Ibid.	<i>Vrtica vulgaris maior</i>	ibid.
<i>Valeriana minima Nardifolia</i>	206. p. 2.	<i>Vrtica minor annua</i>	446. p. 2.
<i>Valeriana bulbosa</i>	207. p. 2.	X	
<i>Valeriana tuberosa</i>	Ibid.	<i>Xeranthemum</i>	25. p. 2.
<i>Valeriana maior odorata radice</i>	209. p. 2.	<i>Xeranthemum aliud siue Parmica quorundam</i>	Ibidem.
<i>Valeriana sylvestris magna aquatica</i>	210. p. 2.	<i>Xeranthemi forte species</i>	26. p. 2.
<i>Valeriana minor pratensis vel aquatica</i>	211. p. 2.	<i>Xanthium siue Lappa minor</i>	572. p. 2.
<i>Valeriana rubra latifolia & angustifolia</i>	Ibid.	Z	
<i>Valeriana graca quorundam</i>	212. p. 2.	<i>Z Atarendi herba</i>	256. p. 2.
<i>Valeriana peregrina seu Indica</i>	Ibid.		
<i>Valeriana Alpina</i>	208. p. 2.		
<i>Valde bona dicta planta</i>	167. p. 2.		
<i>Verbascum silvestre salusfolium exoticum folio rotundiore</i>	307. p. 2.		
<i>Verbascum silvestre Monspelienfe flore Luteo hians</i>	Ibidem.		

FINIS



